









BIBLIOTHECA

MUSEI HISTORICO-NATURALIS

ROMAE

EX LIBRIS

TISSOT

ROMAE







BIBLIOTHECA

MEDICO-PRACTICA

*SIVE*

RERUM MEDICARUM

THESAURUS

CUMULATISSIMUS



BIBLIOTHECA

MEDICOTRACIA

LIBR.

REBAM MEDICAM

THESSAURUS

CUMULATISSIMUS



JO. JAC. MANGET. M.D.

# BIBLIOTHECA

MEDICO-PRACTICA

SIVE

RERUM MEDICARUM

# THESAURUS

CUMULATISSIMUS

QVO

OMNES PRORSUS HUMANI CORPORA  
MORBOSÆ AFFECTIONES

Tum ARTEM MEDICAM in Genere, Tum CHIRURGICAM  
in Specie, spectantes

ORDINE ALPHABETICO EXPLICANTVR

ET

PER CURATIONES, CONSILIA, OBSERVATIONES, ac CADAVERUM  
ANATOMICAS INSPECTIONES, tam hinc inde proprias, quàm à variis,  
iisque præstantissimis Authoribus, Veteribus & Recentioribus petitas,  
abundè imò & curiosè tractantur.

TOMUS PRIMUS.



GENEVE;

Sumptibus JOANNIS ANTHONII CHOUËT.

M. DC. XCV.





JO. JAC. MANGET. M.D.

# BIBLIOTHECA

MEDICOPRACTICA

ALVA

RERUM MEDICARUM

# THEZAVRUS

CUMULATIVUS

OMNIBUS REBUS HUMANI CORPORIS

INDICIBUS ET SYMPTOMATIBUS

ORDINE ALPHABETICO ET METHODICO

AB AUCTORITATE JOHANNIS ANTONII CHOUET

PARISIIS



GENEVE


JOHANNIS ANTONII CHOUET

M.DCC.LXX.



GENEROSISSIMO AC ILLUSTRISSIMO  
HEROI, D. D.  
ALEXANDRO A DHONA  
S. R. I. COMITI AC BURGGRAVIO;  
SERENISSIMO ET POTENTISSIMO  
ELECTORI BRANDEBURGICO  
*A Sanctioribus Consiliis*

Nec non  
EJUSDEM MILITIARUM  
PRÆFECTO GENERALI STRENUISSIMO &c.

ON diu mihi cunctandum fuit,  
ILLVSTRIS-  
COMES, cui demum quicquid  
meæ est opellæ in hâc concinnandâ atq;  
adornandâ Bibliothecâ Medico-  
Practicâ consecrarem: Siquidem in  
Te præter Virtutum ac Generis verè Heroici splendo-  
rem, Patronum habui non unò beneficiorum & bene-  
volentiae nomine venerandum. Munus reverà levidense,  
& tanto Viro minùs dignum, si ex propriis æstimetur  
vigiliis, Tibi offero: At illud si licet maximè ex Præ-  
stantissimorum Virorum curis æstmare; quicquid  
Ars Asclepiadæa nobilius habet, coëgit; quicquid  
felicior Praxis Mystas suos edocuit, revelat; quicquid



## DEDICATIO.

*tertiâ marique datum, aut etiam variò artificiò, multiplicique Chymistarum industriâ, tum ad sanitatem tutandam, tum ad eam cadivam rest aurandam, ac restitueudam, paratum, exhibet; quicquid denique solertior ac sagacior valuit Anatomia in ægitudinum & focus & causis retegendis, abundè complectitur, & sinû suò reconditum gerit.*

*At enim de opere ipsò quorsum multis apud Judicem proloquar, qui Philosophica ~~in~~ <sup>ex</sup> ~~libra~~ non minùs quàm Politicâ pollet, quique de librò non ex inscriptione, sed ex ejus diligenti evolutione sententiam ferre consuevit; imò qui Litteris omnibus Humanioribus, nontantùm leviter imbutus, ut solent plerique alii Magnates, sed in iis verè Doctus dici potest? Namq; & à tenerioribus annis, cum studiorum Tuorum cura mihi, non sine maximo honore, mandata esset, illis & gnaviter, & felicissimè incumbentem non semel miratus, summo cum gaudio jam tum vidi Te illa Virtutis foventem seminia, quæ Martialibus spiritibus hæreditario jure in Te corrivatis, & sedulò innutritis, maritata, in amplam illam maturuere segetem, quâ Bello Domique clarus alter ab utroque Cæsar meritò audire posses.*

*Hic vastus se orationi meæ aperiret campus, si de Magnanimorum Avorum Tuorum gloria, ab ipsa Domûs non minùs antiquæ quàm illustris origine, aliquid dicere animus esset. Ut enim taceam qui ex Ea priùs in Occitania inclaruere, primum producerem ALORSIUM illum de URPACH, qui Carolo Magno grandi suò meritò verè carus, & è terra patria in Germaniam adductus, ad fluvium Albim sedem fixit, ubi ex Imperatoris donò non tantùm urbem Dhona possedit, quæ Genti nomen dedit, quæque adhuc dum cum castri sui ruderibus superstes videtur; sed etiam COMITIS ac BVRGGRAVII*  
titulo,



## DEDICATIO.

titulò, quem fortitudine heroica verè meruerat, condecoratus est. Hic Imperii fines contra Wandalorum & Suecorum; barbarorum quidem, sed bellicosissimorum populorum, incursiones gnaviter tuitus est: Unde Caroli Magni successor Ludovicus Pius, donum ei concessum, Ejusdem hæredi **CONRADO I.** meritò confirmavit. Hic est ille Conradus qui insignis operis pontem Dresdensem, utramque civitatem conjungentem, extruxit, Familiæque vectigal ejus, vel saltem partem, acquisivit, quod demum ære Augustus Elector Saxonæ redemit; unde etiam ad nostrum usque sæculum eò ipsò in ponte, opere antiquò, **Dhonanae** Gentis insignia bicornia insculpta permanserunt. Tertius ab Aloysio mihi celebrandus veniret **HINCO** ille, qui annò Christi **xxiiii. ciz.** cùm Imperatoris **Ottonis** Vicarius esset, **Boleslaum** Bohemiæ Ducem cepit. **Haberm & VVIGBERTOS, VVILHELMOS, FRIDERICOS, HENRICOS, WOLFGANGOS, COLBATIO, ERNESTOS, IONAS, VVERNEROS, CHRISTOPHOROS, STANISLAOS, ABRAHAMOS, CAROLOS HANNIBALES, OTTONES, IARISLAOS, NICOLAOS, ACHATIOS, FABIANOS & CHRISTIANOS,** omnes rebus gestis verè claros, ac Christiano orbi caros, per quos **COMITVM & BVRGGRAVIORVM** dignitas, quæ in aliis innumeris **S. R. I.** Familiis expiravit, masculâ virtute, ac pari gloria longè propagata est. Verùm si è tot Virorum illustrioribus facinoribus tantillum quidem delibare intenderem, grandia complerem volumina. Quod de unò Fabianò, ut & de Christophorò ejusdem ex Fratre Nepote fecerunt Celeberrimi juxta & Nobilissimi scriptores **Wolsius & Spanhemius;** ambo istò etiam nomine, de Perillustri Domò bene meriti, at manifestè in eo lapsi quòd **BVRGGRAVII**



## DEDICATIO.

*titulum latinè per Vicecomitem reddiderint ; nonnullorum hâc ratione errori ansam præbentes. Nam præterquàm quòd neminem latere potest quanti sit Burggraviorum titulus, qui noverit illum apud Serenissimos Principes, Brandenburgicum ac Saxonicum titulis etiam aliquot Ducum præponi; liceat hic, ne fucus publico ulterius fiat, vel unam laudare Bullam Auream ab Augustissimo Imperatore Ferdinando III. annò MDCXLVIII. Dhonanæ Familiæ s. per hòc negotiò concessam, quâ constat Amplissimam Dhonanam Gentem **COMITVM ac BVRGGRAVIORVM** titulum ab ipsò Aloisio semper obtinuisse, tantumque abesse ut posterior, Burggraviorum nempe, titulus priori vel minimùm derogaverit; quin Familiam Illustrissimam ante plura sæcula ex Comitum dignitate ad Burggraviorum gradum evectam ac promotam esse expressis declaratur verbis, atque adeò Comites & Burggravii à Dhona, S. R. I. verè Comites ac Burggravii omnibus agnoscendi, hâc ipsâ aureâ Bullâ proponuntur & renunciantur.*

*At DHONANÆ FAMILIÆ, per matrimonia etiam Regibus, S. R. I. Electoribus & Principibus, toties, & vel novissimè sanguine junctæ, gloriam quid ulterius rudiori oratione elevatum eo? Quidque tot Nomina ac ejusdem Gentis Decora, jam ab aliis celebrata, æternùmque celebranda, hic cumulate tento? Dum in Te **COMES ILLUSTRISIME**, quicquid grande à tota illa Magnanima Gente actum est, compendiò quasi comprehensum demiror, ac collucere video. In Te, inquam, qui Virtutis Avitæ vestigia firmò premens talò, jam à puerilibus annis, ingentes versans animos, bello, quod contra Succos, laceßitus intentarat Augustissimus Heros Fridericus V Vilhelmus Elector Brandenburgicus verè Magnus, primùm interfuisti, ibique Tuis gnaviter gestis per omnes militiæ gradus ad Colonelli dignitatem ante decimum & septimum ætatis annum ascendere meruisti. Qui inde contra Turcas cum copiis Brandenburgicis in Hungariam profectus, in obsidione  
urbis*



## DEDICATIO.

urbis Granae aliisque in periculis, non parum inclaruisti. Qui ex Hungaria redux, aliò lauros rursus collecturus properans, in oppugnatione generali urbis Bonnæ, locum muris proximiorē, telisque hostilibus undique patentem totam noctem, duobus etiam sclopeti ictibus, at sine ulla noxa petitus, (quæ fuit Divina erga carum adeò pectus clementia) intrepidus obtinuisti. Nimius forem, si fortia alia facinora recenserem, quibus eò pervenisti, ut ab Augustissimò Electore Militiarum Generalem Præfecturam promeritus fueris, dignusque habitus sis qui Arci Pilau, totius Borussiae clavi, præponereris.

Ut in Bellicis Rebus fortitudinem, ita in aliis maximis negotiis Generositati Tuæ commissis; industriam ac solertiam summam exhibuisti. Quis enim non stupebit Te adhucdum juvenem, non tantum Serenissimo Electori à Sanctionibus Consiliis, sed etiam ab eodem in Poloniam Legatum dictum; solertia in rebus promptè conficiendis Viros grandævos, ac multiplicis experientiæ, longè superantem? Quapropter post aliquot annos, Serenissimi Friderici Wilhelmi Augustissimus Filius Electoratū potitus, Te continuò eodem, fœderum renovandorum causâ, remisit; Ibi Poloniæ Regi acceptissimus, brevè peregisti quæ aliàs Viros etiam consummatissimos, propter gravissimas lites subinde inter utramque Coronam enascentes, diu detinuerant; Indeque reportasti luculentissima sagacitatis ac scientiæ politicæ, aliarumque virtutum heroicarum, ab ipsò Sapientissimò & Fortissimò Rege testimonia, in aliâ ad eundem Legatione, eaque tertia, amplissimè confirmata, & cumulata. Nec sola Polonia Te in magnis agentem Ministeriis mirata est, sed etiam Succia: In eam quippe aulam delegatus, quid in rebus intricatissimis ac difficillimis prudentiâ & solertiâ tuâ valeres abundè ostentasti, & ab Augustissimo Rege, apud quem in magnò sanè nomine fuisti, profectus; ac per Daniæ iter faciens, Monarchæ isti non minùs quàm aliis commendatissimum Te præbuidisti.

Verùm;



## DEDICATIO.

*Verùm, quid iniquiore stylo tanti Viri laudes detero, Virtutumque, quas tota Germania ac ipsa Regna adjacentia demirantur & suspiciunt, aliquid hic propalare adnitor? Imò, quid vim facio modestiæ singulari, quâ meritissima etiam encomia aversaris ac rejicis? Sisto itaque gradum, COMES GENEROSSISIME, ne dum partem eorum quæ surdissima etiam Posteritas debitis prædicationibus in Cælum delatura, ac immortalitate donatura est, rudiori penicillo adumbrare satago, minùs gratus accedam; Deumque T. O. M. humillimè & totò pectore precor, ut TE, Illustrissimamque CONIVGEM, ac Generosissimam PROLEM, Nestoreos sospitet in annos; ad Aulæ Brandenburgicæ, imò totius Germaniæ longum decus, & ut Virtutibus Christianis, Civilibus ac Heroicis diu omnibus præfulgeatis. Sic ex animo vovebat.*

ILLVSTRISIME COMES.  
EXCELLENTIÆ TVÆ

*Dabam Geneva die Januarii  
28. Anni 1695.*

*Additissimus & obsequensissimus*

J. J. MANGET.






# BIBLIOTHECÆ MEDICO-PRACTICÆ LIBER PRIMUS

*De Affectibus à Litera A incipientibus*

## ABORTUS.



UIDAM confundunt abortum & aborsum, alii vero in eo disterre volunt, quod hic, fetus corruptelam primis mensibus inductam significet, ille vero, exclusionem fetus ad legitimi partus terminum propius accedentis, denotet. Graeci habent *κατάβολος*

& *καταρῆμα*, *κατὰ βολή* proprie est rejectio fetus sub forma ovi, *καταρῆμα* vero est ejectio fetus jam formati.

Abortus autem est fetus imperfecti exclusio præmatura caularum internarum, vel externarum vi excitata.

*Causa abortus proxima* est, vel uteri contractio, unde fetus crescentem continere minus capax est; vel præternaturalis relaxatio, quæ fibræ emolliæ conceptui arctius complectendo impares evadunt, ipsumque ante tempus præ facile explicabiles vias dimitunt; vel eundem uteri motus convulsi & contractivi, a plethora retinente, spirituum nimio influxu, aliisque irritamentis procreati.

*Causa abortus remota* est, vel commotio animi, vel nimius motus, saltus, st. mutatio, tussis, vomitus, immodicus alvi fluxus, vociferatio, ponderis gravioris suolatio, brachiorum fortis extensio, hæmorrhagiæ, terror subitaneus, atque, quamvis rariùs, insufficientis nutrimentum fetus à matre suggestum, ut etiam gestationis tempore frequentius adhibita & assumpta medicamenta, præcipue opiora.

*Signa abortus imminenti* sunt, tum jam memoratæ causæ graviores prægressæ, tum corporis rigor & horror subitaneus subsequente leviculo calore; item nausea, inappetentia, sitis major, dolor lateris, lumborum, atque totius corporis lassitudo, animi deliquium, cordis palpitatio, halitus fetidus, aliæque minùs univoca: Tum præcipue lumborum & coxarum gravitas insolita, atque ponderis vulvam prementis importuna sententia longè ante tempus partui legitimo vicinum, dolores vagi in imo ventre crebriùs recurrentes & ad pudoris usque sinum deorsum se extendentes,

cum involuntario conatu ex utero egerendi, eruptio sanguinis aquali, aut aquarum in membranis fetus obvolvendis contentarum, sicut denique uteri qualimutatus, ita ut qui priùs supra regionem pubis eminebat, deorsum jam inclinet: adde ex Hippocrate, mulieri in utero gerenti si mammae lubræ extenuentur abortit.

Quandoquidem autem non parùm interest nosse an fetus sit mortuus, an vivus; (ne mortuum excernendum retineamus) mortui fetus signa hæc habet ex Hippocrate, sc. judere oportet mulierem, ut modò quidem dextrum in latus, modò etiam in sinistrum convertatur; dilabitur enim fetus in utero quocumque se verrat mulier velut saxum, aut aliud quidpiam, si mortuus fuerit, & pectinem frigidum mulier habet. Item si cum iam movetur fetus corrumperetur & suffocetur, venter imus intumescit, & ad contactum velut ex ulcere dolet, febris & dentium fremitus eam prehendit, dolorque gravis & vehemens, ipsa pudenda, imum ventrem coxendices, laterum inanitates & lumbos detinet; *At hæc non sunt perpetua* addimus præterea si observantur femina se leviter aliquando ex repentina causa, terrore & simili inhominile talem horrorem morituri, seu morientis fetus signum esse, præcipue ubi brevi sequitur genitalium gravamen.

In omni abortu magis periclitantur femina, quàm in partu naturali, ac præcipue quo grandior fuerit fetus; sed in majori veriantur periculo teneræ admodum constitutionis mulieres, quamobrem, Abortum graviozem aliquando sequitur inflammatio, ulcus, hæmorrhagiæ copiosior, indeque enata syncope, imò deliria & convulsiones, hæc autem prehenlas, nullas se vidisse teratas asserit Aretæus: Imprimis periculosum est si prima conceptio per abortum rejiciatur, sic enim sterilitas aliquando inducitur, aut eadem mulier alii fetus ad suum terminum gerendo inepta æpissimè evadit.

Ubi abortus sit, cura nulla tenenda nisi ea quæ exclusionem faciliorem minoribusque tymptomatis stipatam faciat, periculum enim foret, ne si fetus mortuo, aut jam in egressu morituro, per astringentia à Medico adhibita via præcluderetur, in utero restitaret cadaverosa, atque inflammatoria maceria, millium symptomatum patens funesta.





Ad præſervationem autem in genere, commen-  
datur primariò verbena intus & extus adhibenda,  
ex eaque paratum extractum, aqua, & eſſentia, ſe-  
quuntur grana Kermes ſed ſincera, & quantum fieri  
poceſt recentia, indeque paratus pulvis, atque tin-  
ctura; Ebur & omnia ex ebore, ejuſque præcipuè  
gelatina in potu diſſoluta, cancri fluviatiles, qua-  
cunque demum ratione adhibiti, at in ſpecie eorum  
exſiccatorum pulvis quem ſpecifici antiabortivi ho-  
nore dignabatur Poterius. Corallia ex iſſique ex-  
tracta tinctura per ſpiritum cordis cervi; Germina  
ſeu porius Chalazæ ovorum gallinaceorum recent-  
ium tria numero cum foliolo uno auri in juſculi  
carnium cochlearibus aliquot ſoluta, atque non  
una tantum vice ſed per dies duodecim matutinis  
horis longè antepaſtum exhibita.

In ſpecie Ubi à plethora nimia, vel cachochy-  
mia periculum eſt abortus, utilis erit venæ ſec-  
tio, purgationeſque mitiores cautè adminiſtratz.  
Ubi à terrore, faciet pulvis Marchionis, item ſpe-  
cificum cephalicum ex dente hippopotami, ca-  
ſtor. &c. tinctura coralliorum & ſimilia. Si à frigore  
externo conveniet internè, aqua vitæ mulierum,  
baſſamus Embryonum, aliaque ſpirituola, externè  
inunctiones, ex oleo maſtichino, addito oleo ma-  
cis vel garyophyllorum aromaticorum atque cin-  
nam. ſtilatit. imò baſſamo Peruviano. Si ab ira  
conducat ex ebore parata gelatina ipſaque eboris  
ſubſtantia per aquatum vaporem eo modo ſoluta  
quo C. C. philoſophicè præparatur, hiſce permif-  
ceri debent acida, quo commodius bilis commo-  
vetur, nervolumque genus in ſpalmos deducere pa-  
rata, acrimonia temperetur, remediique pori per  
fermentationem ab acidis inductam laxiores eva-  
dant, & abſorbendis atque quaſi in carcerandis  
particulis efferatis magis idonei. Si ex tormini-  
bus, doloribusque cholicis, internè proſuius erit  
pulvis Zedoariæ, per ſe, vel ex crulta panis bu-  
tylo illita allumtus, externè verò piperatus inelle  
illitus, & caryophyllis aromaticis ſinapizatus re-  
gioni umbilicali admoſus. Si ex relaxatione, lau-  
datur unguentum comitiſſæ, item bdellium &  
maſtiches aceto diſſoluta, & inſtar emplatri regio-  
ni hypogaſtricæ applicata. Quæ autem vi attri-  
ctiva validiore ſunt prædita, qualia ſunt balnea alu-  
minola, non ita tutò in præſervationem adhiben-  
tur, quia vaginam anguſtiorē, partumque diffici-  
liorem & laborioſiorem faciunt.

Abortu factò mulier extenſis atque cruciatis  
cruribus immota in lecto maneat, extremique ſub  
ltragulis ita contineat, ut omne frigus vel leviuſ-  
culum ab illis arceat, ſi verò non ſic ſatis reprimat-  
ur hæ. northagia nimia, ad remedia, ubi de lochiis  
nimis, explicanda, confugiendum.

### Curationes, Conſilia, Obſervationes & Ana- tomice Inſpectiones è variis Autoribus.

#### Curationes.

Nihil melius ſcio quam in victu non errare, ne  
vitioli humores in corpore colligantur, dein-  
de ut vitet affectuum immoderationem, iram, cu-  
ras, vehementes corporis motus, & quidquid  
ſanguinem poteſt commovere. Ad ſanguinem li-  
ſtendum ſi torré fluat, & ſanguinis boni adſit co-  
pia, tuaderem & ego, ut cæteri medici, venæ ſec-

tionem, nec moveret me Hippocratis autori-  
tas, qui venæ ſectioni in graviſſis tantoperè ad-  
verſatur, cùm noſtro tempore diæta alia ſit, quam  
olim fuerit, & experientia teſtetur, ſæpe multos  
gravidarum morbos venæ ſectionem poſtulare &  
ferri ab iſis ſine incommodo, aliqui ad ſanguinem  
liſtendum prædicant pulverem ranæ ultz in olla re-  
centi in ſacculo de collo appenſum, experiri licet;  
Contra abortum utilis eſt hic pulvis manè ſumptus  
in ovo ſorbili. ℞. rad. biſtor. ʒj. granor. Kermes,  
ſem. plantag. portulac. ana ʒß. coriandr. præp. ʒij.  
ſacchar. ad pondus omnium, fiat pulvis Joann. Cra-  
to. Conf. 32. lib 4.

Quando menſes tempore convenienti non  
fluunt, ſuſpicio eſt mulierem concepſiſſe, nihil tamen  
adhuc agendum, donec altero menſe, quòq;  
menſes non rediſſe certum ſit: tunc incipiat iſis  
quæ conceptum retinent, & uterum firman, uti;  
primùm ceratum ſequens lumborum regioni noctu  
cubitum itura applicet, illudque totà nocte reti-  
near, idque ſaltem ab initio tribus noctibus ſemel,  
& poſt menſem quartum, alternis noctibus, &  
quò magis uterus creſcit, eò frequentius mutan-  
do aliquoties locum, ita ut quando quater in  
lumbis geſtavit, poſtea in ventre ſub umbilico  
totidem noctes ſerat. ℞. Rad. biſtor. ſem. co-  
riandri ana ʒij. nuc. cupreſſi, ſantal. rubr. hypo-  
ciſt. ana ʒj. ladan. maſtich. ana ʒß. thur. bdell.  
ana ʒij. corall. ſuccin. ana ʒj. pulveriſanda, pul-  
verifentur, & excipiuntur oleo maſtichino, ad-  
dendo ceræ, & terebinth. q. ſ. f. cerata quadrata duo  
vel tria ad uſum, Interea uratur tabulis, quæ mirè  
ad abortum præcavendum ſunt utiles, capiendi  
unam alternis vel ternis diebus manè. ℞. ſe n.  
coriandr. præp. ʒij. radic. biſtor. raf. ebor. corall.  
rubr. ana ʒj. ſuccin. cryſtall. ana ʒj. cocc. intect.  
ʒß. ſacchar. diſſolut. in aq. roſar. ʒiv. f. tabulæ  
ponderis ʒj. lapides azites, lazuli, jaſpis, brachiis  
alligati proprietate juvare creduntur, caveat cum  
uterum geſtat à nimio motu, ruſſi, ſternutatione,  
ab aromatibus nimis, & vino generoſo. Felix  
Platerus Obſervat. lib. 3. pag. 744.

Inter intrinſeca pulvis hic noſter ſi frequenter  
ex vino propinetur magnoperè profuturum non  
dubito. ℞. Spec. diamar. utriuſque ʒß. pulv.  
cancr. fluviatil. ʒij. coagul. lepor. pulv. ʒj. corall.  
rubr. ʒij. m. f. pulvis cujus ʒj. ex vini alb. ʒiij.  
vel ex aq. plantag. horis 4. ante cibum, bis, terve  
in hebdomada exhibeatur. Inter extrinſeca, quæ  
lumbis, ſpinæ doſi liberè reſicta, & locis appo-  
nuntur, eſt imprimis unguentum celebratiſſimum  
Comitiſſæ appellatum, probatiſſimum eſt ſubſcrip-  
tum ceratum, quod ſæpius feliciter uſurpatur. ℞.  
Thuris, maſtich. ladan. ana ʒß. lapid. hæm. r. bol.  
armen. coagul. Leporis, rat. ebor. ana ʒj. refin.  
pin. q. ſ. f. ceratum ſ. a. quod applicatum lumbis  
non immutetur, niſi decem dierum ſpatio adhæ-  
ſerit detineatur tribus à conceptu menſibus, deinde  
auferatur, detur quandoque pulv. corall. rubr. ʒj.  
ʒj. in ovo ſorbili. quod ſe nedium licet vulgare  
ſit, ad hoc tamen officium efficaciſſimum eſt. Joann.  
Zecchius Conf. 94. & 86.

Admoveantur regioni ureti ceratum infra ſcrip-  
tum mihi pluries expertum & ad octavum u que  
menſem geſtetur. ℞. Maſtich. ʒj. ladan. ʒvj. rad.  
biſtor. ʒv. nuc. cupreſſi, hypocit. ſang. dracon.  
roſar. tur. ſantal. rubr. menth. ſicc. coriandr.  
præp. gall. moſchar. terr. ſigill. ana ʒij. ol. oliva-  
rum, ceræ citrin. terebinth. claræ, picis ana q. ſ. m.  
f. cer.



f. ceratum. Sed. & quæ à proprietate abortum prohibent non sunt negligenda, quare intus pulv. cancr. fluviat. coaguli. leporinum, lapis aquilinus pulveratus & ex vino nigro austero datus non improbat. *Julius Cesar Claudinus Consult. 34.*

℞. Granor. Kerues ʒj. lantal. rubr. ʒss. caryophyll. nuc. mosch. ana ʒj. rad. tormentill. ʒss. margarit. corall. rubr. præp. ana ʒj. fol. aut. num. iij. manus ch. perlac. ʒiij. f. pulvis sumat ad ʒj. cum paucio vino rubro. *Rodericus à Fonseca Consult. Tom. 2. Consult. 71.*

Occultam proprietatem habere conium equi manini pro retinendo fœtu in utero certum sum, ex quo si hac zona, & toto gestationis tempore juxta carnem cinguli modo feratur, abortus non continget, quod auxilium plurib. incallum tentatis præstantissimum temper inveni. Si haberi nequit utere zonâ ex lupino cocto parata quam huic usui esse mirabilem fidelissimo experimento adveni. *Zacutus Lusitanus Praxeos Medic. Admirand. lib. 2. Observ. 150.*

Ubi metus est abortus propter concussionem vel calum ventris inferioris, gravidam dispone in lectum, ut quiescat, & singulis diebus manè exhibe cum ovo recenti cocto gallatatas numero 7. vel 8. cum lactico Kermitino ad ʒj. incito minutissimè, vel tantundem granorum Chermes; ventri autem pro confortando fœtu impone sacculum c foliis cupressi, majoran. & rotmarin. in vino & aqua coctis. Sic conservabitur fœtus ad justum parienti tempus, ex obstetricæ gallicæ. *Wolfgangus Haesernus, Hercul. Med. lib. 7. cap. 3.*

Abortum impediunt magisterium corallorum & perlatum, si capius cum aqua vitæ mulierum, vel aqua lilior. convall. detur, tinctura corallor. ritè rectèque parata abortum prohibet, si gestationis tempore prægnantes ejus accipiant gutt. iij. vel iv. singulis mensibus bis; à proprietate succus Astaci unius contriti, & expressi in vino bono datus singulis mensibus semel vel bis, fœtum nunquam abortivum nasci sinit, nisi externâ vi impelatur. Sic sal Astacorum fluviatium dextrè paratus, & singulis septimanis cum amygdalatum dulcium decocto in vino malvatico maceratus mirabiliter fœtum conservat dos. gr. iij. iv. v. (vinum ne bibant, pellit nimirum lactum.) *Joann. Hartmann. in Praxi Medica.*

Valdè efficax est sequens opiata ℞. Conserv. ros. ʒij. cortic. citr. condit. ʒvi. pulp. dactyl. myrob. condit. ana ʒss. corall. præp. margarit. præp. & ras. ebor. ana ʒj. cum syrup. cydonior f. opiata, de qua capiat frequenter magnitudinem castanæ, quamprimum dolores & tormina apparuerint in ventris fundo, versus pubem, in lumbis & osse sacro eorum sedationi incumbendum est, tam sumptis quam admotis, pro varietate causarum adhibitis, si ob cruditates & flatus excitentur (quod frequentissimum est) exhibendus erit pulvis ex aromatico rosato & sem. coriandr. compositus, in aqua imperialis exhiberi poterit, si major sit pituitæ & flatuum congeries, eodem tempore applicentur abdomini camminantia, ut sacculi ex tein. anis. fenicul. sanugræc. florib. chamæmel. sambuc. anthos & stibæados compositi, vel placenta rotacea friza in sartagine cum vino generoso & pulv. nuc. moschar. & coriandr. conspersa, si hisce dolores non cesserint, inji iaturelyster ex vino & oleo confectus in quo phitonii rom. ʒij. dissolvi poterunt; aut etiam narcotica per os, in minima dosi exhiberi, ad

fixandum flatuum & humorum impetum. Sequentia duo remedia pro secretis habentur, & factum certò retinere creduntur, si antequàm fœtus à cotyledonibus divulsus fuerit, ulupentur ℞. fol. aut numero xii. spoadi ʒj. germinatium ovorum non subventancorum m. l. probè, postea dissolvantur in dimidio cytho vini albi, & detur manè per triduum. Eodem tempore sequens cataplasma admoveatur. ℞. Thur. masculi pulv. ʒij. album. ovorum nam. v. agitentur simul super prunas temper movendo ne concrecant, addendo terebinthinam, postea stupis excipiantur, & quantum teste poterit, calidissima umbilico applicentur, bis in die, manè & serò per triduum prædictum. *Lazarus Riverius.*

Ante partum abortus præcaveri debet V. S. Si mulier sit plethorica; purgatione, si cacoehymia adsit, matricis frigiditas, lubricitas & humiditas est corrigenda, si ea in causa fuerit, & quidem thermis, sudoribus, aliisque. Affectus uteri, si qui adfuerint, removendi. *Graviditatis vero tempore* ea omnia fugienda, quæ vincula fœtus vel laxant, vel rumpunt, vel uterum debilitant, vel expultricem ad expellendum irritant, vel fœtui alimoniam subtrahunt, vel vitiosè alunt, vel potius enecant, vel aliâ quacunque ratione matrem, vel fœtum offendunt. Bona è contra convenientisque *Diaeta* præscribenda matri, eique foris ac intus medicamenta appropriata ordinanda V. G. ℞. pulv. contra abort. August. ʒij. magist. corall. cum succo citri. ebor. sine & parati, granor. mastich. ana ʒij. m. f. pulvis. dosi ʒss. ad ʒj. cum vino rubro aut ovo sorbili. ℞. Mag. corall. cum succo citri, ebor. sine & præparati gran. mastich. ana ʒj. pellic. ventr. gallin. ʒiv. m. f. pulvis sumat manè scilicet in jusculo carnis, horâ 3. vel 4. & ante somnum. ℞. Aq. verben. plantag. ana ʒj. syr. corall. ʒi ss. tinctur. corall. ʒij. misc. ℞. Tinctur. corall. ʒiij. Dos. 20. vel 30. gutt. ℞. Balsam. embryon. ʒiij. Dos. ʒss. ad ʒj. Potest etiam hic balsamus embryonum seu puerorum optimè applicari cum vino malvatico ex pane tosto: item pulv. nuc. moschar. mac. & caryophyll. crustæ panis aquâ appropriata quâdam madefactâ, aspergitur, prodest etiam pulvis perlatum & corall. læpius cum aq. lilior. alb. vel vitæ mulierum sumptus. Externè ℞. unguent. Comitiss. ʒi ss. olei mastich. cydon. ana ʒi ss. misc. fiat litus. ℞. unguent. Comitiss. ʒj. olei Omphacn. ʒiij. misc. fiat litus, potest etiam emplastrum contra herniam regioni Lumborum & hypogastrio imponi. Si à nimio frigore, internè prodest aq. vitæ mul. & balsamus embryon. externè verò potest fieri inunctio. ℞. olei mast. ʒss. dest. nuc. mosch. gr. iij. macis gr. iv. caryophyll. gr. iij. cum ol. nuc. mosch. express. f. linimentum. Si a terrore ℞. aq. cerasor. nigtor. flor. tilia, epilept. Lang. ana ʒj. syr. corall. præp. ana ʒvi. tinctur. corall. ʒj. misc. ℞. aq. borrag. buglos. Balsam. embryon. ana ʒj. corall. rubr. præp. margarit. præp. ana ʒss. misc. vel ℞. aq. epilept. Langii ʒi ss. Cerasor. nigr. flor. tilia ana ʒij. pulv. March. ʒi ss. Smaragd. præp. ess. de C. C. gran. xii. syr. corall. præp. ana ʒiij. misc. Ajunt pelliculas ex ventriculis gallinarum extractas pulveratas, & diebus aliquot manè aurei pondere cum vino jejuno stomacho assumptas certò abortum præavere. Ide n facere perhibent radic s eryngii veti emplastri modo hypogastrio impostæ. Cum radi-

mentis futuri abortus apparet, per aliquot guttulas



sanguinis ab utero stillantes, mulier deglutiat cor pulli ex vivo extractum & adhuc palpitans. Arites de collo suspensa gestetur, magnes umbilico admoveatur & applicetur, tanacetum manu calefactum tenendo. Ceterum *gravida abortum passa* per omnia ut puerperæ tractandæ, viretque illarum convenienti victus ratione corroborandæ. Sæpe enim magis debilitantur abortientes, quàm tempestivè parientes & gravioribus affliguntur symptomatibus. *Joann. Michael.*

### CONSILIA.

*Pro abortu præcavendo* contineat ceratum dorso appositum. Secundo obducantur duo cauteria, nuperrimè coxis inusta, utpote quæ molestiam atque dolores, ut ex relatis habemus continuos inferant, & abortum facilius conciliare possunt: per os verò assu nar quotidie, matutino tempore, quinque aut sex guttulas tinct. corall. quandoque etiam semidragmam margarit. præp. nonnunquam & ʒj. pulv. mastich. & granor. tinctor. omnia dissoluta in aqua aut jure plantag. aut in aqua foliorum quercus: aliquod quoque à proprietate juvans in usum revocandum, tum internum, tum externum. Internum quidem, pulvis ex matrice leporis paratus, sive internæ membranæ ventriculorum gallinarum. Externum lapis aquilinus brachio alligatus, sicut & lapis magnes umbilico appositus.

Cauta autem admodum atque accurata esse debet victus ratio, & potissimum in cibi & potus quantitate & qualitate, quantitas enim parca nimis mihi videtur, cum gracilis valde sit matrona illustrissima, & præterea in præsens, & mater & foetus nutriendi sint, quamvis ciborum qualitate illi suppleri possit, ut nempe sint faciliis coctionis, faciliis distributionis, & optimi nutrimenti, & ut quidem nutrant, ac non graveant. Sic prima mensa hauriat cochlear instaurantis in jure, tum in prandio, tum in cœna: & quoniam nox hoc tempore longior est, manè diluculo, cum jam dictis pulveribus, vel sine illis, idem instaurantis erit repetendum. Ova autem recentia, torbilia, duplici nomine aptissima fuerint. Sed præterea non minor esse debet motus cura, cavendo Rhedam, & domi hærendo. A viro suo sejuncta dormiat, nec unquam ipsum admittat, atque domesticis omnes occasiones præcavendæ, quæ ejusdem animum turbare aut commovere possint, quæ pauca pro statu præsentis, satis. *Raym. d. Joann. Fortis Consultation.*

Nobilissima & formosa femina, calidioris, & humidi temperamenti sexto mense gravida, non ita pridem, circa horam octavam matutinam, die xxii. Novembris (febris malignis petechialibus grassantibus) ætatis anno xxxii. sibi Climacterico, nulla cæteroquin præviâ causa extemâ, dolores crebros circa ventrem & lumbos, versus pubem & os sacrum desinentes, magnūque ex utero egerendi conatum sentiens, cum copiosæ aquæ & sanguinis ex utero fluxu, factum benè formatum, sed mortuum, totoque corporis habitu luteum & ictericum, enormique molâ stipatum, cum secundina livida plane, inter animi deliquia minimè simulata, exclusit. Cum ve d prædicta matrona jam binâ vice peperisset filios, intra decennium à partu

ictero extinctos; foetus hic mortuus, adstantium jussu à me dissectus, monstravit non tantum ventriculum cum intestinis bile repletum, sed & ipsum hepar aridum, splenem scirrhum, pulmones corruptos, & cor flaccidum; causas interitûs sat evidentes.

Quomodo autem ejusmodi abortus præcaveri possit? operæ pretium est inquiratur. Suaderem ego Gravidæ, ut medio gestationis tempore viis primis evacuandis lenè purgans sumeret ex manu. ʒij. & postea sanguinem mitteret non ex venis erurum, sed ex mediana vena dextri brachii, hisque præmissis & servatâ bonâ diætâ, omnes res lex naturales complectente, alterantia, bilem edulcorantia, ab ictero præservantia atque roborantia v. g. syrup. corall. agrestæ, acetos. citri, rubi idæi, cerasor. condit. Pulveres margarit. corall. & lapides pretios. C. C. alcis, cooris &c. de quibus paulò post, usurparet.

Quoad Diætâ, talis gravida fugiat aerem caliditate aut frigidity nimia excedentem, putridum, foetentem, herbas fortiter olentes, fumum sulphuris, catorei, lucernarum extinctarum. Cibi sint boni succi & faciliis coctionis, abstineat amaris, salis, pipetis, & crudis cibis, atque omnibus aliis rebus bilem augentibus. Potus sit, si cerevisiæ adfusa fuerit, cerevisiâ tenuis defæcata, infusione radicum caryophyllatæ, & corticibus citri confecta: sin vino, bibat album tenue, acidulis ubi haberi possunt permixtum, quantum loco interdum atque quot guttas elisi possit instillare.

Ex pharmaciâ, præter supra enumerata, gestationis tempore sæpe sumat dragmam unam sequentis electuarii, & quandoque aquæ descriptæ ʒj. proderit etiam usus rotularum inferius descriptarum, si unam alteramque per vias assumpserit. Singula etiam hæc medicamenta biem alterant, ejus fervorem mitigant, vires quoque tum matris, tum embryonis roborant, ipsumque abortum præcavent.

℞. Conserv. rosar. ʒj. borrag. bugloss. papiv. errat. ana ʒss. cortic. citr. condit. ʒjss. extract. lign. aloës ʒss. spec. diamargar. frig. ʒj. syrup. corall. q. s.

℞. Spec. diamarg. frig. ʒij. sacchar. aq. borrag. solut. ʒijss. mîsce t. rotulæ.

℞. Balsam. Embryon. ʒij. aq. borrag. bugloss. ana ʒss. tinct. corall. cum sp. panis parat. ʒss. syrup. corall. ʒij. mîsce.

Si suis nimia urgeat, oris amari tudo molestiam pariat, & vomitus accidant, frequenter sumat Sympum de Agrestæ, Sympum corallorum succum citri, in cibo frequenter ut ut et mala citria, succum granatorum, rubi idæi, & post cibum succum cydoniorum. Pro ipso facinoroso torporando extemâ abdomini sæpius lin eamine exceptus applicetur Balsam. embryonum, panis item mellitus aut saccharatus vino Hispano intortus, dorsum inungitur unguento Comitillæ composito v. g. ℞. unguent. Comitillæ ʒj. olei succis. express. ʒj. mastich. elect. ʒij. mîsce lento igne adde ol. ovorum q. s. pro linimento. *Joann. Michael.*

### OBSERVATIONES.

Femina quædam primaria Liptæ aliquoties periclitata de abortu, sub medium gestationis tempus



pus utebatur vino malvatico, cum panis frustulo eodem imbuto, mane jejuno ventriculo. Ita insigniter roborato sætu feliciter enitebatur; vinum malvaticum cum amygdalis celebratur ad idem apud Sennertum. *Hier. Rensnerus.*

Mulier quædam n. 13. H. b. tom. 1. de imprægnationis cervicis cocturæ adhibens, situlamque pleniorē in priuventius tollens, abortum terē rejecit, ruptis membranis & exitum embryone moliente, fortē empyricus præfens ad omnia audix, huic incommodo succurrere satagens, iussit sine mora, & sitū prægnantis, & manus dexteritate, repōnendum tæm. Capite igitur gravidæ declivi, elatiquē eructans, osteritix subtili manu opere- ra embryonem proditarum intrulit; statimque peractâ operatione in lecto compoluit matrem, ut fœtus repositus solitum locum repereret, fluxu- re tamen lochia ad tertium diem, ad membranz ruptæ regenerationem fuisse idem congressum cum marito; hinc retentus fœtus justo tempore, deinde fuit exclusus, adhuc superstes. *Thomas Bartholinus.*

Mulier quædam *Monspeliensis* tres abortus con- sequenter passa erat variis gestationis temporibus, jam verò à duobus mensibus gravida pariebatur dolores circa umbilicum & lumbos, qui abor- tum minabantur, alter medicus duo emplastra præscripserat lumbis, & umbilico admovenda, ex mass. emplastr. pro fræctur. unde melius habuit ad aliquot dies, postea verò iidem dolores re- versii. Vocatus ego advertens mulierem juvenem & sanguineam, venam secari jubeo, unde intra paucas horas à doloribus, & metu abortus om- ninò liberata est. Sanguis erat valdè serosus, tan- dem ad præcautionem præscribo rhab. pulv. ʒ j. cum jusculo iterandam semel in septimana per mensem, unguentum astringens lumbis, & ventri admovendum pridie purgationis, & opia- tam astringentem, postmodum rhab. quibus tamen non ulla est, symptomata illa accesserant eo protius tempore, quo me struas purgationis pari- continebat extra graviditatem, tertio deinde mense eadem symptomata redierunt & venæ sec- tione statim liberata est, quarto iidem, quin- to, sexto, septimo & octavo, iidem symptomati- bus periodicè recurrentibus, iterata est venæ sec- tio, & statim liberabatur; ultima venæ sectio celebrata fuit octo diebus ante principium noni mensis, cum eodem fructu, & in fine noni mensis peperit filium bene habitum & vitalem, sed pallidiusculum. *Lazarus Riverius.*

Aliquando vidi juvenculam quatto mense gra- vidam quæ per scalas deciderat in cellam & exin- de insigniter retrecta, ita ut ferè per dimidiam noctem non sentiret motum tætus alias alacris, præscripti sequentem *misturam*: ʒ. aquæ flor. lil. convall. ceratior. uigrot. epilept. langii ana ʒ j. ebortis sine igne par. ʒ. ʒ. specific. cephalic. ʒ j. pulver. Marchionis ʒ. ʒ. Ther. Matrich. ana gr. v. Syrup. corall. Quercet. ʒ. ʒ. de qua mistura non ingrata capiat libinde benè agitata, aliquot coch- learia: unde factum est, ut benè postmodum ces- saret alteratio à pavorē inducta, & tortus inde ro- boratus denuò se alacriter moveret: applicatâ. Si- mul externe abdomini crustâ panis cum vino malva- tico. *Michael Eschmullerus.*

### Anatomica Inspektiones.

Nobilis Matrona multis annis gravissimis Rē- num doloribus sinistro præfectum in latere ab ini- tio divexabatur, & quatuordecies uterum ge- stans, toties octavo vel nono semper mense abor- tivit, &c. Eam mortuam cum secatem, renem sinistrum penitus consumptum deprehendi. Dex- trum verò tumidum in immentum excrevisse, in quo per medium dissecto calculus justæ magnitu- dinis excreverat, &c. *Platerus Observ. lib. 2. pag. 467. præcos lib. 2. cap. 12.*

Anno 1605. matrona cacochymica circa quin- tum mensem imprægnationis parturientium dolo- ribus correpta, post maximos ac diuturnos co- natus gemellos cum multa aqua enixa est, fœ- mellam scilicet ac masculum. In hoc d. dissecando sequentia annotavi, 1. abdomen non secus ac hy- diopictorum, aqua plenum erat: 2. Testes extra abdomen non propendebant, sed in ventris capa- citate residebant, & quidem eo loci in quo vasa spermatica ad fœtorum descendunt: vasa sperma- tica tam brevia erant, ut extra ventrem propen- dere non potuerint. 3. Hepar supra modum ma- gnum, inflatum & aliquo modo lividum. 4. me- senterium & renes inflammata. 5. Urachus sine cavitate ulla, neque stylo reperiri potuit: imò nec ipsa vesica apparebat inflata. 6. Vesica rugo- sa plane & vacua, præter quàm quòd humor vis- cidus ei ad latera, non secus ac in intestinis vi- dere licet, adhærebat. 7. Cutis undiquaque mac- culis, ut in febribus pestilentialibus conspersa. *Fabricius Hildanus Cent. 2. Historia 59.*

Mulierem satis laudatæ sanitatis quinto mense abortientem vidi: cumque fœtus ferè nullam in morte mutationem pertulisset, ipsum secui, de- siderio impulsus an aliqua necis causa in tam ro- busto fœtu innotesceret; cum ipsius mater valida hujusmodi abortus nullam affertret causam.

Secundo corpore, in cavitate thoracis sub jugu- lo dextro lucidam vesicam, aqua plenam, arte- riæ asperæ adhærentem inveni, quæ copiosa, hu- mori inundatione, quam recipiebat à capite, in pueri valdè humido, eventilationem cordis pro- hibuerat ipsum suffocando. *Dom. Panarollus pen- tec. 1. Observ. 5.*

Anno 1644. Nob. matrona q. into mense gra- vida, post fluxum triduanum uteri eruentum, abortum patitur atque fœtum efficit masculum, quoad omnes partes perfectum quidem, quan- titate tamen deplumatum tætum vix æquantem, exsuccumque & aridum. Vasa umbilicalia erant instar filorum communium usualium, collo cir- cumvoluta & quasi alligata non tamen brevia, uti duplici exemplo exponit *Hildanus*: nec dis- rupta, uti aliàs *Bauhinus* notavit. In dissectione norabantur partes singulæ d. ceteræ, hepar albicans & exsuccum, cor pallidum, vasa umbilicalia sic- ca: sub noctem secundina prodit putrida & fetida. *J. Dan. Horstius. Observ. Anat. 5.*

*Torentina Mayer*, ætatis tempore anno 1605. ad quinti mensis finem ferè signis omnibus fœtus vivi apparentibus, gravida fuit: circa finem verò quinti mensis fœtus primò imbecilliter moveba- tur, ita ut vix perlentiri potuerit: d. inde paula- tim & intra paucas dies omninò cessabat moveri, mammae q. loque, quæ ante lacte turgiebant, tunc subsidebant, flaccescebant & exsiccabantur, alia-



que signa aderant ex quibus foetum in utero mortuum esse facillimè conicere licuit: Tandem circa finem octavi mensis, parturientium doloribus correpta, enixa est masculum, quem per tres menses fere mortuum gestaverat. Longitudinem spithamæ cum dimidia non excedebat, oculi ex suis orbitis seu capsulis propendebant: os item apertum, caput nigrum, & flaccidum erat, interium tamen foetor nullus aderat: hepar uterinum integrum, sed flaccidum pallidumque inspiciebatur. Chorda, ut vocant, umbilicalis, quæ communiter & in omnibus ulnarum aliquot longitudine esse solet, vix spithamæ erat longitudinis.

Hujus abortus causam nullam aliam invenire potuimus quam malam ac ineptam conformationem vasorum umbilicalium: hinc perspicuum fit crescentem foetum in utero materno paulatim placentam ab acerbulis sive cotyledonibus abstraxisse, & separasse: abstracto autem hepate uterino necessitudo moritur foetus. *Fabr. Hildan. Cent. 2. Obs. 50. & 51.*

Domina illustis per multos annos affectibus spasmodicis obnoxia, potissimum verò quoties utero conceperat pathematis convulsivis, quasi hystericiis supra modum tentari solebat; sub finem tertii mensis gravida, quo tempore constanter abortire solebat, menstrua eruperunt, quibus per duos aut tres dies una cum membranarum laceratarum frustulis descendentibus abortum expectabat. Tandem uteri sarcinam deposuit, & demum apoplectica interijt.

Quoniam uteri principaliter affecti suspicio ferebatur, quantum hoc viscus meruerat proximè inquirebam: quod in debito situ, & quoad omnia sanum & rectum reperi. Circa uterum aut appendicem ejus, nihil extrabat, cui tanquam causam morbificam imputari potuerit: At verò principiam & originalem morbi causam in capite quærivimus, haud frustra: nam omnes cerebri cavitates & anfractus aqua implens, ejusque totam compagem quasi inundans cernebatur; Juxta nervorum splanchnicorum origines aqua se plurimum insinuans piam matrem, medullæ oblongatæ caudicem, per duos digitos latos separaverat, proculdubio horum nervorum ductu materies morbifica à capite in mesenterii plexus descendens, & dolorum & spasmodum, & hoc consensu abortus, causa existeret. *Thom. Willis Patholog. cerebri cap. 10.*

Cum in oppido Reinheimb, Phil. Rheimichii uxor, concivis conjugem ultimo mense gravidam, non tantum jurgiis prosequeretur, sed & dextræ parti capitis, ipso tum ardente lyrio impingeret, editus paulò post infans, in ea ipsa, qua mater concussa fuerat parte, continui solutionem passus: Re ad me delata, misertus pauperulæ ocyus illuc concessi, atque deprehendi continui solutionem ad ipsum cerebrum penetrare, portionemque ipsius cranii fractam jam putredinem concepisse. Licet autem externa & interna roborantia fuerint exhibita, putrida etiam portio cranii execta, multaque fetida purulenta materia extracta, brevi tamen infans demortuus, sequentia notanda dedit: Venulæ fuerunt turgidæ, ventriculi cerebri aqua repleti, cerebri substantia flaccida. Inter cerebrum & meningis aderat collectio materiei purulentæ & fetidæ.

Quæsitum an verberans fuerit causa hujus mali? Respondi quod sic, cum etiam à minis partium

conformatio virari possit in foetu: sic narrat *Gemma Cosinocr. lib. 1. c. 6.* infanti eadem calvaria parte, cui in matre acies minitabatur, magnum continuitatis divortium apparuisse: facile enim imaginationi formationem mutare, etiam in ultimis gestationis mensibus, teste *Sennertol. lib. 4. p. 2. Sess. 4. cap. 7.* quomodo verò hoc fiat, id citato loco ostendit patiensque noster de causis similitud. & dissimil. in foetu, &c. *Joh. Dan. Hartliu Observ. Medic. 2.*

## ABSCESsus.

Græcis dicitur, *ἀσκήνη* denotatque tumorem præter naturam cujus materia vel induruit ac Schitrum facit, vel in pus, aut saniem abit. Hæc rursus est vel cum, vel sine folliculo. Folliculo contenta materia, vel pultis speciem refert, unde *atheroma*, vel mellis, unde *meliceris*, vel sevi, unde *sphæatoma*. De hisce omnibus legantur quæ suo loco.

Hic tantum curationes aliquot generales cum observationibus abscessus particulares spectantibus, anatomicisque cadaverum ipsis denatorum inspectionibus adjungemus.

### Curationes generales.

Quando pus conficitur mitè commendatur oleum chamomillæ & oleum lumbricorum. Conveniunt anodyna, ut & oleum hyoscyami parè aliis admixtum, quod multum quoque facit. Item cataplasma ex lumbricis; non solum enim dolorem lenit, sed etiam abscessum rumpit. Sic etiam protunt folia hyoscyami parè adhibita & aliis admixta. Inter maturantia convenit unguentum maturativum Felicii Wurzii, ol. chamomillæ, & liliorum alb. Cum pus fieri incipit, acuminibus illinatur pinguedo leporis: Deinde imponitur emplastrum viachylou sive cataplasma ex mucilaginibus, additis rad. althææ flor. malvæ &c. Ad mundificationem profunt præcipue medicamenta ex nicotiana v. g. oleum ejus succus, & unguentum, quæ etiam simul consolidant, Item apium. Ubi verò opus est efficaciori, prodest unguentum diapompholygos. Inter sarcotica & epulotica mitè prodest nitrum & medicamenta ex eo parata. Item emplastrum Italicum Crollii vel Paracelli, emplastr. diapalma cum oleo nicotianæ malaxatum. *Joann. Michael.*

Cura abscessuum est eadem quæ ulcerum: propinando internè potiones vulnerarias, in specie salia volatilia, quibus massa sanguinea purificetur, & fermentum stomachale in naturali vigore conservetur, & acidi proventus prohibeatur. Externè probè mundificando abscessum, vel communi digestivo vel balsamo sulphuris, vel balsamo peruviano cum ol. nicotianæ aut simili. Quod si malignitas venerea subest præter interna, mundificantibus semper de mercurio aut dulci aut præcipitato patum addendum erit. *Caries* occulta inquirenda, & ut alio loco dicetur curanda. *Michael Esth-müllerus.*

Pro abscessuum apertione, & consolidatione præstat balsamus sulphuris cum oleo papav. *Joann. Hartmann.*



*De Abscessuum apertione.*

Humores hic & illic congesti, sæpissimè tumorem efficiunt, qui non semper à natura dissipatur, nisi ars idoneis medicamentis ei auxilium præbeat, quidam si non obediunt, eam ad suppurationem impelles, & expectabis donec spontaneam apertionem faciat, nisi necessitate coactus fueris eam maturius instituere, & perfectam suppurationem non spectare. Hoc plerumque contingit, cum materia valde acris & maligna vicinas partes corrodat, & os, & tendines & nervos corruptioni obnoxios reddat. 2. cum nobiliorē partem possit lædere. 3. cum in articulis sita sit. 4. cum crisi ejiciatur. Antequam te ad apertionem accingas, distinguendum est an materia propria tunica, sive folliculo sit contenta, an verò sine folliculo. Si sine folliculo sit, nunquam transversè, sed per longitudinem semper & rectitudinem sub cute jacentium musculorum incidet: exempli gratiā in capite secundum capillorum ductum per longitudinem: in palpebris transversè: in temporibus, in nato, in cervice, in pectore, in dorso, in brachiis, in pedibus & articulis per longitudinem: in lateribus ventris parum obliquè, in medio per longitudinem: in inguinibus parum transversè, sed non admodum profundè, ob vasa spermatica ibi subjecta. In genere cave tibi, ne venam magnam, arteriam, sive nervum attingas, licet fibras transversè secates, alias enim ex minori majus malum produceret. Locus apertionis commodissimus est pars abscessus eminentior & mollior quæ tamen magis ad interiora quàm ad superiora vergere debet ut tanto aptius à pure exonerari possit: porro hunc in finem vulnus inflictum rotunda apertum conservabis, usque dum pars illa ab humoribus præternaturalibus prorsus sit purgata, & pristinam operationem exercere queat. In ipsa apertione cave, ne lanceolam nimis profundè, neque ulterius quàm ad pus utique infigas: quamprimum hoc animadverteris, eam paululum retrò trahito, & culpidem sursum vertito, & porro apertionem tam magnam efficeito per cutim, quàm materia inclusa deliderare videatur. Si abscessus in propria jaceat tunica semel tantum, si parvus sit, per longitudinem incidito: si magnus bis, hoc est, in modum crucis. Præ cæteris tibi cave, ne folliculum lædas, alias ulcus fædum & ferè insanabile sequetur. Hoc bene peracto, folliculum, qui rard aut nunquam cili affixus est, & libenter sequitur, digitis eximito: arteriam quæ alimentum acceperat transversè abscindito: & rursum tibi cave, ne frustulum folliculi ei adhæreat; si jam supra dicta incommoda evitare velis. Quia autem plerumque in abscessuum apertione comperio, hunc Chirurgum *Lanceolam*, alterum cauterium potentiale eligere, & longè præ alio extollere, rem paucis declarabo.

Cauterium potentiale hoc habet commodi, quod agros polissimè nullo pavore percutiat, & quod eo ore a timentibus non admodum sit dolorosum, præsertim si hodie decantata remedia adhibeas: nam calx viva Hollandico Sapone commixta profundè laesæ carne corrodit autem multo lenius quàm Ambrosii Puzi corrosivum holotericum. Verum hoc habet incommodi. 1. Quod, prout cunctis corpora infirmiora vel firmiora sit, etiam multo profundius corrodat, quàm sit necesse: in

altero enim cutim & musculos, ad ventris cavitationem usque perforasse, & in altero procellum peritonæi, & vasa seminalia in eo sic insanabili modo læsisse, experientia comperi. 2. Corrosivum illud se etiam ulterius ad longitudinem & latitudinem extendit, quàm quidem desideras, præsertim si sub axillis, in inguinibus, vel articulis collocari debeat: nam quamprimum incaluerit, profluere incipit, imò emplastrum defensivum parum cavebit. 3. Necessariò aliquot horarum spatio indiget antequam operationem tuam perfectè absolvere queat; sed plus temporis in hoc, quàm in isto corpore deliderabitur, verum hoc tibi humor non semper permittit, præsertim si sit malignus. 4. Crusta quam induxeris, non statim decidit: & humoribus si è vestigio exitum præbere studeas, lanceolam tum est utendum. Quam prudenter circumspexeris, incommoda hæc non evitabis. Contra verò lanceola hoc habet incommodi, quod plurimi ægrotum eam reformident, quasi dolorem moveret. Sed timor silentio est anticipandus, & dolor sanè non est magni momenti. Interim à lanceola hæc expectabis commoda. 1. Lanceolæ apertionem tam longam & profundam efficeite potes, quàm morbus & tua curiositas requirat. 2. Statim habes materiam, & patiens relevatur. 3. Materia reliqua & nondum concocta maturius ad concoctionem movebitur, naturâ idoneis medicamentis, tam externis quàm internis opem ferente. 4. Atque ita fiet, ut stillationem diuturnam non habeas: nam stillatio si nascatur, certus sis, culpam hujus rei penes te esse sitam. Rationem si desideres, hanc accipe, omnes ferè tumores qui se post aures, in cervice, sub alis & inguinibus produunt, ex induratis glandulis & ab humoribus præternaturalibus valde penetratis originem trahunt omnes hæ glandulæ propriâ circumvestiuntur tunica, quæ si a lanceola sive medicamentis cathartecis lædatur, necessariò stillatio sequitur; nulla enim glandula se ipsam, aut suos humores tunica aperta conservat: & hæc stillatio tamdiu durat, usque dum tunicæ foramen curatum, vel tota glandula in auras dissipata sit. *Paul. Barbette in Praxi Chirurg.*

## OBSERVATIONES

*Abscessus frontis ex contusione.*

Non ita diu est, quod cum Chirurgo, quodam ætium aut quatuor circiter annorum infanti mederetur, qui è cubili adversè in laxum pavimento fronte ceciderat, ita ut maxima in fronte mediâ appareret contusio, cui commodis remediis non ita poterat resisti, quin tandem in abscessum degeneraret. Quare necessum fuit, ut aperiretur, verum lapsu temporis observatum omne pus per factam aperturam non posse educi. Nec tamen placuit, alterâ incisione, (erat enim puellula) frontem deformare: quare parumper expectavimus, & pus pulvillis ad dictam aperturam propellere adniti sumus, quod tamen neutiquam succelsit. Tum mihi in mentem venit de osse frontis infantum ad septimum plerumque, octimumve annum futurâ in duas divisi partes, per quam futuram dura mater etiam transmissa pericranio adhæret, atque toti interitum quoddam efficit, quod ipsum nos adiecit, ut & aliam frontis partem incisione aperiremus, qua puella, brevi tempore sanata est. *Corn. Stalpart. Vander. Wel.*



*Cerebri Abscessus.*

J. V. B. Ultra 60. annos natus, corpulentusque jam aliquandiu pulvere iterumatorio usus fuerat, undè paulatim veluti quoddam pondus in anteriori capitis parte animadvertenterat, quod tandem abscessus in cerebro sequebatur; quandoquidem ille quodam tempore copiam benè magnam tam viridis, quàm flavæ, sed putentis puris dextrâ exonerabat aure: quod ipsum illi initio quoddam levamen afferre visum; ita ut liberatum sese à diuturnâ illa cerebri obstructione (ita enim vocitabat) jam sibi firmiter persuaderet: Verùm paulò post mentis usus deficere, nervique contrahi cœpere ita ut ipse intra biduum ferè post ruptum abscessum moreretur. *Idem*

*Abscessus in ventriculis cerebri.*

Cum fabri cujusdam ferrarii famulus, cui nomen *Martino*, equo caudam amputasset, jamque ut reliquam partem ignito terro uteretur, intentus esset, equus septio clausus, calce supra trabem, quam transveriam vocant, elevatâ, frontem paulò suprâ superciliū percussit ita, ut ibidem cranii fractura reperiretur, salvâ tamen secundâ tabulâ quoniam cranium eo loco insigni concavitate præditum est. Continuo illi syncope supervenit, multumque sanguinis naribus emisit, & quoniam abundabat, hujus illi non parùm adimi jussi, postea valdè somniculosus, parumque mentis compos evasit, quandoque etiam ligamina, & fascias dissolvebat, ac surgebat è lecto, seque vestiebat. Quarto tandem die febris superveniente, ipso quinto obiit. Aperto capite, repertus in cerebri ventriculis Abscessus. *Idem*

*Faucium Abscessus.*

Gubernatrix Nosocomii *Scheveringani* corpore tenuis admodum, ac sanguine abundans, violentâ vexabatur febris, non sine magna gulæ inflammatione, ac tumore, quem *Synanchen* dicunt. Quamvis ipsi vena scissa, aliaque remedia, uti decebat, admotâ essent, musculi tamen œsophagi ita ipsi obsidebantur ut per 9. dies nec cibum, nec potum intrromittere posset, nihil etiam liquoris (ita ipsa retulit) per fauces descenderet, ac omnia in os immixta per narium emitterentur; ita ut vita ejus periclitaretur, accedente etiam vocis defectu; verùm nono die liberata fuit, ruptusque una faucium parte fuit abscessus, dieque sequenti pariter alterâ parte: ita ut temporis tractu ad priorem redierit valetudinem. *Idem.*

*Abscessus post aurem sinistram tardius apertus lethalis.*

*Idem* Quadragenariam & innuptam puellam *Coloniz Agryppinz*, abscessu post aurem sinistram laborantem vidi: nulla ad fuit in principio febris, neque lecto decumbebat, imò domestica administrabat; demum circa decimum quartum morbi diem, cum abscessus ad pugni magnitudinem excrevisset, & materia planè esset præparata, sed propter durtiem cutis diutius recenta, viam deorsum sibi petebat. Tum advocatus, inveni abscessum ex semetipso ante aliquot horas ruptum: puellam verò

febre, lipothymia, nausæ & cibi fastidio, vigiliis, item dolore dorsi, & renum, laborantem: nihil tamen aut parùm ex abscessu effluebat, neque pus sursum revocari potuit. Itaque paucos post dies è vita decessit: ex quibus perspicuum est, in hujusmodi abscessibus, live sint in emunctoriis, live in vicinis non esse expectandum, donec spontè erumpant. *Guilielm. Fabricius Hildanus.*

*Abscessus Musculorum Abdominis.*

Honesta quædam matrona, cum de maximo ac pungitivo ventriculi dolore conquereretur, & me advocandum curasset, durtiem è regione ventriculi, ad latus linear albæ, hepar verius, inter musculos abdominis deprehendi, quæ tamen non nisi palpatione manus persentiebatur, nec quicquam exteriùs apparebat, febris quoque continua, dolor ingens, pungens & pulsatorius aderat, ex quibus (licet in cure nulla apparet interempties) mihi facillè colligere licuit, abscessum inter peritonæum & abdominis musculos subelle: cum verò morbum periculo non vacare, & immaturam (nisi musculis abdominis incisis) mortem expectandam esse, probè cognovissem, auctor fui, ut clarissimum virum, Dn. Doctorem Jacobum Aubertum accerserent, ac suo quoque uterentur consilio. Quo accessito, mecum planè sentit, nimirum phlegmonem subelle, qui nisi maturè incidere, aut de vita actum esse, aut ægram ipsam morbum inde diuturnum ac curatu vilicilem contrahaturam. Verùm cum adstantibus hæc significarem, ætonici erant: quia enim in cure nulla nec intemperies, nec tumor apparet, ac de interno abscessu ipsis persuaderi non posset, consilium nostrum de apertione & incisione musculorum omnes planè respuerunt, nihilominus tamen petierunt, ut si qua ratione anodynus exteriùs adhibitis, dolor leniri, & internis sumptis medicamentis, febris, nausea, & eructationes, aliquo modo mitigari possent, tentarem. Nos (de præsentis tamen periculo factâ prius prognosticatione) omnia quæ necessitas requirebat, & ea quidem, quæ heri potuit diligentia, administramus. Post dies aliquot, cum circa mediam noctem dolor protinus remississet, liberatam prorsus se esse, ægra sibi persuadebat. Mox septima hora matutina vix domum ingressi, ecce præ gaudio maritus nobis occurrit, significans, uxorem suam dolore penitus liberatam. Id quod & re ipsa verum esse, illud compertimus. Dolor enim ferè nullus aderat, tensio quoque, eructationes & nausea cessaverunt. Durtiem manu abdomen conectendo, nullam ferè persentire potuimus, febris quoque aliquo modo imminuta, & pulsus laudabilior erat. Ex quibus abscessum parte interna ruptum materiamque in vacuum ventris delapsam esse facillè nobis colligere licuit, quod etiam maritum de eventu morbi certiorum faceremus. Paucos post dies, denuò in infimo ventre dolore exorto, febris ardens simul & continua supervenit. Tandem lipothymia, quin etiam sudore frigido correpta ægra, naturæ satisfaciendo, planè, pieque ex hac vita decessit. *Idem.*

*Abscessus Abdominis è regione hepatis.*

Sabaudus quidam quadragenarius & robustus, cum dolore maximo dextri lateris ad finem coitarum notharum laboraret, Lausannam venit, meque



que unâ cum Dn. Alberto Roscio, apud Lausan-  
nenses Doctore Medico in consilium advocavit.  
Invisentes eum, nullum neque tumorem, neque in-  
temperiem, verum duritiem inter musculos in pro-  
fundo, nobis observare licuit. Quare dolor prop-  
ter compressionem & extensionem peritonæi erat  
ingens, cum febricula adjuncta. Corpore leniter  
purgato, fomentationes, cataplasmata, inunctio-  
nes, discutientia, resolventia & anodyna per dies  
aliquot applicuimus sed absque fructu, hinc spem  
aliquam concepimus, materiam in habitum resol-  
vi posse, quemadmodum mihi ipsi olim acciderat.  
A Dn. itaque Roscio decoctum ligni guajaci, &  
sarsaparillæ, additis herbis hepat respicientibus  
præscriptum, & per dies aliquot exhibitum fuit.  
Verum tantum abiit, ut materia dissipata fuerit,  
quin potius intra paucos dies circa regionem he-  
patis inter musculos abdominis & peritonæum de-  
fluxerit, atque collecta sit, ut ratione doloris pun-  
ctorii & putatorii, locus, in quo incisio facien-  
da, nobis satis innotuerit; quamobrem etsi extin-  
ctus in cute nihil appareret, ne tamen materia peri-  
tonæum penetraret, atque in vacuum ventris deflue-  
ret communi consensu deliberavimus, musculos ma-  
turè incidendos esse. Id quod etiam præsentè præ-  
dicto Dn. Roscio, Claudio Marione aliisque, felici-  
ter à me factum fuit. Quo facto, pus copiosè ef-  
fluxit, neque diu post, febris, dolor, lypothymia  
paulatim cessarunt. Ulcus propter puris copiam,  
quæ effluebat, per mentes aliquot apertum retinere  
coacti fuimus. Interim optimâ victus ratione ob-  
servatâ & corpore per intervalla proè expurgato,  
decoctis item sudoriferis, additis iis, quæ hepar  
respiciunt, partesque nobiles roborant ulus, tan-  
dem singulari Dei beneficio optimè convaluit.  
*Idem.*

*Abscessus alius abdominis è regione  
hepatis.*

Quadragenarius quidam in monte Coronato,  
pago propè Hildensem per annos aliquot obstru-  
ctione viscerum, & cachexia laborans, tandem  
dolore diuturno ac magno, è regione hepatis cor-  
reptus fuit. Ego tandem ad ægrum accessurus, in  
dextro hypochondrio abscessum immensæ magni-  
tudinis deprehendi: Cutis enim totius ferè lateris  
ab illi ossè ad costas veras, lineamque albam, &  
spinam dorsi, puris plena, elevata & extensa  
erat. Dolor continuus & magnus lypothymia item,  
nausea, appetitus, viriumque prostratio aderant.

Quapropter etsi æger & astantes amici ut absces-  
sum aperirent efflagitarent, propter maximum ta-  
men ac instans mortis periculum, neve nomen im-  
periti chirurgi, mihi adhuc juveni comparare vi-  
deretur, manum adhibere reculaui, & sequenti die  
domum reversus fui. Post mei abitum, cum  
Barbitonsor in consilium adhibitus, vomitum ape-  
risset, maxima puris copia impetuosè effluxit.  
Inde etsi dolor aliquo modo immittus esset, intra  
biduum tamen æger animam Deo reddidit.

Ad matronam Bernensem decrepitam vocatus  
fui: laborabat & illa ingenti tumore è regione he-  
patis, cum maximo dolore totius ventris & vi-  
rium prostratione. Tumorem hunc cum prop-  
ter imminens periculum aperire recusarem & ano-  
dyna & corroborantia nonnulla interna & externa  
præscripsissem, triduo post per se ruptus fuit ab-  
scessus, ex quo maxima puris copia effluxit. Et æ-

gra intra paucos dies ex hac luce subacta fuit.

Caveant itaque juniores Chirurghi, ne in magnis  
abscessibus materiam è vestigio, & de repente, sed  
sensim & per vices evacuent: etsi enim apertio ma-  
gnorum abscessuum circa partes nobiles imprimis  
sit periculosa, videmus tamen, inquit Galenus, &  
in aliis partibus, quando aliquis magnus tumor  
suppuratur, periculosam esse universam evacua-  
tionem, cum è vestigio deficiat anima, & vires de-  
bilitentur, & postea debilitas ista remedium non  
habeat. Videntur enim in his propter magnam di-  
stentionem partis & putis acritudinem ora quo-  
rundam valorum arteriosorum esse adaperita, quæ  
prius veluti quoddam operculum pus continebat:  
quo universim evacuato, multi spiritus unâ cum  
eo exeunt, atque excernuntur: unde periclitantur  
ægri. *Idem.*

*Abscessus abdominis hydropem mentiens.*

Puer quidam tumore ventris laborans, hydropi-  
cus censebatur & cum umbilicus valdè promine-  
ret, apertio tandem facta est, ex qua puris lauda-  
bilis octo vel decem libra profluxere, sicque om-  
ninò æger curatus est.

Advertant tyrones in pueris frequenter tales ab-  
dominis abscessus generari, qui hydropem men-  
tiuntur, & si maturè à perito artifice aperiantur,  
ægros à certo interitu plerumque liberari. *Perrus  
Esthove.*

Puella quædam ventris tumorem patiebatur  
octo mensium spatio, cum doloribus aliis, quibus  
ad extremam maciem perducta fuerat: hydropi-  
ca ab omnibus censebatur. Ego verò ad eam vo-  
catus & ventrem diligenter explorans, abscessum  
latentem invenio intra musculos hypogastrii, cum-  
que caustico potenciali aperto, unde 15. aut 20. li-  
bræ puris laudabilis effluxere intra plures dies, sic-  
que ægra perfectè curata est. *Idem.*

*Abscessus Abdominis.*

Scriba quidam cum ruri haud procul *Antwerpæ*  
esset, dexteri lateris, cum febris, dolore cor-  
reptus, sed juxta & paulò intra nothas costas: Me-  
dicum accessit, qui venæ sectione imperatâ co-  
legmata, linimenta que præscripsit, qualia pleu-  
riticis adhiberi solent (pleuriticum enim mor-  
bum esse existimabar) ab his verò cum malè æger  
haberetur, febrisque intenderetur, domum vehi po-  
stulavit. Ad quem deinde vocatus hominem offendi  
febricitantem quidem, sed debilem & vitiosum  
parùm valentem, dextrum hypochondrium non-  
nihil dolentem, ventre verò vehementer distento,  
ac veluti hydropici alicujus tumore, exhibuit mox  
purgans medicamentum, sed in exigua quantitate,  
quod cum feliciter cessisset, postidie idem, sed in  
majore quantitate propinavi, quo expurgatis  
multis vitiosis humoribus, sinistra ventris pars to-  
ta subsedit: dextræ verò tumor permansit & cum  
non modò tumida hæc pars relicta esset, sed & du-  
rior, ac digitis renitens, cataplasma admovi: quo  
tumore intra paucos dies emollito nunquam verò  
apparente loco, per quem pus erupturum sperari  
poterat. Sectionem adhibuimus, diligenter caven-  
tes ne peritonæi membrana vulneraretur: quæ cir-  
ca inferiorem ventris partem factâ mox copiosum  
effluxit pus; quo deinde expurgato, vulnereque  
solidato, æger sanitati restitutus est: adhibita inte-  
rim



rim bonâ victûs ratione, & paucis remediis. *Rembertus Dodonæus.*

*Abscessus ipsius hepatis qui curabiles.*

Tumores aliquando in jecore suboriuntur, in quibus alii sunt crudi, & nunquam suppurant, alii verò ad suppurationem veniunt, & quia jecur pauci est sentus, nervulis quippe gibba tantum sui parte donatum, non ita facile propterea, nisi progressu temporis horum differentia dignoscitur: tunc enim qui suppurant, gibba potissimum ipsius parte in acumen prominent, & sectionem indicant, nullo vitæ discrimine; prout ego in multis sum expertus, sectis licet integumentis communibus, musculis, & peritonæo; quod si in cava delituerit, per urinam expurgandus, ut observavi in Vestali virgine Divæ Annæ, ex Buzzacarinorum familia, quæ cum maximam copiam puris minxisset, à tumore liberata est, dolore licet jecoris quandoque molesto, cum febre. A quibus tamen sola evacuatione sanguinis ex vena jecorina dextri cubiti, convaluit. Hoc non contingit tumori partis gibbæ jecoris, cui secto imponenda est turunda, imbuta ovi albumine; cum digerentibus utendum, prout in vulnere illius partis; postmodum sarcoticis; tandem epuloticis cicatrix inducenda, evacuata prius tamen tota materia putulenta, turundarum ope, nec non cannulis plumbeis, quibus utpote citius, & commodius expurgatur, qua ratione multos sanavi, quorum aliqui adhuc num incolumes degunt. *Dn. de Marchettis.*

*Abscessus ingens inter peritoneum & musculos exterius ruptus, post ulcus renis.*

Nobilis & singulari virtute prædita matrona, Domina Magdalena Biss quæ jam quadragesimum aut circiter, agit annum, anno 1617. circa finem Januarii, de dolore quodam gravativo lateris dextri conqueri cepit. Circa costas autem mendolâs, & vetus altiore partem hepatis primo exortus est, deinde paulatim versûs regionem renis dexteri descendit. Nullam tamen hujus doloris causam externam dare potest. Urina, uti Dn. D. Scharandæus diligenter observavit, statim tacta est turbulenta, & non diu post putulenta. Supervenit quoque febris & nausea: præcipue autem carnem avertabatur. A D. D. Scharandæo adhibitis quibusdam, acidulas Griesbachenses solodurum alportandas curavit: quas cum ipso menie Januario & Februario bibilet, appetitum recuperavit: maximam quoque copiam excrementitiorum cum urina excrevit. Interim tamen dolor ex toto non cessavit, sequenti mense Augusto cum thermas Piperinas in Rhætia inviseret, dolores adeo adaukti fuerunt, ut ab eo tempore nunquam ab ipsis immunis fuerit. Anno 1618. mense Februario, prædictus dolor, mitum in modum auctus fuit. Præter D. D. Scharandæum itaque Dominum Doctorem Martinum Chmielerium, Balileensem medicum clarissimum, in consilium adhibuerunt. Corpus iterum ex arte expurgatum; venæ brachii ter, pedis verò semel sectæ fuerunt, per intervalla quoque aquam acidam Griesbachensem bibit, nec sine fructu. Interim putulentam materiam per urinâs continuò, per intervalla quoque arenulas excrevit. Sæpiissime quoque filamenta semidigitum longain lotio compecta fuere. Auctis doloribus

è regione renis, & ego quoque vocatus fui, anno 1618. 23. Junii, ut quid factò opus sit, cum Dn. Doctore Scharandæo deliberarem. Iterum expurgato corpore, inunctionibus, & similibus tentavimus, an dolores sedari; & materia contenta in halitum resolvi posset, sed frustra quapropter ad suppurationem pervenimus, sed & nec eis materiam ad suppurationem attrahere potuimus: quapropter sexta Julii, paulò ante prandium, etsi incute indicium nullum abscessûs appareret, caustico tamen meo, escharam, sine dolore, è regione renis, aut paulò magis verius umbilicum, induximus: sub vesperam, ad carnem ferè vivam usque, escharam scalpellis ad id aptis excidi: quæ quæ nondum satis profunda, nonnihil de eodem caustico ad fundum incisionis imposui. Sequenti die cum per reliquam escharam ad materiam putulentam usque, incisionem prosequutus fuisset, pus album & bonè coctum copiosè effluere cepit. Prima tamen vice, ne vires prosternerentur, ultra uncias quatuor non evacuavimus. Circa vesperam iterum multum effluxit, uti quoque sequenti die: tunc trutinatâ materiâ, repertum fuit, spatio viginti quatuor horarum, ad uncias tredecim effluxisse. Exinde symptomata omnia, quæ gravissima, veluti febris, nausea, lypothymia, vigilia, & hujusmodi, paulatim imminuebantur, imptimis dolor tum lateris dextri tum etiam è regione ventriculi, qui ægram ab initio morbi adeo exercuerat, ut sæpiissime culcitram vix sustinere posset, remisit. Doct. in super totius citius dextri, qui ante incisionem abscessus vehementissimus fuerat, nullique remediis sedari potuerat, sequenti nocte imminutus est, & intra paucos dies evanuit, nullis adhibitis remediis: pus tamen per mentem integrum, & diutius copiosè emanavit. Ubi notandum, ante incisionem abscessus, sæpiissime in urina grumos sanguinis magnitudinem lentis vix excedentes, conspectos fuisse, qui post apertionem apostematis non amplius per urinâs, sed cum ipso pure per ulcus excrebantur. Materia quoque putulenta minùs copiosa in urina reperta fuit. Unde facillè collegimus, abscessum esse inter musculos & peritonæum, communioneque cum rene habere: quod postea manifestius apparuit, cum materia fetida puri permixta per ulcus efflueret, per quas autem vias id factum fuerit, non facillè est scire. Catum escharæ sequenti unguento anodyno & digestivo, ut vocant promovimus: ℞. Cera novæ ʒ. colophoniz, & gumm. elemi, ana ʒ. ss. cro. i ʒ. i ss. cum oleo rosaceo, & amygd. dulc. q. s. fiat unguentum, addendo vitellum ovi. Sic satis digesto ulcere, pulvere præcipitato & rectificato, nec non butyro recentis mixto, ulcus mundificavimus. Tandem balsamo Tolutano turundis imposito, circa finem mensis Augusti, consolidatum ulcus & cicatrice obductum fuit. In applicatione autem pulveris prædicti, quod notandum est, inflammatio aliqua gingivarum, & salivatio, non minùs ac si hydrargyto inunctus fuisset, sequuta est, tam est delicatula & tenuis texturæ.

Porro dum circa Topica occupati fuimus, in reliquis nihil prætermisissimum quoque fuit: victus rationem optimam observabat: frequenter trochiscos Gordonii, ad drachmam unam cum lacte è primo, nonnunquam quoque nonnihil terebinthinæ, & trochiscorum alkekengi jejuno ventriculo, post cenam verò serum lactis cum saccharo rosato exhibuimus, cum autem medicamenta in forma portio-



porionis, non nisi cum difficultate tumeret, frequenter exhalans sequentes pilulas, pondere quorum terapulosum, & paulo post iusculum carnis, sine pane superbibendum adimus, quod medicamentum eo melius in ventriculo dissolvi, & ad locum affectum pervenire posset. *℞.* Terebinthinæ præparatæ cum decocto agrimonie, veronice, alchymillæ, saniculæ, pyrolæ, liquiritiæ ʒvj. pulver. liquirit. ʒij. spiritus terebinthinæ rectificat. ʒijss. misceantur: & fiat massa. Interim dum his utebatur remediis, symptomata, uti dixi, remittunt: vires quin etiam paulatim recuperavit, pus tamen quotidie cum urina excrevit. Quapropter consulimus, ut ulum trochiscorum Gordonii, & præscriptarum pilularum, nequiquam intermitteret. Ad tempus quidem paruit: tandem vero, cum ab usu medicamentorum in utrobunda facta fuisset, cum in unum intermisit: satis tamen feliciter & commodè vitam traduxit, usque ad mentem juvenem, anni 1619. tum iterum de dolore latens male affecti conqueri cepit, ita quidem, ut secunda Julii iterum coacti fuerimus applicare e ultimum, & eodem modo, quo & antea, omnes musculi que partes ad peritonæum perforare, non tamen in eodem loco, sed nonnihil altius, & magis verum, musculum rectum abdomini: pus iterum, quædammodum & antea, copiosè effluxit. Cicatrix quoque præcedentis ulceris post menses aliquot rupta fuit. Tum finem tericem per unumque ultimum auximus, in eum finem, ut forsitan hoc modo materia liberius efflueret, & affectus in tene tandem sanari posset. In eundem quoque finem decoctum Traumaticum ad tempus exhibitum, & ulceribus syphongijectum fuit: sed frustra laboravimus. Paulatim enim materia deorsum versus coxam delapsa est. Quapropter cum multa variaque medicamenta, tam interna quam externa, etiam sudorifera sine fructu sumpsisset; Tandemque Therimas Badenes Helvericas inviteret, iterum collecta fuit materia, ideoque versus musculi latissimi medium, & ferè eo in loco, ubi Vesalius ipsum tabulâ decima X. notavit, Badenæ, præsentem, Dn. Doctore Scharandæo aperta fuit vomica; ex qua rursum pus copiosè effluxit. Mansit aliquando in therinis, deinde domum rediit, ubi nunc utrumque commodè vivit: ulcera tamen etiamnum aperta sunt, ex quibus quotidie pus exstillat, non tamen usque adeo copiosè, urinas quoque adhuc purulentas quotidie reddit. *Guilielm. Fabricius Hildanus.*

*Abscessus gravissimus anni ex inepta vena-sectione.*

Amicus quidam meus 50. circiter annorum ætatis Reverendus Dn. Nicolaus Henzius in Berneſi schola linguæ Græcæ Professor, quendam ex primariis Baritonatoribus nostris, venæ secandæ causa accersiri jubet. Is ut nostrorum hominum mos est atque consuetudo, præclarum facinus se facturum putans, si larga hæret sanguinis extractio duas eadem hora (qui modus secandi venas nostris usitatus est) aut potius eodem momento venas incidit, primam videlicet in brachio dextro, alteram in manu sinistra. Quid sit? vix tribus à venæ sectione horis elapsis maxima sanguinis & humorum requinta agitatione, versus podicem delapsus est humor peccans, ita ut sibi vi-

deretur sanguinem omnem per secessum evacuatum ini, & veluti cum impetu effluxurum. Agita us enim sanguis in vena cava, in d. & in ipso hepate & vena portæ: commotus item humor melancholicus facillè ad podicem decubuit: facillè inquam, id fieri potuit, cum corpus pravis humoribus & præcipuè atrabilioso (qui propter sui gravitatem, mediantibus venis hæmorrhoidalibus, nona difficultè ad podicem descendebat) tectum, nec ante venæ sectionem purgatum esset. Tribus itaque horis ut dixi, a venæ sectione, exorto dolore & inflammatione, subsequens nox gravis ipsi fuit altera die, cum decubitatione tempus fallere vellet, adactus est affectus, & in abscessum durum, renitentem, ac dolorosum degeneravit, febris quoque supervenit, vigilie item & inquietudines adactæ fuerunt: sicque in tertium diem doloribus acerbissimis, cum alvi constipatione devexatus fuit. Baritonator interim universalia negligit, & nihil præter emplastrum suum incognitum, ut vocant, applicat. Ego quinta maii, vespera accessus sui, non inemque in maximis angustis inveni. Statim suppositoriis alvum lubdixi. Debebat id elytere fieri, verum illud, etiam docti ferè omnes, non minùs ac plebei homines, veluti crudele & imminere remedium non tantum reipunt, verum etiam si penes ipsos esset, libenter ad inferos detruderent. Circa nonam noctis potiunculam anodynam & cordialem ex collectione alkeimæ, extracto anodyno, aqua cinnamomi & borraginis confusam propinavi, & cataplasma anodynum simul & supparans applicui. Utrumque quiescit hæc nocte, altera die cataplasma iterum bis applicuimus, & post eam præscriptam potiunculam exhibuimus. Septima die maturatus à cataplasmate abscessus, circa exortum solis ruptus est, ex quo serosa, sæculenta & livida materia effluxit, quæ adeo erat fetida, ut conclavetorum putrilaginoso & verè cadaveroso odore, & fetore adimpleret, ita ut non solum facias & indusia, sed & lineamina & culcitra murare, ætemque suffumigiis tota die corrigere necesse fuerit.

Abscessus autem qui in nate sinistra in ipsis clunibus prope podicem erat, duobus in locis ruptus est: immisso in utrumque ulcus stylo exploratorio, compertum est, horum alterum, quod superius, sinu quinque transversorum digitorum longo profunditate ad latus vergere: utrumque imprimis profundius illud ferè absque sentu doloris stylum tam profundè admittebat, tam in gola & ingens fuerat putredo. Ab initio digestivo & cataplasmate prædicto per dies aliquos, deinde mundificativis & porione traumatica usi fuimus. Convaleuit tandem & hucusque quam optimè se habet. *Idem.*

*Abscessus in sinistro hypochondrio cum intestini erosione.*

Nicod. Estop. y, paganus de Trey, quinquagenarius & homo robustissimus, acutissimo dolore colico, maxime sub costis mendoſis lateris sinistri, & ventris constipatione correptus est; cum autem nulla adhibuisset idonea remedia, & excrementa supra modum indurata per angustiam (quam Casparus Bauhinus Anatomicus & Botanicus insignis, in colo intestino primus observavit) permeare non



possent intestinum verò in ea parte excrementorum & flatuum copia turgeret exacerbatus est dolor & cruciatus. Inde febris vehemens & continua, item vomitus, syncopæ frequentes, deliria, aliaque graviora symptomata sequuta sunt, ita ut præiens vitæ periculum immineret: accensa in collo inflammatio degeneravit in abscessum, unde simul & excrementa, & lumbrici aliquot manarunt. Ego advocatus ægrum in extremis invenio langoribus. Nam præter symptomata superiora, ipsa quoque excrementa toto bimestri per ulcus emanarunt. Remediis tamen tum interioribus, tum exterioribus adhibitis, dolor, febris, aliaque symptomata sensim remiserunt: ita ut trimetri spatio, Deo gratia, pristinae sanitati, nulla relicta fistula, restitutus fuerit. *Idem.*

#### *Abscessus sub musculo psoa.*

Chirurgus quidam ad honestam matronam accersitus, eam invenit decumbentem cum acutissimis doloribus circa lumbos, febre, lypothymia, & urinæ difficultate. Is cum ex doloris specie, aliisque indicibus cognovisset, apostema esse internum (exterior enim nihil apparebat nec tactu quicquam apprehendi poterat) nimirum sub psoa musculo, qui Vetalio femur movendum sextus, & septima musculorum tabula t. octava verò e notatus est, vitæ periculum prædixit: nisi forte aperto latere illo, contentus humor efflueret, inuentibus amicis, ipse ad spinæ dorsii latus, cutim & musculos exteriores ad psoam usque incitavit novacula. Effluxit copiosus humor purulentus & fætidus. Ab eo tempore mitigata sunt symptomata omnia & ipsa brevi restituta, vixit & valuit multos annos.

Ulcus ad menses aliquot turundis, cum ex radicibus gentianæ tum ex spongii præparatis factis, & medicamentis mundificantibus & abstergentibus illinitis, apertum retinuit. Postea sarcoticis carne implevit. Ab injectionibus tamen, quæ syphone sunt, planè abstinuit. Quod etiam in omnibus aliis vulneribus & ulceribus, siue ea in pectore, siue in interiore ventre fuerint, observandum: faci limit enim pars aliqua in ectionis in vacuum pectus aut ventris delaberetur, ibique non leviora symptomata, magno cum periculo ægrotantis, excitari possent. *Idem.*

Apud eundem alia legitur historia similis operationis in eodem casu peractæ à peritissimo D. Grifonio, Chirurgo Gen. v. antea celebratissimo, Autoris Præceptore.

#### *Abscessus in spina dorsii.*

Cuidam apostema ingens in spina dorsii obortum Barbitonsor scalpello id aperuit supra affectam partem, quæ nisi compressa nihil liquoris emittebat; hinc stagnans materia ossa corrodendo fistulam excitavit: Doctus Fossius cauterium potentiale affecto loco imponi jubet, apparuerunt post escharam ossa nigra, quibus abradis, & nitore restituitis, vulnus curabatur sarcoticis & emplasticis: residuum adhuc erat punctulum, aciculæ caput vix superans, ex quo lingua liberalius fluxit, nec ante sextum diem fisti potuit, tumque inducta cute convaluit æger. *Bartholinus.*

Quinque abscessus in ibi videre conigit doctum occupantes juxta ejus spinam, qui ex materia fri-

gida sensim collecta geniti fuerant, sine dolore aut inflammatione, & partis colore nullo modo mutato: molles erant tumores, oedematis similes, pugni magnitudinem fere adæquantes, ex iis rancida aqua petris pus laudabile effluebat. Tres priores lethales fuere, intra trium aut quatuor mensium decursum, cum ulcus ex abscessu aperto relictum inuoluitum admodum evaserit, ex eoque continuo magna puris copia efflueret, unde corpus universum exhaustum, & in atrophiam conversum est, licet multis remediis ulcerum curatio fuerit tentata. Quartus curatus fuit incisionibus magnis in dorso factis, quibus limus omnes detecti sunt, mox fortibus ex aqua cutapultatum, aliisque topicis, ulcera sanata sunt. Interim tamen causæ antecedenti providebatur, frequenti evacuatione, & usu decocti sudoriferi. Quintus denique curatus est sine incisione, sed magna apertione facta per cauterium potentiale, mox detractione ulceris per injectiones ex decocto catapultatum, & foris ex eodem, ac denique valida compressione partis cum fasciis & spleniis, & valde adstringentium emplastrorum continua admotione in ambitu ulceris. Interim verò causæ antecedenti providebatur remediis prædictis. *s. Riverius.*

#### *Ingens femoris abscessus in Virgine è quo serpsit mensstruus fluxus.*

Nobilissima Virgo annos circiter 19. nata, superpresso menstruo fluxu per aliquot menses, febre lenta laboravit, cui successit tumor erysipelatosus circa genu, qui remediis ordinariis quadringentis cedere vilis in abscessum postea totum prope femur occupans degeneravit. Abscessus ille continuè admodum ad suppurationem agrè deductus, prominentiam tandem in parte femoris domestica ostendens, apertionem indicavit; quæ ope lapidis caustici & scalpelli peracta est. Evacuata hac ratione puris ingenti copia, medic. menta detergentia, vulneraria & balsamica, quæque suo tempore adhibita fuerunt; cuiusmodi sunt decocta herbarum traumaticarum, radic. aristolochiæ, gentianæ &c. tincturæ ex myrrha, aloë & cæteris id genus, ut & ex balsamo Peruviano, nec non Judaico cum spiritu vini extractæ, balsama sulphuris varæ compositionis, fixa & volatilia. Vulnus interea apertum est inductis turundis ex linamento, item ex radice gentianæ, atque spongia præparata, injectiones perpetuè celebratæ ex tinctis & decoctis mox memoratis; revocata & in usum per intervalla aqua phagedænica, fasciæ ionibus apris interim non neglectis, quibus pus ad abscessus orificium promoveretur licque exitui parabilis foret. Non omittebantur præterea interna remedia, purgantia n: nipe, vulneraria, decocta ex radice chinæ, julecula viperina &c. Quindecim circiter post diebus novus tumor in poplitis medio apparuit, qui & peritus communicationem cum superioris vulneris osculo habere visus est; q. & tamen interrupta fuit, tum propter in reia vicinitatem, tum propter partium tendinosarum dilatationem majorem non ferentium sensum ex quibuslibet. Cæterum cum evacuari, aut omnino detragi per longum tempus non posset ulcus, q. in novæ subinde pelliculæ concretionibusque membranaceis nascerentur, novusque materiæ purulentæ salæ & viscidissimæ proventus in dies accederet, imò sanguinis impetus tempore fluxus menstrui illuc tanta vi ageret,



ut ter inde periodicè efflueret in larga quantitate, medicamenta etiam maximè appropriata frustra propemodum adhiberi videbantur. Consultatione cum insinuat existimatum, ulcus hoc cachœthes curationem vix admittit nisi ferro & igne id obtineri possit. Et primò quidem cum ageretur de ulcere cavernoso cujus cavitas novem aut decem pollices, secundum femoris longitudinem extendebatur, incisio videbatur per se indicari, verum vasorum majorum propinquitas non parum obstabat, & à tam longa incisione per interjectis crassiores carnes non immeritò abhorrebat Nobilissima Virgo. Itaque tutius videbatur ulcus in ipso fundo per pluries admotos lapides causticos resecare, ut ope communicationis illius faciliùs detergi posset, & ignis pro patris corroboratione sobrie admoveat. Ulcus poplitis quod attinebat censebatur illud, curato prædicto, iponte consolidatum iri. At verò sine ferro aut igne cura, Deo benedicente, peracta fuit, injecto scilicet sæpius balsamo sulphuris essentiali & volatili, cutoso artificio à me parato, spirituique vini maturato, unde quicquid callosum in ulcere fuit resolvebatur, concretionesque membranaceæ, profundius innatæ atterebantur & separabantur, ita ut beneficio largiorum injectionum vulnerariarum sensim educerentur, novusque proventus inhiheretur, tum per memorata remedia, tum etiam per turundas & linteis emplastro maxime detergente & vulnerario imbutis, confectas, in ulceris profundum cum unguento appropriato liquidiori & exalta-to, immixtas.

#### *Abscessus mira structura.*

Anna Gerhardi, ancilla hilaris animo, agilis corpore, ex consilio Amplissimi Dn. Consulis Nicol. Tulpii ædes nostras accedit; humero sinistro inhærebat abscessus insignis, rotundus, quem sciatoma vocaverunt alii. Ad ejus ablationem admissi, primò omnium *Cauterium potentiale* ex calce viva cum sinegmate paratum elatiori ejus parti (à ferro enim abhorrebat) applicuimus, die sequenti loco cauterisato *sectionem* levem instituimus, primò rectam, hinc transversam, & occurrit nobis corpus aliquod candidum, hoc dilecto simile aliud se obtulit, quod, æquè, ac alia, dissecare necessarium duximus, & sic totum abscessum auferendum esse contigit, quod etiam brevi, vasis sanguineis laceratis, peractum, ad hæmorrhagiam, lintea combusta, *Bovist*, similiaque applicabamus. Abscessus exstirpatus, tabula impositus, curiosam nobis, aliisque mirram exhibuit structuram; ex viginti enim & pluribus, albicantibus corpusculis rotundis, tibi invicem impositis, compositum eum invenimus, quævis harum lamellarum materiam continebat albam, glutinosam. Sanguinis fluxu sedato, ad mali omnimodam eradicationem *mercurium præcipitatum rubrum* applicuimus, hinc mundificantiâ usurpare necessarium, consolidantiâ denique & cicatizantiâ, *Job. à Meekren*.

#### *Cadaverum Anatomica Inspectio.*

##### *Abscessus intestinorum.*

Inter affectus intestinorum est phlegmone seu inflammatio eamque excipiens abscessus, ejus exempla si morbo denatorum cadavera sæpius

aperire liceret, non ita forsitan rara forent. Quid nobis in duobus ejusmodi casibus videre contrigerit hic referre non gravabimur, idque ea potissimum ratione quod hæc non ita frequenter apud Practicos occurrant. Lectissimus Adolescens quidam annos præter propter 22. natus, diarrhæa febri continuè junctâ, per integrum mensem vexatus fuerat. Usu tamen medicamentorum methodicè exhibitorum melius habere cepit; usque adeò, ut recuperatis maxima ex parte viribus, & appetitu, rus, commutandi aëris causa, petierit, ibique per quatuor aut quinque septimanas satis, ut videbatur, sanus, manserit. At in urbem postmodum rediens de stomachi dolore, & respirandi difficultate queritur. Faciei color herbaceus erat. Dolor & tentio hypochondrii dextri, usque ad cartilaginem xiphoidem urgebat. Tussis sicca & sonora. Febris à tertia die intensissima, pulsus parvus, sed creberrimus nausæ, sitis; Decubitus in latus dextrum perpetuus. Mox dolor ad latus sinistrum vergit, & ad claviculam usque ascendit. Desidendi cupido frequens, biliosa sed pauca dejectio. Assumpta interdum vomit. Urinæ sat multæ, rubræ & crassæ. Circa septimam respirandi difficultas aucta, nulla amplius tamen tussis. Frigus extremorum, sudor putidus, pulsus formicans, extra lectum pedes habet pendulos. Nonâ pulsus perquam exiguus, imò syncope ingruit, mortem præ se fortibus juraret. Decimâ pulsus ferè nullus, crura & femora tument, per intervalla vomitur, subinde cibum petit, avidèque juseculum bibit. Oris fætor deprehenditur. Undecimâ primùm delirat. Admodum irrequietus est, nec in lecto ullatenus contineri potest. Duodecimâ delirium intenditur. Cibum & potum omnino respuit: frigus extremorum maximum, per totam noctem pileum detrahit, & abjicit, mirumque in modum contorquetur & jactatur. Decimâ tertiâ pulvis, ut videtur, nullus: Alvus biliosis & purulentis copiosè solvitur, lecto reponitur. Decimâ quartâ, oculi extra orbitam eminentes opaci & splendore vitali destituti apparent, facies Hippocratica, spiritum laboriosè ducit, sudorem croceum sudat. Tandemque longiorem cum fatigâ luctum sustinere impar cedere cogitur. Die 20. Julii 1683. cadaver aperimus. Maxima puris copia in ima abdominis cavitate collecta reperitur. Totus penè intestinorum, tum tenuium tum crassorum, tractus inflammationis notas habebat: Sed coloni potissimum lividum & nigrum erat: dumque in eo locum abscessus quærimus, pars hepatis seu ventriculo substrata, chatæ madidæ instar, laceratur, & inde multum pus, faecibus commixtum erumpit omnia viscera curiosè lustrare, præ summo fælore, non potuimus. Ea tamen & potissimum hepar, quod nobis phlegmonem pati primis morbi diebus vitium erat, non ita malè se habere obiter notavimus.

Historiam priori affinem nobis suppeditavit Juvenis quidam annos 32. natus. Is à pluribus annis colicum dolorem subinde pariebat. A quatuor verò ante obitum mensibus, tormina & cruciatus in dies augebantur: alvus adstricta, ut plurimum, erat: quod si interdum solveretur, liquida tantum eaque pauca excernebat. Quatuor autem ante supremum, diebus, venter multum intumescere excrementa alvi ne validissimi cly-



Ceres educebant. Supprimebatur & urina. Assumptos cibos statim vomebat, ipsaque demum alvi faeces, anxietas erat summa, extrema frangebant. Pulsus ut in ægro priori formicans, imò nullus. Cadavere die 15. Septembris anni 1683. aperto, peritonæi facies interna nigra admodum pluribus in locis apparebat. Omnia intestina subrubra, livida, nigra; sed colon inprimis affectum videbatur, ex eo enim lacerato, foramine pugnum facile admittebat, pus copiosum in infima abdominis parte, pelvim vocant, eruperat. Sed, quod notatu dignissimum, ejusdem intestini portionem, duabus præter propter à Recto Spiritu distantem, octo uncias longam, nigerriam, ponderosam, intestini portionem proximam, non quidem superiorem, sed inferiorem, quatuor digitos subeuntem reperimus. Dillecti intestini partes pollicem crassitie æquabat, & materia nescio qua subalbida, inter glandularem & adiposam ambigente, qualis fere est steatomatum, infarciebatur, adeò ut, quæ digiti minimi apici admittendo sufficeret, cavitas vix luperet. Hinc sanè symptomatum omnium quæ miserum malè habuerant rationem facili negotio reddidimus; simul & inversionis intestini, præ pondere, in proximam cavitatem descendens, rarum exemplum, & à nullo forsitan è Præcicis qui hætenus scripserunt observatum, notavimus. Nec nobis temperare potuimus, quin Medicorum sortem (qui affectus quosdam quorum causæ ita occultæ sunt, ut eas ne suspicari quidem possint, curare posse, & debere vulgò creduntur) doleamus. *Autores Bibliothecæ Anatomica.*

*Abscessus in inguine ex ictu sclopeti unde pus per urinam globulique plures plumbei minores sunt ejeti.*

Juvenis quidam viginti circiter annos natus, dum in venatione vertaretur, proprium sclopetum imprudens in se ipsum explodebat, unde pluribus globulis plumbeis minoribus pars femoris inguini immediate subiecti durius imperebatur. Cura Chirurgus quamvis perito commissa, non ita absolvetur, quin præter globulos memoratos in profundo ulcere, eoque fistuloso, relicto, restitueret tutum frequentium formæ; subinde enim tumor ingens in tota superiore femoris parte, regioneque ossis innominati cum febris intensa exoriebatur, qui, nunc hic, nunc illic abscedens, miserum crudeliter vexabat; non ita facile erat pro palliando morbo canulam in abscessum fundum immittere, ut pus inde quasi contingendo transiens moram non traheret totæ tragædiæ suscitandis aptam, illud enim in ossis ischii intimiore concavitate cum grandi carie positum erat, quò non ita tutum, imò impossibile per inferiora pervenire; interim pro morbi necessitate sumto consilio, canulam plures pollices longam per superiora intrulimus, ut sic materię ostio quocumque demum aperto servato, illa quadante us eacuaretur, injectionesque ex vulnerariis, admisto balsamo sulphuris sæpius repeterentur, & ulcus mundum quantum possibile foret servaretur; sic per quinque circiter annos a doloribus prope immunis vivebat, donec tot cautionum periculis, seu potius se omnino restitutum credens, omnia abjiceret. Non longe

autem poenam peccati tulit, nam aggesta sanies non tantum cuniculos per totam femoris longitudinem egit, sed etiam in clunes usque promotæ, horrendum tumorem efformavit cum febre intensiori. Dum hæc oppugnandis graviter incumberemus, priusque contento exitum ex parte pararemus, vidimus cum stupore post aliquot dies illius plures libras per vias urinarias emanantes, imò globulos plumbeos per easdem reiectos; non dimittebat interim febris ut nec alia symptomata quibus tandem oppressus vir pius vitam cum morte commutavit, cadaverisque usuram nobis dedit. Reserato itaque Abdomine, & explicata tota parte ulcerata, conspeximus cariem non modo ab ossis ischii marginibus sed intimiores coxendicis concavitates serpsisse, indeque prædicti ossis substantiam ad caput ossis femoris penetrans, in illius iidem mediam descendisse partem. Observavimus præterea saccum pus in inguine complentem in plures cellulas distinctum membranaceum & fistulosum quid de se produxisse, quod in ipsum vesicæ cavum abierat, illucque non tantum saniem prius à nobis in urinis visam, sed etiam globulos plumbeos cum eadem reiectos, deponeret, sic itaque mirari desimus quibus demum viis provida natura materias circuitibus aliis peragendis tam inhabiles exoneraret. Pars eorundem globulorum ossis coxendicis cavo vel impacta vel proximior, nobis cum puris viscidissimi reliquiis etiam occurrebat. Alia quod attinet imi ventris viscera intacta vidimus.

*Abscessus in Inguine cum erosione intestini, purisque ac excrementorum fatidissimorum reiectione.*

Mulier quinquagenaria major, variis doloribus diu vexata, ac præcipue rheumatismo, seu arthritide quadam vaga, à sero acri omnes corporis partes nerveas & tendineas, perluente, orta, in intestinorum tandem affectum vehementiorem incidit, protuberantur scilicet illa in inguine ad ovi columbini magnitudinem sub herniæ incompletæ forma cum tanto cruciatu, vomituque tam horrendo, ut de ea cum brevi actum ita arbitraret, ipsam aliquo modo prognostico suo relinquerem, verum post dies aliquot revocatus, reperio pulsus formicantem vomitusque perpetuos, cum tanto interancorum ardore, ut se damnatorum pœnis affligi misera delirans crederet, ac præ sit inextinguibili aquam sibi continuo ingurgitari inter ipsos vomitus expeteret, sed quod maxime ad rem nostram facit, vidi herniam prius à me adnotatam in abscessum degenerasse, ex eoque aperto saniem cum excrementis alvinis foetidissimis effluere. In casu prorsus desperato quædam revera tentata sunt, ut alvinibus satisfaceret, dolorque aliquatenus leniretur, ac omnia in callum adhibita, siquidem postquam per viginti quatuor horas duro agone conflictata fuisset è vivis excessit. Aperto abdomine vidimus intestinum ileum in sui propè medio perforatum, saburræ intestinales magna vi per foramen in abscessu enatum eructasse, magnæque sui parte gangræna affectum. Cætera curiosius lustrare prohibuit factor omni alio major.

*Abscessus*



*Abscessus Mesenterii Hydropem Ascitem  
mentiens.*

Nobilis mulier 20. circiter annos nata languore totiusque corporis ingravescencia per aliquot menses fatigata, remedia varia adhibuit aperientia & corroborantia, chalybeata sc. purgantibus levioribus admista, catarri præparationes, salia volatilia &c. quibus cum non ex voto profligarentur morbus, se restituendam commisit empirico ignaro, a quo cum pilulas accepisset è vicini indici desiccato fructu paratas, aliisque id genus, satis quidem pro tempore hilatis & sana videbatur, dum interim sensim accresceret tumor in ipsius imo ventre, qui remediis cedere nescius, post annum præterquam quod ingens visus est, dolores etiam atroces cum febre acuta &c. peperit; quibus symptomatibus eliminandis plura consumimus, nec sine omni fructu; nam sic abiit febris, & dolor cum abdominis tensione inflammatoria, relicto solo tumore magno, sed indolente; cui rursus dissolvendo atque discutendo præsidia apta apposuimus, aquas scilicet minerales, præparationesque artificiales tam vegetabilium quam mineralium &c. sed in cassum prope omnia nam augebatur continuò tumor, venterque totus in granuiorem elevabatur molem, donec post novem circiter menses à mox memorato insultu febrili, reconvalescit hoc symptoma cum doloribus, ægramque lecto præ debilitate affixerit: tum brevi tumor ex abdomine in femora & tibias proventus est, variisque excoriationes in partibus affectis peperit. Sollicitante ægra, quæ præponere corpus amplius movere non quibat, & lacerationem in imi ventris visceribus perentiebat, acum tuiatam in ipsius cavitatem immisimus, sicque puris foetidissimi per decem dies continuos libras circiter 30. eduximus, in igno ægræ nostræ solatio, quæ placide tandem & pie decima tertia post perforationem die obiit. Tum aperto abdomine, effluerunt quidraginta ad minimum puris putidissimi & viscidissimi, cui ionatantia intestina gangrenosum quid in sui exteriori membrana redeiebant: testiculus dexter seu ovarium dextrum per compressionem tumoris mox deferibendi, ita flaccidum factum erat, ut curioso examine ad eum inveniendum opus fuerit. At, quod novatu dignissimum, tumorem monstruosum advertimus in melocolo à latere illius intestini coli partis qua in rectum abiit, enatum, ejus basis diametrum habebat trium circiter pollicum, seque sub intestinis extendebat ad latus dextrum, ubi caput efformabat di. metrum habens pedis integri longitu. inem æquantem, illinc ad superiora reflexus peritonæo adharebat, adhesionemque eandem ad latus usque sinistrum quò u que pergebant, originem suam quasi repetiturus, servans, super intestina crassa recumbens, eaque sic absolute prope circumcingebat, dum interim tenuia cum ventriculo sursum adacta liberiora erant. Tumor hic glandulosus erat, membranaceus, & per totam sui longitudinem in cellulis variæ magnitudinis & figuræ excavatus, quarum cellularum plures inter se invicem communicabant, complectebanturque variæ indolis materias, a quodas sc. mucilaginosas, pultaceas, & prope stercaceas, omnes in genere foetoris acutissimi. Pondus erat tumor hic cum materiis contentis tri-

ginta quinque circiter librarum. Cetera sana re-  
perta sunt.

## ACHORES SAHAFATI.

Vide

## CRYSTA LACTEA.

## ACROCHORDON.

Est verruca subcutanea durior & asperior, callosa, atque plerumque teres, cui concolor, in basi tenuis, summitatis verò latioris, fabæ magnitudinem raro excedens, juniores maxime intestans. Sic dicta, quod in imo adeò angusta sit, ut pendere videatur. Super hoc vid. VERRUCA.

## ADIAPNEUSTIA

idem quod

## PERSPIRATIO IMPEDITA.

## ÆGILOPS, ANCHILOPS, ET

*Fistula Lachrymalis.*

Hi omnes affectus in eadem sunt positi parte, scilicet inter nates & majorem oculi canthum seu angulum, in eo autem differunt quod *Anchilops* sit abscessus oculatis seu tumor in parte memorata positus, humore viscido, qualis in theatomate, arthemomate, aut meliceride, videtur, plenus; cysti aliquando conclusus, incrementa sensim & sine dolore ut plurimum sumens, donec ad suppurationem perveniat, quo tempore *Ægilops* dicitur; qui rursus si abeat in ulcus callotum parvum & profundum, super glandula lachrymali positum, cum, vel sine ejusdem abluptione, ut & cum, vel sine partis ossis nasi proximiori carie, *Fistula Lachrymalis* vocatur. Inter se verò rursus differunt fistule lachrymales ut & ulcera ægilopem conficiunt, quod alia extra oculum, & in spatio inter angulum ipsius majorem & nasum posita, alia verò intra ipsum angulum aperiantur, & rursus quod alia saniem serotam subflavam, alia albidam & viscidam, continuò, vel per intervalla tantum eructent, alia præterea oculum in atrophiam deducant, alia minimè, alia os nasi tantè afficiant carie ut ad narium interiora perforantur halitus foetorem pariat, alia illud intactum relinquunt aut superficialiter tantum corrodant, alia sint miæ & curabiles, alia canerosæ quas noli tangere.

*Causa* in genere est circulatio humorum læsa, seu eorundem à vicinis glandulis eruptio; unde stagnando visciditatem acquirunt, cystimque brevi tibi efformant, donec acrimonia, per salium contentorum exaltationem, contracta, carcerem suum abruptant, & laxe, præterquam quod integumenta sua perforant, subjectam glandulam absumant, ipsumque os corrumpant. Hisce sæpe occasionem præebet, vel ictus, vel faciei erysipelas, vel variolæ &c.

*Signa* ut & *pars affecta* ex suprà dictis satis patet. *Prognosis* verò quod attinet non dubium est quin curatu difficiles sint hi morbi, ac præcipuè lachrymalis fistula, propter oculi partis nobilissimæ viciniam, illudque eò magis si intra ipsum oculi angulum aperiat, maxime verò si glandula lachrymalis absumta sit, aut os nasi carie







& inveteratis affectibus capitis, dummodò periculum non fuerit in mora, vide cent. 3. observ. 1.

Postea dilatanda est fistula, id si turundis ex radicibus gentianæ ipongijs præparatis fieri potest, bene est, sin minus, nonnihil de caustico meo applicare soleo: sed vide ne in quantitate pecces. Quantitas autem grani milli totis sufficit. Diligenter quoque claudendus est oculus, ne forsitan causticum liquefactum in oculum fluat. Sunt qui guttula una aut altera aquæ fortis, vel olei vitrioli, fistulam aperiunt, callumque & carnem superfluum erodunt, sed perperam, propter insignem enim vim penetrandi, os, quod forsitan adhuc sanum atque integrum fuit, corrumpunt: quod de caustico nostro minimè timendum est, cum sit materia crassa & terrestris, quæ vicinas partes incontaminatas relinquit: oleum verò vitrioli, & aqua fortis longè lateque se extendit. Aperta fistula, pulvis præcipitatus, quam diligentissimè præparatus, inspargendus, aut filamentis imponendus est ulceri, quod emplastro ex solo gummi elemi, in alutam aut telam extenso, obtegendum. Ego fortiori pulvere isto non utor, ne os si forsitan adhuc sanum fuerit, a suo peritio de-regatur. Sæpissime enim fistulas lachrymales, etiam inveteratas, sanavi, in quibus caries in osse reperta non fuit. Quapropter festinandum non est, sed lentim procedendum, insperio pulvere prædicto bis, vel tunc in die, prout ulcus fuerit humidum: ut plurimum tamen dum pulvere isto utor, semel tantum in die ulcus deligare soleo. Stylo ab initio cariem ossis curiosè perquirere non est necesse: si enim os cariolum fuerit, pulvis iste cariem, quia mollis & flaccida est, faciliè absumet; sin sanum fuerit os, sanum illud relinquet pulvis, & ulcus non solum mundificabit, sed & ad cicatricem perducet. Habet enim diversas hæc facultates pulvis iste, uti ego primò in agris excellentissimi Medico Chirurgi Dom. Colmæ Slotani. p. m. præceptoris mei fidelissimi, & ab eo tempore in praxi mea observavi.

Si os cariolum inveniatis, quantum fieri potest, detergendum est, postea euphorbium in subtilissimum pulverem redactum copiosè insperge: nihil enim præstantius esse euphorbio, in ossibus cariiosis, imò & in fistula lachrymali, sæpissime ex me intellexisti, habes quoque exemplum in quinta centuria observat. 22. Nec te deterreat ipsius acrimonia; euphorbium enim nostrum adjacentem carnem non adurere, ut volunt plurimi, observavi, de quibus vide centuriam 2. observ. 64. centur. 3. observ. 22. Admonendus autem est pharmacopæus, ne pulverando euphorbium, pistillum ut inotus est oleo inungat: oleum enim vim euphorbii infringit, & ossibus adversissimum est. Ne autem acrimonia sua nares feriat, guttula una aut altera spiritus vini affundenda est. Sunt qui cariem ossis oleo vitrioli, sulphuris, aut aqua forti corrigere tentant, sed malè: ad circumjacentes enim partes fluunt, & os ulterius corrumpunt: quapropter vide, atque etiam vide, mi Dom. Schobingere, ne hujusmodi medicamenti utaris, imò ne quidem in ossibus duris & solidis, uti sunt tibiae, multò minus narium. Alii cariem ossis fistulae lachrymalis cauterio actuali corrigunt, quod non improbo, mihi tamen, laus si Deo, præcedens methodus cum euphorbio, sæpè tam aciliter successit, ut cauterio actuali nunquam usus fuero: Interim tamen illud, ut di-

xi, non rejicio: quæ enim ferrum non sanat, in-sanabilia esse, Hippocrates pronuntiavit.

Saris mundificato ulcere, & prædicto pulvere præcipitato ferè carne repleto, balsamum Tolutanum filamentis applicare poteris: Cicatricem enim planam & pulchram facit. Per totum autem tempus curationis, sequens collyrium oculo bis aut ter in die instillandum, & lineum reduplicatum, & collyrio madefactum, applicare convenit, sintque omnia fasciæ diligenter ligata, ut oculi motus, quoad fieri potest, impediatur. Motus enim humores attrahit, & consolidationem impedit, collyrium tale est ℞. aq. rosar. plantag. ana 3 i ℞. aq. euphrasie & valerian. ana 3 j. sem. cydoniorum contul. 3 j. misceantur maneantque in infusione horas sex, vel octo; colaturæ adde tuthiæ præparatæ, plumbi squamosi diligenter præparati. Cornu cervi usti, & præparati ana 3 j. caphuræ 3 j. misceantur omnia diligenter in mortario, fiatque collyrium, quod tepidè applicetur. Hæc si diligenter administrata fuerint, spem habeo, Deum opt. max. omnibus abundè benedicturum, id ut faciat, ex corde opto. *Gust. Helm. Fabr. Hildan.*

Graviter errant qui existimant perforationem hoc commodum præstare ut materia per os effluat, licet hujus opæ os perforatum citius abscedat: observandum tamen, non esse perforandum os nisi præsentem maximam ipsius corruptionem, quæ perveniat usque ad cavitatem internam ipsius nasi: sola squidem ipsius superficie corrupta, aut alterata, sat fuerit partem læsam scalpulo abrasorio abradere, dum pars cutis coalescat ossi, quod tamen fieri non potest nisi sanum fuerit. Ejus autem corrupti & scalpulo excisi hoc vobis fuerit indicium, cum spatio x. aut ad summum xii. horarum caro illi accreverit, quod nonnisi facta abrasione contingit, coalescente fistula. Quod si post abrasionem nulla caro subcreverit, os corruptum adhuc subselle pronunciandum, quod proinde denudè abradendum, quousque hæc signa omnino non appareant. Qua ratione feliciter, semper, & turò sanavi fistulas lachrymales, non solum puerorum sed & adultorum. *Petrus de Marchettis obs. 22.*

### Observationes.

Superiori mense Julio, Solodurum unà cum doctissimo viro Dom. Ludovico Scharandæ, ejus Reipubl. Doct. Medico celeberrimo, ad puerum tredecim circiter annorum ætatis, & ex nobili familia natum, *Hans Jacob Von Venus* nomine, vocatus fui: Is ab annis quatuor fistula lachrymali ex sinistra parte, quæ pro deplorata habebatur, laboravit; non enim os solummodò cariolum, verum etiam glandula ita erosa erat, ut quotiescunque puer ploraret, lachrymæ per ipsam fistulam copiosè exstillarent. Est præterea puer adeò morosus & impatiens, ut cauterium actuale, quod summum optimumque censetur esse remedium fistularum lachrymalium, nunquam ipsi applicare potuissimus; quapropter de aliis remediis nobis cogitandum fuit. Itaque instituta optimè victus ratione, corpus secundum humoris prædominantis naturam & ægri tolerantiam expurgavimus, deinde teraceum nuchæ applicuimus: post dies aliquot optimè fluente teraceo, manum fistulae adhibuimus hoc modo. Primò, quia angustissima, nonnihil de caustico meo, quod absque dolore, uti tu ipsemet vidisti, erodit applicuimus:



Post casum escharæ, fistulam unguento escharotico, & spongiis præparatis, usque ad ipsum os, dilatavimus. Tandem Euphorbium per se fistulæ inspersimus, & quidem in copia: deinde emplastrum ex solo gummi ekmi applicuimus. His eâ quâ fieri potuit diligentia, per septimanas aliquot adhibitis remediis, squamula ossis sese obtulit, quam Dn. Scharandæus me absente, ipsemet extraxit, & postquam per paucos dies semiguttulam balsami Tolutani, semel in die cum filamentis imposuissimus, brevi plenissime consolidata fuit fistula, quæ hucusque clausa est, oculo & visu planè intactis. Setaceum quoque, non diu post consolidatam fistulam, cicatrice obduximus.

Aliud exemplum non vulgare, de præstantia euphorbii in osse corrupto, prædictus Dn. Scharandæus mihi communicavit, quod non ita pridem in tracte suo observavit: Illi enim cum post ruptum abscellum circa dentium ocularium radicem dextræ maxillæ, relictum fuisset ulcus cum carie maxillæ, p. st. m. duriusculam ex puro euphorbio & melle rosaceo contexit Dn. Scharandæus, ipsamque ulceri imposuit, & laminâ cerâ, ne excideret, cooperuit. Huic viro, qui juvenis est, & optimo corporis habitu præditus, intra paucos dies excidisse squamam cariosam, & protinus cicatrice obductum fuisse ulcus, testatur Dn. D. Scharandæus. *Idem.*

Ex defluxione capitis ad canthum oculi sinistri tumor enatus juvenulæ, quo pressio ferum ex oculis fluxit; postea perforato, ut videbatur, ad nates usque osse, purulenta per nates materia fluxit: caput cephalicis pilulis prius expurgavimus; mox ad humiditatis depulsiis exsiccationem collyrium inunximus, omnia sine ferro prius experturi, ne facies deformaretur: demum cauterium potentiale illi nasi parti applicuimus, ubi nullum à musculo oculi orbiculari periculum: post escharæ casum caro in fundo aded luxuriavit, ut præcipitato aliquoties inhibere fuerimus coacti, sæpiusque ea carne crescente, cauticis repetitis curatio fuit retardata: tandem exsiccantibus in auxilium advocatis, osque mundantibus, sed sine ferro aut igne, ab Ægineta præscriptis, cum per nates nihil puris vel feri prodiret, carne sana opplerum fuisse ossis carioli totamen animadvertimus, fistulamque obcuratam, unde vulnus consolidatum, cicatrice subtili in lueba. *Thomas Bartholinus centur. 5. hist. 85.*

Chirurgus suo tempore insignis Domicellam quandam religiosam ex ægylope fistulâ lachrymali laborantem, hoc modo sanavit, optimâ victûs ratione præscripta, & pharmacis universalibus adhibitis, tum etiam venæ sectione præmissâ brachii & pedis, orificium ulceris tentâ aperuit ex gentianæ radice confectâ, & orificio successivè satis aperto, pro ulceris mundificatione sequens medicamentum præscripsit. ℞. mell. communis ʒ ij. visid. æris ʒ ss. aq. rutæ ʒ iv. & viride pulveriserut, & cum aliis lento igne decoquatur, ad tertiæ partis consumptionem. Colatura tepidè & suaviter per syringam imponebatur: si acius videbatur, aq. rutæ ulcus abluebatur omni die, & post lotionem exiguum unguenti apostolor. admovebat, hoc modo tribus continuis septimanis procedebat, superponendo etiam emplastrum conveniens, & os. ulum rosac. aquâ defendebat. Postea pro tertia intentione perficienda, nempe incarnandi atque cicatrizandi, ulcere jam satis repurgato, illud

collyrium præscripsit. ℞. Thurib. saccocoll. aloës, sang. dracon. balauft. antim. alumin. ana ʒ j. visid. æris gr. v. subtiliter pulveriserut, & cum aq. rutæ fiat collyrium satis liquidum. Imponebatur leviter cum rutæ stipite, deinde exsiccabat, continuabatur ter in die, tribus septimanis; postea bis in die minorando tentam, deinde tantum lavabat, diapalma super impositâ, & panno lineo raro loco compressionis, atque hoc modo feliciter abolvebat curationem. *Jacobus de Carpo* Chirurgus suo tempore expertissimus, ad fistulam lachrymalem sequenti collyrio utebatur. ℞. aloës; myrrh. croci ana part. æquales infundantur in aq. viræ quinquies, sexiesve distillatæ q. l. per noctem, & diem, deinde coletur, & colaturæ adde theriac. opt. & camphor. q. s. fiat collyrium. *Petrus Forestus observ. 15. lib. 11. de morbis ocul.*

Curavi quendam Canonicum Polonum, laborantem Meliceride, magnitudinis jujubæ, quæ à caruncula anguli majoris oculi ad totam pupillam porrigebatur. A multis tentata curatio, medicamentis, decoctis scilicet, collyriis, & aliis hujusmodi; omnia tamen octo mensium spatio in cassum adhibita: cum verò me consulisset, ipsum tumorem evellendum censui, quod cum reformidaret, spe tamen salutis operationem admisit; quam statim molitus sum corpore prius expurgato accuratissime ab aliis medicis. Paravi itaque hamulum, quo ipsam meliceridem perforavi, & manu apprehendi, altera verò forcipe eandem cum solliculo sectione separavi, tum à caruncula, tum à tunica adnata, & ipsa pupilla, atque ita totum tumorem eduxi, sine ulla offensa ipsius oculi; à quibus, statim applicui gossipium imbutum aquâ rosacea, cum ovi albumine agitata, & portuncula croci, patiente tres dies hoc modo fasciâ vincto; adhibito postmodum collyrio ex aq. rosarum & pulvere tuthiæ præparatæ; quibus spatio octo dierum omnino convaluit æger; increpante licet meam præceptione meo ab Aquapendente audaciam, cum tamen brevi spatio reponens id præstiterim, quod alii medici non potuerunt perficere, idque præsentibus, præclarissimo Joanne Dominico Sala, cum multis studiosis. *Petrus De Marchettis observ. xxi.*

Leetissima Virgo annos 21. nata post varios cathartos tandem in oculi sinistri canthi majoris affectionem incidebat, plura adhibita sunt, tum pro leti acrimonia temperanda, tum pro eodem leti redundante vacuando, tum pro corroborando oculo ejusque glandulis; interim non cessavit morbus, imò non tantum corruptionem aliquam in glandula lachrymali induxit, & ligamentum anguli oculi relaxavit, sed etiam eum duplici in loco inter oculum & nasum perforavit. De igne admovendo cogitabant Chirurgi advocati, cum ego solo præcipitato albo diaphoretico muniti cum paucis opio misto, atque tum suprâ glandulam lachrymalem ipsam, tum in foramina insufflato, aliis etiam minoris momenti adjunctis, ægram summo agnatorum applausu integrè restituerim.

Nobilissima Matrona annos circiter septuaginta nata tumorem erysipelatosum totam faciei partem dextram occupantem passa, præ humorum acrimonia, ad canthum oculi majorem præcipue decumbentium, subitò in fistulam lachrymalem incidit. Advocatus reperio, ulcus callosum inter oculi dexteri canthum & nasum situm, callumque



ad os usque pervenire adverte, os ipsum præterea cariem contraxisse observo; tum cum nihil proficeret præcipitatum mercurii, ut nec aquæ vitriolo venetis impregnata, terramque & ignem omnino reformidaret ægra, ad butyram antimonii me converti, cuius particulam cum osli catiolo admovissem, totumque callum eodem sobriè attigissem, excidit calus sub torina intestinuli, orque corruptum extoliam un est, unde brevi adhibito mercurii præcipitato, unguento Nicotianæ & emplastris, de quibus jamjam curatione, integrè restituta est. Interim nec vezæ sectionem celebrare, nec purgans medicamentum, aut alia præsiilia generalia adhibere fuit possibile, liquidem omni re puebat nobilis ægra, eorum usus in longa affectione hypochondriaca, seu potius scorbutica prorsus penalis.

Illustrissima quædam annos 40. nata post cathartum faciei partem dextram occupantem, oculum dextrum præcipuè affectum vidit, tumor enim ingens eum totum cingebat, palpebraque necessariò occludebat; discussa tumoris parte per remedia à mulierculis exhibita remansit anchilops, qui citò in ægilopein abiit, advocatus tumorem aperio, in quo fungosum quid ad os usque nati parvum reperio. Tum nullo alio medicamento adhibito quam mercurio præcipitato albo, aut putro, aut unguento nicotianæ admisto, fungum enatum abluisti, oleus mundificavi, & carnes cum cicatrice laudabili induxi. De emplastris & balsamis, de quibus jamjam in curatione, nihil addo.

Puella Nobilis anno ætatis quinto variolis affligebatur, quæ post sui discessum, satis, ut videbatur, prosperum, oculum dextrum reliquere lachrymantem; elapsis duobus mensibus exasperatum est malum, & à majore oculi cantho copiosam humiditatem excidere observatum est, quæ humiditas continuò in pus abiit. Applicationes, tum aquarum, tum pulverum detergentium primò postea verò astringentium morbo statim opponuntur, adjunctis universalibus, purgationibus sc. per intervalla repetitis, cauteriis, emplastris cephalicis, decocto radicis chinæ &c. non sic tam minus, quamvis lentiori passu, sacrum sibi excavavit humor compressione se per ipsum oculi canthum exonerans, ex consilio Clarissimi cujusdam Medici deligatione compressiva utebamur, ut sc. evacuato per oculi canthum pure, nova ejus aggestio impeditetur, verum in cassum omnia, liquidem post aliquam intermissionem, & mali quali oculationem, semper de novo caput exerebat, donec quintò à suo principio anno, tumor multò quam prius grandior apparuit, qui ad supurationem deductus scalpello apertus est, tum cum os carie immune advertissemus, abicellui per præcipitatum album, & balsamum sulphuris reebinchinatum facile medebamur, additis injectionibus, è collyriis aptis, ac difficilius erat debilitati partem prospicere ac præcipuè glandulæ lachrymalis aliquantulum eroræ & corruptæ, hoc tamen ultimum tandem obtinimus beneficio olei myrtinæ per deliquium, & æxingiæ viperinæ,

#### AFFECTIO HYPOCHONDRIACA.

Affectio Hypochondriaca Galeno à flatuum exuperantia Passio flatulenta dicta, ab Arabibus quibus Mirach Abdomen est Mirachialis appellata, à Chemicis hypochondriorum caratus, Hip-

pocrati, ut credunt, sub morbi exicatorii, morbi iuctuosi, & morbi nigri, nominibus cognita; nostra ætate gravis & frequens admodum reperitur propter causas mox enarrandas. Definuit vulgò æstus & obstructio lienis aliorumve viscerum in prima corporis regione locatorum, ab humore atrabilario atque colico, nullum habens febrem affectam. Recentioribus verò quibuldam est morbus à sanguinis succorumque corporis acrimoniâ varia acidâ sc. austerâ, lixiviali, atque etiam mutiatica, unde depravatur totius nutritio, doloresque aliquando & lancinationes, aut inquietudines vel in ipsis visceribus, vel in artubus sine febre nascuntur. Quæ tamen definitio in morbo complicatissimo non ita est adæquata, quin accuratior expectari possit.

Partem primariò affectam Diocles Carystius Antrigoni Regis Asiæ Medicus Hippocrati semè coartans ventriculum esse voluit, quod eum in hac passione crudeliter semper affectum animadverteret. Quam sententiam nostris temporibus suo firmavit calculo Highmorus, cujus super hac re hæc sunt propria verba. Dum in ventriculo affectionis hypochondriacæ sedem ponimus, volumus in eo fibrarum nimiam relaxationem & debilitatem præcipuè peccare, unde ingesti cibi nec debito calore toveri, comminui, & in intestina propelli possunt, sed partes tenuiores & spirituosæ, à debili fibrarum compressione in intestina proinse, à visceribus avulsimè per vasa rapiuntur lactea, neglectis, aut saltem non separatis crassis, mioribus & fibrosis particulis, nondum à ventriculo concoctis & dissolutis. Atque inde sanguis tenuior, flatulentus, ac nimium spirituosus, fermentationi perpetuè obnoxius, ob fibrarum partiumque miorum inopiam, assimilationi ineptus generatur. Sic etiam Etmullenus. Qui aliquando hypochondriacum, vel incipientem, vel confirmatum examinavit, ejusque symptomata consideravit, aut qui unquam curationi hypochondriaci præfuit, is tantum non manu palpare potest, radicem morbi veram & unicam hæere semper in stomacho, & quidem in vicio succi ejusdem fermentativi, non ritè scilicet digerentis alimenta; unde & chylus, & massa sanguinea, & lymphæ reliquique actantes corporis machinam humores vitiantur & depravantur. Verum respondent alii, ventriculum secundariò duntaxat, atque sympathicè torqueri, ita ut verum atque præcipuum hypochondriacæ passionis diversorium existimari non debeat. Quæ ulterius explicaturus Willisius. Licet, inquit, ventriculum in hoc affectu sæpe graviter laborare concedam, cujus si quidem tonus si laxus, & robur præfractum, propter alimenti indigestionem, pituitæ viscosæ lactis, usque in sinu ejus progignitur, cui ob particulas salinas diutina mora in fluorem evectas sæpe acor insignis, aut austeritas accedunt. Deinceps quia vitium in prima coctione, haud emendatur in secunda, istam sanguinis discrasiam & inordinationes excipiunt. Verumtamen in illam opinionem haud aducat ventriculum semper esse primum in culpa, aut cætera morbi hypochondriaci symptomata, tantum à vitiosa illius constitutione pendere: Novi enim plures agri istius immaniter afflicti, qui stomacho satis valebant; etenim de pulsatione in sinistro hypochondrio, de pectoris angustia, & dolore vagò in eo excitato, nec non de cordis tremore & ex-



pressionem, cum menti continuo & imaginatione perturbata, plurimum quæsti sunt, interim cibos copiosè appetere, ac ingesta quævis sine ventriculi molestia aut gravamine, etiam absque sputatione, aut ructu acido, digerere solebant. Quinimo observavi alios bibaces, & mala victus ratione utentes, stomachi flacciditatem cum dyspepsia, & crebra vomitione contraxisse, qui circa præcordia & facultates animales satis sani, pro hypochondriacis haud omnino habebantur. Præterea in hoc affectu ventriculus sæpe potius aliatum paritum, aut sanguinis vitio, quam propria culpa laborat; quippe ulciturum est ejusmodi ægros, quandiu in lecto compositi multum perpirant, circa stomachum rectè habere, cum verò excitantur, poris oclusis, & massæ sanguineæ facultati inus restagnante, statim cardialgia, flatuum aggestione, & crebro vomendi nixu affici &c. Alii quorum meminit Galenus huncce morbum in pyloro inflammato collocant, unde alimentum ad intestina statuto tempore delapsus interceptitur. Alii in jecore præcalido itubulantes apud se humores exurent, cibosque ante absolutam chylisum & rapiente & præstante (quæ opinio omnino jam inutilis est, in hodierna sc. anatomica luce) Alii in liene genuino, ut credunt, faculentis humoris domicilio, è quo etiam Willisius vitium sanguini communicari asserit, quod in cerebrum, per circulationem elatum, nervique exceptum vellicationes & spasmos pariat. Alii in melenterio, pancreate, auteris melentericis & celiacis, illisque præcipue quæ per omentum partuntur, mali mineram ponunt. Sed enim quid opus est tam anxie morbi huiusce sedem radicalem primariumque & genuinum focus in parte aliqua exquirere, siquidem sapientissime plurimum functiones perturbantur, non a labe altius ipsis impressa, sed ab acriore sanguine & succis ipsas perluentibus. Sic Glissonius, Borrichius, Highmorus, sectos hypochondriacos, omni lienis vitio carere observant, qui in omento, ventriculo, melenterio, pancreate &c. læsi deprehendebantur; Nos vero quosdam omnis prorsus in visceribus labis immune, hisce in passionibus adnotavimus. Interim tamen si parti cuiuspiam primario accensenda veniat culpa, ventriculæ cum Diole, Highmoro atque Hermulero incusabimus, nec contra id satis faciant rationes à Willisio allatæ, quandoquidem etiam si præ fermenti stomachalis aciditate intensiori, quibuldam hypochondriacis familiari, alimenta copiosa ingesta subito satis alterantur, irritationeque per salium spicula in fibras ventriculi inducta, foras continuo amendantur, non sic tamen ventriculi fibræ minus laxæ, aut alimentum per eam spasmos potius quam naturalem contractionem, quasi cilium, minus indigestum credendum, sanguinique iis qualitativis pravis insinuandis, de quibus Highmorus, minus aptum. Tandem verò posteaquam choream in hoc affectu duxit stomachus, in eo confirmatur à sanguine & succis vitiatis, sicque pro morbo & continuando & augendo sibi invicem suppetias veniunt ventriculus & varii succi.

*Causa* ex mente Veterum est bilis atra, & ut, inquit, Menjorius quasi cinefacta, promiscua tamen omnigenorum humorum farragine, à quo heterogeneorum, ut addit, ac sibi controversorum humorum confusione atque anarchia, ru-

multus atque strepitus moventur intra præcordia, ac symptomata à se ipsis dissidentia lobolescunt; sicut per sævissimas ætatis torridæ tempestates, turbulentus fit nigrantium nimborum, coruscantium fulgettorum, & crepitantium grandinum, simul cum furentibus ventris concursus. Verum non satis est humorem attrahilium pro causa morbi flatulenti adduxisse, concursumque varium ipsum in tumultus agentem magnificè descripsisse, videndum quale sit illius humoris genium, & quomodo cum aliis succis heterogeneis tam facile effervescat atque effervescendo, symptomata mali hypochondriaci tam varia quasi alter Protheus tam facile induat, Quod Veteres bilem atram vocitabant in liene aggestam, recentioribus est succus acidus & aulterus in toto sanguine, imo & lymphæ, atque ipso nervorum humore aggestus; non mirum itaque si succus ille non tantum varios dolores & lancinationes per spicula sua faciat, verum etiam succis aliis lixiviale acrimoniæ contractis occurrens, vel viscera & partes musculotas quibus illi suam vim imprimere, perluens, in effervescentiis cieatur, quæ pro varia partium & viscerum ubi peraguntur indole, variisque sic perturbatis functionibus, symptomata innumera producere aptæ sunt. Effervescentiæ autem illæ non dispari oriuntur ratione à concursibus memoratis, quam videmus spiritum cerebintinum, oleo vitrioli, aut spiritum vini recte sicatissimum, spiritui nitri admistum subito & ad minimum calorem cum tumultu fermentescere, imò explosionem quasi facere, non itaque opus est de torrida materia, aut calida viscerum, ac præcipue jecoris intemperie, pro ventris calore, hypochondriorum æstu, imò & plantarum pedum atque volarum manuum ardore explicando, multis hac affectione laborantibus, satis familiaribus, verba facere; natales enim suos jam explicatis effervescentiis debent. Non opus est præterea in alvo eorundem adstricta, calorem excrementa retinentem & allantem incusare, cum illud potius referendum veniat stipticitati succorum per canalem pancreaticum, variaque glandularum intestinalium officia eructatorum, & insuper penetranti eorundem vi qua excrementi salino terrestriores etiam partes fundunt, secumque & per lacteas, & per alia à quibus imbibuntur vasa, in sanguinem, & liquorem nervorum acrimoniæ ipsorum sic aucturi deducunt. Verum quid ulterius hisce immoramur, quæ ex signis morbi diagnosticis mox afferendis, satis patescunt; superest tantum dicamus illud omne demum mali hypochondriaci causam fore quod ventriculæ circa quadam ratione debilitet, variamque succorum acrimoniæ inducat; quod præterquam quod ab alimentis instantibus atque limotam gravitatem interentibus, aut acidæ qualitate præcordiis infestis, perfici potest, non immerito etiam tribuitur, spirituum, succos edulcorantium, ventriculorumque animantium, depaupetationi, à meditationibus protractis, pernoctationibus assiduis, inediis ac jejuniis, laboribus vehementioribus, effusis libidinibus, venere nimia, hæmorrhagiis abundantioribus, irorbitque chronicis, summo cum ægrotantium tedio, prægressis. Adde corporum ad huncce morbum dispositorum habitudinem, juxta Hippocratis verba ex editione Charteriana; sanguineum & aliquatenus biliosum acidus ructus excitat. Fortassis autem ad



atque bilis orbem hinc desinet. Quæ Menjorius sic reddit; Sanguinei & aliquantulum bilioli, acidis ructibus conflictantur; atque adeo verendum ne in morbum nigrum desinant.

Quam affectionem hypochondriacam dixerunt, in hepaticam, splenicam, & mesentericam, quibus alii addunt, stomachicam, pancreaticam, hysterica, hæmorrhoidalem, & pharyngicam, verum sine necessitate, quandoquidem hinc unus & idem affectus, in hac vel illa parte vim suam magis, aut minus exerens, denotatur, nec primarius ipsius vidus radicalique origo explicatur. Differt a Melancholia Hypochondriaca quod hæc metum & tristitiam perpetuos habeat comites, rationemque persandet, cum contra morbus hypochondriacus loca quæ sapere homini ministrant nullatenus attingat, cum propriis sc. continetur terminis. Itaque hic per transennam cum aliis advertimus, Dioclem m. à Galeno cap. 1, quod si symptomata istius ægitudinis enarrans de metu ac tristitia siluerit, quandoquidem cum hæc adsunt phænomena, morbus non in passionis hypochondriacæ, sed melancholiæ hypochondriacæ nomine in ligari debet. Differt præterea Scorbuto tanquam minus à majori. Affectio enim Hypochondriaca est quasi scorbuti mater, seu potius scorbutus a thudum in cunis degens; aucta sc. acrimonia, & debilitatibus affectionum hypochondriacam patientibus scorbutus enascitur legitimus.

Passio Hypochondriaca multifariis nobilitatur symptomatibus, unde signa ipsius diagnostica in in mentum propè succrescunt, non enim unus tantum venter ab ea afficitur, sed per illos omnes præterquam vagatur, in habitum etiam corporis vim suam exerit. Hæc breviter quantum heri poterit, perlustremus, postquam adinoverimus ea omnia non in eodem individuo, sed in pluribus tantum sparsa reperiri.

Hypochondrii sinistri minus sæpe dextri, quandoque præcordiorum in genere ætus affligit, qui se magis exerit calidioribus ingestis, aut cum corporis exercitio agitantur humores; tum etiam tota facies rubore suffunditur. Arteria carotica, ipsaque aorta dorsi perrepans vehementius pulsant, quod Medico contractum facile fit obvium. Flatulentus tumor totum abdomen cum dolore, præcipue post cenam distendit. Flatus hi præterquam quod in ipso phragma ad suffocationem propè interdum comprimunt, magno cum impetu, & miro quodam boatu etiam eructant, idque cum levamine. Venter omniū maxime vexatur, cibos ingestos malè coquit, & in materiam aqueam, acidam, ponticam, austeram, aliâque acrem, atque etiam viscidam immutat, unde vellicationes variae atque cruciales, præcipue in ejusdem ore toto nervis confuso, ut & flatu, qui, vel inter viscerum membranas conclusi, eas quasi dilacerant; vel intra ejusdem sinum exsp. times, exitum non adveniunt, ætato sc. duplici ventriculi orificio ab immoderata ipsius dilatatione, quomodo videmus urinx copiam vesicam magnopere distendentem contractis eius collo ita turiam parere; inde dolor ad dorsum usque porrigitur, imò ad lumbos aliquando descendit nephritidem mentimus. Sitis quandoque ægotantes excruciat, vel etiam prorsus abest ob seri aquosi spuitionem confertam tunc tumque inde factam eluisionem; quidam meribuli, alii hydropotæ sunt. Qui

busdam ab acido exaltato voracitas provocatur canina, aliis exuperantibus visciditatibus appetentia ista difficitur, ut eos omnium alimentorum tædeat. Vomitus est nunc inanis, nunc verò aqueus, pituitosus, fellofus, ferruginosus & niger, atque interdum ira acidus ut ex eo dentes stupescant; quæ aciditas in saliva etiam quandoque tam intensa est ut eundem stuporem pariat, imò quandoque eadem saliva acrimonia prorsus diversa peccans saporem pipetis, aut aromatatum acriorum in totum os effundit. Cibos si non corruptos, saltem inconcoctos ægi sæpius vomitu remetiuntur, ac regustant, in ruminantium animalium censum propterea quasi accensendi. Alvus adstricta est & pigra, non quod per pylalum & incensum vitæ excrementi absorbeat humor, sed propter rationes supra allatas; fæces plerumque nigre, terrestres, limosæ, & quasi argillæ, pituita tenaci & viscosa permixta. Urina nunc aquea & tenuis est, instantis paroxysmi signum. nunc turbida, crassa, rubra, acris, & foetida, cum arenulis rubris macula parietibus adhaerentibus. Ad venerem sunt prioni, à sale enim ut plurimum sunt salaces, seu à pruriente scro genitura immisto partes genitales non parum excitantur. Novitamen quosdam in quibus temerarius quid penis spongiosis corporibus, ut & scilicet vasis irpectum non tantum inertiam & flacciditatem, in pedito spiritum & sanguinis appulsu, sed etiam urinam difficilem per compressum inde in radice uterum faceret. Pulsus nunc durus, nunc concitatus, nunc tardus & frequenter intermitens. Cor ubinque palpitans & quicquid emundus, unde crebra animi defectiones, viriumque defectiones præcipue ubi de objecto vel minimum intolito agitur. Ægi de œsophagi angustia, & asperæ artæ arctatione suffocante conqueruntur, propter vapores austeros à ventriculo elevatos, lymphamque & succum nerveum ita perica acrimonia peccantes, atque nervos & musculos laryngis & pharyngis ita angustantes ut utraque contracta videantur, quod in suffocatione hypochondriaca, fædè hysterica non inata, præcipue solet contingere. Adest caligo oculorum, putos non auminentum soles, aurium tinnitus, vertigo, quandoque dolor capitis immanis, aut gravitas, pervigilium, aut somnus ab intomniis terrore plenis perturbatus, præterim post mediam noctem. Memoria in quibusdam aboletur, in aliis loquela deficit, aut impeditur, imò motus tum animalis tum naturalis torpidius atque difficilius peragitur; unde lassitudines spontaneæ. Dolores in extremis digitis, ac fornicationis sensus & stupor excitantur, cutisque integra prurigne & punctationis sensu, quem quandoque subequuntur maculae, fatigantur. Corpus univertum, sed præsertim facies fugaci rubore suffunditur, cujus materia in sudores putentes cito resolvitur, à quibus molesta interdum procreatur pediculorum turba. Sed quod in huic affectionis signis præcipue advertendum venit, est varietas pathematum, unde alii certa victus ratione gaudent, quæ aliis omnino nocet, alii ab eodem medicamento levantur, quod aliis est perniciosum, imò aliquando eidem individuo uno tempore non leviter obest, quod alio non parum contulit.

Difficilis est admodum curatio mali hypochondriaci, idque eo magis, quod magis inveteratum



tum fuerit, & si ex ea non observetur diæta. Præterea ejus medela nunquam fidet, nā ut ingeniosissime Menjotius, superfluit vel minimo fermento morbo. post aliquot menses *παύσηται*, ac ipse sibi quasi superfluit, extinctique parum fideliter incensam more flammam revivunt: idcirco hic, aut in quibus alias, Medicis prudentibus opus est, expugnato longa quasi obliatione hypochondriaco morbo, cum um U. ille in imitari qui post everfam Trojam Atty. inactem. Hectoris filiolus ē turri in præcepit dedit, ne eo dū re bellum in posterum intantaretur. Itaque non immerito Tachenius in suo de morborum principe libello. Hoc autem productum (sc. hypochondriacum) medicinis purgantibus non autulcare, multoque minus pro. uctū t. b. um sive fermentum, quilibet medicinx ingenuus practicu. mecum sine dubio fatebitur, hinc namque illud inter medicos; ab hypochondriacis non solventibus libera nos Domine. Quotiescunque enim, etiam datū quoddam productum & uginum excrementum, eva. uatione toras pelatur, illico novum, tabro sc. relicto regenerante, succenturiatur.

Morbi huius paroxysmus qui per se ingruit, deterior existit, quam qui fortitē ab ira, clamore, motu, aut ingetis concietur; item cujus finis integer non est.

Urinæ aquosæ, crassior præfertur; imo ut alvi laxitas moderata, vomitus cum *σφοδρ.* narium hæmorrhagia, hæmorrhoidum apertio, varices, mentium profluvium, ita etiam urinæ nigra sæpe morbum solvunt. Splenici præterea, ex Hippocrate, dysenteria superveniens, bono est; *at ipsa diutius perseverante*, hydrops aut lienteria supervenit, atque ægri, *exhaustis viribus* intereunt.

In splenicis propter malitiosum humoris indolem suspecti sunt quilibet decubitus, inde enim nimia, epilepsia, convulsiones, & ipsa quandoque apoplexia excitantur.

Pertæpe remedium prius administratorum absoluta cessatio, hypochondriaco morbo afflictis fuit salutaris, natura enim, ut habet Menjotius, sic præsidium ratio liberata, fractis afflictisque vires refover, quibus morbum curatione antea facta jam tentatum profligat; neglecti enim morbi, ut habet Aëtius, sæpe sunt leviores, minusque ad aliquod contere negligentiam.

Hippocrati, morbus siccatorius, qui proculdubio hypochondriacus, affectus diuturnus existit, & senescentes, si ita visum est, deserit; sin minus cum ægro commoritur. Quam eandem habet de morbo incerto prognosin.

Indicationes præcipuæ stomachum respiciunt, qui sc. evacuandus & ejus fermentativus liquor temperandus atque volatililandus, & digestio naturalis quæ utrum fieri potest restitueret. Adnotandum præterea vitiosos humores & acrimonia qualicunque, sed præsertim acida peccantes, sive in visceribus hærentes, sive cum sanguine commistos, sensim corrigere & blandè educere.

Curationis basis est secundum plures Practicos in vomitu quod ventriculus ab onere suo commode levatur, & à cruditatibus acidis & nidorosis liberatur; purgantia verò validiora non ita bene cedunt, quin potius nocent, per investa cornina aliaque symptomata; interim alvus servetur libera remediis usualibus atque lenioribus, pilulis v. g. tartareis Bonii, de ammoniaco Querceta-

ni, Elixysion, purgantibus ac præcipue volatilibus, quæ non uno nomine arident, quandoque clysteris quorum materiam non opus est hic addamus, & aliis id genus, mutatis læptus auxiliis, ne eorum uni nimium assuecat natura. Hinc purgantibus lenioribus adhibendis alterantia etiam possunt adjungi, cumque in finem, tum vina, tum syrupi, tum marmelatæ, tum confectioes, tum infusiones, varietate compositionis parati.

Chalybs præterea maxime commendatur tanquam robusta. cum cinerea, cujusque vis in acido intringendo valde est probata; interim tamen quandoquidem varia est morbo hypochondriaco laborantium constitutio, & temperies, advertendum cum Witlino, si eorum sanguis crassus sit, parvisque terrestrioribus, fixis, & ubi frigoris prægnans, cum viscerum inde enata obstru. ctione, medicamenta è chalybe parata exquiri. At si sanguis sit fervidus, seu per salium variorum ad fusionis statum devectorum confectum, perpetuò quæsi fermentescens, atque præcordia & intus, & vellitationibus dolulicis affligens, remedia indicari fervorem sedantia, fugienda verò quæ chalybem admissum habent, ne sic ulterius commoveatur quod sedandum potius est. Advertendum etiam cum Tachenio circa chalybem quod nisi excrementa ab isto tingantur, temere non sit exhibendus, quia tum non reperit idoneum humorem qui illum solvat.

Lac atque lacticia omnia, non parum profunt, dummodo iis ferendis sit æger, corpusque ritè prius præparatum, nam præterquam quod acedinem humorum, temperant, corpus exquisitè enutrient, imò corrigendis, seu temperandis antiscorbutis acrioribus, in morbo hypochondriaco necessario quandoque exhibendis, mirè inserviunt.

Diuretica & siccantia in subjectis etiam propensis, cautè administrantur, ne sic scilicet sanguinis tonus per fusionem jam inchoatam ex parte depravatus, ulterius collabatur; fibræque aliæ attritæ nutriendi corporis officium oblitæ, una cum sero eliminentur. Sed quam maxime à mercurialibus abstinendum, ne inde orta salivatio periculosissima interat symptomata, quod non semel vidimus, nec minus erit iis qui salium morbo hypochondriaco familiarium spicula norant, quàmque facillè terrestriore, imò ponderosiores eorum particula, mercurii vi in corrosivum quid & perniciosissimum sublimantur. Quæ de re vide in sequentibus observationem notatu dignissimam.

Aquarum mineralium melioris notæ, & præcipue earum quæ marre & lixivialibus imprægnantur, aut etiam bituminosum quid & balsamicum nitro admistum redolent, usus proculdubio erit proficuum, sic enim non tantum sanguis, lymphæ &c. exagitantur variæque fermenta ipsis admista excutuntur, sed etiam viscera quasi everruntur, acorque ipsis invidulans è latebris suis magna vi educitur, atque salia in succis restitancia, novis turbis per sui exaltationem excitandis paratæ, innocuam induere coguntur naturam. Revera tamen, sicut vala quæ aceto continendo fuerat adhibita, etiam si summa diligentia lora, fermentum quàm obstinatè conservant, liquoribus immixtis propria qualitate imbuendis, idoneum; sic & de visceribus, semel humore hypochondriaco



driaco imbutis meritis dici debet, quo semel est imbuta recens servabit odorem, testis diu. Nec ita fidendum sopitæ acrimoniæ quin continuò ipsi invigilandum sit; (ut supra jam adnuimus) & quod maxime advertendum, cum quibusdam aquis, aciditatem sanguinis, extinguere annitimur, sæpe vitando scyllam in carybaim cadimus, sc. exsuscitata acrimonia lixiviosa; (ut aliquando mihi videre contigit) non enim acidum ita omnium morborum patens dici meretur, quin sapissime, lixivium ipsi prædominetur, à quorum varia combinatione, varilique exaltationum gradibus, falsedines innascuntur non unius sortis, sed pluribus symptomatis in hanc aut illam partem inducendis habiles.

Venæ sectiones præter illas quæ per sanguifugas mariticas affixas perficiuntur, aut ad præparandum corpus aliis remediis sobriè præmittuntur, multum sanè non arident; causæ enim per eas non occurrunt, imò salum motus, sic facilius, variis concursibus indeque enascendis effervescentiis, anam præbet.

Remediis majoris momenti jam lustratis superest ut de alterantibus quibusdam, imò specificis, uno verbo agamus. In eis alterantia reperire est varias radices, armorac. atonis, filicis, helenii &c. Herbas absinthii, chamædrysos, chamæpith. cichorii, agrimon. fumar. cent. ur. min. aliaque amara, unde extracta, & essent. & confici, imò salia erui commodissime possunt. Tanquam diureticum insignis facit sal restitans in destillatione sal. ammoniaci cum sale tartari, item varia è tartaro parata, tum fixa, tum volatilia, tartarus vitriolatus, ut & solubilis, atque chalybeatus, terra solvata tartari, arcanum duplicatum Myusick. tinctura tartari antimoniatæ, tartarique spiritus ac præcipue sal volatile, volatiliæque alia omnia quibus hocce in morbo oppugnando vis inest quasi specifica, atque ea propter variis, tum purgantibus, tum alterantibus amaris in elixyria, aliaque id genus utiliter commiscenda, imò quandoque, sic exigente morbo, in tertium quid per sui cum acidis aptis unionem, commutanda, quale quid productum est mistura simplex cum volatilibus generosioribus, spiritu nitri &c. parata, cujus efficaciam non satis laudare possumus.

De variis martis præparationibus, ut & de spiritibus è cochlearia, mentha, aliisque eliciendis; de terra martis præparata aliisque pluribus, imò de diaphoreticis ex antimonio & Marte, atque jovialibus, &c. non est quòd pluribus hic agamus, ut nec de emplastris stomacho atque lienì applicandis &c. Sic enim in immensum excreveret hoc caput, atque etiam plura circa hæc videri poterunt in consultationibus & observationibus mox afferendis.

### Curaciones, Consultationes, Observationes, & Cadaverum Anatomicæ Inspectiones de variis Auctoribus.

#### Curaciones.

Affectiorem hypochondriacam incipientem, vel simplicem, plerumque curat vomitus; nominatim ex aqua benedicta Rulandi procuratus, hæc nimirum ratione saburra ex ventriculo & vi-

cinioribus partibus eliminata faciliorem reddi curam, quæ tota insumenda est in obstructionibus, si hæc viguerint, demolienti.

Aperientia itaque cremor tartari, tartarus vitriolatus, vinum Mart. pulvis cachecticus, vel præmittenda sunt vomitionibus instituendis, vel iisdem postponenda. Utrobique præsentia Medici hic desideratur, à qua cum pendeant omnium curationum momenta, sæpe petit omnis felicitas, nisi illa cautè & religiosè, & cordatè sublit.

Purgantia in hoc primo casu præter vomitoria sunt cholagoga & melanagoga, pulvis lennæ laxativus, extractum rhabarbari, mechoacanæ, panchymagogen Crollii, extractum ellebori nigri, item mercurius dulcis, hic multum proiunt, à quibus evacuationes sæpiùs si opus est instituta laudabiliter proficiunt. Sic extractum pilularum de ammoniaco hic quoque unice præstat.

Ad mitiganda symptomata, quæ plerumque fiunt à statibus distendentibus præcordia, & in cerebro spiritus animales lancinantibus, faciunt corroborantia nobiles illas partes, si diutius, quam par est & ipsæ obstructiones durant, iunctque magisterium & sal corallo. um & perlarum, lapis bezoar, tinctura corallorum, c. i. x. proprietas, item oleum croci. Hæc nimirum ungula cor & cerebrum roborant: cerebro imprimis tinctura lunæ in hoc casu utilissima est.

In confirmata affectione hypochondriacæ, si leviora ista minus locum habere possunt, præmittenda tamen sunt, ne vomitus formidandus.

Experientia deprehensum est aperientia ista quandoque profuisse, & acerbum malum sustulisse: Recidivam tamen per intervalla redeuntem & graviter affligentem, radicem ex toto non averruncant.

Eadem ratio est in acidularum usu quotannis instituendo aliqualem viscerum apertionem causantium, sed morbum ipsum non penitus tollentium. Operæ pretium itaque est, ut in subsidium affectionis hypochondriacæ confirmatæ curandæ talia accessantur remedia, quæ funditis radicem morbi evellant: sic ℞. aquam philosophicam, seu sp. vini tartarificatum in convenienti liquore à minima dosi ad maximam usque (à gutt. 1. 2. 3. 4. iusta dosi, ad 8. & 12. ascendendo, quotidie gutt. 1. interdum pro ratione circumstantiarum in eadem dosi persistendum) quotidie exhibitus, præmissis tamen illis lenioribus & parùm proficientibus, funditis curat. Idem præstat extractum pilularum Ammoniacar. de quo supra; cujus si decur quotidie ʒj. vel etiam (interdum per dies gr. j. augeri potest ad 3j.) si opus est, per dies 12. vel 14. 2. horis ante cenam, sumptis post horam iusculo, operatio admodum felix subsequitur.

Nobis sæpe usu venire solet, ut ab exhibitione horum præsertim solutis obstructionibus internis viscerum alvus ita proticeretur, ut quasi dysenteria subsequi videatur. Tunc providendum erit corroborantibus istis supra enumeratis; præsertim tincturâ corallorum & elixyre proprietatis. Interim respiciendum quoque fuerit in hoc casu ad legitimè directam dietam, sine qua nulla penè potest esse felix curatio.

Venæ sectiones in morbi statu præsertim salvatellæ magnum adjumentum præstant. *Joann. Hartmann. Practic. chymiatr.*



Si in ullo loco vel affectu variant symptomata, certe variant in malo hypochondriaco. Dicitur quoque *Tartar. Hypochondriacum*.

Si diutius durat, degenerat in Scorbutum, novi experimentum quod humor ab hypochondriacis, per vomitum reiectus in petri in vitriolum concreverit, in olivacea corroferit. Clysinata ad alvum adstrictam hic commendantur, hæc enim in primis debet esse aperta. Vomitoria conveniunt non adeo fortia. Prolunt rad. filicis, polypodii, flores borragin. buglossæ, genittæ, succus pomorum borstorianorum. In hisce possunt infundi purgantia. Conveniunt hic quoque tinctur. tartar. antimoniat. essentia fumariz aperitiva, tinctur. vitrioli martis Zvelf. Acidulæ quod plus de matre participant, eo sunt præstantiores. De usu vero acidularum vide *Sebysum*. Si adsit ulcus in liene vel omento, vel ventriculus sit admodum debilis, tunc acidularum usus non convenit, nisi ventriculum roborantia simul adhibeantur. Calisia non prodest, quia flatulenta, neque myrobalani, quia post se adstrictionem relinquunt. Optimè in hoc affectu usurpantur extracta catholici, Andernaci, Crollii. Præprimis autem hic valent medicamenta martialia. Multi Medico-Chymici clarissimi uruntur hic feliciter remedia quæ reperiuntur circa mineram martis, cum præcipue de matre & multa præstet in obstructionibus mensium. Potest in marmore lavigari cum aquis appropriatis. Apprimè quoque hic convenit elixir proprietatis. Item medicamenta ex tartaro. Si hæc affectio super consensum à ventriculo, profunt pilul. hieræ cum agarico. Item pulvis stomachicus Quercet. sal ablynth. chrysellinum, sal stomachale Mynsichti. Diapolyticon Galeni verò in malo hypochondriaco & melancholiâ hypochondriacâ cum utilitate ventriculi singulare atcanum est, quod plerumque hypochondriaci ad extremam maciem redacti faciliter curati sunt, teste *Fabro & Bartholeto*. Præcipuas autem vires hic pulvis obtinet ab ingrediente sale, quod in flatibus & ructibus sistendis singulare est remedium. Si oritur ab hepate per contentum, iterum lactis portigi potest cum ipso vitrioli martis spiritu tartar. vitriolat. vel clyffo vel succis herbarum specificis. Si ab utero oriatur præparantibus medicamentis addatur sæcula ari, vel bryoniz. Purgantibus verò radix bryoniz & aristolochiz. Item fiant noduli ex herb. melissæ, maticariz, pulegii, mercuri dis. Si oritur ab obstructionibus hæmorrhoidalis fluxus alias consueti, conveniunt pilulæ aloëticæ. Item frictio cum sol. ficis.

Digestiva ergo & purgantia dirigenda sunt ad partem mittentem, sive ad hepat, sive lientem, sive uterum. Vel possunt præscribi medicamenta, quæ simul aperientia sunt & purgantia; vel manè purgantia & vespere aperientia profunt. Quod si enim digestiva nulla adhibeantur, creatur dolor colicus ob materiz pertinacitatem. Si malum est contumax, interdum per tres vel quatuor dies præmittantur digestiva, & profunt hoc loco martialia, ut crocus martis aperitivus cum sale. Salia enim laxant & valde penetrant. Digestiva & tartar. chalyb. 3 iij. facul. aronis 3 j. div. in 3. part. aquales. & croci mart. aperitiv. cum salibus 3 vj. pulv. each. Quercet. 3 ij. D. in octuplo. & sal. hypochondr. gr. x. D. in quadruplo; præparatur hoc sal hypochondriacum ex sale armoniac. & sale tartar. & claret. chalyb. 3 viij. syr. de s. rad.

aper. 3 ij. & ag. filicis, cuscute, cichor. agrimon. ana 3 ij. syr. de s. rad. aper. 3 ij. essent. mart. liquid. 3 iij. tinctur. tart. 3 ij. misce. Dumitur duabus horis ante cibum. & ag. aperit. usq. 3 vj. syr. de s. rad. aper. 3 ij. sp. aperit. Pen. 3 ij. misce. Purgantia & rad. gram. filicis, asparagi ana 3 lb. herb. cuscute. eupator. fumar. agrimon. ana m. j. flor. cichor. bellid. genist. ana p. iij. Rhab. monach. 3 i lb. rad. polypod. helleb. nigr. ana 3 j. esul. prap. jalapp. ana 3 lb. zedoar. Galang. Cort. aurant. ana 3 ij. vel 3 iij. sem. anis. 3 i lb. crem. tartar. 3 iij. m. f. nodulus. & rad. s. aper. 3 iij. flor. cichor. genist. bellid. ana p. iij. limatur. martis 3 iv. passul. min. 3 ij. cum. elect. 3 iij. carophyll. macis, ana 3 j. sol. S. S. 3 j. rad. helleb. nigr. prap. polypod. jalapp. esul. prap. ana 3 lb. f. novulus. & M. pilul. tartar. Quercet. 3 i lb. de ammoniac. ejusd. 3 j. extract. helleb. nigr. 3 lb. scam. sulphur. gr. viij. cum tinctur. tartari f. l. a. pilula instar pisorum minorum. & M. pilul. tartar. Quercet. 3 j. extract. helleb. nigr. gr. vj. resin. jalapp. gr. v. cum essent. fumar. hanc pilulæ pro j. dosi & M. pilul. de fumariz 3 j. extract. helleb. nigr. gr. vj. scam. rosat. & sulphur. ana gr. vj. m. f. pilul. pro dosi. & M. pilul. tart. Quercet. & de ammoniac. ejusdem ana 3 j. aloes rosac. multipl. infus. extract. martis ana 3 ij. f. l. a. pilulæ cum essent. aperit. instar pisorum minorum & pulv. cathol. purg. 3 j. croc. mart. aperit. cum salibus 3 iij. Dos. 3 ad 3 ij. & syr. laxat. fumar. compos. ana 3 ij. extract. helleb. nigr. 3 ij. in aq. cinnam. vel borrag. dissolut. scam. rosat. 3 j. essent. mart. liquid. 3 ij. tinctur. tartar. 3 i lb. ag. aper. usq. 3 j. misce. Dos. 1. vel 2. cochlearia duabus horis ante cenam vel prandium. & sol. fenn. S. S. 3 iij. rad. helleb. nigr. 3 j. flor. cichor. genist. borrag. bugloss. ana p. j. rad. gram. filicis, ana 3 iij. crem. tart. albiissim. 3 j. infund. in f. q. ag. fumar. & cuscute. per noctem, manè ebulliant ad dissolutionem tartar. colat. adde syr. de pom. laxat. 3 vj. misce pro j. dosi. & extract. helleb. nigr. scam. rosat. ana gr. viij. syr. de pom. laxat. 3 j. ag. cinnam. borrag. ana 3 ij. essent. mart. liq. 3 j. tinctur. tartar. 3 j. misce. Clysmata inhibent vaporum adscensum ad cor & caput, unde palpitationes cordis proveniunt. & herb. fumar. cuscute. epithymi. flor. cent. minor. ana m. j. chamemill. Rom. p. iij. cord. ana p. j. rad. filicis, rhab. monach. ana 3 j. polypod. 3 vj. helleb. nigr. 3 lb. sem. carui, cum. ana 3 i lb. cog. in f. q. feri lactis, col. & f. in qua dissolve elect. cathol. 3 i lb. de bacis lauri 3 lb. sal. nitri cum antimon. fixat. 3 ij. vitell. ovor. n. j. f. l. a. enema. & Decoll. emoll. carminant. ana lb. lb. in quibus dissolve elect. diacath. 3 i lb. hier. pier. 3 lb. extract. helleb. nigr. 3 j. vitell. ovor. n. j. m. f. enema pro duabus dosibus. & Decoll. flor. & fruct. aperit. ana lb. i lb. in quibus dissolve confect. hamech. 3 j. sal. nitri cum antimon. fixat. 3 j. ol. still. lauri gutt. xv. f. enema pro 2. dosibus Confortantia & aperientia: & Elyx. propriet. Sennæ cum succo hed. 3 vj. sp. aperit. Penoti 3 iij. m. dos. gutt. 30.

& Essent. fumar. cum mart. liquid. ana 3 lb. m. dos. 30. 40. vel 50. gutt. & tinct. mart. Zvelferi de fumar. comp. ana 3 iij. m.

& tinctur. tart. mart. 3 vj. dos. gutt. 20. vj. tinct. tart. antimoniat. 3 lb. dos. 20. gutt. & essent. carminat. aperit. ana 3 iij. dos. gutt. 30. ad 50.

& eboris suo igne par. 3 ij. facul. aron. 3 j. pulv. cathol.



*cachet. Q. 3ij. dof. 3b. ad 3j. ℥. Conserv. fumar. flor. eichor. moliss. ana 3j. eboris sine igne 3i b. spec. diarrhod. diatrion. santal. ana 3j. croc. mart. aperis. 3ij. confect. alkerin. 3j. syr. meliss. q. s. c. f. q. Sacchar. in aq. agrimon. solut. f. rotule confortantes ventriculum & aper. hepar. dof. 6. vel 9. In malo hypochondriaco stomachico.*

*℥. Pulv. stomach. Quercet. 3ij. sal. stom. Myrs. 3j. m. ℥. eboris sine igne 3ij. sacul. aron. 3i b. epas. rubr. 3j. milt. dof. 3b. vel 3ij. ℥. eboris sine igne 3ij. sacul. aron. 3j. sal. absynth. chrystall. 3ij. m. ℥. sp. mastiches 3ij. aperis. 3ij. m. dof. 3j. ad 3b. ℥. essent. menth. 3ij. sp. mastich. 3i b. sal. mart. 3j. m.*

Externe convenit emplastrum stomachicum Cratonis, quod, si ructus adsint, misceri potest cum tertia parte empl. de bacc. lauri & malaxari oleo chamomillæ, zedorizæ, oleo stillatitio rutæ, cham. absynth. aneth. Potest etiam ex his aut aliis primum fieri unctio & deinde applicari empl. Item possunt fieri l. oculi ex discutientibus, si adsint ructus & exhiberi. In malo hypochondriaco hepatico. *℥. conserv. flor. eichor. 3i b. rad. eichor. 3j. eboris sine igne 3ij. spec. diarrhod. santal. 3i b. croc. mart. aperis. 3ij. pulv. cachet. Quercet. 3j. cum f. q. syr. de eichor. f. l. a. electuarium. ℥. eboris sine igne 3ij. spec. diarrhod. santalon. 3i b. sal. epas. Myrs. 3ij. m. dof. 2. 3j. ad 3b. ℥. eboris sine igne, spec. diarrhod. abbas. diarrhod. santal. ana 3j. pulv. cachet. Q. 3j. c. f. q. sacchar. in aq. agrimon. solut. f. rotule. ℥. ti. flur. flor. bell. 3b. sp. vitr. mart. 3ij. M. Dof. 30. ad 40. gutt. ℥. tintur. flor. bellid. 3b. sp. pro arid. arif. ana 3b. m. dof. 30. gutt. in sero lactis vel cerevisiæ. Succus pomorum borskoffiano cum sero lactis misceri potest & exhiberi. Serum enim lactis laxat & abstergit. Si de viriol. mart. aliquid inficiatur in acidulæ naturales majorem efficaciam acquirunt & in minori dosi possunt exhiberi; idem præstat clystus, de quo vid. Schroderus. Si ab utero, hysterica profunt; Item crocus martis. per. Zvv. qui potest misceri cum l. ula bryonæ Joann. Michaeli. lib. 4. cap. 32. praxicos. Clyn. Gener.*

### Consultationes.

Temperamenti cholericæ Juvenis annorum 21. dolores circa orificium ventriculi non adeo graves, per intervalla sentiebat: neglectis autem consiliis ac medicamentis inordinataque victus ratione addibitâ, tandem ita malum prosperere ac incrementa sumere passus est, ut ad extrema ferè deductus fuisset. Antea enim uti leves, ita jam insignes circa præcordia dolores, totum pectus tensione gravissimâ ad dorum usque penetrantes, quotidie & maximè assumto cibo, non per horam 1. sed per 3. aut 4. durantes persentiebat, ita ut ferè exanimatus aliquando præ dolore jaceret. Caput doloribus non minùs punctoriis divexabatur gravissimis: Appetitus, nausea, & frequens sputatio atque evomitio materiæ pituitosæ valdè cum molestabant: symptomatibus aliquo modo remittentibus, totius corporis lassitudo aderat. Tristitia præterea, metus, atque falsa imaginatio cum miseriæ excruciant. Idèd consilium atque auxilium exposcens, ad medicinam, tanquam anchoram sacram confugit æger.

Quæstio jam inter arti medicæ addictos, satis

ardua agitabatur de morbi essentia, parteque imprimis affecta & causis. Multi hujus erant sententia, ac si ab humore melancholico ortum traherent hæc mala. Alii accusabant hepatis nimis calidum quod sanguini effervescentiam conciliare, à quo, ut & à vicina bile nocivos fumos elevari, atque ad varias partes transmitti allerebant. Plurimi totam culpam in lienem conferebant & hunc sexcentarum ærumatum authorem esse statuiebant. Quibuldam mesenterium variis humorum generibus refectum malè audiebat, scaturiginem & fontem omnium morborum & nutriculum medicorum illud pronunciantes. Nonnulli ventriculum imbecillitate suâ, sive nativâ, sive asciticiâ malè coquentem, maximè in noxa esse sibi firmiter persuadebant. Habitui ac dispositioni naturali ac vitio hæreditario, non parùm adscribendum esse, quædam pars judicabat. Alii cavitatem inter ventriculum & septum transversum, quam Hollerius foveam stomachi nominat, inculpabant. Omnes tamen in eo conveniebant & unanimiter conspirabant, propter varia symptomata esse melancholiam hypochondriacam, à medicis proceribus ita denominatam.

De parte affecta atque causis, ut ex prædictis satis luculenter elucet, dissentientium authores, ita ut si unquam, certè hic cum veritate dicendum sit, quot capita, tot sentus, ac eas bono consilio extricandas (ut Lindenius loqui amat) parliamenti cui concilii principum ac procuratorum populi medici convocatione opus sit. Unde inter tot dissentientium authorum opiniones, quid statendum, at uti revera est & difficile. De Clarissimo enim atque experientissimorum virorum in medium allatis opinionibus judicium ferre, illasque vel approbare, vel rejicere mei nec hic est instituti, nec mearum virium, aliis, quibus magis exquisitum est Judicium, ea relinquens; hoc saltem ad meam explicandam mentem addo, facili negotio dirimi posse controversiam, si inter causam generalem & specialem: ac inter proximam & remotam constituatur discrimen: & ita si, qui affirmant lienem, hepar & mesenterium maxima ex parte laborare adstruunt, non adeo distare, cum utrique habeant, quod rationi & experientia consentaneum videtur. Qui in hypochondriis partes, quales, sunt hepar & lien, ut & vasa harum partium, necnon præterea ventriculum & mesenterium pro subiecto colluviei hypochondri, agnoscunt, non reprehendo. Ventriculum tamen debilem relaxatum & malè coquentem præcipuè peccare, malique causam proximam constituere existimo: à ventriculo enim vomitiones, nausea, fluctus & murmura ortum petunt, & ita verè ventriculum læsum ostendunt. Ad stabilendam meam sententiam Dioclem audiamus sic autem ille referente Galeno l. 3. de loc. aff. c. 7. oritur, inquit, alius à ventriculo morbus, qui ab aliis flatuosus nominatur, quem sumto cibo, maximè coctis difficilis, spiritum multum comitatur, item ructus acidissimi, flatus, affus in hypochondriis, fluctuatio, non illico sed cum reituerint: Interdum quoque ventriculi vehementes dolores, qui nonnullis ad dorsum usque procedunt, congestis inde cibis quiescunt, mox aliis cibis ingestis eadem reveruntur accidens; quæ interdum à Cæna molestant atque vomitu crudos cibos & phlegmata subamara, calida & acida, adeo ut dentes nonnunquam torpedine afficiantur, hætenus ille.



*Temperamentum autem cholericum, ex quorum numero ætorus noster, habitus quoque corporis tenuior, futuri hujus mali magis subjiciuntur, quia à caloris augmento dissipantur magis spiritus & fibræ laxiores & magis flaccidæ redduntur; adeo ut assumti cibi in ventriculo rite contringi, & dissoluti, feliciter expelli nequeant; sed in acidam, viscosam & acerbam degenerent materiam. Hanc ipsam, calor viscerum, hepatis scilicet ac lienis, magis quam par erat, exagitant in status abundè resolvit, hinc malo huic obnoxii inveniuntur cholericum, ut potè qui visceribus calidioribus gaudent: viri etiam & ætas media ob calorem abundantiorum hoc magis infestantur malo, quam foeminae, & in prima ætate constituti. Hinc quoque fit, ut habitus etiam corporis extenuetur semper, neque pinguescant, qui malo laborant hypochondriaco.*

Causæ remotiores sunt, quæcunque fibras ventriculi flaccidas & debiles reddere solent: exque ab erroribus in dieta peruntur maxime, cibi flautenti ventriculi tunicas ultra naturalem extensionem distendentes, ut se rursus debito modo contrahere nequeant. Naturalis etiam fibrarum laxitas & debilitas jure hæreditario à parentibus in liberos translata, & quam maxime quoque vita sedentaria ad hunc affectum generandum & accelerandum apertissima est. Plura adhuc recensenda essent, sed promissæ brevitatis memores hic sistimus gradum, atque ad curam nos accingimus: si quis autem est affectus, qui & medico & ægro negotium facillit, est certe hic præsens, ut jure opprobrium & crucem medicorum quis eum appellare possit: tentanda tamen res nobis erit, dexteram saluiferam ægro porrigentes, & quibus remediis in genere litque lectioribus curatio aggredienda sit, brevissimis indicantes: præstat enim, in eo magis laboremus, ut fideliter curemus, quam ut subtiliter differamus. Quia autem, ut in omnibus corporis affectibus nunquam in remediis naturalibus subsistendum, sed semper summi JEHOVÆ auxilium implorandum; ita & imprimis etiam hoc in affectu id observandum & summè necessarium est. Potentiam enim affectus Protheo mutabilioris non nescimus, nec hoc, quanta quanta etiam scientia si nostra atque ars, Divinæ subjacere majestati, absque cujus benignitate, ne in minimis quidem agere non posse, ignoramus; etenim

*Ni Deus adjuverit viresque infuderit herbis*

*Quid rogo, distillamus? quid Panacea juvans?*

Sed ad curationem ipsam, in qua ed respiciendum, ut primæ viæ evacuentur, humores peccantes, præmissis præmittendis exterminentur, viscera, imprimis ventriculus, roborentur, atque urgentiora symptomata contringantur, non neglectis viribus quarum conservationi opera detur: mercuriam suggerunt usitati illi fontes: *Chirurgicus, Pharmacæuticus, & Dieteticus.*

Ex *Chirurgico* fonte, nisi plethora adsit, aut nimius calor urgeat, venæ sectio locum vix habebit. Conveniens autem erit cucurbitularum usus, nec non hæmorrhoidum fluxus, si is, vel spontè fiat vel arte, in assueto conciteretur ille: Ita nec fonticuli nec frictionum usus foret frustraneus. *Pharmacæuticus* evacuantia primò

loco offert, eaque per alvum, leniora, ut sunt, ex simplic. fol. senn. epithym. polypod. Rhab. Ex compositis syrup. ros. violar. solutiv. fumar. compos. de pom. de Epithym. pilul. de ammoniac. tartaræ, & de aloë rosar. Extr. ab. panchym. & id genus plura, imprimis autem extract. piul. de ammoniac. ut potè in quo nonnulli omnem sanitatis spem ponunt. Pertinent huc & vomitoria initio adhibenda, modò ventriculus non sit justo debilior, & æger huic evacuationi alluetur; ex quorum numero sunt aq. bened. Ruland. sal. viatriol. electuar. Diasar. Fernel. &c. Nec negligenda diuretica, qualia sunt ex tartaro parata medicamenta imprimis tinctura tartari, utpote quo unico remedio, præmissis tamen lenioribus hoc malum sæpiùs funditus curasse gloriatur Boissierus. Habent quoque locum suum diaphoretica, antimon. nimirum diaphoret. simpl. & martiatum. Evacuandis præmittenda, aut cum iis jungenda sunt aperientia quorum seges passim occurrat. Primum tamen locum sibi vendicant tartarea & martialia medicamenta. Confortandis visceribus, ventriculo, præprimis, congruunt præ aliis omnia amara quæ huic amica habentur; Tonus enim ejusdem vel conservant vel restitunt, sale, quo plurimo abundant, putredini resistunt, acidos p. n. in ventriculo humores figunt, Limosos & viscosos viscerum & mesenterii vala obstruentes humores abstergunt, & qui relaxabant fibras succos absorbunt. Quo nomine quam maxime celebrantur absynthii, centaurei min. juniper. salia. Quæ cordi nec non cerebro confortando conveniunt, passim illa apud præcticos occurrunt, quorum benevolum lectorem, breviter causa, remittimus. Symptoma nata ventriculum infestantia mitigantur præter modò dicta: confortantia etiam pulveribus pepticiis moderatè calidis, inter quos hic præ aliis excellit. *℞. conserv. sem. ans. fanioul. ana 3 ij. cori. citr. condit. 3 j. margar. corall. rubr. præp. ana 3 lb. cinamom. acerrim. 5 ij. sacchar. ros. tabul. 3 iv. m. f. l. a. pulvis. sumatur parvi cochlear. mensura à quovis pastu. Extra confortabitur idem oleo stomach. Craton. nucistæ, nardino, de absynth. Item emplastr. de ladan. Tacamahac. sacculo parato ex absynth. meliss. menth. caryophyll. mac. bacc. juniper. flor. rosar. &c. Oppressiones pectoris, communissimum hypochondriacorum malum, cum à vaporibus vel stribus crassis, diaphragma ejusque membranam impetentibus oriantur, corrigantur Carminativis. Hinc injiciatur clyster, ex status discutientibus: applicentur sacculi ex flor. chamomill. melilot. sambuc. summit. aneth. & aliis; aut etiam sacculus ex avena in sarragine frixa, quam calidissimè. Si non cedat, sitque dolor ingens, suadent nonnulli cochleari vini sublimati; aut essent. anil. aut aq. cinamom. cum juteulo sat calore, aut exhibendum Theriac. aut michtidarii momentum. Pletisque si non omnibus scopis satisfaciunt acidulæ, nec non aquæ thermæles: in harum tamen usu majore opus est circumspectione. *Dieteticum* tandem Fons, v. c. t. rationem observandam monstrat, quæ adeo necessaria est, ut (teste Galeno) frustra iis præscribantur remedia, qui rectam victus rationem servare non norunt. Est dieta reverà ille philosophorum lapis, omnibus recommendanda, nulli metuenda sexui, quovis tempore tractanda, & cunctis morbis sine ullo subsequuturi mali metu congrua, cum illorum non paucos ipsa sola curet.*

Teste



Testi. G. m. Quo sequentibus etiam schola Salernitana respicit vesiculis:

*Esariant, sitiant, qui rheumata curant.*

*Abstine & effices quod medicina nequit.*

Quin & sine clavo & gemis navigat, qui nulla vi-  
ctuatione observatam dicit in facere conatur.  
Triplex autem a modernis fluitat dicta. Navi-  
tans, vitalis & animalis. *Naturalis dicta*, ea quæ  
ali nutritur temperat. In altum, ergo cibus  
& quantitas & qualitas accurate observatur.  
Quoad quantitatem Nilus Hippocratis monitum,  
quod in 6. ep. d. com. 4. text. 12. jubet Galenus,  
fluitum nimium saturatis esse non satari ci-  
bis, & quod habet Avicenn. 3. num. Doctr. 1.  
c. 7. cum reliquis famis urgentium esse a mentis,  
& melio. um habet. Quoad qualitatem cibus om-  
ni acrimonia, lassitudine atque nimia aciditate ca-  
reat, concoctionis non sit inficilis, non vaporosus,  
nec flauentis, aut excrementitio icatens  
suo. Po. us si quantitate moderatus ad frigidi-  
tatem aliquantulum inclinet, sit d. tec. rus, vetonica,  
absinthio, scolopendrio, agrimonia, aliisve  
aperientibus medicam. nis alteratus. *Vitalis æ-*  
*tem putum & terrenum præcipit.* Animi pathem-  
a, ut iram, tristitiam, timorem, in tum cane-  
pente & angue, rug. re jubet, ne ipsi itas perturbentur;  
potius it, utigantur, quo vigori cotundem ad-  
ant in. t. mentem, qui proprii tranquillitati  
animi studeat æque in lect. tur. *Animalis*  
*sonni rationem habet & vigilantum, inquit*  
& quietis, excrementum & retentorum. Sonno  
æger non indiget nimio, neque nimis, vigilis,  
neque etiam statim post assumptum cibum, ante  
duas tresve horas cubitum eat. In exercitiis cor-  
poris pariter modus tenetur: Alvis quotidie  
munet, respondeat, si verò aliquando contingat,  
ut solite evacuationis atque excrementi autode-  
tineatur diutius, medicamentis levioribus na-  
tura ad expulsiorem erit prostrandam. Uno verbo  
omnia quantum possit, sic, temperentur, deturque  
op. ra, ut nullus committatur excessus. *Joan. Mi-*  
*chael.*

Vir florentis ætatis, duris, salis, acrisq; cibus diu  
assuetus, otiosi vivens, a longo tempore, modo pla-  
ne inappetens nausea quotumcunq; alimentorum  
detentus, modo nimis appetens fuit, sed ing. sta ali-  
menta cum turg. tu tensione, ac dolore ventriculi æ-  
gre tulle & angellit per intestina quoque totumque  
ventrem inferiorem plerumque tormina cum ma-  
gno murmurate percipit. Hæc tamen mala fla-  
tum copiosissimorum sursum deorsumque erup-  
tione pro tempore multum immixta sunt. Sub-  
inde liquor quid in subaltis sponte cum summa  
nausea vel leuissimo vomitu, ab ore effluat, sicut  
præcipue matutino tempore, quamvis etiam aliis  
diei temporibus illud non raro contigerit; hoc  
evacuato nonnihil melius se habet. Nunc tan-  
dem ante mentem hæc omnia in pejus verti cœpe-  
runt, quippe vomitus frequens accessit, quo omnia  
assumpta magno cum impetu eicit, quæ licet non  
diu assua præ fuerint, tamen val. è acida evomun-  
tur: & quod mirandum interdum paulo post as-  
sumptum primum ex. mit. duas tresve uncias so-  
lius liquoris cupido impel. ucti nonnihil (ut di-  
git) subaltis subaciv. vel austeri, omnetque as-  
sumptos cibos & potus in ventriculo re. inet. quos,  
illo liquore evacuato, bene fert & digerit. Cum

non vomit, tunc multo molestiores sunt venti-  
tiones & rugitus. Eger non sentit, sed co-  
gitabundus ac subterit est, eique scorbucæ  
maculæ micillæ in cute subinde apparent, totum-  
que corpus paulatim emaciatur.

Varie partes in hoc ægro male afficiuntur, præ-  
cipue autem ventriculus, intestina, & pancreas:  
de ventriculo res nota est ex nausea & vomitu, ut  
& ex appetentia ciborum modo nimis aucta, mo-  
do nimis minuta, intestinum affectio ex ru-  
gibus, flatibus & torminibus innotebit. Affe-  
ctionem pancreatis effecta docent. Appellatur hæc  
morbus affectio hypochondriaca, quæ est intem-  
peries acidæ pancreatis, ventriculi, intestinorum par-  
tiumque vicinarum. Causa primaria tym. roma-  
tum. in historia enarratorum procedit ab acida ac-  
tusata quadam intemperie pancreatis ex inordi-  
nato victu imprimis contr. cta, cuius ergo succus  
pancreaticus in hoc ægro nimis acer & talis sub-  
acidulve gignitur, inque uno tempore in gis quam  
alio, prout scilicet per hæc illave assua. præ ali-  
menta isti malo major, minorve fomes adiecitur.  
Hic succus ex pancreate in intestinum duodenum  
defluens, & aliqua sui parte versus ventriculum  
ascendens, paulatim fermentum ventriculi cor-  
rumpit, sicque vitiose coctionis causa fit. Quip-  
pe si prava fœdave qualitate præditus (in anima-  
lium vivorum sectionibus maxime tecum s. po-  
tem nonnunquam habere competum est) in  
ventriculum irrepit, tunc inappe. ntiam ac nau-  
seam, & interdum vomitum in ucit: si verò ni-  
mis acidus influat, tunc nimiam fam. m, in idam  
coctionem, & nonnunquam ob acidam vellicatio-  
nem ventriculi, etiam vomitum suscitatur, idque  
magis aut minus, prout excedens qualitas major  
in notve fuerit, & ipse succus majore vel in notve  
quantitate ventriculum ingreditur. Ex ista vitiosa  
coctione ac fermentatione oriuntur tensiones, do-  
lores, & rugitus, plurimi que flatus suscitantur,  
qui nonnunquam sursum per ructus erumpendo,  
tensiones nonnihil imminuere, sicque levamen ali-  
quod pro isto tempore inducere solent. Si verò  
vitiosus ille succus ad ventriculum non ascendat,  
sed totus in intestina defluat, tunc coctio ventriculi  
in ægro nostro melior, & nausea minor, seu vitio-  
sa effervescencia in intestinis excitatur, cum in  
coctis alimentis è ventriculo elabentibus, cum in  
pituitosis ac mucosis succis in intestinis contentis,  
atque hinc in intestinis flatus, rugitus, dolores, ac  
tensiones, tum anxietate tuncit. n, inque sæpe alvi  
de. ctione flatusque plurimorum excre. tione  
multum imminuti sunt. Liquor ab ore subinde  
cum nausea effluens, est succus pancreaticus suc-  
cum ad ventriculum delatus, & per nauseam unà  
cum ei in ventriculo admisso taliv. li liquore, per  
os erumpens. Tandem succo pancreatico tempo-  
ris progressu peiore, ac simul aciore evadente, &  
ventriculum magis, quam antea, vellicante, ac-  
cessit frequens vomitus violentus, quando scilicet  
in ventriculum accendit: & si hoc contingat paulo  
post assumpta alimenta, isque affatim per illa ali-  
menta sursum cum impetu ad superiorem venti-  
culi partem protum. p, magnam ibi nam em-  
faciens, sæpe levi cum vomitu, quia alimentis  
nonum est admistis) solus evomitur, alimentis  
in us subsistentibus, quæ tunc, vi fuso isto suc-  
co fermentaceo evacuato, bene digeruntur. Non  
febicit æger, quia nulla putredine efferves-  
centia in corde excitatur. Cogitabundus ac sub-



tristis est, quia propter acidos humores sanguini admistos spiritus animales minus tenues seu subtiles, sed paulo fixiores in cerebro generantur qui minus alacriter & inordinatè per pororum cerebri angustias transeunt, ægrum cogitandum ac suavissem, & rebus suis minus intentum faciunt. Corpus emaciatur, propterea quod alimentorum prima coctio non bene peragitur, atque hinc sanguis paucus & parum lausibilis, sed lecorbatica qualitate infectus, sicque ad partium nutritionem minus aptus, generetur. Ex modò dictis, quid de prognosi statuerum sit, facile iudicari potest, scilicet quod hic affectus periculo non careat, & mendum sit maximæ corporis atrophie, cum summa virium prostratione paulatim ægrum dejectura.

In Curatione primùm æger purgandus, cum infus. fol. lenn. agaric. &c. addendo aliquantulum elect. hier. pictæ, aut diapruni, aut cum pilulis cochiis, extracto catholico, pulvere diatribich, aliisque similibus, eaque purgatio postea singulis octo vel decem diebus reiteranda. Venæsectio hic parùm ad rem factura videtur, si tamen febris aliave aliqua magna exandescencia accesserit, pro ratione necessitatis institui poterit. Si vomituriendi conatus permanferit, non inutiliter tale vomitorium dabitur. ℞. fol. atar. recent. 3 iij ℥. aq. raphan. 3 ij. fiat s. a. expressio succi, adde vini antimoniat. 3 ij. oxymelit. scyllitici 3 ℥. misce fiat haustus. Postea conveniens apozema præscribendum, ejusque ter de die haustus exhibendus. ℞. rad. tamarisc. capparum, polypod. querc. helenii ana 3 vj. herb. chamædryos m. j. ℥. meliss. betonic. bortagin. cuscut. ana m. j. fol. lauri, tritol. palustr. ana m. ℥. cort. aurantior. 3vj. sem. anis. fœnicul. ana 3 ij. passular. mundat. 3 ij. aq. q. s. fiat s. a. apozema ad lb j. ℥. loco apozematis vel intermeoitis horis subinde dari poterit particula hujus conditionis. ℞. Rad. helenii, cort. aurantior. condit. conserv. bortagin. meliss. flor. salv. ana 3 ℥. olei anis. gutt. xii. tyt. helenii q. s. misce, fiat conditum. In magna ventriculi aut intestinorum tensione cum anxietate & dolore, conveniet exhibere talem bolum ℞. Theriac. 3 j. ocul. cancr. præp. 3 j. olei anis. gutt. v. misce, f. bolus. Interdum manè jejuno stomacho, loco apozematis, exhibenda dosis hujus pulveris, cum pauxillo cerivisæ aut jusculi. ℞. ocul. cancr. præp. 3 ij. corall. rubr. præp. 3 ℥. succin. præp. 3 ℥. t. pulveris divide. dus in quatuor doses.

In victu sit aer mediocriter calidus. Cibi sint facili digestionis & boni nutrimenti, & abstineat æger ab omnibus cibis salis, acidis, acerbis, fumo siccat, antiquis, rancidis, aliisque difficilis coctionis aut pravi nutrimenti. Potus sit cerevisia communis bene defæcata, nonnihil sudamara, minimè acida: item vinum tenue minimè acidum. Somnus & exercitia corporis sint mediocria: fugiantur otium & nimia quies. Excreta naturalia bene procedant, si non ponè, saltem arte. Fugienda quælibet tristitia animi pathemata: læritia & hilaritati, quantum fieri potest, indulgendum. *Libr. d. de Diemerbroeck. de morbis infimæ ventris Medicat. 1.*

Reverendissimus Abbas, annum agens quinquagesimum, temperamenti totius, & potissimum jecoris calidi & sicci, ex parentibus hypochondriaci natus, & ipse multis ab hinc annis ea-

dem affectione hypochondriacâ molestatus, & quandoque moderata sanguinis per hæmorrhoidas evacuatione cum sui levamine tentatus, quinque jam mensibus elapsis, post graves atque molestissimas animi perturbationes, fluxu sanguinis ex hæmorrhoidibus abundantissimo atque superfluo correptus fuit, quo in animi deliquia incidebat, eoque suppresso, statim supervenit intensissimus lævæ partis thoracis dolor, difficiliter reddens anhelitum ipsam, cum ejusdem pectoris fervore maximo; quo tempore urinam copiosam, crudam & aquosam mingebat, & lævæ dolore, febricula levis insurgebat, quæ primo aut altero die solvebatur. Hæc autem omnia symptomata & affectiones ter hucusque repeterunt, semper præcedente aliqua molesta animi motione, & præterea quodam pondere in podice ad perinæam quoque sese excurrente, non sine aliquo dorsi dolore & ventriculi inaccessibilitate. Modò quamvis ad finem mensis Junii jam pervenerimus, Patavium tamen te consulit, ut à gravissimis jam dictis symptomatibus ope medica præservari possit.

Abbatem Reverendissimum multis ab hinc annis hypochondriacum fuisse & esse ex relatione tum à viro excellentissimo in scriptis adducta, tum ab eodem Reverendissimo oretenus exposita necellatio deduci potest, præsertim addita totius & jecoris calidæ intemperie, ætatis, & naturalis ac hæreditariæ dispositionis consideratione; quin imò cætera graviora symptomata de quibus nonnullis abhinc mensibus conqueri cepit, non aliundè quam ab hypochondriaca affectione, ortum duxisse decerno, & præsertim superabundantem sanguinis per venas sedales effusionem, necnon dolores in lævæ pectoris parte cum ardore & pectoris oppressione, præcedentibus rugitibus abdominis, non sine aliquo dolorifico sensu ad dorum quoque petveniente, iidem tamen etiam circa thoracis dolorem frequenter repertentibus; cum enim jecoris fervor naturalis à clausuris etiam & impedita ventilatione adactus, propter mesenterii obstructions, à quibus flatulenta orta fuit affectio, & inde dolor ad dorsum usque pertingit, ubi scilicet ejusdem mesenterii duplicatura alligatur; cum inquam, jecoris fervor sanguinem fervidum necessarid producat, nec ipse à corde calidiori exaltatus corrigi possit, in valis ita julto calidior & acrior congestus, quippe ad eamum generationem & totius nutritionem ineptus, dum circumlando ad mesentericas arterias pervenit, naturæ molestus, ab eadem intrata per eadem vasa, indeque per hæmorrhoidalia ad sedem detrahitur, quibus valis repletis requiritur pondus, quod perinæo quoque communicatur; imò quandoque monet Gal. quod lumborum & trochanchi dolores antecedere solent, sique hæmorrhoidalis requiritur ipsius sanguinis per sedem excretio, quæ tunc toto genere præter naturam non est, quoniamque tempellivè fiat: tempellivè autem hic, quando id quod constituit excernitur. Cum autem in calu nostro prius quoque sanguis copiosus post improbi evacuationem excretaur, & g. p. u. evadit hujusmodi evacuatio eoque magis, cum niger non appareat, tunc enim melancholicis magnopere prodelle solet, cum naturalium humorum sanguis per-



multum ad vasa sedis excernit, ut ad crura varices, ac sanguis profluens talis non est, & copia peccat, robor ideoque viscerum naturalium totiusque vires prostermit. Quoniam vero ad eodem jecoris & hypochondriorum fervore ventriculi quoque concoctio labefactatur, dum fermentatio ciborum, quæ est via & præparatio ad chylificationem absolvendam, a nuncio illo calore probe perfici nequit, hinc fit ut frequenter cruditates sobolescant, quæ antiquis & exiccatibus obstructionsibus in melenterio existentibus superadditæ atque commixtæ, eo loci stagnantes plures molestos & perniciosos effectus pariunt: primò namque ab eodem calore in habitus crallos & exhalationes magna ex parte convertæ, sinistri lateris cruciotos parium dolores; dum verò aut per potulitates, aut per vasa ad musculorum intercostalium interstitia sese intinuant, distensione, ac morfu illarum partium continuum solvunt, & dolores excitant, quo eodem tempore & febriculae, & crux urinae copiosæ excretionibus observantur, dum eundem cum litatum portio relicta, partim in eodem ignobili loco fermentatur atque putrescit, & febriculas accendit, partim à fervore liquitur atque funditur, & per copiosas urinas ejicitur, quæ omnia tunc exacerbant videntur, quando animi passiones motusque vehementes præcesserint, cum perpetuo verum sit quod non solum corporis, sed multò magis animi motus sit causa caloris, ut propterea mitum non sit quòd molitiarum tempore circa præcordia de æstu & insigni fervore conqueratur Reverendiss. Abbas

Cui ut opem medicam feramus, vitium sanguinis potissimum deinde & vasorum sedalium est corrigendum; jecoris & hypochondriorum calida intemperies est emendanda; antiquæ, terreae & melancholicæ obstructions sunt alterandæ & imminuendæ, & ante jam dicta omnia, ventriculus & primæ viæ à recentioribus cruditatibus sunt vindicandæ, adeò ut quod primum fuit in intentione, postremum evadat in executione.

Et quamvis fons malorum, nempe hypochondriaci affectio antiqua & confirmata sit, salus tamen desperanda non est, cum hucusque nonnisi ad primos gradus melancholicæ pervenerit, & ideo nonnisi per exiguam melancholici sanguinis portionem circa viscera naturalia stagnantem supponamus; præterquam quòd superabundans sanguinis evacuatio, si non ex toto supprimenda, saltem magna ex parte cohibenda est, alioquin calore nativo progressu temporis valde imminuto, cachexia succedere posset: hanc enim per hæmorrhoidas evacuationem tantoperè formidavit ipse Gal. ut nulli ex consuetudine convenire existimaverit, ac propterea dixerit non esse assuesciendum hominem evacuationi per hæmorrhoidas, quoniam uterque excessus periculosus evadit, live sanguinis nimium effluat, live nihil.

Quamprimum igitur Reverendiss. succurrendum; nec obstat anni tempus calidum si quidem post prima administrata remedia, sic tempore nondum fervido existente, reliqua, utpote alterantia & refrigerantia, fervidissimo quoque exequi poterunt. Expientur itaque primæ viæ portio ex manna clarificata. Quinque deinde sequentibus diebus cruditates in iisdem viis commorantes præparandæ erunt Julapio acet. ad ℥ iij. cor-

tibus citri alterato, addita uncia aq. flor. citri, ut dilutior, & suavior evadat. Mox repetatur portio ex manna clarif. ad ℥ vi. cui duabus aut tribus transactis horis, superbibat teri capræ depurat. ℥ j. & duobus horis ab assumpto sero prandeat. Inde ad antiquas obstructions imminuendas, deveniendum, quæ quoniam iam exiccatæ sunt idèd humectantibus & moderatis incidentibus egent; in hunc igitur finem succi depur. apertissimi erunt, ut ℥. succi depur. & per aren. trajecti, cichor. borragin. endiv. ana ℥ ij. sal. tart. fixi gr. x. decoct. in jure paratæ folior. malv. violar. sonch. ℥ v. m. pro syr. & sic pro aliis. Et si fortasse decoctio à ventriculo non toleretur, cum aliquam concoctionem, & consequenter moram requirat, succi jam dicti diluantur, cyatho aq. stillat. borrag. & malvar. citius enim à ventriculo ad melancolicas pervenient. Sequenti verò die præbeantur summo manè fl. cass. ℥ iij. additis gr. x. sal. tart. & post horam superbibat cyathum teri capræ aut asin. depur. tribus verò horis ab assumpto sero prandeat. Tertio verò die rursus succos depur. assumat, ut supra, & ita perseveret alternatim, succos & cassiam assumendo, ad 20. vel 25. dies. Rhabarb. autem usum omitto, cum propter hypochondriorum fervorem, cum verò maximè propter sanguinis fluorem, quod alioquin cassiæ commistum ad obstructions referandas aptissimum foret. Interim secunda succorum die jecoraria dextra erit aperienda, & sanguis moderatè, prout excellentissimo Assistenti visum fuerit, erit educendus, & quotidie toto purgationis tempore ung. ros. mcf. totum abdomen illinendum. Terminato succorum & cassiæ usu, serum capræ aut asin. depur. ad ℥ iv. vel v. ter saltem tertio quoque die erit propinandum, præmissis vehiculo syr. rosar. solutivi: idque eo fine, ut hypochondriorum partes humectentur, viæque laxentur, & apertæ reddantur ad aq. Nocer. transitum expediendum, liquidem calorem, & inde siccitatem primarum viarum interceptionis aquæ thermalis aliàs tenetæ, causam fuisse censeo. Nocerianas autem dixi propinandas esse, quoniam cum minerales non sint, nec adeò exiccantes, facilius permeare & pervadere poterunt; & si earum aliqua portio fortè detineretur, nocere non posset, ut nocent thermæ quæ nunquam teste Hippocrate à natura nostra actuantur & superantur. Ut autem facilius eisdem reddatur transitus, tribus primis diebus cum vehiculo dejectorio sunt exhibendæ; reliquis verò diebus cum vehiculo diuretico, quale tum is esse poterit spiritus tart. ter rectif. ad semidrachmam in primis tribus cyathis, cui addatur quoque syr. de succo limonum, ut potus quoque suavior evadat. Tandem lactis asin. xx. diebus, totidemque capr. usus de more manè assumendi opportunissimus erit; quo tempore pro balneo aquæ dulcis, aut infusione administranda opportuno existente, convenire poterit; sin minus, in annum venturum, dum reliqua quoque omnia reperenda erunt, differri potest, ut ex toto obstructions extirpentur, jecoris fervida intemperies emenderetur, & sanguinis vitium omnino corrigatur, sicque à natura toleretur, imò in vasis ad usum detineatur. Sed quoniam vasorum quoque sedalium vitium, live laxitatem nonnihil concurrere dixi, idèd opportunè aliqua iisdem corroboratio est afferenda, spongiola aqua rosacea cum albumine ovi madefacta, qua pulvis astringens



lingatur, & post fecum depositionem atque con-  
suetam absterfionem podici iterum atque iterum  
apponatur, ut pulvis ipse adhæreat, & iteratis vi-  
cibus vasa ipsa roborentur; pulvis autem erit con-  
strictivus magistralis conlietus, eidem gypsi vul-  
garis portione additâ.

Jam dictis verò omnibus congruam victus ra-  
tionem addere debet, & calidiora alimenta præ-  
sertim evitare, prout salita omnia, condimen-  
ta aromatum, allii, caparum, usum aceti & vina  
generosa, memor quod suimeripius status insi-  
gni humectatione & moderata refrigeratione in-  
diger; & idèd familiaris sit & quotidianus usus  
juris tenuis herba aliqua refrigerante alterati, in  
prima mensa hauriendi; herba autem poterit esse  
æstivo tempore oralis, acetosa vulgò dicta, cæte-  
ris verò temporibus, intybus, endivia vocata.  
Somnus diuturnior semper conveniet. Exercitium  
verò moderatum esse debet, & non nisi jejunio ven-  
triculo. Consuetudo alvi evacuatio, nisi sufficiens  
fuerit adjuvanda, prima mensa assumendo flor.  
cass. 3 ij. aut 3 j. quam disponere quoque poterit  
jus prima mensa, ut supra, quotidie sumptum.  
Tandem animi motus vehementes, qualescunque  
sunt averrendi, sed præsertim molestæ perturbatio-  
nes; quæ si casu occurrant, non sunt fovendæ,  
sed fortiori animo repellendæ. Quæ omnia Reve-  
rendissimo Abbati à Deo Opt. Max. salutaria præ-  
cor. *Raymund. Fortis. Consultat.*

### Observationes.

Sentiebat nobilis quidam Burgundus, à longo  
tempore, tensionem in sinistro hypochondrio,  
cum turgitu & murmure, & quia corpus nonni-  
hil macrum fiebat, faciesque decolor, graviora  
metuens, cum postea media multa, quibus jam  
usus fuerat, non remitteret illud, meum expe-  
ritis consilium: huc veniens, judicavi causam in  
venis mesentericis, lienem copiosè ambientibus  
positus, quàm ipso liene contineri, esseque illic  
illuviem, unde terri vapores & flatus gignantur  
cum obstructione notum ductuum, quibus cimen-  
dandis hisce tuitus. Syrupum sequentem præ-  
scripsi. ℞. Rad. cichor. tenebul. apii veri, iridis,  
ana 3 j. enul. 3 vj. alar. 3 ij. rad. liquirit. 3 i s.  
corr. ramarisc. rad. c. p. rum, sambuc. ebuli, ana  
3 j. herbarum endivie, chamæpit. chamædr. eu-  
pator. veronic. capill. veneris, ceterach. bugloss.  
utriusque, fumariæ, luminit. lupul. asparag. ana  
m. j. flor. bugloss. utriusque, genit. ramarisc. ana  
p. j. sem. anit. tenebul. ana 3 ij. carui, petrosel.  
ana 3 j. cicet. rubr. p. j. passul. enul. leat. 3 i s. pui-  
norum paria v. s. decoctio in aq. & tertia parte  
vini & in colat. lb viij. intunde sol. senn. mundat.  
3 iij. rad. polypod. 3 ij. turpeth. 3 s. sem. car-  
tham. conquass. 3 i s. myrtobal. nor. citrin. &  
chebul. ana 3 iij. t. iterum decoctio addendo thab.  
in panno ligat. 3 s. spic. sichoananti. ana 3 j. cina-  
mom. 3 ij. post levem ebullitionem coentur, ad-  
de succi pomor. odor. 3 iv. sacchar. q. s. deco-  
quuntur ad syrupi consistentiâ: capiat 3 i s. pro  
vi. e per se, vel cum jussulo cicetum rubrorum, &  
rad. petrosel. si non operatur sufficienter, dissolve  
in uno haustu, diagrydi rectè præp. gr. iij. con-  
trinet illius usum aliquot dies, postea hebdomada-  
tim dein mensuatim.

Pilulis sequentibus utatur interdum loco syru-

pi. ℞. aloës 3 ij. thab. agarie. ana 3 i s. extract.  
absynth. 3 j. gumm. ammoniac. dissolut. in oxy-  
mel. squill. 3 s. mastich. 3 j. rad. gentian. summit.  
centaur. min. ana 3 j. rad. asari 3 s. spic. 3 s. li-  
matur. chalyb. præp. 3 i s. diagrid. 3 j. cum resina  
laricæ f. massa pilul. capiat 3 ij. vel 3 j. pro vice.  
Emplastrum hoc sinistro hypochondrio applicet.  
℞. emplast. de baccis lauri, de melilot. ana part.  
æqual. malaxentur oleo de cappar. extend. suprà  
corium, subducatur syndone rubra ne nimium ad-  
hæreat. Hac ratione se integrè fuisse sanatum  
per alios, quos ad me consilii causa ablegavit,  
mihi significavit. *Felix Platerus observ. lib. 2.  
pag. 469.*

Vir quidam illustis, temperamenti melanchol-  
lici & semper pro lienoso habitus, ac dolore &  
inflatione hypochondrii sinistri, crebro turgitu,  
ructu acido, necnon tremore cordis, assidua verti-  
gine, nimis vigiliis, & phantasia perturbata p u-  
rimum conquestus erat: circa trigessimum quin-  
tum ætatis suæ annum, morbo ingravescente;  
somnia ægrè, ac rarè admodum capessere noctu,  
& interdum cogitationum æstu, & fluctuatione  
molestari, res omnes ac personas suspectas ha-  
bere, & objecta quævis valde pertimescere cepit;  
præcordia plurimum contringi, & coarctari, at-  
que in imum subsidere videbantur, quasi cor p-  
sum usque in ventrem deprim. retur, quo sympto-  
ma urgente, valdè mortuus, & animo dejectus  
evasis; postea tamen, remittentibus istis animi af-  
fectibus, una cor paululum elevari, simulque  
præcordia relaxari, & dilatari persentiebat: porro  
dolores, & contractiones circa viscerum ac mem-  
brorum musculos variè excitatos, & huc illuc  
discurrentes creberrimè sustinebat.

Quoad morbi naturam, facillè constat, affec-  
tionem hanc ejusmodi esse, quæ vulgò *hypochondria-  
ca* appellatur; quod verò spectat ad symptoma-  
tum admittendorum causas, supponere licet, san-  
guinis massam degenerem, & laxulentis attrabi-  
latis refertam recrementa sua angusta capiti conti-  
nuò suggereret; unde liquor cerebrum, & nervos  
irrigans, actis, & spiritibus improporionatus ta-  
ctus, corpora continentis in contugationes dolo-  
rificas, & contracturas irritabat: porro cum à  
capite, in nervos *pari vagi & intercostalis* hæc la-  
bes præcipuè derivatur, cerebrum & præcordia  
noxam inde lucratam quam maxime lunt.  
Quod autem sanguis eo ritu depravatur, lienis in-  
itio imputandum videtur, in quantum hoc visus  
perperam habens, feculentias atrabillarias à san-  
guine non rectè fecerit, quinimò & recrementa  
quæcumque ab illo suscipit, amplius pervertit,  
eademque intermentum noxium exaltata cruori  
remandat, proindeque massam ejus plurimum in-  
quinat, & diversalia acetosa & planè vitriolica im-  
buit. Obvium est intelligere, symptomata isthæc,  
caput molestantia, scilicet *vigilias nimias, verti-  
ginem, phantasiam perturbatam*, cum multis aliis,  
a particulis heterogeneis, & sanguine in cerebrum  
suffusus procedere: Quoad istam pæctis angus-  
tiam & cordis subsidentiam, cum insigni metu &  
tristitia, opinari licet fibras nerveas cordis, ac in-  
primis pericardis insertas, in ipsas & contu-  
gationes actas, partes istas contringere, & acor-  
sum convellere: quapropter in toto pectore ve-  
lut contractio, quædam sentitur, & cor ipsum  
deprimi videtur: porro in quantum præcordia  
ita contractis & depressis, sanguis intra cor mis-  
cetur



simus sistitur, ac velut stagnare cogitur, anima cum vitalis cum sensuiva à tota expansione, & irradiatione purimum inhibetur, proutque à *hystasi* ejus diminuta, & deaurata, immanes illi *meius* & tristitiae affectus oriuntur: cum eidem, spasmus remittentibus, ista cordis & appendicis ejus contractio relaxatur, etiam anima, velut flamina amplius expansa, per hanc ita catus paululum excurrere nititur. Pro curatione istius affectionis cum plurima remedia & administrationes medicas a longo tempore usurpat, sine magno tamen fructu, demum aquarum scidularum usu aliquantulum sublevaris, & exinde sensum melius habens a gravioribus istis symptomatibus immunis evasit, inquit tamen affectui hypochondriaco obnoxius degit. *Thom. Willisius, de morbis convulsivis.*

Illustrissima atque excellentissima quædam, temperamenti sanguinei & biliosi, habitudinis corporis magnorum laborum & defatigationum, ut videbatur, non satis patientis, varias tamen longasque peregrinationes & tentare & perficere ausa, & in rebus non naturalibus pluribus modis peccans, in varia tandem affectionis hypochondriacæ symptomata incurrit, quæ in dies numero & graui cum augetentur, Illustrissima ad eorum quali cumulum devenit, per abundantissimas sanguinis effusiones, in curatione aneuriæ, quod Chirurghi arteriam in brachio dextero pro vena secanti, imprudentia ipsi tacerat, uter in duobus abortibus, enatis.

Post hæc itaque omnia jam enarrandis affligitur symptomatibus, intensam patitur sitim & præcipue post pastum, si in illo utatur cibus solidis; sitis autem non tam sedatur assumpto potu etiam largo, quam suffocatio inducitur per totius abdominis distentiones; fallere propterea eam debet, tum per mala aurea Lusitanica dicta, tum aliis mediis.

Ciborum appetentia satis bene se habet per intervalla, aliàs magis aut minus deficit, idque verò potissimum tempestate.

Ventriculus tam malè officio fungitur, ut etiam si appetens Illustrissima comedat, cibisque ingestus sit, cum vi quadam, distentiones importunas patiente, penetraret, perest tamen nullatenus excoquatur, & totus prope in stomacho, etiam post duodecim horas subsistat: Unde si quinque aut sex a pastu horis cubitum eat, omnia ad fauces & os ipsius rejiciuntur, ea propter cogitur semel tantum de die cibum sumere, nec licet pluribus horis illi tenuis jusculum præmittere. Reverta si alio non utatur cibo, quam jusculis, bis de die assumere potest, sicque minus sitit, sed hæc diæta langorem universalem procreat. Ab omnibus prope cibus assumptis malè habet, sed præcipue a gravioribus, flavosis, viscosioribus, frigidioribus & crudioribus. Lac, pro tempore, unicuique fuit, quod aut solum, aut aliis admixtum, non multum molestæ peperit, præterquam quod in alvi perpetua stipticitate aliquid movebat, dum tamen illius cremor seorsim assumptus foret intolerabilis, sed jam ipsam amplius ferre nequit. Non tantum ventriculus ingesta vix & imperfectè excoquit, sed ea quomocunque excocta, in intestina minimè disturbare valet, nisi medicamentorum vi ad id quasi cogatur, ea propter in duram devenit necessitatem purgantibus medicamentis quotidie utendi, imò crescente in dies ma-

lo, alvi que difficultate, plura jam unica die adhibendi cathartica, etiam validiora; sin minus vomitus patitur horrendos, ut semel postquam dies septem ab illis, abstinisset, ut & rursus postquam dies tantum res ab illis caruisset, maximo suo malo expetra est. Nonque tantum singulis diebus cataclicis vitur, iisque repetitis, sed quandoquidem sic etiam humores aggeruntur viscidissimi, cum ponderis totum abdomen gravantis sensatione, anhelatione, ructibus nidorosis, & materiæ acrioris ad os regectione, aliisque pluribus incommodis, semel prope singulis mensibus ad validissima, additis etiam antimonialibus deveniendum. Post pastum pulsationes adunt arteriarum per totum corpus distributarum, cum doloribus regionem lumbarem occupantibus, totumque abdomen cingentibus; atque tanta gravatur corpus ad motum inertia, ut ne quidem tribus aut quatuor à pastu horis illud humiliter inclinare valeat.

Tumebant perpetuò tibiæ, totumque abdomen, sed illæ jam protius detumescere, hoc per intervalla inflatur.

Menstruæ purgationes per aliquot annos satis fuere inordinatæ, sub autumnalis enim tempestatibus suam suppressantur ad aliquot menses, cum ventris, tibiæ, totiusque ferè intumescencia, vigente interim appetentia, vultuque parum, aut nihil morboſi indicante. Cassavere verò omnino à tribus annis quadragesimo sexto scilicet ætatis.

Urina quæ in paucissima evacuebatur quantitate, paulò copiosior jam egeritur, etiam si potulenti multò minùs ingeratur. Pluries istius excrementi examine instituto, repertum est, primò odoris & saporis prope expers, etiam ad plures dies asservatum, coloris expallido subflavi, consistentiæ tenuioris, sine ullo sedimento, aut confusione. Secundò, ab affusione liquorum aut materiæ præcipitantium, nihil aut parum separatum, quantumvis hoc peractum fuerit, tum in urina recenti, tum in ea quæ jam per moram computrescere debuisset. Tertiò, Distillatione ejusdem lotii peracta, spirituum, atque salis volatilium acerrimi parum admodum elevabatur, resiliante interim in vasis fundo materiâ desiccata, salina sulphurea, & dum dissolveretur viscidissima; quæ octavam totius urinae ponderis partem facile implebat.

De morbi descripti nomine non est quoddam ambigamus, per symptomata enim satis superque constat, passionem hic adesse hypochondriacam inveteratam, in qua multiplex acrimonia, cum totali ventriculi debilitate, viscidioris materiæ proventur spirituumque; universali depauperatione, peccat. Inventa autem fuit à variis peregrinationibus, morsturiis, hæmorrhagiis &c. quæ Illustrissimam afflixit.

Ad symptomata jam ut deveniamus. Sitis omnium consensu à faucium desiccatione & vellicatione oritur, quid itaque mirum, si ubi serum adeſt multo imbutum sale, viscositasque adnata, per obstructos canales salivales illud tantum quod salino suo spiculo penetrantius est descendat paucò copulatum viscido, quo mediante partes quas eluere, & humectare deberet, potius irritat & per adhaerentiam suam continuè vellicat. Potulenta autem non ita facile huic medentur incommodo, quandoquidem inter transeundem partem contrumfatum prædictorum faucibus per viscosam copulam



agglutinatorum, imprægnantur, partemque propterea non satis liberant, quod multo melius obtineretur à succo malorum aut eorum lustranicorum dictorum, qui sensum exsuctus, præterquam quod temperat salium acrimoniam, orificia vasorum salivalium mucro obstruente liberat, sicque efficit ut lymphæ per os fluere parata, viam nacta apertam, levatisque impedimentis, cumulatius in os deveniat, ipsumque sic plenius irriget.

Appetentia ut plurimum viger; quia etiam si copiosum phlegma in ventriculo reperitur, obtundendis salibus, quos in ipsius cavitatem, tum propriæ tunicæ glandulæ eructant, tum alimenti prius assumpti ponderosiores particule jam exaltatæ suffecerunt, ipsis tamen satis superest virium pro vellicando ventriculi superiori orificio. Revera per totam hyemem cumulatius humoribus transpiratione tum impedita, atque etiam corporis exercitatione omissa, dum subsequentes primi vernæ tempestatis tepores eos in motus cient, à diluvio inde enato malè habet stomachus, sic enim necessariò diluio atque quasi extincto fermento, summa oritur inappetentia.

Ventriculum quod attinet, siquidem viscosa faburra semper infarctus est, in eumque appellant plura salia, in se invicem hostiliter primo concursu agentia, quid mirum si viscositas à particulis fermentescens penetrata in flatu abeat qui postquam visceris fibras, per distensiones vehementiores & continuas debilitavit, atque alimenti ingesti complexionem non parum offiunt, eademque ratione digestionem incommodant. Hæ distensiones post pastum maximè vexant, eò quod fermentum stomachale è salibus effertis, geniumque aquarum stygiarum redolentibus, constitutum, præcipitanter nimis cibum deglutitum adurit, illiusque partes vehementius à se invicem divellit. Nec interim legitima perficitur coctio quæ aliam prorsus & magis amicam fermenti atque stomachi actionem expetit. Quid itaque mirari subest, si alimentum quamvis per crassiores sui partes solutum, non eò fluiditatis deveniat, ut languide comprimentibus fibris per importunam distensionem, si non laceris, saltem quàm debilibus, obediatur, ni purgantium quotidie exhibitum ipicula ipsas in motus validiores cieant, quodque maximè viscosum in ventriculo est, non tantum glutinis instar partes alimentitias ipsi quasi connectens, sed etiam pylorum aliquatenus occludens, emungant. Huic beneficio conferendo non satisfaciunt clysteria, quorum copia, viz supra intestina crassiora ascendit, quæque nihil eliciunt è ventriculo, quem alias per flatuum subitus contentorum repulsionem opprimunt. Ex hisce factis constat quid causæ fuerit cur purgantium abstinencia vomitus non semel moverit, per inductam tandem ab alimenti morâ putrescentis, pondere, irritationem, unde demum quæ data pota sibi onerosa regerebas, imò semel in spasmos actus, non ita facillè sopiebatur, quin symptoma ad septimanas & menses extenderetur. Adhibita purgantia quotidiana non prorsus impediunt quin subinde cumulentur in toto variis humores, siquidem cum primæ coctionis vitia in subsequentibus facillè non corrigantur, chylusque iners, & impuri lentoris quem ventriculus & intestina vi remedium coacti in lacteas & sanguinem emiserunt, in visceribus languentibus non ita alteratur & defæcatur quin per sui tenaciores partes undique impactus,

evacuari amet per generosiora exhibita purgantia.

Anhelatio diaphragmatis compressioni à ventriculo & intestinis distentis factæ, ut & viscido pulmonum substantiam & respiratoria vasa occupanti, accepta referri debet.

Arteriarum vehementior post pastum pulsatio, soboles est fermentationis in ventriculo magna vi peractæ, calor enim atque inde oriundi motus sanguini cuius viz non ita sunt liberæ & explicatæ communicati, agitationis intensioris, fibrarumque vasorum ipsum circumvehentium verberationis durioris, sunt materia.

Dolores in lumbis, partim à distento ventriculo, & intestinis lumbis ut centro suo affixis, partim à flatibus inibi enatis atque conclusis proveniunt. Dolores præterea abdomen circumcingentes debentur illi intestini colis parti quæ infra ventriculum posita est, fræno sc. ipsum contrahente & corrugante seu potius sinuante, à flatibus contentis dolorificam vim patiente.

Totius corporis langor atque gravitas procedit, tum à spirituum depauperatione, tum ab humorum gravantium copia.

Urinarum examen ulteriori inservit eorum quæ jam fuere explicata, demonstrationi, nam si urinarum status sanguinis, aut saltem seri proprii sanguinis vehiculi status respondeat, quis non videt primò, illas inodoras, insipidas, atque tenues seri inconcocti, talibus fixioribus atque quali infasciatis prægnantis, & sulphuri propè emortui, parçè copulati, testes esse. Secundò, impossibilis plurium urinas constituentium partium segregatio, etiam per adhibita præcipitantia exquisita, indicium est confusionis, seu potius glutinis varias materias in sero ita implicantis, ut spirituum actio languida, non satis habeat virtutis, pro iis moru vario, & unicuique proprio, agendis. Varias hæc materias in urinis adesse patet terribè, ex distillatione qua quod calor, & spiritus innari, præcipitantibus etiam adiuti non potuerunt, commodè satis separatur, spiritus enim sic elicitur, minus potens, sed tal illum subsequitur acerrimus &c. de quibus vide quod supra.

Illustrissima ægra non uno remedio tot mala oppugnare per plures annos tentavit, circa quæ in genere adnotabo primò, quod aquæ tantum quedam minerales ipsi fuere proficue, inter eas innumeras quas ex ipsis fontibus ebibit. Aquenses in Sabaudia quamvis calore actuali nobiles, facultate tamen minerali sulphurea & nitrosa tam parçè imbutæ ut propè vacuæ dici mereantur, morbo incunte assumptæ lumino fuere nocumento, ut & aliz etiam maris, mineralis sœ x aut vitriolicæ, solæ, verò Svalbacenses, sale armoniacali tenui, paucoque matre prægnantes, & Wallenses in Gallia sale lixiviali de nitri fixi natura divites, non parum attulere auxilii. Secundò, plures ac diversæ chalybis præparationes, ut & talia penetrantiora è mineralibus & plantis arte chymica extracta, semper excitant dolores hæmorrhoidales atroces, quandoque fluentes, quandoque non, minimo interim percepto alias levamine. Terribè, opii atque opiatorum medicamentorum usus in doloribus & vigiliis ventriculum debilem semper gravavit, vomitus ferè, nec unquam somnum, sed potius stuporem cum vertigine conciliavit. Quatò Mercuriali omnia cum cunctis præparationibus, & quomodocunque assumpta, atque



que vel in patissima dose purgantibus admista, salivationis periculum minuantur. Quibus, volatilia vicia per aliquot annos sumpta, atque precipue singulis diebus, tal quoddam volatile stomachale & amatum, ut & interdum tal volatile viperaum, maximo fuere emolumento, donec natura ejusdem remedi generis diutius continuati perterrita, aliud a nobis exegerit, sc. tertium quid in et acida & alcalia volatilia, mixtura nempe bezoaricam, & spiritum vini, tale volatile viperaum, C. C. & m. m. contigit. vini chemicali camphorato paratum, cui subinde intercalatur ulius elixyris cujusdam purgant. s. verè volatilis; ab hiis non tantum stomachus paulò melius habet, purgantiaque minus debilitant, sed etiam fistis movetur, distentionis abdominis, dolores in lumbis &c. multò minus affligunt. Sextò, è purgantium sylva quam in proprium usum collegit, forte tum pilulae variae, aut mitiores, aut validiores, tum elixyria, tum vina medicata, tum pulveres, tum electaria, quorum vim singulis annis, & prope mensibus augere cogitur, eteicente in dies alvi difficultate, illiusque arte evacuandæ necessitate. Hæcque omnibus vitam protrahit minus miseram &c.

### Cadaverum Anatomica Inspectiones.

#### *Hypochondriaci mors ab inunctione mercuriali.*

Illustrissimus quidam in Bohemia, temperamentum calidi & humidum cum prædominio bilis, vixit ætate, à multis annis, variis concurrentibus causis, de obliuio omnibus hypochondriacorum conquerebatur, pro iisque tollendis varias adhibuit curas, inter quas erat etiam ante aliquot annos tertius ulus mercurii Carolinatum, quas profuisse eidem Illustrissimo in confesso fuit. Quia autem videntur errores in lex rebus, non naturalibus interea successisse, non attenta corporis debita expurgatione, factum est, ut in corpore congererentur humores crassi, & viscosi, qui cum alimento translati ad juncturas artuum, denegato corpori omni exercitio, ibidem loci degeneres, effecerunt artus ita debiles, ut Illustrissimus ille inhabilis foret ad deambulandum, & se de loco in locum movendum. Multa in hanc rem, ut intellexi, adhibita fuerunt, quibus tamen non causa sed effectus curabatur, ut fuerunt balnea, confortia, otium nervorum causa & rebus calidissimis confecti, quæ materiam in juncturis hærentem magis incassabant & exsiccarunt, inunctiones, trictiones, & nescio quæ alia cum nullo denique Illustrissimi patientis levamine. Tandem hac hyeme præter. ann. 1670. nescio quis curam proposuit, inungendi artus cum unguento mercuriali, cui se mense februarii commisit; itaque ab homine rudi, uno verbo carnitice inunctiones factæ sunt, non quater tantum, sed spatio triu septimanarum, non observata regula ulla, ætatem vitæ, nec ullatenus purgato corpore. Unguenti hæc fuit compositio. ℞. taur. de bacc. lauri & olei de baccis lauri ana ʒj. ceruss. ʒij. malliches ʒj. alum. usti ʒi. oliban. ʒj. mercur. c. ʒij. x. ung. veteris ʒij. camphor. ʒj. mortuò est materia crassa & viscosa quæ longa annorum serie in artibus delinuerat, & morè con-

fusio, spatio triu septimanarum exoneravit se pars illius per fauces cum periculo excidentie dentium, pars autem ejusdem occupavit cor, pulmones, imò ventriculum, hepar, lienem, &c. renes, unde spirandi difficultas, punctum cordis, dolor lienis, urina pauca & accensa colorem sanguineum referens. Pyralismo procedente, Medicum qui errores tam antiquos, quam noviter tactos corrigeret, advocate fuit provisum, itaque ego die 13. Martii accessimus varia per plures dies adhibita sunt remedia, sibi invicem succedentibus interim variis symptomatis lethaliibus, difficili sc. urina, aut suppressa, respiratione impedita, anxietate, tumore pedum xematoso, abdominis postea tensione (quæ fuit apud autorem suum describuntur) Donec septimo Aprilis duplex animi deliquium passus aliquot post horas animam Deo cessavit.

Octavo Aprilis Cadaver Illustriss. Domini apertum est, sicque in stomacho duo ulcera reperta fuere, præterea totum quod ingestum fuerat alium colorem referebat. Hepar magnum, durum, & quasi coctum, in duabus partibus syderaum. Splen totus putridus. Renes utrique duri, & materia crassa, viscidaque repleti. Membrium virile cum testiculis totum quantum necrosi infectum, eodem modo officium Vesicæ corruptum. Omentum circa vesicam, inferius disruptum & nigrum. Cor magnum sed flaccidum. Pulmones thoracis utriusque lateri accreti, ab inflammatione nigri, & integra sui parte materia putulenta undique repleti. Femora cum Tibiis, hydropicorum instar, aqua tumida. Caeterum abdomini prius applicitum, nec dum pinguedinem, quæ Illustriss. ad quatuor digitorum crassitiam pollebat pertransiverat. Jac. Joh. Wencesl. Dobrzensky de Nigroponte Miscell. Curios. A. 1. Observ. 80.

Secuit Cl. Sylvius cadaver Mulieris prægnantis nomine Catharinæ Caspareidis quæ post varia affectionis Hypochondriacæ symptomata tandem per sanguinis vomitum extincta fuerat. Rugæ se offerebant in infima ventris superficie, externa, signa partuum antegressorum. In abdomine scito copiosa & laudabilis pinguedo: Intestina pleraque flatibus distenta. Illorum substantia tenuis & elegans, imprimis quo in loco distendebantur, Præ aliis tamen omnibus in immensum distendebatur intestinum tenue, ante sui inflexionem sinistram versus: Intestina hinc inde colore felle infecta: folliculus felle prægrandis erat & pallidus. Lien quoque solito multo pallidior. Plures in intestinis erant lumbrici. In ventriculi aperti parte inferiore nihil cruenti, sed materia viscidissima spadicei coloris ferè: Totus ventriculus valde rugosus & densus: ex parte superiore, extra, insignis copia concretæ sanguinis cum fluidiore, simul saporis aulteri: Orificium inferius, sive pylorus, valde constrictus: Rugæ ventriculi tortuosæ & prope pylorum ferè circulares. Intestini verò rectæ secundum fistulæ intestinalis ductum. In intestinis nihil rubicundi aut obscuri: Hepar variis in locis per fibrillas diaphragmati annexum. Pulmo dexter pleuræ firmiter connexus, mollis, boni coloris, sed flatu distentus, thoracem totum opplens, nectas apertusque liquorem limpidum, salum, subacidumque fundens Sinister lividior distentus, passim connexus pleuræ, gelatinoso & viscido humore obductus,



humus nigricansque, interius etiam sanguinis instat coagulati. Pancreatis substantia elegans, à liquore per syringam immisso parùm rubebatur. In latere complures glandulæ planè non tinctæ: Ductus pancreaticus insignis: lien pallidior multo, in quo initia apostematis. Hepar benè habebat: bilis copiosa, pallida & tenuis. Humor in pericardi os subsalsus & subacidus: cor benè constitutum: In dilecti cordis ventriculo dextro parùm sanguinis, in sinistro ne gutta quidem. Extrema in parte tubarum, varix vesiculæ aqua repleta, hydatides dictæ. Rami illi, qui ex iliacis ad uterum tendunt hic ferè æquales illis qui ad crura. Quatro mense gravida iudicata. Totà substantia uteri spongiosa & cavernosa multis magnis foraminibus, sive poris canalibus pervia, in locis quibusdam stylum crassum admittentia: in horum unum immittimus sinistram versùs, tubuli ope flatus, per uteri substantiam & venam spermaticam in venam renalem & cavam transit, magisque tumens universus observatus uterus, quasi etiam in ipsius cavitatem flatus penetrallent. Inflata arteria spermatica ad ipsos usque testes mota & tumefacta placenta uteri cum secundina, sive membrana chorio, mirabili textura è tenuissimis fibrillis conjuncta. Funiculus umbilicalis in latere sinistro placenta insertus. Foetus caput in fundo uteri: hic unius & maculus lateri sinistro incumbens: extremitates manuum pedumque ut & narium albicantes. Umbilicus parte ventris magis inferiore quàm in adultis. In totius corporisculi superficie venarum ramificationes elegantissimæ conspicuæ: facies radice efformata. In arteria pæra sanguis coagulatus, in œsophago non. *Maffias Pausenius in Miscell. cur. ann. 4. & 5. Observat. 96.*

Patritius quidam intemperantissimus in affectionem hypochondriacæ non dissimilem admodum sua forma incidit: aderat & nausea continua, creber vomitus, & cogitationes melancholicæ: symptomata levibus purgationibus & tempestiva sanguinis missione aliquanto remissiora sunt reddita, ac nunquam malum fuit extirpatum: aliquot diebus post sentit horrorem, & supervenit tumor & dolor in sinistro genu: itidem circa pubem tumor prognatus, qui velicæ orificium ita compiebat ut difficulter urinam reddiderit: hic tumor interdum augebatur, interdum minuebatur, unde causa flaribus adscripta est: quotidianum tantum incrementum ita auctus est ut sese ad umbilicum & latus sinistram extenderet & respirandi difficultatem excitavit: fuit redditus cacochymicus & cachecticus, & postquam cruciatibus morboque totas contabuerat, septimo à morbi principio mense obiit diem. Apertum fuit corpus, & in eo inventa collectio materis purulentæ ac fetoris, nimirum inter duas mesenterii tunicas: collectio hæc occupabat majorem inferioris ventris partem & hepat sua putredine infecerat.

Hinc non mirum si facta malà sanguificatione humoribus inflammationibusque crura infestata (ut hydropicis contingit) fuerint: opinandum sanè est multos similem materiam, tanquam gravissimorum morborum fomitem in hoc mesenterio coacervate, à qua si non per vomitum vel per alvum liberentur, in radiolos, longos, atque gravissimos morbos incidunt, & ultimo miseris consumpti occumbunt. *Cotter. libello observat. anat. & chirurg.*

Honesta Virgo annos præter propter quinquaginta nata, plures annos variis eruicibus indeque enata affectione hypochondriacæ, seu flatulenta vexata, vitamque languidam agens, die 14. Octobris Anno 1682, à sacra conditione torré reddux, in totalem pulsus suppressionem per viginti quatuor ferè horas durantem incidit, eandemque inter loquendum, atque etiam comedendum vitam cum morte commutavit. Die subsequenti aperto cadavere, reperiebantur ventriculi utrumque prorsus inversum, ita ut pars illius amplior quæ in statu naturali, humiliori posita loco fundum ejusdem constituit, supremo hic locaretur sicut: Pars verò paulò contractior, quæ in statu naturali sensim magis artata in pylorum abie in superioribus à dextris positum, ima hic occuparet, fundique ventriculi officio fungeretur. Pylorum præterea vidimus, glutine ita obiectum, & per fibras suas ita contractum ut stylum majorem non facile admitteret. Duodeni portionem immediate è pyloro emanantem & ad superiora tendentem, in sui principio ita dilatam ut secundarius quasi ventriculus videretur, observavimus. In thorace resecrato advertimus cor stupendæ magnitudinis cujus cavitates adimplebant polypi grandiores, quorum alterum auriculam dextram lato & crasso pediculo opplens, contractior lentim factus, cavitatis parti cuspidi proximior affigebatur, indeque rursus in amplum elevabatur corpus, quod posteaquam ventriculi totam longitudinem decurrisset, per varias arterie pulmonaris, veteribus venæ arteriorum dictæ, divagationes aliquantum divagabatur. Alter polypus, è pluribus radicibus in cavitate cordis sinistra, ejusdemque & fundo & lateribus implantatis, ortus, illa sui parte quæ cavitatem prædictam occupabat, pollicem integrum latus, umidiumque crassus, circa ventriculi exitum multum contrahabatur, & in aortam ascendebat. Prioris substantia firmior, glandulolum quid, fibris variis, quasi nerveis, intertextum exhibebat; in cujus medio per totam longitudinem sanguineum vas decurrens viscebatur. Posterioris verò substantia, è fibris sanguineis glutine albo infectis, compaginata erat. Non mirum itaque si facta sit hæc memoria post longas pulvis debilitates, à polypis descriptis, eò utique tandem auctis ut sanguinis motum absolute propè impederent. Cruditarum autem, indeque enatæ affectionis hypochondriacæ, rationem commovimus & melius assignare non potuimus, quam descriptæ ventri in dispositioni; in qua sc. quod fundi vices sustinebat, non ejus erat capacitas, nec ita in pyloro propendebat, ut ponderosior chyli pars, præ excusio is difficultate, ibidem eas traheret moras, quæ sui in termentum exaltationi necessariæ forent, unde minus bene dissolvere alimenti assumpti particulas crudiores succum sanguini sufficiebant, qui in variis visceribus, atque carnibus inter circulandum detentus, langoris, & cachexiæ; quæ que in corde coagulatus polyporum materiam dabat, præterea crassior quædam ejusdem portio ad intestina, tum è ventriculo, tum per varia excrenacula, pancreas sc. glandulas intestinales &c. demandata, puitram ibidem aggerabat veram flatuum causam materialem; nam dum à salibus crassioribus in sui centro nidulantibus agitur, bullas efformat non absimiles illis quas sapo aqua dilutus, & stipulæ immersæ extremitati adhaerens, aere



immisso dilatatus, efficit. Sic autem non tantum molesta distensione gravantur intestina, sed eorumdem fibrarum per vim sibi factam convelluntur, unde in varios hæc viscera, omnesque etiam abdominis, seu partium in eo contentarum membrarum, cidentur spasmos. Ventriculi descripti vide figuram in nostra *Bibliotheca Anatomica* Tom. 1. pag. 76.

## AFFECTIO HYSTERICA.

Eadem est ac Affectio Hypochondriaca, & quoad sua signa præcipua, & quoad causas, & quoad curam, itaque illam explicare supersedebimus, suo tantum loco suffocationem Hystericam tradere contenti, hucque de Afectione in genere aliquot.

### Curaciones, Consultationes, & Cadaverum Inspectiones à variis Auctoribus.

#### Curaciones.

In Afectionis Hystericæ Paroxysmo. ℞. Spir. sal. armoniac. aromar. ʒʒ. C. cerui, tartari, tinctur. castor. ana ʒj. aq. menth. fœnicul. matricar. ana ʒj. miscce. Dosis cochlear. j. ℞. Spir. sal. armoniac. succinat. tartar. ana ʒʒ. lavendul. ʒij. essent. calami aromar. zedoar. ana ʒj. solut. galban. gutt. xv. aq. Rosl'm sin. menth. ana ʒij. cinnam. ʒj. miscce. ℞. Spir. C. C. tartar. ana ʒʒ. tinctur. castor. succin. ana ʒj. solut. a. æ fœtid. gutt. xii. aq. naphæ ʒij. carminat. ʒj. miscce. ℞. Spir. epilept. ex ungula Alces ʒj. ligni ebeni ʒʒ. solut. a. æ fœtid. gutt. xii. Ment. cinnam. gutt. x. torilmarini ʒj. aq. calaminth. ʒij. miscce. In nates infundi possunt Sp. C. C. tartari, sal. armoniac. aromaticus. Externe inungi ol. C. C. ol. C. Rhinocerotis, tartar. fuliginis, cinnam. rutæ, castorei, &c. Duplici autem operabitur commodo, qui in instrumeto Glauberiano spongiam misturata ex spir. C. C. sal. armoniac. aromatico & aq. menthæ composita, turgentem applicabit. Paroxysmis convictis, ægros appposito purgo cathartico. ℞. Gummi. galban. ʒj. resin. jalapp. scammon. ana gr. v. mag. succin. gr. iv. ol. menth. gutt. ij. miscce f. pilul. n. v. vel ℞. gummi. sagapen. ʒi. resin. scammon. gr. vj. extract. Agariçi gr. viii. castorei gr. vi. ol. still. myrrhæ gutt. ij. menth. gutt. j. m. f. pilul. n. vii. Ad aperendas obstructions, & serosos, acres, flavososque humores ejiciendos est sequens sudoriferum. ℞. Spir. tartar. satiafrati, C. cerui ana ʒʒ. carminativ. ʒj. antim. diaphoretic. ʒj. ocul. caner. gr. xv. Rob. sambuci ʒij. aq. artemisiz ʒij. m. f. sudoriferum. Hermann. Nic. Grimm. *Compend. Medico-Chymici* pap. 294. &c.

In indicationibus Afectionis Hystericæ satisfactorius, paucula hæc & vulgaria præscribere soleo; quæ licet nihil magnifici præ se ferant, ut plurimum tamen id præstent quod volo.

Mixturatur sanguis ad uncias octo è brachio dextero. Post ℞. Galban. in tinctura castorei soluti & colat. ʒij. cacamahac. ʒij. f. emplastrum umbilico admovendum. Sequenti mane aggredietur usum sequentium pilularum. ℞. Pilular. cochlear. ʒij. Castor. pulver. gr. ij. balsam. peru-

vian. gutt. iv. capiat hora quinta matutina superdormiendo. Repetatur per duas vel tres alias vices, idque singulis vel alternis autoris pro ratione virium, aut operationis. ℞. aq. cerasot. nigr. rutæ, & bryoniæ compos. ana ʒij. castor. in nodulo ligat. & in vitro suspens. ʒʒ. sacchari crystallini q. s. f. julapium, de quo capiat cochlearia iv. vel v. in omni languore; intillando primæ dosi, modo paroxysmus urgeat, spir. C. C. gutt. xx.

Post pilulas purgantes modo supra descripto sumptas, utantur & sequentibus. ℞. limatur. chalyb. gr. viii. cum f. q. extracti absynth. f. pilulæ n. ij. sumat summo mane repetanturque horâ quintâ pomeridianâ, per dies xxx. superbibendo haustum vini absinthitis, vel pro usu quotidiano, ℞. limatur. chalyb. & extract. absynth. ana ʒij. m. asservetur pro usu. Capiat iisdem temporibus gr. xvi. vel ʒj. in pilulas tres redact. vel si forma boli magis ardeat ℞. conserv. absynth. roman. & conserv. flaved. aurantiorum ana ʒj. angelic. condit. nucis moschat. condit. & cheriac. andromach. ana ʒʒ. zinzib. condit. ʒij. cum l. q. syr. aurantiorum f. electuarius. æ. electuarii præscript. ʒij. limatur. chalybis probè tritæ gr. viii. cum f. q. syr. aurantiorum f. bolus lumen dus manè, & horâ quintâ pomeridianâ, superbibendo haustum vini absinthitis. ℞. myrrh. elect. & galban. ana ʒij. castor. gr. xv. cum f. q. Balsami peruvian. f. pilul. è singulis drachmis xii. sumat. ij. singulis noctibus, superbibendo aq. bryon. compos. cochlear. ʒij. vel iv. per totum decursum hujus processus. Sin autem pilulæ ultimæ præscriptæ ventrem moverint, quod in corporibus quæ facillimè purgantur, præ gummi quæ insunt, quandoque fit, tum sequentes substituantur. ℞. Castor. ʒj. sal. succini volatilis ʒʒ. cum f. q. extract. rutæ f. pilulæ exigue numero xxiv. capiat ij. singulis noctibus. Hic autem observandum quod *chalybeata* in quacunque forma aut doli exhibeanur; tæminis quandoque magnas tum animi tum corporis perturbationes inducant, idque non solum primis diebus (quod ferè omnibus tolerne est) sed etiam per totum tempus quo illis utuntur; in hoc casu non statim chalybis usus dictis temporibus interrumpendus, sed quod melius eundem ferre possint, laudanum aquâ aliquâ hysterica mistam singulis noctibus ad tempus aliquod propinandum. At ubi symptomata mitiora sunt, ut res sine ferro intro sumpto transigi posse videatur, (in minore scilicet morbo) satis habeo sanguinem mittere atque alvum solvere ad dies tres quatuorve, ut supra diximus: Dein pilulas hystericas alterantes præmemoratas manè & serò per x. dies capiendas imperare. Quæ quidem methodus in affectu leviori rariò à scopo aberrat. Imò pilulæ istæ solæ, vel omittis phlebotomia & catharsis, sæpè magnos effectus edunt. Senò interim animadvertendum est, nonnullas fœminas idiosyncrasia quadam ab hysterica illis medicamentis (quæ pleisique hujus morbi symptomatis levamen afferunt & solatium) ita penitus abhorere, ut non solum non juventur, sed etiam insigniter ab eorum usu lædantur: in his itaque omnino sunt omittenda ista: *quævis* *pharmaceutica* ut divinus Senex, *una mixta* Invita minervâ nihil quicquam moliendum. Quæ quidem idiosyncrasia adeò insignis ac frequens est, quod respiciendo eam non habito ægræ in discrimen vitæ conjici possint.



possunt; idque non solum quoad hysterica, sed quoad multa remedia alia: cujus impræsentiarum instantium unicam adferam. Fœminæ nonnullæ variolis laborantes *syrupi e meconio* uum ferre non possunt, utpote à quo vertigines, vomitiones, & id genus symptomata ad affectus hystericos pertinencia acceruntur, quibus tamen *Laudanum liquidum* imprimè conveniat.

Atque ita hysterici affectus quoad plurimum sanantur, ut & pleræque mulierum quæ appellantur, obstructions, ut præ æteris chlorosis seu pallidi virginum colores, uti etiam mensium suppressiones qualescunque. Attamen si sanguis utque addit effusus fuerit, tantaque proinde spirituum æratio, ut chalybs præscripta methodo usurpatus malo vincendo par non sit, adeundæ aquæ minerales aliquæ ferri mineræ saturæ, quales sunt nostræ *Tunbrigenses*, aut aliæ nuper repetæ. Harum enim virtus oblybeata, tum ob insignem quantitatem quæ hauriuntur, tum etiam ob eam idem cum natura convenientiam intimiùs sanguini permiscetur, & potentius morbos expugnat quàm ferrum quocunque demum artificio nobilitatum, ut volunt cunctiones imputantiores. Hoc autem præ cæteris inter bibendum observandum; si æritudo quævis ad symptomata affectio is hysterica referenda acciderit, hoc in casu per diem unum alterumve æget aquis abstinet donec symptomata illud transitum Aquarum aliàs impediunt, penitus abeat. Etenim tametsi hæ aquæ humoribus agitantis ac proinde spiritibus confusione inducendæ minùs aptæ nate sint, quàm cathartica vel lenissima ex officinis deprompta, aliquantulum tamen idem præstant, quatenus scilicet diuretica sunt; ut taceam quod sæpe etiam ventrem movent. Quod si ipsæ aquæ humores ac spiritus exagitant, turbandoque aditum sibi in seipsis præcludant, quo minùs facillè transeant, videant illi quàm importune agunt qui medicamenta purgantia per harum usum imperant, semel aut bis in septimana assumenda, vel, quod adhuc ineptius, ipsi aquis immiscenda præcipiunt; unde fit tam in his quàm in aliis aquis mineralibus ut non solum non promptius sed & planè tardius ac difficilius eadem operentur. Hic mihi non reticendum, quòd tametsi his aquis ferrum inesse in principiis solutis nonnullis videatur (quod idem planè est ac si *ferrum liquidum* supponamus.) nullus tamen dubito, quin eadem nonnulli simplices aquæ extant virtute minerali per quam transeunt imprægnatæ ac infectæ. Quod cuipiam liquidò constabit, si aquæ communis conquis aliquot satis magnam vim clavorum veterum ex calceis equinis extractorum infuderit. Sentiet scilicet aquam hanc cui pulvis gallarum, fol. Theæ, vel similia fuerint immista, eodem planè colore infici, ac si aqua esset fontis mineralis. Neque sanè diversos effectus hæ aquæ sive artificiales sive inartificiales (utrum enim mavult quis appelleret) epotæ edent, modò tempore ætivo atque aère salubri assumantur. Sed utur hoc sit, si ob contumaciam ejus hic affectus ferreis aquis minùs cedat, a seundæ sunt aqua calida sulphurea quales sunt nostræ *Bathonienses*; atque æget, postquam tribus autoris continuis eas intus assumpserit, sequenti die *Bathnæum* ingrediatur, & postero die iterum eas bibat; idem faciendo alternatim per duos menses integros. Etenim tam in his quàm aliis, cujuscunque demum generis sint, hoc sæculo notandum, quòd in earum usu consueque æ-

gro persistendum donec non tantum levamen aliquale sentiat, sed, quo minùs symptomata omnia brevi postliminiò revertant, donec omninò convalescat. *Theriacæ Andromachi*, vel sola, si crebrò diuque usurpetur, magnum est in hoc morbo remedium. Neque verò in hoc solo, sed in aliis quamplurimis a caloris & coctionis sive digestionis defectu oris, omnium totte potentissimum, quæ intenus nobis immorere, utit à plerisque falsidetur, quòd & pervulgatè sit & a tot jam sæculis agitur. *Vina Hispanica Germanica, Agelica, Absinthio, ce tantio, cricum Anraiorum flavescere*, aliisque corrob'orantibus intus medicata, si ad aliquot cochlearia ter in die potentur, a'mo am'conferunt, ito id ægræ tenui non fuerit bilio o' ut corporis habitu. Profectò vel *vina Hispanica simplicis* licet a'hor haultis, horà somni aliquot noctibus, meo iussu propinatus Hysterici nonnullis per quàm salutaris fuit, cum ex co robustior universi corporis habitus redderetur, ipsæque addit fœminæ è cachecticis vividæ simul ac vegetæ fierent. Ad hæc *Peruzianus Cortex* eximius mirandæque vires in sanguine & spiritibus confortandis invigorandisque habere nonnunquam deprehenditur, cujus scrupulum unum mane & serò ad sepi' imanas aliquot deg'utitur, sanam firmamque corporis crasin (tam vitis *hypochondriacis*, quàm *hystericis* fœminis diu multumque ægrotantibus, dejectæ que jam quæ corporis æconomia) restituere, ipse observavi. In nullo autem Hystericorum affectuum genere feliciùs succedit quàm in illo quo *spasmus* afficiuntur fœminæ, nixus edentes fortissimos & plusquàm muliebres, peccora simul ferientes. Interim tamen confitendum est, quòd hoc medicamentum non ita crebrò etroque huic malo succurrat ac *febris intermitte'ntibus*. Quamvis verò (ut id obiter dicam) in harum curatio .e egregia præster, ne dicam miracula, dictus cortex, æque eodem tum ipsi nos libenter utamur, tum uxoribus liberisque usurpamus imperemus quoties res postulet; sunt tamen quibus haud minùs jam displicet, quòd tam crebrò subitoque morbos expugnet, quàm olim displicebat, quòd nonnisi nuper his terrarum oris immoruerat. Quo quidem fato tum optimi quique viti, tum etiam præst' missi na quæque ac *spasmodica* remedia semper ferè urgentur. Verùm tamen ad hanc notam, seu lydiu lapidem, indolem nostram licet adductam experiri a, que exinde dignoscere, homin'sque boni si nus, an verò probrosi; pro gradu scilicet quo vel exultamus, vel dolemus, vel tingimur; quoties publica res hominum communialiquo beneficio, ac Nummis favore augeat.

Si quæ verò ex remediis suprà recensitis minùs conveniant, quòd temperamento bilioso ac tenui præditis sæpe accidit, tunc *Dieta lactea* possit usurpari. Etenim mulieres aliquot (quod primò sit itim fronte mirabitur quis) cum affectibus hystericis diu conflictatæ, etiam iis qui omnes medicorum conatus spreverant eluserantque tandem hæc solo aliquandiu velicentes convalescere. Atque illæ quidem maxime quæ ea specie laborabant quam ego colicam hysterica appellò, quæ nonnulli a narcoticis potuit deliniri; qui us itaque per intervalla repetendis multum assueverant hæ fœminæ, dolore recrudescere ut primò ematuerit Anolyni virtus. Id verò in hac curandi methodo præcipuè mirandum, quòd cum lac frigidum tantum er-



dumque alimentum præbeat, spiritus, nihilominus ejus usu corroborentur invigorenturque. Nec tamen hoc a ratione abhorre illis videbitur, qui secum reputaverint, lac, cum simplex omnino nutrimentum suppeditet, naturæ minus in coquendo negotium facessere, secus ac solent cibi ac liquores magis compositi, quodque perfectissimam illam concoctionem æqualis sanguinis spirituumque crasis necessariò sequatur. Illud etiam est animadvertendum, quod non nuda spirituum debilitas per se considerata, sed eorundem debilitas ad sanguinis statum comparatorum *trahitur*, quam patiuntur, causa sit. Fieri enim potest, ut infanti spiritus satis firmi robustique sint pro sanguinis ratione, qui tamen debitam ad sanguinem adulti hominis proportionem non teneant. Jam verò cum ex jugi lactis usu & dicta quantumvis illa sit cruda atque invalida, sanguis mollior & tenerior evadat, si spiritus ab eo nati sanguini pares tantum sint, satis bene se res habet. Non omnibus tamen contingit, quantumlibet à lacte alias juvari potuerint, ea incommoda superare posse, quæ primis fere diebus apportat, quò nempe tum in ventriculo coaguletur, tum etiam viribus corporis in statu conservandis sustentandique minus sufficiat, ac verò nihil ex omnibus quæ mihi hætenus innoverunt, adeò impensè sanguinem, spirituique fover, firmatque, ac diu multumque singulis fere diebus *equo vehi*. Cum verò in hac Gymnasticæ specie impetus, sermè omnis in ventrem inferiorem fiat, in quo vasa excretoria (quorquot facultatis, in sanguinis massa itabulantibus, educendis à natura instituuntur) sita sint, quæ tanea functionum perversio, aliave organorum naturalis impotentia vel fingi potest, cui tot succussionum millia eodem die ingeminata idque sub dio, operi non attulerint? cuius calidum innatum usque adeò defervuerit ut hoc motu non excutitur, & denuò effervescat? quæ verò si prætenuaturalis substantia, si succus depravatus in aliquo harum partium sinu recondi potest, qui non hoc corporis exercitio, vel in statum naturæ comitantem perducatur, vel quaquaversum dissipetur elimineturque? Quid quòd sanguis perpetuo hoc motu indefinenter exagitatus ac permixtus quasi renovatur ac vigescit. Quæ quidem methodus licet terminis vitæ æstli acque imbelli assuetis, minus accommoda sit, utpote quæ à motu, maxime in principio, possint lædi, viris tamen est aptissima, & sanitatem præ cæteris conciliat. Quoties paroxysmus invaserit si tale aut tantum sit malum ut inducias ferre nolit, donec sanguine & spiritibus corroboratis, quasi per ambages sanari possit, confestim ad remedia *hysterica* ista contugendum est quæ odore viroto ac gravi spiritus, ut dixi, exorbitantes ac defectores, in proprias stationes remandant, siue intra corpus sumantur, siue naribus admoveantur odoranda, siue exterius applicentur; cuiusmodi sunt *Asa fetida*, *Galbanum*, *Castoreum*, spiritus salis armoniaci, & quicquid est denique quod odorem terrum admodum ingræumque spirat. Hic enim quod res est dicam. Quæcunque fortè, ea omnia intentioni huic apprimè inserviunt, siue natura, siue etiam ars ea putido odore donavit. Atque ni fallor, spiritus C. C. sanguinis humani, urinæ, ossium ac similium, inde præcipuas suas vires acquirunt, quòd, dum vi ignis præparentur, *pyreuma* contrahant terrum, ac male olens,

quasi essentia eorum intemius annexum. Quod pariter cernitur in fumis à Corio, pennis, & id genus animalium partibus, cum exurantur, exhalantibus. Exenim id habent commune singula animalium substantiæ, ut inter exurendum fumum emittant olidum & olfactui ingratum; qui si importuno igne affertim eliciatur, ac organis excipiat, condensatus is in liquores istos abire ac convertitur, qui spirituum volatilium nomine insigniuntur, quique facultates eas facillè reportant quæ subjectis suis haud primis inerant; utpote qui ignis solummodo creatura existunt, & singuli eorum eandem planè virtutem cum cæteris nanciscuntur, ex quacunque demum substantia (modo animalis ea sit) procedantur extrahanturve. Proximo loco animadvertendum est quòd si paroxysmum comitetur dolor aliquis intolerabilis in quacunque æmum parte, aut vomitus enormior, aut etiam *diarrhæa*, tunc præter hysterica jam laudata, *laudatum* in usum revocari debet quod solum vires habet his symptomatis cohibendis prorsus pares. At verò in his doloribus sedandis, qui vomitiones excitant, cavendum est sedulo, ne illi siue laudano, siue alio Paregorico mitigentur, non præmissis debitis evacuationibus, nisi patientiam fere humanam omnem vicerint. Primum, quia tanta nonnunquam sanguinis & humorum copia est aggesta (maximè in feminis sanguineo, & maculis proprio habitu præditis) quanta narcotici vel efficacissimi, ejusque sæpius repetiti, operationem valeat sufflaminare. Unde in talibus sanguis e brachii venis necessariò est extrahendus, & catharticum eis est propinandum, antequam ad laudani usum accedamus; his enim rite peractis, quod prius, vel in maxima doli exhibui nihil proficiebat, jam in doli mediocri scopum attinget. Deinde quia multiplici experientia edocti sumus, quod quoties ægra paulatim laudano allueverit, non præmissa evacuatione debita, necesse habuit, ob dolorem mox ad evanescente remedii virtute denuò revertentem, Paregoricum rursus ingerere, idque quotidie ad annos aliquot continuos, doli subinde per gradus aucta: ita ut nullo modo jam à laudano abstinere queat, licet omnes ab illo digestionem vitentur & functiones naturales debilitentur. Quamvis non sentiam laudani ulum siue cerebro, siue nervis, siue facultatibus animalibus immediate nocere. Judico itaque ego, quod expectus loquor, evacuatione aperienda debere præmitti, v.g. viragibus & feminis in quibus sanguis prædominatur, vena secanda est, & alvus subducenda, præsertim si non jam à longo tempore paroxysmo fuerint correptæ. Si verò feminæ debiliores, & quæ temperamenti à prioribus illis planè diversi sunt, hujusmodi paroxysmo & dolore affligantur atque eodem subinde haud ita pridem laboraverint, sufficere eorum ventriculos congiungo, plus minus, lactis cerevitiati hausto, & mox per vomitum rejecto detergere; dein largam doli impetare siue *theriacæ Andromachi*, siue *eletharii Orvietani*, & cochlearia aliquot liquoris alicujus spirituosi & gustui non ingrati cum p. ucis laudani guttulis superbibenda. Quod si ægra jam pridem vomuerit, antequam accerseretur Medicus, & metus sit ne emeticis ulterius sollicitent, in furorem agantur spiritus, & ægræ vires nimium deiciantur, hoc in casu *laudatum* sine motu propinari debet, eo dosis modo numeroque quæ symp-



omnis magnitudinem ac durationem non tantum ex parte uare possit, sed & vincere. Duo autem hic præ cæteris diligenter sunt notanda. Primum, quod cum semel post evacuationes iustas & necessarias, laudano uti coeperimus, ea dosi, atque illâ toties repetitâ sumendum est illud pharmacum, donec symptoma omnino fuerit debellatum, interjecto tantum spatiolo inter singulas doses, ut quid prior præstiterit ante noiscamus, quam alteram reperamus. Sed de hoc fufius alibi egimus. Deinceps dum laudano morbum aggredimur, nihil prorsus movendum est, nihil evacuandum, cum vel mitissimum illud enema de lacte saccharato possit destrucere quicquid reparaverat Pægoricum, & tam dolorem quam vomitionem postliminid revocare.

U: ut verò dolores, quod jam innuimus, supra memo rati importuni sint in anodyno essi igitando, tamen vomitiones enormes & dosin eundem longè maximam & sæpissimè repetitam indicant, cum ab inverso motu ventriculi peristaltico (quo in eo contenta verius inferiora erant protrudenda) remedium Pægoricum prius eliminetur per œsophagum, quam opis aliquid afferre queat, nisi post singulas vomitiones Narcoticum de novo toties quoties iteretur, idque in forma potissimum solidâ; aut si in liquida detur, vehiculum ita parcum esse debet, ut ventriculum imbuat tantum, & præ materiæ inopia ab illo fortium evelli nequeat. v.g. *Gutta aliquot in cochleari uno aq. cinamom. fortioris*, aut similis. Monenda in ætate est ægra ut statim ab assumpto laudano conquiescat, ac caput præsertim quantum fieri potest immotum teneat; quando vel levissimus capitis motus præ cæteris omnibus vomitionem provocat, unde medicamento modò degluti jactura sit. Quinimò etiam cessante & quasi perdomitâ vomitione, expedie anodyno ad pauculos dies manè & serò exhibito, seu injecto fixo, recidivam præcavere. Quod itidem post dolorem hystericum narcotico sedatum, aut diarrhoeam, omnino observari debet.

Atque ita demum methodo jam tradita & dolori & vomitioni symptomaticis mæderi in promptu est; à quibus cum aliorum persæpe morborum speciem præ se ferant, Medicis facilius imponitur, quam ab aliis quibuslibet symptomaticis, quotquot manum medicam deposcunt, de quo pauca subjungam v.g. in ista hystericæ affectionis specie quæ Paroxysmum Nephriticum imitatur, quis non videt quanta sit paritas morbi utriusque & similitudo, tum quod pars eadem utrobique doleat, tum quod in utroque affectu vomituriæ ægræ, cum tamen à causis ita ab invicem variantibus pendeant, & tam impari methodo debeant sanari, ut quod in hoc lædat, in illo juvet, & e contra? si enim sive calculus, sive arena Renum substantiam atterentes dolorem inferant, atque ex partium consensu vomitionem, nihil æquè conducet ac prælarga & frequens causa antecedentis, per phlebotomiam revulsio, tum ut dilarentur laxenturque meatus, per quos calculus excludendus est, enematis emollientibus sæpenumerò repetitis, aliisque ejus generis remediis internis: Quibus medicamenta Diuretica, & lithontripica addenda sunt. Jam si dicta symptomata à calculo nullatenus oriantur, sed à spiritibus animalibus nimia copiâ Renes impetantibus (quo in casu Pægorica tantum indi-

cantur, nec vel enema è mitioribus, post primas evacuationes, sine periculo injicitur) in quanto vitæ discrimine versetur in felix ista de cujus jam corio luditur, non opus est dicere. Idem potest affirmari de affectu illo hystericæ qui colicam biliosam, vel iliacam passionem simulat. Hic ubi pro concessio habeatur affectum istum (licet indolis omnino sit diversa, imò contrariæ) colicam biliosam esse, & ab humore acri in viscera per arteriarum mesentericarum oscula excreto nasci (in quem errorem dolor intolerabilis, & viridis color qui in materia cernitur tam per os quam per sedem expulsâ Medicum incautiorem & cogitationibus minùs assuetum haud ægrè perducant,) quæ methodus tam commoda, quam ut in contemperanda, remedium refrigerantium atque incrassantium ope, humorum acrimonia operam locemus? atque, quò humores è visceribus exterminentur, præter enemata quotidiana, ut cathartica frequenter propinemus; inter cætera verò etiam mercurium dulcem diagrydiiis permixtum ad plenioram materiæ morbi eradicationem? Quam male autem cum ægris agatur, quantumque eis periculum immineat, dum huic methodo insistamus, si affectus qui colica biliosa censetur, re ipsâ hystericus tantum fuerit, aut hypochondriacus, nemini non liquet: cum clamet experientia, quod post primas evacuationes universales (quæ humorum putrescentium, quos peperit ægræ jam sæpè dicta, quique anodynus oblitaculo esse possint, saburæ amolientæ dicantur,) nihil jam restat nisi ut tumultuantes spiritus contopiamus, donec tandem symptomata evanuerint, at iis cessantibus opportunè chalybeata imperemus, vel si quod aliud est remedium quod sanguinem accendendo atque invigorando morbum radicidus extirpet. Meum non est plurimas atque ingentes illas calamitates enumerare, quas feminis contigisse ipse novi, ubi colica hæc hystericæ a bile ortum ducere existimaretur. Verum tamen affirmo evacuationes sæpe repetitas, quæ quidem in colica biliosa omnino indicantur, dolorem vomitumque non solum non compescere, sed irritare magis, spirituum scilicet perturbationem, quæ vera horum symptomatum causa est, promovendo. Tandemque malum ad menses aliquot prolongatum, mensuati detrepere in cerebrum tactâ, acsinit in spasmos, à quibus ægra brevi è medio tollitur; idque vel maxime post alias evacuationes diutius repetitas, suadente colore viridi eorum quæ per os è ventriculo excernuntur, emeticum fuerit propinatum verbo dicam: si quid ego observando dicici, imprimis cavendum est ne symptomata feminis hystericis familiaria ab aliis quos sæpè emulantur morbis, diagnosi errante putentur oriri.

Hic non est reticendum, quod præter errores jam recensitos, à quibus feminæ affectibus hystericis obnoxie de vita periclitantur, permulta insuper errore non minùs funello dictis affectibus mulcentur ea tempestate, quâ hic morbus, licet suâ naturâ non sit lethalis, tamen vi malorum intractabilium ac subsequenrium non paucos è medio tollat. Exempli gratiâ: femina teneriori atque infirmo corporis habitu infantem parit, cui omnia scilicet & secundum naturam cedunt: Obstetrices sive rudis & imperita, sive sit iactabunda, & quàm præclarè suo illa munere sancta sit palam ostentans, suadet ut puerpera paucis à partu die-



us surgat, & se à lecto aliquandiu abstinere, hæc morem gerens, statim à primo corporis motu affectione hysterica corripitur, & pro ratione qua morbus inaugeat, lochia primùm immittuntur; deinde sistuntur penitus; quotum suppressionem præmaturam longa symptomatum series excipit: quæ, nisi permagna tam diligentia, quam in meaendo petitiâ intercedat, ægram brevi perimunt, nonnunquam enim phrenisi laborant ex hac occasione, quæ in dies effratior redditâ passim primùm, dein mortem affert: si verò mortem evadant, mitiùs aliquantulum insaniunt, quandoque ad ultimum vitæ terminum, nonnunquam post lochiorum suppressionem in febrem incidunt, quæ vel in earum quæ tum grassantur, epidemicarum castra transit, vel ab ea sola pendet origine. Adde quòd iidem affectus hysterici, quibus lochiorum suppressio inprimis debetur, jam magis æviunt, tanquam ex se denud nati. Diu est à quo mihi subijt in mentem, quòd ex eis quæ moriuntur puerperis vix decima quæque, ut modestè computemus, vel ex eo perit quòd vires parui necessitatæ eam defecerint, vel ex doloribus partum laboriosiore comitantibus; at eo maxime nomine, quòd debito citius exurgat, excitatis à motu illo paroxysmis hystericeis, à quibus cum sistantur lochia, mox ingens ineluctabilem symptomatum turba ingruit. Quamobrem illis quæ me audiunt ubique auctor sum, ut ad diem saltem decimum usque in lecto se contineant, si modò naturâ paulò debiliores sint præcipuè si vaporibus, qui vulgò dicuntur, jampridem fuerint tentatæ. Præterquam enim quòd ista, quæ in lecto fiuntur, quies à malis jam toties commemoratis eas immunes præter, non interruptus lecti calor spiritus pariter reficit tum à pariendi doloribus, tum ab evacuationibus in hoc casu solemibus exhaustos fractosque; quinimò & naturæ suppetias fert, atque omnes, quas gestationis tempore mulier congesserat, cruditates digerit & amolitur. Verùm si ab admisso hoc errore quodvis è dictis symptomatis supervenerit, indicationes curativæ eò dirigendæ sunt, ut spiritus ab hoc motu jam inquieti redditi sedentur, & ut lochia rursus fluant quandoquidem eorumdem suppressio horum symptomatum causa sit proxima atque immediata. Neque tamen huic methòdo pertinaciùs insistendum, sed exhibitis aliquandiu remediis quæ in hoc casu cum successu usurpari solent; si voris ea non respondeant, ab iis temperandum est; cum neque torriora hic locum habeant, neque in mitiorum ulu perseverare debeamus, propter attritas & ferè prostratas puerperarum iræ affectarum vires. Exempli grætiâ, ubi primùm lochia jam supprimi constat, è re fuerit seminam è vestigio lecto addicere, mox emplastrum hystericum umbilico admove, atque quamprimum electuarium sequens propinandum imperare. Ut ℞. conserv. absyn. h. roman. & rutæ ana ʒj. trochisc. è myrrha ʒij. castor. croci angl. sal. volatil. salis armoniac. & asæ fœridæ ana ʒi. cum s. q. syr. de s. radicibus fiat electuarium cap. ad magnitudinem nucis moschatæ majoris: tertiâ quæque horâ superbibendo seq. julapii cochl. iv. vel v. ℞. aq. rutæ, bryon. compos. ana ʒij. sacchar. candi q. s. m. f. julapium. Atque hæc, si statim à primo suppressionis indicio exhibeantur, hoc malum plerumque devincunt. Sin autem dictis remediis eoulque continuatis donec tota quantitas

assumpta fuerit, lochia adhuc supprimantur, hoc in casu laudanum, unâ saltem vice, tentandum. Hic laudanum, quantumlibet suapte indole astringat, cum tamen spirituum perturbationem, à qua solennis lochiorum evacuatio fuerat interrupta, compescat, quandoque plurimùm juvare, & emmenagogus nihil proficientibus, lochiorum fluxum postliminò revocare possit. Commodissimè verò narcotica unâ cum hystericeis & emmenagogis propinantur; v. g. laudani liquidigutt. xiv. in aqua bryonia composuâ; vel laudani in forma solidi granum unum semis cum scrupulo dimidio assuade in pilulas duas redactum. Sedulo interim animadvertendum est, quòd si telo hoc semel misso scopum non attingamus, nec sequantur lochia, Optum nullo modo est repetendum, ut in aliis casibus fieri solet ac debet: etenim si reiteretur hic Pægoricum, lochia ita potenter sistet, ut ea nullâ acinceps arte provocari queant. Verùm enim verò si & hoc minùs succedat (interjecto aliquo temporis spatio, quo certiores simus quid illud præstiterit) ad medicamenta iterum immixta hystericeis permixta redeundum est & dein ad enematis ex lacte saccharato injectionem. Verùm quòd de opio supra, hic de enematis dicendum est; nisi enim primò injectum lochia educat: nihil prorsus à pluribus est sperandum: cum unum humores leniter sollicitando, ut fluant lochia efficere possit, plura verò eadem aliud divertant. His itaque peractis, (quæ tamen leviter tangenda sunt) tenuissimum est, & prudentis medici officium, temporis opportunitatibus præstolari; cum singulo quoque die curationis negotium magis magisque extra aleam ponatur, & si ægra vicesimam diem superaverit, jam ferè in vado est. Etenim cum à morbo, quisquis is fuerit, jam diuturniori semina aliquantisper respiraverit, viresque quadantenus receperit, eam methodum valebit ferre quæ aptissima videbitur isto malo averruncando, quòd à lochiorum suppressione accreverat: quando remedia obstinatius ingesta, primis ne hilum promoventibus, cum ipsum morbum, tum etiam spirituum perturbationem, à qua morbus oritur, augere possint, quòd sedulo advertendum velim.

Si fas mihi sit liberè quæ sentio effari; jamdiu in ea hæresi fui ut arbitrarer me, non tantum in dictis puerperarum morbis, sed etiam in acutis omnibus, ubi curationem ab hac illave, quæ uti placer, methòdo certò infecutam polliceri nequeam, & viri & Medici boni probique pulchrè defungi munere, quoties nihil omnino tento, modò ægrum invisens, illum non se pejus habere hoc die quàm heri habuit competiam, nec cras habituram quàm hodiè conjecturâ assequi possum. Cum si in ægro curando ea methòdo incedam, de cujus efficacia nondum mihi certò constet, tam ab experimento quòd ex eo capturus sum, quàm ab ipso morbo is periclitabitur: Neque ita faciliè genuinum discrimen effugiet, ac simplex erat evasurus. Quamvis enim impræsentiarum nullum vel incipientis convalescentiæ signum manifestum se prodât, certissimus tamen sum morbi acuti cujuslibet naturam non ferre ut quis eo semper laboret: ac proinde dies quislibet res ægri magis magisque in tuto collocat, vel saltem modico aniam præbet, ex qua opportuniùs ac certius morbum feriat confodiatque, quàm in præcedentibus liceret. Quòd quidem uti de acutorum



pletisque verè affirmatur, ita præcipuè de puerperatum morbis; quibus error vel leviusculis fatalis esse possit; & in quibus ita parùm valeamus naturalem illam evacuationem regere, à cuius suppressione mala de quibus diximus proveniunt. Cum verò *affectus hysterici* non semper primariæ sicut, spirituum nempe debilitati nati, sed adventitiæ aliquando originem suam debeant, huiusmodi itaque c. usam antequam finiam, hic recensere libet, quæ frequentissimè *vaporum*, quos appellant, pararia exiit. Atque ea est *fluxus mensuum immodicus*, live in puerperio, live extra idem invadat. Quoad primam speciem, capitis diebus post partum laboriosiores maxime infestat, & longa symptomatum hysteriæ catervâ itipatur. Et sicuti in primis hæc diebus solum ingruit ac urget, ita etiam brevi se proripere solet. Etenim si victus paulò incalescens instituat, facile abigitur; cui & sequens potus addi poterit. Assumatur aq. plantag. & vini rubri ana ℥j. coque simul ad tertias, & deinde edulcoratur S. q. facchar. albißimi cuius, cum frigescat, capiat ℥ss. bis vel ter in die. Interim iulapium aliquod hysteriæ, ac satis mite, subinde propinetur, & nodulus seq. natibus admoveatur. ℞. Galbani & asæ foetida ana ℥ij. castor. 3 i ss. sal. succin. volat. 3 ss. m. f. nodulus vel ℞. spir. talis armoniac. 3 ij. quem sæpius olfaciat.

Quod verò ad huiusmodi *extra puerperium fluxum* attinet, licet idem omni tempore sæpissime accidere solet, eas tamen paulò ante tempus illud quo sponte sua omnino menses cessaturi, sæpissime invadit; circa ætatis scilicet annum 45. si modo temporibus fluere inceperant, circa autem 30. si ferè in vita prius prorumpabant. His uti dictum, paulò ante totalem eorundem discessum (instar candelæ jam ferè absumptæ deflagatæque, quæ subito flammam edit insigniorem mox penitus disparaturam) cum magno impetu assatim excidunt, & ob copiam sanguinis ingentem qui continuò excernitur, in paroxysmos hystericos ferè continuos miseræ deiciunt. Hic licet *hysterica* tam interna quàm externa obiter usurpanda (fortiora devitanda ne fluxum ulterius provocent,) omnis tamen curationis cardo in mensibus cohibendis vertitur, quæ in hunc modum quàm primùm sistenda. Mittatur sanguis è brachio ad 3 viii. seq. manè exhibeatur potio purgativa communis, quæ repetenda est tertiâ quâque die per duas alias vices; & singulis noctibus per totum morbi decursum sumat *Paregoricum ex syr. de meconio* 3j.

℞. Conserv. rosar. succar. 3 ij. trochisc. de terra lemn. 3 j ss. corr. granator. & corall. rubr. præp. ana 3 ij. lapid. hæmarie. sang. dracon. & bol. armen. ana 3 j. cum S. q. syr. è corall. simpl. f. electuar. de quo sumat ad magnitud. nuc. moschat. maj. manè & quintâ pomeridianâ superbibendo seq. iulapii cochl. vi. ℞. Aq. germin. quercus & plantag. ana 3 ij. aq. cinamom. hord. & syr. de rosis succis ana 3 j. sp. vitriol. q. f. ad gratam aciditatem. ℞. fol. plantag. & urticæ ana q. f. contundantur simul mortario marmoreo, & succus exprimat, qui postea clarificetur. Cap. cochl. vj. frigide ter vel quater in die. Post primam purgationem applicetur emplastr. seq. regioni lumborum. ℞. Emplastr. diapalm. & ad herniam ana part. æquales m. extendatur super glutam, & f. emplastr.

Dixi refrigerans incalescensque imperanda, nisi quoddam erit semel vel bis in die vini claret hauritum. Aegre indulgere, quod etsi minùs conveniat in quantum ebullitionem cedere aptum natum sit, ad vires tamen refocillandas concedi possit. Atque hæc quidem methodus ut sæpissime hoc modo affectis apprimè proficua sit, ita eadem iis, quibus abortus periculum imminet, non minùs confert, atqui cathartica & succi hic omittantur.

Est & alia minùs frequens, affectuum hysteriæ causa, nempe post partum laboriosiores *meri precipitentia*, magnam tu ulmo. i. malorum iliada secum trahens, quæ tam non citò ac facile hoc modo sanatur. ℞. corr. quercus 3 ij. coq. in aq. font. ℥ss. ad ℥ss. sub finem aduenso corr. granator. contul. 3 j. rosarum rubr. flor. granator. ana m. ij. deinde adde vin. rubri ℥ss. coarura sit pro fotu, qui cum panis lancis parti affectæ admoveatur manè horis duabus antequàm è lecto assurgat, & nocte post decubitu donec symptomata penitus evanuerint. *Thomas Sydenham Dissertat. Epistol. ad Gulielmum Cole.*

### Consultationes.

Nobilis Vestalis, annorum viginti trium, habitus mediocriter carnosus, hepatis calidiusculi, nigri capillitii, otio indulgens, in pravam victus rationem peritæpe incumbens, instantibus mensibus diminutè tamen ac inordinate fluentibus, quinque abhinc annis incidit in quorundam motus totius corporis depravatos qui interjecta quiete alternatim cessabant ac redibant, solaque saphæna phlebotomia prorsus remittebant. Dum hac corporis concussione vexabatur, nedum principum cerebri facultatum actiones, verum etiam tam internorum quàm externorum sensuum omnino cessabant operationes. Dicti morboßi insultus periodi ferè quolibet mense recurrerant; nunc verò breviori tempore exacerbantur, & quandoque, cessante partium irregulari motu, dolorem costalem, vel colicam passionem sentiuntur. In paroxysmo ligaturas, frictions, cucurbitulas, iustit, deludit, sola saphæna sectione miscens consumax affectio. Ad horas quinque sæpe extenditur paroxysmus, mo. d. in ventriculi angores, inanesque vomendi cupiditates terminatur; mo. d. loquaci paraphrenitide, mo. d. placido somno finitur. Transacto paroxysmo, bene appetit, licet in prava edulia propensior Patientis appetitus; & ideo mirum non est, si obstructions in jecore manifestæ, non adeò verò in liene, ipso tactu percipiantur. Vires ex violento partium motu resoluunt, facile reparantur; alvus modicè laxatur; ad consueta redit munia; placidus ac naturalis somnus irrepit. Pro debellanda igitur adeò rebelli affectione, multoties tentata curatio, verum recurrentibus dictis morboßis affectionibus, nec non viribus ægotantis collapsis, tum ob largam sanguinis evacuationem in paroxysmis institutam, tum ob incongruam victus rationem, nunquam perfici potuit. Proximis tamen duobus annis elapsis, ineunte vere, corporis universalis expiatio instituta fuit lenientibus, præparantibus, alterantibus ac purgantibus medicamentis. Post quæ per



per aliquot dies, Symplicium Fernelianum; deinde succos cichorii, ac borrag. depuratos, ac denique Chalybem portabilem Bononiæ paratum Medici præscripserunt. Multoties missi, i. nguis à pede, & bis in anno à brachio, adhibita cucurbitula, frictiones, lotiones pedum ex arte præcipiunt. Interim specifica remedia in usum revocata, ut aq. destill. poron in x. capr. &c. Cordiales Saxonia cum oleo succini, aqua antiepileptica ac theriacales, &c. vina medicata, specificis parata, sales cranii humani, &c. & hæc & similia adhibita, tum in accessione, tum extra accessiōnem, &c. Præcepta dietetica Patiens, genio indulgens, omnino prævit; quumobrem per annum vinum abstinentiam, usum lactis, aliquod Magistrale decoctum, vel aliud generosum remedium n. Medici præscribere minime ausi sunt.

Hystericam esse affectionem, quæ quinque abhinc annis, ferè singulo mense, instantibus mensuris, valde imminuere proleuntibus, Nob. Vest. tem. inf. ita, non est quod dubitemus: potius suspicandum venit de altero affectu in capite, ab utero & hypochondriis causam agnoscere, nimirum de epileptico insulsi, non solum quia principes omnes operationes aboleantur, verum quoniam motus irregulares totius corporis & convulsivos contingere, in relatione audio; & suspicionem augeat capitis temperamentum calidum & humidum cum nigro capillitio; præterea prava & libera vivendi ratio forsitan magis in potu; atque tandem accessionum solutio, cum ventriculi angore, ad vomitum propensione, loquaci Paraphrenitide, hypochondriorum & capitis lationem nobis significant. Et quamvis circa os spuma non observetur, hæc tamen epilepsia perpetua comes non est, nec necessario supervenit, ut considerant Medicinæ Principes: sed superveniens, affectus ideam confirmat. Diuturnitas quoque hujus contumacis affectus suspicionem addit, quæ in uterinis tantum, non adeo facile perseverare solet. Castissimum autem est potissimum causam affectus utriusque in Utero reperiri & ab Utero pendere, dum anno suæ ætatis decimo septimo menstrua imminui ceperunt, & eodem tempore invadere cepit affectio: cujus imminutionis, & ferè suppressionis causa non in vasorum angustia quia in teneriori ætate copiosa & statim temporibus erumpentia Menstrua, sed in vitium sanguinis à prava vivendi ratione contractum est referenda: namque iusto crassior à calore, & vitiosior à cruditatibus redditus est, qui uteri vasa pervadere nequit, & in istis stagnans, obstruendo, reliquo sanguini impuro transitum impedit: & progressu corruptus (forsitan non sine aliqua utilis excrementi corruptione) iterum inquinavit, a quo venenati vapores, viscera omnia & cerebri ventriculos inficere, eoque ad quassationem & correctionem cogentes, sicque spiritibus animalibus motum regularem impediunt, & expultricem facultatem irritatione convulsivos quoque motus in accessionebus excitare valent; sicut sanguis in vasis retentus, præ multitudine resiliens in cor & septum, ut dicebat Hippocrat. aphonia, fatuitates atque deliria movet. Quæ symptomata omnia non parum fovere possunt obstructions in visceribus existentes: sicut mineram in utero adaugere otiosa & libera vivendi ratio cicochy-

miam in massa sanguinea conservans.

Modò si cura tali tantum momenti & confirmati aggredienda est, non solum, ut monetur. Hippocrat. à Dils exordiendum, verum & à Nobil. Vestali Pat. perendum, vis sana fieri & annuenti præcipiendum, ut serveat mandata medica, sine quibus nihil cetera profuerint: Etenim non salva de fine tu, dicebat ipse Christus; ridiculum enim est, docere Taranta, cum Medicinis incipere operari, non præmissa & supposita congrua vivendi ratione. Et quamvis incurabiles non sint affectus isti, licet confirmati, non tamen adeo facile, nec brevi superari poterunt: ut idem constans perseverantia in medicamentis necessaria futura sit. Primo enim pro purgatione præservativa, primæ viæ erunt à cruditatibus expediendæ. Secundò obstructions viscerum referendæ. Tertiò tota massa sanguinea ab impuritatis vindicanda. Quartò uteri obstructions aperiendæ. Quintò intemperies corrigendæ; atque tandem appropriatis alexipharmacis Antihysteriis & Antiepileptis utendum. Pars verò curativa locum habebit in accessione ipsa, Antihysterica per os præbendo: naribus sterida, & utro odorata apponendo: Omnia revulsionum genera, & soporant faciliorem excitantia administrando. Sed post accessionem, statim ad ordinem præservativum exequendum reverendum erit: eoque tutius cum in relatione habeatur, quod absoluta & transacta accessione, Nobiliss. Virgo integris viribus ad consueta munia obunda redeat. Primæ igitur intentioni satisfacere poterit Leniens, ita parandum. ℞. pot. ex manna clarificata, cum cremore tartari & infusione senæ parata ℥vj. aq. flor. citri, aut totius citri parum. misce pro potu. Præparata deinde sequentibus quinque diebus sit ℞. Julap. acer. ℥ij. aq. cinam. ℥j. m. pro una vice & sic pro aliis. Deinde reperatur iuprascriptum leniens, aut ex lenitivo, cassia & tartaro paratum. Pro secunda intentione explenda rhubarb. usus efficacissimus erit, non tamen in infusione, sed in forma solida, ad proximiores obstructions referendas, ut ℞. rhubarb. maturi ℥ss. floris cassiæ ℥ij. m. f. boli, quibus post horam superbibat jus cichorii & lupulis alteratum. Sequenti verò die præscribatur præparans ex succis, ita ℞. in ci depurat. & per arenam injecti, cichor. borrag. agrimon. ana ℥j. decoct. in juve puli parata, endiviz, malva, lupulorum, melissæ ℥iv. pro una dosi & sic pro aliis; ita alternatim perseverando in usu rhubarb. & succorum ad decimum quintum utque diem: in quorum intermedio & fine, præbeatur mi. orativum hujusmodi ℞. flor. cassiæ rec. extract. ℥vj. pilul. de tribus cum rhubarbo ℥j. misce f. boli, quibus post horam superbibat leri capr. aut alin. depur. libram, & tribus horis ab assumpto scto prandeat. Interim captanda occasio aperiendi jecorariam dexteram, diebus intermediis & æque distantibus à tempore utriusque menstruæ purgationis. Inde ad tertiam indicationem exequendam deveniendum erit, cui facile satisfacere poterit syr. Fernelianus ita præscriptus: ℞. Radic. cichor. petroselini, cappasum, polyod. querc. ana ℥j. semin. carthami ℥ss. sol. hyssopi, prassii albi, origan. agrimon. ceteract. cu. cuta, adiant. una manip. f. sem. anis. for. ficul. eniv. melon. ana ℥ij. aq. agrimon. ℥ss. m. bull. ad co. for. m.



teniz, colatur postea infunde per horas xii. fol. sei. x. m. d. 3. iv. agarici albi 3. ij. rad. helleb. nigr. 3. ij. epithymi 3. 6. gingibetis 3. ij. cinam. integri 3. 6. Postea bull. parvum & expressioni adde sacchar. alb. lb. j. vel quantum satis. bull. ad syrup. consistentiam, deinde adde rhubarb. in peria alligati 3. 6. & servetur ad usum: cuius dosis erit ad 3. ij. cum totidem uncis vini albi tenuis, non dulcis. Sequenti vero die præbeantur succi jam præscripti in decoctione, ut in ora, addendo talis tart. fixi gr. xii. & ita alternatim perseverandum est in a. & ly. upi Ferneliani & suc. corum usque ad vigesimum quartum diem, quorum utrum claudat medicamentum huiusmodi 2. elect. plenit. 3. v. diaphoric. 3. ij. de succo rosarum 3. j. pilul. de hiera cum agar. 3. 6. misc. reform. boli, quibus post horam superbibat seri capr. aut alin. deput. sive aq. nocerianæ lb. ij. & tribus horis a portione prandeat. Quartam intentionem explebunt aperientia hysterica ita paranda 2. Decoct. in iure tenui pumi junioris paratæ, cichor. borag. dictamn. eret. attemilix, pulegii, calamenthi 3. vj. ol. tabin. gutt. v. spirit. tart. alchaliz. gutt. x. m. pro syrupo & sic pro aliis. Repetatur deinde tertia die decoctio, ita alternatim perseverando ad decimam quintam usque diem, in quorum intermedio & sine præbeatur hiera picta ita paranda. 2. hier. pict. Galeni 3. j. floris castoreen. extract. 3. vj. m. f. boli, quibus superbibat aq. capill. ven. & poron. lb. j. tribus vero horis ab epota aqua prandeat. Interim superveniente accessione, aperiat suppurat, & sanguis satis parce educatur. Toto vero hoc tempore hystericozum Aperientium extrinsecus regioni uteri magna spongia, decoctione huiusmodi madefacta & mox expressa, fomenta exerceantur 2. fol. pulegii, calamenthi montan. dictamn. eret. sabinæ, flor. Keiri ana m. j. rad. lil. alb. 3. ij. rad. altheæ, lauri ana 3. j. aq. commun. lb. x. misc. bull. ad consump. quartæ partis, & f. colatur. in qua dissolve trochisc. de gallia mosch. 3. 6. & servetur pro fomento: quo amoto, illinantur partes illæ uterinæ oleo lil. alb. & Keirino, mistis.

Pro quinta intentione, quoniam aquis Porreanis nec per os minusque per infusiones cum tubulo uti licet, idcirco aquæ Nocerianæ substitui poterunt, primis diebus cum vehiculo dejectionis, reliquis vero cum diuretico, quod erit spiritus tart. ter rectificat. Infusiones fieri quoque poterunt in aqua dulci, foliis malvarum, violarum & cheiridis, atque liliorum floribus alternata, eodem tempore circa vespertas, dum aqua epota integrè educta fuerit, sin minus, differenda infusiones usque ad absolutum Nocerianæ usum. Postremæ intentioni satisfacientem erit usû alicujus antihysterici & antiepileptici medicamenti, tum interni, tum externi, & inter interna extra accessionem præscribenda, sit spiritus viatrioli, cum rad. peron. & visco quercino extractus, in aqua peroniz, ad gutt. v. frequenter exhibendus. Frequenter etiam in usum ducatur commendabilis aqua stillat. ex hirundinibus nuper natis ad 3. ij. nonnunquam etiam theriacæ, aliquando cochlear. aquæ theriacalis. Conserva peroniz, vel lil. convall. sub ingressum lecti. At si conjici ac præcognosci possit ventura accessio, duos vel tres ante dies, efficacissimum observavi præservativum esse validum purgans, ut propterea teram atque iterum à Medicina principibus com-

mendatur hiera diacolocynth. & helleboratum à Celso, quod sic parari posset 2. pilul. terad. de hiera cum agarico ana 3. 6. extract. hellebor. nigr. 3. j. m. & præbetur circa noctis dimidium, cum superdormiat, & lumine inanè superbibat aquæ nocerianæ libras. Extrinsecus nationis foetida, & odorata uretro, de more admovenda. Ungula alcis in annulo gestanda. Radix peroniz nigra inclinata luna collecta, collo appendenda Collum vipera suffocant collo appennum à pizlocatione Uterina præservare docuit Galenus.

Sed omnium maxime ab utroque insulso præservare valebit congrua vivendi ratio; & præsertim a vino abstinencia saltem per annum, utique affectui quam maxime contentæ potest. Abstineat præterea à quibusdam cibus à proprietate nocentibus, ut à carne hordina, à co. unicitus, à pericibus, atque aliis, ab allio, capis, apio, feniculo, lungis & teræ tubercibus; insuper à carne suilla; ab usu casei; à frequentibus edulis ex pasta paratis & à nimio aromatatum usu. Pro potu vero patet vinum ex cerasis nigris, aqua nocerianæ immiscendum; & pro toto anno aqua stillat. ex iisdem cerasis in vasis vitreis adservanda. Patet etiam vinum ex pomis dulcibus, toto anno in vasis vitreis, collo oblongo abstractis superimposito oleo adservandum, cuius portio aquæ nocerianæ immiscetur propotui suavi. Huc pertinet quoque exercitium quantum fieri potest, etiam laboriosum, evitanda etiam intentas applicationes atque meditationes. Et hæc extra accessionem.

In actuali vero accessione, meliusque in instanti, Antihysterica & antiepileptica sunt per os præbenda, inter quæ selectiora & à me experta sunt aqua antihysterica Quercetoni ex m. aliquot guttulis Opiz Angeli Salæ, quæ tunc & fideliter parata reperitur venetiis ad signum Sanctæ Margaritæ. Egregium quoque & præsentatum remedium, est tinctura granorum sambuci ad t. microchl. in aq. mariar. Eodem tempore stramentata excitare valde prodest. Natis quoque foetida admoveat simili tinctumigio 2. Castorei. ana 3. 6. x. ana 3. j. pigis 3. 6. luccin. 3. 6. terebinth. q. t. m. t. p. stilli pro suffumigio. Utero vero odorata apponantur; & pasta servetur pro suppositis, cum aequali portione caricorum & l. naris parata: Spatio namque unius horæ cutem sufficit; apponatur autem in tribus utrinque auriculis in d. li. præ. ideri possit invasio, hoc solo remedio quat us horis ante accessionem administrato, vidi ego non semel accessiones ipsas retrocessisse. Quibus omnibus non sufficientibus, vena, ut antea, erit aperienda: sed ab accessione die sequenti, eandem erit incumbendum, & ad curam præservativam revertendum, congrua in ceteris omnibus addita vivendi ratione, a viro Doctissimo Adstanti præscribenda, cui cetera quoque omnia tunc & rectè administranda committo. Raym. d. Joan. Foris Consultationum Tom. 2. centuria quarta.

Nobilissima Germana Juvenis annum agens vigesimum sextum, temperamentum totius calidi & humidum, jecoris fervidioris & humidioris, atque excrementosi capitis; duobus abhinc annis, dum filium propriis mammis nutrebat, corripit cepit affe. Quodam in facie, qui Rosa, sive Rosalia appellari solet: facies enim hinc inde cum rubore inrumescebat; qui tremores per hebdomadam,



dam, & ultra permanebant, & frequenter ab una ad aliam partem transfusi faciebant. Ab octavo filio, remissa affectus: sed concepit, & post paucos dies abortivit, quâ occasione tanta sanguinis copia ab utero effusa fuit, ut de vita ob virium defectum dubitatum fuerit. Rursus autem viribus, rediit quidem affectus in facie, at non adeo evidens & molestus, ut antea, excrementorum tamen semper fuit caput, dum per nates copia pituitosæ & saniosæ materie expurgabatur & modò expurgatur. Interim acidulas Egenses per os assumptæ, & Badeses pro stillicidio & lotionibus; quibus tamen parùm proficientibus, affectus idem perseveravit continuò usque ad undecim menses, quamvis multò quàm antea remissior. Dum iterum rursus concepit, mense Martio proximo præterito abortivit, & tanta sanguinis copia ab utero prodit, ut multo tempore exanguis & viribus destituta iaceret; Puerperii autem occasione ob visitationes, moschi, ambre, & alios suaves odores evitare non potuit, à quibus tantopere læsa fuit, ut postmodum in hunc usque diem hystericis affectionibus frequenter affligitur, præterim alicujus suavis odorato calone, correpta fuerit, si non usque ad animi deliquium, saltem usque ad exolutionem, nimirum sine principum animalium operationum abolitione. Varias hucusque subivit purgationes, sanguinis missiones, qui serotius valde fuit observatus, Cauterio brachio inuito, præterea aquis refrigerantibus, nempe stillat. cichorii, usu rhubarbari; vino medicato purgante; aqua chinensi, atque externis pulveribus & aquis, fortissimè repellentibus & exiccantibus, à quibus cum exiguum, aut nullum levamen reportaverit, quinimodò caput adeò sibi debilitatum asserat Nobiliss. pater, ut in præsens quidquam legere, minime scribere valeat, ideo etiam hoc anni tempore hyemali incongruo de agendis pro salute eximios viros Paravinos consulit.

Duplici affectu divexari mulierem Nobiliss. ex relatione adducta liquidò constat rosa nimirum, sive gutta rosacea, duobus ab hinc annis faciem invadente, & hystericâ passione, in abortivo puerperio à suavioribus odoribus excitata, mox etiam extra puerperii tempus Nobiliss. mulierem divexante & usque ad animi exolutionem ducente. Prioris affectus causa reponenda videtur in sanguinis vitio & in capitis imbecillitate, cum à natura fervidius jecur & calidam atque humidam capitis intemperiem sortita fuerit; quamobrem sanguis, præsertim accedente ætatis vigore, calidior fuerit genitus, biliosior atque tenuior, qui circulando per venam cavam ad cor, & inde per arterias carotidas ad caput, portione deteriori, utpote naturæ magis molestam, per ramulos potius externos, quàm internos, faciem nutritæ, assatim & copiosius deposuerit, sicque faciem totam, quandoque tantum ejusdem partem rubram reddiderit, non sine exuberantione, eam solum erysipelas legitimum, utpote à bile tenui & excrementis genitum superficiem tantum afficiat, sicut non exquisitum quodammodo cutem in tumorem elevet, citò evanescentem; non autem semper adeò citò in gutta nostra rosacea, quoniam tenuiori sanguini à toto transmissio pituitosum copulatur excrementum, à præhumido capite genitum, adeò ut affectus ipse à jecore calidiori originem ducat: permanentiam autem & diuturnitatem ab ipso capite essentialiter affe-

cto acquirat. Neque probare opus est sanguinis acrem atque tenuem qualitatem, ob fervidius jecoris intemperiem: sicut nec ejusdem crassioris consistentiam, ob capitis intemperiem humidam, cum priorem conditionem satis superque nobis significaverit larga & exuberans per uterum sanguinis effusio adortuum occasione, quam & autopsia extracti sanguinis confirmavit, sicut posteriorem ostendit quotidiana per nates excrementorum evacuatio. Quare conclusum restat, quod vitium sanguinis ob jecoris calidioris intemperiem, & imbecillitatem capitis ob calidam & humidam, sine causâ potissimè rosaceâ affectionis.

Hystericos verò affectus quoniam non ante puerperia palli fuit Nobiliss. Juvenis, ideo existimo uterum ipsum non solum propter securos abortus, sed multò magis propter copiosam sanguinis effusionem, labem, sive imbecillitatem contraxisse, nonque aliâ intemperie, & non sine aliqua suspitione, quod portio crassior sanguinis assatim & confertim ad uterum irruerit, in aliquò ejusdem tenuiori vase hæserit, quæ corrupta imbecillitatem foveat, & uterum ex qualibet levi externâ causâ moyente infestare non desinat, à u essentialiter afficiatur.

Hæc autem mala sicut tolli posse non est dubitandum, ita repetitas curationes congruis temporibus exposituræ censendum; namque primis viis expeditis, secundo tota massa sanguinea à serositatibus erit depuranda. Tercio eadem à capite revellenda ac divertenda. Quarto caput purgandum. Quinto Jecoris calida intemperies corrigenda. Sex à capite quoquo pacto firmandum; atque tandem uterus roborandus. Quibus intentionibus vere venturo erit satisfaciendum repetita sanguinis missione, primò ex superioribus, mox ex inferioribus venis, necnon frequentibus potum lotionibus. Præterea succis depur. cichor. endiv. lonchi, acetosæ in decoct. cichorac. addita semper hepatica; & per intervalla medicamentis serositates elective evacuantibus. Pilulis capitalibus deinde ter repetitis caput purgandum. Inde acidularum aquarum usus repetendus: & postea capiti stillicidium refrigerans & exiccans, ut esset ex aquis nostris Lactansibus administrandum; & pro utero roborando infusiones cum tubulo in aquis sulphureis exercenda. Duo alia remedia mihi in animo sunt, in præsens tamen in dubium revocata, alterum utramque partem principaliter affectam respiciens, Decoctum scilicet sulfuriferum, refrigerans tamen, sed valde exiccans, pro corrigenda capitis valde humida intemperie, & pro evacuandis à toto, & divertendis à capite serosis humiditatibus: Alterum pro remittendo jecoris fervore, & pro sanguine edulcorando; quæ commodè præstare poterit lactis caprini usus, capite tamen prius magnâ ex parte exiccato; de quibus tunc in arena consilium capiendum. Interim hoc quoque hyemali tempore aliqua agenda in subsidium Nobiliss. Patientis, quæ paucis, sapientibus viris proponam. Et primò, præmissis aliquo leniente, & quinque aut sex diebus exhibito præparante sive diluto, leniens adhuc repetendo, inde cauterium coræ inutendum, necessarium existimo: sicut singula hebdomada Magisterium mechoacum, ad gr. xv. aut xx. electuat, lenit. ad 3ß. immixtum, summo opere commendo, & pro demulcenda sanguinis acrimonia usum



lactis arte facti ad quadraginta aut, quinquaginta dies propono, quod ita pateretur.

℞. Sem. melon. mundat. sem. anguriz, & cucurbit. mundat. ana ℥ss. aquæ stillat. de succo cicchor. aut endiviz ℥ vii. contund. semina. & cum præscripta aqua extrahatur emulsio, cui addatur syrup. de pomis ℥ j. & misc. pro quotidiano po. u. matutino. Intercitato hoc tempore frequentes pedum lotiones aqua calente ante cibum erant exercendæ, quæ utrique affectioni prodesse poterunt. Et quamvis de parte affecti, nimirum de facie parùm sollicitus sim, attamen sicut præterite affectu nullum medicamentum admovendum esse puto, ita abente, præservativum aliquod utile fore credo, quod esse poterit oleum saturni, & melius, balsamum, quod ex eodem oleo saturni & myrtino simul mistis parabitur, quo facies noctu saltem, illiniri poterit. Utero quoque prospiciendum censeo, sed potius topicis adnotis, quam per os assumptis, ne magis jecori noceamus, quam utero proficiamus. Et idè per exiguum siphonem clyster frequenter injici poterit, ex decoctione pulegii, matricar. origani, calamench. latureiz, lauri, additis granis aut moschi, aut trochiliscorum de gallia moschata, quæ decoctio etiam parari poterit vino albo generoso, vel addatur ejusdem vini portio jam decoctioni paratæ. Venim tamen est quod in actuali hystericæ passione & animi exolutione porrigi poterit aliquod cochlear aquæ antihystericæ Quercetani, quæ adhuc validè or evadet, si guttulæ opiatæ Angeli Salæ additæ fuerint, & hæc si præsto non sint, præbeatur aliquod cochlear aquæ totius citri, aut cinam. additis guttulis olei succini: & eodem tempore pelli, seu pessaria introduci poterunt, eadem decoctione imbuta. Quod si contumax, vel frequens fuerit hystericæ accessio, licebit quoque saphanam aperire, sed parè nimirum ratione revulsionis sanguinem mittere.

Quibus congrua vivendi ratio erit addenda; præsertim caput ab æris inclementiis, tum calidis, tum frigidis custodiendo; suaves odores evitanda; & per integrum annum à potu vini abstinendo, cui substituantur cerevisia tenuis, non geniosa, hordeo paranda, addito quoque globulo sanctorum alborum. A vaporolis pariter, tum calidis tum frigidis cavendo; & in reliquis omnibus excellentiss. Medicis assistentibus prorsus obtemperando, quorum prudentissimo iudicio etiam præscriptorum omnium rectum usum libenter committo. *Idem.*

#### ¶ Cadaverum Anatomica Inspectio.

Puella quædam ante plures annos corrupta à veneris usu tottè diu abstinerat: varia affectionis hystericæ symptoma à sensim successerunt. Tandem immanes in hypogastrio dolores, tumores duri vagi, nubes referentes, imprimis dextrorsum, nullis pacandi medelis pullularunt: Die 3. Octobris accessit, inveni decumbentem, tabidam tumidum ostendebat crus dextrum, vestigia compunctis digiti circa malleolum retinens, sinistro quod priùs intumuerat, extreme emaciato: Inflatum etiam erat abdomen, oblitteratis prioribus extubetantiis, sceleton dixisses: die 7. Octobris, anno 1660. circa horam 4. matutinam, an-

nos 49. nata obiit.

Aperto cadavere, hepatis convexum, intestina crassa, livida & gangrenosa apparuerunt, indurato stercore plena: vasa spermatica præparantia semine albugineo, viscido, sub cæruleo plena erant: Testes, uteri tubæ, vasa deferentia, vesicæ seminales, omnes inquam illæ partes semine inflatæ mirum in modum targebant, itaut in quibusdam incoctum, in aliis omnino excoctum, crassum, album & naturale, in aliis ita inauratum esset ut steatoma referret: plus sanè semilibra binis chirurgis & mihi apparuit, pravi nullius odoris: Uterus parvus erat admodum, compactus, pyri instar supernè & infernè complanatus, cujus ostificium corruptelâ lividum erat, fortè ob intestinorum inferiorum viciniam gangrena labefactorum: pulmo, sinistè imprimis, etiam vicarius costis adharebat,

Catharina soror, honesta virgo, fortè quadragenaria, ab anno 1660. floribus albis laborans, magno cum hypogastrii & lumborum cruciatu, tandem exulcerato utero, & suppressi seminis violentiâ, biennio post quasi tabida expiravit, inde facile conjecturis assequi licuit, plurimas mulieres, maxime corruptas, & viduas juniores, veneris usu interditiis, à cumulatâ, vel peculiari-ter infecto semine languere, tandem interire: Nec enim in illis nonnisi coaccervati & labefacti poterit, infinitorum malorum prava & venenosa qualitate contracta author, nisi excernatur, hinc illæ querelæ, *Joann. Nic. Bindingæ observ. 90. centur. 2.*

Vir illustis, in vicinia degens, uxorem ex illustri familia ortam ducit, tormosam, pudicam, proceram, ingenio & corpore præstantem; hujus fastidium obrepit, ac peiusque ignobilis, pumila, deformis, suspectæ castitatis amoribus interitur: injuriam moesta & tacita uxor concoquit, omni officiorum & cuius generis conjugis benevolentiam revocare annuit: Interca à non ex-culto, aturæ tundo crebris affectibus hystericis, ac multiplicibus vexatur, quibus melancholicum succedit delirium, erroris mariti team se professâ, innocens; ab eo criminis veniam deprecatur, domesticos promiscuè, quoque admittitios sustinuisse falso enuntians: hinc diutino more confecta & inedia, à longo decubitu, inter-veniente morte mentis errore & corporis langore exolvitur.

Aperto cadavere, sola generationis organa in vitio deprehensa sunt, nam testes, vasaque omnia tum præparantia, tum afferentia, tum deferentia, semine turgere sunt deprehensa, sed inaurato ac in gypseam duritiem congesto, *Joan. R. olim Anthogr. lib. 5. cap. 1.*

Cum feminæ illustris paulò ante obitum affectibus (quos dicunt) hystericis gravissime laborantis cadaver apertum, uterum, quidem prorsus intonem reperi, verum juxta melleosiphosque nerveos, (ut videbatur) in molem attolli & elevati solitos, visceris illius membra ab invicem divallas & solutas, ut circumquaque tumidæ & laxæ, quasi in bullulas sive vesiculas inflatæ apparerent. *W. illis Patholog. Cerebr. cap. 6.*

Domina per illustris, forma elegantissima, optimaque animi & morem indolis præditâ, nupèc in hac vicinâ segebat, quæ per multo. annos affectibus spasmodicis obnoxia, liquidem valetudinariam hanc diarrheam originaliter, sive hæreditatio



ratio contraxerat, atque hos morbidi seminis fructus, ferè quovis ætatis lux lustro expecta fuit. Potissimum verò quociens utero conceperat, (crebros enim conceptus & abortus passus) parthematibus convulsivis, quasi hystericeis, supra modum teurari solebat: quippe itarum à mentibus cohibitis, particulari heterogeneæ ad cerebrum & nervorum genus translata: atrocissimi affectus paroxysmos mulere.

Postquam novissimè conceperat, primis mensibus, juxta pristinum morem, affectus convulsivis lubinde molestabatur, circa nonam gravitationis hebdomadam, à frigore suscepto, in febrem particulosam incidit, in qua dolores valde acuti, per plures dies in lumbis, & juxta hypogastrium gravissimè urgentes abortum minari videbantur: atamen dolores isti, prout ab eventu constitit, potius colici censendi, ab humore acris per nervorum ductus à cerebro in istas partes decumbente procedebant; nam circa febris declinationem, materia ista alibi translata, diarrhœa, pedum dolores, dispositio velut ulcerosa successerunt. Quamprimum hæc Domina à febre & doloribus convalescit, affectus convulsivi redibant, nam quolibet mane è somno evigilans, circa oris & faciei partes, necnon in brachiis & cruribus spasmos & contracturas immanes pati solebat; quæ symptomata proculdubio à terosa colluvie, in capite circa nervorum origines aggregata, ab istaque una cum succo irritivo, in somnis aliis imbibita oriebantur; & cum postea eadem materies nervorum interiorum ductu, iterum in mesenterii plexus, ac lumbos ferebatur, istarum partium dolores atrocissimi, ac insuper paroxysmi quasi hysterici eam graviter infestabant. Enimverò isti faciei & membrorum motus convulsivi brevi tempore cessabant: usque tamen imbecilla, ac enervis, cum vultu pallido, gressu infirmo ac tremulo, atque alimenti tantum incongrui, & liquorum calidiorum apperens, persistabat; sub finem tertiæ mensis quo tempore constanter aborire solebat, menstrua eruperunt, quibus per duos aut tres dies, una cum membranarum laceratarum frustulis descendens, abortum expectabat: atamen fluxu isto cessante, dolores, velut partientis, in abdomine & lumbis, uti prius exorti sunt, eamque hebdomadæ spatio die & nocte miserrimè torquebant: tandem balneo herbarum emollientium uti, & exinde lecto ad sudandum commissa, uteri sarcinam deposuit: conceptus ita cum ingenio cruciatus decedens, galli indici ovum & magnitudine & figurâ æquabat; hujus tunica exterior fuit lacerata & disrupta, interior integra manens, aqua limpida circiter 16 fl. & nihil præterea continebat; nulla quidem fortis aut formati, aut usquam futuri rudimenta apparebant: postea per quatuor aut quinque dies lochia cum aliquibus membranarum frustis effluebant; interim dolores cum solita atrocitate urgebant; cumque elapso hebdomadæ spatio, haud spontè desierint, demum iis sedandis remedia expectebantur. Propter hunc finem, imprimis linimenta, foras, balnea, & clysteres crebro adhibebant; etiam medicamina uteri sordes expurgantia, in quas totius mali causa rejicitur, intus sumuntur: priorum usum torminum breves intermissiones sequuntur sunt; subinde verò affectus cum insigni molestia redibat; quinimò intra tres hebdomadas, morbus plurimum ingravescent, multa

alia horrenda symptomata ascevit: nam præter dolores in abdomine & lumbis, qui in dies atrociores fiebant, insuper in dorso, cervicæ, scapulis, necnon in brachiis & cruribus magno cruciatu mox afficiebatur, idque acerbius quoties lecto incalefcebat: ceterum crebra vertigine, vomitu & nausea, atque sæpius in die paroxysmis convulsivis gravissimis affligebatur; scilicet primò moles in hypogastrio ascendere visa, illic totum ventrem cum impetu atrollebat, mox respiratione cohibita cum vultu cadaveroso successit: postquam ita velut demortua, per tria aut quatuor horæ minuta jacuerat, subito exilite solebat, ut ab altantibus vix comprimi, aut contineri posset; dein contractiones immanes & distorsiones in cunctis oris & faciei partibus, necnon in omnibus corporis membris sequuntur sunt symptomata hæc reverà hysterica judicabantur, quoniam Domina illustris ita nuper abortiverat. Atamen hæc singula perpendens, in ea demum sententia fui, utriusque paroxysmi, scilicet tum *αλγυναιδης*, tum *εμμεναιδης* causam omnino à mala cerebri & nervoli generis affectione, etiam absque uteri culpa pendere; nempe quod humor acris intra *σπινθαιον* congestus, exinde per nervorum ductus in partes longè distitas descendere; qui membranæ & fibræ insidens, cumque humore à massa sanguinea influo fermentescens, eas plurimum irriteret, adeoque dolores atroces ciceret: postea dein cum particulari heterogeneæ & explosivæ cum humore isto intra *σπινθαιον* admixta atque ductus nerveos subeuntes, spiritibus accrescerent, propterea diarrhœa spasmodica subinde in graves paroxysmos erumpens inducebatur, prout mox solius parebit.

Juxta hujusmodi Aetiologiam intentiones curativas instituens, Domina ægotanti, quo tempore gravissimè laborabat, sanguinem è vena saphena misi, intra biuum lene catharticum exhibui, idque semel, aut bis in hebdomada iterandum præcepi: insuper aliis diebus, vespere & mane sp. C. cervæ, aliisque horis bis aut ter in die pulver. è margaritis & oculis canthorum cum dosi sequentis julapii propinabam. ℞. aq. limacum, lumbicor. magistralis ana ʒ iij, laxitrax. cerasor. nigror. ana ʒ iv. hysterice ʒ ij. syr. è corallis ʒ i β. misce: Balneo herbarum dulcium frequenter usa fuit cum necessitas urgeret, opiata semper bono successu assumpsit; vesicatoria inter cetera parti utriusque femoris, etiam cruri applicabantur; porro foras, linimenta, clysteres, cucurbitæ, sternutatoria, cum multis aliis administrationum modis, juxta symptomatum exigentias præscribebantur. Ab hac medendi methodo per 14. circiter dies adhibita, Domina illustrissima plurimum alleviata, paroxysmis convulsivis omnino caruit. Quinimò viscerum & membrorum tormina, aliaque symptomata valde mitigata, cum convalescentiæ speciem optimam fovebant: Posthac verò parim ob malam victus rationem, cui ægotans vel paululum refecta semper indulgebat, præcipue tamen, propter subitam terroris vel tristitiæ passionem, quam funestum accidens, intra propius ædes contingens, excitavit, recidivam passa, mox morbus in multò deteriotem statum eversus; nam & spasmi & dolores atrocius infestabant, quin & ventriculus vomitu ferè continuo laceratus, nec alimenta, nec medicamina admittebat. Lac asinum per aliquot dies cum fructu quodam



sumebat; quod tamen liquidem in ventriculo bilefcens, ei molestiam pareret, brevi omitebatur: tandem inuis omnibus remediis, juxta plurimum medicorum consilia diligentissime præscriptis, nobilissima patiens magis in dies, magisque elanguescebat, atque lentim morti appropinquabat: biduo ante obitum, ventris & lumborum tormina plurimum remittebant, ipsaque solitè alacrior facta, convalescente præquamquam concepit: interea tamen conquesta erat, de capitis dolore & gravitate insigni; cumque circa initium noctis alitè dormiret, exasperata in paroxysmum convulsivum valde horrendum incidit, qui statim in apoplexiam citò lethalem transiit; namque insensibilis & æstiva facta; intra 12. horas hac vita emigravit.

Cum circa ægritudinis, ex qua Illustrissima Domina obierat, causam, varia indicia ferebantur, plerisque nimirum mala omnia in affectiones uterinas, aliis in abscessum aut apostema, quod alicubi circa abdominis viscera latitans suspicari sunt, referentibus; placuit amicis ut cadaver, ob funus diu prolatum, aperiendum, sedulo inspiceretur; adeoque genuinæ morbi & mortis causæ investigarentur, quod pensum euit meæ delictum, lumina qua poteram diligentia executus sum.

Itaque primò circa habitum corporis observatu dignum erat, quod membra, & partes inferiores, juxta ac ultra dolorum sedes contra plurimum contabuerant, ut crura prorsus emaciata, instar sceleti apparuerint: Interim facies, cervix, & brachia satis plena & torosa manebant, unde constat liquorem nervosum operi nutritio non minus quam facultatum animalium exercitio conferre: quare cum liquor iste, in lumbis & abdomine ætansu multum impeditus, & spasmis continuus absorptus, haud debito influxu ad partes inferiores descenderet, iste propterea statim tum enerves, tum emaciatæ evaserunt. Hujusmodi atrophia in hoc differt, ab altera hæbica quæ sanguinis vitio contingit, quoniam in hac facies Hippocratica præcipuum morbi signum est, in illa vultus aspectusque parum aut nihil mali prædunt.

Domina Illustrissima cadaver, ut valde emaciatum, & viscera omnia inanita fuerint, tamen illud ætissime computuerat, nam intra 40. horas, cutis per totum discolor, in hac parte livida, in illa viridis, inque alia subnigra apparebat; & corpus tam subito putrescens odorem summè tetrum exspirabat: cujus ratio proculdubio erat, quod propter miculos spasmis perpetuis exercitos, mixtionis principia in canalum laxarentur, ut illa in dissolutionem prompta, post obitum mox ab invicem decederant, pari certè ritu uti observamus de carne letarum, quæ aut cursu diuturno fagigata, aut sustibus contusa occiduntur, hæc enim multò citius putrescit, quam illarum, quæ statu tranquillo & sedato macerantur.

Abdomine aperto, Intestina & ventriculus, satis sana scilicet integra enim & benè colorata apparebant, erant tamen inanita, & quasi inflata, utpote quæ in perpetuis ferè evacuationes, scilicet supra, aut infra habitas, sollicitata fuerint: in tota hac cavitate nulla abscessus aut apostematis vestigia cernebantur. Dum morbi causam perquirentes, viscera huc illuc devolvimus, in mesenterio aliquid notatu dignum occurrebat: nempe cir-

ca medium ejus ubi dorso affigitur, atque majores nervorum plexus continet substantia laxior & pluribus quasi veliculis inflata manus latitudinem exæquans videbatur, eo scilicet ritu, ac quando in armo vitalino interstitia musculorum à laniis insufflantur, ut pars ea plenior & velut pinguior facta exumescat: Hoc mesenterii loco, quatuor midior & tactu mollior fuit, humorem aliquem doloris causam hospitari putavimus, aperiens verò deprehendi tantum membranas fuisse ab invicem solutas, & interstitiis suis nihil præter flatum inclusisse: qualis membranarum separatio, & ab invicem divulsio, proculdubio inducta fuerat à crebris spasmis, live spirituum explosionibus, quæ intra plexus, & fibras nervæas illud densissime confitas ferè continuò ciebat, atque spasmis illi, ob particulas heterogeneas & explosivas illuc nervorum ducta à capite derivatas contingebant. Enimverò quod spectat ad ista ventris tormina, & in affectibus convulsivis velut molis ascensum & abdominis inflationem, non dubitandum est quin eam æ morbificæ sedes in mesenterii parte delinuerit: attamen quoniam uteri principaliter affecti tanta suspicio ferebatur, quantum hoc vitæ meruerat, proximè inquirebam: itaque pelvim intra ossa pubis centitam diligenter scrutatus, utrum in debito situ & quoad omnia sanum, & solum rectum reperi: corpus ejus ad justam molem, licet 5. tantum septimanarum post abortum præterierant, contraheretur, scilicet pyramidum minus & magnitudine & figura refereret; glandulæ ex utroque fundi latere, quæ testes dicuntur ut per exigua & flaccida, sine quovis humore superfluo, aut virulento, in iis continuo, apparebant: uteri corpus ubilibet distensum, crassitudine supra pollicem larem æquabat; ejusque interior cavitas haud major fuerat quàm ut fabam contineret: intra hunc speciem, sicuti in aliorum viscerum cavernis asolet, mucosum quiddam in perexigua quantitate includebatur; reverà circa uterum, aut appendicem ejus nihil extabat, cui tanquam causæ morbificæ symptomatica modo descripta imputari poterat: quapropter hinc quod prius opinatus sum, dante conclusionem liceat passionem dictam uterinas sæpiissime ab alia causâ quàm uteri vitio excitari. Intestiniis amoris enim tenes satis sanos reperimus; alter tamen eorum multatæ erat figura, scilicet in plures lobos instar tenuis vitulini imdebatur. Lien, pancreas, & omentum sine culpa: ventriculus valde inflatus erat, ejusque tunica interior, absque plicis aut rugis planè erat, quod certè acciderat, propter crebros vomitus viscere hoc spasmis ferè continuus affecto: porro ob hanc rationem, scilicet: Stomachi tono præfracto, alimenta nec benè appetere, nec concoquere solebat. Hepar à sana constitutione plurimum defeciverat, fuit namque tumidum & sub durum, pallidi coloris, atque instar ligni putridi, exangue prorsus & exiecum, hoc proculdubio effecerat liquorum cardiacorum & impensè calidum crebrior usus. Pulmones erant lividi coloris, & per totum obstructi, utpote ichore spumato, & fetido infarcti: certè hoc vitæ & hepatis à longo tempore viriata extiterant, propterea ut sanguis diutius à recti crassi degeneret valde depravatus, ægritudinis prima semina, ejusque deinceps fomitem constantem suggesserit.

At verò præcipuam, & quasi originalem mor-



bi causam in capite, idque non frustra quæsi-  
mus: Itaque calvaria exempta, vasa meningas &  
cerebrum perreptantia sanguine plena & distenta  
apparebant, cum in reliquo corpore inter dissec-  
candum vix quicquam sanguinis efflueret: me-  
ninge crassiorē amara, per alteram tenuem, &  
pellucidam, aqua limpida cerebri plicas & an-  
fractus implens, ejusque totam compagem quali  
inundans, cernebatur; reversā omnes cerebri cavi-  
tates & recessus colluvies serosa impleverat: *plex-  
us choroides* aqua diu immotus, & velut elixus,  
dilutor & semī corruptus evaserat: Juxta ner-  
vorum splanchnicorum origines, aqua se pluri-  
mū insinuans, piam matrem, a medulla oblon-  
gata caudice, per duos digitos latus separaverat,  
proculdubio horum nervorum ductu, materies  
morbifica à capite in metenterii plexus descen-  
dens, & dolorum & spasmorum causa existerat:  
porro eadem materies etiam aliorum nervorum  
capita afficiens, eorumque ductus pervacens, pos-  
tea in aliis partibus, scilicet quibusvis ferè to-  
tius corporis, atrocissimis huius affectiones pro-  
duxit. *Thom. Willsius de morbis convulsivis cap.  
10.*

Virgo annos nata 12. in otio magis quam labo-  
ribus educata, Ducis Albani Tyrannidem præve-  
niens in voluntarium exilium mente Aprilis 1567.  
patria excesserat: Interea ex calamitate patriæ æ-  
gritudinem animo concepit, quamobrem per æ-  
stus non ita commodè degebat, quin cruditati-  
bus ventriculi & viscerum obstructionibus sub-  
inde laboraret; mentes inordinate fluebant, ex  
utero aliquoties suffocabatur: sub finem tamen  
æstatis, correcti uteri expurgatione meliusculè  
habebat: paulo post sororum 12. Septembris ex  
Budoritia Lemgovium conitabatur; profectio-  
nis molestias æque ferēbat, præterquam quod  
aberrans in itinere letorino, per metu tenebra-  
rum, animo deficeret; ultimo ejusdem mensis  
evacuatio menstrua fiebat, sed modica, inde cor-  
poris lassitudo, dolor, & gravitas capitis, hypo-  
condriorum inflatio detinebat: Dejecto appeti-  
tu, cibo paucissimo, coque minimi alimentis, in  
prandio tantum, a cœna abstinens, utebatur: cit-  
ca 12. Octobris febris quotidie intermittens sub  
vesperam invadebat, quaducante, singulis nocti-  
bus animi deliquium, uterinæ suffocationi simile  
patiebat, in quo extrema refrigerare, respi-  
ratio crebre scire, prorsus concidere, nonnun-  
quam ad tempus etiam planè intermittere, sine  
ullo spiritui, voce, motu, sensu, moribundæ instat:  
Interea pulsus celer, creber, inordinatus, inæqua-  
lis & minor quidem solito, nunquam tamen de-  
ficiens, multo minus *æquus*: durabat paroxys-  
mus iste alias dimidiū, alias integram, alias ses-  
quihoram; quo finito temper ad mentem redi-  
bat: Passa fuerat hæc deliquia ter quaterque an-  
tequam febris nasceretur: Queri solebat id mali  
à frigore quodam, ex interiore abdominis parte  
surgente, inde thoracem & cor feriente exoriri,  
videri enim cor congelatū: Increscebat post  
dies paucos hæc leypothimia, ut nonnunquam  
mane, etiam postquam surrexerat, ferè tamen  
vespeti, vel ante, vel post febrilem accessiōem,  
etiam ex levissima defatigatione obreperet: Ani-  
madverti tamen affectum hunc non solum ex las-  
situdine, verum etiam ex vehementioribus animi  
perturbationibus, tristitia, excaulescentia, atten-  
tioribus cogitationibus, &c. rectuduisse. Tornos

plerumque insultus syncope ista ad tempus ali-  
quod observabar, manè videli cœ ex rubili des-  
cendendo, crepulo vespertino, & circa no-  
ctem mediam: Afficiebatur interim albo fluore,  
servato tamen utrunque menstrui ordine & tem-  
pore, præterquam quod deterius fuerit, colore &  
quantitate mutata. Urina tenuis, vix spicæ, se-  
cumento ferè destituta: febris adhibita sunt quæ  
cum moderato calore & patrium tenuitate tergent,  
aperiunt & robur conferunt, ex quorum vi mi-  
nor reddebatur: circa calendas Decem. evoluta-  
ri periodo menstrua, frequentioribus jam factis  
lipopichis, ut intra 24. horas etiam quinto re-  
petent, quum jam non aliunde quam ex utero  
illas tenaci puritatem, tardiorē solito maricis  
excretionem in menses provocandam auxi,  
sperans inde commodi aliquid accessurum: Dis-  
plicebat ad hanc rem etiam in malleolis vix se-  
cto, propter hybernū tempus, exiguas & pro-  
fundas venas, sanguinem purum, crudum, cor-  
pus sobrium, noctes intomnes ex cœna absti-  
nencia, quam febris vespertina & *æstus* impe-  
rabat: Purgarum quoque ante & subinde, sed ele-  
mentius: Exhibui itaque Duci pollinem ex aqua  
artemisia: lassitudinem obrui ex asa tærida, dauco  
& castoreo pingui æqualiter mistis ʒj. pilulæ  
forma: Cum autem non um obediret uetus, of-  
ferebam adentame vespere rursus ex illidem ca-  
topotis duplum; Quibus devotatis in somnolen-  
tiam novam incioit, in quam cum se veigere præ-  
sente: Quid nunc tandem fieri uidebat, & pau-  
lo post soporē instat jacebat: quo sopore dis-  
cuto, obrepebat cum frigore contrita & ves-  
pertina olisatio, assilientis febris prænuntia. To-  
tum diem furore inhærebat, carens vaporatio, &  
situs premebat, ea itaque nocte cum febre de-  
litabat: durabat autem delirium illud biduum fe-  
rè continuum, & jam finito febrili paroxysmo,  
nam interdiu nunquam febricitabat calore nota-  
bili: At cum cataplasma subsidio uerus res-  
ponderet, posttridie theriacis opt. ʒss. cum ci-  
nam. ana ex aq. artemisia & saccharo propina-  
bam, qua potiuscula eadem die menses compare-  
bant ferrugini, crassi, puri & copiosiores so-  
lito per totum ferè quadriduum fluebant: Nihil  
tamen profuit ista exetio, imò symptoma acer-  
bius & frequentius videbatur: Quot enim ultra  
quinos ad turnum imperus uno die ex more non  
faciebat, jam ut neque nulla nec temporis nec  
consuetudinis ratione habitā creberrimè redibat,  
ut nonnunquam quater eundem horarum spatio  
repeteret, imò unicus paroxysmus septenas ho-  
ras & quandoque denas expleret, neque is ejus-  
dem formæ cum præteritis, sed respiratio stran-  
gulationi simillima fiebat, una cum tonitu & stri-  
dore magno, convulsionemque artuum tam violenta,  
ut præ concussione fultum cum toto rubili  
tremere & crepitarent, cum colli capitisque  
inordinato motu, imò extensione velut teraq;  
universi corporis, voce inarticulata, coacta, stridula,  
abrupta, diplota, clamosa, stentorea, ut  
per violentia paroxysmi simul plerumque toto  
corpore sudaret: Finitis uterinis hisce etiam  
exacerbationibus ferè desipiebat, absurda lo-  
uebatur, caput huc illuc assidue agicans, & canci-  
lanti voce idem perpetuo occinens, neque ab  
hoc coccyssimo desisteat nisi ad mentem redisset,  
neque id nisi probè & præter solitum obdormis-  
set: Dum deliraret, impinentem symptomatis  
insultum



insultum annunciabat his formulis, scamnum hoc aufer, nimia hic est angustia, trabs nimis imminet, ego aduro; delinquente animo, est mihi volandum paulisper, & simul cum hac voce, plerumque impetu quodam, corpus erigere, tanquam jam volaturâ conabatur, verum in mediis conatibus ægra deficiens menti eripitur: Durabat hæc amentia tres quatuorve dies continuos sine ulla restitutione mentis: Dum delirabat omnium, etiam minutissimorum quæ multò ante acta essent recordabatur, sed quæ mutilatis verbis & obscuris efferebat: Tantæ rerum difficultati cum quid opponerem anxius delibero (neque enim ex frictionibus, ligaturis, fomentis, vacuationibus, odoratis & sordidis usque deque ad moris &c. utilitas ulla accedebat) ad catapota illa non purgantia revertor, additoque michridatio tali proportioni miscui, ut ad castorei pinguis simplum, alic & dauci singulorum sexcuplum, michridatii duplum accederet: hujus medicamenti quorū tie 3j. in pilulas formatam exhibebam, cui lumini cochlear parvum ex cerevina saccharata sorbere jubebatur: Deprehendi antidotum expectationi utrunque prosperum, quare & instante vespere offerre audebam: cujus usus Dei beneficio, ita nobis succedebat, ut affectus, cujus frequentissimi uno die insultus, iidemque pertinaces esse solebant, vix tandem bis, idque multò mitius infestarent, imò ita quotidie decreverent ut infra nonum diem prorsus exstingerentur: Totum itaque biduum & mente & corpore valebat, victâ febris jugulatoque hysterico malo, cibos appetere cepit &c. Die Decembris 21. falsò suspicata est hominem in hypocausto adesse, cujus vocem audisse imaginabatur: hinc furtim, vacillanti gradu spontè in subucula è lecto per gradus 8. in atrium usque descendebat, etiam progressura alterius nisi à sorore ad eam redeunte deprehensa fuisset; quam adveniantem sentiens, magna cum celeritate scalam ascendens rursus se in lectulum proripiebat: subitum hoc illius robur satis mirari nequeo, quæ vel pridie de grabando vix ulnis exportari se inoffensè sustinuerat: Ex hoc descensu fatigato corpore, variaque imaginatione animo turbato, illico in pristinum affectum prolabitur, per biduum delirans, 23. die iterum ad se redit: Interea 26. Decembris menses refluiebant, qui ut commodius manarent, pharmaco promovimus, nihilo tamen sublevarent symptoma: Alternis diebus ferè mentis compos fiebat, idque interdum tantum usque ad vespertam: Per hos dies deficientibus catapotiis, pulvisculum ex una 22. duabus dauci partibus edulcata cereviziæ inspersum exhibebam, à quo mitius solito habebat per 4. dies continuos, licet semper vespertina accessione desiperet. Tertia Januarii 1568. ob ægritudinem animi ex fratrâ discessu, adeò rursus morbus reviebat; ut intra bidui spatium plus minus 32. paroxysmos prioribus ferociores pateretur: reversi verò fratrâ presentia malum denuò cicurabatur; quod postredie, ex ejusdem discessu iterum ferocire cepit; Ante quatrduum aliquando mane talis illam paroxysmus invadebat qualem ante Calendas Dec. habere solebat, cum densissima respiratione & spiritus interceptione, suffocationis specie: 7. Januarii dolor quidam punctorius utrinque ab osse sterni, inter geminas mamillas, affligebat, neque rufiendo, neque respirando invalescens, imò sine ruficula, hærens

nihilominus loco, ad singula ferè momenta spontè sua ita pungebat ut subinde vocem attollere cogereetur, sed sequenti nocte mitigatus & ferè sublatus: 8. Recrudescerebat cruciatus ille & vehementer lancinabat, fomentorum usum non admittebat, quod illorum pondus pectori molestum esset; potus & cibi omnis oleosum quid sapere ægra videbatur: Purgabam eo die catapotiis, mediocris excretio sequebatur, nihil tamen remittebat dolor. 9. Cataplasma pectori nihil conducebat, imò profundius inde dolebat: paroxysmi uno die interdum plus minus 16. 10. utebatur tragemate ex diatrium piper. & castor. ana 5 6. sacchar. duplo; venæ-sectio, cucurbitulatum usus perparum conferebant: 15. suspitiis increbrescentibus, extorta vix tandem causâ, amorem erga Juvenem, invita admodum fatebatur: Ex hoc animi affectu appetentiam cibi, somnos, sanasque cogitationes labefactatas: hinc illi 21. Decembr. ex curvili descendendi impetum, suspitione de delicto illo provenisse; Ex eo tempore eaque causa morbus illi cum ex acerbationibus magis sævire visus, cumque delirio majori & diuturniori quàm antea: 18. mihi & uxori suspitionum causas pervicaciùs scilicetantibus, etiam alios profitebatur, adeoque se amatoris imaginationibus ab eo ipso momento assidue perturbatam fuisse: 20. Hieram cum agarico mellitam hausit & commodè purgabatur: eodem die menses apparebant nigricantes, puridi, qui postredie medicamento promoti laudabiliter fluxerunt. 2. Paroxysmi uterini à purgatione & rarefiebant & mitigabantur, Edulia adhuc oleosum sapiebant, sed vespertino insultu rursus de mente excidebat: 23. A prandio oscitabat sæpius, frugebat citribus & lumbis: novæ febris quotidianæ annotatio, priore jam diutius mense, discussa: 25. A meridie ad mentem revertebatur: 27. Post meridiem oborta vertigine querebatur, & se & omnia circumtorati; excipiebat hanc statim quiddam convulsioni simile, oculorum depravatus motus apertis palpebris, & detrepente brachiorum manuum etorumque denæ aut duodenæ violentæ extensiones, distinctæ inter se mora perquam exigua, occupata mente & sensibus, capite immoto: His finitis illico solitus paroxysmus, strangulationi similis, cum tremula totius corporis concussione, subsequerebatur: A prandio, levissimo vomitorio exhibito multam viscidamque pituitam rejiciebat; 5. Februar. inter multos paroxysmos unus quinque horas continuabat, à quo desipiebat usque adeò ut me quidem ne dignosceret, in quo tamen nunquam erraret: 8. vesperti unicus paroxysmus octo horas implebat; Ante biduum de dolore sub norhis costis supra lienem, idque ab anteriore parte in dorsum usque, querebatur, sed rariùs, exasperari tamen motu thoracis vehementiori: Dolor pectoris punctorius prorsus evanuerat, qui per quatuor septimanas duraverat; dolebat & circa dexteram umbilici partem profundè, 10. unus paroxysmus res stupenda, per 12. horarum ferè spatium totum perseverabat: 17. Cetarum impositum parotidi, quæ in glandulis colli, sub aure dextra, strumæ non absimilis, ante quinque hebdomadas enasci coeperat, jam ad tactum dolebat. 23. toto die optime valuit, mentis compos sine ullo paroxysmo: 27. jam in sextum diem sine paroxysmo ullo persistebat mentis compos usque in meridiem hujus diei, quo tempore in reparatum lectulum



lectulum deportata, ex levissima hac defatigatio-  
ne in paroxysmum veterem recidebat, ex paroxyl-  
mo verò, in dementia, sensit autem ante me-  
diam noctem paroxysmos tres: Notandum quod  
præ metu levissimi illius paroxysmi plerum-  
que vix ante quartum aut quintum diem lec-  
to dimoveretur: A calendis Martii totos dies  
17. continuos animo & intellectu pollebat, repe-  
tentibus tamen interitum aliquando primis illis de-  
liquis levioribus, nisi quod his, dum lectus  
reliciebatur, ex transportatione defatigata, ratio-  
ne excideret. 13. menstruum, quod redire debue-  
rat, intermisit: 31. Tantæ vehementiæ paroxyl-  
mus novus erat, caputque de latere in laus rap-  
pissimè agitabat, ut sanguinem ori exprimeret,  
qui ex capite manasse videbatur: Ad 20. diem  
Aprilis usque eadem morbi conditio: Maii 4.  
paroxysmus cum jactatione capitis totiusque cor-  
poris, comitante thristore vocis acutissimo inex-  
pectatus adveniebat: 5. sanguinem ex basilica ad  
3 iij. detraxi: 16. venam malleoli secui, fluxit  
sanguis modicè, torré ad 3 iij. 25. sumpta cath. l.  
3 j. deiecit sexies: Junio mense graviora illa  
symptomata miscere, adeoque minui coeperunt:  
Tandem sub finem mensis hujus nulli reuertunt  
paroxysmi, ne tunc quidem cum lecto moveretur.  
Sed toto hoc mense cathartus ad os fluens  
(quo jam a Januario fatigabatur) infestabat magis  
ut quod assueret cava manu abjiciendum ex-  
cipere coegeretur: Julii 14. febris rursus intermit-  
tente quotidie repente, & quidem duplici, affli-  
gi coepit: hac febre plurimum emaciata imò ex-  
hausta est: Augusti 5. catharrus desinere coepit;  
febris intermittens in continuam conversa vires  
prorsus labefactat: Post idus tenemus ad fre-  
quentissimas sedes, sed irritas, cum summo do-  
lore sollicitabat: A calendis hujus mensis, fetè  
non potuit, præ nimia macie consumpto corpus-  
culo, in clunes amplius surrigi ut alvum aut ve-  
sicam exoneraret: hoc mente tumores illi duri &  
scirrholi per se diminui coeperunt, ut mortuæ fe-  
rè prius evanuisse viderentur. 18. paulò post  
tertiam matutinam sana mente, constanti fide in  
J. C. ex hujus vitæ miseris emigrabat anno 1568.  
Corporis habitus, & quidem sub-pinguis, quo  
naturæ beneficio prædita erat, usque ad solstitium  
hybernum suis sibi constabat quavis semel tan-  
tum quotidie cibaretur: imò ab eo tempore in-  
crementum, adipemque contraxit majorem mul-  
to quàm dum inculpatæ valetudinis esset: Nam à  
21. Decembris meliori appetentia quàm ante præ-  
stabat, pluresque quàm cum sana esset, cibos lu-  
mebat, durabat id per menses ferè duos: Ab Idi-  
bus Februar. laudabilis illa corporis constitutio  
flaccescere coepit, fastidio nempe ciborum ob-  
orto, & febre quotidiana altera, quæ priori ta-  
men mitior esset, per ingluviem suscitata: Inter-  
im nec ab hebetica fehti symptomatice immunis  
fuit, quæ per menses plus minus sex ante obitum  
apparere coeperat, etiam ut ab aliis febribus pu-  
tridis liberata esset. 4. Calendas Januarii ad mul-  
tas hebdomadas, sæpissimè unico die, tres, & qui-  
dem specie diversissimas inter se syncopas patie-  
batur: nam non rarò & illa cum leporhythmia re-  
currerebat, quæ ante calendas Decem. singulis no-  
ctibus etiam dormientem opprimere solebat, id-  
que potissimum quoties ad mentem reditura es-  
set.

Dissecto corpusculo, pulmonis lobos, undique

thoracis membranz firmiter annexos ut sine la-  
bore aut dilaceratione divelli nequirent, eosque  
duris quibusdam tuberculis scirrholis omni ex  
parte resectos deprehendi: Tenui intestina rubi-  
cunda, velut erysipelate quodam affecta: Bilis  
folliculum felle quodam vitescenti tumidum: O-  
mentum ferè corruptum & consumptum; Cœte-  
ra viscera bellè habebant: Jecur colore substan-  
tiæque bona, communem tamen humani hepatis  
magnitudinem excedebat: Uterus quoque, in-  
testinum rectum, aut lien nihil præ se vitii fete-  
bant.

Nulli alteri corporis parti, præterquam utero  
attribui debere immanissimos hos (quibus pia &  
pudicissima virgo tanto tempore excruciatæ sunt)  
paroxysmos apud medicos in confesso est: *Galenus*  
cetèræque *Acetius* præter sensus, vocis, mo-  
tus, & spiritus intercipiones, etiam hystericeis  
artuum contractionem aliquando accidere testan-  
tur, quod quo facilius credam facit ipsa ægræ ad-  
stipulario, quæ de frigiditate ex imo ventre sur-  
gente, & cor ipsum quodammodo congelante,  
accessioni initio queri solebat: sed quid in cau-  
sa sit, fortassis controversia non omnino caret:  
statuit autem ex proba illiusorum veterum sen-  
tentia causa duplex, videlicet vel menstrui vel se-  
minis corrupti culpa; semini major vis tribuitur  
quàm menstruo, ut toti corpori noxa afferatur.  
At si seminis corruptela tanta symptomatum di-  
ritas adscribatur, unde tanta ejus copia ut sede-  
cim, ne dicam viginti paroxysmos intra 24. ho-  
ras susciter: præsertim cum id ipsum etiam tanis  
exiguum existat, neque tam sæpe ut cætera ex-  
crementa expelli postulet, præcipue in virgine  
nunquam concubium experta: addè quod tam  
longo morbo afflicta in sextum usque mensem,  
priusquàm hysterice exacerbationes finem face-  
rent, tam sobria, ut unico pastu, eoque valdè  
modico, ad menses aliquot, etiam ante decubi-  
tum acquiesceret, utpote tota præcedente mor-  
bum ætate in Clivia, propter exilium, patriæ  
calamitatem, parentum pericula mœrenti & va-  
letudinariæ semen abundare nequiverit: De se-  
minis acrimonia nulla est suspicio ob habitum  
corporis pinguiusculum, qualis illi à natura fuit,  
adeoque in otio molliter educatæ moribus, mo-  
destæ & pacificæ: At *Galenus* minimam corrupti  
ipermatis periculum tantorum affectuum causam  
esse posse, a phalangii & scorpionis ictu rabidi-  
ve canis saliva affecti. Quid si ita haber, unde  
tam crebra totietque renata hujus genitalis succi  
putredo? unde tam assidua ejusdem expulsi-  
o, quæ per sex menses, vix triduum sine ternis  
quaternisque insultibus ægram nunquam destituit?  
sanè tanta est febrilis paroxysmi æqualitas quanta  
puncti humores uniformitas, quo dissensio  
etiam accessio dissolvitur: similem hysterici pa-  
roxysmi rationem esse statuamus, ut donec hu-  
mor venenatus subsistat, tandiu affectus quoque  
seviat: sed si cum singulis insultibus finientibus  
ipsorum etiam materia absumatur aut ejiciatur,  
unde tam sursum nova colligetur? Quan liu pha-  
langii, aut scorpionis & canis rabidi virus in  
corpore hæret atque agi, tam liu quoque affe-  
ctus ejusdem sine ulla intermissione perdurat con-  
tinuò, neque novos facit paroxysmos. In febris  
quidam concoctio & nutritio corporis assiduo recre-  
mentum quædam seponit, sit ut pro patris morbo-  
sæ qualitate, ejusdem nutrimentum atque excre-



mentum vitietur; vitiatumque prae imbecillitate neque concoqui rectè, neque expelli commodè queat, sed inhaerens putrescat & pro putredinis suae natura hæc aut illa symptomata producat. At in feminis consideratione, tametsi testes ex continuo seminis accessu, pro suo modo sese alant, non tamen quicquid post sui alimoniam superfluum est id statim omnia se propellunt, sed tanquam in meliorem vium utile excrementum propriis conceptaculis reponunt & conservant, dum vel copia molestum turgat, vel procreandæ speciei necessitas, ut illud exentiat tollit. Quamobrem, quæ ratione horum frequentissimorum symptomatum causas in corrupti seminis venenosam substantiam rejicere debeam, allequi non commodè possum: nisi lentam quandam & continuam tanti temporis gonorrhœam factam esse imaginemur, neque enim alibi quam extra vasa semen putrescere verisimile est; valis autem excidere posse, nisi cavitæ matricis excipiantur statim, anatomici veteres negant: At si ita frequenter vel minima particula seminis in uterum illabatur, illapsa putrescat, sanè putrefactum tandem necessariò semel Utero excuti debere verisimile quoque est, ut rem non tantum utero sed & toti corpori adeò infestam & venenatam; si excussa fuerit, alienam sanè qualitatem facillè sensibus proderet, neque enim calore ut in febre dissipari posset: neque uterus tantum venenum perpetuò fovere valet: sed in hac ægra nulla vel paucissima humiditas, nec illa quidem ingrata qualitate prædita genitalibus (post linitos paroxysmos) emanasse animadverti potuit, teste torore assidue affidente. *Henr. Smetius Miscellan. lib. 4. epistola 7.*

Mulier quædam hysterice passionibus obnoxia, tandem moritur. Mesenterium plurimis glandulis scirrhis, durissimis, & varis magnitudinis & figuræ obfessum; vix ob duritiem discindi poterant. Uterus & Ovaria, cum Tubis, recentis quasi coagulato lacte turgabant.

Ex obstructis mesenterii glandulis sæpe convulsio orta, præsertim quando cibo, vel potu corpus repleatur, tunc enim magis istæ glandulæ distenduntur, unde membranarum ruptura, distensio, & dolor. Porro convulsiones istæ in Abdomine, ob communionem cum aliis visceribus, idque mediantibus nervis paris vagi & intercostalis, hysterice (ut dicitur, quamvis uterus sit inculpat) passionem incalecunt.

Ægra hæc istas in mesenterio obstructions nunquam passa fuisset si acidis & viscidis humoribus se non divitem fecisset. Atque hoc acidum abundare testantur succi in Ovariis, Tubisque Fallopiæ, ac uteri cavitæ coagulati. *Steph. Blanchardus Anatom. Pract. Observ. 55.*

#### AGRYPNIA.

Vid.

#### PERVIGILIUM.

#### AGRYPNOCOMA

idem quod

#### COMA VIGIL.

#### ALBOTIS.

idem quod

#### TERMINTHVS.

#### ALBVGGO seu LEVGOMA

Vid.

#### OCVLI VITIA.

#### ALCOLA

Est nomen morbi apud Avicennam, idem significans quod *Aphiba*.

#### ALGENA, ALGOS.

idem quod

#### DOLOR.

#### ALOPECIA

Capillorum est defluvium; sic dicitur quod vulpius frequenter accidat. Vid. Pilonum defluviu.

#### ALPHVS

idem quod

#### VITILIGO.

#### ALVI FLVVS

Vid.

#### DIARRHÆA.

#### ALVVS SUPPRESSA, DVRA & Pigra.

Expulsio in intestinis, aut imminuitur, aut ad tempus omnino nulla est, unde enatitur alvus dura, vel alvus suppressa.

Causa est vel in ipsis intestinis, vel in ipsis contentis expellendis. In ipsis intestinis, si vel inflammata fuerint & tumefacta, vel post dysenteriam ita cohaerint, & eorum arictes agglutinati invicem sint, ut nulla super sit via materis excrementis; vel etiam, si intensilia, paralytique tact, unde aut spicula excrementi non percipiunt, aut illi egerendo motum aptum, sc. compressivum, non habeant. De aliis quæ hunc faciunt; motumque intestinorum peristalticum invertunt, hic non est quod agamus, suo liquorem reservantur loco. In ipsis contentis expellendis erit causa alvi pigra aut suppressa si, vel indurata nimis fuerint, vel viscosiora, atque alterutra hæc de causa, ad motum inepta. Indurantur faeces, vel quod ingesta jam fuerint dura; vel ex succorum salinorum intestinorum cavo per varios tubulos suffectorum actione penetrantiori, unde ab eo quocunque demum quod fluxilitatem aliquam ipsis faceret spoliata, excrementitantum quasi caput mortuum prædictorum salium terrestrisque sua vim eluden, relinquitur. Præterea est et quandoque salium in intestina invectorum natura coagulatoria quæ excrementi portionem in lapideum quid pervertit valeat; unde vidimus aliquando gypseam materiam intestini recti cavum ita opplentem, ut omnis contentorum exitus fuerit impossibilis priusquam inferciens hæc materia per remedia, imò manualet operationem emora tuisset. Viscosiora redduntur excreta, vel itidem per copiosam



alimenta vitiosa usurpata; vel propter bilem parcius admistam; (cujus beneficio diluuntur excrementa, atque ea propter clysteris naturalis nomine venit) vel propter succum pancreaticum austeriorem fluxilibus excrementi particulis in pituitosum quid, intestinorum parietibus quàm facile adhærens coagulare aptum; vel propter porum parè nimis haustum, &c.

*Curationem* quod attinet, illa minimè tentanda venit si intestina post dyenteriam coaluerint; si verò inflammata, aut paralytica, illis medendum, quæ ubi de inflammatione & paralyti, dicentur. Si alvus supprimatur aut pigrescat ex alimento duriori, aut viscoso, ingesto, necessario cum molliori, & minùs tenaci, atque porus parcius cum largiori est commutandus, reliquum quod spectat, iis quæ emolliunt, ut & quæ stimulant res perficienda; atque si durius quid uno vicinum reperiat exitum ita obstruens & obturans, ut contentorum nihil prorsus pervadere queat, illud quicunque demum arte emovendum.

Inter interna alvum emollientia & lubricantia apprime facit oleum amygdalarum dulcium, &c, ut quidam volunt, ova sorbilia, atque porus copiosius, vel simplex & ordinarius, vel pallulatus, pallulæ enim vel per se, vel paucò arcano duplicato Mynsichti permixtæ hypochondriacis petrinaci alvi aiffi. ultate laborantibus, in potu exhibitæ, maximè conferunt. Conducit item serum lactis, succo pancreatico præmixtis nimis auctero, temperando atque corrigendo maximè idoneum, præter enim salium quid & nitrosum volatile non parvæ efficaciz; & ulterius præterea emollit si tamarini ipsi incoquuntur. De decocto tenn. tartarizato, electuariis purgantibus, passulis laxativis variæ compositionis, quia unicuique eorum usus factus est notus, hic nihil addimus, ut nec de decocto ficuum longo nimis usu, ex observatione Henrici ab Heers, periculosos ingenerante. In alvi obstructione remediis communibus non ita facile obediunt quidam tanquam infallibile medicamentum commendant aurum fulminans à gr. vj. ad x. cum extracto hellebori nigri in pilulas compactum, interim tamen nec spei, nec voris respondit effectus in quibusdam ægris, sc. parum movit; revera, si salium, & dissolventium & præcipitantium tota propemateria in illo fuisset relictæ, per eorum aculeos, magis expurgasset, sed tum vi corrosivæ atque venenosa egisset, quæ ipsum iteratis lotionibus spoliare omnino consuevit. Alii pro secreto habent vinum in quo per mentem mercurius vivus fuerit infusus, illudque ad cochleare unum vel duo exhibent. Non ingratum est medicamentum tinctura tartari antimoniatæ parè aromatizata, in vino, vel etiam jusculo ad gutt. xx. propinata per dies aliquot, ut nec tinctura antimonii post ejusdem in oleo nitri per deliquium, digestionem spiritu vini extracta, atque etiam liquor terræ foliæ tartari, aliæque id genus de quibus consuli possunt scriptores Chymici.

Inter externa sunt primò Clysteres è variis herbis, aut aquæ, aut jusculo carnium, & omasorum, aut lacti incoctis, sed præcipue ex oleis parari, sic enim pituita etiam viscidissima parietibus intestinorum adhærens ut ab iis aliis mediis divelli nequeat, commodè extrahitur, eadem ra-

tione qua ipsorum beneficio materias emplasticas glutinosissimas à manibus facile separamus, ea propter in doloribus colicis à pituita vitæ non tantum intestinis agglutinata, sed eorum etiam tunicas per salia corrosiva immista, lacerante, generosæ sunt efficaciz. Si verò indurata prorsus fæces solvens validius exquirant, incoquantur pulpa colocynthidis, imò immiscea ut sal gemmæ ipsamque vitæ stybiatum; interim tamen per blandiora sæpius reperita negotium hoc venit tentandum, priusquam ad vehementiora procedatur, quæ ut optimè observat Ballonius præmaturè injecta volvulos quandoque intulerunt. Secundò suppositoria è variis pericæ materiis, & præcipue ex alumine vel in longum scisso, oleisque illiro, vel etiam pulverato atque cum macilagine gummi tragacanthi aqua liliorum alborum extracta, in massam compacto; alii loco suppositorii quam maximè laudant intrusionem digiti oleo semini, napi, vel lini intincti. Tertio sunt topica imò ventri, vel ipsi tantum umbilico illita, inter quæ sunt unguentum de anthanita aliæque officinalia, ac pro specifico habetur Zibethum, (quod etiam in colica umbilico inunctum tueretur) valet item cataplasma è felle tauri & colocynthide, admisto si lubet aloë, imò esula & sale gemmæ cum farinis. Quidam præterea topica iuxta plantis pedum admovent, quale est quod commendatur ex oleo populeonis cum hiera picra confectum. De exemplis rationibus quales Principis illius apud Meibomium quæ alvum deponere non potuit nisi prius à serbo si gellatus; item de rassi & sternutatione quandoque pro excrementorum ejectione necessaria, in eumque finem à Placero imperata, nihil hic addimus; iungimus tantum, quod si à tumefactis atque dolentibus hæmorrhoidibus fæcum præpediatur exclusio, fori lactis cui chamomilla, verbasum, hyosciamus &c. fuerint incoctæ aliisque anodynis esse agendum. Sequuntur jam

### *Curationes, Consultationes, Observationes & Cadaverum Anatomica Inspectio- nes è variis Auctoribus.*

#### *Curationes,*

In tardissima alvi defectione à quacunque causa procedente mirabilis est effectus essentia salis tart. cum sp. vini extracta & ad consistentiam redacta, cujus gutt. ij. usque ad vi. vel vii. tandem singulis diebus vesperti horis 2. à cena in haustulo vini vel alio liquore exhibeantur, donec spontè subsequatur lubricitas alvi. Hoc felicissimè usus sum in melancholia hypochondriaca. *Joann. Hartmanni prætic. chymicæ. pag. 47.*

Arcanum ex alumine in hoc casu in forma suppositorii exhibet Angelus Sala in fine operum. Valet etiam clyma ex croco metallorum & ol. olivarum. Item sp. vini cui per mentem mercurius est infusus etiam valet. Prius, quod notandum, croci metallorum decoctum de vet. filtrari, alia nocte. ℞. ol. lini, raparum ana ʒiv. diacoloc. Q. ʒvj. vel ʒj. f. l. a. clym. ℞. pulp. pascular. ʒij. pulv. rad. jalapp. ʒss. scam. solat. ʒij.



crystall. tart. alb. ʒ iij. cum f. q. syr. ros. f. electu-  
rium. Rob. passul. um optimè prodest in ti- cio-  
sibus, præsertim ubi hepar est nimis calidum. In  
alvi obstructionibus præprimis a siccitate, mini-  
mè conveniunt aloëtica, neque rhabarb. myroba-  
lani &c. quia nimis exsiccant, & post se astric-  
tionem relinquunt. Optimè verò eo in casu con-  
veniunt potius largiores, ut & passulæ laxati-  
væ ʒ 6. ad ʒ j. elect. de ramarinis cum sol. senæ ab ʒ 6.  
ad ʒ vj. vel ʒ j. pruna item laxativa. N. iv. vel vi.  
*Joan. Michael prax. clinic. general. libr. 4. cap. 16.*

*Pro alvæ suppressa in Gravidis.*

Alvi suppressio ac durities vel tarditas curatur  
cibis liquidis & humectantibus, ut juleulis pur-  
gantibus, butyro, malv. botrag. &c. alteratis.  
Item prima mentia sumantur pruna dulcia vel  
mel. rosatum ad 3. vel 4. cochl. quæ signavida res-  
puat clysteres humectantes & emollientes sine  
omnibus purgantibus in minori quantitate sine  
periculo injici possunt. Cave tamen ab herba  
mercuriali, quia menses ciet, exempl. gratiæ. ʒ.  
Decoct. hord. & juleuli carnis, vel pulliana q. s.  
flor. borag. herb. pariet. ana m. s. colat.  
ʒ. ʒ vj. adde mell. rosat. vel sacchari Thomæ ʒv.  
vel ʒ j. vitell. ovor. n. i. m. f. clyster. Quem Ob-  
stetrix prudenter & cautè, fistula scilicet non su-  
perne versùs uterum, sed inferne versùs os ischia-  
ticum directè applicare debet. Suppositoria hic  
minùs tutè adhibentur. Ceterùm si calor adsit,  
hepar refrigerandum, clysteribus admisceri etiam  
potest ol. amygd. dulc. violatum, rosatum &c.  
oleum amygd. dulcium etiam per os commodè  
assumitur. *Idem. Prax. clinic. General. lib. 5. tit.*  
*14.*

*Pro Alvæ suppressa in Infantibus.*

Si oritur à causa frigida & sicca post purgatio-  
nem humectantia profunt. Manna, Cassia, passulæ  
laxativæ, poma laxativa, rob. passul. brod. prun.  
laxat. minimè verò profunt validè purgantia, cum  
exsiccant & adstringant. Si oritur à pituita vis-  
cida, convenit Mechoacanina vel suppositoria of-  
ficinalia pro infantibus. Possunt illis ol. dia-  
colocynthidos, pomum Borsdorffianum putridum  
cum pinguedine anserum intestinis illicum; Item  
pinguedo anserum & gallinatum cum juglande  
umbilico imposta; Item unguentum de Artha-  
nica cum unguento dialthæz. ʒ. Unguent. de  
archaniz. ʒ ij. fellis taur. inspiss. ʒ j. cum ol. dia-  
colocynthid. f. l. a. linimentum. ʒ. Decoct.  
emoll. ʒ vj. vel plures, unguent. clysmat. ʒ ij.  
vel iij. f. l. a. clysmat. *Idem. lib. 6. prax. clinic. ge-*  
*neral. cap. 13.*

Linimentum hoc Nitrum umbilico alvum mo-  
vet, nec post se detrimentum relinquit. ʒ. ol.  
amygd. dulc. rec. pingued. anser. butyr. majalis  
unguent. dialth. ana ʒ ij. colocynthid. gr. xvi. salis  
ʒ i s. spec. hierz simpl. ʒ j. diagryd. gr. iv. misc.  
pro linimento. *Reinertus Solander. Consil. 19.*  
*Sect. 3.*

*Consultationes.*

Per illustris senex sexagesimum secundum an-

num agens, temperamenti sanguinei ab ortu mo-  
dò ad melancholicum vergentis, post errores mul-  
tis ab hinc annis commisos, & præcipuè in vi-  
ctus ratione, cibariis nempe valde salitis &  
aromatibus infarctis, à scabie sævissima tandem  
fuit correptus, per quinque annos ipsum excru-  
ciantem, magnoque cum labore, repetitis expur-  
gationibus cedente, à qualibet, pristinum sta-  
tum recuperavit, à morbis immunis vivens: so-  
lummò post sexagesimum annum torqueri cœ-  
pit alvi astrictione insolita ac pertinaci, adèd ut  
non nisi medicamentis exhibitis alvus respondere  
valeat, & magis magisque invalescit affectus; in  
hoc enim cursu erysipelate sputio in facie & in  
capite fuit tentatus à quo medicamentorum ope  
liberatus fuit, & ad præsertionem inustum suis  
cauterium in cruris dextri parte inferiori. Quie-  
vit aliquantisper; sed hoc hyemali tempore præ-  
terito rediit erysipelas in crure & in coxa, nonse-  
mel, sed bis & ter infestans, tandemque etiam in  
capite, sanatum propriis adhibitis medicamentis.  
Laborat in præsens alvi stipticitate molesta cum  
flatuum in ventre strepitu, adèd ut nisi, utatur  
medicamento aliquo solutivo vix faeces ex-  
cerni possint. Quare pro levamine tanti viri, hoc  
tempore veris purgationem instituere decrevi-  
mus, tuo tamen sapientissimo judicio proponen-  
dam.

Sicut ab atra bile in toto existente elephantia-  
sin excitari, in parte verò particulari Cancrum,  
dicebat *Galenus*, ita & nos in casu Nobilissimi  
Viri asserere possumus, quod bilem crassam, quæ  
jam præteritis annis diu in toto scabiem & pso-  
ram producebat, eadem natura, à toto ad par-  
tem, & primò ad caput, postremò ad crura natu-  
ra demandaverit & deposuerit, & affectum ery-  
sipelatosum constituerit, quem licet legitimum  
esse potuisse propter ætatem vix credi possit, æ-  
tamen bilem redundantem arguere licet tum quia  
jecoris temperamentum calidum & siccum ab  
aromatibus & salutorum usu, & forsan etiam me-  
taco potu comparatum fuit, tum quia evanescit  
affectus, nullo in partibus relicto tumore. Et  
quoniam nonnisi à jecoris fervore bilis copiam  
generante, erysipelas prodidisse censendum idèd  
ad corporis peripheriam non ampliùs, ut supe-  
rioribus annis, transmissa, sed in centro modò  
detenta, & jecoris & hypochondriorum fervo-  
rem necessariò adauxit, à quo & intestina ipsa  
quodammodo contrahi, & faeces quàm maximè  
exsiccati fuit necesse, unde alvi stipticitas, quàm  
facile hypochondriacus affectus quoque aut com-  
mitatur atque comitabitur: rugitus enim & mur-  
mura in abdomine abundantia, sicque potius ex-  
halationis, quàm vaporis, sicque flatuosæ affe-  
ctionis non leve jure merito præbent indicium,  
eoque magis, cum ad melancholiam vergere an-  
notetur in morbi tradita historia: cujus affectio-  
nis comes esse solet alvi stipticitas, tum ob addu-  
ctam superius siccitatem, tum ob crassas flatuo-  
sitates fecalia excrementa suspendente; & non-  
nunquam à crudioribus viscidis expultrici facul-  
tati torporem quandam inducentibus: In hujus-  
modi autem insigni alvi stipticitate excrementa  
biliosa, quæ per inferiora evacuati debuerant, ab  
hepate per venam cavam ad cor, indeque per ca-  
rotidas externas ad caput delata, & ab arteriis  
ad integumenta transusa ad superficiem perve-  
nit.



nientia, erysipelas per intervalla excitant. Quod erutibus quoque accidit, bile ipsa per crurales arteriarum ramos à prudenter infixo Caustico eo revocata, copiosioris & superabundantis bilis indicium, ut quæ per Causticum tota expurgari nequiverit.

Affectus quidem non spernendi: nam licet erysipelas ad extra pelli bonum sit, cum affectus superficialis evadat, nihilominus quoniam partem nobilem aggredi cœpit, & quia si per internas quoque carotidas bilis serpat in caput, nec extra pellatur, affectus erit priori contrarius, malus enim non solum, sed pessimus evadit, namque & meningum inflammationes & phrenitica deliria cum acuta febre, & tandem quoque ex eo interitus contingere solent. Sed præterea & in erutibus temporis progressu aut tumorem, aut ulcus aliquod post se relinquere possit. Fovetur autem ab alvi stypticitate, à qua & alii affectus acutiores, ut ardentes febres, derivari possunt; ut propterea non sine ratione Hippocrit. dixerit, quod ventris torpor omnium consultio.

Ex quibus adductis non est difficile, quid faciendum sit opus, cuilibet Medico cognoscere. Primum namque ventriculus & intestina ab excrementis expianda. Secundò si quæ lateant in mesenterio obstructions, humectantibus & peristentibus referenda. Tertiò bilis in toto redundans minoranda & expurganda. Quartò jecoris & hypochondriorum fervor contemperandus, siccitasque corrigenda; & tandem caput quoquo pacto roborandum.

Quibus intentionibus ut satisfaciamus, ex fonte Chirurgico non unica tantum est depromenda sanguinis millio; bilis enim neque tenuior, sed crassior & mita, & ided erysipelas non exquisitum sed sparium censendum, in quo & Galeæ. & reliqui quoque sanguinem mittunt; Aperiatur igitur jecoraria dextera, sed parca mittatur, ut ejusdemeductio ab hæmorrhoidibus reperatur. Causticum nuper inustum & apertum, custodiendum, spe concepta fore, ut præienti cura præservativa expurgata nimirum bile, intemperieque calida jecoris remissa, non amplius irruat in crura & interim paulatim biliosa serositas minor reddita, per causticum expurgeretur.

Ex pharmacia reliqua sunt depromenda remedia: & primò leniens erit syr. ros. solut. rec. cum portione man. clarificata, cui superbibat aut aquam hordeaceam, aut serum. Præparans erit, à viro Excellentiss. jam propositum, julap. acet. aromatiz. addito poline cr. mor. tart. & aq. flor. citri. Inde repeti poterit portio ex syr. ros. solut. & de polypos. sero superepoto. Mox ad ulteriora præparantia humectantia deveniendum; cujusmodi esse poterunt succi depur. & per arenam tractati cichor. borrag. pom. dulc. ad 3 iij. in decoct. injure pullæ parata, malv. viol. sonchi & endiviz. Sequenti verò die præbeaturs flos cassiad 3 ij. vel iij. summo mane & post horam superbibat seri capr. aut asin. libram, tribus verò horis ab assumpto sero prandeat. Tertia die repetat succos, & quarta florem cassiæ, sic alternatim perseveret ad vigesimum usque diem. Verum decimo die exacto, addi poterit flos cassiæ rhab. opt. 3 j. Transactis verò jam dictis viginti diebus, præbeaturs portio ex syr. solut. man. clarif. cum sena & paratro, addendo infusioni jam dictæ consueta rhab. 3 iij. cui, incepta evacuatione, superbibat seri

depur. 3 ij. & duabus horis ab assumpto sero prandeat. Sequenti verò die assumat seri depur. 3 ij. summo mane: deinde sequentibus diebus, tribus saltem aut quatuor vicibus præbendum erit serum caprinum depur. ad 3 ij. vel v. cum vehiculo dejectorio, eodem modo quo aquæ Terrucianæ exhiberi solent, idque ut hypochondria excalescentia & exiccata refrigerentur & humectentur: offeratur autem aut quotidie, aut tertio quoque die, habita virium ratione.

Tandem pro jecoris intemperie calida corrigenda, aquarum acidularum & ferreæ thetimalium usus opportunus esset, quibus substitui posset Noceriana, quæ mineralis non est; cum solam terram saniam pro fundamento habeat; quam si respiciat Nob. patient, statim deveniat ad lactis alimini usum, ut quod jecoris & venarum calorem contemperate, & furentis bilis acrimoniam & motum compescere valeat. Et quumvis biliosis & murmurantibus hypochondriis ab Hippocrit. denegari videatur, eo quod facile corrumpatur, corruptionem tamen minime sequenturam spero. præmissis jam propositis humectantibus & refrigerantibus medicamentis. Incipiat igitur ab 3 v. cum semi cochleari sacchari albi, & ascendat usque ad x. cum integro cochleari: assumatur autem statim multum, quinque horis ante cibum, cui minime superdormiat, & perseveret ad quadraginta vel quinquaginta dies. Nec veritate potest ulum, quia, *lac dare caput dolentibus malum*, illud enim intelligitur de capitis frigidis affectionibus, cum calidis & siccis sit verum remedium. Eodem tempore Balneum aquæ dulcis non esse omittem mihi videtur, horis vespertinis administrandum, alteratæ sol. mal. viol. nymph. sonchi, salicis, viginti saltem diebus, quo viscera omnia totumque corpus cum sanguine ad moderationem redigi poterunt. Nec interim capitis tutela omnino negligenda, sed à prandio in ulum ducat conservam rosatum: sicut quoque sub ingressum lecti, cui addi possit exigua portio Diarrhod. Abbatis, aut reformari cum gutt. cinet. coral. chymicæ.

Hiscæ omnibus congrua addatur vivendi ratio refrigerans, humectans, & potius incitans, à Pericillimo viro præsentenda, à quo reliqui quoque proposita fuerunt, & à me in præiens confirmata. *Regimund. Joan. l'ortu consultationum centuriæ quarta.*

### Observationes.

N. Ab Offendorph, Nobilis Germanus, militans sub Capiteo Lex, Vir fortis & honoris ætatis, ordinariè tantà alvi constipatione laborabat ut vix unquam absque medicamento alicujus usu eandem deiceret, quod malum ipsi multis annis familiaris fuerat. Interea tamen non ægrotabat, sed cum alvus jam quinque sexve diebus subtraheret, tunc somnolentus & in actionibus omnibus piger fiebat. Accidit mense Augusto, cum alvus per septem dies constipata pilulis suis ordinariis (quæ ex præscripto Medici cujusdam Germani semper secum portabat) non moveretur, ut D. Romphium, Regina Bohemæ Medicum ordinarium (qui tunc temporis Principem Anriacum in castris sequebatur) adierit, qui injectis duobus clysteribus, & duabus portionibus



cathartica fortioribus exhibitis, cum alvum emovere non potuisset, non ausus fuit ulterius procedere. Quapropter ipse vitæ suæ metuens, è castro No. 10. in agum ad me venit, ac totum negotium mihi exposuit, simul aliquod salutaris auxilium exoptans. Decimus sextus jam agebatur dies quo alvus constipata erat. Ego ejusdem emotionem sequenti clystere tentare volui.

℞. Radic. bryoniæ ʒj. herb. malv. althææ, mercurialis, absynth. centaur. minor. florum chamæmil. meliloti, an. m. i. tol. tenæ ʒjss. pomi colocynthidis ʒj. sicum ping. num. vii. sem. anis. ʒss. coquantur in aquæ communis q. l. ad ʒx. colaturæ adde vini sibiati ʒiv. fiat enem.

Hoc cum per horæ quadrantem tetinuisset, alvus vehementer conturbata fuit, & ultra viginti dejectiones subsequutæ sunt, cum maximo levamine. Postea dietam emollientem & laxantem præscripsi, atque sic illum tanto onere levatum, bene lætum ad cisternam remisi.

Inveniuntur nonnulli quibus alvus mirabiliter constipatur, eorumque varia & stupenda exempla collegit Schenckius observ. lib. 3. in talibus naturis, si cathartica exhibita nihil prosint, non semel observavi vinum sibiatis clysteribus admistum egregiam operationem addidisse, idque tunc, cum cathartica fortiora per os exhibita, interdum prohibito transitu, facile aliquod periculum inducere possint. Memini me aliquando rustico Bataviensi robusto & valde constipato catharticum forte exhibuisse, à quo cum alvus planè non commoveretur, postmodum injeci enema cui, præter alia, semiunciam tabaci sicci incoxeram, atque sic alvus egregiè deturbata fuit. Novi capitaneum navis bellicæ, qui mihi narravit, sibi quondam in mare alvum multis diebus constipatam fuisse (unde valde anxius fuerat) neque à Chinurgo suo multis variisque medicamentis emoveri potuisse tandem verò cum jam de vita desperaret, quendam ex nautis consuluisse ut aliquantum rasuræ unguis pollicis cum haustu cerevitiæ biberet, quod cum fecisset, se maxima anxietate correptum in animi deliquium incidisse, ita ut ipsum moriturum omnes arbitrentur, postea verò ad se rediisse, & sursum deorsumque enormiter purgatum, atque sic ab imminenti mortis periculo liberatum fuisse. *Librand. De Diemerbroeck. Observation. & Curat. Medicar. 89.*

Novi illustrissimas & formosissimas Dominas, quæ cæterum sanissimæ, & quotannis iterum gerentes, nunquam nisi vigesimo, vel serius, die, alvinas fæces deponerent; nec quidquam inde incommodi etiam puerperæ sentiebant.

Vixi cum Sacerdote Religioso, omnium quos novi mortalium ingeniosissimo, linguas enim Orientales, Hæbreæ, Syriam, Arabicam, autodidactos ita calluit, ut eas publicè, in celeberrima Germaniæ Academiâ docuerit, summa cum laude. Hic nunquam nisi post 24. diem, alvi beneficium a puero sensie, sanissimus, nec ullum unquam expertus pharmacum.

Generosus quidam jam multos annos ita vixit, ut fœcum alvinarum nihilo plus per anum quam per oculos excerneret, accumbit sub meridie mensæ opiparæ, convocatis ut plurimum aliquot Nobilibus, comedit, bibit, nihil à quoquam accumbentium discrepans. Sub horam primam surgit à mensa, pridianum prandium revomit, retentis accuratissime omnibus recens ingestis, posttri-

diè illa, ut hesternæ egestus, putidissima, atque ab alio stercore non differentia, in vomitione conatus nullus, mora nulla, simul & semel magnam quantitatem exitomachar, abluto aquis odoratis ore, ad mentem redit: ventriculum interim quod illi in sequentis diei meritiem satis sit, resumere cogit, jentacula, cœnasque ignorat, solo prandio contentus. Sic jam ultra 20. annum continuat.

Sapè mihi in mentem venit, duos illi, ut animantibus ruminantibus esse ventriculos, quorum unus altero recens impleto, vomitu se depleat. *Henricum ab Heers. observ. 29.*

Amicus quidam meus non solum 10. 15. aut 20. dierum spatio incolumis sine fœcis dejectione servatus est, sed contigit aliquando, alvum, ita exsiccatum fuisse, ut usque ad tres menses sanus per se extiterit. *Dominicum Panardum, Observ. 1. pentecostæ 1.*

Cum viro cuidam nullis medicamentis solvi poterat alvus, & jam per dies 14. ex toto suppressa erat, ipsi statim dedi mox ante cibum ʒj. sequentis electuarii è zizibis dicti devorandam, quo ceterè alvus continuo fuit emollita, mota & subducta, nec de novo alvus suppressa fuit. Electuarium è zizibis *Καταρρηγνόν* sic se habet. ℞. Polipod. q. recent. bene munitat. ʒviii. sol. orient. rad. althææ ana ʒiv. anis. ʒss. fiat omnium decoctio s. a. in aqua fontan. donec veniat ad ʒij. plus minusve postea cola cum levi expressione. Colaturæ expressæ adde pulpæ zizib. (i. e. jujub.) lotæ cum vino albo potenti & maceratæ in dicta decoctione, postea per teraceum transmissæ, ʒj. sacchar. albi. ʒiv. bulliant iterum ad cydoniati consistentiam. In defectu zizibi, ponatur uva passa detrahitis Arillis. Hoc electuarium communicatum est ab excellentissimo D. Doctore *Alexandro Petro-nio. Martini Rulandii. curat. 79. cent. 10.*

*Hier. Thruvarum, comm. in aphorism. 10. sect. 2. Hippocr. scribit, rusticos jam iudum posse experientia, si nudis pedibus humi obambulent, ventrem pertinacem solvi, atque ejus rei historiam refert Brassavolus cap. 9. tract. de Medic. purgant. Dum scribit Petraricus Ducem Borium in alvi duritiem incidisse, & per triduum nihil excrevisse, & consultum ea de re medicum eo tempore insignem, Michaellem Savonarolam, suavis clysterem injici, quo nihil proficiente, iulii pavimenti, quod erat marmoreum, frigidâ aquâ copiosius conpersi, & Ducem lecto surgere ac nudis pedibus ambulare: non 30. passus pertexerat Dux, cum per ventrem dolorem, ac *Ασπυρμόν* sentire cepit, sedem petiit & potentissime excrevit, quo facto iussit Savonarola, aqua in qua herbe calidæ essent decoctæ, Ducis pedes, ac crura ablui: quod consilium, Dux cunctum aureis remonerari iussit.*

Hoc proculdubio accidit ob pedum, quem cum partibus nervosis & membranosis, qualia etiam sunt intestina, habent consensum, & ob intestinum refrigerationem; sicut aliàs etiam, si ventris frigori exponatur, dolor colicus, & alvi excretio copiosa excitari solet.

Verùm Brassavolus hoc periculosum auxilium esse putat, & non tentandum, cum tormina inducere possit, & Diarrhœam. Nonnullis ex solo purgantium odore, alvus laxabatur. Novi medicum, cui, si in vola manûs, pomum colocynthidis contineret, donec incalesceret, alvus laxabatur



batur. *Daniel Sennertus. cap. 4. sect. 2. lib. 3. practica.*

Cuidam alvi feces duræ in podice substituerunt, nec egredi cæsi vehementi conatu propellere tentate, poterant, aded ut podicem, cum cruciatu, nimium aperirent, & veluti divollerent, huic ut mederetur, sternutationem movi, & cum suffire jussu prius podice tornato cum oleo, quibus conatibus & imperibus scibalon propulsum & erectum est, reliquaque excrementa subseculi sunt. In multis aliis, quibus ob duritiem excrementa ægrè per podicem feruntur, tussim imperando ea ut prodirent, quæ alio conatu exprimi non poterant, effeci. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 125.*

Seni quidam qui singulis tribus septimanis, aut aliquando mente alvum semel reddebat, hoc consilium dedi ut pinguibus jusculis uteretur, in quibus & malva decoctæ esset. Romana quædam mulier utrica tenella ex oleo & tale comestæ alvum sibi reddebat. *Petrus Forestus, observ. 24. lib. 21. de mesenterii & intestin. affectibus.*

Vidi duos qui nullo antimonio, aut alio eproctico ne quidem hellebori extracto alvum laxabant cum meo consilio propriorum unguium, pælegmina & raturam bibissent, vomitu juxta secessuque abundè se deplebant. *Henricus ab Heers, observ. 29.*

Vir quidam corpore athletico post viscerum intemperiem, & gravem morbum per 18. dies, alvum habuit suppressam, cui ter interjecti clysteres, sed in ventre resistentes, & alia medicamenta exhibita, non potuerunt ad obsequium sollicitate. Tandem cum omnia videret esse conclamata, nec ullum superesse sanitatis, vitæque diuturnioris spem, amicos convocat, inscitique medicis aliquot vini rhenani cyathos ebibit, solitas delicias ultimum ita vale illis dicturus. Dehinc tamen post vini, cujus usu assueverat, haustum siccatorumque calices, murmure in ventre obpito, liberaliter soluta alvus ægerque medicis stupentibus, celeri pede ad se, & sanitatem rediit, diuque supacites inter amicos pancreaticè vixit. *Thomas Bartholinus, histor. 40. cent. 5.*

Quendam contumax alvus tantum non ad incitas redegit, nequicquam hic solutivis, siue per os, siue per anum adhibitis proficientibus: perstat obstructio per duas vel ultra septimanas pertinaciter: venter tumore intumescit duro, cum calore p. n. gravioribusque symptomatibus: ducto igitur nodo durum quatenus esse conneum arbitratus, missi tænti emetici gr. vi. ex aqua pingui seu sapida assumenda, applicato simul supposito: hinc sequuta diu expectata alvi solutio. *Th. Hensford. Miscell. curios. ann. 73. observ. 16.*

Virgo laborabat obstructionibus: interdu vilius Pharmacopæus multis tentatis, desperatus deperata potuit. *Th. Hensford. Miscell. curios. ann. 73. observ. 16.*

Sicuri variis de causis mortales alvi profluvia inquietos reddunt, ita etiam contra ipsorum excrementorum ejectio per alvum nimis tarda eos valde molestat. Huius autem exemplum obvenit. *Dom. Samueli Cabellato Medico hic Ha-*

gæ anno 1677. In senula, quæ morbo laborans quinque amplius hebdomadarum spatio semel tantum alvum exoneraverat, primum scilicet quarto decimo die, ac deinde post trium hebdomadarum intervallum quamquam & quotidie sufficientem alimenti portionem sumeret, unde tæctum, ut ei valde anxie venter multum intumesceret, atque ipsi purgantibus opus esset. quæ licet jam ab alio Medico præscripta, injectioneque per alvum adhibita essent, illa tamen neutiquam per alvum quicquam excernere potuit, quare supra dictus Medicus ipsi tæctum præparantem, & simul purgantem mixturam præbuit, atque hinc nonnihil singulis horis cochlearim sumere jussit, quod cum illa per duodecim quatuordecimve horas, uti debebat, fecisset, denud ipsi alvus enemate tortiori, atque molliori simulque purganti, ac nec quicquam tuit stimulat. Quare ejus venter per viginti quatuor horas in antecellum totus tuit sacculo emolli, ac attenuat. herbis, nec non seminibus repleto, quæ in vino albo gallico, tenuiorisque cerevitiæ simili copia cocta erant: postea autem purgans potus & sol. lenz, rhubarbo, lpec. diacath. & manna constans matutino tempore ei datus est, cujus usum tempore pomeridiano dutorum admodum, atque argillæ limillum excrementorum secuta est, terque, quaterque emissio, ipsamque famulam non ita diu post rigor, ventrisque tumor deseruit; quamquam persuaserint ei Medici, ut dictæ mixturæ usum non intermitteret; atque ita deinde ipsa convaleuit. *Corn. Stalpari vanderweil Observ. 59. Centur. 1.*

Nobilis quæ iam Matrona annos præter propter quinquaginta jam nata, ea est ab infanzia alvi stypticitate ut semel tantum intra decem aut duodecim dies eam deponat; vivit interim hilaris, nec affectionibus hypochondriacis hactenus obnoxia, appetit & vegeta est, imò respectu ætatis jam paulo provecæ, tormola, nec aliquid unquam molestius patitur quàm quando alvus solutior fuerit, unde à medicamentis purgantibus, solaque etiam rheï tinctura in leporhymis, aliaque non minus gravia deducitur symptomata. Cum nuper apud me conquereretur de ventriculi quo iam pondere atque indigestione, ipsi exhibui elixyr volatile mihi familiare, & variis promacis & theriacalibus constans, verum cum sic, (ut aliquibus evenit per aromatica & volatilia assumpta) alvus aliquatenus mota fuisset, tam male habuit, ut eo amplius uri noluerit.

### Cadaverum Anatomica Inspektiones.

Religiosa mulier intestinorum doloribus multis jam mensibus urgebatur & alvus nihil nisi ægrè & durum, idque decimo tantum quoque die reddebat. Mortuæ corpore inciso, inventa sunt intestina altiore tæcto consticta, adedque iter angustum relinquebatur ut dejectiones ægrè transmitti possent. *Benaventus de Abdin c. 30.*

Joan. Pressius, Medicus Romanus, se in cadavere Capucini vidisse asserit Duodenum intestinum undique repletum stercore coloris atrii, levi & durissimo; quod in plures partes divisum tubera ad unguem æmulabatur, sine tamen magno fetore; quod à caliditate maxima orum habuisse credibile est: Pater ille cum prius iuris, alterius-



que rei cochleari iunxerit, illam vomebat, & cum vomitu magnam pituitæ vitæ quantitatem exercebat, abique eo quod ullus tumor, ullusque stomachi & ventriculi partium dolor adesset.

Id à quo eveniat conjectari assequi possumus: nam cum pater prius fere quoties quintam totis marini essentiam iunxerit, si quis diceret ex hoc ortum tulisse; forte veram morbi causam indicaret: Medicamenta enim chymica sicut aliquando mirabiles producunt effectus, ita sæpe absque modo & mensura adhibita sunt tanquam gladius in manu pueri: facile illa quinta essentia sicut hepar excalescere; ita qualitate ignea humidum ventriculi absumere potuit. *Dum. Panatolus penec. 2. Obs 29.*

Quidam 40. annorum obstructione alvi sæpe laboravit, post mortem repertus ingens abscessus circa fundum ventriculi, ex eo genere qui ileo-matitici dicuntur, ad magnitudinem anteriori ovi, qui satis durus fuit redditus. *Ex Joach. Camerarii. Observ.*

Cuidam ante annos 30. aut 60. ita alvus pigra erat, ut non solveretur nisi clymæte aut alia arte: Hujus rei causas varias machinabantur, sed cada-veris apertio rem aliter habere demonstravit, non in intestinum jejunum ita angustum & cartilagineum est deprehensum, ut vix per illud chylus deflueret, itaque diu morabatur in eo, tum propter angustiam tum propter impeditum motum peristalticum. *Ballonius Epid. lib. 1. pag. 58.*

Nuper ex demissione difficili convulsa satis cessit N. filiola, alias ab oris sui vestibulo sana, præterquam quod in excernendis fecibus, etsi liquidis, summam patebat difficultatem, & talem quidem ut ex conatu nimio & respiratione retenta tota facies nigresceret. Exenterationi traditum corpusculum. Inventa viscera omnia sana, præter intestinum ileum, in quo tres nodi una fere spicula inter se distincti visendi erant; in horum quolibet magna portio hujus intestini, ipsi mententerio non adhaerens, abscondita latitabat: *Ex observ. D. Matth. Franc. Herodi Medici Moravi in miscell. curios. anni 1670.*

Septennis puella diarrhœa corripitur: à mulierculis largè cydoniarum illi exhibetur; alvus inde omnino restitit: hinc tormina, dolor ventris, mors. Aperto cadavere, circum intestinum ad cydoniato obstratum deprehenditur, ut illac nihil pertransire posset. *Fernelius Patholog. lib. 6. cap. 9.*

Cuidam gravis affectus alvum prorsus cohibuit, qui tandem ventre supra modum intumescente decessit: è visis, inventum est colon usque ad pinnitâ infarctum ut solidum prorsus censeretur, nihilque omnino fecis in alvum delabi sineret. *Fernelius Patholog. lib. 6. cap. 9.*

Mirum quod cuidam per totam penè vitam contigit; alvus nil penè reddebat nisi liquidum, aut sollicitata pharmacis: nesciebatur quo id esset referendum. Aperto cadavere, repertum est in medio unius crassi intestini annulus crassus & durus, qui mediam penè intestini partem occupabat: sic crassiora excrementa non poterant transmitti: *Ballonius Paradigm. 30.*

Uxor N. parvi vicina, post comestionem fructuum horariorum & lactis; superhausto magno haustu cetevisæ frigide, statim incidit in dolorem in latere sinistro sub regione Hepatis cum alvi adstrictione. Secto corpore 30. post die mor-

tus inventa est in eo loco pars intestini coli putrida & denigrata. *Observat. D. D. J. Hefsi.*

Alius cum intemperantius cœnasset, incidit in dolorem ventris circa pubem acerrimum, cum sensu caloris & adstrictione alvi. Secto mortui corpore, invenimus colon circa illum locum plane putrefactum, ita ut etiam ad levem contractum plane rumpetur. *Idem ibidem.*

Fœmina, quædam uterum gerens, per omne tempus gestationis, neque minus ultimo mense, totas dies indelincenter a summo mane in multam noctem acutabar, perpetuò sedens, in seie quasi contracta & incurvata, prono capite, ut solent acui intente: hinc in ventris tantam constipationem incidit, ut 10. 15. 20. etiam diebus, ne semel quidem alvum deficeret, id quod illa parvi faciens neglexit, pergens quousque poterat tum sedendo tum nens; donec præ incalabili ventris tumore & dolore (quorum utrumque ex alvi strabus retentis contractum erat) ledere ulterius ac vere non posset: Decumbit tandem misera, tormina ventris ejusdemque tumor, inleque orta anxietas, crescent in dies, ac in tantum augentur ut res in extremo periculo videretur esse omnibus quotquot illam adhaere: Suppositoris & clysteribus ad alvum ciendam vel dolorem leniendum ne proficerebatur quidem tantillum: Clyster enim qualiscunque vel quantuscunque injectetur, in recto nonnihil tantum inhærebat (ut res tandem patuit) intestino, paulo post regressus, nihil prorsus secum educebat; Partus insuper labor, durantibus his ventris torminibus, illam occupat, accersitque Obstetricæ fœtus, celi immaturior, vivus tamen editur sic rectè: At etiam si fœtus egressus esset, ne tantillum quidem detumescerent venter, sed idem, ne dicam major, & tumor atque renitentia & dolor permanebant, ut res aspecta etiam terribilis esset adstantibus, existimantibus fore ut jam præ nimia tensione rumpetur venter: Quid multa? diem suum ægra obit, ipsamque rogans ut sibi mortuus aperiretur & inspicerebatur venter, factum. Ibi verò colon inventum (lecto peritonæo & sublato omento) primum omnium è sede sua emotum seie oculis offerebat, totum gangrenosum; color ex cæruleo rubicans, qui color etiam per abdominis musculos, & cum, nimia extensione extenuatam quidem illam, transparebat: Ea verò intestinum illud apparebat magnitudine, distentum scilicet merito stercore, ut amplioris canthari, cui pueri etiam caput inseri posset, capacitatem referret: Reliqua verò intestina superiora omnia statim maxime turgabant, supra modum: hinc colon, ea parte quæ in sinistro latere à rene descendit (urgentibus inde flatibus intestina elevantibus, hinc verò stercoreis copia, extensione intestini secundum crassitiam seu profunditatem, illud brevius reddente, quasque contrahente illud secundum longitudinem) è loco suo discesserat usque ad umbilici regionem: sub eamque intra ductum rectorum musculorum abdominis conticiebatur, a ventriculo recta in medio descendens: Hinc abique dubio ipsius coli inferius, qua parte recto intestino continuatur, contorsione facta, tota à fascibus & flatibus exituris, clysteribus verò intraturis in universum præclusa est: Tanta verò ex perforato colo fecidissimarum fecum illuvies effluebat, ac si jumentum aliquod maculasset. Atque hinc manifestum est quid gravidis conferat multa



vita sedentaria neglectaque alvi dejectio, maxime vero ad ultimum usque gestationis mentem producta. *Ex observationibus Franc. Tidici Medici Thoruntensis horussii.*

Nobil. N. jam in ienio constitutus, alvi suppressionem incurrit, quam arceat tentantur Medici medicamentis & clysteribus, quæ nihil per interiora educebant: exhibitum quoque oleum amygd. ad 3 vj. pondus, quod tamen nec ipsum quicquam eduxit per interiora: Ultimo loco ceream candelam, per anum indidit, cujus portio ad cubitalem longitudinem intromissa, nitida, nullisque facibus deturpata extracta fuit, nulla tamen nec proinde excretionem sequuta: Aquæ thermæ quoque ex aquario propinatæ, quæ & ipsæ ad intra corpus dentæ nihil profecerunt: Quæ ab ii. decubitus die extinctus, cum febris valida & indeficiens supervenisset. Cadavere aperto; Intestinum rectum, in parte superiori, ita per digitum transversum longitudinem coarctasse ac coivisse repertum, ut vix tenuioris funiculi crassitudinem æquaret; utrinque in confinio intestinali partibus in tumorem quandam velut glandulosum elevatis: ex quo factam quo minus fæces in superioribus intestinis genitæ, per constrictam, familiaremque regionem naturæ detraherentur; quinimò nec thermalis aqua coangustatam partem potuit pertransire, sed in monoculo congregata reposita.

Intestina quidem non solum ex humorum repletionem, sed etiam ex acrimie humorum, frigidaque ac vitæ pituitæ redundantia, atque etiam ex intemperie sola dolere posse omnibus compertum est, quinimò & ulcera frequenter patiuntur, & Apoplemie corripuntur atque etiam suppurantur, ut docet *Galen. cap. 8. lib. 7. de loc. affect.* At quod aliqua in parte ita arefiant ut transitus per illa intercipiatur, rarum admodum est nec antiqui scriptores, quod meminerim, docuerunt, neutri itaque animalium intestina atre intorqueri seimus, sedibus parandis in lyxæ, testudinis aliorumque instrumentorum musicorum utrum, ita & aliquando ex ignea humoris aliusque caliditate ita areheri in corpore humano intestinum contingit, ut in chordæ seu funiculi formam redigatur, ut nec spiritus quidem transitum admittat: Quod vero in corpore humores ignei generari possint & adurentes, nulla probatione indiget, qui in intestinum aliquod prolabentes istud arefacere possunt ut ex igne lora & membranam paginam arefieri; atque ad minimum redigi conspiciamus, quod in ipso narrato factum censeo, qui cum ex ætate ad venereos congressus minus aptus esset, frequenter ad excitandum veneris stimulum pharmacis quibusdam calidissimis utebatur: Quod vero in toto ægritudinis tractu nullus vomitus excitatus fuerit, causa fuit quod non intestina tenuia & superiora laborabant, sed duntaxat inferiora crassioraque, unde quæ per os ingerebantur, libetum è ventriculo ad intestina, ad eam usque affectam partem transitum habebant, ita ut mesentericæ venarum medio, ad Hepar delatum alimentum corporis nutritioni distributum inferire posset: fæces vero ex valida calida intemperie multum exsiccebantur, atque in variis intestinalium anfractibus collocabantur, in quibus non solum per dies, sed & per mensem, nulla insigni noxa suboriente retineri posse non semel observatum est. *Marci. Donatus hist. mirab. lib. 4. c. 10.*

Mulier robusta, sexagenaria, nihil excrevit per alvum spatio novem dierum: Aperto cadavere, inventa pars illi tota inferior coarctasse, ut nihil hac via pertransire potuerit. *Bartholinus centur. 6. observ. 38.*

Fœmina quædam, per septem vel octo annos, vix unquam sine medicamento fœces depoluerat: vel si quando sponte sua, post ingentes conatus deponebat, albidæ illæ erant: quibus vero Medicina tulera auxilium, iisdem & coloris sui tincturam & suspensionem dabat non satis bilem a sanguine separari, augebant hanc pustulæ rubræ per totum corpus, sed maxime circa regionem Hepatis, cum insigni dolore distulæ: Durities etiam hepatis se extrinsecus tactui objiciebat: Tandem tabes cum febre hæctica miserrimum tot miserrimum finem attulit.

Avebam ego tot morborum causam penitus scrutari, sed nihil impetare potui quam ut obiret Hepar inspicerem, quod contenderem ibi latere totius mali originem, & latebat: Nam ipsum erat durum, & folliculum fellis exhibebat in sese collapsum & fere totum consumptum: haud dubie causam tam difficilium initio secessum, postea ex permixtione bilis cum sanguine, dolorificarum pustularum originem. Interim concludendum nobis reliquit, quandoquidem permixtio humorum importuna tantum corporibus creet incommodi, diligentem Medicis adhibendam curam, ut comoda semper fiat separatio maxime bilis cui separandæ præter folliculum fellis, tot fabricata est natura sagax alia instrumenta. *Theod. Kerekringius Spicil. Anat. observ. 81.*

Matrona per triennium aithra te periodico detenta, per aliquod tempus nunquam nisi clysteris aut aquis laxativis sollicitata illi alvus itum fecit officium, ad omnia autem purgantia melius se habuit: Illius vesica fellea magna, aperta nihil continuit bilis, sed lapidem inclusum habuit magnum, inæqualem, pondere 4. drachmarum officinalium: Hinc conclusimus alvi constipationem ortam proculdubio fuisse à defectu bilis: *Carolus Raygerus in miscell. curios. anni 4. obs. 2.*

Sutoris uxori excrevit 60. ætatis anno ingens tumor inter alvum ac vulvam, sed loco penitior quam ut eo vel penetrarent medicamenta pus morientia, vel ferrum abscessum aperiens: unde factum ut in dies latius se extendens, pervenerit tandem ad eam magnitudinem ut suppleret ipsi juxta alvum ac velicam: quarum partium cum non potuerit catere ulu, cavendum fuit vita.

Periculosa uti sunt duriora tubera, inter gulam ac asperam arteriam se insinuantia, sic neque sine evidenti discrimine est ille tumor qui hæret maribus inter vesicam & intestinum rectum; & feminis inter easdem partes ac vulvam intermediam: præsertim si adultus nec matureseat maturè, nec effundat tempestivè pus in se contentum: intercludit quippe sua mole exitum excrementis illac erupturis, impediendo rigidè descendat alvus, profluat vulva, vel lotium deponat vesica, quæ impedimenta occidunt infallibiliter hominem. *Nic. Tulpinus observat. 10. lib. 3.*

Juveni à duobus calculis in vesica deprimebatur eo usque rectum intestinum, ut coarctatum produxerit plurima membranosa filamenta, intertextentia tam arcte interiori i. lius fistulam, ut nihil excretorum potuerit amplius transmittere. *Idem obs. lib. 3. c. 2.*



Quidam Sutor per mensem aut ultra, feces alvi non excreverat, multis clysteribus, ac potionibus purgantibus frustra usurpatis, tandem interit; aperto cadavere, omnia intestina inventa sunt tectibus, aut alimentis, vel potulentis, omnino repleta, imitator sanguiculorum (vulgò *boudins*) quod judicatum fuit a facultate intestinum expultrice abolita provenisse. *Samuel Forminus, Observ. 18.*

Basilus per quinque ferme hebdomadas feces alvinas non deponens, quamvis catharticis superne & inferne præscriptis, tandem obiit. A raro sectus, intestina ei quorumvis ingestorum, farciminis ad instar repleta. Tecmaris in Medicina multi usus. Haud semper novimus quæ intus latent. Curandi methodus fuit optima; ast si scivissent Medici intestina, aut spasmus, aut paralyti laborare, vel nihil fecissent, vel alio modo Medicinam applicassent. Ex spasmus, aut paralyti intestinum, contenta non multum prorsus, exinde ab ingestis repleta farcimen repræsentant. Cathartica spasmus potius augere quam diminuant. Hic potuisset usurpari balneum calidum, & hoc cum rore masino, vel veneto sapone coctum calidè propinari. *Stephan. Blancard. Anat. pract. observ. 30.*

#### AMAVROSIS

Est totius lucis in Oculo impedimentum de quo vid. *Cura Serena.*

#### AMENTIA.

Vid.

#### DELIRIUM.

#### ANAPHALANTHIASIS.

Est pilorum in superciliis defluvium de quo vid. *Pilorum Defluvium.*

#### ANAPHRODISIA

Idem quod *Impotentia Venerea.*

#### ANASARCA.

Vid.

#### HYDROPS.

#### ANCHILOPS

Vid.

#### ÆGYLOPS.

#### AMBYSTIO

Vid.

#### COMBYSTIO

#### ANCYLOBLEPHARON.

Est vitium oculorum, quando palpebræ, vel inter se, vel cum alba, aut nigra oculi parte coalescunt & coherent. vid. *Oculorum vitia.*

#### ANEVRISMA.

*Aneurisma* vulgò definitur tumor præternaturalis digicis illum comprimentibus facilè cedens,

illisque ablati statim rediens cum forti pulsu.

*Partes affectæ* sunt arteriæ ubicunque æmum in corpore existant. Sic in nato post variolas aneurisma passæ est Virgo, quod testantur Act. Hassnienſia; in collo familiare est, ad medium propè sternum se extendens vidit Fabricius Hildanus; super meninges cerebri Henricus à Moinichem sub sinistra homoplata Antonius Saporri; in genu, brachiis, manibus, aliisque corporis extremitatibus per sæpe occurrunt; imò ipsius quoque aortæ aneurisma inter multa alia anatomica rara Romæ in Museo Gulielmi Rivæ, cum corac cui adhærebat in certo quopiam liquore conservatum admiratus est Joach. Georg. Ellingerus de quo in *Miscell. Curios. Ann. 1670. obli. 18.*

*Causa* ut plurimum est externa, quandoque etiam interna; *causa externa*, est vel conulio & laceratio, vel excisio atque punctio arteriæ, vel ejusdem distentio violenta, qua varix ipsam constituentes fibræ ita laxantur ut sanguini pulsanti cedant. *Causa interna*, vel sanguis vehementius saliens, præteribitque ipsam continentibus durius impingens quam ferat eandem portionis, quopiam, ubicunque æmum in corpore locata, tenuior à nativitate textura; vel humor actis sanguini commistus, interiores arteriæ tunicas erodens. Ut autem bene dignoscatur quid sit aneurisma, & quomodo gigni queat, notandum est arteriam illius veram sedem triplici lamellarum appositione constare, quarum prima sit reticularis, è nervulis, valis sanguineis, membranosis expansionibus, glandulisque eorum linibus interfectis compaginata, secunda musculosa è fibris in circulum totius atque villosis fibrulis inter se se devinctis constructa, tertia seu interior merè membranacea ex planis expansionibus constata. Quis enim sic non videt arteriæ vel vulnerata, vel exesa, tunicam ipsius exteriorem utpote mollem valisque pluribus, constata facillimè coalescere, eademque facilitate postea extendi, dum media musculosa, interiorque membranacea, tum quia sicciores atque sanguine autique succis minus irrigata, tum quia imperium sanguinis potius sustinent, aperte manent, viamque liberam sanguini pulsanti faciunt qua ad exteriorem in magnam & quandoque monstruosam molem distendendam progrediatur. Contra hanc sententiam docet Regius in sua Praxi Medica lib. 4. Medic. II. unicæ historiæ sibi à Jacobo de Back enarratæ innixus, aneurisma effusione sanguinis extra arterias, generari, nugarique seu potius delirare omnes qui putant aneurisma fieri, à fibratum ipsius mediæ tunice muscularis latione, atque exterioris extensione. Verùm hæc in parte acriter & solide ipsi adversatur Diemerbroeckius dum sic habet Anat. lib. 6. cap. 1. Parum considerat clariss. Vir, admodum turpe, maximèque indecorum esse viro docto, sententiam suam calumniis potius, quam rationibus defendere, ejusdemque adversarios probrosis dictis libentius proscindere, quam melioribus argumentis refutare. Præterea non animadvertit, quod sanguis in aneurismate contentus, non corrumpatur, nec unquam apostemata faciat, cum alioqui sanguis copiosus extra vasa inter partes effusus semper corrumpatur, & inflammationes ac apostemata generet, secundum Hippocr. Sect. 6. Aphor. 10. Item, quod sanguis extravasatus non possit sibi membranas circumjicere generare, sed quamprimum putrescat. Deni-



que, quod in tali humore ab extravasato sanguine producto non sentitur pullatio aliqua insignis (forte ad locum læsæ arteriæ exigua aliqua percipi videbitur) qualis in aneurismate continue procedit. Scribit quidem Regius medicat. suprâ citata (hanc ex casu a Backio ipsi narrato effinxisse videtur, sicut eodem libro plerasque alias ex Hortio, Valleriis, aliisque excerptis, easque, paucis mutatis, tanquam suas dividendis, ut sententiam suam hoc quod si exemplo confirmaret: verum si de eodem Backii ægro illud dictum velit, tunc historiam male proponit) in illo vulnere sui ægri ad cicatricem pene deducto, circa locum affectum apparuisse tumorem valde pulsantem, & quotidie magis magisque incrementum: sed hoc tamen de dicto Backii ægro (quem ille tanquam suum deteriorere videtur) minime verum est. Nam neque vulnus ante meum adventum, ad cicatricem pene deductum est, neque pulsatio in brachio ab extravasato sanguine tumido percepta fuit: quod testor oculatus testis. Nam ego ipse met tunc temporis Rotæodami subsistens, ad illum ægrum a Backio ipsi narratum primus vocatus fui, cumque læsam arteriam profundo loco suam esse, totumque brachium ab infuso inter musculos sanguine admodum intumescere, nec sanguinis ex arteriæ effluxum ullo modo sili posse, atque hinc ægrum brevi moriturum animadvertens, nisi cito remedio occurreretur, consilium dedi de brachio ad locum vulneratum abscindendo, seu extirpando, ut tali modo læsa arteria videretur, ac vel ligatura, vel cauteriis actualibus constringi, sicque æger in vita servari posset. Tunc mox secundus fuit advocatus Medicus Jacob. de Back, qui suasie atque ad extirpationem deveniretur, prius aliud experiri, scilicet brachium superius fortissime ligare, sicque omnia vasa simul constringere, atque tum rapim discissis musculis, læsam arteriam querere, & inventam filo cerato ligare. Mox dictum factum, nam periculum erat in mora. Incisione facta, sanguis valde copiosus inter musculos effusus, mox effluxit: sed nulla ibi pellicula sanguinem continens observata, nec de tali pellicula observanda cogitatum fuit, imò nec sanguis tanto tempore inter musculos subsisterat, quod talis pellicula generari potuisset, (si modo generari aliquando queat) nam secundo die ab infecto vulnere hæc acta sunt. Inventa & ligata læsa arteria, solutaque mox injecta superiori brachio ligatura, alii que topicis convenientibus adhibitis, æger noster præter expectationem servatus, & brachium bene persanatum est. Interim ex ipso casu, vel cæcus videat, istam sanguinis inter musculos effusionem non fuisse aneurisma, etsi Backius hoc ita male putaverit, & de circumjecta pellicula magnum sibi somnium finxerit. Certe miror quoddam Regius tam facile sibi aliquid persuaderi sinat in re quam ipsemet nunquam vidit, (nam hæc sua sententia satis ostendit se verum aneurisma nunquam vidisse, vel novisse) & ex eo mox novum, & tam firmum doctrinæ Medicæ fundamentum constituat, ut alios, contrariam seu aliam opinionem bono jure sustinentes, negari, imò delirare existimet, & dicat, cum potius delirii suspicionem ægrè effugere possint tales *phrenetici*, qui sua tantum inventa & excogitata tanto cum stupore admirantur, ut aliena quædam, etsi suis multo meliora, cum vi-  
lissimo quodam despiciant, atque respiciant, & ex

aliorum falso relatu mox regulam medicam constituisse, quam verè sententibus assentiri valent. Hæc ille. Interim tamen non solus in ea est sententia Regius, quod scilicet sanguis ex disrupta vel infecta arteriâ inter musculos effusus aneurisma faciat; jam enim Antonius Saporra libro de tumoriis, inter aneurismata recenset tumorem inter musculos intercostales situm, è quo disticto sanguis copiosus, sed solidus protulit, qui mox putrescens illius loci vertebra & costam ita labefecit, ut cariosa sibi vitalis. Sic etiam Paul. Barberte in praxi medicæ, assensit se in aneurismate (quod ægrum occiderat) vidisse copiosum sanguinem, tam terotum quam gummosum; tunicas arteriæ utraque erosas, & claviculam finitimam maxima ex parte carie exesam. Imò Henricus à Moench de aneurismate meningum cerebri suppurato verba facit in Act. Hoffm. Anno 1671. 1672. observ. 78. Verum hoc nihil pro sententia Regii defendenda facit, nam in historiis à Saporra & Barberte allatis, quis non videt arteriæ tunicam exteriorem tantum per plurimum annorum pullationem fuisse distentam, ut tandem abumpere-  
tur, sanguinemque inter musculos effundi permitteret, ubi putrescens cariem ossium vicinorum continuè crearet, tunc verò aneurismatis nomine: propterea & etiam amplius non venit, sed potius abcessus ex aneurismate. In ultimâ verò ex Henrico à Moench recensita, quandoquidem Vir clariss. post mortem non videri communicationem immediatam tumoris cum arteriâ cerebri meningum, quis non facile credat hic non fuisse aneurisma, sed potius alium quemcumque demum tumorem meningibus cerebri insistentem per earumque pullationes pulsantem. Simile quid mihi videtur con-  
tingit ab aliquot annis in puella annos decem nata, quæ tumore à clavícula dextra ad medium prope sternum descendente, uris colore quam minime interrim imminuto, afflicta, me in auxilium vocavit, tumori admota capius manu tantam temper ipso pullationem ostendi, ut minime dubius pronunciaverim cum alio etiam Medico Celebrissimo, illic subesse aneurisma, cui vel attingere sacrum erat, ne sic scilicet disruptio lethalis maturaretur, interim tamen post aliquot dies tumor ille pulsatorius per se apertus est, ingentemque copiam puris laudabilis effudit, juvenulaque post decursum & cicatrizationem ulcus bene convaleuit, & adhuc dum sana vivit; mirari metum tubiæ quo demum pacto hic tumor tam impetuosè pulsaret, sed re accuratius pensitata vidimus illum in musculis intercostalibus, & super pleura enatum, saccum grandiore efformasse, qui ipsius cordis corpori inniteretur, ejusdem vibrationes, quasi sibi proprias nobis exhibiturus: Ea propter cor quasi in continua erat suffocatione, quod nos impedita ex parte circulationi per grandius illud aneurisma tribuebamus.

*Signa aneurismatis diagnostica* sunt, tumor nunc magnus, nunc exiguus, cum pulsu, colore & nativa cutis constitutione non diverso. Mollis est tumor, & digitorum impressioni sic cedens, ut si is forte sit exiguus, penitus dispareat, sed mox sublati digiti pari regrediatur celeritate. Quædam aneurismata, ut adnotat Vigierius, non modo cum comprimuntur, sed etiam ex se sibilum edunt, admota prope aure, sensibilem, sed hic in majoribus aneurismatibus, seu iis qui maiori-  
bus insident arteriis non subaudiunt. In vetera-  
tum



tom aneurisma minus pulsat, minusque tactui cedit.

Ingentia in axillis, inguinibus, collo, aliisque insignioribus valis insidentia, curationem aliam non admittunt quàm palliativam; itaque huc monendi veniant tyrones, aneurismata temerè, nisi forte exigua, & in parte ignobili, non aperiunt; imò caveant ne cum imperitis habeant illa pro abscessibus suppuratis, aperto enim tumore jugularetur æger. Lethalia in genere creduntur in illis qui à morbo gallico curari volunt.

Curatio est vel pro impediendo aneurismate post punctam arteriam; vel pro eo incipiente reprimendo; vel pro eodem jam aucto in arteriis minoribus, vel medicamentis, vel operatione, sanando. Arteriam puncta, statim secerur vena in latere opposito, partique affectæ apponantur medicamenta styptica, qualis est succus plantaginis sale communi imprægnatus & inspissatus, item liquor ex eo quod in sublimatione primi entis venetis ex colectorare restitit, elicitus; item aquæ stypticæ Weberi, Charaz, & l'Emery; hisce strictius superligata laseina plumbea, vel quod tutius est sæpe renovatis medicamentis stypticis, prestius interea continuo & indefinenter impositis loco affecto per quatuor aut quinque dies (imò plures, si necessum fuerit) plurius hominum, per vices hocce in negotio intervientium digitis, quibus scilicet non tantum arteria excita constringatur, sed etiam ita firmetur, ut prædiorum beneficio pulsanti sanguini non cedens, per omnes suas tunicas coalescat, sicque aneurisma minimè enascatur. Advertendum autem, si deficient homines hæc in cura adhibendi, dum eadem vi ligaturæ peragitur, illam sapius esse immutandam, ne scilicet constitutione fortiori sine ulla prorsus intermissione continuata, gangrena oriaur. Curiosum est quod observat Horstius & ex eo Hæserus, laudanum opiatum arteriæ punctæ applicarum hæmorrhagiam momento sistere. Aliis expectum est hoc cataplasma. ℞. pulver. sumach, hypocistid. acacia; sangu. dracon. aloës, thuris ana ʒj. Ex his cum album. ovi subactis fiat cataplasma, seu ceratum addita loco ceræ, emplastri contra rupturas particula, applicandum autem est statim in principio, ita ut tangat arteriam vulneratam, quæ sic consolidetur, ubi verò grumus sanguinis est collectus, immediatum remedium cum arteriæ vulnere contactum impediens, frustra admoventur. De Galeni medicamento ex thure, aloë, pilis leporinis & albumine ovi, tanquam omnibus noto, hic nihil addimus. Lamina plumbea, vel sola applicata, vel succo plantaginis illita cum arctiori ligatura, aneurisma non tantum ex vulnerata arteria arceat, sed etiam illi efformato palliativè quàm commodè medetur. Incipiente aneurismate illi mox enarratis medicamentis occurrendum, quibus alii addunt emplastrum e scoris ferri Montagnanæ, de quo vide in sequent. item sperniolam Crollii &c. Hartmannus tale libi probatum habet. ℞. Ciner. sicum ʒss. ceræ ʒj. rebinth. ʒij. M. F. emplastrum extendatur & applicetur sæpius; aliquando balsamus sulphuris adjiciendus est, nonnunquam terra vitrioli putificata addenda.

Efformato aneurismate, vel incipiente remediis descriptis non cedente, si in arteriis majoribus, collo, inguinibus &c. fuerit, non alia cura quàm palliativa, per adstringentia enarrata, &

ligaturas mediocres, erit tenenda. Si verò in extremis, minoribus arteriis, locoque operationi apto sitis reperiat, tentari poterit Hildani cura in sequentibus exhibenda; item illa quam Esculapio Pariliis ut ipse narrat vidit peractam in aneurismate dimidium ovum æquantem. Astantes scilicet superiorem aneurismati arteriæ partem digitis ita comprimunt, ut post aperturam infra in ipso aneurismate instituendam nihil amplius sanguinis effluat quàm quod ipsum continet aneurisma, quo evacuato quam accuratissime, foramini arteriæ globulum magnitudine pili ex vitriolo cyprio ad albescentem calcinato bombace probe involuto adponunt, hinc inspergunt vulneri aperto pulverem ex thure & colophoniam, reliquam cavitatem replent plumaceolis digestivo ordinario illitis, posteaque vulnus ligant & fasciant, quotidie remouent plumaceolos superficiales, ut in tumoris labiis enatum pus evacuetur, ipsum verò globulum & immediate superinjectos plumaceolos, nequidem tangunt, sed sponte cadere sinunt. Unde fit ut solum tenuissimum vitriolum arteriæ apertæ labia nonnihil tondat, simulque blande ita adstringat, ut prædicta labia novo quasi vulnere sauciata, per proximum nutrimentum denud conglutinentur. Si verò exciderit globulus nondum sufficienter conglutinata arteria, novum imponunt, idemque donec scopum attigerint repetunt.

Cura autem, seu operatio in aneurismate ut dictum sit, sed per medicamenta minimè sanabili, peragenda, hæc est. Incidatur cutis loco aneurismati superiori atque inferiori, arteriæque cui insidet inventa, & nudata utrobique colligetur, aneurismaque postea apertum continuè evacuetur, & vulnus modo ordinario pertrectetur. Alii arteriæ tantum partem aneurismati superiorem colligant; alii que rursus nulla præmissa incisione acum filo cerato forti & duplicato indutam per brachii musculos e regione medii humeri profundius trajiciunt ut omnia vasa facile complectantur, superimpositisque, pulvillis largioribus atque crassioribus inter fili extrema, super iis quicquid demum filum complectitur, rectè colligant; ea ratione ligatura nec æquè dolorifica est, ac si nuda adhiberetur, nec partes colligandas præcidere valet. Postea per longum apertum tumor in cubiti flexura situs, tam præ ipso evacuando quàm pro arteria adveniendâ, quæ circumjectâ prius ligatura, excinditur, superiorque in medio humero primum instituta solvitur. Alii tandem ut Vigierius in sequentibus adnotat, aneurisma ex arteriæ laceratione efformatum filis decussatim adactis per propriam basin constingunt.

#### Curationes.

Curatio aneurismatis fieri solet aut medicamentis, aut manibus operâ. Medicamentis quidem adstringendi & conglutinandi facultate præditis, sanguinem in arteriam unde effluit solenter reponendo, atque dilatare, aut ruptæ membranæ labia utrinque admovento, & dextrè illam fasciando & continendo.

Manualis autem operatio per quam aneurisma curatur, duplex est: una sit duarum acuum operâ, quarum altera arteriam recta in longum pungit circa



circa tumorem altera verò obliquè transversum cam secat, quas in crucis formam politus, & sibi propinquas filo circumdate oportet, futuræ umbilici instar, easque simiter vincere, & tantu ibi de necesse, donec arteria penitus coaluerit, & consolidata fuerit. Altera autem sit quum arteriam detegendo, tum supra, tum infra tumorem induit illam à nervo & vena separamus; deinde filo subtus transimilo, eam solum supra tum intra ligamus & secamus, ut sit in varice, denique quod cætera morbo curamus. Nimia autem sanguinis abundantia aneurisma fieri potest, in his præcipue, qui arteriæ tunicam teneram, tenuem, & dilatatur faciliem habent. Cujus si in magno profundoque vas fiat, curatio difficilis est. Sin vas parvum est, quod videri tamen tangique possit, curari potest ut diximus. Ante operationem purgetur corpus casta recens è canna extracta. Abstinere a vino, & utatur decocto hordei, lacte caprillo, vel vaccino, hordæatis cum semine papaveris albi, caseo recenti, & admovea ut aneurismati caleus etiam recens ad formam cataplasmitis, & injiciantur clysteres sæpius in hebdomade. *Jos. Vigerius lib. 1. Chirurg. cap. 42.*

Cerata plura in ulumine vocantur, sed inter cætera laudo ego illud Montagnanæ ex scoria ferri, in suo antidoratio, quod ita se habet. ℞. scoriz ferri 3 v. mumiz, tragacanth. gum. arabic. ana 3 ii. thuris, acaciz, linaarach. ana 3 i. p. cum glutinis, gallatum cupreth ana 3 j. visc. q. 3 ii. gyph 3 ii. resin. lb i. s. f. coratum cum sugco consolid. maj. aceto & cera rubra. Emplastrum etiam ex cortice ulmi cocto suprà excepto, & appposito, deteretque a siccatione est miri ulus; quemadmodum totus cum spongia mædefecta in aceto decoctionis scoriz ferri. *Jul. Cesar claudius consulti 67.*

### Consultationes.

Egregius Juvenis trigessimum circiter annum agens, temperamenti secundum totum ad calidum & siccum vergentis fervidioris jecoris & capitis humidioris, mediocri habitus, sed fusci coloris, melancholicum succum in toto abundanter significantis, jam tribus annis à quodam vapore tenui & calido se leviter lædi observavit, qui poru meraciori evanuit, sed successit cum insigni capitis calore rheumatica affectio valde molesta, quæ per nares copiosam & quodammodo purilaginosam materiam transmittit, cujus portio ad clavículas quoque perveniens evidentes in iisdem dolores excitabat, sed & hæc spatio quadraginta aut quinquaginta dierum remissa est, succedente tumore supra claviculam dextram, qui tumor cum exiguo dolore, spinusque calore a peritis medicis cum folliculo fuit judicatus; & ideo & cauterium in parte opposita, & alia ob id administrata fuere Medica auxilia: quibus tamen parum aut nihil proficientibus, tabaci fumum sibi conferre posse existimans pater, non sine Medici assensu, tribus continuis diebus assumpsit & quidem tumor diminutus fuit, sed dolor in eadem parte successit magis, quam antea cum evidentiore arteriæ carotidis pulsatione. Cum verò Chirurgus quidam Aneurismatis futuri suspicionem Patienti significaverit, hoc inopere formidans, rigida viventi rationi

seipsum dedit, & nihilominus spatio septendecim mensium temper major atque molestior increvit affectus nempe & calor & dolor supra claviculam vertus maxillam. sed pulsatio violentior, quæ omnia ulque ad post riorum quoque capitis partem sese extendunt, sed calor & dolor ad brachium etiam pettingit sicut ejusdem speciei, cujus sensum eundem molestem percipit Patientis etiam in thorace, sine tamen pulsatione sensibili, & ejusdem ordinis calorem & dolorem tribus abhinc mensibus aut latus quoque infra septum quinque & ad coxam communicari Patientis affirmat. Mox ad nostras manus pervenit & quidem perexiguus apparuit tumor supra claviculam, de quo tantopere conquiritur, licet arteriæ carotidis solum servans, cum non adeo evidenti ejusdem arteriæ pulsatione. Præterea habitum corporis consideravimus, hypocondria quoque manibus tractare duximus, nec tamen sensibiles obstructions percepinus, nec de rugitibus aut flatuosis tibus conqueritur, sed potius de frequentibus halitibus & vaporibus caudis ab hypocondrio dextero præsertim incipientibus, & sursum per thoracem ad caput ascendentibus, & in illa parte affectu præsertim terminatis. Cum autem alios quamplures præclariss. viros consuluerit, Aneurismi in tunica magno arteriæ aortæ ipsum gestare, quæ ad carotidam dexteram propagatur, & in eadem manifestatur, suspicari fuit. Quare hac de re nostrum petiit consilium, & de agendis quoque consulit.

Aneurisma propriè est arteriæ dilatatio cum evidenti intumescencia ejusdem atque manifesta pulsatione, quæ fieri potest dupliciter, vel à solutione continui, vel à soluta unitate, quando incisa, aut rupta arteria licet unita, & sanata cure, sanguis tamen extra vasa effusus sub cute remanet, & cutem ipsam intumorem elevat: à solutione continui verò, quotiescunque à sanguine fervidiori spirituosio, copioso existente, arteria in aliqua corporis parte dilatur, quod tunc facilius contingit, quotiescunque arteria ipsa in illa parte fuerit ab aliqua extrinseca causa & præsertim comprimente, angustior redditur: spiritus enim cum fervido sanguine in transitu impetum faciens, vas ipsum pulsantem dilatat, sicque Aneurisma, sive Aneurismatis speciem excitat. Quod egregio Juveni evenisse credimus, quem, sanguinem justo calidiorum habere non est quod dubitemus, si temperamentum jecoris & totius, habitum corporis atque prægressos porus meraciores consideremus, & circa patris affectum examinemus olim prægressam capitis destillationem non ad nares tantum, sed ad clavículas pervenientem, & molestiam inferentem, cui successerat frigidus tumor, à peritis Medicis sine pulsatione observatus, unde meliceridem esse potuisse suspicari fuit, atque tantem imminuto tumori, post assumptum tabaci fumum, arteriæ carotidis dilatatio ac evidentiore pulsatio, fervidiori nempe spirituosio reddito sanguine, qui à trunco aortæ per ramum tubelavium, indeque per carotidam ascendens, antequam ad bifurcatos ramos internam & externam constituentes perveniat, à cathartici materia relicta eidem arteriæ circumposita & compressa & impedito libero transitu, ac propterea impetum faciens, pulsationem potentiorē tractuque temporis dilata-



tionem majorem necessario induxit: ipse vero sanguis cum spiritu quodammodo retrocedens, ob occurrentem difficultatem, concitatori motu ad subclavium ramum divertit, a quo primò propagatur arteria cervicalis, unde calor & dolor in cervice, sequuntur deinde rami scapulares interni & externi, inde thoracica superior & inferior: subclavio autem continus est ramus axillaris, à quo & rami ad cubitum propagantur, quibus omnibus partibus per ramum subclavium communicatur molestus calor, & quodammodo dolor, citra pulsationem.

Verum quoniam tribus abhinc mensibus conqueri quoque cepit de ejusdem tumoris calore & dolore in inferiore ventre naturali, quò non perveniunt rami subclavii cum carotidibus consentientes, sed cœliaci à trunc. o arteriæ magnæ descendentes emanantes, & nullam omnino cum Aneurismate communicationem habentes; & præterea in præiens pariter & de eodem calore, atque dolore querelæ incipiunt in altera quoque clavicula idèd uos noxam multò magis in sanguinis conditione consistere, quam in carotidis dilatatione, jure merito credimus: justo namque palidior & fumosior existens, affectum localem in collo non solum primam originem præbuit, fovet atque conservat; sed plures alias corporis partes afficit, & hujusmodi affectum majorem quam sit, Patientis imaginationi repræsentat, cujus consideratio non parùm ad curationem conducere poterit.

Quomodo autem Aneurisma in trunc. o arteriæ magnæ fieri possit non videmus, sicuti nempe in magno ramo subclavio, sine insigni & evidentissima omnium enumeratarum arteriarum ab eodem subclavio emanantium pulsatione, quoniam insigne quoque esset Aneurisma in adeò magno & insigni ramo constitutum, præterquam quod circa jam dicta omnia observatione dignum nobis videtur, quod in Aneurismatis definitione, dolorem nunquam reposuerat ipse *Galenus*.

Affectum hunc, si Aneurisma vocari permitamus, mitioris tamen conditionis esse dicimus, quoniam nec modò difficilis aut rupta sub cute existit ipsa arteria, neque ante hac discissa aut rupta fuit, moxque agglutinata, cum utroque modo verum atque legitimum Aneurisma produci posse asserat ipse *Galenus*; Quare sine prægressa arteriæ carotidis læsione & potius ex sanguine arterioso non solum plurimo spiritu sed copioso quoque statuofo & fuliginoso vapore refeito, accedente exiguo illo tumoris externi scopulo, ortum habuisse putandum, & idèd non adeò magni faciendum, imò sperandum fore ut correctæ & ad probiorem conditionem massa sanguinea redacta, affectus imminutionem potius, quam augmentum sit suscepturus; sicut non adeò tutum esset affectum ipsum negligere.

Curatio igitur hoc apto & opportuno anni tempore incunda primas vias expiando. Secundò humores in cavis viscerum deturbando. Tertiò massam sanguineam à calido & exusto humore vindicando. Quartò fervorem hypochondiorum, jecoris & venarum contemperando. Quintò evaporationes sistendo & sanguinis crassitatem ad lentorem potius & visciditatem convertendo: atque tandem arteriam ipsam refrigerando & excitantibus adstringendo & roborando.

Pro quibus explendis intentionibus, à fonte

Chirurgico non unica, sed multiplex depromenda sanguinis missio, nimirum ex utroque brachio & tandem ex pede lateris affecti, nisi aliqua adesset ad venas hæmorrhoidales propensio: tunc enim pro veni pedis, venæ hæmorrhoidales esse aptæ. Cauterium jam inultum custodiatur, & alterum in coxa altera affligatur.

Ex pharmacia primas vias inundantia depromantur, syrupus rosar. solut. & manna clarif. vel electuarium lenit. & cassia: Deinde quinq; diebus præparans exhibendo ex jussu pili acet. & aquæ citri ana ʒij. deinde repetatur leniens ex syr. rosar. & de polypodio, vel lenit. & cassia cum tartaro, quibus superbibat jus hordeo vel malvâ altetatum. Deinde ad ulteriorem præparationem deveniendo succis potius depuratis, quam syrupis saccharatis; præbeantur itaque succi depur. & per arenam trajecti, cichor. boragin. malv. poin. dulc. ad ʒiv. addito decocto malv. viol. meliss. & hepaticæ; in quorum succorum usu decem diebus perseveret; sed sexta die allumat cassiam cum pilul. de tribus, cui post horam superbibat serum ad ʒij. & tribus horis ab assumpto sero prandeat. Reliquis verb quinq; transactis diebus sumat medicamentum ex cassia, lenit. & elect. de succo rosarum, cui pariter superbibat serum. Repetat deinde succorum usum & sequenti die allumat floris cassiæ ʒij. rhab. opt. ʒj. m. f. boli, quibus post horam superbibat siccicapr. depur. libram, & tribus horis ab assumpto sero prandeat, tertia verò die repetat succos; quarta bolos, ut supra: & ita perseveret usque ad decimum quintum diem, tuncque præbeatur.

℞. Decoct. epith. mel. syr. ros. solut. ana ʒij. aquæ florum citri parum, m. f. potio cui, incipra evacuatione, superbibat siccicapr. ʒij. & duabus horis ab epoto sero prandeat. Potio hæc duabus aliis vicibus tertio aut quarto die repetatur, siccicapr. dosim augendo, & intermediis diebus succos depuratos offerendo.

His peractis ut reliquis intentionibus satisfiat, ad aquas terreas vel acidulas contagientium, & quidem ad sistendos halitus ascendentes, imò & ad sanguinis impetum remorandum, virtuosiores in valle solis nascentes, opportune essent: at si ad eas seipsum conferre noluerit Patient, substituantur Vi lentæ, quas tamen ab amico per aliquem fidelem custodem transmitti hæc curandum, alioquin iisdem parum fidere possumus, tuncque potius Nocetiana, sed legitima, esset eligenda: licet enim nec terrea, nec mineralis sit, hæbet tamen in fundo terram samiam refrigerandi & quandam alstringendi facultatem obtinentem; præbeatur autem primis tribus diebus cum vehiculo de-  
fectorio, reliquis verò diuturnis, quod apud nos esse solet aqu. stillat. capill. ven. ononidis, malvæ, ad ʒij. ʒ. addita ʒ. ʒ. spir. tart. rectif. necnon succo unius limonis primis duobus cyathis aquæ porant. Terminato aquarum usu, usus lactis asinini primis viginti diebus, & mox caprini aliis quadraginta nullo modo omittendus, ut quod jecoris & hypochondiorum fervorem remittere, sanguinem refrigerare, probiorem reddere, magis dentare; & ejusdem impetum cohibere valeat: Balneum quoque dulcis a uæ locum habere possit, totius corporis habitum retrig. rando & humectando, & humores quoque cogendo, si frigidum & hernis refrigerantibus, agglutinantibus & alstringentibus alteratum fuerit. Verum quomodo



niam extrinsecus densando, astringendo, & calore ad interiora pellendo, fundendi vim obtinere suspicamur, ideo Adstantis excellentiss. arbitrio utrum remittimus, collum tamen omnino excludendo. Tandem aliqua topica ad usum revocare non inutile fore existimamus; pateret itaque emplastrum nocturno tempore parti affecta linteo eodem illito, apponendum, ex albumine ovi, addito pulvere croci marris confectivi; vel ℥. vitrioli. rom. ad albed. calcin. ℥ss. aq. plantag. rosarum, portulacæ, ana ℥ss. m. & spongiola imbuta saepe tangatur pars affecta vel ℥. tinctura martis ℥ss. olei tartari ℥ij. aq. stillat. & baccis cupressi ℥ij. m. & spongiola intincta pars affecta tangatur, vel noctu lintheum madefactum apponatur.

Quibus omnibus congrua vivendi ratio erit addenda, nec tenuis nec atrox, sed incassans, adeo ut edulia ex lacte & pasta parata, sine alacritate permittenda, ita fructus & olera frigida; potusque sit vinum austrium, lintalo tubro medicatum: aut aqua albis lantalis alterata, chinam & reliqua fundentia omittendo, sicut statuta omnia necnon calida & vaporosa. Quæ omnia jam dicta Excellentiss. Adstantis iudicio, non solum executioni mandanda, verum & alteranda, & commutanda libenter committimus. *Raymond. Jo. Forst. consili. T. 2. cent. 1.*

Vir Nob. trigelimum sextum annum agens, temperamenti totius calidi & licci, fervidioris verò cordis & hepatis, ad operationes obeundas promptissimus, libera vivendi ratione semper usus, duobus ab hinc annis consuetudine gracillior factus est, cum prius copiosi flatus in abdomine observari fuerint, cum hypochondriorum tensione & insigni arteriæ magnæ pulsatione, cum evaporatione in cor & aliqua difficili respiratione, cum alvi stypticitate & aliquo dolore in hypochondrio sinistro, ad mammam usque sese extendente. His accesserunt lassitudines ulcerosæ in partibus musculosis, ad motus impotentiam inducentes, ita ut ferè continuo decubere cogereetur. Jam dictis omnibus addebantur vigilæ, somni turbati, cum moribus convulsivis & totius corporis concussione, non sine timore atque anxietate. Interim dum quotidie magis semper emaciabatur, dolor in parte pectoris sinistra augebatur, cum motu pulsativo ejusdem partis, & ideo nonnullis Medicis Phlebotomia imminenti, aliis, cordis palpitacionis suspitionem faciebat. Tandem anno elapso, post vehementes dolores progressos, tumor in parte pectoris sinistra apparuit, in intersticio secundæ & tertie costæ infra claviculam, qui paulatim excrevit, & hucusque ferè ad ovi magnitudinem observatur, cedit autem tactui, sed pulsatio vehemens, eademque cum pulsu ordinata percipitur absque ulla coloris mutatione. Varia ac non adeo appropriata adhibita fuere remedia, quibus tamen hypochondriaca symptomata non parum remissa fuere, sed tumor pulsatilis semper majus incrementum suscepit, perseverante quoque totius corporis macie. Modo a nobis consilium & auxilium petit.

Hypochondriaca affectione simulque melancholica duobus abhinc annis correptum fuisse Nob. Virum non est quod dubitemus, siquidem sola statuum copia, non solum naturalem regionem, verum & spiritalem infestans, hypochondriacum affectum à Galeno statuosum nuncupatum, constituebat, quem excrebant reliqua

symptomata, nimirum difficilis respiratione ob compressionem septi, sicut ob compressionem arteriæ magnæ & spirituosæ sanguinis fervorem insignis percipiebatur ejusdem pulsatio. Afflictam autem in lancholiam designabant, primo timores & motores insoliti, sicuti mox licetis tentio, cutidis oppressio, vigilæ & somni turbati, cum totius corporis concussione & musculorum lassitudine ulcerosa à continuo acro vapore, & illius exhalatione proveniente, unde Hippocr. si aliqua pars supore eliditur, melancholicum signum esse dicebat. Hæc autem omnia à viscerum & sanguinis effervescencia primam originem duxerunt, cum calor usque ad trigelimum quintum annum semper auctor redolere soleat, præsertim si non cauta, sed libera addatur vivendi ratio; Ab interiori verò calore concoctiones, tum in ventriculo, tum in jecore detrimentum pariebantur, & ideo à ventriculo cruditates, indeque obstructions oriebantur, à jecore verò sanguis imputus & julto calidior producebatur, qui à servidiori corde non adeo depurari poterit, ut ad totius nutritionem idoneus evaserit, unde mirum non est, si macies totius subsecuta fuerit, & quod peius est, cum fervidus, acris & acidus sanguis ipse à corde per arterias delatus, una cum spiritu statoso in ipsas arterias impetum fecerit, & arteriam mammariam externam sinistram imbecilliorē inveniret, eandem primò intrinsecus dilataverit, ad cujus dilatationem continui solutione secuta, dolor quoque emergebat internus, qui quotidie magis intendebatur ad majorem arteriæ dilatationem, paretur arteria pervenerit, & tumorem apparentem excitaverit tactui cedentem, sine ulla coloris mutatione cum aequali motu atque cæterarum arteriarum eadem pulsatione, Aneurisma communiter & propriè appellatum. Ad eandem verò arteriæ dilatationem, vel ruptam esse internam ejusdem tunicam (vel cum aliis) squamulas unice tunice crassioris existentis, attenuatas discissas atque consumptas fuisse certo credendum, & tunicam ipsam ad insignem tenuitatem redactam omnino existimandum, si mammariæ arteriæ naturalis exiguitas consideretur.

Quibus ita se habentibus, non erit in arte vetstus qui non videat postremum hujusmodi affectum, nimirum Aneurisma incurabilem esse, & imminere periculum, ne arteriæ tunica sub integumentis dirumpatur, tuncque infra paucos dies Patientem interimat: ruptionis autem indicium præbet, non solum tumor confectum in majorem molem elatus, sed & color tumoris ex albo in rubrum atque cruentum mutatus. Non tamen est deferenda palliativa curatio, ut vitam protrahat Nob. patienti, cum nobis curatio vera atque legitima impossibilis videatur, quam aggredi non possumus, nisi vinculo ad latera tumoris arteria alligetur cum Paulo & aliis antiquioribus necnon Recentioribus multis; vel saltem alligata parte superiori juxta sanguinis circulationem postremò observatam, quam ligaturam, vel arteriæ punctiōnem facere impossibile est, & ideo impossibilis quoque evadit legitima curatio.

Ut igitur Nob. patienti aliquam opem feramus, viscerum obstructions relictæ sunt humectantibus referandæ; sanguis depurandus & demulcendus; eorundem viscerum sanguinique fervor contemperandus; totum tenuiendum, atque tandem tumoris incrementum altringen-



tibus, refrigerantibus & exsiccantibus impedendum. Pro quibus intentionibus exsequendis, aliqua sunt hoc etiam incongruo anni tempore agenda, alia vero in ver venturum sunt differenda.

In praesens igitur ex fonte Chirurgico depromenda est aliqua sanguinis missio, liquidum peccat sanguis quod sitate, substantia & motu, eaque saltem semel in mense ex venis sedalibus. Praeterea locum habet cauterium coxae sinistrae inustum, tum ad revulsionem, tum ad actis atque acida serositatis evacuationem. Proderunt praeterea frequentes pedum lotiones aqua calente ante coenam.

Topica tumori admovenda, varia & multiplicata esse poterunt, sed selectiora apud nos erunt. Albumen ovi in quo dissolvatur pulvis boliarum orient. Item aqua stillatitia ex albuminibus ovorum & succo agrestis in qua dissolvatur pulvis aluminis cruvi; vinum quoque nigrum aulem cum herbis atque radicibus vulnerariis ebullitum atque linteo appositum. Efficax est ceratum de pelle aspergina, demptis calidioribus ingredientibus. Efficacissimum autem erit oleum saturni, live saturni balsamum, ex oleo ejusdem & myrrino paratum. Ex internis medicamentis, in quibus ducat flor. cass. ad ʒij. sub coena; summo mane vero bibat emulsionem ita parandam.

℞. sem. cucurb. ʒss. amygd. dulc. num. xii. nucleorum pineorum nu. xx. m. contundantur, & postea addantur juris pulli aut vini ʒ viij. & f. emulsio, eidem addendo sacchar. albi cochlear; horum enim usu exierat obstructions nonnihil emollii, jecoris & cordis fervor contemperati, & sanguis dulcior fieri poterit. Vere autem venturo (si Deus dederit) purgatio regularis erit incunda primas vias capiando, primo flore cass. addito crem. tart. aut syr. ros. solut. mox preparando humores quinque aut sex diebus julap. acer. aut crem. tart. aqu. flor. citri dissoluti; ut inde sequens sit evacuatio syr. ros. sol. & de polypod. cui portioni superbibat. Pateriens, feri capr. aut asin. depur. ʒij. Mox ad ulteriora praeparantia & depoluerentia erit deveniendum nimirum, ad succ. depur. cichor. endiv. lonchi ad ʒij. in decoct. cichoraceo, additis foliis malv. & viol. in quorum usu perseverandum ad quindecim dies. & prima trima hebdomada, praebatur cassia cum elect. de succ. ros. cui medicamento post horum superbibat feri capr. aut asin. depur. ʒij. citius vero hosti ab assumpto sero prandeat; quod idem medicamentum repetendum in fine jam dictae praeparationis. Interim sanguis erit emittendus ex sinistro pede ratione revulsionis, sicuti in progressuurationis erit repetenda missio ex brachio dextero diversionis gratia.

His peractis feri capr. usus dejectorius locum habebit ℞. Syr. ros. sol. ʒv. feri capr. aut asin. depur. parum m. f. p. cui statim superbibat cyathum ejusdem feri & mox incepta evacuatione, bibat feri ejusdem ʒiv. aut y. & duabus aut tribus horis ab assumpto sero prandeat; hoc idem repetat sex aut septem vicibus tertio quoque die; diebus vero intermediis praebatur emulsio sem. melon. extract. cum sero dissoluta ad ʒx. cui addatur sacchar. alb. cochlear. vel julap. rosat. ʒj. Quod si fortasse Patientem portionem respuat, pro syr. ros. sol. exhibeat illis cassia cum modica portione elect.

de succo rosarum ante feri portionem. Aquas thermales, praeterea ut diureticas, acidulas suspectas habemus ut minerales, non solum, quia ratione lactearum venarum Aetoli & dardaniacae Pecqueti confectio succent & in cor & arterias, verum etiam quia spiritus sulphureos aqua in seipis continent, qui in sanguinem impetum facientes Aneurismam valde obesse possent. Quare sanus erit jam dictis aquis ut lactis caprini subliuere, & in ejusdem quinquaginta aut sexaginta diebus perseverare, ut hepatis & cordis fervor contemperetur, sanguis demisceatur & crassior reddatur, atque tum totum corpus reuertatur; sed interim supra hordeo herbitique refrigerantibus nutrienda erit, eodem tempore confectio poterit, balneum aquae dulcis foliis viol. lact. nemph. & tal. alterna, in quo sedeat usque ad septem: tum enim laxantibus opus non habet, sed refrigerantibus & adstringentibus à nobis supra propositis; quae semper actu frigida apponi debent, imo attivo tempore nunc quoque refrigerantia.

Quibus jam dictis omnibus congrua erit addenda vivendi ratio ab Excellentiss. viro Austriaco praescribenda: refrigerans enim & sublimiter humectans, atque sanguinem potius incassans esse debet, alterando vinum pro m. n. sa. sanalo rubro, licet jura catinum pro terculia sanalo albo; Quies est imperanda, & animi motus atque perturbaciones arcendae. *Raymund. Joan. Forus consultationum T. i. centur. 1.*

### Observationes.

Anno 1606. Bernae peregrinum quendam in re 3 podochio inviti. Is in ur. mare quod totam suam vitam pacem & otis in iterum & collum utque occupabat, assidue habuit. Pulsatio illius tumoris adeo erat magna ac vehemens, ut etiam vestimenta elevarer. & exterius bellie co. spici posset. Dolor nullus, maxima tamen respirandi difficultas adebat, mansit ibi aliquandiu, nonnulla quinetiam remedia tam interna, quam externa ʒpsi a D. Conrado Reipubl. Medico ordinario praescripta fuisse, frustra tamen. Tandem domum reverfus est, & curis nam fuerit exilis, ignoramus. *Gustavum Fabricius Hildan. Centur. 3. observ. 43.*

Quidam Nicolaus Gesslin nomine Ludimagister in Veullexans sub praefectura Morgiacensi ad lacum Lemannum, cum anno 1604 propter scabiem ex humore melancholico orram, lili venam basilicam dextram a Barbitoufote lici co. tallet. arteria quoque simul compuncta fuerat. Unde paulatim aneurisma exortum est, cui cum in spatio mensis & ultra, medicamenta multa, (supra tamen) adhibita fuissent, Geneva Medicos & Chirurgos nonnullos in consilium adhibere coactus est. Hi cum rem in distelli esse, ac vix brachium servari posse ipsi lignifi. tarent, ad me Paterniacum venit mense Maio. Tum eo loci ubi antea venae sectio facta erat, deprehendi tumorem magnitudine pygm. anserium adaequantem, pallidum & utrinque durum, in quo pulsatio non tantum digito perentia erat, verum etiam oculis conspiciebatur. Brachium quoque extendi non poterat. Dolor tamen non erat adeo ingens, nisi cum brachium extendere vellet. Ego, cum cu-



ratu difficillimum hunc affectum animadvertentem, manu quidem amovere recusavi, precibus tamen ipsius commotus curationem sic aggressus fui. Instituta primò optima victus ratione, applicatoque tumori emplastro nostro de cicuta, enemata infudi, iulapia pro digestionem humoris melancholici exhibui, & tandem corpus à pravis humoribus exoneravi per purgans medicamentum bis intra quatuor dierum spatium propinatum, primam dosim ingrediebatur diarubith, alteram confectio hamech, cum extracto corticis elular. Ultimum medicamentum cum violentia quadam humores, tam superne, quam inferne caussisset, spiritum & sanguinem in aneurismate contentum ad interiora ad eò revocavit, ut altera die nulla nobis nec appareret, nec sentiretur pulsatio, tumor quoque multum imminutus conspiciebatur, unacum lequens emplastrum applicui.

*℞.* Emplastr. diacalis. 3 ij. pulv. r. mastich. rosar. rubr. myrsill. radic. lymphimaj. ana 3 j. Cum s. q. olei rosæ. formetur emplastrum. Postea pulvillum, aut potius nodulum ex linteo multoties reduplicato formavi, & tumori imposui, fasciaque firmiter ligavi, idque in eum finem ut tumor reprimereetur, & sanguinis vitalis ex ipsa arteria in externam membranam dilatatam influxu impiretur, atque his remediis brachium Dei beneficio brevi in integrum restitutum fuit. *Idem Centur. eadem Observ. 44.*

Familia filium septennem baculo ad sinistram capitis partem, quæ carotidum transitus est graviter percussit, unde tumor pulsatilis, avellane nucei instar, primò nigricans, digitis cedens, statim oboritur; & octidui spatio in tantum augeatur, ut dimidiam capitis partem, à suâ utraque sagittali per tempora & frontem ad oculos ulque occuparet. Consulti Medici, anceps remedium certissimo vitæ discrimini præferendum cientes, scalpello tumorem aperiant, sanguisque confestim profluentis parte quadam dempta, quadam verò arcta ligatura & stringentibus cohibita, dum crebro id agunt, insequentibus diebus sanum puerum reddidere brevi: vel quòd in tenellis omnia tenera sint & coactura facilia, vel quòd arteria læsa os subjectum habuerit, ut arctissime potuerit comprimi ad consolidationem. *Jeau. Alicheil Febr.*

Sponsus uxorem ducturus pupugit acutissima cultri acie arteriam manus sinistrae, inter pollicem ac indicem; cuius sanguine subitum profluentem, per adstringens emplastrum, in tempore, inhibito, coarctatim magis externa, quam interna arteria tunica, quæ mansit hians, ac à se invicem sejugata elevata propterea a vitali sanguine utque eò externa ipsius membrana, ut de generari in verum aneurisma, cum pulsu perenni, ac dolore in vicinis nervis insidente. Pulsatilem hunc tumorem vix digito deprelleras, quin sanguis prorinus regurgitaret ad venas, & aneurisma videretur ex toto sublatum; quod tamen actutum sub adipis iterum venit, ubi vel minimum removerentur digiti. Non deerant Chirurgi qui aciem hanc etiam transversim, saragebant terro ignito adurere, ne sanguis plus æquo efflueret: sed crudelior fuisset Medicina quam morbi natura requireret; ac proinde periculum potius factum, per adstringens emplastrum, à plumbei lamina, atqueque vinculo ira depressum, ut expulso ex tumore sanguine, & constricto convenienter

vulneris hiatus, facilius coiret, agglutinareturque, interior laceræ arteria tunica. Cujus coactus etiam sequutus fuit ante mentem quintum; relicto dumtaxat prope cicatricem exiguo nodulo, qui tamen tandem etiam evanuit, antequam ex toto desinere aneurisma. *Nicol. Tulpus Obs. Medic. lib. 4. cap. 17.*

Chirurgus sanguinem missurus cuidam febre continua laboranti, non venam, sed arteriam aperuit: adstans insignis *Garcias à Loper* Medicus Hebræus, Burdegale, permittit sanguinem ad libras duas, & amplius effluere, inde ad syncope usque supervenientem, eo consilio, ut exhaustis ex parte vasis, minor esset arteria pulsatio, quæ consolidationi impedimento fuisset. hinc appposito cum splenio nummo argenteo, additaque arcta ligatura, post octiduum soluta, æger aneurismatis periculo evasit; a febre post tam profusam sanguinis evacuationem liber superstitit tamen diuturna vitium debilitate.

Anno 1635. Tonsor foeminae sexagenariae arteriam pro vena hepatica secat; sanguis cum impetu fluit floridus, brachiumque intumescit cum quidam renitentia. Empiricus hic sanguinis copiam largi pro more emula, quasi se bene gesta vulnusculum deligat; interea tumor ob sanguinis per arteria ostiolum in musculorum spatia effusi copiam, in dies attollitur, nec ullis tomentis discari potest: Ipso tandem medicastro ex desperatione fugiente. Mensiuo post spatium alius aesciscitur Chirurgus cum Medico, qui periculi magnitudinem attendentes, statim austrin genibus & arcta ligatura tanto malo obviam decenter eunt, sed post festum, & casto eventu: vesiculæ enim plures & tuercula, quasi aneurismata, circa medianam & cephalicam hinc inde oriuntur, quæ tractu temporis sponte rupta tantam sanguinis copiam effundunt, ut selectissimis remediis listi non posset fluxus iste per quatuor septimanas, eò quòd ob ingentem tumorem arteria ostium, etiam sagacissimis oculis, non pateret, donec in putredinem gangrenosam abeunte toto brachio, sanguis grumosus, ovorum gallinarum magnitudine, fustillarum ac insigni cum fetore exiret, ac omnis caro musculosa, quæ interim omnimode computruerat (præter tendines, nervos arteriasque, quæ ac periositas) disfluere ad humerum usque. Tum demum in conspectum veniens arteria ostium convenienter obturatum, & caro ablata, sarcoticis, probaque dicta spatio bimestri integrè restituta fuit ad miraculum usque, *Horstius* ejusmodi errorem feliciter correxit laudano opiato, superimposito emplastro lithico Crocilli.

Pauperem quendam per laminam plumbeam, aneurismati supra genu dextro efformato, ovi gallinacei magnitudinem æquanti, superligatam, palliative ita curavi, ut decimo quinto post anno mihi sanus fuerit loquutus. *Paul. Barthele prax. Medic. lib. 2. cap. 3.*

Illustissima quædam ex arteria in flexura brachii loco venæ puncta, aneurisma passa est, sensim ad ovi gallinacei minoris magnitudinem cum magna pulsatione excrevens, quod cum adhibitis remediis non auscultaret, Geneva Lugdunum transiens, se chirurgi curæ committi, pollicentis perquam stypticam mixturæ efficaciz excelsam aneurisma, nulla alia adhibita operatione,



perfectè in Illustrissima curaturum. At eventus promissis non respondit, liquidem ab imposito styptico, archique ligatura, non potuit acceri hæmorrhagia, ad plures dies cum Illustriss. absoluto vitæ stictimine perdurans, donec ad operationem, in denudatione arteriæ, ejusque colligatione positam; devenitum est. Retractum incertim manit brachium per aliquot septimanas quibus demum elapsis beneficio levi cervini aliorumque facile extendebatur ac debilitè atrollebat, imò alio brachio multo minus, & atrophia tactum per plures annos manebat, jam vero recuperavit naturalem magnitudinem, vitæque propè integras.

Vir quidam Honellus in vicinia, cum supra caput pondus ingens magna vi elevaret, cervicemque ab onere imposito ad postèriora immoderatiùs flexisset, non parum extendebantur in colli anterioribus arteriæ carotides, quarum sinistra, vel quod debilior esset, vel quod præcipuam vim passa fuisset, de se continuo promebat aneurisma lentim ad pugni magnitudinem excresecens, plura tentata fuere ab impetitis, qui tumoris naturam non agnoscens, ipsius apertionem omnibus suis emollientibus maturare conabantur, alia verò in mali palliativam curam à periculis quibusdam seriùs advenientibus, adhibita sunt: nam emolli-tio præmissa auctorem multum facilitaverat, unde colligationibus aptis diu impediri non potuit quin grande aneurisma dispanxam primò, postea-que mortalem suffocationem faceret.

Sacrificio cuidam, Magistro Joh. Mailleto, cum ad humeri dearticulationem aneurisma subesset nucis juglandis magnitudine, edixi ne id sibi aperiri curaret, aliàs vitam in manifesto fuerant discrimine: tutius ipsi futurum, si conduplicatis lineis in tolani & aizoi succo maceratis, casco recenti & seroso admisto. Si unguento de bolo, emplastro contra rupturam, aliisque refrigerantibus & adstringentibus mali impetum rerunderet; si laminam plumbeam imponderet, caligifque uteretur brevioribus, ut ad eas continendas esset illi thorax ex quo caligas subnecebat, fasciæ loco: interim vitaret omnia quæ sanguinem attenuant & incendunt; præsertim verò a vocis omni contentione sibi temperaret. Hac dixit etli per annum esset usus, efficere tamen nequivit quin tumor cresceret: Quo animadverso tonsorem adiit, qui rarus tumorem illum esse ex genere vulgariū apostematū, pytoricum escharoticum, quo apertionem moliretur, sub vesperam apposuit. Exacta nocte sub auroram tanta sanguinis, rupto tumore, prorumpibat copia, ut ætonius omnium opem imploraret, atque me vocari juberet, qui ipsi hæmorrhagiam tantam sisterem, pœnitere quod monitis minus obsequens fuisset. Vocor igitur, sed cum vix dum ædium limina attingissem, jam animam cum sanguine reddiderat. Joh. Udalr. Rynlerus observ. 3i.

### Cadaverum Anatomica Inspectiões.

Ante annos plus minus 40. habui cum Collegis in cura quendam Patritium, Nob. L. Welferum; is ex saltu & concussione equi ferocientis incidit in vehementissimum dolorem dorsi, qui nulla erat medicabilis arte, plurimis & diversis cujusque generis tentatis; tandem ex Belgio hac

vocatus Vesalius, cui in Anatomicis administrationibus suo tempore par non erat, ne dum superior. Is ut deprehendit tumorem aliquem non ita magnum in dorso circa vertebis, aut spinam pulsantem, statim dicebat esse aneurisma ex dilata-tione aortæ arteriæ. Nam ut in vancibus vide-mus contineri sanguinem in media vena; ita in hoc affectu in media aorta arteria, idque ex lita, seu concussione equi contigisse, & incurabilem fore. Item asserbat se equi modi affectus vidisse in gutture, in pectore, in poplite, in brachiis, & semper infertè exitimos dolores & tandem i de-rationem; nec curari nisi absoluta parte affecta. In ejusmodi aneurismate se quandoque reperisse humorem concretum instar glaciei, aut humoris crystallini; interdum veluti sanguinem concre-tum, aut molam, in vivis corporibus verum sanguinem deprehendisse, in defunctis nigum & siccatum, & cum gravissimis doloribus agros mori, sponit interdum fieri equi modi vasorum dilata-tionem, interdum ex causa antecedente, qualis fuit in hoc nostro agro; qui supra bien-nium hoc gravissimo morbo conflatus, omni-que auxilio Medico destitutus, tandem in manus Empirici incidit, qui salutem pollicens, exhibuit caraporia, ne scio qualia, ex quibus in sanguinis sputum incidit, & miser ille in sinu conjugis tan-dem extinctus 15. Junii 1557.

Dillecto corpore reperimus id quod Vesalius prælixerat, in ipsa arteriæ aortæ cavitate, tumo-rem prægrandem, durum, carnosum, ex sanguine arteriali concretum, qui foras etiam protube-rans, in dorso dolorem & pulsationes intercebat, ejusmodi nimitum qualis in arteriatum pulsu de-prehendi solent.

Hæc ex Adolpho Occone. Achilles verò Gasseri ad Vesaliū post cadaveris sectionē sequentia transmisit.

Setto ventre apparuerunt membra naturalia satis bene constituta, in ventriculo & intestinis nul-lum erat vitium, hepâr integrum, & valde ma-gnum, vena cava item maxima, quanta forte nunquam visa; ea rupta erat, qua parte apen ista ipsam attingit; lien admodum brevis & ex parte exterius subalbidus, & quasi semiputridus; cor magnum sano simile & plurimo sanguine abun-dans; in ipsa aorta dilata-tio non modica ad palmæ magnitudinem, quæ costis, & dorsi vertebis ita erat adnata ut integra separari nequiverit; ea igitur divulsa emanavit sanguis tenuis, ruber, & quilibet esse solet arteriosus, qui contentus fuit concreto quodam cruore, seu carnitorni ma-teria fibris destituta, quam rursus circumdedit sub-albida & dura quædam substantia transversè digiti spissitudine, colore & specie lardo suillo elixaro non ablimilis. Tota autem aneurismatis compa-ges cum suis contentis pugnum, non parvi homi-nis, sed ovi struthiocameli magnitudinem, fere æquabat; costæ circa locum aneurismatis me-dium erant quasi cariosæ, una potius (ex fortis-simis præcudibus impressionibus) rupta & fra-cta, similiter & dorsi ipondyli colloco, quo su-pra diaphragma aneurismati connexi erant, ipon-giosi & ita atrofi, ut uni atque alteri, suprema mi-nimi digiti superficies iseri potuerit, circa ra-men insignem fœtorem; pulmonum nulla læsio, licet æger copiosum sanguinem ante obitum ip-sum expuerit, adeo ut ex eo sputo suffocatus adstantibus videretur; extrema cutis, ubi in dorso tumor & pulsatio in vivente notari poterat, à morte



motu livida & sanguine suffusa id instar flagellatorum. Hæc recenset *Joh. Udalr. Rumbert. Observ. 81.*

In Collegio Rhemenſi cuidam Sacerdoti aneurisma erat in cruribus. Aperto cadavere reperiæ est magna dilataio arteriæ, & sanguis in ea arteria conreverat, indurueratque. Indurationis causa tribuebatur immoderato rerum refrigerantium usu *Jacob. Thevart. in Ballon. consil. lib. 1. consil. 107.*

Dom. Pelet Civis Monspeliensis quinquagenarius, atrabilatio temperamento prætorus, cum gravissimis curis esset afflictus, post multa symptomata melancholiam hypochondriacam aciebat, pallus est tumorem sub clavicula dextra eminentem, & ovi dimidii magnitudinem æquantem, mollem & reliquæ curi concolorem, in quo pulsatio insignis apparebat. Judicium fuit esse aneurisma intanabile. Eo defuncto, inventa est arteria magna ascendens à corde ad claviculam ita dilatata, ut brachii tere magnitudinem æquaret, & ovum gallinaceum in suam cavitatem facile admittere potuisset. Præterea tunica illius admodum densa & cartilaginea evaserat, quod admirabilem naturæ providentiam notat, quæ tunicæ maxime dilatæ ruptionem vitare contendens, eam densiorem ac auriozem effecerat. *Lazar. River. centur. 4. observ. 34.*

Lethale aneurisma vidimus in Juvene ex læso femore, nec mirabamur, quia arteriam magnam centalem ruptam in apertione vidimus; unde in tantum tumorem femur excreverat, quasi prorsus schirrhosum, ut non tantum ea copia sanguinis ex aperto post mortem femore effunderetur, qui tres mensuras nostras impleret, sed ex sinibus inter musculos vastos efformatis, sanguinem grumulosum forma & magnitudine parenchyma hepatis maximi, referentem extraheremus. In isto vivo, nec sectio tuta erat & possibilis, propter magnæ arteriæ, & inter musculos delitescens ingentem rupturam, nec ligatura sufficiens. *Thom. Barthol. centur. 3. epist. 54.*

Admodum reverendus Pater Franciscus Beitoius, Metaphysices in Gymnasio Patavino publicus Professor, ætate quinquaginta sex annorum, decem, aut duodecim annos pulsationem præternaturalem in sinistra thoracis parte, ubi cordis præcipue pulsus micat, passus est; quæ ab anatomes ignari cordis palpitatio censebatur. Ego verò accitus, conjecti ipsum laborare aneurismate, ex quo postmodum, multis in casum tentatis remediis, noctu suffocatus obiit. Dissecto cadavere, cavitatem thoracis dexteram sanguine repletam observavi, cui copia feri supertusa erat, pulmonis dexteri substantia consumpta, & sola ejusdem superstitie membrana, instar sacculi, quæ dissecta, parvit membrana interna arteriæ magnæ, prius quidem laxata, postmodum verò, cum dilataioni nullus esset locus, disrupta. Aneurisma itaque fuit in arteria magna extra cor duos solummodo digitos transversos; quò loco sanguis à sinistro ventriculo effluxus, valido impulsu, prius internam disruptam membranam, externa dilatata, qui, cum nullum aliud pateret spatium, intra pulmonem dextrum sibi viam fecerat, ubi calore, motu, & compressione, substantiam ejusdem consumpserat. *Petrus de Marchett. Observ. 48.*

## ANGINA.

**A**ngina nihil aliud est quam periculosissima illa musculorum s. u. ibos ac gutturis inflammation, sic ab *Ango* dicta quod idem est ac fauces adstringo, Græcis dicitur *πνιγναι* item *ἀνγίνα*, quod canes & lupos frequenter afficiat; unò *σπασμὸς* ab *ἀνγίνα* laqueus, quod non secus ac laqueus præfocans enecet, vel a *σπινθηρ*, quod respirationem inhibeat spiritum continendo.

Causa est eadem quæ omnibus aliis inflammationibus familiaris, scilicet sanguinis exagitationimia, per quam serum salibus fixioribus particulisque viscidioribus, circulationi minus accommodis prægnans, abundantius in partes corporis omnes relatum, hic aut illic, atque præcipue in faucibus per aërem frigidiusculum inspiratum, spicessit, obstructionemque facit quæ sanguini ulterius promotio obicem ponens, ejusdem in viciniam effusioni non tantum occasionem præbet, sed etiam per propria spicula, loca quibus impactum est & irritat & corro lit. Unde satis patet causam hujusce morbi antecedentem accenseri debere particulis crassioribus, salibusque acrioribus & ad fermentandum promptis (nisi circuitus suos in valis, carnibus & visceribus facile peragant) in sanguine aggestis; atque ea propter non minimi hyberno tempore accumulatis ejuscemodi materiis, illo postea tempore quo facillime exagitantur, scilicet ipso vere, juvenes præ cæteris & temperamento sanguineo præditos, imò rufos familiarius aggrediatur. Causa verò occasionalis erit illud omne quod sanguinem sic dispositum exagitat, seroque abundantius ad fauces promotum, per refrigerium inductum impingendo facit.

Anginam præterea produciunt res variæ faucibus inhaerentes, sic à spina piscis faucibus infixa earundem periculosa inflammationem adnotavit, Schenckius; & nos aliquando ab acicula, aliquando ab officulo pulli gallinacii, in eisdem partes profundius adacta, aliquando à nucleo cereasi in tonsillæ cavum inducto, anginas entas vidimus. Item res aliæ quæ guttur exasperare & tumefacere valent, quales sunt fungi, ac præcipuis qui orbicularis dicitur, lepus marinus, ac planta illa è solani genere quæ vulgò Italis Belladonna vocatur, &c.

Angina vulgò distinguitur ratione scilicet musculorum affectorum, tum pharyngis, tum laryngis, eorumdemque, tum interiorum, tum exteriorum, in *σπασμὸς* & *ἀνγίνα*, *σπασμὸς* & *πνιγναι*, quatum ex illis prima musculorum gula interiorum, altera verò exteriorum inflammationem denotat; ex his autem prior interiorum laryngis musculorum, posterior exteriorum affectionem designat. Ac missis hisce levioris momenti & ad præxim medicam minus facientibus, ad alias procedamus differentias; quatum prima erit inter Anginas veras, musculis prædictis, tum aliquos, tum omnes affligentes; & Anginas spurias, seu nothas, tum tonsillas, tum partes glandulosas, ad radicem linguæ & in extremo palato, atque imis faucibus sitas, tum ipsam Uvulam, tumefacientes. Item alias in quibus tumor sive intus, sive extus, sive utrobique apparet; alias verò in quibus nullus tumor sensibilis adest, propter



reque Aretæo latentes non ineptè dicuntur; ejusce sortis anginam vidit Riolanus à Thymo rumente, gangranosumque quidam redolente; arque etiam expertus est Clar. Lucas Tozzi in juvene ex gallica lue in maximam spiritandi & deglutendi difficultatem subito sine tumore sensibili incidente. Aliæ præterea Anginæ quamvis per se periculosæ, non sunt tamen malignæ, aliæ verò malignitatem tumorem, arsenicalemque, ac pestilentem virulentiam, adjunctam habent, hinc fauces non tantum eructatæ redduntur, sed etiam tumor, ad instar carbunculi atrocioris, partes quibus insidet longe latèque exurit; unde probabile cum Athanasio Kirchero credit Christian. Langius talem putredinem animatam esse, venenatissimisque vermiculis abunde scacere, quorum erosionibus malum facillè serpat. Anginæ etiam aliæ sunt ab inflammatione, tumefactione &c. de quibus supra; aliæ à vertebriis cervicis ad anteriora, ut quidam credunt, luxatis, tum per vim externam, ictum, casum &c. tum internam scilicet humorum confluxum, quale quod Hippocrates describit *Epid. 2. sect. 2.* cum tamen credat Erymullerus impossibilem esse hanc vertebrium ad anteriora, luxationem, Hippocratisque locum potius explicet de convulsione emprostotono simili.

Incipit hic morbus cum rigore & horrore, eos sequitur febris, illaque sæpe acutissima, sed etiam paulò post dolor atque faucium inflammatio, & tumefactio, quibus tanquam concomitanti necessarium continuè adjungitur deglutitionis, & respiratio nis ea difficultas quæ cum sensu strangulationis ad præfocationem citò deducit, ni morbo maturè occurratur.

Non immerito itaque morbus hic inter periculosissimos accensetur, cum sæpissime suos ægros ante quartum diem aut paulò post suffocationem perimat; præcipue verò si malignitas ad fuerit, cum enim vitalibus locis sit proximè vicina, quidni illa promptè pervadat, sicque vitam extinguat. Gravior est cum difficilem anhelitum adfert, tumore in faucibus apparente, eo autem in collo, vel pectore etumpente salutare, nisi inflammatio intro recurrat, aut cum partibus exterioribus interiores simul occupet. Si vero malum è faucibus in pulmonem repat, aut intra septimum interficit, aut ultra hanc diem in empyema commutabitur. Cæterum si cum spiritandi difficultate conjungatur oris foetor, vel circa guttur & fauces livor, aut albor appareat, sphacelum arguit, & gangrenam, quam partium extimarum refrigeratio, pulsus languor, & sensuum hebetudo, ac sopor consequetur; ut fertur accidisse post annum 1618. per totam ferè Italiam: quod adnotat Clar. Lucas Tozzi. Cavendum autem, ut addit idem Celeberr. Autor, ne humor ex Angina suppurata in tracheam & pulmonem delabatur: is namque suffocationem asserre posset, vel saltem empyema, & phthisim. Interdum per modum crileos terminatur; sic refert Forestus de Chyranche veraque quarto die per fluxum mensium criticum fuit curata. Angina quæ subito & facillè evanescit, (cum eam ad interiora recurrere probabile sit) periculum suffocationis, vel alium gravem morbum, minatur. Si anginosus, sicut strangularis spuma circa os appareat vix ad vitam redeunt.

*Curatio* debet esse prompta, si enim in ullo alio morbo, in hoc certe qui fauces veluti resti con-

stringendo citissime strangulat, occasio celeriter & opportune arcepta, feliciter medendi anima dici metuit. Ipso itaque statim morbi initio vena secanda, & sanguis satis larga manu educendus, idque non una tantum vice, sed pluribus, tum scilicet è brachio, tum è jugularibus, tum è iuginis venis &c. Post venæ-sectionem largiorem celobratum commodè medicamentum purgans, illudque validius, admisto etiam paucò emetico, non semel pro occasione data propinabitur, non omittis interea salibus volatilibus, mistura simplici, spiritu nitri dulci, dente apri, diaphoretico, & bezoartico minerali, stercoribusque omnibus animalium quæ nitro rurgent, quale est caninum, album græcum dictum. Valer præterea cinis cancrorum ulcorum & hirundinum, imo & noctæ, pariterque succus nasturtii, atque mel purum, ulularia, cervicaria, prunella, consolida, item fungus sambucus elixus, decoctum radicis althææ, caricarum & zinziberis cum quadrante vini in quo agaticum fuerit maceratum; rob nucum juglandium, atque extractum & sal hyperici & papaveris rhæados cum diaphoretico minerali, ter aut quater exhibitum. Ea autem omnia, vel sub forma Eclegmarum, vel alia, prout videbitur, commodiori methodo usurpari debent: imò ex his gargarismata confici poterunt quæ leviter adstringant, & circueant; vel etiam sub sinem & in casu necessitatis tumorem emolliant, atque ad suppurationem deducant, species aptas in sero lactis, vel ipso lacte recenti incoquendo.

Applicationes interim extus fiant ex unguentis, emplastris, cataplasmatibus, atque etiam in rebelliori morbo ex oleis stillatitiis. Inter unguenta usurpatur unguentum dialthææ, & martiarum cum oleo chamomillæ & amygdalarum dulcium. Inter emplastra, emplastrum de meliloto, & ceratum de spermate ceti. Inter cataplasmata è caricis oleo chamæmelino incoctis, item ex pano eritico cum radice althææ in lacte cum paucò croco usurparis. Appropriata magis creduntur quæ ex nidis hirundinum, stercoribus animalium & præcipue albo græco, stercore ovillo, capriuo &c. capis sub cineribus coctis, nasturtio aquatico & similibus parantur. Inter olea stillatitia maxime prædicatur oleum succini, item oleum è gummi caranna, quæ potenter & validissime resolvunt ac discutiunt. Pro amuleto commendatur filum, sericeum purpureum quo vipera fuerit strangulata collo circumductum; item bufo, seu rubeta cocta.

Victus fiat ex jusculis hordeaceis, & avenaceis, aliisque id genus. Potus verò, tum decoctio hordei solo, tum ex eodem cui nitrum depuratum sit immistum, tum etiam tinctura papaveris rhæad. additis flor. nymph. & verbasci in parca quantitate & adjuncto nitro cum paucò, si ita placet, saccharo, vel melle depurato.

Enemata injiciantur illis omnibus diebus quibus per intus assumptum medicamentum non expurgatur corpus, sintque emollientia & refrigerantia, tum etiam incoctis purgantibus, electuariisque admistis, paulò validius ad excrementorum expulsionem intestina sollicitantia, quorum formulas non opus est hic adjiciamus.

Hiscæ omnibus non satis proficientibus, si æger evidens atque præsens suffocationis periculum incurrat, viresque & morbus ipse ferant, ad Laryngo



tyngit omnia remedium alias illis curum, est de ventrem; huc mucus tamen foret si inflammatio, & tumor, in eoque materia coacta totam tracheæ longitudinem occuparet, ipsosque pulmones. Debet autem operari. Chirurgus angina tuum collocabit in se infra pſteriora rumpet, & ministri in id subitū reclinato, ut licet caput, & latus, cum manu quantum fieri poterit releventur, a latorumque incisionis loco, transverſum ſcilicet, pollicem intra ipſum laryngem, inter cartilagineam quantum tracheæ anulum, miſiſſe faciem cutem utraque apprehenſi manu, itaque per tranſverſum reſpicabit, illicque Chirurgus incisionem faciet tranſverſum pollicem longam, per quam adactis digitis, dilatato vulnere, emollique muſculis bronchicis & ſternohyoidæ, ipſa trachea, ſatis denudabitur, ut inter ſerium & quantum ejuſdem annulum ſtylus in id aſſerere conſectus ad ipſum uſque cavum immitti poſſit, cum ea ſolertia quæ vala, muſculos, aut membranam tracheæ oppoſitam minime lædat, reſpirationemque libere ducat, tum introducta cannula argentea paululum incurvata, & brevi, figuræ, in extremitate quæ eſt in uſenda, depreſſa, alia vero extremitate alata, & duplici annulo armata, quibus per ligamina inducta circum collum ſic alligari poſſit, ut immota perſtet. Cannula hæc in tracheæ cavum penetrabit quidem, ut jam inſinuimus, ſed brevior erit, quam ut poſſit ejuſdem paſſerem oppoſitum attingere, ac enitenti in uſuſtabilem provocaret. Operatione peracta, inducta cannula perſtabit in inſiſto vulnere donec remiſerint, aut evanuerint ſymptomata, quo demum tempore ad ſe invicem reſtitutis annulis tracheæ cartilagineis, conſuevit probe cutis vulnus nec aliquid amplius agendum reſtabile, niſi ut anodynus dolor ex futura ortus leniatur, cicatrixque promptè inducatur.

Angina maligna cum de peſtilentium morborum ſit genere remedia adhibenda, tum ex ipſa peſtis cura, tum etiam ex parte e ſuprà dictis petantur.

Angina notha, alias alba, partim memoratis medicamentis, atque venæ-ſectione, partim etiam aliis curabitur. In ſpecie ubi lentor vitæidus linguam obſidet prodeſt ſaucium abſterſio ex lintheo, aceto, ſucco agrellæ, naſturtii aquatici, aut acetoſellæ imbuto, poſtea gargarisma e floribus liguſti in aqua cum pauco aceto, aut nitro, incoctis; ſiſit etiam ſalis armoniaci, vel ſi aphthæ ſimul adſint, aluminis particula. Succus prætere remperivi majoris, cum ſale armonico non parum erit eſſentialis, ut & alia plura. Sub ſinem pro ſtimationis oris & ſaucium membranis, contra humorum fluxum inungatur rob nucum vel diamorum cum poco melle roſato, &c.

#### Curationes.

Opem latius, ſanguinem cum primis e brachio copioſe detracto, mox ex ſanula utraque; deinut per eſt inſtam nax melle roſaceo ſpiritu ſulphuris ad ſummum acorem permixto, tangantur author ſum: mox Gargarisma lequens præſcribo, non vulgari modo uſurpandum ſed ita ut in ore ſine ulla agitatione contineatur, donec incalſcat,

cat, acin expuitur, & repetatur ſubinde. ℞. Aqu. plantag. roſar. rubr. & Sperm. Ranar. ana ꝑ. iv. album. ovorum in aqua m agitando redact. n. iſſ. ſacch. cand. a. b. ꝑ. iij. f. gargarisma: jubeo etiam ut de emallione in cura morbi lateris præſcripſi vel ſimili, indices ſum t.

Sequenti mane, niſi febris & dolor inter degluſiendum perceptus aliquantulum remiſerint, venam in brachio iuxta ſcapulo, Cathariſi in diem poſterum reſecta. At ſi utraque hæc moruantur, Catharticum lenitivum ſtatim exhibito; quod quidem poſt ſanguinis miſſionem præ omnibus aliis perutile ac appropinquè neceſſarium eſſe inſuper experientia, compoſiti, ſi fortean, quod quidem oppido ratum eſt, febris, aliaque ſymptomata, etiam poſt cathariſin, bellum minuentur, iterum ut prius venæ ſectione perdomanda ſunt, ut & Epipſaico amplo ac forti, poſteriori cervici applicando. Per integrum hujuſce morbi decurſum, enema refrigerans emolliſcentque omni mane, dempro illo quo cathariſi vacat, injiciendum, atque ægrem hoc pacto reſiciendum quotidie præcipio. Carnes, cujuſcunque demum generis, ut & juſcula ex iis parata, ſæpe ſunt; juſculis vero horſtaceis avenaceis, pomis coctis ac id genus aliis veſcitur; peſtana ex hordeo, vel cerevitiâ tenuiſſimâ uitor. Lectulo interim per horas aliquot quotidie abſteat; cum hujuſce temporis cum febris, tum reliquis ſymptomatis, quæ hæc methode expugnate laryngo, vires addat. Animadvertendum eſt autem, quod illiuſmodi Angina, quæ febris, mihi ſtationaria dictæ ſymptoma tantum eſt illa ipſa methode curari amat, quam febris ſibi vendicat, ac proinde vel per Aſaphen & curis ſpiracula exterminanda eſt, vel per aſiam qualemcunque medendi methodum quæ febrim primariæ cui inhæret debetur; quod ſeuſu obſervatione dignum. Th. Sydenham. de morb. acut.

Anginam vel incipientem vel etiam confirmatam, præſentem ſi febris uigeat, ſubito vomitoria, in primis aqua benedicta tollunt. Sic nimirum inflammatio ceſſat, & uſcera vel apoſtemata rumpuntur. In omnibus vero hiſce reſpiciendum ad naturam patientis & virium robur.

Quod ſi ergo vomitoria locum habere nequeant, recurrendum ſtatim eſt ad ſpecifica, quæ niſi ſerius etiam poſt vomitoria locum habere poſſunt, talia ſunt.

1. Quod eſt apud Paracelſum in trachæa de peſtilentia ad Stierzingenſes, quod ℞. vj. vel viij. caneros vivos (canceruſque reſrigerant) ſed majoris m. iv. quæ invicem conſuſa in mortatio, & poſtmodum expreſſa ſuccum reddunt, quo lingua & fauces ſunt foveatæ, vel ipſa lingua tangenda, imò ejuſ (ſed parum valde: gur. v. deſicet aliquot) in liquore convenienti aliquid intus concedendum.

2. Eſt experimentum Anton. Anſmani civis Auguſtani, quod ℞. ſedi majoris ꝑ. i. contunde in mortatio, & exprimat ſuccus. Hujuſ ℞. ꝑ. j. aude ꝑ. j. ſalis armoniaci, relinque in loco humido utque ſolvatur ſaſpoſtea deſtilla per alembicum. Hæc aqua poſtea ablue linguam calidè & repidè. Eſt probatiſſimum. Vide Cotradinum de luc venetæ.

3. Gargarisma ille de quo ſuprà de Guſtu aboſſo & depravato.

In hoc cam aliquid addendum eſt ad plantas illius de tedomajori.

Quod



Quod si gargaris nequeat, siphunculis injiciendus est Gargarismus, post singulas gargarisationes 22. corium de lardo duos digitos latum & assulam incide, ex ea parte, qui adhuc lardum est, & pone ad linguam, ut aliquando detineatur: Sic nigerrima cuticula linguae resolvitur, & tandem discedit & curatio sequitur celerior.

Extremè ad collum ipsum applicentur emplastrum ex nido hirundinum (integris & albo grano) cum aqua terrariorum coctum, calidè.

Pro potu dissolve vitriol. vel sal. prunell. (vinum non erit) 3 j. in aq. fontanæ mens. j.

Anginae confertur ea in quibus sal nitrosum Ammoniacum delitescit, ut sterces canis albi ossa roventis, in aqua probe coctum & cum melle exhibitum.

Rauriz dentis apri 3 j. cum oleo amygdalarum dulcium & saccharo.

Cinis cancorum ultotum.

Cinis hirundinum.

Conioida media, prunella, Vulvaria, cervicaria, mentha cilpa, rubus idæus.

Angina notha puerorum curatur emplastro modo dicto.

Caput viperæ exsiccatum & collo appensum commendatur pro amuleto.

24. Noctuanam unam, cum pennis combure & f. pulvis cuius postea modicum in guttur immittatur, perit & rumpit apostema mirabiliter.

Spiritus salis miri tum in extinctione inflammationum, tum in resolutione Apostematis plurimum valet.

Exhibentur ejusdem in huntu aquæ fontanæ calido 3 ij β. aqua m. misce cum spiritu vini & sp. salis ana 3 β. vide Crollium.

25. Aq. sempervivi, prunell. ana 3 j. sal. armoniac. 3 j. m. f. Gargarisma.

Crytallum vel anodynum minerale, ut vocant, seu lapis prunellæ (quod linguae inflammationi, item faucium vicinarumque partium asperitati unicè medeatur) insignis virtutis est; 3 β. vel 3 j. in aqua aliqua appropriata resolutus & gargaritacum mirè confert post etiam patum hujus multum cum saccharo, unde deglutito, vel, si mavis, salis prunellæ vulgari modo præparato quantum placeat adde sacchari candi ana vel etiam plus, utrumque pulveritatum coque cum aqua rosarum quantitate sufficiente, donec gutta lamellæ stannæ superfusa consistentiam habeat effunde in concham & repone relinquendo, donec instar lapidis induerit, tandem exime & in particulas distringe, vel etiam in pulverem redige, utre hoc sæpius. Joann. Hartmann. Prax. Chimiæ.

Angina quædam est maligna s. epidemica, quæ bezoarticis refrigerantibus curatur. Huic malignæ non convenit V. S. si una die duraverit. Angina verò non maligna pro test V. S. non tamen admodum larga & quidem in brachio. Si verò oriatur ab obstructione mensium, in talo & quidem saphena medenda.

Purgatio adhibeatur in principio & sit vehemensissima. vide Zacut. Lusitan. in Hist. & Barthol. de angina puerorum.

Repellentia cautè adhibeantur, lapis prunellæ mira præstat, in omnibus inflammationibus cum sempervivi.

In omnibus faucium morbis optimum est rob seu extracta. core nucum, resistit enim venenis. It. aq. core nucum cum sale armoniaco, vel succus can-

corum & sempervivi cum sale ammoniaco mixta. Cinis hirundinum internè adhibetur ad 3 β. pro certo habetur remediò. Aq. hirund. fung. sambuc. De filo purpureo, quod se pens est strangulatus vid. Barthol. Entwurff. & alii.

Angina ab inflammatione incipit aq. cordial. Saxoniz, Medic. ext. re, imprimi sale um ammonio fixato, aq. acetosæ &c. spiritus salis in omni. us inflammationibus mira facit. Joann. Aft. chael.

A provisione habitatorius corporis seca venas sub lingua, & si non juveni, jugulares in collo externas, & quæ intus sunt pui is hirundinum, & foris admove emplastrum ex nido hirund. cum aceto. Si ad pus aheat.

26. Myrtæ 3 ij. lin. pi 3 j. morsus diabol. scabios. ana m. j. coq. ex aq. ad 3 j. coiat. adde mellis optimi, & diauuc. ana 3 ij. f. Gargarisma.

Admiratione etiam facit hoc emplastrum.

27. Farin. tritic. hor. l. tem. fœnugræ. ana 3 ij rad. lil. alb. 3 ij. sicum numero. vi. Levist. chamamel. melilot. malv. ana m. β. ferm. rei æris 3 ij. decoctis ut decet ex aqua f. cataplasmata dolorem sedans & quod sequitur.

28. M. iulæ pomorum sub prunis coctonum 3 viij. butyri rec. 3 i. pingued. galli. 3 j. lactis muliebris 3 ii. farinæ hor. 3 j. bulliant ad ipsi tudinem, in fine adde vitell. ovorum num. ii. & patum croci f. cataplasma anodynum. Joann. Henr. nius ad Hippocr. Aphor. 43. Sect. 2.

Ex Hippocratis consilio omnia admovehimus ut foras prodeat in collum materia: tale est emplastrum quod coquitur ex nido hirund. ex decocto malvarum, melilori, sicum, fl. sambuci, additur theriaca & crocus. Ita litus ex adipibus, & oleo amygdalino, cum croco. Idem ad Hippocr. Aphor. 37. sect. 6.

### Consultationes.

Vii triginta annorum carnosus, robustus, plethoricus, cum a gravi labore admodum incaluisse, plurimumque siccit, cerevisiam tenuem, & frigida cella de promptam, avidissime magno houstu oibit, ita ut friguitatem potius in f. uibus sentire nequens, poculum ab ore deponere cogere. Paucò post angustia in quâdam cum ardore in f. uibus, & hinc respirandi & deglutendi molestiam percepit, quæ continuè magis magisque adaucta est. Post septem aut octo horas febris valua accessit, cum pulsu magis, crebro & inæquali, tantumque adaucta est respirandi deglutendique difficultas, ut vix stans aut erectus sedens respirare posset, & assump. us potus illico per nares resisteret. Os siccum est, cum magna siti, quæ ob deglutendi, impedimentum, nullo potu lesari potest. Lingua obscurioris coloris evalit, eaque oris speculo depressa, postquàm in faucibus maxime intena rubedo seu fuscus color apparer; tumor tamen insignior, quia humiliore loco eo sistit, compieci nequit. Venæ raninæ ubi lingua crassæ & tumida sunt. Loquela etiam acedè impedita evalit ut vox ægrè audiat. Ager maxime anxius se quaquaversum summa cum inquietudine mover, & frigidum patulumque ærem continuè capere. Foris nullus tumor sed insueta aliqua rubedo circa faucium regionem apparet.



Gravissimus affectus, qui ægrum nostrum exagitat, vulgò ab angendo *Angina* appellatur; *Etiæ respirandi, & deglutendi difficultas*, ab inflammatione & angustia partium summæ gulæ, laryngis, fauciumque procedens, ac brevi febrem continuam sibi comitem assumens.

Non est autem nostra angina a tonsillarum ex catarrho tumore cum tu ore conjuncto, sed est vera angina, ex meta inflammatione genita. Cui cum pro varia intensiōis magnitudine à Neotericis quatuor gradus constituantur, hæc ad gradum tertium referenda videtur, quem *Angina* appellant, quippe in nostro ægro inflammatio versùs superiores faucium partes se extendit, & depressa lingua quodammodo compici potest, quæ alioquin in duobus prioribus gradibus *anxia* & *anxia* tota occulta latet.

Sanguinis redundantia hujus mali antecedens fuit causa; hic autem sanguis a causis procatarrhicis agitur, ac in faucibus & laryngis musculis majore copia conservatus, ibidemque putrescens, causa continens evasit. Procatarrhicæ verd illum partim moventes, partim circa dictas partes detinentes, duæ sunt, nempe gravis labor magnus calorem excitans, & nimis frigida potio, subitam refrigerationem inducens.

A gravi quippe labore excalefacto toto corpore, nec minus corde, sanguis per validas crebraque cordis pulsatione rapidè fuit agitur, ac celeriter per vasa transiit, idque sine ullo incommodo, quoutque in viis nullum dabatur impedimentum. Vtùm cum ab actuali frigidityte assumpti nimis frigidi potus, qui in minimis venis, circa fauces & laryngem hærebat sanguis nonnihil incrassaretur, ipsæque venularum radices & orificia constrikerentur, ac cor excalefactum tamen non desineret per crebros magnosque pulsus æque multum sanguinis, atque antea, eò per arterias propellere, non potuit tanta quantitas à venulis per tris incrassatumque sanguinem angustatis, tam citò recipi & transmitti, sicque circulari, ac proinde cum singulis pulsibus aliquid transiret, aliquid etiam dictis locis detineretur, hinc per plurimos pulsus multum sanguinis in dictarum partium subitantiâ detentum ac collectum fuit, unde tumor calidus respirandi deglutendique vias angustans, paulatim magis magisque adauctus est; ipseque detentus ibi sanguis, cum à corde non amplius regeretur nec moveretur aut elaboraretur, paulatim majorem inflammationem & putredinem concepit, cujus pars, cordi per venas communicata febrem continuam accendit, non quidem primâ hora, sed inter septimam & octavam: in ipso enim exordio copia sanguinis paulatim collecta, ejusque nimis calor continuè adauctus fuit, sed putredo cum magna inflammatione post aliquot horas primò invasit, scilicet cum tanta esset copia, quæ naturæ gravis foret, etiam effervesce inciperet: à qua effervescencia pulsus major & crebrior, quam antea, evasit ac simul etiam inæqualis, à putrescentibus particulis, reliquo sanguini inæqualiter permixtis, in cor illabentibus.

A febris invasione multo difficilior fuit respiratio, tum, quia effervesce sanguis majorem locum requirebat, atque hinc tumorem & viarum angustiam plurimum agebat; tum, quia ratione majoris caloris febrilis, majore opus fuit respira-

tione; cum per angustas vias procedere vix posset, difficilior evasit, & defectus quoque necessarii refrigerii maxima anxietatem & inquietudinem induxit; atque hinc est quod æger trigram partiumque aërem capiet.

Os siccum & litis maxima est, à calidis vaporibus, partim ex inflammato loco, osi proximo, partim per febrem, ex corde & inferiore corpore sursum in os exhalantibus, idque exsiccantibus. Potus tamen degluti nequit, sed in os relinquitur, quia ab inflammatorio tumore superior œsophagi pars tantopere comprimitur & angustatur, ut nihil amplius transmitti possit, hincque potus deglutitionis impetu versùs œsophagum impulsus, cum non possit per eum transire, per superiora palati mox resinit in nares.

Intensæ rubedo seu fuscus color, qui in faucibus depressa lingua conspicitur, fit à copia sanguinis eam parte, ob ante dictas causas coarctata, qui color se inde aliquo modo versùs linguam extendit; & propter denegatum liberum sanguinis per venas transitum, venæ raninæ sub lingua admodum tumescunt.

Loquela impeditur, ut æger vix audiri possit, propter respirationis difficultatem & musculorum laryngis inflammationem.

Foris nullus conspicuus est tumor, quia inflammatio tota intus circa laryngem, œsophagum & fauces latet: rubedo tamen aliqua, propter viciniam, se versùs exteriora protendit.

Acutus sanè ac periculosissimus est hic morbus, à quo æger aut citò liberati, aut citò mori debebit, quia si paucillum adhuc increseat inflammatio & augeatur tumor, respirandi via omnino præcludetur, & æger suffocabitur. Periculum auget febris magnitudo, & quod æger nihil omnino deglutire, sicque ardor internus nullo potu leniri, nec vires ullo alimento corroborari possint. Aliquam tamen lenitionis spem facere videtur, quod inflammatio non omnino in interioribus laryngis musculis abscondita delitescat, sed aliquo modo versùs fauces extendatur, ita ut topica ad partem affectam paulò melius accedere queant. Adde, quod aliqualis rubedo, foris apprens, videatur etiam promittere aliquam protrusionem inflammationis versùs exteriora, quod cum salute ægri fieret.

In curatione 1. Affluentis sanguinis impetus in partes affectas est impediendus. 2. Qui jam influxit & ibidem collectus est sanguis, quantum fieri potest discutendus est. 3. Si ad maturationem tendat, ea quàm citissime promovenda est. 4. Si dum hæc tentantur, ægri suffocatio interea metuetur, illa per Chirurgiam præveniendâ erit.

In hoc magno igitur morbo statim à generoso remedio suspicanda erit curatio, & venæsectio in brachio instituenda, ac sanguis liberaliter detrahendus. Si prima vice non immineatur affectus, haud diu post eadem venæsectio in eodem vel altero brachio erit reiteranda: atque illud ipsum etiam tertia vice, si necesse videatur, sine scrupulo tentandum; quoniam ab hoc imprimis remedio salus expectanda. Etiam è vernis raninis, sanguis bona quantitate per phlebotomiam erit extrahendus.

Interea clysteribus ordinariis alvus interdum subducenda.

Utatur æger sapius hoc gargarismo discutiente

&



& emolliente.

2. Glycythizæ ratæ ʒiij. caps. duas medio-  
eris magnitudinis herbar. sc. biol. violariæ, mal-  
væ m. rautianis, betæ, ua n. j. flor. chamomillæ,  
rotarum pallidarum m. ʒ. cotarum citri ʒi. a. p. a.  
q. l. coq. l. art. ad ʒi. ʒ. adde cotarum, syrupi  
diamor. ʒi. diamor. ʒi. mellis rosacei ʒi. melle  
f. gargarium.

Huic, si tumor ad suppurationem tendere vi-  
deatur, hordei mundati ʒi. ʒ. fol. althææ m. ʒ.  
ficus novem.

Extremis us imponatur hoc cataplasma.

2. Rad. liliorum albor. ʒi. ʒ. fol. betæ, mal-  
væ, mercurialis, althææ flor. chamomill. an. m. j.  
rotarum pallidarum m. ʒ. farinæ furnur. ʒi. ʒ.  
unius nidi hirundinis interioriorem partem pulveri-  
ficatam, aquæ q. l. coquantur f. art. ad puliculae  
formam, cui adest olei chamamelini ʒi. j. misce f.  
cataplasma.

Huic si maturatio expectanda videatur, addi  
poterunt.

Ficus pingues septem aut octo, farinæ rad. al-  
thææ, l. m. lini, pulp. cassiæ, olei liliorum, ana  
ʒi.

Quamprimum æger aliquid deglutire poterit,  
detur elementis purgans ex infuso rhabarbari, pul-  
pa cassiæ, syrupo rosato solutivo, aut de cichoreo  
cum theo, &c.

Tunc etiam pro potu præscribatur Julepus.

2. Decoct. hordei ʒi. ʒ. syrup. diamori, dia-  
nuci, violæ, ana ʒi. j. olei sulphuris pauxillum ad  
levem acorem, melle, fiat julebus.

Si abscellus rumpatur, æger prono capite pu-  
ulentiæ materiam expuat, & ulcus abstergat gar-  
garismo, ex decocto hordei cum saccharo, melle,  
aut syrupo de prallo vel hyssopo dulcorato: ex  
quibus tyupis etiam linctus confici potest. Postea  
utatur gargasmarum ex sinicula, plantagine, agri-  
monia, nucibus cypressi, rosæ rubris, &c. cum sy-  
rupo de rosæ siccis & granatorum dulcorato.

Si interea dum hæc adhibentur, magis incre-  
scat respirandi difficultas, suffocationis periculum  
jamjam imminere videatur, antequam materia  
vel discuti, vel ad maturitatem deduci possit, viri-  
bus nondum planè collapsis, ad extremum con-  
currentem est remedium, scilicet *laringotomiam*;  
de qua consulendi sunt Julius Cæsar in *historia  
anatomica vocu.* Aquapendens titulo *de perfora-  
tione aspera arterie*; Sennertus *institutorum lib. 5.  
part. 1. sect. 2. cap. 7.* alique Chirurgiæ scriptores.

Vivat æger in aëre frigidiusculo. Cum degluti-  
re poterit, concedatur victus tenuis, ex cremore  
hordei amygdalaris, juleculis pullorum vel carnis  
vervecinæ, decoctis cum lactuca, codivâ portula-  
ca, acetosa, prunis Damascenis, &c. Potus sit ce-  
revisia tenuis, julebus refrigerans, pitana. Alvus  
laxa servetur per clysteres, aut concessa deglutitio-  
ne per assumpta corporis animique sit quies. *Is-  
brand. D. Dienerbroeck.*

Morbus quo Illustrissima Patiens affligitur,  
evidens adeo est, ut cum vel ipsis oculis pateat,  
Medicis conjecturis, quantum ad ejus ideam, opus  
non sit, de quo præterea tum apud differuit, & quod  
magis est, tam opportunis remediis succurrit Ex-  
cellentiss. Vir, ut mihi penè mihi restet addendum,  
sed omnia breviter confirmanda quæ summo ju-  
dicio proposita fuere. Angina itaque premittit  
Nob. mulier, cujus essentia ex Gal. in impedita  
deglutitione & respiratione consistit non verò, ut

plerique asserunt, in inflammatione quæ in huius-  
modi malo, causa potius, quam essentia rationem  
habet. Symptoma igitur erit in actione animali læ-  
sa, eaque nunc imminuta; sed interdum abolita.  
Hanc autem & nos legitimum censemus, non so-  
lùm ratione patris affectæ cum inflammatio occu-  
pet fauces, sed etiam ratione causæ, cum ab in-  
flammatione dependeat.

Fauces itaque sunt partes affectæ, quod conji-  
citur ex eo, quod deglutitio magis, quam respi-  
ratio impedita sit, quæ cum læsa magis sint te-  
cundum internam, quam secundum externam par-  
tem, Angina hæc in specie cum Gal. Cynanche  
erit appellanda.

Symptoma hoc, ut dictum est, ab inflamma-  
tione dependet. quum nimis sanguinis in illam  
partem influxus induxit, non sicuti tamen, aut  
bilioli, sed pituitosi, quod ideo asserimus, quia  
deglutitio magis, quam respirationis læsa est, quia  
frequentissima sunt ipsa pituitosa materis &  
tandem quia videmus linguam continuè pituita  
irrigari. Pituitosus verò iste sanguis in partes illas  
influxit, non per modum attractionis, sed per mo-  
dum transmissionis, cum Pociens diu caput ante  
soli expoluerit, cujus calore materia ista liquefa-  
cta, præceps contrigit in fauces destillatio, à qua  
postea inflammatio, illarum partium angustia, &  
difficultas non deglutitionis solum, sed etiam res-  
pirationis.

Ut curenur hoc malum, variæ esse debent me-  
dicæ indicationes prout diversa sunt tempo-  
ra ejusdem morbi: In principio enim revellen-  
dum, repellendum, & partes illæ extrinsecus re-  
laxandæ, In augmento revellendum, & digerend-  
dum. In statu validioribus digerentibus uten-  
dum, dummodo tamen inflammatio ad reso-  
lutionem vergat, ut sperare licet. In decli-  
natione tandem unica intentio est ipsa resolutio.  
Et quamvis morbus acutissimus sit, & per conse-  
quens periculi plenus, præterea cum legimus  
ut & in interiori parte, nihilominus propositis  
intentionibus satisfacere sperandum, cum collum  
extrinsecus etiam intumescere incipiat: namque  
ex Hippocr. c. *Ab Angina habito*, si tumor fiat in  
collo, bonum, foras enim morbus deducitur.

Quoad Chirurgiam, jubet Galenus statim san-  
guinem ex Cephalicæ affectæ partis educi, ne æ-  
ger suffocetur; quare opportunè soluta fuit bra-  
chii vena, & non semel, sed per partitas vices,  
docente Avicenna unicâ vice sanguinem copiose  
emittendum non esse, ne attenuatis & liquatis hu-  
moribus, fluxio angeatur, & Angina in peripneu-  
moniam transeat. Cuiuslibet, frictions, lotio-  
nes, si opportuno tempore administrantur, om-  
nia conveniunt. At cum morbus jam sit propè sta-  
tum, determinandum superest quid in præsens  
agendum sit, cum jam sufficientes universales  
evacuationes præcellerint. Et mihi quidem parti-  
cularis evacuatio selectis venis sub lingua valde cum  
Galeno placeret, nam hoc modo non exigua por-  
tio jam fluxæ materis derivaretur.

Quoad Pharmaciam, opportunissimum fuit  
medicamentum exhibitum, tyupis tamen præ-  
ferretur emulsionem seminum melonum aquâ ace-  
tosæ extractam, addito modico julep. viol. tam  
mane, quam vespere in vigore accellionis; die ve-  
rò ore derineat, modò julepium viol. modò con-  
servam violarum. Gargarismus quoque parari po-  
terit non ex rosæ, myrto, balauft. cum aq. ros. &  
plan-



plantaginis; talis enim cum maxime repellens sit, potius in principio convenit; sed ex decoct. rosarum, liquiritiæ, passular. caricatum in aqua communi, addito etiam diamorone: vel paratur gargarismus ex aqua plantaginis, acetosæ & diamorone, addendo parum oxymel. simplicis.

Interim si perseveraret dolor, vel deserviret magis, admoveat possit extrinsecus emplastrum ex flore cassiæ, pulv. nidi hirundinis, oleo amygdalarum dulc. & sapa; vel ex farina hordei, fabarum, nidi hirundinis, oleo amygd. oleo ros. compl. & sapa. Tandem pro omnimoda illius materię discussione, uti poterit Patiens Illustriss. Gargarismo ex decoct. pulegii, calamenthi, origani, thymi, addito diamorone, myrrha, & parum spicæ.

Quod si inflammatio ad suppurationem vergeret, lac repidum conveniet, prout decoct. caricarum pinguium, rad. malv. & similia.

Victus sit exquisitè tenuis & sufficiat sola psittacina hordeacea, aut panatella in aqua cum lacte seminum melonum, Quæ summa viri Sapientissimi prudentiæ satis. *Raymund. Joan. Foris. Consult. Tom. 2. Cens. 1.*

### Observationes.

Civis quidam anno 1615. Gieffæ primò de faucium dolore, mox difficili respiratione, degluti-tioneque conqueritur ita ut cibum nullo modo, potumque vix admittere posset. Exteriùs tumor fere nullus, interiùs verò partes circa linguæ radicem intumescerent atque inflammatae conspiciebantur; pulsus aderat frequens, & calor febrilis per intervalla totum corpus maximeque faciem invadens.

Gravis est illa species angina, cum gutturis interni musculi sic inflammantur, ut neque in faucibus, neque in cervice quidpiam appareat, unde *Celfo* meritis pestiferum, acutumque morbi genus, *Galeno* morbus extremè peracutus, *Hippocr.* verò lethalis dicitur. At major est spes in illa, quæ sit inflammatis internis faucium musculis, ubi tumor atque rubor in faucibus oculis subsiciuntur. Talis etiam erat hic morbus, qui incipiebat cum dolore faucium, ibidem per congestionem & affluxum collecta materia sanguinis pituitosi quo musculis faucium repletis inflammatio & tumor subtequebatur, unde mox difficilis respiratio reddebatur, ocellus scilicet quodammodo viis spiritalibus, ipsaque deglutitio desiciebat, propter gulæ difficilem dilationem sine qua cibis potusve transire nequit. Hinc cibis nullo modo propter soliditatem complimentem, quam partes inflammatae terre nesciunt, potusque vix admittebatur, qui scilicet liquidâ suâ substantiâ quadantenus guttatim descendere poterat. Exteriùs tumor nullus apparebat, quatenus inflammatio musculos internos faucium apprehendebat quod interiùs rubor atque tumor circa linguæ radicem innuebant, in quo alias hæc species a priori, quæ proprios laringis musculos afficit, distinguitur. Pulsus frequens erat; incalcescente corde propter impeditam respirationem, convenienti ventilatione denegata, quam ob causam calor præter naturam per intervalla totum corpus, spiritibus effervescentibus una cum sanguine arteriali hinc & inde concitatis, imprimisque faciem invadebat, quæ alias

in hoc agro propter jecoris caliditatem fervidas exhalationes promptè recipiebat, maxime hoc tempore, dum in vicinia humor phlegmonodes generaretur, Hic primo totum corpus sanguine abundans evacuandum. 2. affluxus ad fauces repellendus & avertendus 3. materia phlegmones circa fauces collecta vel ad resolutionem, vel ad suppurationem ducenda, 4. necnon pars affecta roboranda veniebat.

Pro primo suavisimus pro lenitione clysterem, cum venter etiam instans videretur, qui.

℞. Rad. Altheæ ʒ j. herb. violar. mercurialis, parietariæ ana m ss. flor. violar. rosar. ana m j. fol. senæ ʒ j. sem. lin. tœnugr. ana ʒ ij. scenicul. ʒ ij. ss. F. decoct. in aq. ad tertias, coletur. ℞ j. adde mass. pil. Aggregat. ʒ j. ol. chamæmelini ʒ ij. salis parum, fiat enema.

Hoc modo ventre laxato venæ-sectionem suavisimus in brachio, quod non tantum sanguis copia abundans minueretur, sed totum incalcescens alteraretur. Quoad affluxum repellendum & avertendum ab empiricis primò vocatis gargarismi præscribebantur, non quidem ex hac indicatione sed potius juxta consuetudinem, qui solis adstringentibus decoctis faucium affectibus succurrere conantur, quorum utrum eò direximus, ut primò lenis fieret adstrictio per aq. prunell. plantag. cum Diamoro & Rob nuc. permixtis, dein etiam subsequenter collutionem concessimus, quæ ℞. Rad. Bistortæ ʒ ij. cupul. gland. ʒ j. Herb. prunell. flor. rosar. rub. ana m ss. f. decoct. in l. q. aq. ad tertias, coletur, adde aluminis ʒ ss. Diamoron. ʒ j. misce. Porro majoris avertionis ergo venas sub lingua quoque incidimus & ventosas sine scarificatione scapulis & brachiis appolimus. Hoc modo sufficienter affluxu correcto, materia circa fauces copiosè collecta, quæ resolutionem non admittebat, suppuranda veniebat qua de causa mox emplastrum, quod patius nosset p. m. Jacobus Horstius olim commendabat, appolimus exteriùs, quod ℞. Rad. altheæ ʒ ss. caricar. ping. num. viii. myrrh. ʒ ij. croci ʒ ss. Farin. sem. lini, scœnugr. ana ʒ ss. mellis q. l. f. emplastrum. Interiùs adstringentes gargarismos mutavimus, & cum discutientibus emollientia & maturantia præscriptimus remedia, nimirum collutionem ejusmodi, quæ ℞. Rad. glycyrrhiæ ʒ ss. herb. malv. melilot. ana m ss. fl. chamæm. p. ij. Passular. minor. ʒ ss. caricar. ping. num. iij. f. decoct. in l. q. aq. ad ʒ. coletur, & adde mellis rosar. ʒ i ss. misce.

His continuatis, apostema faucium maturabatur, & spontè ruptum, pus copiosum per os emittebat, pro cuius mundificatione consequenter gargarismi fiebant ex aq. prunell. cum melle rosato permixta similibusque, quibus non tantum ulcus eluebatur sed etiam pars affecta vicissim ob modicam adstrictionem roborabatur, ut perfectè restitutus æger, in hanc usque horam bellè vivat qui alias extemam suffocationem tunc temporis sibi instare putabat. *Gregorius Horstius.*

### Angina per resolutionem materie soluta.

Puella 18. annorum, fluxionibus capitis & obstructionibus mensium obnoxia, superiori anno 1609. incidit in difficilem respirationem, ita ut non nisi rectâ cervice spirare possit: tumor cum dolore circa collum apparet, transglutienti ma-



xima difficultas subsequatur.

Aderat hic anginae species, quæ *angina re-*  
*c-entiorib. nominatur, ubi exteriores faucium muscu-*  
*li inflammantur*, quod in hoc casu factum fuerat ob  
sanguinis pituitosi copiam ad superiora regurgita-  
tem, adjuvantibus defluxionibus capitis. *Difficilis*  
*fit respiratio*, tum propter asperæ arteriæ compres-  
sionem, tum etiam propter superfluitates per con-  
tensum in pectore collectas: *rectâ tantum cervice*  
*spirat*, ubi minus aspera arteria comprimitur: *in-*  
*mor apparet*, ob materiam parti affectæ jam impa-  
ctam: *cum dolore*, propter inflammationem: tan-  
dem *transglutendi difficultas maxima* subsequitur,  
propter gulæ extensionem, quæ dilatata à cibo so-  
lidiore partem inflammata comprimit. *Quod*  
*curationem in principio huius affectus vena-sectione re-*  
*vellendi causa convenit*: verum cum in præsentem  
casu, Medico vocato materia non amplius in flu-  
xu esset, statim eò allaborandum esse duximus, ut  
interius gargarismo repellente & discutiente fau-  
cibus prospiceremus, & exterius tumorem emol-  
liremus ac resolveremus: illud perfecimus ejusmo-  
di gargarismo.

℞. Rad. Bistortæ ʒß. Herb. prunell. cum fl.  
plantag. ana m i ʒ. salv. agrimon. ana m j. alumi-  
nis ʒ j. F. decoct. ad ʒ. colentur ʒix. & adde mell.  
rosat. ʒ j. Diamor. ʒß. misce f. gargarismus. At  
hoc partim inunctione ol. chamæmelini, partim  
cataplasmate ex ficibus, Rad. althææ ana ʒ j. myr-  
rhæ ʒ ij. croc. ʒß. mell. q. l. peractum fuit, qui-  
bus ægra restituebatur, cum non admodum co-  
piosa esset materia. *Idem.*

Varia sunt anginae genera, sed nullum perni-  
ciosius illo; quod produxit, vel vertebra intro-  
sum luxata; vel inflammatio musculorum inte-  
rioris laryngis. Quorum profundus tumor, si-  
quidem coarctet angustam, asperæ arteriæ, ca-  
put; & ligulam illi insculptam (quæ sunt proxima  
vocis instrumenta) supprimitur non tantum  
vox: sed præcluditur quoque via spiritui; vel po-  
tius ipsi vitæ. Quæ sine spiritu nulli diu, durabi-  
lis. Ac proinde non inconsideratè, Hippocrates  
lib. 3. prog. latens angina, vel primo, vel secundo  
die, lethalis.

Nauta pleni habitus, correptus intempestâ no-  
cte, ab urgente faucium angustia, traxit illicd spi-  
ritum adeo difficulter: ut excitatâ febre, & accenso  
gutturè, incidere protinus in grave suspirium spi-  
ritum turbidum, imò ipsam mortem. Cujus peti-  
culo, quod subtraheretur, nihil non molitum: sed  
urgentior fuit necessitas; & vehementior, ab in-  
cluso spiritu, strangulatus: quam ut juverint ip-  
sum, vel sanguis maturè ex utroque brachio de-  
tractus: vel incisa ranula: vel cucurbitulæ, gar-  
garisationes, clysteres, cataplasmata aliaque latis  
celeriter adhibita Nicol. Tulpus.

Plurimis remediis nihil proficientibus in Viro  
Excellentiss. anginâ laborante monito empirico  
edoctus, ut lanam ovillam, nigram verò, in oleo  
chamomillæ fixam, duplicatis involutam linteis,  
desuperque emplastrum de meliloto parti affectæ  
applicarent iusti; quo applicato intra pauculas  
horas talis subsequabatur effectus, ut omnes ad-  
stantes summopere admiraremur, ægerque se pa-  
rum sublevari, nonnihilque auxilii perferre voce  
languidâ effabatur: Cùmque singulo quovis die  
ternis vicibus hoc reiteraretur topicum, præter  
omnium nostrum spem & opinionem intra paucos  
dies æger convaleuit, & hodie sanissimus suo per-

strenuè fungitur munere & officio. *Joan. Georgius*  
*Sartorius.*

*Bemvenum* cuidam angina latente strangulante  
affecto, etiam conclamato, incidit locum alio-  
ribus plagis sub ipsis maxillis, & etiam supra col-  
lum; unde sanie multâ protumpente, illum à  
morte ad vitam revocavit.

*Pro angina in viro quodam ex sanguinis*  
*repletione.*

Sanguine extracto, & clystere injecto, hoc  
gargarisma præscripsi.

℞. Fol. plantag. m j. fl. ros. rubr. p. j. gallam  
omphacridem (i. viridem) crasso modo contu-  
sam, sem. cydon. ʒ j. bulliant in tb j. aq. plantag.  
addendo aq. solani, equiseti, ana ʒ ij. colaturæ im-  
misce diamor. dianuc. ana ʒ i ʒ. f. gargarisma,  
quo cum gargarisasset, loqui potuit, quod antea  
minimè poterat, deinde hoc sequenti usus est.

℞. Fol. plantag. bellid. min. ana m. j. fl. ros.  
rubr. p. j. balauft. ʒ j. hord. communis, p. j. coq.  
in tb ij. aquæ communis ad tb j. cui adde tb ʒ.  
aq. plantag. & aq. scabios. ʒ ij, sem. lini scenn-  
græc. malv. (cùm jam in augmento essemus) ana  
ʒ j. gallam unam crasso modo contusam, nidum  
hirundinis cum plumis incisum (ad resolutionem  
aliqualem) ebulliant hæc simul, fiat levis cola-  
tura, adiendo diamori, dianuc. ana ʒ i ʒ. mell.  
rosat. colat. ʒß. m. eo plurimum delectabatur, cùm  
se levamen inde sentire fateretur.

Secundo die manè glande albo exoneratâ, venas  
sub lingua incidere jubeo crassissimo sanguine ac-  
nigerrimo effluente, & melius habere cepit, &  
spiritum liberius ducebat: eodem tamen die, gur-  
tur inunxitur linimento sequenti, simul etiam ca-  
taplasmate imposto.

℞. Ol. amygd. d. ʒ j. pingued. gallin. butyr.  
rec. in aq. viol. & camom. loti ana unc. ʒ. mucil-  
lag. sem. lini, scenngræc. malv. alth. extract. cum  
aq. chamæm. ana ʒ ij. ceræ citrinæ modicum, f.  
linimentum, lanâ succidâ superpositâ.

℞. Rad. althææ unc. i ʒ. fol. malv. viol. ana  
m. j. fl. chamæmel. melilot. ana p. j. coq. in aq. ad  
mollitudinem, pistentur, adde farinæ sem. scenngr.  
lini, hordei ana p. j. nidum hirundinis in pulverem  
reductum, ol. amygd. d. viol. butyr. rec. ana unc.  
ij. ol. chamæmel. unc. j. f. cataplasma, & amotâ  
lanâ, calidè apponatur.

Istis præliis cum paucis aliis, morti additus,  
luci fuit restitutus: *Petrus Forestus observ. 16. lib. 15.*  
*de faucium, gutturis, gula & aspera arteria affecti-*  
*bui.*

In Angina periculosa festinandum est; veteres  
eodem die, & sanguinem mittebant, & medica-  
menta exhibebant. Ego sanè (inquit *Trallianus*,  
*lib. 4. cap. 1.*) novi me, cùm usus valde urge-  
ret, venam manè aperuisse: diluculo linguæ lub-  
jectas secuisse; & vesperi ex cremore pisanæ la-  
chrymæ scammon. exhibuisse: atque ita la-  
queum ex inflammatione ortum vix potui dissol-  
vere. Et alium quendam novi me, postquam duo-  
rum brachiorum in cubito venas secuissem, re-  
purgasse, sequenti die non expectato. *Petrus Fore-*  
*stus, Observ. 15. lib. 5.*

*Pro Angina cum tumore in faucibus.*

Vocatus ad quendam, cui gutturis regio adeo  
intu-



Stumuerat, ut ne verbum proloqui posset, & se-  
re suffocaretur, tumore in faucibus manifestè  
apparente, cum adhærente tenacissima pituita &  
lentore. Statim cucurbitulas cum scarificatio-  
ne scapulis adhibui gargarismum sequentem  
suavi.

℞. Aq. solan. plantag. ana ʒ iv. syr. viol. mell.  
viol. ana ʒ ss. diamori ʒ j. acet. flor. papav. rhæad.  
ʒ ij. f. gargarismus.

Applicuit collo sequens cataplasma in illius  
ambitu sub mento.

℞. Farin. hord. fabarum ana ʒ iv. nid. hirund.  
ʒ ij. stercor. canis sicc. ʒ i ss. mell. unc. ij. ol. ro-  
fac. q. s. fiat cataplasma. Hisce vix dum per diem  
usurparis, melius habere cœpit, & è summo pericu-  
lo evasit. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 412.*

Protinus alvi excrementis per acrem injectum  
clysterem depositis, cephalicam dextri brachii ve-  
nam incidere iussi; hoc etiam gargarisma præ-  
scripsi.

℞. Syr. de ribeo, rob. mororum ana unc. j. aq.  
plant. skipit. rosar. ana unc. viii. m. f. gargarism.  
quo sæpe utatur.

Foris etiam ubi tumor in collo apparebat, lo-  
cus oleo chamæmel. superaddita succidâ lanâ, fo-  
tus fuit. Vesperti verò ex sinistra saphæna sanguinis  
unc. vj. fuerunt extractæ: sequenti verò die cucur-  
bitule ad primam vertebram & scapulas sunt ap-  
plicitæ; tum olei vice, quod foris admovebatur,  
emplastrum hoc apponi iussimus.

℞. Rad. alth. fol. malv. ana m. j. rad. lil. alb.  
num. ij. sicum ping. num. x. f. decoctio in aq.  
donec mollescant, dein in mortario optimè pitten-  
tur, & per seraceum transmittantur, quibus postea  
adde tarin. hord. lini fœnugræc. ana p. j. cineris hi-  
rund. unc. ij. stercor. canin. arid. & alo. unc. ij. farin.  
chamæmel. p. i ss. decocto prædicto omnia exci-  
piantur & f. emplastrum cui adde ol. chamæmel.  
rosar. an. unc. i ss. m. & ad ignem parùm tractetur,  
& collo affecto applicetur. Porro hujus emplastri  
vice stercus caninum atidum pistum & melle ex-  
ceptum, & dolenti parti admodum præstantissimum  
est remedium. Item cinis hirund. cremat. efficac  
quoque remedium est, si modo cum melle admo-  
veatur. Emplastrum etiam ex nido hirund. magnam  
in hoc casu habet prærogativam. Nec sunt audien-  
di qui ex nido hirund. tanquam ex terra frigida,  
emplastrum fieri formidant; cum reverà terra nidi  
hirundinis cum paleis, & cæteris in eo contentis,  
discutiendi vires habeat. Quanquam præsci Græci  
nunquam quod legerim, nido isto in hoc affectu  
usuli fuerint, sed potius cinere hirundinum. *Amatus  
Lusitanus, cent. 3. curat. 28.*

#### Pro Angina gravi in viro quodam.

Clysterem primum paulò acriorem in hunc  
modum præscribo, quoddâ strictâ alvo esset.

℞. Herb. 4. emoll. fol. caul. rubr. hyssop. cent.  
min. ana m. j. polipod. q. unc. j. sem. cartham. con-  
tul. ʒx. agatic. in petia ligat. ʒiij. sem. melon. cum  
cott. contul. unc. j. sem. anili & anethi ana ʒiij. flo.  
chamæm. & melil. fursur. macr. ana p. j. f. omnium  
decoctio in colatura ʒb j. dissolve catholic. unc. j.  
hier. Galen. ʒv. ol. viol. & liliorum ana unc. iij.  
mell. rosar. colar. unc. ij. f. clyster.

Ingentem excrementorum copiam dejecit æger, à  
quâ alleviationem sensi, cædendo clystere sanguinem  
eodem die bis è cubito detraho ad unc. xx. quod &  
æger valentissimis viribus esset, & morbus quo-

que magnus. Interea gargarismate astringente, &  
repellente, ut ægrum jubeo.

Sequenti die è venis sub lingua sanguinem de-  
traho, & Cucurbitulas cum scarificatu, sub volve-  
ram admoveo scapulis jubeo, à quibus mirificè se  
levatum sensit, & paulò tum facilius respirare cœ-  
pit. Interim in omnimoda abstinencia ægrum con-  
tineo; nec per primos tres dies, quicquam aliud  
præter aquam multam sumere jussi, neque etiam  
solidiora alimenta sumere potuit, ut qui etiam mul-  
sam ore sumptam per nates rejiceret, quod angio-  
nolis frequens esse solet. Infernas partes vinculis  
deligo, collo & cervici hæc impono.

℞. Ol. chamæm. viol. liliorum & cheirini, ana  
ʒ ij. ol. amygd. d. rec. ʒ iij. axung. Gallin. rec. ʒ j. bu-  
tyr. rec. sine sale ʒ j. croci ʒ j. f. linimentum, quod  
calidum collo & cervici, mollibus sanis pinguibus  
intectum admoveo jubebam. Ubi erò ad tertium  
diem ventum est, mox propiæ medicamentum  
solvens sarago, sed frustra in tentatum est: quare  
dixi æternis diebus clysterem superscriptum, à  
quo alleviari se plurimum æger sentiebat.

Cum autem ad quartum diem tubor aliquis cum  
dolore & tensione foras ad maxillam dextram se  
proderet, bonum id esse sum. ex Hippocr. & Gale-  
ni sententiâ arbitratus, itaque naturæ motum se-  
cutus, foras humorem evacuare studii, in hunc  
modum.

℞. Fol. plantag. hyssop. caul. rubr. ana m ss. caric.  
ping. num. xii. uvarum pass. ex acio. num. xx. liqui-  
rit. rasæ ʒ j. col. rubr. p. j. hord. cum corrice p ss. f.  
omnium decoctio in aq. hor. l. in colat ʒb i ss. adde  
diamori & dianthe. ana ʒ i ss. oxymel. simpl. syr. viol.  
ana ʒ ij. mell. rosar. ʒ j. m. f. gargarism. quo sæpe utatur.

Foris verò ad tumorem prominentem evocan-  
dum, & suppurandum tali sum usus cataplasmate.

℞. Fol. malv. alth. cum rad. ana m. ij. fol. caul.  
rubr. viol. hyssop. ana m. j. caricar. ping. num. xxx.  
fl. chamæm. & melil. ana p. j. sem. lini & fœnu-  
græc. ana ʒ j. capitum liliorum alborum ʒ i. fursu-  
ris p. j. f. omnium decoctio in aqua, pittenrur &  
cribrantur. Cribrata adde ni i hirund. in ol. li-  
lior. præbulliti, & cum toto probè in mortario  
macerati & postea cribrati ʒ iij. farin. sem. lini &  
fœnugræc. farin. frumenti ana ʒ j. coquantur fari-  
næ cum oxymel. ad convenientem glutinositatem.  
Postea adde axungie gallinæ rec. butyr. rec. sine  
sale ana ʒ j. croci ʒ j. ol. lil. ʒ iij. m. f. cataplasma;  
mirificè profectò humorem foras evacuat atque  
ad suppurationem deduxit: intra biduum namque  
suppuratus fere, qui foras subfederat tumor, fuit;  
cui tamen tertio post die canini stercoris sicci ʒiij.  
adjuuxi, quod si quid aliud, vel Pauli vel Avicen-  
næ testimonio. huic affectui maximè prodest, oc-  
cultâ quadam vi & proprietate. Suppurato tumo-  
re ad 7. diem candenti ferro aperiri jussit, quod  
id ulceribus & abscessibus plurimum conferat, ex-  
siccando, & virus malum ignis potentia corri-  
gendo. Pus fœtidissimum, virulentum & copio-  
tum prodit, ulcus mundificari curavimus, un-  
guento ex melle rosato, succo apii & absynth. fa-  
rin. hord. myrrha & aristoloch. postea probè de-  
terso ulcere, quod intra 20. diem con-igit, ad sar-  
corica & cavum ulcus implentia nos contulimus  
unguento ex thuris polline, myrrha, iride, aloëque  
confecto, addito chalciteos emplastro, sicque Dei  
nutu integrè curatus fuit, magnâ omnium admira-  
tione.

Interim dum hæc facio, reliquorum præsidio-



rum, quæ juvare posse sum arbitratus, minimè obliviscor; nam cum devorare potuit æger, putigans medicamentum, & cataporia dedi, ad deducendum humorem, quæ quidem feliciter operabantur. Exhibui etiam rasur. dentis apri. ʒj. ex ol. amygd. d. & saccharo candido, quæ in hoc affectu prout & in pleuritide, præsentaneum est remedium atque arcanum. *Franciscus Valerius Observ. 10. lib. 2.*

Anginam magnam & periculosam non omittis, quæ ex universalium genere conveniebant, hoc gargarismo percuravi.

℞. Semperviv. m. ss. fl. prunell. p. iij. sal. armoniac. ʒ ij. decoq. in aq. lb. iv. ad casum unius, & utere pro gargarismo.

Vidi cuidam anginâ deploratâ laboranti, aquam æthereore vaccino destillatam, exhibitam ita profuisse, ut mox convalesceret. *Hieron. Kemsnerus obs. 91.*

℞. Fl. chamæmel. m. iij. aceti & olei ana part. æqu. decoq. pro cataplasmate quo calidè applicato extrinsecus ad locum affectum, intra horæ spatium apostema disruptum est, ac per os saniola & cruenta multa rejecit, & mox convaleuit. *Martius Reglandus cur. 36. cent. 4.*

Mulier quædam superstitiosè butyrum mense Maio asservabat, & colligebat tribus diebus rogationum, viris è lacte vaccæ quæ marem peperisset. mulieribus, quæ feminam; urgente malo inungebat, collo, cervici, & partibus vicinis, carpo, plurimum fricando atque hac ratione non paucos sanitati restituit. *Jac. Hollerius, cap. 23. lib. 1. de morbis internis.*

Sartor quidam anginâ laborabat, quâ deglutitio impediebatur, ei secta fuerat vena, clysteres injecti, & admodum velicatorium.

His non proficientibus, me vocante advertens cum vix tantillum jusculi cochleari magno conatu deglutire, ac per consequens medicamentum putigans haurire non posse, præscribo aqu. benedict. ʒ ij. quibus purgatus est pluries per vomitum & secessum, eodemque die ab angina liberatus. *Lazarus Riverius observ. 24. cent. 2.*

Juvenis quidam fossor anginâ laborabat ita vehementi, ut nec loqui, nec deglutire posset, respiratio tamen integra manebat, cum ad eum vocatus sum injectus fuerat clyster, statim verò sanguinem mitti jubeo ad ʒx. postea admoveitur velicatorium posteriori cervici, cucurbitulæ scapulis admoveatur cum scarificatione, & 4. horis à venæ-sectione exhibentur aq. bened. ʒ ij. quibus purgatus est per vomitum & per alvum; & inde loqui ac deglutire coepit, ac paulò post integrè curatus. *Lazarus Riverius, obs. 10. cent. 2. vide ejusdem obs. 60. cent. 4.*

Illustris mulier Gabriela Goulier Domina à Saul-tono: cum angina autumnali omnium periculosissima detineretur, venit in mentem me legisse apud Ætium lib. 15. cap. 6. agaricum occultos abscessus absorbere, vel foras materiam evocare; statim agaricum in taleolas concisum in decocto rad. althææ, ficuum cum momento zinziber. & quartâ parte vini albi maceravi, addidi syrupum de althæa, & portionem ægrotæ dedi monuique ne illam deglutiret sed aliquod tempus in imis faucibus contineret, si hac potione vitam sibi redimere vellet, obsequitur ægrotæ, interim dum cum illa sermonem conferebat, ecce magna puris albi copia, tam putridi & graveolentis ore rejicitur, ut filia quæ ad matrem cum pelvi adstabat, excipiendi puris ergo, prægravi eius fetore, conciderit animo, ad ægro-

tam postea rediens, eam & vocis vitio & respiratio-ne difficili, & gravi deglutitione, & febre levatam reperi & ab omni vitæ periculo tutam, quâ nunc fruuntur incolumis, *Jac. Doryneus, apolog. lib. 3. c. 1.*

Hispanus quidam cum acutissima anginâ in horas strangulati videretur, & omnia universalia & localia per venam sectam, scarificatas in collo cucurbitulas, acres clysteres, essent celebrata auxilia. & ipse nigricante facie velut emortuus jaceret; peritissimi Medici jugulares secandas imperantur, adfuit Chirurgus secandi arte dexterissimus, illas sanguine ad caput ruente, vaporesque multo impletas turgentibus & conspicuas resecuit, inseparabili sanguinis fluxu sequuto, ægroque lapsa in omnimodam virium jacturam, spes salutis abest, quum de eo ob violentum sanguinis fluxum, jam desperarent omnes vocatus accuro, emplastrum Galeuicicum ex aloë, thure, pilis leporis exactissimè trituratis & mixtis cum candido ovi, superimpono, quo ipse ad arteriarum & jugularium hæmorrhagias feliciter utitur; sicque collo commode ligato, ægrum jamjam exaltum resocillo, qui post horas aliquot, respirare & loqui coepit, & à morbo immunis revixit. Nec mirens ad tam periculosum remedium nos confugisse, quando enim salutis unica est via, hæc, licet cum periculo tentandâ; cum sciriis sit ægrum periclitari quàm spe adempta certò perire, ut monet Magister nam malo nodo malus cuneus querendus est, rariorque crudele malum nisi crudeli depelli potest auxilio. *Zac. Lusitanus obs. 95. lib. 1. prax. admir.*

Anginâ caninâ cum femina quædam nullo apparente tumore graviter corriperebatur, magnacum violentia respirans, ita ut in horas strangulati videretur, & neque cephalicæ, aut venarum sub lingua sectio, in occipite scarificatæ cucurbitulæ, actia clysteria illi opem ferre possent, tandem eodem die quo omnia ob procrastinationis periculum acta sunt, sub mento scarificata cucurbitula lummo fuit auxilio, allumpris deinde syrupis excretaque per spiritum pitui. à crassa & multa altero die melius habuit *Zac. Lusitanus obs. 94. lib. 1. prax. admirand.*

Juvenis quidam 20. annos natus, pituitosus, post celeritorem deambulationem, avidè hausit cerevitiam frigidam, unde intra horam deglutitio admodum difficilis, fauciumque dolor & tumor apparuerunt, vocatus venæ-sectionem levem institui jussi, sequenti que gargarismo curatus est.

℞. Aq. fl. sambuc. ʒ iv. myrrh. pulv. ʒ ss. sp. vin. rectificat. ʒ iij. sp. talis armoniaci ʒ i. luce. tarax. express. ʒ ij. m. pro gargarismo. Puella 20. circiter annorum, subito in maximam respirandi difficultatem incidit, cum faucium tumore & dolore, ut ne gutturam quidem liquoris deglutire potest; vocatus statim venæ-sectione celebrata fuit ad ʒvj. moxque sequens apozema pro gargarismo præscripti, unde levamen quoddam observavit.

℞. Fl. ros. rubr. ʒj. baccar. lauri excort. sem. levistic. ana ʒ ss. coq. in aq. communis lbj. vase optime clauso; in colat. dissolve mell. ros. ʒj. aq. theriac. simpl. ʒv. sp. salis armoniac. ʒj. m. pro gargarismo. Sequenti die clysterem purgum eminjici curavi, unde optime deiecit, eodemque die collo sequens cataplasma bis de die renovandum applicari jussi.

℞. Nid. hirund. num. 1. fl. sambuc. p. iij. coq. parum sub cineribus coctum num. ij. coq. ex cerevisia tenui. Contulis adde albi Græci ʒiij. ol. olivar. q. i.



q. l. m. f. cataplasma, quo quarto die abscessus fuit ruptus, ulteriùsque uia fuit solummodo melle rosaceo. pro linctu. *Fredericus Deckers obs. ad cap. 1. lib. 2. praxeos Barberiana.*

Anginâ laborabat Nicolaus Rota, nullus tamen rubor aut tumor, vel ingûs in gula, vel extra videbatur; & ipse nihilominùs vix spiritum trahens, quicquid præterea edendum sumeret, per os statim & nares rejiciebat: quare cum arescente corpore, pallente jam facie, ac vertentibus oculis, spes omnis sublata esset, & Medici, quibus curâ demandata fuerat, ægrum ampliùs non audirent; me licet juniorem convocant, ægrum ostendunt, & quæcunque acta fuerant exponunt; at ego cum & ægrum ipsum ad monem tendere, & medicos quæcunque opportuna fuerant præsidia adhibuisse intelligerem, cœpi ipse mecum cogitare, satius ne esset, ægrum ipsum Deo & Naturæ, ut cæteri Medici, incuratum dimittere, an aliquod licet insolitum, utile tamen auxilium experiri: verum adhortantibus his qui ægro assistebant, consilium capio, & locum altioribus plagis sub ipsis maxillis, ac eriatâ suprà collum incido, ex quo cum sanies multa prorumperet aded morbus levatus est, ut faucibus ipsis spiritum simul & cibum capientibus, facilis dein ad bonam valetudinem ægro daretur regressio. *Antonius Benivenus cap. 38. lib. de abditis morborum & sanationum causis.*

Dn. Joan. Merula Pastor noster fidelissimus Dysenteria per menses duos gravissimè laboravit. Ex qua cum ferè curatus esset, interim dum ego Vivacum ad ægrum profectus fui novo & gravissimo morbo corripitur. Pustulæ enim quæ in fine morbi in labiis exumpere solent, in ipso natura propter virium imbecillitatem, (quæ cum ratione morbi, tum etiam ætatis, sexagesimum enim sextum annum prætergressus est, aderat) tam procul expellere non poterat. Circumscitæ uvulam ipsamque radicem linguæ eruperunt, idque non sine dolore & inflammatione: Barbitoniosem atque ineptissimum hominem in consilium adhibuit; is quotidie ter aut quater pulverem pipæris & croci gulæ faucibusque insperxit ac sufflavit. Dolor mox auctus est, aucta & est inflammatio & febris, per intervalla quoque lipothymia superveniunt. Tum ut optimum istum virum à morbo penitus liberaret, & ad patres ablegaret, medicamentum, quod simul per superiora & inferiora operabatur (Antimonium fuisse arbitror) exhibuit. Ego advocatus, cum celeriter ad ipsum ivissem, in mortis ferè agone cum reperi. Vix enim spirare potuit; inquietudines aderant maximæ, lingua quin etiam faucibusque aded intumefactæ erant, ut vix spiritum ducere, aut jusculum aliquod nonniti summo cum dolore, & agitationibus involuntariis & convulsivis totius corporis, deglutire posset.

Curationem porro quod attinet, illam sic institui. Os faucesque continuo ut lacte recens emulso ablueret, jussi, per intervalla quoque decocto hordei, rosarum, scabiolæ, melle rosato mixto, os colluebat: singulis quinetiam horis parum olei amygdalarum dulcium ex cochleari assumebat. Ter item quaterve interdum, ac totidem noctu, collum, pectus, cervicem oleo liliotum alborum & amygdalarum dulcium, inunximus, & lanam succidam calidè applicuimus. Euntibus item maceriam, quæ propter doloris ve-

hementiam affluebat, deorsum revocavimus. Cum ita per horas circiter triginta processissem, vomica in faucibus rupta est, ita ut materiam purulentam per os expueret.

Hinc imminuto mox dolore, faciliùs spirare & juscula sorbere coepit. Tum continuo lupetibâ decocto hordei os abluens & nonnunquam aliquid mellis rosacei ex cochleari lambendo alluens, nec non optimâ victûs ratione & medicamentis vires refocillans, paulatim singulari Dei beneficio, pristinae sanitati præter spem atque expectationem omnium miraculosè restitutus fuit; ita ut in præsens etiam septuagesimum annum ætatis intraverit, nihilominùs tamen rectissimè valeat, & officio suo cum laude & hujus Ecclesiæ emolumento fungatur *Guilielm. Fabric. Hildan.*

Vir quidam apud nostros mercaturam exercens annos præter propter 40. natus, & crassiori collo præditus, subito in anginam talem incidebat quæ musculi omnes & laryngis & pharyngis, sique tum externi, tum interni, ita tumebant, ut non tantum respiratio atque deglutitio difficillimè fierent, potiusque ipse per nares inter bibendum regeretur, sed etiam totum coillum extus prætumidum atque prædurum videretur. Plurima in ipso morbi initio celebrata sunt remedia; venæsectiones scilicet tum in brachiis, tum in pede, tum in jugularibus. Purgantia atque emetica medicamenta exhibita, eclegmata, gargarismata, aliaque appropriata, clysteriis singulis diebus injectis adjuncta fuere. Extus item applicata cataplasmata è nido hyrundinum, nasturtio aquatico, oleo chamomillæ, meliloto &c. cerarum è spermate ceti, inunctiones variæ è balsamis tum naturalibus, tum artificialibus, ipsoque etiam oleo succini; quæ omnia ad tempus aliquod satis proficua visa sunt, nam & febris imminuta est, & ipsa die morbi quinta facilior deglutitio atque respiratio, interim tamen in nocte ejusdem diei subito suffocatus obiit, unde satis apparet non multum fidendum induciis quas morbus tam atrox remediis quasi coactus concedere videretur. In aliis tamen non ita infaulta fuit cura eadem methodo instituta.

#### ANGLICVS SYDOR

Vid.

#### SYDOR ANGLICVS.

Item Febris Maligna.

#### ANGOR.

Est potius symptoma morbi alicujus, quàm morbus ipse, & consistit in quadam quasi cordis contractione, quæ sanè pessimum est signum si in principio febrium acutatum adveniat.

#### ANHELOSI.

Sunt Asthmatici de quibus vid. *Asthma* alique respirationis læz species.

#### ANIVLCVS.

Vid.

#### VLCVS ANI.



## ANI FISTULA.

Vid.

## FISTULA ANI.

## ANI CONDILOMATA.

Vid.

## CONDILOMATA ANI.

## ANI INTERTRIGO.

Vid.

## INTERTRIGO ANI.

## ANI PROCIDENTIA.

Vid.

## PROCIDENTIA ANI.

## ANOREXIA.

**A**norexia seu Inappetentia, cum sit una e famis latæ speciebus pro ejus natura melius intelligenda, quid sit famis prius explicare non inuile fuerit.

Fames autem nihil aliud est quam cibi absentis appetitus, ut eo scilicet reparantur damna sanguini, & partibus solidis illata; ob eorum particulas, tum sensibilibus receptas, tum insensibilibus per cava cutis spiracula in circumfulum æterem diffusas.

Circa illius causas & irritamenta, cum varient opiniones præcipuas recensere non pigebit. Galenus cumque sequenti multi causam famis unice constituerunt in quadam suctus sensatione ventriculo inuito familiari, quam sententiam illustraturus Anton. Menjotius sic scribit. Partium omnium, primùmque extremarum, quippe quæ ob æris viciniam interioribus prius inanescant, inconspicua vacuatio appetitum naturalem provocat, qui inclinatio quædam, ac ipsa quædam insita propensio, potius quàm peculiaris ac distincta potentia: Solicitato appetitu naturali sic attractio succi alibilis e minimis finitimisque venulis, quæ a majusculis venis vicinis & continuis aliud nutrimentum rapiunt, hæcque rursus ex aliis majoribus & sibi propinquis, donec per successionem quandam velut in choro translatione festinanter facta, tractionis impetus perducatur ad mesaraicas venas. Hæc in intestinis totæ desinunt ac obliterantur, nec proinde a ventriculo, ut communiter fertur, quasi radices stirpium e terra, sed ex intestinis pabulum, hirundinum more, queritant, moxque intestina medio pyloro tanquam ore ventriculum lacte utarque fellant. Verùm ut nervosè admodum adnotat Glissonius arteriæ hunc suctum non perpetrabunt, quandoquidem earum munus est tantum sanguinem ad partes affundere, quæ actio repugnat suctui. Non venæ, quarum officium est excipere & reducere sanguinem ab arteriis effusum, non ventriculum sugere. Insuper neque nervis hic suctus convenit: Hi enim motum ventriculo, sensumque quo suctum, si forte adesset, percipiat, impertiuntur, ac suctum ipsum moliri nequeunt. Restant ergo tantum lacteæ, quæ huic muneri præterdant, sed hæc admodum, (aut potius nulla) in ventriculo

reperiuntur. Quibus addimus quoddam etiam si hæc in ventriculi fundum, implantarentur, non tamen propterea sugerent, sed tantum exciperent illud quod ventriculi actio latè attenuatè elaboratè, ut per crustam ipsius villosam, aliæque semicula ad ostia vasorum lacteorum posita transmitti possent. Neotericis plures spiritibus acidis superius ventriculi officium vellicantibus, hoc munus demandantes, eos in liene exquirunt, indeque per vas breve, sive sub forma vaporis, ut placet Helmontio, sive sub formali quous, quod pluribus in gis aridet, in ventriculum de u. unt. Verùm etiam si humor in acidum e sanguinis miscella in liene non tantum separari, sed etiam exaltari, concedamus, non tamen propterea concludendum credimus succum illum, in ventriculum quomodocumque per vas breve deduci posse; nam & ligaturæ, & valvularum situs, jamque constans apud omnes sanguinis circuitus opinio, latè superque evincunt nihil sanguinis aut succi acidi per vas memoratum e liene in ventriculum, sed potius e ventriculi parietibus in venam splenicam, quod per partem ad hepatis devehatur, procedere. Non illiusmodi Des Cartes; ejusque auctoritati assurgentes quidam viri Docti, acido famis causam cum prioribus quidem tribuunt, sed illi in stomachum devehendo arteriæ celiacæ ramos nun. upant; quod ulterius explicat Ludovicus de la Forge dum addit, non quidem omnes sanguinis particulas per has arterias appellentes, isti officio destinari, sed quoddam tantum maxime fermentaceas quæ a poris apertis exceptæ in visceris cavum intromittantur. Verùm quandoqui semper hæc omnia a Viris Clarissimis asseruntur, illis aut studiosius expendendis, aut diligentiùs impugnandis non iminoratur. Alii tandem quibus calculum nostrum facile adjicimus volunt chylis sedimentum seu portionem ponderosiorè atque crassioribus particulis salinis prægnantem in fundi ventriculi rugis profundioribus restitare, ibique salivæ indefinenter deglutitæ & succo per vasa excretoria minima, e glandulis itidem ventriculi minoribus producta, advecto, intimè misceri. Addunt præterea particulas hasce variis invicem mistas proprio ventriculi calore, alioque a partibus adjacentibus mutato, ita exagitari, ut earum portio aquea exhalet, sulphurea volatiliteretur, atque salina, quæ abundantior, exaltetur, sicque spiculis suis sulphure volatilifero temperatis, tunica ventriculi nervæ vellicationem spècificam inferat, quæ cerebro communicata ex legibus unionis animæ cum corpore famis sensum exciter.

His ita positis quis non vider famem aboleri sensum debere & propterea Anorexiam induci, si; vel a vita, nimis otiosa vel alimentum per multum tempus ingestum sit nimis aqueum, imò si sit nimis crassum & terreste, quorum illud doliuendis salibus in ventriculum allatis, hic verò iidem obtundendis & stupefaciendis, potius quàm exaltandis aptum est; vel si saliva iners atque viscidior e faucium & palati glandulis ad inferiora continuè depluens lentore suo fermenti vires quasi pessundet; vel si officia vasorum e glandulis tunica ventriculi productorum mucosè obstruantur, sicque humori illac in cavum visceris derivando obicem ponatur; Vel si laxiores eadem glandulæ, laxiorque aut aquosior ipsa sanguinis miscella serum copiosius lussit; Vel si rugæ ven-



ventriculi ita obliterentur ut particulis salinis ponderosioribus descriptis ad tempus sui exaltationi necessarium continendis non sufficiant, casq; prius quam par est elabi sinant; Vel si calor partis viscerumque adjacentium, (cui non parum intervit fibrarum ventriculi vigor, quod circum alimentum validius coarctatus, illud proximius complectitur) aut languescat, in gradu qui verè digestionis aptus est non reperitur aliisque rationibus, nihil aut parum deperdatur succorum in corpore circulantiū, Vel ventriculus ilupore aut marcoli afficiatur, proptereaq; vellicationes minus percipiat; Vel tumor aliquis aut aliud corpus extraneū aut scdus humor ab ulcere tum in ipsa parte, tum in vicinis constituto, exudans, aut vapor ab iisdem corruptis continuo exhalans viscus in munere suo perficiendo intermitat. Sic ab officio ventriculi aut alia ejusdem substantiæ parte ulcerata; a compresso per magnum & ponderosum hepar stomacho; a copiosa adipe, aut potius sebo circa fundum integre superficiei ventriculi adnato; a corruptione, imo tandem syderatione, tum ventriculi fundi, tum ipsius pylori; a lapillis pluribus in ventriculi fundo pronatis; ab admodum dilatato ventriculo, fibrisque ejusdem prorsus relaxatis; ab induratis iisdem fibris moribusque ad cibi exceptionem, compressionem, & exclusionem necessariis prorsus ineptis; a vomica, aut tumoribus cavæ hepatis parti connatis; a pancreate magno & scirrholo; a putrefacto omento; a dextro rene consumpto & sinistro parte infecto; ab utero corrupto, & quasi gangrena affecto; a pyloso indurato, aliisque similibus causis anorexia factis probavit cadaverum anatomicæ inspectio.

Quandoquidem quod plantæ in sui vegetacionem & conservacionem per radices exugunt, animalia per comestitionem faciunt; satis apparet famis absentiam magno fore detrimento, præcipue si illi omnis propè vorandi impotentia adiuncta sit, sic enim corpus necessario non tantum marcescit, sed etiam sanguis fit evanidus & instat vapor, languent omnes succi, & ipsa viscera, sicque anorexia & cachexias, & icteri & hydropes, aliorumque multorum morborum, est parata. Itaque inappetentia immoderato appetitu deterius censeri debet, quia ab hoc non tot damna nascuntur facilliusque etiam est naturam incitaram inhibere, quam detrectantem incitare. Interim tamen cibi fastidium simplex atque *stripi* passio est plerumque chronica, nec absolute formidanda. Imò nec in principio, augmento, & vigore morbi acuti terribilis est anorexia, quod eo tempore opus sit tenuiore victu, ac extincta febri symptoma dispareat. At iuente morbo censetur magis insaufa, ut habet Menjotius, & ut causa, & ut signum; Ut causa quod obicit refectioni ac recreationi membrorum defectorum: Ut signum quoddam recidivam interminetur propter reliquias morborum apparatus. Secus dejecta sub finem morborum appetentia, ob facultates corporis laceratas, acrietas suisque muniis segniter tungenças, ægriitudinis recursus per se non prælagit, nec ut sic affecto succurras continuo ad purgationem deveniendum, quin potius in corroborantium usu expectandum donec vires ventriculo æque ac aliis partibus reddantur. Hiscæ omnibus addamus ex Hippocrate. In morbo diuturno cibi fastidium & sinceræ dejectiones malum. Aphor. 6. sect. 7. In longis intestinorum difficultatibus, cibi fastidium

malum, & cum febre peius Aphor. 3. sect. 6. Ubi plurimum omnes male habentes, circa initia quidem cibum bene sumentes, neque quicquam proficientes, tandem cibum rursus averlantur: qui verò circa initia cibum vehementer fastidiunt, postea autem bene appetunt, si melius evadunt. Aphor. 3. sect. 2. De prognosi ejus anorexiæ quæ ab aliqua è causis, quæ in variis cadaverum refectionibus allatis, apparere, nihil adjicimus quia Lector satis superque videt quid de illis judicare debeat.

*Curatio* varianda est pro ratione causarum quæ anorexiæ faciunt; in genere tamen probantur vomitoria blandiora ex antimonio initio parata, item purgantia miltiora & præparatis aloëtica indeque parata varia elixiria, (tum acidis, tum volatilibus) ut & pilulæ. Conducunt etiam plantæ amaræ & aromata è quibus decocta, tincturæ, essentia, & vina medicata, confici possunt. Quidam maxime commendant spiritum veneris, omnesque etiam acidos spiritus, qui revera non tantum pituitæ ventriculi parietibus agglutinata, incidendæ valent, sed etiam fermento suscitando, ventriculoque excitando; illi tamen omnes commodius & tutius adhibebuntur si prius edulcorati fuerint.

Ex rartato etiam plura conveniunt, maxime verò tum tinctura, tum liquor è terra ejusdem foliata paratus. Inter fructus non immerito laudantur cydonia, quorum etiam succus amaris admixtus, magnæ est efficacis. De applicationibus externis, emplastris scilicet variis, balsamis, litibus, toribus, hic verba non facimus, illa enim omnia satis cuique sunt nota, aut ex iis quæ mox afferenda è variis autoribus restant, innotescent.

#### Curationes.

In fastidio & inappetentia valet spiritus vitrioli philosophicus, cujus affectus satis laudari nequeunt. Exhibendus is est in vehiculis convenientibus (in aqua menthæ acetosæ in vino, brodio) Fastidium id sit ex succo vitriolato viriato in ventriculi fundo, & contopito, qui iterum excitatur acidis. Elixir vitrioli Myntichti, si morbus ex defectu fermenti, insigne est stomachicum.

Externè cibi fastidium aufert Epithema ex vino malvatico & acetosæ, cum crusta panis pulvere caryophyllorum (si imbecillitas ventriculi quoque accesserit) aspersa & aliquoties calidè supra ventriculum posita. Idem efficit unguentum ex butyro capræ & oleo caryophyllorum stillatitio mistum inungendo ventriculum (præsertim in chronicis.) Joann. Hartmann. Præx. chymiatric.

In Anorexia debilitate caloris non datur melius remedium, quàm ambra in substantia, vel saccharo mixta, ut & pulvis analepticus Mindekeri. ℞. Pulv. stomach. ʒij. pulv. eparrubr. ʒj. misce. Dos. 2. cuspid. cult. ℞. Essent. menth. ʒij. sp. vitriol. rectif. ʒj. misce. ℞. Elix. stomach. ʒvj. Spec. admodul. imper. ʒj. pulv. stomach. ʒiij. cum s. q. sacchar. in aq. menthæ solut. ℞. morfili. ℞. Sp. malkich. ʒij. sp. vitriol. philosophici ʒj. misce.

Myva cydoniorum ad abiectam appetentiam mirabilis est, teste Zacuto l. 2. histor. 66.

Aqua cinnamomi cydoniata in frigidis stomachi affectibus valet. Optimè myva cydoniorum



potest cum hac vel aq. mentha misceri essent. menth. sal peregrinant. Ambra datur a gr. 4. ad 5. cum saccharo, vel quod melius cum facula aro- nis. Ex pulv. analeptico Myndereri, facula aro- nis & ebor. sine igne possunt fieri rotulae, Joann. Michaelis in *Praxi clinica generali*.

Cum materia catarrhi in venticulum delabatur, sæpe inappetentiam, Nauseam & Vomitus con- ciliat; contra hæc mala ita agendum.

℞. Aloës lotæ & succo rotar. aliquoties imbu- æ, 3 j. thei elect. cum aq. cinnamom. aspersi 3 iv. extract. thab. 3 ss. agar. trochisc. 3 ij. pulv. ma- stich. 3 ss. dissolvatur agaricus oxymelite. & om- nia cum syr. conservationis zinziber. misc. ac fiat massa pilul. aloëm in exigua quantitate sumpsi, quod hæmorrhoides fluere. cæc. rum 3 iv. al- vum quater placidissime abduxerunt. Venticu- lum de quo querebatur, tali unguento inunxi, & subidò melius habuit.

℞. Ol. nostr. stomach. 3 j. nuc. mosch. 3 j. mastich. pulv. 3 j. misc. de scriptio olei nostri sto- machalis hæc est.

℞. Ol. absynth. 1b ss. summit. absynth. m. j. caryoph. santal. citrin. ana 3 ij. ros. rubr. 3 j. ma- cie 3 ss. mastich. 3 ij ss. vini odorat. 1b ss. coq. ad vini consumptionem, & æstatis tempore collore- tur in sole, hyeme in loco calido. Cum vomitio- nes molestæ essent, ordinavi sequens scutum sto- machale.

℞. Ladani puri 3 iij. mastich. 3 ij. lign. aloës santal. citrin. galang. caryophyll. nuc. moschar. ana gr. viij. ol. stomach. & ceræ q. s. aspergatur speciebus arom. rosar. & obducatur syndone. Jo. Crato consil. 13. lib. 5.

Curatio hujus affectus, si ab aliarum partium vitio dependeat, ab earum curatione delumenda est. Si verò ex proprio ventriculi vitio contingat, ad calidam vel frigidam illius intemperiem cum materia conjunctam reducenda est.

Calida intemperies curanda est primùm humo- ris biliosi expurgatione blandè & frequenter re- petitâ eaque componi poterit ex thab. myrobal. tamarind. syr. rosar. vel de cichor. compol. cum rheo: aut si æger sit ad vomitum proclivis, blandis vomitoriis provocandus erit. Idem humor alte- rabitur julepis aut jusculis refrigerantibus, in qui- bus non omittendus est spiritus vitrioli, aut sul- phuris, quandoquidem acida omnia, præterquam quod bilem valdè contemperant, appetitum etiam maximè excitare valent. Unde sit ut ace- taria æstatis tempore ad excitandum appetentiam frequenter usurpentur, vel simul & semel humor ille biliosus alterari & expurgari poterit apoze- mate convenienti, cui ratione ventriculi addi po- terunt absynth. pont. m ss. myrobal. citrin. 3 ss. post purgationem ad venticulum roborandum convenient myva cydoneorum aut cydoniarum ipsum vel syr. cydon. cum syrup. de absynth. mix- tus, tabellæ diamargar. frigid. vel triasantal. vel etiam diarrhod. abbat. si obstructionis suspicio fuerit, vel opiata sequens.

℞. Condit. lactuc. & cucurbit. ana 3 j. con- serv. acetos. ros. ss. cichor. & bugloss. ana 3 ss. san- tal. rubr. corall. præp. margar. præp. ana 3 ss. tro- chisc. de spodio & sem. acetos. ana 3 j. cum syr. de limonib. s. opiata, cujus capiat ad magnitu- dinem castanæ manè & serò, superbibendo pa- rum vini dilutissimi.

Exterius verò sequenti unguento regio ven-

triculi inungatur.

℞. Ol. rosar. myrtini, & cydonior. acetos. rosar. lotor. ana 3 ij. santal. omnium, corall. rubr. coriandr. præp. ros. rubr. ana 3 j. gran. Kerites & spodii ana 3 ss. ceræ alb. q. l. F. linimentum, quo subtepi to inungatur dicta regio is aut ter in die, addendo acet. rosar. p. aum unctionis tempore, vel eidem parti a moveatur placenta rosar. a. eto irritata, aut in eod. imputum macerata, quæ re- movenda est priusquam incalescat. Denique in perseverante effectu plurimum proderit balneum, vel semicupium refrigerans & humectans bis aut ter repetitum.

Si a frigida intemperie producat inappeten- tia, Curatio institucnda est per evacuationem humoris moribici, & ventriculi corroboratio- nem. Vacuatio potest fieri per vomitum, si æger sit nauseabundus, & facillè vomat, aliàs per feces- sum, idque pilulis præcipuè, quæ hic magis con- veniunt, quia diutius in venticulo morantur, ut docet *Galenus lib. 4. de sanitate tuenda cap. 7.* qui etiam valdè commendat pilulas de hiera, quæ ex- hiberi possunt ad 3 ij. vel 3 j. manè duabus horis ante pastum; vel in hunc modum compo- ni possunt.

℞. Aloës elect. succo absynth. diligenter nu- trita 3 j. agaric. troch. 3 ij. thei pulv. & vino al- bo irritati 3 j. nuc. mosch. spic. nard. ana 3 ss. sal. tartar. mastich. & cinnam. ana 3 j. cum syrup. de absynth. F. massa pilul. ex cujus 3 j. formetur pi- lulae vj. deauratæ: capiat summo manè, si velis in- tegre purgare: vel sumat 3 ss. horis duabus ante prandium, bis aut ter in septimana. Possunt acui diagrydio si validius purgare volumus. Validio- res pilulae non conveniunt, quia humores ab aliis partibus ad venticulum alliciunt.

Si pilulae devorari non possunt, fiat infusio fol. senæ, myrobal. thei & agar. in vino absynthice vel decocto stomachico.

Terebinthinae usus opportunissimus est, quia viscera omnia commodè repurgat, maximè si ex ea & thab. pilulas confecerit.

Post purgationem sufficientem, ad roborantia veniendum est, tam interna quàm externa, quæ in sequentem modum præscribi poterunt.

℞. Syr. de absynth. 3 j. capiat manè jejuno stomacho per plures dies, vel illius loco vinum absynthites substitui poterit.

℞. Conserv. anthos, menth. cort. citr. condit. nuc. mosch. condit. ana 3 ss. myrobal. condit. nu- mero j. confect. alkerm. 3 iij. tunicar. interior. ventric. gallinæ præp. 3 ij. pulv. aromar. rosar. & cinnam. ana 3 j. cum syrup. de mentha F. opiata; vel cum saccharo rosar. F. conditum. Utatur ma- nè, superbibendo parùm vini generosi. Dictis re- mediis utiliter additur sal absynth. vel oleum men- thæ arte chymicâ extractum: vel sal absynth. & cortic. arancior. vel alterutrum ad 3 ss. in vino vel jusculo dissolurum exhibeatur. Sequens etiam sy- rupus efficacissimus est.

℞. Syrup. cydonior. & condit. cort. citri ana 3 ij. aq. cinnam. 3 j. ol. sulphur. gurr. xii. M. ca- piat cochl. j. per intervalla. Aqua clareta frequen- tissimo in usu apud multos habetur, cujus com- positio talis est.

℞. Cinnam. crassiusculæ reiti 3 j. maceretur in 1b j. aquæ vitæ per se in vase vitreo: in alio va- se vitreo per se & seorsim macerentur sacchar. al- biff. 3 vi. aq. ros. 1b ss. stent hæc omnia seorsim



in infusione per duos aut tres dies, agitando quolibet die pluries hæc duo vasa: tandem simul miſceantur materiæ in iſtis contentæ & per manicam tranſmittantur, colatura ſervetur in vaſe vitreo bene obturato: ſumat cochl. i. aut 2. jeſuno ſtomacho.

Apud *Parienſes* maximo in pretio habetur ſyr. de abſynthio Penæ, in maxima frigiditate ventriculi aq. cinnamom. ſola præſtantiffima eſt. Non minoris efficaciz eſt ſyr. cinnamom. cum aq. vitæ confectus prout deſcribitur à *Queretano* in *Pharmacopœa*.

Ad idem præſtat ſpiritus maſtiche, ita compoſitus.

℞. Maſtich. ʒij. galang. ʒj. ſpir. vini lb ſs. digerantur ac deſtillentur.

Utile eſt etiam elixyr proprietatis à *Crollio* deſcriptum, cujus gutt. xii. aut xv. cum vino exhibitæ miſcæ ſtomachum roborant.

In affeſu inveterato plurimum conducit decoctum ligni guajaci aut ſaſſafras, in plures dies ſumptum, cum levi ſudore, aut ſine eo in debilibus. Aquæ etiam thermæ ſulphuræ & niſtroæ, quales noſtræ Bellilucanæ, magnâ copiâ per plures dies ſump. æ, craſſos & mucilaginosos humores, omuemque ventriculi & inteſtinorum illuviem potenter abſtergunt & evacuant.

Ballaſtum *Peruvianum* ad roborandum ventriculum præſtans & efficax eſt remedium, ſi ejus guttæ aliquot cum vino Hippocratico, vel alio horâ una ante cibum exhibeantur.

Exteriùs verò admoveantur fomenta, linimenta, & emplaſtra in ſequentem modum.

℞. Rad. cyper. galang. ireos, flor. cort. citri ſicc. ana ʒij. ſol. menth. hyſſop. ſalv. roſimar. & majoran. ana m. j. ſem. aniſ. bacc. lauri, nuc. moſch. caryophyll. cinnam. ana ʒiij. ſ. ſthæcad. ſchænanth. roſmar. ana p. j. incidenda incidantur, & contundenda contundantur, ut artis eſt, includantur duobus ſacculis interpunctis, qui maceſcant in vino generoſo, & applicentur regioni ſtomachi calidè viciffim.

℞. Ol. abſynth. menth. nardini, ana ʒß. ol. nuc. moſch. ʒij. lign. aloës, macis, cinnam. ana ʒj. ceræ parum F. linimentum: quod præſtantius evadet, ſi addideris olei caryophyll. gut. vj. moſc. & ambr. grifæ an. gr. vii.

Fiat etiam linimentum ex ol. nuc. moſc. & ballaſto *Peruviano*; vel ex oleo abſynth. maſtic. & ballaſto *Peruviano*.

℞. Maſt. emplaſt. de maſtic. aromat. roſat. an. ʒj. ol. nuc. moſch. q. ſ. F. empl. ſcutiforme, applicandum regioni ſtomachi.

Crato ſequens emplaſt. miſc. laudibus effert.

℞. Ladani ʒij. ceræ ʒiv. ol. nuc. moſch. ʒiij. F. emplaſtri maſſa ad uſum.

Admonet *Galenus* huiusmodi emplaſtra diutius non eſſe in parte detinenda, quia tandem calorem diſſolvunt. *Lazarus Riverius* lib. 9. *prax. Med.* cap. i.

### Conſultationes.

Affeſus, de quibus poſſimum conqueritur Per illuſtris Matrona, annor. 32. ſunt in ſignis inappetentia, diſſiliſque liquidorum deglutitio; quibus accedunt rugitus, ructus, tentiones hypochondrii dextri, non ſine aliquo dolore, vomitus-

que copioſiſſimæ pituitæ acidæ, cum ſponte, tum arte excitatus; de quibus querela primò fuit, tunc autumno præterito, licet antehac 20. & pluribus ab hinc annis conqueſta fuerit de continua inappetentia, oris amaritudine, tarda coſtione, diarrhœa, jecoris obſtructione, & magna flatuum copia.

Ex quibus unicuique compertiffimum ſit, ventriculum eſſe partem eſſentialiter, & graviter affectam, atque affectionem iplius eſſe intemperientis frigidam & humidam, eamque non immaterialem, ſed junctam cum magno pituitæ acidæ, craſſæ & viſcidæ proventu, cum in ventriculo genita propter intemperiem prædictam, & errores præteritos in aſſumptorum qualitate, tum & aliunde ſuſcepit per conſenſum cum aliis partibus malè affectis materiis viſcoſas ad iplum tranſmittentibus. Partes autem mandantes ſunt duæ poſſimum, caput nempe humidius, & fortè æquo calidius, & jecur præcalidum cum a naturæ primordiis, tum à prohibita ventilatione caloris iplius, ob graves & obvias iplius obſtructiones, unde ſons omnium malorum. Inappetentia verò cauſa eſt prohibita corrugatio oris ventriculi, quod ſit à pituita cum à capite jugiter delabente, tum in ipſo genita; quam ob cauſam neque ſitit, & liquida deglutire non poſſet, ob flatuum copiam; à quibus ſit etiam rugitus, & ructus ſerè continui: ſicuti iplius pituitæ vomitus, & obſtructiones ortum debent, ad tactum dolorificæ in hypochondrio dextro.

Eſt utique præſens affectus curatu difficilis ob morbi durationem, magnitudinem, & complicatos contrarios affectus præter naturam; cum præſertim in hac ætate declivi tantùm non langueat calidum innatum in ventriculo, fonte & origine ſerè omnium malorum. Non propterea de ſalute Nobilis Matronæ deponenda ſpes: quinimò alacriter congruis præſidiis tentanda erit.

Quare præmiſſâ primarum viarum expurgatione, detergenda, & evacuanda eſt materia in ventriculo contenta, diſſolventi flatus, obſtructiones attenuantibus, incipientibus, detergentibus, & evacuantibus ſunt reſerandæ, atque contemperandæ ſunt intemperies viſcerum malè affectorum; ventriculi quidem calefacientibus & exſiccantibus, jecoris, refrigerantibus, & capitis, exſiccantibus; vicium interim ratione habita congrua viſc. ratione. Quæ præſtabuntur remediis Chirurgicalis, Pharmaceuticis, & Dieteticis.

Sanguis propterea educendus venit ex ſalvatella, ac deinde ex venis ſedalibus, ad divertendam fluxionem, & jecoris fervorem contemperandum. Fonticulus ſiniſtro brachio inurendus, pro derivatione materiæ à capite ad ventriculum fluctantis.

Inter Pharmaceutica, præſcribatuſ lenientis loco *hierapiera Gal.* cum elect. lenitivo. Præparentur humores ſyr. ſine diluto putâ oxymel. ſimpl. ci mell. roſ. ſimpl. ſyr. de betonic. & de corticibus citri, cum emulſ. ſem. citri; quo tempore vomitus à cibo ciendus. A quibus exhibeatur triduum aqua Tertuliana, ad lb. tres, cum quatuor unc. mell. roſ. ſol. in primo cyatho. Deinde præſcribantur ſyr. aperientes. In quam rem uſui erunt oxymel compoſitum, ſyr. de cichor. cum rhab. & byzantinus cum aceto, addit. decoct. agrimonie, ceterach centaur. beton. ſcordii, & eichorii, alteraſque diebus exhibeantur unc. iij. decoct. epithymi



**Mel.** Loco prædicti decocti, atque repetitâ corporis purgatione cum infusione *agarici*, & *rhabar.* in decoct. *myrobalarum chebulorum*, & *emblicorum*, addito *syrr. ros. sol.* & de *polypod. composita*. A quorum utu assumat singulis matutinis horis *drach. j. rhab.* in tenues taleolas incisi, cum *passulis*, 15. dies, circiter. Hujus enim ope roborabitur ventriculus, flatus discedentur, obstruæ omnes aperientur, additi, externis inunctionibus ventriculo, pulveribus exsiccantibus capiti, & epithematibus ex *succo cichoris*, & *agrinonia* jecoris superinducto cerato *oxycocco*.

Sic enim prædictis affectibus prospectum ibimus, rectâ victûs ratione institutâ, & alvo lubrica servata *pil. de tribus cum rhab. ad drach. j. tertio* quoque die sub vesperam hora ante cenam assumptis, non neglecto modico corporis exercitio. *Benedicti. Silvatic. consil. & respons. Medic. censur. 3.*

Illustriss. quadragenarius, temperamentis totius & jecoris calidi & sicci, mediocritis habitûs exercitiis & venationibus antehac assuetus, modo tamen multis abhinc mensibus, ob cras ex catu affectum, domi continuò morari coactus, e bisque & potibus immoderate indulgens, tribus ab hinc mensibus de inappetentia conqueri cœpit, quæ aded tandem invaluit, ut cibos non solum aversetur, sed omninò ab iis abstinere cogatur. Sitis tamen illum maximè infestat, cum oris amaritudine, licet spura, imò & vomitus etiam quandoque viscida materiz & amaræ observentur, quamobrem infelix Pat. de agendis ad appetentiam recuperandam nos consulit.

Quoniam itaque ad vitam continuâ instauracione inligemus prout continuò resolvimur, & hæc forsitan a nobis neglecta fuisset, nisi aliquod ad illam irritamentum natura molita esset, ided nobis appetentiam indicidit, primò naturalem, ultimò animale, quæ quoniam in ventriculo magis viget, quàm in aliis partibus, ided propriam esse ventriculi actionem, & potissimùm ejus officii statuimus, prout in fundo ejusdem concoctio pethicitur, u. de jure Gal. ventriculum ciborum divinum promptuarium appellabat. Quare si appetentia propria est ventriculi actio, inappetentia ejusdem actio imminutè læsa omninò censenda, quam Anorexiam Gal. nominavit. Hoc autem affectu detentum esse Nob. hunc virum manifestum est, adeo hucusque adaucto, ut inappetentia ad ciborum abstinentiam deveniret, & Anorexia ad Aposittiam transire fecerit.

Affectus aqrem hujus immediata causa est defectus-suctionis in ore ventriculi, quæ casu nostro non solum deficit, quia non fiat, sed quia etiam, si aliquando sit, non percipitur. Primò autem non fieri credendum, quoniam suctionem præcedere debet venatum exinanitarum naturalis appetentia, atque hanc totius exinanitio, quàm non aded facile fieri posse in Nob. Pat. ob intermissa exercitia arbitramur, à quibus caloris ope toto corpore rarefacto, non solum per diaphoresim universalem, excrementorum, verùm & proborum succorum copia resolvebatur, quod hæc quies & otio fieri minimè potest. Sed præterea suction hæc licet aliquando fiat rard tamen aut nunquam percipitur, quoniam suctionem sequitur illius sensus, atque hunc appetitus animalis, ex Arist. enim appetitus procreatur ex fuga vacui, quod sequitur media, dum venæ majores à proximis non solum,

verùm & à distentionibus, in subsidium cordis sanguinem attrahunt, unde & ventriculus ipse exinanitur licque excitatur suction, quæ à facultate Animalis influente percipitur, à qua offertur primo sentatio inde Phantasia, ut tandem ab intellectu Agente illustrata, à Passibili intelligatur, & facultatibus ministris imperetur, ut indigentiz prospiciatur. Cum vero os ventriculi eruditatibus, ex libera vivendi ratione congestio, infarctum fuerit, suction non percipitur, quia adstrictio & corrugatio perthet nequit, præterquam quod mucosi aibus, bilioli quoque humores adjunguntur, quæ utpote calidi corrugationem eandem prohibent, quæ vel a frigido succo sit, vel à frigiditate non sine ope inanitionis inductæ. Hinc Cleonactides feblicitans, quia non abhorruit à cibo, biliolum succum & calidum non habuisse in ventriculo creditum fuit, à quo fastidiosi, id est, appetitu carentes fiunt. Quamobrem in casu nostro d. fiat appetitus, cum quia non præcedit totius exinanitio, quæ omnium prima ad appetitum excitandum concurrere debet, unde suction fieri non potest, tum quia, si interdum sit, ejus abest sensus in ore ventriculi, aded ut ob primam causam naturalis appetitus oritur, ob secundam Animalis, qui proprie fames dicitur.

Affectus equidem semper magni faciendus, intensus enim vel resoluta ciborum appetentia futuram prænuntiat ageritudinem aded ut sani à cibo diu abstinentes in convulsionem incurrant. Aposittia quippe invadens hominem tandem interficit, cujus vita sine cibo in septimum diem protrahi posse credidit Hipp. dum dixit, quod, *vita hominis septem dierum est* & usque ad undecimam Plinius. Quæ tamen utraque assertio perpetuæ veritatis non est, sed variat pro varietate ætatis & temperamenti, siquidem, qui crescunt plurimùm habent calidi innati, & ideo plurimo indigent alimento: senes vero facillimè jejunium ferunt ex Hipp. Ita humiaum temperamentum diutius famem tolerat, ut videre est in Animalibus degentibus in laebris, siccum verb inedia diu non fert, ut in picrocholis quotidie experientia demonstrat.

Quamprimum itaque Patienti Nob. appetentia restituenda antequam vires deficiant, ac proinde difficilior reddatur curatio. Quod præstabit congestos humores, tum in venis, tum in spatiis evacuando, ut non solum totius exinanitio, indeque sectio obtineatur, verùm etiam sectionis senius. Secundò ventriculum roborando. Et tandem aliqua à proprietate juventia in usum ducendo.

Atque à fonte Chirurgico repetita deprimenda sanguinis missio, licet Avic. moneat, quod nauseantem phlebotomare non oporteat, etenim sectio venæ, nostro casu, inappetentiz causam auferre potest, unde est concedenda, licet parca. Conveniunt etiam totius corporis frictions. Balneum quoque Aquæ calidæ cutem rarefacere, humores insensibiliter resolvere & discutere, ac exinanitionem adjuvare poterit. Et licet Hipp. cibos fastidientes non esse lavandos pronuntiaverit, intelligendus tamen de iis, in quibus adeest succorum defectus, ob metum syncopes.

A Pharmaceutico fonte primo evacuantia desumenda & vomitoria, ex Hipp. dicente, quod *si quis febrem non habens abstineat à cibo, & cordis morsum, & vertiginem patitur, & oris amaritudinem sentit purgatione indigere per superiora significat.*

Quod



Quod aliàs repetit dicens. *Si sine febre et amarum, & cibum averfatur, pharmacum dandum: hoc enim à bile patitur.* Cui fubfcripfit quoque Paulus. Præfcribatur itaque vomitorium, fed blandum, ne nova attrahatur à jecore materia ad ventriculum ipfum.

℞. Juris carnium rad. raph. alterati ℥x. julap. acet. ℥ iij. m. pro vomitorio. Inde clyster. quoque infundatur, qui poffit tum evacuare, tum à ventriculo revellere. ℞. Decoct. mal. viol. mercur. hord. ℥ j. fyr. rof. folut. ol. amyg. ana ℥ iij. falis parum, vitellum ovi. m. pro clyst. Tertio loco præbeat leniens, ita parandum. ℞. Elect. lenit. flor. caff. ana ℥ iij. crem. tart. ℥ iij. m. f. b. Sequentibus vero quinque diebus præparans hujusmodi. ℞. Julap. acet. ℥ iij. Pollin. crem. tart. ℥ iij. m. pro fyr. & fic pro aliis. Postmodum evacuans hoc pacto. ℞. Elect. lenit. ℥vj. cremor. tart. ℥℥. spec. hieræ simpl. ℥℥. m. f. b. a. quibus hora post ebibat aquæ hordeaceæ libram. Ac quoniam, licet biliolus humor adfit, ob vifcidi tamen, pituitosi & crudi per miffionem in ipfo ventriculo hæreat, idè ad perfectam ejusdem detersionem & ventriculi ablationem, aqua retentiana cum vehiculo mellis, & fyr. rof. fol. opportuniffima fuerit, femel exhibita, quinimo etiam repetita, fi vifcidæ atque tenaces obferuatæ fuerint excretiones. Inde repetantur præparantia, ferum nempe capr. deput. ad ℥ j. vel aqua hordei, præmiſſis ℥ iij. julap. acet. Septem autem exactis diebus ita purgentur humores. ℞. Elect. lenit. ℥vj. crem. tart. ℥ ij. Pil. de tribus ℥ j. m. f. b. quibus hora tranſacta fuperebat feri deput. aut aq. hordeac. ℥℥℥. & tribus poſt horis prandeat.

His peractis ventriculus quodammodo roborandus hac ratione. ℞. Conſerv. rof. ℥vj. spec. Diarrhod. Abb. ℥ j. tinct. corall. chymicæ gut. x. m. reform. elect. roborat quoque conſerv. cydon. tinctur. rof. cum ſp. vitriol. extracta. Sicut extrinſecus emplaſtrum de cruſta panis Montagnanæ vel de pulpa cydon. ſub cineribus coctorum additis pulveribus rof. ſumach. & maſtiche, cum aceto reform.

A proprietate juvant acida omnia, unde multi in hanc opinionem deveniunt, quod inappetentia fiat ex ſucco vitriolato vitiat in ventriculi fundo, & veluti ſopito, qui iterum acidis ſuſcitetur, idè ſpiritus vitrioli Philoſop. nunquam ſatis laudari poteſt, in exigua aq. menthæ, quant. vel vino exhibitus. Extrinſecus verd mirabilis habetur inunctio ex butyro caſtæ, cum aliquot guttulis olei Caryophyllorum reformata.

His accedat congrua viſus ratio, circa quam obſervandum, quod ſicut, *ſomnus ſtabilis, reſtation dormitatio.* Unde Gal. ait quod quos volumus profundè dormire, tantis pervigilare faciamus. Ita caſu noſtro, quem volumus elutire non oportet adeo ad cibum capiendum ſolicitare. Secundo notandum quod cibus, licet parum deterior, ſuavior eſt concedendus, quæ enim oblectant, addit Gal. avidius expetuntur. Tertio conſuetudinem, tempus & ordinem obſervare oportet. Viſcentur autem pinguis, oleoſa, ceterbum, medulla Animalium, naſcabundi & ingrati odores, ventriculus namque gratis & bonis odoribus gaudet, & ut ait Avic. *Amat aromatizationem.* Acida & acerbæ appetentiam excitant. Sapa ventrem firmat & appetentiam irritat, ſic olivæ muria & aceto conditæ. Aqua quandoque potius loco præferenda,

Edax ab Hipp. dicta, unde Piſcatotes & nauræ avidè cibum appetunt. Miva cydoniorum amiſſam appetentiam reſtituit, ut notat Gal. corpus exerceatur. Vigiliæ potiùs quàm ſomno indulgendum, alacriter vivendum. *Raymund. Jo. Forus conſult. Tom. 1. Cent. 2.*

Pergratæ mihi fuerunt litteræ tuæ humaniſſimæ, dextro mihi Mercurio traditæ, hoc ipſo gratiores, quod de nato Tibi ex conjuge tua lectiſſima, propitia Junone Lucina, filiolo, læta mihi annunciarunt evangelia. Eum Tibi cum conjuge lectiſſima ſalvum & perpetuum eſſe velit Deus opt. max. qui Te utriſque benignè beavit. Malè ſaltem me habet conjugis tuæ, meliori fortuna dignæ, Aſia & omnimodum ciborum ſatiſdium, quo non tantum toto imprægnationis tempore, ſed & nunc, dum nutritis munere fungitur, imo pectore ingemiſcit, accedentibus inſuper hſtericis ſymptomatibus admodum moleſtis. Non Te late, antequam Virum experta eſſet, & poſt contractum quoque matrimonium, quam mira & abſurda malicia, à pravis & certo modo corruptis humoribus, in ventriculo ob læſam ejus concoctionem collectis, orta, miſerè fuerit emacerata. Rectruduit illa, dum utero gerebat, nec dum evicta, cujus genuina quædam ſoboles eſt inappetentia. Ordinarium eſt hoc malum, virginibus chloroſi laborantibus, & gravidis quoque ob menſtruum ſuppreſſionem, quæ in corpore moram trahentia vitiolam induunt qualitatem, & ad partes ſuperiores regurgitantia non tantum ventriculum & ejus maxime oriſium ſuperius, appetentiæ ſedem, pravo ſucco inſiciunt, à quo actiones ejus depravantur & appetitus inprimis à naturali ſtatu deſicitur; ſed & vaporibus, ab eadem minera exhalantibus, hypochondria diſtendunt, caput gravant, atque mammillas de quo conquiritur, acrimoniâ ſua vellicant. Hinc certè omnes lacrymæ ac totius fundi calamitas. Inveterato huic malo & quali in habitum degenerato, bonis avibus eradicando *Æſculapio*, aut potentiore aliquo numine opus erit, maxime cum in mulierum morbis curandis Medicos divino inprimis auxilio indigere, magnus ille & æternum venerandus è Coſe-nex prudenter aſſimet, quod non facile quivis mulierum morbus ſuperetur, præſertim vetuſtus. Quia tamen naturæ potentia ac virtute atque temperamenti bonitate incurabiles propè morbi interdum vincuntur, velim, ut conjux tua dictum facum non minus de bonæ famæ, quàm boni corporis habitus Nutrice, cui filiolum lætandum elocet, diligenter circumſpiciat. Durus hic quidem ſermo, ſed ſanum conſilium. Metuendum enim ne mater cum prole dulciſſima, cibo debito deſtituta fame peteat. Sine cibo vita diu prorogari nequit. Siquidem, ut ellychnium lampadis olei fomento conſervatur; Sic genuinus humani corporis calor, humiditas & vires, quæ continua & occulta corporis exhalatione faciunt, ſalubri & debito cibi & potus pabulo conſervantur, quo nec aſſumpto, nec appoſito, neque inſanti lactando ſataget conjux, neque proprias vires reparare & cuſtodire poterit, quibus conſumptis ipſum extingui necellè eſt. Magna fateor, ſunt incommoda, quæ ab infantum elocatione nutricum incuria ſæpè læpius contingunt, quæ adeo nota ſunt, ut veteribus proverbii occaſionem præbuerint apud *Arſtophanem*, quemadmodum nutrices paſſim malè. Sed è duobus malis minus eligendum, & præſertim



stat filioi elocationem periclitari, quam matrem cum filio perdere. Tu hæc serio tecum rumina-  
bis, & quod maxime consultum videbitur facies. Laborat præterea conjux tua pertinacissimis visce-  
rum naturalium, Lienis præsertim obstructioni-  
bus, ad quas referandas antequam accingamur,  
ventriculus probe erit ab omni humorum, in eo  
latitantium, saburra everrendus, ne si malè sit huic  
coquo, totum amplius trahatur in malignitatis  
confortium. Hinc mari assimilatur, quasi mala  
toti corpori communicet, ab eodemque recipiat.  
Id leni emetico, addo etiam vitriolato, omnium  
optimè feceris. Quid si hujus remedii vim expe-  
riaris si ægram dicto audientem habuerim, velim  
ut vitrioli albi, ex artis lege probe depurati semi-  
drachmam, cum extracto Glycyrrhizæ, vel cen-  
taurii minoris in binas pilulas efformatam, jeju-  
no ventriculo devoraret, superhausto modico se-  
si lactis, cetevisia, more *Anglicano*, segregati,  
observato debito regimine. Medicamentum hoc  
tutum est & quod ventriculum non transcendit,  
cui quoque roborando non parum est accommoda-  
tum, antimoniali longè præferendum; Hæc enim  
non sine magna humorum perturbatione opera-  
tionem suam perficiunt. Id tanti mecum est mo-  
menti, ut reperendum suaserim, si votis, quod  
spero, responderit, & ægra cum *Æsculapio* sustine-  
rit. Omne hujusmodi ventriculi everticulum ex-  
cipiat alvinæ sentinæ deturbatio, ut illud Augiæ  
stabulum exactè, si fieri possit, expurgeretur, habito  
effectorum virium respectu, de quarum custodia  
maximè solliciti esse debemus, quum prima indi-  
cationum omnium ea sit, quæ de viribus sumitur.  
In eam rem amara præcipuè, quæ simul abstergen-  
di virtute pollent, ului etunt, atque hinc aloë ven-  
triculograta & amica dicitur. Præparentur hu-  
mores oxymelitis uncias duabus, syrupi de men-  
thæ & absinthio uncia cum dimidia, invicem mis-  
cendis & decocto hyssopi diluendis, bina dosi pro-  
pinandis & postea purgetur sequentibus pilulis, re-  
cipiendo pilularum de Hiera cum, agarico, masti-  
chinatum, ana ʒij. aggregativarum ʒj. alephan-  
ginatum, ʒiʒ. & cum balsamo Peruviano  
fiant pilulæ num. 30. quarum capiat quinque pro  
dosi. Interim corroboretur ventriculus speciebus  
aromatici rosati saccharo permixtis & cum pane  
albo tosto, vino canarino vel malvatico inebriato,  
hora una ante singulos pastus devorandis. Extra  
verò foveatur ventriculus decocto menthæ ab-  
sinth. rosarum rubrarum & florum camomillæ,  
nuce moschata, caryophyllis & similibus in vino fa-  
cto, & imponatur emplastrum sive scutum stoma-  
chale ex caruina & racamahaca in aqua cinna-  
momi solutis, adjectis speciebus aromatici rosati,  
cum balsamo Peruviano in emplastri formam re-  
digendis. His adiungenda proba victus ratio quæ  
neglecta oleum & operam ludet ægra. In ea vi-  
tentur omnia, quæ ventriculi orificium laxare ap-  
ta nata sunt, qualia sunt pingua quæque. Fugien-  
da quoque ingrata & nauseabunda. Usurpentur,  
quæ vim habent sensum appetitus stimulandi, in  
quorum censu sunt salsa & acria, modè assump-  
ta, & in prima potissimum mensa. Cibus ita præ-  
paretur, ne multa masticatione opus habeat, alio-  
quin si diu in ore versandus sit ingratus evadet &  
appetitum pervertit. Vinum ventriculo confert  
mediocre, modicè austerum, gustui gratum, non  
verò generosum, quo vires debiles fieri & ratio &  
experientia docet. Prodest absynthiæ. In genere

potus & cibus, modè calefaciendi, siccandi, at-  
trahendi vim habeat, calorque sopitus excitandus  
exercitio & laboribus, ante pastum incundis, cum  
distributionem ciborum promovendo appetitum  
egregiè excitent, quod in laboribus deditis ma-  
nifestum est. Singulas diartæ minutias recensere  
nimis longum foret. Hoc talem notandum ex  
*Hippocratis* oraculo, quod qui cibos deterioris  
notæ appetunt, cibos vero boni succi pertinaciter  
aversantur iis cibum parum deteriorem permit-  
tendum esse. Sed hæc sufficiant. Nec refert quam  
multa; sed quam apposita & efficacia præscriban-  
tur. Ventriculo quodammodo restituto, de visce-  
rum infarctu referando cogitandum, stadium cha-  
lybeatum percutiendo, in quo totius curationis  
cardo versatur. De quo in posterum. Tu his frue-  
re in conjugis lectissimæ compendium uberrimi-  
um, Valc. *Frideric. Lossii consil.* 12.

### Observationes.

#### De Anorexia mirabili.

Honesti & spectabilis, dum viveret, viri *Ge-  
rhardi Roggen*, relicta vidua, præclaris tam animi  
quàm corporis donibus pollens, sensim sine præ-  
gressa aliqua causa externa cibum minus appetere  
incipiebat, de nullo præterea conquerens fasti-  
dio, de nullo tædio, nisi quod nil comedere, nihil  
quoque bibere posset. Temperamento autem  
cum calido esset & humido, aqualiculum habe-  
bat satis capax & genas ut venusta erat, ruben-  
tes. Rogavit sæpius cognati, ut opem quæro-  
ret medicam. Ipsa verò cum remedia fastidiret,  
semper contradixit, cum satis commodè habe-  
ret, nec ullum sentiret malum: cur ergo, inquit,  
Medicinam adhiberem? sana sum, & satis obesa:  
nonne quilibet me rideret? sufficit exigente ne-  
cessitate medicamentorum capistro collum subde-  
re. Continuabat interim, imò in dies augebatur  
*anorexia*. ut aliquam virium jacturam sentire inci-  
peret. Varia interim præparabantur fercula, cum  
condimentis variis, pilces, carnes, aves, fructus  
horti omnis generis, & alia apponebantur, qui-  
bus sana sæpius delectabatur, frustra omnia: &  
quod mirum erat, non fastidiebat cibum vel  
potum, imò videre eum poterat, & ejus odore  
non offendebar sed comedere penitus non po-  
terat, quod nullum sentiret appetitum. Cum  
persuaderetur, ut iuscula saltem, quod corpus su-  
stentaret, ebiberet, impossibile sibi hoc esse, &  
peius sese sine dubio habituram, imò rejecturam  
se ingestum omne regebat. Durabat affectus  
per 17. septimanas, in quibus præparatum, imò pe-  
nè nihil biberat, multo minus autem imò vix po-  
lioni cum grossum valens comederat. Vocor tan-  
dem, num ad aliqua possit persuaderi remedia.  
Cum defectum fermenti causam affectus hujus  
cognoscerem, illi appropriatis mox succurrere  
medicinis tentavi. Verum uti à cibo, sic à medi-  
camentis longè major erat aversio. Nil sibi hæc  
profutura perpetuo dicebat, cum sana esset. Tan-  
dem præter spem vehementissimam narium patie-  
batur hæmorrhagiam, quam cognati nullis arti-  
bus sedare poterant. Advocor, venam ad revul-  
sionem faciendam incidere curo, anacollema fronti  
applicatur, lineum in acetum rosarum calefa-  
ctum immersum hepatis regioni adhibetur, lapsi-  
hama



hæmorrhagies in substantia & tinctura propinatur, nares fungo (povi dicto) obturantur, sicque sedata hæmorrhagia exanimis penè ad sese rediit, & ad iusculi usum per vim persuasa est. Recrudescere autem ad levem motum malum, ut rubentes iunctio genæ & labia pallefcere statim inciperent, quem pallorem ad ultimum viræ halitum etiam servabant. Redire quidem aliquatenus videbatur appetitus, ita ut iuscula, & ovum sordibile bibere inciperet; relinquere autem hæmorrhagia hæc tam gravis cachexiam, hanc excipiebat anasarca, quæ liberalius licet, frustra tamen adhibitis remediis ob exhaustum cum spiritibus calorem, tandem in beatam definebat *anasarca*.  
*Joann. Schmidii.*

Miles quidam chronicè febre malè mulctatus, incipiens jam aliquantisper respirare ab accessibus, simplex à me petiit, ut appetentiam in se planè dejectam revocarem, alioquin intra quadriduum indubiè periturum, ego præscripsi portionem ex ꝑ. diaphœnic. cum absynth. vulgaris & agrimon. decocto. Postea sequentibus veluti core, appetentiam acui.

℞. Fol. agrimon. absynth. vulg. cent. min. ana m. ss. ꝑ. omnium decoctio: de colat. capiat ꝑ. ss. cum paucis saccharo, iussi ut novem dies huic decocto indulgeret. Sed post dies quinque rediit ad me, enixè rogans ut caninam appetentiam ulu medicamenti nostri excitatam obrunderem, quod præstitimus abstinendo à portione nostra amara, illique consulendo ut butyro & vino generoso uteretur. Plures eodem remedio in talem affectum incidisse testis sum. *Petrus Pachonius.*

Vir quidam Consularis apud *Delphenses*, cum inappetentia laboraret, ad incitandum appetitum; una cum *Vergilio Medico Hagano* sequenti præscripsimus.

℞. Syr. de limonib. de acetos. citri ꝑ. ij. syr. acetos. simpl. syr. ros. ex multis infus. sacchar. rosac. ana ꝑ. j. syr. menth. ꝑ. ss. m. capiebat omni mane duo cochlearia, paucis vino rhœnensi addito, egregiè profuit. Verum post discessum alterius Medici, cum medicamenta abhorreret, macerabam per noctem absynth. Romani comam, & dentic leonis radicem unam atque alteram, paululùm contusam, in vino rhœnensi; mane vinum expressum propinabam, & dicta mirum vir Septuagenarius vermem mortuum postea & vivum deiecit, & appetitus miraculi instar, rediit. *Petrus Forestus observat. 8. lib. 18. de stomachi affectibus.*

Juvenis quidam macilentus ob biliosos humores cibum averfabatur; cum hoc modo curavimus. Cum mordaces humores biliosi ventriculum lancinarent, & hic nausabundus & in vomitum satis proclivis esset, statim je uno ventriculo emeticum blandum exhibui. Deinde pro levi purgatione propinavi syr. ros. pallid. ꝑ. ij. cum ꝑ. ij. feri iactis; qua portione brevi benè excrevit biliosa. Bilioso humore evacuato, & intemperie ventriculi calida syr. acetos. citri & granator. acidor. alterata, imperavi deinde ut persicam in principio paltus assumeret; hæc enim maximè appetentiam incitat, si à causa calida prostrata sit. Syrupus de persicis hunc in modum fit, quo uti possumus in tali casu.

℞. Succu persicor. nondum plenam maturi-

tatem assecutorum lb. iv. decoq. ad dimidii consumptionem: permittantur feces subidere: Deinde adjiciantur succi malorum punicorum ꝑ. vj. sacchar. q. s. simul perfecte coquantur, depurentur, adjectaque sanctali citrini q. l. suaviori odore reddantur: dantur ex hoc syr. ꝑ. ij. mane & vespere duabus horis ante pastum. Si persica defint, pro illis substitui potest succus pomorum acidorum redolentium. Exterius foris & unguenta adhibui deinde appolui ceratum sanctalinum, victu quoque refrigerante utens, & moderato somno, rectè deinde valuit. *Petrus Forestus observ. 7. lib. 18.*

### Abstinencia insolita.

Quidam *Marta Tailer*, nata in Provincia *Derbienti*, ab icu sibi in dorsum à molendario inflicto, lecto diu affixa est, unde parùm convaleuit; sed post paucos dies iterùm recidivam passa, sentit in gula deglutiendi difficultatem, & unà prostratum appetitum, adeò ut à festis Natalitius mensis Decembris Anno 1667. abstinere desierit ab omni cibo solido, uti & pedetentim ab omnibus liquidis, nisi quod rarissimè paucis gutturis prunorum coctorum, vel aquæ saccharatæ, vel succus unius uvæ passæ intillitur, cum pluma in os. Tredécim menses elapsi unè ab omnimoda hac abstinencia inchoata. Nihil evacuat per urinam, alvum, vel os: labra sicca cum pluma prædicta madescunt. Vultu manûs sæpè madidæ reperiuntur, vultus satis floridus, vox sonora. Abdomen ad ipsam spinam concidit, quæ manu palpat, non obstantibus musculis & intestinis, jam aridis, mediancibus. Cavitas est insignis à cartilagine entiformi ad umbilicum. Pars trunci superior valdè emaciatur, sed inferior longè magis: cutis prutiginosa scorditate exasperatur, quare aliquando lacte abluitur. Rarè dormit; sorores aiunt, illam quinque septimanas egisse insomnes. Curiosi multi undique conflunt ad illam visendam Medici, Chirurghi, aliique, qui integras noctes, per vires huic negotio insigilant, ut, si forsan fraus aliqua ab ipsa vel amicis facta fuerit, detegere: nullus hic est religionis prætextus, nullus Enthusiasmus. Mense Februarii præter ipso, hanc mirabilis hujus historię rationem accepi, de cujus veritate nullus dubito; utrum virgo adhuc superstiti nescio, nihil adhuc de morte ejus auditum, *Henrici Sampsonii.*

Noribergæ virgo quædam, statura corporis gracilis atamen ossium compage robusta temperamenti calidi, sicci, ad iracundiam facilis, à juventute assueta ob conceptum odium ac dissidium sæpissimè aliquot dies inpransa, & sine omni potu, citra virium lapsum permanere. Imò quodam tempore, & in ætate nubili, ob ejusmodi causam, inediam atque sitim per dies quindécim sub ædium supremo lecto, loco lualido & tenebricoso latitans, cunctorumque consortium ac alloquium fugiens, tam pertinaciter sustinuerat, absque omni degustatione cuiuslibet cibi, & aquæ alteriusve liquoris, ut familiares illam morbos sibi gravissimos ascituram matuerent. Sed illa sextâ decimâ sub nocte, cum ceteri dormiebant, prodicens incepit panis buccellam aquâ fontanâ imbutam tantum lambere.



moxque nutus in larebras suas recessit; die decima septima iterum noctu buccellam panis aqua imprægnatam modò rodebat; decima octavâ jusculum tenuè tepidum cum pauxillo pane incerto forbebat, demumque subsequenti tempore alios cibos quoque in minima portione sumebat, zythumque delibabat, usque alimentis ordinariis in dies stomachus probè allueficeret; nec unquam inde sanitatis noxam sensit, ac de more hoc ætatis annum quinquagesimum octavum attingit. *Helwigii.*

Christianus ab Ummerfom, vini mercator, anno 1636. mense Martio valdè nauseabundus erat, & appetitum dejectum jam multis diebus habuerat, ita ut vix quicquam comedens totus debilis evaderet. Quia autem pestis tunc temporis crudeliter grassabatur, ipse se pestilenti labe infectum esse putabat. Verùm non pestis, sed ordinarium suum præservativum, quò contra pestem quotidie ante meridiem nimia copiâ utebatur, mali causa erat, nempe vinum absinthiacum. Quapropter hujus vini usum planè prohibui, & dietâ conveniente præscriptâ, corpus leviter ex purgavi, ac deinde sequens conditum præscripsi.

℞. Rad. calam. aromat. nucis moschatae, maceris, florum sulphuris, ana ʒi ss. cremor. tart. ʒj. cinnamom. elect. ʒj. gariophyllorum ʒ ss. pulveriscentur subtilissimè, deinde addantur rad. helenii condit. ʒvj. conserv. anthos ʒ ss. zinzib. condit. ʒvj. olei vitrioli gutt. xv. syrapi de limonib. q. s. s. conditum.

Hujus conditi manè & vespèri interdum etiam meridiè particulam edebat, & vini absinthiaci usum intermittebat. Hinc brevi, cessante nausèa, rediit appetitus. Ex illo tempore conditum hoc tantum fecit, ut illud postea per aliquot annos multoties à Pharmacopœo confici curaret, ad appetitum & sanitatem (ut aiebat) conservandum. *Isbrand. D. Diemerbroëck. observ. & curat. Medic.*

Dominus Heer, Nobilis Anglus circiter 30. annorum cum per aliquot dies, præter consuetudinem, crapulæ nimis deditus fuisset, atque hinc ventriculi functiones interturbasset, multasque cruditates in eo collegisset, adeò inappetens evasit, ut spatio duarum septimanarum vix quicquam comedere potuerit; Tandem meo consilio hoc vomitorium assumpsit.

℞. Folior. asar. recent. ʒiij. contundantur & exprimatur succus cum decocti raphani ʒi ss. adde expressioni, oxymelitis cum agarico, ʒj. misce, t. haustus.

Hinc enormiter evomuit. Postea radicem helenii conditarum tria quatuorve frusta bis terve de die assumere, dietam calefacientem instituere, à crapulis abstinere, vinâ generosâ quidem sed pauciore quantitate bibere & statim post prandium vel coenam (quia ventriculus illi admodum humidus erat) frutulum unum aut alterum haledis salitæ crudæ comedere jussi. Atque hoc modo appetitus illi paucis diebus optime restitutus fuit. *Idem observ. & curat. Medic.*

Vir inter nostros Primatius sexagenario major, apud me conquestus est de tanta inappetentia quæ per duos annos ulgimò elapsos omnem prius carnium aut jusculorum ex iis paratorum assumptionem arcuisset. Consului masticatio-

nem rhei, & usum elixyris cujusdam volatilis amari. Post aliquot septimanas mihi obviis, dixit, se ex usu præscripto melius quidem habere, sed quandoquidem non præsto essent qui quoriâse admonerent de assumendis; remedium adhibendorum ut plurimum oblivisci. Cujus oblivionis pœnas non diu postea luit, liquidem debilitato ventriculo, illiusque vitio crudis multis aggestis, in hydropem ascitem sensim incidit, quò, post aliquot menses, miserè cunctus est.

Vir quidam spectabilis circiter septuagenarius, à pluribus annis summo ciborum fastidio cum laboraret, vitam vino generosiori sustentabat, atque ea propter quandoque Baccho paulò liberalius litabat: langor tamen totius in dies augebatur, & tandem in Atquarum nigrum incidebat, quò brevi extinctus est.

Mulier quædam quinquagenaria vino nimium dedita, in eam anorexiam incidebat quæ per annos propè duos ne quidem carnis unciam, aut jusculorum guttam ipsam haurire sineret; vino itaque unice vivebat, in quo quandoque panis frutulum intingebat. In ea dietâ, per annum integrum munia vitæ ordinaria sustinere valuit, & per urbem, quamvis languida, ambulare. Altero verò anno lecto affixa, ultimum diem expectavit, illumque nullis remediis prorogare valuit, quandoquidem ad ea omnia ita nauseabat ut illorum particulam assumere ipsi proflus impossibile fuerit.

Ex his & innumeris similibus quas afferre possem historis, abundè paret anorexiæ pertinacioris prognosim semper infatigam esse, nec ab ea aliud sperandum quàm lethalia symptomata, morbosque ut plurimum insanabiles.

### Cadaverum Anatomica Inspectiones.

Juvenis robustus cum lauto convivio interfuisset, eadem nocte dolore stomachi correptus fuit, qui ab initio mitis, sed post auctus & vagus factus est; nunc de dolore acutissimo capitis, mox, & in ipso momento, de maximo cruciatu ventriculi, ventris & artuum conquerebatur, cum vomitu omnium ingestorum: quandoque febris adiuvebat continua, anorexia: vigilia à prædictis doloribus vagis ejulare cogentibus: multa à D. Rescio frustra præscripta, nam post tormenta 18. mensium, tandem anno 1599. obiit.

Inspecto cerebro, in ejus ventriculis ad duas libras aqua limpida inventa; arteriæ item & venæ membranarum cerebri sanguine crasso & sacculato turgabant: In ventriculi ostificio superiori, parte anteriore, ubi ramus sextæ conjugationis interitur, ulcus erat magnum ac foetidum, in vacuum ventriculi usque penetrans: cætera in ventre inferiore rectè se habebant: ventriculus præterea humoribus corruptis, foetidis & atabilaris repletus erat; *Fabr. Hild. cens. 31. obs. 20.*

Mulier Romana 35. anno per plures annos inappetentiam passa, cum tussi sicca & spirandi difficultate, cum frustra variorum Medicorum auxilia tentasset, moritur; Dissectoque ejus cadavere, ventriculi omnes sibiæ nigre duræque repletæ sunt: Tres verò pulmonum lobi adeò indurati, ut potius rophos lapideos quam carnem omnibus videntibus ementirentur: Lienovi-



gallinacci magnitudinem non excedebat. *Ex. P. Spheræ observatoribus.*

Filia sexennis post lentam tabem, doloribus hypochondriorum & Inappetentiâ, seu prostrato ciborum desiderio, viribus fractis expiravit. In dissectæ cadavere Hepar univertum ferè occupabat abdomen, ventriculumque adeò ad inferiora depressoerat, ut quasi ab œsophago videretur separatus: Pulmo sinister contusivus. Tabi dederat occasionem, Pondere igitur Hepatis intestientis propter impeditam circulationem depresso ventriculus cibos vix necessarios respuit. *Thom. Bartholinus cent. 4. observ. 71.*

Cur nonnulli paucillam quantitatem cibi assumere possint causam videre vilius sum in vigili arcis Deslaviensis: Hic quidem munus luum obibat sed aliquot annos conquestus erat de cibi fastidio & vomitu, ut ferè solo potu se sustentare cogeretur, moriebatur tandem:

Aperito cadavere abdomen humore aquoso repleum reperiebamus: Deinde omentum putridum, ut ad tactum statim divelleretur: Præterea fellis vesiculam secundum quandam ramum ruptam: Quin & corrugatio aderat, seu concretio quasi membranatum scirrhodes: foramen quoque ventriculi vetus, quemadmodum ex lateribus nigris, crustosis & inveteratis patebat, conspiciebatur; cui & ulcus fistulosum jungebatur: tandem etiam ventriculi capacitas admodum exigua, & vix cum nucis juglandis magnitudine conferenda, occurrebat, quibus sanè factum fuit ut nihil ferè comederit; omnesque cibos ingestos statim rejecerit: quemadmodum sanici ratione ex ulcere, omentum & vesicula fellis computuerunt; & ob foramen portio porùs ad abdomen delata fuit: Miror verò, cum foramen vetus apparet, cur non major aquæ copia ibi reperta fuerit? fortian *vena ventriculi avida*, cum parùm aliàs alimenti allumerent, avidè potum statim luxerant & ad melataिकास deculerant. *Philip. Salmon. cent. 1. observ. 43.*

Ulcere ventriculi visus fuit quidam cerevisiæ coctor laborare, & quidem interioris partis: huic non modò ventriculus malè affectus erat, sed omnia viscera inferiora corrupta ac fetidissima: Multo tempore hic pallidus admodum fuerat, & mali in facie coloris: circa digitorum articulos tumores habebat; delectabatur cerevisiâ forti & medicatâ: Contigit huic ut ventriculo pure ac crudis humoribus repleto; cibum potumque non solum aversaretur, sed conatus ne transmutare quidem potuerit: Profuit serapium acerosum, ejus uno aut altero cochle ite sumpto, mox pituitam crudam, copioso pure permixtam vomuit: quod cum aliquoties deinde feceret, & vomitus tandem non amplius succederet, ad sanitatem se rediisse sibi persuadens, alia remedia admittere recusavit: Supervenit paulò post digiti unius sinistri pedis sphacelus; qui cum arte Chirurgi constitisset, mox dextrum pedem gangrenâ occupavit, & velociter progrediens, brevi supra talos pervenit: Hoc tempore cum de vitæ periculo admoneretur, respondit se nullâ corporis parte dolere, neque nunquam antea doluisse: Ita absque dolore, paucissimis post diebus, sub initium Julii, è vita migravit, tertio videlicet

mensis ex quo pus vomuisset.

Hujus omnia viscera, quæ aperto corpore in conspectum venire, corruptissima fuere, multo pone consistente pure, quorum tantus fœtor, adeoque gravis ac molestus, ut diutius hæere non fuerit possibile: multo minus singulas partes lustrare: Et tam fœtidum corpus necesse fuerit mox sepulture committere: videtur hic *interna viscera sensu destituta habuisse* contra planè quam nonnulli alii, quibus sensu prædita sunt. *Dodonæu observ. 27.*

Viduus quidam literatus, quadragenario major, melancholicæ, & dum viveret, valetudinariæ constitutionis, m. Februarii anni 1670. solito plus conquestus est de Rachibus austeris, Inappetentiâ & dolore ventriculi, necnon renum & dorsi: Subsequuntur dehinc sunt *obstructiones alvi*, noctes inquietæ & sæpè insomnes, doloresque obscuri, gravativi circa illa, iique in sinistro latere supra ventriculum quasi accendentes: febris apparuit nulla, major tamen nonnunquam sub vespere quam interdiu, lumborum dorsique incallescencia: urina pallidiores plerumque & crassiores deprehentæ, cum sedimento copioso, nonnunquam Tartaro rubeo, sæpius albo, mucoso: Pulsus in dies debiliior, ab initio tardior, versus interitum celerior; supervenit his omnibus vomitus sanguinis nigricantis, ingruens majores tenacissimos maximam partem concreti, qui cum intra triduum copiosior aliquoties rediisset, ægro, exhausto viri thesauro, leipothymias frequentiores, ipsam denique mortem accessit.

In aperto corporis mortui abdomine atque thorace, sequentia, ad partem affectam, causasque morbi & mortis imprimis facientia, occurrerunt notatu digna. 1. Pinguedo quidem fat multa sub cute per totum corpus diffusa. 2. Musculi verò abdominis & thoracis excarnes. 3. Cor nihilominus obetum satis, duriusculum, compactum, benè constitutum sanguine vacuum. 4. Pulmones, quoad colorem quidem à naturali statu parùm deficientes, flaccidi tamen & exanguis, horumque lobus dexter inferior versus dextrum thoraci annexus. 5. In ventriculo nullus sanguis, tunica benè constituta. 6. Lien justæ figuræ, magnitudinis & coloris. 7. Mesenterium non glanulosum, sed unâ cum pancreate naturaliter constitutum. 8. Hepar admodum magnum, totum obvolvens ventriculum, admodum pallidum, totum licet sanguine vacuum, ponderans tamen libras med. iij. & unc. viij. 9. vena porta versus Hepar sanguine exhausta. 10. Intestina in sinistro latere fuere benè constituta; quæ verò in dextro, livida, nigricantia, sphacellata valaque melataिकास in intestinalia desinentia sanguine nigricante turgida. 11. Intestini coli pars superior in sinistro latere supra ventriculum inflata, quæ verò deorsum vergit, incisum, sanguine concreto, fœculento, nigerrimo, instar picis, quale vomitu rejecerat æger, admodum repletum. 12. Renes pallidi & flaccidi, inque dextro horum materia multa Tartarea, & circa infundibulum calculus instar fabæ majoris. 13. In sinistro verò major & albicans calculus, pondere scrupulorum v. figura & magnitudine cordis avium oblongiore cornata, multa materiz serosolacea, quæ qua cum plurimis particulis



artareis, instar calcis, per totam renis substantiam dispersa erat, quasi innatans. Ex observationibus Dom. Friderici Orshlobii, Medici Uratislaviensis.

Vir quadragenarius post longam Anorexiam in Hydropem Ascitem inciderat, quod, nihil proficientibus remediis selectissimis, 28. Junii anno 1682. enectus est. Aperto cadavere sequentia adnotavimus. Omentum prorsus retractum, seque ad umbilicum usque non extendens, illudque ut & imi ventris viscera omnia in aquis contentis ita macerata, ut extris subalbida appaterent, hocque magis aut minus pro varia eorum ipsorum natura, coloreque naturaliter magis aut minus saturato. Hepar inter alia prorsus album, membrana crassa, scirrhosa, variisque protuberantibus onusta, vestitum. Vesicula fellea albidula, bilem interea complectebatur coloris ad naturalem aliquomodo accedentis. Secundò quod præcipuum fuit, quodque hic ad rem maximè facit ventriculi flabibus turgentis rugositates omnes erant prorsus oblitteratæ, ejusque corpus, seu potius cavitas, multò ultra naturalem statum distendebatur, eò quod sibi sensim non tantum laxata, sed etiam quasi laceræ visceris capacitatem intra proprios terminos non continuissent, sed illud quotidie magis ac magis dilatare visissent. Unde nihil mirum si fermentum appetentis naturalis excitantæ aptum, in eo non fuerit elaboratum proptereaque & anorexia, & à cruditatibus per partis debilitatem aggestis, hydrops tandem lethalis enati sint. De aliis in eo ipso subiecto repertis nihil addo.

### APHTHAE.

**A**phthae sunt ulcuscula ut plurimum albican-  
tia, subinde flavescentia & quandoque nigricantia per palatum, gingivas, linguæ latera & radicem, serpentina, quæ Latinis *Lacuum*, Arabicis *Alcola* nominantur. Hæ autem renellos præcipuè vexare solent, sed adultos etiam interdum, nempe mulieres mensium suppressionem patientes, imò gravidas, scorbuticos item, ac eos qui febribus malignis laborant.

*Causa* in infantibus petitur à lactis vitio & corruptis in ventriculo cibis, unde acor sanguinem & lympham inficiens deducitur, halitusque etiam acres in oesophagum & os ipsum elevantur, de quibus sic habet Sylvius de le Boë. Aphtharum causam veram non dubito asseverare humores halitusve acres, & quidem acidos, nunc quidem vomitu, aut exhalatione sursum ab intestino tenui ac ventriculo deductos, nunc una cum saliva in os delatos. In adultis verò, & his præcipuè qui febribus malignis laborant, accusabimus cum Christiano Langio impuritates causticas & acres retentas, imò sanguinem salsa, ac vehementi putrilagine inquinatum; unde humor salivialis ab eo, in toto ore, faucibus, & oesophagi atque trachæ tractu secretus veneni erodentis instar, eas quas alluit partes miserè corrumpit. Tumque non mirum si ventriculus ipse, thymus, pulmones, aliæque adjacentes partes, affecti visi sint in cadaveribus iis priùs denatis. Istius proculdubio fuit sortis morbus in Neapolitanam Gentem anno 1682. ingressus,

quem antecessit boiū annua lues; quique à Marco Aurelio Severino *manducatorum* nomine, seu pestilentis ac præ oculis pueros abscissus, in suo de recondita Abicellium natura, verè aureo libro; abundè descriptus & explicatus, reperitur.

Aphtharum color candidus nihil funesti præfigit, malè verò audit flavescent, & pessimè nigricans, præcipuè si febris copulatur hæc ulcuscula. Rursus si crusta regantur tenui, a partibus affectis facillè separabili, imò in plures particulas discreta; aut paucas tantum oris partes attingant, non ita mali sunt ominis; contra verò si crusta vestiuntur crassa, subjectis partibus quam maximè agglutinata, compacta & æquali, imò sicca & arida, idque eò magis quò diutius durat, aut ulcuscula in totum palatum, linguam, fauces imò oesophagum &c. serpent, illaque depascantur. Longum morbum significant aphthæ quæ intra triduum veniunt & abeunt, hæc enim alimè continuè subsequuntur, idque eò magis, ut habet Etmullerus, quò frequentius purgaveris. Quæ post singulum invadunt deteriores sunt, præcipuè in febribus, sic enim ventriculus primò affectus, denotatur, & probabile est morbum ab inferioribus oesophagi partibus ad superiores ascendendo, totum hujus tractum occupasse.

Aphtharum Infantiliū curatio tota in eo est, ut humorum acidorum aliisque acrimis vis retundatur, copia evacuetur, ne utque proventus impediatur, item ut partes affectæ ab iis liberentur, mundentur, ac consolidentur. Quibus intentionibus ut satisfiat non necessarium est plura adhibere remedia, sufficiet enim id. Lac nutritis, si per se peccet, corrigere, imò si malum prorsus sit, commutare, illudque per intervalla parca exhibere, quò melius & commodius digeri queat. Secundò corpus infantis blandè expurgare cum syrupo rosar. solut. vel è floribus persiliorum de cichorio cum theo, vel pauca manna in lacte soluta. Tertio os colluere ex decocto hordei, vel satureiæ, veronicæ, nucum expressi gallarum immaturarum, radic. bugiossi recentis, aquis rosar. & plantaginis, admixto etiam paucò amylo; succis telephii seu sedi majoris, malorum puniceorum &c. addito syrupo myrrhino, rosarum rubrarum, vel paucò diamoro, simplici lacte chalybeato, adj. Etiam si placeat rosarum rubrarum pulvere. Imò nihil vetat misturas hæc guttatim haurire, nec aliter etiam infantium os collui valeat. Præcipuè commendatur in hunc ultimum usum syropus è succo rapatum sub panis assatum, quò temperatur & alteratur humor peccans, partique affecta mundatur & consolidatur; ut & etiam syropus ex aqua rosarum, albumine ovi & saccharo, simul commixtis, probèque agitatis &c.

In Adultiorum Aphthis præterquam quòd digestam imperamus convenientem, acrimoniæ scilicet sanguinis retundendæ aptam; sanguinem si necessarium videatur, mittimus, corpus sobrie expurgamus; & præterea utimur gelatinis ex C. C. & ebore; mucilaginibus ex seminibus cydoniorum &c. aqua plantaginis & menthæ extractis; emulsionibus ex pistachiis, addito syr. jujubino; suffumigationibus ex herbis traumaticis, floreque hyperici vino incoctis & per tubum ap-  
ium



tum in os admissis; aliisque mox in aphthis puero-  
rum allatis.

Si verò Aphthæ febres consecretur malignas,  
ab hacum curatione illarum amorio pender, in-  
terim tamen non abs te fuerit eas remediis des-  
criptis lubinde demulcere, ne scilicet partes qui-  
bus insident crudeliùs depalescantur, atque cor-  
rumpant.

### Curationes.

In Aphthis primò est decoctum saturæ in vi-  
no, quo colluatur os sæpiùs,

Decoctum vero sic præstans, præsertim si ad-  
ficiatur aliquid mellis rosati.

Aphthæ infantibus maximè familiæ sunt,  
quibus fortiora & acria medicamenta non satis  
apud adhiberi queunt, ideoque nullum jucundius  
medicamentum de felicius, quàm succum carotæ  
luteæ expressum & ad syrupi consistentiam inspissat-  
um quo aphthæ apius illiniantur, propriâ expo-  
rientia commendate possum.

In Aphthis contumacibus hæc decoctis adde  
aliquid ip. vitriol. & non resistunt. (Item aqua in  
qua zluen dissolutum.)

In Aphthis ex lue venerea omnem absolunt  
nodum aquæ vitides, in primis si loco aquæ sim-  
plicis assumatur aqua persicariæ, vel si in secunda  
aqua foliis reliquis addantur folia persicariæ, *Joan.  
Hartmann. Præb. Chymiaris.*

Ad Aphthas magis convenit decoctum fi-  
cium, quàm passulatum, cinch. bellidis, rosa-  
tum vel maris vitriolati, aqua viridis Hartman-  
ni, rinctura lactæ, rob diamoron, aqua corr.  
nucum.

Ad puerorum Aphthas optimum est remedium  
syrupus fumaræ, purificat enim sanguinem.

℞. Syrup. de fumar. compot. 3 i. syr. po-  
mor. laxat. 3 ss. essent. fumar. 3 i. ss. misce. *Joan.  
Michaelis Præb. clinic. general.*

Quibus ægris lingua ac os intus tenaci & vis-  
cida crusta, ab illius viciatæ salivæ orta, obdu-  
cta sunt, illidem antequam ullum cibum, po-  
tum vel medicamentum sumant primò spathu-  
la, vel cochleari eandem deficiant, simulque  
salvia folio viridi fontana innatante lingua etor-  
didus curatius detergeatur, deinde os atque fau-  
ces aqua limpida, in cujus sextario nitri purissi-  
mi, aut sulphure aut sale ammoniaco præparati,  
vel, quod adhuc efficacius, nitri vitriolati 3 ij.  
solutæ sint, diligenter gargazent atque elu-  
ant.

Hoc in casu antequam inflammatio harum  
partium mortem alicui minuat, venas sub lin-  
gua, rarinæ vulgò appellatas, abique ulla mora  
tundere proficuum est: sed maxime cavendum,  
ne à Chirurgo fortiter ac profundè scalpello fe-  
riantur; alias sanguis tanta quantitate profuere  
possit, ut ipsius animæ cum sanguine expositio  
metuenda foret; cui maturè sistendo nihil aliud,  
quam eandem ferri atrocitas, frustra aliis ischa-  
mis priùs applicatis, necessarius est.

Si v. post hæc omnia rite applicata nihilom-  
minus lingua, oris ac faucium inflammatio nimis  
ingravesceret, eaque in oris siccitate, lingua ari-  
da, fissa ac nigra aut squallida cinerea crusta ob-  
ducta, inque faucium ac gulæ exulceratione, fissu-  
ris ac ardore turorem suum ostenderet, ab acri-

bis, acidis falsisque, ac omnibus quæ spiritibus  
purgentibus horrent (qualia sunt nitrum, chal-  
canthum ac ejus spiritus, spiritus sulphuris, alumen,  
acetum, diamoron, syrupi acidi) planè abstinen-  
dum esse, ipsa hujus affectus necessitas exigit; &  
contraria autem parte os lacte tepido, aut ejusdem  
sero, aut hordei cremore, vel succo è gammaris flu-  
vitilibus, aut succo raparum lepiissime detergi ac  
elui debet.

Sequens etiam gargarismus, seu potius apozema,  
de quo interdum calidè haustulum capiat æger,  
quam maximè conducit.

℞. Hordei mundati manipulum, cornu cervi  
rati 3 ij. herb. solidaginis medix, florum malvæ  
arboresc. singul. manipulum medium, fol. sedi  
major. recent. manipulum, gammariorum fluv.  
contus. n. xii. sem. cydonior. plantag. sing. 3 ij.  
Incisa & contusa cum aqu. font. lb. ij. vel sextantio  
duobus ad tertiam, artis exhalationem coquantur;  
deinjure hoc colato os sæpiùs eluatur, ac lubinde  
sorbillando unc. j. vel unc. ij. æger lentè deglu-  
tiat.

Post singulam gargarisationem de liqu. nri mix-  
tura mellinum vel integrum cochlear tantum fre-  
quenter delingat, cujus descriptio sic se habet:  
℞. Lentoris sem. cydon. aq. rosæ recti, mellis  
rosacei, vel syrup. de siliquis singul. 3 ij. ucci  
sempervivi recent. cochleari iv. Misceantur pro-  
bè ad siccile.

Vel de hac butyri compositione interdum fru-  
stillum fabæ majoris quantitate capiat.

℞. Butyri rec. probè loti unc. ij. diacod.  
Mont. unc. j. pulv. diatr. gauth. frig. unc. sem. bol.  
armen. præp. 3 ij. misceantur diligenter ad ol-  
lam.

Nonnunquam in jussulo calido pulveris è creta  
compositi myrsinici, aut diatrageanth. trig. 3 ss.  
singulis sex horis hauriat: quæ egregiè ardori  
faucium, gulæ ac ventriculi medentur.

Sic quoque pro.unt radix altheæ saccharo con-  
dita, succum raparum cum pauxillo sacchari ad spissi-  
tudinem decoctus, ac cochlearim h. u. l. u. s. ol. un.  
seminis & parum cum saccharo cando linctum;  
item oleum amygdalar. dulcium cum syrupo semper-  
vivi mixtum, sæpiusque deglutitum injurias fau-  
cium laxatum abigere solet. *Secreta de febre Ca-  
strensi. malign. sect. 3. cap. 2.*

Lingua infantium & oris partes, quæ pustu-  
lis sunt conspersæ, eluantur & confricentur bis  
terre post luctionem lacte bubulino, vel capri-  
no, in quo auriculæ judæ vel fungi sambucini  
sunt incocti; cum ipsis itaque fungis & lacte,  
aut foliis salviæ vitentibus in eodem lacte ma-  
defactis pustulæ confricentur & abstergantur:  
quibus absterhis partes oris pustulosæ inungan-  
tur, aut melle rosaceo, aut diamoro, aut rob-  
ribium, omnium autem certissimum & præstan-  
tissimum remedium ad Aphthas, cujuscumque  
coloris, tam in infantibus, quam adultis est,  
eas priùs diligenter ablutas & absterhis collinire  
sequenti modo.

℞. Mellis rosac. unc. sem. ol. vitriol. 3 j. m. f.  
linimentum. *Franciscus Joel Sect. 7. lib. 2. Pra-  
ctica.*

### Consultationes.

\* Infantes duorum mensium, cum matris lac defi-



cetere, nutritici commissus fuit, temperamento bilioso prædita, sed alioqui bene valenti multo-que sanguine & lacte abundanti. Huic cum per octiduum adfuisset, cepit lac coagulatum cum pituitosis & biliolis humoribus mixtum sæpius evomere, inquietus dormire, biliosa flava ac viridia multa per alvum deficere. Tandem etiam os interius aphthis albicantibus undique oblitum est, ita ut jam propter dolorem hinc procedentem vix amplius sugere possit, licet mammam cum desiderio appetat & ore amplectatur. Interea tamen nulla manifesta febris accedit, nec pulsus quicquam immutatus est.

Causa harum aphtharum est lac nutritici ferocius, calidius & acrius, quod in debili ventriculo infantis non satis bene concoquitur, sed multa bilis inde generatur, à qua acres halitus sursum ad os ascendentes, tenellas totius oris interioris pelliculas exulcerant.

Bilem copiosam inde generari liquet ex bile flava & viridi, quæ copiosa per inferiora deficitur.

Lac autem in ventriculo coagulatur ob acrimoniam bilis & cruditatem ibi genitaram. Coagulatum verò evomitur, quia natura illo, aliisque crudis humoribus gravata, & acrimonia irritata, molestiam illam per vomitum, quantum potest, deponere nititur.

Febris non adest, quia bilis illa putredinem nondum concepit, neque etiam ad venam cavam delata est, sed hætenus sursum deorsumque satis copiosa excernitur.

Infans vix amplius sugere potest, quia dolor, quem ex aphthis habet, sugendo exasperatur. Mammam tamen appetit, quia maiorem oris calorem humiditate lactis lenire & extinguere desiderat.

Hæ aphthæ quia recentes & sine febre sunt, neque malignam causam habent, facile sanabuntur; si remedia tempestive adhibeantur. Alioqui si differatur curatio, metuendum est, ab aucta, & tandem putrescente bile, non tantum aphtharum profundiorum & periculosam exulcerationem, verum etiam alvi fluxum cum torminibus & febris graviore secutum.

In curatione ante omnia ratio habenda est nutriticis, utpote quæ ob temperamentum biliosum lac acrius generat, quam infantis ventriculus bene ferre aut digerere potest. Deinde ratio habenda est ipsius infantis.

Nutrix igitur semel atque iterum bene purganda est medicamento cholagogo. Deinde vena secunda, & apozema aliquod refrigerans, ex cichoreo, endivia, lactuca, borragine, acetosa, tamarindis, seminibus frig. maj. aliisque similibus, per aliquot dies exhibendum. Etiam puppa ex rhabarbato ʒ iij. in pinta cerevisiæ tenuis suspendenda, de qua bis terve in septimana haustum bibere, hinc non tantum ipsa, sed etiam infans biliosa deiciet.

Curandum ut cibus utatur boni succi, conditis cum hordeo mundato, endivia, lactuca, asparagis, pomis citriis, cerasis, fructu libell. &c. Abstineat ab allis, cepis raphano, sinapi, aromatibus, omnibusque multum calefacientibus; etiam à melle & saccharo copioso, aliisque quæ facile bilefcunt. Potus sit cerevisia tenuis, aut mediocris notæ: evitet vinum, spiritum vini, melicramum, omnetque potus fumosos & calidos, æt-

non iram, aliasque animi emotiones.

Infanti autem (cui vix quicquam exhiberi potest) sæpe in os ingeratur syrupus de moris & cydoniorum, vel de rosis siccis & granatorum acidorum, aliisque similis, quo totum os interius oblinendum est. Etiam cum cochleare iubinde exhibenda pulicula liquida ac tenuis, ex decoctione passularum corinthiacarum ad rupturam coctarum, cum pauxillo sacchari & micæ panis aibi parata.

Si his remediis adhibitis tamen perdurent, aut in peius vergant aphthæ, quamprimum mutanda est nutritrix, & alia querenda quæ naturæ infantis convenientior sit. *Isbrand. De Diemerbroeck de morbis capitis, thoracis &c.*

Mulier triginta annorum continuâ febre correpta est, cum magna anxietate, sine vehementi calore, sine magna siti, quæ intra biduum vires admodum prostratae sunt. Pulsus est parvus & inæqualis: urina instar urinæ hominis sani. De nullius partis excellenti dolore, sed de maxima totius corporis conqueritur debilitate, quæ tantum est ut in lecto erecta sedere nequeat. Quarta die in deglutendo sentit aliquam difficultatem, ita ut porus non sine dolorosa molestia & impedimento per gulam & œsophagum descenderet. Eo tempore palatum, gingivæ, lingua, & fauces innumeris exiguis pustulis albicantibus obliterati comperta sunt. Gustus etiam adeo læsus est, ut alimporum verum saporem vix percipiat.

Laborat hæc ægra febris maligna, ad quam accedunt aphthæ, quæ sunt exulcerationes quedam in summa oris superficie, cum caliditate conjunctæ.

Causa antecedens sunt humores putridi, acres, maligni, in corpore contenti, qui à calore febrili attenuati, per arterias & occultos meatus ad os delati, in eoque exulcerationem hanc facientes, causam proximam continuant.

Has aphthas à maligno quodam putrido humore excitari, liquet ex febre putrida precedente vel adjuncta; cujus malignitas satis innotebit ex maxima anxietate & virium ægræ prostratione, cum tamen febris nullas manifestas tantæ debilitatis causas exhibere videatur. Humorem autem illum magna ex parte punitosum esse, patet ex minori febris calore, & pustularum seu ulcusculorum albedine.

Hic humor à calore febrili attenuatus & acutus ad os deveniens, ejus interora (palatum, linguam gingivæ, fauces &c.) magis quam alias partes per quas transit, exulceravit, quia tenui & molli tantum pellicula involta erat, quæ à rebus acris, imprimis putridis, eo devenientibus & diutius ibi remanentibus facillime exulcerari potest, cum alix partes firmiores hujusmodi corruptioni in luds resistant.

(Quia verò illa pellicula oris interiora investiens se per fauces & totum œsophagum extendit usque ad ventriculum hinc etiam cum faucibus & œsophagus similis aphthis iterum obsidetur, ut ex eo liquet, quia deglutitionis adest difficultas & porus non sine dolore & impedimento ad ventriculum descendit.)

Gustus oblatus est, quia pellicula oris interior, cui nervi gustatorii inferuntur, & qua mediantæ gustus sit, ab illis ulcutentis a se obsidetur, ut objecta gustabilia ad eam integra pervenire, & ab ea percipi vix possint. Adde quod lingua ab ulcusculis dolens, etiam pravis humo-

ribus,



ribus infecta de saporibus allumprorum bene judicare nequeat.

Hæ aphthæ sunt magis signum, quàm causa periculi, indicant enim febrem malignam & valde periculosam, à cujus curatione eorum curatio maxima ex parte dependeat.

Corpore igitur expurgato, vena-secta, aliisque febri convenientibus remediis adhibitis, os sæpè colluat & gargatise ægra hac decoctione.

℞. Hordei mundati, radic. bistortæ, tormen-tille, ana ℥ ss. glycyrrhiz. radic. ℥ liij. herb. plantaginis, portulacæ, polygoni, foliorum quercu, ana m. j. flor. malvæ arborescentis, rosar. rub. balau-stiorum, ana m. ss. aquæ q. s. f. decoctio ad lb. j. adde syrûp. diamoti, dianuc. ana ℥ i ss. miscentan-ur pro collutione.

Post collut. onem lambat ægra, totumque os interius oblinat hoc syrupo. ℞. Syrup. cydonior. granator. acidor. de totis succis, ana ℥ j. miscentan-tur.

Si dolor acrior evadat, ægra in ore detineat lac dulce, vel potius serum lactis, idque sæpius mutet. Deinde solum syrupum cydoniorum vel de rosis succis lambendo assumat, imprimis cum aphthæ jam separantur.

Victus sit refrigerans & malignæ putredini res-sistens. Cibi sint euchymi, cupepti & liquidi. Potus sit getevisiatenuis aut psilana. Alyus bene respondeat, & abstineat animi emotiones. *Idem de morbis capitis & thoracis &c.*

Si totum perlustraveris mundam V. N. & om-nia, quæ in sinu ejus reposita sunt vel superficiei adherent; sedulo contemplaveris, omnia mira-culorum plena invenies. Inter miraculorum verò iliada nullum homine admirabilius & quod rati-tate & præstantia sua animum magis suspensum & attonitum reddat. In ejus sanè mirabili & non imitando opificio ineffabilis Dei, conditoris opt. max. providentia, sapientia atque immensa boni-tas luminooperè elucescit. Hinc non illepidè *Mercurius Trismegistus*, & divinioris illud sapien-tiæ lumen *Plato*, *Aristotelis* quondam Præcep-tor, *Microcosmum*, idest, hominem, augustum Dei Templum & simulachrum nominarunt. Nam sicut in Numismate *Cæsaris* charagma, ita in ho-mine conspicitur Dei sculptura, quem non abs re miraculorum maximum statuerunt olim celeberrimi Philosophi. Quid obsecro infantis in utero materno plasmate, nutritione, statò tempore eni-xu, quid inquam mirabilius, dici vel excogitari possit? Certe nihil. His mihi septem orbis mira-cula jure videntur cedere, ut meritis quis cum *Martiali* de infantis plasmate & enixa dicere queat.

*Barbara Pyramidum sileant miracula Memphis,  
Assiduus jactet nec Babylona labor;*

*Nec trivium Templo molles laudentur honores,  
Dissimulatque Deum cornibus ara frequens.*

*Aëre nec vacuo pendentia Mausolea,  
Laudibus immodicis Cares in astra ferant.*

*Cuncta puerperio cedant miracula mundi,  
Infans quo referat claustra pudica Matris.*

Lugendum saltem, quod tantum tanti Condi-toris opificium, tam affabrè constructum & miro artificio fabricatum, adeò labefactum peccato obipio statim ortu, ut mille morborum phalangi-

bus undique obvallatum ocyus contraheret, nisi Deus illud præpotenti manu sustentaret. Nempe ut fragilis aliqua cymbula, agitata procellis & tempestatibus plurimam admittit rimosa undique paludem; ita & tenella infantulorum ergastula, la-borioso per angusta uteri latibula transtu, dolori-fica venæ umbilicalis abscissione; aëris amico ca-lore blandientis cum inclementi pe. mutatione; vi-ctus quoque à naturali & consueto omnimodâ diversitate, necnon è molli loco in duram, aspe-ram, spinis setisque confiram, coloniam trans-migratione, attrita languent, & variorum mor-borum carnificina marcescunt, & sæpè sæpius quam vix hauserunt, vitalem auram immaturè ef-fundunt; ut non immerito dubitet quis, meliorne his sit mater, an tristior noverca Natura. Misari sanè subi *Platonem*, omnis augustioris sapientiæ Magistrum, qui omnes morbo. ab animo ortus sui primordia derivare asseruit, cum tamen in-fantes, antequam ipsis à Deo animo uti datum est, morbis sæpè affligantur. Hinc *Græci* olim & *Ro-mani*, de vita & valetudine eorum dubii, non-nisi effluxo longiore temporis spatio nomina iis imponere solebant. Nulla sanè ætas ab ullo mor-bo libera & immunis, sed omnes cujuscunque ætatis mortales æ. nium tyrannidi æque subiecti sunt; quod non tantum *Hippocratis*, summi in Medicinâ Dictatoris, oraculo sancitum est, sed & quotidiana experientia, fida rerum magistra, a-bundè docet & ratio ipsa evincit. Sunt tamen ali-qui infantulis propitii, quos longâ setie veneran-dus noster è Coo Senex in Aphorismis suis enu-merat, in quorum censu oris quoque tubercula seu pustulæ, *Græcis* aptè dictæ recensentur, lactis vitiosi vel saltem in ventriculo infantis corrupti, genuina soboles. Familiarissimus est infantulis af-fectus hic, ita ut è centum vix unus reperiat, qui non pustulis istiusmodi moleste-ur. Et promptè quidem hoc malo afficiantur ob corporis molli-tiem & terneritudinem, victis inalluetudinem; & copiosiore lactis suctionem, unde lac in ventri-culo corruptum huic malo generando satis esse po-test. Tubercula hæc seu pustulæ si in ulcera de-generent, plurimum negotii facessunt, & suction-em impediunt, quandoque etiam lethum acce-lerant, maxime si nigro colore erumpant, aliàs in mollioribus infantium corporibus modestè ad-stringentibus facillè curantur. Magna est horum tuberculorum differentia, de qua nihil invenio in literis tuis, ita ut difficile sit rectum Tibi consi-lium suppeditare. Varianda enim cura pro diver-so Aphtharum colore; siquidem alia requirunt remedia quæ alba sunt, alia quæ rubra & ignea, alia quæ livida, & sic de alijs. Ne tamen deesse Tibi videar, velim ut sæpius in die laves ulcuscu-la hujusmodi aqua vel, quod præstat, decocto he-dere terrestri addito melle rosarum vel hujus lo-co decocto veronicæ; quæ duo remedia in hoc af-fectu efficacia non semel sum expectans: quod si malum non cesserit his, poteris iis adjicere lapi-dem prunellæ, imò & spiritum vitrioli in contu-macioribus Aphthis admiscere. Hæc tota sunt, & si forte aliquid eorum ab infantulo degluriatur, minime nocitura. Cavendum: men ne infans mor ab eorum vi lactetur, præterim si spiritum vi-trioli adjeceris, ne lac in ventriculo coaguletur. Prodest etiam singulis diebus ter u terve confri-care Aphthas foliis viridibus salviæ rummis seu in cacumine natis, in aqua prius ablutis ac deinde



vino rubro imbutis. Non incommode etiam mentham cum mastiche ventriculo fistolæ tuæ impo-  
 fueris, ne lac in eo contumatur: in quem finem  
 etiam patet lactandam suam ferim donec ventriculus  
 fuerit emendatus & probe concoquat. Hæc sedulo  
 adhibenda à conjugē tua, & monenda; cum ip-  
 sa fistolam nutrite & lactare de te veniat, ut in vi-  
 tu diligenter abstinere ab omnibus, quæ malam  
 sanguineam serosis, fervidis & acerbis humoribus  
 inquinare apta nata sunt. Nec ullo modo  
 omitat pulverem ante biduum transmissum pul-  
 veris permittendum, qui peculiari vi caput roborandi  
 & à convulsivis insultibus tuendi præditus est. Et  
 hoc eo serio magis animo urgeo, quod fistola tua  
 dulcissima in ipso plenilunio nata sit, *Mercurio*  
*Lunam* minime inveniēte: unde *Astrologia* petiti  
 paroxysmos epilepticos prælagunt & observa-  
 runt, infantes in novilunio aut plenilunio in hanc  
 lacerem editos, raro durabiles esse aut firmā valetu-  
 dine uti. Hi quidem propter nimiam humilitatem,  
 illi vero propter nimiam siccitatem lingue-  
 re solent. Id quod à me quoque in non paucis  
 annorum. Sed hæc in Dei voluntate posita, qui  
 numeravit omnes dies nostros. Faxit ipse, ut fisto-  
 la tua tausta *Lucina* nata, sit Tibi perpetua, quæ  
 tibi olim ferā, ut *Ciconia* totum parentibus senio-  
 enervatis, sustentaculum præbeat & consolatoriū  
 sit, atque *ἀντιλήρη*, gratiam beneficiorum re-  
 muneratorem referat. Et hæc Tibi, quem ob  
 absentiam meam coram alloqui non potui, per li-  
 teras significare volui. Vale & nobilissimum Do-  
 min. parentem, conjugem, sorores meo nomine,  
 quam potes, officiosè saluta. *Frideric. Lossi*  
*consil. 31.*

### Observationes.

Nos linctum utimur ex diamoro, succo granat.  
 & melle, hoc etiam addam quod à Pharmacopæo  
 accepimus. Multi infantes cum *Amurverpiæ* ex  
 aphthis morerentur, ex vetulæ consilio, tanulam  
 vivam ori puerorum admovebant, suctione ma-  
 lignitatem attrahentem, eaque defossa & mortuā  
 alteram ori imponebant: deinde rursus aliam, si  
 opus esset; quo præsidio, & pueri, & infantes  
 evadebant. Idem in pueris suis, cum aliis expe-  
 ritum narrabat. *Petrus Forestus observ. 21. lib. 14. de*  
*afflictibus labiorum, gingiv. dentium, oris & lin-*  
*gua.*

Juvenis biliosus cum in aphthas incideret, val-  
 de ignitas & flavas, postquam ex infus. rhab. pur-  
 gatus esset, collutionem præscripti, quæ refrige-  
 raret, & fervorem restingueret in hunc mo-  
 dum.

℞. Fol. plantag. bellid. min. portul. semper-  
 viv. solan. ana m. j. fl. ros. rubr. p. j. sem. cydon.  
 ʒ i s. F. decoctio in aqua. in colat. ℥ j. dissolve  
 diamori ʒ ij, succ. mali punici acid. ʒ s. m. f. col-  
 lutio. Postea adjeci ad majorem refrigeratio-  
 nem, succum solani, & aceti modicum: Deinde  
 ut magis abstergeret, in decocto adjeci hordeum  
 integrum, etiam mellis rosæ nonnihil, ut citra  
 mordacitatem magis discerneret. *Petrus Forestus*  
*observ. 22. lib. 14.*

Hic tyrtupus mirum in modum prodest. ℞. fol.  
 viol. fragrar. semperviv. bellid. min. plantag. por-  
 tulac. ana m. j. sem. cydon. ʒ j. coq. in aq. com-  
 muni, colat. fortiter expressit addo sacchar. q. s. &

coq. ad consistentiam tyrtupi, S. A. ut melius ab-  
 stergat, loco sacchari mel jaddi potest. *Petrus Fo-*  
*restus. Schol. observ. 25. lib. 7. De febrium symp-*  
*tom.*

Filius meus quatuor annos natus, passus est  
 fluxionem acerrimam in linguam & fauces, ut in-  
 finitis ulceribus leterent, inque asibantibus, &  
 admodum dolorificis, cum magna inflammatio-  
 ne, non poterat cibum, aut jusculum capere, nec  
 lac lugere; diebus ac noctibus ejulabat insomnis,  
 macilentus, ac ferè consumptus. Ex remediis  
 non profuit mel rosaceum cum sp. vitrioli; quod  
 alias mirifice confluxerat; aderat alvi fluxus co-  
 piofus, quod bilem porraceam ejiciebat, vesica-  
 torium valde profuit; sed dolores & clamores  
 perseverabant, & continuò æger per os humorem  
 serolum & acrem emittebat dolore & inflamma-  
 tione magis ac magis attrahente, tandem exhibui  
 laudan. gr. j. cum jusculo, eoque dolor sopi-  
 tus est, somnus levissimus conciliatus, qui post-  
 modum perseveravit moderatus & suis horis ad-  
 veniens. Hinc cepit convalescere, & fluxio illa  
 humoris per os emanantis omnino cohibita est:  
 sequenti tamen die purgans medicamentum exhi-  
 bitum est, quod multum etiam profuit. *Lazarus*  
*Riverius observ. 43. cent. 2.*

Quædam mulier laborabat Aphthis coniuma-  
 cissimis, quæ neque venæ-sectionibus, neque pur-  
 gationibus multis, neque julepis refrigerantibus,  
 neque illitu ex spiritu sulphuris curari poterat;  
 noctes insomnes traducebat, & vix cibum de-  
 vorare poterat, quia omnes oris partes hujus-  
 modi ulceribus scatebant: inopsit noctu laudani  
 gr. iij. idque remedium continuavit per triduum,  
 & sic fluxio actis in oris partes defluens cohi-  
 bita est, ac consequenter oris ulcera paucis  
 diebus percurata sunt. *Lazarus Riverius, observ. 39.*  
*cent. 3.*

### Aphtha Ferina purgatione levi & alteran- tibus curata.

Excitatissimus annorum quatuor puer, Aphthis,  
 seu oris ulcersulis diu nocturne ita lancinatus, ut  
 nec potum, nec jusculum sumere, multò minus  
 ob oris excoriationem ubera sugere valeret, febrili-  
 culâ tentâ, vigiliis, doloribus non tantum ad ex-  
 tremam maciem, verum convulsionibus super-  
 venientibus, vix non ad funera redactus, mulier-  
 culatum pseudo-medenium nullis proficiantibus  
 oris superni ac inferni collutionibus, vocatus cau-  
 sam materialem tyrtupo mannato iteratis vicibus  
 evacuare; Efficientem verò, tanquam primorum  
 humorum fontem, alterantibus contemperare  
 conatus, quo facto gratiosulus magno parentum  
 cum solatio exorci faucibus ereptus. *Nicol. Gu-*  
*lielm. Beckers.*

### Aphtha ferina, morbillorum comites, neglecta mandibulæ corruptionem inducentes.

Quam novercali odio anni 1659. tempore fer-  
 vido, atque inter igneas illas Pl. metarum opposi-  
 tiones, morbilli apud nos in Norvægia in adul-  
 tos saevierint, ac infantes, pauperiores maxime, li-  
 bitinæ docebunt rationes: Omnes tanè ad unum  
 qui hydromelite morbillorum tentantur expul-  
 sionem, nullo ad malignitatem habito respectu,  
 con-



convulsionibus aut diarrhæa miserando perierunt modo; Nonnullis ex neglectis Aphthæ tanta acerevit oris pustredo, ut ante instans mortis punctum mandibulæ spontè exciderint; aliis à Chirurgis caro circa illas gangrænâ infecta ut mihi retulerunt, omnino resecta fuerit. *Joann. Eridic. Trembler.*

#### *Aphtharum infanilium remedium.*

In puerulis Aphthæ laborantibus nihil est quod tam præsentaneam afferat operam quàm *oleum raparum*, si in eo tantum dissolvatur sacchari quantum potest, illudque ori illitum lambant; quod in meo filio Petto Joanne, vix octo dies nato expertus, cui Aphthæ laboranti dedi oleum hoc raparum saccharatum, & paucorum dierum spatium curatus est.

Rustici infans cum non posset sugere, itidem Aphthæ obfesso palato, morbo jam per decem dies vigente, eodem modo à dicto medicamento sensit levamen præsentaneum. *Joann. Ludovic. Hanneemannus.*

#### *Aphtharum remedium emporiston.*

Aphthæ illæ flammantis oris pustulæ, infantibus frequentes sunt, adultos rarissimè corripunt, & nunquam sine periculo ferè. Anno 1669. cum praxin Medicam Fridrichstadii exercerem, hoc genere morbi tres puerperæ extinctæ sunt. Hocque malum æquè ac morbilli & variolæ homines semel invadit. Tres mei filii & his pustulis laborarunt, duo recens statim isto malo correpti sunt, natu verò maximus, qui nunc quatuor annorum & dimidii est, nunc paucis ante diebus iis quàm vehementissimè laboravit, & coronidem imposuerunt variolis, quæ & hic grassantes ipsum lecto afflixerant. *Francisc. Joel* hic commendat.

℞. Mellis rosar. ʒss. olei vitriol. ʒj. m. f. linimentum. *Timæus à Gudenstee* laudat florem laevis capilli cum cantillo niti purissimi l. s. cal. 9. *Wolf. Hoeferus* in Medicat. familiaribus p. 359. præscribit.

℞. Syrup. è ros. sic. mellis rosar. simplic. ana ʒij β. mastich. cl. et. pulv. ʒss. spir. vitriol. gutt. iij. m. inungè sæpius. Verum uti simplicitatè amatur, sic quoque simplex emporiston hic recommendabo, quo usus sum in meis tribus dilectissimis admirando cum successu, quo & præstantius & certius non datur.

℞. Olei rapar. q. v. tantumque adde sacchari quantum recipere potest, de eo sæpius dato lingendum infantibus & infallibiliter curantur. Infantibus medicamentum tutum, certum & jucundum est, & blandè in iis alvum solvit hoc oleum, & isto euporisto meus filius natu maximus nunc quoque (Dei gratia) restitutus est. Bararæ femina & obiterices ruberam filo alligatam ori infantum his pustulis correpto imponunt, extractam in frigidam aquam injiciunt, ut vires recolligat, tum iterum imponunt sed contingit sæpius imbibito isto veneno flammante rubera rumpatur, istaque ruberæ novæ impositione sæpius reiteratâ infantes curantur, & istæ flammantes pustulæ evanescent. Causam hujus curæ per ruberam ego in duo rescio j. in modicam respirationem, quam affert Rubera ori hisce ulcus-

culis flammanti. 2. in attractionem malignitatis pustularum, quam si atteraxerint ruberæ, ut plurimum statim rumpuntur & extinguuntur. Malignitatem enim contagiolam possident istæ pustulæ. Nuper mei affinis, Senatoris Fridrichstadiensis filiola his pustulis laborans per Rubetarum infectionem curata est. Sed quod notatu dignum, prior Rubera extracta statim etiam in aqua frigida exspiravit, & altera etiam difficillimè in frigida lympha servata fuit. Tantam malignitatem habuerunt istæ pustulæ. Adde de meo filio natu maximo, hic gravissimè variolis decumbens, Hæccos colligebat, lodicem complicabat, quod & cæteroquin infustum censetur signum, ut plurimum mortem prælagire dicitur; sed & hic ut & sæpius fefellit. Ego hic recordor quod scribit *Wolf. Hoferus* in *Hercule medico* p. 346. & 348. Et quod non semper infustum signum præbeant, plures probant observationes. Malo ergo hic *Cardano* credere quàm *Galeno*. Tum demum enim infustum signum est, si simul facies Hippocratica adsit, *Buxtehude* quendam feminam laborabat febris maligna, hæccos colligens, lo-dices explicans & complicans, sese meæ curæ commisit, & Dei gratiâ restituta est. *Joan. Ludovic. Hanneemann.*

Matrona quædam inter nostras primaria annos 38. nata, sub initium octavi graviditatis mensis, degens; apud me conquerebatur de Aphthæ feris quæ à quinque mensibus ip. m. durius vexabant, nec per venæ sectiones, ut & purgationes repetitas, imò adhibita varia topica, ullatenus remittant at potius à gargarismis quantumvis paucis acido impregnatis exacerbabantur. Vidi nobilis mulieris linguam laceram & quasi simbriatam, profundis ulcusculis crusta crassa ex parte vestitis desuper non parum abumiam, palatum præterea & gingivas, atque fauces ipsas eodem morbo deturparas, imò non immeritò arbitratus sum ipsum ad orificium usque ventriculi superius descendere, siquidem à faucibus ad scrobiculum usque cordis intus ardorem per sentiebat ægra non parum molestum. Sic autem affecta non tantum solidi prorsus nihil masticare, & per os volutare valebat, sed etiam omnia alia alimenta nauseabat; febris lenta consumebatur, & noctes insomnes cum tussi continua, ab aliquot mensibus transigebat. Non difficile fuit judicare alia omnia symptomata nobilem matronam molestantia, ab Aphthæ ipsis non bene hæctenus curatis originem suam ducere; itaque illuc vim omnium remedium dirigere consultum habui, & propterea gelatinas tum ex volatilibus variis, tum ex C. C. & ebore præscripsi emulsionem è pistachiis sensim hauriendas præbui; syrupum raparum, ut & ex albumine ovorum, aqua rosacea & saccharo in usum adhibui; suffumigationes ex decocto calido herbarum traumaticarum, folior. prunellæ, Horum hyperici, rosar. rubr. balaustior. &c. in vino rubro parato, bis de die ex tribulo apto in os admittendas curavi; Imò sub finem aliquid tincturæ gummi lacæ decocto foliorum prunellæ & hederæ terrestris cum syrupo althææ, quod os subito collueret admiscui; quibus julecula plantis aptis alterata, diætæque aptæ, adjunctæ.

Ita hæc, Deo sic benedicente, fuere proficua, ut intra duas septimanas fuerit sanata Nobilis Mulier Matris suo merito charissima, & inde ad partum usque terminum sine ulla febre, aut alio molesto symptomate deveniret, sicque novissimè quæ in



gravitate tam molesta supremam diem necessarium obitum credebant. puellam enixa fuerit formosam, nec aliis afflicta sit symptomatis, (imò mitioribus) quam quæ ipsi in aliis pluribus partibus familiaria fuerant.

Puella nobilis septem annos nata, cum variis oris morbis primò ægrotasset, tandem in aphthas incidit, easque tam rudes & malignas ut per aliquot dies neglectæ, absolutam propè partium in ore contentarum corruptionem fecerint, ita ut, (cum nihil proficientibus remediis) non tantum, quod adnotavit Severinus in Aphthis pestilentialibus Neapolitanis, uvulam ad palati os usque, & tonsillas ad epiglottidis basin exederint; seu etiam in sinistram faciei partem serpentes, maxillæ superioris, carniūque adherentium portionem, ante obitum brevi accedentem, separarint, quam super pulvinari reperiēbamus, dum ægra caput aliquot ante fatale momentum horis, elevaremus.

### APNOEA.

Vid.

### RESPIRATIO ABLATA.

### APOPLEXIA.

**A**poplexia est subita sensuum omnium, tam internorum, quam externorum, pariterque morus omnis, & functionum animalium, (præter respirationem) privatio, cum universi corporis resolutione & consternatione. Homo etenim hoc morbo oppressus non aliter quam victima ad aram prostrata, uno quasi ictu percussus concidere solet.

Varia sortita est nomina, nam syderatus, & attonitus morbus, Hippocrati *ἀπνοια*, aliis etiam gutta dicta est. Syderatus autem & Attonitus morbus primò vocatur quia eo affecti æquè subito corruunt ac si fulmine forent tacti, aut vehementi ictu ab invisibili manu desuper inflicto, quasi exanimis prosternerentur. *Απνοια* secundò appellatur ab Hippocrate, vel quia ea affectus vox præcipuè deficit, vel quia sub vocis privatione ceteras operationes animales lætas intelligit. Gutta tertio ab iis nuncupata est qui in hac ridicula fuere opinione in utroque temporum latere sanguinis guttam dependere, quæ si fortè in alterutro decidat hemiplegiam faciat, si verò in utroque, apoplexiam gignat. Ab hac denominatione suam petiit signaturam pro lilio convallium Crollius, illud enim pro specifico habet in hoc morbo, quod scilicet ipsius flos quasi gutta inclinetur ac pendeat. Apoplexia tandem dicitur à verbo *ἀπνέω* quod frequentativum est verbi *ἀπνέω* ferio, & propterea significat vehementer ferire, quod affectus horrenda gravitas designatur.

Partem affectam cerebri ventriculos & quartum præcipuè dixere quidam, quæ opinio in hodierna anatomica luce stare minime valet; cum enim jam non amigatur cerebri ventriculos cloacas esse exonerandas substantiæ cerebri, glandularumque in toto plexu choroide intertextarum sordibus destitutas, quis non videt ut bene adnotat Christianus Langius, eandem esse non posse spirituum & extremæ officinam, eandem culinæ & cloacæ

dignitatem, idem regis & vilissimi servi conclave. Nam ut subiungit ille qui anulum eundem sit quod illac excernitur, certum est, quod etiam parum cœni immundi multum lymphidi colutulet inhiatque. Semel verò posito articulos cerebri spirituum emporia & promouendos nullatenus esse, necessariò sequitur morbi in eorumdem affectione propriè positi, si dem in his cavitaribus non esse exquirendam, sed potius in ipsa cerebri substantia cineritia seu glandulosa spirituum animalium officina genuinam, nec. ique inde dependentibus, ut ex sequentibus satis patebit.

A respiratione magis vel minùs læsa quatuor facit Galenus Apoplexiæ differentias; si enim omnino deficiat, nec pectus a suis muscularibus ullatenus attollatur apoplexiam exinde denominat acurissimam; si verò respiratio adsit sed cum vehementia quadam & stertore sortem vocat; si respiratio sit tantum inæqualis & interrupta minùs vehemens apoplexia, atque si ordinem aliquem seruet, debilis ipsi dicitur. Ex hiis omnibus variis tantum morbi attoniti gradus designantur unde prognosis in sequentibus explicanda deducitur. Distinguitur rursus Apoplexia in idiopathicam & sympatheticam, quæcum illa proprio cerebri vitio sit, illic scilicet agilis & tabificata quæ spiritus subito prosternunt & stupefaciant; hæc verò ab affecto imo ventre inæque elevatis exhalationibus ceteris spiritibus peculiariter insensis, enascitur; Imò ab iis omnibus quæ tum ab extra, tum ab ipsis corporis succis corruptis, aut infectis visceribus, spiritus pro apoplexia producenda afficere valent, peti possent differentiarum plures si conducibile & convenientem foret illas multiplicare.

Ut Apoplexiæ causas eruamus necessarium erit ut prius aliquid de spirituum animalium in ea affectorum genesi, ac distributionibus, instrumentisque istis munis destinatis aliquid præmittamus. Spirituum materia in sanguine est & in capitis interiora vehitur per arterias cephalicas, vertebrales scilicet & carotidas quæ in productiones innumeras diremptæ in corpore cerebri cineritia præcipuè obliterantur. Jam eò corpus illud cineritium à colore dictum, nemo hodie ex demonstratione Malpighii nescit esse magnam glandulam de genere conglomeratarum, in cujus glandulis ea ipsa methodo qui in aliis corporis partibus variarum secretionum ministerio glandularum perficiuntur, purior atque volatilior sanguinis pars latino sulphurea in spiritum animale ejusdemque vehiculum exaltata & elaborata, ulterius secernitur, atque ab innumeris tubulis corpus cerebri callosum medullamque oblongatam atque spinalem constituentibus, & à glandulis memoratis quasi totidem vasa exeretoria dependentibus, per libi continuatos in totum corpus nervos abundè derivatur. Corpus autem hoc cineritium seu corticale veram esse spirituum conficiendorum officinam ex eo patet quod vasa sanguinea eorundem materiæ in deportantia in ipso omnia propè absumantur, nec alii cuiquam propterea parti cerebri aliud sufficiant, quàm quod aut ipsi nutriendæ, aut illi in functionibus suis adjuvandæ, necessarium fuerit, sic multum sanguinis in ipsam & duram præcipuè materiem distribuitur, quod scilicet corpus prædictum proximè complectentes, illud blande foveant quoque calore actuent. Hiis sic positis facile



facile concludemus apoplexiam oborituram, si vel spirituum efformatio per affectum corpus celeritum subito impediatur, vel eorumdem distributio per suos canales intercipiatur, vel confusio in eos inducatur. Efformatio impeditur; tum si ipse sanguis multa serositate prægnans in cerebro intumescat ipsiusque substantiam corticalem non tam alluat quam quasi submergat, glandulasque ipsam constituentes ad absolutam turgescentiam adimpleat, imò mucosè facile in viscere frigidiculo congelabili inferat; Tum si ipsæ glandulæ à pondere incumbente compressæ, aut à sanguine extravasato & in grumos coacto circa ipsas stagnante ita molestantur ut proprii munii oblitiscantur; Tum si autem aliqua assentur maligna spirituumque generationi atque motibus tota natura insensita, qualis est venenis quibusdam, crypticis subterraneis exspirare potest. Distributio intercipitur, si canales, vel à glutinosa sanguinis putrilagine aliisque obstruantur, vel à comprimendo & circumcingente corpore ardeant, & constringantur vel in sui continuitate solutionem patiantur, imò ita contorqueantur à vi aliqua sihi facta ut ipsorum cavitatis continuatio non parum alteretur. Hæc omnia facient, tum proprium sanguinis vitium mox memoratum; tum plenitudo valorum nimia per suppressas evacuationes solitas; tum cohibitus ejusdem refluxus per impeditas jugulares venas, vel à grumo sanguinis, vel à polyposo aliquo corpore in ipsis enato, vel à timore aut laqueo constringente &c. si enim sanguis in cerebro aggetitur, valaque sua tenella ad disruptionem utque distendit; tum concussio, delapsus ex sublimi, ictus, vulnusque cerebri profundum; tum abscessus, aliisque tumor in cerebro enatus, atque ad certum augmentum deductus, itaque locatus ut præcipuas glandulas, indeque productos nerveos canaliculos comprimat, sicque totam visceris œconomiam interrumpat, tum spirituum animalium refluxus subitus ad propriam originem, à timore vel alia aliqua causa occasionali inductus, qui confusionem & contuminationem inibi pariat &c. Quæritur hic quomodo cessante per morbum, rationesque illius jam allatas, motu omni voluntario, persistet tamen motus naturalis? Cui quæstioni facile est Willisio respondere, cum enim aliam spirituum motibus spontaneis, aliam eorum qui motibus naturalibus dicantur, originem faciat, illam atque posse hac intacta affirmare potest. Verum quandoquidem de hisce omnibus à Viro Clarissimo assertis non ita constet apud egregios Anatomicos, satius est dicere primò in confusione & conturbatione spirituum à morbo attonito, aut potius ejusdem causis facta, illos animæ imperio ita subtrahi ut mandata sibi commissa nec exequi valeant, nec aliquid pro unione inter duas hominem constituentes partes continuanda, facere. Secundò & præcipuè, facillimum esse spiritibus eas subingredi vias quæ ab ipsis sortis rudimentis jam trite, animali autem pro puncto saliente movendo, devehendæ assueverunt, sicque spiritibus quantumvis depauperatis & conturbatis paulatim reddere sunt. Quod idem dici nequit de aliis nervis motus scilicet spontanei instrumentis, quandoquidem illi nequaquam continuato indolenter spirituum influxu fuere actuari, sed tantum per intervalla, unde vix per eos non ita sunt apertæ & libere, quin vi aliqua ab anima, ex ejus cum cor-

pore unione impressa, opus sit pro spiritibus in eolūm inducendis.

*Signa Apoplexiæ diagnostica* ex suprâ dictis abundè satis patent: Si quis enim subito corruat motu, sensu, ac voce destitutus, sola respiratione eaque difficili & stertorosa, imò quandoque nulla permanente, si membra laxa suo pondere concidant, non minùs quam mortuorum, pulsu interrim in principio satis forti & pleno, aliquando etiam debilissimo, persistente, apoplexiam adesse non erit dubium. Distinguitur autem à Syncope quòd hanc sensus non destituit, pulsus tamen absolute deficiat. Ab epilepsia in qua membra non flaccida sed variis motibus & agitationibus convulsa videntur. A Lethargo in quo & febricitat æger, & oculos subinde excitatus aperit, atque ad interrogata delirans responderet. A Caro in quò respiratio non est difficilis, ita ut eo affecti tranquillo & quieto somno dormire omnino videantur; imò in quo omnis prorsus sensus non intercipitur. A suffocatione uterina, in qua pater subinde conqueritur, atque interrupta suspiria ducit &c. Signa Apoplexiam præcedentia pro varietate causarum etiam variant; si enim à tero cerebrum opplente oriatur, præcessit sopor, hebetudo atque ad actiones animales quædam imbecillitas, memoriæ imminuta atque gravitati capitis & totius corporis adjuncta; si ab extravasato sanguine, ut illud à vulnere contingat, prægressa fuit ut plurimum dura cephalalgia; si ex abscessu, febris, lethargus, imò phrenitis præverit; si à timore alio, stupiditas, tenebrosa atque erriginosa affectio, imò gravis capitis dolor, ejus fuere præcursores. Apoplexia à vulnere continuitatem cerebri solvente, ab ictu aut casu partem tum commovente, tum canaliculos nerveos contorquente, à laqueo vasa sanguinem è cerebro referentia constringente, à timore grandi spiritus ut dictum est conturbante, venenis & exhalationibus venenatis aliisque causis externis evata non habet signa sui præcedentia.

*Prognosis* quod attinet, vix alia quam funesta potest denunciari, cum Apoplexia sit morbus acutissimus & periculosissimus, dicatque Hippocrates experientia fretus fortem apoplexiam impossibile esse solvere, debilem verò non aded facile. Quid verò affectum hunc validissimum à debili per varios suos gradus distinguat, ex superioribus innotescit. Asserit præterea Hippocrates eos ad vitam non redire quibus spuma circa os apparet, quamvis Galeus nonnullos in vitam reductos, referat quibus spuma circa os apparuerit. Sed attendendum ad naturam spumæ credit Etmullerus, alia enim vera est quæ ex imo pectore sensim scaturit, & sursum fertur sensim sensimque augmentata; alia illegitima, (qualis est epilepticorum) ex membranis pituitariis, vel potius glandulis iis interris atque subjectis, abundè stillans: illa omnino quid omnino exhibet, hæc verò non item. Non dubitamus à variis respirationis lætæ gradibus, indeque denominata apoplexia, debili, valida, ad validissima, prognosin cum Hippocrate deducere, validissimamque apoplexiam in qua respiratio prorsus deficit, deploratam pronunciare, interrim cum Willisio credimus sideratos qui mox pulsu & respiratione privantur, & paulò post refrigerati, animam exhalasse videntur, non statim lecto esse eximendos aut administrationibus Medicis destituendos, imò quamvis vitæ spes nulla



nulla affulserit, non nisi post tres aut quatuor dies sepultura esse mandandos; quippe tales aut sponte, aut remedium usu quandoque reviviscunt. Nam etiam si pulmones à pectore alternatim per musculos suos elevato & comprello sensibilibiter non moveantur, interim tamen à propriis suis fibris tacite agitantur succosque in suis vasis contentos aliquatenus promovere & pellunt, unde etiam si pulsus non appareat, circulatio tamen quaedam inestina permanet. Sic Hirundines, si Auroribus pluribus fides habenda, in fundum maris Baltici se dejicientes, illicque per totum hyemem inhabitantes, nulla sensibili fruuntur respirazione per totum suæ submersionis tempus, interim succos conservant in venis suis circulationibus quam maxime aptos, siquidem adventante æstate, à solis radiis vires mutantur saris integras ut ex imo maris volatu suo non tantum auras petere, sed etiam ad remotas regiones transmigra- re queant. Eadem est ratio submersorum de quibus in Ephemeridibus Germanicis sic mentio. Sic & nos aliquando in aquis suffocatos, caloreque, motu, sensu, respirazione & pulsu prorsus destitutos, vidimus ad vitam reductos, tum per inversionem corporis, inductumque calorem, tum præcipue per insufflatum in tracheam per tubulos aërem, qua ultima methodo canes strangulatos & per horas jam resolutos, non semel excitavimus, facta scilicet in iis laryngotomia, atque per intrusum in tracheam tubulum, insufflato sobrie aëre, quo machina pneumatica vi strangulationis sopita rursus actuaretur, succique omnes animalis per ipsam transfecti.

Si evacuationes tum per venæ-sectiones, tum per vomitoria & purgantia validiora peractas, imò si adhibita alia remedia excitatoria levamen aliquod sequatur, spes salutis affulget; sin verò affectus vi omni remedium major supra nyctem- xi spatium sine remissione persistit, aut in deterius vergit, de ægrotante conclamatum est. Si in difficillima respirazione sudor supervenit lethalis est, oppressionem enim integram, non verò naturalem aliquam atque profuturam secretionem denotat. Si Apoplexia juvenem medixque ætatis virum temperamenti sanguinei, adortur, non æquè funesta erit ac si senem, debilem, aut emaciatum aggreditur. Si post primum morbi attoniti insultum bene finitum, ægrotans tamen torpidus magis fiat, imò crebra vertigine afficiatur, signum est recidivam in procinctu esse; si verò cerebro bene liberato hemiplegia aut paraplegia fiat, vix recurret apoplexiæ paroxysmus. De prognosi apoplexiarum omnium à causis occasionalibus mox memoratis prognatarum facile est pronunciare; de ea tantum quæ ex ebrietate fit adducemus ex Hippocr. Aphor. 3. sect. 5. Si ebrius quispiam de repente obmutescat, convulsiis moritur, nisi subito corripiatur, aut ubi ad horam pervenerit, quæ crapulæ solvantur vocem recuperet. Notandum autem hic per obmutescentiam sive *aphasia* Hippocr. apoplexiam designare, quod supra jam vidimus.

Curatio vel est pro paroxysmo præsentente tollendo, vel pro eodem imminente præcavendo. In præsentem paroxysmo, quandoquidem vix satis percipi potest, an à causa invincibili, abscessu scilicet suppurato, vel tumore in cerebro enato &c. originem trahat, festinantes adnendum ut cerebrum liberetur, spirituumque vigori suo restitu-

torum viæ expediantur, itaque primò ut languinis in cerebrum impetus ex litu ægri aliquatenus cohibeatur, hic, si satis robustus fuerit, commodè extra lectum in cathedra tenuiter vestitus locabitur; si verò imbecillis lecto imponetur sed capite erecto ac ad latus modò unum, modò alterum inclinato. Hisce enemateque acriori injecto, quandoquidem sanguis nimis turgens causam morbosam aut inferre, aut augere valet, de ipso sedando primo cogitandum, eumque in finem in quibusvis ferè apoplecticis necessaria est venæ-sectio; quamvis enim de ea Cornelius Celsus pronunciet lib. 3. Cap. ultimo apoplecticum vel occidere vel liberare, sæpe tantum mortem differre, vitam interim infestare, non minus eam, etiam larga manu, celebrabimus. Postea vesicatorium amplum cervici atque cruribus, cataplasmata attrahentia plantis pedum applicabimus, tempora & nares imò palatum oleis iuccini, aut castorei sale volatili oleoso nostræ præparationis, item balsamis turæ, atque apoplecticis variis sed sine moscho ac ambra confectis perungemus; atque in vehementiori malo sal volatile viperarum, aut sanguinis humani, probe pulveratum per nares in os ipsum parè insusillibimus. Vomitorium interim parabimus, illudque in minima dosi, quò scilicet facilius hauriatur; huic inventioni adhibebimus vel extractum Glauberi emeticum ad 3 j. aut 3 ij. vel solutionem tartari emetici adjecta, dosi extracti panchymagogi in spiritu vini soluta, & paucò sale volatili viperarum. Vel si largiorem hauritum cibere æger valeat, decoctionem purgantem validam conficiemus illique cum speciebus benedictæ laxativæ, syrupoque rhamni cathartici &c. adjungemus vel vinum stibiatum vel oxyæchar. Salæ &c. Si ab ejusmodi remedio nec evomat, nec alvum deiciat æger, clysterem acriorem iterabimus, atque si opus fuerit suppositorium etiam in anum intrudemus, quò scilicet intestinum crassum aliàs sopitum, excitemus, seque citius exoneret faciamus. Frictiones totius corporis & præcipue ejus extremitatum dolorificas, cum succussionibus etiam moderatis interponemus, salia volatilia naribus continuo admovebimus, eaque frequenter in spiritu cerasorum nigrotum, lilior. convallium, aquis apoplecticis & epilepticis compositis soluta, haurienda exhibebimus. Si verò malum non minus interim perstet veter jugulares venas aperimus, toti capiti raso vesicatorium imponemus, iternitatoria valida ex florib. lilior. convall. ciclamine, asaro, elleboro albo, imò ipso etiam euphorbio parata in nares insusillabimus, cauterium actuale nuchæ inuremus, cucurbitulas scarificatas scapulis, continuoque etiam femoribus & tibiis, applicabimus, aliæque etiam supra memorata repetemus. Hirundines temporibus, vel pone aures, vel in ipso naso, admovebimus, nec præsidia prius intermitteremus, quàm à paroxysmo liberatio, aut ab eodem moris adveniret.

Curam prophylacticam quod spectat, ea respicit tum eos qui insultibus apoplecticis fuerint tentati; tum eos qui in hos proclives videntur, qui scilicet à patentibus apoplecticis sunt procreati aut vertigini, incubo ac lypothimix frequenti obnoxii vivunt, quorumque caput amplum sustinetur à collo toroso &c. Hæc autem cura remedia nec ita valida, nec tam multa expetit, sufficiat igitur vere & autumno catharsim atque phlebotomiam



miam, imò quandoque vomitionem semel instituere, decoctaque subinde, pulveres, electuaria, atque aquas stillantias ex antiapoplecticis parata, assumere, adjecto salium volatilium usu frequenti tanquam antiapoplecticorum omnium veræ basis. Fontanellæ, si corpus seto multo turgat, vel inter homoplasas, vel in brachio atque crure, cruciatim excaventur, non neglectis interim, variis anni temporibus, pilulis usualibus, tum ex massa de succino Cratonis adjecto oleo succini, ejusque sale volatili verè urinoso, tum ex aliis id genus, notè hunc somni, sub ipsum lecti ingressum vorandis. Imprimis verò exquisita victus ratio instituat, errorisque omnes in rebus non naturalibus vitentur. Remediorum antiapoplecticorum tam simplicium quàm compositorum, è quorum sylva seligi potest quò parentur variæ formæ medicamentæ, catalogus potest videri, tum in Schroëderi Pharmacopœia illustrata & aucta, seu potius indice morborum atque remediorum ipsi adjecto, tum alibi passim; quapropter non est quod de iis hic ulterius agamus.

### Curationes.

In Apoplexia qualicunque insignis est: 1. Spiritus cerebri humani, 2. Sanguinis arteriosi humani spiritus, cujus vires insigniter commendat D. Grafeccius Argentinenfis in libro suo de vita humana nuper edito spiræ in quarto 1615. Germ. utriusque operationis & vires vide ibid. in aliquot observationibus ab ipso habitis. Spiritum sanguinis arteriosi vocat *Aq. Benedictam*: Spir. cerebri humani vocat *aq. auream*. (Quod si sanguis desit humanus, qui ex brutis, cervis potissimum & damis extrahitur eodem successu substitui potest, phlegma per alembicum, spiritus & oleum per retortam, extillat, quæ separanda, ut autem sanguis conservari possit, affundatur spiritus vini, quo, si recens destillandus, non opus est.)

*Apoplecticos excitant* 1. Mercurius vitæ jussu docti exhibitus: à crebris enim vomitionibus in robustioribus prima regione ventris expurgata, paulo post ad sese redeunt, præsertim si epithema fiat in suturam coronalem ex succino pulverisato, & in sacculum oblongiorem interpassum conformato, prætereaque in aqua vitæ vel spiritu vini cum pipere longo essentificato, & cum ol. succin. gut. aliquot adsperso, decenti ligatura suturæ coronali imposito multum prodest, si (in debiliotibus scil. præsertim ubi Mercurius vitæ non est exhibitus, enemata primò leviora, postmodum & acriora injecta fuerint. 2. Excitant eternutationes præsertim ex semine nigellæ & leniore nigra, hoc est helleboro nigro Paracelsi (ex moscho & ambra) it. sem. lolii, tutius & melius, exempli gratia.

3. Fol. majoran. 3 ij. sem. nigell. 3 j. rad. elebor. nigr. 3 ij. mosch. opt. 3 ss. ambr. gr. vj. m. f. pulvis dosis magnitudine pili, insufflatur in nares utramque calamo fortiter. 3. Fumus pennatum perdicum. It. fumus succini, vel etiam ol. succini intra nares sæpius cum penna perdicis sumptum.

N. B. in Apoplexia mirabilis est ille balsamus vitæ ex nobilissimis illis balsamis, Orientali nempe & Turcico, itemque oleis aromatam diligenter confectus à nobili Chymico *Joan. Eichtenac-*

*ter*, dosis à gr. ij. ad iij. in mistura simplici cum aq. appropriata, de quo in notis ad Crollium.

(Spiritu salis armoniaci naribus admoto excitatos fuisse apoplecticos testatur illustris Boyle, ejusque optimum & facillimum destillandi modum describit. Aquam cucurbitæ infundit unâ cum sale armoniaco, tum calcis vivæ pulverem adjicit, statimque adaptato capitello excipulum accuratè connectit, lenique balnei calore destillat spiritum, quem semel aut iterum rectificat, quo vix ullus elicietur spiritus præstantior & terrior, præter alios usus & hysterics mulieribus imprimè conducibilis.) In præsertione maxime conducit Balsamus Apoplecticus Crollii. It. aq. vitæ apoplectica ejusdem.

Ad præsertionem autem & curationem in unico prodest aqua antiapoplectica max. compositionis, quæ sic est.

℞. Flor. lilii convallium mense Maio cum exitu solis collectos (maturos & adhuc torridos statim in vitrumingere sine lotionem ulla) eoque recentes sine apiculis, latem protuberantes flores abscerptos in vino generoso, malvatico vel alio dulci digere ad solem, in vitro optimè clauso, relinque tam diu, donec etiam lavendula floreat, cujus flores exuleos sine calicibus & apiculis diligenter separatos aequali pondere, conjunge cum floribus lilii convallium in idem vitrum, quod firmiter clausum relinque usque ad mensem Septembrem. Tandem per alembicum ex B. destilletur, & quæ primo loco egrediatur aqua spirituosissima diligenter reservetur. Est nimirum præsertiosa & tam præsertiendo quàm curando Apoplecticis prodest (reliqua etiam usui esse potest, sed tam virtuosa non est, facit in primis ad frictions membrorum) ex capite mortuo elici potest sal. Hæc aqua diu durat & fragrantissima est, dos. cochl. ʒ. vel j. per se etiam i ʒ. vel ij. pro ægri & morbi natura cum gut. una atque altera olei succini jejuno stomacho.

Aqua apoplectica alia.

℞. Flor. primul. veris ʒ j. lavendulæ, stœcadod arabicæ ana ʒ j. lilie, bugloss. ana ʒ i ʒ. anthis, nymphaeæ ana ʒ ss. Rad. pæon. caryophyllatæ ana ʒ x. zedoariæ, macis, ipiæ Indicæ ana ʒ iv. Iridis Florentinæ, visci quercini ana ʒ j. galangæ, caryophyllor. ana ʒ vj. pomor. circiorum recent. num. ij. rasur. lign. cassias ʒ i ʒ. fol. majoran. artemis. ana m i ʒ. rorismar. m. j. sem. feniculi, sileris montani, pæoniar, basiliconis ana ʒ iij. confractis & contulis crasso, modo affunde in marteo capaci aquæ rosarum ʒ j. vini generosi, ʒ ij. simul per 3 dies vase bene clauso digerantur, hinc adde recentem expressi succi ex foliis salviæ ʒ vj. beronic. melillæ, spiritus vini ʒ iv. Denuò per 3 dies digeratur & destilletur in M. B. per alembicum ad siccitatem. Fiat semel cohobium. Hinc per se in cineribus vel B. aqua illa rectificatur, destillando 3. partes, quarta relicta, & intendo rostro alembici, moschi, ambre ana gr. vj. bombace involuta, tandem omnia in vitro bene clauso servantur. His omnibus potest annumerari diaphoreticum in peracutis, præsertim, si cum ejusmodi aquis appropriatis apoplecticis mixtum exhibeatur, & sudor provocetur. *Joan. Hartmann. Practic. Chymiatric.*

Cutatio apoplexiæ certa, tuta, & jucunda in sublatione causarum materialium ipsius apoplexiæ consistit: cum enim apoplexia dependeat à sum-



ma venarum & arteriarum partiumque omnium, quæ commercio spirituum vitalium atque animalium inserviunt, obstructione; quumque ea in veneno quodam glaciali ac summe frigido partes illas valdoperè constringente & quasi glaciante consistit, adeò ut spiritus vitales atque animales liberum patremque aditum ad partes omnes, quas alioquin suis vitalibus radiis illuminare ac collustrare debebant non habeant, ideoque si quis citò tutoque ac jucundè apoplexiam curare cupiat, has causas omnes tollat necessum est.

Non possunt autem hæ causæ omnes citius, tutius, jucundiùque eliminari; quàm remediis sequentibus. In primis ergo natus calor, qui glaciali illo veneno ferme exinguitur, essentia corroborantini & spiritui vini alcoholisatò insimul in quantitate æquali mixtis, & ad 3j. ana propinatus, refocillandus est, ut, si fieri potest, excutitur febris.

Deinde elapsà horà post propinatam istam essentiam, vomitus *datur* sal. vitriol. 3j. & in aq. sal. aut alterius alicujus vomitivæ 3j. dissoluta provocandus est: Secretum namque curandæ apoplexiæ in vomitu consistit, quoniam per motum illum, quò ventriculus pectusque sicutum atque deorsum commoventur, summa illa obstructio tollitur; unde vinum emeticum, ut & flores antimonii aut pulv. emeticus, atque omnia ea in apoplexia summopere tunc profunt, quòd vomitum excitando omnia illa viscosa & glutinosa venenoque glaciali infecta protrudant, idque citò, tutò, ac jucundè.

Cætera autem quæ communiter præscripta videntur, teste experientià, inutilia, ut frictions & sanguinismissio, reperiuntur, nisi corpus apoplecticum sit valdè plethoricum aut sanguine turgeat in quo casu sanguinem mittere licet ad quantitatem satis maximam, alioquin tunc missio sanguinis mortem potius accelerat, cum corpus sic magis refrigeretur & venenum illud glaciale, quò corpus congelatur, potius augmentetur, aut saltem diminuto hinc calore nativo proprietates hujus veneni propægetur.

Purgato corpore postmodum ad sudorifica maxima deveniendum est: Illa enim radicibus ea omnia tollunt, quæ in apoplexia relinquuntur, quæ paralyticum facere solent. Si igitur corpora apoplecticorum citè purgentur, & post purgationem terque quaterque iteratam sudorifera adhibeantur, ita ut sudor copiosus provocetur, tunc in Paralyticum non incidunt atque sic ab apoplexia omnino ex voto sublevantur.

Sudoriferum igitur illud, quò maximè sublevantur apoplectici, est stannum sudorificum quod sequenti paratur modo.

℞. Stann. Anglic. ℥j. liquetur in tigillo, & postquam fufum est, auferatur ab igne, & adicitur ipsi Mercurii crudi optimi pariter ℥j. ut fiat amalgama: Amalgamati huic trito add. Mercurii sublimari iidem, ℥j. & permisceantur insimul ac probe contundantur in mortario marmoreo; postmodum retortæ forti hic perindantur, & lenissimo cinerum igne destilletur, quo ipso aqua perclara destillabit in vas recipiens, cui tamen in antecessum etiam aqua commanis stillat. ℥j. infusa esse debet. Postquam ergo omnis liquor stillaverit, & retorta refrigerit, tunc retortæ illi, si adhuc sit integra omnis illa aqua recipientis cum liquore stillat, uncta infundenda est & super cineres calidos

ponenda, ut materia, quæ remansit in retorta cum hac aqua liqueat, tum temporis amalgama mercurii & stanni. Separatur a capite mortuo, quòd cum salis stanni sapiat naturam, sic resolvitur cum hoc recipientis liquore. Hæc ipsa autem cum sit turbida, ideo filtranda est, ut solutio illa salis stanni clarescat, filtrum verò chartaceum infundibulo aliquo vitreo est stabiliendum, ne à pondere ipsius aquæ rumpatur. Postquam sic clarificatus est liquor, destillandus est igne cinerum in retorta vitrea nitida ac nova & stillatus hinc liquor magneti infundo retortæ superstiti aenuò est reddendus, ut dissolvat illud; quæ solutio postea iterum filtranda est ac destillanda, atque hic labor quater aut quinque reperendus, donec sal in fundo retortæ superstes sit albidissimum, tunc enim denudò solvendum est, ac dissolutum filtratumque retortæ vitree quam maximè imponendum, cui sal. natri opt. & purificatissimi unc. vj. sint injectæ, retortæ autem maximum recipiens juugendum est; hæc etenim materia valdoperè ebullit, ac materia elevatur, & foras exit cum vento & impetu maximo: Nisi itaque recipiens sit magnum & retorta maxima, materia illa perdetur. Ebullitione igitur super cineres tepidos transacta ex retorta stillandus est liquor ad siccitatem usque materiæ, quæ in fundo retortæ, albidissima remanet: Et hæc sine ulla alia præparatione & lotionem sudorifera est. De eo gran. x. accipienda sunt: Permisceri autem id remediū debet cum essent. sal. 3j. & tantundem spiritus optime rectificati; quæ simul mixta ægrotis sunt propinanda, deinde statim cooperiendus quàm maximè est æger, regulis & aliis vasibus aquâ bulliente plenis, adeoque omni arte sudor est provocandus, quòd prolepto eo æger dein in tuto existat: Neque calidatum essentiatum exhibitio commendanda est, quum valdoperè hæc omnia apoplexiæ curandæ profunt, utpote quæ febrem pariter atque sudorem excitare possunt. *Joann. Petr. Faber.*

#### *Animadversio Langii in eundem.*

Tutior certiorque curanditatio vix excogitari potest causarum materialium & morbo occasionem præbentium remotione, quæ præstata morbus evanescit utique. Et hoc ipsum de apoplexia nobis etiam existimamus dictum, cui id in upet notandum adjungimus, quòd cum fortissimæ apoplexiæ contumacissima etiam ac vehementissima existat causa, generosa etiam & valde magna, præsertim scilicet damnatam illam materiæ pertinaciam expugnandi facultatem habentia, tunc adhibenda esse, velut hoc quoque ex remediis ab auctore laudatis jam luculentum evadet.

Sed sciscitabitur hic protinus quispiam, cur Author, qui tantoperè antea causatum remotionem citò molientiam commendavit, à confortantibus & generose calefacientibus remediis curæ auspiciū nunc faciat: Ratio nempe in proclivi est: cum enim apoplectico stupore cæti sensu motuque propemodum existant destituti, ac proinde consopiti in illis sint omnes facultates & actiones, adeoque insimul etiam medicamenta deglutiendi potestate pauciter tum careant, incassum sanè porrigentur pharmaca, licet præsentissima virtute celeberrima, deglutire atque in ventriculum devenire, adeoque in actum deduc-



deduci ista queant: Ideoque prudenti consilio huiusmodi spirituosa ardentia & penetrantissima medicamina tunc prius exhibere jubet, ut calor natus ad incitras redactus, atque in proximo extinctionis gradu constitutus hoc modo nonnihil refocilletur, atque sic deglutiendi facultas quodammodo saltem irriteretur, quo vomitivum, in quo reverà curandæ apoplexiæ arcanum consistit, ut mox id demonstrabitur, in ventriculum demitti possit. Neque dubitamus etiam hæc ratione spiritum seu calorem nostrum, nisi penitus jam extinctus sit, fervorem quendam (Auctor febrem vocat) concipere, atque sic officii sui de novo quasi memorem fieri posse, præsertim si cautela ista juxta advertatur, quam subsequenti paragrapho adijcere constituimus. Præ reliquis autem spiritibus & aquis antiapoplecticis seu specificis essent. rotisimar. dubiò line cum spiritu rectificatissimo parata (magis tamen pretiosa & adpropriata evadet hæc essentia, si propriò sub spiritu, qui scilicet elicitur ex succo rotisimar. fermentatò, & suo etiam sale fixo imprægnatur, conficiatur,) hic commendatur, quòd magnæ virtutis sit rotisimarinus, & ob effectum probatissimum herbæ salutaris appellationem à latinis hinc acceperit: Pollet namque excalefaciendi, attenuandi, resolvendi, & obstructions referandi virtute non tantum egregiè, verum ad rigidos etiam & stupidos resolutosque capitis morbos (id est soporosos capitis affectus) cum applausu Practicorum masculè præstat. Deinde huic essentia spir. vini alchocolisatum, id est per frequentes cohobationes seu destillationes ad summè volatilem subtilitatem perductum, & in virtute sua mirè exaltatum associat Auctor, quod instabilem vim penetrandi & naturam tunc consopitam ardoris sui stimulo iritandi excitandique possideat. Verum quid nobis hic potius agendum esse videatur, & quomodo unà fideià duo parietes sint dealbandi, hoc est uno medicamento scopi principales expleti possint, jamjam monebimus.

Quòd secretum & singulare quasi mysterium scilicet curandæ apoplexiæ in vomitu consistere affirmet Auctor, nos omnibus modis approbamus, & partim hoc thema jamdudum in Miscellaneis nostris curiosis per partes suas diduximus, partim etiam in præsentì verbis tamen ad compendium coaditis adhuc nunc arbitrari non pigebit: Nempè viscidissimum & quasi glaciale, adeoque contumacissimum hoc excrementum nonnisi vehementissimâ commotione resolvi & proterudi poterit, id quod nullâ melius ratione quam generoso remedio vomitum ocyssimè provocando impetrabitur: Per hunc enim vehementissimæ commotionis impetum seditio quædam ac velut tumultus in toto corpore & omnibus ejusdem partibus effectissimè concitatur, natura alto & funesto quasi sopore sepulta suscitatur, eaque ad arma sic cogitur, & hostile hoc excrementum valde commotis concussisque partibus visceribusque pariter commovetur, atque ex voto tandem exturbatur, ut sic natura ab infestissima & glaciale hæc humorum visciditate hætenus gravissimè oppressa unà cum viscerum meatibus pertinaciter obstructis rursum sibi juris fieri queat. Quod verò vehementer commoto ventriculo confestim quoque in consensum irahatur & con-

simili vehementia vellicetur aut concutiat cerebri, non tantum ex communicare nervorum recurrentium, qui à cerebro oriundi orificio ventriculi implantantur, Anatomicis tam famigeta, verum etiam ex interiore ventriculi tunica faucibus quoque communi, & à cerebri seu meningibus producta satis conspicuum esse potest. Dum enim per impetuosam hanc ex vomitu commotionem nervi recurrentes quoque & interior ventriculi tunica fortiter convelluntur, necessariò quoque tota cerebri & ejus membranarum nervorumque inibi exorientium æconomia contremiscit quasi & lancinatur, adeoque factâ hac irritatione, vel si sic loqui liceat, partium trepidatione, spiritus ad redintegrationem moris & actionis suæ excitulantur. Clariorem uberiolemque hujus negotii qui expostulat expositionem, haud gravatim Curiosorum nostrorum circiter adeat primordium. Deinde vomitorium excellentissimam præstantiam in cura apoplexiæ dicteria Helmonitii adscriptu dignissima pulchrè etiam confirmant, quæ adponere non displicet: Ens apoplecticum, inquit ille, in stomacho præiens animam quatit. Item apoplexiæ scena circa stomachum seu orificium ventriculi præcedit atque peragitur: certum etenim est, susceptum in stomacho excrementum mucilaginis vitium ac rudimentum late & ad remota in corpore nostro potenter dispergi, unde remediis quoque stomachicis in tempore oblatis beneficium restitutionis in hoc casu, utpote in quo mali origo & nidus uplurimum tesidet in ventriculo infirmo aut cruditatibus præpedito, faciliè præstari potest, imò nobiliora stomachica cerebro semper sunt accepta, ex adverso cephalica specifica ventriculum præstantissimè etiam solari solent, atque id quidem sub fide rationis & testimonio experientia indubitatissimæ. In hoc ipso igitur cum Auctore consentimus, quod mœdendi jam dictam rationem aut arcanum attinet, sed in eo stare ab ipsius parte non possumus, dum observari unius horum pausâ post adhibitam rotisimar. essentiam demum ad emetica accedendum esse statuit: Anima namque curandi dicitur sine cunctatione atrepta occasio, & tempori citè observato magnum est pouendum præcium. Pindarus *ἀσκήσαντι* laudibus multis extollit Medicum, qui tempestivè omnes commoditatis articulos in curatione amplectitur: Proinde etiam occasionem mœdendi Hippocrates momentosam vocat ac præcipitem: Hæc enim elapsa inevitabilis ad ferale exitum appropinquat non tam inclinatio quam præcipitium. Ideoque monemus ne citò auxiliari in apoplexiâ quis differat, quia irreparabilis est hoc in casu opportunitatis jactura. Atque propterea asserimus ferè ut vel statim post propinatum spirituosum medicamen omnis moveatur lapis quòd emeticum apoplectico pariter sine mora insinuari queat, vel quod consultius unà cum ess. rotisimar. tanquam vehiculo portigantur, aliquot Mercurii vitæ philosophicè præparatî (nempè v. vi. vel vii.) grana, vel tale infusum, dum videlicet ut artis est, spiritus vini rectificatissimus seu aqua aliqua antiapoplectica pretiosa croco metallorum vel laudato vitæ Mercurio (qui sanè sic nominari meretur, quod vitam jam abeuntem potissimè valeat revocare,) vel floribus antimonii affunditur (hæc recensemus aquam Rulandi benedicam) atque eadem sic emetica virtute im-



prægnatur, citò citissime propinetur vel juxta Auctoris manuactionem sal vitrioli curiosè purificatus in aqua hujusmodi seu essentia spirituosâ dissolvatur atque sic exhibeatur: Sic enim geminæ statim satisfiet indicationi, dum & calor natus hinc potenter excitabitur, & ratione energiz emeticæ partes membranæ nervosæque faucium stomachique vellicabuntur, atque sic citiori negotio vomitus provocabitur, summæque glutinosa excrementorum visciditas propullabitur: Et quævis primâ vice hujusmodi remedium in ventriculi fundum non pervenerit, tamen fauces ad minimum eâ quâ pollet lancinandi potest ut iritare valebit, ut deglutiendi facultas exinde pariter extimuletur, atque iterata dosi postea minùs impeditum per officium ventriculi consequi transitum queat. Quo magis itaque acceleratâ ope vomitus concitati poterunt, eò certior etiam spes restituenti apoplecticum adfulgebit, modò cum ulterius præstanda perperam non negligantur.

Levioris moneræ præsidia in paroxysmo apoplexiæ frictions & cucurbitulas utraq; commicantur, quam non scarificatas seu ventosas, nec non ipsam venæ-sectionem esse (nisi summa plethora contineant hanc operationem efficiens ac sanguinis circulati in nimiam valorum repletionem cohibens hanc exposcat in quo casu copiosè emittendum sanguinem nos scitò quoque hortatur.) Auctori ambabus manibus largimur, quæ ratiocipio ipsius hac de re instituto alibi quod dicitur calculum prompti addimus. Ad quam si semel clysteres etiam utut acres referendos esse existimamus, si neglectis nimium emeticis in paroxysmo apoplexiæ illi adhibeantur: Tanti enim tum valoris non sunt, ut unica opitulanti fiducia ab excellentissimis etiam Practicis in eos collocent; post uturpata prius verò vomitoria, & quando ad se nonnihil rediit æger, convenientia emetica sæpius iterata fructuosè admitti nequaquam negamus, quòd hâc ratione tam fomes mali, quam id, quod de suspectissima excrementorum visciditate aut materia peccante circa vias primas residuum est, penitusque sic eliminari queat.

His in curatione apoplectici paroxysmi præmissis, & corpore ite recteque postmodum expurgato ad officiorum maximorum, quorum mentio in antecedentibus capitulis passim facta fuit, nos remittit utique, ut omnia & singula hujus characteris recte remota, quæ in valis aut corporis habitu adhuc delitescunt, ne paralytis exinde fiat, aut aliis exstirpentur removeanturque. Cumprimis autem hic laudat statum diaphoretic. seu sudorificum suum maximum, cujus virtus ut ex præfatione jam nobis cognita est, ita notatò ex præfatione quod sudorifici a illa cum essentia sanguinis (quo est igneo ardentes & cum spiritu vini optimo factis denotat) porrigere præstat: Ut enim, ut a Helmontium medicamenta vix nobilitatis aliquis aut singularis præstantiæ titulum sibi vendicare possunt, nisi cum spiritu vini sint mixta, ita tantum abest, ut noceant eadem, ut potius abducentur corporis nostri loca penetrare, ac sudorem efficaciter sic suscitare queant. Atque hæc sunt, quæ Auctor pro apoplexiæ medela hic adnotavit, quam nos etiam in praxi nostra omni ex parte observamus, eamque cum fortunato successu hætenus præsertim in ipso paroxysmo al-

cohol acceti virtute vomitionis nobilitatum, cui intuper unam aut alteram guttam de oleo cinam. destillato (quod spiritus vitales mire reficit, & proinde hoc ipso nates apoplectici etiam invinsecus inire tunc tolemus) addere continevimus, sine ulla dubitatione adhibendo sequuti fuimus: Ubi pariter fatemur amissam loquelam, nempe familiarem illam apoplexiæ prolem certiori subsidio restitui non posse, quàm emeticorum iteratorum auxilio, id quod toties probatè experientia fultis bonâ fide testamur. Oleum succin. alb. stillat. tam extra quàm intra ad habitum probatissimi experimenti laudem sustinere sæpius sæpiusque etiam compertum sumus: Post vomitoria utilissimè omnino enemata nobis suæ aliquoties, iteravimus, spiritum nostrum cephalicum, item sudorifica nobiliora & sanguinem pariter renovantia nempe tinctur. corall. veram æque tinctur. antimonii utramque nostram dedimus, & ita apoplexiæ curam ex voto absolvimus, non enim pluralitas, sed bonitas remediorum hic respicienda est, quæ Medicum verâ celebritate ac felicitatis famâ unice exornat. Reliqua quæ hic animadvertenda forte te affuerunt, morbi circumstantiæ docto Medico facili insinuabunt, &c. *Christian. Langius Patholog. animas.*

*Methodus, Therapeutica, aut est curatoria ad paroxysmum, quando ingruit aut præservatoria ad ipsum, ne redeat, præcavendum; prior ad apoplexiæ omnem, altera tantum ad habitalem spectat.*

*Morbi insulæ scilicet, (si non à capitis læsione externa, aut vehementi, præcedat) quamvis nescimus utrum à causa invincibili (cujusmodi sunt sanguis in cerebro extravasatus aut abscessus disruptus) exciteur, necne; utrunque Therapeutiam ejus operâ sedulâ conari debemus. Et quia sanguis nimis turgens causam morificam inferre, aut saltem augere, eandemque subsidens, & sedatior factus, nonnunquam auferre solet; idcirco imprimis de cursu ejus moderando deliberare oportet. Atque hic quæstio oritur de Aegrotantis situ; nempe utrum mox in lecto reponi, vel annon extra cum aliquandiu detineri debeat? Nonnulli postea hoc religiosè observare, nec sine ratione; quia nimium in lecto major ad somnolentiam propensio est, atque sanguis propter ambientem strati calorem magis effervescent, & uberius efflagrans, plus materiam excrementitiæ utque in cerebellum affectum suffundit; è contra, dum Aegrotans tenuiter vestitus in cathedra locatur, sanguis tardius fluit, atque xata subsidentia, ad humores ex insula reoribendos potius, quàm ad eos illuc nutriendos aptiora videntur. Quapropter si Pateriens satis robustus fuerit, exprobat forsan, per 6. aut 8. horas, donec materiam morificæ fluxio prætereat, & sanguinis cuius phlebotomia, aliisque remediis sedulò adhibitis, sedatior fiat, eum extra lectum manere; imbecilles autem, & qui tenellæ sunt constitutionis, quamprimùm percussimox cubili committantur. Aegrotantis si e in lecto, siue extra ipsum, sumi non sit supinus sed capite nonnihil erecto, ac ad latus, modò animum, modò alterum inclinato.*

*Phlebotomia, in quibusvis serè apoplecticis necessaria, minimè differatur: vetum enemata priori injecto sanguis copiosè detrahatur. In clystere dissolvatur species hiæ diascolocynth. ac infuso*



*fusio croci metallorum turbida. Vescatorium amplum cervici, aliaque cruribus & cataplasma atrahentia pedibus applicentur: tempora & nares oleis aut balsamis appropriatis illinantur, atque membrorum immò totius ferè corporis frictiones dolorificæ instillantur. Interim quæ spiritus animales exulcent, & vinculis expediant, scilicet sp. C. C. fuliginis, & similia cum iulapio cephalico subinde propinentur.*

Post hæc ægrotante cubili imposito, (si ad vomendum satis facilis, & potens videtur) emeticum ex sale vitrioli, oxymelite scillitico, aut ex infusione croci metallorum exhibeatur, & subinde pennâ gutturi intusâ vomitio quater aut quinqueies proritetur, liquore pollexico ex intervallis infuso.

Vomitione peractâ confortantia, uti elixyr vite, Quercetani, spiritus lavendula, aut theriacalis camphoratus, tinctura pœoniæ, aut corallii cum æquis apoplecticis, aliisque appropriatis in dosi convenienti exhibeantur, & prout res exiget, repetantur. Die secundo iisdem remediis adhuc continuatis, intusper cucurbitula sicca aut scarificata circa homoplatas, aut cervicem applicentur; aut si plus sanguinis detrahete oportebit, vena jugularis aperiat; enema repetatur; spiritus salis armoniaci aut suffusus ex Galbano in aceto acerrimo costis naribus admoveatur. Intusper errhina, & apophlegmasismi utantur: Dein vesperti catharsis ex pilulis Rydii, vel electuario rosar. solut. in liquore quovis dissolutis instituitur.

Hiscæ nihil juvantibus, etsi spes tenuis aut nulla est, capitis vertici raso aut ferrum candens, aut vescatorium amplum imponatur; reliqua pars ejus, ac imprimis frons, & sinciput foveatur aceto bezoardico; hirudines temporibus aut post aures applicentur, spiritus C. C. aut fuliginis in majori dosi, & sæpius infundantur; his, aliisque administrationum modis insistendum erit, donec mors in propinquo esse videbitur, quam scilicet (uti Celsus habet) ejusmodi remedia sæpè tantum differunt, atque vitam interim infestant.

Methodus prophylactica respicit tum eos, qui insultibus scilicet uno aut pluribus prius tentati fuerunt, tum & eos qui in hos proclives videntur, utpote qui à Parentibus apoplecticis enascuntur, aut qui vertigini, incho aut lipothymia crebris obnoxii sunt, etiam qui collum brevius & tortosum habent.

Vere & autumno catharsis, & phlebotomia (ubi conveniet) instituantur; quoad prius qui ad vomendum faciles sunt emeticum imprimis sumant ex infusione croci metallorum, cum sale vitrioli, vel ex sulphure antimonii; & dein per tres aut quatuor vices repetatur: fonticelle duæ amplæ juxta homoplatas excutuntur, vel, si loca ista quibuldam non attrident, unam illi in brachio, alteramque in crure opposito gestent.

Diebus aliis à purgatione vacuis, medicamenta alterantia & cephalica bis in die sumantur.

℞. Conser. flor. lilior. convallium (vel pœoniæ maris) 3vj. pulv. rad. pœon. maris 3ss. cranii humani præp. 3ij. sem. & flor. pœon. maris pulv. ana 3ij. corallii rubr. præp. margit. & succin. albi, ana 3j. salis corallii 3iv. lytop. è floribus pœoniæ maris, q. s. f. electuarius dosi 3ij. ma-

nè & vesperti superbibendo aquæ sequentis 3ij. vel 3ij.

℞. Rad. pœon. maris, angelicæ, imperatoricæ ana 3ss. rad. zedoar. galang. minor. ana 3j. folior. visc. pomor. ruzæ, salviæ, beronicæ ana m. iv. cort. exteriores 10. aurant. & 8. limoniðr. cardam. cariophyll. nucis moschar. ana 3ss. omnibus confectis & contusis affunde vini albi (in quo stercoris pavonis 3ij. per diem infundebantur) 3x. claus. infundantur per triduum, dein destill. f. art. liquor totus misce.

℞. Specier. Diambicæ 3ij. pulv. rad. pœoniæ maris, zedoar. select. ana 3i ss. marg. 3j. ol. succini putill. 3ss. sacchar. albi, solut. in aq. pœoniæ & ad tabul. cost. 3vj. f. s. a. tabul. pond. 3ss. Pociens comedat j. vel ij. sæpius in die ad libitum.

Intra dies 15. aut 20. remedia, quod minus tædio & plus emolumento fuerint, mutari debent; itaque loco electuarii substituatur per duas vel tres septimanas, modò spiritus salis armoniac. succinat. aut coralliat, aut cranio aut castoreo imprægnatus; modò elixir pœoniæ aut tinctura succini, vel corallii, aut elixir vitæ Quercetani aut mixtura simplex: etiam loco istius aquæ compositiæ propinentur, vel aq. cerasor. nigror. vel jugland. vel rosmarini, vel lavendulæ simplicis, modò haustus liquoris possentici, cum floribus pœon. maris aut lilior. convallium incoctis, vel haustus Tex vel Coffeæ tempore maturino, (aquæ è qua paratur prius incoquendo ejusmodi ingredientia:) vel paratur confectio chocolacæ ad hunc modum.

℞. Pul. rad. pœoniæ maris, cranii humani præp. ana 3ss. specier. diambicæ 3ij. f. pulv. cujus singulis chartis adde carn. nucleor. cacao 3ij. sacchar. q. s. f. confect. sumat hujus 3ss. vel 3vj. quodque mane in haustu decocti salviæ flor. pœoniæ, aut similitum.

℞. Pulv. radic. pœoniæ maris, cranii humani præp. ana 3ss. rad. zedoar. select. dictamn. ciet. angelic. contrayervæ, ana 3ij. f. pulvis omnium subtilis, adde flaved. aurant. & limonii conditi ana 3ij. simul terantur in pulverem, sumat circa 3ss. vel 3j. horam, ante & post prandium.

℞. Pro potu ordinario doliolum iv. congiortum impleatur Allâ mediocri, cui incoquantur folior. matrubii albi odorati siccati m. vj. fruct. anacardin. cardamom. ana 3i ss. confect. & contus. f. sacculus.

Imprimis verò exacta victus ratio institui debet. Aer temperatus, siccus & benè perflatus eligatur; cibi tantum cupepti, & tenues comedantur. Cœna sit parca, aut nulla, somnus meridianus, comotationes, aliaque circa res non naturales consuetudines malæ vitentur. *Thorn. Willis de Apoplexia.*

Cum levi etiam apoplexiâ correpti vix possint ab interitu vindicari, summa esse debet Medici sollicitudo, ut eos, qui in hanc perniciosissimam affectionem propensi sunt, ab ejus insultu præservet. Cum itaque apoplexiæ causa sit melancholia, præcipuus esse debet omnis præcautionis scopus ut hujus humoris generatio prohibeatur, idem genitus evacuetur, temperetur, ne congenita aciditas evecta aliquando vires suas exerceat, & sanguinem figens horrenda inferat apo-



plexia symptomata. Cerebri etiam quod præcipua est istius affectionis sedes, tuendum est robor.

In primis itaque rerum nonnaturalium usus in hos scopos dirigi debet; nec solum humoris melancholici ratio habenda est, sed etiam eorum omnium quæ possunt ad illius generationem quomodocumque conducere, aut illius activitatem augere, aut ad ejus effectus perniciosissimos producendos, aut accelerandos conferre, cujusmodi sunt præcipue plethora & cacochymia pituitosa & morbi varii præcipue cerebri. Quia verò hyeme & tempestatibus humidis frequentius invadit apoplexia tunc major debet esse cura eorum qui in hunc morbum propensi sunt, cavendo ne ab æris intemperie noxa aliqua suscipiatur, aut si quæ suscepta est emendetur. Quæ præstantissima sunt ad præcautionem præidia facile erit intelligere ex iis quæ dicentur in hujus morbi curatione, quam jam aggredior.

Cum apoplexia sit abolitio functionum omnium animalium excepta respiratione &c. à prohibito spirituum animalium influxu propter obstructionem ductuum cerebri excitatam ab humore melancholico figente sanguinem, ab hoc morbo indicatur obstructionis solutio, & causæ illam efficientis remotio, quibus omnibus citissime prospiciendum est, cum primò succi melancholici afflatu sanguis incipit concretescere; quandoquidem magna & consummata concretio, omnem remedium vim eludit. Cum verò morbus non modò præceps sit, sed etiam magnus & perniciosus, præter Medici diligentiam, maxima etiam requirit auxilia. Quæ verò magna vocantur auxilia sunt sanguinis missio & purgatio de quibus inquirendum est an & quomodo conferant apoplecticis, sumpto à sanguinis missione inquisitionis exordio.

Quanta sit vis missionis sanguinis ad apoplexiam ejusque causam debellandam experientia quotidiana demonstrat, cum plerique solà sanguinis missione tempestivè administratà statim à terribissimo hoc morbo vindicentur, eà vel neglectà vel in longius tempus dilatà quæ reliqua adhibentur auxilia nullam plerumque conferre utilitatem, ægrique symptomatum violentià de medio tollantur. Quapropter non immeritò in omnium ore est illud Celsi lib. 3. c. ult. ubi dicit *sanguinis distractionem in apoplexia vel occidere vel liberare, aliud verò curationis genus vix unquam sanitatem restituere, sæpe mortem tantum differre, vitam interim infestare.* His addit si post sanguinis missionem non redeat & motus & mens, nihil spei superesse; si redeat, sanitatem quoque respici.

Prædictorum autoritas & fausti hujus auxilii evenus, quanti facienda sit in apoplexia sanguinis missio satis suadent iis, qui alios tantum sequuntur, eorum quæ agunt rationes nosse parùm curant, satis esse existimantes ad famam tuendam, si magni Medici in similibus occasionibus similiter se gerant. Quia verò convenientem auxiliorum modum ii tantum possunt adhibere, qui ex perspecta morbi natura ejus curationem instituant, demonstrandum nobis est, ex idea apoplexiae ejusque causâ juxta doctrinam hæcenus stabilitam, quanta sit in hoc morbo necessitas sanguinis missionis, & quæ debeant esse in hoc auxilio administrando præcautiones.

Missionem sanguinis per se indicat plenitudo,

seu in toto corpore, seu in parte aliqua cumulatâ; ea verò aliquando totum apoplecticorum corpus gravat: certè semper cerebrum & pulmones infestat, ex demonstratis, ac proinde, in apoplexia semper indicatur sanguinis missio per se ratione plenitudinis, & per accidens ratione coagulationis sanguinis quam plenitudo adjuvat, & ratione obstructionum quas fovet, ut patet ex dictis. Plenitudine pulmones infestari manifestum ex difficultate respirandi, ex rupture vasorum quæ aliquando contingit cum effusione sanguinis in thoracis cavitatem, ex pulmonum distentione, quæ aliquando perseverat aperto thorace eorum qui apoplexiâ extincti sunt. Plenitudinem cerebri demonstrant venarum jugularium distentio in vehementi apoplexia, vasorum sanguineorum in cerebro ruptio, & sanguinis effusio satis frequens in ventriculos cerebri aut circa cerebrum.

Utilitas venæ-sectionis statim perspecta erit perpendenti apoplexiæ causas & symptomata & quæ sanguinis missionem necessario sequuntur. Undecumque mittatur sanguis totius plenitudo minuitur; sed præcipue ea quæ cerebrum & pulmones gravat, si vena aliqua, ex iis aperitur, quæ sanguinem reducem in cavam ascendentem convolvunt. Cum enim qui sic effunditur sanguis, ab illo alveo subducatur, minor quàm antea illius eorum vasa distendit per angustiores ductus facilius in cor elutrietur, indeque in arterias: subducto etiam sanguinis in jugularibus stagnans impedito, qui ad cerebrum defertur, facilius ad cor remeat, tum proprio pondere, tum ejus impulsu qui per arterias advehitur. Ob hæc omnia celerius quàm antea sanguis movetur in vasis à coagulatione prohibetur, & qui in ductibus exilioribus incipiebat concretescere, ibique hærebat, inde extrahitur, & validiore agitatione suæ fluiditati restituitur, ac denique quæ oclusæ erant sanguinis & spirituum viæ referantur. Ad hoc etiam confert restitutus per venæ-sectionem liberior sanguinis motus, ut quæ exhibentur sanguinem solventia medicamina ad cerebrum uberius deferantur, & expectantem conferre utilitatem; nec enim facile ad partis cujusquam interiora penetrare possunt, nisi cum sanguine ad ea devolvantur. Eà de causâ statim in prima morbi invasionem mittendus est sanguis, dum ut ait Hippocrates *ad hoc elevati sunt spiritus*, dum viget sanguinis calor & fluiditas, si enim hoc auxilium differatur & sanguis penitus in vasis concretus, nulla expectanda ex missione sanguinis, aut aliis auxiliis utilitas: cum à consummata coagulatione non detur regressus. Si enim in cerebri vasis fiat ejus coagulatione, immedicabilem inducet resolutionem: si accedat ad cor delatum in ejus ventriculis & vasis vicinis omnino figat sanguinem apoplexiæ syncope copulabit, quæ subitò interimet agrotantem: sic apud Petrum Salium divertim l. de particularibus affect. c. 4. puella 14. annorum, cum per diem capitis gravitatem, vertigines & anxietates passa esset, qui proculdubio erant apoplexiæ prodromi, die sequenti subitò extincta est. Secto post mortem cadavere, in arteria magna & in vena cava totus sanguis concretus apparuit, ne apprehenso illius altero principio, ita integer ex vena & arteria educeretur, ac gladius è vagina extrahi solet. Adde quod ad eam coagulationem



vix potest perveniri, quin à sanguinis cum impetu ruentis & exitum non invenientis conatu vasa cerebri rumpantur, & magna sanguinis copia effundatur, unde mors certissima est expectanda. Cautissime itaque administrandum est sanguinis missionis præsidium apoplecticis, nec expectandum est, cum res urget, ut clyster aut quodcumque aliud remedium præmittatur: maxime vero in plethoricis, quos sanos apoplexia invadit, quibus, inquit Hippocrates, l. 4. de dicta in acutis ut plurimum coincidunt rubores faciei, oculorum immobilitates, manuum distentiones, dentium stridores, pulsationes, maxillarum adductio: his inquam liberalis convenit sanguinis profusio, juxta præceptum Hippocratis eodem loco. Venam igitur secare oportet in dextro internam, & detrabere sanguinem, secundum habitum & aetatem imitâ rationes, plus aut minus. Ubi æqualis est utrinque affectio venam in dextro brachio secare satius existimo, quam in sinistro, quia in illo ob majus exercitium, vasa sunt latiora, quam in isto, ex quibus proinde largiore facta sanguinis profusione, major & magis subita contingit in sanguine mutatio. Unde merito Hippocrates per venam internam creditur designare magnam. In brachio autem præscribitur venæ sectio, quia missio ex ea parte sanguine plenitudini totius & speciatim cerebri & pulmonum prospicitur. Ut citius immutetur plenitudo universalis, quidam eodem tempore in utroque brachio venam aperiant. Capi-vaccius l. 1. pract. c. 17. spatio horarum 12. tres venas aperendas monet, in brachio, in pede, in capite; scilicet ad vacuandum, revellendum, derivandum. Verum horum indicatio desumi debet à copia & à motu humorum, quem designant: non solum præsentia symptomata, sed etiam quæ præcessere, & apoplexiæ dedunt occasionem. Vires, quæ qualem in mittendo sanguine oporteat modum servare indicant, æstimandæ sunt non ex impotentia præsentis, sed ex robore ægrotantis ante morbi invasionem, quo fit ut etiam pulsus ferè deficiente aliquando mitti debeat sanguis, nec metuendum est ob sanguinis missionem perfrigeratio, concitatio enim in motum sanguine & prohibita coagulatione redit calor, sique vegetior, qui quiescere sanguinis penitus extinguatur. Nullus itaque apoplecticus à venæ sectione immunis esse debet, nisi summa virium dejectio prohibeat. An ex sine penitus exoluta judicabitur ex respiratoris læsione, faciei pallore & coincidentia, extremorum aut etiam totius corporis perfrigeratione, sudore post angustiam respirationis. His enim omnibus mora proxima significatur, & inutile foret missionis sanguinis præsidium. Hic subit mirari Medicos, qui existimantes apoplexiæ causam esse pituitam crassam & viscidam obstruentem cerebri ventriculos aut ipsos nervos, nihilominus venæ sectionem præscribunt; nec enim video quem sibi scopum proponant, nec quâ ratione missio sanguine, tam subito obstructio solvatur. Quod enim tam subito abit pituita crassa? Quas ipsi, ut inde evacuetur vias aperit sanguinis missio? An illam attenuat, incidit, ac fluidam reddit?

Postquam, sectâ in brachio venâ imminuta est universalis plenitudo, patres præcipue afflicte sublevandæ sunt: ad quod præstantissimum est præsidium venarum jugularium apertio, à quibus, ob eorum magnitudinem affatim profunditur sanguis, quo restagnante cerebrum gravabatur; &

pulmones hoc onere detractò minus premuntur, ac patiore affluente sanguine, facilius quem continent deponunt in arterias & sinistram cordis ventriculum: ac tandem liberiore reddito sanguinis fluxu coagulatio impeditur, obstructions solvuntur, functiones animales sensum restituntur. Circa apertionem venarum jugularium experientia suffragatur rationi, edque facilius eas venæ tundi possunt, quod cum in hoc affectu tumidiores sint, nulla opus est ligatura, quæ hic posset esse noxia, quæque tam ob causam post venarum jugularium apertionem non est arcte adhibenda, sed vulneri imponendum est emplastrum ex bolo armeno, aloë, pilis leporinis & ovi albumine, ac sine constrictione deligandum.

Si non sit locus venæ sectioni ob virium dejectionem applicandæ sunt cucurbitulæ cum scarificatione scapulis, lumbis, cruribus, brachiis, uni vel pluribus ex illis locis: prout vacuandi, revellendi, derivandi necessitas indicabit.

Hirudines margini ani applicatas conferre ex eo manifestum est, quod spontanea hæmorrhoidum apertio salutaris est, monente Hippocrate loco supra citato. Tum verò sunt potissimum utiles quando in partibus infimi ventris collecta est ingens humoris atrabilarii colluvies, & sublato plenitudinis excessu hirudines applicantur, tum enim & reliquam plenitudinem tollunt, sanguinem atrabilarium evacuant, ejusque qui sit ad inferiora motum retrahunt ad opposita. Eadem hirudines venis capitis affixæ, post generales evacuationes & revulsiones juvant: Nec non cucurbitulae sincipiti aut occipiti applicitæ cum scarificatione, sed cavendum ne ante adhibeatur quam instituta sit conveniens evacuatio & revulsio, alias humorum motum ad superiora concitarent.

Frictiones etiam sunt utiles non solum quia revellendi vim quandam obtinent, & calefaciendo sanguinem attenuant, sed etiam quia sopitam animalem facultatem excitant & majorem corporem impediunt.

In apoplexia quæ comitem habet causam concitantem plenitudinem, quam signa supra memorata designant, mittendus est statim sanguis largâ manu, juxta præscriptum Hippocratis nullâ adhibita præcautione, quia vires sunt remedio ferendo pares, & periculum urget. Quando verò non adest plethora, sed humorum acrimia ingens copia melancholiæ scilicet acidioris multitudo aut exaltatio apoplexiæ inducit, quod indicant dolores prægressi, fomenta venæ sectioni præmittere jubet Hippocrates, nec abs re. Cum enim venæ inflammantur ac exsiccantur angustioresque fiunt, & sanguis sentim concresecat, si is occurratur per fomenta emollientia, calefacientia, attenuantia, sanguis facilius fluet suoque rapido motu quod concresecere incipit, à dilatis & mollioribus factis vasculis capillaribus absterget, si statim post fomentum aut in ipso fomenti usu vena secretorialis metuendum est ne per venæ sectionem tenuior sanguinis portio effluat, crassiore & coagulati incipiente relicta, quæ mox exhibendi cathartici effectum impediat: fovendum autem est præcipue caput, cum in eo maximum imminet à coagulatione periculum, deinde hypocondria, sed & fomenta & venæ sectio in ipso sunt morbi principio usurpanda, dum adhuc sunt elevati spiritus.



Postquam demonstravimus missionis sanguinis in apoplexia necessitatem, inquirendum superest an in hoc morbo aliqua sit necessitas purgationis. Cum præcipua apoplexiæ causa sit melancholia, qualitate, aciditatis scilicet excessu aut acerbitate peccans, evidens est humorem illum cum à natura sit alienus, sui evacuationem indicare, eoque magis, quod periculum præsens est, nec datur etiam multo tempore ab aciditate ad benigniorem & spirituosam aut balsamicam naturam reditus: multoque magis adhuc indicatur purgatio si cacochymia melancholicæ pituitosa conjungatur. Nec post sanguinis missionem, sublata è toto aut è cerebro plethorâ, majorem patitur dilationem purgatio, quam venæ sectio post apoplexiæ invasionem, nisi vires dejectæ ad refectionem moram postulent. Quapropter sine ullo temporis delectu purgatio est quam citissime præscribenda. Nisi enim statim fluidiore reddito sanguine per venæ sectionem, & obstructionibus cerebri & pulmonum ex parte solutis, aut earum augmento prohibito, dum adhuc elevati sunt spiritus, medicamentum exhibeatur catharticum, sensim progrediente sanguinis coagulatione, tam pernix effici poterit partium sanguinis, & humorum ipsi permistorum inter se cohesio, ut omni purgantium vim eludant: imò poterit purgantis ad partes potissimum affectas distributio aut omnino, aut saltem ex parte, viis per coagulationem sanguinis angustioribus factis, prohiberi. Nec quaecumque est exhibendum medicamentum sed vehemens, tale enim indicat, humoris peccantis natura, sanguinis dispositio & ipse locus affectus. Ad primum spectat aphor. 9. sect. 4. *melancholicos vehementer purgabis per inferiora*. Nec enim movetur melancholia nisi mochlico medicamento à reliquis humoribus divellatur. Sanguis verò concrelescens aut ad concrelescendum proximè dispositus non facile contenta dimittit, sed valido indiget fermento ut ferveat, & partium secretionem patitur. Denique cum non è ventriculo & primis viis educendus sit humor, sed è tota sanguinis massa, & potissimum è cerebro, necesse est, ut per totum corpus purgantis vis diffundatur, & integra ad caput perveniat, quod nunquam pertingeret purgans debile.

Erunt itaque conveniens medicamenti purgantis materia diacarthami, trochisci alhandal, hiera diacolocynthidos, sed maxime vinum emeticum quod, ut per inferiora purget in senæ infuso dissolvitur. Nec sola vis purgandi vinum emeticum commendat, sed etiam ob insignem, qua pollet, vim sanguinis coagulationem impediendi, & coagulationem solvendi, quod imprimis hoc in morbo requiritur; ea de causa, ut vim illam in reliquis purgantibus acuant prælici, illis solent castoreum permiscere.

Consideratis indicationibus inquit Hippocrates, medicamentum purgans exhibere oportet, si non aliovetur sursum; ad inferiorem vero alvum si non subeat, infusum per clysterem. Spectare debet Medicus quam in partem vergant humores, ut si nullus se prodar ad vomendum motus, aut dispositio, purgatio per inferiora sit instituenda, & contra: per eas enim vias optime & cum minore ægrotantis molestia fit ope medicamenti evacuatio, in quas humores vel ex propria natura, vel ex ductum & totius corporis dispositione spontè profluunt. Si itaque ex structura corporis, consuetudine, &c.

ægrotans sit ad vomendum optime comparatus, & nihil sit aliud metuendum, exhibendum est ipsi emeticum. Verum majora sunt quæ in hoc morbo vomitus inferre potest incommoda, quam ut debeat sine meditatione promoveri. Non possunt enim muscoli abdominis cum in vomentibus contrahuntur subjecta viscera & vasa comprimere, quin sanguinem ex ipsis exprimant & ad caput propellant: unde fit, ut qui extra apoplexiam vomunt, dolorem capitis gravatissimi patiantur, & venarum in fronte & temporibus distentiones. Hinc patet vomitu in apoplexia concitato noxam augeri, quia cerebrum jam sanguinis statione oppletum uberiori per arterias adfluxu adhuc magis impletur, cum magno periculo ruptionis vasorum, maxime quando adest plenitudo ad vasa, antehic proxima. Tutius itaque semper erit per inferiora purgare, quamvis forte aliquando vomitum concitare non esset aded periculosum, cum vasa non sunt humoribus distenta, & vix incipit in cerebri aut pulmonum vasis obstructio. Hic advertendus est frequens error in exhibendo vino emetico, mediculosi enim illud in minori dosi ad unciam scilicet aut sesquiunciam ad summum præscribunt, expectatoque effectu frustrati medicamentum acculant infamantque, quod in adultis & robustis debet ad uncias tres circiter exhiberi ex insulione senæ. Clysteres acres frequenter injecti conferunt ex decocto herbarum cephalicarum, in quo dissolvenda sunt purgantia valida, diacarthami, hiera diacolocynthidos, benedicta laxativa, aqua benedicta, vinum emeticum, &c. Horum clysterum unus utiliter præmittitur venæ sectioni, si quod imminet periculum patitur dilationem venæ sectionis; clysteres enim evacuant ac ad inferiora revellunt, & quod spirituosum est & volatile, tum in purgantibus, tum in cephalicis, in venas illapsum sanguinis fluiditatem auger.

Nec negligenda sunt ab ipso principio quæ intus assumpta effervescentiam sanguinis augent, spiritus retocillant, calorem deficientem suscitant, præteritum post venæ sectionem in plethoricis, in reliquis tum ante, tum post præstantissima sunt maxime spirituosia, & quæ sale volatili abundant, cujusmodi sunt aquæ apoplecticæ multiplicis generis, spiritus vini tartaratus, olea stillantia sniisi, rosimarin, salvia, caryophyllorum, & similia cum aqua aliqua cephalica. Magnam imprimis & repentinam conferunt utilitatem sales volatiles à corporum concretionem separati depurati, cujusmodi sunt tales volatiles salis armoniaci, fuliginis, sanguinis, cornu cervi, inter quos primas obtinet sal volatilis viperarum. Sales illi citissime totam sanguinis massam pervadunt, fluidioremque reddunt, acidorum vim infringunt, sanguinis grumos dissolvunt. Prætereo Theriacam veterem, Mithridatium & varias portiones, ex usu præsentis & prout varia medicamenta reperiuntur, parabiles quibus castoreum cum summa utilitate admiscetur.

Extrinsecus illinuntur palatum, nares, aur es, balsamis apoplecticis, theriacâ, mithridatio, confectione anacardina, & similibus cum castoreo. Ita profunt quia eorum partes magis volatiles in venas capillares penetrando sanguinem fundunt, & vias, quibus humores crassi evacuantur, aperiant præcipue circa fauces.

Vesicantia capiti, cervici, brachiis, cruribus empla-



emplastra epispastica pedibus applicata sunt alicujus utilitatis, non tam securum eliciendo, quam aliquando quod concretibile est.

A prima invasione morbi xgrotans ita in lecto collocetur, ut corporis truncus non sit omnino erectus; hoc enim esset nimis laboriosum & xgrotanti & adstantibus, sed parum inclinatus: sic enim abdominis visceribus deorsum procumbentibus, & diaphragmate ad eorum pressionem libero, facilior erit respiratio, sanguis superiora petet minore impetu & facilius inde defluet ad inferiora.

Succussiones possunt esse alicujus utilitatis vacuo corpore: At in plethoricis & cacochymia pituitosa laborantibus mortem accelerant. *Franc. Bayle de apoplexia.*

*Frictiones* fiant circa venas jugulares. Palato inungatur castoreum in aqua appropriata solutum. Conferunt & *reversiones* si ad suum plethora venarum secatur, cum foramine amplo, quod cerasio ex aloës p. j. thur. p. ij. & pills leporinis ultis agglutinari potest ac debet. *Purgantia & vomitoria* sint in forma liquida saporis ingrati, cum oleo stillat. ma. is & aquis appropriatis. *Disententia* in humore crassiori debent esse miora. Conveniunt spiritus vitriol. apoplectici, sal apoplect. comp. pos. Myrsichii, vel sal ex capite mortuo aq. apoplect. paratum, acetum rutaceum vel appropriatum. It. sal. bened. vitriolatum. *Fortes clysteres* ex revellentibus fortioribus specificis ac pituitum educen. tibus. Glandes item fortes ex specif. stimulantibus. *Lingua theriac.* salibus appropriatis admixtis illinatur.

*Appropriata* sunt semen sinapi & erucæ, aquæ apoplecticæ variz impr. myrsichii, aq. lil. convall. cum vino, aqua primulæ veris essent. flor. anthos. sal. lil. convall. cum spiritu prop. spir. cereos. humani, sang. hum. spir. vitriol. volat. Balsamus apoplect. Crollii, essentia ligni sancti &c.

*Externæ* species diabolaut. myrs. lixiv. Spicent. & cucuphæ exiccantes.

℞. Herb. rutæ sal. cent. min. origan. ana m. j. flor. sal. lil. convall. primul. veris stoe cad. arab. ana p. j. rad. aristol. rotund. cy. lam. ana ʒ. j. sem. cartham. in pet. ligat. ʒ. vj. agatic. ʒ. ij. coq. in l. q. aq. commun. col.

℞. ʒ. vi. vel viii. in quibus dissolv. hier. pier. cum agatic. ʒ. j. fell. taurin. inspiss. ʒ. i. sal. apoplect. vel rutæ ʒ. j. mellis anthosati ʒ. j. f. l. a. clysm.

℞. Herb. rut. torismar. origan. fol. asari ana m. j. flor. stoe cad. arab. cent. min. lil. convall. ana p. j. rad. aristoloch. rotund. ʒ. j. imperat. pyrethri ana ʒ. ss. sem. cartham. in pet. lig. ʒ. vj. agar. albi ʒ. i. f. pul. coloc. in pet. lig. ʒ. j. coq. in l. q. aq. commun. col.

℞. ʒ. viii. in quibus dissolve elect. hier. pier. cum agar. bened. laxat. ana ʒ. ss. succ. rut. inspiss. ʒ. ss. extr. & castor. gr. vj. m. f. l. a. clysm.

Possunt quoque ipsæ pilulæ dissolvi in clysteribus, dissolvuntur scilicet a ʒ. j. ad ʒ. ij. in decocto. Potest etiam clysterizatus addi ol. diacoloc. quercet. Et pro *diutoribus* olea destillata exempli gratia oleum sal. rut. torismar. ac melioris penetrationis ergo ess. sal. torismar. & lil. convall.

℞. Spec. hier. pier. cum agatic. ʒ. iij. pulv. el. jeb. sal. ʒ. ss. sal. apoplect. vel rut. ʒ. j. c. l. q.

mellis anthosati f. l. a. suppositoria num. ii. illinatur oleo diacoloc. Quercet.

℞. Fell. taur. inspiss. ʒ. j. succ. rut. inspiss. ʒ. j. succ. cent. min. inspiss. ʒ. ss. sal. rut. ʒ. j. c. l. q. mellis anthosati f. l. a. suppositoria. Inungantur unguento clysmatico. Castoreum vel eius extractum quoque potest addi, vel inungi supposit. ol. castorei.

℞. Aq. cerasi nigr. lil. convall. c. vin. meliss. c. v. ana ʒ. j. apoplect. ʒ. ij. ess. flor. anth. lil. convall. ana ʒ. j. sal. ʒ. ij. Q. E. Marthiol. ʒ. j. tyrap. de betonic. ʒ. j. muce.

℞. Aq. apoplect. opr. ʒ. j. lil. convall. cerasi nigr. ana ʒ. i. ss. spir. primul. ver. ʒ. ss. syrup. flo. tunice. ʒ. i. ss. m.

℞. Aq. meliss. c. vin. lil. convall. c. vin. ana ʒ. ij. apoplect. cum moscho & ambra ʒ. vj. spir. lil. convall. ʒ. j. acer. rutac. acer. apoplect. ana ʒ. ss.

℞. Aq. me. ill. cum v. aq. lil. convall. c. v. ana ʒ. i. ss. specif. cephalic. ʒ. i. ss. syrup. flor. unice. betonic. ana ʒ. vj. m.

℞. Flor. anthos. flor. meliss. flor. sal. ana p. ij. cubebar. cardamom. ana ʒ. ss. rad. ireos Florent. ʒ. j. f. l. a. nodulus c. stylo.

℞. Balsam. maioran. balsam. rut. balsam. succin. ana ʒ. ss. balsam. apoplect. Crollii ʒ. j. misce.

℞. Extract. sal. extract. theriacal. ana ʒ. j. sp. lil. convall. sp. cerasi nigr. ana ʒ. ss. m.

℞. Sp. cerasi nigr. spir. eruc. ana ʒ. j. syrup. flor. unice. ʒ. ij. m.

℞. Theriac. veter. ʒ. j. confect. anacard. ʒ. ij. essent. sal. ʒ. j. m. *Externæ* applicentur medicamenta principio nervorum.

*Extra patoxylinum*: ℞. Sal. vitriol. ʒ. ij. f. ʒ. j. dissolv. in l. q. aq. sal. Adde syrup. de beton. ʒ. iij. m.

℞. Fol. S. S. S. elect. ʒ. i. agar. albi ʒ. j. flor. primul. veris fl. anthos. ana p. j. cardamom. cubeb. ana ʒ. ss. Infund. in l. q. aq. sal. & cerasi nigr. stent in infus. per 24. horas colat. adde syrup. de beton. ʒ. iij. scam. tu phurac. gr. v. m.

℞. Extract. diacartham. ʒ. j. dissolv. in l. q. aq. primul. veris vel lil. convall. c. vino adde resu. jalap. gr. v. syrup. de stoe cad. ʒ. iij. m.

℞. Mell. pil. de succino Crat. pilul. cochiac. ana ʒ. ss. extract. troch. alh. gr. ij. vel iij. c. l. q. ol. stillac. majoran. f. l. a. Pilul. num. xix.

℞. Extract. diacarth. ʒ. j. trochic. alhand. gr. ij. castor. gr. ij. c. ol. stillac. sal. f. l. a. pil.

℞. Pulv. rad. jalappæ ʒ. j. scammon. sulphurac. gr. v. ol. stillac. majoran. gr. ij. m.

℞. Fl. primul. veris flor. lil. convall. fl. rupie. flor. stoe cad. Arab. anthos. flor. beton. ana p. ij. rad. aristol. rot. ʒ. j. rad. peron. ʒ. ss. fol. S. S. S. elect. ʒ. j. sem. cartham. ʒ. vi. agatic. albi ʒ. j. jalap. ʒ. ss. cubebar. cardamom. ana ʒ. j. raspat. lign. salatr. ʒ. ss. sal. tartar. albi ʒ. j. f. l. a. Nodulus. Quod si omisso sale tartari & ceteris ingrati i. poris, species reliquæ infundantur in vino, clarificenturque per manicam Hippocratis & sive saccharo live syrupo aliquod edulcorentur, & aromatizentur & erit Claretum.

℞. Spir. cerasi nigr. lil. convall. primul. veris ana ʒ. j. essent. fl. sal. ess. anthos. ess. lil. convall. ana m ʒ. ss. dosis gutt. 30. vel 40.

℞. Spir. apoplect. ʒ. ss. dosis gutt. 20. vel 30.

℞. Conserv. flor. anthos. conserv. primul. veris, conserv. betonic. conserv. sal. conserv. tunice. conserv. lavendul. ana ʒ. ss. succini præp. ʒ. iij. spec. diamar. spec. diamolch. ana ʒ. j. cum l. q. syrup.



Syrup. flor. tunic. f. l. a. electuatum liquidum. Potest etiam adui spiritus apoplecticus vel loco spir. ol. destillat. appropriata.

℞. Succin. p. p. 3 ij. spec. diamosch. dulc. spec. diamb. ana ʒ. i. ext. et. sal. 3ʒ. c. f. q. aq. apoplect. opt. f. l. a. ext. et.

℞. Conserv. flor. anthos, conserv. lavendul. conserv. sal. conserv. calendul. conserv. tunic. conserv. primul. veris ana 3 ij. cubeb. cardamom. ana ʒij. nuc. indic. condit. ʒij. c. l. q. sacchar. in aq. apoplect. sol. f. l. a. mortui. Pro ditioribus adpergi possunt ess. ambra.

℞. Spir. apoplect. ʒʒ. tinctur. fl. tunic. tinct. fl. poron. ana ʒj. m. dotis gutt. 30. vel 40. Commendatur etiam tal. vol. sanguin. hum. in spir. appropri. dissolutus, it. spir. cerebr. human. tunc. & simil. affut. spir. vitriol. destill. & sapius super cranio humano cohibetur, donec sal. vol. evchar.

Clarenium corroborans.

℞. Flor. aneth. fl. lavendul. fl. sal. fl. primul. veris, fl. tunic. fl. betonic. fl. calendul. ana p. ij. rad. aristol. rotund. rad. irid. florent. ana ʒj. ras. lign. sassafr. ʒi ʒ. visc. quercin. ʒʒ. n. m. nu. ʒij. cinamom. call. lign. ana ʒij. cardamom. cubeb. ana ʒi ʒ. Infund. in l. q. vini Rhenan. opt. per biduum in loco calido postea coletur per manicam Hippocratis & edulcoretur saccharo.

Externa.

℞. Flor. chamomill. Roman. p. ij. lavend. fl. primul. veris fl. thæcad. Arabic. ana p. ij. fol. laur. meliss. puleg. ana p. ij. succin. ʒij. gum. juniper. ʒi ʒ. benz. styrac. calam. ana ʒj. n. m. ʒij. ras. lign. Rhod. ʒij. incis. d. ad chartam. Post sunt ejusmodi species adpergi spir. lil. convall. rosar. vel ol. destill. appropri. & pro ditioribus essent. ambra.

℞. Empl. Vigon. emplastr. de racamahac. emplastr. carum. ana q. s. malaxetur cum balsamo Peruvian. Induc. super alutam, & obduc. syndone rubro in forma orbis medii.

℞. Ung. nervin. Aug. ʒj. balsam. Peruvian. ʒij. ol. stillat. rosismar. ol. stillat. sal. ol. stillat. rut. magur. vj. m. pro principio nervorum.

℞. Aq. artic. ad ext. sp. lumb. rectestr. aq. apoplect. opt. ana ʒij. m.

℞. Ol. irim. ol. nicotian. ana ʒj. ol. stillat. majoran. g. vj. m. pro educenda puita e naso. It. tumida ex rad. iridis nostratis.

℞. Pulv. lil. convall. ʒi ʒ. c. f. q. ol. nicotian. & ol. n. m. exprell. f. l. a. linimentum pro naribus illinendis. It. succus betæ, rad. cyclam. ex quibus turunda cum hilo parati debent.

℞. Succ. betæ, succ. anagallid. majoran. ana ʒʒ. m. ex vola manus atrahend.

℞. Herb. majoran. herb. puleg. anagallid. ana m. j. sem. nigell. ʒij. fol. S. S. S. elect. ʒi ʒ. agaric. albill. ʒij. coq. in l. q. aq. commun. col.

℞. ʒij. m. Adhibetur ut succus præcedens.

℞. Ferment. acerrimi ʒij. pulv. cauthar. ʒj. euphorb. gr. vj. m. f. l. a. cataplasma. Commendatur etiam fonticuli, frictiones, & sinapismi. Ess. lign. præmissis universalibus ad ʒj. singulis diebus bis: vel infus. lignorum c. aq. appropriatis: Infusum præcipue lign. sassafr. Mynsicht. Pro exsiccatione quoque conveniunt species diabalaust. si capiti adpergantur. Item pulveres peptici post cibum sumi. Vesicatoria ex ranunculo ardente maculis nigris, plantag. aquat. flammula Jovis,

cantharidibus, fermento, sinapi &c. *Joan. Michae-  
lis Prax. clinic. general.*

Apoplexia si aliquem cum amissione pulsus & respirationis invadit, raro; his autem salvis adhuc existentibus, difficulter, & magno labore curatur. Si igitur Patiens tali modo prosternitur, tunc pluma aut speculum ori & naribus, ad explorandum vitæ spiritum admovetur, et si non nato insufflatur, aut fumus ex in censo sulphure per infundibulum immittitur, patiens hinc inde movetur, pectus denudatur, vena aperitur, vomitus oleo & aq. tepida excitatur, spina dorsi deorlum linimentis calidis fricatur, lamina ignita cervici & collo propius admovetur, capilli capitis detonduntur, ac gallina nigra vivens in medio dissecta capiti calide superligatur, postea abratum caput oleo aut linimento aliquo calefaciente & siccanie inungitur, os aperitur, ac spiritus cerasor. nigrosum, vel aqua apoplectica infunditur ac propinatur. Et si deinceps iterum ad se rediit tunc humor peccans per appropriatum medicamentum catharticum per os sumptum (vel si æger valde debilis, per clysterem) derivatur & evacuat. Ubi præ cæteris usus rhabbari, tam ad præventionem, quam curationem, quemadmodum in aliis, ira præprimis in hoc morbo, commendatur. Quin etiam cerebrum & pars mandans, per medicamenta convenientia roboratur.

Ad præventionem quotidianus Rhabbar. usus, vel in forma pulveris vel rotularum ʒj. pondere continuatus, aquæ cephalicæ, Tabulæ, Pulveres, Balsami apoplectici & cephalici, fonticuli, purgationes, venæ-sectiones, scarificationes, sudorifera &c. Sed omnia pro dispositione caularum, ætatis, temperamenti, &c. conferunt. Utiles etiam sunt rotulæ sequentes.

℞. Spec. diamb. compl. diamosch. dulc. ana ʒj. sacchar. albill. in aq. borrag. dissol. ʒij. ol. anis. destill. g. ij. m. & f. l. a. conf. in rotulis. vel.

℞. Sacchar. in aq. ros. solut. ʒij. amb. gryf. gr. iv. ol. anis. still. gutt. ij. m. & f. confect. in rotulis. vel.

℞. Spec. diamosch. dulc. diamb. ana ʒj. succin. albill. ʒj. ol. anis. g. ij. sacchar. in aq. lavendul. dissolv. ʒij. & f. orbiculi. Aut,

℞. Specier. diamb. compl. ʒi ʒ. ol. succin. g. vj. ol. carui ʒʒ. sacchar. albill. in aq. sal. solut. unc. ij. m. f. l. a. Rotulæ. De his rotulis singulis septimanis ter vel quater aliquot assumi possunt. Dimidia quoque pars nucis molchatae masticata & comesta, proficit. Simili ratione spiritus cerasorum nigrosum, tam ad præventionem quam ad curationem, magnatum est virium præsentim, si in libris ejus duabus species. diamb. compl. ʒj. in syndone suspendatur. De hoc manè jejunio stomacho, aut ventriculo existente frigido, etiam vespere, singulis hebdomadibus bis vel ter repetendo, cochleare unum assumitur, aut guttæ duæ vel 3. vertici capitis instillantur.

Pari modo etiam sequens pulvis ad præventionem apoplexiæ summè commendatur.

℞. Rad. Sefel. Cret. ʒj. sem. eruc. cardamom. piper. alb. ana ʒij. m. f. pulvis subtiliss. sæpius ʒʒ. vel ʒj. quantitate in vino vel juleculo sumendus.

Vel ℞. Succin. alb. pulv. ʒij. specier. diamb. ʒj. sem. carui ʒ sem. m. & f. pulv. subz. Dosis, quantum cuspidibus caleri capi potest, singulis men-



mentibus proxima die post novilunium. Nec minus semina erucæ & carui, æquali pondere mixta, pro certo & infallibili remeio præservativo prædicantur si singulis mentibus quater in vino albo vel brodio carnis deglutiantur. Et notum est, dicta etiam semina in affectibus pectoris & asthma re omnibus aliis remediis prævalere, ut D. Schorer in Tractatu suo Germanico de apoplexia adstipulat. Nec verò sufficit ut materia peccans solummodo evacuetur, cerebrumque cum capite confortetur, sed modice etiam exsiccantia requiruntur, qualia sunt, Pilulæ sine cura, de succino Cratonis, de Cynoglossa, quibus spec. diambri, compl. extract. lign. aloës, moschus & ambra addi, ac de iis una vel altera septimana grana viginti degluti possunt.

Ad præventionem etiam Pulvis sternutatorius ex majoran. subtiliss. pulveris. 3j. & balsam. apoplect. opt. gr. iij. invicem mixt. paratus, utiliter adhibetur. Apud Pauperes phlegmaticos Nicotiana non sine fructu accendenda & potanda conceditur. Pro ditioribus species Diatabaci, gratum odorem spirantes, parari possunt.

℞. Tabaci commun. (non imbuti) unc. iv. majoran. unc. sem. Rosmarin. flor. ros. rubr. fl. spic. hortens. cubeb. ana 3ij. nuc. mosch. 3j. sem. anis. 3ij. caryophyll. 3j. styrac. calamit. expr. mastich. ana 3ij. m. gross. mod. incis. d. in scatula. Sacculus quoque sequens in metu apoplexiæ aut catarrhi suffocativi optimum remedium est.

℞. Pulv. succin. alb. 3ij. inde lindoni albo vel rubro, & fiat sacculus oblongus interspassatus.

Hinc ℞. Pulv. piperis longi 3j. inde vitro angustiorifici, superfundendo spir. vin. opt. rect. f. unc. iij. ol. succin. gr. vii. stent bene cooperta ac clausa in loco calido. Quoties dein le neccissitas postulat, sacculus prædictus cum hoc spiritu præparato humectetur, & capiti, vertici, utriusque sagittali secundum longitudinem versus sursum coronalem & faciem superligatur, ne decidat. Theriac Pollenses in affectibus, si ex consilio Medici secundum rationem adhibentur, ut experietur, proficua, & salutes prædicantur.

Ad hæc, diæta quoque, & 6. rerum non naturalium accurata est habenda ratio, ne in his peccetur, & sic damnum aliquod causetur.

Apud cholericos & sanguineos hæc præcipue signa apoplexiam præcedunt: tunc adhuc corpore facies est rosacea & rubicunda, frons & vix oculorum turgent, ad vertiginem sunt proni, memoria est habilis, facile inebriantur, ac contestim, antequam alii animadvertunt, prosternuntur. Et hæc apoplexia omnium est periculosissima. Et quia ita dispositi sunt, vere & autumnio per usum rhabarbari, aut syrup. ros. sol. autem expurgentur, ceterisque temporibus, nec semel duntaxat in anno, sed sæpius largiorem sanguinem, & quidem cruciatim mittant, & scarificent, ac bonam diætam observent. Ponticuli in hoc passu aut cum discrimine parentur, aut planè mittantur. Acidulæ quoque, propter refrigerationem sanguinis, & obstructionum resolutionem sunt proficua. Cholericis etiam supradictis aquas calidiores apoplecticas fugiant, & huius loco trochiscos diambri assumant. Morbus attonitus si magnus fuerit, vix sanatur, unde remedia non sunt adhibenda, cum natura sponte exitialis sit: Debilis autem difficulter curatur. Si autem, qui periculum mortis effugiunt, plerumque in diuturnum morbum,

paralyfin nimirum aliquantum partium incidunt. Subinde etiam totius corporis, aut memoriæ jaçturam faciunt. In omnibus nervosi generis frigidis affectibus febris superveniens adiumento est Gal. 1. Protheticor. aphor. 30. Hinc Practici jubent alternis diebus (ut inter hos uno die quiescat) exhibere 3j. Michriacii, in aqua sal. vel lavendul. ad excitandum nativum calorem, ut deinceps noxios edomare, & resolvendo eliminare possit humores. Si apoplexia sit fortissima, & fortiter sternutamentum provocanti us non sternuter, neque impressionem sentiat lethale.

Methodus curandi apoplexiam Practica huc plerumque spectat. i. clyster. Donec autem sit paratus, substituat suppositorium seq.

℞. Mell. coct. & conciet. unc. sem. pulv. euphorb. 3 sem. colocynthid. gr. iv. helleb. alb. gr. ij. sal. 3 sem. m. & form. gi. n. d. Clyster. autem seq. paratur modo.

℞. Rad. angelic. 3vj. sal. rut. mercurial. betton. hyssop. ana m. j. flor. rhœad. cent. min. ana p. j. sem. anis. urtic. cumin. fœnicul. laur. ana unc. sem. agaric. alb. & lev. 3 sem. colocynthid. 3ij sem. f. decoct. in l. q. iij. ad lb i c. Colatur. ad de hier. logad. diacolo. ynthid. ana 3i sem. benedict. laxat. diambri. cum rhab. ana unc. sem. opoponac. 3ij. mell. ros. unc. ij. ol. de castor. laur. ana unc. i sem. sal. 3ij. sem. f. enema, quo paulatim per intervalia vacuabimus humores a toto corpore, donec Pharmacum solutivum per os sumere poterit, N. B. Si summum periculum non imminet, mittatur colocynth. & hiera discolocynth. Testia vero vice alligatum injiciatur enema.

A i cause antecedentis imminutionem sequentes in unum veniunt Pilulæ.

℞. Mass. pil. de euphorb. fœrid. coch. ana 3j. sem. castor. 3 sem. Diagryd. corr. gr. vj. f. cum aq. ceras. nigr. Pil. Aur.

℞. M. Pil. sine quibus 3ij. Panchym. Crollsi 3j. gurt. gamandr. gr. v. f. pilul. communes, asperg. pulv. cubeb. & hæc pil. singulis septimanis repetantur. Hoc pacto, & si corpus sit plethoricum, conducibilis est ventisectio cephalicæ in parte sana, vel opposito latere, in signo Pilicium vel Aquarii. Ligaturæ quin etiam fiant sortes & dolorificæ axillatum & extremarum corporis partium. Affigantur cucurbitæ magnæ cum multa flamma ad scapulas, & una mediocris ad commissuram (cucurbitula ad ignem calefacta, verti. i. ad movenda) sagittalem. Profunt quoque frictions palati & colatorii cum castoreo dissoluto in aceto squillitico, aut cum Theriaca veteri. Frictiones item totius corporis, & præsertim colli, qua parte veit sunt & arteriæ. Nec minus commendantur punctiones & pilorum evulsiones. Ut & inunctiones totius corporis cum oleis calidis castorei, spicæ, laurino.

Externè, ad corroborationem nervorum, & dissipationem humorum influxorum applicetur Principio nervorum atque cervici, versus ægram regionem sequens emplastrum.

℞. Empl. de bacc. laur. nervin. ana unc. j. sem. euphorb. rad. pyrethr. sem. sinap ana 3j. cum ol. philosophor. seu de lateribus q. f. f. l. a. Emplastrum. Aur. si nullus p. n. calor in affecto membro observatur.

℞. Ol. laterin. & stercor. columbin. ana unc. j. sem



sem. sem. eruc. nasturt. ana 3 ij. m. & applica. Aut,  
℞. Ol. rutac. nardin. ana 3 i β. ol. destill. e  
bacc. juniper. 3 iij. Pulv. castor. 3j. euphorb. 3β.  
cer. q. f. f. linimentum. Aut,

℞. Ol. lil. alb. 3 ij. castor. 3β. euphorb. 3 ij.  
ol. nardin. 3 iij. f. unguentum pro capite raso,  
ervice, & spina dorsi. Interiora narium ungan-  
tur balsamo apoplect. rutaceo, ol. nardino rura-  
ceoque, in quibus aliquid castorei, nucisque  
moscharum dissolutum sit. Observandæ etiam 6.  
res non naturales, ne in his peccetur, quæ om-  
nes, ad caliditatem inclinent. Potus sit decoctum  
ligni sassafras & guajaci, addito cinamom. pro  
potu ordinario. per se, aut cum vino mixtum. Vel

℞. Scob. lign. guajac. sassafr. ana 3 ij. cinnam.  
acerr. 3 ij. baccar. juniper. 3 iij. sem. anis. fœni-  
cul. coriandr. præp. ana 3β. m. & f. decoctum in  
3. aut 4. mensur. aq. fontan. Ad obstructionis ner-  
vorum resolutionem & resolutionem egregie ju-  
vat oleum succini albi, aut spir. tart. de die tertia  
vice 3 j. pondere in brodio carnis, aut aq. ceral.  
nigr. sumendus. Capiti abrafo emplastra, olea &  
unguenta, appropriata, applicentur. Thermae,  
praesertim ferinae non procul ab oppido Kalvus,  
Badenses, piperinae, & aliae his similes proluunt.  
In defectu verò harum substituantur artificiales:  
Ut,

℞. Herb. menth. thym. puleg. hyssop. origan.  
sac. meliss. serpill. rosmar. sal. hyperic. lavendul.  
majoran. anam. j. flor. chamomill. sambuc. spic.  
stœcad. rosar. rubr. melilot. ana m. β. scob. lign.  
juniper. 1b ij. guajac. 1b j. rad. pyrethr. ebul. ana  
3 ij. baccar. laur. 3 iij. juniper. 3 iv. sal. 1b j. sul-  
ph. viv. 1b ij. sal. nitr. 1b β. vitriol. crud. 1b j. Om-  
nia hæc gross. mod. contul. & concis. d. ad char-  
tam. In Balneo, & alias quotidiè potest loco præ-  
servationis, corroboracionis, & curationis ore  
sequens quantitate avellanae sumi electuarium.

℞. Conserv. flor. anthos, primul. veris, beto-  
nic. sal. ana 3 ij. spec. diamb. compl. diamosch.  
dulc. ana 3β. diaphir. elect. de gemmis ana 3 j.  
succin. alb. præp. 3β. theriac. andromach. 3j. con-  
fect. alkerm. compl. 3β. corr. ciet. condit. 3j. nuc.  
moschar. cond. num. i. cum symp. de stœcad. f.  
electuar. molle d. ad ollam.

Finito Balneo, super carbonibus ardentibus ca-  
lesfactis & suffumigatis lineamentis deorsum  
corpus abstergetur & fricetur sequenti suffumi-  
gio.

℞. Mastich. succin. ana 3β. baccar. juniper.  
crassiusculè contul. 3iβ. m. & adhibe. Aut.

℞. Thur. mastich. sandarac. ana 3 β. succin.  
storac. calamit. ass. dulc. ana 3 ij. caryophyll. 3 j.  
flor. rosar. anthos ana 3β. m. gross. mod. d. ad sca-  
tulam.

His quoque medicamentis annumerari possunt  
Fomenta, quorum paratio tali modo fit.

℞. Scob. lign. juniper. bacc. juniper. ana m. iij.  
ebul. sal. origan. puleg. hyssop. sisymb. domest.  
balsamitz. thymi. flor. sambuc. rosmarin. ana m.  
3j. coq. in aq. & vino an. part. æq. fiatque fomen-  
tatio artuum & corporis.

Si placet sacculum vino madidum calentem ar-  
tibus superponere, para sequenti modo.

℞. Bacc. juniper. laur. ana m. j. rosmarin.  
melilot. ros. rubr. fursur. ana 3 j. rad. ircos Flo-  
rent. 3 ij. sal. m. j. indatur sacculo & adhibeatur.  
Post universalia adhibeantur sternutatoria quæ  
passim nota sunt. Inprimis verò excellentissimus

est hic pulvis.

℞. Herb. anthos, majoran. 3 ij. sem. nigell.  
3j. rad. helleb. alb. 3β. mosch. gr. v. ambr. gr. iij.  
ol. lign. rhod. gutt. v. majoran. cinamom. ana  
gutt. iij. caryophyll. g. ij. ballam. apoplect. opt.  
3β. misce.

Aquæ confortantes & præservantes contra apo-  
plexiam speciales.

℞. Aq. hyrind. cum castoreo, epil. lang. ana  
3 j. fl. anthos, cerasor. nigr. borrag. ana 3β. cin-  
nam. stillar. 3 ij. elix. vit. Matthiol. 3j. confect.  
Alk. compl. 3β. lapid. bezoard. or. gr. v. mag-  
perl. or. gr. iij. man. chr. perlat. 3 iij. theriac. an-  
drom. 3 β. misce.

Hoc in malo castoreum magnatum est virium.  
Utiles quoque sunt ad hunc effectum spiritus &  
aquæ apoplecticæ, passim in officinis & manibus  
doctissimorum virorum præstantes. In casu neces-  
sitatis potest de sequenti cochleare unum & alto-  
rum allumini.

℞. Spir. ceras. nigr. fl. anthos, cephalic. An-  
halt. ana 3 β. juniper. 3 ij. lign. guajac. lil. con-  
vall. ana 3 j. elix. vit. Matthiol. aq. cinamom. stil-  
lar. ana 3β. m. d. ad virtum, & indatur nodulus ex  
spec. diamb. compl. 3β. & diamosch. dulc. 3j.  
paratus. Cui in usu ad quodvis cochleare sumen-  
dum addi possunt ol. succin. alt. gutt. v. Alternis die-  
bus quoque conducibile est exhibere patienti 3j.  
mithridat. aut theriac. in aq. lavendul. vel salvia.  
Eberhard. Gockelium consil. 28.

Alia sunt in paroxysmo tentanda, alia extra pa-  
roxysmum ad apoplexiæ præcautionem exhi-  
benda:

Quidquid movendum, statim move; & quod  
vis facere fac citò: In talibus enim tardare ma-  
lum:

*Tu propea nec rem venturam differ in hora.*

*Qui non est hodie, cras minus aptus eris.*

Agris pessimè agitur dum suspensâ manu Me-  
dici minus valida medicamenta importuno metu  
perculsi exhibeant, cum extrema remedia adhibe-  
re expediat.

Sanguinem in plethoricis liberâ manu mitte: ve-  
sicatoria nuchæ, brachiis, pone aures, imò toti ver-  
tici applicato. Quæcantur folia asari viridia, quæ  
leviter trita indantur naribus: Interim ex eorum  
pulveris 3 ij. pulv. rad. cyclam. 3iv. & 3j. rad. hel-  
leb. alb. f. pulvis subtilissimus per calamus nari-  
bus insufflatus.

Liquamine sequenti illinatur palatum laxissime  
fricando.

℞. Anacard. rad. pyrethr. & staphisagr. ana  
3ij. granor. paradif. cardamom. major. ana 3 iij.  
caplici live piperis Indici 3 j. hellebor. alb. 3iv.  
bulliant simul in vini alb. 1b β. ad medias, fiat  
expressio, quæ cum æqua portione mellis antho-  
lati redacta ad mellaginem reddatur acidula sp. vi-  
trioli antiepileptico, addendo salis succini volati-  
lis 3β. m. pro litu.

Emeticum sequens exhibeatur. ℞. aq. ceta-  
sor. nigr. 3iij. syrup. flor. pzon. 3j. gillæ Theo-  
phrastii 3j. vel 3iv. t. potio. Si hæc minor æquo  
videatur, optimum in apoplexia vomitorium est  
oleum antimonii, cujus gutt. x. vel xii. dentur ex  
optimo vini spiritu. Cita & tercia est ejus operatio;  
multos hujus ope excitavi.

Ad apoplexiam præcavendam caput per sedem  
purgantia frequenter sint in usu (qualia in cap. de  
epilepsia & vertigine præscripta sunt) emetica  
item



item temporibus idoneis exhibita plurimum profunt. *Emetella* in nucha, vel *serum* communis sunt in usu. Videntur omnia quæ caput nimis tentant, quia sunt vinorum generosiorum liberalior ingurgitatio, tabaci per tubum improba fumatio, Venetis usus nimius &c. In plethoricis sanguis sæpè mittendus è brachio vel hæmorrhoides aperiendæ. Caput denique roborandum est specificis cephalicis calidioribus, qualia in *Epilepsia* & *Vertigine* videre est. *Theod. Mayerp. in Praxi.*

### Consultationes.

#### Apoplexia in Paralyfim terminata.

Nob. Senex sexagenarium annum agens, temperamentum secundum totum & caput, calidum & humidum, boni habitus, ad plethoriam vergentis, comestationibus & comotationibus affectus; tribus ab hinc annis vertiginibus corripitur, à quibus sanguinis missione & purgatione liber evadit. Sed quoniam ad pristinum vivendi modum revertitur est: cum varietate vinorum meraciorum deleatur, & copiose bibat aliquot ab hinc mensibus vertigines rursus & frequenter Nob. tenem molestantur; quibus accesserunt quoque tremor in manibus, infusa delatio in somnum, imò & somni solito profundiores atque longiores: atque tandem usque sine hyemis, dum decumbebat in lecto, summo mane extemporanea succedit sensus & motus privatio, cum omnium principum operationum abolitione, necnon iniqua respirationis latione & mediocri stertore. Accessit autem Medicus sibi domesticus multa præstitit medica præsidia, nimirum acia supposita oria; mox repetita sanguinis missione ex orachio, vesicantia quatuor apponi iussit; Quibus adhibitis, requies non deventi a somno expergetactus, aditantes cognoscere & impertectè loqui coepit, brachio sinistro sine motu & sensu in mente, cum oris tortura, labiis ad partem dexteram laxatis. Et quoniam de novo hujus accidentis recusu, non sine ratione timet excellentiss. Medicus Assistent; ideo ad te, vir præstantissime, contugunt coniunguntur, ut motus & sensus paralyticæ partis, si possibile fuerit, restitua ut, & novi prævertantur insultus.

Subitanæ privationem sensus & motus cum principum omnium operationum animalium abolitione & respirationis latione, quæ contingit Nobili seni, apoplexiæ appellandam esse docebat Galenus, quam syderationem vocabat Hippocrates, & Paulus, in qua semper læditur respirationis, parum in debilissima, magis in debili, & maxime in forti apoplexia, ita ut ejusdem gradus, ut placuit Galeno cum Hippocr. a latione respirationis desumi soleant. Quod si jam dicta privatio cum omnimoda apnoea contingeret, non amplius apoplexiæ, sed carinomen teneretur. Hanc prænotant vertigines, quibus tribus ab hinc annis obnoxius fuit, quas proximas esse comitialibus & apoplexiis pronuntiavit Galenus. Sicut enim in vertigine spiritus animales inordinate moventur, ita ut recta via ad organa visus & motus deterrui nequeant sicque Patientes procidant: ita in apoplexia impeditur omnino irradiatio spirituum propter obstructionem, sicque concidunt una cum sensu & motu ceteræ omnes functiones

principes: Quam obstructionem non tantum in ventriculis reperiri, sed multo magis in valis, nimirum in arteriis per cerebrum dispersis, censendum esse iudico, dum sanguis aeris & calidus crassior factus stagnat in valis & spiritibus transitum intercipit, unde sensus, motus & omnium functionum animalium privatio. Servatur autem respiratio, quamvis læta, ob vitæ necessitatem, non ut Avetioes, quia sit motus ex naturali & animali compositus. Obstructio autem in casu nostro, non à solo sanguine calido & crasso, sed etiam à viscido & lento commisto facta fuit, cum solutam apoplexiæ sinistram partem Paralytis subsecuta fuerit, facta nimirum metastasi à cerebro per nervos ad colli vertebrae, si. que vox vitata fuit; præterea mediante cerebro pari ad labia sinistram partem, unde oris tortura in dextram partem, laxatis nimirum sinistram partem musculis: licet per septimam nervorum conjugationem linguæ motus semper fuit; atque tandem ad quintam, quæ vertebrae deposita crassiori materia, brachium motu & sensu privatum fuit. Nec mirum genuinam hanc materiam in sanguine collectamuisse, cum a potibus meracioribus caliditas & acrimonia: à copioso vini potu, triguitas & visciditas provenire soleant, ut considerabat Galenus, dicens, *Ubi vinum plus bibitur, quam vinci possit, tantum abest ut calefaciat, ut potius frigida vitia gignat;* & ideo præcesserunt quoque tremores, debilitatio nempe a meri potu nervoto genere: sicut à redundante in capite pituitoso sanguine, somni profundiores & longiores aut casum observari fuerit.

Affectus iste est semper peracutus, quicquid dicant aliqui, dividentes apoplexiæ in calidam & frigidam: citò namque utraque solvitur: calida enim insensibiliter solvitur ad salutem: fortis terminatur ad mortem; frigida ante septimam vel occidit Patientem, vel in Paralyfim degenerat. Et quoniam propter pravam apparatus in sanguine, & imbecillitatem in capite contractam, recidivare solet huiusmodi affectus, ideo exacta Medici assistentia hic opus est, ne revertatur apoplexia, & ut interim à Paralyfi libere ut.

In quem finem materia in venis existens, licet verè non turgeat, ut turgens tamen tractanda est; & id non expectata perfecta coctione & præparatione, aliquo Purgante, statim a capite evacuada & educenda; deinde reliquum peccans materia præparandum, & epioracice evacuandum: mox ad topica paralyticæ parti deveniendum, & caput cum toto nervoso genere roborandum.

Et sicut in actuali apoplexia, post acia suppositoria apertissime & cum evidenti utilitate missus fuit sanguis, ita si rursus ingrueret talis accessio (quam Deus avertat) rursus vena illa brachii aperienda esset, ita docente Galeno cui subscribunt ceteri Medicinæ principes: Aetius quidem dicens, *Aequale adjutorium, utpote morbo magno, remedium in gremio est sanguinis missio:* Paulus, *Sicutari possit, statim sanguis detrahendus, & si confert, sequenti die iterandum:* Aetius jubet ineptis venæ-sectioni cucurbitulas admovendas esse; imò magnam occipiti post venæ-sectionem commendat quoque Paulus. Contert autem sanguinis missio, quoniam affectus, non à sola friguitate, sed etiam à crasso & calido sanguine ita gnante procedit; & ideo Aetius à sanguinis



missione excipit apoplexiam cum multa frigiditate & torpore invadentem; & propterea à quibusdam exapitur Celsus, dum ait, quod *sanguis detrahitur, aut occidit aut liberat*: occidit enim, si tantum ab humore crudo & frigido facta fuerit: liberat vero, si à calido; in priori igitur abstinendum à sanguinis missione: sicut in posteriori administranda & iteranda. Clysteres acres proponuntur à Medicinæ principibus, sed non adeo facile injici, recipi & retineri possunt. Vesicantia quoque passim usurpantur, præsertim scapulis appolita, & tertium candens occipiti admotum. Cervicem quoque & mentum calefacit Aretæus, pro frigidi humoris attenuatione & discussione. Quibus omnibus addamus nos purgans medicamentum ab alto trahens omni industria per os infundendum esse, ex trochiscis aliandæ, diagrydio & castoreo paratum. Et hæc obiter pro curatione apoplexiæ dicta sufficiant. Ad præsentis Paralytis itaque curam revertamur. Et quoniam jam primæ viæ expiatae fuerit, Præparans ita instituendum erit.

℞. Oxy mel. simpl. syrup. de betonic. ana ʒ ij. decoct. cichor. borrag. agrim. saliv. ʒ iv. m. pro syrupo & sic aliis usque ad decimum quintum: sed quinto quoque die prebeatur minorativum huiusmodi.

℞. Pil. de hiera cum agarie. de tribus cum rhubarb. ana ʒ ij. masticiarum ʒ j. m. reform. pilulæ summo manè exhibendæ. Dum hæc omnia sunt, paralyticæ parti frictiones quotidianæ sunt exarandæ, cucurbitulæ admovendæ, atque tandem rubificantiæ apponendæ, præsertim post validiora purgantia exhibita: & erunt pilulæ de nitro Alexandri, cochix præparatæ cum helleboro, de hermodactylis, aggregativæ, quarum dosis erit ad ʒ i ss. circa noctis dimidium assumendæ, & bis aut ter repetendæ, dum diebus intermediis validiora Præparantia præscribenda erunt, ut

℞. Oxm. compos. syrup. de iya, de beton. compos. ana ʒ ss. decoct. cichor. betonic. herb. paralyt. hyssop. majoran. ana ʒ iv. m. pro syrupo. & sic pro aliis. Nec omittenda topica aliis partibus affectis: sic spinali medullæ circa quintam vertebra inunctio ita instituenda erit.

℞. Olei vulpini, viperini ana ʒ ss. ol. succini ʒ j. m. pro inunctione spinæ cui præmittantur frictiones factæ cum squilla per medium dissecta. Faciei quoque sinistra pars resoluta quinta essentia rosismarini erit illinienda: sed hoc tempore pro capitis expurgatione, erithinum manè attrahendum ita parabitur.

℞. Pulveris tabaci Indici ʒ ij. majoran. iteos ana ʒ j. m. f. pulvis per nases attrahendus, & ad linguæ motum restituendum, pro oris collutione patetur multa cum aqua salivæ, addendo aquæ vitæ juniperinæ exiguam portionem. Patiter in ore detineat frustulum nucis moschatæ, aut legitimi cinnamom. aut caryophyll. integr. tandem caput & nervosum genus roborantia erunt in usum ducenda, ut conservæ capitales sub ingressum lecti ex florib. rosismar. saliv. betonic. additis speciebus aromatici rosari.

Statim à prandio sumatur acorus conditus: m. ne aliquod cochlear aquæ vitæ, bacis juniperi, cinnamom. & caryophyllis alteratæ. Vinum pro mensa medicarum reddatur visco quercino & salsafias. Quibus jam dictis omnibus Nobilem senem sanitati restitui posse sperandum; Quod si fortasse non

ex voto succedat, sudorificum decoctum erit addendum, ex ligno guajaco, taltâ, visco querc. & salsafias, in aqua stillat. cichorii, betonicæ, iya, parandum, cui præmitti poterit pulvis viperinus.

Congrua interim vivendi ratio præscribenda erit, & præsertim in ulu potus: etenim & quantitas & qualitas vini, necnon bibendi tempus moderatione indigebunt. Victus autem sit attenuans, & præsertim ex avibus terrestribus: & valde prædesse poterunt pulli, carne viperina & ejus decoctione nutriti ut considerabat Avenzoar. Cætera viro Doctissimo præscribenda relinquo. *Raymund. Jo. Forst. consult. tom. 11.*

Pallor ataxis consistentis, affectioni hypochondriacæ aliis obnoxius, tempore hyemali, inter concionandum irâ accensus, primò horrore, post vertigine correptus, obmutescit, omnes tam interni quàm externi abolerentur sensus, corrumpit, ira ut cum de suggestu deportare necesse haberent auditores, stertebat cum respiratione difficili, pulsu parvò & inordinatò, facies rubebat &c. Intra horæ fere spatium adhibitis infra dicendis internis & externis medicamentis, ad se redire cepit, linguæ immobilitate, totiusque corporis imbecillitate remanentibus, quæ tamen continuatione medicamentorum brevi quoque cessant.

Omnibus & singulis, quorum in propolæ casus historia mentio sit, benè probèque peripetia signis, facillè quilibet judicabit, ægrum nostrum cò correptum fuisse affectu, quem apoplexiam vocamus, *ἡ ἀπὸ πλῆθους*, quod fortiter & graviter percutere significat, ductâ similitudine ab animalibus ad aram uno ictu cornuentibus. Ulteriorem qui desiderat etymologiam & synonymiam, practicos aliosque adeat auctores, fusi hæc ipsa pertractantes.

Sumitur verò apoplexiæ vocabulum dupliciter. (1) Generaliter, Paralytin, stuporem, obstupescentiam &c. includens vid. Hippocr. sect. 7. aphor. 40. (2) Specialiter & in propria significatione. Estque subitanea sensuum & moris abolitio, remanentibus respiratione difficili, interdum nullâ & pulsu inordinato, ex p. n. spir. animalium stagnatione live statione proveniens: alii definiunt, quod sit mentis consternatio cum sensuum externorum & motus abolitio. *Lindano* est hæmorrhagia in capite.

Symptoma ergo est, & quidem actionis abolitæ: de parte affecta in seqq. dicetur.

Exactius verò ut calleamus *generationem & naturam* hujus affectus, inquiramus parùm in ejusdem causâ, rem planè perplexissimâ, de qua diversissimis & intricatis sententiis multum pugnat: sed posthabitis litigationibus istis, portionibus quorundam auctorum breviter, pro ratione instituti, recitatis opinionibus, mea quæ sit, paucissimis subjiciam.

Sunt itaque qui statunt, ex obstructione principii nervorum in basi calvariæ apoplexiam generari, ita *Galenus*, *Paulus Aegineta*, & qui eos sequuntur alii. Sed quid obstructio illa incommodabit functionibus principibus, cum cerebrum cæteroquin sit illatum, imò cum nervi manifesta destituantur cavitare, humor viscidus eos intrare, obstructionemque causari non poterit.

Alii oriri eam exillimant ex compressione principii nervorum, verum & hæc opinio antedictam patitur



patitur instantiam, quod nempe functiones principes hæcenus non læderentur.

*Alii* intemperiei cerebri frigidæ causam apoplexiæ tribuentes, si considerarent nudam intemperiem, quæ lunum gradum non in instanti, sed successivè adipiscitur, non tam citò actiones omnes tollere neque tam subito corrigi posse, convenientibus enim adhibitis remediis, citò interdum affectus hic desinit, hæc, inquam, si paulò accuratius expendere, brevi tux valedicerent opinioni.

Obstructionem ventriculorum cerebri ab humore viscido & crasso ortam, *alii* accusant; verum experientiâ anatomica constat, in ventriculis cerebri variorum apoplexiâ extinctorum nihil repperitum, eoque ab humoribus ejusmodi protus immunis fuisse, de quo videatur *Fernelius lib. 2. de abditis rerum causis*. Ulteriùs hanc opinionem redarguit hydrocephalo laborantium insignis & maxima cerebri cavitarum ab humore repletio, nihil interea peritumque apoplectici sentientium.

*Fernelius* causam in compressione arteriarum, plexum retiformem, seu rete mirabile constitutum, rejicit, experientiâque hanc tuam itabilire conatur sententiam. Sed quicquid sit, licet concedam, interdum obstrui vel comprimì posse hæc vasa, cerebrum tamen omni debitoque pro conficiendis spir. animalibus sanguine minimè defraudatur, cum alia adhuc superline vasa sanguinem sufficienter advehentia, nempe arteriæ vertebrales.

*Gregorius Nymmanus* apoplexiâ otium trahere ab obstructione torcularis arbitrat, cum tamen ejus officium non sit, sanguinem cerebro afferre, seu potius advehere, ita ut venæ, non arteriæ fungantur officio, insuper ad iller arteria cervicalis, ad illent arteriæ plexum retiformem constituentes, quæ cerebro, sanguinem apportando, sufficienter providerent. Posset igitur & *Nymmanus* concedi, apoplexiâ interdum ex obstructione torcularis oriri, ob impeditam scilicet sanguinis circulationem, verum eò, quò vult *Nymmanus*, modo fieri non credo. Alii dictas observantes difficultates provenire dicunt ex stagnatione sanguinis in vasis sanguinem cerebro adducentibus, cui sententiæ favere videtur *Dn. D. Mezerius in Dissert. Medic. Anom. 3. de flux. & reflux. sang. pag. 29. 30.* Huic sententiæ & ego subscribo, quod scilicet tæpissime inde generetur atrox hoc malum, prout ex seq. patebit. Plures Authorum hic adducere opiniones chartulatum hatum angustia non concedit.

Causam igitur immediatam apoplexiæ posui spir. animal. stagnationem. spir. animalis ad motum & sensus perficiendos in continuo motu & influxu sit necesse est. Ad hoc verò requiritur motor perpetuus & via libera; Horum alterutrum vel unumque, si simul subitoque lædatur, apoplexia præsto est.

Considerabimus itaque prius motorem, ejusq; in hoc affectu vitia, postmodum viam ejusq; obstructionem, aliaque eidem affinia. Quò verò hæc omnia fiant planiora, de generatione, naturâ & motu spir. animalis pauca quædam etunc præmittenda.

Generationem verò spir. animal. modo sequenti fieri, mihi persuadeo: sanguis si per arterias capillares, unicâ saltem tunica dotatas, cerebrum transiit, spirituosæ sanguinis partes cerebri substantiam, corticalem præprimis penetrant, relictis partibus crassioribus aquosis aliisque heterogeneis, haud aliter ac spirit. vini in destillatione transiit spongiam

oleo imbutam.

*Naturam spir. animalis* quod concernit, vini spiritui vel cuicunque alteri simillimum esse arbitror, id quod præter alia generatio modò proposita & restauratio indicant: Consumpti enim ab exhibitio spir. volatili facillè reparantur: Videatur *Timmerman in respons. Med. pag. 20.* statuens, spiritus constare in sale volatili spirituosissimo, illique acidum aversissimum esse: Ubi tamen notandum cum spiritui vini similem non esse prout est in forma liquoris, sed halitus & vaporis, tum enim expansus ac mobilis existit, & quædammodum parva quantitas spir. vini in halitus resoluti totam cucurbitam & alembicum cum vase recipiente in destillatione implet, imò per tenuissimas rimas cum impetu erumpit, ita & spir. animales cerebrum, nervos & musculos subito adimplent.

Eos verò halituosâ formâ suas perficere operationes, ex dicendis elucecet: Cum calidus effususque sanguis cerebro communicatur, tum halitus spirituosus id penetrant inque halituosa forma à calore, tanquam subtilissimi spiritus, conservantur, atque ad partes corporis, expansione & motu per spinalem medullam & nervos deferuntur: Cerebrum enim cum spirituali medulla multis vasis sanguiferis refectum est, nervisque concomitantur, arteriæ, à quatuor calore continuo foventur, facillèque in forma halituosa conservantur. Unde, ut experientia docet, si partes corporis admodum refrigerantur & humectantur, spiritus hi concretunt, (similiter ac spir. vini in alembico impositis linteis madidis) & partes ad motum & sensum redduntur ineptæ & resolvuntur: Hi enim spiritus, cum omnibus corporis partibus sensum & motum largiri debeant, motu latius celeri præditi sint necesse est, quo voluntatis in motu potens ac celerissimum exequantur arbitrium, sentationesque externas citissime ad cerebrum deferant: Spir. volatilis, si expansus ad hæc omnia aptior erit, tum enim citò & facillè transire nervos, expandere musculos, & resiliere in sentatione poterit, quæ à coagulato simili modo peritici nequeunt.

*Modum autem motus hujus* talis est: Halitus isti spir. volatilis, si in cerebro dispersi & expansi sunt, propelluntur non tantum expansione, sed & cerebri motu per spinalem medullam, ceterosque nervos ad omnes corporis partes. Ad motum verò hunc propria facultate edendum cerebrum ineptum esse, fabrica ejus satis superque testatur. Meningibus motum cerebri qui attribuit, experientiâ refutantur, ablata enim magnâ cranii parte & ipsis meningibus, motum tamen cerebri observavit *Riolanus in ovo*. Motus enim ille qui in cerebro deprehenditur & manifestè quidem in infanum recens natorum & vulueratorum, pullum motui respondet, pulcherrimè in demortuorum cerebro representari potest: Cranio nempe prius ablato, quo cerebrum suis meningibus vestitum in conspectum veniat, crassam quoque meningem remove proficuum foret, tum eam cerebrum tenui solum meninge rectum mandros intestinorum quali repræsentabit. His ita paratis, si inflentur arteriæ carotides in collo, per distinctos pullis egregium edet spectaculum singulis namque inflationibus non solum arteriæ inflantur & attolluntur: sed & integra massa cerebri movetur & intumescit, quoliter inflationis ictu, sic quoque apertis ventriculis lateralibus, si ramus arteriæ jugularis, plexum constituens choroidem, inflatur, tremulum



vifque jucundum exhibebit motum, unâ etiam movebit partes quafdam adjacentes, præfertim glandulam pinealem.

Ex hoc pulfâtili univerfo cerebro communicato *motu*, arteriarum beneficio, *ſpiritus animalis* in motu verſari & in nervos propelli ſuſpicor. Dum enim cerebrum tam arctè a cranio circumdatum ſit, ut in multis craniis, viz arteriarum exſcriptæ quali extant, fieri aliter nequit, quin per motum & appuſum ſanguinis cerebrum intumeſcat, cum ulterius ob acutitatem cranii adjacentiam, propelli nequeat, ipſius ſubſtantia movendo & dilatando prematur, & conſequenter *ſpiritus animalis* exprimantur in ſuos canales & nervos. Arteriæ verò ſpinalem medullam & nervos undique concomitantes, præterquam quod calore eos expandant, continuo quoque motu pulſatili eorum motum promoven.

Moveri autem *ſpiritus animalis* continuo illo motu & calore ſanguinis in cerebro ejuſque appendicibus, ex eo conſtare videtur, quod, quoties impediatur ſanguinis ad cerebrum partefque ſenſiles motus, toties derepentè, omnes actiones animales labefactentur & tollantur.

Quemadmodum videre licet in ſtrangulatis, in quibus in momento ferè omnes ſenſus tam interni quàm externi, motuſque animales ceſſare ſolent, quorum hiftorias quaſdam collegit *Wepferus in exercit. de loc. aff. in apoplex.* quarum illa præ cæteris memorabilis exiſtit de Angli ſuſpenſa Medicorum verò ope reſtitutâ: Hujusmodi notatu dignam recenſet hiftoriam *Helmontius de curioſo quodam Altrologo lib. de Lithiaſis cap. 9.*

In morbis ſynopticis, cum motus ſanguinis & pulſus ſuſpenderentur, animales etiam actiones labefactantur & tolluntur, non autem functiones animales ſubito abolentur, quod ob impeditum ſanguinis influxum, *ſpiritus animalis* ſuo deſtinantur & fruſtreantur alimento, cum enim lente labefactarentur ejuſmodi actiones, donec tandem ſucceſſivè conſumptis ſpiritibus deficerent hoc autem non ſic in illis ſanguinis ſtagnationibus ſed derepentè, alia igitur ſubitanæ hujus abolitionis functionum querenda ratio, dicta ſcil. ceſſatio morbis. Ceſſante enim in cerebro pulſatili motu, ceſſat, ab impedito ſanguinis influxu, calor, ſpiritus ad partes non propelluntur, ſed ſtagnant, brevique coagulantur.

Cum itaque impeditum ſanguinis influxum ſequatur repentina *ſpiritus animalis* ſtagnatio, læſio verò & abolitio functionum à *ſpiritus animalis* dependens, inquirendum in cauſam tam ſubito ſanguinis illius influxum impediendentem: Hæc eſt repentina ſanguinis in arteriis carotidibus & vertebralibus ſtagnatio, coagulatio & concretio, & hæc, ſi non ſemper, ut plurimum tamen generatur apoplexiæ cauſam eſſe exiſtimo.

Coagulatio verò ipſa cauſatur ab halitibus acido-aſtutis & coagulativis ſanguini commiſtis; Halitus hi afficiunt vel extrinſecus advenientes, corpusque in reſpiratione vel per poros intrantes, vel intrinſecus in corpore noſtro, mediante effereſcentiâ vitioſâ in tenui inteſtino excitantur aſcendunt, ſanguini commiſcentur, eumque coagulant. Huc inclinare videtur *Bernh. Sævalve in tract. de querel. vent. p. 222.* Sublimatum autem acidum quippiam, inquit, ſi ab aſtro ſuo depulſum ſuat in ſpinæ medullam, rectum motumque reſolvit. Ideoque ſæpius apoplexiæ præcedere videmus cardialgiâ, vomitus vel vomendi conatus, dyſenterias &c. Id quod variorum etiam reſtantur facta. Ex his

dictis ſecus qualitaſque materia haud obſcurè jam colligi poterit, cum & poſt apertionem in ventriculo & inteſtiniſ cauſtica & nigra materia ſæpius reperta ſit.

Generari hæc materia & in corpore noſtro produci poteſt prævâ diſtâ, multa ſcilicet acido aſtuta in alimentis allumendo, unde humores tales in corpore generantur, præ cæteris verò ſuccus pancreaticus facilè eam inducit naturam, inque ductu laterali ſtagnat, ſtagnatione actior factus tandem copia & acrimoniâ materiam obſtruentem, pituitam nimirum viſcidam, pertumpens, cum bile vitioſum in duodeno excitat effereſcentiam, unde halitus illi acido aſtuti & coagulativi exſurgentes, acrimoniâ ſuâ in oriſicio ventriculi admodum ſenſibili cardialgiâ excitant, ventriculum ad vomendum, inteſtina ad egerendum irritant, imò, corroſis inteſtinorum tunicis, dyſenteriam patiunt. Fieri coagulatio quoque poteſt à veneno exhibitò coagulativo, mercurio ſublimato communi, aqua forti & ſimilibus, quæ cani propinata mortem ſubitanæam cum coagulatione ſanguinis inuſiſſe vidimus.

Num verò ſanguinis in cerebrum influxus alio etiam modo tam repentè impediri queat, citò determinare non poſſum. Pituitam viſcidam quod concernit, eam quidem in arterias capitis delatam, eadem obſtruere poſſe non nego, quod verò conſertim & ſimul omnes oppilari & obſtrui poſſint à pituita, eſt de quo maximè dubito. An quoque ſubito omnes comprimi poſſint arteriæ, ut tranſiſus denegetur ſanguini, non aſſe quor, poſitò verò hoc fieri à ſanguine extravasatò ut plurimum fieri arbitror, quanvis non ſequatur in hujus vel illius apoplectici capite inventus eſt ſanguis extravasatus, ergò hujus mali cauſa exiſtit, cum vaſa obſtructa facilè tumpantur & ſanguis extravasetur, quemadmodum videre eſt in pleuritide: Per ſubitanæam verò arteriarum carotidum & vertebralium abſciſſionem etſi hæc apoplexia ea tamen Medico curanda non offertur. Non deſunt quoque qui ex obſtructione ſinuum cerebri, qui ſanguinem revehant, circulationem ſanguinis impeditam, ſtagnationem interdum & extravasationem, & per conſequens apoplexiâ provenire ſtatuunt.

Pereſpectâ hæc ſtagnatione *ſpiritus animalis* à motore labefactato & ſublato pendente, pauca quæ tam addam de *viciſſe* influxumque ſpiritibus denegante. Certum eſt incisâ ſpinali medulla illi cedere ſequi omnium interiorum partium reſolutionem, eorum ſenſus & morbis abolitionem, cujus rei experimentum in brutis facilè inſtitui poteſt, incisò enim ſpinalis medullæ principio, apoplexia præſtetur Medico rum incurabilis. Comprimi poſſe medullam oblongatam & quidem ſubito cenſeo, repentè materia conſtante circa magnum occipitis foramen, (foramen inſindubuli repræſentans) per quod tranſit medulla oblongata, medullamque comprimente, ut ſpiritibus denegetur exitus. Conſertim autem eò materia confluere poteſt, ſi ventriculi cerebri & quidem laterales humoribus ſint repleti, qui quantitate nimia coacervati, contiguitatem limbi cum cerebri radice pertumpunt, licet hæc etiam motu cerebri violento divelli poſſint, in ſtemuratione aliove modo. Sanguis ex ruptis cerebri vaſis eò effuſus, medullam oblongatam comprimere aptus exiſtit, tumpuntur verò vaſa à vulnere, concuſſione, ſi conſuetæ ſupprimantur hæmorrhagiæ per nates & menſe, vel alio quocunque modo.



A causis mediatis proximioribus ad remotiores nunc progrediendum, quas in naturales, non naturales & præter-naturales dividunt: *Naturalem in classe* sele offert temperies ad frigiditatem præcipue & humiditatem proclivis: *Ætas* senilis apoplexiæ terax secundum *Hippocr. sect. 3. aphor. 31.* ubi apoplexiam inter senum morbos refert. Dispositionem hæreditariam multum huc conferre quibusdam placet. Inter *nonnaturales* se sistit primò aër aquilonaris, frigidus, violentus & asper: Occidentalis, pluviosus, pituitam serosamque humores augens: Aër exhalationibus venenaris & narcoticis infectus: Radios Lunares peculiari vi cerebro infestos huc quidam acculant. Pertinet & huc tempus anni hyemale, de quo *Hippoc. sect. 3. aphor. 23.* Dietam supra parum tetigimus: Venere nimia apoplexiam imò mortem sibi quosdam acquisivisse, legimus. Præ aliis verò animi pathemata humores exagitare solent, ex ira enim vehementiori quidam apoplexiam passos esse observavit *Forestus. 20. in schol. obs. 70. ex præternaturalibus* adducitur melancholia. *Vid. Hippoc. sect. 6. aph. 56.* Causa externa violenta verbi gratia contusio, casus, vulnus, ictus, fractura &c. Plura reperimus apud Auctores; hic brevitati studens, dictas causas calui nostro nonnihil applicabo.

Affectum Ægri nostri ortum habuisse à vaporibus acido-austeris & quali malignis, non solum ex supra positis, verum etiam si circumstantiæ, symptomata, aliæque in historia casus propolita, imò curatio sequens, diligentius paulò inspiciantur, ad oculum patebit: Primò enim dixi eum affectioni *hypochondriaca* obnoxium fuisse; cujus causam plurimi moderni Medici in acido-austero latitate asserunt: Hyems erat coagulationem & stagnationem humorum promovere apta, imò cum ipsum frigus in particulis acidis & nitrosis consistat, aciditas in corpore præprimis disposito aucta fuit. *Ira inter concionandum* corripitur, Pathemate à scherbio vehementissimo dicto. Ira enim humores agitando, mineram causæ morbificæ in pancreate absque dubio latentem excitavit, unde vapores acido-austeri elevati, primò horrorem, postea caput petentes, spir. animal. inordinate movendo, vertiginem produxerunt, tandem coagulato in vasis sanguine & per consequens cessante spir. animal. motu & influxu (à quibus omnes corporis partes tanquam à sole irradiantur) necessario subsequuta fuit omnium, qui à spir. animalibus aliis sustentantur sensum abolitio, corporisque lapsus. Remansit autem respiratio difficilis cum pulsu parvo inordinato, non prout quibusdam videtur, ob summum respirationis ad vitam conservandam necessitatem: Quamquam enim respiratio summè sit necessaria, tamen per se efficaciter agere nihil potest, efficiente scilicet causâ deficiente. præterea natura nunquam non hoc ageret in omnibus ad vitam conservandam necessariis actionibus: Neque etiam à spir. vitali us, calore & motu cordis, ut aliis placet, conservatur, sed ob facilitatem spir. animal. in illos nervos influxum evenire suspicor, qui influxus à prima nativitate & dormienti & vigilantia sine ulla intermissione continuatur, hinc, hos nervos poros suâ sponte apertos & dilatatos habere quidam existimant, reliquos non item, sed tantum per inflationem spir. animal. dilatati. *Pulsus erat parvus & inordinatus*, cum sanguis

propter obstructionem arteriarum vix circulari poterat.

At ad ea, quæ supersunt festino, ubi si obices differentias & signa apoplexiæ tetigero, curationem postmodum subiungam: *Differet apoplexia ratione graduum*: Quorum *Hippocr. sect. 2. aphor. 42.* duos; Galenus verò *lib. 3. de loc. affect. c. 7. & 10. & comment. ad aph. 42. sect. 2.* Hipp. quatuor constituit, quem plurimi imitantur: *apoplexia primi gradus* est, ubi respiratio aliqualem servat ordinem: *Secundi gradus* est, ubi respirationis major adest difficultas & inæqualitas, modò enim crebra, rara modò observatur. *Tertii gradus* fortis dicitur & vehemens, in qua respiratio quidem præsens, sed summa cum difficultate æger laborat, aded ut cum stercore spuma prodeat. *Quarti gradus* acutissima & fortissima est, in qua respiratio ad sentum abolita est, ægerque cadaveris instar jacet: Ratione causarum porò differt apoplexia, cum alia sit à motore cessante, sicut in ægro præfenti, alia à via obstructa & laborante: Rursus alia à causis internis, alia ab externis, item alia à vi externa à contusione, ictu, vulnere &c.

Signa imminutis interdum ferè nulla sunt, interdum præcedunt torpor & stupor, sensus amissio sine manifesta causa, dolor capitis & gravedo subito ac vehementer invadens telle *Ceo sect. 6. aphor. 51.* somnus altus, oculorum caligo, circumgyratio capitis per imaginationem, & vertigo tenebrosa, horror, incubus, tinnitus aurium ac linguæ balbuties secundum *Hippocr. sect. 7. aphor. 40.* stridor dentium in somno, sterminationis conatus sed impotentia, & quæ sunt alia: In præfenti apoplectico præcursores erant horror & vertigo. Præfentis apoplexiæ signa satis sunt evidenter, subitaneus nempe lapsus, cum sensus & motus privatione relicta saltem respiratione vel difficili vel ad sentum nulla cum pulsu inordinato & parvo, ut hic, vel magno, neque concussus neque punctus sentit, dormit profundè, imò stertit, membra laxa elevata concidunt suo pondere, mortuorum instar.

Signa causarum, ut in aliis quibusque morbis, ita & hic ob curationem probè sunt observanda: Si enim sit à motore cessante & sanguine stagnante, plerumque adest pulsus magnus, interdum, ut hic videmus, parvus, cum majori nitu respirationis & faciei rubore, sæpè eam quoque supradicta præcedere solent signa. Si à compressione medullæ oblongatæ, pallor potius quam rubor faciei observatur, neque tam subito sentus interni omnino tolluntur, pulsus admodum debilis cum respiratione simili adest. Si à sanguine extravasato, plerumque evidens causa vel plethora præcessit. Oportet autem causarum signa ex circumstantiis & per se patent, vel judiciosâ calculatione & diligenti symptomatum observatione faciliè eruuntur.

Nec verò hic cum aliis affectibus valde ipsi affinis, confundatur, operæ pretium me facturum arbitror, si signa approposito distinguantur: *Distinguitur à lethargo*, quod in hoc, quamvis somnolenti sint, excitentur tamen, quod apoplecticis non accidit, insuper lethargum febris comitatur, in hac non, nisi superveniat. Ille paulatim fit, hæc subito. A caro, tactu, qui remanet & plerique sensus, puncti enim sentiunt partemque movent, carus sensum invadit & respiratio adest libera, hæc repentè cum respiratione vel difficili vel ad sentum



sum nullā: apoplexia plerumque in paralyſin deſinit, ille citra paralyſin curando evaneſcit. Ab epileptia motibus convulſivis: à ſyncope ubi pallor faciei & pulſus tere abolitus cum ſudore frigido. A ſuffocatione uterina dicta, colore faciei cadaverolo (quamquam teſte *Lazar. Reperio Prax. lib. 8. cap. 1. p. m. 360. & lib. 15. cap. 6. p. 219.* interdum rubicundus obſervetur) fauciumque ſtrangulatione, Patientes ſenſibus tum internis tum externis aliquantum conſtant, vocatz enim audiunt & poſt paroxyſmorum dictorum aut factorum recordantur: à catalepti, quia cataleptici liberè reſpirant, & membra rigida, apoplectici verò reſoluta habent, præterea in illa ægri in eodem ſitu, in quo deprehenduntur, rigidi permanent: A catarrho ſuffocativo, quod hoc correpti ſenſibus motuque integris ſuffocentur.

Prognofin quod attinet, ſciendum eſt, hunc affectum periculoſum & ſæpè lethalem eſſe, quamvis pro varietate grauium curam admittat, ſecundum *Hippocr. aphor. 42. ſect. 2.* apoplexiam fortem ſolvere impoſſibile eſſe, debilem verò non facile. *Hippocr. aphor. 15. ſect. 6.* ſequens ponit prognoficum: Qui valentes capitis dolore tubiſco corripiuntur, & protinus muti fiunt & ſterunt, intra 7. dies intereunt, niſi febris ſupervenerit: Graviores ob vitium imbecillitatem frequentius opprimunt quàm iuniores: Si à difficili reſpiratione ſudor ſuperveniat, præſertim frigidus, lethale. Quæ à ſanguinis ſtagnatione oritur, ſoluta faciliorem eſſe exiſtimo, cum medicamenta locum affectum faciliùs attingere queant, ſecus ac in illa, quæ à compreſſione medullæ oblongatæ provenit, quod remedia hic adhibita locum deſignatum difficiliùs aſſequuntur. Cum igitur à ſanguine poſſimum ſtagnante malum in ægro noſtro fovei æquè ac ortum traxiſſe pareat, tantum abſuit, ut de ſalute ægri deſperatum ſit, ut potiùs omnis eò moveretur lapis, quò citiùs convenientia adhiberentur remedia.

Statim itaque, ægro in juſto ſitu priùs colloca-to, pro conciliando & reddendo ſanguini motu, ad nobiliſſimum pariter ac generoſiſſimum auxilium, *vena ſectiōnem* tempo, confugi-mus, ſanguinemque è mediana brachii dextri miſimus ad 3vj. *Ceſo* enim notante *lib. 3. cap. 28.* poſt ſanguinis miſſionem ſi non rediit mens, nil ſpei ſuper-eſt: magni idèò æſtimanda venæ ſectio, cum ſcilicet, ut huc, adſit plethora & ſtagnatio ſanguinis: Poſt venæ ſectiōnem reſpiratio liberior, pulſusque fortior erat: Subinde cochlearia duo mixtura ſeq. ipſi infundebantur.

℞. Aq. lavendul. 3 i ſ. aq. apoplect. Sennert. ſpir. lilior. convall. ana 3 ſ. tinct. caſtor. 3j. ſpir. armoniac. 3j. ol. ſuccin. nigr. 3 ſ. ſyrup. de betonic. 3vj. m.

Cervix, collum, adjacentesque partes ſeq. inungebatur linimento.

℞. Aq. anhalt. aq. theriac. ana 3 iij. ſpir. ſal. armon. ol. ſpic. ol. philoſoph. ol. vulpin. ana 3 ij. ungu. mariat. 3 ii ſ. m. l. linimentum. Quibus per dimidiam horam adhibitis oculos aperire incipiebat, membraque movere, interea frictiones & inunctiones non intermittebantur, naribus admovebatur ſpir. ſal. armoniac. inungebanturque oleo ſuccin. nigr. His ita continuatis per 3. hora quadrantes planè æger ſe recolligit, remanentibus ſolum, ut in hiſtoria caſus dictum lin-guæ immobilitate virumque imbecillitate, quæ

continuatione medicamentorum dictorum brevi quoque ceſſantur, & hæc ad Paroxyſmum tollendum ſufficiunt ordinata & adhibita: Ad præſervationem ipſi recommendabatur ulus crebrior ſpir. ſal. armoniac. non ſatis laudandi vel alterius un-noti, pituitam enim viſcidam, ductum pancreati-cum, alioſque obſtruentem non ſolum deobſtruit, incidit & attenuat, verum etiam humorem acido-auſterum corrigit, præterea tempore veris & autumnii purgatio præceſſa præparatione inſtituatur pilulis ſeq.

℞. m. p. tartar. quercet. 3j. reſin. jalap. diagryd. ana gr. ij. ol. garyophyll. gr. iij. cum con-ctery. flor. lavendul. ſ. pilul. num. xii. Tempore verno poſt purgationem venam incidere valde quoque proſicuum foret, præſertim cum æger noſter ſanguine abundet: In ulu retum ſex non-naturalium dietam obſervet exactam: Aer eli-gatur purus & temperatus: Cibus & potus cau-tæ morbiſice ſit contrarius. Vigilia & ſomnus non excedant: Motus mediocriſ præſertim ante prandium & coenam inſtituatur: Imprimis verò animi pathemata & præ cæteris ita mane peius, ac angue fugiat. *Jeann. Michaelis Prax. clinic. ſpec. cl.*

Vir quadragenarius ac fortis, crapulæ & ebrietati admodum deditus, poſtquam de capitis gra-vativo dolore, modò majore, modò minore, per duos menses conquieſtus fuiſſet, nec remedia adhibuiſſet ſed more ſolito, tam antemeridianis quàm pomeridianis temporibus, aliorum ſanctam magnis multiſque poculis bibendo, tuam ci-tiſſimè proſtigare diligenter ſtudiuiſſet, tandem matutino tempore in cubiculo deambulans, poſt-quàm tria quatuorve inarticulata verba protuliſſet, repente concidit, omnis ſenſus & motus ex-pers ſolà reſpiratione excepta, quam Medicus poſt ſeſquihoram vocatus aliquantum ingraveſcere percepit, pulſu mediocriter valido etiamnum exiſtente.

Caput in hoc ægro graviſſimè oſſigi, anima-lium functionum proſtra io ſatis docet.

Atteſtio hæc apoplexia nominatur, quæ eſt ſub-ta omnium functionum animalium, excepta reſpira-tione, privatio.

Non eſſe lethargum, ſyncopen, comam ſom-nolentam, carum, cataleptin, aut epilepſiam, ex eo liquet, quod æger ſine febris exiſtens, proſus immobilis jaceat, nihil omnino ſentiat, nullis mediis excitari poſſit, & omnia membra flacci-da habeat, cum pulſu mediocriter valido, & reſ-piratione jam ingraveſcente, quæ omnia ſimul in prædictis affectibus non adſunt.

Cerebrum autem in hoc ægro imprimis affici-tur circa principium medullæ, è qua omnium ner-vorum origo procedit: quod principium ab hu-more pituitolo obſideretur.

Cauſa remota fuit continua ebrietas & crapu-la, qua longiore tempore debilitatum eſt cere-brum, in eoque multi crudi ac pituitoli humores generati, & in ventriculis cumulati, cauſam an-ecedentem dederunt; qui poſtea ad nervorum principium decumbentes conſtituerunt cauſam continentem.

Iſtius enim nervorum principii poros obſtru-ctione & compreſſione repente anguſtantes, in-greſſum ſpirituum animalium prohibentes qui cum ea de cauſa tubiſco ſiſtentur & in nervos non afluant, ſubiò etiam concidunt, omnes anima-les



les functiones, ægerque omnis morbus & sensus expers relinquatur: excepta tamen respiratione, quæ aliquandiu persistit, quia spiritus animales in principio mali ad solos musculos respiratorios adhuc influunt, propter pororum in nervis respiratoriis majorem latitudinem, qui ea de causa tam citò non obstruuntur, ut aliorum nervorum pori angustiores. Verum malo perdurante, & humore pituitoso se magis magisque in eorum poros paulatim interente, vel eos compressione angustante, etiam magis magisque impeditur spirituum animalium in eos influxus, unde tunc actio musculorum respiratoriorum imminuitur, & respiratio cum illegore ingravescit.

Pulsus integer sentitur, quia malum est in principio, & sanguis à dextro cordis ventriculo in pulmonem impulsus propter respirationem adhuc permansentem satis refrigeratur. At si perduret malum, etiam pulsus paulatim imminuetur ac deficiet, non quòd totius motus ab influxu spirituum animalium dependeat, ab eoque deficiente etiam deficiat, sed quòd dextri ventriculi sanguis, propter respirationem desinentem, non satis evanescat & refrigeretur, atque hinc pauca quantitate ad sinistrium ventriculum deveniat, unde cor debilitatum in suo motu deficit.

Malum hoc periculosissimum est, nam juxta 2. aphor. 42. *apoplexiam fortem solvere impossibile, debilem vero non facile.* Quia tamen in principio est, & respiratio nondum sit cum stertore, ægrique calor ratione ætatis validior existit, aliqua sanatio nis spes elucere videntur, sed non sine metu paralysis post morbi solutionem secuturæ.

Curatio igitur citissime instituenda est: ac studendum primò ut humores pituitosi nervorum principium obstruentes, loco moveantur, sicque spiritus in nervos transius pateat: deinde eorum nova generatio & in capite collectio impediat, ac cerebrum corroboretur.

Corpus itaque moderatè commoveatur, fiantque pilorum vellicationes & asperæ frictiones ac ligentur in brachiis & cruribus. Hic quoque clyster injiciatur.

℞. Herb. absynth. rutæ, parietariæ, mercurialis, hyssopi, betæ, centaurei minoris ana m. j. fol. senæ ʒj. cotocynthidos in puppa ligatæ ʒj. sem. anis. ʒv. aq. q. l. coquantur f. art. rec. colatur. ʒx. elect. hier. pier. diaphanici, ana ʒj. olei chamæmelini, rutacei ana ʒj. talis ʒiv. misce, fiat clyster. Vel ejus loco uti licet tali suppositorio: Rec. specier. hieræ ʒi. trochisc. alhandal. ʒss. sal. gemmæ ʒj. mell. ʒvj. f. l. art. suppositorium, cujus extremitati adhaereant diagridi gr. iv.

Post injectum clysterem secetur vena in brachio, & sanguis mediocri quantitate educatur. Deinde cucurbitulæ cum & sine scarificatione applicentur collo, humeris, scapulis & cruribus.

Naribus etiam hic pulvis sternutatorius insuffletur. Rec. rad. helleb. alb. ʒj. pyrethr. ʒss. fol. majoran. ʒj. piperis nigri, castorei, ana gr. v. fiat pulvis.

Fortis capiti calidè imponatur hic facculus.

℞. Sal. m. j. ss. tabuli marini. m. ij. sem. cumini, fœniculi, levistici, ana ʒij. gariophyllorum ʒi ss. calefant simul in olla lapidea sicca, ac sacculo lineo infusa, capiti calidè applicentur.

Naribus, temporibus & vertici illinatur hoc linimentum.

℞. Ol. castorei, lavendulæ, rosmarini, succi-

ni, ana ʒj. unguent. marciat. ʒj. misce, f. linimentum.

Cum æger incipit ad se redire, detur interdum cochlear hujus aquæ.

℞. Aq. flor. tiliz, lilii convallium, vinæ Martholi, syrup. de sthœcade, ana ʒj. misceantur.

Deinde purgetur cum pilulis cochliis, vel extracto catholico, vel elect. diaphanici. aut hier. pieræ, vel pulvere diatubith, vel infusione ex phlegmagogis parata. Quæ purgatio tubinde repetenda est.

Corpore purgato præscribatur hoc apozema.

℞. Rad. acori, fœnicul. ana ʒvj. galang. ʒij. herb. majoran. betonic. rosmarini, rutæ, calamintæ, hyssopi ana m. j. flor. sthœcad. m. ss. cordialium ana p. j. baccarum juniper. ʒvj. sem. anis, fœniculi ana ʒij. aq. & hydromelitis, ana part. æq. coquantur f. art. & fiat apozema ad ʒi ss. de quo sumat æger ter de die ʒiv. vel v. cum particula hujus conditi.

℞. Specier. diambæ ʒiv. diamolch. dulc. ʒss. rad. acor. condit. conserv. flor. salviæ, anthos, betonic. ana ʒv. syrup. de sthœcade q. l. fiat conditum.

Capiti imponatur hoc capitium.

℞. Fol. majoran. m. j. rosmarin. flor. lavendul. ana p. ij. gariophyllorum, nucis moschatæ, ana ʒij. benzoini ʒj. fiat pulvis grossius, è quo in serico rubro fiat l. art. capitium.

In diata sit aer modicè calidus & siccus, vel natura vel arte. Cibi sit boni nutritivi & facili coctionis, conditi cum is quæ attenuandi, calefaciendi, & caput corroborandi vim habent, quælia sunt, rosmarinus, majorana, serpillum, salvia, betonica, melissa, hyssopus, semina carminativa, & aromata. Potus sit melicratum, vinum tenue, & nonnunquam paulillum vini hypocratici. Somnus sit brevior, & corporis exercitatio mediocris. Excreta naturalia bene procedant. Fugiantur animi pathemata. *Isbrand. de Diemerbroeck. Medicat. 12.*

#### Apoplexia ex concussione cerebri lethalis.

Reverendus Theologus, D. Jeremias Vietor, Superintendens Giesensis, fere sexagenarius, fluxionibus capitis admodum obnoxius 7<sup>o</sup> anno 1609. vespertino tempore scalam descendens in domo propria decidit, capite pavimentum feriens, ut circa frontis os concussio deprehenderetur: subito collapsus instar mortui jacer, sine voce, nec videns, nec audiens; quin etiam tactu, motuque privatus, cum stertore quodam, pulsu adhuc integro, sine febris. mox vomitus subiequitur, omnibus in eodem statu permagentibus, donec tandem vitali facultate suffocata, die sequenti vitam cum morte mutaret.

Verum est illud Hippocratis lib. 7. aph. 58. quibus aliqua ex causa cerebrum concussum fuerit, necesse est statim mutos fieri, quod *Gal. in comm.* hoc modo interpretatur, eos scilicet absque sensu pariter & motu instar apoplecticorum jacere. Hoc modo *Fernelius lib. 2. de abditu rerum causis capitis* ex ictu oculi puerum, & *Here. Saxen. in prælect. prat. par. 1.* quendam Venetiis ex alapa contusione apoplecticum redditum fuisse testatur. Mirum ergo non est, quòd hic etiam ex eadem causa, nimirum contusio ex lapso, apoplexia occasio-



nem de Jern, in sexagenario, cum senili ætati familiaris alias hic affectus sit, juxta Galen. lib. 3. aphorism. comm. 31. qui fluxionibus capitis admodum obnoxius erat, quâ ratione proxima continensque hujus symptomatis causa nimirum subitanea compressio cerebri, respellens unum & basos, seu principii nervorum originem suam, externâ violentâ concurrente, citius habere potuit: vespertino tempore, nimirum post cibum, capite alias repleto, spiritibusque versis concoctionis membra revocatis, ergo subito collapsus instar mortui jacet, quod omnes facultates animales æqualiter languant, unde situs talis in universali prædictarum facultatum quiete solet observari, quod patet in lipotymia ex resolutione, cui melius succurri nequit, quam ubi laborantem protinus in dorsum extremis æqualiter extensis procumbere jubemus; sine voce, nec videns, nec audiens, lætis scilicet tam internis quam externis sensibus; his propter denegatum spirituum animalium influxum, illis propter cerebri compressionem subitam, illarum partium respectu, per quas spiritus animales aditum libertatem requirunt, quia etiam tactu, motuque privatus, quod non tantum anterior cerebri pars, sed undique totum esset affectum, ubi colligitur differentia præsentis affectus 1. à Caro & gravi sopore, quod prioribus cerebri partibus potissimum hic oppressis per posteriorem medullæ partem communicatio spirituum, quanquam diffculter adhuc, fiat; unde stimulari sentiunt & moventur. 2. à lethargo, cui idem accidit, lentâ febre simul presente 3. ab epilepsia, quæ cum motibus convulsivis jungitur. 4. à suffocatione veri, quæ non tantum similes quoque motus, sed sensuum etiam internorum & externorum imperfectam operationem relinquit, cum stertore quodam, propter motricis facultatis imbecillitatem; quæ thoracem abundè satis attollere nequit, adjuvante simul calor is imminente suffocatione, qui propterea collectus circa cor amplius eventilari cupit, quâ ratione dormientes etiam, non vigilantes, frequenter stertorem edere solent; inprimis ubi dorso incumbunt, pulsu adhuc integro, corde videlicet principaliter non affecto; sine febri, quatenus affectus hic inflammatione destituebatur, quod non fit in lethargo, in soporiferis febribus, &c. Mox vomitus subsequitur, à concussione suam originem trahens, quatenus vomitus, inprimisque biliolus, cerebri, membrarumque potissimum lationem sequi solet; juxta Hippocr. lib. 6. aphor. 50. & alibi. His signis perditantibus prognosin facillime fecimus, nimirum affectum lethalem esse, cum Hippocr. lib. 2. aphor. 42. apoplexiam fortem nullo modo, debilem vero non facile solui posse statuat.

Ne verò quicquam, quod Christiana charitas requirebat, intermitteretur, aliquid tentandum esse judicavimus, propterea quod interdum etiam in desperatis casibus benedictio divina luculenter, præter spem, dum ex officio sæpius extreme laborantibus succurrimus, nobis apparere soleat. Hinc revulsionem à capite variis mediis institutam, & deinde omni ingenio facultatem animalem excitandam esse putavimus.

Pro primo mox venæ sectionem instituvimus in brachio dextro, sanguinis 3 vii. vel 8. extractis, propterea quod suspicio esset, sanguinem ex concussione capitis eo confertim affluxurum. Quamquam verò sanguinis missione dextre petasæ, res-

piratio levior videretur in cæteris tamen nulla mutatio sequebatur, unde non tantum extremorum frictions & ligaturas dolorificas ordinavimus, sed paulò post clysterem sequentem suavimus, qui.

℞. Herb. betonic. salv. primul ver. centaur. minor. calamint. montan. ana m. i. s. fol. lenn. 3vj. pulpæ colocynthid. 3 i. s. coq. in aq. & vin. ad tertias, colatur. ℞ j. diss. elect hier. simpl. Ind. major. ana 3 s. ol. rutæ, de castoreo. anethin. ana 3 j. sal. gemm. 3 s. m. f. clyster.

Præter hæc remedia revulsionum, partem affectam quoque non negleximus; quæ ob causam, prosequendo, non tantum aquam apoplecticam Langgii, cum spiritu cætorum nigrorum permistam, aliquoties instudimus, corroborationis gratiâ, sed etiam ol. succini verticem, tempora & nares inunximus, ac tandem sternutatoriis ex castoreo & similibus, quæ post universalia & revellentia rectius, quam in principio adhibentur, naturam excitare conati sumus, sed frustra, sensim etiam virali facultate remittente. Gregor. Horstius de Morb. cap.

### Observationes.

Juvenula in veram apoplexiam, cum mensui effluvio, incidit; pluribus celebratis auxiliis, ego neglectâ indicatione quæ à menstruo fluente actu delimitur, oburgens periculum, facis crurum frictionibus & cucurbitulis femoribus apposis, octo horarum spatio quater à cephalica copiosè sanguinem mitto, à quo præsidio convaluit. Zacutus Princ. Med. Histor.

Sartor quidam pallidi coloris extra urbem exiens, subito apoplexiâ correptus, in domum sine sensu ac motu fecit; qui cum pituita abundaret, & venæ non apparent, sectionem venæ prætermisimus. Sed ut subito materiam à capite divertendo avellerem, ut hic clyster infunderetur mandavi.

℞. Cent. min. puleg. calament. origan. beton. rutæ, salv. mercurial. hyssop. ana m. j. fol. lauri, fl. stœchad. & anthos, ana p. j. sem. anis. feniculi. catham. contul. ana 3 ij. nivarum pass. enucl. 3 j. colocynth. 3 i. s. coq. in aq. communi incol. ℞ j. dissolv. elect hier. simpl. benedict. laxat. ana 3 s. hier. logad. diacolocynth. ana 3 i. s. ol. chamæm. rutæ. ana 3 j. ol. anethi, 3 s. ol. castor. 3 ii. s. salis gemm. sal. communis, ana 3 j. m. f. clyster. iniecit dum clyster parabatur, etiam alvus irritata est ad solutionem glande intrascriptâ.

℞. Trochisc. alhandal. 3 ij. spec. hier. picr. 3 j. sal. parum, mellis q. s. f. suppositorium. Adhibui etiam frictions; & vincula tum femoribus, tum brachiis inieci, quibus adhibitis, tendebat in patalsim. Sed non expectatâ digestionem, ut has pilulas devoraret præcepi.

℞. Pil. coch. 3 j. castor. 3 j. cum syrup. de stœch. hanc pilul. 7. quas, cum non potuit devorare, dedimus solutas cum aq. beton. Cum ventrem egregiè solvisset, cepit melius loqui. Exhibui tunc syr. de stœch. & oxym. scilicet. Et postea cum pilulas devorare posset, prædictas deglutendas dedi, nucham quoque inunximus oleo lampuchino & nardino simul mixtis. Deinde parti-



particulari evacuatione, palatum iunximus cum theriaca & sinapi; etiam masticatoriis quoque adhibitis, & erthinis cum succo betæ, rutæ, & majoranæ, & sternutamento hunc in modum præscripto.

℞. Nigell. piper. alb. nuc. moschat. ana ℥j. helleb. alb. pyrethr. castor. ana ℥ss. m. f. pulvis. pauxillum ejus calamo insuffletur in narces. Ultimo ad maiorem resolutionem & capitis roborationem, theriac. michtidar. & oxymel scillinum, dedimus, & imperavimus ut ex hoc sequenti condito sumeret subinde.

℞. Conierv. flor. rosimar. beton. salv. ana ℥j. michtidar. ℥ij. theriac. el. ℥j. spec. diamb. diambolch. plicisarchont. ana ℥i ss. diacori ℥ij. oximel. scillin. syr. è stœch. ana ℥ss. m. bibebat & hoc claretum.

℞. Salv. majoran. hyso. beton. ana m. j. flor. rosmar. stœch. ana p. j. liquirit. cal. ℥ij. coq. in aq. q. s. in colat. ℥ix. dissolv. mell. despum. syrup. è stœch. ana ℥j. clarificetur & aromatizetur cum ℥ij. cinam. f. claretum pro tribus dolibus.

Exterius verò spinam totam inungebat, & crus paralyticum his oleis.

℞. Ol. Nardin. samplich. ana ℥j. ol. vulp. ℥ss. ol. caryophyll. gutt. v. tempore inunctionis addebatur aliquid aquæ vitæ rectificatæ, & sic hic tunc tandem egregie curatus. *Petrus Forestus observ. 77. lib. 10. de cerebri morbis.*

Juvenem pleni habitus, præcipitavit redundans capitis sanguis in subitam ac gravem apoplexiam, cum tremore, aphonia, ac stertore; tribus periculosis hujus morbi comitibus; quorum vehementia maturè quo infringerebatur, emittebatur illic sanguis in brachio dextro, sed eo lenius fluente quam ut satisfaceret morbi magnitudini, exolarum fuit utique eodem ferro & brachium finitum: quo bipartito fluxu aliquandiu continuante, remisit evidenter stertor, traxit commodius spiritum, & recuperavit brevi sanitatem. *Tulpius cap. 7. lib. 1. observat.*

Mulier Hebræa, cum continuos 4. dies de more gentis jejunaret, inde debilis facta est; ceterum cum postea mali succi cibariis vesceretur, multum humorem pituitosum exaggeravit, ex quo cerebri cavitates occlusæ sunt, ad quas privatio sensus & motus sequuta; pro quibus recuperandis multa illic facta sunt, & ad cauterium in futura coronali deventum, unde aliquantulum ad se rediit, sed Medicus inscius ad eam juvandam præsens sanguinis ℥viii. vel x. extraxit, unde mors brevi supervenit. *Amanus Cur. 3. cœm. 4.*

Anglus sexagenarius, virginum Anglarum Leodii agentium, lymphoniarum organique præfectus, media quadragesima ætatis, in pœnarium hospitii pugilum, in quo potarat, delapsus; occipite contuso, ollè tamen calvariarum integro, vera, & forti apoplexia correptus fuit. Convenimus ad illum quotquot Leodii erant Medici: omnibus qui aderant illum desperantibus, atque soli prognostico relinquentibus, Rogavi Patres, & Virgines Anglas quæ aderant, quibus tum ordinariam Medicinam faciebam, parerentur me aliquid tentare, remedium, ut nullo modo anceps experiri? Illis annuentibus validè consulto & agitato clysterem acerrimum injicio, quo duabus horis cessante, & glande acri evocato cum insigni evacuatione, toti capiti raso cataplasma, ex simo co-

lumbino, euphorbio, pyrethro, sinapi applico; hinc multæ magnæque vesicæ cum se luttigerent, omnibus forcipe lectis, aquæ flavissimæ plurimum effluxit, superpositis rubrorum caulium contulis foliis, multà jam nocte domum redeo.

Postridie specierum hieræ colocynthidos dragmas duas, castorei dragmam semis, rutæ scrupulum, cum aqua antapoplectica propinavi: quæ potio cum ex voto successisset, cucurbitulas humeris cum scarificatione applicui, unde minuo stertore, salivaque circa os omnino siccata, in speciem erectus, vesicis capitis non amplius fluentibus novas in nuca & vicinia, sed solis cucurbitis excito, quod quando meum inventum est, neque quod sciam ante me cuiquam usitatum, libenter vobis communico. Capiō latioris orificii cucurbitam vitream, aut vitrum humilior quo Mosellanica, aut Rhœnana vina sorbemus, illis stuppâ ardente ut sit munita, ubi libet applico; cum per horæ quadrantem hæserint, detraho, novamque cum flamma, quam possum maxima stuppam appono, pauld post in junioribus & eularis, (in senibus aut densâ cute prædictis tardius) vesiculæ surgunt, parvarum acicularum capitella vix æquantur; quibus omnibus horæ spatio coeuntibus, surgit vesica maxima, & orificio co. urbitæ, aut vitri, par vel major. Tum si vas vitreum, quorum multa huic usui paravi, non habet foramen cerâ obductum, quo acu perforato, flans exeunte spontè sua cadit, plerumque vitrum cultro peredilum frango, alioquin vesicam dum manu avellitur lacerans, dolorem ævum excitat. Hinc educta semper magna aquæ copia, efusaliibus discibus caulis folia, extra qua rigescit tempus, macram muscoli bovini carnem alligo, tandem, tum illa virore & fetore movendam se indicet. Hoc modo innoxie & intra horariorum spatium, certo certius surgunt vesicæ, cum omnia alia vesicantis post multas horas sæpe spem nostram eludant, morbumque vel procrastinent, vel contumacem aut etiam invictum reddant.

Quarta demum nocte cum naturaliter dormisse visus, jamque liberius respiraret, neque tamen oculos aperire, aut ulla sensus vel motus signa edere posset, alimentis convenientibus maxime decocto cicerum, & tenui mulso, pro potu præscripto, totum decipit spinæque medullam, aquæ catarrhali cum petroleo remixta, peruxi; plerisque horum remedium ad vigesimum diem continuatis, addendo etiam in cibo & potu balsami Peruviani, aut olei succini aosis guttam, aut olei rosmarinii salvique, chymica arte educti; cum interm aliquoties alvus bonis pusculis & melicerato rigata, jam spontè officium faceret. Die vigesima primâ, oculos aperit, caput leviter morat, & jam carpit, temporibusque pulsus redierat, ita ut de salute ejus jam securus, rogarem num loqui posset: Eii respondit, quod Anglis ita significat. Cæterum cum utgerem, aliud quid pronuntiaret, nec illo nec altero die, syllabam extorquere potui, ipso quoties aliquid dicere jubebatur, amarissime flente.

Suspiciatus de paralyti musculorum, aqua antapoplectica, cui insuderam sinapi, staphidam agriam, baccas lauri, pyrethrum &c. os continuo collueret imperavi, cum liberiore linguæ motum notarem, dixi recitaret orationem dominicam, cum ille cancellatis manibus, oculis sur-



sūm veris, tantū, quantum ad hanc diem non vidi lacrymarum imbrem profudit, ita ut jam & si loquelæ ulum habuisset, nimio illum fletu & suspiriis amittit; multo post cum lacrymas abstergeret tempore: sequere, inquam, me dicentem, dicebat: Ille hianti ore & tanquam aeris aucupio intentus, æpius ut Pater diceret sollicitatus, pūm in tandem protulit syllabam, deinde alteram, eodem prorsus modo quo pueri Abecedarii. Sic paulatim redeunte quam penitus amiserat reminiscencia, & musicam, & fidium peritiam recuperavit, decimaque demum à calu septimana, conuicta vitæ munia integrè obivit. Simili fere modo mulierem curavi; nisi quod huic ex octo gradibus delapix in occiput, cum nec concussione, nec pilorum vullione septem qui aderant Medici, ullum ab illa vitæ signum extorquerent, acicul. m. p. ziongam inter pollicem pedis sub ungue adegit, è cujus orosifico sensu excitata, momento citius, magno clamore edito in lecto confedit, sed paulo post iterum concidit, at mox ad se rediit, antapoplecticisque remediis adjuncta intra diem septimum omnino convaluat. Neutri sanguinem detraxi, quia plethoræ suspicio nulla, & utrobique cacoch. mixta signa manifestissima. Tertium curavi apoplecticum Anglum in cujus caput, magna porta, cum trabe cui adhererat, deciderat. Illius capiti raso post universalia impo- si emplastrum Alexand. Benedicti, quod etiam Franciscus Valerola commendat observ. 9. lib. 5. quod quia fidium inveni, hic describam.

℞. Gummi. hederæ, ceræ, terebinthinæ ana ʒij. resin. purgæ ʒb. succ. corymborum. hederæ ʒiv. ammoniaci ʒij. olei rosar. ʒij. s. farinæ sabbatim q. l. f. cerotum. *Hær. Ab Hær. observat. Medic.*

Vit quidam temperamento phlegmatico, sanguineus, 55. annorum præter propter, posteaquam præcedentibus diebus symposiis opeiam dedisset, in prandio, inter cibum porumque incipit balbutire, mox insequens apoplexia terminatur in paralytin lateris dextri, quam comitatur inexpugnabilis dormiendi cupiditas. Secundo die morbi adveniens, ægrius omnino repetio soporiturque deditum, facie tamen sana, & omnia intelligentem, solum latere dextro immobili, & paralytico: præmissis morbi curatū difficilis prognostico, illico hunc clysterem injiciendum curavi.

℞. Rad. angel. zedoar. ana ʒj. fol. rutæ, cent. min. origan. serpill. beton. mercutial. ana m. i. s. Sambac. cent. min. cordial. omnium ana p. s. sem. cumin. anis. ana ʒb. bacchar. laur. ʒb. fol. sen. elect. ʒj. f. decoctio in colat. ʒx. dissolv. diaphan. diacathol. ana ʒj. bened. laxar. ʒb. ol. chamæm. meth. irin. ana ʒj. f. l. gemm. ʒj. f. clyster. statim inj. ien ius, Interius accepit per vires cochlear unum hujus aquæ apoplecticæ.

℞. Aq. hirsut. apoplect. Lang. ana ʒj. aq. pzon. lil. convall. ana ʒb. ol. succin. gutt. vii. m. diligenter ad vitum. Postea vertex, totumqueincipit unā cum nucha, illinebatur primum cum ol. succin. calidè, deinde cum hac aqua.

℞. Aq. sal. colmar. lavendul. ana ʒi s. aq. vitæ opt. ʒj. ol. sal. succin. destill. ana ʒb. m. ad vitum post forum cum hac aqua illinebantur partes illæ cum his oleis.

℞. Ol. lumbricor. laurin. ana ʒb. ol. costin. nardin. ana ʒij. vulpin. ursin. ana ʒj. ol. rosinar.

lavendul. ana ʒb. m. ad fidile. Sequenti die cum in soporem subinde relaberetur, injectus est alius clyster. paulo acrior, additis spec. de hiera ʒij. colocynth. in peria ligat. ʒij. Sed neque hic quicquam promovit, tamen per horam mediam & paulo ultra subsisteret: in hœque clapsa horâ, ex indito suppositorio, tand. m bis terque deiecit. A meridie contra soporis augmentum sequentibus pugnatum est.

℞. Rad. Angelic. imperator. zedoar. tormen- till. dictamn. ana m. j. fol. satureiæ (quæ contra veternum peculiaris) m. ij. lavendul. rutæ. serpill. majoran. ana m. s. coq. in q. s. vini & aceti vinosi pro decocto peritæ duplicatæ hoc liquore imprægnatæ, tam fronti, quam nuchæ calidè adhibeantur, & sæpius renoventur. Succus rutæ cum aceto acerrimo mixtus, ex spongiâ subinde naribus obiectus. Intus de hac mixtura oringestum.

℞. Oxytel. icellit. ʒb. mithridat. el. ʒj. Castor. pur. ʒj. cum confectioe anacardina fiat mixtura. Oleo etiam sequenti paulo fortiori præeunte aqua supratriptâ, juxta cum spina dorsi, nucha calidè fovebatur.

℞. Ol. laurin. petrol. ana ʒj. ol. castor. laterin. ana ʒij. euphorbii pulv. ʒj. ceræ rubr. & aceti parum M. F. Linimentum. Pulvis pariter sternu- torius naribus insufflatus est. Gargarismi etiam tentati. Denique ut in tam magno peneque des- perato morbo, nullum remedium aliâ salutem prætemitteretur, clysteris suppositoriisque nihil aut parum efficientibus, sequentes pilulas capita- les pro revulsione ac minoratione repletionis illius apoplecticæ præscripsi.

℞. Extract. pil. cœch. ʒj. gummi gutt. lax. elect. gr. v. castor. elect. gr. iv. ol. succin. gutt. iij. Syrup. de storachad. q. l. f. pil. num. v. inaurantur, quia deglutire non poterant, sic dissolutas propi- uavi.

℞. Aq. pzon. sal. ana ʒx. dissolv. pil. prædict. adde aq. cinam. perlar. ana ʒj. sp. vitrioli, gutt. iij. m. f. haustulus brevis. clapsa horâ excre- vit aliquoties materiam duram, nigram, foeten- temque, pro majore revulsione, ab utraque parte nuchæ applicata sunt vesicatoria, sed omnia præ- stidia frustra, nea, *Joannes Petrus Lotichius. obs. 10. cap. 1. lib. 2.*

Fortissimâ apoplexiâ correpta fuit mulier qua- dam 48. annorum habitu corporis *diapne* ac car- nolo concidit subito. Seniores Medici vocati ni- hil spei superesse judicabant; tandem 16. ab inva- sione horis votatus accessi, tunc temporis adhuc juvenis, observavi gravissimam cum difficili ad- modum respiratione apoplexiam: pultura fortem & magnam, tentan tam esse curationem existima- vi; itaque sanguis illo die bis, & quidem satis co- piose, detractus, semel è brachio dextro, deinde ex pede: Enemata quoque hoc ipso die satis acria duo injecta, deinde singulis diebus singula, adhibita & localia quædam, ita tandem octavo ut nono die suos domesticos agnoscere cepit, & nonnihil balbutire. Postea purgantibus medica- mentis per os exhibitis, deinde *phlegmatis* po- phlegmaticis, aliisque similibus usâ, meliuscu- lè habuit; verum eo usque perduci non potuit, ut mentis ac sensuum integrè compos fieret, aut pe- dibus consisteret. Mansit reliquo tempore im- potens: sedebat ac gestabatur in sculi, ita t men- aliquot annis supervixit. *Reinbertus Dodonæus. cap. 8. obs. Medicinal.*



Ab hinc quatuor annis, prælidem valentem, qui ab obstructione venarum jugularium, & carotidum arteriarum apoplecticus penè considerat, liberali sanguinis detractio, curavi, hunc etiam in apoplexia totam noctem dormire permisit, quoniam abique stercore dormire vius est, unde melius nabit, nam si cum stercore dormiat apoplecticus statim excitandus est. *Ludovicus Duretus* in annotat. ad cap. 7. lib. 1. *Jac. Haller.* de morbis internis.

*D. Serevelius* anno 1639. commemoravit mihi quod Hagæ Comitum tractasset Chyrurgum quendam apoplecticum, quid statim ac corripiebatur morbo, clamabat pellis humana: *Serevelius* quærebat quid ea vellet? collo appentiam dicebat, eo morbo enim ante tempus aliquod apoplecticum Germanum sanatum vidisse qui subinde cutem humanam expectabat: quam cum ipse à *Petro Pavio* anatomiz Professore *Leydensi* petiisset, illico collo appenlebat, & apoplexia planè liberabatur. *Ortbo Henrinius*, ad cap. 3. lib. 5. pathologiæ *Joan. Fernellii*.

*Ex consuetâ Hemorrhagiâ narium suppressione*  
*Apoplexiâ.*

Ad

*Clarissimum atque Doctissimum virum,*  
*Dn. Ioh. Iacobum Craßium, apud*  
*Neocomens. Doctorem Medic. ordin.*  
*atque celeberrimum,*

cui

*Guilhelmus Fabricius Hildanus S. P. D.*

Quemadmodum superfluz evacuationes, clarissime atque doctissime *Dn. V. Craßi*, periculose sic quoque videmus, si consuetæ fuerint retentæ, perniciotum atque exitiale esse. Id mihi cum alias, tum etiam *Lausannæ* videre contigit, *Historiam*, quia annotatione non indignam esse sentio, T. Exc. communicare non gravabor.

*Simon Clericus*, *Aurilaber Lauanensis*, natione *Gallus*, homo pius, sanguineus & robustus, hemorrhagiæ narium a juventute ita obnoxius fuerat, ut etiam sæpius sanguinis ad uncias aliquot pro vice efflueret, singulis annis, aut biennio semel tanto impetu erupit, ut difficulter cohiberi posset. Cuius rei ego testis sum ocularis. Anno enim 1586. cum sanguinis ei impetuosius copiosissimeque ex naribus proflueret, aded ut de vita periclitaretur, una cum clarissimo *Dn. Jacobo Auberto Vendone*, piz memoriz apud *Lausannenses Doctore Medico* longè celeberrimo, amico ac fautore meo plurimum honorando, in consilium adhibitu, sanguinis fluxum ipsi non sine difficultate multisque laboribus restrinximus. Convalescit tamen divino favore, & per annos aliquot supervixit. Tandem adultior factus, cum eminens aliquod periculum ex crebra hemorrhagiâ narium sibi metueret, & ad sanguinis profluvii præcautionem amuleto quodam collo appento, fluxum inhibuisset, apoplexia correptus fuit anno 1589. Ex qua protinus animam Deo reddidit, cum annum sexagesimum ætatis prætergressus esset. Post duodecim horas ab obitu, cum cadaver jam sepultum tradendum esset sanguis copiose e naribus & ore emanavit. *Fabr. Hildan. obser. 21. cent. 3.*

Mulier quædam pia & honesta, nomine *Bonadonbelle*, *Bylantina*, commater mea, ætate quadraginta annorum, valde obesa, cacochymica, admodum plethorica, destitutionibus, doloribusque præcipuè capitis, ventriculi suffocatione uteri licet ante biennium ipsam eâ laborasse, & per tres horas morti quasi similem fuisse, tum animum recollegisse, (ego ocularis testis) necnon hemorrhagiæ potissimum eo tempore, quo menses retenti fuerunt, omnino sarcinam menstrualem copiose per os & nares deposuit, à multis annis obnoxia fuit.

Inde ipsam apoplexia, (ut postea dicetur,) plethorica, cum lubidè quasi attonita concidit, prius tamen benè se habens, & in officina sua nens, & mori excepta, perdifficili respiratione, pulsu vehementi, magno ac veloci, & omni sensu privata, vitam cum morte commutasse, quid credibilis? affluxio namque ista consuetâ sanguinis, non neglectâ in temperie, atque mala dispositione ex interioribus corporis partibus, majori ex parte ad cerebrum, quod omnium adionum animalium fons, author, & principale, necnon instrumentale subiectum apoplexiæ, abique violenta & agitatione internorum viscerum: live valvularum venarum præcipuè jugularium, tam internarum quam exteriarum, ut *Hippoc. 4. de vict.* ac atque resistentiâ facta non fuit. Quamvis *Fernellius 5. De partium morbis & sympt. cap. 3.* assistente *Gal. 5. de sympt. causis cap. 6. & 3. 4. loc. aff. cap. 27.* asserat apoplexiâ fieri ex causis frigidis, pituitosis, lentis, crassis, & vis. i. n. quæ ventriculos affari implent, sicut refert *Ælius* capite de apoplexia, functionem radiorum spirituum animalium impediunt transire ad musculos respirationis: unde systole & diastole diminuitur seu aboletur, ac finis respirationis tam cerebri, quam cordis tollitur, qui est eorum refrigeratio, recreatio, live augmentatio, & extremorum expulsio, atque tandem vel lubidè vel brevi, idque secundum latitudinem obstructionum, uti in hac muliere vidimus, spiritus & functio animalis suffocantur: tamen alibi, ut lib. de sang. miss. cap. 7. & 4. de vict. in morbis acutis comm. 27. in lib. introduct. live *Medic. Avicenna can. 3.* Non negant & plethora nonnunquam id fieri posse, quoniam, ut aiunt, tempore potissimum veris nonnulli venæ-sectione ab ejusmodi morbo liberantur: id quod nobis in nostra muliere apparuit. Non eo tamen inficiâ, sanguinem pituitosum fuisse, quia maximè repleta ac cibis horariis, quibus summo prære delectabatur, crudos indigestosque humores fovit, putredo inde interna genita in causa fuit, quod læpissimè febricula laboravit, unde cerebrum incalcraftum, humores quodammodo liquecendo affatim delabi sivit. Sanguis insuper menstrualis retentus, sursam regurgitatus, ventriculos & ductus radiorum facultatis sensitivæ, & motivæ, ita è toto occupans, replens atque obstruens, ut vim animalem in reliquum corpus, præcipuè musculos thoracis, partim influere non permiserit, partim ipsos provocarit. Insuper talem apoplexiâ plethoricam fuisse plenius affirmatur, quod in agone mortis grumos sanguinis ex ipsius ore extraxi, sperans, ea modo maxime difficilem respirationem allevari: sed frustra. Deinde non parvum adminiculum dedisse, planè credendum, hysterica passio, qua aliquando, ut superius anno-

cavimus



tavimus laboravit : Et hoc secundum Avicennam cap. 13. qui etiam apoplexiam procreari dicit à communitate alicujus membri : maximam autem habere cerebrum cum utero, & conera, lippis & tonsoribus notum. Et has fuisse causas, & quidem materiales, concomitante quadam intemperie, totum cerebri corpus occupantes reor : quamvis aliam adjungat *Gal. comment. Aphorismi 42. sect. 2.* ait, fieri quoque à dispositione simili inflammationi : quod intelligitur ab Avicenna, apoplexiam fieri à copioso sanguine, qui non egreditur vasa : id est, venas, arterias, alias fieret inflammatio, quæ tunc non esset, *Alph. 42. sect. 2.* Sanguis ergo vasa non egrediens, ea vehementer replet, affectum similem inflammationi efficit : Et fit angustia, quæ est compressio non substantiæ, sed pororum cerebri.

Summopere certe admiratus, audiendo, ipsam quandocunque menses suppressi erant, sanguinem & per os, & per nates ad aliquot dies copiose expuere atque emungere, ac ita sarcina menstruali per ea loca liberari : quod cum factum, bene cum se habere, uti illæ, quæ mensibus per vias naturæ designatas purgantur.

Et hinc proculdubio una inter alias promittitur ratio, quod nonnulli semel, sicuti ipsamet mihi retulit, conceperit, & conceptum non diu retinuerit, quanquam hoc majori ex parte plethoræ & magnitudini corporis adscribat. Menses enim cum adhuc ordinariè & secundum naturam fluebant, maximam semper copiam solebat excernere. Et hæc, qua fieri potuit brevitate, de duabus hujus historiarum partibus dicta sunt.

Nunc eadem conditione, relictis quamplurimorum opinionibus & sententiis, & tertiam subnectemus, quæ est : longè post mortem sanguinem magnâ copiâ excrevisse. Quæ proinde, cum mortua tempore consueto almæ matri committi non potuit, propter sororis distantiam, quæ ad funus etiam accersiebatur : Ideò in hypocausto calido aliquandiu manens, ob fetorem coacti fuerit feretrum immittere, quod in culina erat, aliàs propter angustiam & incommoditatem domus, foras portari non potuisset : Locus non minus calidus, quàm in hypocausto ; Addo & insuper, quod eo tempore loco frigoris, & Austri & pluvii satis diu regnabant : quæ duo, calor videlicet externus, tanquam causa efficiens, & humiditas tanquam materialis, quàm plurimum augent putredinem, ut *Gal. 4. 9. Methodi Med. cap. 3.* Calor proin aëris ambientis in hoc cadavere putredinem non parum juvit. Idque secundum putredinis naturam, ut *Gal. 11. Meth. Med. 8.* quæ est mutatio totius putrescentis corporis substantiæ & corruptelam, à calido externo, vel in corpore ascititio vel aliunde adveniente : quæ omnia causam hujus fluxus maximè promovebant. Calor enim naturalis nondum omnino extinctus, focus præternaturali & adventitio seu extraneo, tam hypocausti culinæ, quàm temporis Australis & pluvialis proprio enim calore nihil corrumpitur, siquidem putredo juxta Aristotelem, est corruptio seu interitus proprii atque innati caloris, per externum & adventitium, in unoquoque humido proveniens : ex crudis, pravis & retentis humoribus, putredinem, vapores atque flatus excitavit, qui quoniam calor non minus non dissipat frigus non ingens, non coacti seu condensati, uti Aristoteles dicitur, nimium ca-

lorem vapores consumere, contra frigus eos consistere & impedire, verum horum medium fovere, idè adèd aucti fuerunt, ut ventrem tympani instar intumefactum intenderent.

Non sanguis in venis, contentus, ac nondum calore insito totaliter privatus, quamvis mors non aliud sit, quàm caloris nativi extinctio ut *Gal. 2. de temperam.* docet, motu vel intrinsecè vel extrinsecè excitato, ut videre libet in cadaveribus morte violentè sublati, aliquando post multos dies ex vulneribus sanguinem prominare, potest moveri, non ilicò enim cessat, præcipuè in eis, qui morbis chronicis non sunt consumpti aut exenuati, quemadmodum fuit hæcce mulier, quæ nullo tunc temporis morbo apparente laboravit : quamvis videatur animâ efflata corpus subito tetrigerari, poros, vias, ductusque ita contrahi atque coarctari debere, ut humores seu sanguis omnimode in loco retineatur, & arctè incarcerationetur, propter insitam tamen arteriarum & venarum proprietatem, sanguis quandiu in ipsis continetur, non coagulatur, extrà verò quamprimum, sed semper liquidum ac fluidum conservant, id quod ultra auctoritates, autopsia nobis, & anatomicæ sectiones, uti & quotidiana experientia ostendunt, sicuti mihi semel Batilæ videre contigit, in quadam adolescente, qui aquis submersus, decimo sexto demum die repertus, merum, & non loturæ carnis similem, ut quis inferre posset, sanguinem per os & nates omnium cum admiratione ejecit. Putrilaginosi igitur isti vapores ex retriis & feculentis humoribus tanta copia excitati, humores in calore foventes, vias ductusque quæ spatio viginti octo horarum contracta & clausa, proculdubio propter jam instigridatum & rigidum cadaver erant, releserunt, ac per *ostium* sanguinem excluserunt, ob compressionem flatuum in ventre inferiore excitatorum : qui adèd ventrem implentes ac replentes, sanguinem præcipuè in vena cava contentum, sursum expulerunt ad venas jugulares, quæ sine dubio jam debilitata ac laxa erant, potissimum intertnas : quæ magis aperta propter calorem, qui aliàs aperit, rarefacit, liquefcit, humores attenuat, & sic fluxum aliquo modo accelerare potens, ubi *arctioris* consuetam sanguinis menstrualis exclusi reperiens, itaque propter repletionem erumpere cogens, & per os & per nates copiose exiit, & hanc unicam hujusmodi fluxus fuisse rationem principalem, quamvis non ignorem, & alias multas posse esse, quæ ora venarum seu arteriarum cerebri, vel aliarum partium accedine, calore extraneo, calu, motu, ( fieri enim inquit Lemnius, potest ut sanguis, qui in venis delituit, agitato, motoque corpore erumpat ) quantitate, qualitate corrodunt & aperiunt : planè mihi persuasum. Et hæc insuper etiam causa est, quod ret quaterve per horam colorem faciei mutaret, cum mox vividum, rubicundumque, mox pallidum ac morti similem habebat. Nam quoniam, ut diximus, admodum cacochymica erat, calor qui conveniens ex putredine flatus excitavit, qui cum comprimentes venam cavam sanguinem sursum expulsum aliquid in venas capillares vultus intruserunt, qui tandem ibi manens colorem tunc, quamprimum autem per os seu nates efflatus, fuerdè pallidum peperit, alius deinde cum appulsus, rursus vividum, cum ejectus, lividum effecit : idque sæpissimè, ac per intervalla, quod adstantibus



bus & causam hujus nescientibus maximum horrorem, dubiumque ipsius mortis in. ultio: exultantes, pliusquam miraculum ac inauditum quid, necnon omni ratione desititum esse: ideo me advocant; id cum vidissem, statim supra recitatis rationibus cuilibet labello compescui, retrorem excussi, & ad rectam veramque hujus rei opinionem induxi: & hoc per horas novem duravit, tandem post mortis horam 37. tenax commissa est. *Joan. Jacob. Crassius apud Fabricium Hildanum cent. 3.*

Civis & Arcularius quidam Bernensis, Vir probus, & 50. circiter annorum ætatis, homo cacochymicus & obstructionibus viscerum laborans, cum anno 1623. 9. Februarii, circa 6. vespertinam, inter pocula alacritationem cum patricio quodam habuisset, & colaphum acceperet, protinus in pavimentum hypocausti cecidit, & aliquantisper veluti ex nimis permansit: paulo post tamen ad se rediit; surrexit, & ad res suas (quæ non procul absunt a loco, ubi percussus fuit) se contulit, ubi apud domesticos de dolore capitis conquestus est: nihilominus tamen iusculum sumpsit, sed mox evomit illud cum reliquis cibis indigestis. Ad lectum se confert, perseveranter tamen dolore, & tædii quiete dormit usque ad horam primam noctis, tum veluti rigore quodam correptus subito loquelam amittit, sicque apoplecticus, & postero die circa meridiem, naturæ debitum percolvit. Post mortem sanguis, pinnicæ vitæ mixtus, copiosè per os emanavit. Dorsum lividum erat. Posterior quin etiam pars capitis, & nucha intumescita reperta fuit.

Potius quomodo id acciderit, quod levissima illa causa & casu mors successerit, perquisitione dignum est. Arbitror ego, post ictum colaphi & casum, commotionem cerebri sequutam esse, id enim inde colligitur, quod veluti exanimis mutique permanserit, & cibum indigestum rejecit. Sunt enim hæc signa commotionis cerebri certissima. Si casus aut percussio capitis præcesserit: In hac potius agitatione & concussionem cerebri ruptæ fuerunt venæ (sanguis, qui ex ore emanavit, testis est) ex quibus sanguis effluxit, ventriculosque cerebri, & ipsius anfractus opplevit, & spiritus animales suffocavit, ita ut partes infra caput existentes deducere non possent. Hinc apoplexia illa maxima, quam fortrem appellat Hippocr. lib. 2. aphor. 42. Hæc verò ita se habere, ex Galeni libro de sanguinis missione colligitur, ubi hæc habet verba: nonnunquam (inquit) priusquam conpirescat sanguis, ingens ipsius vis decumbit in partem aliquam, quam aut omnino, ita ut ultio ipsius pereat, aut si certe nonnam non contemnendam insigit. Huc si quidem patto apoplexia eveniunt, multo nimirum sanguine incumbente in animantis principium. Hæc Galenus. At apoplexiam hoc modo ex ictu aut casu fieri posse, etiam experientia, & viri docti testatur. Placenis inter alia hæc quoque habet verba. Extra vasam sanguis delatus, si non in cerebri substantiam insusus inflammationem pariat, tunc enim phrenitis fieret, sed anfractus & ventriculos subito oppleendo obstruat, nervorumque initium premeat, stuporem & apoplexiam causat: ut frequenter rupta vena accidit: idque nonnunquam ob plethoram ad vasa inferiora, quibus consuevit hæmorrhagia per menses

hæmorrhoides & naves subliterant. Idem à causa externa violenta, ut cerebri concussionem, ex ictu vel casu potest accidere: nisi cerebri substantia vulnerata minime sit, ut sanguis quoque cerebri cavitates, ipsiusque substantiam, ex locis præsertim ubi confusa est oppleat. Hæc. Plac.

Sed quaestio est, cur non è vestigio post ictum & casum, sed saltem post aliquot horas sequuta sit apoplexia? Respondeo id evenisse propterea, quod venæ disruptæ in capite fuerant exiguae, & proinde sanguinem sensim ex eis ad ventriculos fluxile, eosque oppleville. Pituirum quinciam (quam in hac apoplexia ex præcipuis fuisse causis morbi, viscosus ille sanguis testatur) quia tardè moveretur, non tam celeriter ex remotis partibus ad ventriculos cerebri confluere potuisset. *Guilielmus Fabricius Hildanus, observationum cent. 6.*

Domina Sara Schvevin, à multis ab hinc annis propterea sua robusta, pa omque morbis obnoxia, imò etiam hæc hy. me, quæ tamen propter intemperantiam, & inconstantiam aëris (ut ego etiam in memorato experior) senibus gravis & valde molesta fuit, provinciam suam cum laude administravit. Cæterum decimo prædicti mensis, circa meridiem, quam ex improbo & agresti tabelario literæ ipsi transierant essent, & ex eis inopinanter intellexisset, filium suum, qui in Dalen, in Argovia hujus Reipublicæ antiquus pago, Ministrum Ecclesiæ agebat, quemque unice amabat, diu suum clausisse; adeo mente fuit commota & cordolio prostrata, ut vix perlectis literis, in grabatum se projiciens, protinus syncope correpta sit. Adstantes hac de re non usque adeo solliciti (cuius enim ex Medicis vocatus fuit) optimam ac piam hancce matronam sine auxilio ex arte præscripto derelinquunt, & mulierculatum, imperitorumque hominum remediis ipsam refocillare tentant, sed frustra; Hæc quum mihi ab amico quodam meo nunciata essent, protinus & quidem ultro accuro, an forsitan opinor maioræ anxio esse possem, verum fessille me opinio: sine loquela enim, intellectu, & plane apoplecticam ipsam inveniri, ita ut sequenti die extincta fuerit illa, quæ præcedenti die corpore adhuc sana & valida, ad meridiem usque per urbem ambulaverat. Vides, quam pernicioz sint passionis animi, præsertim in corpore senili, si subito & inopinato acciderint. *Guilielmus Fabricius Hild. observ. 12. cent. 6.*

Somnambulo quidam, ætate ann. 1633. ex altro medium se in straturam silicem via publicæ præcipitavit: artubus misce conquallatis & cranio hisso cum collectione sanguinis sub cranio. Egro & altantibus trepanum abhorrentibus, bis venæ sectionem adhibuit: totum dorsum oleo discutiente inunxit: truncum pelte arietina adhuc recenti detractione catente involuit: Capiti taceulos cephalicos in vino coctos applicuit: cerebro dedit Tincturam automaticam: vinum denegavit, propinavit decoctum corn. cervi alvum lussuavit brodio prunorum lax. & suppositoriis. Vires suinde refocit aqua Cord temperata, sic convalescit. *Joan. Jacob. Wepfer. tractat. de Apoplexia. Ex Ephemer. Burge Werig.*

M. G. V. D. M. Tempus sinistrum, casu ab alto per scalam lapideam, vehementer allitit 1634.







Livida eventientia, in febre, brevem mortem significante.

Potuit itaque, hæc repentina suffocatio, has quidem produxisse maculas: sed rarius cum occurrant in eorum pulmonibus, quos occidit morbus attonitus: & contra frequentius, in illis quibus Nicotiana fuit in delitiis, non incon-sultum fortassis erit, excutere hic naturam illius sumi: qui aëri permixtus, & ore attractus, tam bene facit ad multorum palatum: ut cum præferant omnibus epulis; modò non & ipsi sanitati: quàm tamen humano generi nihil utilius.

Extra omnem itaque controversiæ aleam est, Nicotianam potui datam, tantùm adversari ventriculo, ac intestinis: quantum prodest humido, ac frigido cerebro. Sed dubitatur, utrum fumus ipsius offendat pulmones? calida quippe est planta; imò actis ac yellicans: sive naturâ, sive arte. Ex pulvere videlicet euphorbiæ, pyrethri, piperis, aliorumve actuum aromaticorum, lucti causâ, à fraudulencis, ac invidis mercatoribus, clanculùm, contortis ipsius foliis, insperso. Quorum omnium vapore, verisimile est non minùs offendi pulmones, quàm à raphani agrestis, ac piperis tritura, cerebrum stemutans.

Immodicus namque calor, ut exhaurit humidum radicale; sic obsecrat nebulosius ipsius fumus, non parùm, illustrem nostræ vitæ spiritum: imò suffocat tam efficaciter calidum innatum, ut instat tabidorum (qui ex sententia Galeni, à siccitate consumuntur) planè extenuentur, cum tussi pereunt; & insatigabili spiritus difficultate. Quæ duo arguunt inextirpabile, oppressi pulmonis, vitium.

A quo equidem plurimos, qui dies, ac noctes cum hac Helena transegerant, vidi pessundatos. Moderata certe uti nullo, sic neque hic culpan-tur. Sed modum in hoc fumo si excelleris, defari-gaberis à tussi, vitiabitur pulmo, emarecescet ani-mus, & tandem consumetur corpus universum, vel lentè, si fueris integer, ac valens: vel celeriter, si quid vitii alibi sit in visceribus. Sicuti videre fuit in hoc ægro. Quem eò, proculdubio, citius strangulavit morbus attonitus; quo minùs poverit reluctari, & spiritum ab interitu vendicare, exsuccus, ac maculosus pulmo. *Nicol. Tulp. Observ. Med. lib. 1. cap. 6.*

Joann. Jacobus Reiter Kenzingi-Brisgoius, ætatis circiter 45. annorum; habitu corporis gracili, capillis flavis & crispis præditus, ingenio pollens; honestis parentibus Patre scilicet Consule prognatus; à puero literis operam dedit, ac laute victitare potuisset, nisi miserranda & Germaniam universam devastantia obstitissent fata: quæ cum & patriam communi calamitati involuissent, varia passus, inprimis truculentam famis tyrannidem gravissimè anno 1634. experius est, quæ malesuada ipsum coegit, etiam his vesci quæ natura, ceu venenum aliàs hortere solet. Hinc post multa discrimina & casus Rheinovium appulit, ubi aliquot annis Ludimòderatorem egit: Tandem à Reverendissimo & Amplissimo Domino D. Bernhardo à Freiburg, celeberrimi eundem Monasterii Præsule optimè merito, Domino meo plurimis nominibus colendo, intra Monasterium aditus fuit, ubi Clavicularis munere aliquot annis fideliter functus est. Patius semper, quandiu ipsum novi, comedit, indulgit verò plus poculis, adeò tamen ut non nimium Baccho litaret. Ad iram paulò pro-

nior, non tamen rixarum amarus, nec lites ex libus ferens. Aliquoties, in hoc Monasterio vivens, podagra excruciatu fuit, quæ primis annis in pedum articulos sevit, sequentibus tamen nec reliquis articulis pepercit: Dum cum hoc morbo luctabatur, nihil agnus tulit, quam si podagra nomine insignitus ille fuit. Ab anno verò & quod excurrit, aucte obitum nunquam ejus consuetam sevitiam sensit, sive id medicamentorum clanculùm usurpatorum culpa, sive naturæ imbecillitate non potens morbi causam amplius ad articulos, ceu ignobiliora loca protrudere, factum sit. Hinc circa id temporis tulli molestissima diu vexabatur, adeò ut phthisicum crederetur, quæ podagrarum supprella tribuebatur. Verùm idoneis à me propinatis remediis, tussis cessavit & satis commodè per integrum fere annum valuit, si herniam intestinalem excipias, quam tussis violentia effecit. Anno 1655. 7. die Novembr. quinto die à plenilunio, mane sanus salusque, quantum omnibus constitit, Reverendissimo D. Præsuli sacra peragenti assistit, quibus peractis in conclave suum se consueto more contulit cum fortè fortuna famulorum quidam ipsum convenire voluisset, reperit ipsum humi prostratum, ad vocitationes surdum, & ad concussiones & corporis vellicationes, instar trunci, stupidum; accurritur, infunditur aqua antiapoplectica, atque alia, his, quæ ad manum erant, tentantur, sed omnia frustra. Accertor & ego: cum post bihorium advenissem, vidi illum ex pallore livescentem, sensibus omnibus & motu animali orbaturum, solâ respiratione, primùm satis ordinata, excepta; & nisi respirantem vidissem, primò intuitu Leptothymia vel omnino syncope affectum visissem, adeò exsanguis facies erat ac livebant extrema, & cum naribus ad tactum perfrigebant. Pulsus primò validus, magnus, celer, mox debilior, minor & crebrior, respiratio quoque laboriosior, mox inæqualis evalit, ac sæpè penitus cessatura videbatur. Nullum genus congruorum remedi-orum omisi, venam in debili tamen & brevi expiraturò tundere non ausus fui. Hora decima antemeridiana motu quodam convulsivo aliquoties totum corpus concutiebatur, plurimumque sputi albi, vitæidi, lenti ex ore emanabat, nihil vero cruoris: hinc magis magisque vires labasce-re, ac extrema amplius frigescere ceperunt: Hora prima pomeridiana ejusdem diei vivere desit. Statim ac morbo correptus fuit, plurimum solum nigratum per alvum excrevit, quod vino cuidam chalibeato tribuit, de quo tum temporis, nescio ex cujus empirici consilio, aut quem ob finem singulis mane & vespere cyathum epotare solebat. Indulgentià Reverendissimi Dom. Præsulis antea memorati, Patroni literarum omniumque bonarum artium summi, caput aperui: remoto cranio ac discissa dura meninge plurimum cruoris profluxit ex spatio, quod inter eam & tenuem meningem satis capax est, copiose p. n. undique & undique eò effusum; neque enim solum circa basin cerebri cruor stagnavit, sed & verticem utque & ad anteriora & posteriora pertigit, quin etiam intra anfractus quotquot fere cerebri sunt, se insinua-vit. Ventriculis detectis repetii & illos omnes cruore adimpletos; nec quarto quidem excepto, quorum laterales, propè basin quasi laceri, ac si nimio cruore distenti rimas egissent. Cruoris extravasati quantitatem duarum libra-



rum pondus superasse non difficile divinare potui. Toto cerebro, ventriculis & superficie à nimio & grumoso sanguine contaminatis, ulterius nihil observare, nec vel ruptam venam aut arteriam deprehendere valui. Hoc tamen certum est, nullam causam violentam externam, sive ichum, sive casum, tantæ rupturæ vasorum sanguiferorum auctorem præcessisse, cum derasis capillis & ablata cute, ne minimum quidem contusionis alicuius vestigium apparuerit. *Joan. Jacob. Wesper. de apoplexia.*

*Barbara Zuberin.* Septuagenariæ vicinior, totum ferè vitæ cursum in famulatio consumpsit, ac jam senex desponsata, utramque vitam toleravit? Vidua in Nosodochium recepta fuit: Habitu corporis erat mediocri, & quantum mihi constat, non multum morbis conflictabatur, nisi quod ab aliquot annis visus ipsi imminui cœperit, quo quandoquæ tantum non penitus privabatur, quem tamen brevi, citra ferè impediam opem, aliqua ex parte, recuperabat, protinus recrudescente malo: nunquam tamen cæca omnino evasit. In utroque oculo manifesta suffusionis exordia conspici poterant. Jam ab aliquot mensibus apoplexiæ prodromi in ea ab astantibus animadverti sunt, dum subinde lingua citubavit, mox tamen hoc loquelæ vitio cessante. Anno 1657. 29. Januarii 20. à Plenilunio die, hora 3. pomeridiana, dum ut rebantur, sana cum locis fila trahebat, subito sermonis usum perdidit atque inclinare corpus visa est: mox ab ancillis in lectum ducta fuit, incessu illo observatum est adhuc dextri lateris pedem illam movisse, manum ad caput sustulisse atque verba quædam, sed non intelligibilia, protulisse: statim tamen omnem sensum & motum animale amisit, permanentibus respiratione (quæ tamen paulò post cum stertore fiebat,) pulsu & faciei colore rubicundo. Remedia pauca adhibita, cum nihil amplius à primo insultu deglutire valuerit. Eodem die, hora sextâ pomeridianâ exspiravit. Altero die post meridiem cum Cl. Dom. D. Hardero collega meo honoratissimo & harum rerum studiosissimo, caput aperui: olla ablata, orbiculatim duram meningem mediam discidi, corpus falciforme à crista galli liberavi, ac laterales sinus dissecui: hinc reclinato ad latera cerebro, omnia nervorum paria, arterias carotides propè infundibulum ipsum, arterias vertebrales, ubi in occipite emergunt, ac denique medullam oblongatam in ipso officio magno occipitis, abscidi, atque ita cerebrum undique ab omnibus vinculis liberum, totum extraxi, quo penitus subiti casus proximam causam perscrutari valerem. Exempto cerebro, duram meningem ei adhuc incumbentem levavi: apparuit pars dextra cerebri superior ac posterior, inferior, non tamen ad basin usque, & anterior frontem versùs tota sanguine suffusa: cerebrum ibidem molle erat & humor quidam in eo fluctuans manifestè tactu deprehendi poterat; in eximendo hoc in latere rimam egit, ex qua prominuit grumus sanguinis nigerrimus, nucis myristicæ magnitudine: digito immisso sensim cuticello rimam dilatavi: inveniri cavitatem amplam ad frontem ferè antrotam, sursum ad corpus ferè falciforme & li-

midium, ac deorsum etiam ultra dimidium dilatatam. Longitudo hujus cavitatis, seu antri præternaturalis octo, latitudo quatuor, & profunditas duas cum semillè uncias superavit. Continuit grumum sanguinis ovum gallinaceum æquantem, præter alios minores grumos & fluctuantem sanguinem, pondere unciam circiter octo, vel integræ ferè libræ, ventriculum lateralem primo intuitu opinati sumus: Verùm accuratius inquirendo invenimus cavitatem hanc non esse ventriculum, vel ejus portionem aliquam, sed peculiarem & p. n. à sanguine extra vasa effuso formatam: & quidem ex rupto ramo aliquo, sobole insignis rami arteriæ carotidis anterioris, qui postquam nervos opticos transscendit, in parte anteriore & laterali cerebri notabilem anfractum ingreditur, ac non procul ab exortu in plurimos ramos scinditur, inter omnes cerebri anfractus medios incidentes, quandoque eorum superficiem scandentes, mox deicentur ac ulterius per medios anfractus sursum ad corpus falciforme ferè in minutissimos subdivisi furculos, ambulaturi: horum etiam non pauci nec uno in loco manifeste cerebri substantiam subeunt: Et quidem hujus arteriæ ramos unum vel plures hoc in loco ruptos fuisse, clarè & sine dubio cognoscere potuimus, nam dum illius progressum in eo latere investigavimus, primarium ramum ejusque furculos, tum in principio, tum in cuncto reliquo incessu, vacuum omnino sanguine invenimus, secus ac se habebant arteriæ ceteræ omnes, tum in parte opposita, tum & posteriores in hoc latere & anteriores quædam non ab hoc ramo profectæ. Præterea ubicunque incedebat hæc anterior lateralis arteria, ejusque rami, grumi sanguinis obviam facti sunt, sæpe pertinaciter arteriis adherentes, idque tam latè & altè, quàm hæc arteriæ disperguntur. Rupta itaque una atque altera harum, & sanguine intra anfractum profundiorum effuso, novi semper sanguinis appultu, ut unda impellitur unda, magis magisque spatium anfractus dilatatum fuit, atque dum ab irruente sanguine perpetuo pulsu, humilior anfractuum superficies depressa, aliorum interitium tenerum gracile, molle & sanguinis impetui cedens perruptum fuit, in hanc amplitudinem facillè crevit, non secus ac in aneurisma te fit, nisi quod citius in cerebro talis caveras à sanguine irruente, quam in quavis aliâ parte, ob ejus molliorem, conficiatur. Superficies anfractuum superius integra permansit, id cavente piâ matre, eos colligando & quasi uniendo: nec basis hujus cavitatis perrupta fuit, lecto seu fornice ventriculi dextri magis medulloso & tenaciorie existente, quam anfractuum interitium, quod flaccidius, est ex contrâ cerebri, ut vocat Cl. Bartholinus, confectum. In toto spatio illo, quod inter duram & piâ matrem est, nullus humor ullibi, nec etiam in basi vel occipite occurrit. Ventriculus dexter undique integer fuit: vix tantum feri suberuenti continuit, quantum dimidium nucis juglandis, putamen caperet: in posteriore & ima ejus parte plexui choroideo hydati parva adhæsit. Similiter omnino vacuus fuit plexus choroidei medio ibidem calculum gypsum, candidum, aspersum & inæqualem, seminis lupini magnitudine invenimus, alios, in utraque plexus parte, seminis milii & majore magnitudine hinc inde dispersos vidimus, in tertio ventriculo



grumulum sanguinis subz magnitudine repetimus. Glandula pinealis non accurate præstat canalis, è tertio in quartum ventriculum apertus, forsan quod ob tumoris hujus, seu aneurismatis cerebri magnitudinem fursum aliquantulum, cum quarto sinu, rapta fuerit. In principio hujus canalis parietes ejus paululum sero suberuentis tingebantur. Verùm quartus ventriculus mundissimus erat, nec vel minimam in eo labem animadvertimus. Omnes quatuor crassæ meningis sinus vacui erant à pituitosis corporibus, nec ullo in alio vase cerebri ea vidimus. In sinistro cerebri latere ne minimum quidem *γερμιν* apparuit, nec quicquam sanguinis grumoli vel alterius rei p. n. vestigium occurrit. Adè ut hoc *adversum* ad apoplexiam fortissimam producendam iussu cerit. Carotis interna utriusque ad latera glandulæ pituitariæ incedens, tum ante, tum post perforationem duræ matris, lamina ossæ & tenera in crustabatur. *Idem de apoplexia.*

Illustrissimus Dominus Rudolphus Hannibal Comes de Reingau, ultimus faminz, annorum 39. habitu corporis obeso & staturâ mediocri præditus: à multis annis melancholicus, facie attonubescens, taciturnus. *Παράφρασις*, literis addictus ac in legendis historiis plurimum occupatus. Anno 1671. 16. Januar. manè è lecto surrecturus anxietatem quandam præcepit, quàm vomitus secutus est: eodem die parùm comedit: potulenta rursus evomuit: nocturnam habuit inquietam, parùm dormivit: nocturnam inquit. Hominem pilulas sibi familiares sumpsit ante prandium: inde bis vomuit, quater d. jecit die 17. Januar. vomitus cessavit, parùm comedit nec multum bibit: manus & facies per totum diem erant pallidæ & frigidæ: nocturnam melius dormivit. Die 18. Januar. nonnisi de anxietate præcordiorum conquestus est: parùm comedit, bibit vinum cum decocto rhabarbari & macis alteratum: Circa vespertinam rursus pejus habuit: cœnavit parùm; variè faciem assidentes immutatam observant: nocturnam habuit quietam die 19. Januar. Illustrissimum Dominum plene restitutum putabant: in prandio melius quam hæcenus comedit: à mensa hora prima pomeridiana surrexit inque locum, secretiorem secessit, ubi per horæ quadrantem commorabatur: famulus ibi hominem jacentem invenit, domestici consilii facti omnes statim accurrunt inque lectum deportant. Post bihorium adveniens ipsum fortissima apoplexia jamdudum defunctum inveni. Apoplecticum verò fuisse conjeci, quia Aulici aiebant Illustrissimum Dominum postea adhuc respirasse atque illi sacris provisum fuisse. Die 20. Januar. cadaver conditum causa apertum, præsentibus multis Aulicis & D. Laurentio Chirurgo Hohenrvieleensi. In ventre intimo omnia se naturaliter habebant, præterquam quod lien valde corrugatus esset, variè incisuræ & corpora duo cartilaginosa in superficie apparent. Inter secundum Chirurgus diaphragma læsit, unde ex Thorace magna sanguinis quantitas, dimidiam circiter libram ponderans, defluebat. Thorace apertus, nec cor, nec pulmones ob maximam sanguinis grumoli copiam primò in conspectum veniebant: pendebat libram cum dimidia ferè. In pericardio & cordis ventriculis nullum planè sanguinem deprehendere potui. Pulmones nullum vitium contraxerant, demptâ

calvaria in capite, extra ventriculos cerebri sanguinem quoque, sed magis serosum deprehendi dimidiam plus minus libram pondere. Cerebrum dissecto omnia diligenter examinavi, nec qui quam tamen vitiosi animadvertere potui. *Idem de apoplexia.*

Nuper studiosus Jurium egregius infra orbitam sinistri oculi, propè natum, abique ulla læsione oculi, à milite nequissimo ense punctum vulneratus fuit. Paulo post, loquela & ratio privatus, per 24. horas se jectigans, tandem reverà cum stertore apoplecticus mortuus est. Aperto à me cranio vidi vulnus per orbitam oculi & os cubrosum propè cristam Galli factum, dextro quoque cerebri ventriculo infictum fuisse: ex quo etiam magnam portionem sanguinis attingumosi & fibrosi ad crassitatem & longitudinem medii digiti exiti: basis cerebri & regio cerebelli copioso sanguine extravasato repleta erant, præterquam quod tota cerebri molles quasi ab infima ratione etiam rubicunda apparet. *Idem de apoplexia ex communicatione D. D. Exc. Maximiliani Henrici Eggermeteri Med. Professi. Cæberrimi in Inclita Academia Friburgensi.*

Verula quædam furiatum non postrema, concitavit maritum apud egregiè verberibus redolare, quod plerumque patienter perit. Mense Jul. 1673. cum nelio quas toras leopis abstergeret insignibundaxor accurrat ac verbera intemavit, verum patientia tandem aliquando in furem versa à marito scopis in tempore dextro fortiter percutitur, adè ut dissolutis ac avolantibus scopis acuminata leopitque infixa baculi pars tempus transiret. Sanguine largissime ex vulnere emanante, à vicina amice monita ut illius curam gereret, verum tenuit, mirè in vitum convitiis debacchata est ac se jugulum propediem ipsi fracturum minabatur. In cœna iratum plena cibos devoravit ac potu se ingurgitavit: mox tamen focu assidens omnia assumpta evomuit: Postea lectum petiit: surrectura nescio quam eb causam humi cecidit: & juxta lectum manè mortui inventa fuit. Ex Illustrissimi luptemi Dicasterii Hassaci mandato, Exc. D. Combachius cum Chirurgo vulnus contemplatus est: invenitque vulnus primo aspectu exiguum & quod tegetetur apice minimi digiti: verum indito vulnere stilo deprehenderunt baculi acumen altius penetrasse: ejus rei matricis conficius factus, mox sibi fuga conuultus: detracti cuti circa musculum temporalem omnia sanguine suffusa erant: remoto musculo temporali in osse foramen forundum ac si sclopeti manuvitii, quod Pistolam vocant, globulo petrusum & efformatum fuisset, occurrit: ablato cranio inter illud & duram meningem, item inter utramque meningem, imò in ipsa substantia cerebri plurimum cruoris inventum fuit. Ex substantia cubque cerebri duo fragmenta à baculo avulsa exiierunt. Quibus rite expensis merito vulnus se hanc judicavit ac sententiam suam Illustrissimo Dicasterio explicarunt. *Idem de apoplexia. Ex communicatione excellentissimi Domini D. Ludovici Hermanni Combachii Lud. Fil. Serenissimorum Principum Hassorum Medic.*

In cadaveris muliebris à Cl. Veslingio Paravil 1644. nostram in gratiam petiti, ex apoplexia, illique succedente Paralyti tandem defuncti, apertum cranio repentini mortis innocuit causa: omnes



cerebri ventriculi concreto sanguine turgabant, ut ne guttulam amplius exciperent: *Th. Bartholinus cent. 2. historia 60.*

Illustis matrona octoginta annorum plethorica valde, à multa dieta & exercitio nullo, exeunte Decembri, ipso plenilunii die, hora nona vespertina, mentis accumbens, prociùs irà incaluit, ac duriusculum quid intra dentes diffringens, cecidit sensus & motus expert, cum stertore multo, oculis rubris, atque clavorum more defixis, manibus resolutis ac frigidis, post, idie febre correpta fuit, & 18. ab intuitu horis vitam exhalavit.

Aperta calvaria, arteriæ tumidæ erant, tum in dura meninge exteriùs, tum circumcirca cerebri gyros omnes. In utroque cerebri ventriculo majori aderat grumus sanguinis, ilque spississimus, & ad ovi aserini magnitudinem concretus: Insuper plurimum serum cruentum devolutum erat in tertium & quartum ventriculum ac spinam medullarem usque: Plexus autem choroides juxta suarum alarum concursum, eo scilicet loci quo sanguinem suum in *venam magnam Galeni*, seu in *quartum cerebri sinum* effundit, crepuerat mediùs, atque nihilo secius per omnem suum, intra ventriculos illos anteriores decursum, veliculis aqueis tumidissimis adunatis & conglobatis refertus, atque summè decolor erat. *Ex observationibus Clar. Caroli Drelincurtii Lug. Batavorum Professoris Prædici & Anatomici.*

Septimo Martii 1671. Lunæ nondum impleta falce, juvenis armiger, lautè victitans, torolus & athleticus, statim post prandium, dum sese incurvabat, de repente corruit sensu motuque privatus, utpote apoplecticus, nonnihil tamen universè convulsus est, & intra quindecim horas animam expavit.

Dirutis cerebri muniis, nigerrimi sanguinis quantitas ingens, ab arteriosis tubis, & caroticis & vertebralibus, gyros cerebri naturaliter perrepantibus, ibi denique præternaturaliter passim distractis, ubique reperta est, sub meninge scilicet dura, à cerebri basi ad verticem, & ab anteriore cerebri lobo in posteriorem usque, juxta utrumque illius hæmisphærium, ventriculis ejus quaternis illæsis & intaminatis. *Ex observationibus Clariss. D. Caroli Drelincurtii Professoris Prædici & Anatomici. Lugdun. Batavorum.*

Anna Waltherin è pago Loninga, sex circiter stadiis ab urbe nostra distante oriunda, sexagenaria major. Habitu corporis mediocriter carnoso prædita. Viram à prima infantia vixit rusticam, paupercolæque omnes operæ rusticæ subeundæ erant etiam gravissimæ, quæ in vineis colendis, ab utroque sexu eò loci peraguntur; aliquot prolium mater fuit: hinc senior facta ad obstetricis munus peragendum ordinata est. Crebrò sanguinem, tam venæ-sectione, quàm scarificatione, malo nostrorum more profudit. Solent enim nostrates rusticolæ, imprimis, ter quaterve in anno venæ-sectiones usurpare, & qualibet vice duas, quandoque tres, non raro quatuor venas pertundendas curant, emittunt sæpè binas sanguinis libras; nulla cura est vel temperamenti, vel sexûs, vel ætatis: Videntur quandoque gravidæ, quæ bis terve gestationis tempore sanguinem V. S. effundunt, nec etiam partui vicinæ à V. S. sibi temperant persuasæ salubrius tum puerperium agi. Vidit senes octuagenarios hoc remedii genus experios: nec sanguine fuso solliciti admodum sunt,

qua ratione inanitè venæ præstantiore sanguine replendæ sint, itrequenter enim statim ac venæ secta, & cibo & potu nimio corpus infarciunt; videres sæpiùs ex urbe nostra domum properantes citubare, nec pedes vestigia tervare; & sæpè sæpiùs vel altero die ad consuetam victus rationem & solitos labores redeunt; alios errores taceo.

An verò & quibus morbis afflicta fuerit fœmina hæc toto vitæ curriculo, ab astantibus intelligere non potui, præterquam quod jam vetulæ incessus difficilior fuerit. Anno 1655. decimo tertio Julii, sexto die à plenilunio, circa vespertinam, domo ad vicina pago dumeta, sarmenta collectura, egressa est. Ea nocte à suis desiderata & quaesita, sed non inventa fuit. Sequenti die juxta septem intertemporis sinistri medio leviusculè vulnerata & mortua reperta est. Tertio die cum inopinatus casus ad Rev. D. Ludov. Spleissium vigilantissimum pagi pastorem delatus esset, viso in tempore vulnere, operæ pretium esse duxit me accersendi, ad indagandum num ex hoc vulnere, fortè violenta aliqua manu illato, an verò vi morbi alicujus latentis occubuerit? quo postmodum Amplissimus Magistratus noster de tota re certior fieri posset. Detracta itaque cute, in tempore sinistro inveni vulnus vix cutim transiisse, & temporalem musculum parùm in superficie attingisse. Ablato musculo temporali, os ad sensum integrum erat. Hinc cranium sustuli, adjunctus præcipuè fratris charissimi Joannis, Medicinæ studiosi operâ. Dillectâ durâ matre nequè serum nequè sanguis in spatio, quod inter utramque est, occurrit. Neque vel minima macula in interiore parte ossis temporis, vel in dura matre contigua, eo inlatere ubi vulnus accepit, apparuit. Aded ut mortis repentinæ causam vulnere huic tribuere nullatenus poterim. Mox elevato & nonnihil reclinato cerebro omnia sanguine suffusa comparuerunt: quæ ut rectius viderem, nervos dextri lateris abscidi: Hinc accuratius conspexi totam basin cerebri, quaquaversum cruore subductam, effuso illo intra piam matrem & substantiam cerebri. Suggillatio hæc diffundebatur antorsum ultra nervos opticos, vel retrosum usque ad foramen sacrum sub medulla oblongata, & ad latus ejus utrumque in ambobus cerebri lateribus, etiam intrâ anfractus longè lateque spectari poterat, maxime verò *in dextro latere*, parte scilicet vulnere opposita ultra dimidium cerebri intra gyrorum hiatus & per superficiem eorum emicuit. Circa orificium magnum in occipite, intra duram & piam matrem, etiam aliquid sanguinis grumosi inveni. Omnes ventriculi toto flavesciente stagnabant, cui innatabat grumus sanguinis in tertio ventriculo fæx magnitudinis. Aliquot hydarides parvulas plexui choroideo adnatas vidi: glandulæ hujus plexus manifestè turgidæ & duræ erant. Cor in dextro ventriculo replebatur copioso & grumoso sanguine, nec similiter ab eo vacuus erat. Pulmones aëre distenti, totam pectoris cavitatem occupabant, ut videri potuisset potius inspirationem ultimam vitæ actum, quàm expirationem fuisse. In cæteris partibus imi & medii ventris nihil notatu dignum deprehendi. *Ex observat. Georgii Baubini.*



*De iis in quibus serum multum effusum  
visum est.*

Septuagenarius ebrius, delapsus ex altiori loco, contraxit in calvaria tam amplum vulnus, ut commodè per ejus hiatus educeretur quicquid inhaereret extimæ cerebri membranæ: Invadentibus ipsum nihilominus illi, à vertigine, vomitu ac stupore, sive à residua crapula, sive à concussio cerebri, sed postmodum rediit ad se, expers febris & immunis aliorum omnium symptomatum: Verum die 4. excreatis prius sputis putulentis, periiit præter omnem spem ab inopinata apoplexia.

Cujus ergo interiora capitis penitiùs perscrutantibus, obtulit se primum frequens humor replens ventriculos cerebri: Sed mox longissima rima excurrentes continuatæ serie, per frontem oculique foramen usque ad scellam equinam, prope ossis cuneiformis meatum: quo loco animadvertimus (quod jure in omnium oculis fuit rarissimum) ingens ossis cuneiformis fragmentum, ita sejugatum à reliquo osse, ut manifestè elevaretur supra quascunque partes circumpositas: In quantum remotiori recessu cum deliresceret plurimum sanguinis coagulati, verisimile est ex ejus putredine produsse postremo vitæ die quod excreavit pus: Sed morbus Attonitus, qui ipsum occidit, traxit originem partim ex obstructis processibus spinalis medullæ (qui sunt verum nervorum principium) partim verò ex angustia *vetis mirabilis*, quod constat ex intricato venarum jugularium, arteriarum carotidum ac cervicalium concursu: Quibus nobilissimis partibus impeditis privatur homo non modò sensu ac motu, sed ipsa vitâ, juxta illud Celsi lib. 5. cap. 16. Servari non potest cui basis cerebri percussa est. *Nicolum Tulpium Observat. lib. 1. cap. 3.*

Momma Baxius, homo torpidus ac hebes, occisus repente à morbo attonito, obtulit secanti Chirurgo cerebrum flaccidum, & membranas ipsas tam frequenti pituita persutas, ut *opus fuerit eam spongia detergere*: Qua eadem pituita replebantur utique & vena per cerebrum dispersæ, nec minùs sinus falceiformis, & quidem utrobique tanta copia ac lentore, ut inde potuerit extrahi instat longioris alicujus filii. Movente hac concretâ pituitâ non levem polypi suspicionem, sed quem id temporis frustra quaesivimus in naribus, illum offendimus deinceps insciti in sinistro cordis ventriculo: Sed redeundum ad pituitosum hoc cerebrum, in cujus ventriculis invenimus, non tantum plurimum aquæ (quod attonitis familiare,) sed spinalem medullam ita humidam, imò udam, ut necesse fuerit exuperantes liquores prius spongiâ absorbere, antequam licuit inquirere in naturam nobilissimæ hujus partis. Constabat autem hic polypus *ex alba concreta pituita*, inclusa membraneo involucre, & inhaerens suis cardiacis carneis Cordis fibris, affurgebat bifido erunco, obturatum non minùs arteriam aortam quam venosam: quarum nobilissimarum viarum obstacula impedimento fuisse, ne deinceps vel aërem libere attraheret, vel fuligines debite expelleret Cor, nedium exactè se clauderent valvulae postegressum spiritus vitalis, cui tamen usui illas ibidem loci destinavit sollicita natura, unde factum ut partim ob exclusum aërem, partim ve-

ro ob retentas fuligines & spiritus plus æquo dissipatos, infirmaretur utique eo cordis robur, ut nequirit amplius officium facere, multò minùs spiritus vitales quibuscunque partibus impartiri: quorum calore ac foris ubi carendum fuit, restitit inde confestim corpus, emarcuit animus, & corripuit tam vehementer cerebrum, ut tandem perierit à gravissima apoplexia. *Nic. Tulpium lib. 1. observ. cap. 27.*

Jacobus Rentinger Virardinga, ditionis per illustres & generosi D. Baronis Hohnsteinii, oriundus, quinquaginta circiter annos habens, temperie totius ad calidam & liccam vergens, coloris fusci: habitu corporis utrunque canolus erat, capilli nigri & crispi, rari, dimidiumque caput, juniori adhuc, calvities turpabat: ad iram vehementiorem proclivis. Pauper victum & amictum duris laboribus, præcipue vitæ rura acquisivit, Mutuum ipsi utum cum Baccho tulisse & non raro sicca labore pectora fervido maduisse mero, Gutta rosacea, quæ faciem sæpe labat, fidem fecit. Quibus morbis toto vitæ tempore affligus fuerit, ut de homine ignoto impothibile, ita hoc loco id recte supervacuum existimo. Quantum mini constat ab aliquot mensibus sæva cardialgia excruciebatur, ob quam & m. a. opera usus est, quæ purgantibus & stomachum corroborantibus cessavit: brevi tamen ob pravam victus rationem, famem & pauperie etiam noxia impetante, rediit: hinc opera mea non contentus etiam carnificem contulit, (nam & hoc genus hominum his in otis medicinum fieri continevit: & nulla non mortalium *causarum* hæc invadere audent) & haud obicere intelligere potui, illum nec à benedictionibus, ut vulgò loquuntur, rectius ab incantamentis, abstinuisset, ad quæ sæpe plebis, seu ad sacram anchoram, non raro contugere solet, addo ut nefanda impietas vix satis dissuaderi possit. Aliquot septimanis ante obitum crudelissima cephalalgia totum caput, frontem præcipue & occiput afflixit, à qua ipsi nec mora nec requies; fastidivit omnia medicamenta: Extrinsecus quædam muliercularum suavis applicita fuerunt. Præ dolore quandoque amens erat, ut quicquid vel diceret vel faceret non raro nesciret. Tribus septimanis ante mortem cæcus omnino evasit, nullo vitio extrinsecus in utroque oculo apparente, verà tamen gustâ serenâ excæcatus. Doloris quidem levitatis in capite aliquantum tunc temporis remissis, remansit quædam anxietas ob quam corpus hunc inde dejectitabat, nec, proculdubio mente æger, causam hujus volutationis per lectum revelare valuit. Medicamenta plurima adhibita, sed serò, id. o. que sine successu. Quatuordecim diebus ante fatalem diem, lectum permingere cepit; nec diebus post hanc calamitatem nova excepit, Paralytic scilicet pedis dexteri, quam secuta paulò post & sinistra. Quatriduo ante obitum apoplexiâ fortis tactus fuit, jacuit sine omni sensu & motu animali, nulloque ingenio excitari potuit. Totis his ultionis diebus largitus iudavit: per integrum diem cum sterore respiravit. Quamdiu decubuit *corpus* erat 11. Februar. & 11. a plenilunio anni 1656. vitam cum morte commutavit. Altero die cranium apertum, sanctâ durâ meningem profluxit serum pallidum spicci coloris, cum impetu quoddam, non secus ac mediana vena brachii secta sanguis erumpit, & quidem tantâ copiâ, ut cyathis aliquot unciarum capaces eo impleri potuissent.



Hoc serum maxima ex parte colligebatur in spatio, quod inter duram & piam matrem est, quod mihi amplius & capacius esse videbatur, quam naturaliter existeret solet, sero præ nimia copia duram matrem undique, ubi nullum obstaculum inhibebat, expandente, ac cerebrum cerebellumque deprimente. Quin etiam seri plurimum ultra piam matrem ac cerebrum & cerebellum continebatur, unde tota cerebri & cerebelli superficies, tam gyri, quam divulsis gyris, anfractus, seu gelatinâ quaquaversum obliti videbantur, quâ cuitello læsâ serum exstillavit sincerum, simile fere illi, quod inter duram & piam matrem cumulatam fuit. Imò ipsam substantiam cerebri & cerebelli plurimum seri imbibisse, clarissime cognoscere potui, nam summopere utrumque flaccidum & molle erat, ut instat fere pulvis, etiam leviculo attractu dissolverentur, ita tamen, ut non dissilueret, prout vetula apud Cl. Platerum contigit, cui pulvis forma cerebri emanavit: nam circa attractum & figuram, & terminos antiquos cerebrum & cerebellum, ablata quoque piâ matre, aliquo modo servabant. Tota cerebri externa facies pallida, vasaque languiduca tantum non omnia exsanguia erant: ablata portione cerebri, raræ sanguineæ maculae pullularunt. In omnibus etiam ventriculis serum redundavit; mucum nullum vidi orificium seu canalem è tertio in quartum ventriculum patulum, obturancem; Verum presso cerebello, plurimum seri in tertium ventriculum regurgitavit. Plexus Choroidæ totus erat luridus & sanguine fere privatus, quamplurimis nodulis varicosis subduriatulis præditus. Abscissa medulla oblongata propè orificium magnum, elevatisque cerebro & cerebello, nonnihil declivi posito capite, plurimum seri ex ostio illo profiliit, ut non dubitarem, totam quoque fistulam sacram eo repletam fuisse. Aded ut non vereretur, morbum hunc hydropem cerebri & *hydrocephalum* quandam speciem appellitare. In reliquorum viscerum conditionem lubenter quoque inquisivisse, sed nec pretio quicquam à defuncti uxore & affinibus impetrare valui, ac potestatem mihi caput aperiendi factum fuisse, pro magno beneficio reputare debui: Ex superstitione enim quadam, pluitquam ethnica plurimi posttratum opinantur, cadavera humana injuriâ quadam affici, si studio alios ægros juvandi, secentur, brevi verminum esca aliâ futura. *Joann. Jacob. Wepfer. de apoplexia.*

Jacobus Speerlin C. B. septuagenarius: statura proceræ, pallidus, gracilis, robustus: Victor in laboribus assiduus, industriâ celeritateque in opera & dextérité nulli secundus, plures, dum junior erat, superans, nec facile cuiquam jam senex cedens. Mercaturam aliquandiu exercuit, spiritum vini aliaque in castris divendit, & hujus causâ pericula præsentissima crebrò subiit, variasque tempestas injurias in itineribus frequentissimis passus est. Ante plures annos ad carceres perpetuos, nescio ob quas causas, condemnatus fuit: in quibus tenebris & squalore terrificis ultra duodecim annos vixit; tandem amplissimi Magistratus nostri intercessionem libertati restitutus ac in Nosodochium nostrum receptus fuit. Huc perveniens totus cachecticus erat, facies & labia pallescentia, pedes œdemate tumebant, omnes artus languebant. Tibia dextra ulcere dyssepuloto afficiebatur, quod ichorem flavum acer-

rimum copiosumque continuo cum summo dolore stillavit, ut plures noctes insomnes duxerit: quandoque etiam sanguinem sincerum profunderat: quamprimum emplastri sine mortu licentis utum intermiserat, serpebat ac profundius reddebatur. Funiculus in tibia parte externa interceptionis causâ excitatus ad ulcers consolidationem non exiguum opem tulit, sed non fidam, nam sæpè recruduit. Postquam liberiore aëre, cibis salubrioribus & medicamentis congruis, fruebatur, sensim cachexia & pedum œdema evanuerunt, ac strenuè pristinos labores adiit, ac vix imitandam in dolis minoribus conficiendis solertiam ostendit. Paulò post adventum ipsius in Nosodochium, scilicet mense Augusto 1650. Illicuriâ omnimodâ cum alvi occlusionem per integrum octiduum ægrotavit; utrumque symptoma, imprimis alvi constipationem occultans. Postquam clysterem emollientem injiciendum curaveram, pluribus scibalis summopere induratis excretis, protinus urina effluxit copiosè, acque in posterum nihil ampliùs hujus generis passus est. Urina clara erat: nihil vel sabulosi, vel arenosi, vel mucosi subdit; nec memini ipsam unquam calculum excrevisse, quamvis sæpè de dolore circa regionem renum & lumborum conquestus fuerit, qui non rarò ad alterutram coarum pertinebant. Quandiu in Nosodochio vixit, cibis salubrioribus frui poterat, cum talis effectus suppeditetur, ipseque nutrimis abundabat: & quantum rescire potui, à nocuis vir prudens & longævitas per quam studiosius abstinuit. Sæpè omnem cibum, imprimis carnes fastidivit: Sæpè etiam nec vinum sive rubrum sive album, sapuit: non rarò amarore quodam omnia imbuta videbantur, quæ assumpserat. Crebrò manè jejuno stomacho aquea, quandoque meram bilem non sine violentia evomit. Alvo suppressâ protinus colicâ torquebatur, quam bis intra novem circiter annos, dum hic commorabatur, Parens brachiorum secuta est: eandem quoque antequam huc pervenerat aliquoties post colicam expertus est, ob quam minimi & auriculares digiti in manibus incurvi permanserunt, ut quamvis flectere, tamen extendere nequirit. A Parens tum ab Exc. D. D. Ch. Hardero, tum à me non magno medicamentorum apparatu vindictas fuit. Diarrhæam biliolam iteratis vicibus non incommodè sustinuit. Fere perpetuè de dolore quodam compressivo & sensivo præcordiorum conquerebatur. Assiduè quoque caput doluit, comite nonnunquam Vertigine. Hæmorrhagiæ narium frequenter obnoxius fuit, quæ non rarò profusissima erat. Anno vitæ ultimo, manè inprimis tussire cœpit, & purulenta exspuit: tussis magis magisque crevit eaque diu noctaque miserè excruciebat: sputum subvitide, turbidum, lentum, viscidum, rotundum, planè non fœtidum, quandoque etuore tinctum ejecit. Paucis septimanis ante obitum conquestus de catarrho manè impetuose ad pectus rueret & suffocationem intentante. Febricitavit lentè: emaciebatur; non tamen ita corpus contabuerat, prout in plerisque Phthisicis observatur. Ultimis mensibus terribissimum dolorem percellus est in utroque interfemineo, ut attractum minimè perficere poterit: incipiebat ab ossè pubis ac desinebat in medio femoris, ductum musculi tricipitis sequens, in loco dolente, nullus tumor præter paucos quosdam & exiguos ac concolores cuti nodos, nullus rubor



rubor videbatur. Paulo ante obitum loquebatur & corpus præ langore & impotentia immobile, verti perierat: quavis nondum omnis motus animalis perierat, dē 10. Maii 1657. ringentibus malevolis, cadaver cum Exc. D. D. Hardero aperui. Dissecti integumentis imi ventris, ventriculus & intestina sanis similia apparuerunt. Pancreas & mesenterii glandulæ duriusculæ, sed non tumidiore erant ductus pancreaticus vacuus: Epas fuit legitimæ magnitudinis: debito mollius, pallidum & tantum non cruoris expertis, si venæ majores excipiantur bilis in ductibus cholidochis vitellina reduncavit, pressoque parenchymate copiose profluxit: vesicula foris albicans simili bile flava implebatur simulque continuit calculum magnitudinem nucis moscharæ. Lien fuit lividus, major debito, mollis & divitus, naturali similis. Reines erant pallidi: unius Caruncula papillaris extremo apici exiguum lapilli frustulum immersum fuerat: cetera nec vestigium arenularum ullibi apparuit. Vesica nihil præter naturam continuit. Pectore recluso pulmonum lobos superiores utrinque maximè sinistram, accretos invenimus, ambo iuduri & compacti erant, nondum tamen ad illam duritiem pervenerant, quam alias in phthisicis observavi: discissi in suprema parte exulcerati erant ac cavernulas avellanæ capaces obtinuerant, non tamen exactè rotundas, aut æqualiter cavas, sed quasi laceras, ac si à mustella vel glite, frustulatum porciuncula avulsa, pulmones exesi fuissent. Præ hæc pulmonum parte ex bronchiis spurum viride minus tamen viscidum ac tussi rejecerat, prodiit. Lobi pulmonum inferiores nec pleuræ accreverunt, nec quicquam puris continuerunt. In cordis ventriculis corpora pituitosa parva nec longè per quatuor fontes propagata, ac firmiter suis radicibus thalamorum anfractibus immersa & connata invenimus. In pericardio plurimum serii flavi continebatur. In cavo pectoris serum subruentum copiose redundavit. Remota cranii olla ac discissa durâ meningē plurimum serii subpallidi effluxit, quod in spatio inter utramque meningem continebatur, sed non in tanta copia, quanta apud Jacobum Reutingerum videram nam interstitium angustius erat. Tota anfractuuum superficies quasi gelatinâ operata fuit, qua culte lo succiata aqua exstillavit. Huius serii quoque plurimum in omnibus ventriculis reperiunt a nobis fuit. Plexus choroideus palluit ac exsanguis propemodum erat: in illo manifestè glandulas, sed utidas, cœnosasque vidimus ac duriusculas tergitimus. Cerebri consistentia mollis quidem & flaccida fuit: minus tamen quam apud prædictum Reutingerum: nec collapsam aut coarctatam & compressam observavimus. Multum quoque serii, reclinato pectore ex ostio magno occipitis promanavit. *Jonn. Jacob. Wepser. de apoplexia.*

*Ursula Puley Frizem* In sylva Martiana *an Hausen* habitans. Habitu sanguineo-Phlegmatico prædita. Victu gauderet laetiore, qualem scilicet Rustici melioris conditionis hæc loca incolentes nanciscuntur: potissimum ferè lacteisimilis, que illorum delitæ sunt, truebatur. Aliquot liberorum mater erat. Menstruus fluxus extraviditatis tempus ritè manabat 1661. circa 37. ætatis annum iterum gravida, diu continuos eosque gravissimos capitis dolores passa est cum vertigine. Quanto mente conceptionis scilicet circa princi-

pium Maii, manè è lecto surrexit, humi sedit ac caput manibus sufficiens de consueto capitis dolore conquesta est, atque malum quoddam gravissimum sibi immineere prædixit: mox oculi pervertebantur: vomituriēbat: maritum & liberos miserabili vultu intruebatur, ac *apoplexia* facta amplius alloqui nequibat: proripiens instat trunci omni sensu & motu privata contidit, solâ respiratione salvâ manente. In lectum traducta, per triiduum, eo situ quo locabatur, immota jacuit. Juscula & aquas anti-apoplecticas spiritum vini redolentes absque labore deglutiit. Post diem tertium ad mentem aliquantum rediit: compellata annuit: & paulò post artus sinistri lateris denuò movere valuit. Intramensis spatium nullis aliis medicamentis adiuta, à marito aliisque adstantibus sufflata, in cedere potuit: ita tamen ut dextrum pedem trahere & manu dextra ad opus aliquod perficiendum impotens esset: intellectus temper debiliior mansit: Appetitus contulit. Mense Octobri 1662. delirio melancholico corripiebatur. Circa finem Octobris infanrem vivum enixa est. Appetitus ad 14. diem puerperii integer permanit: hoc die subitè debilitate obruta omnem cibum fastidivit, simulque delirium initius evasit, & ipsa quietior aliquandiu fuit. Rediit delirium cum cephalza solita atque ad anni 1662. fœmiecium usque perduravit. In hoc delirio nocissimos & omnia rura timebat: maximè à fragore lignorum minus aridorum in foco crepantium percelleretur: læpidè in sylvas aufugit, ut vix satis custodiri potuerit: ter violentam mortem sibi inferre nitēbatur, jamque laqueum collo sibimet adaptavit totiesque mariti providentia à tanto facinore vindicata fuit: Nullam penitus liberorum curam habebat, nec famelicos vel mica panis refocillasset: nonnisi coacta comedit: Delirium hoc plerumque sub auroram incepit: duravit usque ad vesperam: hinc minus sibimet metuebat, quietior erat nec custodiam sui egerat. Medicamentorum, nescio tamen qualium, usus frustaneus fuit: Empirici suavisere, æstare & autumno singulis mensibus, hyeme verò æternis mensibus largè venæ-secta sanguis emitebatur, unde delirium propulsatum fuit, quin etiam capitis dolor mitigabatur & vertigo ablata fuit. Ultimo vitæ semestri venæ sectionem omisit: ob nimiam sanguinis profusionem vividus faciei color periit & cachectica evasit. Postea iterum concepit fœtumque vivum peperit, quem ad terminum suum fatalem usque lactavit. Ab illo tempore quo ab apoplexia prostrata fuit, totum dextrum latus debilius persistit, adeò ut inter incedendum imbecillitas quædam observaretur: in super manu dextra corpora crassa & ponderosa facillè arripuit firmiterque tenuit, ac gracilia & levia apprehendit quidem verum invix & insciè statim iterum elabebantur, die 21. Februar. 1664. noctu in lecto horrore concutiebatur, subsequente æstu cum dolore lateris dexteri punctorio: Pleurizidem neglexit: Vinum bibit: Venæ-sectionem distulit ad signum Zodiaci gratius & magis ex superstitione valetudini commodum: singulis horis dolor lateris dexteri incrementa sumpsit, iussit frequenter: ob doloris vehementiam spui ueruentipitum exerevit: dolor à latere dextro quandoque ad collum usque pertigit, qui tamen continuus, nec una sede fixus permansit, die 25. Feb. expectatus venæ-sectionis dies advenerat, verum ob vitium langorem & delirium omitebatur: die



26. Februar. mortuus est, die 27. Febr. indultu Reverendissimi Domini D. Francisci Chouloti Abbatis Monasterii S. Blasii optimè meriti, Viri iudicio acerrimo & rerum agendarum dexteritate apud omnes laudatissimi, cadaver secui, cum Cl. D. D. Joh. Ludovico Silbereiten Bada-Helvetio, Phylco Lauferburgensi & collega dum vivebat suavissimo. Remota cranii ossa dura meninx tumida & clata erat ac si flatibus distenderetur: ejusque arteriæ sanguine turgidæ. Sublatâ durâ meninge, tenuis ita omnes anfractus colligavit & æquavit, ut tota cerebri superficies levis & æqualis apparuerit, crassiorque debito fuerat: illa saucia ex omnibus anfractibus tam dextri quàm sinistri lateris copiosè serum emanavit. Vasa sanguifera tenuis meningis ubique majora & sanguine pleniora videbantur. In utroque ventriculo laterali serum subcruentum abundè stagnavit: simile quoque serum in occipite circa medullam oblongatam invenimus, quin etiam antorsum inclinato capite ex foramine sacro juxta medullam ad unciam hujus feri effluxit. Utriusque ventriculi lateralis superficies latea penitus & quasi rubigine obducta videbatur, oblita enim erat mucro croceo, illi simili, qui circa aquas ferratas conspicitur & lapideum & terræ superficiem incrustare solet: Eodem quoque plexus choroideus infectus erat: pertingebat rubigo ista quoque ad tertium ventriculum: quartus prorsus mundus erat. In dextro plexu choroideo plures hydatides, quarum quædam pisto majores invenimus, in sinistro itidem plures aderant, quarum una nuce avellanâ major, angulosa, instar humoris crystallini perspicua, totidaque à nobis vita fuit. Cerebellum valdè flaccidum erat. Medulla spinalis multo naturali gracilior nobis apparebat. Sterno remoto pulmo in toto dextro latere firmiter pleuræ adhæsit, quo avulso in postica pectoris cavitate ad libras duas circiter feri pallidi comparuit: in sinistro latere fibris intermediis pulmo leviculè accretus erat. In dextro latere pulmonum lobi omnes magni, duri, tensi, utrunque rubri, vel potius ex rubro variegati: illorum membrana externa densa & crassa: incisi intus pleni ichore subcruento, subaqueo, spumoso & in partibus profundioribus purulento adimpleri erant. Sinistri pulmonis lobi erant molles, flaccidi, albicantes, paucillâ rubedine diluti. In ventriculis cordis invenimus corpora pituitosa, quæ ramos in pulmonum vasa spargebant. Ventriculus & intestina flatibus admodum distenta erant; ut gravidam purarent. Epat pallidum & Renes flaccidi erant, Lien naturalis visus. In utero nihil præter naturam apparuit. Mammæ adhuc lacte niveo abundabant. *Idem de apoplexia.*

Juvenis quidam annorum circiter 14. staturæ mediocris: macilentus, cute fuscâ & strigosa præditus: quantum ex vestitus semilaceri forma conjicere licuit miles profugus, ex morbo aliquantulum convalescens; (nam circa illud tempus plurimi Gallorum ad Rhenum in Marchionatu Badensi inferiore Febre Hungaricâ, dysentericâ gravibus morbis ægrotabant, ac quotidie tum sani tum reconvalescentes non pauci huc venerant, per Helvetiam Patriam repetituri) in vicino colle extra urbem nostram propemodum frigore eneatus die 14. Novemb. 1673. repertus moxque trahi circa 10. annimeridianam in Xenodochium deportatus fuit. Satim accersitus fuit Exc. D. D.

Henricus Sciera à Zavoiz: deprehendit ægrum, quamvis in hypocaustum catenatum delatum & lecto plumbo forum, toto corpore non solum in capite & artubus, sed etiam pectore, dorso & abdomine attractu frigidissimum esse. Artus rigebant adeò ut nec brachium, nec pedes flecti potuerint: brachium tamensum facile rotabatur: ore hiabat, verum aquarum cordialium usque guttulam quidem deglutiit. pulsum nullum invenire potuit: nulla inelamoratione, vellicatione, aut frictione excitari valuit, ut vel minimum alicujus sensus superstitis indicium præberet: oculos semper clausos tenuit: respiravit cum stentore: in lingua maculæ rubræ videbantur ac si illam convulsus momordisset. Vespero circa quartam vivere desuit. Die sequente cum D. D. Sciera, D. D. Hollandeto & Chirurgis aliquot cadaver perlustravi. Foris in pectoris latere sinistro duo ulcera rotunda, dimidii bazi amplitudine aliquoussque sinuosa, ultra cutim sed non ad pleuram penetrantia, pus coctum continentia, invenimus: In dextro latere circa costam tertiam cutis parvi latitudine lugillata erat: omnia tubercula ad pleuram utique sanguine suffusa vita sunt, sive à percussione, sive à calu contigerit. Abdomine aperto omentum perenne & macilentum, occurrit: Ventriculus & intestina, præcipuè tenuia, flatibus & fecibus liquidis subflavis plena erant: iisdem tæcibus quoque Colon infartum fuit. Foris à Colo imprimis papillæ plurimæ, aquâ lymphidâ turgidæ pendebant. Hepar fuit rubicundum: Vescicula biliaria tumida & quasi inflata: Pancreas album: Lien lividus, major debito, nam duos palmos longus, palmo latior, crassitie dimidii palmi erat: aliquotque in locis quasi fissuris præditus, sed non perviis. Renes consistentiâ & colore naturales, sed omni pinguedine destituti erant: ubi vasa emulgentia renes subeunt loco pinguedinis humor aqueus subflavus in gelatinam concrevisse sinus impleverat. Vesica distendebatur ab urinae serenæ copia. In pectore pulmones dextro & sinistro lateri per fibras oblongas hinc inde laxæ, non tori nec firmiter accreverant. In dextro latere pulmonis lobus interior debito rubicundior & paulo durior fuerat, ita tamen ut inflammationem nec magnam nec pridem enatam credere poterimus. Omnes pulmonum lobi aere pleni & turgidi erant. Cordis dexter & sinister ventriculus, venarum cavæ & arteriarum aortæ rami superiores & inferiores sanguinem prorsus fluidum, neutiquam fibrosum continebant & fundebant, adeò ut ne minimus grumulus à nobis inveniretur. Extravasatus in pectoris cavum, diu post effusionem grumescerebat, ita tamen ut maxima pars fluida persisteret. Cranii superiore parte demptâ antèius sub fronte dura mater admodum rugosa apparuit ac si ibi à flatu vel aqua distenta fuisset. Propè cristam galli, incisâ durâ matre in sinistro latere protinus multum aquæ promanavit, quod itidem incisione in dextro latere factâ conrigit. Durâ matre à crista galli utrinque juxta sinum tertium ad sinus laterales incisâ, vidimus in sinistro latere sub osse syncipitis versus tempus duram matrem tenui meningi, ferè dimidii daleri amplitudine, præter naturam intermediis fibris validissimis firmiter accretam fuisse. Sub pia matre intra cerebri anfractus aquæ plurimum undiquaque fluctuabat. Reflexo corpore falciformi, diducto cerebro vidimus insignem arteriam super corpore calloso



calloso incedentem sanguine vacuam: & quamvis arteriæ & venæ sinum tertium adeuntes sanguine plene essent, nihilominus tamen sinus tertius & laterales non usque adeo sanguine implebantur. Cerebro cum cerebello è cranio exempto, separatâ durâ meninge circa sellam equinam ostendi utrinque arteriam carotidem tortuosam esse, neutiquam verò ut in brutis in plexum seu rete mirabile dispesci, quod aliis quoque vicibus feci: nec hæcenus aliam arteriæ faciem in his locis inueni, autimque dicere talem semper apud homines reperiri ita; ut quoque tandem aliquando fatebuntur Reris mirabilis patroni, si modò & ipsi quoque rei periculum facient. Inversa cerebri & cerebelli mole vidimus quoque arteriarum vertebrarum & carotidum coniugium, ramosque varios hinc inde per universam machinam dispersos; In dextro ventriculo multum aquæ limpidæ continebatur, minus in sinistro: multum quoque aquæ ex fistula spinalis medullæ sublato trunco emanavit. In glandula pituitaria duplo majore solito, sinum inveni plenum mucosum qui in gelatinam subflavam pellucidam concreverat. Meningem tenuem citra cerebri lacerationem longè latèque avellere potui, evulsis simul innumeris fibrillis arteriis instantiæ cerebri immeris: quâ sublata in superficie denudati cerebri rimulæ innumere conspectæ fuerunt, è quibus presso leviusculè cerebro sanguis exiit labat. Idaliis vicibus præstare potui, quoties madidius cerebri debito fuit, aut si per biduum aut triduum cerebrum frigido & humido aëri exposui. Cerebri pars cineritia flaccidior medullosa, utraque flaccidior debito; quin etiam cerebellum mollius quàm in aliis observaveram. Non tamen cerebri substantia tam flaccida erat ut in se concideret ac subladeret, aut pultacea evaserit, quanvis undique aquæ immersa fuerit, nam etiam extra calvariam exemptum cum cerebello figuram suam retinuit, etiam sublata tenui meninge in locis plurimis: adeo ut spectantibus cætera cerebri & cerebelli curiosa demonstrare potuerim: ut racemam, imprimis cerebrum intra cranium corpus falciforme librasque & ramulos arteriosos tum ab ipso, tum albi à dura matre profectos suspensum tenuisse. Intestinis à sordibus mundatis, in medio jejuno invenimus tumorem juglande majorem inter intestinunicam externam & internam conclusum proprio folliculo circumdatum, continens corpus mirè fibris & vasis sanguiferis intertextum: In principio jejuni reperimus quoque valvulam seu circulum membranæ, coli valvulæ similem, ascensum impediens: In recto plurimos serobienlos superficialios dimidian pili capaces vidimus, ac si non ita pridem dysenteriam passus esset, quæ tunc militibus epidemia fuit. Certe diarrhœæ vestigia clinici in indumentis invenerunt; cujus quoque indices fuerunt faeces intestina implentes. Velliculæ seminales continebant humorem copiosum in gelatinam concretum: utraque ductu insigni & proprio prædita qui ambo quoque osculo proprio ad latus monticuli in urethram capaciorē hiabant. Quæ insuper circa partes generationi dicatas in hoc cadavere observaverim & num in lithotomia saucientur alibi erit commodior differendi locus. *Idem de apoplexia.*

Obusio quidam ingenio, repente apoplexiâ correptus vitæ usuram deponit.

Cerebrum erat flaccidum. Meninges mucosæ & valde tenaci humore perfusæ: imò ille sinus tertius cum adherentibus vasis illic liquore turgebant. Ventriculi quoque eodem repleti. In cordis sinistro thalamo polypus fuit ex viscida materia concretus. Madebat, etiam spinalis medulla liquore lymphatico. *Stephan. Blancard. Anatom. Pratt. rational.*

Mulier quædam quadragenaria, boni corporis habitus, sed subinde de doloribus capitis gravantibus, conquesta, subitò, cum capite inclinato, igni suo in culina, pro cæna paranda accendendo incumberet, apoplexia validissima correpta est, & intra paucas horas nihil proficientibus remediis, sublata. Die subsequenti tummo mane aperto cadavere, elevatoque crânio reperiebamus cerebrum totum quantum tero sanguinolento abundantissimo suffutum. Interna substantia ipsa cerebri in omnibus suis partibus nobis sana visa est, de grumo aliquo sanguinis in ejusdem vasis aut sinu, us nullatenus constitit. Mentis & imi ventris viscera omnia optinè se habebant.

Puer quidam annos præter propter duodecim natus, postquam febre lenta pueres mentes perdurante, contrabuisse, lethargo tandem & postmodum apoplexia validissima correptus oblit. Crânio amoto reperiebamus sinum talconatum polypo prorsus oppletum; serum præterea coloris ex flavo viridiusculi, post resectam eam matrem, ad libram unam & semis ad minimum effluens, non minus interim turgidis remanentibus vasis quæ tum duram, tum piam matrem, tum etiam ipsam cerebri substantiam corticalem perluunt, illorum scilicet portio aliqua sanguine diluori, alia tero coloris viridiusculi ad maximam distinctionem adimplebantur. De iis quæ in medio & imo ventre tum apparere, hic verba non facimus, quia ad morbum quem hic tractandum habemus, non pertinent. Adnotabimus tantum, quod vesica urinaria cujus sphincter æquè ac illa ani plurimis apoplecticis resolvitur, urinæque evacuationem in ipso paroxysmo facit; hic tero copioso ad grandem expansionem turgida sit repleta.

*De iis in quibus vasa multum distenta apparere cum aliis &c.*

Sub finem Octobris anni 1675. Nobilis & lectissima N. uxor Viri clarissimi & celeberrimi Dom. N. annos circiter 20, nata, temperamenti laudabilis, coloris subfusci, aliquot ante matrimonium annis, sexto per mortem dissolutum mense, capitis dolori obnoxia vixit, sinistra præteritum partu infesto, & ubi fluere mensēs, graviori, quo vigente cervix in id latus invicè distorquebatur; Quindecim ante obitum diebus de ingravescente conqueritur, absque dilucidis intervallis, nec tamen à domesticis officiis distrahente, ac si gravior fieret: oculus sinister intorsum corripitur videbatur: Consultus Medicus lienem malefici accusat, quia conjugium viscerum obstructions præcesserant: Ed collineat, tympus & apozemata ex succis herbarum composita præteribit, nec non venæ-sectionem, à quibus prælidiis nonnihil solatii percipit, generosioribus, in graviditatis suspitione, prætermittit. Pridie ante fatalem diem aliquid in cerebro crepitasse exclamat, mox tamen inficiatur, metum incutere

*quædam.*



fatiganti & sollicito de salute marito verita: Nox tam diem excipiens utcumque tranquilla, mane vultum intus palior obliet: accedit in prandio prater morem apolitia, unde gravitatis opinio certior Medico. Circa meridiem vilitate coarctas hilari excipit vultu, sed paulo post dimittit invaletudinis pretextu, curam ad cubitis usque limen comis, quod dum repetere intendit, tuborâ vel vertigine, quod verisimilius, vel leipothymia, humidi sedili obvio insidare volens, concidit: Jaceus deprehensa in cubiculum deferatur, cui supposita vires brevi reparatas iri ait, ac quietem sibi permitti possunt: Interim absente Medico de confectione hyacinthorum aliquid præbetur, à qua vomitus excitatur: Superveniens ille hystericum rûsus suspicatur, alvum enemate prolui jubet, & cucurbitulas internis femoribus athigi: dehinc somnus conceditur, qui diutius protractus assid. nabus suspectus fieri incipit, quod vix verbum extorquerent: erectæ caput nutabat, cum insigni & plumbæ corporis gravitate, unde serius animadversum *apoplecticam passionem* ægram invaluisse; exinde ad extrema concutitur præsidia; Sympus emeticus salæ exhibetur, à quo *indur.* & irriti ad vomendum conatus, sed nulla exclusio, mors quæ ita à decubitu hora subsequitur. Præcep. ille & lugubris obitus mortuissimos maritum & consanguineos ad causæ cognitionem per cadaveris resectionem impulit, quæ eodem die instituta est, hæc est prosectorum, Medico adhuc exarante relatio.

Nos subligati D. Medici & M. Chirurgi, rogante clarissimo D. N. instituimus dissectionem cadaveris conjugis suæ, initio ducto ab apertione capitis: Remoto cranio statim, se obtulerunt venæ duram matrem perrepantes ultra modum & morem dilatæ ac expositæ, nigæ & varicosæ, minimi digiti crassiem penè æquantes, parte præsertim sinistâ: inde cerebri superficies livida admodum apparebat: Hinc ad duræ meningis separationem progressu facto, eâ deprehensa est insignis & insolitæ tum crassietei tum duritiei; circa præsertim basim cerebri, in qua venæ distentæ etiamnum & admodum lividæ apparebant. Dein ad Thoracem devenientes, omnia in eo integra visa sunt, pulmones à connexionem cum collis liberi, ad livorem tamen utcumque vergentes: Quoad inum ventrem nulla in eo labe asuit: examini enim subjecti renes & lien, integritate donati reperi sunt; Uterus insigniter parvus citra ulla conceptionis rudimenta: Quibus perpensis, censemus, insignem dolorem capitis, Agri olim molestum, ortum duxisse à crassie & duritie extraordinaria cerebri meningum, liberam vaporum & fuliginum, à cerebro manantium, distentionem impediende, à quibus diuturnus ille capitis dolor excitabatur, quæ de causa sanguis ad hoc alliciebatur, qui idèo illuc uberiori copia confluent, vasa præter motum rep'ebat & distendebat; ejus etiamnum portio in cerebri substantiam haurique decubuit; Cum autem sanguis nimiam venarum distentionem pareret, ejus circuitus & reditus ad cor idèo prohibitus fuit, ac postmodum concretus quasi & immobilis redditus, basis cerebri ab eo compressione facta syncopen apoplecticam, ac tandem mortem inulit. *Thom. Willis Tractat. de Anima Brut. par. i. cap. 2. p. 257. 258. 259.*

Bartholomæus Feer Triboldinga-Turgovius: Adolescent novendecim annorum: tator: Circa

principium Novembr. 1656. capite doluit: assumpta evomit. hujus causa carnificem consuluit, qui purgans propinavit & venæ-sectionem inulit: an præterea aliis medicamentis & quæ diætâ usus fuerit, rescire non potui. In dies morbo in detentius vergente 11. Novem. ad Notodochium delatus fuit; Febricitate mediocriter videbatur: dormivit parum un, cap. rigeluctus stupidus quæsi erat & deliratioquebatur: nec cit un nec potum perit: oblatum & intusum deglutit: cibarius erat instar infantis. Una naturali simillima; die 15. Novem. quo ipsam cum Exe. D. D. Christophoro Hardero conveniam, profundissime dormivit, ut ipsum nulla ratione excitare potuerimus: aiebant adstantes ipsum interdum dormire, noctu vigilare: atamen initius lectum perminxerat; In respiratione nullum adhuc vitium observatum fuit, die 17. Novem. hora 10. noctis motus est. Ex ore demortui plurimum cruoris effluerat. Dum cu sanus adhuc vivebat odontalgia obnoxius erat; ejus causa sumam Tabaci hauriebat; an crebrius id fecerit? non constitit nobis. die 18. Nov. caput aperuimus; sublata cranii ollâ; perduram meningem vasa tenuis meningis in syncephalo ad sinum tertium meantia vidimus valde cruore oppleta & triplo ampliora, quàm alias existunt, adeo ut primo intuitu circa verticem omnia sanguine suffusa apparent; verum insâ durâ meninge nihil extravasati invenimus; ipse quoque sinus tertius sanguine turgidissimus: cruetum corpore ac fal. itorni primò cerebrum ad ventriculorum sinistram incidimus, protinus iterum flavum satis copiose effluxit. Sublato prorsus fornice conspeximus utrumque ventriculorum cerebri lateralem, maxime sinistram humore putulento, vitcido, instar pulvis fluidioris turbido copiose imbutum: hic quoque ad ventriculorum tertium defluerat. Ventriculus quartus planus mundus nec vel minimum compureatus erat. Superficies utriusque ventriculi aspera & inæqualis & insuper flaccida fuit, dum enim blandâ manu & leviusculè pus derergebam successit statim medullosa substantia candido suo colore privata, corticis cerebri instar flavescentis aut subsulca appatens. In dextro ventriculo observavimus superius tabulatum seu fornicem, imæ ejus parti, humore hoc putulento intermedio aliquomodo agglutinatum fuisse. Plexus choroidæus isdem coloribus inquinatus fuerat. Aperto pectore, inciso pericardio effluxit aqua limpida, flava. In corde nihil morbovisum fuit. Pulmo in dextro latere leviter pleuræ accrevit; minus rubebat; in sinistro latere summiter pleuræ adhæsit undique admodum cruore suffusus. In abdomine ventriculus, intestina, lien, pancreas, hepat & ceteræ partes à naturali dispositione non desciverant, quantum quidem oculis usurpare licuit. Vesicula biliaria ille coloris fusci plena fuit. *Joan. Jacob. Wepfer. tract. de apoplexia.*

*Deus in quorum cerebris abscessus sumus reperi.*

Ursula Aberlin Wolfachensis, virgo 23. annorum: Plethorica, statura mediocri, carnosa, robusta; famula apud cauponem ad solis insignem ætate 1667. semel magnam graminum farraginem ac pondere gravem capite gestatam ex agro domum deportavit: Sub hoc onere sensit manifestè aliquid



aliquid intra cranium ruptum fuisse: paulo post cibaria cum suppellectili capiti imposita ad met-siores in loca montana Wolfachio vicina detulit; cum ab hoc onere summopere gravabatur, ut sibi sub illo occumbendum putaverit, nemoque præ-sto esset qui ipsum hoc onere levasset, magnâ con-tentione etiam per acclivia ad locum destinatum properavit, unde denuò fragorem intra cranium editum animadvertit. Ab illo tempore minùs urinam detinere valuit; nihilominùs officia ser-vilia solito more præstitit: strenua aliàs nec ob pa-trem duriores labores fugiens, nec unquam de ullo alio symptomate conquerens. Menses sem-per ritè fluxerunt, die 22. Decembr. 1667. nihil mali præsentiens ad templum ira cucurrit, ut in-de incaluerit: in templo persfrigeratur: mox ani-madvertit se pedi sinistro non posse firmiter, unde ingenua decubuit, vix inclinato corpore, nisi à vicina sustentata fuisset, humi prostrata fuisset: Torum sinistram latus motu & sensu privabatur: labia torquebantur ac maxilla inferior dextror-sum abripiebatur: primùm loquebatur ut intelli-gi potuerit, paulo post verò ægerimè. Altantes Leipothymiam morbum tate, quamvis vividum faciei colorem non amisit, ipsam frigida largè conspergunt. Hemiplectica domum deportata per dies 14. deliravit: conquerebatur de syncipitis dolore lævissimo, quasi tummâ vi sursùm capilli ibidem caperentur continuè: oculus quoque dex-ter intensissimè doluit ac videbatur ipsi ac si ex or-bita evelleretur. In sinistro latere toto hemiple-ctico neque in capite neque alibi præter morûs ablationem nec vel minimam molestiam experie-batur. Primis diebus creberrimè & copiosè min-gere cogebatur, nunquam tamen lectum permin-xit. Cephalalgia diu continuè afflixit atque hanc unicè causabatur. Medicamenta nulla, præter aquas quisdam cephalicas, pauperculæ exhibita fuerant, die 12. Februar. 1668. cum Wolfachii apud Illustrissimam Dominam Annam Magdale-nam Comitissam de Fustenberg ellem, ad ipsam vocabar, scilicet post octavam septimanam ab in-sultu hemiplectico. Tunc temporis carnosâ & be-ne colorata fuit: os non ampliùs distorquebatur, loquebatur sana & expedite: non multùm de ca-pitis dolore conquerebatur: Brachium sinistram movere suâ spontè nequivit: at uno alterove di-gito incurvo fortius à me compresso brachium aliquantulum attraxerat: Pedi sinistro aliquan-diu insistere, antrosum ipsum promovere non valuit. Tum brachium, tum pes sinister sæpè mo-tu quodam convulsivo succubiebantur. Appetit, & cætera satis benè habuit: menses quoque sta-to tempore ceu sanæ hucusque legitimè manarunt. Suasi tunc temporis decoctum torilunar. alianunque herb. cephalic. purgantia per vices sumenda & linimentum nervinum: imperatâ si-mul congruâ victûs ratione; qua in te suppetias Illustrissima Domina Comitissâ, erga pauperes benignissima, luculenter contulit: His aliquan-diu, sed non satis sollicitè continuatis, sensim viribus pedi sinistro redeuntibus, scipione sufful-ta in publicum prodijt. ora æstare, templum quo-que frequentavit. Subinde tamen cephalalgia re-crudit, quæ à vini potu exacerbabatur: tota itaque æstare aquam, aut feri lactis caprini bibit: Fri-gida præ calefactis unicè appebat, unde totâ æ-estate acerariis, fructibus crudis & lacticiis pro-fusè vescabatur: Sæpè toto die nonnisi manè ius-

culum comedit. Mense August. 1668. manè è le-cto surrectura sensit motum animale denudè lan-gueneri simulque querebatur de dolore in planta pedis dextri aliàs lani, ob quem nunquam diu posthæc nudo & non prius linreaminibus probè involuto pedi insistere audebat: doloris rationem ipsamer effari nequibar. Rediit quoque tum ante, tum post novum hunc insultum Cephalalgia præ-cipue dextram capitis partem occupans & nunc occiput, nunc synciput, nunc tempus, nunc fron-tem miserè exeruciavit: quandoque præ dolore exclamavit abicellum intus sub syncipite latere, imò jam exitum parare: unde quoque non rarò ut ille ope chirurgicâ maturaretur, expetiit. Tunc quoque de vertigine querebatur, ob quam pro-nam se casuram verebatur: huiusque sedem dex-tram potius partem dicebat, cum cerebrum præ-cipue turbati ibidem distinctè sentiret. Incede-bat nihilominus subinde: at brachium sinistram paralyticum tam ponderosum aiebat læpiùs fieri, ut casum timeret, pondere corpus antrosum trahente. Hicine adventante tum ob frigidum abutium, tum ob vitam sedentariam, tum denique ob medicamentorum neglectum sensim pedes œ-dematoli facti fuerunt ac intumuit abdomen. Mense Januar. 1669. primum menses substituerunt. Subinde catarrhi ad pectus ruebant, & tussim ex-citabant, qua aliquoties sanguinem concretum fabæ magnitudine excrevit, aliàs cessante catar-rho libere respiravit: incommodèque decubuit, humilius certe quam cæteri hydropici. Hydrops in dies incrementa sumpsit abdomine prætumido & œdemate etiam lumbos occupante. Doluit summopere pes dexter. Die 23. Mart. 1669. Ipsam moribundam conveni; præter pedes, abdomen, lumbos, brachium quoque sinistram admodum intumuerat: Facies erat Hypocratica, extrema frigida; lingua arida; pulsus summè debilis; in pedibus maculæ rubræ apparebant: in dextra tibia gangræna in procinctu aderat: delirabat per aliquot dies, ante obitum ad mentem rediit: semper & ad ultimum usque halitum accuratè vidit & acutè audivit. Die 24. Martii 1669. mortua erat. 25. Mart. Cadaveris apertionem prece & pretio obtinui. Ante apertionem in cadavere observavi maculas in tibiis latiores & lividas evaluisse; alicubi ves-cas amplas sero turgidas emersisse, quibusdam in locis ex poris serum exsudasse, abdomen subsidisse, ex ore humorem viscidum subflavum copiosè emanasse. Cuti capillata decussatim incisa tum ex vasis capillaribus faucibus tum ex cranio denudato exstillavit sanguis ichorosus, fluidus, omnibus fi-bris destitutus nec in grumos concreescens. Ollâ ablata, integrâ durâ meninge aliquid serosi exci-dit. Divisâ durâ meninge copiosius serum occurrit. Corpore falciformi à crista galli resecto ac re-trosum flexo superfices cerebri ubique ceu gela-tina flava transparente tegebatur, illaque alias an-fractuosa, plena & levis conspiciebatur: fauciatâ tenui meninge exstillavit copiosè serum flavum, tenue, admodum fluxile. Cerebri portione ad ventriculū dextrum atque ablata, protinùs ex illo exiliit aqua turbida: dilatato amplius hoc ven-triculo occurrit abicellus ovi gallinacei magnitu-dine peculiari tunica, crassitie pennæ columbinæ velutius, cujus oppositum latus versùs tempus dextrum exporrigebatur; inciso folliculo aqua turbida subfusca effluxit, qua evacuata cerebri su-perficies in fundo & ad latera inæqualis & quasi



exesa & exulcerata apparuit: nam detecto in fundo muco subidente, manifestè cerebri portuuncula prominula & lacera videbantur. In folliculo hoc nullibi foramen nec premendo ante incisionem, nec postea reperire potui. In sinistro ventriculo ut & tertio quoque aquam sed pauciorum & limpidam inveni, unde conjeci dextrum duos folliculos recondidisse, quorum primus incaute incitus fuerat. Plexus choroideus utrinque glandulis plurimis, minutissimis albenibus & perlucidis refertus erat. In toto reliquo cerebro nullum vitium animadverti: in basi quidem sinistra pars mollior primùm videbatur: verum posteaquam ipsam cum dextera contuli, discrimen admodum exiguum deprehendi. Cerebellum mollius & flaccidius cerebro fuit. Cerebro & cerebello è calvaria exemptis, recisâ medullâ spinali ex orificio calvariae amplo plurimùm feri tuberculi effluxit: simulque observavi ostii illius spatium multo amplius fuisse quam ut à medulla impleteretur: vidi medullam, hinc inde manantibus quibusdam fibris alligatam quidem, sed nihilominus humoribus descensum concedere. Ex medullæ incisæ superficiei guttulæ sanguineæ exudabant: quæ alias firma & nitida erat: sinistra tamen pars dextrâ minor videbatur. Quicquid sanguinis intra cranium stagnaverat fluidum mansit nec in grumos concrevit. Imò venite aperto aqua citrina effluxit, sed præter expectationem, quantitate minor. Ventriculus & intestina tum tenuia tum crassa flatibus turgidissima erant: Crassa ab excrementis vacua. Hepatis superficies livida inæqualis seu corpus ex plurimis glandulis conglomeratum apparuit molle, vatum. Lien non erat naturali major, mollis, lividus. Glandulas mesenterii & pancreatis admodum duras comperi. Videbatur pancreas esse corpus ex multis glandulis conglomeratum: ejus ductus vacuus erat. Uterus ejusque testiculi minores, quàm aliàs in hac ætate inveneram. Nullibi sanguis concrevit. Pectus quia aliò apocatabat, nec nullum de pectoris morbis conquerebatur non apertui. *Idem tractat. de apoplexia.*

Maria N. post contusionem syncipitis à me curatam, per integrum annum de sola vertigine gravissimas querelas habuit, remediisque frustra usurpatis apoplexiâ fortissimâ subito obiit.

Aperta calvaria, inspectoque cerebro, in sinistro latere tumorem, quoad folliculum & materiam contentam, superiorum duorum postremo non abhilem, qui magnitudinem ovi gallinæ mediocris adæquans tertium cerebri ventriculum ex parte compressit.

Quærentibus quænam hujus tumoris tunicati causa extiterit? Respondi, nec forsan aded malè, quod cerebrum ea parte vehementer perculsum, debilitatem quandam contraxerit, ob quam affluens alimentum non in cerebri, sed in descripti tumoris substantiam fuit conversum, *J. Schlectus Chirurg. Armentar. obs. 10. & 11.*

*De apoplectico in cujus cerebro nihil prorsus inventum est cui apoplexiæ tribui potuerit.*

Senex Theologus, vir probus, & pius, corpore obeso, necnon collo breviori, & toroso præditus, diu invaletudinarius, & vitam sedentariam agens, cacochymiam valdè scorbuticam contraxe-

rat, respiratione difficili, & anhelosa & capitis gravitate, & torpore imolito affectus, vix quicquam præterea laboris, aut exercitii præstare poterat, quàm quòd quotidie e cuicunque ad la cellum & rectorium iret, & rediret: Quodam mane Capellam paulò ante preces ingressus, cum genibus prostravit, de repente percussus & mox apertè, & insensibilis factus, in humum concidit, illico verò inoblatus, & vultibus exutus, lecto concalido imponitur. Ipse atque Medici mox accesserunt, ac ocysimè adventum expevimus eum, non modò absque sensu, pulsū, & respiratione, sed toto corpore frigidum, & planè rigidum, nec ullis remediis, aut administrationum modis, aliquandiu licet diligentissimè adhibitis, ad vitam aut incallescens revocari potuit: unde suspicari somus à primo ictu, cordis pulsū penitus inhibuitum fuisse flammæque ejus extinctâ, sanguinis statim omnem motum luppellum fuisse.

Postidie cadaver exanime satis, & obriguissè visum aperuimus, nihil cubitantes, quin affectus ira subito lethalis vertigia satis clara, intra horæ spacia relicta, in conpactum prodierint. Verum illic, aut in alia quavis parte, morbi, licet atrocissimi, ne vel umbra quædam supererat: *vasa meningæ* irrogantia, sanguine mediocriter repleta fuerunt, atque ulla tamen phlogosi, aut extravasatione: *cerebrum, cerebellum, & medulla oblongata cum processibus eorum* omnibus & prominentiis, ubique firma & benè colorata, tum extrâ, tum in us, per totum apparebant: nec serum nec sanguis effusus, ullibi intra eorum poros, & meatus, nec etiam intra ventriculos majores coacervabatur; quin imò plexus choroideus tum intra cerebri cavitatem tum penè cerebellum confiti, omni culpâ immunes videbantur, adeo ut materies morbifica, æquè tenuis, ac subeillis, ac sunt spiritus animales, quos offecerat, prorsus in conspectum maneret, ejusque illi præsentiam, tantummodo ab effectu arguere liceret.

Attamen ne alibi extra caput lateret illa, post singula *symptomata* contenta accuratius inspecta, ad Thoracem devenimus; ubi pulmones discoloros & ichore spumoso per totum infarcti respirationis difficultis & anhelotæ causam satis manifestè prodabant: Cor verò satis sanum ac firmum obstructione quavis, aut polyposis concretionibus immune prorsus existerat. Porro nec in vicinis ejus, nec in aliis circumvicinis visceribus, abscessus quilibet aut apostoma, à cujus contactu, aut furore cor opprimi, aut spiritus vitalis (si modo hoc possibile est) de repente suffocari potuit, repugnabatur.

Quamobrem in hoc casu nihil aliud suspicari licuit, quàm spiritus animales intra cerebri medullam confitos, à particulis quibusdam malignis, sive narcoticis, sive alias infectis, subito profligatos & quasi extinctos fuisse; proinde ut cordis, quasi primi in machina elateris, motu illico deficiente, statim cæteræ omnes functiones, earum impulsibus ademptis, prorsus cessarent.

## ARTHRITIS.

Arthritis est periodicus articulorum dolor, à distentis & punctis membranis ipsos vestientibus, per affluxum humoris acrioris. Simplex hæc aut similis descriptio non ardet Clar. Wilhelmo ten Rhyne, qui in sua de arthri de distentione cum flatum ejus causam facere, probare nitatur



nitatur, morbum sic definit; Arthritis est præternaturalis periosteï, parvus, plerumque invisibilis, atque intrinsecè delitescens, tumor; ex sicco frigido, & maligno ortus statu; qui per arterias sanguine subiectus contractivo cordis motu ad artus eorumque præprimis articulos expellitur, & ab ossibus periosteâ vi divellitur; cui interstitio impactus status hic inibi tenacissimè hæret, dictamque tenerimi sensus membranam distendit, acerbè adedò doloris author, ut & ipsum membrum in suo motu quandoque impediat. Hæc paulo fusiùs ex ipso Autore huc adduximus, ut curationis ab eo per inunctionem ex moxa perficiendæ, quam in sequentibus exhibemus; seu potius ejusdem curationis rationes à Clarissimo Viro allatæ, magis pateant.

Patet affectam ingentem esse articulos varios, apud nullos disputatur; verum quæ in specie articulationis pars à morbo arthritico affligatur, in quaque verè & potissimè recumbat materia illius productiva, non ita patet, unde alii in ipsa articulationis cavitare, alii in ligamenti ossa connectentibus in genere, eam collocant, alii verò multò satius in ligamento in specie membrano à periostio producto ossium capita invicem colligante & comprehendente satis laxè ut liberam motionem ipsis relinquit, morbi genuinam sedem reposuerunt, hocce enim solum sensibile admodum est passionisque arthriticæ quam maximè capax.

Arthritis autem commune seu generale nomen est, sub se comprehendens Chiragram in qua manus, Podagram in qua pedes, & Ichiadem in qua commissura femoris & coxæ, dolent; imò secundum Paræi minus necessarias distinctiones; Siagonagram in qua maxilla articulus; Tracholagram in qua cervix; Cleisagram in qua clavicula; Rachisagram in qua dorsa spina; Homagram in qua humerus; Pechyagram in qua cubitus, affliguntur. Verum ab hisce differentiis ad alias magis necessarias deveniamus, scilicet Arthritides aut breves sunt aut chronice; novitæ aut veteranæ; crudeles aut clementes; longis aut parvis intervallis recurrentes; unum pluresve simul articulos, imò ipsum corporis truncum atque caput petentes.

*Causam* arthritidis immediatam putabant veteres, & in specie Galenus, esse non tantum phlogistolum humorem, sed qui propriè crudus appellatur, quique crassus sit ad similitudinem puris crassioris. Illum autem humorem Fernelius vult à capitis exterioribus in subiectos articulos esse deciduum, atque sub cyre deoriam decurrere: At quomodo humor arthritidem patiens, non que sola quæritate in articulos influente, indeque orta distentione, sed etiam quicquid contra asserant, pungitiva qualitate, maximè noxius, de cerebro, aut capitis exterioribus delabi valebit, sine ulla vel stuporis, vel vellicationis totius sentatione, totque sine noxa peragratis exterioris corporis regionibus, in extremo pede, pollicis scil. v. g. articulo, ferus hospes tandem domicilium sibi seliget? Paracelsus tunc tum accusat à plantis variis quibus vescimur luctum, in que ventriculo ubi prima peragitur coctio, non ita attritum ut postea commodè segregetur, atque per alvum & vias urinarias excernatur. Helmontius quatumvis partium proprium alimentum depravantium, illudque in articulos demandantium, vitium arguit. Menjo-

nius causam arthritidis esse asserit serum vel sanguineum instar mutæ duræ ac maturæ salugineum; vel biliosum pro more piperis acerrimum, vel melancholicum aculeatam aceti asperitatem æmulans; additque quòd serum istud magis fuerit dentatum atque mordax, eò acutiores excitari dolores, hin. q. arthriticos salaces esse in ipsa quoque doloris, etli veneream puriginem aliàs reprimen-  
tis acerbitate, necnon iracundos & attrabilarios. Alii tandem, sero atque lymphæ analogum quid accusate non dubitant, at de viis per quas ad articulos derivetur magis sunt solliciti, quidam enim sanguifera vasa, quidam nervos quidam verò lymphæ ductus illius vectores faciunt. Verum, ut habet Willitius, si talis humor solummodo per nervos deferretur, non primùm in pede & articulis extremis, at in toto itinere nervosum genus irritando ~~aliquando~~ feriatim & tractu continuo excitaret. Si vero juxta Hollerii, Sennerti, aliorumque recentiorum sententias statuatur, imputitates quasdam serotas a sanguine effervescente deciduas & ab articulis susceptas, inlustris podagrici causam materialem esse unicam, effervescentias immanes in vasis suis excitabit sic constitutus sanguis, quod nullo modo in accessionibus podagricis est perpetuum, imò ne quidem frequens. Unde concludit succos fermentativos morbum hujus pancreantes non ab unico vasis genere amandari, sed potius a vasis sanguineis, lymphaticis, imò nervis subministrari, eoque quantumvis immiscibiles in articulis coire vellicationes dolorificas in fibris nervis ligamentorum capita ossium complectentium, per exortam inter se luctam atque effervescentiam, perituros.

*Causa remota* est primæ coctionis vitium, scil. in ventriculo malè peracta digestio, unde succi crudi, circulationibus inepti, acres, & fermentativi ubivis in corpore congeruntur, qui propter rationes mox enarrandas in articulis præcipuam vim suam exerunt.

*Causa externa* sunt primò, Aër frigidus atque humidus, frigiditas enim articulis omnium consentu est infesta, humiditas verò mollit ac laxat, Itaque bonum fuerit contra ejusmodi aëris injurias articulos munire, nec mirum si Japones qui capite nudo, pedibusque nudis, etiam bruma livente incedunt, non minùs arthritidi quàm cæcitate sint obnoxii. Secundò alimentorum assidua superingestio, non expectato necessario coctioni spatium; Helluationes perpetuæ, eorumque auxiliares; Usus ciborum & liquorum quorundam in hoc morbo præcipuè malè audientium, anguillæ v. g. & cypini limosa inmutati terra, caponum verustorum, anserum, pomaceorum, imò ipsius vini præsertim generosi & vacuo ventriculo sumti, unde cautos decet arthriticos lymphis potius litare quàm baccho. Tertiò balneum aquæ frigidæ frequentius usurpatum; Nam quantumvis algida dolentibus articulis largè affusa momento succurrere videatur, per stuporem scil. inductum, non ideo tamen minus noxia credenda. Quartò incessus per loca lurulem atque uliginosa pedibus non bene communitis. Quintò otium atque desidiosa, viscerum debilitatis, excrementorumque fons abundantior, ut enim inquit Solon apud Lucianum, criticum ventilationibus, sic & humana corpora exercitiis persurgantur. Immodicæ tamen exercitationes cum articulos enervent ac deterant minimè probantur, & in mediocritate libitè-



dum. Sextò, effusa venus quæ non tantum concussu, præcipuè in adolescentibus quorum articuli nondum satis sunt firmati nociva est, sed etiam summa quam inducit nervorum, nerveorumque corporum debilitate, per rejectam abundantius, in mediis quasi convulsionibus materiam, ab omnibus partibus, præsertimque nerveis ac tendinosis deciduam. Septimò, solitorum effluviis occultaio, ut intempestivè resiccatis ulceribus tibiarum inveteratis, ani fistulis, &c. hæmorrhoidibus vel menstruiis suppressis &c. Octavò, artuum offensiones ac impulsiones quæ materiam in corpore quiescentem laceffunt, articulosque vexando arthriticum paroxysmum provocant. Hisce omnibus causis adventitiis ingenitam addamus, jus scilicet hæreditarium rigidum ac quasi indeclinabile, non tamen omnino perpetuum: hoc autem nihil aliud est quàm articulorum atque viscerum nutritioni dicatorum debilitas; quæ cum diutè proba aliquatenus reprimi possit, ita ut in actum, aut minimè, aut non tam citò prorumpat, commissis è contrà erroribus faciliè augetur, ita ut avita arthritis cujus semen visum fuerat apud integrum & sanum parentem expirasse, in nato ab eo nepote exsuscitetur. *Hæc præcipuè ex Menjorio.*

*Signa hujusce morbi diagnostica* non aliunde nobis petenda veniunt quam ab ipso Sydenhamio, qui tam accuratam Arthritidis historiam exhibet ut integrum illam hic adicere, sarius multò repetemus quàm propriis verbis eam describere.

Sic itaque, Clariss. Author. Podagra eos plerumque invadit, qui meliores vitæ dies molliùs ac delicatius transegerint. Epulis lautioribus, vino, aliisque liquoribus spirituosius liberalius indulgentes, tandem ob pigritiam, ætatis ingravescentis semper comitem, ea corporis exercitia penitus omiserunt, quibus juvenes allueverant. Ad hæc, illi, qui huic morbo sunt obnoxii, Crania habent grandiuscula, habitu corporis ut plurimum sunt pleniori, humido & laxo, & constitutionem habent omnes luxuriantem vitosamque, ditissima atque optima vitæ stamina. Non quòd podagra eos solum adoriatur, qui crasso & corpulento habitu donantur, cum aliquando etiam, etiam ratiùs, graciles ac macilentos invadat; neque quòd hic morbus in omnibus senium præstoleretur; quandoque enim etiam ætate florentes corripit, quoties scilicet infælicia morbi semina à parentibus, quasi ex traduce acceperint; vel si hoc non fuerit, immodicè veneri præmaturius indulserint, aut exercitiis omnino valedixerint, quibus priùs etiam vehementioribus utebantur; edaciores insuper fuerint & liquores spirituosos immoderatius hauserint, postea derepente ad liquores tennes & refrigerantes se converterint. Si quem nonnisi jam senio confectum primùm adoriatur, nunquam postea, vel tam statas habet periodos, vel tam immaniter sævit, quàm si juniorem occupaverit; tum quòd vita ut plurimum elabitur antequam morbus naturalibus symptomatibus stipatus ad ætatem pervenerit, tum etiam quia calore nativo & vigore corporis imminutus, nec ita jugiter, nec vehementer in articulos displodi potest. At si quem maturius laceffet, quamvis nec sedem adhuc ligat, nec eum ita malè tractet, sed incertà periodo pro data ansa ingruat, leviter ad paucos dies torquens, & nullà methòdo invadens recedensque, sensim tamen castra metatur, legem sibi ponens, typumque præformans, tam quoad anni tempus quo arma

quotannis movebit, quàm quoad paroxysmi durationem: ad hæc, ferociùs quàm primo intuitu debacchatur. De hoc morbo dum ita regulam typumque servat, libet primò differere: postea de ejusdem Phænomenis Anomalis, atque incertioribus, quoties scilicet vel præpostero inidoneorum medicamentorum usu de statu suo dejectus fuit, vel ob subjecti debilitatem & langorem ad propria & genuina symptomata nequit assurgere. Quoties itaque regularis est podagra, hoc terè modo ægrum aggreditur. *Januario* exeunte, aut incipiente *Februario*, derepente & nulla ferè præsentione antecedente ingruit, nisi quòd ventriculi cruditate atque ~~anxia~~ ad septimanas aliquot æger laboraverit; corporis insuper intumescencià quasi ventosà & gravitate, quæ in dies augetur donec tandem detonet paroxysmus, quem paucis diebus præit torpor & quasi statum descensus per femur, in carnes, cum affectione ~~anxia~~ tum etiam pridie paroxysmi appetitus voracior, non tamen naturalis. Sanus lecto somnoque committitur, horà verò secunda post mediam noctem excitatur à dolore pollicem pedis ut plurimum occupante, quandoque vero calcaneum, suram, aut talum. Hic dolor eum refert quòssum dictorum dislocationem comitatur, cum sensu quasi aquarum non frigide partis affectæ membranæ affusæ; Mox sequitur rigor cum horrore & feblicitatione aliquali. Dolor autem hic primò remissior gradatim intenditur, (& pari passu rigor atque horror recedunt) idque in singulas horas, donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit, se ad varietatem ossiculorum tarsi & metatarsi, quarum ligamenta obsidet, perbellè accommodans; nunc tensionem violentam, vel ligamentorum istorum dilacerationem, nunc morsum canis rodentis, quandoque pressuram & coarctationem exprimens: ad hæc, ita vivum exquisitumque habet sensum pars affecta, ut nec linctorum super-incumbentium pondus, nec cubiculi à fortiori ambulatione concussione ferre valeat. Atque hinc fit ut nox non tantum in cruciatu transigatur, sed etiam cum irrequieta partis affectæ hæc illac rotatione, & mutatione suis quasi perpetuà. Neque minor est torius corporis jactatio incessans, quæ semper paroxysmum, maximè verò accedentem, comitatur, quam torti membri agitatio & dolor. Hinc etiam mille conamina, sitius tum ipsius corporis, tum membri affecti mutatione assiduà, doloris sedationem incallum exambiunt: quæ tamen non contingit ante horam secundam tertiamve matutinam, (decurso scilicet nycthemeri spatio à primo appulsu paroxysmi) quo tempore æger post materiam peccantis modicam digestionem & distillationem aliqualem, subitò à dolore respicit; licet hanc ille liberationem isti membri affecti possit, quæ posticmò utius erat, immeritò acceptam referat. Jam leni madore perfusus somno concedit; à quo evigilans, dolore multum imminuto, partem affectam tumore recenter occupatam cernit; cum solum antehac (quòd in omnibus podagricorum paroxysmis solemne est) insignior intumescencia venarum membro laxato intertextarum se in conspectum dederat. Sequentè die, fortè etiam ad biduum triduumve, si materia podagræ generanda apta fuerit copiosior, dolor non nihil pars affecta, idque vehementius die tam advespetante, levatur autem sub galli cantu. Intra paucos dies, alter pes eodem dolore torquetur quo is qui prior doluit, vel si prior iste jam dolere desierit, debilitas



debilitas infirmaverat, mox evanescit, tam viribus quam integra sanitate illi pedi statim restituitur, perinde ac si nunquam laboraverat, si modò dolor pedem nuper tentatum ferocius lancinet. Nihilominus eadem hic excitat tragedias quas prius in altero pede, tam quoad doloris vehementiam, quam durationem. Quandoque etiam primis morbi diebus cum materia peccans adeo exuberat, ut ei capiendæ pes unus impar sit, utrosque simul pari vehementia fatigat: sed ut plurimum pedes successivè, uti diximus, aggrediuntur. Postquam utrumque pedem exercuerit, qui sequuntur paroxysmi abnormes sunt, tum quoad tempus invasionis, tum etiam quoad durationem; hoc tamen ubique servant, quod dolor noctu recrudescat, inane verò remittatur. Atque ex serie horum paroxysmorum (sic verbo venia) constat paroxysmus qui dicitur podagra, diuturnior breviorve pro ægri ætate. Neque enim censendum est quoties quis cum hoc morbo ad menses duos vel tres fuerit constitutus, unum illum paroxysmum fuisse, sed seriem potius & catenam paroxysmorum, quorum posterior quilibet priore & mirior fuit & contraxior, donec tandem materia peccante prorsus absumpta: æger pristinam obtinuerit sanitatem, quod in vegetioribus, & iis quos podagra rariùs invadit, diebus sæpè quatuordecim fit; in senioribus, atque iis quos sæpiùs affligit, duobus mensibus, iis verò qui vel annis, vel diuturniore morbi morâ fractiores jam sunt, non priùs valedicit quam ætas jam adultior eam fugaverit. Ad quatuordecim primos dies minima coloratio est, quæ post separationem sedimentum rubrum & quasi arenulis repletum deponit; nec æger ut plurimum nisi tertiam portulentorum quæ assumptæ partem per vesicam reddat. Alvus item ad dictos primos serè dies constipata est. Appetitus prostratio, rigor totius corporis sub vesperam, partium etiam non affectarum gravitas & molesta sensatio integrum paroxysmum comitatur. Recedentem paroxysmum excipit pedis affecti pruritûs vix ferendus, maximè inter digitos, unde decidunt fursus, & pedes ipsi quasi ab epoto veneno desquamantur. Morbo jam discusso, ægri tum vigilia, tum appetitus redeunt pro ratâ doloris quo sequebatur paroxysmus nuper elapsus, & in eadem proportionem servata vel acceleratur vel differtur sequens paroxysmus. Nam si hic ultimus ægrum pessimè multaverit, sequens paroxysmus nonnisi anno ad idem punctum revertente denud accedet. Atque hoc se habet modo podagra regularis phænomenis genuinis propriisque se ostendens. Cum verò vel ab indebita medicatione turbatur, vel ob diuturniorem morbi pertinaciam, corporis substantia quasi in morbi fomitem pervertitur, neque par est naturæ eidem, methodo consueta, eliminando, phænomena multum sunt divertita à jam descriptis. Nam cum hæcenus dolor pedibus tantum fuerit infestus, (qui peccantis materiæ sedes sunt genuina, quæ cum alias quasilibet partes occupat, certissimum est vel morbi methodum invertam esse, vel corporis vigorem paulatim jam imminutum,) jam itaque manus, carpos, cubitos, genua aliæque regiones occupat, ea jam, sicut pedes olim solebat, discrucians. Quandoque enim pruritus vel fursus digitos distorquens, fasciculo radicum pastinacæ similes eos reddit, motu paulatim privans, tandemque concretiones circa articulorum ligamenta topha-

ceas generans, quæ articulorum cuticulam ipsamque cutem destituens, nudos tophos ceterum vel oculos canctorum æmulantes, aciculâ eruentes exhibet conspectui. Nonnunquam materiam morbum committens cubitis impacta tumorem subalbum excitat ferè ad ovi magnitudinem, quæ sensim inflammatur cum rubore. Est ubi tenetur occupans sensum exhibet quasi ingentis ponderis appensi, sed dolore tamen notabili, ac genu exinde petens id actius urget, motum omnem inhibens, ut quasi clavo transacto lectulo afixum ne latum pilum à loco in quo est se queat dimovere. Et quando vel propter totius corporis inquietudinem huic morbo ita familiarem, vel urgente necessario aliquo vitæ officio, æger aliorum operâ est movendus, omni cautela opus est ne forte vel minima motus contrarietas dolores accersat, qui eo tantum nomine potest tolerari quod contentum evanescat. Quæ quidem corporis ratio ita causæ & d. licet peragenda, haud ex qua pars est ætumnatum quibus podagra oneratur; dolor enim vehementior non per omnem paroxysmum extenditur, si modò pars affecta omnino quiescat. Cum podagra antehac nonnisi exeunte hyeme solet invadere, post duos treve menses pro more recessurus; jam per annum integrum vexat ægrum, demptis duobus vel tribus mensibus calidioribus, atque æstivis. Et quod insuper est observandum, quemadmodum paroxysmus major sive generis et his protractior quam olim fuerat, invenitur, etiam paroxysmi isti particulares ex quibus generaliter componitur, singuli diutius seviunt: cum enim antehac particulares isti non ultra unum alterumve diem excruciant; jam ubicunque sedem, figant, maximè si pedes vel genua occupaverint, non ante diem decimum quantum castra movent: Primò ad hæc, aut secundo post appulsum diem, æger præter dolorem, aliqualem etiam ægritudinem patitur, æque simul omnimodam appetitus prostrationem. Postremò cum antequam malum usque adeo intruderat, æger non solum longioribus frueretur paroxysmorum intervallis, sed etiam durante ista intermissione rectè valeret tam artubus quam reliquo corpore, facultatibus singulis naturalibus officio suo debitè fungentibus; jam artus habet serè undiquaque contractos atque impeditos, ita ut quamlibet stare possit, forte etiam aliquantisper procedere, gressu tamen ita claudicante ac per molesto protrepit, ut etiam cum ambulet quiescere videatur: & si ultra vires ambulare persistere, quo pedis us rectius valeat, quanto magis ipsos ambulando confirmat & dolori excipiendo minùs obnoxios reddit, tanto morbi fomes, nunquam per hoc omne intervallum perfectè dissipatus, visceribus periculosius imminet, cum in pedes ita libere nequeat effundi: qui hoc morbi tempore vix unquam doloris sunt expertes, sed sensatione aliqua plus minusve molestâ perpetuò tentantur. Quin etiam multis aliis symptomatibus instatur æger, ut venarum hæmorrhoidalium dolore, ructu nidoroso cibi jam manducati & in venericulo putrescentis gustum referente, quoties vel aliquid è dyspeptis assumpserit, vel eam tantum cibi quantitatem quæ sano competit. Appetitus languet, uti & totum corpus præ inopia spirituum. Denique ideo tantum vivit ut calamitosus sit & miser, non ut vitæ dulcedine vel minimùm fruatur. Urina, quam priùs coloratior, maximè



in Paroxysmis & in paucâ quantitate solebat redde-  
dere, jam illam tam colore imitatur quam copia  
quæ in diabete excrevitur. Dorum atque par-  
tes molestè prurunt, maxime iis notam totum.  
Id etiam in hoc morbo quoties jam confirmatior  
est, incommodi acciuit, quod ab oscitatione,  
inaptis vero matutina, ligamenta ossium me-  
tatastè vehementer convelluntur, cum sensu quali  
coa ctationis vel compressionis tortilimæ a manu  
valida. Quandoque etiam nulla oscitatione præ-  
cedente, æger jam se totum committens ictum  
quali clavi metatatum contingentis deieperit  
perterritus, unde cum ejulatu expurgitur. Sen-  
dines musculorum qui tibiis sustinentur subinde  
spasmo corripuntur: ita acti & violento, ut do-  
lor quem excitat, si vel tantisper duraret omnem  
humanam patientiam deiceret vinceretque.

Post multos diutisque cruciatus & castitiam  
diuturnam, cum pignus missionis quæ in mors  
jam in propinquo stans mox est natura, paroxyl-  
mi subsequentes ægum quoad dolorem elam-  
tiùs tractant, (natura partim ab onere materiæ  
peccantis oppressa, partim ob lenium, eandem in  
corporis extremitates jugiter ac strenuè relegare  
non amplius valente) at loco doloris conuelli, æ-  
gritudo quædam cum dolore ventris, lassitudo  
spontanea, quandoque etiam propensio ad diar-  
rhæam superveniunt. Hæc symptomata, dum vi-  
gent, ægum dolorem leniunt, quæ pariter eva-  
nescunt quoties articulos dolor fatigat: atque ita  
nunc dolore, nunc ægritudine quasi alternatim  
lasciente, paroxysmus longas moras necit. Ani-  
madvertendum est enim quod ubi quis ad multos  
annos podagra laboraverit, dolor singulis paro-  
xysmis gradatim immittitur, tandemque ægri-  
tudo potius conficitur quàm dolor. Quem  
enim in his patitur dolor, quamlibet sint produ-  
ctiores, vix ad decimam partem ejus assurgit do-  
loris quem pati solebat cum viribus esset magis  
integris. Nihilominus hæc ipsa morbi inclemen-  
tia pensabat ut plurimum longiore intercapedi-  
ne quæ paroxysmos intercedebat, cum sanitate  
quæ interea satis commoda utebatur. Namque  
hoc in morbo dolor amarissimum est naturæ phar-  
macum, qui quo vehementior est, eò citius  
præterlabitur paroxysmus, atque insuper & lon-  
gior erit intermissio & magis perfecta; & vice-  
versa. Neque tamen dolor, claudicatio atque  
impeditus parium affectuum motus, ægritudo  
abaque symptomata jam descripta, hujusce mor-  
bi tragediam absolunt: Calculum insuper Re-  
num in quamplurimis parit hic affectus, cum ex  
eo quidam æger diu supinus recumbat, cum etiam  
quod ferientur organa secretoria à debitis sibi  
functionibus: sive etiam quod calculus ejusdem  
materiæ morbificæ in genere portio quædam sit,  
quam ego licet non dijudico. Quæcunque verò  
sit hujus mali origo, nonnunquam ægri animum  
mœstissimè interpellat contemplatio calculi sine an  
Podagra immittit sit. Quandoque etiam calculus  
loci per meatus urinarios in vesicam transitum  
impediens, ægum de medio tollit lentas poda-  
græ moras haud amplius expectantem. Nec sa-  
tis est ægum ita miseris modis dilaniari, ut nec  
sui jam fuerit compos, alienæ opis prorsus indi-  
gens: sed & hic accedit miseriarum cumulus,  
quod durante paroxysmo, animus etiam cum con-  
tagio afflatus, eo usque corpori compatiatur, ut  
haud facile sit dictu utro horum æger calamito-

sus doleat. Non enim rectius podagra, quam  
iracundia, Paroxysmus omnis dici potest; cum  
mens & ratio utque adeo ab intima corpore  
eminentur, ut vel levissimo affectuum motu im-  
peliantur & vacillent: unde non magis ipsi quam  
aliis gravis est. Quid quod & cæteris quoque  
passionibus est obnoxius, timori viscerum sollici-  
tudinique atque aliis id genus. A quibus pariter  
torquetur donec morbo evanescente, animus  
quoque pristina tranquillitate recepta una con-  
valescet.

Tandem æger (ut funestissimi hujus morbi Ca-  
tastrophæ semel experiam) visceribus a mate-  
riæ peccantis incubitu complexuque ita latis, ne  
secretionis organa non amplius suo munere fun-  
gi queant, unde & sanguis quasi limo & siccus  
lentis recessus stagnat, & materia peccans non  
jam, ut olim solebat, in corporis extremitates  
diploditur atque rejicitur; tandem, inquam  
iis ægum vitam æthiolicam & jamdiu non  
vitalem cum morte æmulum requie feliciter  
commutat. At vero (quod mihi aliisque licet  
tam fortunæ quàm ingenii dotibus mediocriter  
instructis, hoc morbo laborantibus solatio esse  
possit) ita vixerunt atque ita tandem mortem  
obierunt magni Reges, Dynastæ, exercitusum elat-  
issimæ Duces, Philosophi, antiquæ his similes  
haud pauci. Verbo dicam, articularis hæc mor-  
bus (quod vix de quovis alio affirmaveris) Divi-  
tes plures interemit quam pauperes, plures sa-  
pientes quàm fatuos; naturæ quasi digito mon-  
strante quam parum iniqua sit omnium Parens  
& arbitra, quam paribus non studeat, cum eos,  
quibus alicubi d. t. n. c. alio aliquo bonorum ge-  
nere cumulatis, ditare soleat; Profusorem vero  
erga alios munificentiæ æqua malorum parte ad-  
mixta diluat & contemperet. Adeo ut ubique  
gentium ita sit lex atque inviolabilis nullum ho-  
minem vel ex omni parte beatum, vel per omnia  
miserum ac calamitosum posse inveniri, linguæ os  
autem utramque experiri sortem. Quæ boni at-  
que mali contemperatio, fragilitati nostre &  
mortalitati ita propria, nobis fortasse appu-  
conducit. Podagra tæminas peritæ infestæ at-  
que non nisi jam vetulas & viragines seu corpore  
malescentium habitum æmulantes. Graciliores quæ  
vel in adolescentia vel constanti ætate symptoma-  
ta patiuntur Podagram mentientia, ea ipsa vel af-  
fectibus hysteriis, vel rheumatismo quo jam  
olim laboraverunt, & cuius tunc non satis initio  
fuerat eliminatus, accepta reterunt. Neque pue-  
ros neque juvenibus minores podagra verè atque  
genuinè vexat hæc nus oblectavi: Nonnulli ta-  
men mihi noti sunt qui priusquam eam ætatem  
attingerent, leviculam aliquam quali velicationem  
præferant: quorum namque patres etiam tunc  
hoc morbo tenebantur cum his generandis operam  
darent. Haller. Sydenh.

Quoad arthriticis prognosim, nemo nescit ipsam  
ab aliarum molestiarum myriade vindicare, ne-  
que desunt qui tot ab ea beneficia proficisci auri-  
mane, ut illam ferè optabilem sibi ctingant, dum  
enim scotiz atque spureitiz in articulos tanquam  
loca viliora ablegantur, melius habent vitæ  
omnia, hinc podagricorum longævitas; vitam ut  
inquit Menfortius, ita doloris mercede redimen-  
tium, ac in penam vivacium; itaque ubi ejus con-  
suetudo jam facta est, funditus extirpari neque  
potest, neque debet, si enim semel absit pernicio-  
sum







rum rino, salvia, betonica aliisque compositum, cernuus prodest. Verum in his peculiare corporum consuetudines spectanda sunt, ex quibus coniecere licet utrum ne potius, aut aqua sit profutura: quamquam mediocritas semper est tutior, & salubrior in utroque. Atque hactenus de dicta pro paroxysmo præcavendo, nam in ipso paroxysmo vinum omnino vitandum est, nisi ille admodum levis fuerit, alias exacerbabitur & contra actionis membrorum periculum incurrit æger. Alius etiam lubrica servanda est in ipso paroxysmo, si ita permittant dolores, per clysteres, ex decocto althææ, flor. chamomill. papaver. thæd. verbasc. paralyt. &c. in lacte vaccino recenti, addito pauca electuario lenitivo & melle violaceo, purgatio siquidem omnia per os assumpta currente paroxysmo in plerisque potius nocent quam juvant. Extra paroxysmum vero vidimus aliquos qui continuatis singulis diebus per annum integrum pilulis mosicæ purgantibus à podagra immunes fuerunt, sed in quibusdam adnotavimus symptomata inde enascentia multo quam ipsi podagra periculosiora, & propterea ab ejusmodi medicamentis semper abstinuimus, interitum non negamus, purgationes suo tempore, vere scilicet præcipue & autumnio institutas, easque satis validas magni fore emolumenti, dum stomachum evertunt indeque minere morbi partem educunt ænequam ad artus devehatur, aut cum ad eos devehit jam parata est. Itaque præterquam quod singulis prope mensibus ventriculum & intestina ab onere suo liberare expedire remediis levioribus, ineunte vere atque autumnio conducibile erit, in illis qui facile ferunt vomitum citre per remedia antimoniaia, quibus scilicet valde succulso stomacho, excitanturque fibræ viscerum omnium, abunde exprimitur & egeritur materia peccans arthritidem jam jam putitura, unde aut ipsius prorogabitur insultus, aut admodum minuetur. De exercitatione podagricis necessaria hic jam nihil addimus, quisque enim novit ab ea dum modò vires non superet, invigorari non tantum viscerum & partium corporis musculorum fibras, sed etiam ipsum sanguinem, & animantes corpus humanum succos varios, sicque humores minus stagnare ac fermentationibus post longam moram inducendis minus aptos evadere. Remedia alia omnia ventriculi corroboracionem unice respicere debent, de quibus infra ex parte Sydenham &c.

In ipso paroxysmo quidam venæ sectionem celebrant, eamque in pluribus institutam vidimus, at succellus promissis atque operatis non semper responderet, nam plerique qui in primis arthritidis insultibus inde bene habuerant continuata ejusdemodi evacuatio fuit noxia, dum scilicet vel morbum in uno aut altero tantum articulo dolorosum ad omnes in universum aut plerisque saltem extendebat, vel convulsiones quandoque lethales accersebat. Fatemur quidem in plethoricis & opipere viventibus, si ante insultum neglecta fuerit sanguinis missio, eam ipso ineunte institutam utilem futuram; itaque in hiis omnibus attendendum ad constitutionem & consuetudinem. Alii eodem tempore purgacionem suadent, eamque validiorem, nos etiam à quibusdam faulse vidimus usurpata, at in plerisque morbum auxit quem non facile fuit postea anodynus adhibitis demulcere, imò dolores colicos peperit atroces & per-

tinaces, propterea ejusdemodi evacuationibus vacitantes, live per caryocollinum Bayei, live per pilulas ex hermodactylis, live per pulverem arthriticum Poracessi, live per arcenum co alinum ciolli, live per essentiam hellebori Martmanni, aliaque maxime specifica sollicitentur, unice confugimus ad anodyna, extractum scilicet opii vel syr. papaver. alb. parca dosi talibus volatilibus mixtum aquilique appropriatis immistam, revera vidimus hoc medicamentum aliquando soporem quidam conciliasse, quem violabant dolores artuum cum tremoribus atque subultibus, convulsivis, sed hoc tantum factum est ubi intestina humoribus scætentia, clystere ex decocto mox descripto, aliquatenus non fuissent elata; itaque singulis diebus, ante anodyni exhibitionem clysterem repetebamus. Applicationes quod attinet præter eas de quibus in sequentibus & Willisi, & Sackenius & Sydenham, & Theodorus de Mayerne, item institutionem de qua Then Rhyne, imò inter illas applicationes pocas vidimus proficuas. Commendatur inter alia focus tepidus urinæ vitilis, cui admiscetur vitriolum per radios solares calcinatum: Laudatur etiam immersio partis affectæ in cumulum strici, exemplo Sexti Pomponii Hispaniæ ceterioris Principis, qui, ut habet. Plinius, cum horreis suis ventilandis prælideret, correptus dolore podagrie, misit in stricum sese super genua, levatusque siccatis pedibus mirabilem in modum, hoc postea remedio usus est. Hic autem monendum, inquit Menjorius, non solum in diversis individuis, sed etiam in uno eodemque ægrotante innumeras occurrere doloris arthritici rationes, pro diversitate ineffabili salium ferorum humorem accendendum & velut aculeis amantium; ac propter variam istam dolorum periodicè recurrentium idiosyncrasiam, remedia quæ adversus plures paroxysmos fuerint salutaria, postmodum reddi hand modò inutilia, ac interdum quoque malefica. Prædicatur à quibusdam narcoticorum, laudari v. g. fol. hyosciami &c. applicatio, verum metus est ne dum dolorem reprimunt, motus libertatem in sequentibus impediunt articulumque debilitent. Hæmionio usus, fuisse ranæ vivæ in butyro infusæ extractæ, sicut patitur focus aquæ spermatis ranarum. Platero nix dicitur aliquibus profuisse ut & acetum frigidum. Reusnerius vult illinendas esse partes dolentes pinguedine herinacæ; Nos sæpius cum successu adhibuimus pinguedinem viperarum, item stercore vaccinum recens admisto oleo catellorum & olei racamahacæ salini guttis aliquot item forum calidissimum flor. sambuci in aqua fontana, urina, aut lacte incoctorum &c.

In Ischiade si cætera remedia nihil prosint, ex ex documento veterum pars alia innuitur, aut etiam, quod ipse per Chirurgum nostrum aliquando cum fructu vidi peractum, ampla cucurbitula cum multa flamma prius applicata, per medium carnis ab illa elevata profundius, scilicet ad periostium usque ferrum acutum adigatur quod ichor illic nidulans dolorumque malignus auctor educatur. Nos aliquando cum successu sequens emplastrum adhibuimus.

℞. Picis albæ th i s. liquefiat in vase terreo, tum affunde aquæ vitæ simplicis, seu spir. vini debilioris ℥ iv. igni lento impolita agitentur continuo bacillo donec consumpta sit prorsus aqua vitæ; quo peracto adde ceræ cirtinæ ℥ iv. cinna-



moni pulverat, gum. ammoniac. storacis, benzoini & gummi arabici ana ꝑ ij. semper bacillo aut spatula agitando materias, quibus exquisitè permittis vas ab igne removendum est, concentratque in aliud vas aqua pura plenum sunt projicienda. Frigefacta massa extendatur super alutam satis amplam ut totum femur ab illa contegi possit; ipso verò applicationis momento sinapiferum emplastrum paucò pulvere piperis albi & cantharidum num. vj. Jaceat oportet æger super culcitra prope ignem luculentum, parique afflicta spiritu vini calidè foveatur manibusque fricetur donec integræ spiritus prædicti ꝑviii. sine consumatur, tumque demum imponatur emplastrum probè calfactum, postquam semel applicatum est non prius debet amoveri quàm per se excidat, quod post absolutam operationem evenit; æger autem per totam adhesionis emplastri tempus aëri libero non exponatur. Si una applicatio non fecerit satis ad secundam deveniendum. Alii componunt emplastra ex pice, sulphure & sinapi, aut ex pice, sulphure & oleo lumbricorum: Item cataplasmata ex piperide & nasturtio, ex urtica in cerevisia; aut urina cocta &c.

De Podagræ transplantatione sic scribit Borellus; si catelli cum podagrico recumbant, & ciborum reliquias, ac spura deglutiant, futurum ut morbum illi contrahant, æger verò convalescat. Sic etiam Helmontius ex Paracelso asserit quòd si sanguis podagrici calens in ovi putamine foras, cani vel sui in cibum carnibus commistum exhibeatur necellarid ægritudo in canem vel suum transilier. Verùm de hisce, ut & de cruribus testudinibus, ex animali vivo excilis partique dolenti & tumenti applicatis cum maximo emolumento, ut se ipsum vidisse narrat Reinerus Solenander, idem judicium facimus ac de curis omnibus magicis tantopere à Paracelsitis decantatis, scil. potius confectis esse in minus cautorum deceptionem, quàm in generis humani aliquod emolumentum, interim si quis per imaginationem ab ejuscemodi propositionibus salutaris agitarum, aut Archei, ut loqui amant, inde enatam oblectationem fructum aliquem perceperit, quem aliis per propriam commendationem & imaginationis aliquod contagium percipiendum tradere valeat, per nos illud omnino licet.

### Curationes.

Arthritis seu articulorum dolor est instar matris plures ex se generans natus, specie podagram, chitagram & ichiatricam.

In Arthritide interdum est universalis omnium articulorum dolor cum summa inquietudine; in cæteris particulares dolores externarum partium manuum in Chitagra, pedum in podagra, coxendicis in ichiade.

Horum omnium universalis cura consistit in consumptione vel etiam expulsionem tartari in toto corpore humano stibulantis.

Hæc itaque cura unicè instituenda est, nec tamen quovis tempore promittuè in singulis subjectis, nisi prius omnia probè fuerint considerata. Itaque hæc cura universalis paroxysmos non tollit, nec leviter etiam affectos extra alia medicamenta curat: oportet igitur, ut aut ante insultum, aut post eisdem (non in paroxysmo) quies-

centibus scilicet & insuis matricibus quasi dormientibus, cura instigatur & tartarus resolvarur. Sic nimirum felicius successerint omnia. Eiusdem curæ prophylacticæ simili modo cum lapideis altacorum in eam formam medicamenti præparatis instituenda: maximopere pro corroboratione naturæ succenturiari potest Magisterium perlarum à Riverio Medico Regio olim plurimò cum fructu præparatum & exhibitum hòc modò: Perlas reduc in pulverem impalpabilem, quemadmodum alias redigi solent, (vulgariter margaritæ præparatæ) his in vitro superfunde de succo citri vel de pomis aurantiis recentibus q. l. ut fiat instarpasta, relinq. aliquandiu postea solve cum aceto, & remoto aceto per inclinationem à facibus aliud affunde, donec nempe perlæ ex toto fuerint solutæ. Collectum acetum misce cum tercia parte aquæ fluvialis, destilla per retortam ex igne arene primùm igne lento, post fortiori. Destillatum reasfunde capiti mortuo restanti & vicissim solve, postea cola per filtrum, evapora admodum lentè & restabit perlarum Magisterium. Hujus ꝑj. ad summum aliquoties jejuno stomacho in vino datus potenter naturam recreat, eamque ut medicamenta antecedentia (atque ludum humani & Astacorum) felicius operentur, excitat. Multum ad præcautionem facit cruditates fugere, & si adsint castigare vomitionibus manè si facile, à praudio si ægre, vomat.

Quod si verò paroxysmi podagrici vel arthritici soleant recurrere, id quod sapius fit, præterim ubi vita non usquequaque conformis fuerit, regulis tales insultus vel impediendis vel prorsus r. s. cientibus, hoc unicè providendum fuerit, ut quotannis statò Equinoctiorum & Solstitorum (circa eadem nimirum fluxiones podagricæ plenumque vigent) corpus benè mundificetur, & in primis ratio victus, quæ alioquin nupiam negligenda est, solers & rectè instituantur, auferendo tum plethoram; si quæ adsit, tum cacochymiam quamcunque suis idoneis medicamentis. Hæc etiam evacuatio institui debet in principio morbi, & ubi quædam signa imminentis præsentent æger. Potus sit vinum melissæ cum rad. Caryophyllatæ infusum in menta pro haultu primo, aut vinum anti-podagricum Paracelsi.

℞. Rad. caryophyllatæ, acori ꝑb. sol. majoran. m. iv. flor. lambuc. p. iv. intunde in vini ꝑb. iij. stent in infusione per 8. dies, sumatur ex hoc manè & vesperti haultus. Cum sale humano misceri, possunt ossa humana calcinata, in cibo galedda ex eisdem in modum galeddæ cranii facta. Post mundificatum corpus corroborantis & diaphoretica scilicet peculiaria Solis transparentis extractio, de qua in notis ad Crollium & pilulæ antipodagricæ mæx quæ descriptæ à Rhénano in tractatu Solis è puteo emergentis cum arcano alari aliquot diebus assumptæ. His omnis podagra, modò non sit nodosa, curari potest. Hoc nimirum modò paroxysmi raro vel nunquam recurrunt: aut, si insultus à levi errore externo aliquando coincidunt, tam graves nunquam sunt, nec dolores excitant continuos, aut insolentes, quin externis balsamis facillè cedunt. Ex numero mundificantium seu urgantium est pulvis arthriticus Paracelsi à Crollio descriptus, ubi in primis notandum, in ejus descriptione pro rasura cranii humani substituienda esse ossa hominis calcinata, juvenis non in hamati, manuum ad chitagram, pedum verò ad podagram.



dagram. Ex hoc pulvere status est pulvis caryo-  
collinus, quem vocant, etiam vulgaribus Medi-  
cis usitatus. Ille verò pulvis secure & leniter om-  
nes defluxiones podagricas purgat. Felicius id  
præstat essentia radicis ellebori nigri vulgari mo-  
do cum spir. vin. non ad limum correcto ex-  
tracta. Cujus quotidie cochl. j. mane & vespere  
sumatur, donec alvus sponte sua quater vel sexies  
tandem fuerit soluta quotidie. Hac nimirum faci-  
li, lenique purgatione impuritates, fluxionesque  
podagricæ satis commodè repurgantur, fortifica-  
tur essentia ellebori cum arcano silicis totius. (N.  
B. arcana hæc nobilia) vel cum arcano asari de-  
bita proportionem, nempe, si admiscantur alteru-  
tra cum essentia ellebori. Præstat alioquin hanc  
eandem essentiam ante consuetum tempus paro-  
xysmorum podagricorum assumere, quemadmo-  
dum & pulverem arthriticum, sic nimirum faci-  
lius ante invasionem corpus integritate adhuc  
dum constans ab insequentibus influxionibus li-  
beratur. Idque eo magis, si ad hanc evacuationem  
temperata victus ratio accesserit, & vinum majo-  
ranarum cum radice caryophyllaræ & floribus  
sambu. i. insutum ad victum pro primo potu hau-  
stum fuerit. Quidam convenientius utuntur de-  
cocto ligni salutaris, præmissis his purgationibus,  
impuritates crassiores, quæ adhuc restare solent,  
finaliter exterminandæ cum Mercurio laxativo,  
aut cum oleo aut pulvere arthritico sequente.

℥. Hermodactylorum turbit, diagrydii, fol.  
senæ, ossis manus hominis juvenis violenta morte  
perempti calcinatorum si chitagra manuum, si po-  
dagra pedum sacchar. candi ana 3 j. m. f. pulvis.  
Dosis a 3 ss. ad 3 ij. mane ex aqua iux arthritica  
per 3. aut 4. dies. Hinc demum ad confortantia,  
quod est magisterium perlarum Riverii, & ad  
diaphoretica accedendum, quale est extract. So-  
lis transparent. Profunt & maxime in his affecti-  
bus cauteria.

Qui vomitus ferre possunt & statis temporibus  
veris & autumnis ante imminentes paroxysmos  
podagricos, aqua benedicta utuntur, dosi legiti-  
mæ, rarissime vel etiam nunquam, modo reliqua  
correspondent, insulibus podagricis cortipiun-  
tur. Hoc itaque modo, cuicumque sanitas curæ  
est, quilibet de podagricis insulibus tutissime se  
præservare potest. In paroxysmis vigentibus &  
graviter articulos occupantibus, sæpius mitigan-  
tibus opus est, ea sunt interna & externa. Inter  
interna omnibus modis superat & excellit lauda-  
num opiatum suis proprietatibus maxime vigen-  
(vide Quercetorum in responso ad Aubertum) do-  
lores nimirum sistit, placidum somnum inducit,  
fluxionibus frenum injicit, fervores consumit &  
delatatos spiritus roborat. In aliis qualibuscun-  
que vulgaribus Medicinis haud iisdem viribus  
pollentibus, frustra sperandum est aliquid. Ex-  
terna sunt. 1. Balsamus podagricus primus & se-  
cundus apud Crollium, quibus succenturiari po-  
test unguentum anodynum, quod est apud eun-  
dem. 2. Est spiritus salis armoniaci qui sit h. m.

℥. Ammon. sublim. misce pulverisatum cum  
4. partibus cinerum & destilla per alembicum ex  
arena prodiit spir. ammon. qui æqualibus partibus  
cum sp. vini mixtus & plumaculo loco dolenti  
(aliquoties, bis terve) illitus confestim dolores  
extinguit. Nonnulli aliquid camphoræ adiciunt,  
ut prius solvantur in iisdem, postea ad illinendum  
utuntur. Hujus mirabilem usum sæpe deprehē-

di. 3. Est aqua antipodagrica Rulandi.

℥. Florum chamomillæ, meliloti ana m. j.  
Mercur. sublimati 3 ij. coque in aqua simplici.  
Hujus aquæ colatæ æqualem portionem m. cum  
ss. iv. aq. mortuæ quæ est aqua fortis, quæ uti sunt  
autifabri in separationibus, aq. fortis recentis 3 ij.  
succo seu decocto myrtillorum (3 ij.) q. s. ad co-  
lorationem. Utire ceu patet ex curationibus (du-  
rat aliquot annos aq. mortua.) 4. aqua Antipo-  
dagrica, quæ.

℥. Spermatum ranarum mense Martio colligi  
circa novilunium ss. iij. adde stercoris bubuli re-  
centis ss. totidem M. diligenter & relinque per  
diem unum, postea, destilla & serva, Calidiusculæ  
membris affectis applica, Confestim sedat dolores.  
Felicius operabitur, si addetur aliquid spir. vitæ o-  
li aut stercus vaccæ cum mellis 3 ij. Cataplas-  
matis loco imponatur, præsertim in podagra fri-  
gida. 5. Oleum petroleum, in quo radices ellebo-  
ri incoxerint, præsentissimum est in doloribus po-  
dagricis sine tubo: & vehementi tumore (alii vo-  
cant podagram à causa frigida) tubidè sistendis.  
Ubi inducitur facta sunt cum morbo, si ita neces-  
sitas exigit, purgantia tandem commodius (vo-  
mitus hic non est necessarius) locum habere pos-  
sunt, quæ fuerunt supra; præsertim, si pulvere  
specifico arthritico utendum sit, is per aliquot  
dies iusta dosi (3 ss.) in brodio vel etiam aqua iux  
sumptus impuritates tartareas mobiles, causan-  
tesque paroxysmos à corpore educit. Sæpe  
vidi in hoc calu pilulas antimonialis per secessum  
solum purgantes, semel duntaxat sumptas mul-  
tū profuisse. Eiusdem facultatis est arcanum co-  
rollinum per Crollium descriptum. Omnibus his  
præstat specificum purgans Paracelsi, si tæpidus ur-  
gente necessitate, crassiores adhuc in corporis ha-  
bitu particulæ residuæ fuerint, ex deinceps mundi-  
ficantibus, si vires & facultates patiuntur, expellen-  
dæ sunt. Insuper etiam ad diaphoretica descen-  
dum. Diaphoretica supra proprio titulo propo-  
suimus. Sunt nimirum in eo genere specifica,  
tum tinctura antimonii, tum pilulæ antimo-  
niales podagricæ: Descriptionem vide in libello  
Rhenani Solis de puteo emergentis tractatu postre-  
mo p. 18. & 19. Tincturæ præparatio hæc est:

℥. Minera antimonii ss. iij. iv. v. (minera  
Hungarica præstat) in defectu minere antim.  
crudum locum supplete potest, tere minutissime  
superfunde aquam calcis vivæ per simplicem infu-  
sionem (aq. ss. xv. Calcis ss. vi.) à calce viva co-  
lando (aliquoties aqua infundatur calcis, donec  
subsider) de facatam delinque (in alembicum la-  
ti fundi) insolando & aliquoties quotidie mo-  
vendo donec nempe spondilia & superficies aquæ  
rubere incipiat; quanquam rubedo nulla apparet,  
& tamen satis tincturæ extractum est, si per 6. vel  
7. dies infusio sit. Habebis autem signum extra-  
ctionis (extractio tantisper fiat, donec nihil sit  
residuum) si in particulam istius infusi seorsim in  
vitrum peculiare transfusam guttas aliquot æteri  
injeceris, repente nimirum immutabitur aq. (ni-  
hil aliud est quàm antimonii sulphur,) & tinctura  
antimon. in colorem corticis mali aurantii præ-  
cipitabitur (in mixturam simplicem infusam præ-  
cipitabitur in colorem albicantem propter spiri-  
tum vitæoli) extractionem trajice per filtrum &  
leniter ebulliendo in catillo reduc in pulverem ru-  
beum, quem extrahe cum sp. v. non usquequa-  
que forti (Alcohol non extrahit) ad flavedinem  
(instat



(instar extracti Solis) & filteran so decanta. Antequam move (pulvisculus nimirum semper ad fundum precipitabitur) dos. gr. v. vi. viii. x. ad summam spirit. vini hac tinctura antimonii imprægnatus aliquoties (sepius) per cohobia ex alembico destillatur, deinde ex retorta vitrea in arenâ datis ignis gradibus, vel etiam ignis suppressionis pellitur, & prodibit in forma rubicundissima oleum antimonii dulce cum stiris splendidissimis. Postea vero spiritus vini leni B. evocatur, remanet in fundo tinctura antimonii rubicundissima (confortativum summum) dos. gr. j. ij. ad summum. Vide Ragerium Bacchonium de oleo antimonii dulci.

Tinctura porro antimonii (apposita ean delà luce noctu instar carbunculi) vel dicto modo saltem leniter extracta, vel deinceps per multa cohobia cum sp. vini. in nobilissimam essentiam exaltata, contracturam ex podagra in articulis externis cautam feliciter curat, si observandis ad legitimum nempe dictam pertinentibus & corpus mundificantibus (N. B. in hoc casu pilulæ antimon. per secessum tantum purgantes maxime commendabiles sunt) quotidie vel alternis diebus gut. 5. vel 8. de tinctura simplici, sed gut. 1. de tinctura exaltata in diaphoretico in peracuris vel mixtura seu in auro exhibeantur, & sudor vel in lecto vel in laconico provocetur (id quod in declinatione contracturæ cum spir. vini tandem fecisse expedit) & contractura nulla resistit arthritica.

Ad externam curam podagræ tephaceæ, sed non admodum inveteratæ, præmissis præmittendis alioquin ad podagræ tum dixereticam tum therapeutica pertinentibus, de quibus hæcenus, externa auxilia accersenda sunt, quæ nempe duros illos nodos tanquam morbos compositionis ab internis medicamentis difficulter resolubiles penetratione suâ resolvant, & quod in articulis heterogeneum est, eliminant. Ubi igitur nodositates admodum inveteratæ non fuerint, unice hoc emplastrum commendatur, quod præter sedationem dolorum etiam ex articulis tephaceam materiam seu sulphur coagulatam cure leniter aperta resolvendo extrahit. Emplastrum tale est.

℞. Vitrioli Romani seu Hungar. aluminis roche ana ℥ss. salis ℥iv. Hæc omnia conjunctim calcina in catino terreo evaporando saltem, donec spiritus etiam exhalare inceperint, quibus odore perceptis statim subverte à calcinatione, & refrigerant omnia, pulverulentur. Hujus & pulveris ex farina hordei.

℞. Ana q. pl. misce cum facibus vini ad instar pulvis, qui super laciniam more solito ad ipsitudinem cultri extensam applica ad locum affectum & relinque. Exsiccatum dequid cum facibus vini distempera, & apponen so sic perge, donec primum dolor omnis consumptus, postea etiam ex articulis ipsis contortis omnes topi assumpti fuerint: Interim sit sæpe, ut simul cutis, præterit ubi verrux & scrophulæ in articulis appaerant, hoc modo aperiatur, id quod formidandum non fuerit. Vel nimirum sponne suâ postea ulcera coeunt, vel cerâ saltem emplastris loco superimpositâ vicissim consolidantur, ipsis articulis denuo mobilibus & agilibus redditus. Quod si denique nimis inveterata podagra seu protus nodosa & tephacea fuerit, ab illa quidem externa cura dolorum mitigatio speranda est, sed tamen

ipsi topi vix cedunt, nisi Chirurgia accedat potentior. Tunc igitur hoc modo procedendum fuerit.

℞. Mercur. sublim. arsen. albi ana q. pl. m. cum aq. forti & fiat in modum pulvis, deinde appositâ prius emplastrâ Basiliconis majoris (vel alio defensivo, vel etiam sparadrappâ) ad locum affectum foraminatâ, foramini de pulve præscripta instar lentis impone, & statim aliam particulam emplatri prædicti desuper, ac relinque aliquandiu, donec cutis bene aperta sit, ac nonnihil tumoris, ac exinde elichara accesserit. Hanc cum butyro vel oleo rosaceo emolliendo remove & attractivum appone specificum, quod omnes topophos coagulatos in aquas resolvit & extrahit, etiam aliquando sponte eaturas instar calcis ad parietes incrustatos; cessantibus postea fluxibus locus vicissim est consolidandus & epuloticis vulgaribus. Attractivum emplastrum tale est.

℞. Lithargyri, l. p. calaminaris, succini, magnetis ana ℥ij. pulverisata omnia tenuiter coque in olei lini ℥ss. ceræ ℥j. terebinth. ℥ss. vernicis ℥iv. coque in q. m. aliquandiu, donec inspissentur, addde postea gummata sequentia vulgari modo in acer. soluta & colata vicissimque opopauacis, terapini, galbani, bdelli, ammoniaci ana ℥ss. ebulliant leniter in fine addde de pulveribus mastichis, thuris, myrtæ, aloës hepaticæ ana ℥j. diligenter move spatulâ, tandem maxillando in magaleones redige, prædictoque usui serva. His modis infelix podagra prosperè & facile curari potest; modò omnia prudenter & legitime fiant. In externa cura tephorum sæpius mundificantiâ doloreque mitigantiâ sunt utianda, insuper sudores à superioribus diaphoreticis provocandi. Et hæc est genuina illa cura, quæ ægros nobiles & ignobiles nullo alio remedio adhibito me curasse affirmare certò certius possum.

Articulorum dolor variis in se species includit, Podagram, gonogram, chiragram, homoplatæ dolorem, & ilchiaticum, arthritidem item propriè dictam, quæ omnes simplicem scopum habent, symptomatis scilicet mitigationem & causæ ablationem. Usitatissima sunt Podagra & Chiragra, in quarum curatione unice providendum, corpus semper mundum sit, & victus ratio observetur exacta, quoramsi itato tempore Equinoctiorum & Solstitiorum, ubi fluxiones arthriticæ plerumque sunt, corpus bene mundificetur auctendo tum plethoram, si quæ adsit, tum cacoehymiam quæcumque suis medicamentis idoneis. Imò hæc ipsa evacuatio institui potest & debet quoque in principio mali, & ubi signa quædam imminenti præsentent æger. In primis extractum asari & essentia ellebori nigri tacta secundum artem atque ad consistentiam mellis seu pilularum redacta. Electuarius item caryocostipura apud Bauderonium, quæ semper ante contractum podagricorum tempus, ac in primis circa dicta assumi debent aliquot vicibus quæter aut quinquies semper observata victus ratione.

Pro potu sit vinum melillæ cum rad. cariophilatæ infusum in mensa pro haustu primo parè tantum sumptum. Aut vinum Paracelsi antipodagricum de quo supra de arthritide. Cum sale mensali misceri possunt ossa humana calcinata in cibis. Hinc statim ad confortantia & diuretica accedendum. Inter confortantia principale est

Magi-



Magisterium petrarum Riverii Regis Galliarum Medici, de quo supra, Maxime quoque in his affectibus profunt Caustica seu Fontanelle: Ad præcautionem prodest iugiter studere, quæ si hant, castiganda vomitionibus, manè, si facile vomat, sin minus longè à prandio. Nodosa modo non fuerit Podagra, his medicamentis curari potest. Nodosa verò præter hæc requirit etiam curam externam, de qua postea. Dolor seu Paroxysmus si adsit, dictis medicamentis non est fatigandus æger, sed quies imperanda, dolor mitigandus, & ne ad partem affectam affluat materia, præcavendum. Dolor igitur intra corpus ex hito laudando sedetur, præmisso tamen clystere. Si adsit magna plethoria, vena fecetur: Istringentia paulò altius à loco affecto versus partem internam adhibeantur, ut pulvis adstrictivus aceto & albumine ovorum exceptus, vel aqua adstringente, ut Myrtillorum, centinodii, glandularum quercus vel cataplasmatibus ex fructibus acerbis, cotoneis, herbis, pyris, prunis, imprimis sylvestribus, sorbis, quibus addi potest farina lentium, cum pulvere balaustræ, gallarum, rosarum, bistortæ: aut tantum applicetur Bolus armenus cum lacte & pulvere radicis bistortæ ad formam cataplasmatibus.

Supra partem affectam refrigentia & dolorem sedantia imponenda. Communiter nec sine fructu sit cataplasma mica panis albi, verbi gratia lbj. temperetur lacte super ignem lentum, ne bulliat, contunditur & reducit ad formam cataplasmatibus addendo vitellorum ovorum lbj. croci parum, calidè applicetur. Alii tantum in lacte tepido panem macerant paulisper & applicant de s. in s. horam renovando. Nos hætenus habuimus in usu catnem bubulam, cujus fructum etudum sine pinguedine parti dolenti superligavimus, idque manè & vespere mutavimus, atque ita feliciter dolorem sedavimus.

*Balsamum Podagricum.*

℞. Varioli ad flav. dinem calcinati lbj. mel-  
lis lbj. silicum calcinatorum lbj. destilletur spi-  
rit. igne ab initio lento per alembicum in cineri-  
bus (nam facile ebulliunt) postea fortiori. Ab hoc  
spiritu auferatur phlegma, cum destillando ad ter-  
tias usque, quæ in cucurbita restant, misce cum  
mastiche, olibano, myrrha, axungia humana,  
gumm. ammoniaco, opopanace, bdellio ana ℥ij.  
destillentur adhuc per retortam, cum destilla-  
to misce æquales partes spiritus vini atque ad usum  
serva. Non quoque inutile erit in hoc affectu vel  
totum spiritum salis cum aqua fontana tempera-  
tum tepidè adhibere, cum laciniis duplicatis, ut &  
oleum tartari per deliquium ex sale factum. To-  
phaceam podagram præter ordinariam curam re-  
quirere externa, vide annotata mea in Cröllium,  
quæ huc transfer. *Joann. Hartmann. Practic. Chy-  
mistric.*

Methodus therapeutica tres primarias indica-  
tiones suggerit, quarum prima curatoria tantum  
in paroxysmis ad dolores sedandos, aut citius fi-  
niendos adhibetur; 2. Præservatoria accessionum  
intervallis destinata, morbi procatarsin (propte-  
rea ut dolorum insultus rariis, aut mitius, aut non  
omnino reperant) tollendam molitur. 3. Vitalis  
instituit, quo victus genere, & quibus remediis vi-  
tes inter diros cruciatibus sustentari; atque vita, non  
obstantibus morbi crebris, aut continuis ferè mo-  
lestiis, prolongari, simulque refocillari pos-  
sit.

1. Prima indicatio, nempe dolorum sedatio,  
duas hæc præcipuas intentiones continet; nempe,  
ut solutio continui auferatur; ac interea ut libra-  
tum, sive spirituum in iis sententiam irritatio, sive  
exacerbatio compescatur.

2. Ad tollendam in locis affectis unitatis solu-  
tionem, & humorum, qui illuc tendere apti sunt,  
fluxiones inhiberi, atque minera jamjam impæcta  
discuti, ac dissipari, ejusque particula à mutuis  
effervescentiis supprimi debent. In hos fines re-  
media evacuancia, & alterantia, ac utraque tum  
interna, tum externa destinantur. Horum formu-  
las, & administrationum modos quosdam sele-  
ctiores ordine subiiciemus.

Phlebotomia arthritide recenti, aut non mul-  
tum inveterata, & præsertim in constitutione ca-  
lidiore, circa morbi initium celebrata, sæpè juva-  
men confert; verum in morbo habituali, necnon  
temperamento frigido, ac ætate senili, plus obesse  
quam prodesse solet; quatenus sanguinis & spi-  
rituum haud nimis efferatorum vigorem depri-  
mit, absque materiae morbificæ diminutione.

De purgatione circa morbi initia, res valde con-  
trovertitur, dum Medici quidam à catharsi omni  
aut paroxysmi declinationem, aut finem, reli-  
giose abstinere; alique è contra circa morbi ini-  
tia purgantia fortiora constanter exhibent, & non  
raro cum bono succellit. Discriminis ratio potissi-  
mum in hoc consistit videtur, nempe quod arthriti-  
cis quibusdam humorum ac vasorum continen-  
tium constitutione, & tono adhuc firmis, atque  
articulis nondum debilitatis, quoties sanguis & li-  
quor nervus à pharmacia perturbantur, haud sta-  
tim superfluitates eorum & recrementa in morbi  
minera præcipitantur; quin ea medicamento ir-  
ritant, simulque incitant obsequentia, ex arteria-  
rum osculis in cavitates intestinorum emulgentur;  
ac interim vasa inanita materiae morbificæ partem  
quandam retrahunt; aut res resorbent: Secus au-  
tem, in constitutionibus teneris, & debilitatis, à  
levissima medicamenti commotione, utriusque  
humoris purgantia in locum arthriticum deci-  
dunt. Quibus itaque purgatio convenit cum me-  
dicamento fortiori, & elaterio institui debet. In  
hanc rem vulgò celebra sunt. Electuarium Car-  
yocollinum, syrupus de Rhamno cathartico, pulv.  
hermodact. compos. pilul. ex duobus, pil. rhasis;  
quæ si auctori credendum sit, incedere non va-  
lentes mox pedibus inambulare faciunt.

℞. Aloës opt. ℥ss. rosar. rubr. ℥ij. hermodact.  
de cort. ℥ss. diagridic. ℥j. mell. rosar. q. s. f. pil.  
Rodericus à Fonteca mirè prædicat. rad. helleb.  
nigr. & inter alia, pomum cum fibris ejus intis  
ad ℥ss. sub cineribus coctum & comestum.

℞. Calomelanos ℥j. resinæ jalapii gr. iij. vel  
scammonii gr. iij. olei catiophyl. gut. j. balsam.  
Peruvian. q. s. f. pil. iij. vel iv. pro una dosi. Inter  
purgandum, alicujus forsan momenti erit, quod  
præcipit Solenander; scilicet emplastro, aliove me-  
dicamento defensivo supra loca affecta imposito,  
humorum in eo decubitus inhibere. Vomitus qui-  
bus tuta solet esse, ac facilis, etiam in hoc morbo  
convenit: ob quem finem tartarus emeticus myn-  
sichti, sulphur. antimonii, flores ejus, Mercurius  
vitz. vinum emeticum, gutta gamba adhiberi pos-  
sunt.

Cæterum in paroxysmo arthritico profunt lapi-  
dum, ossium, & testaceorum, necnon vegetabi-  
lium acrium pulveres; quæ hujus morbi alexiteria  
dicta



dicta, particulas quasque subjungant, cumque iis effervescentendo quasi mortificant; & demum subjungas, per urinam aut sudores foras eliminant.

℞. Pulv. ē chelis compos. ʒij. eboris rad. di-  
amni cret. rad. peron. maris, ana ʒj. ligni aloës,  
lanceol. cicerini, ana ʒss. f. pulv. sumatur ʒss. ad ʒj.  
aut per se in cochlear. aq. papav. thœad. superbi-  
bendo ejusdem coch. vj. vel redigatur in bolum,  
aut pilulas cum theriac. Androm. aut terebinth.  
vener. q. l. dosis ʒj. bis in die, superbibendo aquæ  
destill. infra præscriptæ ʒij. vel iij.

Vel ℞. ejusdem pulv. ʒvj. conserv. flor. tuni-  
cæ, betonicæ ana ʒj. ss. dialcoriij ʒij. tyropi de  
Meconio q. l. f. electuarium, dosis ʒj. ad ʒij. ves-  
peri, & mane. Interea dum hæc aguntur, ad ma-  
teriam morbificam in loca affecta effluxuram aliò  
devocandam, aut foras eliminandam, insuper me-  
dicamenta alterantia, & placantia, quæ sanguinis  
& lucci nervei turgelcentias sedant, & rectemen-  
torum ab iis deciduorum, fluxiones sistunt, vices  
suas habeant; propter hunc finem victu tenui, ac  
hydropisia (si convenit) institutis, emulsiones,  
julepia, apozemata ex blandis, & anodynis præ-  
scribantur.

Quod spectat ad cæteros medendi scopos, viz.  
mineræ impactæ dissolutionem, & fibratum ac spi-  
rituum exandescantias leniendas; posteriori huic  
primò incumbendum erit, sine qua peracta inten-  
tione alteri minimè satisfiet: In hunc finem igitur  
remedia, tum externa, scilicet topica vârii generis,  
tum internâ, scilicet hypnotica adhibere expen-  
dit. Cùm sit immensa topicorum sylva, ea vel tan-  
tùm anodyna dolorem per se respiciunt; vel ad hunc  
finem, & tumorem collimantia, aut sunt repellentia,  
vel resolventia, & discutientia: Horum cuius-  
que generis varietate sunt formulæ & administratio-  
num modi: præcipue tamen ulus solent esse focus,  
cataplasmata & emplastrâ; ex his quædam maxi-  
mè celebria subdemus; & primò applicationes  
anodynas, quæ mulcimine quodam libras, le-  
nium, & spiritus compescunt. Propter hunc ulum,  
cataplasma ex lacte & mica panis, vel ex iis  
cum mucagine foliorum, & rad. malvæ, & al-  
thææ, & similitum, usque apud vulgus in praxi  
communè usitata est. Alii laudan cataplasma ex  
stercore vaccino recenti calidè applicatum.

℞. Aq. solani, spermatis ranarum ana ʒvj.  
sacchari laxum ʒj. misce; lintea huic intincta ca-  
lidè applicentur.

℞. Minij ʒij. aceti destill. lb. ij. digerantur per  
plures dies; aut liquor hic per se, aut aqua per  
destillationem advocata pro focu usurpetur. Item  
aqua destillata, à tinctura viridis æris in aceto de-  
stillato facta, sæpè dolores sedat.

Accepi à generoso podagræ graviori sæpè ob-  
noxio, se interdum istius morbi cruciatus, præ-  
sentaneum semper levamen habuisse, à focu cum  
aqua sti illacina è contentis stomachi bovini recens  
mactati.

Ad extremos podagræ cruciatus narcotica ex-  
ternâ: nonnunquam adhiberi debent.

℞. Fohor. Hyosciami cicute ana m. iij. in-  
dantur aquæ bullienti, & quamprimum teneres-  
cunt eximantur, quibus contusis adde pulv. flor.  
chamomeli circa ʒij. vitellum unius ovi, f. cata-  
plasma.

Vel ℞. Tinctur. croci in spiritu vini facti ʒiv.  
Camphoræ, opii, ana ʒj. digerantur clausè, & ca-

lidè ad dissolutionem; pars dolens hoc liquore illi-  
natur. Hujus salinæ medicamenta alia innumera  
passim in libris Medicis prostant, & ubique tri-  
vio, à quibusvis fere è plebe hominibus præscribi  
solent; quæ insuper alteri intentioni, nempe hu-  
morum reperculioni (si quando indicari videbi-  
tur) explendæ sufficiant.

Quod spectat ad topica resolventia, & discu-  
tientia, non esumo si requiruntur, quæ tantùm po-  
ros aperiant, ut letum evaporet, & sanguis circu-  
lationi reddatur, prout in phlegmone aut œdema-  
mate; attamen quorum particule salinæ istis uni-  
veræ arthriticæ salinis oppugnandis destinatæ,  
eas aut amplectendo foras educant, aut præcipitan-  
do ab effervescentiis dolorificis supprimant.  
Quamobrem in hoc morbo cû n focus aut cata-  
plasmata ex chamomelo, malva, althæa, f. m. lini,  
& foeniculæ. parùm aut nihil jutaminis præbent,  
immo partes nerveas relaxando sæpè multum offi-  
ciunt; talis armoniaci aut marini, nitri, vitrioli,  
calcis visæ, & similitum dissolutiones, aut liquo-  
res stillatili, in aliis tumoribus aut doloribus tem-  
per intelli, maximi emolumenti esse solent. Hu-  
iusmodi liquores in paroxysmis arthriticis, parti  
dolenti applicandi, à Quercetano, Crollio, Har-  
mano alii que chymici vârii præscribuntur quos  
cum Medici illi celebres, sæpius experti compro-  
barunt, eos ob rationem prædictam juvenem con-  
fiteri concludimus. Non opus erithorum formulas  
repetere, cum possim plures alias ejusdem tati-  
næ præparationes suggerere; liber tantùm hic unam  
aut alteram adjicere.

℞. Salis tartari & armoniaci pulv. ana ʒij. dis-  
solv. in aq. pluvia vel font. lb. iv. usurpetur tepidè  
cum pannis lineis intinctis.

℞. Spiritus vitrioli non rectificati lb. j. salis  
marini calcinati & pulv. lb. j. misce, & destilla in  
retorta vitrea colore arenæ; prodibit purus terè  
putus spiritus latus, qui nempe ædibus suis per  
stigma vitriolicum expulsus, illicque possessionem  
relinquens, facile ascen sit: Capiti mortuo affun-  
de spiritus vini lb. ij. digerè clausè & calidè ad-  
dendo camphoræ ʒij. applicetur tepidè cum pan-  
nis lineis parti dolenti.

℞. Ematuræ ferri, flor. salis armoniaci ana  
ʒvj. misce, simul terendo; destilla in retorta vi-  
treâ, donec flores sublimantur; capiti mortuo tri-  
to affunde spiritum vini, digeras, & terves pro  
u. u.

Audi vi quosdam ad dolores podagricos sedan-  
dos, pedem affectum sacculo, sale in uno calcina-  
to, & pulverisato impleto, includere, à quo leva-  
men usque serum ac citum expectant.

In paroxysmi declinatione ad partem corrobo-  
randam, atque materiæ morbificæ reliquias discu-  
tendas, emplastrâ utiliter adhibentur; quæ tamen  
non omni. indifferenter omnibus, verùm his ma-  
gis, illis minùs calida conveniunt: Plerique au-  
tem maximè efficaci esse solent, ea quibus mi-  
nium, litargyus, mercurius aliæque mineralia,  
aut salina inhunt. Nobis præcipuè in usu est em-  
plastrum ex minio, cerullâ & sapone, cum oleo  
coctis, vel quod

℞. Emplastri de minio p. ij. Paracelsi part. j.  
misce, & extende super alutam. Remedia interna  
ad dolores arthriticos usurpanda fere tantùm sunt  
narcotica, quæ in diris & d. u. u. n. cruciatibus ex-  
hiberi debent. Ex his maximè commendamus opi-  
um, sale tartari, aut tinctura ejus præparationes.



Potro in hunc usum Laudanum Paracelli, aut Londinense, pilulæ de styrace, de Cynoglossio, & rupus de Meconio, theriaca Androm. & dialcoidium emolumento esse solent.

Secunda indicatio præservatoriæ dicta, Arthritidis causas præcatarticas tollendas respicit, propterea ut dolorum paroxysmi rariùs ac minus, aut non omnino infestent: In hunc finem remedia evacuantia, alterantia, & corroborantia, una cum exacta victus ratione, extra paroxysmos adhibenda præscribuntur.

Primo igitur Arthritici, vere, & autumnus solenniter purgari debent; atque vomitionem, si nihil contra indicat, tunc celebrari, & postea interdum ex intervallis repeti expediet. Stomacho & præcordiis firmiter prædicti emetica mineralia ex antimoniæ aut mercurii præparatis sumant. Qui constitutionis tenetioris sunt, post pastum ex cibis lubricis, vinum scilliticum, aut salem vitrioli cum sero lactis capiant, dein stomacho aqua tepida, aut liquore polletico simplici, aut cum tollis cardui incoctis, impleto, vomitio bis, vel ter aut sæpius provocetur. Pro cathartice crebra etiam vice cum interstitiis idoneis celebranda purgantium formulæ superius præscriptæ satis conveniunt.

℞. Fibræ. hellebor. nigri mundat. ℥j. lign. aloës, cariophyllor. ana ℥ij. contusis affunde spiritus vini non rectificati ℔ij. digerantur clausæ & calidè, per plures dies, dosis cochl. ij. manè bis, vel ter in septimana: & vomitio, & purgatio temper ante Aequinoctia incipiantur, ne forte paroxysmus, prius contingens, medicinæ cursum prævertat.

Phlebotomia aut vasorum hæmorrhoidalium apertio Arthriticis, temperamento calido, & sanguine actiori prædictis, nonnunquam vere, aut autumnus conveniunt. Caustica in brachiis, & juxta homoplatas excitata, quibusque ferè huic morbo obnoxiiis utilia sunt.

Præterea tamen, medicamenta alterantia, à veteribus Arthritidis antidota dicta, egregii sunt usus, & longo tempore una cum exacto circa sex non naturalia regimine assumpta, juvamen sæpè magnum præstant, in hoc sensu medicamenta tale volatili, ac sulphure balsamico prælita, quatenus nempe hæc salem fixum exaltant, illaque acerosum reduciunt, præcipua habentur; insuper amara & adstringentia, uti herba, chamædrys, chamæpitis, centaureum, rad. gentianæ, & aristolochiæ, &c. (siquidem experientia duce in hoc morbo comprobantur) hac ratione utilia esse videntur; quod pepseos, & chylosificationis munia adjuvant, acque excrementa salino fixa, ne in sanguinem ferantur, cohibent. Cujusque horum formulas quasdam subdemus.

℞. Pul. chamæpityos 3vj. oculorum cancri 3ij. terebinth. Vener. q. s. f. pil. exigua sumantur iij. vel iv. vesperi & manè per 30, aut 40. dies, superbibendo aq. destill. sequentis ℥ij. vel ℥iij.

℞. Folior. cupress. abietis, vitici pomorum ana m. vj. rad. cariophyllaræ, bardanæ, ana ℔j. corr. exteriores 10. aurant. & 6. limonum, nucis mosch. maceris ana ℥j. contusis & confectis, omnibus affunde lactis recentis ℔vij. vini malagani ℔j. destillentur f. a. liquor totus miscetur. Vel paratur aq. folior. bardanæ simplex, bis vel ter cohobando super folia recentia.

℞. Pul. semin. bardanæ 3vj. ocul. cancri 3ij.

nucis moscharæ 36. balsami capicci q. s. f. massa, quæ formetur in pil. exiguas, sumantur iv. vesperi, & manè per plures dies.

℞. Tinctur. antimoniæ 3j. dosis gutt. 20. ad 25. vesperi & primo manè, cura ℥iij. ac modò descripta. Pauperibus præscribere soleo ad hunc modum.

℞. Pul. folior. salviæ ℔ss. ocul. cancri, sacchar. crystall. ana 3ij. misce; servetur in vitro, sumantur cochl. j. bis in die cum haustu decoct. foliorum salviæ, vel rad. bardanæ. Vel pul. Dottorelli præscribatur eodem modo sumendus.

℞. Pulv. folior. chamædrys, ivæ arthriticæ, centaurei minoris, majoranæ, salviæ, betonicæ, rad. gentianæ, aristolochiæ rotund. ana 3j. sacchar. ℔j. misce f. pulvis. Vel pulvis Joannis Anglici, ab ipso Sartacenus appellatus.

℞. Pulv. folior. chamæpityos 3j. ossum humani pedis combust. 3ij. liquirit. ℥iij. misce.

Pro potu ordinatio patet Bochetum ex sarapari, tanal. lign. Rhod. rasur. eboris, C. C. &c. vel paratur alla tenuis pro doliolo iv. congiarum capaci; cui vice lupulorum incoquantur folia chamædrys & chamæpityos; & post fermentationem indantur foliorum salviæ siccatæ m. iv. assafras 3ij. rad. cariophyllaræ 3viii. Inter alterantia locum non infimum vindicat dicta ex lacte; nempe, ut Patens per tres aut quatuor mentes nullo alio alimento utatur; manè, & vesperi, lac recens emulctum bibat; circa meridiem, & aliis temporibus comedat cum pane albo; hordeo, aut farina avenacea, coctam: Novi quosdam ab hoc victus genere, insigne juvamen accepisse; alios verò à lactis usu multo deterius habuisse, & Arthritide nullatenus curatâ, viscerum obstructions magnas, & cacochymiam contraxisse. Itaque methodus ista, sine prudentis Medici consilio & observatione sedula, utrum conveniat necne, haud temerè incutit. Non ita pridem mox vulgò inoleverat, ut Arthritici uno quoque mane urinam propriam biberent; quod nonnullis commodo fuisse memini. Cujus juvaminis ratio videtur esse, quod urinæ latex salinus, sanguinem denud pertransiens, particulas salino-fixas prius in articulos deferri solitas, Arthriticum sublevar, plerumque Nephriticum auget. Thom. Willis de Arthritide.

Arthritidis curationem quod spectat; (ut primò quæ sunt omittenda subinnuam) licet, si humores respiciamus atque indigestionem unde isti trahunt originem, primâ fronte videri possit indicationes curativas imprimis ad humores jam factos evacuandos, dein ad coctiones roborandas, (unde aliorum humorum succrescentium aggestio possit præcaveri) collimare debere, quandoquidem hæc sunt indicationes magis generales quibus in plerisque aliis morbis humoralibus satisfaciendum est; in Podagra nihilominus naturæ quasi prærogativa est materiam peccantem suo modo exterminare, & in articulos deponere, per insensilem transpirationem dissilandam. Namque haud plures tribus proponuntur modi, quibus causam Podagræ continentem ejicere valeamus; venæ sectio scilicet catharsis, ac diaphoresis per sudorem: nulla verò ex his methodus scopum attinget unquam.

Imprimis venæ sectio, quantumvis magna polliceatur, tum in humoribus, qui in procinctu stant & quasi descensum meditantes, tum in illis qui jam



jam Articulos obsiderunt, evacuationis; manifestò tamen pugnat cum indicatione illa quam causa Antecedens, quæ est Indigestio à spiritu (quos sanguinis detrahitio magis imminuit opprimique) deprivatione ac defectu vitæ, sibi vendicat. Non est itaque adhibenda Phlebotomia, vel ad præcavendum Paroxysmum qui timeatur, vel ad illum qui jam adest mitigandum, in his nempe qui ætate jam uni provectiores. Quamvis enim qui educit sanguis Pleuriticorum & Rheumaticorum laborantium sanguinem ut plurimum referat, atamen venæ sectio haud minus intigret in hoc morbo vitæ ægro, quam in duobus prædictis prodesset cernitur. Etenim si sanguis in intermissione, quantumlibet diu post Paroxysmum, fuerit extractus, periculum est ne à sanguinis & humorum agitatione novus succedat Paroxysmus, qui & priore diuturnior futurus est & symptomatis enormioribus stipandus, sanguinis rubore & vigore, quibus adiutoribus morbi fomitem trementæ ac constanter excutere debuerat, exinde retulit. Atque hoc incommodi toties etiam accersitur, quoties incunte Paroxysmo vena pertunditur. Si mox à Paroxysmo feriatur vena, ingens periculum est ne natura, dum sanguis adhuc sanguis hior est & nondum pristinas vires à morbo succitias redintegraverit, ejusmodi vulnere importune inflicto usque adeo infirmetur & succumbat, ut Hydropi aditus aperiat. Veruntamen si æger adhuc juvenis fuerit & ab immodica potatione excatfectus, sanguis, initio Paroxysmi potest detrahi; sin autem in Paroxysmis subsequenibus Phlebotomia jugiter utatur, Podagra quam citissimè etiam in juvene inveterascet, & intra paucos annos latius imperium seu potius tyrannidem propagabit, quam alias in multis extenlere valuisset. Deinde, Catharsin quod attinet, sive *an* sive *æter*, animadvertendum est, quod cum naturæ lex sit inviolabilis atque ipsi iussu morbi essentia intertexta inextinguique morbi fomitem semper in Articulos rejici debere; nihil profus aliud præstebunt Remedia, sive Emerica, sive Cathartica propriè dicta, nisi ut materia peccans, quam natura in corporis extremitates protrulerat, in sanguinis massam denud revocetur; unde accidit ut quæ in Articulos eliminari debuerat, in aliquo visceribus forte irrumpat, atque ita æger, qui in nullo prius discrimine versabatur, jam de vita periclitetur. Quod his fatale esse haud tardò observatur, qui in medicamentis purgantibus, vel ad Podagram præcavendam, vel (quod adhuc pejus est) ad leniendum Paroxysmum assueverant. Etenim cum natura a methodo sibi familiari exturbata fuerit, quæ, utpote se utilissimè optimaque, materiam morbificam in articulos ablegat, dum humores intus versus intestina sollicitentur, loco doloris in juncturis, quem vel nullum habent vel certe perexiguum, ventriculi ægitudine, alvi rotundibus, lipothymia, & longo Anomalorum symptomatum agmine miseri quasi necantur. Ego certe persuasissimus sum, à jugi & læpè iterata experientia edoctus, Catharsin omnem tam per lenientia, quam per fortiora medicamenta, qualia pro more Articulis expurgandis destinantur, primum non nocere; sive in Paroxysmo ad minuendam materiam peccantem, sive in fine ad dissipandas morbi reliquias, sive in perfecta intermissione & recta valetudine, ut ventuto Paroxysmo occurratur, Purgatio in usum revocetur. Etenim

tam mei ipsius quam aliorum periculo compertissimum habeo, Catharsin quovis horum temporum administratam, ita parum votis respondisse, ut malum quod debuerat avertuncare atque avertete, accerseret. Primum itaque purgatio faviente adhuc Paroxysmo adhibita, naturæ, in materia morbifica separanda & in Articulos deponenda occupata, negotium faciens, magni in spirituum *atque* nonnunquam excitavit, unde non tantum Paroxysmus magis invalescebat, sed & æger in vitæ discrimen haud obscure conjiciebatur. Deinde Cathartica in fine Paroxysmi uturpata, cum morbi reliquias amoliri debuerint, id tantum egere ut recens Paroxysmus de novo suppullularet haud minor priori isto; atque ita æger ipse falsè lactatus ea sibi fabricat mala, quæ non fuerat perpessus nisi humores denud in rabiem agerentur. Quod genus incommodi ipsemet plus semel expertus sum, artis medicæ opem præposcere implorans ad exturbandas, ut mihi videbatur, reliquias morbi. Postremo quod Purgationem attinet, certis intervallis & integrâ sanitate repetendam, ut Paroxysmo eatur obviam atque ei aditus præcinitur; etsi, quod est sciendum, non ita præcens periculum est ne nova accessio intretur, atque tui in eodem jam dicto cum æger nondum *et* omnino fuerit, tamen etiam hoc tempore Paroxysmum patitur, itaque ob causas suprà memoratas; quo malo si forte agram non ita multaverit, nullatenus tamen eum à morbo liberat, quantumlibet constanter & debitis intervallis Cathartica hæc utave-assumpserit. Quinimo nonnullos novè hunc morbo obnoxios qui Catharsi non solum Vere & Autumno, sed & singulis mensibus, imò & septimis continuis celebrat, sanitati litabant, neque tamen horum quisquam Podagram effugit: quæ ex hinc crudelius plerumque & immanioribus symptomatis eos imprecatur quam si ab omni medicatione sibi temperassent. Licet enim jam dictæ purgatio Causæ continentis partem aliquam possit educere, cum tamen Concoctioni roboranda (à quo tantum abest, ut eam debilitet, recenti vulnere naturam subruens ac dejiciens) ne hilum conferat, uni tantummodo causæ opponitur, & morbi curationi impares prorsus habet vires. Ad hæc annotandum est, ab eodem illo spiritu detecta quo concoctiones in his vitiantur, qui podagrâ solent laborare, eorundem spirituum Animalium *et* minus firmam vegetanturque reddi, unde mox suspicatur & inturbatur a quavis causa quæ vel animum vel corpus paulò violentius concutit exagitatione; ac proinde jam fugax ac dissipabilis est admodum, prout his qui Affectioni vel Hypochondria, vel Hysteria obnoxii vivunt, per se accidit. A qua etiam Spirituum ad *et* propensione sit ut Podagra vel levissimam quæ immolet evacuationem facile subsequatur. Dissoluto enim corporis tono, quem Spirituum firmitas, dum in vigore suo persistunt, præ compactam vegetumque servat, materia peccans quasi disruptis repagulis jam sui juris est, atque ab hac plaga corpori i. scilicet Paroxysmus statim exoritur. At vero hæc ipsa methodus ut ut perniciosa ac nocens, nihilominus Empiricis quibusdam, qui Catharticum quo urebantur medicamentum astute omnes celant, hanc methodem exultimationem conciliavit. Observandum est enim quod Purgatione currente, æger vel non omnino vel remissè admodum dolet; & si



Catharsis ad plures dies produci queat, nullo superveniente Paroxysmo recenti, &ger confestim ab eo, quo jam tenetur, convalescet: verum enim verò penitus imposterum pender diuissimas ab aragia inquam dicti humorum exagitatio naturam precipitem egit.

Denique materiz peccantis per Sudores evacuatio, licet prædictis evacuationibus minus officiat, liquidò tamen officere cernitur. Quumvis enim morbi fomitem non terrahat in viscera, sed è contra in corporis habitum propellat, atamen his saltem nominibus obest. Primò quidem quod extra Paroxysmum humores adhuc crudos & nondum ita subactos ut ritè separari debeant, quasi vi quadam protudit in Artus, atque eo pacto conctantem Paroxysmum ante diem, & vel invità naturà sollicitat. Deinde quod sudoris provocatio in ipso paroxysmo materiam morificam nimis violenter in affectum membrum impingat adigatque, dolorem simul adducens haud tolerandum; & si major sit materiz peccantis copia, quàm ut pars affecta eam queat admittere, illam mox in artus alios demittit, unde orgasmus interea atque ingens tam sanguinis quàm cæterorum humorum ebullitio sive exaltuatio; si verò corpus colluvie ferolâ Podagræ generandæ aptâ admodum scateat, metuendum est ne Apoplexia ingruat. Quamobrem in hoc affectu, perinde ac in cæteris omnibus in quibus sudores Artus ope sollicitantur ad eliminandam materiam morificam, non verò naturæ ductu profluunt, periculosum est eisdem nimis violenter atque ultra eum Coctionis gradum ad quem humores evacuandi suâ spontè pervenerint, elicere. Et celeberrimus iste Hippocratis Aphorismus, *Costa non Cruda sunt medicanda*, tam in sudoribus provocandis quàm in subducenda alvo locum habet. Quod quidem liquidò constat ex sudore illo quo Paroxysmus Februm Intermittentium claudi solet, qui, si modicus fuerit & materiz Febrilis à præcedente Paroxysmo concoctæ quantitati aptè respondens ægrum insigniter juvat levatque; si verò ultra naturæ modum solatio promoveatur, ex eo quod æger lectulo jugiter affligatur, jam Febris continua subnascitur, & recens focus succenditur, cum iste qui prius effligebat, fuerat extinguendus. Pari ratione in Podagra etiam lenis ille mador qui ut plurimum manè suâ spontè oritur post minorum Paroxysmorum, è quibus majorem Paroxysmum constare docui, singulos, tam dolorem quàm inquietudinem quibuscum æger totâ nocte conflictabatur, mitigat; è contra verò, si quando levis hiee mador & suapte natura fugax, diutius & vehementius proriteretur quàm fert proportio materiz peccantis jam ab ultimo Paroxysmo concoctæ, morbus inde exacerbatur. Tam itaque in hoc quàm in aliis morbis quibuscumque quos mihi videre contingit, demptâ solâ Peste, sudores prolicere non tam Medico, quàm Naturæ provincia est: Cum nullo modo assequi possimus, quanta materiz pars ejuscemodi separationi obeundæ jamjam est parata, nec per consequens quem in provocando sudore modum tenere debeamus.

Ex jam dictis cum satis liqueat non solum Podagræ curationem à medicamentis evacuantibus incalsum peti, sed & eadem *modum* noxam adferre, restat ut exquiramus ad quem alium scopum Curativæ indicationes sunt dirigendæ. Ego quidem ex accurata *pharacopæa* prædictorum om-

nium pensitatione & diligenti examine colligo, duabus potissimum causis in hujusce morbi curatione obviam iri debere. Prima est causa Antecedens, sive humorum indigestio à caloris & Spirituum Naturalium defectu orta. Altera est causa Continens, sive eorundem humorum calor & exaltuatio, ubi jam tum putredinem, tum etiam acedinem nacti sunt à mora in corpore quam oportuerat diuturniore; quæ mora ab incoctione supra memoratâ pender. Hæ causæ ita toto celo, quod ajunt, à se invicem discrepant, ut, quæ huic profunt remedia, alteri obstat; unde hic Affectus ita curatu perdifficilis est. Etenim dum Medicamentis calefacientibus Indigestionem vincere satagimus, periculum est ne ex altera parte humorum calor intenatur: atque è diverso, dum sive Dietâ, sive Remediis refrigerantibus calorem & acedinem humorum commutigare volumus, *accetimus*, laborætur scilicet calore naturali. At verò hic Causam Continentem non eam tantum intelligo, quæ jam actu Articulos oblidens Paroxysmum tormat, sed eam insuper quæ adhuc in sanguine delitescens separationi hætenus est inepta. Petraræ enim materia morifica omnis à Paroxysmo quantumlibet diuturno & crudeli, ita plene egeritur, ut nullæ protus in corpore reliquæ sint, eodem jam elapso. Ac proinde utriusque hujus causæ tam extra Paroxysmum quàm eo vigente ratio habenda. Quandoquidem verò materiz continentis eliminatio Naturæ omnis opus est, suâ ipsius methodo peragendum, cumque nihil interea temporis ad humores calidos acresque leniendos, absque damno digestionibus illato, possit tentari, nisi ut exulent ac evitentur victus medicamentaque calidiora à quibus inflammantur humores: maxima certe & præcipua Curandi intentio in eo verti debet, ut Coctioni, indigestionibus sublatis, contulatur, de qua jam agam: ita tamen ut in Dissertationis serie ea etiam attingam Remedia, prout anâ data fuerit, quæ ad leniendum humorum calorem, & acedinem retundendam facere possint. Quæcumque igitur naturæ opem ferunt in muneribus suis ritè fungendis, sive Ventrículum confortando ut alimenta ritè coquat, sive sanguinem ad debitam chyli in illum investit assimilationem, sive partes solidas corroborando, quo melius succos earundem nutritioni atque augmento destinatas in propriam substantiam convertant; quæcumque denique varia excretionis organa ac munitoria corporis in eo statu conservant ut singulatum partium recrementa debito tempore acque ordine valeant amandare; hæc & hujusmodi omnia huic intentioni adimplendæ conferunt ac propriè *Digestiva* appellantur, sive Pharmaca ea fuerint, sive ratio victus, sive exercitatio, sive aliæ ex istis quælibet, quæ *sex res non naturales* indignantur.

Hujusmodi Medicamenta sunt in genere quæ moderatè excalefaciunt, & vel ematiant, vel linguam leniter feriunt, utpote quæ ventriculo sunt pergrata, sanguini medentur, & cæteras partes fovent confortantque; qualia sunt, verbi gratiâ, Radices Angelicæ, Enulæ, Folia Absynthii, Centaurii minoris, Chamædryos, Chamæpitys, &c. Addi possunt etiam Anti Scorbutica vulgò dicta, ut Radices Raphani iustitiani, Folia Cochleariæ Hortensis, Nasturtii aquatici, &c. Cum autem herbæ istæ acres ac pungentes, ut ut stomacho



Stomacho ardeant, atque eidem conferant in Coctione juvanda, morbi tamen fomiti jamdiu fortuito, aculeos subdant, & augeant calorem, patet illis utriusque veniunt, præ aliis istis quæ miti calore atque amiritudine & ventriculum corroborant, & sanguinis massam vegetiorem reddunt ac magis vitæ em. Iota species aliquot affabre permittit humoribus concoquendis rectius, ut mihi videtur, quam simplex quolibet ex eorum tribu desumptum. Quilibet enim quoties specificis medicamentis cuiuslibet virtutis opus est nobis, Regula tenet, *Quo simplicius eo melius*; tamen cum id habemus propositi ut huc illive in licatione satisfaciendo regim tanquam, singula ingredientia Symbolum pro morbo curando quati conferunt; atque in hoc casu, quanto major est simplicium numerus, tanto potentius medicamentum operabitur. E prædictis itaque & reliquis ejusdem farinae materia medicæ, variaz Remedium formulæ ad hunc scopum tendentes concinnari possunt. Ego formam Electuarii ad exemplum Theriacæ Andromachi cæteris præfero, seu vultibus præst. utilissimam, eod quod maiori simpliciū confermentatio omnium virtutem adjuget, quali aliquid Tertium progignens, quod in ita conjunctis majora non est vitium in pari quantitate quam in eorum quolibet. Verum tamen delecti me ejusmodi ingredientium quam formulas quibus exhibenda sunt prudenti Medico lubens restituo; cum nunquam mei officii esse duxerim Recipeulas, ut vocant, conferbere, ac potius veras Indicationes notare ad quas Curationes sunt dirigendæ. Quod cum minus observetur, ex hinc, ut alio dixi, Empiricis anst. data est ut se artis medicæ Principes jactent. Veruntamen Tyronum gratia, remedium, quo ego uti soleo, in medium proferam, quod ad hunc modum componitur.

℞. Rad. Angelic. Calam. Aromat. Imperator. Enul. campan. Fol. Abiath. vulg. Centav. minor. Marrub. alb. Chamædr. Chamæpit. Scord. Calam. minch. vulg. Parthen. Saxitrag. pratens. Hyperic. Virg. aur. Scorpil. Mentha. Salvæ Rutæ. Card. Ben. Puleg. Abrotan. Flor. Chamæmel. Tanacet. Lil. Convall. Croci Anglican. Sem. Thlasp. Cochlear. hortens. Carvi. Bacc. Juniper. singulorum quantitatem sufficientem. Leguntur singulæ Herbar, Flores, & Radices quo tempore viribus pollent maximis. Siccantur ac in Pypitaceis Sacculis assistuntur dum in pulverem tenuissimum redigantur. Singulorum Unciæ sex simul probè mixtæ excipiantur s. q. mellis opt. despumati, & Vini Canarini, & in Electuarium debite consistentiæ conficiantur s. a. Sumat Drachmas duas manè & terò. Vel hujus defectu, sequenti utatur.

℞. Conserv. Cochlear. hortens. ʒi β. Absinthii Rom. & Flav. Aurantior. ana ʒi. Angelic. condit. Nuc. Moschat. conditana ʒβ. Theriac. Andromach. ʒiij. Pulv. Ari compos. ʒij. cum s. q. stupi Arantiorum fiat Electuarium. Copiat drachmas duas bis in die superbibendo sequent. Aquæ cochlear. v. vel vi.

℞. Rad. Raphan. rustic. incis. ʒiij. Cochlear. hortens. manip. xij. Nasturt. aquatic. Beccabung. Salv. Menth. ana m. iij. Cort. Aurantiorum num. vi. Nuc. Moschat. contul. num. ij. Cerevitæ Brunsvic. lb. xij. Destillentur organis communibus, donec solummodo libræ sex Aquæ eliciantur pro usu. E Medicamentis vulgè cogni-

tis Theriacæ Andromachi Concoctionibus robustis præ cæteris content: Cum tamen plures in se ipse res contineat quæ plus satis calefaciant, atque insuper Opio abundet, Electuarium supra dictum commodius parari potest & Vegetationibus præ ipsis excalefacientibus & corroborantibus. Curandum est interim ut ea simplicia eligantur quæ ad ægri gustum magis faciant; cum enim omni admodum, scilicet ad omnem ferè ætatem, in ejus vi perseverandum sit, omnino convenit ut palato minus sit ingratum. Inter simplicia cortex peruvianus primas obtinet, cum sanguinem corroboret vegetumque reddat, si ejus grana aliquot manè & terò assumentur. Et sanè uti in hoc Affectu de quo jam agimus, ita & in aliis Chronicis plerique hæc & hujus similia remedia quæ sanguinem corroborant, vegetumque reddunt (si modo eorundem color, propter easas postea adferendas, in spiritibus vinosis non consistat) præ cæteris juvant; quando quidem singuli hujus generis morbi ad unam eandemque causam universalem, humorum scilicet Indigestionem, si rectè conjicio, referri debent. Nihil est utem ex quo hoc certius evinci possit ac probari, quam si oculos ponamus differentiam præter morbos Acutos & Chronicos in eisdem; quoniam ob causam æquas Lector boni conlucet si præter ab eo, quod jam præmissis est, negatio digreditur. Prout itaque morbi Acuti præter habentur qui citò vel perimunt, vel ad Concoctionem perducuntur; ita Chronicis appellantur illi qui vel non omnino vel tardè admodum & longâ temporis morâ ad eandem Coctionem perungunt. Atque hoc quidem tam ipsa rei natura, quam verba quibus illa exprimitur, aperte loquuntur; ac verò causa hujus differentie quæ inter hæc duo morborum genera deprehenditur, altius latet, haud ita facile erenda: cujus indagationi si aliquantisper immoremur, opere, ut puto, vix nos poenitebit, cum harum rerum noticia clara ac distincta, ad inveniendas veras Indicationes horum Morborum Curationi accommodas, magnum momentum adferre queat. Sive in interiora terræ viscera, si ita loqui fas est, varias subeant mutationes, unde à Vaporum inde exhalantium interventu aer inquineretur, quod mihi maxime probatur: sive inficiatur Atmosphæra omnis, ab alteratione quam eidem inducit peculiaris aliqua corporum Cælestium quorumlibet Conjunctio: res ita se habet, ut ad hoc illudve tempus aer particulis referatur quæ humani corporis economiæ adversentur; ut etiam alio tempore istiusmodi particulis imprægnatur quæ cum corporibus speciei alicuius Brutorum minus conveniunt. His jam temporibus, quoties nos hujusmodi noxia & naturæ inimica præparata in nudum sanguinem inspiratione attrahimus, & in illos morbos Epidemicos incidimus, quos illa parere præparata sunt, Natura Febrim accerit, solennem nempe sibi Machinam ad sanguinem à materia aliqua hostili & contraria intus stabulante vindicandum. Et tales morbi Epidemici vulgè audiunt, & idè Acuti sunt & Breves, quia motum habent ita celerem & violentum. At verò præter hos morbos à causa externa excitatos, sunt & alii perinde Acuti, ab hoc vel illa peculiari sanguinis inflammatione nati, quæ non à causa aliqua generaliori ab aère pendente, sed à particulat particulatum corporum Anomalia vel intemperie producuntur. Quod quidem Febrim ge-



nus ego *Intercurrens* & *Sporadicum* idcirco vocito, quod annis fere quibuslibet occurrant. At vero morbi *Chronici* genus habent longe ab his diversum: quoniam is enim aer minus salubris hujus vel illius generis ad hos morbos generandos multum conlerat; non tamen aeri ita immediate originem debent suum, sed ut plurimum communi horum omnium *Patenti*, *Humorum* scilicet *Indigestioni*. Ubi enim quis Naturæ principia jam habuerit infirmata ac protrita, sive a senectâ, sive a magnis & continuis circa sex res *non-naturales* erroribus, præcipue in Cibo Potuque; vel si *Organæ Secretoriæ* eo usque fuerint deilitata, ut jam functionibus suis ad defæcandum sanguinem & ejus superfluitates eliminandas destinatis, prorsus fuerint impari; his in casibus uberiori humorum proventu jam coagmentato quam cui digerendo hominis vires iusticiant, dicuntur humores morâ maturiore varias fermentationes ac putrefactiones patiuntur, tandemque in *speciem* erumpunt, & varias morborum species edunt pro depravationum varietate. Et prout hi succi depravati variam habent indolem, ita variè in hanc illamve partem dilabuntur, quæ citæque excipiendis aptissima est; atque ibi sentim longam illam symptomatum seriem explicant, quæ partim à talium succorum natura, partim ab *aragis* illis patribus illata, tolent exoriri: quæ quo simuliuncta istam naturæ *disruptione* constituunt quæ morbi alicujus nomine insignitur.

Jam quodd ejusmodi impotentia naturæ ad coquendos humores plerorumque Morborum *Chronicorum* causa sit præcipua, facile liquebit, si animadvertamus Senes, quorum *Cochiones* sunt *læx*, & spiritus, earum instrumenta, ablumpti à repetitis vitæ longioris functionibus, hisce *Affectibus* magis esse obnoxios quam sunt Juniores quorum vitæ flamma magis accensa recrementa ista coacervata dissipat; & quorum *Organa Secretoria* jugi isto caloris naturalis sublidio instruuntur, ut functionibus in totius sanguinis massa depuranda peragendis nequaquam deficiant, nisi insuper premantur & quasi suffocentur à nimia humorum copia. Ad hæc talem humorum indigestionem plurium Morborum *Chronicorum* causam esse ex eo constat, quod Hyems ad istiusmodi morbos gignendos longe magis faciat quam *Æstas*. Licet nonnulli ex his morbis non actu exerantur nisi sub Brumæ exitum; attamen iste humorum proventus à quo illi pendunt per omnem Hyemis decursum succrescens, auctior factus ab ejus tempestatis frigore & effæro langore naturam debilitante, quo minus valeat in administranda corporis œconomia. Unde fit ut qui in *Æstate* satis bene habeant, ratò tamen Hyeme eos morbos effugiant ad quos magis sunt proclives, *Podagram*, verbi gratia, *Asthma*, *Tusses*, &c. Atque hinc etiam ratio deducenda est quare Peregrinatio in *Regiones* magis *Australes* ita efficaciter eos morbos expugnet, quorum curatio in frigidioribus incassum tentabatur. Eorum, quæ de generali morborum *Chronicorum* causâ jam dixi, veritas magis adhuc patebit ab ingenti & quasi stupendo ac incredibili emolumento quod ij qui morbis *Chronicis* plerisque, præcipue vero *Phthisi*, laborant, ab Equitatione percipiunt, quod genus *Exercitii* digestiones singulas invigorat firmatque, dum à continua corporis succussione calor naturalis re-accenditur, & *Organa secretoria*

destinata in munere depurandi sanguinis rite fungendo promoventur: unde necesse est ut sequatur Digestionum deperditatum quasi renovatio quadam, & e consequenti totius corporis Crasis optima. Quocirca è rationibus jam allegatis satis elucescit, quod non in *Podagra* tantum, sed & in aliis quoque *Chronicis* morbis, ubi nullum symptoma manifestum contra indicat, *Herbas* equimodi *excalescentes* magnum omnino commodum adferre, cum sanguini *Æstatis* calorem vel mediâ hyeme concilient: quamvis si *Æstivo* tempore earum usui assuescamus, melius præcavebunt mala ista quæ adversa tempestas solet apportare. Et profecto si ad hyemis usque appulsus deferantur quo tempore ingens humorum saburra accumulatur, periculum est ne terò nimis ad hoc alylum confugiamus, & quod dici solet, *per vitæ erroris*. Quamvis autem, ut supra fusius disserui, *Podagra* id sibi habeat peculiare, ut non tantum non juvetur, sed & lædatur a *Cartharicis*; tamen in aliis *Chronicis* plerisque & venæ sectio quoties opus fuerit repetita, & Purgatio ante sunt impetanda, quam Remediis corroborantibus & Digestivis hic à me laudatis opera danda est: ubi verò seeger his addixerit, in iis perleverandum est nullis intercalatis Evacuationibus. Etenim hoc est firmiter retinendum, quod quoties cujuscunque morbi curatio Remediis corroborantibus innititur, Evacuationes, qualescunque ex fuerint efficiunt prorsus. Denique non is sum qui asteram Medicamenta Digestiva jam memorata cæteris quibuscunque præstare: at verò dico eum qui Remedium ad hanc intentionem satisfaciendam potentissimum invenire potuerit, longè majora in sanandis Morbis *Chronicis* præstare posse, quam ipse se posse existimaverit. Illud verò iis omnibus quæ de *Podagra* sananda dicturus sum, præmittendum est, & maximopere præ cæteris observandum, nempe quod *Digestiva* Remedia quæcunque, sive medicamentorum apparatu, sive *Dietâ*, sive *Exercitatione* ea constent, haud obiter instituenda sint, verum constanter atque omni adhibita diligentia assidue usurpanda. Cum enim in hoc morbo, uti etiam in *Chronicorum* quamplurimis, causa ejus in habitum, & novam quasi naturam transiverit, nemo sanus existimaverit leviculam aliquam ac momentaneam alterationem sanguini atque humoribus à quolibet sive remedii sive vitiis genere superinductam, curationis scopum posse attingere; at verò corporis habitus omnis aliò traducendus est, atque homo integer deinceps quasi novâ include resingendus. Neque enim hic ita se res habet atque in morbo Acuto aliquo, ubi is qui modo athleticè ac pancreaticè valebat, repente Febre correptus, ab optimo sanitaris ilatu in morbum periculosissimum, quasi rupto ponte, præceps ruit. *Podagra* dispar admodum ratio: ubi quis per multos annos continuos comestitionibus, comotationibusque intemperantiis indulgendo, solita exercitia intermittendo, delicta atque pigritia intabescendo, vel etiam nimio studio atque irremissa animi intentione, aliisque vitæ erroribus, id egit tandem quasi dedita operâ ut varia corporis fermenta pervertantur, atque opprimantur Spiritus *Animales* (qui *Cochionis* instrumenta sunt primaria,) unde humores præter-naturales coacervati erumpunt tandem, cum jam ad summum gradum exalati fuerint, ac stragem edunt; Carnibus denique emollitis & effeminatis Articulis, unde humo-



humores illabentes promptius excipiunt. Atque ita demum alia quali natura sensum super inducitur, pristina & naturali corporis œconomia eversa funditus & deleta. Cum illi Paroxysmi, qui hominum incantominis ac minus perspicacium oculos animoque soli ferè perstringunt & occupant, nihil prorsus aliud sint quàm series & ordo symptomatum ab ista methodo pendentium, qua uti solet Natura in materia morbum committente fortas pellenda. Quamobrem operum ludis quilibet hoc illove sive medicamento, sive etiam regimine subinde in usum revocato, hunc morbum protelare satagit. Cum verò hic habitus tum in Digestionum omnium labefactione, tum & in amissione firmitudinis naturalis partium singulatum præcipue funderetur ac conlueret, utrique malo occurrendum est; & tam Coctionum robur, quàm firmitudo partium pedetentim reduci debet ac restaurari, pro modulo scilicet pristina ac consuetæ corporis œconomiz. Quantumlibet verò istud plene perfecteque fieri non posse videatur, non eo solum nomine, quod Habitus quicumque non nisi ægerime in sibi contrarios transmutantur, sed etiam quod ætas lenilis, quæ huic morbo ut plurimum comes est & locia, vehementer retragatur: tamen quantum vires annique sinent, tentanda est curatio, & prout æger propius ad hanc metam accedet, vel recedet longius, Podagræ tyrannidem magis minusve effugiet. Atque porro animadvertendum est, quod Remedia *ætica* vel Digestiva, sive partem Medicam ea spectant, sive Diæticam, in Paroxysmorum præcipue intervallis in usum revocanda sunt; idque quàm longissime fieri potest à Paroxysmo insecturo. Neque enim sine magna temporis mora & periculi Remediorum ulu Concoctionum omnium corroboratio, fermentorum corporis jam imminutorum restauratio, tantaque firmitas quantam experitur tum sanguis, tum viscera, lenio adversante possunt acquiri. Quantumlibet verò profuit hæc aliæque ejusmodi remedia, attamen huic solis hæc corroborandi intentio satishieri nequit; sed & eorum etiam rerum habenda est ratio quæ ad artem propriè medicam non spectant. Et certissime voto frustrabitur is qui in hoc aliove morbo Chronico omnem curationem Medicamentis solis absolvi posse autumat. Primum itaque ea in cibo potuque mediocritas est observanda ut neque plus alimenti ingeratur quàm ventriculus concoquere valeat, ac proinde morbo fomes subministretur: neque è contra, nimia abstinencia partes eâ proportionem defraudentur, quæ earundem robur & vigor debuerat sustineri, unde etiam magis debilitentur quorum utrumque ex æquo nocet, prout tam in meipso quàm in aliis haud semel expertus sum. Ad hæc, ciborum quilibet quod spectat, licet *ætica* per se considerata *ætica* præferenda sint, attamen ægri palato est consulendum quandoquidem observandum est, quod sæpe numero id quod ventriculus vehementer appetit, licet difficilius coquatur, citius tamen à natura vincitur quàm quod facilius concoctionis habetur; si ventriculo nauseam creet: at verò quæ *ætica* habentur, ideoque parcius sunt comedenda. Unica etiam ciborum specie singulis partibus vescendum arbitror, cum varia carniū generà simul ingesta plus ventriculo molestiæ faciant quàm unicuique quod omnia ista quantitate exaquet. De cæteris, demptâ carne, pro libitu

comedat, modò nec actia, nec sale condita sint, nec aromatiz; quæ licet coctionem non laedant, nocent tamen quatenus morbi fomitem exagitant.

Tempora quod attinet, Prandere tantum expedit; cum enim lectus humoribus dirigendis propriè dicatur, id temporis in cibis concoquendis non est instrumentum. Non conent itaque qui Podagræ sunt obnoxii; haurtum tamen Cerevisiæ alicujus tenuioris libet diorem sibi indulgeant: quandoquidem etiam Renum Calculo generando proclives ferè sint tales; cujus concretionis à liquore ejusmodi hoc tempore hausto multum impeditur, refrigeratis scilicet ab eo Renibus prolutisque. *Galactophoria*, seu Diæta è solo lacte sive crasso, si ve cocto, exulantibus cæteris omnibus, nisi quod panis aliquid semel fortè in die adjiciatur, ab Annis terò viginti obtinuit. Profuit hæc quamplurimis præ cæteris hujusce morbi prædictis, quandiu ne latum unguem ab ea discesserint. Quamprimum verò ad sanum usum diætam, ut ut lenem mittentque, sese receperit qui huic insueverat, Podagra confestim reverta ægrum pejus longè quàm antehac vexavit: labefactis enim hac methodo naturæ principis, æger jam morbo pellendo magis impar redditur, unde & periculosius infestatur & diuturnius. Qui igitur huicce methodo tradere cogitat, primum serid tecum perpendar, num valeat per omnem vitam in eadem persistere: quod tamen fortassis penes eum non erit, ut ut propositi tenax fuerit: Novi enim Nobilem quendam qui postquam per annum integrum solo lacte victitaverat, non tantum sine offensione sed & cum summa voluptate; (quo tempore quotidie semel aut pluries deiecerat) iustente detrepente alvo ac mutata corporis temperie, manente verò adhuc animi propensione, & ventriculo tandem ad lac nauseante, abstinere coactus est. Nonnulli verò Hypochondriaci, crasso corporis habitu, vel qui aliis liquoribus spirituosius diu multumque assuevere, lactis usum nullatenus ferre possunt. Interea emolumentum illud per breve ac fugax quod ex hac diætâ percipiunt illi quibus cum lacte convenit, hinc oritur, videlicet quod non tantum diætâ sit simplicissima (unde nullus dubio quin Jusculum Avenaceum, modò ventriculus illud ferat, idem præstare possit) sed etiam sanguinem dulciorem mitioremque reddat, particulas in eo actiores contemperando: atque insuper, quod ego palmarium judico, cum hac alimenti genus sic A ulis prorsus impar, istam humorum turgesceniam sive viscositatem reprimat cui Podagra ortum debet, atque eo nomine paucos istos quibus congruit, tamdiu Podagra immunes præstat quandiu eo solo vescuntur, nec juvat ulterius. Cum enim Podagræ causæ originali ac primariæ nempe Concoctionum ac Fermentorum debilitati omnino contrarietur, longè magis hac ratione obest quàm alteri prodest. Quod cum minus perspectum fuerit, nonnulli incautiores in errores permagnos & planè exitiales inciderunt; dum morbi causas, Continenti, humorum scilicet calori & acedini, obviam ire satagentes, Concoctiones persuaderunt, & Functiones naturales prostraverint omnes. *Liquores* quod spectat, si, me iudice optimi sunt qui neque ad Vini generositatem ascendunt, nec ad aquæ debilitatem deprimuntur, cujusmodi sunt Cerevisia tenuis *Londonensis*, sive lupulata, sive non lupulata, cum



extrema ab utraque parte nocent. Primum de vino, licet Proverbio jactetur, Vinum potans Podagrâ laborabis, & Vinum non Potans laborabis Podagrâ; extra controversiam tamen est & variis *medicamentis* experimentis confirmatissimum, Vinum de tacto officere. Licet enim prodelle credatur uvanis Coctionibus, quarum vitia causam Podagrâ Antecedentem) in udam illam ratione tamen Cautâ Continentis omnino esse censendum est, humores scilicet, fomitem morbi, jam in prociectu stantes accendendo exagitandoque. Sed in que damus Vinum propositi ordinatio usurpationis Coctiones promovete, et potius subvertere dicimus, in diu vino allietis. Quamvis enim calorem aliquem in transitu impertiat, certissimum est tamen ferreâ corporis ab eo subjugari, & avocari spiritus naturalis atque fugari: unde est si bene consilio, quod Bibaces atque Nepores isti male ferari, Podagrâ. *Paralyti, Hydropes* aliisque morbis frigidiis re. e perimuntur. Adde, quod jugis & immodica vini ingurgitatio corpus ad instar corporum Fœminatæ emollit laxatque; cum liquores temperati partem omnium tonum roborent ac firmant; unde qui liquoribus tenuioribus semper anteverser, Podagrâ ferè nesciunt. Notandum est in super quod huic morbo maxime obnoxii viri sunt, qui licet immensam habent concoctionem ca utalem, tamen ex quadam sanguinis luxuria plus satis nutritio & in remaneum lumunt ex materia quadam indigesta loco substantiæ tanioris & citè compæctæ. Hanc sanguinis luxuriam *Omentis* ad auget magis, ac proinde tum novam materiam laborantem accumulat, tum etiam fomitem jam diu repositum quasi uisitatâ facit actu in morbum provocat. Huic accedat istud, quod cum Podagrico tum sanguis isti qui est Pleuriticorum, aliorumque morbis inflammatoris laborantium periculis venis extrahitur, perissimilis sit, si ac infanorum esset sanguinem jam *Pyrolyti* ulterius spirituosus liquoribus, seu ignem oleo, proutat. Neque tutius ex advero liquores nimium refrigerantes in usum revocantur, cum hi Concoctiones prorsus deiciendo, & extinguendo calorem naturalem, majorem adhuc noxam inferant; non dolorem scilicet ut vinum, sed ipsam aded mortem: prout experientia docet in iis qui ad senium usque vino liberalius indulgentes aquam aut tenuiores liquores derepente cum vino, & non ita diu post vitam cum morte commutantur. Hic itaque podagrâ obnoxii in potum modus statuatur, ut iis uvanur liquoribus, qui neque vel in maxima copia assumpti inebriare possunt, neque frigore suo ventriculum lædere. Hujusmodi est, ut dixi, cerevisia tenuis nostras, & aliis regionibus confici poterit ex multa aqua cum p uero vino permixta. Aquam puram crudamque periculosam existimo, & expertus sum meo damno. Atamen satis commodè ab inuente ætate potatur aqua; quâ hodieque longè major hominum pars sitim levat: inopia uia teliores sunt quam nos nostrâ copiam & luxu. Testes appello ingens morborum agmen quo corpora nostra hoc nomine discruciantur, podagrâ scilicet Calculum, apoplexiam paralyfin, &c. tum & vim animis illam quâ a nativâ rectitudine transversum aguntur, dum adventitiæ illius liquorum spiritus, cum spiritibus animalibus cogitationi formandæ interservientibus complicati mentem nimium volatilitando perturbant,

vana ac ubi illa loco feram solidatam aqua alienius momenti succingentes: atque ita cum inuim ingeniose lepiolos ac sicaces, pro sapientibus non reuocantes; inter quos eadem reuocant diffidentia interuenit atque est inter substantiam de prioribus nihil. Sed de his satis.

Jam vero quomodo sufficit tibi qui podagrâ mittis at eandem per intervalla talet, vel cerevisia tenuis ut, vel vino diluitori, cum is morbi gradus tanti non sit ut severiori regimini se subiiciat; tamen cum universa corporis sustinentia in podagrâ quali degenetaverit, minus quam exoptet in profligando morbo promovebit, qui non a liquore fermentato quouque quantumvis tenui & tenui, in totum abstinet: cum hi omnes spiritus pungentes, & aliquem acedinis gradum in se continent; & quod potius est, quatenus tamen nro imbuit, (perinde ac flores cerevisiæ liquoribus in huius vim tamen fermentativam totum maxime communicant,) humores fermentationi perpetue adducunt. Potus itaque dixeris ex ingredientibus vulgò notis & huic utilitatis potus & lipoti ordinatio præstibendum est: modo non sit iusto fortior, quo huius multo minus periculose accenduntur humores quam ipso vino; nec è contra aquosior iusto, naturales functiones nimis refrigeratione prosteruens. Hujusmodi potus si recte paratur vel etis ingredientibus illis quæ ægro minus sunt ingrata, licet ad septimanam unam alteramve non sine aliquam fastidio ita jugiter assumatur, postea tamen perinde gratus & acceptus est ac ut alii liquores quibus quis maxime assueverit. Atque ab hoc potus genere non tantum non imminuetur appetitus, sed & augebitur: magis insuper naturalis & genuinus evadet quam cum liquoribus fermentatis uti soleret. Hoc insuper commodi accedet, quod qui hujusmodi potum dixericum loco ordinarii hauriunt, liberius in cætero victu sui possent indulgere, quam cum cerevisiam bibent, aut vinum: cum errores in victu, (cuius omnes penitus eitate pene supra humanum iocum est) hoc pacto aliquatenus corrigantur compensentur que. Quod verò omnium primum est, æger hoc modo non à Calculo præteribit: qui Podagrâ ferè in iis iduus est comes; cum liquores acres ac attenuantes quilibet, uti ad Calculum jam factam proritandum, ita ad eundem generandum etiam faciunt. Liquor sequens, ut pōte qui gustu ac colore jucundo est, mihi maxime arridet.

℞. Sall. paril. ʒvj. L'ign. Sall. phr. Chinæ, & c.c. ana ʒij. Glycyrrhiz. ʒi. coq. in Aq. tonan. Cong. duobus per horæ dimidium; deinde stent clauis super cineres calidos per horas 12. postea ebulliant ad tertiam partem consumptionem. Cum primum ab igne amoverint, infunde sem. Anisi ʒss. Post duas horas coletur, & postea deputeatur per residuum, & liquor clarus reponatur in lagenis vitreis probe clausis ad usum. Hic liquor tum primum commodissime in usum trahetur uoi quis à Paroxysmo convalescit; atque in eo perseverandum tam in ipsis Paroxysmis, quam in eorum intervallis per reliquum vitæ cultum. Neque enim satis factum est se viiente adhuc morbo novis rebus stultis, cum in eiusmodi aetate & motu inordinato natura vix ferre queat ut liquores fermentati, qui vegetiores sunt ac magis spirituosus, cum alio meri ac spiritibus destituta com-



commutentur. Eodem etiam tempore & *Electuarium* prædictum usurpabitur; quod pariter deinceps tam in Paroxysmorum insultibus quam extra eos quotidie est devorandum. Huius calor Potus Dietetici aquositate quadatenus pensabit, sanguini & visceribus debitum caloris gradum concilians, sine ista agitatione quæ excitari solet ab æstu liquorum fermentatorum. Si quis objiciat eam vitam vix vitalem esse in qua omnimodum à vino tum ab aliis liquoribus fermentatis abstinentia observatur; respondeo perpendendum esse an non longè mihius sit ac minus tolerabile diutius inveteracentis Podagræ cruciatibus (nam in minori morbo non hoc postulo) quotidie excarnificari, quam huic soli liquoris adstringere; cuius usu continuo in cæteris esculentis ferè omnibus animo obsequi licet: ut jam non repetam, quod & hic potus (uti cætera omnia) dulcescet consuetudine. Certe qui hunc morbum expertus est modò Homo, modò bipes fuerit pecus, nihil ambiget in quam partem debeat concedere. Quo non obstante, si æger vel à longo ac nimio usu liquorum inebriatus, vel ab ætate provectiore, vel denique præ nimia debilitate, cibos absque vino vel quovis alio liquore fermentato nequeat concoquere, non vacat cerè periculo eundem protinus ac derepente à vino depellere, qui quidem error haud paucis lethalis fuit. Proinde itaque, si me avertit, Apozema Dieteticum supra præscriptum addicet, vel, si eodem uti statuerit, ei sensim alluescat, haustum vini in pastibus ad tempus aliquod sibi indulgens, quasi Remedii loco potius quàm Dietæ, donec decoctum illud familiaritas evaserit. *Vinum autem Hispanicum* hic loci tam Rhenano, quàm Gallico omnino præferendum est; quæ posteriora licet ventriculo pergrata sint, tamen exacerbandis humoribus & augendo morbi fomiti apta nata sunt. Adde quod cum æquè ferè cruda sint & vix magis concocta quam est nostrum Pomaceum, non perinde cardiaca sunt atque calida ac res postulat. Atque hæc de Cibo Potuque *adversarius* dicta sunt.

Est & aliud quod tamen parvi pendatur, magni tamen momenti est, tam in digressu morbi sonite, Paroxysmo adhuc vigente, quàm ad prohibendam ejusdem materię generationem extra Paroxysmum, nempe ut æger, maxime hyemistempore, maturè lectum petat. Etenim post venæ sectionem & Cathartin nihil æquè naturę vires subruit ac noctu vigilare: quod quidem valetudinariorum quilibet expertus affirmabit, si serio animadverterit quanto alacrior vegetiorque exurgit quoties se lecto temporis commiserit, quàm verò enervis est ac languidus quoties ad multam noctem vigilaverit. Et quamvis res eodem recidere videatur an citius serivle quis lectum repetat, modò per tot horas eidem indulgeat, verbi gratiâ, an *horâ nonâ* cubitum; eat & *quintâ* surgat, vel *undecimâ* cubitum eat & surgat *septimâ*; multum tamen interest, idque ob hanc, ut existimo, potissimum rationem. Inter diu scilicet spiritus dissipantur, sive in corporis exercitio, sive animi, qui in minus rectè valentibus ita sunt infirmi ac debiles ut vesperti somni subsidio maturius opus habeant; & cum noctis appulsiu æconomix corporis quasi relaxationem quandam adferat quæ diurno tempore à

solis influxu vegeta conservatur, lecti calor, brevità præferam, solis vicem ut gerat necesse est. Mane verò spiritibus tam à prægressis noctis quiete quàm à lectuli calore refocillatis invigoratisque, præter quam quod dies superveniens firmitatem ac robur corporis tono conciliet, diluculo surgere hoc tempore, licet horam unam alteramve à somno matutino detrahat, non ita altum vulnus Naturæ infligit ac vigiliæ vespertinæ ad horam unam vel alteram protrahit. Quamobrem illis qui Podagræ sunt obnoxii Author ego sim, hyeme præcipuè, ut lecto maturè admodum se committant, & diluculo exurgant, quantumvis somnus iusto brevior suadeat: ut diutius cubantes eundem adhuc veniant. Cum somnus qui ita diutius capitur lectu ut noctis somno tantundem detrahat, atque ita tandem in diu vi illata, spretoque sapienti ejus instituto, noctem pro die quis habeat, diem perverius pro nocte. Quamvis autem tranquillitas omni ope stabilienaa est: cum perturbaciones omnes, si repagula semel effringant, ad solvendum spirituum, qui sunt Digestionum instrumenta, istam, ac proinde ad Podagræ incrementum magnum faciant. Prudenter itaque secum meditent æger mortalitatis suæ conditionem, nec se eam quæ eam sequuntur molestiarum exortem stultus opmatur: sive enim suipsius, sive aliorum culpâ hanc animi ægritudinem pariat, non poterit unquam mundo leges dare, qui nemini hætenus, quantumlibet demum potens aut sapiens fuerit, semper mortem gessit, neque ita cuiquam semper ex animi voto cadebant res omnes ac vana mens sponderat, ac derepente inter rerum apparatus animam agens humanæ fragilitatis specimen tandem edit, immerito se brevi vitæ fructu spoliens: Idem etiam incommodi sequitur nimiam animi ad studia & res serias applicationem: Cum enim huic morbo præ cæteris quibuscumque melancholia vulgè dicta comes semper adhæreat, qui ei sunt obnoxii, Spiritus Animales diu multumque cogitando, etiam non adhibito artificiali librorum à liminulo, fatigare solent atque obruere, hoc ipsum ita valde ac nimio opere agentes, ut corporis æconomia integra amplius conservari nequeat: Quam ob causam ut mihi videretur, hic morbus per paucos insipientes (me excipiat qui vult) occupavit unquam. Cæteris verò omnibus, quæ ad impediendum humorum indigestionem (quam ego primariam Podagræ causam constitui) & ad sanguinem idcirco corroborandum, ac firmitudinem partibus conciliandum faciunt, *Exercitium* corporis facile palmam præcipit. Animadvertendum est autem, uti supra monui, quodcum in hoc morbo, etiam magis quàm in Chronicorum quovis totius corporis Habitus immutari debeat, exercitatio corporis nisi quotidiana fuerit nihil juvabit: huiusmodi enim exercitatio per vices intermissa, uti nihil ferè conferet ad immutandum corporis habitum ab inertia atque indulgentia jam languescens & effeminata, ita fortassis & nocere possit, Paroxysmum accensendo, ubi quis jam diu ab ea desisterat. Hoc verò exercitium vehemens non sit oportet, tale verò quale Senibus competit, qui Podagræ subiecti sunt magis usitata. Morus enim corporis iusto vehementior spiritus nimium dissipat, & de consequenti Concoctiones lædit; quando exercitatio



ratio moderata ac perseverans eisdem firmet. Quantumlibet hoc durum videatur homini, qui præter senium & corporis ad motum ineptitudinem, & locordiam huic præsertim malo quasi connaturalem, dolore insuper mactatur, tamen si hoc omittatur nihil ex hæcenus inventis quicquam proficiet. Uique Paroxysmorum intervalla sine jugi corporis exercitio magna esse non possunt, ita etiam ad Calculi generationem talis erit proclivior; qui quidem plus habet & periculi & cruciatûs quam ipsa Podagra. His adde, (quod magnum pondus habere debet) materiam *trophaceam* a longa requie admodum auctam in Articulis corporis maxime verò Digitorum, ita ut tandem omni motu priventur. Ut ut enim fidenter asserant nonnulli horum trophorum materiam nihil aliud esse quam sanguinis *Tartarum* ad articulos transmissum, facili tamen constabit cuilibet rem paulo attentius perpendenti, quod dum magna vis materię inconcoctę Podagram faciens in Articulos quosdam depluit, & partes vicinas diutius tumidas reddit, tandem accidit, ut partim harum virtus assimilativa sufflaminetur, partim à suffocante obstructione quam in eis parit inter hic humor, dicta materia generetur, quę a calore doloreque articuli in huiusmodi substantiam cogitur, atque indies augeatur, tum eandem tum eorum articuli in propriam naturam vertens; quę jam nuda jacer, aciculā, ad instar *Creta*, *ocul. Cancer*, aut similis alijus rei, extrahenda. Jam verò hoc malum ab exercitio quotidiano præcaveretur, a quo oritur debita humorum Podagram generantium, qui unam aliquam partem libenter occupant, distillatio per omne corpus. Unde sit, uti ipse experitus sum, quod exercitatio longa & quotidiana non tantum non officit generationi trophorum, sed etiam trophos veteres & induratos solvit, modo non consueque invaluerint ut eorum extimam in suam substantiam mutaverint.

Exercitii genus quod spectat, *Equitatio* quoties nec grandior ætas, nec Calculus intercedant, reliquis longè præferenda est. Et sanè diu multumque mecum reputavi, quod si eni innotesceret medicamentum, quod & celare vellet, æquè efficax in hoc morbo, ut in Chronicis pleurisque, ac est *Equitatio* constans & assidua, opes ille exinde amplissimas facile accumulare posset. Hęc si uti non liceat, vectio frequens in curtu ferè eodem recidit. Atque in hoc saltem Podagrę laborantibus plerisque benè est, quod opes quę luxurię, unde pullulavit morbus, irritamenta erant, facultates curtus habendi subministrant, quo hac saltem exercitationis specie fruuntur, cum altera frui nequeant. Observandum est autem, quod Exercitatio in aëre salubri longè eā præstantior est quę in minus salubri peragitur: ruri scilicet potius quam in urbe, ubi aër vaporibus a variorum Artificum officinis exhalantibus est repletus, & ædificiorum densitate contigatus; qualis est in *Londra* hoc nostro, urbe quantum certo scimus omnium quę in toto terrarum orbe sunt, spatiosissimā. Quantum verò intersit ab his ruri an in urbe, se exerceat, Podagricorum quivis statim persentiet. Quod *Venerem* attinet, is qui tam Podagrā quam senectū laborat (quandoquidem jamjam eā spirituum copiam destitutus est quā Concoctiones promoveri debuerant, & per consequens abique hac cla-

de adventitiā articulos & reliquas partes adiacentes plus satis laxatas habet & debilitatas) æquè improvidus meo judicio foret, si ejus concinns indulgeret, atque ille qui cum longum iter emetiendum suscepit, Viaticum omne prius abligitaret quam te via committeret. Quinò præter malum quod sibi acciderit languidiora vi jam fatiscentis desideria non cohibens, in xmo illo Privilegio fruendi Jubilæi, quod speciali atque eximio naturę munere senibus conceditur, se abdicat, qui jam in ultima viæ scena ab eorum libidinum impetu, quę, ceu tot tabida senex, eos per juventam omnem diu incedit, quasi laniabant, tandem aliquando sunt emancipati: cum horum appetituum expletio nullo modo longum illud malorum agmen quod cum vel commitabatur, vel insequabatur, penaret unquam. Atque hæc de Reginine.

Quamvis autem huiusmodi Regimen tam Diætam quam ceterum regimen spectantes, si ab homine Podagrę obnoxio religiose observentur, ab enormioribus morbi insulubus præservare queant, atque istam sanguinis & partibus solidis firmitatem conciliare, quę ab illa malorum illiade unde morbus non solum supra humanę patientię vires, sed & funestus tandem redditur, eundem immunem præstare possit; non tamen efficiunt ut non post quædam interalla maxime exeunte hyeme, Podagrā quandoque teneatur. Licet enim æstivo tempore dum totus vigorque sanguinis à Solis calore excitatus fuerit & in statu conservatus, & pariter debita humorum per poros eliminatio pro voto successit, omnino oportet ut coctiones longè melius quam hyeme celebratę fuerint; tamen cum appetente bruma & sanguinis robur fuerit imminutum, & perspiratio per cutis poros impeditior, necesse est ut ingens materię indigestę colluvies sit accumulata, quę tandem diuturnā morā in speciem prorumpet, propriis se exerens symptomatis & Paroxysmum inducens, quamprimum vel ab humorum motu ab accessu Solis propiore, vini potatione, exercitio vehementiori, aut aliā causā evidenti quacunque ansa derut. Ex jam dictis liquet eum qui huiusce morbi curationem molitur, id negotii sibi dare debere credere, ut totius corporis habitum immutet, atque illud ad pristinam constitutionem resingat, quantum per ætatem & reliquas circumstantias fieri possit: quod in Paroxysmorum interstitiis, non in ipsis Paroxysmis annitendum est. Cum enim morbi formes non solum generatus, sed & in articulos jam ablegatus fuerit, serò nimis vel ejusdem mutationem vel eliminationem per alias vias conabimur: Cum non aliā methodo foras ejiciendus sit, quàm eā quam natura pramonstrat, cui soli permittendus omnino est Quod & in Febrium Intermitentium Paroxysmis usu venit, quas ob eandem causam remediis non oppugnamus, nisi æstu prius consopito. Nec absurdus quis in exringendis harum febrium, calore scilicet à sibi, inquietudine, aliisque symptomatis anxie operam locaverit, quàm exillimaverit alius se Podagram sanare, cum in Podagrę symptomatis tantum coercendis laboret; quam tantum hoc tempore à curatione morbi abscedat, ut eandem aliquatenus impediat ac remoretur. Quanto enim magis ægri dolores leant, tanto magis humorum concoctioni adversatur; quantoque claudicationem accit



ardet, tanto materiz morbinica expulsiōi officit. Adde quod quanto paroxysmi furor ac acies retunditur, non solum tanto diutius affiget, sed & brevius erit spatium interjacens, & minus etiam liberum ab omni gradu symptomatum quibus hic morbus lunectatur. Quod nemo inhiabitur qui diligenter trutinaverit quæ supra in huiusce morbi historia edisserui. Quamobrem licet nihil magis in *Paroxysmo* tentandum sit, nisi quod istis symptomatis occurrendum est, quæ talia medendi methodus quādoque paratur: tamen cum omnes uno ore fateantur morbum huncce ab humorum copia & exuberanti plenitudine nasci, ægro fortasse conducet à carnibus per aliquot dies, ubi primum à morbo corripitur, abstinere, & harum loco simplici iusculo Avenaceo uti, aut alio pari alimento: cuiusmodi diæta tenuis materiz morbificæ imminuendæ multum conferet, & naturæ opportunitatem subministrabit, quā eandem ocyus digerat. Cum vero ingens sit corporum aliorum ab aliis discrimina, quibusdam abstinentiam a carne non ferentibus, statim verò ab ea spirituum animalium *crasis*, animi deliquio, aliisque symptomatis quædam faminis Hysterica affectione laborantibus accidere solent, correptis; istos non tantum non juvabit, sed & lædet, si diutius à carnibus abstineant quam ventriculus earum usumnaveretur: quod ut plurimum non excedit primum aut secundum diem eorum Paroxysmorum particularium, qui omnes simul iuncti integrum Paroxysmum, ut supra innui, constituunt. At verò si tardius sive ocyus quis carne vescatur, seriò cavendum est ne urgente morbo maiore copiâ utatur, quam quæ ad naturam sustentandam necessitas sit, nec minore curâ opus est in assignanda victus qualitate. Namque ut semper in Paroxysmorum intervallis, ita præcipue Paroxysmo jam præsentē, æger summo perē curare debet, ne quid vel in quantitate vel qualitate sive potus, sive ciborum peccetur. Neque in hoc solo, sed in alio omni Regimine, de quo fufius egi, in intervallis observando, cautela haud vulgaris adhibenda est. Et licet tam dolor quàm magna ad motum inhabilitas, exercitio, quod ego præ cæteris omnibus laudavi, contra indicare videantur, tamen & hic labor exantlandus omnino est. Quilibet enim in Paroxysmi initio ægro impossibile videntur ut lationem in cursum multò minus ejus motum ferre queat, attamen si tentaverit, non ita diu post sentiet se minus a tali motu dolere, quàm cum se in cathedra domi contineret. Id insuper accedit emolumentum, si ad horas aliquot tam manè quàm post meridiem in curru vectus fuerit, quod cum domi toto die sederet noctem ferè insonnem ageret, jam dolorem somno ad multam noctem fugare poterit; cum exercitatio permodicæ Podagræ laborantem eonsequē delasset, ut in somnum dilabatur. Adde quod eadem exercitatio calculum, quem vita deses ac iners, ut plurimum accersit, quadantenus præcavebit. Quod verò maximi momenti est, à jugi ac pertinaci exercitio occurreretur totali Artuum ad motum impotentiz, quæ haud paucis accidit post Paroxysmum unum alterumve diuturniorem contractis, sive poplitum sive calcaneorum tendinibus dum enim in cruciatu longiore quie-

ti indulserint (maximè crura volentes extendere quoties dolor genus occupaverit) tandem crurum ac pedum motu per reliquum vitæ tempus orbatî sunt, tam in Paroxysmorum interstitiis quàm in ipsis Paroxysmis, quos non ita tamen effugiunt. Quinimò in iis senibus quorum concoctiones admodum vitiatæ sunt, & qui à morbo per multos annos affligente ipsam corporis substantiam quasi in Podagram habent conversam, nihil minus sperandum est quàm ut morbus sine exercitio ad digestionem perducatur unquam: cum enim morbus naturam viribus superet, sæpè moriuntur à langore atque ægitudine fomitis morborum copia concoctionem respuentis apportat, & ab hac materia incoctili, quæ nullo modo potest assimilari, tanquam a veneno enecantur. Attamen non obstantibus iis quæ de exercitii utilitate in Podagræ Paroxysmis dicta sunt; si tamen æger præ nimia Paroxysmi atrocitate primo statim in ultu quasi prostratus fuerit, (quod istis ferè usu venit in quibus podagra jam *crura* suam attingit, nec adhuc à multorum annorum decursu mitigata est) hoc in casu si æger cubiculo includendus est, e re erit ut etiam lectulo ad primos dies aliquot, donec scilicet doloris vehementia remiserit, idem includatur: etenim lectulus exercitii defectum aliquatenus supplebit; cum ejus usus continuus materiam morbificam potentius digerat paucis diebus quàm excubatio aliquam multis, maximè incipiente morbo; si modo æger absque leipothymia aliisque malis symptomatis à carnibus abstinere queat, solo iusculo Avenaceo, cerevisiâ tenui & cæteris ejusmodi contentus. Veruntamen haud emittendum est, quod si podagra jam inveterata fuerit, atque æger ad animi deliquia, ventris tormina, diarrhæam, aliaque his similia symptomata propendeat, vix libitina evitabit ab aliquo Paroxysmorum jugulatus, si non exercitio utatur, idque in aère liberiore ac perstabili loco; quod diligenter animadvertendum censeo, quando magnus Podagricorum numerus iis symptomatis jam perierit, quibus hæc in cubiculo, & præsertim in lecto incarcerationio eosdem obnoxios fecerat, qui non ita maturè factio concessissent, si molestiam vegetationis per maiorem diem partem devorare voluissent. Licet enim qui unico artuum dolore fatigatur, se cubiculo possit includere, tamen qui loco doloris acerbissimi, ægitudine, aliisque symptomatis prædictis laborat, talis idem imitando, se in vitæ discrimen coniciet. Et quidem benè nobiscum agitur quod quoties dolor ita vehemens est, ut æger motum tolerare non valeat, neque eo admodum opus habeat; ipso dolore, quod amarissimum est naturæ remedium, ægro de vita prospiciente.

Jam vero quod attinet podagræ *symptomata*, iis occurrendum est à quibus æger in *Paroxysmo* de vita periclitatur. Horum maximè familiare est ventriculi debilitas ac languor, cum ventris torminibus tanquam à flatu; quod iis accidit, qui vel jam à multis annis podagræ obnoxii vixerunt; vel iis qui licet non ita diu eadem laborantes, hoc tamen mali invitarunt præposterè, liquores spirituosos cum tenuioribus & multum refrigerantibus derepentè,



commutantes; vel *emplastra repellentia*, aliaque medicamenta refrigerantia partibus affectis ad leniendum dolorem admoventes, unde morbi causa materialis quæ in artus debuerat deponi, in viscera rejicitur. Multa egomet expertus sum in postremorum annorum Paroxysmis ad mitigandum hoc symptoma; nihil vero æque votis respondit ac vini *Caurenfis* haustus subinde deglutitus, laugore, atque ægritudine urgentius: neque vel vinum Gallicum rubrum, vel Theriaca Andromachi, neque aliud quodlibet e Cardiacis mihi hæcenus notis pares habet vires. Sed neque vinum hocce, nec Cardiacorum aliud quodlibet ægrum, si exercitio non utatur, omnino servare posse existimandum est. Sin autem gravius aliquod symptoma inducias non ferens, ex retrocessu materię podagricæ subito ingruat, & mortem ægri minuetur, neque viro neque exercitio supra laudatis sfidendum, verum hoc in casu, modo non caput, at partes naturales vel vitales ejusmodi malum impetat, ad *laudarium* statim confugiendum; nempe *laudarium liquidum gutt. xx. haustulo aq. epidemicæ immista propineatur*, & in lecto ad quietem æger se componat. Quod si materia pod. gram committens, quia non jam in artus fuerit eliminata, Diarrhœam induxerit, modo ea Paroxysmi singularis crisis non fuerit, & *laudario* jam laudato, & exercitio omniūsmodi (hoc enim imprimis ad diarrhœæ curationem obeundum est) non obitante, alvus nihilominus diutius fluat, ægritudine, torminibus ventris, &c. accedentibus, unicuique quod scio, remedium est, *Sudor* provocetur methodo & medicamentis huic usui destinatis: quod si fiat ad biduum triduumve manẽ & vesper, per duas tresve horas continuas, sistetur et plurimum Diarrhœa, & morbi fomes magna vi in artus detonabit. Hac ego methodo aliquot retrò annis meæ viæ consului, postquam me in hoc malum a potatione aquæ frigidæ pro ordinario potu, imprudens conjeceram; idque posteaquam Cardiacorum & adstringentium varii generis opem frustra imploraveram. Est aliud symptoma non perinde crebri, quod tamen aliquoties ipse vidi, metastasis scil. materię peccantis in pulmonum lobos; quoties nempe tussis brumalis à frigore, tempore paroxysmi suscepto, materiam censum in pulmones allicit, artus interim, ob translationem materię morbificæ in aliam regionem, vel omnino, vel tantum non, tam a dolore quam a tumore liberatis. Uno hoc in casu intentio curativa non ad ipsam podagram dirigenda est, at verò hoc symptoma pari modo tractandum est quo peripneumonia absoluta; venæsectione scilicet repetita, cum diætâ & remediis refrigerantibus ac incrassantibus, cum sanguis, in hoc symptomate præcipue extra us pleuritico-rum sanguinem profus referat. Turgendus est insuper æger inter venæsectiones potionibus lenientibus quibus hæc colluvies in pulmones inaptâ possit mandari. Sudoris autem provocatio, quam vinum cunque habeat in morbi fomite super artus deturbando hic tamen non tantum prodest, sed & obest; materiam pulmonibus impactam indurando; unde generantur *abscessus*, & tandem ægri mors certissima

subsequitur. Hic porro notandum, quod *podagrica* tere omnes, postquam cum hoc morbo diu conflixere *causæ remanent* sint obnoxii, proutque vel statu, vel declinatione sapius, paroxysmi generalis Nephritico dolore laborare soleant, inque cum magno ægorum non tantum cruciatu, sed & virium dispendio, cum jam plus satis attrita tractaque ex fuerint. Hoc in casu posthabitis quibuscvis aliis remediis, liquoris possëtici, cui rad. althææ unc. i. incorporetur, congruum unum quam citissime devoretur, & sequens enema injiciatur.

℞. Rad. althææ & lilior. ana ʒj. fol. malv. parietar. branc. urum. & illor. chamæ nel. ana m. j. sem. lini & fœnugr. ana ʒv. coq. s. q. ad lib. j. s. colatura dilolv. sacchari culinariis & syr. diathææ ana ʒij. m. s. f. enema. Quamprimum per vomitionem æger totum reddiderit, quod per os ingestum fuerit, ut etiam enema rejecerit, *laudarium liquidum* satis magna dosis propinetur viz. ad gutt. xxv. vel p. l. Matthæi gr. xv. Remedia externa si quis quærat ad leniendum podagræ do- orem accommodata, nulla hæcenus mihi cognita sunt (licet pluri na tu n in incipio, tum aliis expertus fuerim) præter merè refrigerantia & repellentia, quorum usum jam supra docui periculo haud vacare. Et fidenter assero, multâ & longâ observatione suffusus, maximam partem eorum qui podagrâ perierunt, non tam ipso morbo quam sublesta atque indebita medicatione fuisse peremptos. Si quis autem remedium externum, quæ pro anodynis indubitatim habentur, virtutem probare velit, non solum sibi faciat, eadem sub declinatione paroxysmi, particularis (quo tempore dolor jam sponte sua cessurus est) applicando: quin potius sub initio paroxysmi ita ulurpet, & statim edocebitur quam heulneum sit illud auxilium, quam vana spes; cum hæc epithemata nocere quandoque possint, prodesse nunquam. Quæ de causâ egomet jam a multis annis remedia externa adhibui. Pulticula ex pane similigineo cum croco in lacte cocto, addito postea oleo rosaceo in paucâ quantitate, mihi olim præ cæteris proluir; quæ tamen in paroxysmi initio nihil prorsus juvabat. Si igitur dolor admodum exacerbat, æger rectius sibi consulet se in lecto continendo, donec is aliquantisper remiserit, quam anodynis utatur: attamen haud abs re fuerit *laudarium* pauxillum vesperi sumere, si dolor patientiam multum vincat; aliter melius omittetur. At verò cum in externis hujusmodi remediis jam sim, omnino aliquid mihi dicendum est de mulco quodam Indico, *Moxam* vocant, nuper magni nominis in podagræ curatione, si nempe pars affecta eadem accensa leviter ustuletur. Quamlibet hoc remedium genus *Indis Orientibus* acceptum referatur, atque Europæis universim constabit antiquioris id esse ævi etiam apud nos, illi qui Hippocratis effata jam ante annos bis mille litteris tradita voluerit conuere. In præstantissimo illo de *affectionibus li- ro, sect. 3. pag. mihi 521. de Ischiade* ægens, hæc habet: *αἱ δὲ ἐν τῇ χροῖ, &c. id est. Quod si in uno aliquo loco primitus coxerit dolor, neque medicamentis expellatur; quocunque loco dolor forte extiterit, cum lino crudo ungitur.* Et paulo post de pod.



gra verba faciens: *Epistola* & c. i. c. Huic eadem qua Articuli in rursu conserunt, & longum quidem hic morbus est & gravis, in iuncu tamen letalis. Quod si i. digitis dolor remaneat, vnde in digito paulo supra articulum iurro; nstio autem per tunc crudum iurro. Opinor nequaquam posse existimare eam esse differentiam speculicam inter nannam vel a lino, vel ab hoc mulco Indico excusatam, ut nre nla in anatione Podagra plus valeat, non magis quam reputaverit ignem e Roboris legmentis accensum majus aliquid prestare posse nro qui *Fraxin* ligno alitur. Hæc partis attenta utul tio aliquid pollicetur (quod & efficere quidloque possit) ad doloris committigationem, evoc ita scilicet fomitis morbinæ parte subtilissima ac maxinè spirituosâ, in articulum jam depositâ. Attrahent benedicunt ab hoc remedio partum, cum Inaigitionem, quæ Podagra cunctis est Antecedens, nullo modo attingat, Yuzax se oportet ac breve. Neque opus est ut dicam illud in Podagris tantum incipientibus locum habere; quando enim sive a morbi diuturnitate, sive ab importuno atque in debito Medicamentorum usu, Podagra, ut subinde ne, ad partes internas fuerit conversa, ac proinde ægritudine, torminibus ventris, atque longo hujusmodi symptomatum agmine, potius quam dolore ægrum multaverit, nemo sanus igne utendum esse arbitrabitur.

En vobis omnia quæ mihi h. ætens comperta sunt in hujus morbi Curatione. Si quis objiciat multa esse Remedia specifica ad Podagram; ego me nescire lubens fateor: & vereor ne Promissores isti perinde sint ignari ac tum ego. Et sane dolendum est Medicinam (Artem nobilissimam) hujusmodi nugis, quæ, sive ab insectia, sive a pravitare scriptorum, credulis opiciuntur, usque adeo deturpari; cum in omni fere morborum genere hujusmodi aliquid a Nugivendulis tanquam *Sim xini* decontetur pleno ore. Et, quod est magis mirandum, quod non tantum in morbis typo indutis hujusmodi deliramenta obtineant, sed & minime formati qui ab Organorum latione aliqua, aut *reperu* externa proluentur. Viris etiam cetera cordatis imponant. Atque hoc satis evincunt Specifica in Comuisionibus vulgo prædicata, quæ sunt *Sperma Celi*, *Tegula Hibernica*, &c. quæ omnia id tantum præstant ut Methodum qua tractari debuerit hic Affectus diverteant: prout illi satis constabit qui experiri vouerit, quanto tutius atque cæcius sanabitur is qui *Vene sectionibus* ac purgationibus utetur alternati usque diu benè habuerit; neglectis prorsus levidentibus illis quæ pro more post sanguinem semel eluctum sape exhibentur, atque etiam eâ sudorum sollicitatione quæ pari passu cum eorum usu solet procedere: a qua partium jam diu ad inflammationem propensarum excalesctione æger sine causa in vita periculum adducitur. Quod si nihil proficientibus his quæ attulimus omnibus, adhuc minus sagax videar, & minus copiosus in medicamentis eruendis enumerandisque; Univerfa illi proponam quæ *Lucia* in *reperu* jam plenius collegit, e quibus tam externa quam interna qui volet eligat: quæ forsitan haud minus efficacia sentiet quam sunt eorum plurima quæ a nonnullis deprædicantur.

Apud hunc Podagra Personæ ita istos alloquitur, qui secreta quedam Remedia se habere jactabant, quibus is morbus possit expugnari.

*Vic tui auctori*, &c. id est:

Quæ invictum me dominam dolorum  
Ignorat Podagram in terra mortalium?  
Quam neque Thuri vapor placat,  
Neque effusus sanguis aræ ad incensas;  
Non templum divitiarum undique suspensis ornatum demaris:

Quam neque Apollo Medicamentis expugnare valet,

Omnium Medicus in celo Deorum;

Non sum Apollinis æstissimus Esculapius:

Postquam enim enatum est primum hominibus genus,

Conantur omnes meam elidere potentiam,

Miscetes semper Medicamentorum artificia.

Alius etiam in me experitur artem.

Terunt Placages, & Apia mihi,

Et folia Lactucarum; & silvestrem Portulacam;

Alii Marrubium, alii Potamogetonem;

Alii Urticam terunt; alii symphytum;

Alii lentes afferunt ex pulvisculis lellas;

Alii Passinacum collam; alii folia Persicorum.

Hyoscyamum, Papaver, Cepæ agrestes, Mali Punci Cortices,

Psyllium, Tuna, radicem Ellebori, Nitrum.

Fenum græcum cum vino, Cyrenem, Collamphacum.

Cyperissiam Gallam, Pollinem hordeaceum,

Brassica decolla folia, Gypsum ex Gæro,

Stereota Montana capra, humanum oleum,

Farinam Fabarum, florem Asii lapidis;

Coquunt Rubeas, Mures-araneos, Lacertas, Feles,

Ranas, Hyenas, Tragelaphos, Vulpeculas:

Quale metallum non exploratum est mortalibus?

Quis non succus? Qualis non arborum lachryma?

Animalium quorumvis ossa, nervi, pelles,

Adipi, sanguis, medulla, sterces, lac.

Bibunt alii numero quaterno pharmacum:

Alii octono sed septeno plures.

Alium verò bibens Hieram purgatur:

Alius incantamenti impostorum deluditur:

Judæus alium stultum excaecat nactus:

Alium verò remedium petit ab Hirundinis nido:

Ego autem his omnibus plorare impero,

Et facientibus hæc atque irritantibus me

Soleo occurrere multo iracundior.

Iis vero quæ cogitant nihil adversum mihi,

Benignam adhibeo mentem, facilisque fio.

Nullus dubito prudentissimos quosque eorum qui cum hoc morbo diu confixere de omnimoda Curatione desperantes, Choro qui istius Dramatis Catastrophen facit, suffragaturos.

*Hæc a midæu*, &c. id est.

Lenem, O ubique gentium Celebrata afferas  
(nobis) dolorem o Podagra,

Levem, facilem, non acutum, brevem, haud  
sævientem,

Tolerabilem facile desinentem, parum validum,  
ambulationes non impediens.

Multi sunt modi miserorum:

Sed exerciti, dolorum, & consuetudo  
Podagricos soletur.



*Ideoque equo animi, o Complices obliviscimini;  
Dolorum Si ea que placent non sunt,  
Tamen etiam prater spem accidentibus viam in-  
venire solet Deus.  
Quisvis saltem Podagra laborantium  
Deludi & derideri:  
Talis enim huius morbi natura est.*

Ut semel finiam. Methodus quam hic tra-  
do *quoniam* prædictorum & examini inuitur;  
quamque ego secutus sum in ipso me, quam in  
aliis, morbi levamen percepi. Therapeja Ra-  
dicalis & usquequaque perfecta, qua quis etiam  
à diathesi ad hunc morbum foret liberatus; ad-  
huc in Democriti puteo latet, atque in naturæ  
sinu reconditur, nescio quando, aut a quibus  
in lucem extrahenda. Spero nihilominus me  
hoc scripto humano generi commodi aliquid  
contulisse, si istos scopulos nescitè indigita-  
verim, ad quos tum ipsemet, tum alii plurimi  
naufragium fecimus; atque insuper optimam  
quæ hactenus innotescit methodum præmon-  
straverim. Non his majora promitto; quamvis  
à longa cogitationum serie quas huic rei im-  
pendere tantum non sum coactus, inducat cre-  
dere ejusmodi Remedium non quodloque inventum  
iri. Quod si unquam acciderit, incertum suum  
Dognaticis exprobrabit, atque exinde liquebit  
quam insigniter tam in dignoscendis morbo-  
rum essentiis, quam in medicamentis quibus  
eos aggrediuntur, hallucinatur, Cujus rei  
exemplum satis luculentum habemus in reper-  
tione summi illius ad *Febres intermittentes* Spec-  
ifici, Corticis Peruviani. Per quot jam sæ-  
cula homines quique solertissimi ingenia exer-  
cuerant in investigandis harum febrium causis,  
quibus praxin quilibet aptavit Theoria à se ex-  
cogitata optimè respondentem? Quomodo  
verò hæ Medicationes Theoremata valebant  
defendere, ex his constat quorum adhuc recens  
est memoria; in quibus varias intermitten-  
tium species in variis humoribus in corpore re-  
dundantibus collocantes. Curationem ad hu-  
morum istorum Iterationem atque evacuatio-  
nem dirigere solebant. At quæ in inspicatò  
id egerunt eorum in his conaminum frustratio,  
præcipue verò hujus Corticis usus felicior, pa-  
lam faciunt: cuius ope nos nunc temporis tum  
humores hujusmodi omnes, tum etiam Diarræam  
& regumen quodcumque suscipere deque habentes,  
ac nihil nisi methodum pulveri exhiben-  
do debitam observantes, scopum rectè attingimus;  
vix ab illo aberrantes unquam iussi ægrum  
lecto sine ulla necessitate addicimus, dum in  
ejus usu est: Tanta tamen est hujus remedii vis,  
ut non obstante eo incommodi, quod scilicet  
febris à Lecti calore plus quam erat opus inten-  
datur, ægrum nihilominus ad sanitatem ut plu-  
rimum reducat. Interea donec hæc Podagræ  
Curatio Radicalis comperta fuerit, quod Me-  
dicos omnes, me præcæris, optare fas est;  
hanc meam qualemcumque opellam boni con-  
sultite. Quod si minus eveniat, hominum mo-  
res ita probè perspectos habeo ut non multum  
fallar; & officii mei rationem ita calleo ut ani-  
mo neutiquam cadam. Et si sævissimi isti cru-  
ciatus, impotentia ad motum, cæteraque cor-  
poris mala, quæ ego per maximam vitæ partem  
sum perpassus, (cum cum damno rei familiaris

quod sustinui, à Medicina facienda, toties  
adversa valetudine avocatus) aliis quietem &  
sanitatem possint comparare, erit unac me fru-  
ctum aliquem à Mercurio hujus generis, quas  
in hac vita toleravi, in aliam naturam perce-  
pere exultimabo. *Th. Sydenham Tractat. De Po-  
dagra, & Hydrope.*

In magnis Arthritidis doloribus & cruciati-  
bus statim ad compellendos eos animus est ad-  
hibendus, relicis & postpositis tantisper  
aliis intentionibus, donec doloris carnificina  
cesset, in quo statu astans Medicus non minus  
sæpe rubore suffunditur, & pudore, quam æger  
dolore. Quæ ex topicis spagyrica & antiquis-  
sima Hippocratica methodo inventis, & ratio-  
ne approbatis selectiora nunc memorabo: ante-  
versare enim non oportet (M. Gillet & ba) prop-  
ter varia attributa & circumstantias, quod  
unum aliquod remedium applicatum statim  
prolaturum sit, & ideo varietatem constituere  
ratio suadet, horum plurima à vulgo præfican-  
tium, & ab Hippocratica vetustissimi metho-  
do dissecti citantur, nullum tamen horum le-  
gere aut videre contigit, qui minimam ratio-  
nem addere potuisset: quare hæc ita fierent?  
Cum autem citum, tutum, & jucundum auxi-  
lium animadverterint, & ad frigidum, vel ca-  
lidum quadrare non possint, vel nocuum, vel  
empiricum vocant, manifesto argumento à  
nostris hæc & alia excerptisse, & eorum ipso igno-  
rare se testantur, in Natura scilicet ad unquam  
fieri posse, cujus legitimi causa non præcedat.  
At non solum in his, sed in reliquis omnibus  
admodum juvenos se manifestant: exempli gra-  
ti, bezoar, dicunt urinam & sudorem movere,  
perlas cor roborare, &c. nullus tamen, qua-  
ratione sic indubitè in corpore humano age-  
rent? & ideo dixi sectari à principio ad finem  
ulque sunt, inveniunt, & consensuant empirici,  
& experimentatores, semper discentes, &  
nunquam ad veritatem pervenientes, sic enim  
habet Author in Hollæcium de Vinaceis, *je l'ay  
pratique cent fois, il n'y a rien de meilleur sans  
la chappe du ciel*, attamen nulli podagrico pro-  
ferunt unquam, quare illis receptula quadam,  
qualitativo, & frigido sermone roborare sine  
causarum cognitione satis est, superflua, ait  
Philosophus, dicunt, necessaria ignorant, quia  
aliud non cognoscunt, quam quod externo sen-  
su friget, vel calet: id est quod nesciunt, scire  
nolunt. Sperma ranarum, luna decrecente col-  
lectum, & ex balneo ad siccitatem distillatum,  
prolicita aquam alcali insipidi distillatam da-  
bit, ut Hippocr. Chim. mechanice docet, quæ  
tepidam cum lineis pennis applicata calidæ  
igneæque podagræ optimum est refrigerium.  
Avertat tamen patiens, ne aqua addatur ali-  
men, ut suadent Crollius, Sala, Tenacius, &  
alii: licet enim alumen sit refrigerando, eius ta-  
men adstringentia poros cutis claudere, dia-  
phresis impeditur, dolorque in excessum auge-  
tur: experto crede. Unde rectè Hildanus,  
alumen podagricis esse unicum monet. Multo  
promptius dolorem levetis, si aqua prædictæ  
alcali acueris, sive multiplicem ad additionem al-  
cali urina, tali proportionem, ut infra matam  
dolentemque partem applicata aqua non  
puargat, quod lingua facillimè metiri potest.  
Cum autem ex *Magistri libro de morbis*, totum  
corpus,



corpus, dum vivitur, transpirabile habeatur, dolenti loco tepidè duplicatis, vel triplicatis linteis fomenti modo aquibita, non potest alcali urinx non trahere aciditatem ibi ebullientem, & cute per fomenti calorem rarefacta acidum spiritum non extra corpus erumpere, ac promde quietem non consequi dolorem, *Verba Hipp. de flatibus*. Dicta nempe aqua non primis qualitatibus, sed absumpto, ac attenuato acido igneo refrigerare dicitur, ex quo postea magno patientibus solamine dolor mitescit. Alii, loco spermatis ranarum aquæ spirituum vini eligunt, atque urinx alcali commiscunt, sed ubi inflammatio prævalet, caute procedendum est, alias enim urit, & vesicas atto lit: etiamsi locus affectus pumaceo-  
lo leviter et intumescit perungitur. Urinx spiritus commodissime ac celerrimè parabitur ex sale ammoniaco, quod nihil aliud est, quam alcali urinx ligatum, vel condensatum cum acido communis sale cibario, ut docet Hippocr. Chemicus c. 2. Si enim ammoniaco addideris æquam alcali fixi (ex gr. Tartari) portionem, & ex retorta vitrea levi calore ambo unita pepuleris, in illo tepore nixum alcali tartari amplectitur, trahitque ad se acidum salis cibarium, & alcali urinx, quia fugax & volatile, dimidia horæ spatium, in mediocri magnitudinis vas recipiens se recipit ab igne fugiens volatile, albulumque, qui servandus est ad usus prædictos vas vitreum cera perquam optime obturatis. Hac in operatione simplicissima, naturæ instrumenta rarefactio nimirum & condensatio oculis mechanicè patefunt. Alcali enim volatile urinx liberum dimittitur à societate aciditatis communis, se iterum alcali tartari fixiori copulantis. Unde alcali urinx, si dolentem locum podagricum attingit, acidum rursus trahit, utpote vacuum, illoque saturatur: & in neutrum ambo vertuntur. Unde *Magister* Generare, & interire idem, commisceri, & discerni idem. Eo quod Naturæ muniter sive spagyris profundius habeat ingenium. Recens etiam in urina sani pueri, in defectu aquæ spermatis ranarum, ex Balneo distillari potest, adjecto cinere communi, cujus alcali sorbet acidum urinx partem, & alcali urinx cum aqueo humido ascendit per alembicum: hæc quoque alcali hæc aqua pluribus profuit. Ex eodem fundamento patetur ex tempore absorptiva aqua sine ulla distillatione, sed simplici mixture ex salis ammoniaci pulverizati, & alcali tartari, cui mixtura affunde aquæ communis, tantum, quantum pro solutione sufficit, & linteis molliuscule petis duplicatis, fomenti modo tepidè applicatur. Sunt, qui lacte recentissimo utuntur, eo quod inter alcalia, quæ acida bilunt, infimum locum non habeat: sed quia in calido statim in aliam naturam mutatur, propterea omnibus non æquè confert, placet interim, & mitigat acidum ignem trahendo, locique asperitatem demulcet, præsertim quando cum hyosciamino semel ebullierit, ut habent ab experienti plurimi præcepti. Huc etiam referri potest Crollii unguentum Anodynum, præsertim in febre absente, ab huius enim unica tepescit unctio: fictissimum arthriticum a doloribus liberatum vidi, qui deinceps sospes vixit, caveat men ab hoc, & aliis omnibus unguentis,

si dolor febriculam comitem habeat. Sunt qui virga, seu ferula cadunt dolentem podagricam partem, donec rubescat, sic acidum expirat, & à doloribus tuti vivunt. Caro bubul: alcali ditissima, ut Hippocr. Chym. mechanicè ostendit, lacti præfertur, ut & prædictis omnibus: huius enim frustum crudum sine pinguedine partem dolentem olim superligavimus, à qua mane vesperique mutata feliciter siluere dolores: memores, quod aliquando quidam ita levissimo teneretur pedis dolore, ut foras in publicum egredi sua peracturus negotia non dubitaret, verum in itinere parum progresso, dolor increbuit majorem in modum circa malleolum externum sinistri pedis, intensissimo cum cruciatu: & deficiente vectura, pedibus, domum laboriosè repetiit, carnis bubulæ frustum illico applicabatur, cujus alcali acidum dolentem, & igneum electivè vel spagyricè trahente, sequenti mane locus circumquaque veluti atramento conspurcatus ater visitur, in ximo patientis terrore: dolor tamen planè sublatus aberat. ejusmodi enim nigredo sanguis erat ab igneo acido calore, violentoque dolorifero articulari motu extravenatus, ac expressus, qui ab alcali attrahentis appositu rarefatus paulatim expirando evolabat. Infimum locum hic etiam non habet spiritus vini camphoratus, præsertim à rosmarino rectificatus. Insuper pulvis radicis consolide majoris cum aqua communi in pulcem coquitur, quam minimi digiti grossitie dolenti loco applicatam, optimum mitigativum in novella podagra, primaque doloris invasione deprehendi: etenim post tres vel quatuor horas à parte elevata nares ferit odore ex putri acido: argumento, acorem extrahere. Inveteratæ tamen podagræ nil commodi adfert. Dolor & febre, & si remissis, lecto ægrum sibi non obligante, attamen incessus, ac ambulatio impossibiles sunt: videntur enim mille aciculæ juncturas lancinare. Unde pro hoc statu opportunum Emplastrum composui, cujus præparatio hæc est.

Olei rosati lib. i. calefiat in patella, adde saponis albi rasi unc. iij. liquefacto sapone, adde cerussæ, minij, ana unc. iij. coque lento igne continue movendo ligneo paxillo, donec emplastri duriorem consistentiam acquirat: si enim eo duritiei non adducatur, rursus in aëre moliescit, quia saponarium alcali humidum ab aëre rursus attrahit: cui demum ab igne remotum, & nonnihil refrigerato addatur lub continua agitatione camphoræ unc. i. prius solutæ in mortario spiritu vini: d pulvis formam. Hoc emplastrum ex meris alcalibus compositum mirabiliter non solum acidum podagricum ibidem latens, sed & apollemata, tumores duros, pedum c illos, varios dolores tam Nephriticos, quam ex acido ubicunque obortos, etiamsi sel rices promptissime sopit, refrigerat, mitigat, adhæretque plures dies super peilem extensum, tandem scilicet, donec poris apertis acidum morbosum exhalet, tunc nimirum degenerata humiditas expirans à cute depellit: quod autem morbosum acido non concordat, illud dolenti loco, neque adhæret, neque assidet. Huius alcalizati emplastri encomium hic non adduco, ut mihi esse velim ceu hederam suspensam, sicut titillabundis dec. nis acetum, sub



poniposo titulo: *spiritus veneris noster, sal vini-nos-trum, m-gisterium nostrum, & familia nostra!* ne-tiquam verò: abhorret enim animus meus ab ejusmodi vanis ostentationibus, quod norunt, qui, Tachenium liberi candoris alunum esse, sciunt. Decani verò docent, dolori podagri-co oleum saponis esse lenimen illud, tamen oleum, quod ex sapone stillando eliciunt, cum nihil aliud sit quam distillata pinguedo una cum fixo alcali cocta in saponem, eorum va-nitatem pro dolore placando illis lubentes re-linquimus.

Est & alius Arthriticus dolor sine inflamma-tione & rubore, qui plerumque scapulis ita in-fixus hæret, ut respirationem nonnihil aggra-vet: hic ex acido dolor, quia non profundus, facillimè ideò mitigatur potentiori acido, qua-re huic usui spiritum vitrioli optimum elie de-prehendi, ab unica enim hujus unctione quies sequitur: cavendum tamen, ne inter ungen-dum lineamina, seu vestes alicujus momenti hoc spiritu attingantur: eas enim corrodit at-que nullar ignis urit, tamdiu ungendo cum la-nei panni frustulo continuandum est, usque quo pars dolens pungi sentiat, tunc ab unctione cessantes locum abluimus tepida aqua, deinde superlinimus oleo Hypericonis. Addit *Magi-ster*, acetum (ejus enim tempore nondum in-notuerat vitrioli spiritus) valere ad podagram, si non corpus vulneraret, eadem etiam frax vini facit: frigida namque Podagra (ita loqui lubet) quando scilicet dolor igneus abest, aceti totus accommodatissimus est. Notandum hoc loco, verum non esse, quod turba scribillat: *spiritum vitrioli, & spiritum sulphuris idem esse, easdemque possidere vires*, quam assertionem pernitiose falsam esse deprehendi, n m spiritus vitrioli sex dies, totidemque noctes igne reverberii naturæ possibili expulvis, mercurium præcipitat, eundemque eo simul ipso reddit longe constan-tiorem præcipitato per sulphuris fumum con-densatum, ut ut oleolum. Vitriolum enim ab igne, cum non facile fugiat, ideò mercurium ab ejusdem acido, firmiore constantia durari, eo-que perfectioribus dotibus insigniri, quam à sulphuris slagmate præcipitatum, necesse est. Mercurius nempe terrestris cum Cælesti symbo-lizat: eorum enim, quibus jungitur, inquit po-testatem, ut docuerunt Veteres sub experien-tiæ testimonio: vid. Clavis c p. 8. adeoque Turbith mercurii à prædicto vitrioli acido ve-niens, est medicamentum nobile, præsertim ad veneream lueem, similia contagia, pestilen-tialesque morbos exhibitum in rosarum conser-va, patta Russi, aut in succo liquiritiæ, sub pilu-larum forma, &c. Cave autem, ne ipsum commis-ceas cum scammonii refina, vel terebintho, vel gummi gutta, ut docet Hartmannus: omnis enim mercurius quocunque modo præcipitatus, pinguedinibus ireritus, vi laxativa exiit, & hætenus cinnabaris, quæ est sublimatus mercurius, alvum non ciet, pinguedini sulphu-reæ combinata.

Ichiadicus omnium arthritidis dolorum gra-vissimus ob doloris magnitudinem, & synpto-matum supervenientium momenta, sedem in profundo habeat, necesse est, ideò inflamma-tio raro extra apparet. Itaque ad salutem sta-tus intus eò loci detentus discutendus est.

Cibi conveniunt tantillo saturegiæ aromatisa-ti. Podagricum medicamentum exhibendum in haultu jusculi, vel vini semel ebulliti, una cum quatuor seminibus calidis majoribus, & locus ætæus toris perungendus oleo lini: de-superque noctu fovendus applicatione tepe-f ætæculi cum lini semine ruenter contuso, & furtim conmixto reierti. Præsentē febre; ve-hementique pulsatione, sanguinis missio miri-hæc contert: ea ablente phlebotomia inutilis est, atque lini oleo adungere præstat dimi-dum, vel quartam partem olei laterini rectifi-cati. Hæcque simplici methodo, brevi tem-poris spatio sanitas induci solet, cummodo morbus inveteratus non sit. Sunt qui oia hu-mana ad albedinem exusta oleo vetulso extin-gui, indeque distillari jubent, hoc postea oleo laterino præferunt. Hi sunt ex illa classe, de quibus dicitur, *quæ nesciunt, scire nolum* sacram scientiam odio habentes vituperant, & vilipen-dunt, *quæ nesciunt, quid faciunt, ait Magister*, nesciunt, inquam, ossa combusta oleo in hoc casu non plus communiare, quam lateres igniti, eò quod oleum in forma fumi ab illis ele-vetur ossa enim semel candefacta & ignita sunt, sicut lateres ipsi, inanità & vacua corpora rursus exalari cupientia. Unde per os assumpta, acida specifica, non secus, quam cornu Cervi ullum, bibunt, ut in Clave mechanice ostendi. Do-lorem verò ischiadicum à sanguine extravena-to, radix bryoniæ recens rasa, & cum lini oleo commixta tep de applicata narum in modum pacat: renovandus est labor, donec sanguis planè dissolutus, & ad transpirationem seu vo-latilizationem aptus transtuler: interea tamen temporis podagricum medicamentum nullo modo intermittas, ut acidum obortum sor-beat, novumque regenerari non patiatur. Clysterem in hoc casu ex Bryonia, ut docet Lonzellinus Neapolitanus in suo Dispensato-rio nemini su deo, nam rectum intestinum ma-gnam habet consonantiam cum ore ventriculi, ideò cholera facile causare potest. dein morbus inveteratus cum sit frigidus, & acasi-zatus, oleum lini cum euphorbio applicatum loco affecto optimum deprehendi remedium, licet magno cum dolore ligat. Pedibus con-tinuatæ diaphoresis ita requiritur in omni us arthritidis speciebus, ut instantis paroxysmi præ indicio sit, quotiescunque intra pedum di-gitos excrementum proprium, & consuetum non reperitur; quare in subcalceolos, seu sac-cos ex denso lineo panno confutos, digitos pedum versus, infundo parùm cineris ex herbis cephalicis, ut rosmarini, rutæ, salviæ, lavendulæ, betonicæ, &c. ejusmodi enim cinis alcali suo modo volatile continet, ut Hippocr. Chim. docet, quod quia solum, inanità & vacuum esse non potest, ideò trahit per poros cutis, com-bibitque acidum pedum articulos torquens: unde licet podagricus tota die sine motu deam-bulationis sedeat, renovandi sunt tamen quo-tidie linei subcalcei, aut ad minus cinis: horum enim continuato usu, & perseverat effluviu, & rariùs deinceps morbus infestat. Altquan-do post paroxysmum, plures menses pedum, malleolorumque tumor persistit, quem tamen alcali dictarum herbarum udonibus lineis in-spersum optimè, celeriterque demittit, com-planatque.



planatque. Picem navalem emplastri forma applicatam hoc in calu quoque proficuum esse animadverti. Cinis dictus non solum acidum trahit, sed etiam pedes mundat a lordibus, ut ablutione, quæ podagricis pessima est, præsertim ab aqua, opus non sit. Pedum vero lotionem ab aceto, vel vino instituere volentibus, per me, sed valde raro, liberum esto. Sunt, quibus pedes olentem mephitim spirant, quod vitium conversatio civilis atmodum horret, & præsertim in iis, qui aulas frequentare habent, cujus causam plerique descendentes nescio quibus putridis humoribus ascribentes, evacuationes cum cautela, ne hepar accendatur (res risu digna) indefinenter repetitas, & rigorolum vivendi genus frustra præscribunt. Sufficit cunierem prædictum lineis calceis, modo quo dixi, inspergi, & fetor unaque diffuens sudoris maior illico cessant: argumento, id evenire non putridi humoris descendens, sed vitio ventriculi, cuti pedum insiti, affluentem pro alimento sanguinem deturpantis, & in ejusmodi satorem convertentis: ut sanandi methodus ostendit, eo quod alcali dictorum cinerum acidum putrefactivum ab ipso cutis ventriculo (non secus quam alcali calcis cadavera) absorbeât, absumatque. *Otto. Tachenius Tractat. de Arborum Principe.*

Podagra, Chiragra, Gonagra & Arthritis vaga necessarîo ex male disposito succo nervoso ortum trahunt, qui acris est, & continuo peior redditur a male elaborato Chylo, & exinde confectio sanguine, curari debent, primò per strictam dietam, ut eligantur tales cibi, qui superfluum sal alcali volatile continent. Intestina interdum à crassis vitiosis humoribus purgari debent per purgantia, sive supra interdum, sive infra; Deinde talia medicamenta usurpant, quæ ex Alcalibus volatilibus constant, tam ex Animalibus quam Vegetabilibus parata, ut vitiosus acris & acidus succus nervosus corrigatur, alias parum efficietur. Optima Medicamenta, quæ nobis semper honorem creant, vobis communicabimus. Vomitoria possunt esse talia.

℞. Tartar. Emet. gr. v. oxymel Scyllitic. ℞. Vini Rorismarin. ʒi. m. f. Vomitorium. Vel

℞. Sulph. antim. gr. vi. Crem. tartar. ʒi. Aq. Rorismarin. ʒij. m. f. Vomitorium f.

℞. Sapa vomitor. gutt. vij. Vini lilior. Convall. ʒi. misce f. Vomitorium. *Purgantia.*

℞. Resin. scammon. resin. Jalapp. ana gr. vi. Mag. succin. gr. v. sal. succini volatil. gr. iij. Conserv. flor. Anthos ʒij. Misce f. Bolus. Vel

℞. Extr. Helleb. nigr. ʒi. Resin. Jalapp. Turbith. ana gr. v. Mag. tartari ʒi. Mag. succin. gr. vi. Ol. still. Rorismarin. gutt. iij. Conserv. Rosarum ʒij. Misce f. Bolus. Vel

℞. Extr. Agaric. Helleb. nigr. ana ʒss. Resin. Mechoacan. Resin. Scammon. ana gr. v. Sal. Tartar. ʒss. pulp. Cassia ʒss. Misce f. Bolus. *In Arthritis vaga, quando dolor magnus.*

℞. Extr. Pilul. Alexphang. nostr. ʒi. laudan. Aromatic. gr. iij. Misce f. Pilul. n. vij. vesperi assumenda.

℞. Extract. Diacatholici nostr. ʒss. Laudan. Aromatic. gr. iij. Misce f. Pilul. n. vij. vesperi assumenda.

℞. Pilul. Ruffi ʒss. Resin. Jalapp. Scammon. ana gr. vi. Mag. succini gr. v. Ol. still. Sassafras gutt. iij. Misce f. Pilul. n. vij. Vel

℞. Extr. Aloës, Extract. Rhei, Extr. senn. tartarizat. ana ʒi. Resin. Agarici gr. viij. Mag. succin. gr. v. Ol. still. majoran. gt. ij. Misce f. Pilul. n. vij.

Corpore hoc modo superscriptis pilulis purgato & preparato, uno ex sequentibus compositis semel aut bis in hebdomade sudorem prolificere potestis.

℞. Antimon. diaphoretic gr. xv. Corn. Cerv. philosophic. præp. ʒi. Ocul. Cancr. præp. gr. xvi. Spir. C. C. Spir. Tartar. ana ʒss. Decoct. lign. sassafras ʒij. Misce f. Sudoriferum.

Vel ℞. Spir. sal. ammon. aromatic. spir. fuliginis Succinat. ana ʒss. Tinct. tartar. antim. ʒi. Antimon. diaphoretic. gr. xvi. Ocul. Cancr. præp. ʒi. Decoct. Lign. sassafras ʒij. Misce f. Sudoriferum.

℞. Spir. Ligni Guajaci ʒi. Spir. Tartar. Spir. C. C. ana ʒss. Sulph. aurat. diaphoretic. ʒi. C. C. ust. & præp. Matr. Perlarum præp. ana ʒss. Decoct. Sarsaparill. & Chiu. ʒij. Misce f. Sudoriferum.

Vel ℞. Rob Sambuci, Rob Juniper. ana ʒi. Spir. tartar. sassafrati, spir. sal. ammon. succin. ana ʒi. Flor. antimon. diaphoretic. gr. xv. C. C. ust. præp. Ocul. Cancr. præp. ana ʒi. Decoct. lign. & Cort. Guai. ʒij. Misce f. Sudoriferum.

℞. Spir. tartar. sassafrat. Spir. Lumbricor. terrestr. ana ʒss. Sal. lign. Guajac. Sal. Viperin. ana gr. x. Antimon. diaphoretic. Ocul. Cancr. præp. ana ʒi. Rob. Juniper. ʒij. Decoct. Lign. sassafr. ʒij. Misce f. Sudoriferum. Ubi dolor in paroxysmo magnus est, tunc laudan. aromatic. gr. i. gr. ij. vel gr. iij. pro ratione circumstantiarum adjungi possunt. In India hæc sequentia haberi possunt.

℞. Spir. Lign. Ebeni, Spir. Lign. Colubrin. Spir. C. C. ana ʒi. Antim. diaphoretic. gr. xvi. C. C. usti, Lap. Percar. præp. ana ʒi. Rob Sambuci Indici ʒij. Aq. Zerumbeth. ʒij. Misce f. Sudoriferum.

℞. Spir. fuliginis Cinnamom. ʒi. spir. sal. ammon. spir. C. Rhinocerotis ana ʒss. Spec. dissolis ʒi. Decoct. Ligni Sassafr. ʒij. Misce f. Sudoriferum.

Vel ℞. Bezoart. C. & Ungul. Alcis ʒi. Spir. Lign. Ebeni, Essent. Lign. Colubrin. ana ʒss. Sal. Volat. oleosi Zerumbeth. gr. vij. Aq. ex Rad. Cinnam. sylvestr. ʒij. Misce f. Sudoriferum.

℞. Spir. C. Capri Cervi Orient. ʒi. Spir. Lign. Ebeni ʒss. Sal. viperin. ʒss. Sal. volat. oleos. Zedoar. Sal. Rad. Cinnamom. Sylv. ana gr. v. Decoct. Sarsaparill. ʒij. Misce f. Sudoriferum. Elyxiria, quæ per vices inter sudoritera, ad præervationem usurpant possunt.

℞. Elixir. Balsamic. Tinct. tart. antim. ana ʒi. Tinct. C. C. ʒi. Misce. Dosis mane & vesperi gr. xx. Vel

℞. Spir. Sal. ammon. aromatic. spir. fuliginis succinati ana ʒi. Tinct. tartar. antim. Elixir. Balsamic. ana ʒss. Misce. Dosis gr. xv. m. n. & vesperi.



32. Essent. Succin. Essent. Cinnamom. ana 36. Essent. Rorismarin. 51. Spir. C. C. 31. Misc. Dosis 3i. mane & vespere. Qui multorum Medicamentorum usum abhorret, ille mane & vespere assumat 36. vel plus volatilium Alcalium ex C. Cervi, C. Rhinocerotis, Unicornu, Viperis: vel dosim unam Bezoartic. C. Cervi. Corn. Rhinocerot. Viperin. deque magno auxilio condat. *Hermann. Nicol. Grun. Compend. Medico-chymic.*

Quoad Arthritidis præcautionem, perfunctorie eam exequitur Galenus, existimans purgationes & sanguinis missiones, vere & summo celebratas, satis esse, accedente recta vivendi ratione, non modo ad eam præcavendam, in his qui ab ea hactenus immunes fuere, verum etiam in quos jam aliquando invasit. Addamus vero plurimarum aliarum rerum concursum requiri: Dieta sibi primas vendicat, atque ex alimentis eligenda euclyma & eupeptæ, lacerare iussis quibuscumque glutinosis, tartareis, sale imprægnatis, & iis quæ facile coagulantur. Eorum species petantur e libris, qui regulam continent utilium vel noxiorum. Potus maximum hic momentum obtinet, qui cum diuendo cibo inserviat, ichorosi excrementi collectioni materiam præcipuam præbet. Is si tartareæ ejusmodi materiæ plurimæ particeps est, proculdubio per similitudinem substantiæ ad se allicit eam quam alimenta continent, ac proinde podagræ generationem promouet: Constat enim potiones viscidas, quales sunt Zythum & cerevisia non rite defæcata, ad coagulationem aptas esse, ac facile calculum parere. E contra tenuiores potus, maxime simplices, atque quibus minimum salinæ materiæ melt, minus pronos esse in generationem ejusmodi mali: Hinc raro aquæ potiores, modò sincera sit, in podagram proclives sunt, præsertim divites: qui curiositatis ergo in fontes, e quibus aquas hauriunt, silices fluxatiles terfos & nitidos coniciunt, hi limo mucilaginoso, quem secum vehit aqua, terræ venas persuens, obducuntur, removenturque injectis aliis: Velutuntur aqua pluvia cisternis excepta, sabulo repletis, Hydro: el ex aqua cœlesti paratum, rite depuratum, accedente fermentatione, donec limpidum fiat, nec quicquam in fundum deponat, in ignis utilitatis est, aridò medicamenti vim adipisci potest, adjectis herbis cephalicis, neutreticis & arthriticis, quales sunt betonica, iua arthritica, & moschat, primula veris & similes: Vinum nimia copiâ assumptum turbidum, non exactè a facibus depuratum, & a suo tartaro liberatum, sanum noxium est, tum quia à continuo illius usu & immodico dissipatur calor natus, tum concoctio in ventriculo impeditur, præsertim carni, quæ in eo liquore indurefcunt, secur offenditur, sanguis acris simul ac serosus gignitur, cerebrum debile redditur, nervorum robur infringitur, catarrhi cientur, quorum materia in suprema illa regione condensata, perpendiculariter in subditum corpus decumbit, & devastat quicquid obvium est & maxime debile. E vinis: lia polyphora sunt, & quinquam diluta linguam vellicant: ejusmodi tartaro vitriolico abundant, acido, pontico, pungente: Alia generosiora, plurimoque spi-

ritu pollent, quorum robur ab admixta aqua cito retunditur: hæc cerebro præsertim intesta, ut priora artubus: Ars modum excogitavit quo vaporem noxium vino demeret, id transcolando per instrumentum vitreum duplex, dictum Galis *Montevm*, eoque ingenio tartaro superfluo privant, infuso aliquo liquore præcipitandi vi prædito, quale est oleum tartari, (cujus ope vinum ad acorem vergens dulcescit) lithargyri solutio, vel saccharum plumbi ex aceto tactum: crystalli calcinata solutio per crebras in aquæ unice extinctiones & reverberationes cum spiritu acido trebinthinæ, s. a. sed dum est & tardiosum medicato cibo & potu in palatibus uti: Qui vino sibi temperare non possent, e igit quod minus noxium, & oligophorum est, optimè id diluat, neque ultra necessitatem diluat, abstinendo quoque a copiosiore cibo: Hac sanitatis prima sit lex, non letari cibis, nec ventriculum gravare, vires ejus superando, superflua *phlegma* quo calor natus in objectum sibi commissum sine molestia agit, quod *phlegma* est; neque etiam novus ingerendus cibus priore nondum cococto: hic elto simplex, cuius præcipuum condimentum sit fames: eam revocando, si deficit, mediocri exercitio horis debitis instituto, ante, non immediate a panu, cuius ope excitatur, calor sopitus, non secus ac sopitus ignis cinerum agitatione reviviscit. Sed quandoquidem exercitii mentio injecta, cuius essentia est in motu, accersiantur huc frictiones tum totius, tum artuum, quæ poros referant, exhauriunt suppressas superfluitates caloremque ad partes, functionum omnium officem principem & instrumentum facultatum reorant: Porro, cum nullum alimentum non liquidum purum in se contineat, quod in excrementum faciat; in id elaborandum quo supervacanea excludantur per vias naturales, quantitate convenienti & opportuno tempore: quod si naturæ caspiter, arte ei succurrendum in id sedulo incumbendo, ut venter secedat, nec ventriculus unquam impuritatibus scateat, ita ut priore concoctionis reliquæ vice fermenti non sint, quod sequuturo limento acorem conciliet: In id conducent remedia quædam familiaria, ut pilulæ mastichinæ, macri, aloës variis succis imprægnatæ, stomachicis, epiticis, atque aliis levibus medicamentis, quæ vocamus *Eccoproticæ*. Maximeque relet respicere an urinx & potus copiæ sibi invicem proportionem quadam respondeant; alias portiones aliquæ aperientes & diuretice certis temporibus & medicamenti forma assuæptæ, atque extra palatium, eximii usus erunt, quibus est liquor vinosus, qui ex bacis juniperi exactè maturis, ope aquæ bullientis extenditur, tanto paulo fermento, vel sinapi, ut sic ejus fermentationis promoveatur; aut tantillo liquore in quo quæ sale tartari cum spiritu vini elicitur. a. Mirè quoque sudorum provocatio confert, sive mediante exercitio excitentur, sive in laconico, semel aut bis in mense, injectis liquore enematis, ventriculo cibis exacto: Aeris extremæ injuriæ vitentur, frigoris præsertim & humiditatis, sedulo artus contra earum vim muniendo. Somnus & vigilia in mediocritate consistant, excessus enim aque noxius est: De Venereis



acris idem esto iudicium, Podagricis summe infestis, quanquam, experientia teste, humores salii & nitrosi, quibus podagrici abundant, ad ejusmodi conlictum crebro impellant: de quo quondam sciscitatus quidam, quod tempus illi foret opportunum? Scite respondit, cum quis seipso debiliior fieri cupit. Tandem, si mediocritas ex usu sit in omnibus quæ corpus spectant, potiori jure in iis quæ ad minimum attinent, eisque impetus, qui organis corporeis usus, ea destruit & consumit, nisi a Ratione motus ejus regatur.

En succinctam *Δυσπεψία* præcipuorum Canonum in dicta à Podagricis observandorum, vel ut quibus merito suspecta esse debet podagra: A) præcautionem adiungenda quedam remedia, præcipue vacuantiæ, quo infortunii plenum illud malum in acerbæ, ut ajunt, & inprimodius verruatur, subtrahunturque illius causæ priusquam in actum erumpant, ac obsideant partes in quas tyrannide suâ & laniena facere solent.

Vomitus Podagræ prophylacticum præstantissimum est, qui potest provocari emeticorum opem plenitudine insigni, ubi juncturæ admodum laxæ, & morbus præforibus est, atque ubi Podagricis (qui alias insultus sustinuit, vel nondum expertus est) sui est juris Medici imperio non parens, sed genio in valetudinis incommodum plerumque indulget. Ex vomitoriorum classe, hoc unum certissimum est, successu nunquam in urino exhibitum, scilicet infusio croci metallorum, in alcohol redacti, optimè loti, macerati in duobus tribusve uncis vini albi per horas 24. exhibendo ejus colaturam cum i. oxymelitis simpli. mane, vacuo ventriculo, dato pauculo juscule pingui, post singulos vomendi impetus. Id genus remedii vim suam cum aliqua violentia exserit: ideo non æque omni corpori conveniens est, sed illi solum quod rite a natura ad id est comparatum: nullum verò radicibus tollit, neque unquam frustra præbetur, & quamvis comite aliqua molestia, innoxium tamen est, modo tempertive exhibitum. Vitrioli, illi depurati drachmæ una, in aqua hordei dissoluta, aut cum conserva aliqua exhibitæ, ingenio desuper ejusdem aque magno h. uttu, cui multa liquoricia incocta sit, emittit, simulque roborat ventriculum in mollioribus corporibus, ac ubi humor e penitioribus partibus non est eliciendus: valet quoque emulsiō viginti quinque aut triginta granorum cataputicæ majoris, additis duobus vel tribus amygdalis, t. et cum jure pulli & tran. colata, aut aqua hordei saccharo dulcorata. Est aliud vomitionis genus, utilissimum minusque molestum: cujus ratio ut teneatur, in memoriam revocandum, quod superius dictum, primitivam Podagræ materiam in ventriculo n. t. les habere: Ex Arabum consilio inebriari semel in mense convenit: quod non inaeccens est, modo portorum natura non in. natur, & rationis usus superites sit. Quadrat ejusmodi præceptum in belluones, qui omnia sine discrimine vorant: Semel ipsi ut bis in mense ventriculum ultra motum lafarciant, ingestis quibuscumque promiscue sibi, pinguedine præsertim, Superhusto qui libuerit liquore, solito si coctio. si saburrati per horam quiescant, demum senni horæ spatio

lente deambulent, tandem indito in fauces digito ventriculum ad subversionem sollicitent, & ad excretionem non modo ingestorum ciborum, sed etiam mucilaginum congestarum, illiusque parietibus jam pridem affixarum & adherentium; quæ à pastu ad provocatum usque vomitum alimentis sese immiscuerint, ac assumptis liquoribus & potu diluatur; natura in singula quavis concoctione tentante colligere quicquid ventriculi spacio continetur, ac illi chyli substantiam & formam inducere, deinceps in sanguinem transmutandam; In quibusdam longius requiritur spatium ut ad summum bihorium, prout ventriculus tarde chylicationis munus obit; Quoad motum ante vomendi actum requisitum, sufficienter ostendit navigatio, monente Hippocr. ab illo juvari & promoveri ejusmodi vacationem. Præter vomitum purgatio quoque corporis necessaria est, præmilla prius præparatione per remedia leptomeria prædit. & spirituosæ quæ *Δυσπεψία* ejusmodi tartareis adorianatur, quæ sunt spiritus acidi Vitrioli, Sulphuris, Salis, qui ex quovis liquore, comervis, aliisque propinari possunt; Tartari tum cremor, tum spiritus, tum sal, materiam ad exclusionem parant. Cathartica podagricum humorem respicientia, verè sint hydragoga, quorum immensa est sylva: Syrupus de rhumao adversus id malum specificum est, immediete ante cibum sumendus, dosis sit uncia duæ vel tres: Cremor tartari, additis quindecim, duodecim aut decem granis extract. scammonii, in aqua rosarum præcipitati, simul in vino albo dissolvendo, ex juscule sumendo, addita gutta olei c. cinnamomo stillariti, ex die remedium utilissimum: Cydoni tum laxativum, aug. unctis oleum, ejusdem est efficaciz: valet et dix. Gi. lapa ex vino albo sumpta, drachmæ unius quantitate aut scripturorum quatuor, utile & jucundum est remedium: Non minoris emolumentum sunt Ebuli grana, eorumque oleum per ebullitionem aut expressionem elicium: singulariter commendatur Electuarium Caryocollinum: Sed omnium remedium potentissimum est Mercurius dulcis, cujus scripturus unus felicissimo successu exhibetur, additis, si uli gratia, ne moram trahat in corpore, xx. ut xxv. granis massæ pilul. cochiarum minorum fideliter dispensatarum, & correctionis gratia aliquot aurifolis, guttisve oleorum destillatorum rotularum, aut cum omni. Generosiorum remedium, ne creber citio usus, sed tantum tempestatum, vernæ aut autumnalis, initio: Vomitus, ut ante dictum, frequenter esse debet, & maxime pilularum usualium nominatarum. Ad vacuantiæ pertinet Nitrum, educet id per renes & vesicam substantiam Tartaream, quæ facile coit in calculum in iis qui ad Podagræ vergunt: assuntur, declinante lunæ, d. drachmæ unius vel alterius quantitate cum aqua hordei vel saccharata: Tandem Antimonium axium diaphoreticum, Crolliano modo præparatum, sudores proovet, in laconico vel lecto exhibitum, ex sapa vel roob granorum sanctuæ, semel aut bis in mense, pro corporis plenitudine, aut si in dicta gravius erratum sit. Quoad cætera, *Zorli, bracali, buon capella, pochi quadrecht inenco cer-*



*vello*; Et, ut adagio fertur, Cura ut caleant pedes & caput, cetera, brutorum vitam agas, i. e. horis commodis pultum in eas, vitata plenitudine. Qui prædicta observavit, quinquam insitam ad podagram propensionem habeat, vix eam incurret, modo ex ordine & cura adhibita id fiat. Tempestivum jam est iis opem ferre qui actu hoc morbo affliguntur; iis autem manifesto solatio posse succurri experientia crebra mihi compertum est: vel paroxysmis mora injecta, vel crebro insultu eorum prohibito, vel accisa eorum longitudine, dolorumve atrocita mitigata, aut citius restituto robore artubus partibusque à diuturno malo debilibus. Ad horum tutelam, præter generales easdem & necessarias indicationes, 1. vacuanda materia tartarea, initium ducendo ab ipsa origine, scilicet ventriculo, 2. eadem præparanda per omne temperantium genus, 3. materiæ præparata per anum ventrem excludenda: 4. maxima ejus pars per vasa excretioni urinx dicata exhaustiunda, 5. Præterea superfluum per exsiccantia & absorbentia dissipandum: 6. procuranda, per interceptionis viam, consumptio ejus quod medicamentorum vim eludet, 7. retundenda salis acrimonia in partibus patientibus: 8. id in vapores solvendum quandiu sub forma manet liquida, 9. si necessitas ingruat, idem fixandum & congelandum in sua scaturigine, 10. Doloze acius urgente, narcoticis is sopiendus, quod forte paradoxum quibusdam videbitur, 11. unum inter & alterum insultum articuli leniendi, quo minus fluxioni in posterum opportuni sint, strenue roborantibus post paroxysmum usurpatis: 12. si licet, dicta materiæ & salia dissolvenda, antequam omnino concreverint & in ipso, si licet, concretionis initio: Ad Curationem enim nodosæ podagræ, lapide philosophico opus esset, aut Medex balneo in quo senectam deposuit Jason. Præire cunctis debent vomitori, omnium quippe maxime necessaria, quorum enumeratio antea est facta; crebro autem an rarius in usum ducenda sint, docebit necessitas, aut dicta ratio, ordinata vel susque deque habita: convenit autem solum hic eradicans Emeticum, e croco metallorum aut vitriolo albo, quod nunquam non in usum duci debet; cum cetera ad præcautionem mali satis sint in iis qui nunquam id experti; Convenit quoque sæpius à cana concitatus vomitus ventriculo prius cibis gravato, cujus laborem nox sequens emendabit, patientemque instaurabit; Semel ad minimum in mense id vacuationis genus advocabitur, utpote maxime efficax præsidium, saltem vere & autumnno, vel necessitate postulante, cujusque tempestatis initio. Id vero annotatione dignum salia Alkali dicta, quæ e vegetabilibus per calcinationem extrahuntur acerrimos & pungentes spiritus edulcorare, inter quos sal Tartari potentissimus est: Idem accidit in corporibus nostris, quorum salia recensita tenuitur tantum a substantiis eorum spirituosis, quarum retuso aculeo, salis corpus enerve & innoxium restat; Neque potest ulli noxius esse usus salis Tartari cum juscule assumptus, vel conservæ aliqua betonicæ, chamæpithios, cichorii, sub qualicunque tandem forma, Podagricis eximie conducit, non solum

quatenus temperat, sed & evehit per urinx vias Salinam materiam & tartaream mali causam: Eundem prodent effectum salia chamæpithios, betonicæ, absinthii, ebuli &c. Tuto intus assumitur saccharum Saturni cum consensu appropriatis, actuque mitigat, indice gustu, sed veneream cupidinem infringit, in commodum forsan podagricorum. Ejusmodi remedium exhibitio ultimis tantum diebus fieri debet, præmissis levioribus quibusdam eccoproticis. Purgantibus, podagræ maxime convenientibus, superius commemoratis, accedat hoc specificum, Pulvis scilicet noster arthriticus, qui semel saltem in mense, circa plenilunium, cum maxime turgent humores, a drachma una ad scrupulos quatuor, plus aut minus, pro morbi magnitudine, virium præsertim ægri habita ratione, usurpari debet: Qui sunt plethorici & Podagræ graviter vexantur, si quoque illum in usum ducere poterunt, suspectis præcipue tempestatibus, uno aut altero die ante novilunium, ex pingui caponis juscule, vino albo, cremore hordei, lactis sero, cujus haustum à sumpto medicamento iungere convenit.

2. Naturæ cranii humani insepulti, turbit, hermodactyl. Gialapæ, fennæ, cremor. Tartari, diagryd. garyophyllana ʒi. misceantur, ac in subtilem pulverem terantur: Baurus, Medicus Italus, laudibus extollit Caryocostinum, cujus simplicia, cum maxime caleant, ejusque operatio paulò vehementior sit, vix utile putat siccis corporibus, sed tantum summe frigidis & humidis; ita ut prædictus pulvis vicem aliorum supplere possit, excepto Mercurio, cujus vim & energiam cæteris omnibus antepono: Actum supra de eum exhibendi modo, vehiculum ei debetur quod citò operationem perficiat, quales sunt pilulæ cocciæ minores, similiaque purgantia colocynthidem admittentia, scammonium, elleborum nigrum, e quibus, si lubet, concinnari poterit extractum, pilulari forma, permiscendum Mercurio. Si quos jam invasit podagra, liberari ab ea postulant, aut saltem mitius tractari, si post purgationes universales triplicis corporis regionis, pro exigentia & gradu affectionis, præmissa diata sudorifica, per annum subsequenteribus pilulis utantur, quibus tanquam sensibilibus desit vacuatio, diutino tamen nun nec interrupto, materia ejusmodi Tartarea cum urinis evehitur, de quo toties actum: facultate demum omnino specificæ, in quam semper intentum esse decet Medicum, cuicunque demum insillatur methodo, articulos roborant.

2. Pulv. chamæpit. ʒss. liquir. Hispan. ʒij. beton. ʒi. ossium mespilorum ʒiij. omnibus in pulverem subtilem tuis cum f. q. terebinth. Venet. f. pilul. à ʒi. ad ʒi. & ʒij. quotidie, tribus horis ante prandium exhibenda, post deambulando & leviter se exercendo. Illius remedii basis est Chamæpytis, quam nonnulli simpliciter terebinthine remiscant, addunt alii betonicam, usus ut supra: Exacto primo anno, utendum hoc remedio singulo vere & autumnno, spatio xxx. aut xl. dierum, effectu observato, ita ut si venter libere fluat, res natura committatur, remediumque eò conspirantibus: si pigra sit, sollicitetur pilulis stimulantibus, idem idem assumptis fortioribus purgantibus, ut dictum; vitata



vitata interim vitiosa diata, cavendoque ne quod una manus adstruit, altera destruat. Absorbentia siccandi vi possent, qualitate manifestata, cui si specifica associetur, præstantior & vegetior orietur effectus: Ossibus cuicunque generis, crudis aut calcinatis, e. vis inest, sed humana, ex iisdem partibus quæ affliguntur desumpta, efficacius agunt ratione similitudinis.

26. Dictorum ossium ʒiij. C. C. crudi & calcinati an. part. ij. ocul. cancr. subtil. pulverisat. part. i. pulv. aut medullæ f. rinacæ satrapar. l. part. v. omni in pollinem terantur; quibus, si lubet, adjici poterunt sem. amf. f. nicul. coriandr. cinnamom. succini, moschi, sed exigua quantitate ac solum ad gratiam guttus: mane & sero allumatur cochlear integrum, procul a cibo; cum destiterit podagricus ab usu prædictarum pilul. chamæpithios, vel intermedio, quo eas non usurpabit, tempore. Caetera br. chris multa, vel tibiis, humorem in articulos fluentem interceptiunt alioque deducunt, maximi solatium ad præseruationem arthritidis, tum curationem, præsecum si ægi legibus diata non obtemperent, quæ de e. ulâ ea admittere tenentur. Succedunt jam remedia doloris urgentiam spectantia, ad quorum disquisitionem, ob ægrotum impatienciam, tormentique vehementiam Medicorum solertia impellitur: In memoriam revocetur, quod prius dictum, materiæ salinas, acidas & mobiles, simul permixtas sese mutuo se operare: Eademmet podagricum dolorem sedant: Lixivia e cineribus cauium, sarmenorum, cinerum clavellorum, tartari, similibus & salibus Alkali in mitigationem doloris concurrunt, maxime si vitriolica admisceantur, in quibus later anodium sulphur & sal, potenti discutendi vi præditum: vitriolum album in aqua stillatitia caulium dissolutum: Limbum nativa dulcedine mordacitate s. l. podagricum exuit, exterius: d. motum ex prædicta c. ulium aqua, ut & silicis, cujus s. l. in cineribus latens eximia est virtutis. Phlegma vitrioli albi, aqua spermatis ranarum, simileve liquores, quibus per sepe narcotica adduntur, duplici nomine utilia sunt, quæ sensum obtundunt (de quibus infra) & ope naturæ sulphureæ, quæ temperant humorem. Maxima pars eorum qui podagricis auxiliares manus porrigunt, cataplasmatibus inepte utuntur, unde plus damni, poris cutis oculis, quam commodi accedit: Referandi potius ij & in id elaborandum quo foras eliciatur id lixivium, dum sub forma est liquida: Eum in finem utendum aquis apoplecticis, tantopere ab Authoribus decantatis, coactis e salibus & vitriolis supra memoratis, Oxoronia Zavingeri, Aqua ex urina & vitriolo diu simul maceratis, digestis per putrefactionem, egregiam opem fert: Eximia est iis in doloribus camphora, digerit, halitumque insensilem juvat, mediante summa ærimonia: Ex aquis supra dictis utiliter admoveatur, etiam in intensissimis doloribus: Vidi qui dissolvant opium, digerant, postmodum distillent, utiliterque ejusmodi mixturam dolentibus articulis admoveant, etiam maxime vigente dolore: ejus efficaciamugebit: d. litio camphoræ: In id satis sunt hæc præsidia, quan-

quam & alia non minus generosa afferri queant & præscribi. Somnus vacationem omnem cohibet, excepto sudore: atque ubi fluxio vehemens est, doloresque intensi, nihil gratius & utilius ad eum accersendum, nec quicquam æquiparandum venit Laudano, cujus duo, tria, quatuorve grana possunt præberi horâ somni, imò pluribus ex serie noctibus. Per quietem humores concoquuntur, natura vires resumat, & insurgit hostem superatura: Alia prostant somnifera laudani succedanea, sed istud cæteris palmam præripit. Maxima Medicorum pars contra narcoticorum & stupefacientium usum insurgit, eaque impugnat; quod non desunt alia præsidia tutiora quorum ope doloris vehementia demulceri possit, ac satius sit, ex ipso rûm mente, ejulatus non compescere quam ægrum enervem reddere per ejusmodi medicamenta: Lepidum sanè & plavum excipiendum excusationis genus, quasi vero per ea tam insignis inbecillitas partibus & ægro inuri queat: Reverâ intus assumpta narcotica, si dextre in usum non hectantur, damni non sunt expertia, quippe quæ intempestive data in cerebro congelationem quandam, ut ita dic. m, pariunt, spirituumque quand m. d. non mediante refrigeratione, sed fixatione, quæ sulphuris, luxuriantis in iis remediis, soboles est, unde inducta immobilitate spirituum animalium, illorum influxus prohibetur, hinc mors per suffocationem sequitur: sed si viget atrox dolor, ab ejusmodi remediorum admotione nihil quicquam simile pertimescendum, cum certum sit dolorem, vel una die urgentem, majorem nervis inferre labem & debilitatem, quam topicorum admotionem sex dierum spatio continuatam; supponamus verò stuporem inde aliquem superstitem esse in partibus, mille præsto sunt remedia eam labem eluere valentia, balnea, fofus, emplastra, laconica & alia quæ brevi tempore id præstant: adde his narcoticum fore innoxium suæ antidoto annexum: Omnes prope autores in vehementia doloris podagrici hyoscyanum in usum ducunt: ad opium quidam ascendunt: si splen multum induruit cicutam illi innoxie apponimus, quod & oculis utiliter superimponitur, quanquam cerebro proximis: Ego autem non vereor, comprobante felici eventu, in usum ducere utramque illam plantam cataplasmatibus forma; addita cassia, camphora, spermate ceti, atque axungia humana, quæ præstantissimum est anodynum eo in affectu. Sedato dolore ad roborantia accedendum, inter quæ vinum optimum, quod ut extrus ad motum partibus nervosis utile est, sic intus assumptum maxime infestum est omnibusque cerebri propaginibus. Qui alias insultus arthriticos sustinuerit, admittere necesse habent remedium quod siccandi vi roboraret partes nervosas, quarum tonus & temperamentum nativum per similia conservari postulat: Paulus Aegineta, antiquus & doctus medicus, podagricorum articulos linimento ex sale & oleo perfricat: conducit id remedium mitigatis doloribus, sed præstantissimum est in iis præcavendis: Paretur, oleum ex violis luteis (cheirinum vocant) ex iteratis florum infusionibus, quod optimum evadet additione florum verbaschi.



27. Prædicti olei tibi. salis marini decrepiti, dissoluti & in alkool redacti super porphyrite, saponis albi veneti ana ℥iv. m. fiat instar nutriti. Eo vesperi omnes articuli inungendi, præsertim pedum & manuum, præ cæteris partibus maximè doloribus obnoxii: post inducantur tibialia & cheirothecæ laneæ in introitu lecti. Quondam mihi fuit notus Medicus doctus, qui cum podagra per annos triginta fuisset infirmus, (fuit is Dom. Quartier Ducis Bullionzi Medicus) demumque totidem annis supervixisset, reliquo vitæ tempore, (prætergressus enim est annum centesimum) beneficio supra scripti linimenti, decem annis ante obitum, incedens visus est æquè firmo talo, ac si nunquam eo affectu tentatus fuisset: Plurimis forsitan adstrictior hæc diæta & medendi methodus tædiosa censetur, quæ sic redit labor actus in orbem. Agricolis, quibus vita sobria, exercitiumque indefectum, cætera præscribere superfluum est: Divites, qui labori tædio servorum ministerio omnia exequuntur, quantum velint debaccantur, nihil moror. Desinentibus paroxysmis, familiaris est usus Emplastri diachalcitæ, quod reverà innoxium est, sed exigui solatii, Prostant meliora, qualia sunt Empl. de hermodactylis, de minio magistrale, vocant Emplastrum sandicis, Gummi carum spiritu vini dissolutum, ut & Lacamahaca singularis sunt efficaciz: Emplastr. betonicæ: masticæ, storac ac benzoin, liquefacta cum prædicto spiritu, egregiè conferunt. Balsamus Ebuli, paratus cum lumbricis, catellis lactantibus, addito sale præstantissimus est. Balnea & fotus ex herbis neuroticis, lixivio ex aqua chalybeata confecto, incoctis, addito vino rubro, sale, sulphure & alumine, mirè corroborant, Lac aluminis singulariter valet, quod sic paratur.

28. Aquæ vitæ tibi. album. ovorum rec. num. vi. diu una conquassentur cum 3. aut 4. grandioribus aluminis frustulis in olla terrea vitreata; ea satis erit agitasse & commovisse, si prius in dicto vini spiritu facta fuerit infusio herbarum nervialium salvæ, majoranæ, rorismarini, inde remedio virium accessio fiet: hoc vero calefacto, cum ovorum albumina indurescant, & crassescant, ac in grumos abeant, satius erit seorsim excalefacere vinum rubrum optimum, (de alicanto si proster) demum in vas igne exceptum, duplam aut triplam quantitatem alterius lactis aluminis injicere, atque in eam miscellam immergere lintea duplicata, ac calide admovere; sed quorsum plura, cum prædicta satis efficaciaz sint. Ridiculum se præbet qui topiorum dissolutionem pollicetur, nam si iudurnerint, tale quid tentare, laterem lavare est: sed materia existente adhuc viscidâ, credo rem non omnino esse impossibilem, si modo nanciscamur remedium quod illam subeat, ac similitudine subst. ntiz cum illa conveniat; Tale est sal armoniacum, tum naturale tum artificiale, imo compositum ex fuligine & urina animalium. Sed sal urinæ volatile, crebris depuratum sublimationibus, viribus antecellit. Partium poris sufficienter reteratis, vel balnei ope vel Laconici, aut ad lixivii vaporem, parati cum fæcibus aut scoriis flavis reguli antimonii: (cujus sulphur potentissimè

attrahit: nec minori dissolvendi vi pollet) Accipiat sal urinæ, misceatur cum optimo spiritu vini, ex hac mixtura fiat totus: Oleum arsenici digerit & ad superficiem allicit, nec remedium extat hoc in opere æquiparandum; si tantillum ejus misceatur cum butyro Majali vel alia pinguedine, leniterque inungantur artus: Dissipantur aliquando ejusmodi tumores exsudante materia quadam viscidâ, pinguedinem referente, & sæpè exoriuntur pultices aquæ guttas fundentes non secus ac ova igni exposita. Cardio vero, circa hujus remedii usum, in hoc vertitur, ne festinatio quæritur, ejus enim effectus per sæpe duodecimo demum, vel decimo quinto die se exerit. Quidam, ut Dariosus, apertionem partium circa articulos per ruptoria moluntur; & ante factam ullam concretionem utiliter vesicatoria admovent. Ego autem in ea sum sententia priorum consilium supervacaneum esse, atque cum qui mali causam antecedentem per remedia autus assumpta impugnavit, externis facile posse cedere, vel saltem à dolorificis hisce abstinere, cum iniquum sit afflicto afflictionem addere. Priusquam colophonem imponam de sanguinis missione aliquid adjiciendum, quæ in corporibus plethoricis, in iis qui laetè & opipare vivunt, vero indulgent, præcautionis gratia nunquam non fieri debet: vere brachii venæ tuncantur & autumno: In melancholicis referentur hæmorrhoides; in ulceribus cicantur menses si substituerint: Gelenus intrepidè asserit præsentaneum esse auxilium in maximis doloribus, præcipibus fluxionibus & ingentibus inflammationibus: his tribus sæpè simul concurrentibus primo podagræ insultu, quis eam sæpius instituentiam negaverit, juxta necessitatis urgentiam? Hujus remedii cum tam eximia sit utilitas, quoniam quæso majori certitudine, minusque ancipiti spe poterit decerni? Nunquid in urgentia dolorum purgationi anteposenda? Quanquam Bayrus asserat se ipsum podagra ad extremum afflictum, ab a. unpto Elect. suo Caryocostino in doloris urgentia, semper libertatem pedum restitutam fuisse, ut solus, nemine fulciente, sellam perforatam adire valuerit: Ite illi idem adhibeamus, Medico quippè docto, seni & experientissimo: Constat tamen vel non purgandos podagricos urgentibus doloribus, vel id ad faciendum, aliter commota camariâ malum ingravescere certum est: præcavebitur id dum si ea ipsa die qua assumptum purgans, exhibeatur noctu laudani dosis, ut supra dictum; Eo pacto organa us humorum sistitur, figuratur spiritus, tandem imminuta causa mitigatur malum, restituiturque natura pristinae libertati. Positis his regulis, non difficilis erit usurpatio plurium particularium remedium, præter specifica dicta: sed multitudo deterret ægros, confusionemque invehit tum in Medici animo, tum eorum qui ægro assident: Et quamquam sylvam medicamentorum huc adduxerim, non ea tamen mihi mens est, ut omnia in usum duci debere velim in eodem subjecto: Medici est ea eligere quæ unicuique ægrotanti commoda credit: Medicinalia consilia artis magistros directores habere debent, quo rectus usus neatur & opportunus, hincque utilitas



litas emergat, futura aliis gladius in manu furiosi, si quis vero artis ignarus his intendit uti, deceptum se à sinistro usu, gnoſcat: diſcit idem totam curationis ſumman in electione opportuni temporis ſitam eſſe, quod non omnibus obvium eſt, ſed his tantum qui in artis operibus conſeſcere & e nos acquirere; hæc non annus ne ſun dies una docet. Ante quam finem faciant illud moneo, hoc conſilium ab amico extortum, atque in ejus gratiam & reverentiam a me conſcriptum fuiſſe, ejus curioſitati potius quam neceſſitati ſatisfacere. *Theod. Targuius de Mayerne Tract. de Arthritide.*

Arthritidis cura eſt in cauſæ ſubſtatione, hoc eſt natuum, oſſa inter periſtium neque deliteſcentium evaporatione, quæ apud Japonenſes hoc modo perſicitur. Tenuiora ſoli ſuſcitataſque artemiſia latifolia colligunt, collecta ſiccant in umbra, ſiccata manibus fricant ambabus, cauliculos, foliorum fibrillas, aliave inutiles reliquias, vel ſordes abſciunt, ceteram molluginem ſervant ad uſum, quæ tum goſſypii inſtar eſt, ſi præparata ſit bene. Ille eſt maxime præparandi modus, tum apud Japonenſes, tum ſinas vulgariſſimus, liſſiſque & ſonſoribus non minus quam inſignibus quæ ſi Doctoribus notus: Nec minus communis eſt iſthæc medicina: quam ejus uſus; hic enim copioſius quam alibi inſelix ſolium, illa panacea creſcit. Hanc igitur ex arefacta ac mundata artemiſia molluginem, pollicis ac prioris digiti apicibus in parvam, minoris piſi, vel paulo amplius, magnitudinis, formant ſtupam, acutiori præſtate, baſi latiore prædictam: Vel etiam purificatam herbæ goſſypium charta obvolvunt, & diducta p. lina circum volvant, ut illa plantari lina magis & æqualius compingatur, de qua ſua cultro præſciunt ſtupas, duos circiter ſcriptorios calamos craſſas, quas dolenti loco (digito parum ſaliva imbuto prius ſubmadefacto) imponunt, atque ellycinio aliove vel flammæ vel ignis ſub ecto (ſic ſæpe una ſtupa ſequentem iteram) incendunt, ut hoc medio articulorum ille tortor, doloris omnis autor, ſtatus extricetur, & agatur in fugam. Haſ ergo artemiſiales tinuiculas, vel plana manu, vel extremis digitis urendæ parti imponunt. At hic prius arteriarum pulſus in affecto loco explorandus eſt (quod ſinæ japonenſque non ita attendunt, ut ex ſtupis conſlet de natuum hoſpitio. Quin corpus ſervandum eſt in eodem ſitu, uti diſtæ gentes notant. Hanc ergo facile combuſtibilem, modò ſiccata ſit congrue, ſtupam ſquam idcirco etiam in ignariis ſuis pixidibus ſecum portant ſinæ) in apice cum conſagrante bacillo (quem potentiores ſinenſium, non japonenſium quantum mihi ſaltem conſtitit, ex rebus æromaticis in olfactus delicias coacti curant) accendunt; quæ lente ardens flamma turriculam hanc in cineres non quinino convertit, ſed parvam ejus ſegmentum in baſi reliquit, quod epidermida nulla violentia trahit, pulſulamve, ſed pierumque clauſitiam tantum in oculum, etiaſi quoque ſæpius ſuper eandem plagam illa renovetur inuſtio, ſuperſtitem ſinit; quoniam cucurbituræ inſtar peccantes humores, æſte viſu, licenti, eodem imbibit, ut plume coſtuz, cutemve

nimis corrodere nequeat; humores enim ad hoc ſtupæ incendium celerius etiam conſuunt, quam in urbe vicinæ paries cum proximus ardet. Neque valde dolorifica eſt (quod, præter ingens levamen, hoc genus auxilii ſummopere commendat) inuſtio; mollis namque eſt hæc ſtupa, nec ſpiſſa, nec magna, neque ad ipſam cutem flamma penetrans, atque ipſa conſagratio momentanea eſt. Hæc imbecillioribus in locis ter quaterve communiter reiteratur inuſtio; aliis vero in plagis, ſi robuſtiores ſint, ſtatimque profundius hæreant; Verbi gratiâ in Iſchiade in qua cruſtas valde multas, magnas, ubi ſinenſes ac japonenſes parvas, ac inter ſe propinquas inurendas præcipit Hippocrates) quandoque vices, trigelies, etiam quinquageſies, imo pluries, illa repetitur; donec male ſuadus ille natus exhalet, atque hinc nullus mali alicujus metus eſt, neve doloris reliquæ; & quanprimum ſinitum eſt hoc comburium; licet inuſtam partem tractare, vel pro lubitu comprimere; hoc enim dolorem ſedit, & ut plurimum tollit mox incendium, ſi bene ſucceſſerit.

Inuſtionis hujus utilitati quidam contrarium, uti ſupra attigi, experientiam opponunt, dicentes, quod podagrici inſtionum vexantibus animales ſimul & vitales vires exantlent, nutritionem vitient, & (quod quidem leviſſimum eſt) cutis planticem cicatricibus deformant. Verum in Japoniam ac ſinam concedant illi antagoniſtæ, ubi experientur homines cujuſvis ætatis, ſexus ac conditionis, in quocunque doloris, cum externi, tum interni, inſultu, nec non tumoris accellu ſua mox urere, & crebrius urendo robuſtiores evadere, urere etiam tamen ſani degunt, ad formidati mali procatarſin: Quanquam, fateor, nonnunquam contingat, ut longâ, forti, & ſæpius iteratâ inuſtione in leiſporhythmiam concidant; & inuſtio hæc in regionibus calidis (ubi per perpetuū patulos corporis poros ſpiritus phres exeunt) minus proſit, quam in locis frigidioribus, ubi corporis habitus contrariſe habet modo. Præterea etiam macri tenerique non ita fortiter, nec ita frequenter, quam validi carnoſique, urendi ſunt. Et quod cicatrices attinet; ego ſaltem exiſtimo, ſanitatem ægritudini præferendam. Verè igitur, quod de igne generatim Plinius, de hac inuſtoria ſtupa ſigillatim dixerō; eſt & ipſi igni medica vis; maxima autem noſtro: Ita valentiſſimum ſuper omnia medicinz auxilium ſimpliciter eſſe ignem comprobat Galeus, ubi dicit; Uſtio ex his eſt præſidiis, quod totam ejus quod infeſtat ſubſtantiam exanimant. Quod ſic interpretatur M. A. Severinus; Nullum eſſe vitium tam ferreum ac impenetrabile, quod vi ignis domari non queat; præſertim ſi ejuſdem vires atque uſus ad amuſſum intelligantur: Uti hæc non minus acutè, quam prolixè perſequitur prædictus autor; Quippe uti flamma aëre, tanquam ſuo pabulo ac incitamento fovetur, ſic hæc artificialis inuſtio noxiis ſtatibus, eorum ſtallibus, magis ſuccenditur, & quod primarium eſt, eoſdem exhaurit atque diſpellit. Attamen debiliori naturæ ſubveniendum, leviſque ſeparanda eſcara eſt, hoc pacto; Coactu nullo allium eſcaræ imponendum;



ponendum, quod iterum ejusdem corticis lamella, in ore parumper humectata, contegendum, ut emplatri loco serviat; atque ita post diem naturalem auferenda sunt ista ex alio tegumenta; nam separationi tunc proxima est crustula; postquam, dum decidit, pellucidior in curicula cicatrix remanet, rarius rotunda pustula; quæ si nihilominus suboritur, minutione forcipe leviter incidenda est, ut peccanti materię exitus pateat: Verum abstinendum a violentis mediis; nec fortioribus instrumentis, scalpello, cultellove, &c. auferenda est illa crusta: Uti barbara Hottentorum gens solet, quæ, si pars quæpiam læsa lenioribus (nam præter ovillum, bubulum, vaccinumve serum in extremis doloribus nullum agnoscunt pharmacum) telorum acutissime (quibus hostes aggrediuntur externos) internos etiam dolores demere conantur; dum post violentam scarificationem, mali causam exurgere tentant ore; quos inter optimus ille Chirurgus est, qui fortius fugere novit. Verum quis nostratium crudellem illum medendi ritum non aspernetur? Cum exinde dolor exacerbetur, hinc febris sæpenumero sobolescat: Escara illa facili ratione tollitur, si modo plantaginis folium (rusticorum apud Japones communis in vulneribus & ulceribus medicina) beta, brassicæ, Syri &c. modicè tostum manibusque frictum, ut mollescat, applicetur, atque ita patienti animo crustulæ decidentia expectetur & cura. Ubi notandum si illa plantaginis folia (ignitis carbonibus prius impolita, ut lentescant & concidant, manuumque palmis compacta iterum explicentur) nervoso sui latere calidè simul & humide applicentur, illinc fonticuli instar ichor exsudet; si vero parte glabra adhibeantur (cum consolidationem exigit ulcusculum) illa citò & sine notabili cicatrice (quod cum negligunt Japones, & unctiosa putrilagine luxuriare plagam, & emanantem incrudescere sanem faciant, deformibus ex hac inuisione nævis scindantur) coalescit vulnusculum, convenientius etiam quam si vel electa intrat: fuissent emplastra, propter pinguedinem maxime postponenda. Verum non est precipitanda illa escaræ ablatio, etiam si plagulæ levissimè tantum adhæreat; Naturæ remittendum illud opus, neque sistendus est saniei fluxus; neve globulorum introductione excitandi sunt meri fonticuli; suopre exeat, quantum velit udor: Quare diutius illa folia fibrilloso latere super plagam retinenda sunt, quia sic insanum ichor liberius effluit; verum parte glabra non ita diu; quia tunc nimis cito vulnusculum consolidant; servanda ergo super plagam nervosa foliorum facies, & ne illa decendant, obliganda, vel conglutinantibus emplastris (si ligaturas non ferat plaga) detinenda, atque ad minimum bis viginti quatuor horarum spatio renovanda sunt. Si verò plantago (quæ in Sina ac Japonia, ubi hic medendi modus usitatissimus est, per quam abundat) deficiat, brassica, beta, ruscilago, hederæ, vel consimilia substitui possunt: Quæ si desint singula, uti mare peragrantibus accidit, diapalmæ, basiliconis, vel, quod magis probò, stichicum Paracelsi, alteriusve emplastrum succedaneum sit.

Est tanti non est monstrasse portum, nisi scopuli, qui cum periculo allidi possunt, simul ostendantur. Prohibent igitur Japones, quorum inuisionis praxim nunc imprimis doceo.

1. Ne in febribus ardentibus, sive continetibus, sive continuis quamdiu illæ typum servant, vel exacerbationes cum suis accingentibus patiuntur, corpora inurantur moxa, experti febrem cum suis symptomatibus exinde intendi.

2. Moxæ usum vetant in intermittentiâ paroxysmo, quod accurate observant Japones, verum extra eandem inuisionem hanc seduli inculcant & strenue administrant.

3. Moxæ comburium interdicit in gravidine, secus febrem, eamque nonnumquam gravissimam, supervenire inquit, præsertim si corpus tegentis non bene amant: Quod semper in inuisionis opere observandum inungunt ob metum febris, uti experientia comprobant; secus enim externum aeris frigus adpartis inuisione poris, quibus ilatus egressi tuere, se insinuat, atque vetus malum in pejus sæpe pervertit.

4. Gravidæ etiam urere, nisi centum diebus jam transactis, recusant: Quod de his locis intellectum velim; namque non semel lamias fatum recens enixas adversus cephalalgiam, aliosve cum capitis, tum pectoris dolores magno cum levamine inuri præcepi.

Post inuisionem, (hoc est, primis post primam inuisionem diebus) ultimam partem digito, vel potius munda syndone, in aqua c. lita ac subalsa leviculè tinctis, & lenissimè, formidine febris, iteratò molliterque contrectant; præcavescentes, ne aqua nimiam sanguinem contraxerit, digitusque perfrigidus, præhumidusve sit. Quanquam hæc monitoria regula in omnibus non habeat locum; id tamen commodi adfert probè observata, quod purulentum ichor ex inulto stigmatē, citius tutiusque proleat.

His adde, si lubet, Hippocratis monitum. Dextras urere aut secare lethalius (saltem non damnosius) esse.

Enim verò quibus hic labor nimis videtur (nam Japones veri paroxysmi sunt) aliis cautius actibus utuntur, in quorum usu illam præceptorum exactitudinem non sequuntur; Coniciunt ergo ex siccis integrisque Artemisiæ &c. foliis herbaceam turundam, digitum longitudine, non crassitie superantem; hac longiuscula stupā inurendam partem octies deciesve cautè tangunt & leviter, aut ultima vice eandem plagæ aliquanto fortius imprimunt. Hanc & prædictam pariter operationem *Sin kin* nuncupant Japones, cujus nomen & usum à Sinis (quibus hæc hodie saltem non ita familiaris est) accepere: Huic ego vulgatam cum moxa inuisionem anteponebam. Ad quam juxta artis leges bene absolvendam sui habent schemata Sinenses & Japonenses Practici, in quibus loca totius corporis perussioni designata notarunt exigua anatomæ notitia: Malim ipsos consuli sensus & venas pulsantes in circuitu inuri. Hanc pyrotechniam chirurgicam plerique Japonum ad morborum prophylaxim quotannis saltem semel, ut plurimum bis, imò pluries, administrant; eodem quo nostratium



nostratum multi ritu, qui ad aegritudinum præservacionem, præsertim vena tempestate, cum in organismo sunt humores, corpus evacua- re & sanguinem fovere assuevere.

Hactenus *Wilelmus Ter. Rayne Dissertat. de Arthrit.* Qui us non omnino consentit *Herman. Nicol. Grinn.* qui compendii sui medico chymici pag. 301. sic scribit. In India Arthritis inter primarios & minores versatur. Hujus causa est quod sanguis humilis volatilis supprimitur; unde nihil, nisi acris & acidus succus nervosus generatur; ad quod non parum facit prava diæta, aer calidus & excessus in horto venereo. Sed hac de re quid dicam, nisi quod forte iusta Dei poena hisce hominibus superveniat? Nam plurimi ex inferioribus in manus barbae morum conscientia carentium incidunt, qui propter avaritiam omnes eodem modo tractant. Quamprimum enim de dolore capitis, humeri, brachii &c. conqueruntur, statim luc venerea insectis adiunguntur, probeque mercurio unguuntur, ita ut debilis sanguis adhuc magis tandem exhauriatur, & illi miseria ex Nolocomio venereo exeant, quam introverint. Plurimi ditiores sese quidem (quod gustus inferni est) exuri permittunt; sed sine fructu, nisi forte subtilis & volatilis vapor solum, modo partibus exterioribus mudeat.

### Consultationes.

Pro præservacione Arthritidis, sanguinis missionem, & purgationem, certis anni temporibus, tibi pronuncia judico; ut & usum decocti ligni Guajaci inter utrumque tempus purgationis, videretur mihi conultum esse, uti aliquando leviori purganti medicamento, quod prima solum viscera aliquando aggravata expurgaret, quare sit usus hujus electuarii frequens.

℞. Succus fenicul. depurati lib. ij. mell. desumat. lbj. coq. lento igne usque ad succ. consumptionem, trigefacto adde hermodact. ℥ij. M. rosæ Castaneæ magnitudo bis terve in hebdomada cum decocti anisi, feniculi, carvi sem. agat. ℥ij. hujus loco velim aliquando in ingressu mensæ assumere cochlear unum Syr. de Spm. Cervin. quem sæpe in hac dispositione prohenum cognovi, exhibeatur dissolutus in vino vel jure carnium, & quoniam sere solum serolum humorem educit, & aliqua ex parte biliosum, minus pituitosum & crassum, poteris aliquando uti his pilulis videlicet seniel in mente.

℞. Agar. troch. hermodact. ana ℥ij. turbitih. elect. ℥i. trochisc. alhand. ℥ij. nirobal. Cneul. Citrin. ana ℥ij. rhei, mallich. 2 mizib. ana ℥ij. spec. hier. simpl. ℥i. cum melle rosace. f. pasta pro pilul. quæ crassa & viscida recrement. educunt potissimum. Ut artus nrmmentur advigilandum ne pedes, vel ceteri artus uilo frigore premantur, aut humore malefiant, abstergerendi tam vespere quam mane sicciora liateo. Lavandi item singulis 14. diebus aqua chalibeata, salsa incoctis rosis, salvia, rva, verbasco, artemisi, vel id genus similibus. Post ablutionem perungendi oleo rosaceo omphacino, unctio sale. Ad mali præsentis Cu-

rationem jam veniendum. In principio induens humor statim vacuandus venit, & revelendus, quod commodissime fieri potest vomitu & medicamento purgante: quod licet quibusdam non probetur, tamen ego multa experientia didici mirum in modum prodesse; neque novum illud est, & inusitatum: etenim *Traillan.* lib. ij. expressis verbis jubet exhibenda solutiva, non solum præservacionis ratione, per morbi intervalla, sed in ipsis mali paroxysmis. Intercipiuntur viz, ut dictum est supra, quoties medicamentum purgans per os assumendum erit: nam sic fiet, ut exagitus & ad motionem expeditus humor, minus illabatur in juncturas. Si dolor vehemens accesserit, utatur hoc cataplasmate quo frequenter feliciter usus sum in magnis doloribus tam ischiadis, quam podagræ.

℞. Cicutæ, parietar. Lapath. malv. ana quantum placet, coque in vino albo bono, coctis & contusis adde axungiam porcinam recentem & subtilissime tritum fursur. Et f. Cataplasma, applicetur loco dolenti, postquam fluxio desistit & dolor cessavit humoris resolutio tentanda est fotu cum decocto rad. althææ flor. itachad. Lavendul. Calan. cath. Chamamel. Melil. & salis momenti, & hoc Cerato.

℞. Diacalcit. ℥ij. diachyl. iteat ℥i. Emplast. c. melilot. vel oxycroc. (ubi magis resolvere velis) ℥ss. emolli. ntur intillato oleo vulpino, & extend. super alutam. In hunc uñum etiam mirè valet decoctum vulpis integri adjectis ranis, & lumbricis, & herbis paulo ante dictis, hisce addam (licet quæ hactenus scripsi sufficiant) hoc naturale remedium, cujus ego experimentum vidi hisce meis oculis. Episcopus quidam mihi familiariter notus, graviter laborabat arthritide: Cum ubique auxilium imploraret, remediaque undique conquireret, intelligit Monachum quendam eodem morbo laborantem, remedio sequenti curatum esse. Accipiatur testudo mascula (cognoscitur inter cetera ex caudæ discrimine, & leni, sub inferiore testa incisura) ubi luna fuerit maxime lumine diminuta, priusquam cum sole conjungatur: amputentur vivæ crura omnia, ea consuta in sacculos, ex pelle hordina angustos, alligentur membris patientibus, ita ut dextrum eius testudinis dextro cruri agrotantis respondeat, sinistrum sinistro: item anterius eius dextrum, brachio dextro applicetur, sinistrum sinistro, quo loco alligari debeant non expressit Siculus Medicus cujus fuit experimentum certissimum: Monachus verò supra genua suspenderat, & in brachiis supra cubita. Quibus postquam usus esset, capit paulatim melius habere, genua quæ humore mirum turgida fuerant, ceterique pedum articuli egregie detumuerunt, adeo ut membra jam agilia sine scissione levarentur. Aptavimus his intellectis idem remedium Episcopo, ex quo tempore cepit paulatim melius habere, sed cum statim mihi abeundum fuit, intelligere non potui an penitus convalesceret. De differentia testudinis nihil addidit Monachus: Si quid tamen inde auxilii sperandum sit, arbitror in podagra frigida, applicandas terrestres; in calida aquaticas. Nam illud discrimen observare soleo,



in unguento quodam quod ex testudinibus ad arthriticidem compono, quo alias sum taliciter usus. Nolim hoc aut simile remedium parvi fieri, quod ab usu communi, aut à ratione alienum videatur: non multa sunt in rerum natura, quæ experientia talia comprobant, licet ratio nihil inveniat, quo illa dijudicet. *Rennerus Solenander. Consil. 20. Sect. 1.*

*De Doloribus Articularibus, Colicis, & Nephriticis. Pro Sereniss. Vladislao, Polonia, & Suecia Rege.*

*Ad Clariss. Jo. Gasparem Crassi. Regia Majestatis Archiatrum.*

Serenissimus Rex, naturalem eam totius corporis, & partium principum constitutionem sortitus, quam accuratissime expressit Clarissimus ejus Archiater; non sine hæreditaria labe, doloribus Arthriticis, Colicis & Nephriticis per intervalla torquetur; quorum quidem arthritis nunc sævit atrocius, & diutius, ad augmentum quippe perducta; a renibus forsan, & intestinis ad articulos tota, irumpente materia; non quidem errore ut tunc docuissimæ, quamvis non didicerit, ex Hippocr. cum leviores sint articulorum morbi, quam aliarum partium.

Quorum omnium causa materialis frigida omnino est prædominio, tartareæ particæps, calidiunculis serositatibus immixta; ejus causam eandem agnoscimus hæreditariam dispositionem, quæ affectas partes imbecilliores produxit: ut propterea frequentius dolores hujusmodi invicem connectantur; atque raro arthritici, non aliquando nephritici, & colici doloribus divexati fuerint. Et quamvis omnium fons, & origo referri possit ad viscerum naturalium intemperies; censemus tamen, capitis humiditatem primas obtinere, à quo fluxiones ad articulos plerumque decurrunt; imbecillioris potissimum ex epilepsia, quæ antehac laboravit; ejus intemperiei luculenta habuimus indicia; gravem nempe capitis præcedentem dolorem; quem primo excepit partium superiorum arthritis, quæ & omnes jam articulos obsidet.

Ex quibus patet, præsentem affectum omni quidem periculo vacare; ejus tamen difficillima sanatio sit futura, perfecta saltem, imò nec præservatio effatu digna, & tuta satis, ac diuturna; cum sit antiquus, hereditarius; atque roboratis articulis, imminet periculum, ne materia in penitiora corporis remeunte, dolores nephriticos, & colicos exsuscitet. Quidquid eorum sit, in certa spe sumus, fore ut Serenissimus Rex, hoc in primis tempore, quamprimum a præsentis insultu incolumis evadat; cum jam in declivi sit, & remedia nuper adhibita juvamento fuerint; usque adeo quidem, ut nullum vestigium superstes sit futurum eorum humorum, qui articulos obsederunt; atque cum humores, tenues alioquin, brevi adeo temporis spatio in nodos concrefcere non potuerint, de aliqua saltem præservatione certior allucet spes; accedente inprimis temperantia Serenissim. Regis, qui tantum non est abstemius, & quod palmarium est, exercitiis

addictus; eam potissimum sortitus constitutionem à naturæ ortu, quæ morborum est medicatrix, ut ab affectu æque pertinaci, ac gravi conalecere potuerit; Epilepsia scilicet & quidem ea ætate, quæ difficillime plerique sanantur.

Agitur vero nunc de superstitute materia in articulis discutienda. Quod quidem si hætenas ad vota Clarissimi Archiatri non successit; probetur nobis exercitium par viribus Regiæ Majestatis; non tamen equo; juxta Hipp. præceptum, a quo solo Scythæ ischiade laborabant; necnon, & præ cæteris topicis, ac commodata frictio manibus spiritu vini perfusis; immersione in eo facta sturni vis, sævia & vorisimaria. Quod si forte obdormuerint humores; qui provide validiori emolliatione, & dissolutione opus habeant, confugiendum primo ad Gal. *Emplastrum ex casio veteri, & perna de cocto*; atque ejusdem oleum veteri salitum, *sissimigia*, & alia, quæ his proportionem respondeant. Quo autem, favente Numine, res à votis magis succedat, instituenda est blanda, & familiaris aliquæ purgatio, cum uni versalis, tum particularis capitis; atque hoc exsiccandum, missis calidis; roboratis pro virili articulis: quanquam fieri nulla ratione possit censamus, ut hæreditaria eorum imbecillitas, seu laxitas omnino amovetur. Victus ratio est adhibenda, atque si, quod veremur, accessio aliquando invadat, localia erunt usurpanda.

Purgationem universalem quod spectat, et bis in anno omnino repetenda; levioribus tamen medicamentis; atque missa etiam venesectione, si abunde fluxerint hæmorrhoides: sin minus quam pro usu, Vere saltem, ex Hipp. & Galen. præcepto, sanguis modicè educatur. In purgantibus vero, clysteres locum habent; quorum usus aliorum purgantium erit vice Vere, & Autumno, atque sævientis ischiade; acriorum etiam præsentis erit remedium, addita *colocythide*; quæ nunquam & sint utiles futuri purgationis familiaris loco, quolibet tempore, & Hipp. 6. Epid. 3. & Lib. de Humoribus, sub finem, his verbis: *si doloribus articularibus intestinorum à dextra parte supervierint dolor, reddet agrum quietiorem; hoc autem curatio, magis dolet.* In quam rem dejectiones etiam in ischiade commendavit Lib. de Affectionibus. Quod si accurata adeo purgatio exigi non videretur, medicamentum saltem aliquod habeat in familiari usu, præter clysteres præscriptos, paratum ex pilulis arthriticis, aut de htera cum agarico; quarum vis augebitur, exigente quodvisque usu, addito modico pulvere hermodactylarum; qui hac formula Patavii prostat.

*℞. Turbith. hermodactyl. pulverisatorum ana ʒi. sem. diagrydii ʒiij. Zinziber. ʒi. sacchar. alb. ʒss. ejus compositi integra dosis est ʒi. quorum loco vomitus esse posset, si ipsi Sereniss. posset assuescere; quod facilius à cibo, & oxymel. usu consequetur. Purgatio capitis fiet erethinis, & apoplegmatisimis notissimis; atque ex Ferbellii consilio; ejus opinio in hoc casu rationi est consentanea, perfrictiones ad ejus futuras, & occiput, sacculis calidis, sale, fursuribus; milio, & seminibus calidis repletis. Quibus tamen hoc tempore*



tempore super sedendum duximus, cum dolores in declinatione sint universales: atque vigeat æstus; non sine aliquo vitium imbecillitate; spe freti, fore ut pauca in articulis superstes materia, exercitiis, & victu paulo tenuiori, & attenuante potissimum, iustro te in pore calidore, atque diaphoreticorum imprimis, & topicorum a Doctissimis Viris prescribendorum usu, elidi proestis, & dissolvi possit. Alios scopos quod ætinet, tempore frigiliori, in quamplurimum internorum remedium censu, quæ ex usu esse possunt, probatur nobis præ cæteris Terentianina Cypria; immixtis ossibus combutis, & ipsa arthritica, cum modico balsamo Orientali. Conferet enim summiopere emundandis renibus, & roborando ventriculo, ac intestinis: in cuius usu, ne nova materia ad renes insuat, dejectorium sæpius prescribendum. In externis, instar omnium erit inunctio, tot laudibus a Gal. celebrata ex oleo veteri salico; vel prescripta frictio, cum aqua vitæ; non neglecta nixteria, quæ in dies succrescit, & ad articulos illabi posset; quæ omnino divertenda est, & evacuanda, vomitu, dejectione, & sudore, ne roboratis articulis ad partem aliquam nobiliorum irumpat, & graviora inferat mala. In quam rem, & eadem lege, opportunum erit usus illarum aquarum Thermalium, quæ antehac juvamento fuerunt; ut & Vnicorum vindemix tempore. Commendantur autem Hipp. & aliis Græcis, ad præsertionem, & sanationem, inunctiones in ipsis articulis, cum potissimum dolores a mucosa materia ad articulos laxiores influente ortum ducunt. Nec abs re, cum magna vi polleat ignis absumendi materiam viticidam, & lentam; articulos roborandi, & contrahendi. Quod tamen remedium in doloribus universalibus Regis Sereniss. locum non habet; nisi dolor ischiadicus majus f cesseret negotium, atque refractarius, & pervicax evaderet. Tunc enim inurenda esset pars affecta juxta Hipp. consilium 6. Aphor. vel ferro candente, vel si Sereniss. Rex hoc respiceret, medicamento caullico, quod commendat Gal. ex radice Iberidis, contusa cum adipis suillo; Materiam verò divertendam, & protuto magis usu remedium corroborantium, fonticulus sinistro brachio inultus præfenti esset remedio, si admitteretur. Invadente vero arthritide, potissima cura sita est in internis remediis, & victu. Interna in ipso principio constantibus viribus, validiora usurpentur; puta, pulvis hermodactylatus; vel pilula de hermodactylis; exhibito ea die ipsa purgante medicamento, quia turget materia, ex Gal. præcepto. Sæpius enim non minus æstuant, atque ad fluxiones proclives sunt humores in arthritide, quam turgentes; ac proinde ad evacuationem æquè proni. In victu, quiescendum in accessionibus; & a vino abstinendum; cibo tenuiori utendum. Atque si his demulcebatur dolor, topicis super sedendum; cum periculo profus non vacent. Repellentia vero quod attinet, urgentibus doloribus; videntur quidem ex usu, ex Hipp. 5. Aphor. 25. ubi commendat frigidam large affusam parti affectæ; quod scilicet levat, & extenuat, solvique dolorem. Cui adstipulantur plures Me-

dicinæ Scriptores, dum ad opiata confugient, irrita repellentium usu. Verum quia trallus inter Recentiores, qualibet repellentia improbat, quarta Disputatione contra Paracellum, illius sententiam nos quoque amplectimur, in hac arthritide a materia frigida; cui consultius ducimus super sedere quibuslibet localibus; ne materia magis impingatur, & Vinculetur in parte affecta, evadatque arthritide tophacea, & inmedicabilis: quanquam sæviente dolore, leviora concedantur; ut aqua rosarum primò, cum albumine ovi; mox & cum vitellis, & modico aceto; vel perfusio partis affectæ lacte tepido chalybeato; vel lotus ex moderatè calidis, ab Hipp. commendatis, Libro de Affectionibus; qui 5. Aphor. cit. affusam frigidam parti affectæ in arthritide calida prescribit; ex Gal. in Com.

Extra accessiones, & earum declinatione, hæc potissima; in victus ratione, cibi, & potus parsimonia, ac temperantia; hæmorrhoidum modicus fluxus; repetita sæpius purgatio totius, & capitis; atque in rebus omnibus nonnaturalibus temperantia. Tandem cum nec rustici Podagra torqueantur, nec eunuchi, & pueri, ante Venereorum usum; neque mulieres, quibus menstrua non defecerint: id quidem Hippocr. ævo contigit, quo nullos in victus norma mittebant errores: Galeni tamen seculo, & nostro potissimum, pueros, eunuchos, & mulieres podagra exercet, ob promiscuam vitæ rationem in omnibus sex rebus nonnaturalibus. Potus medicatus parabitur ex cerevisia, & immixta melle, vel aliquo hujusmodi ex melle illi affuso. Atque hæc in Sereniss. Regis salutem potiora duximus: quam illi à Regum Rege, ferventibus votis precamur. Archiatro Præclariss. expendenda, & exigente usu administranda. Bened. Sylvat. Consil. Centur. iij.

Excellentissimus, Augustissimæ Majestatis Generalissimus, sexagesimum octavum annum agens, temperamenti totius & capitis calidi & humidi, cum aliquo excessu caloris in jecore & corde; qui in victus ratione satis caute vivens, æris tamen inclementis, tum diurnis, tum nocturnis frequenter seipsum exposuit, ut Munus & Ministerium suum tanti momenti requisivit: incolumem nihilominus diuturno tempore vitam duxit: sed quinque jam transactis mensibus, prægressâ capitis molestia gravedine, non sine infueto calore, incidit in dolores articulares, pedes occupantes, dum antea ab occipite per dorsum & scapulas materiam defluentem sensibiliter percipiebat. Dolores autem succedente tumore, remissi sunt, sed mortis impotentiam reliquerunt, quæ adhuc in præfens perseverat. Et cum topicis medicamentis res solventibus & roborantibus hucusque adhibitis malum non cesserit, & salutis recuperandæ spem totam in Te, Vir Præclarissime, modo Viennæ commorante reposuerit, de agendis tum pro curatione, tum pro præsertione auxilium implorat.

Dolores articulares, quibus Excellentiss. Vir, Generalissimus Augustissimæ Cæsaræ Majestatis quinque abhinc mensibus correptus fuit, arthritici potius, quam podagrici, cum Hipp. appellandi sunt, qui non a partibus



laxis, à quibus inutiles desumi possint medicæ indicationes, sed potius a causa lædente nomen desumere solebant: & idcirco cum eodem Podagra nomen, & nihil us, & pedibus competere potest, quotiescunque insignis fuerit dolor itabilis, & ægre medicamenti cedens; sicut e contra Arthritis pedibus quoque competit, dum dolor non adeo fixus & itabilis, sed mobilis, ab uno ad alium articulum migrat, nec diuturnus est, sed facile medicamenti cedens; & ita causam respexit Hipp. ipse, quam expressit sub illis verbis, quod Podagra fiat à sanguine, à bile & pituita corrupto: Arthritis vero a bile & pituita comotis; ac si dixerit, Podagra provenit à crudo succo in visceribus coctionibus destillatis genito: Arthritis autem non ita, sed a materia pituitosa, eaque catarrhali; bili commista; & hinc Fernelius suum inventum facile deduxit: sicut enim Podagra à visceribus naturalibus sumit originem suam, & per venas succum crudum atque biliosum, sanguinem inquinantem, in articulos recipit, ita Arthritidis causa potissima in capite generatur, catarrhalis nempe materia, quæ biliosa serositati immista, à jecore per venosum genus ad caput elata, non per vasa, sed per musculorum spatia ad articulos deferretur, neque sine sanguinis corruptione, sive inquinamento, ex sola pituita & bilis commixtione arthritici dolores excitantur; quod quidem contigit Excellentissimo Viro, qui in victus ratione, quoad potuit, semper moderata vixit, nec de visceribus naturalibus quicquam conqueritur: aeris autem inclementi in & vigiliis in Castris cum evitare nequeverit, capitis naturalem calidam & humidam intemperiem non parum adauxit, & idem ad pituitosæ catarrhalis materiæ productionem aptius reddidit: addita vero aliqua serositas biliosa in jecore genita, per venas, atque tandem per carotidas in caput facile elata, catarrhalem ipsam materiam ad partes inferiores, ad articulos scilicet per musculorum spatia secum duxit, & dolores arthriticos peperit.

Quæ cum ita se habeant, non erit in Arte versatus, qui non videat fontem mali, ut dicebat Celsus, tolli & extirpari debere, si Præservationsratio habeatur, cum affectus ille recidivare soleat: si vero Curationem expostulet, ut in casu præsentis, dum materia in articulis, si non omnino tophacea, saltem valde densa atque dura relicta fuerit, tunc valde Emollientibus & parim Resolventibus est utendum, hisque toto tempore usque ad venturum, quo ineunda erit purgatio, primas vias expiando. Totum venosum genus quodammodo depurando; sed præsertim caput purgando, & ejusdem humidam intemperiem corrigendo: dum iisdem præfidiis musculorum spatia exiccare, & articuli roborari poterunt.

Quibus intentionibus satisfieri posse sperandum, cum sexagesimum octavum annum suæ vitæ attingens, ab hujusmodi arthritica fluxione immunis semper vixerit, ex quo conjectari licet, naturam ad hanc dispositionem non habuisse; sed ex accidenti propter injurias externas in eandem incidisse.

Quare alacri & confidenti animo erit ineunda Purgatio, & primò in præsens curativa,

mensis vero Aprilis venturo præservativa. Et pro enodandis articulis tum ore affectis, Balneolum præscriptum admittendum erit, ex radicibus m. lvaum, alt.æz & liliorum alborum, in lixivio duci, aut aqua communis decoctis, paratum, in quo per horæ dimidium mane & vespere erunt detinenda: tunc tractanda partes ipsæ affectæ; postea inungenda linimento pariter ita præscripto.

℞. Adipis asserini ℥ij. pinguedin. felis ℥i. sal. alb. in patella torref. cr. aquæ vitæ juniperinæ ana ℥i. m. bulliant lento igne ad consumpt. aquæ, deinde retormetur linimentum; quo tempore congrua & parca erit servanda vivendi ratio.

Præservativa verò medela proximo Vere erit aggredienda. Et pro prima intentione, Leniens bis exhibendum erit.

℞. Pot. ex manna clarif. ℥vi. aquæ florum citri parum, m. f. potio.

Vel ℞. Syr. ros. solut. clarif. ℥vi. aq. florum citri parum, m. f. potio. Quinque vero inter medius diebus sumat summo mane hujusmodi Præparans.

℞. Julap. acct. ℥ij. aq. florum citri ℥i. misc. pro syr. & sic pro aliis.

Pro secunda intentione, ad ulteriora præparantia deveniendum, & esse poterunt uci depurati, cum decoctione ita paranda.

℞. Succis depurat. cichor. borag. betonic. ana ℥i. decoct. in jure pullæ tacti cichor. borag. endiviz, acetos. ivæ arthriticæ ℥iv. n. pro syr. & sic pro septem aliis; quibus assumptis, præbeat infusum hujusmodi.

℞. Rhabarb. opt. agarici trochisc. ana ℥i. sol. senz Orient. mund. ℥ij. cimini. integri ℥i. 2q. meliss. q. s. m. inf. per hor. xij. deinde fiat fortis expressio, & colaturæ adde syrupi ros. solut. ℥iv. m. f. potio, cui, tribus transactis horis, superbibat feri capr. lb. s. duabus verò horis ab assumpto sero prandeat. Sed interim in horum dierum intermedio aperiatur pectoraria dextra, & parce sanguis educatur.

Inde pro tertia intentione explenda, pilulæ capitales tribus vicibus, quarto aut quinto quoque die circa noctis dimidium erunt præbendæ, ut.

℞. Pilul. capitales Paracelli ℥ij. m. f. pilulæ, & aurentur. Intermediis vero diebus assumat syropos capitales ita parandos.

℞. Succis depur. cichor. betonic. ana ℥i. decoct. cichor. endiviz, betonicæ, itæchados, chamædryos, chanæpityos ℥iv. m. pro syrupo, & sic pro aliis. Et interim Errhino aliquo capitis purgatio coadjuvanda erit, ut.

℞. Pulveris majoranæ, ireos l. lorent. ana ℥ij. nigellæ ℥i. m. pro Errhino.

Postrema tandem intentio Decocto sudorifico erit perficienda, sine quo reliqua non suffecerint; & ideo hypocaustum parandum erit, ut caput potissimum, una cum toto corpore sudet. Decoctum autem hunc in modum concinuumdum.

℞. Sarsaparill. el. lign. visc. querc. ana ℥i. ligni rorismar. santal. alb. rasp. ℥i. aq. still. cichor. lib. ij. betonicæ, ivæ arthriticæ an. lb. m. f. infus. per horas xxiv. deinde bull. ad consumpt. dimidi, & colatura servetur pro tribus vicibus, summo mane, hora una ante ingressum



gressum hypocausti assumenda. Pro potu verò consueto.

24. Residuum lignorum, aq. comm. opt. lb. xv. m. bulliant ad consumptionem tertiam, in hunc ebullitionis adde cinnam. elect. integri 3ij. bulliant parum, deinde colaturæ adhuc ferventi adde sacchar. alb. 3ij. vel ad libitum, & frustula citri recentis, ut agitando fiat aqua, itaque dicta Cedrata. Maneat autem primis diebus in hypocausto solum per horæ quadrantem: ceteris per horæ dimidium, & non ulterius; mox iacet in lecto. Decimo vero quoque die præbeatur potio ex manna clarificata, & in hujus Decocti sudorifici usu quadraginta diebus perseveret, semel in die. Sed interim victus ratio non adeò tenuis esse debet, verum quotidie præter panem biscoctum, nucleos pineos, amygdalas atque passulas, in prandio caro assa est concedenda, aut palumbæ, aut pulli junioris: in cœna verò nonnunquam prasan hordeacea. Quod si fortasse tumor durus in aliquo articulo remanserit, vesperi sub ingressum lecti pars ipsa petia, ol. lil. alb. imbuta, erit involuenda, totaque nocte detinenda: minè verò curandum ut pars ipsa in hypocausto sudet, pedes nimirum altiores detinendo. Mox quotidie a sudore balneo praescripto erit utendum, & articulus nodosus praescripto linimento unguendus.

Quadraginta autem jam dictis diebus peractis, totum corpus vestibus diu ab ambiente frigido muniri debet, noctu vero operimentis, sive culcitris, ita ut quandoque sudor excutatur, articuli vero fluxionibus obnoxii, sed sani & immunes existentes, frequenter spiritu salis vola manus calida fricari debent, ut roborentur; & sub ingressum lecti Conserva aliqua capitalis in usum ducenda, ut è floribus betonicæ, vel rorismarini: imò & anni tempore calido, etiam rosarum.

Quibus omnibus, quantum fieri poterit, congrua vivendi ratio erit addenda. Primo caput ab injuriis externis, tum calidis, tum frigidis erit custodiendum. Secundo Semel in die cibum capere, erit adversus hunc affectum egregium Præservativum: sin minùs, saltem cœna sit parcissima atque frugalis, & decem saltem horis distet a prandio. Inter carnes omnino omittatur suilla, vitetur bubula, & animalia omnia annosa atque pingua: sic & extremitates, ut caput & pedes vituli &c. ita & caro volucrum aquatiliùm. Inter pisces vitentur canoli, glutinosi, Conchyliæ & Ostreae. Laticinia omnia nocuum aliquid afferre possunt, sed præsertim caseus, potissimum antiquus. Edulia ex pasta parata omittenda, exceptis levioribus, ut vermiculis Apulicis, & hujusmodi. Omnia legumina debilitant articulos, hostile & oryza exceptis. Ex oleribus caveat ab usu lactucæ, fœniculi, apii, fungorum & tuborum. Ex fructibus permitti possunt fraga, melones optimi: nonnunquam persica & pyra cocta. Ex condimentis, abstinendum a lardo suillo, ab allio, capis & aromatibus, excepto cinnamomo & pipere ruditer confuso: acida quoque non nisi raro usurpanda. Vinum sit rubrum, nec dulce, nec austerum, non valde generosum. Tertio somnus nocturnus saltem septem horarum necessa-

rius esset: quo deficiente, suppleat diurnus. Quarto exercitium, etiam laboriosum, quam maximè convenit, sed ante cibum ut propterea Hipp. dixerit, Labor articulis & carnibus, somnus visceribus. Ultimo alvus quotidie exoneranda, & si opus fuerit, arte sollicitanda prunis aut passulis in vino dulci decoctis, saccharo aspersis, & in prima mensa comansis, superbibendo jus carniùm tenue. Venus autem articulos extremè lædit. Tandem animi pathemata, nisi evitari possint, saltem aliqua gemali consocietate divertantur. Quæ omnia eximio atque invicto Excellentiss. Viro à summo Leo salutaria ex corde precor. *Raymund. Jo. Forus Consult. T. 2. Cent. 4.*

Illustrissimus vir trigessimum quintum annum agens, temperamenti totius ad humidum vergentis, hepatis tamen calidioris, habitus mollis & delicatioris, ex Patre podagrico natus, nonnullis abhinc annis arthritidis insultibus obnoxius, cum Autumno 1673. Roma discesserit, Bononiam perveniens, ibique commorans, post tempestatem Austrinam in hyemis principio eadem Arthritide universali, nempe omnium articulorum correptus fuit, eaque ceteris præteritis sæviori atque diuturniori, imò toto anno 1674. usque ad hunc diem, lophis in manibus relictis. Cum autem hucusque nullo modo Præservationem ullam tentaverit, sed tantummodo ab accessionibus, levioribus medicamentis seipsum paraverit, modo variz atque diversarum curationes hinc inde eidem considerandæ veniunt; quæ cum sibi invicem contrariæ & contra indicantes videantur, apud ipsum electio incerta, imò nulla restat. Inter multiplices autem quatuor proponuntur, iudicio tuo prudentissimo perpendendæ: Prima est, his in anno, primis expurgatis viis, circa Equinoctium, & semel misso sanguine, assumere serum vaccinum, aut caprinum stillatitidum, cicchoraceis, & malvis prius alteratum, hocque ad triginta dies, eo sine, ut corrigatur & edulcoretur acris atque salina qualitas in sanguine exilens, quæ in accessionibus podagricis ad articulos præcipitatur. Secunda curatio est illa, quæ diuturno solius lactis vaccini usu, etiam in mensa perficitur; quod curationis & præservationis genus & Germani, & Galli, & Itali, præsertim Parmenses experti fuerunt. Tertius curandi modus, forsitan a summa tua Prudentia inventus atque præscriptus, est vini Antipodagrici solutivi usus ad quadraginta dies, tum Verno, tum Autumnali tempore. Quartus modus de quo præsertim consilium à te petii, est, post prægressam totius & capitis convenientem expurgationem, Decocti sudorifici usus, quod quamvis communi Neotericorum opinioni contrarium videatur, attamen cum a te, pro temeipso, jam Podagrico existente, utiliter usurpatum fuerit, ab ore tuo pendere intendit Illustriss. iste vir, dum auxilium implorat.

Jure merito exclamabat Trallianus, unus ex Medicinæ Principibus, Podagram incurabilis nomen acquisivisse ob Medicorum inscitiam, ejusdem causam ad amissum ignorantium. Hinc fit ut medicamentum quod Podagricum aliquem sanat, alteri non profit, imò sæpe noceat; & præterea multarum intentiones contra indicantes, pro individuorum diversitate, à Medicis



Artem callentibus proponuntur, & felici successu executioni manentur. Sic primus Iurgationis modus pro Irtervatione utilis esse poterit is, in quibus generatur copia biliosi & lassi humoris, sine tamen pituitæ natura, quæ præfente, jam dictus medendi modus satis prodesse non poterit. Secundus modus nimirum diuturnus atque continuus lactis vaccini usus, juvabit gracilia corpora obstructionibus carentia, affectu hypochondriaco vacantia, caput humidum non habentia, neque distillationibus catarrhilibus obnoxia, & bile quidem, sed qualitate potius, quam quantitate peccante scitentia: in his enim Podagra facile nodosa & tophacea evadit; quibus absentibus conditionibus tantum abest ut lactis usus juvare possit, quin potius & Podagram augere, & alia lethalia mala interire soleat. Circæ tertium Præfervationis modum, vinum Antipodagricum purgans medicatum, & a me in ulum ductum, valde profuit habitu mediocri præditis, a catarrhi si distillatione immunibus, sine excedenti jecoris calore; in quibus ob intensas applicationes & nimia studia, addita quoque libera victus ratione, cruditatum copia in venis accrevatur, præsertim Æstate & Hyeme, quæ, vere & Autumno a natura ad articulos pro minori malo transmittitur; unde Gal. cum Hipp. dicebat, quod *Dolores podagrici Hyeme & Æstate fiunt: Vere autem & Autumno moriuntur.* Et idcirco cum vinum purgans ineunte Vere & Autumno, nimirum toto mense Martio & Septembri, in prima mensa quotidie epotum, cruditates epicitrico modo per alvum educere valeat, mox Natura quicquam quod ad articulos deponat, amplius non habet: unde Præfervatio. Postremus præfervandi & simul curandi modus, consistit in Decocti exiccantis sudorifici usu; hoc utem competit distillationibus à capite obnoxiiis, & serositatibus quibuscunque scitentibus; quæ frequentissime in Junioribus podagricis observantur: ut propterea Decoctum sudoricum mirabile sit, tum pro serositatibus per corporis peripheriam educendis, & ab articulis divertendis: tum pro exiccandis spatiis, & defendendis viis intermusculosis, per quas cum Fernel. frequenter humiditates ad articulos feruntur: atque tandem efficacissimum & unicum evadit remedium pro capite exiccando, & feliciter ejusdem humida intemperie auferenda; quam felicitatem expertus sum ego Podagricus triginta quinque annorum, ex Genitore podagrico natus, ter huc quæ ad sexagesimum usque quintum ætatis annum hoc præstantissimo remedio ab arthriticis & podagricis doloribus curatus atque præfervatus: absque eo, quod nec minimum quidem Podagraz vestigium in meipso modo septuagenario fuerit relictum. Verum tamen est quod exactissima diligentia & observatione eget remedium hujusmodi, sine qua plures recto neglecto usu, ad motum impotentes redditi fuerunt: cum eodem tempore quo partes mandantes exiccatione indigent, recipientes, à Podagra detentæ, sæpe humectatione egeant, ne tophacea evadat Podagra, si non est, neve magis confirmetur, si fuerit. Ex jam dictis omnibus apertum erit cuilibet in Arte perito, quantum Illustriss. Viro prodesse possit, imò quam necessa-

rium sit ut ad Medici præsentiam seipsum conterat, qui præfervandi non solum, sed curandi quoque directionem præscripturus est. *Idem Tom. 2. Centur. 3.*

Cum Illustrissimus & Excellentissimus vir ex Matre podagrica natus, olim arthriticis & podagricis doloribus à capite & toto procedentibus luserit tentatus, & tandem in consistenterate majora remedia, Decocta scilicet sudorifica vinique medicata purgantia in casum fuerit expertus, illud nobis dicendum venit, quod qui bonam victus rationem tenere nequeunt, optimam medicinam præscripsisse supervacaneum fuerit; mali enim, dicebat Celsus, cum ex toto convalesceret, periculosa vitæ genus subito mutant, & inordinata agunt, sicque, ut Aretæus, tanquam ab inferis elapsi, licentiosiores vitam ducunt: unde delicatos curandos non contingere, melius & fortunitus est, dicebat Aëtius. Et licet qui Veneri & Gula indulgent, si hereditaria his accedat imbecillitas in articulis, difficulter admodum præfervari possint; nihilominus pronunciavit Hipp. quod qui juvenes sunt, & nondum tophos contraxerunt, si Medico intelligenti obediētes fuerint, accurate vivunt, laboris amantes, & alvum apertam servant, sanari, magisque præfervari possunt; in quibus Vinum Excellentissimum deliquit minime dubito; & ille & manus, & pedes, & cubitos, cuncta à venis & catarrhalis à capite materia majori & vehementiori ferocia, quam antea, invahit, tumoresque & lupos & duros, at non adhuc tophaceos reliquit.

Et quoniam novas & repetitas purgationes ægerime permittit, quas forsitan nec facile tolerare posset, idcirco ipem totam in congrua vivendi ratione reponens, hanc sibi præscribendam mihi mandavit, quam primo in hujusmodi affectibus universalem, secundo quidem particularem assignabo.

Et quidem summa prudentia Vir Excellentissimus ad rectam vivendi rationem contigit, cum Gal. asserat se non paucos Arthriticos vidisse, qui usque jam articulorum omnia denudata fuerunt, attenuante congrua victus ratione in totum persanatos, alios ad multo meliorem statum redactos; quæ vivendi ratio cum inexterum non naturalium recto usu consistat, has omnes exanimabo, & tumque s. lubrem usum Viro Excellentissimo significabo.

Et primò si de aere loquamur, ad calidum & siccum vergere debet; & licet consulat Celsus, loca, cælum & cibum esse sæpe mutanda, in meliorem tamen fieri semper debet mutatio.

Partes autem affectæ, pedes nimirum & manus, nec nimis caleant, nec nimis frigeant, & sicca potius, quam humida detineantur.

A radiis solaribus, a crepusculis cavere debet; neque caput hyeme igni exponatur, sicut neque æri venoso & nubiloso.

Secundò victus debet esse tenuis, tenuitatem tamen intelligendo respectivam, non absolutam, respectu scilicet vias favorum; & ideo Aët. audiendus non est, qui ab omni cibo & potu abstinere præcipit, sed potius cum Fernelio dimittam cibi & potus circumscribendum esse, dicendum, quod forsitan desumpsit à Paulo dicente, quod præcaverat a Podagra ciborum



rum detractio, eorumque probitas; sicque reputabat Fernelius, quod iam interdum tolerare bonum.

Varietas tanquam pestis fugienda: minus enim nocet simplex ex cibis malus, quam bonorum multiplicitas; simplex itaque cibus est, non solum ut huius, verum & a condimentis immunis, coquorum enim apparatus est præcipua cruciaturum causa; nec ingeri debet novus cibus, priori non bene contexto; nihil enim deterius, quam comestio supra comestionem; sit autem potius attenuans, non itaque crassus, non glutinosus, non concoctui difficilis, sed tenuis subtilis, ut pauci excrementi, facili coctionis & distributionis; nec alimenta sint humores fundenti, s. lsa, vaporosa & caput tentantia.

Quare inter c. rnes vitentur suilla, bubula. licet a Tral. biliosis concedantur, ovina, aves palustres; vitentur pauciter extremitates animalium, c. pita & pedes. Caro caponum succum quendam continet glutinosum, & propria natura parum in articulis amicum, præsertim antiquiorum; carnes enim omnes antiquæ peccant in hoc quod præsumunt succum generant. Inter pisces, pulchres & cæno, ut anguilla, tinca, & huiusmodi alii prohibentur: sicut quoque testacei & ostr. cei, quos armatos appellant. Inter lacteum, cæcus potissimum prohibetur: de reliquis vero lacteum, & præsertim de l. teis usu dubitari solet, cum apud Gallos, & quosdam etiam Italos lac Podagræ, etiam tophaceæ, ut remedium fuerit expertum, præterquam quod ab Hipp. quoque in cura Arthritidis & Podagræ recensetur; de quo ego ita decerno, quod lac concedi, & convenire possit in Arthritide biliosa & gracilibus corporibus, à siccitate namque facile nodosa redditur; & ideo emollientia & humectantia conveniunt; unde & G. I. victu humectante curavit Arthriticum illum ab eodem in Campania repertum, ab illis Medicis ad morbum exiccatorium deductum; ac ubi pituitosa materia, & cruditates abundent, suspectus est lactis usus, & omnino interdicens, cum modo cat. rhealis materia à capite ad articulos deferatur; unde Hipp. *Lac dare caput dolentibus malum.*

Ova admittuntur, sed sine ullo unctioso condimento. Prohibentur omnia legumina, hordeo & oriza exceptis: omnibus enim qui in oppido Acrio ob t. mem leguminibus vescebantur, articuli debilitati fuerunt. Omnia ædulia ex p. st. par. ta noxia. Inter fructus horarii præsertim prohibentur, pomacea item omnia à Dioscoride, inter olera, prohibentur lactuca, s. niculum, apium, asparagi, ostroboli, fungi, tur. era terræ. Inter condimenta, vitentur aromata, frequens usus aceti, sed & succi limonum, aurantiorum, allii, caparum.

Inter carnes eligantur phasiani, gallinæ cohortales, atagenæ perdices, turdi, aviculæ montanæ. Inter pisces, saxatiles, & habentes substantiam albam ac friabilem. Inter edulia ex pastis, adnitti possunt vermiculi Apulenses.

Inter fructus concedi possunt fraga, cer. sa sublyptica, uvapensilis, hœus nonnunquam, & paræ. Inter olera libenter admittitur borrago, intybus quoque, quandoque brassica non

valde cocta: Ante prandium ventriculum roborant gingiber conditus, vel acorus conditus. A cibo vero diacydonium cum pipere.

De vino valde dubitatur; Paulus enim ait, quod qui per totam vitam à vino abstinuerunt, omnes opem senserunt, aut ex toto liberati fuerunt; sic Rhasis ait se, vidisse relinquentes vini potum, sanitati restitutos. Fabulantur enim Antiquiores, Podagram esse Bacchi & Veneris filiam, pauperibus inimicam, & Mæfues rationem reddit: vinum enim per se nocet oculis atque nervis, præterquam quod suo calore fundendo, attenuando & aperiendo fluxiones concitat, quatenus dilatat vias, & humores fluxiles reddit, & apud Chymicos, eosdem sulphureos tartareosque parit. Attamen quoniam Podagra minera in capite & ventriculo esse solet, ideo probæ concoctionis magna & præcipua est habenda ratio; propterea non omnibus vini abstinencia & potus aquæ conferre potest, unde & ipse Paulus subdebat; Si nihil prohibeat; & Cæsus præscripsit tempus, dicens quod quidam, cum toto anno à vino & venere sibi temperassent, totius vitæ securitatem consecuti fuerint; & si tanto tempore sine vino perdurare nequierint, consulit quod ubi triduo aut quadriduo vinum delibaverint, uno aut altero die aquam interponant; & qui nullo modo aquæ potum sustinere possunt, vinum eligant, cum Paulo, modicum & aquosum, nigrum potius, quam album; & licet album dicant ab articulis ad urinam humores divertere attamen quoniam ut aperiens cito è ventriculo defluit, alimenta quoque cruda, & non bene concocta immaturè secum ducit, & ideo cruditates in venis multiplicat. Quod si à ventriculi imbecillitate non desideretur, aquam bibere conferre poterit, santalinam, si bilioli fuerint, lentisciam si pituitosi, & china optima alteratam, si valde graciles fuerint.

Tertiò somnus & vigilie sunt moderata: ab immoderato namque somno caput repletur, sicut ab immoderata vigilia cruditates generantur; unde Galen. dicebat quod *somnus concoquit, vigilia digerit.* Intercedant autem dux horæ ad minimum inter cænam & somnum, & à somno pomeridiano cavendum.

Quartò exercitium quam maximè necessarium; unde Hipp. *Labor articulis & carnibus cibis, somnus visceribus;* & ideo laboris amantes esse debere Podagricos jubebat idem Hippoc. Verum tamen est quod labores cibum præcedere debent; ita enim nervis, cartilaginibus & ligamentis robur & firmitatem confirmant, calorem naturalem excitant, alimentum deferunt, & excrementa discutunt atque resolvunt; motus tamen immoderatus non sit, nam lassitudo articulos largius excalefacit, & materiam à longinquiore partibus attrahit. Corpus itaque exerceatur matutinis horis ambulando, vespertinis in rheda. Et quoniam manuum non adeo facilis evadit exercitatio, ideo pila manibus iisdem affectis tractetur, & melior, si fuerit ex succino parata.

Quintò alvi excrementa promptè & quotidie excerni debent; quantum enim conterat Podagricis soluta alvus, innuit nobis Hipp. dum Dysenterias Podagricos sanare affirmavit unde



& Aët. perfectam curam in fame & Clysteribus reponere: & ideo nisi sponte fiat, arte sollicitanda erit evacuatio pilulis mastice vel crem. tart. in pituitosis, electuario lenit. ad 3 sem. in cæteris; prunis quoque Damascenis vel Gallitis coctis & saccharo conditis. Nec spernenda evacuatio & exiccatio capitis post pectinationem, spongia lixivio dulci ex sarmentis parato, & betonic. rosæ, serpilli, calamento, majorana alterato imbuta, expressa & exiccata caput ipsum detergendo, deinde pulveribus aspergendo ex caryophyll. in aq. rosac. maceratis, moxque exiccatis.

Articulorum quoque aliqua evacuatio & roboratio ex Antiquioribus, addenda, quod adeo antiquo salito præstare solebant: nos autem spiritu salis, vola manus madefacta, articulos fricando.

Venus ut Podagræ mater & Nutrix, semper mala: non enim est de illis morbis Podagra, qui coitu sedantur: quare Galenus duplici nomine coitum, Podagricis inimicum esse dicebat, primo quia articulos enervat; secundo quia vires ventriculi labefactat, sicque Podagræ materiam multiplicat, & partes affectas debilitat; ut propterea Hipp. Eunuchos & Pueros ante usum venereorum a Podagra immunes pronuntiaverit; unde proferebat Paulus quod Venus extreme lædit, imò & omnis voluptas.

Tandem animi motus omnes violenti sunt evitandi: ita enim biliosis non parum obesse potest, humores ipsos accendendo, agitando, attenuando, & ita ad motum fluxibiliores reddendo: sicut reliquæ animi perturbationes, vigilias inducendo, cruditates multiplicare valent. Applicationes autem & studia nimia, calorem & spiritus à ventriculo divertendo, effectum eundem producant, eoque magis, statim, aut parum ab assumpto cibo; præterquam quod caput quoque quam maxime repletur.

Et quamvis ex jam in universali præscriptis Excellentissimum atque prudentissimum Virum particularia sibi que propria electurum minime dubitem; nihilominus ut desiderium meum in sui beneficium omnino propensum agnoscat, & præterea quoniam affectio hujusmodi morbosa ultra progressa est, ideo particularem quoque vivendi rationem subdam.

Et primo circa aerem, ut Patavinum inspi-ret, quantum fieri potest, consulo, ut qui mediocris inter Venetum nimis crassum & humidum, & inter montosum nimis tenuem atque subtilem exsistat. Cubiculum vero nullo modo Septentrioni sit expositum. Ubique crepuscula fugienda, nec radiis solaribus, neque igni caput exponendum; indumentis potius copiosis corpus diu noctuque à frigore munien-dum.

Secundo de cibo & potu pauca sunt dicen-da, status enim Excellentiss. P. exigit tenuem cibum, non valde tamen attenuantem, quia corpus ad gracilitatem vergit, ejusque viscera ætu ut, at boni succi, pauci excrementi, facilius coctionis & distributionis. Potus parcissimus esse debet. Sed ut ad magis particularem usum deveniam hoc anni tempore à pullis junioribus vel palumbis turricolis vario modo coactis discedere non debet, addito in prima mensa ferculo ex oriza aut hordeo, sive ex lacte, ovis & saccharo parato. Autumno vero

venturo aves sylvestres, perdices, alaudæ, aviculæ montanæ eligi poterunt. Pro potu vinum tenuis substantiæ rubrum, nec austerum, nec dulce, nec generosum, nec nimis oligophorum. Prandium & cæna conceduntur, intercedentibus tamen novem aut decem horis. Verum integro anno (nec tædeat Excellentiss. Virum) talis debet esse usus, ut tam in prandio, quam in cæna comedat, ex nuper præscriptis alimentis quantum comedere potest, quousque sitis accedat, & bibere cogatur: mox bibat unica vice ad saturitatem; vinum autem sit frigida non nive refrigeratum; sicque prandium & cænam claudat exigua assumpta Conserva perlicorum & cydoniorum, & toto jam dicto anno à cæteris omnibus & carnibus, & piscibus, & fructibus, & oleribus prorsus ab-istineat. Anno vero transacto, ad victum licentiosorem seipsu traducat, meliora alimenta ex superius descriptis seligendo, quantum in prandio adaugendo, & parcam cænam sibi metipsum instituyendo.

Tertio somnus sit saltem septem horarum nocturnus, quo deficiente suppleat diurnus, nec se somno tradat, nisi una aut altera à cæna hora præterit.

Quarto motus corporis nullo modo negligendus, præsertim matutinis horis, etiam si pedes ægre laborem ferant, ita & manus pilam aliquam, aut quid simile tractando exerceantur; erit reassumendum.

Quinto excrementa, licet pauca, sunt tamen bis in mense ad excretionem sollicitanda; idque commode præstare poterit usus elect. lenit. ad 36. parum ante cibum assumendi; non enim alvum stypticam reddit, uti reddunt Clysteres. Articuli vero sani, manu spiritu salis illita confricentur, sicut tumoribus detenti, ita quotidie illinuntur.

2. Adipis asner. 3 ij. pingued. felis 3 j. salis albi 36. spiritus vini 36. m. bulliant omnia ad consumpt. spiritus vini, & servetur ad usum quotidianum.

Tandem applicationes legendi, scribendi, magisque gravia negotia tractandi, a cibo omnino cavendæ: caput enim Viri Excellentiss. facillime repletur.

Hæcque pauca extra podagricam accessionem observanda præcipio, quibus universalia præmissi, rationibus & auctoritatibus comprobata. Nec severa nimis Excellentiss. Viro præscripta vivendi ratio videatur; sicut postea severissima esse debet in accessione ipsa: Urgentibus enim doloribus, & carnibus, & vino omnino parcendum, ut cuilibet notissimum est, & victu verè tenui tunc temporis utendum, Idem Tom. 2. Centur. 4.

#### Ischiadici Dolores.

Illustrissimus & Excellentissimus Comes Generalis quadraginta quinque circiter annorum, est à Parente articulari morbo obnoxio oriundus, temperamenti sanguineo-biliosi, habitus corporis mediocriter carnosus, vultus coloris ex rubro flavescentis, ad iram præceps, viscera habens calida & sicca, cum lienis obstructione & duritie. Olim ob errores, qui iis, qui Castra sequuntur, in sex rebus nonnaturalibus contin-



gere solent, catarrhis colicisque doloribus frequenter cruciabatur. Postquam vero ante annos octo in loco superioris Hungariæ paludoso, inter assiduas, easque per sæpe molestissimas mentis occupationes uanis æterius ætatis spatium vitam egisset, & cibus, præsertim vero piscibus sæpius veiceretur lutumugatis & nimia conditis, dolorem sensit in hæmorrhoidali ossis femoris, ea præsertim parte ossis, quod licet non indigitur, qui inde jam per femora ad genua & crura descendit, jam inverso ordine à cruribus per genua ad regionem ischiadicam ascendit, mox hæc, mox illa loca magis magisque affligens. Hic dum in summo, seu animi constitit, motum progressum trepidum elecit, ac genua vellicando, convulsivo similem. Invasit autem plerumque circiter principium somni, observando certas quasi, periodos, quæ nunquam subinde etiam de die tristitia sua fecerit interludia, præcipue cum gravior aliqua præcesserit animi passio. Ex signis propositis concluditur esse affectum esse dolorem licet ischiadicum, a rheumatismo dependentem; pro quo extirpando quamplurima quidem, usurpata sunt remedia, tum via methodica & regulari, tum etiam aliquando empirica sine regula. Methodica via corpus reddebatur fluxum per digestiva, purgatum est per episcorin, & fortiter; lectæ sunt venæ, sanguisugæ applicitæ hæmorrhoidibus; sanguis utem extractus semper duas ferme partes continebat feri tenuis & corrupti. Item excitata sunt Cauteria in brachio & supra genupartem dextræ dolore magis afflicta, revulsionis & derivationis gratia. Semicupium adhibuitur est ex Vinaceis, Balneum plenum ex Decocto capitum & pedum Vervæcis, bibit lac caprinum, alminum, acidulas; sed omnia hæc sine expectato effectu sanitatis. Hinc statutum est, tubule huic malo fermentum aliquod peregrinum, seu malignitatem venere, in, quam usurpatione Decocti lignorum, seu proprio ipsius mali Alexipharmaco, per sudorem in læconico exterminare a laboratum est per duas vel tres septimanas: hinc assumptione Mercurii dulcis sine salivatione; sed omnia citra sequelam sanitatis. Quapropter derelicta via Methodica ac rationali, tentavit Excellentissimus Comes Empiricam cuiusdam Medici Anglici hic existentis, qui, sperata omni diæta lege, ei victus ratione omnia concessit; præter hæc & brassicam conditam: ac compromisit, se solo vino adusto medicato in dies sub certa dosi introsumpto, integrum valetudinis statum Excellentissimo Comiti reducturum. Proinde sumpsit spiritum illum vini modo præscripto ultra annum & adhuc eo utitur, quo se in tantum adutum scribit, ut dolores antea intolerabiles nunc non sentiat amplius, nisi circa magnas æris, & Lunæ præsertim crescentis mutationes: illosque ita remittit, ut non impediatur in suis functionibus, sed possit cum illis ambulare, equitare, pergere curru, domi & ruri fungi suo munere militari, sine notabili impedimento; hoc præcise tamen animadvertens, quod dum leges diætae circa cibum & potum transgrediatur libenter, sentiat se heri constipatum, donec accepto sibi familiari Enemate, alvus, denuo reddatur fluida. Quia tamen Excellentiss. Comes

unicè integram anhelat sanitatem, querit consilium & auxilium, ut possit etiam ab hoc per intervalla recurrente dolore reddi liber & inanius, periculo recidivæ.

Mirum non sit, quod Illustrissimus & Excellentiss. Comes Generalis ex arthriticis Parentibus natus, inter trigessimum & quadragimum annum ischiadico dolore divexari coeperit, cum jam a semine paterno causam hinc qua non, ipse contraxerit, ut ideo Galenus dixerit, necesse esse Arthriticis prius articulos invalidos habere: quoniam invaliditatem in eorum frigiditate consistere voluit Aretæus. Causam utem in terialem suppeditavit prava vivendi ratio, forsitan in omnibus sex rebus non-naturalibus, cum primò loca paludosa octo abhinc annis incoluerit, unde lenofus; & æris inlementis caput & totum corpus in Caltris exposuerit; cibus pravis humiditates serofas multiplicantes, & præsertim piscibus salitis frequenter usus fuerit, atque forsitan generosioribus vinis in Hungaria consuetis. Nec somnum concoctionibus adeò necessarium temper capessere potuisse credendum, & corpus atque articulos coxæ & crurum equitando nimium exercuisse, & imbecilliores reddidisse; sicut forsitan utilium & inutilium excrementorum evacuatio sanitati prorsus idonea non fuit. Atque tandem animi pathemata, à quibus omnia mala prodire posse credidit Plato, valde molesta Excellentiss. Comiti luere: hinc excrementorum copiam necessario fuisse genitam non est qui non videat; quorum portionem crassiorem in primis viis stabulare, & obstructions conservare facile credi potest, sicut crassiorem sanguinem atque limosum in splenicis vasis stagnare, Medici tactus judicavit. Cum autem non exigua eorundem excrementorum pars ad massam sanguineam sese insinuaverit, Natura gravata, eandem ad imbecilliores partem, ad coxæ nimirum articulos deposuit, & ischiadicos, sive coxendicos dolores excitavit, quos quamvis Græci inter arthriticos reponere reculaverint, sub genere tamen Arthritidis eosdem collocavit Galenus, & ideo crediderim ego, potius à toto venoso genere, visceribus naturalibus nempe, intemperie & morbo organico affectis dolores hos ischiadicos magis, quam à capite defluente originem duxisse: etenim si à capitis rheumatismo magis procederent, Decoctum sudorificum profuisset, & plures dies administratum etiam sanasset; præterea si à catarrhali materia à capite defluente, scilicet progressu densata fuisset, & motum coxæ diutius impedivisset, nec levamen à spiritu vini frequenter haurito adeò facile accepisset. Quare potius ego conferem materiam serofam, exigua cruditati immixtam, à toto ad coxarum articulos transfusam fuisse, & in præsens per intervalla non tantum ad acetabulum per vasa, verum & ad musculos per spatia transmissi, ut sanguis ipse educus confirmavit, & ideo docuit Hippocrato podagricos dolores heri a sanguine, a bile & pituita corrupto: peculiariter vero de ischiadico, hunc fieri, quod ad id sanguinis venis articuli coxæ sanguis a bile & pituita agrotaverit, locutus de ischiadico dolore legitimo; sicut spuris dicendus est ille, qui in coxæ musculis, Iliaco interno, pso, & glutatis pec-



peccantes humores continet & conservat; ut propterea facilem consensum ad furas, imò ad pedem, usque ad extremum digitum, existimaverit Aetius, dicens, *Auspicatur hunc dolorem vicinorum musculorum dolor, maximè lamborum, poplitei, talum, & quibusdam totum crura affligit: imò & ad summum pedem usque pertingit, ut P. ulus.* Non tamen negaverim aliquam quoque a capite destillationem, si non per vasa, saltem per parietes medullæ spinæ ad musculorum spatia defluentem, spurium dolorem coxendicum fovere posse.

Quod si res ita se habeat, massam sanguineam depuratione egere, ut Comes Excellentiss. ab insultibus ischiadicis præservetur, unicuique patere potest. Et quoniam à visceribus naturalibus intemperie & organico morbo affectis, quotidie sobolescit excrementorum proventus, idcirco eorundem viscerum providentia habenda est, non omnino capite neglecto. Et tandem, ne pars affecta adeò facile excrementa suscipiat, exiccanda atque roboranda erit alioquin tractu temporis & declinante ætate, crassiores humores in ventriculo ipso hære, & glutinosi atque mucosi evadere possent, auctisque doloribus, omnino motum impedire.

Quæ mala ut avertantur, proximo Vere Purgationem præservativam regularem infra describendam Excellentiss. Comes inire tenetur, primas vias expiando. Secundo obstructions mesenterii & lienis aperiendo & auferendo. Tertio Massam sanguineam depurando. Quarto caput expurgando. Quinto intemperies corrigendo, atque demum coxæ musculos exiccando, & articulum ipsum roborando.

Ut igitur prima expleatur intentio, integra hebdomada consumenda, repetito Leniente, in principio & fine assumendo, ex syr. ros. solut. vel ex cassia, elect. lenit. & tart. parato. Quinque vero intermediis diebus præparante præscripto ex syr. acetos. de cortic. citri, atque florum citri ana ʒj.

Pro secunda verò intentione exhibeatur summo mane jus pullæ aperiens alteratum foliis cichor. borag. endiv. lupulorum, fumariz, pentaph. & asparagorum, in quo diluantur gr. xii. salis tart. fixi, cui præmittuntur duo aut tria cochlearia julapii acetosi, in quo rhabarb. globulus semper detineatur infusus. In horum utem usu pergat ad nonum usque diem: mox assumat medicamentum huiusmodi.

℞. Floris cass. rec. extractæ, elect. lenit. ana ʒss. pilul. de tribus cum rhab. rb. ʒj. m. f. boli, quibus post horam superbibat seri capr. aut asin. depur. ʒi ss. tribus verò horis ab epoto sero prandeat.

Inde ad tertiam intentionem explendam, & secundam perficiendam erit deveniendum, præscribendo pro sequenti die tale Præparans.

℞. Succ. depur. & per arenam trajecti, cichor. agrimon. ivx arthritic. ʒv. sal. tart. volatiliz. gr. x. m. pro-syrup. & sic pro aliis quatuor horis ante prandium assumendis. Die verò sequenti summo mane assumat bolos ita parandos.

℞. Elect. Lenit. ʒij. rhabarb. maturi ʒss. m. f. boli, quibus post horam superbibat cyathum aquæ stillat. cichorii & agrimoniz, tribus verò horis ab assumpta aqua prandeat; & ita in ho-

rum usu perseveret ad decimum quintum usque diem: quibus transactis, assumat pulverem hermodactylatz præparatz ad ʒi ss. rut. ʒij. tribus aut quatuor horis ante cibum. Sed interrim die secunda succorum aperiatur vena brachii lateris magis affecti, præsentente Medico, & quantitas sanguinis educatur pro ejusdem conditione, & prout Assistenti visum fuerit.

His peractis capitis quoque purgatio non erit inutilis, Extracto pilul. cochlearum, aurearum; vel pilulis capitalibus Paracelsi, quæ tamen non nisi quatuor aut quinque interpositis diebus ab assumpta hermodactylata exhibendæ sunt. Interim verò syrupi capitales ita præscribi poterunt.

℞. Succ. depur. & per arenam trajecti, cichorii, beton. ana ʒj. decoct. betonic. borag. majoran. agrimon. ivx arthritic. ʒv. m. pro syr. & sic pro aliis. Quo eodem tempore per nares quoque capitis erit tentanda purgatio Etrusco ita parato.

℞. Pulv. majoran. ireos ana ʒij. nigell. ʒj. m. f. pulvis per nares attrahendus more tabaci.

Quintæ intentioni satisfaciendum refrigerantibus, & sanguinis biliosi accunoniam, & forsitan etiam melancholici aciditatem demulcentibus & edulcorantibus, quibus caute valde procedendum, ne ferocitates inutiles in corpore multiplicentur; quæ incommodæ ut evitentur, & obtineamus intentum, lac asinum quadraginta diebus in usum duci poterit, de more cum saccharo, summo mane assumendum: hoc enim cum quam citissime per corpus digeratur, caput implere minime poterit, & minus obstructions augere, ut docet Galenus.

Postremæ intentioni satisfacere poterunt, primò infusiones in aquis sulphureis, mox ipsa sulphurea luta pluribus diebus diluenda, & tandem vindemiarum tempore vinacea generosa, dum interim Ceratum oxycroceum super aluta extensum parti affectæ, coxæ nimirum, erit applicandum, singula quaque hebdomada innovandum.

Et nisi præscriptis executioni mandatis, Præservatio ex voto succedat, vinum rhenum Antipodagricum supplere poterit, bis in anno, nimirum incunte Vere & Autumno, quadraginta continuatis diebus assumendum, cujus dosis est primus cyathus in prandio & cæna, præmisso lenienti aliquo medicamento, ut primæ viæ a facibus expediantur; hujus autem descriptio ita sequitur.

℞. Rad. chinæ opt. lentisc. è Chio ana ʒij. Baccarum juniper. m nip. j. ivx arthritic. manip. j. fol. sen. rec. mund. ʒv. hermodactylor ʒij. Turbith. ʒij. mechoac. ʒj. cinnam. integri ʒss. Contund. contund. incid. incid. & m. ponantur in doliolo simul cum duabus noctris titulis Italicis vini, & post infusionem trium dierum, portus ejusdem incipiat mane & vespere, ut dictum fuit ad cyathum unum in prima mensa; per quadraginta dies, Vere & Autumno; in cujus usu perseverandum jam dicto tempore, tribus saltem mensibus.

Quibus omnibus congrua vivendi ratio erit addenda, quæ licet à Viro Excellentiss. Adstanti sit præscribenda, aliqua tamen notatu digna sub-



subscribam. Et primo quod nisi palulre, incola-  
tu mutare possit, saltem crepula tum matura-  
ni, tum vespertina evitare debeat, sicut & aeris  
inclementias præsertim frigidiores; anectæ vero  
coxæ articulus pelle agnna de more vestitus  
custodiat. Secundo ab humidioribus & gluti-  
nosis alimentis abstinere, ut a carne suilla, & g-  
nina, ab uni casei; & a consueto butyri con-  
dimentos a leguminibus; a fructibus; a lactu-  
ca, & a copioso potu. Tercio Regiat somnum  
pomeridianum. Quarto exercitium quidem  
convenit, sed ut monuit Hippoc. *Libores ante  
cibum*: imo Paulus docet, quod conferant de-  
ambulationes, assidui nexu, saltus & curus.  
Quinto Venus extremo ladic: sicut magnope-  
re juvat quotidiana alvi evacuatio: namque ab  
alicta alvo articulus coxæ aggravatur; & ideo  
nisi sponte respondeat, pilula de tribus cum  
rhaharb. singula hebdomada in usum ducat.  
Tandem nisi patheniata, quantum heri po-  
test, accenda; & ab intensis applicationibus,  
præsertim legendo, aut scribendo, repleto ven-  
triculo abstinere, alacrique animo vivat. *Idem  
Tom. 2. Cent. 4.*

Amplissime & Consultissime Vir, fautor, &  
amice pl. colende, literis Ampl. V. certior fio,  
quod non parum sollicita sit, ne posthæc flu-  
xionibus articulis affligatur. Quanquam vero  
pro tempore morbus hic nondum adsit, ne-  
cessarium tamen erit, ut præservatio non negli-  
gatur, cum vagæ nuxiones doloricæ, de qui-  
bus querela est, eundem prælagire soleant, qua-  
tenus pederentim postea magis ipsis articulis  
sele inlinunt.

Cum autem *antecedens causa fluxionum poda-  
gricarum*, a cruditate concoctionum oriatur,  
omnino requiritur, ut ante omnia eò respicia-  
mus, quando cruditas concoctionum vitetur, &  
superflua seroforum humorum copia consumatur &  
evacuetur: deinde pars recipiens una cum capite  
corroboranda veniat. Prius convenienti dicta po-  
tissimum consequimur, ubi primo respiciendum  
ad refectionem spirituum, per aeris ambientis  
usum, ubi frigidus, humidus, nebulosus inpr-  
misque æstuosus is vitandus, qui si natura non  
emendatur, arte corrigendus erit, humo exci-  
tato per pulverem, qui primis ardentibus in-  
jiciatur, ex *Tacanabaca*, *Mastiche*, *Olibano*,  
*benzoin succino* & similibus, cui interdum Gallia  
Moschata admisceatur. *Radix Juniperina* fre-  
quenter incensa plurimum etiam hic inservit,  
ut etiam lignum sassafras frequenter naribus ad-  
hibendum, & in Muzo diversis in locis repositum.

Porro cibus & potus etiam observetur, ubi  
eligantur alimenta facili concoctionis, non  
admodum serosum sanguinem generantia quo-  
rum usus moderatus sit, juxta communem re-  
gulam, cuius stomacho nihil melius, quam ci-  
bus non repleti, nec fame torqueri, quod eo magis  
naturæ congruit, quo magis ordinem observa-  
mus, ne quocunque tempore, etiam absente  
fame, quæ tamen peractæ concoctionis indi-  
cium est, quosvis etiam diversarum quilitatum  
cibos ingeramus. Tales cibos in specie non  
difficiliter quis colligit ex illis, quæ libello no-  
stro de tuenda sanitate literatorum propo-  
nuntur. Quoad potulenta, nihil deterius fre-  
quenti ingurgitatione, quæ copia serositatum

cu nulat, & caput atque articuli debilitan-  
tur. Hic igitur, ut etiam in cibus, Temperan-  
tia regnet, ubi vina immatura, tartarea & ter-  
restreitatibus adhuc permixta, sicut etiam for-  
tiora, penetrantia, vitentur, electis tempera-  
tis Neccarinis & similibus, quibus interdum  
decoctum Rad. Glycyrrhizæ necnon infusum  
ligni sassafras, cum paululis minoribus, &c. ad-  
datur. Primus hauritus in prandio sit vinum  
medicatum infusionis rad. Helenii, quod co-  
ctionem juvat, fluxiones consumit, & serosas  
humiditates per vias urinarias educit. Præter  
dicta sæpius etiam ad corroboracionem ven-  
triculi respiciendum, quo melior alimentorum  
digestio subsequatur. Huc ergo pertinet con-  
ditura & præparatio ciborum, ob calorem na-  
tivum imbecilliolem necessaria, quando cibi  
Cinnamomo, Galanga, Nuce moschata, Croco,  
Mace, & similibus parumper (nimi enim con-  
ditura aromatica sanguinem reddit actiorem)  
aromatizantur: Sic etiam radices Petroselinæ,  
sem. Anisi, Fœniculi, Cumini, herba Majoranæ,  
Salviæ, Rosmarini, Satureiæ &c. conceduntur.  
Quod si viscida pituita ventriculi plicis sese in-  
sinuet, indicante idipsum appetitu dejecto, je-  
juno stomacho plurimum usus Oxy mellis Squil-  
litici ʒij. superaddito hauritu vini Absinthii  
conferret, cui intentioni Aloes insuccatæ usus  
singulis septimanis etiam conveniret, scrupuli  
quantitate mox ante cenam assumptæ.

Verum ubi talis *nausea cum sit* deprehendi-  
tur, indicium est, bilis effusionem stomachum  
occupasse, quo casu Syr. Acetos. Citr. Rob. Ri-  
bes Conserv. Rosarum Vitriolata & similia ante  
cibum succurrunt: cum cibus olivæ immatu-  
ræ, Cappares, Herba acetosæ cum pulis Gal-  
linarum, Columbarum, carne vitulina, hœdina,  
&c. laudantur. Contra *evaporationes a ventriculo  
ad caput* post cibum aliquid corroborandæ con-  
coctionis gratiâ sumatur de confect. coriandr.  
simplice, Nuce moschata cond. sicc. Di. cy-  
donio cum speciebus, Cydoniis conditis, Con-  
serva rosarum rub. antiq. cum Magisterio Co-  
rall. rub. permixta, & similibus, inprimisque  
confectione Morsulorum contra nuxiones, cu-  
jus ʒß. post cenam conveniet.

ʒj. Conserv. ros. antiq. ʒß. Diacydonii f. ʒvj.  
Mastic. opt. Nucis Mosch. condit. sicc. ana ʒj.  
Sem. Coriandr. præp. ʒß. Ambra gryscæ gr. iij.  
Sacchar. opt. in aq. rosar. solut. ʒvj. F. Confe-  
ctio in morulis. Præter dietam, ubi moderatus  
animi, corporisque motus, necnon conjugal-  
is amplexus rarior includitur, pro superfluis hu-  
moribus serolis evacuandis semestrales eva-  
cuationes instituuntur, ubi primo per quatrimum  
Oxy mellis Squillitici unc. j. sem. in decoct. rad.  
Cicnorii quotidie bis usurpatur, superaddita  
quarta die purgatione, quæ fiat Mechoacæ nigr.  
ʒiij. Rhabarb. opt. ʒj. Cremoris Tartari ʒß.  
miscæ f. pulvis. Cum autem Anaplit. V. con-  
stitutio plenior sit, præmissis hisce, verno tem-  
pore ventæ-sectionem non dissuaderem, ubi sub-  
sequentibus diebus, pro dissipandis reliquiis  
superfluitatum serosarum in ipso habitu corpo-  
ris, sudorem provocarem ad dies aliquot as-  
sumpto Rob. Ebuli, cum æqualibus partibus  
aq. fumariz & aq. veronicæ dissoluto, quæ t-  
men omnia propter quotidianas mutationes  
quibus corpora nostra subijciuntur, pro Medici



præsentis directione fieri poterunt. Quod secundo loco capitis atque articulorum corroborationes attinet, post prædicta universalia, hat pileolus capite gestandus, qui

℞. Majoranz, Rorismarini, Salviz, Betonice, H. Lavendul. Ros. rub. ana m. ʒ. Nucis Mosch. Caryophyll. Macis ana ʒʒ. Santal. Citrini, Ibi: na ʒj. Thuris, Lign. Aloes ana ʒʒ. Moschi, Ambræ ana gr. iij. F. pulvis grossus pro Cucupha. Imo B. Ilami Capitales huc etiam commendantur, ut Bals. Majoranz, Rorismarini, Nigellæ, Succini, Macis &c. quantitate pilularibus, temporibus, & cervici frequenter adhibiti. Interius conveniens est Bals. m. Fœniculi, ex ejus oleo, tinctura & sale diligenter præp. ratus, maturius tempore quantitate sabz dimidius sumptus: ut etiam confectio Rotularum, quæ

℞. Nuc. Mosch. condit. sicc. num. j. C. C. ulsi præp. Eboris præp. ana ʒj. Ol. nuc. mosch. per expr. ʒʒ. Sacchar. opt. in aq. Lavendul. solut. ʒv. F. Rotulæ. Ad articulorum robur firmandum fiat balneum pedum ac manuum, in quo decoquantur sequentia.

℞. Fol. Myrti, Plantag. Salv. Origan. ana m. j. H. Rorismar. Bal. ultior. ana m. j. Bacc. juniper. ʒij. Aluminis, Cinerum vitium ana lbj. F. decoctum in aq. pluviali. Hac fomentatione præmissâ, post exiccationes & sufficientes absterisiones, oleo sequenti fiat frictio.

℞. Ol. comm. lbj. adde fl. lil. convall. q. s. aliquoties ebulliat, rursus de novo semper flores imponantur: tandem coletur, exprimatur, & cum ʒi ʒ. olei, ʒj. salis tostii permisceatur. Hæc sunt, quæ servationis gratiâ consignare volui: Deus 𐤀𐤁𐤁𐤁𐤁 det incrementum. Bene vale. Dab. Damstadtii, 12. Maii, 1616. *Gregor. Horilium Oper. Medic. Tom. 2.*

### Observationes.

Quædam benè habita & crassa admodum mulier, unorum 15. quæ semel adhuc tantum pepererat, cruciatu magno affligebatur circa coxendicis articulum, mox etiam in poplite, tandem in manibus, pedibusque, & in dorsi regione atque cervicis, ipsiusque mandibulæ articulo: tumor cum rubore in certis locis se manifestabat, adeoque torquebatur, ut ex contactu, decubitu, & sessione dolores intolerabiles pateretur. Vocatus ego a viro illam abstinere jussi, illiusque loco aquam coctam & lac amygdalinum bibere, Pilulas hæc quoque exhibui.

℞. Pilul. sine quibus ʒij. cum aq. salviæ fermentur. Sequenti die inungere jussi loca dolentia.

℞. Ol. chamæm. Lil. amygd. d. ana ʒj. unguent. dialth. ʒʒ. m. unguentur manibus madefactis prius aqua vitæ. Sequenti die permanente summo dolore, sub vesperam bibit sequentem julepum.

℞. Syr. papav. julep. rosat. aq. ros. ana ʒʒ. m. quærit & sudavit, sicuti post u. reotica sumpta fieri solere, j m sape observavi; quia vero sudor profuerat, ut deinceps quoque sudaret, ordinavi ita.

℞. Ligni Guajaci ʒj. Sarsaparill. ʒʒ. rad. liquirit. ʒj. passul. ʒij. fiat decoctio in mensura i p. ( seu lbj. vj. ) : q. ad tertiz partis consumptionem aroniat cinamom. bibat de hoc decocto summo manè, sudet. Usa fuit dies aliquot, & tolerabilius ferebat dolores. Iterum redeuntibus doloribus, sumpsit tabulas meas opiatas, & placide dormivit, iterumque sudavit, ab eoque tempore caput malum mitescere. Ad tollendas mali reliquias, letracto primùm sanguine, quia corpus plethoricum erat, dedi sequens Apozema.

℞. Lig. Guajac. ʒij. Sassafras ʒj. rad. enul. ʒʒ. fol. Chamæpit. m. j. H. anch. Salv. ana p. j. fol. sen. ʒi ʒ. sem. Coriandr. ʒj. sem. Fœnicul. ʒij. sem. Cartham. contus. ʒj. F. decoctio in Colat. lbj. infunde agaric. trochisc. iij. f. pozema pro 4. vel 5. dosibus; addendo sacchari ʒi ʒ. inde melius habuit, & iterum sanitati restituta est. Razmonica prius, ut parce cœnaret, aliquando quoque cœnam omitteret. *Felix Platerus, Observ. lib. 2. p. 491.*

Advocatus quidam, post varios morbos, quibus a teneris annis erat obnoxius, & tandem post dysenteriam, & podagram, in Arthritidem, plurimis articulorum locis simul affectis & dolentibus, inciderat, cujus causam cum illi exposuissent; curationem sequentem præscripsi.

℞. Hermodactyl. veri ʒij. agar. rhab. ana ʒj. myrobal. citrin. chebul. ana ʒʒ. rad. pentaphyll. aristol. rot. ad ʒʒ. spic. mastich. succin. ana ʒj. cubeb. zinzib. ana ʒj. diagridii, ʒj. extract. chamæpit. ʒj. resin. Laric. q. s. f. massa pilul. sumat bis in septimana, ad ʒʒ. Multum ille successum pilularum prædicavit. Electuario etiam sequenti usus est.

℞. F. Chamædr. chamæpit. ana ʒʒ. fol. salv. betonic. thymi, ana ʒj. sem. hyperici ʒij. rad. acori veri, pentaphyl. ana ʒj. succin. eboris, cineris crani humani, ana ʒi ʒ. margar. ʒʒ. mell. anthol. ʒij. F. Electuarium. Capiet ʒj. alternis diebus mane superbibendo aq. hyperic. & chamæpit. ʒij. dulcorando eas cum hydromelite vero, quod malvaticum vinum retert, ut sud. ret quoque altero die, quoties pilulis præcedenti usus esset. *Felix Platerus, Obs. lib. 2. pag. 498.*

Quidam gravissimos dolores articulares, podagricos, & Chiragricos, sapissimè levabat c. u. libus rubris, apud ignem calefactis, & locis affectis impositis. Butyro recenti aut majali c. u. les primò oblinebat, deinde applicabat, & iterpius renovabat. Sequenti quoque experimento, post universalia remedia, plurimi a dolore, tum podagracum Chiragrac, ac morbi articulis liberati sunt.

℞. Stipites duos s. mbuci, 10. vel 12. digitorum, a quibus extrahatur medulla interiorum impleatur cr. sso sale, & luto, utriusque foramina sigillantur, ne sal excidat, postea in tegula ignita sapius circumvolvendo comburantur, & f. pulvis: cui addatur ol. Lavendul. & ros. c. q. s. coeant in unguentum, quo loca affecta & dolorosa inungantur, *Petrus Forestus Observ. 10. & Schol. lib. 19. de Arthritide. &c.*

*Jo. de Pinquæ* fluxio arthritica, & valde dolorosa, incredibilis humorum rabies, mox in has, mox in illas partes, quæ nervi, & arteriæ, & venæ sanie quadam seatebant, Pilebocomia quæ



quinquies celebratâ melius habebat. Prudentis est medici videre, an non secure vena his in morbis aperiatur, an vero prudenter pratermittatur. Si scilicet tunc recentricis unbecillitas est, prudenter omittitur. Si cacochymia est, immo virulentia, quæ tantæ tragediæ author sit, audacius id facientium. *Guis. Ballinus, lib. 2. Epid. m. & Ephemer.*

Enarrat acopzus quidam *Gratianopolitani* decumbere ex doloribus articulorum, qui pedes & brachia, aliasque partes affligebant, cum tumore, inflammatione, & febricula: a 20. diebus hoc affectu laborabat, eique novies proprio nutussecta fuerat vena, aliquoties etiam purgatus fuerat; tandem meo iussu, illi exhibetur pulvis in iusculo ex Calomelanos, 3j. di grydii gr. viij. Ciryoph. num. j. blandè & copiosè purgatus est, ac multo melius habuit; deinde sumpsit mane & sero julepum refrigerantem, in cuius doli matutina infundebantur sen. 3ij. cum sem. Coriandr. 3ß. frigide per biduum. Postea sumpsit eundem pulverem pari successu & integre curatus est. *Lazarus Reyerius, Obs. 31. Cent. 1.*

*Franciscus Alexander* Medicus de *Francisco Pechio* scribit, eum in quinquagenarium morbo articulari graviter afflictum totis annis 20. turri inclusum fuisse, vixit autem solâ aqua & pane. Eâ dicta benedictio n. turæ materiam absumptam, & motu & exercitio articulos adeo roboratos, ut liberatus nullos unquam dolores podagricos senserit. Ex quo perspicuum est immoderationem in victu hujus morbi quasi matrem esse, *Joan. Crato Consil. 21. lib. 4.*

Cum anno 1665. Consul quidam H. finis secundæ vice Podagra corripere, & præsertim pollex dextri pedis ea affligeretur, venis dorsi pedis valde tumentibus, iussu acutum illi incidere, vena ad locum affectum, & tanto impetu profiliit sanguis quanto vix ex median: Cui postea sequens cataplasma applicui, ingentique miraculo ab omnibus doloribus liberatus est, ita ut tridui spatio in publicum citra ullum incommodum iterum prodire potuerit.

℞. H. boni Hour. rec. sine flor. man. iv. flor. sambuc. camom. sicc. ana m. ij. grossè conscinde, coque in f. q. aq. sambuc. ad putrilaginem, adde gummi carannæ 3ß. camphor. 30. m. f. l. a. Catapl. *S. Pauli Quadrip. Botan. class. 1. Tir. Bonni Hericæ.*

Nobilis sanguinei temper. euscus, gonagra à tribus diebus laborabat; statim sanguinem ad 1b j. mitti jubeo, qui cum valde impurus apparuisset, posttridie iterum f. m. ad parem quantitatem præscribo, qui se multum recreari sentie sanguine priori simili educto. 30. demum sanguinem detractio ad 3x. posttridie medicamentum ex fenna & rheo in decocto convenienti cum diaphoenic. & syr. ros. propino, quo bene omnino habuit: Simile in duobus aliis mihi contigit eodem temperamento & habitu donatis, in quibus f. m. ter aut quater repetita in ipso initio affectum penitus sustulit, oxycrato torvendo partem affectam, & postea illinendo oleo rosaceo. *Francisc. Chomel Obs. 9.*

Matrona pro præcautione, seu præservatione a chiregra & podagra, singulis mensibus utrumque pollicem, & in manuum quam pedum, circa radices unguum scarificare solebat: In

eum finem conjux N. Cucurbitulas scarificatas pedibus applicabat. *Joan. Junischerius* vero afferebat jamdiu se ex eadem laborasse, nisi baculo innixus, summo conatu incedendo, præludia illius avertisset, vel potius consumpsisset: Quod & de me verè affirmare possum, alius enim certè in lecto decubuisse: Ego verò in despectum doloris circum cursitavi, & motu illo materiam potius evaporare feci quam sedem ibi fingere permisi: *Philip. Salmasius. Centur. 3. Obs. serv. 46.*

Mense Novembr. Anno 1675. venit ad me rusticus conjux, petens à me consilium pro filio 12. annorum, arthritide manuum & pedum cum contracturalaborante; cui ego cum sudorifera ex sambuco, rusticorum theriaca, paucis aliis admixtis, dein paregorica præscripsi, doloribus paulisper per solutium hybernium remitteantibus. Sed paulo post, ejusdem mulieris rusticæ infantes, ni fallor, bini eodem malo, sed mitius infestabantur, & à sudoriferorum usu statim ab eodem liberati sunt.

Anno eodem, mensibus Januario & Febr. *Joan. Schuffen*, Civis Thoruniensis filiolus quadriennis, malo hoc gravissimè tentabatur, tam in superioribus quam inferioribus articulis, & quamvis diversa adhibita fuerint remedia tam interna quam externa, etiam pretiosa, frustra tamen omnia fuerunt, puella enim contumptis carne & viribus, doloribus fracta, contractura accedente, vitam cum morte commutavit. Sed parens hujus interdum podagra, & levissimè tentatur: Videbatur igitur nulum apud istam puellam, licet in tenerrima ætate, hæreditarium fuisse.

Hoc verò Anno 1676. Mense Januario, Februario, usque in Martium arthritide vaga primum, dein in manibus & pedibus nodosa afflictam fuisse *Elisabetam Rinnerin*, puellam 16. præter propter Annos natam recordor, cujus uterque parens nunquam podagra laborabat. Sed hæc jam ab ejusmodi doloribus planè libera vivit, licet alias valetudinaria sit.

Nos causam arthritidis puerorum & infantum rejicimus in ingluviem & intemperantiam hujus seculi, crassorum scilicet ciborum & potuum, præsertim apud nos Septentrionales, cujus fructum liberi, per hæreditatem quasi à parentibus, intra se habent & percipiunt per ætates. *Simon Schultzeus.*

Quidam *Hanoviensis pagi* Filivvel Incola adhuc in vivis, Arthritide diu afflictus sub monte pollicis pedis nodum seu verrucam accepit, quam tonsor ebrius cum forfice ovina non jubenti improvise abscidit, unde gypseus humor, hinc sanguis ichorosus effluxit, insignis verò dolor & lipothymia accessit. Ex hac apertione tandem hæc utilitas secuta est, ut quidem non dolor omnis emanaret, is tamen multo levior jam invadat, & dum vulnusculum illud pertum manet, accedens paroxysmus, effluxa tali materiâ albidâ, mutescat, & crus à diuturnis & atrocissimis doloribus incurvatum, atque linea furca ante suffulciendum, nunc liberè extendi & absque sustentaculo possit moveri. Hæc narravit mihi oculatus testis *Isaac Herani Pharmacop. Hanoviens.* curiosus artis nostræ minister & filius, cujus parens aulicus medicus fuit *Custroviz*, quique antecessoris sui *Joan. Angel. d. 12*



multa scripta & secreta hæredibus reliquit. *Simon Keifel.*

Nobilis quidam, Dn. è Tannhausen, duabus circiter horis ab urbe nostra distans præterita ætate, per aliquot septimanas, doloribus podagricis, quibus per decennium jam obnoxius mire excruciatuſ fuit. Cum audivisset esse Empiricum quendam in Franconia, qui diu hunc morbum curare posset, cum advocari iussit, à quo, nescio, quibus medicamentis, per tres septimanas usus, in eadem interim sævitia persistentibus cruciatibus. De utroque interea tempore tumorem durum exsurgere videt, de quo, cum interrogaret Empiricum, responsum tulit, esse causam materialem. Hod grat, per divina sua medicamina, ad exteriora corporis protrusam, misero ægro spem faciens, de pristina sanitate mox nox recuperanda: pro tumoribus his tollendis, adhibuit unguentum, (prout colligere potui) ex oleo laurino cum Mercurio vivo subacto constans; à cuius applicatione utrumque femur intense inflammabatur, reiterata itaque, renuente quamvis ægro, per triduum inunctione hac, inflammatio latius serpere incipiebat, exortis flavis lividisque pustulis circa scrotum partesque aditas. Monitus de Gangræna ab adstantibus, meum consilium implorat. Adveniens, invenio nobilissimum Dn. Patientem, in miserabili statu, totumque abdomen, ad genua usque, intensissimâ inflammatione correptum rubris lituris, hinc inde, ad alias partes tendentibus. Nolebam primò, in tam ancipiti statu, aliquid præscribere, ne Empiricus occasionem haberet culpam in me conserendi, si finitè sequeretur eventus. Victus tandem & ægri & adstantium precibus, præscribo pulverem exsiccatum ex farina fabarum, pulv. baccar. lauri, olibani, myrrh. ceruss. & sacchar. saturni, quem partibus abdominis flavis lividisque pustulis scatentibus inspergere iussi. Pro Gangrænosa inflammatione ordin. b. am spirit. vini rectif. cum croco & camphora. Interne vero propinabam Mixturam sudorificam, ex aq. card. ben. fl. sambuc. ana ʒi ʒ. Antimonii diaphoret. ʒj. myrrh. rub. ʒj. spirit. tart. ʒj. camphor. gr. vj. Laudan. opiat. gr. iij. Syr. papav. errat. ʒij. a cuius usu, cum per subsequenter noctem integram, alterumque diem largissimè sudasset, Dei gratiâ, intra biduum, restitutus fuit, remanente saltem flava crusta, anteriora corporis investiente, quæ ipsa crusta post aliquot dies exaruit, & spontè decidit. *Ex Joan. Georg. Laubio.*

Civis quidam nostras, pistor, David Rumpier, septuagenario major, robustus aliàs, & huc usque vix aliquo morbo tentatus anno 1574. 16. Julii, corripitur Arthritide dextri femoris à coxendice usque ad extremum pedem & digitos, nihil proficientibus purgantibus Medicamentis per episcrasin adhibitis, neque scarificationibus, donec tandem, post sudores naturæ motu excitatos, sensim dolores remiserunt, aut potius omisso crure dextro, lævum occuparunt, sed præscripto sequente electuario sudorifero blando, decima Decembris ejusdem anni in totum evanuerunt. Electuarium sudoriferum tale est.

℞. Rob. juniperi, è succo sambuci cum sacchar. ana ʒij. syr. sambucin. ʒj. m. pro ali-

quot dosibus. Anno Christi 1675. 13. Martii, denovo dolores reversi sunt, & brachium dextri lateris usque ad extremitatem manus occuparunt, graviores prioribus in femore. Instituta sunt purgationes aliquoties cum euphoris, præsertim hoc electuario.

℞. Elect. laxat. extr. fol. seu. nostr. ʒvj. m. Dein scarificationes & sanguisugæ applicatæ, plurimum sanguinis serosi extraxerunt: sed tamen dolorem omnem haud sustulerunt. Suda-  
bat postmodum in Laconico per plures dies, assumpto prius electuario sudorifero superius descripto, cum euphoria: sed parum levaminis sensit, neque etiam emplastra, neque inunctiones anodynæ, neque sustumigationes ex bl. indioribus articulos roborantibus & materiam discutientibus aliquid protulerunt; quin dolores nonnihil remittentes, postmodum revera fuerunt, exortis interim hinc inde in superne corporis seu cutis pustulis pruriginosis. Tandem 13. Junii noctu post vomitus biliosos plurimos naturæ vi promotos biduanos atque diarrhœam triduanam, non absque virium prostratione, Arthritis illa diuturna plane deiecit. Sed stupor quid in digitorum, manus utriusque & præsertim minimorum illa consequutus, adhibito aliquoties vapore decoctionis formicarum cum myrmecio, tandemque applicato emplastro nostro miraculoso, etiam sublatus est, natura pristinum robur & motum manuum acquirente. *Ex Simon. Schultze.*

Divexabant *Zythopæum* dolores vagi arthritici, à quibus jam per biennium cura mea liber, tandem circa festum natalitiorum Christi, advertit exdiata non satis ad leges Medentis gubernata redire, ut solent, genuum labores, & punctiunculas, corpusque totum lassitudine gravari. Rogatus ab uxore ut Medicum talia liarem advocaret, mense Martio id se facturum respondit, nec enim Januario convenire pharmaca, sed veris initio: Inter hæc invalescunt cruciatus genuum, & inviscentes hemina (quod genus ad medelas communicandas officiosissime promptum est) alia atque alia suggerunt remedia. E quibus unum præ cæteris eligit æger, cat. plasmæ ex farina triticea aceto incocta, quod postquam genibus applicuisset, cessare dolores quidem, sed graviore malo succedente. Enim verò repulsi versus superna humor arthriticus, ad cor usque & cerebrum pervasit, unde anxietates febris, & ex intervallis deliria, tandemque mors ipsa, in conspectum venere. *Ex Olao Horrichio.*

Anno 1654. percelebris Medicus Joannes Freitagius, Physicus Ratisbonensis, sæpius Chiragra & podagra infectatus, Anno ætatis supra sexaginta tertio & climacterico, non sine animi lætitia completo, postridiè incipit denovo affligi chiragra, cujus nullam ferè rationem habens, medicamenta tantum adhibuit levia externa, sed succrescente tumore totius manus, retento in digito annulari annulo aureo, accumulatis quoque doloribus, tumor tandem circa internodium huius digiti ruptus, & tophacæa quædam exciderunt, manum verò sphacelus totum invasit, ac subinde partes spirituales petens, bono viro, præter spem conceptam, obitum acceteravit. *Ex Joan. Helvæcio.*

Dom-



Dominus Hameltong, nobilis Anglus florentis ætatis, intolerabili torquebatur arthritico dolore in articulo humeri dextri, ita ut se emori velle, quam tantum dolorem diutius perpeti diceret. Tres dies & noctes ob doloris incontinenciam insomnes duxerat: Præscripta conveniente diæta purgavi ipsum cum pilulis coctis, decoctum valide diureticum aliquot diebus bibendum dedi, & sequens emplastrum loco affecto applicui.

℞. Gummi gallani spiritu vini dissoluti, terebinth. dissol. empl. oxycroci, ana ℥ss. misceantur & extendantur in corio. Hoc emplastrum per octiduum adhæsit, quò spatiò immensus ille dolor totus evanuit, ita ut sine ullo impedimento brachium rursus liberè movere posset. Cum jam sanatus esset, Bredam versus (quod tunc temporis a nostris obsessum erat) profectus fuit, ubi voluntarius arma sumens, aliquandiu post eum hostibus fortissime pugnis interfectus est. *Librand. de Diemerbroeck Obj. & Curat. Medic.*

Magnus quidam Generalis in Europa, ætate quinquagenarius, corpore robusto, solitus est 16. septimanis & ultra, pedibus & manibus sine motu decumbere; dolor in eis erat acerbus, cum tumore & rubore, ita ut calida medicamenta externe usurpari non possent. Huic vesperi sequentes dedi pilulas.

℞. Extract. Pilul. Aloephang. Diacatholic. ana ℥j. Laudan. Aromatic. gr. iij. misc. f. Pilul. num. vii. inaur. tæ. Sequenti die vesperi sudavit ab hoc sudorifero.

℞. Spir. tart. Sp. C. C. ana ℥ss. Tinct. tart. zntim. ℥j. Essent. Lignor. gut. xvi. Decoct. Lign. Sassafras ℥ij. misc. f. Sudoriferum. Externe in forma Cataplasmatidis sequens applicavi, quo dolores cessarunt, ut quarto die sanus fuerit.

℞. Farin. tritici q. s. coquantur in lacte vaccino ad formam cataplasmatidis, adde Sapon. Hispan. ℥j. Sacchar. Saturni ℥ij. Sal. ammon. in aq. spermi. Ranar. soluti ℥j. misc. f. Cat. plasmata, quod semper e hîde applicari debet, & quamprimum frigescere incipit renovari.

Mercator quidam corripiebatur podagrâ, cum dolore intolerabili, inferius in ambobus magnis pedum digitis. Ego ei ad sudandum sequens sudoriferum exhibui.

℞. Rob. sambuc. juniper. ana ℥j. sal. C. cervi gr. vj. mag. tart. ℥ss. ocul. cancr. præp. ℥j. Sp. lign. Guajaci ℥ss. extract. laudan. Aromatic. gr. iij. decoct. Sassafras ℥ij. m. f. sudoriferum. Externe sequens applicui, atque vesicam pulvillis super induxi, ne avolaret virtus.

℞. Sal. tart. sal. ammon. ana ℥ij. tinctur. croci ℥j. Solve in aq. spermi. Ranarum q. s. misc. Hoc citò applicari debet: quod statim dolorem mitigavit, & repetitum aliquoties totum abstulit.

Officiarius quidam nauticus semper in autumno, magno atque intolerabili dolore in flexura humeri atque cubiti corripiebatur. Hunc purgavi per sequens.

℞. Resin. Jalapp. scammon. ana gr. vj. Mag. succini, gr. viij. Mag. tartar. ℥j. pulp. rrunor. ℥ss. misc. f. Bolus. Aliquoties etiam sudavit per hoc:

℞. Theriac. Andromach. ℥j. Spir. tart. C. cervi ana ℥j. Antimon. diaphoret. gr. xvi. ocul.

Cancr. ℥j. Decoct. Sarsaparill. & Chinæ ℥ij. misc. f. sudoriferum. Externe hoc emplastrum multum profuit, ut ager brevi, ab omni dolore liberatus sit:

℞. Ceræ Citrin. ℥ij. Gummi. Ammoniac. ℥i ss. Saponis Hispan. ℥j. Sulphur. citrin. in ol. lini dissolut. ℥ss. Sal. Armoniac. Tartar. ad nigredinem calcinat. ana ℥ss. opii ℥ij. misc. f. emplastrum.

Insignis quidam Dominus in India, vehementi podagra corripiebatur, sine rubore. Primis in annis, in momento sedatus est dolor per spir. Corn. Rhinocerotis, applicatum. Aliquot anni postea, ætate aucta & diæta neglecta, hoc medicamento quidem sedatus est dolor, sed pertinacior fuit, cum rubore & tumore inferius ad genu & dolore magno. Tunc applicui sequens cataplasma: quod miro effectus edidit.

℞. Medull. panis Tritici lb j. coque in Lacte Vaccino, & adde Sapon. Hispan. ℥ij. Croci Oriental. ℥ij. Sal Armoniac. ℥ij. m. f. Cataplasma. *Hermann. Nicol. Grimm. Compend. Medico-Chymic.*

Adolescens me in trivialibus ad Drusi fossam tenuit oppidum, in quo cum Rhenano Baccho non modicè epulabantur Consul res viri, qui omnes fere claudorum te gradum agebant ex articulari morbo; Hic tribus, ille quatuor pedibus, incedebat, iste rheda, alius sella, vehebatur, portulabatur alius ad curiam, unus ex iis miseriarum pertasus, ad prius arthritidis insitum, affectam partem ad ignem præligari mandabat, atque ita doloris impulsorem vi extorquebat morbumque abigebat confestim. *Wilhelm. ten Rhyn. Dissert. de Arthritide p. 102.*

Me primum in Japoniam adventantem invisit nostrorum interpretum, unus in rebus medicis præ cæteris curiosior, ille claudicans, baculoque non leviter immixtus ad me proreptabat, culpans gonagræ molestiam, cum illo de remedio mihi agenti regebat; Cras fortè mirabere præsentanei medicaminis energiam; quapropter ad dictum diem ad me reversus, sine ullo incommodo procedebat; Ecquid hoc rei esset? mihi percunctanti respondit; En tibi promissi eventus fidem. Emplastris ex Japonica papyro plurimis, inustas plagulas tantum defendentibus, obtectum genu ostendit: ita nos expellimus articulorum dolorem, effatus: Verum postea innumera exempla dubitationem omnem non minus ex animo meo, quam omnem dolorem ex ægrorum artubus inultio hæc, abstulere. *Idem p. 107.*

Peditum erat præfectus jam per tres septimanas rigida hieme pessime à podagra habitus, jamque remedia olim utilia nihil conducebant; itaque in desperationem versa impatientia alia & tortuita poscere videbatur, & ut in ejusmodi casibus heri solet, iam quisque conferunt consilia: sed ante alios Vidicus quidam, in eodem pridem morbo deprehensus, nullum aliud remedium sibi profuisse sanctè adhrmabat, quam arbulationem super nivibus; hanc ergo, ut erat solum nivibus coopertum, tantum non suadet, & certo profuturam esse aggre credenti adjurat. Victus doloribus ager inepto consilio facile morem gerit, sed quod nec stare, nec ambulare initio videbatur, primum nives quibus pedes perficeret, adfetri



jubet. Ad repentinum frigus omnium statim dolorum remissio, & jam indens sui in auram frigidiorum educi se patitur nudatis pedum plantis. Inde confecta super nivibus ambulat. Vincula domum refert pedem omni dolore defunctus, atque ex illo anni unius quod alias facium non erat, a morbo immunitas. Sed hoc quoque inusitatum satis, quod Regii sanguinis Principi post identidem frustrata Medicorum consulta evenisse scio. Nempe ad delinendum dolorem podagricum frigida salsa uti ille solebat maximo cum fructu. Ut adeo tot sint futura Podagricorum remedia, quot sunt, qui ex hoc morbo ægrotant, individua; ple-risque enim cum tempore tardum subrepat, & fortuitorum, quam excogitatorum major est gloria.

*Galenistoria*, de qua in superioribus; remedium in Arthritide non ita tutum est, ut ad eam quasi ad sacram anchoram confugiendum veniat, nec ab uno aut altero exemplo fausto inductio est petenda. Fateor quidem ab ejusmodi usu dolores remittere, & articulorum inbecillitatem aliquatenus imminui; verum non sic eradicatur causa morbi, imo in ipsis interaneis dum coërcetur & excursions in artus minime facit, vires acquirit visceribus principibus ut plurimum tunctas: Huiusce rei plurima in praxi exempla videre contigit, inter quæ sequentia seligam. Vir quidam Nobilissimus 66. annos natus postquam in podagra medelam per duodecim annos lacte & pane pro omni alimento usus fuisset, in tantam cerebri, nervosi generis, & memorie debilitatem aliaque incidit, symptomata, ut morti jam proximus videretur, ni mutata diæta vires novas acquisisset, lethoque sic ereptus fuisset. Ejusdem Nobilissimi Frater annos 60. natus postquam per annos octo eadem diæta lactea usus esset, in dies ferrosa colluvies abundantissima in pulmones fluxionis causa, aggregabatur, & debilitas summa inducebatur; meo autem consilio cum ad juscula carniū, carnesque ipsas rediisset, melius multo habuit. Alius præterea 58. circiter annorum, cum per septem annos in arthritidis ipsum vexantis solatium lacti ac lacticiis totum se dedisset, in affectum pectoris tam gravem incidit, ut subinde se suffocatum iri merito crederet; verum abdicata diæta lactea volatilibusque & reficientibus usus, non prius liberatus est pulmo ab hoste lethali ter ipsam intestante, quam materia tartarea in artus expulsa affectionem podagricam renovaverit per interval-la, quam tamen nullo facilius & commodius tulit, quam morbum suffocantem sic fugatum. Videant itaque Tyrones ne confidentius curas ejusmodi suscipiant, eo per dissertationes ab Excellentissimis Viris serio conscriptas, induc-ti; nam sicut una hirundo non facit ver, sic & neque super uno aut altero exemplo cura aliqua generalis est instituenda; sed tantum sic materia ipsis præbatur experimentorum ulterius conficiendorum, an autem proximi sui periculo illa censura sint penes ipsos est videre. Arthriticorum historias, quorum alii a clunibus ad ultimos pedes tophis lapidosis extus incrustati vii sunt alii in iumbis, coxendice, genibus & malleolis rigidi & inflexiles facti sunt; ut & aliorum in quibus pro mitigando dolore

varia superius explicata medicamenta cum successu adhibuimus, hic non addimus, ne hinc necessitate nimis simus in capite per se jam forsitan nimis amplo.

### *Cadaverum Anatomica Inspectiones.*

Anno Domini 1670. fatis cessit Perillustri Dominus Capitaneus Ammon, qui vitam suam longo spatio annorum arthritide excruciatu transiegit, ita ut manibus & pedibus contractus remanserit.

Aperto cadavere, causam contracturæ digitorum tam manuum, pedum, quam reliquarum juncturarum indagans, easdem calce vulgo dicta plenas spatia omnia occupantis reperi tanta quantitate ut ipsa ossicula loco suo naturali cedere necesse fuerit, unde dislocatio ossium digitorum, tam manuum, pedum, & juncturarum facile inde colligi potest; cum enim tanta materia ad articulos transmandetur, ut mole sua prius nervos, membranas, tendines, obruat, & ad obeundas ritè actiones morui & senii convenientes suffocet, tandem & ipsa ossa suo loco dimover. Dom. Joan. Jacob. Dobrzensky In miscellaneis curiosis anni 1661. Observat. 61.

Dom. à Rapolstein in Alsatia degens, cum per multos annos podagra dirà vexatus esset, tandem supremum diem clausit: A mortis, quam exenteratum fuisset corpus, condituraque tumida curatum, Lien inventus fuit plane exsuccus & omni culpa carens, marsupium in modum inanis, sinistris hypochondriis affixus. Ex observat. Jacobi Moccii Professor. Med. in Academia Friburgensi Brisgojorum.

Vidua P. Auberti patiebatur dolores atrocissimos in lischio sinistro, qui sese ad extremum pedem porrigebant: Cum dolor in coxa gravius evasisset, & tumor in parte appareveret, color tamen, tum etiam pars compressa multo doleret, necnon ægra dolores lancinantes eadem perciperet per vices, vocati fuere Chirurgi qui abscessum profundum latitare asseruerunt: Sicque consilio habito pars aperta est caustico & scalpello, nullum pus effluxit: Post xv. dies ab apertione hydropica facta est, & tandem suffocata interit. Aperto cadavere, & secta coxa usque ad os, in loco apertionis inventæ sunt parvæ quædam glandulæ suppuratæ, quæ pus concretum continebant, ita ut non potuerit effluere. Riverii Observo. 53. Centur. 2.

Amedeus Faber hignius, 40. annos natus, biennio variis morbis, ac postremo etiam dolore lischiadico laboravit, & tandem extinctus est.

In dissectione ad rotatorem femoris dextri ingens abscessus, humorem purulentum copiosissimum, supra libræ pondus continens, inventus est: hinc erosio articuli ligamentis, inhibitis etiam musculis, Luxatio quam passus erat æger: Deinde sub musculo Psoa sinistro, cui ren incumbit; quique in cruris anteriorem partem infertur, ingens theroma, ultra libras duas puris crassioris continens. Fabricii Hildanum Obs. 71. Cent. 1.

Vir Doctissimus & Piissimus Gentis hujus patiter, & literarum decus D. D. H. H. cum crebris



crebris dolorum, vomitus, & cruentz mictio-  
nis paroxysmus, per plures annos graviter ob-  
noxius vixisset, tandem remediis sequentibus  
constanter usus; nephritide fere immunis, abs-  
que graviore quopiam insultu supra septennium  
vixit. Curationis methodus, quam Generosus  
quidam edocuerat, sine pharmatica quavis, ad  
hunc modum habuit, vino & Pomaceo absti-  
nens, pro potu ordinario Allam tenuem ex  
Bravio Avenaceo bibebat; portò semel in heb-  
domada mane cepit hauritum eisdem Allæ ad  
libram circiter unam, cum pulveris ossium se-  
nelorum coch. iij. in eo dissolutis: horum usu  
intra paucos menses morbo calculari valedi-  
xisse visus, mox Arthritico laborare cepit;  
ejusque paroxysmis gravioribus per totam ne-  
phritidis vacationem subinde infestabatur; iis-  
que demum, levi quavis occasione in tantum  
obnoxius liebat, ut, si statim a palatu corpus,  
vel nimum, scilicet deambulatione aut stu-  
dio uliateus exerceret, dolorum insultus cer-  
tissime expectaret: Cujus ratio erat, quod san-  
guis particulis salinonxis, & liquor nervens  
acetolis usque ad plenitudinem saturi, scilicet  
quando succo nutritio recenti perfusi simul-  
que incitati turgerent, illico superfluitates  
suas, scilicet materiem utriusque indolis mor-  
bificam, in Articulos valde debiles depone-  
rent.

Itaque venerandus ille vir torturæ ita cre-  
bræ ac tere continuæ pertæsus, ex consilio cu-  
jusdam amici urinam propriam unoquoque ma-  
ne bibebat; cuius usu intra mensem unum aut  
alterum doloribus Arthriticis paulo minus ple-  
tebatur, sed mala vice affectus nephriticus re-  
crudescere cepit; nam dolore circa lumbos,  
cum vomitu & dysuria subinde afficiebatur, &  
brevis postea: urinæ suppressio totalis successit;  
quæ, nullis remediis superanda, post duas  
circiter hebdomadas Dominum Clarissimum e  
medio sustulit.

Cadavere aperto viscera omnia, exceptis re-  
nibus, nihil in se. n. & firma apparebant; attra-  
mentum ren dexter janipridem fere absumptus  
fuerat, superstitie tantum exiguo glandularum  
acervo, valis omnibus & uretere coalitis, &  
penitus oclusis, ut nulla prorsus urina illuc à  
longo tempore transierit: Ren sinister satis  
largus intra cavitate, & ductus suos magnam  
salubritatis, & calculorum aggeriem continebat; in-  
super lapillus rotundus, obdurus, & albicans  
in ureterem spatio circiter trium unciarum de-  
lapsus, ibidemque fixus, loci transitum peni-  
tus occluserat; ureteris membrana, ubi calculus  
hærebat crassa deo, & callosa, promindeque  
indolens evaserat, ut hic nullo modo sursum,  
aut deorsum dinoveri potuerit.

Videtur in hoc casu, quod, cum sanguis &  
succus nervi particula coagulativa, non pe salinon-  
xæ, & acetosa primò in renibus cocentes  
affectionem nephriticam diu excitant; po-  
stea supra dicti pulveris usu salina usque in cor-  
poris habitum protrusa & non facile redditæ, in  
Articulis seminum Arthriticum congenerent,  
renibus interim fere liberis: Tandem vero cum  
ab urinæ propriæ potu, minera salina in renes  
reduceretur, morbus Articularis in Nephritin  
existens commutabatur. *Th. Willis de Arthri-  
tide Tom. 1. Operum.*

## ARTICULARIS MORBIS

Vid.

ARTHRITIS.

ASCARIDES.

Vid.

VERMES.

ASCITES.

Vid.

HYDROPS.

ASITIA.

Vid.

ANOREXIA.

ASPHIXIA.

Vid.

PULSUS DEFICIENS.

ASTHMA

Vid.

RESPIRATIONIS LÆSIONES.

## ATHEROMA.

*De Atheromate, Meliceride, Steatomate, Em-  
physemate, Natta, Lupia &  
Ganglio.*

**H**osce omnes affectus qui de tumorum ano-  
malorum atque cysticorum genere sunt,  
una comprehendimus, quandoquidem plura  
uni ex iis conveniunt, quæ alteri apprimè  
etiam faciunt, ac propterea simul pertrectari  
debent: Est utem *Atheroma* tumor indolens  
tunica sua continens humorem lentum atque  
glutinosum pulti similem, admixtis quandoque  
corpuseculis durioribus, imò etiam pilis aliis-  
que similis sortis. *Steatoma* est tumor proprio  
comprehensus folliculo, cujus materia sevo si-  
milis est; ejusdem ubique coloris, & ab exi-  
quo principio sensim augmentum sumens, qui  
digitis compressus aliquatenus quidem cedit,  
at iis remotis ad priorem magnitudinem &  
elevationem facile redit. *Meliceris* est tumor  
doloris prorsus expers ac rotundus, humorem  
tenuem, mellis substantiam referentem folli-  
culo suo complectens. Diximus tumorem hunc  
esse rotundum, in quo ex parte differt ab *A-  
theromate* & *Steatomate* quæ non ita rotunda  
reperiuntur, sed figuræ ut plurimum magis de-  
pressæ, imò inæqualis. *Emphysema* est tumor  
ex statulento spiritu, sive intra membranosas  
membræ alicuius partes, sive sub ipsa densiori  
cute, sive inter musculorum interstitia, co-  
servato genitus, sævissimum quandoque dolo-  
rem faciens, ob membranarum sensu exquisi-  
tissimo præditarum divulsionem. *Natta* est tu-  
mor, seu potius excrecentia magna & car-  
nosa, cujus plures sunt species, hæc scilicet  
quæ vasa grandiora implicata, & quasi comi-  
mixta habeat, aliæ vero minime, aliæ quæ



super basi magna, lata ac adhærente elewantur, alix vero super basi angusta & minimè adhærente. *Lupia & Ganglion* sunt tumores per se indolentes, tenitentes, & cuti corporis concolores, quorum hoc circa articulos plerumque manuum & pedum partesque illorum nervosas & tendinosas, exiit: Illa vero circa aliarum partium articulos, imò e variis membris emergit. Diximus esse per se indolentes, quia quandoque lupia temporis mora, & præcarie ossis sublati, ab humore contento effecta, non tantum dolens fit, sed etiam in cancerosum quidabit; imò ipsa ut & ganglion vehementer pressa obrutum quendam doloris sensum exhibent. Humor contentus aliquando est tenuis ad instar mellis, aliquando putaceus, aliquando sebaceus, & in ganglio aliquando nullus, & ex mera distentione fibrarum tendinis ortus.

*Causa* horum omnium tumorum est humor viscidus & glutinosus sale multo imprægnatus à sanguine aut lymphâ varie concrevisibili suffectus: folliculus autem materias e quibus constant concludens, efformatur a maximè ramosis ac salinis particulis, quæ dum subtiliores avolant ad tumoris superficiem abreptæ ulterius pergere nesciunt, ibique invicem implicatæ crustam faciunt membranofam, qualiter videmus liquores viscidos & salinos dum igni admoventur subito pelliculam efformare; vel etiam ille folliculus primò conficitur à membranula quacunque partis cui tumor insidet, quæ extensa in dies compactior atque densior evadit per particularum prædictarum adjunctionem. Viscidus autem ille humor varios concretionis gradus acquirit, unde vel ad mellis, vel ad pultis, vel ad sevi consistentiam, accedit, imò quandoque etiam talis à sanguine sufficitur qui excrecentiam prorsus carneam qualem in natâ ut plurimum videre est, constituit. Aliquando tam multus est & a valis grandioribus aut pluribus derivatus, qui tumores magnos, aliquando tam paucus qui tumores parvos conficit; imò aliquando ea tantum in copia effusus quæ possit poros partis obstruere, liberumque spirituum vit. humi commercium impedire, unde status procreantur genuina *emphysemata*, & etiam aliquando ganglii materia.

De *Differentiis & partibus affectis* in hisce tumoribus, non est quod aliquid addamus iis quæ jam dicta sunt. *Prognosis* autem, *Indicationes & Curatio* abundè peti poterunt ex iis quæ jam e variis Autoribus habemus afferenda.

#### Curationes.

Curandum est atheroma septicis, ut ærugine, squammâ aris, chrysocolle, mysi, calcistide, auripigmento, arsenico, calce viva, atramento sutorio, lacte caprino; his autem non indifferenter utaris verbi gratiâ, Septica erunt in durioribus corporibus, arsenicum, chrysocolle, calx viva, quæ in aliis naturis erunt caustica. Calx in pueris quidem est septicum, in adultis vero & robustis est tantum epouloticum. Medicamenta septica sunt.

℞. Calcis vivæ drach. iv. succis vini combusta, utri liquidi tosti drach. ij. mysi drach. j. cum lixivio teantur, & melle ad crassam substantiam adducuntur.

℞. Squammâ aris, Sandarachæ, drach. ij. veratri nigri drach. ij. cum rosaceo.

Item ℞. squammâ aris, sandarachæ, seminis urticæ torrefacti, cum rosaceo.

Item ℞. trinaecorum combustorum, testæ sepiæ, auripigmenti partes æquales ex rosaceo. Valet plurimum aqua fortis, qua utuntur aurifices, in qua tingatur lignum, & eo perfricetur pars, exedet partem. Item valet illud ex lixivio fullonum in sartagine cocto, donec craescat, & indurescat, deinde miscentur auripigmenti partes v. atramenti sutorii part. iij.

Curatur etiam Atheroma per Chirurgiam, scilicet, excidendo, qui modus primo melior est, septicis autem curatur, si eruperit materia, nec folliculus sit abscessus, vel æger ferrum ignitum pertimescat. Excisio autem ut hoc modo; Ægro in sella posito in cubiculo claro, deradendi sunt crines, vel potius recidendi, quia deraditionem sequitur sanguinis eruptio, deinde atramento signanda longitudo incisionis, quæ tanta esse debet, quanta est rotunditas abscessus, interdum abscessus postulat unam, interdum verò duplicem incisionem, crucis modo; quando sit duplex incisio, prima major esse debet, quàm secunda, sit unica in abscessu minore, vel in fronte; duplex vero, ubi est in capillis; in qua incisione scalpellus debet habere aciem recurvatam exterius, & in ipsa incisione efficienda videndum est, ut tantum cutis superposita folliculo incidatur, cavendum vero est ab incisione folliculi. Incidemus autem tantum cutem, sine folliculo, si sciamus colorem cutis, & folliculi, qui cum sit diversus, facile discernitur. Solet autem unum nos impedire, quò minus distinguatur folliculus à cute, scilicet sanguis effluens, ideo Chirurgus manu sinistra spongia exsiccare sanguinem debet. Facta sectione, vel una, vel duplici, statim toto specilli mucrone, inter folliculum & cutem immisso, separetur folliculus à cute, quod facili negotio fiet, quia non valde adhæret cuti folliculus; quod si folliculus magis hæreat, scalpello separetur, in fundo autem, ubi est vena illa porrecta ad folliculum, sanguinem atheromati affundens, & illud augens, præcidere oportet transversum venam, ne cum vase relinquatur aliqua folliculi portio, ac proinde currat morbus; illa enim vena simplex est, sine arteria; quo fit ut sanguis ille non sit alimentalis: hoc peracto, conjungenda sunt invicem labia; non tamen prehendantur pericranium, nec deradatur dimissa sutura, etiam reducuntur labia, quia inter incidendum, semper sanguis exit, & in cavitate semper sanguis remanet, qui per suturam factam induramaretur. Interdum utendum est glutinatione, quando nimirum remanet aliquis tumor in parte, & labia magis quàm pars est, sunt separata; interdum solent liquores replere cavitationem, & eo confluere; tunc utere suppurantibus, quale est.

℞. Resin. terebinth. ℥j. thuris pulverisati drach. j. myrrh. drach. j. olei hyperici ℥j. olei vitellorum quantum sufficit. Quod si folliculus







Bartholomæo Cabrollo obs. 30. & Fabricio Hildano observatione 63. Illud utem frugis consequitur, si declinetur, differaturque Chirurgia, live gestum hominum, qui non permittunt, live Medicorum, qui operam attrahere non vident, culpa; ut sæpe cum illi borare velint, non possint. Notus est homo Neapolitanus, qui circumseptas cervices, & colum quatuor atheromatosis folliculi tumorii magnitudinem æquantibus habet, jamjam, ut apparet, strugilaturis. Notus & eadem urbe Terrandus Ludifella sophista doctorque adolescentium eruditus, qui cum steatomatis in gena extantis excisionem multis jam annis ab experientis medicumnu refugerit: jam accretum ad magnitudinem mali infirmi tumorem, & amictu insolenti nunc obtegere coactus est, & vix aliquem reperit, qui tuto ab eo se malo liberare confidat. Itaque neglectam in arduis chirurgiam penitentia semper sequitur. Quod si me vident, aut medentes, aut vitium hoc ferentes, cum primum se prodiderit exultans cute tuberculum & vestigio succidant nil veriti, facile tenella revellitur arbusculum, quæ cum altis in patrio solo fixerit radices, & revellentis omnes vires ridet, & resecta repullulascit. *Marc. Aurel. Severin. de recond. abscess. natura.*

Antequam verò ad ipsam anomalorum abscessuum curationem accedamus, mentio quidem esset faciendæ curationis eorundem prophylactica, sed quia eandem abunde descriptam nobis reliquit Joannes Langius in epist. 4. l. 10. itaque te eo remitto, interim tamen absolute plurimos ullaione Arabica me curasse, te latere nolo; inter quos etiam est integerrimus generalis Antistes ordinis Montis Virginæ, Reverendus item P. Joannes Baptista Nenna ejusque sodalis Horatius Tarantellus utrique & societate Jesu viri: Insuper sacerdotes templi incurabili duo, ut & Augustinus Saulinus Doctor Medicus probatus ac Gregorius Sapone librarius compositor, ampulo aut ulceri delapsa crusta & membranula per corrosiva subducta, & cilis suis & rnis inductio & in ejectricem obductio. Hæc de prophylactica curatione sufficiant, sequitur nunc altera.

Cum autem triplex is abscessus alieno constitit concremento, expletur omnis curandi scopus evacuatu, atque consumptum materiam, quæ opera, vel sensu evidens, vel obscura est. Evidens quidem tum putrefaciendo, tum exciudendo habetur obscura medicatio per discussum est lentum, quem medicamenta extreme calida præstant, & absorbentia, quæ sunt inter cætera Gal. emplastr. di. pyrites, & diadictannum, & sacrum opere de comp. med. per gen. descripta. Itaque horum abscessuum omnium curatio communis est triplex, per digerentia, per liquantia, per exciudum. Porro uni meliceridi triplex hæc omnis ratio pro libitu, proque ratione affectus accommodari potest: corruptoria verò, & exciud atheromati conveniunt. Solus exciud steatomati competit, quippe materiam crassam contumacissimam ad medicum steatomam; minus atheroma est, multo omnium minime meliceris; de qua Galenus in l. 14. meth. 1. ed. cap. 11. Paulus in l. 13. cap. 34. Fallopius, & Fabricius men oratis locis.

Jam verò, quod Galenus l. 3. meth. med.

meliceridem rescindendam absolute potuit; 14. vero ejusdem operis per discussum medendam: contradiationem aliquam non habet. Et enim eo loco curationem extremam: hic promissuam, & multiplicem explicuit. Præterea nemine nos oportet, Gal. in l. de tumor. prat. natur. cap. 3. haud perpetuas tecum tunicas abscessibus. Hæc ergo potuit, ut tunica quidem tubercula per exciud a se: ipso; tunica vero expertia per digestum a medicamentis curaverit. Enimvero diversitas hæc, cum hi comperta est, qui juveni Romano meliceridem de palpebra detraxi cysti circumseptam in carpo vero mihi, & aliis eandem curam præter eductum rei solidæ. Sed & atheromati non unus est modus, interdum enim adhaerens levius tunica cuti, interdum adjacens laxè reperta est. Sic & steatomatis varium, madore, pinguedine, densitate, compagine, toto habitu systasin adverti superius. Vides jam non dissensisse tibi Galenum productis locis. Major ambiguitas est apud Aetium Amidenum, qui Tetrabib. l. 4. ferm. 3. cap. 7. proposuit medicamenta, quæ melicerid. & steatomat. citra chirurgiam exolvere valent; sed pro eis, qui chirurgiam recusant ea verba protulit: quasi vero condocere facios hos faciamus in medicamentis utendis tadium, non veram curandi efficacitatem esse, vel dixeris tentanda omnia sub tumorum initis. Et Gal. myrmecias dicitur licere docuit l. 6. epidem. com. 1. quimeth. cap. 1. & l. 14. cap. 13. & 17. censuit exciudendas, nimirum, quia toto sunt genere præter naturam. Sed & Iulius Aegineta l. 1. cap. 34. remedia digerentia potissimum ad meliceridas exposuit, qui alia operis parte tradidit exciudendas.

Quoniam igitur cysticis abscessibus una meliceris curationem per medicamenta discutientia tibi prærogat; septica vero expoicit atheroma; de horum utrorumque delectu necesse est, ut dicamus. Quod autem ad meliceridem spectat, curatio per medicamenta difficilis plurimum, quæ fallens usu comperitur: nihilominus, quia tumoris initio debita, omnibus semper optabilis, & à scriptoribus plerisque proposita est: exequemur etiam hinc nos medicamentorum ejusmodi descriptiones, auctore primum adscito Gal. qui l. 6. de compositione medicam. per gen. cap. 14. expoicit Alexandri unum, quod recipit. Salis Hispani, argenti spuma, cerussa, ana lb j. cereæ, terebinthinæ ana 3 j. Galbani & opoponacis, visc. quercum. ana 3 ij. linapeos 3 vj. olei veteris lb ij. aceti sextarios octo. Describit & sic Fallopius. Alterum descripsit ex Democrito, quod sic constituitur.

#### *Libram salis lavissimi.*

Tenuis, duas cerussæ, tot & galbani, Fac uncias, totidem puræ propoleos. Aristolochiæ binas pariter uncias, Præstantis olei libras annosi duas. Crassissimum si fuerit, addes alteram. Coquito similiter, temperatumque probe Ab igne tollito: lavigatum tunc quoque Aristolochiam insperges, injeceris ubi Mollita, propolim scilicet, atque galbanum.

Hæc



Hæc Galenus. Aetius verò proposuit & suum aliud quod

℞. Cera terebinthinæ, squamæ aris, sing. sextantem, sulphuris vivi, nitri, sing. ʒj. radicibus siccarum cannabis sylvestris, xxxv. & si defuerint, Arillolochiæ tantundem, olei antiqui lbj. Radices per triduum aqua madefactas, & contusas in oleo coquito, donec torrescant. Deinde ipsis abjectis cætera, quæ liquari debent, liquata admiscero, & arida ex aceto tria adjecto, atque utitor. Sed Paulus Aegineta l. 4. cap. 33. præter alia multa commendat unum ab Archigene excogitatum, quod

℞. Aphronitri, & veratri partem duplam cum cerato duriore impositam. Hæc isti veteres; & Junioribus verò Joan. Langius lib. 3. epist. & Evonymus Phylitrus tum in operis parte prioris; tum in posteriore, & post hoc aiii celebrant oleum subtiliore ignis arte (chymicam vocant) extusum. De quo hæc ille: Aqua mirabilis, quæ delet naves, tubercula, seu pustulas papulæ, aliqui naves vocant (Itali puto) Lupias, glandulas, scrophulas, porros, id est, verrucas, & omnia nascentia mala ubivis in corpore tollit.

℞. Olei Laurin. lbj. thuris albi, mastiches elect. gummi. Arabic. terebinthin. clara, ana ʒij. Tritis terendis misce omnia, & destilla per alembicum, & in aqua ista sic destillata infunde lbj. cineris terra & iterum destilla, & serva aquam thesaurum: Junomin. tum. Cinerem terræ calcem puto.

Devenit jam sermo ad rationem administrandæ rei chirurgicæ, quam Cornelius Celsus omnium post Hippocratem vetustissimus absolutissimusque auctor scripta reliquit lib. 7. rei medicæ c. 6. his verbis.

Si capillis conteguntur, per medium oportet incidere. sed steatomatis tunica quoque secanda est, ut effundatur quicquid intus coit: quis non facile à cute & subjecta carne ea separatur: in cæteris ipsa tunica inviolata servanda est: Protinus autem alba, & intenta se ostendit, tum scalpelli manubrio deducenda à cute, & carne est, ejiciendaque cum eo, quod intus tenet, si quando tanen ab inferiore parte tunica musculus inhaerit, ne is lædatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est; ubi tota exempta est, committenda oræ, fibulæ quæ his injicienda, & super medicamentum glutinans dandum est, ubi vel tota tunica, vel aliquid ex ea relictum est: pus moventia adhibenda sunt. Hæc ille. Addidit Paulus præcipuam emundandæ tunicæ diligentiam servandam esse in brachiali, in talo, & articulationis motui dicatis: in quibus locis relictæ membrana portio consuevit occasionem exulcerandi vitii præbere. Sed nos adscribemus his utiles quasdam agendi rationes, & observationes. Primum abscessus cum tunica, qui in manibus attritiati per motum sese exhibent circumfluos, id est, quoquoque sub cute mobiles: hos confidentius arripi curandos licet, in alteros vero, qui firmitus hærent, jam apertos materiæque opplente exhaustos candentia ferramenta tutius immittuntur, qui ignis insuper, ubi munus evulsæ videantur fibræ, quibus abscessus nititur, atque ubi periculum est, vel profluxuri sanguinis, vel accessuri corruptio-

nis, opportunissimus erit. Ad inscandum autem cauteria, non vulgariter acuta desiderantur. Smilion, id est, recurvum scalprium requirit Hieronymus Labritius Aquapend. in Tract. de tumor. c. de atheromate, &c. Sed interim homo, qui tractandus est, Hippocr. præcepto in l. de offic. medic. paulo post initia, tum ad lumen illustre, tum ad te curantem, quam commodissime collocandus est; qui si timidus sit, sive puer, sive femina, manibus ad dorsum retractis religandus; nimirum ne doloris impatiens medicum agentem actus variè manibus impediatur, aut pavens, quoquoque agitur. Post hæc ordinatis, quæ sunt ex usu ritumque potissimum habere paratam spongiam, quæ intersecandum effluens turbator sanguis extergatur; notabilisque apte per atramentum scriptorium dissectionis necessariæ situm, magnitudinem, figuram: quæ sectio, quæ tumor exporrigitur, aut paulo citius extendi debet: sic enim & commodius diduci fibræ, & apprehendi tunicam, & purgari ventriculum licebit, tum obverso se ipso rem peragas licet, tentans obliqua manu descensionem: atque ita etiam excoriis cutem, ne folliculum, id est, vestientem membranam convulneres. Incisione facta præcipit Cornelius, ut tunica scalpelli manubrio diducenda sit ex cute, & carne ejiciendaque cum eo quod intus tenet. Sed nihilominus compertum est mini humius hanc adhærescere, quam ut obrusæ rei scalpello divellatur, quapropter acie ferramenti sub tunicam immisi subsecanda est, totaque detrahenda; vel si hoc æger patiatur, medicamentis causticis exedenda: in qua sæpius laborare Medicum contingit.

Meliceris, quæ carpo paulo superius oboritur, his, qui rem nimirum sunt experti plerumque imponit sic, ut credant scirrhosum esse tuberculum gangliumve: atque adeo dissectionem exequantur medentes. Sed nihilominus scire licet hanc duritiem evenire distentione humoris copiosi, qui candidum ovi, aut, ut verius fortasse dicam, mel album refert. Hunc igitur mobilem circumquaque tumorem non contrectaveris; confidenter, si me audis, aperueris, sive phlebotomo, sive pastinacæ marinæ radio, quem homines timidi minus exhorrebunt. Consperta hæc observatio mihi fuit in multis: primum in neipso, qui Pithecusæ degens unam ex his in metacarpo natam discidi; deinde in aliis, & in Leonardo Ciccono Civi Abellinati Doctore jam medico, qui tum usum medendi sub Mario Schipano medico celebri erudiebatur cujus sinistra manus initio natum tuberculum licet aliquibus ganglii speciem referret, nihilominus à me suppunctum pellucida effusa pituita meliceriam manifestam fecit. Cui operæ interfuit principio Dominus Coccia Neapolitanus Medicus eruditus. Meliceridis super carpo superiore natæ folliculus inhaerens nullus quantum ego in plurimis observavi; quare neque ampliore illius c. usâ sectionem feceris; neque ab infecta illa cysti exsolvenda fueris sollicitus, quam curam multi falso volunt habendam.

Steatoma cum absideris, memento intemperiem nonnullam, præcipue si in musculum fuerit idem, in parte relictam curare. Consilium autem



autem tui modentis erit eandem medicamentis naturæ amicis fovere : ubi vero hbras aliquot residuas inipexeris, consultum his fuerit induci causticum, vel ignem leviculum. Hæc equidem à me comprobata sunt omnia, in eo, quod curavimus Gratiz à Philippis Canobita minori : cujus in hoc libro plus semel mentio facta est. Atque hæc quidem curatio est, si lata sit basisteatoma; namque si tenui sit pedunculo propendens, satis erit ad inum exectio. Corrosivis contentus est Fallopius. Illud etiam ex Aëtio negligendum non est, quod in strumis servatur, si steatoma sublevatum fuerit; in circuitu per scalpellum, subter verò digitis, insertum verò in ambitu, & subter incidendum esse. Cæterum ex ejusdem viri doctrina scire licet in atheromate, ac meliceride tunicæ sectionem formidari : in steatomate, quia solidioris est substantiæ, quæ non effluit : nullam ejus rei necessariam cautionem esse.

Sed in atheromatis genere illud inter cætera maxime advertendum est, ab aliis quidem nullis admonitum, à me verò dum hæc sæpe tracto, non semel observatum : detectam ample tuniculam abscissus haud semper oportere totam à cute revelli concluso tum infarctu integram : quippe per acerba revulsio, & ab omnibus vix tolerabilis. Satis est, ut latiusculè dissecta cute, potissimum autem decussatim, quam maximam licet, membranz partem forniculis, aut scalpro rescindat; cæteram portionem medicamentis non dico equidem causticis, sed digerentibus & erodentibus detracturus : Id equidem comperi primum in valetudinario curans Dominicum Riccardum Adolescentulum Abellinatem, qui atheroma obrulerat super ensiformi cartilagine sexto plus mense natum. In quo adolescente nulla etiamnum facta resectione folliculus ample apertus compertuit, & partim abstergentibus, partim catharticis extritus est, & liquidus. Non dissentit autem à me Paulus l. 6. cap. 36. Verum enimvero non te lateat velim, hujus sortis non esse crassiores folliculos, & cartilagineos fere. Ejusmodi fuit is, quem Capuccino de genu subtili, porro par non omnium est conditio etiam ejusdem generis. Ergo prudens Medicus exercitusque sit oportet, qui perspicaciter omnia discernat in lingulis. Aliud etiam à me comprobatum super eodem adolescente rescias velim. Circa pectus execta hæc tubercula distentionem aliquam lacertis thoracis induxisse, quapropter folliculus etto laxandorum continuo musculorum, tum ad ipsos datis medicamentis tum ad axillas, & inguina. Aliud ex Aëtio servandum est. Post ablatam pelliculam, si labia plus æquo laxa fuerint, redundans cutis exsecanda, deinde futuris labia connectenda. Atque illud insuper animadversione dignum est eodem auctore; ut si in capite hujusmodi tumor fuerit post ablatam pelliculam os ambientem secemus, & calvariam diligenter abradamus, quæ in re facienda, quid consilii sit, Aëtius quidem ipse non expressit; sed nos illud interpretamur, aut quia sic omnis mali fomes eluitur, scatenisque quasi fons ejusdem occurrat : nimirum in pericranium, & cranium inducto per derasionem poro, calloque, aut quia securius sic exteritur omnis à

vitio primum inducta labes, nullusque recidivæ relinquatur locus. Confirmat autem opinionem simile quiddam apud Joan. Riolaum, atque alios etiam antiquiores, qui talparium capitis vitium, ut perfecte curetur, etiam pericranium excindunt, & os deradunt, ne aliquando vitiatum, plagæ coalitum renouetur.

Quæstio nunc ad extremum hunc locum occurrit, num folliculo ad ungueni extracto, sutura condecenda sit, nimirum, quia vulneris cruentatio conglutinatum exigit sui ipsius. Cujus rei determinatio non ita facilis est : nam si magnitudinem consulas, & secundum hanc requiri futuram velis, parvus quidem hiatus ex plaga solis medicamentis conglutinationibus contentus est, si magnus est sinus quantum quidem amplitudo vulneris ad augmentum conglutinationi requirit, tantumdem etiam difficultatis exhibet, & ambiguitatis, ne loquaci aliqua remanente per antiquum cutis habitum ex antea subtrata materia abscessus falsus fiat & irritus coalitus, itaque necessum esset evagationem, & coherentem cum carne cutem prius abscindere, deinde conuere, sed hoc sæpe homines, qui tractantur doloribus multis pertæsi non concedunt, possunt autem si concenerint, futura uti, liberam autem, ut consuevit, vel abstineas potestatem fecit Aëtius, qui, inquit, peracta opera, vulneris labia futuris constringantur, ut melius glutinentur, aut linamenta profunda indantur, & curatio ad puris generationem adhibeatur. Tr. dicit & de futura idem vir Tetrab. lib. 2. term. 3. cap. 33. & Tetrab. 4. term. 3. c. 7. & 8. At Celsus lib. 7. cap. 6. tradidit hæc ubi tota ( tunica ) exempta committenda ora, fibulaque his inplenda, & super medicamentum glutinans dandum est. Approbavit, & futuram Paulus Aegineta lib. 6. cap. 36. præter quam ( addens ) si quid membranz relitisse fuerit deprehensum, tum enim erodentibus medicamentis reliquæ sunt absumenda. His & Hieron. Fabricius adhaerit.

Privatam & peculiarem curationem nunciscitur Nata, seu Nasda, quod plerique dixerunt; tuberculum ex anomaliis unum, quod interdum ex graciliore basi, velut ex pedunculo fucus, propendet. Ad steatoma quidem retulit Joannes Lagautius iussit. chirurg. l. 1. cap. 13. verum ego potius de genere meliceridis taceam, quippe steatoma basi nititur ampliore, si credimus Aëtio : id quod de meliceride atque de atheromate, neque idem ipse, neque alius quispiam dixit. Utcunque cum hoc tenuiore basi dependeat; circumsectione, atque amputatione tractandum est, non simplici apertione. Ita enim Brunnus Calaber Longoburgensis lib. 2. chirurg. magnæ cap. 8. quæ cæteroquin exciso sive adstricto filo in pusillatimis ad lupefactum, usque partem; sive etiam sine inmodatu, quod Bruno visum est, fiat; in nostra est manu. Multitudo verò neque ille meminit, neque necessitas ulla est; nisi cum aut profluvii sanguinis, aut recurus vitii metus suadet. *Idem ibidem.*

In Atheromate, Steatomate & Meliceride imprimis corpus repugnandum est ut occurratur causæ antecedenti, ut pilulis cocceis, de agarico



agarico, de hermodactylis, aut diaphœnici, diacarthami. bened. lax.  $\mathfrak{z}$  ij. aut  $\mathfrak{z}$  vj. in forma boli cum saccharo, vel si placet dissolvatur cum decoct. hyssop. thym. puleg. Pulvis diaturbith utiliter quoque sumitur pondere  $\mathfrak{z}$  ij. Ad purgandum mucum thymæ tam sulphureæ quam aluminosæ valde profunt. Celsus & Aëtius commendant esum viperarum opportunius præparatum. Quidam adsumunt frequenter magno cum successu diacalamith. vel diaprastu  $\mathfrak{z}$  j. cum vino aut aqua c. rd. bened. vel scabios. abscessus si veri potest rumpitur, deinde cardiacis, ut theriacæ, Mithridatio, cor muniatur, ne putridis funis offendatur, ut a se materiam putrem longius repellat & potentius expurget. Quo natura verget sequamur. Si videatur viam per urinas affectare, diureticis ejus conatus juvetur, si per alvum, clysteribus, aut blandis catharticis. Abstineat a jusculis & elixis, utatur pane biscocto, anisato, & decocto ligni Guajac. & rad. sarsaparill. china, pro potu ordinario cum saccharo & cinnamomo.

Horum omnium curandarum quatuor sunt communes scopi: Resolvere, exedere, incidere, & ligare. Melicerides his quatuor modis curari possunt: nam si resolvi non possint, aut cauterio exedi, aut facta incisione evelli, si fieri possit ligari debet. Steatoma neque possunt resolvi neque exedi, sola incisione sanantur, quia adiposus humor nec resolvi potest, neque suppurari, semperque includitur tunica duriore. Atheroma non potest quidem resolvi, quia materia est crassior quam ut discuti possit, sed aliquando potest pepticis maturari. Quorum unus si inutiliter tentetur, aut exedatur, causticis, aut cum sua tota & integra cysti humor evellatur. Duobus autem signis cognoscas an includatur humor tunica. Primum si sit mobilis, secundo si à cute separetur. Quando enim immotus manet dum contrectatur, & cohzet cuti aut carni, indicium est membranula non includi. Notandum autem est recentes abscessus & molles resolvi posse & suppurari, duos verò & inveteratos sola chirurgia curari. Itaque in hoc diligenter laborandum est, ut singulæ differentiz discernantur. Steatoma est durius resistitque tangenti, & basin habet solidiorem. Meliceris contra subsidet in modum cedematis, cedit in se compressa, lentèque dissilit, sed cito revertitur: Atheroma vero est veluti medium inter utrumque extremum. Faciamus ergo abscessum esse mollem, non refert si magnus aut parvus fuerit. Resolventibus primum tentanda erit curatio, ut diachylo ireato, aut cataplasmate ex far. fabar. erui, lolii, lupinorum coctis cum pulvere bupththalmi in oxymel. vel thercore capræ, aut ovis cocto in aceto, vel farina lupinorum cocta in oxymel. Calx oleo vetere, aut adipe suillo, aut melle excepta commendatur à Paulo, quia fundit simul & resolvit. Idem Paulus serpentem conjicit in ollam oblitam gypso, quam mittit in fornacem, pulverem miscet cum æquali portione scœnugræci: utrumque excipit melle. Prodest etiam diachylum magnum cum gummis, addito pulvere radic. ireos, ad libr. m unam addatur uncia una pulveris. Ad resolvendas Meliceridas.

$\mathfrak{z}$ . Uvarum passul. exemptis acinis par. iv.

squammæ aris  $\mathfrak{z}$  ij. parti prius fortè imponitur.

Vel.  $\mathfrak{z}$ . Spumæ nitri & veratri duplum cum cerato duriore imponitur.

Vel.  $\mathfrak{z}$ . Lad. ni, bdellii, galban. ammoniac. thymiamatis, propolis, terebinth. ana partes æquales, contunde cum pistillo & applica.

Vel.  $\mathfrak{z}$ . Panular exemptis acinis lb j. cumini levissime triti  $\mathfrak{z}$  vj. nitri  $\mathfrak{z}$  ij. omnia simul in mortario subacta adhibeto ac alligato. Non negligendum quod ex Avicenna ad resolvendos tumores frigidos descripsimus, nam ex Galeno transcribit Guido ut facilius resolvat humorem infusum cysti, primum excrecentiam manibus contrectat, deinde ferulæ aut scutellæ fundo percutit, ut velica rupta materia effundatur, mox applicat plumbi laminam, eamque arctè ligat, quæ non tantum molles & crescentes excrecentias resolvit, sed etiam duras, ut ganglion. Est veluti nodus in nervo, quod tag. utius videtur confundere cum lupia, quando scribit potissimum oriri in capite. Verior tamen est Pauli & Aëtii opinio, qui frequentius talos, & manuum juncturas occupare volunt, rarius cubitum & caput. Ganglion hoc habet peculiare, quod dum premitur stupidiorem sensum exhibet, moveturque tantum ad latera pro situ nervi, neque in orbem, in anteriora, aut posteriora ut melicerides & atheroma. Ad dissolutionem lamina plumbea cribri instar perforetur, quineti m ut emolliat magis & fundat humorem concretum, illuminatur argento vivo, nec ante novem dies removeitur. Ad resolvendas meliceridas, valet decoctum puleg. calament. hyssopi admotum cum spongia imbuta & expressa. Item spongia ex lixivio expressa. At in majori abscessu & in duriori corpore valent testa allii, aut allii decoctum & per spongiam admotum. Valentius hoc est, si in aquam infundamus calcem vivam, donec aqua inficiatur calce, deinde alia infunditur aqua, & fax abigitur, postea exprimitur spongia, & aqua infecta superponitur. Media sunt inter valentissima.

$\mathfrak{z}$ . Salis Hispani & argenti spumæ, cerussæ ana lb j. ceræ  $\mathfrak{z}$  j. terebinth. galban. opopanax. ana  $\mathfrak{z}$  ij. sinapi  $\mathfrak{z}$  vj. olei veteris lb ij. aceti  $\mathfrak{z}$  vj. misce. Est & aliud.

$\mathfrak{z}$ . Salis ammoniac. spumæ argenti ana lb j. terebinth. galbani, opopanax. ana  $\mathfrak{z}$  ij. rubricæ lupolicæ  $\mathfrak{z}$  vj. aceti heminam, misce. Ex Aëtio lib. ij. sequitur curationis secundus scopus, ut caustico exedantur. Admovebis cauterium in medio. Aut si magnus sit abscessus, multa cauteria: cum crusta deciderit, indantur penicilli Ægyptiaco illiti, aut præcipitato & melle, aut troeniscus de minio vel asphodelorum, mixtus cum unguento postolorum. Joannes de Vigo lin mentis omnes excrecentias indolenter erodit intra unum mensem. Accipit ex linteis usu detritis & bene carptis  $\mathfrak{z}$  ij. medullæ panis albi  $\mathfrak{z}$  ij. sublimati tenuissime pulverisati  $\mathfrak{z}$  j. aq. rosarum & plantag. ana lb j. omnia simul coquit in vase æneo ad consumptionem duarum aut trium partium. Deinde expressa linamenta siccant in furno mediocriter calido, quæ iterum carpta servat in vase bene operto ad usum qualem ipse ita describit. Primum defensivo vicinæ partes muniuntur. Den-



de ulcus quod fecit pyroticum prædict. linamento impleatur, superponatur unguentum de ruthia, vel de cerussa; persistendum donec appareat caro viva, tum ulcus melle rosato & terebinthina mundandum. Sunt qui parvas excrescentias totas per transversum incidunt, moxque implent alumine, aut vitriolo uiso, quæ cystim erodunt simul, & hæmorrhagiam sistunt, ad idem valet oleum vitrioli cum plumaceolis applicatum: magnas vero trajiciunt duplici setone cruciatim, uno secundum longitudinem, altero per transversum. Quod si humor fluxilis non fuerit, nilum aut ellycanium ex quo setones parantur maceretur prius aqua forti, vel lini tur ægyptiaco, vel terebinthina, cui pulvis mercurii sit permixtus. Sequitur tertius modus. Quæ non sanat ignis, sanat ferrum. Incidatur primum cutis, deinde unguitibus laceretur ut divellatur a cysti, quæ prehensa vossellis funditus evellatur, quia si remanserit frustulum recidivam faciet; quin etiam si rumpatur dum sit operatio, inanis est labor. Si forte quibusdam vasis adhæreat vossellis suspendatur, atque interim scalpello ab illis separetur. Notandum quod si magna excrescentia adhæreat magnis vasis, venis, arteriis, nervis, tendinibus, utpote si fuerit sub mento, si in manibus, aut pedibus, sinenda ea est. Si sit super futuram, vel spinam dorsi, latera, tempora, nucham, non potest extrahi sine periculo, potest tunc extra illas partes extremas. Sed memineris, extractum abscessum periossum excedere & os subiectum diligenter abradere, si cariosum sit. Memineris quoque quoties cogitas de magna excrescentia mentione tollenda si forte magnam venam subesse putes, prius habere parata, quæ conveniunt tollendæ hæmorrhagiæ.

In curatione Emphysematis seu flatuosi tumoris cum tria insint, materia humid., caloris imbecillitas, & meatuum densitas, ideo tres intentiones habere debemus. Prima erit convenientem victum instituire, qui talem humidam materiam non gignat. Secunda pituitosam & humidam materiam præparare, concoquere, & evacuare, caloremque debilem viscerum, ac aliarum partium roborare. Tertia flatulentam materiam in partem contentam extenuare & meatus recludere. His quarta etiam addi potest quæ erit symptomatibus succurrere ac subvenire. Prius dicta eadem quæ in edemate præscripta imperanda; vitanda legumina ut pisa, fabæ: necnon fugaces, potissimum crudi fructus. Secundo succurrendum cruditati: (nam ex cruditate ab imbecillo calore fit status, qui humores in vapores dissolvit calor, quos non potest discentere imbecillus appellatur.) pilulis de hyera corpus repurgandum, nam inactionis curatio ex communi indicatione posita est in evacuatione status, cujus vacuandi rationem ex illa triplici causarum varietate deprehendimus: Languentem itaque calorem nativum roborare, & vaporem crassum discutere, humoremque frigidum, viscidum, aut crassum, status materiam attenuare, ipsumque continens corpus rarefacere conveniet. Calor ventriculi primæ coctionis officinæ (cujus errorem sequentes emendare non possunt) roboratur aromaticis

stomachicis, & electuariis ad hoc dicatis, ut diacymino, diacalamento, aromatico garyophillato, aromatico ros. diagalango & similibus; Aniso condito, aut tragea communi utendum. Roborandus etiam ventriculus situ ex oleis de mastich. de absynth. &c. Denique ablatione materię conjunctæ, per calida siccantia, attenuantia medicamenta quæ carminativa nominant, ut rarefacta parte humor flatulæque subiectus dissipetur. Varianda tamen erunt hujus generis præsidia pro partium varietate: una enim ventriculo, alia intestinis, alia articulis, alia partibus carnosissimis erunt applicanda. Ad colicam injiciuntur clysteres carminativi, proponuntur resolventes sacculi, & umbilico affiguntur cucurbitulæ: si extima, utimur totum, si intima, si præsertim divexet dolor. Relaxanda cutis, ut transpiret, oleo calattico, ut chamæmeli & liliorum. Immiscendum aliquod oleum cum inativum dissipans flatum, ut anisi, anethi, rutæ, lauri, cum aqua vitæ. Aut ex anetho, ruta, foliis & baccis lauri, florib. chamæmeli, anthos, sambuci, melilot. senambus anisi, fœnicul. danci, cumini, fiat decoctio in vino pro sotu partis inlata. Huic superponatur deinde emplastrum de baccis lauri; confectio de baccis lauri, tam injecta quam sunt præbenefacit.

Vel. ℥. Flor. camomill. melil. rorisin. rosarum rubr. ana p. j. absynth. hyssop. ana m. ij. coquantur in lixivio, addendo aceti parum, pro sotu cum spongia.

℥. Oleor. chamæmel, aneth. rutac. & lilior. ana ʒ j. olei laurin. ʒ ss. ceræ alb. ʒ vj. aq. vitæ ʒ j. liquefiant omnia simul & fiat linimentum quo liniantur partes præmissæ sotu.

Vel. ℥. Ol. rutæ, amygd. amarar. chamæmel. & aneth. ana ʒ j. vin. alb. ʒ iij. semin. anis. duci, fœnicul. cumin. ameos, rutæ, carui ana ʒ j. bulliant ad vini consumpt. & exprimantur, exprell. adde ceræ alb. q. s. fiat unguentum.

Vel. ℥. Ol. nard. aneth. de castor. ana ʒ iij. aq. vitæ ʒ i ss. pulv. radic. gentian. ʒ j. lilior. agrimon. calamenth. organ. ana ʒ ss. rubi tinctor. ʒ iij. scœnanth. mastich. ana ʒ i ss. spic. nard. croci an. ʒ iij. ceræ q. s. fiat unguentum.

Vel. ℥. Farin. fabar. & orob. ana ʒ iij. coquantur in decocto pulg. organ. calamenth. saliv. addico pulvere chamæmel. & melil. ana ʒ ss. sulphur. vivi subtiliter pulverisati ʒ ij. ol. chamæmel. & anethi ʒ i ss. f. cataplasma.

℥. Stercoris caprin. bene triturat. ʒ iij. flor. camomill. an. m. ʒ iij. furfur. farin. fabar. & orobi an. ʒ ij. coquantur cum lixivio communi addendo terebinth. ʒ iij. ol. aneth. & rutac. ana ʒ ij. f. emplastrum ad usum dictum.

Vel. ℥. Milii, vel avenæ ʒ i ss. salis ʒ j. folior. artenis. sampluc. rorisin. rutæ, ana m. j. semin. fœniculi, carui, cumin. baccar. laur. ana ʒ j. flor. stœcad. Arabic. anthos, calamenth. organ. ana p. j. omnia in sartagine torrefiant, & duo sæculi componantur qui generoso vino irrigati calentes vicissim applicentur, postea unum ex superscriptis unguentis adhibe. Emplastrum de ranis seu de Vigo cum Mercurio & line Mercurio in eam rem valde confert. Notandum vero ejusmodi medicamenta calida acio parti imponenda esse, eumque calorem continendum & renovandum, circumappositis luteis



linteris, lateribus, lagenis, similibusque rebus calentibus. Resolutis humore natuque qui in parte conclusi detinebantur, pars solvenda erit, ne subito limi em materiam vel excipiat, vel gignat, id nec totu & cataplasmate sequentibus.

℞. Nutum cupress. cortic. granat. sumac. berberis, balauil. ana ʒj. caud. equin. arnogloss. tapf. barbat. absynth. sal. rorism. lavendul. na m. h. nor. chamamel. melil. sol. rubr. anthos ana p. j. alumin. salis communis ana ʒj. bulliant omnia in aquis partibus aqu. fabrorum & vini aulteri, hanc saccu i pro totu cum spongia.

℞. Farin. fabar. hord. & lupinor. ana ʒij. tereb. communis ʒiij. pulv. rad. ireos nor. malich. ana ʒv. mellis comm. ʒij. ʒ. prædicia decoctionis q. s. f. cataplasma ad formam pucis satis liquæ, applicetur parti affectæ, calde præmissio totu. Ad inflationem genu.

℞. Læcis vera no. x, ex prælo, quæ propoleos dicitur ʒi. ʒ. micæ panis surfuracei ʒi. ʒ. rosar. rubr. ʒj. bulli ut in vino albo, deinde contunde & adde piperis, garyophylli, nucis myristicæ, zinziber. ana ʒij. ʒ. cumini, anisi, Fenicul. ameos ana ʒi. ʒ. ol. chamamel. aneth. rutæ, ana ʒij. fiat cataplasma.

Vel. ℞. S. ponis nigri, ol. aneth. chamam. & mellis commun. ana ʒij. misce applicetur parti affectæ. Potest etiam illi adhiberi vesicatorium & cantharidib. ac fermento & aceto confectum, aut cum sapone nigro: quidam locum illum leviter sc. rificant: quod si omnia hæc remedia nihil prolint, tumorque resolvi nolit, tunc is aut se ipello, aut cauterio, seu actuali, seu potenciali aperiendus est. Utilius autem est illum aperire cauterio, quo scilicet flatus consumitur. Huc adde quod illius evacuatione non sit celeriter, sed paulatim, faciliusque, quod volumus per scartham inde eliciamus, nisi in hydropicis, in quibus cauterio non est utendum, quippe ibi periculofo, propter maximam evacuationem quæ post scarthæ casum fieret: abscessus autem humore, qui non est semper planè statulentus, sed cum serositate aliqu. conjunctus, extracto & dissipato uicus mundatur, ut illud oedematum: Reliquum vero curationis in libro ulcerum reperietur.

Nata curativæ indicationes omnibus abscessibus communes dicuntur à Galeno esse, vel digerere, vel putrefacere, vel excindere rem contentam. Notandum autem curationem omnium abscessuum contineri in evacuatione materia, quæ vel est sensibilis, vel insensibilis. Insensibilis curatur digerentibus, sensibilis vero vel putre reddendo totum contentum, vel excindendo. Per putre reddere totum non intelligitur ut materia contenta putrescat, vel pus fiat suppurantibus medicamentis, sed ut eliquetur, exedaturque non solum materia, sed etiam folliculus. Hæc autem medicamenta quæ id efficiunt omnia sunt calida in quarto gradu. Igitur hic abscessus vel curatur digerentibus vel septicis seu exedentibus, vel excisione quæ ferro fit. Non tamen omnes abscessus curantur triplici illo modo, sed meliceris potest triplici ratione curari, quia continet materiam quæ concoqui potest: at Atheroma,

quia continet materiam crassam & densam non potest curari digerentibus, quia per diaphoretum seu habitum digeri non potest, sed curatur vel septicis vel excisione. Atheroma vero & nata, quæ continent materiam crassam respuunt curationem digerentium & septicorum. Igitur propter duritiem, latam basim, multitudinem sevi, tractandus est abscessus tantum excisione, quia medicamentorum vis sevo obtunditur, & multitudine ejusdem obviatur. Iam nulla purgatione patiens in lecto collocetur, si que Nata satis latam radicem habeat, pars ejus inferior, id est basis sive radix, satis arctè chorda ligetur. Deinde crucis instar incidatur, posteaque undique exorietur, & à partibus adjacentibus separetur, tandemque extrahatur. Alioquin verò vinculo non utuntur. Si verò magna hamorrhagia sequatur, ignitis ferramentis sistatur: nisi verò sit valde magna medicamentis ad hoc aptis sili potest. Cutis vero quæ superest ita excidenda ut labia se mutuo tanguant, nec se superequent ac superponant, deinde suto, si fieri potest: In reliquis verò ut in aliorum tumorum incisione diximus, curationem sequi debemus. Audacter scalpello separetur tunica, seu cystis & serum à periosio, ne aliqu. ndo revertatur abscessus, difficile enim vel curatur vel revertitur propter humorem crassum obduratum, & propter periosium quod reducit ad humidam intemperiem: Unde nec caro gigni, nec cicatrix potest induci; unde ne difficile curetur, nec revertatur, cum Actio lib. 15. separetur periosium, & dardatur os, quia materia est lata, & faciliè utrumque remollit. Deinde claudenda est cicatrix. Si verò Nata pendula sit, & angustam subtilemque basim ac radicem habeat, tunc excorianda non est, sed tota à basi rescindenda, vel ignito ferro vel non ignito: deinde quæ dolorem tollunt & sanguinem sistunt, si opus fuerit admoveantur, postea pars consolidetur & ad cicatricem perducatur. Si ægrotus respuat sektionem & reformidet ferrum, curandum est septicis, ut ærugine, squamma aris, chrysocolle, mysi, chalcitide, auripigmento, arsenico, sublimato; calce viva, atramento sutorio, lacte caprillo. His tamen non indifferenter utaris, verbi gratia, Septica erunt in corporibus durioribus, arsenicum, sublimatum, chrysocolle, calx viva, quæ in aliis naturis erunt caustica. Calx viva in pueris quidem est septicum, in adultis verò & robustis est tantum epuloticum. Medicamenta septica sunt.

℞. Calcis vivæ ʒi. ʒ. siccis vini combustæ, nitri ʒij. minii ʒj. lixivio teruntur & cum melle ad crassam substantiam deducuntur.

Vel. ℞. Squammæ aris ʒi. ʒ. sandarac. ʒij. cum melle rosato f. t. medicamentum.

Vel. ℞. Squammæ aris sandarac. semin. urtic. torrefact. an. q. s. cum melle rosato fiat medicamentum.

Vel. ℞. Erinaceorum combustorum, testæ sepiæ, auripigmenti, partes æquales cum melle rosato fiat medicamentum. Valet plurimum aqua fortis qua utuntur aurifices, in qua tingitur lignum, & eo perfricetur pars, exedat partem. Item valet illud ex lixivio fullonum in farragine cocto, donec crassefeat & murescat, deinde miscentur auripigmenti partes



v. atramenti futorii, iij.

Ad Lupiarum curationem quod attinet, certum est materiam istam resolutioni haud cedere, ut nec veræ suppurationi: hic igitur abscessus aperiendus est, quo evacuetur humor. Ut autem id feliciter fiat, tumoris magnitudo, situs & latitudo seu densitas, basis aut abscessus fundamentum considerabitur. Si tumor fuerit magnus, vasis maioribus proximus, aut in nervosa parte, ut in cervice, ubi sæpe ille nascitur, intactius relinquendus est, ob periculum quod inde consequetur. At si parvus est, in quacunque parte fuerit, resolvi potest eum comprimendo, frangendo tamen cystin, id est vesicam, seu folliculum quo involvitur, ut separetur hinc & illinc materia, & facilius ipsius naturæ beneficio, ut jam dictum est, discutiat & resolvatur. Quod si lupia eo sit in loco, in quo validam compressionem facere non licet, ut in facie, thorace, ventre, gula, apponetur emplastrum quod resolvendi vim habeat, quale est quod sequitur.

℞. Gummi ammoniaci. bdell. galban. ana ℥ iij. liqueant in aceto, & trajiciantur per serratulum, addendo ol. lilior. & laur. ana ℥ j. aquæ vitæ parum, pulveris ireos, salis ammoniac. sulphur. vivi vitriol. Rosæ. ana ℥ ss. incorporentur omnia simul & fiat emplastrum secundum artem. Sin lupia est mediocris, tolli potest incisione in crucis modum facta, in tumoris summo, membranam quidem qua tegitur & continetur minime incidendo, sed à cute ad radicem usque separando, quam solertissime fieri potest, radice tamen non excisa, sed constricta firmissimè ad vitandum impendens sanguinis profluvium, præcipue si ab ingenti aliquo vase longè non absit, quod ubi factum erit, accedendum ad ejus curationem quæ in libro de ulceribus tradetur. Quod si Lupia basin angustiore habet, infima illius pars commode liganda erit, non aperienda, nec secanda ullo modo: atque singulis diebus ligatura contrahenda, donec illius alimentum omnino pereat, ea autem uno duntaxat modo utiliter fiet, sed circumvolutione duplici, ut firmior sit, & facilius si quid erit opus abstringatur. Sin basis lata adeo fuerit ut sola ligatura, ad detrahendum illi alimentum non sufficiat, duplex facienda erit, acum duplici filo instructam per mediam basin trahendo, perque seu ima pars utrinque liganda, quumque ea deciderit, si quod ulcus restet, ad eum quem diximus modum curabitur.

Quoad universalia præsidia in ganglio adhibenda, id est ad victus rationem, humorum præparationem, evacuationem, ventriculi, hepatis capitique roborationem, eadem competunt quæ sup. capite de oedematis curatione fuere dicta. Quod ad topica, molliendi, eliquandi & discutiendi vini habentibus medicamentis uti debes, ut sunt infra scripta.

℞. Fol. sambuc. p. j. salis modicum, misce, & his ganglion fricetur tamdiu donec tabescat.

Vel ℞. Cerat. oxycroc. ℥ j. muccag. sem. alth. lini & fœnugr. ana ℥v. euphorb. sagapen. ammoniac. in aceto dissolut. ana ℥ iij. resin. ℥vj. ceræ albæ ℥ iij. fiat ceratum.

Vel ℞. Mucilag. alth. semin. lini, fœnugr.

ana ℥ x. ol. chamæmel. lilior. ireos ana ℥ i ss. ol. sambuc. ℥ j. coquantur ad mucilag. consumptionem, postea adde ammoniac. bdell. opopanax. sagapen. in aceto dissoluti. ana ℥vj. pingued. anatis & anseris ana ℥ ss. axungia suillæ veteris, & salis expertis ℥ iij. medull. cruris vitulin. & cerui ana ℥v. spuma maris ℥ ij. fiat unguentum, Is plerumque sentitur crebra partis frictione, & humoris hac illacque distractione, ut vi naturæ resolvatur. Ganglii quæ tendines, articulosque occupant terrum admoveere non convenit, sed tantum ammoniacum, & galbanum in aceto & aqua vitæ dissoluta admoveere, ut.

℞. Gummi ammoniac. & sagapen. ana ℥ j. coquantur sub cineribus calidis ad formam emplastri, sub finem adde sulphuris vivi subtiliter pulverisati ℥ ss. fiat emplastrum ad usum. Confectum etiam in eundem finem emplastrum de Vigo cum Mercurio duplicato. His remediis remollito tumore, atterendus tantisper venit, quoad sub digito cystis contusa indatur, quod ego non semel tantum fecitavi: mox laminam plumbeam argento vivo illitam fortiter ipsi apprimere, & advincire oportet, quæ quod superest tumoris consumat & tabefaciat. Vel apponatur verticulum plumbeum ut inquit Oribasius, simile illis quæ mulieres fufis appendunt, & vult hic Author, ut tumore ipso sit latius & arctè alligetur, quoniam pondere suo citius dissolvitur. Aetius superponit ammoniacum juxta ignem, ad cerati sive emplastri compagem emollitum, & postea applicat & superponit laminam plumbeam tumore æqualem, & ne hinc ac inde labatur, arctis vinculis constringitur. Visuntur nonnunquam ganglia exigua ex radice valde tenui velut pendentia: illa ergo vincula ab ipsa radice erunt comprehendenda & in dies fortius strigenda, quo usque decident. Curationis reliquum facile erit ex artis communibus regulis pericere. Si quando verrux, polypi, condylomata, & alia excrescentia filo contrahi possunt, privata alimento, sensim etiam contabescunt *anagallis* hoc genus remedii veteres appellarunt. *Joan. Vigierius Chirurgia lib. 1.*

In cura Ganglii nostro judicio eò incumbendum est, ut obstructions tollantur, ac succi viscosi ante omnia attenuentur, hinc præter interna volatilia & incidentia solis externis peragitur remediis, ut sunt spiritus lumbricorum, matricalis, vini camphor. item fofus & cataplasmata ex blandè resolventibus parata. Hisce vero nihil juvantibus, eò deveniendum est, ut extirpatio hujus instituat manu Chirurghi exercitati, quæ per sectionem fit, hinc Ganglion circa articulos vel alibi emergens tollitur vel concussionem aut digiti compressionem firmiore, seu manu fricetur vel valde comprimatur, usque dum incalefeat, molescat, & evanescat, & sic vi compressionis succi tumorem constituentes iterum quaquaversum protrudantur & quidem per tubulos; & ne recidivam patiantur ægri, ad succos porro attenuandos obstructionsque reliquas tollendas, ipsi tumori superimponatur lamina plumbea aut alia simplex Mercurio incrustata, & super hanc emplastrum tenaciter hærens, cum splenia compactione & deligatione arctiore, eoque quo

cystis



cystis rupta & materia intus contenta discussa fuerit, quod sæpe intra mensem & citius contingit: vel loco laminæ imponatur Emplastrum de ranis cum duplo Mercurii cum stricta ligatura, quæ impedit ne succi viscosi in consueta cavitare iterum ut ante cumulentur. In quem finem & Emplastrum nostrum de Thea egregium erit, item de Labdano, Divinum *Barberes*, Diaphoret. *Myns*. Alii liquid de emplastris his dictis, aut gummi saltem ammoniac. dissolutum tub forma emplastri laminæ plumbeæ supponunt, & facta decente deligatione eundem expectant effectum. Sequens linimentum Ganglii illitum a pluribus magni æstimatur.

℞. Ol. Linac. Lumbriæ, terrestr. ana 3 ij. lil. alb. chamomill. ana 3 i s. verb. tabac. sambuc. ana 5j. c. stor. 3ss. Quo linimento mane & vespere ritus Ganglii infecti & deturpati calide ulinatur, vel loco hujus lotus instituitur ex herb. absynth. Arthemis. origan. salv. grano juniper. in lixivio decocti. Item suffumigius utendum est ex gummosis aliisque discutientibus volatilibus. Sed breviori manu negotium hoc succedere videtur, si nempe pugni ictu duplici fortiore, membro super tabulam commode situato rumpatur capsula, quod vulgus imitari solet, tumorem versùs tabulæ apicem aliudve corpus solidius premendo, sicque pariter cystam ejus lacerando. Sed ubi Tumor altas jam egerit radices, & per annos duraverit aliquot, tunc ad præscriptum Celeberrimi Domini Muys ferula lignea haud differens ab illa, qua Præceptores in castigandis pueris utuntur, nisi quod plumbi portio in illius medio infusa jaceat, juvat, & talis ferulæ uno ictu, ægroti facie a manu affecta in dorsum versa, tumor rumpi solet. Quo remedii genere prælaudatus vir Ganglium per quadriennium patientem vexans evanescere vidit, cujus medella brevi per emplastrum & strictam ligaturam absoluta fuit. Qui a duro hoc cuncto abhorrent; ii uti possunt sequenti vel simili linimento.

℞. Ol. de lateribus 3j. ol. terebinth. 3 ij. ol. ceræ 3 ij. ol. camphor. gutt. v. ol. vitell. ovor. num. j. m. f. Linimentum. Quidam ex Chirurgis sunt, qui aperiunt Ganglia, & eaque per suppurationem sanare tentant. Alii Emplastrum Arsenicale extollunt, ac dein ictum pugni. Rarum est, quod Cl. *Myns* refert in *Podagricis* suo ex *Blascardo*, materiam Ganglii excidare exemptam instar crystalli apparuisse & satis duram, camque literas subjectas exhibuisse, multo majores quam erant revera, sic ut illud Ganglion tum temporis pro microscopio interserviat, quod tamen phenomenon non tam ejus pelluciditati, quam figuræ attribuendum existimo, quod facile experiri est, dum pupilla ex vitulo alioque animali exenta imponatur chartæ, literas videbis multo majores quam erant revera.

In Ganglio Ertmullerus folia sempervivi majoris, cui detracta sit inferior cuticula commendat, quæ imponantur quotidie, mane & vespere removendo, meliore jure applicatur lamina Saturni spir. vini, camphor. irrorata & adspersa euphorbio, quod Ganglia successivè dissipare aiunt, ut penitus tandem evanescant.

Quod Therapeiam affectuum reliquorum Tunicatorum Atheromatis, Meliceridis & Steato-

matidis attinet, cura fere eadem est, eorum enim sublatio fit per interna volatilia & fluiditatem succorum conciliantia remedia, ut sunt potus Theæ vel Caffæ more jam recepto calidè absorbendus, aliaque incidentia & Diaphoretica sæpius recensita. Cura verò insensibiliter peragitur per attenuantia & resolventia fortiora medicamenta, imprimis si tumores hi adhuc materiam fluidam contineant. Sensibiliter verò magis cura perficitur per Maturantia, Septica atque Sectionem. Inter Resolventia medicamenta primas tenent calx viva ejusque decoctum, spir. vini camphor. sp. matricar. cum aliis oleis aromaticis & gummosis mixta vel emplastra redacta, quæ sæpe post pugni ictum imponi possunt ad materiam melius resolvendam ex. gr.

℞. Gummi galban. ammoniac. styrac. calam. ana 3 ij. resin. pin. 3ss. ol. guajac. 5j. ol. ceræ 3ss. ol. philosoph. 3ss. pul. rad. bryon. 3j. m. f. l. a. emplastrum. Emplastrum nostrum de Thea, item de Labdano, de cicuta, de Tabaco, item Divinum, de ranis cum Mercurio de Galbano *Myns*. & Magneticum imprimis si quid camphoræ addatur, egregia sunt in resolvendis quibuscumque Tumoribus, præsertim in his Tunicatis. Vel in forma linimenti sequens vel simile præscribatur.

℞. Ung. Dialth. Martiat. ol. laurin. an. 3ss. ol. philosoph. 3 ij. ol. ceræ 3j. Tinctur. galban. 3j. sp. sal. armoniac. volatil. 3 ij. camphor. 3 ij. m. & illinatur, dein superius præscriptum applicetur emplastrum. Balsamus Peruv. item vapor à pyrite ignita exceptus, & oleum rubetarum à *barbette* laudantur. Quoad maturantia medicamenta asterisco notandum est, quod hisce cautè incedendum sit, ne, quemadmodum à potentioribus exsiccantibus durities redditur scirrhusa, maturantium fortioribus malignitatem cancerosam inducamus. Melius ergo mitioribus resolventibus ut empl. ex gummi. ammoniac. ol. succin. & pulv. rad. pyrethri mixto tumores hi discutuntur, mediante enim hoc remedio Tumorem tunicatum in maxilla ruptum fuisse testatur *Sennertus*. Caustica verò seu corrosiva medicamenta externa Tumores hos Tunicatos erodentia aliquando in usum vocantur, quæ cutem cum folliculo eorum abrodunt, sicque Tumores excavant, ea propter ea in Meliceride, Atheromate & Steatomate maxime conveniunt. Ex quorum erodentium seu causticorum classe uti cuti erodendæ applicandorum sunt lapis infernalis sive causticus officinarum, oleum vel butyrum antimonii, item vitriolum lunæ, vel quæ Eschara, quam illa induxerunt, remota, ipsum folliculum penitus erodiunt, inter quæ sunt viride æris, colchotar dulcis. Alum. ult. Mercurius sublimatus, & præcipitatus, ung. fuscum *Wurfi*, quibus tamen medicamentis eo allaborandum est, ut cum materia contenta omnis folliculi substantia auferatur, & ossa quoque, si his adhærescant tales humores, studiosè abradantur, alias Tumores hi in ulcera abeunt fistulosa, facileque repullulant. Chirurgica ac manualis curatio horum Tumorum Tunicatorum consistit in pugni ictu, prout superius in curatione Ganglii diximus, postea curari potest ut aliud ulcus. Caustico prius adoriendi, & cultro re-



liquia excindi possunt. Operatio ergo sequenti modo peragenda est: Incidatur cutis superposita ad formam crucis, & manu labris a Tumore separatis cyllis exini debet cum tota intus contenta materia, quæ interdum pinguedinis, mellis, pultis, interdum lapidis, vel calcis, vel etiam ceræ, vel glandulæ coctæ similitudinem habet, & si aliquid membræ remanserit, ad istam destruendam penicillum sp. sal. comm. imbui, & sic applicari potest.

Vel, ℞. Empl. diaphysphur. ʒ ij. ol. succin. ol. tartar. ana ʒ ij. & applica Tumorem Teuacatis, Lupix, aliisque.

Curatio Emphysematis consistit potissimum in removendis tubulorum obstructionibus, per interna Diaphoretica volatilia ac carminativa specifica, ut sunt sp. nitri dulcis, essent. carminativ. camomill. Rom. corr. aurant. menth. zedoar. arcan. dupl. sem. carminativa quæcumque, & ex eis parata spiritus & olea. Omnia enim aromatica hic egregia sunt, ut Tinctura cinnamomi, macis & sexcenta alia cum aq. foenicul. carmin. aliisque propinanda. In Juniorum gratiam esto sequens formula.

℞. Aq. tunicul. ʒ ij. carminat. ʒ j. flor. chamomill. ʒ i ʒ. essent. corr. aurant. ʒ ij. sp. nitri dulc. ʒ ʒ. Syr. flor. chamom. ʒvj. m. detur cochlearim. Vel detur per vices arcanum duplicatum a ʒ ʒ. ad ʒj. excellens in flatibus remedium, interponantur spiritus anisi, angel. matric. catarrhal. elix. vit. essent. bacc. lauri, Juniperi, spir. sal. armoniac. anisat. Ut & omnia reliqua salia volatilia oleosa conducunt. Solis enim sudoriferis internis curatur *Emphysema*. Externe in *Emphysemate* conducunt sacculi ex flor. chamomill. sambuc. sem. anis. &c. in vino cocti & tepide parti flatulentæ impositi, vel parentur ex herbis rutæ, scordi, malv. flor. chamomill. sem. cumin. carui, bacc. laur. juniper. sal. armoniac. tartar. &c. Ex quibus pro re nata parentur sotos vel epithemata vino Gallico vel lixivio incoquenda & calidè applicanda. Vel sequens.

℞. Aq. flor. sambuc. aq. calc. ana ʒ ij. spir. vini camphor. sp. matricar. angel. ana ʒ j. m. cum quadruplicatis linteis applicandum epithema. Ceratum de Cuminis, Empl. de bacc. laur. de Thea, de Labdano, carminat. Sylv. &c. optimo sæpe cum successu applicantur. Tumores hi flatuosi haud incidi aut ferro aperiri debent, Gangrana enim ac Sphacelus facile subsequi solent sed potius medicamentis idoneis cataplasmatibus, aliisque oleis chamomill. Philosophor. succin. carui, cumin. anis. &c. resolvendi ac discutiendi sunt. Conducunt etiam suffumigia ex carminativis ac gummosis resinosisque parata. *Joan. Valenti in Encyclop. Chirurg. rational.*

Atheroma, Steatoma, & Meliceris, quandoquidem Tumores sunt folliculis inclusi, vix nisi per manualet operationem curantur; sique inter operandum contingat, quod membrana rupta, aut tota non auferatur, Fistula fere, aut ulcus scædum remanet, quorum difficilis & tarda plerumque curatio. Curationis consilium tribus huc abscessuum generibus, Atheromati viz. Steatomati, & Meliceridi commune est, ut quod tunica illa continet discutiatur, aut medicamentis totum cum sua tuni-

ca exedatur, vel suppuretur, aut sectione auferatur. Triplici hac ratione Curatur Meliceris, utpote humorem continens liquidiorum. Sed Atheroma, humorem continens glutinosiorum, vel sectione tollitur, aut medicamentis exeditur seu suppuratur, atqui nunquam discutitur. Steatoma vero nec discutitur, nec exeditur aut suppurari potest; at sola manus opera, hoc est, sectione duntaxat curatur, quoniam hoc haud ab similibus materies nec resolvi, nec suppurari aut exedi, potest, semperque durior includitur tunica. Notandum quoque hujusmodi folliculis inclusos Tumores, si recentes sunt molles, & Resolvi, & Suppurari posse, duos vero & inveteratos sola Chirurgia Curari. Hinc diligenter in eo laborandum, ut singula differentia discernantur. Steatoma quippe durius est, resistitque tangenti, & basin habet solidiorum. Meliceris e contrario facile subdit, cedit in se compressa, leuteque diffilit, citò tamen revertitur. Atheroma est veluti medium inter utrumque extremum. Igitur hujusmodi tumor si mollis sit, Resolventibus erit tentanda Curatio, imposito scilicet emplastro Scilpicol aracelli, vel e Ranis cum Mercurio; vel mane diu fricetur Tumor digitis saliva hominis juni identidem madefactis, cui ratione salis volatilis & spirituum in ea abundantium vis attenuandi resolvendique copiosa inest; vel post Tumoris diuturnam frictionem illinatur *basilicum Peruvianum*, quo solo scribit Barbette se aliquando molliores hujusmodi tumores curasse.

Scultetus post *Armentum Chir. Observ. 66.* cum in linem valde laudat Ceratum Diasinapios, quo duas Melicerides resolvisse scribit, alteram in Humero, alteram in Genu, ovum anserinum sua magnitudine æquantem, quam tamen hoc solo Cerato mensis spatio integrè discussisse refert. Ceratum Diasinapios Aquapendens describit *Cap. de Meliceride*, & a spigilio correctum ita proponit Scultetus *Arment. Chirurg. Tab. 43.*

℞. Salis gemmæ, cerossæ, lythargiri an. ʒ iiij. Cera, terebinthinæ an. ʒ ij. Galbani, opopanaxcis, an. ʒ ʒ. pulver. semin. sinapi ʒ ij. olei veter. ʒ ix. aceti acerrimi q. s. M. F. S. A. Ceratum. Barbette hoc habet emplastrum.

℞. Gummi Sagapen. Ammoniac. an. ʒ ʒ. pulv. euphorb. rad. pyrethri an. ʒ ʒ. sulphuris ʒ ij. ol. succin. ʒ j. M. F. S. A. emplastrum. Alii laudant id quod sequitur.

℞. Pastularum majorum enucleatarum ʒ ʒ. Contundantur minutim in mortario, & addendo pulv. sem. cumin ʒ ij. salis nitri ʒ i ʒ. simul subigantur, & adhibeantur.

Alterum Curationis consilium est, ut Folliculi hi *Causis exedantur*: viz. Cauterium in medio imponatur Potentiale; aut si magnus sit Tumor multa simul admoveantur Cauteria, cumque Crusta deciderit immittantur in enicilli *Unguento Egyptiaco & Apostolorum illiti*, aut Melle cum Mercurio *Præcipitato*. Joan. de Vigo Mensis intra spatium omnes excrecentias indolenter erodit: Accipit anteorum unum detritorum & decerptorum ʒ ij. mequille panis albi ʒ ij. Sublimati tenuissime pulverisati ʒ j. Aquæ Rosarum & Plantaginis an. ʒ j. omnia simul coque in vase æneo ad consumptionem chartæ aut trium



aut trium partium; dein expressa linamenta exsiccent in furno mediocriter calido, quæ iterum dissecpta servat in vase bene operato ad usum, qualem ipse ita describit. Trium degenſivo vicia partes mutantur; deinde incus quod fecit i yroticum prædictis linamentis impleatur, supponatur unguentum de Tutia, vel de Cerussa; atque ita persiliendum, donec viva appareat caro, tum ulcus melle Rosaceo & Terebinthina mundandum, &c. Nonnulli Arsenico utuntur & Auripigmento, sed non nisi summo cum periculo ea utuntur, quia acris nimis sunt, præterque subjectas penitus erodunt. Non desunt quoque qui parva huiusmodi Tubercula transversim incidunt, moxque implent Alumine, aut Vitriolo uſto, quæ folliculum erodunt simul, & hæmorrhagiam sistunt, vel oleum aut spiritum Vitrioli cum l. lumaceolis applicant: Magna vero cruciatio trahitur duplici ratione, altero secundum longitudinem, altero per transversum. Si ad suppurationem tendant hi Tumores, quod tamen raro contingit, naturam Chirurgus adjuvet Maturantibus fortioribus.

At vero omnium tūtissima Curationis Methodus est, Tumores hosce per Sectionem & Separationem auferre. Fit autem hoc modo: Præmo tum ad lumen illuſire, tum ad Chirur-gum quam commodissime vel in Sella, vel in lecto collocandus est Pateriens; dein cramento signetur sectionis longitudo, quæ sit tanta, quanta est tumoris rotunditas, tum elevanda cutis, quæ incidenda vel simpliciter vel cruciatim, eaque postea circumquaque lato specillo, aut scalpelli manubriolo, aut indice digito separanda, donec integer Folliculus appareat, qui tum circa pedunculum resecandus est, simul cum vase tumori nutrimentum adferente, ne vel minima relinquatur folliculi portio, tumorque regeneretur. Quo in casu notat Joan. van. Horne in *Microtechnie*, prius arcu vasculum tumorem nutriendum esse ligandum, antequam resecetur. Hoc peracto, & folliculum postquam extraxit Chirurgus, vulneris labia sunt conjungenda Linteolis en platiceis in crucem appoſitis, &c. Quod si folliculus jam ruptus sit, aut per se, aut per Chirurgi negligentiam, tum necesse est, ut vel tumor revertatur, vel ulcus remaneat latum, & ferre incurabile, nisi Catharticis abſumatur folliculus. Pura de modo excidendi huiusmodi Tumores videri possunt apud Fabricium ab Aquapendente Operat. Chirurg. part. 2. lib. 1. cap. 16. & Scultetum Armament. Chirurg. Tabul. 35. Sed huiusmodi Tumor si ingentis sit magnitudinis, magnisque valis, arteriis putæ, venis, nervis, adhæreat, sinendus is est, aut saltem magna in excidendo requiritur industria. Ita refert Scultetus observ. 88. se in externa femoris parte Atheroma ovum gallinaceum magnitudine superans excisione curasse. Et scribit Petrus de Marchettis observ. Medico-Chirurg. 11. se Meliceridem majoris oculi anguli, ad pupillam usque protensam, illæso oculo, cum folliculo extirpasse. Atque observ. 24. & 25. duas non minus raras addit historias: alteram Atheromatis inferioris palpebræ, interna parte, prope angulum majorem oculi, ab ortu geniti, avellanæ mole, in puella quinque mensium, sectione extirpati

& sanati, alteram Meliceridis colli prope asperam arteriam, & venas jugulares externas, in cuius dissecto folliculo alius ejusdem generis tumor, sed minor delituit sua & ipse membrana conclusus. Haud minus rarum fuit Steatoma in dorſo circa finem vertebrarum colli, quod pondus librarum septem excedens, a Joanne Grifſonio Medico-Chirurgo feliciter extirpatum fuit: uti videre est apud Fabricium Hildanum Cent. 6. Obs. 16.

Cæterum Tunicatis hisce tumoribus propè accedere videntur Propenduli, qui non exciduntur, sed funditus amputantur; in Pusillissimi filo ad stuporem partis constricto & relicto, donec tumor decidat; in Animosi scalpello. Quod si post Tumoris Propenduli abscissionem, sanguis copiose profluat, aut aliquid de radice reliquat, ne recidiva fiat, locus candente ferro leviter tangatur, & escara ablata, cicatrice obducatur: vel id quod ex radice relictum est absumatur admotis Catharticis, uti Alumine uſto cum Mercurio præcipitato insperſo, vel Unguento Basiliconi admixto, sicque imposito, &c.

Magnus Flatusus Tumor periculosus est, ob sui magnitudinem, & partem affectam debili calore præditam. At parvi si sint huiusmodi Tumores, omnis periculi expertes merito censentur. Porro Hyeme frequentius, quam Aestate evenire solent. In Curatione generalibus circa Dietam, & intus sumenda medicamina roborantia ac evacuantia, præmissis, haud secus ac in Oedemate, partis læsæ meatus aperiendi, in eaque contenta Flatuscula materies attenuanda, discutienda, resolvenda. Quem in finem conducunt Calida, Siccantia, & Attenuantia, *Carminativa* dicta, ut apertis membri læsi poris humores Flatusque dissipari queant, verbi gratia.

℞. Herb. malv. menthæ, pulegii, rutæ, an. m. j. Flor. camomillæ m. 6. Summit. aneth. flor. rosar. rubr. an. m. j. Sem. cumini ʒ j. Bacc. lauri ʒ vj. Coq. in S. Q. Cerevisiæ tenuis, vel Aq. Part. Aq. puræ & vini Albi ad lb. iij. Colatura sit pro fomento. Egregios aliquando vidimus succellus in huiusmodi Tumore resolvendo solo Oleo Cucumeris Asinini illito. Potest tamen ejus loco fieri Linimentum, v. g.

℞. Olei cucumeris Asinini ʒ vj. Anethi, Rutæ an. ʒ ʒ. Nucis moschatæ express. ʒ i ʒ. Cumin. stillat. gutt. vj. misceantur. B. rberte Chirurg. part. 2. lib. 1. cap. 7. laudat hoc cataplasma.

℞. Fol. Rutæ, Calamenthæ an. m. 6. Farinæ Fabar. ʒ ij. sem. Anis. Cumin. an. ʒ ʒ. Baccar. laur. Salis comm. an. ʒ iij. Nutri, Sulphuris an. ʒ j. Stercoris caprilli ʒ vj. Olei Anethini, Nardini an. ʒ j. Vini alb. Gallici q. s. Coq. simul. S. A. & contund. in formam cataplasmat. Conducit quoque emplastrum de meliloto, de Ranis cum, aut sine mercurio.

Vel ℞. Emplastr. de melilot. de Ranis sine Mercurio an. ʒ j. Gummi. Galban. in aceto solut. ʒ ij ʒ. Pulv. castor. ʒ ij. olei Cumini stillat. gutt. vj. Ceræ & Terebinthiæ q. s. M. f. S. A. Emplastrum, extendendum in Corio. Sed notandum ejusmodi medicamenta actu calida præterea semper imponenda esse, caloremque conservandum appoſitis linteis, lateribus, lagenis, similibusque rebus calentibus. Veruntamen Genu



cum Flatuoso Tumore vehementer inflatum sit, nonnulli sequens commendant.

℞. Frcis Ceræ novæ ex prælo thib. Micæ Panis furfuracei thib. Florum Rosarum Rubr. ʒj. Bulliunt in vino albo, dein contundantur, & addendo Iiperis, Caryophyllorum, Nucis moschatae, zinziberis an. ʒijß. Sem. Cumini, Anisi, Foeniculi, Ammios an. ʒß. olei chamæmelini, Anethini, Rutacei an. ʒij. M. F. S. A. Catapl. fina. Platerus *Obs.* lib. 3. Tumore in Genu immensum, mollem, laxum, & diuturnum discussum, ac penitus curatum scribit imposito Cataplasmate ex Radicibus Bryoniz, Iridis, & Liliorum recentibus, simul contulis, atque in vino, addita etiam Aqua vitæ decoctis. Vel fiat Cataplasma ex rasura Radicis Raphani Rustici cum Aceto Rosaceo, quod calide apponatur. Magno quoque cum levamine inflato & tumido admodum Genu aliquando applicari iussi Vesicatorium magnum, ex Cantharidibus & Fermento acris, addito Aceto, confectum.

Ganglion Cheirurgia, hoc est, excisione raro curatur, præsertim si in quodam manus pedisque articulo situm sit: est namque, monente Paulo Aegineta lib. 6. cap. 39. periculum si quid illic excidatur, mutilum reddi illud membrum. Sed Ganglion ut tollatur, imponenda sunt molliendi, attenuandi, & discutendi vim habentia medicamenta, v. gr.

℞. Emplastri de meliloto, oxycrocei, de mucilaginis an. Part. Aequal. olei Petræ cantilluni M. F. S. A. emplastrum, extendendum in Corio.

℞. Gummi Galbani, Ammoniaci, Sagapeni in acet. solut. an. ʒijß. emplast. e Ranis cum duplicato mercurio ʒß. M. F. S. A. emplastrum.

℞. Gummi Ammoniaci, Sagapeni in acet. solut. an. ʒß. Liquefiant, hinc addendo Sulphuris Pulverisati ʒij. M. F. S. A. emplastrum. Eundem in finem conducit Gummi Ammoniacum, vel Galbanum in spiritu vini dissolutum, atque emplastri modo impositum. Vel imponatur emplastrum de Ranis cum Mercurio, & stricta satis ligatura, quæ impediatur, ne viscosi denuo humores affluere, cum aliis concreverint, sicque Ganglion augere queant. Felix Platerus laudat hoc cataplasmata, quo Ganglion pugni magnitudine in utroque Genu curavit, ut refert lib. 3. *Observationum*.

℞. Rad. Bryoniae, Iridis Nostrat. rec. an. thib. Liliorum alborum rec. ʒij. Coclis in Aceto fortissimo ad molliem, & in mortario minutim contulis, addit olei Liliorum alborum ʒij. Gummi Ammoniaci in spiritu vini soluti ʒij. Pulv. Rad. Iridis Florent. ʒij. M. & S. A. redigantur in formam emplastri seu Cataplasmatris. Cum igitur Remediis hisce emollitus sit Tumor, atterendus tantisper, quoad sub digito cyllis fringatur; mox lamina plumbea Argento vivo illita fortiter ipsi apprimatur, & advinciatur, quæ quod superest Tumoris tabefacere & consumere queat. Etiam crebra tantummodo tumoris Frictione, humorisque huc illuc distractione non raro sanatur Ganglion. Et scribit Antonius Chalmereus in *Enciclopedia Chirurgica*, se Ganglia in carpo existentia frequentem cum saliva frictione saepius curasse, absque aliorum medicamentorum usu.

Reinerus Solenander *Consil. Medicin.* 24. sequens commendat emplastrum.

℞. Emplastri oxycrocei ʒj. Gummi Ammoniac. Bdellii dissol. an. ʒij. Pulv. Rad. Irid. Florent. ʒj. Lunbricos terrestres vino lotos & dissolutos num. iij. Commixtis omnibus cum paucis oleo Terebinthinæ & Ceræ novæ F. S. A. Ceratum, quod extendatur in Corio, applicetur Tumori, & Fasciæ arcie constringatur. Tumore autem Cerati ope quodammodo emollito, addit; singulis quatuor quinque, sexve diebus soluta fasciæ, & ablato Cerato, Tumorem debere suffumigari suffitu aceti acerrimi, cui Satureia, Origanum, vel similia incocata sunt, affusi Pyritidi, vel Lapidum Molarium frustis cindentibus; dein absterfo sudore, compresso attritoque satis Tumori rursus Ceratum imponi. Tandem hisce aliquoties factis præcipit, ut tenuis Plumbi lamina arcie Ganglio illigetur, qua ulterius consumatur. Sin vero his modis Ganglion non cesserit, nonnulli volunt ferro resecandum & extirpandum esse; Quorum sententia tamen minime subscribimus, si in manus pedisque articulo existat, ob tendines aliasque partes nervosas ibidem facile læsuras. Sed potius sectione Tumorem aperiatur, atque viscoso educto humore, impositoque Balsamo Peruviano, aut Balsamo Sulphuris Terebinthinato, ulcus porro curetur. Jobus Mekeranus *Observ. Chirurg.* c. p. 60. prolixè docet, quomodo Ganglion in Carpo existens Contusione curari queat. Viz. manus plana mensa imponitur, hinc Cheirurgus manu in pugnum contracta bis terve Tumorem vehementer contundat, donec cyllis addatur, humorque contentus effundatur, qui dein continuo articuli motu, accedente insuper crebra partis affectæ frictione, facile resolvitur: præsertim si hoc vel simile linimentum frequenter inungatur.

℞. Olei Ceræ, Terebinthinæ an. ʒij. ol. philosophorum ʒvj. vitellum unius ovi M. F. S. A. linimentum.

Ad Curationem Lupiæ quod attinet: Materia hæc nec Resolutioni, nec veræ suppurationi facile cedit; sed ut humor evacuetur, tumor hic aperiendus est. Quod ut tuto ac feliciter fiat, humoris magnitudo, situs, latitudo seu densitas, denique & basis seu fundamentum consideretur. Si igitur magnus sit tumor, valis majoribus, partibusve nervosis ac tendinosis proximus, sinendus is est ob periculum, quod ex Apertione facile consequitur. At si parvus sit, in quacunque parte fuerit, sæpe resolvitur comprimendo, digitis saliva madefactis identidem fricando, frangendo tamen cyllum seu folliculum, quo includitur, ut hinc illinc effusus humor dispergatur, & dein naturæ ipsius beneficio discutatur, resolvaturque. Quod si Lupia in eo loco sit, in quo validè in compressionem facere non liceat, ut in Facie, Thorace, Ventre, Guttore, similibusve locis, emplastrum aliquod in Ganglii Curatione præscriptum apponatur, quod resolvendi vim habeat. Scribit Riverius in *Observ. communicatis à Dionysio Panare*. Lupias Resolutione curatas fuisse Folis Acerosæ charta madida involutis, & sub cineribus coctis, quæ potiusmodum cum cineribus per cribrum trajectis incorporabantur.



tur in formam cataplasmatum, calidè applicanda. Sin Lupia mediocris sit, neque in Articulo existat, tollatur excisione, ut Atheroma, Steatoma, vel Meliceris. Quod si basin habeat angustiores, intima illius pars ligetur, non aperiat, neque seletur; atque singulis diebus ligatura contringatur, donec amentum ei omnino detrahatur, sicque Lupia sponte decidat.

*J. Munnicks in Prax. Chirurgic.*

### Consultatio.

#### Pro Meliceride.

Triennium agitur, cum Illustriss. Palatino Polono tumor quidam suboritur fuit in anteriori parte sinistri femoris, doloris expertus, concolor, prementi digito cedens, nullo tamen relicto vestigio: qui in amplam adeo molem lentim excrevit, ut in præsentia ab inguine usque ad genu, illi humis adhærens, protuberet, mitat amplæ cucurbitæ, anteriori, & exteriori femoris parti appositæ; non sine manifesta motus cruris noxa; cuius causa variis ubique locorum consultis Medicis meam nunc quoque exposcit sententiam, cum de præsentis ætæ ætæ essentia, & natura, tum de medicis præstidii huic extirpando in usum revocandis. Quod Illustrissimi, & generosissimi Herois mandatis morem gerens, pro virili aggredior; quo eventus ipsius, & curationis ratio constet. Est autem hic tumor morbus in ætate magnitudine, lædens nexionem cruris, a pituita ortum ducens; hoc indicio, quod nullo dolore sit molestus, atque cuti sit concolor: quæ tamen pituita naturalis non est, cum non sit œdematolus, presso digito cedens, sed præter naturam, non ex permixtione humorum heterogeneorum, sed ex conversione potius propriæ substantiæ in alienam; non quidem fluctuantem, in quam non raro facessere solet, ex Galeno; neque enim tandiu durasset affectus cum tanto ponderis sensu; minus longè in ferulam, & aquosam, particularis hydropis eam; tunc enim pelluceret cutis, tumor esset adeo expansus, sine fluctuatione; quinimo in corporis erectione pars tumida præ aquæ pondere ad interiora procumberet. fuerit itaque pituita tenuior, & fluida in lentam, viscidam, tenacem, statulentæ, & serosâ immixtam, conversa; cuius ratione tumor hic accendendus est tumoribus illis, quos Antiquiores Abscessus: Recentiorum vero barbarorum aliqui Arbum interpretes, exiturus vocant, genitas ex humoribus, & aliis excrementis heterogeneis folliculo conclusis: quorum triplex est genus, Meliceris, Steatoma, & Atheroma; quibus Recentiores addunt Testudinem, Lupiam, & Nattam, seu Napram, & Strumam. Qui quidem tumor struma non est, glandularum propriæ; Non Testudo, seu Talpa, capiti famulans; non Napta; cum hæc sit tumor carnis instar, durus, prementi digito non cedens; cuius generis præiens non est, quippe qui cedit, & est mollis; atque ideo neque Steatoma, neque Atheroma, sed meliceris censendus, illi non absimilis, quem Ambrosius Paræus Lupiam vocavit. 6. de Tumoribus præter naturam qui aliquando partibus adhæret fir-

mius, inquit ille: aliquando verò mobilis est; semper tamen venas habet exiles quidem in principio: processu vero temporis ampliores, quale nunc observamus: qui proinde abscessus est ex tenui pituita ortus, serosâ & statulentâ immixta: a cerebro, ventriculo, & venoso genere sensim eo transmissa, ac cysti seu folliculo conclusa, parti affectæ adhærens. Ex his patet, quis hunc affectum maneat eventus, cum consensu præstantissimorum virorum, quibus & ego accedo, sit insanabilis: quippe qui discuti non possit, cum ob ejus amplam molem, tum ob fluxionis periculum, quod à localium calidiorum usu impendat, quorum ope resolvendus est, neque evacuari patefacto abscessu, & suppurata materia; metu scilicet ulceris, quod inmedicabile evaderet ex fluxione continua, & fortè cancrum. Neque radicibus extirpari poterit, absque enormi sanguinis profluvio, ob venarum copiam & amplitudinem, non sine vitæ præsentis discrimine in ipsa operatione. *Benedict. Silvatic. Consil. & Respons. medic. Cent. 4.*

### Observationes.

#### Atheroma.

In genu sinistro 12. jam annos gestaverat tumor folliculi luforii minoris magnitudinem æquans I. r. Stephanus à Calatio Capucinus, vir qui nra in Deum pietatis, vel hoc argumento cognoscendus, quod cum letheseram hunc in articulo dissectionem celebratissimi Medici viro omnes ore pronunciasent: nihilominus hic tandiu privatus ea, quæ solo dehis utrisque genibus fieri consuevit à Sodalibus sancti Nummi adoratione frequenti: facultatem hanc etiam cum tormento at discrimine vitæ maluit consequi, quam officio suo cedere, ac sanctarum exercitationum carere fructibus. Hujus igitur viri, tam pro desiderio gratificatus; cunctis ex ordine provisus, præcautisque his, quæ curationis cursum interturbare possent: rem instituto cominus, acuto scalpello cutem ample, quæ maxime extabat, infeco, dividique quoad pateret membranam. Quæ subsecta circum, tandem in manus venit, & media dissecata sanem reddidit subnigram foris vini subtilitri, cartilagineis ferme crustis internè oblitâ. Quæ cavitas quidem, & externa aliqua parte caruncule putres, & boleti formam referentes extupesciebant. In universum erat membrana uteri chorii modo densa, dura, crassa, quæ postquam est detergi ministri manu, vellere intarcta, & ad caminum deposita, vendicata jam a putredine talis apud me ad hanc diem asservatur. Chirurgiam ferme nihil infecutum est mali, nisi si paucum effusum sanguinem admemoraveris. Atque hæc de primo illo excisionis actu; ceterum quod ad reliquam curationem pertinet; in ulcere medicamentis primum digerentibus, mox expurgantibus rite percurato; paulatim accreta caro vacuum orbem implevit, sanatusque est homo 40. dierum spatium sine ulla incensus offensa Deo bene favente: cui quidem auctori medicationis omnis felicitas accepta esto.



Neapoli urbe cunctis artibus bonisque florentissima ex honesta Coppularum familia juvenis fuit, ac modo est, cui Liberio nomen, ortum huic 16. jam annis super lævam mammam tuberculum principio pusillum pili instar, quod singulos in annos aggeratum tandem excreverit in ovi gallinacei magnitudinem, concolor, mobile, æquale, durissimum, dolorem non inferens, nisi cum vehementer premeretur, toto decennio sollicitè chirurgicos, qui sunt in urbe omnes consuluit, requisivitque de tollendo vitio. Respondere alii, nihil ut adhibens rem naturæ committeret: quippe vitium irritare periculosum. Alii vel ut balsamato, vel appensa plumbea lamina excuteretur. Nulius e plerisque in multis chirurgiæ meminit, quam nemo non ex auctoribus hujus disciplinæ proponit. Venum me, ac sex e principibus medicis congregat domi, singuli, ut diceremus sententiam: scirrhum dixerunt quidam: quidam occultum cancerum, qui tentandus non esset. ad Hippocratis sententiam 38. aphor. lib. 6. Tertii quidam Emphysema absurda quadam opinione: scirrhum œdematosum pronunciarere plurimi. Ego atque alter quidam, qui sententiam in eam a consulente resciverat, scirrhoma pronunciamus. Consensere in id omnes, ut medicamentis tractaretur, chirurgiæ valere iussa. Ego contra chirurgiæ certum, atque unicum in hac re præsidium, ut professus fueram semper: ita & in dictione mea peroravi. Refutaverunt omnes curandi genus, adhæsitque homo alteri sententiæ, ut quæ leniora proponeret, verumtamen fatigatus diu remediis, victu tenui, sudoribus, decoct. sarsaparill. fonticulis; neque aliquid allequutus ex his, nisi longa laborum tædia, venit ad me festinè, succurretem: vitam odisse se præ noxa illa corporis. Tantum ne quid ferro agerem, certum se pati quidquid oporteret. Breviter: pyrotico cutem aperui, patuit cystis pusculis ovi modo candidans, quæ dissecta promptum fuit mere putridam foetidam, atque atrocerè coctæ modo laminosam, sed crusta referentem substantiam late complentem infarctum suo amplexum omnem folliculi. Labor fuit in eximendis membranis fibris, quæ radicum instar hærebant: quibus tamen extirpatis, dies circiter quadraginta finita curatio est. Hæere autem abscessus hujusmodi anomalos plerumque nerveis & cartilagineis fibris observationes testantur, qualem contigit observasse. liquendo in pedis digito medio, quales etiam fuere observata fibræ in abscessu Marini Caputi Vicarii, Archidiaconi vici Equensis viri spectatissimi: Similiter cartilaginearum fibrarum in abscessu respectarum exemplum habes in R. P. D. Andrea Cancellero Cartusiano Monacho probatissimo, cujus rei historiam ab amico fidelissimè conscriptam, huic nostro de abscessibus anomalis tractatui mittere placuit; est autem ex autographo talis.

Quam lepidè abs te compelli videor, Clarissime Simon, quam urbane, parum abest, quin dixerim ridiculè: sic revocasti ejectas jam pridem e domo tua philosophica argutas Curialium nugæ; quarum quanto major, & religiosior in hoc sœcuto seculo cultus, eo periculosior est usus, magno cum ingenuitatis oppro-

brio. Quid agis cum rythmicis istis alloquiis? amicum, qualem me nosti, stoicum & rigidum (ut tua tibi regeram verba) rogas, precaris, blandimentis excitas? Me fatuum hominem tinguere, te Logodædalon, quo utroque vitio, sicuti revera vacamus ambo, ita cynice, ac libere effando, uterque nostrum, tui etiam suspitione liber est. Amicitia quidem sicuti animorum nexum facit, ita & bonorum omnium communionem. An fortasse nostræ Eutopiæ mores oblitus es; an amicitia transfuga videri vis? Absit. Quid igitur precario postulare, quod jure tuo tuum est? tua sunt mea studia, tui laborum meorum, si quis sunt, fructus, siquidem quod vivo, & spiro tuum est. Hac igitur eadem epistola nobilem illam, quam tam anxie efflagitasti, curationis ostracoli tumoris, a nostra ætatis Chirone, Doctissimo inquam M. Aurelio Severino magno naturæ mystæ confectæ descriptam habebis, utinam tam erudite, quam vere: potero siquidem oculatus testis de re integra fidem facere, qui tunc temporis Chartusianorum hospes vixerim, quorum ut singularis est in bonarum artium, & in usarum affectus studium & propensio, ita liberalitas ac munificentia compotem reddidit, ut cuncta exactissime adnotarem. Feracia sunt (ut hinc exordiar) Chartusianorum corpora, malorum complurium & tartaro ortum ducentium (tolera interim verbum hoc Paracelsæum) sed tumorum in articulis excrecentium terrore: an ob strictam vivendi regulam, qua carnibus & nepejus, & angue abstinent? An ob nonnullarum vigiliarum frequentiam, in quibus Deo psallunt diutissime recti, vel incurvi, leuentes nunquam; laboraverat pertinacissimè medicinæ in dextro genu R. P. D. Dionysius Coccia Cœnobita severiori vitæ addictus in clauetro, cui post aliorum Medicorum audibita, auxiliares manus Severinus ipse dederat eventum iocundissimum, cum V. P. D. Andreas Cancellarius alere se etiam in dextero genu tumorem non spernendæ magnitudinis, cujus natalia ab anno 1631. numerabat; veluti per jocum affirmavit: sphericus is erat, cujus ambitus sesquipalmaris fuit mensura comprehendebatur, omnino indolens, solo pondere religioso viro molestinus, ut provide mollium, & inermium Chirurgorum, quibus nunc Neapolis abundat, timiditate evitatus, nihil de illo extirpando cogitaret, quidquid Clarissimus Severinus pronunciatet de corruptionis periculo. Indulgit igitur proprio genio natura, sensimque & furtim molem illam adauxit adeo, ut operis veluti sumptuosi postmodum pertæsa, ceperit orbis, quem tam sedulo construxerat, ruinam moliri. Accersita igitur fermentatione magno illo separationis instrumento calore & robore, & dolorem etiam aliquem in sui auxilium convocavit, pusillum vero nullum, ob arteriarum defectum, quibus merito carent hujusmodi tumores Doctissimi Duretii sententiâ, ubi hæc urgere coeperunt, coepit etiam Chartusianus suæ salutis integritatem desiderare, ac medicorum conventui adire, ut præsentaneo, sed leni aliquo remedio sævienti morbo obviam iret. Dilexit ergo ad compositos illos & numeros Chirurgos, à quibus, ut pingues aliquas inuentionis imperavit, ita pinguem iniquitatem hostem reddi-



dit: adeo ut circa Februarii finem, anni 1640. pustulis aliquibus in tumore apparentibus ob vim adhaerentem intus corruptionis inceperit in eo floridus color occidere, & tenebrae ex inferiori Limbo obrepere sursum, & corpus molis totum febris inclementum sumpsit, stipata suis afflictiis lumborum gravedine, Stomachi debilitate, virium lapsu. Interim excavato foramine ab ardenicali intus congesto excremento in superiori parte materia ab illo emanavit, coloris quidem faeci vini similis, sed odoris adeo horribilis, & ut ita dicam, pestiferi, ut etiam adstantibus & ipsis Medicis statim atque in cubiculum ingrediebantur, aliqui peregrinis suffragiis odoratum, nauseam, & capitis dolorem excitaret. Cutis in nigrum abiit ex aliqua parte insensilis. Tunc serior res suas agi animadvertit religiosissimus Pater, ac se ab inguentibus Medicis delusum, sicuti ingenie ab Excellentissimo Severino prae-munitum agnovit. Interim R. Prior Joan. Baptista Aslanus incomparabilis in luos pietatis, & zeli acciri Medicorum consilium voluit, in quo sex capita disceptavere, ut Neopoli mos est ad pompam; triquetrum enim tempus est trium horarum in exquirendis & conciliandis Galeni locis: quandoquidem in variis sententiis itum est; putantibus aliis steatoma, aliis meliceridem esse, cum tamen Excell. Severinus demonstrasset intumescere esse abscessum, de quo aliqua obiter Galen. 14. meth. post carbunculi curam: quod postea confirmavit eventus. Conclufum tandem a Senioribus, de agro jam conclamatum esse, futurumque ut degeneret in gangraenam in sphacelum cito mors adhaeret toribus, vel minimo minus etiam ob alias causas agrum lenta tabe liquatum iri. Praescripta sunt putida illa Arabum cordialia ad spiritum vinum confirmandam, quae si postero die aliquo pacto restituta visa fuisset, poterat de foramine aperiendo e diametro prioris respondente cogitari. His medicorum conventus solutus est sub vespertinam diei quinti Martii, in cuius nocte subsequente efficacissime operante erat plasmate ad interceptum gangraenae motum a Severino praescripto; praeter aliquorum Medicorum spem remissa est febris, & symptomata leviora apparuerunt, supererat ex Medicorum consilio loranthinis apertio, de qua cum Clarissimus Severinus, tanquam inefficaci praesidio iustis de causis etiam difficili male sentiret: coram Reverendissimo Priore prius causam bene retexta, agro assentiente magna cum promptitudine, atque animi alacritate decrevit, postero die regularem curam potentibus auxiliis inchoare. Mane igitur octavi diei Martii causticum, haud quidem ad planum femoris, sed superius ad duorum digitorum transversorum altitudinem tori tumorem circumduxit, quod intra paucas horas egregiam operam praestitit, adeo ut die decimae materia extracta fuerint crustae ad daleri crassitatem excavato circumcirca vallo, quod sericeo filo per ligneum vectriculum constrictum ad diem usque decimum sextum tandem novacula omnino exaequatum est exciso globuli tumoris superiori hemisphaerio, interiori candente terro pluries adusto, sic nulla subsecuta est haemorrhagia; doloresque, adhibita prope genu quantum ferre potuit, calidissima testa cum

adstantium omnium admiratione sedari sunt, pendit amputatum culmen uncias quatuordecim. atque in ostr. cosa carnis illius medio, quae nova ulx aescem obtundere potuit, observatus est sinus inaequalis, & cavitas minor quidem quam putabatur, ex proportionem magnitudinis, in quo simul et foetidissimum illud virus. Constitit post recessionem, tumori non fuisse folliculum, ex quo Severini sententia triumphavit. Verum enim verò fuit inter Ministros chirurgus, qui subtilius rem disquisiverat, putans exactiori sua acri via se reperturum latere quicquam proportionale cysti, sed utcumque allaboraverit praeter ostr. colam carnem, quae variis libris intertexta erat, ac veluti inaequalibus corticibus composita, nihil aliud notare potuit curiosus ille anatomicus; octiduo autem elapso ab hac prima operatione ex frequenti, & efficaci illitu saturmini butyri, & aliorum emollientium separata est a viva carne crusta digitalis crassitudinis. Interim bene se habente agro in omnibus vivido suo naturali colore perfuso, & superflite succulentia illa habitus, qui naturaliter praeditus is erat: Capimus de tam felici eventu omnes latari, & rem in tuto positam, beneque peractam existimare: Verum Clarissimus Severinus in subitus derelicta tumoris parte syrtes latere, hoc est, graves difficultates, & pericula mustitabat; nimirum terri se ipsum, aiebat ingenue per rebellem illam duritiem in tumoris radice hematam; adversus quam etiam validissima caustica scilicet robur suum ostendebant. Verum nihil non cadendum tamen animo suadebat: deprompturum se efficacis Chirurgiae suae arma, quibus omnino futurum erat, ut caderet hostis. Vicissim ergo nunc causticis solidis, nunc liquidis, nunc actuali igne nostri seculi Hercules Lernae Hydra tentavit, at illa sui officii haud immemor cum supra os patellae jam deventum esset, ex rimis, in quibus tendones vel ad invicem, vel cum osse coeunt, vel unius noctis spatio fungosa capita emittebat, contra quae etiam Hermeticorum illa Draconum spuma hebes videbatur. Sed tamen excogitavit Clarissimus Vir malo nodo, malum cuneum; ac liquore quodam, cuius nunc compositionem non scribo, superfuso & agitato, & spongiosa illa carne glutinosum humorem emungebat prius, inde arcano suo albo praecipitato desuper adperso saepius crustulas extraxit; tandem ad operis compendium ignito auro radicitus reuascentem bestiam occidit; adeo ut non amplius pullularent capita. Delectus ex parte tendo latus est, ac non sine admiratione observatum est, ostr. cosa carnem, & fungos intra tendonum fibras radices habuisse, & in medio patellae omnino labem ad os usque pertigisse: unde opus desquamationi vacare, quam egregie praestitit extractum Aristolochiae rotundae, euphorbii aequa portione commixta. Huiusmodi laboribus Aprilis & Majus menses insumpti, ac jam ulcus ad daleri magnitudinem, quod in prima sectione diametro spithamae mensurabatur devenerat: curabatur autem emplastro styptico Paracelsi, cum sub nocte D. Joann. cuius festum est. Junii celebramus; descendens ager lecto scipione non bene firmo innixus in pavimentum toto corpore



corpore illisit, ac genu affecto pręcipue  
 & discissa sunt ulceris labra, & fluxione cecidit  
 ta recruduit ex parte malum; adeo, ut  
 dandum pertinacissimę fuerit usque ad vin-  
 nam Augusti, qua die jam otii pertasus  
 suę ipsius salutis bene conscius Religiosus  
 vir ē Monasterio D. Martini ad officium  
 discessit, qui vivit nunc Paneraticę monas-  
 tio impedimento notatus; Cum Martino  
 saepe dietitans, non pejus esse ab uno  
 morti addici, quam a centum medici  
 est ipsissima curationis Historia. Utinan-  
 amice, egregia illa Severini facinora, qui  
 exteros gloriam, ita apud Neapolitanam  
 diam nunc excitassent, qua via torpe-  
 quam facino videtur Clarissimus vir  
 grato mundo bona communicanda  
 cum litterarum, & Hippocraticę Me-  
 trimento, cujus alioquin reparator  
 Ceterum tibi librorum helluoni, qui  
 os ingeram non habeo; nam ut no-  
 cum Scaligero dicam, Italiz non  
 turz, & forensium librorum charra-  
 tur, at felicissima illa Germanorum  
 ob Martis strepitus quiescunt, vel  
 non transmittunt, licet ad miri-  
 quam satis laudata ingenia te  
 bellorum turbines, & literas  
 in medicina exornanda defudent  
 quibus sicuti gratias pro tanto op-  
 ita Italicz glorię memores invidi-  
 sumus. Vale, vir clarissime, qui  
 leris unice, ita fac, ut abs te  
 Neapoli nonis Januarii, Anno  
 rel. Severin. de recond. absce.

Puellam quinque mensium  
 tu genitum fuit tuberculum  
 diue, parte interna palpebra  
 angulum majorem oculi, qui  
 mensium avellanz molem  
 tumorum, quos narras vultu  
 quidem carneus erat, ten-  
 tus; quem propterea secum  
 cum effluxu sanguinis ad  
 fuit suppressus bolo armeni-  
 nis, oviq; albumine, cu-  
 simis, cui postmodum  
 ceam cum ovi albumine  
 armena in pollinem red-  
 dierum fuit sanata agri-  
 colum. *Petrus de Sala*  
*Chirurg.*

Anno 1666. Legioni  
 xagen riuus strenuus  
 reanus, nomine  
 erupit atheroma  
 nam vergens, quod  
 excrevit molem  
 nem excederet  
 prohibere non  
 putrefactionem  
 ad basim se ex-  
 culose hamo  
 sapius ad duos  
 animo linque-  
 nem quam  
 to itaque cor-  
 cripta diata  
 quod sapius



Unctio Ganglion habebat in  
 longitudine, intra oculum supra  
 intra mensum discidium est,  
 tumbea hydrargyro illita &  
 ut melius haereret: eaque su-  
 orta, una cum emplastro, sple-  
 num superimponebam, deinde  
 quæ semphalera à Galeno no-  
 minis *Ung. 16.*

Item tumorem frontis passa est, quem  
 subsequutus est, ante quindecim  
 annos tumor obortus est magnitudi-  
 nis, sed mobilis, nuncque dole-  
 batur, nunc minuebatur, nunc  
 sic per longum tempus cum ma-  
 gno permanit: curatus tandem  
 cum rutz succo mixta admotione,  
 una appositis. *Petrus Borellus. Obs. 5.*

Et sedecim annos natus conquere-  
 re dure, indolenteque, qui, in  
 dextera parte situs, mole sua  
 illam adæquabat, eratque ejus-  
 dem sana coloris; atque jam tertius  
 ex quo æger post laborem consue-  
 rit in hoc malo affectus est. Jacebat  
 ille in superna manus parte, cujus  
 in uero labore ita distorquebantur,  
 in circulatione multas obstruccio-  
 nes, staculo offendentes, stagnarent in  
 tendinis, tandemque ab humoribus à  
 sequentibus propellerentur usque ad  
 iam illam, quæ tendinem investit, ubi,  
 a sibi cavitare, colligebantur & con-  
 stant aliquatenus particulæ viscosiores,  
 illis interim abeuntibus, & sic exortus  
 tor, de quo hic ago, & qui ganglii no-  
 mine appellatur. Ego pollice ma-  
 neu tumorem hunc validè latis compressi,  
 ut hoc pacto extemplo evanescere vidi,  
 scilicet vi compressionis humores tumo-  
 r constituentes protrudebantur iterum qua-  
 versum per tubulos tendinis; sed quia ob-  
 struções sic nondum sublatae erant, ideo re-  
 lidix formidine tenebar, quapropter ad hu-  
 mores viscosos attenuandos & obstruções  
 quas tollendas imposui emplastrum de ra-  
 nis cum Mercurio, & strictam latis ligaturam,  
 quæ impediebat, ne humores viscosi in con-  
 sueta cavitare iterum, ut ante, congregaren-  
 tur. Sed ubi tumor hic jam per aliquot annos  
 duravit, tunc à pollice comprimente tolli non  
 potest, sed adhibenda est ferula lignea, non  
 dinerens ab illa, qua præceptores in casti-  
 gendis pueris utuntur, nisi quod plumbi por-  
 tio in illius medio infusa jaceat; & talis ferula  
 unico ictu, ægroti facie à manu affecta in dor-  
 sum aversa, prorsus evanescere vidi ganglium,  
 quod per quadriennium patientem vexaverat,  
 cuius medela tunc brevi per emplastrum hic ci-  
 tatum & strictam ligaturam absoluta fuit. *Joan.  
 Muys in Prax. Chirurg. ration.*

### ATROPHIA.

**A**trophia quam si latine recedere liceret in-  
 nutritionem diceremus, est morbus quò

ad  
 uni-  
 tu-  
 npla-  
 ntb. li-  
 ontund.  
 guum.  
 rad.ireos  
 et vel cata-  
 emplastrum  
 um nentium,  
 s, adeo ut in-  
 amen nullum fere  
 dat. Felix Plate-



pro insanabili destitutum de poplite pendulum excidimus Reverendo cuidam e Carmelitis novae formae sodalibus Sacerdoti, cui nomen Eugenio Callefano Hispano Madritensi pro insanabili tot annos a medicis permultis Europaeis destitutum, qui ponderis, quo fere deiciebatur, impatiens multa se mihi prece, atque obsecratione curandum commiserat: curavique secta ample cute, ac tubere cystico circumquaque resolutum, mox ulcere repurgato, & intra 40. dies obducto: interventibus ad eam rem Adamo Marchio Medico perdocto, Francisco Mosca, Francisco Romano, & Bartholomaeo Calova in nostro Incurabilium Nosocomio Chirurgis assiduis, ac multos annos exercitis.

Gratiae de Philippis virginis Deo sacrae in Caenobio Jesu Neapoli spectante Mario Schipano viro quidem non sine honore nominando, executum est per me sub jugulum steatoma, quod scilicet pendebat: abscessus, qui sex jam annos nullo medicamentorum tractu continenter crescens sacram feminam perpetuo torserat ac pene jugulaverat. *Marc. Aurel. Severin. de recend. abscess. natur.*

Cuidam sexaginta circiter annorum, Jean Girau de la Tour nomine, robustissimo & optimo corporis habitu praedito viro. in ipso dorso, circa tuum vertebrarum colli, paulatim steatoma in tantam molem excreverat, ut molestum esset xgro onus hocce quamvis indolens, veluti colicicum, amplius gellare: quapropter ut ab ipso liberari posset, expertorum Medicorum & Chirurgorum auxilia imploravit. Vivebat autem eodem tempore Lausannae egregius quidam ac excellentissimus Medico-Chirurgus, Joannes Grissonius, olim praceptor meus fidelissimus, qui cum vocatus & ab xgro & ab adstantibus suppliciter rogatus fuisset, ut manum adhibere veliet, curationem hoc modo aggressus est. Primo optimam victus rationem instituit, & ut a vino omnibusque cibis potentia calidis, ad tempus quoddam ante operationem plane abstinere, iussit. Interim apozenata & purgata exhibuit, venamque secuit. Sic satis praeparato corpore, cutem ad radicem tumoris ad subjectam carnem usque circumcirca tumorem incidit. Postea totam illam partem tumoris, quae spinam versus tendebat, cum sua membrana unguibus separavit, & integrè extraxit, & mox quae haemorrhagiam cohibent, vulnere; quod maximum erat, applicuit: deinde illud more aliorum vulnere feliciter sanavit. Iuxta operationem, trutinata excrecentia pondus librarum septem excedere reperta est. Vixit homo iste per multos annos sine ullo incommodo. *Guilielm. Fabric. Hildan. Observ. Chirurgic. Centur. 6.*

Elisabetha S. ex Palatinatu, ætatis præterpropter annorum quinquaginta, steatoma prægrande per annos fere sexdecim gestarat, abscissionem huius ponderosi oneris expetiit, quæ & anno 1659. die 21. Februarii Ratisbonæ, praesentibus tribus Medicis à Davide Schaffnero, lithotomo & Chirurgo Augustano, feliciter peracta, cæterisque rite adplicatis, ab hoc molestissimo comite penitus illa liberata, nec quidquam ejusmodi hactenus illi recrevit, seseque optime habuit, cuncta munia sua libere obiens. Steatoma hoc in podice lateris dextri non longè ab

ischia de excreverat, magnitudine caput viri robustissimi exsuperans, librarum pondere facile decem. *D. Jo. Hieron. Fierlingi.*

Vetula erat rustica sexagenaria cursoris plerumque operis destinata; hæc a plurimis annis in Lere super costis spuris tumorem aiebat puerili capite majorem, qui cum non tantum cursori pedumque velocitati, qua alias pollebat, officeret, sed & identidem Erysipellate afficeretur, magnopere laboravit ut at nonerosa mole liberaretur. Increbuerat torte tanta B. Affinem meum D. Langelottum Chirurgia felicis specimina aliquot jam tum edidisse; itaque mulier fidens animi ad eum se contexit, ut manus beneficium exoratur. Annis tumoris magnitudine, diviteque venarum, & in grandium, copia exterritus meum quoque poscit consilium; ibi ego in tam ampla tumoris radice, & venarum tum magnitudine tum copia periculum, quod putabam, prospiciens, curam dissuadeo. At illa iterum iterumque numerum ejus sollicitans mori se nolle aiebat, quam cum mole ista tam onerosa atque incommota vivere. Ergo precibus & constantia mulieris mortem alias expectantis victus, periculo ejus curam recipit diemque sectioni dedit. Praeparata illa, velut ad mortem, animos cunctari addidit, & tantundem sibi esse adjurat, sive vivat sive moriatur, dum ab isto onere immunis esse possit. Itaque me inspectante praesentibusque duobus Chirurgis extirpationem aggreditur, cute neque injectam secundum longitudinem novacula discindi jubet; ibi tum ipse admotis digitis primoribus, quæ poterat dexteritate, vesicam vel abscessum a cute solvit, cumque costis cum firmiter adhæsi sentiret, fortice immisso radicem amputabat, integramque molem fere sine notabili haemorrhagia, quod stupendum erat, eximebat. Forte metus ex dolorum sensu enatus, qui & constantissimo cuique sub lenta operatione exprimi solet, sanguinis motum insilaminaverat. Interim mulier ne hiscebat quidem, sed in Lipothymiam prostrata, quam dolor haud dubie intulerat, cardiaco revocari opus habebat. Quanta verò illa & quam huiusmodi plaga, dependentibus utrinque vasti corii laciniis? vulnus styptico & defensivo obligatum compositis ad latus cutis laxæ fimbriis, postmodum resolvebatur; ubi cum vulnere oras explorant, fortè arteria rumpitur, copiosius se se iteratisque pulsibus in lucem efferens. Huic cauterium actuale vel decies adhibuit nihil profuit, donec Bodeti styptico occurreretur. Tum deinde abscissa magnâ laciniarum parte vulnereque per digestiva ad maturitatem perducto consui cutis, commissisque invicem labris intra quinque septimanas sanari coepit, feminâ nullis interim symptomatis in illa temperamenti duritie labefacta. Tumor sive abscessus exemitur quatuor fere libras æquabat, & si textura habeas rationem nihil aliud erat, quam compositum glandulosum pingue membraneum, intertextis copiosissimis inque superficiem satis manifeste expositis venis.

#### Emphysema.

Pro tumore ventoso in genu post universalia remedia



remedia consului, ut hoc c. et pl. sua resolutiva (etiam valens in materia phlegmatica) apponderetur.

℞. Sem. anis. subtilit. pulver. sem. fenic. cumin. c. cui ana qu. rtar. ℞. tar. i. bar. ʒj. lacti crudi, i. subuci, & vin. aromat. ana q. s. decoquendo h. et c. t. plasma, quo apostema illud ventosum resolutum est. *Petr. Corell. Obs. chir. l. 3. Obs. 3.*

## Natta.

Nuper erumpentes si dentibus leviter compriantur Nattæ, sensim marcescunt & pereunt, quod bis observatum *Patavii*, semel in Nobili femina, cujus erumpentem Nattam dentibus vicina mulier apprehendit; & semel in filia summi jurisconsulti. *Thom. Bartholinus hist. l. 4. c. 3.*

## Lupia.

Puella quædam laborabat tumore scirrholo nuchis juglandis magnitudine, superiorem metacarpum partem occupante, qui discussus est neco comissio, adnota super partem antecam lamina plumbea hydrargyro illita, eaque per octo dies gestata auctoris p. ruit, nec amplius est reverius. *Simen Jacoz. obs. 9.*

Frater quidam Capucinus Lupiam habebat in genu, post longum tempus ad lammam mollietiam tandem peracta fuit: cujus ratione aperitionem suadebam, ille vero tenuit, inquit se Lupias huic similes resolutione curatas vidisse totius acetosæ charta madida involutis & sub cineribus coctis; quæ postmodum cum cineribus per cribrum trajectis, incorporabantur in formam cataplasmatiss; quod ille per plures dies applicuit calidè, & tumor prorsus evanuit, quod ego valde miratus sum, & postea duas alias Lupias in eadem parte eodem remedio curavi. *Dionysius Pomaret. obs. 3.*

## Ganglion.

Honestâ quædam matrona aliquot annos in poplite in utroque crure tumorem gerebat, pugni magnitudinis in uno, & altero paulo majorem, concolorem, molestum potius quam dolorem atterentem, flexionem tamen articuli illius, & sic incessantem aliquo modo impediens: quem tumorem cum inspicerem, Ganglion esse judicavi. Plumbariis thermis, ut eos extirparet, aliisque remediis, sed sine fructu, usâ fuerat. Ad fortiora transeundum esse docui, illique primum hunc sortum præscripsi.

℞. Lixivii, urina, & vini an. pt. æq. adde ad mens. j. hujus liquoris, aq. vitæ ʒj. spir. juniper. ʒj. cum spongiâ intincta foventur tumores calidè. Postea apponatur hoc emplastrum.

℞. Rad. bryon. irid. rec. an. lbss. bulb. lilior. ʒij. coq. in aceto tortissimo & contund. & pistentur: addendo olei lilior. ʒij. gum. ammoniac. in aq. vit. solut. ʒij. pulv. rad. arcos ʒij. redigantur in formam emplastri vel cataplasmatiss: continuabat sortum & emplastrum in dies domum reversa, spatio trium mensium, unde admodum immutanti tumores, adeo ut licet aliquid adhuc appareret, tamen nullum fere impedimentum amplius adferrent. *Felix Plate-*

*ius observ. lib. 3. pag. 703.*

Juvenis quædam mulier Ganglion habebat in facie Cerati magnitudine, intra oculum supra zygoma, quod intra mensem discissum est, adnota lamina plumbea hydrargyro illita & emplastro inha, ut melius hæreret: eaque super Ganglion adnota, una cum emplastro, splenium satis solidum superimponebam, deinde faciei alligabam quæ semphalera à Galeno nominatur. *Samuel Formis Obs. 16.*

Mulier quædam ictum frontis passa est, quem tumor nullus subsecutus est, ante quindecimum diem, quo tumor obortus est magnitudinis nucis juglandis, sed mobilis, nunquam dolebat, nunc mollescebat, nunc minuebatur, nunc augebatur, & sic per longum tempus cum maximo incommodo permansit: curatus tandem fuit aq. vitæ cum rutæ succo mixtæ admotione, lintheisque fronti apponitis. *Petrus Corellus. Obs. 3. Cent. 1.*

Adolescens sedecim annos natus conquerebatur de tumore duro, indolenteque, qui, in superna manus dextræ parte situs, mole sua nucem avellanam adæquabat, eratque ejusdem cum cute sana coloris; atque jam tertius mensis erat, ex quo æger post laborem consuetum majorem hoc malo affectus est. Jacebat nempe tendo in superna manus parte, cujus tubuli ab in uto labore ita distorquebantur, ut humores, in circulatione multas obstructions pro obstaculo offendentes, stagnarent in tubulis tendinis, tandemque ab humoribus à tergo insequentibus propellerentur usque ad membranam illam, quæ tendinem investit, ubi, efformata sibi cavitate, colligebantur & crescebant aliquatenus particulæ viscosiores, tenuioribus interim abeuntibus, & sic exortus est tumor, de quo hic ago, & qui ganglii nomine a plerisque appellatur. Ego pollice manus meæ tumorem hunc validè satis compressi, eumque hoc pacto extemplo evanescere vidi, dum scilicet vi compressionis humores tumorem constituentes protrudebantur iterum quaquaversum per tubulos tendinis; sed quia obstructions sic nondum sublatae erant, ideo recidivæ formidine tenebar, quapropter ad humores viscosos attenuandos & obstructions reliquas tollendas imposui emplastrum de rano cum Mercurio, & strictam satis ligaturam, quæ impediens, ne humores viscosi in consuetâ cavitate iterum, ut ante, congregarentur. Sed ubi tumor hic jam per aliquot annos duravit, tunc à pollice comprimente tolli non potest, sed adhibenda est ferula ligneæ, non dimitens ab illa, qua præceptores in castigandis pueris utuntur, nisi quod plumbi portio in illius medio infusa jaceat; & talis ferulæ unico ictu, ægroti faciei a manu affecta in dorsum aversa, prorsus evanescere vidi ganglion, quod per quadriennium patientem vexaverat, cujus medela tunc brevi per emplastrum hic citatum & strictam ligaturam absoluta fuit. *Joan. Mays in Prax. Chirurg. ration.*

## ATROPHIA.

**A**trophia quam si latine recedere liceret in Nutritionem diceremus, est morbus quò



liquiz excindi possunt. Operatio ergo sequenti modo peragenda est: Incidatur cutis superposita ad formam crucis, & manu labris a Tumore separatis cylitis eximi debet cum tota intus contenta materia, quæ interdum pinguedinis, mellis, pultis, interdum lapidis, vel calcis, vel etiam ceræ, vel glandulæ coctæ similitudinem habet, & si aliquid membrarum remanserit, ad istam destruendam penicillum sp. sal. comm. inbui, & sic applicari potest.

Vel, ℥. Empl. diasulphur. ʒ ij. ol. succin. ol. tartar. ana ʒ ij. & applica Tumoribus Turcatis, Lupis, aliisque.

Curatio Emphysematis consistit potissimum in removendis tubulorum obstructionibus, per interna Diaphoretica volatilia ac carminativa specifica, ut sunt sp. nitri dulcis, essent. carminativ. camomill. Rom. cort. aurant. menth. zedoar. arcan. dupl. sem. carminativa quacunque, & ex eis parata spiritus & olea. Omnia enim aromatica hic egregia sunt, ut Tinctura cinnamomi, macis & sexcenta alia cum aq. fornicul. carmin. aliisque propinanda. In Juniorum gratiam esto sequens formula.

℥. Aq. tunicul. ʒ ij. carminat. ʒ j. flor. chamomill. ʒ i ʒ. essent. cort. aurant. ʒ ij. sp. nitri dulc. ʒ ʒ. Syr. flor. chamom. ʒvj. m. detur cochlearim. Vel detur per vices arcanum duplicatum a ʒ ʒ. ad ʒ j. excellens in flatibus remedium, interponantur spiritus anisi, angel. matricar. catarrhal. elix. vit. essent. bacc. lauri, Juniperi, spir. sal. armoniac. anifat. Ut & omnia reliqua salia volatilia oleosa conducunt. Solis enim sudoriferis internis curatur *Emphysema*. Externe in *Emphysemate* conducunt facculi ex flor. chamomill. sambuc. sem. anis. &c. in vino cocti & tepide parti flatulentæ impositi, vel parentur ex herbis rutæ, scordii, malv. flor. chamomill. sem. cumini. carui, bacc. laur. juniper. sal. armoniac. tartur. &c. Ex quibus pro re nata parentur fofus vel epithemata vino Gallico vel lixivio incoquenda & calidè applicanda. Vel sequens.

℥. Aq. flor. sambuc. aq. calc. ana ʒ ij. spir. vini camphor. sp. matricar. angel. ana ʒ j. m. cum quadruplicatis linteis applicandum epithema. Ceratum de Cumino, Empl. de bacc. laur. de Thea, de Labdano, carminat. Sylv. &c. optimo sæpe cum successu applicantur. Tumores hi flatuosi haud incidi aut ferro aperiri debent, Gangræna enim ac Sphacelus facile subsequi solent sed potius medicamentis idoneis cataplasmatibus, aliisque oleis chamomill. Philosophor. succin. carui, cumini, anis. &c. resolvendi ac discutendi sunt. Conducunt etiam suffumigia ex carminativis ac gummosis resinosisque parata. *Joan. Valer. in Encyclop. Chirurg. rational.*

Atheroma, Steatoma, & Meliceris, quandoquidem Tumores sunt folliculis inclusi, vix nisi per manualet operationem curantur; sique inter operandum contingat, quod membranula rupatur, aut tota non auferatur, Isthula fere, aut ulcus scædum remanet, quorum difficultis & tarda plerumque curatio. Curationis consilium tribus hucce abscessuum generibus, Atheromati viz. Steatomati, & Meliceridi commune est, ut quod tunica illa continet discutatur, aut medicamentis totum cum sua tuni-

ca exedatur, vel suppuretur, aut Sectione auferatur. Triplici hac ratione Curatur Meliceris, utpote humorem continens liquidiozem. Sed Atheroma, humorem continens glutinosiorem, vel sectione tollitur, aut medicamentis exeditur seu suppuretur, atqui nunquam discutitur. Steatoma vero nec discutit, nec exeditur aut suppurari potest; at solâ manus opera, hoc est, Sectione duntaxat curatur, quoniam levis haud absimilis materies nec resolvi, nec suppurari aut exedi, potest, semperque duriore includitur tunica. Notandum quoque hujusmodi folliculis inclusos Tumores, si recentes sunt & molles, & Resolvi, & Suppurari posse, duos vero & inveteratos solâ Chirurgiâ Curari. Hinc diligenter in eo laborandum, ut singulæ differentie discernantur. Steatoma quippe durius est, resistitque tangenti, & basin habet solidiorem. Meliceris e contrario facile subidet, cedit in se compressa, lenteque dissilit, citò tamen revertitur. Atheroma est veluti medium inter utrumque extremum. Igitur hujusmodi tumor si mollis sit, Resolventibus erit tentanda Curatio, imposito scilicet emplastro Stiptico Iaracelli, vel e Ranis cum Mercurio; vel mane diu fricetur Tumor digitis saliva hominis jejuni identidem madefactis, cui ratione salis volatilis & spirituum in ea abundantium vis attenuandi resolvendique copiosa inest; vel post Tumoris diuturnam frictionem illinatur *Balsamum Peruvianum*, quo solo scribit Barbette se aliquando molliores hujusmodi tumores curasse.

Scultetus post *Armatum*. *Cheir. Observ.* 66. eum in lumen valde laudat Ceratum Diapsinapios, quò duas Melicerides resolvisse scribit, alteram in Humero, alteram in Genu, ovum aut sericum sua magnitudine æquantem, quam tamen hoc solo Cerato mensis spatio integrè discussisse refert. Ceratum Diapsinapios Aquapendens describit *Cap. de Meliceride*, & a spigelio correctum ita proponit Scultetus *Armatum*. *Chirurg. Tab. 43.*

℥. Salis gemmæ, cerassæ, lythargiri an. ʒ iiij. Cera, terebinthinæ an. ʒ ij. Galbani, opoponacis, an. ʒ ʒ. pulver. semin. sinapi ʒ ij. olei veter. ʒ ix. aceti acerrimi q. s. M. F. S. A. Ceratum. Barbeite hoc habet emplastrum.

℥. Gummi Sagapen. Annoniac. an. ʒ ʒ. pulv. euphorb. rad. pyrethri an. ʒ ʒ. sulphuris ʒ ij. oi. succin. ʒ j. M. F. S. A. emplastrum. Alii laudant id quod sequitur.

℥. Passularum majorum enucleatarum lb ʒ. Contundantur minutim in mortario, & addendo pulv. sem. cumini ʒ ij. salis nitri ʒ i ʒ. simul subigantur, & adhibeantur.

Alterum Curationis consilium est, ut Folliculi hi *Caustico* exedantur: viz. Cauterium in medio imponatur Potentiale; aut si magnus sit Tumor multa simul admoveantur Cauteria, cumque Crusta deciderit immutantur Iunctili Unguento *Ægyptiaco* & *Apollonio* illiti, aut Melle cum Mercurio *Præcipitato*. *Joan. de Vigo* Mensis intra spatium omnes excrescentias indolenter erodit: Accipit linteorum ulu detritorum & decerptorum ʒ ij. medullæ panis albi ʒ ij. Sublimati tenuissime pulverisati ʒ j. Aquæ Rosarum & Plantaginis an. lb j. omnia simul coque in vase æneo ad consumptionem durum aut trium



aut trium partium; dein expressa linamenta exsiccent in fumo meliocriter calido, quæ iterum discripta servat in vase bene operto ad usum, qualem ipse ita describit. Trium defensivo vicinæ partes unguantur; deinde ulcus quod fecit Pyroticum prædictis linamentis impletur, supponatur unguentum de Tutia, vel de Cerussa; atque ita persificandum, donec viva appareat caro, tum ulcus mele Rosæ & Terebinthina muniantur, &c. Nonnulli Arsenico utuntur & Antipigmento, sed non nisi summo cum periculo ea usurpantur, quia acriminis sunt, partisque subjectas penitus erodunt. Non desunt quoque qui parva huiusmodi Tubercula transversim incidunt, moxque implent Alumine, aut Vitriolo uiso, quæ folliculum erodunt simul, & hæmorrhagiam siliunt, vel oleum aut spiritum Vitrioli cum Iunaceolis applicant: Magna vero cruciatim trahunt duplici serone, altero secundum longitudinem, altero per transversum. Sin ad suppurationem tendant hi Tumores, quod tamen raro contingit, naturam Chirurgus adjuvet Mituantibus fortioribus.

At vero omnium tutissima Curationis Methodus est, Tumores hosce per Sectionem & Separationem auferre. Fit autem hoc modo: Primo tum ad lumen illudire, tum ad Chirurgum quam commodissime vel in sella, vel in lecto collocandus est Patient; dein atramento signetur sectionis longitudo, quæ sit tanta, quanta est tumoris rotunditas, tum elevanda cutis, quæ incidenda vel simpliciter vel cruciatim, eaque postea circumquaque lato specillo, aut scalpelli manubriolo, aut indice digito separanda, donec integer Folliculus appareat, qui tum circa pedunculum refecandus est, simul cum vase tumori nutrimentum adferente, ne vel minima relinquatur folliculi portio, tumorque regeneretur. Quo in casu notat Joan. van. Horne in *Microtechnie*, prius arcu vasculum tumorem nutriendum esse ligandum, antequam refecetur. Hoc peracto, & folliculum postquam extraxit Chirurgus, vulneris labia sunt conjungenda Linteolis en platticis in crucem appositis, &c. Quod si folliculus jam ruptus sit, aut per se, aut per Chirurgi negligentiam, tum necesse est, ut vel tumor revertatur, vel ulcus remaneat scidum, & ferne incurabile, nisi Catharticis absumatur folliculus. Plura de modo excidendi huiusmodi Tumores videri possunt apud Fabricium ab Aquapendente Operat. Chirurg. part. 2. lib. 1. cap. 16. & Scultetum Armament. Chirurg. Tabul. 35. Sed huiusmodi Tumor si ingentis sit magnitudinis, magnisque valis, arterius putæ, venis, nervis, adhæreat, sineendus is est, aut saltem magna in excidendo requiritur industria. Ita refert Scultetus observ. 88. se in externa femoris parte Atheroma ovum gallinæcum magnitudine superans excisione curasse. Et scribit Petrus de Marchettis observ. Medico-Chirurg. 21. se Meliceridem majoris oculi anguli, ad pupillam usque protensam, illis oculo, cum folliculo extirpasse. Atque observ. 24. & 25. duas non minus raras addit historias: alteram Atheromitis inferioris palpebræ, interna parte, prope angulum majorem oculi, ab ortu geniti, avellanz mole, in puella quinque mensium, sectione extirpati

& sanati, alteram Meliceridis colli prope asperam arteriam, & venas jugulares externas, in cuius dissecto folliculo alius ejusdem generis tumor, sed minor delituit sua & ipse membranula conclusus. Haud minus rarum fuit Steatoma in dorso circa finem vertebrarum colli, quod pondus librarum septem excedens, a Joanne Grifonio Medico-Chirurgo feliciter extirpatum fuit: uti videre est apud Fabricium Hildanum *Cas. 6. Obs. 16.*

Ceterum Tunicatis hisce tumoribus propè accedere videntur Propenduli, qui non exciduntur, sed funditus amputantur; in Pusillissimis filo ad stuporem partis contracto & relictio, donec tumor decidat; in Animosis scalpello. Quod si post Tumoris Propenduli abscissionem, sanguis copiosè produat, ut alium aliquid de radice relinquat, ne recidiva fiat, locus candente ferro leviter tangatur, & escarâ abiata, cicatrice obducatur: vel id quod ex radice relictum est absumatur admotis Catharticis, uti Alumine uiso cum Mercurio præcipitato insperso, vel Unguento Basiliconi admixto, sicque imposito, &c.

Magnus Flatuosus Tumor periculosus est, ob sui magnitudinem, & partem affectam debili calore præditam. At parvi si sint huiusmodi Tumores, omnis periculi expertes merito censentur. Porro Hyeme frequentius, quam Aestate evenire solent. In Curatione generalibus circa Dietam, & intus sumenda medicamina roborantia ac evacuantia, præmissis, haud secus ac in Oedemate, partis læsæ meatus aperiendi, in eaque contenta Flatulenta materies attenuanda, discutienda, resolvenda. Quæ in finem conducunt Calida, Siccantia, & Attenuantia, *Carminativa* dicta, ut apertis membri læsi poris humores flatulque dissipari queant, verbi gratia.

℞. Herb. malv. menthæ, pulegii, rutæ, an. m. j. Flor. camomillæ m. ʒ. Summit. aneth. flor. rosar. rubr. an. m. j. Sem. cummi ʒ j. Bacc. lauri ʒ vj. Coq. in S. Q. Cerevisiæ tenuis, vel Aq. Part. Aq. puræ & vini Albi ad lb. iij. Colatura sit pro fomento. Egregios aliquando vidimus successus in huiusmodi Tumore resolvendo solo Oleo Cucumeris Asiatici illito. Potest tamen ejus loco fieri Linimentum, v. g.

℞. Olei cucumeris Asiatici ʒ vj. Anethi, Rutæ an. ʒ ʒ. Nucis moschatae express. ʒ i ʒ. Cummi. Still. t. gutt. vj. misceantur. B. Rette Chirurg. part. 2. lib. 1. cap. 7. laudat hoc cataplasma.

℞. Ol. Rutæ, Calamenthæ an. m. ʒ. Farinz Fabar. ʒ ij. sem. Anis. Cummi. an. ʒ ʒ. Baccar. laur. Salis comm. an. ʒ iij. Nuri, Sulphuris an. ʒ j. Stercoris caprilli ʒ vj. Olei Anethini, Nardini an. ʒ j. Vin. alb. Gallici q. s. Coq. simul. S. A. & contund. in formam cataplasmat. Conducit quoque emplastrum de meliloto, de Ranis cum, ut sine mercurio.

Vel ℞. Emplastr. de melilot. de Ranis sine Mercurio an. ʒ j. Gummi. Galban. in aceto solut. ʒ ij ʒ. Pulv. caltor. ʒ ij. olei Cummi Stillat. gutt. vj. Cera & Terebinthinz q. s. M. F. S. A. Emplastrum, extendendum in Corio. Sed notandum ejusmodi medicamenta actu calida p. rti agræ semper imponenda esse, caloremque conservandum appositis linteis, lateribus, lagenis, similibusque rebus calentibus. Veruntamen Genus



cum Flatuoso Tumore vehementer inflatum sit, nonnulli sequens commendant.

℞. Frcis Ceræ novæ ex prælo th̄i β. Micæ Panis Furfuracei th̄i β. Florum Rosarum Rubr. ʒj. Bulliunt in vino albo, dein contundantur, & addendo Piperis, Caryophyllorum, Nucis moschatæ, zinziberis an. ʒij β. Sem. Cumini, Anisi, Ioniculi, Annios an. ʒβ. olei chamæmelini, Anethini, Rutacei an. ʒij. M. F. S. A. Cataplasma. Platerus *Obs.* lib. 3. Tumore in Genu immensum, mollem, laxum, & diuturnum discussum, ac penitus curatum scribit imposito Cataplasmate ex Radicibus Bryoniz, Iridis, & Liliorum recentibus, simul contulis, atque in vino, addita etiam Aqua vitæ decoctis. Vel fiat Cataplasma ex rasura Radicis Raphani Rustici cum Aceto Rosaceo, quod calide apponatur. Magno quoque cum levamine inflato & tumido admodum Genu aliquando applicari iussi Vesicatorium magnum, ex Cantharidibus & Fermento acri, addito Aceto, confectum.

Ganglion Cheirurgia, hoc est, excisione raro curatur, præsertim si in quodam manus pedisve articulo situm sit: est namque, monente Paulo Aegineta lib. 6. cap. 39. periculum si quid illic excidatur, mutilum reddi illud membrum. Sed Ganglion ut tollatur, imponenda sunt molliendi, attenuandi, & discutendi vim habentia medicamenta, v. gr.

℞. Emplastri de meliloto, oxycrocei, de mucilaginisbus an. Part. Equal. olei Petræ cantilloni M. F. S. A. emplastrum, extendendum in Corio.

℞. Gummi Galbani, Ammoniaci, Sagapeni in acet. solut. an. ʒij β. emplast. e Ranis cum duplicato mercurio ʒβ. M. F. S. A. emplastrum.

℞. Gummi Ammoniaci, Sagapeni in acet. solut. an. ʒβ. Liquefiant, hinc addendo sulphuris Pulverisati ʒij. M. F. S. A. emplastrum. Eundem in finem conducit Gummi Ammoniacum, vel Galbanum in spiritu vini dissolutum, atque emplastri modo impositum. Vel imponatur emplastrum de Ranis cum Mercurio, & stricta satis ligatura, quæ impediatur, ne viscosi denovo humores affluere, cum aliis concreverint, sicque Ganglion augere queant. Felix Platerus laudat hoc cataplasma, quo Ganglion pugni magnitudine in utroque Genu curavit, ut refert *lib. 3. Observationum*.

℞. Rad. Bryoniz, Iridis Nostrat. rec. an. th̄i β. Liliorum alborum rec. ʒij. Cocis in Aceto fortissimo ad molliem, & in mortario minutim contulis, adde olei Liliorum ʒij. Gummi Ammoniaci in spiritu vini soluti ʒij. Pulv. Rad. Iridis Florent. ʒij. M. & S. A. redigantur in formam emplastri seu Cataplasmatris. Cum igitur Remediis hisce emolitus sit Tumor, atterendus tantisper, quoad sub digito cyllis frugatur; mox lamina plumbea Argento vivo illita fortiter ipsi apprimatur, & advinciatur, quæ quod superest Tumoris tabescere & consumere queat. Etiam crebra tantummodo tumoris Frictione, humorisque huc illuc distractione non raro sanatur Ganglion. Et scribit Antonius Chalmereus in *Encheiridio Chirurgico*, se Ganglia in carpo existentia frequenti cum saliva frictione sæpius curasse, absque aliorum medicamentorum usu.

Reinerus Solenander *Consil. Medicin.* 24. sequens commendat emplastrum.

℞. Emplastri oxycrocei ʒj. Gummi Ammoniac. Bdelii dissol. an. ʒij. Pulv. Rad. Irid. Florent. ʒj. Limbricos terrestres vino lotos & dissolutos num. ij. Commixtis omnibus cum paucis oleo Terebinthinæ & Ceræ novæ F. S. A. Ceratum, quod extendatur in Corio, applicetur Tumori, & Fasciæ arcuè constringatur. Tumore autem Cerati ope quodammodo cuncto, addit; singulis quatuor quinque, sexve diebus solutâ fasciâ, & ablato Cerato, Tumorem debere suffumigari suffitu aceti acerrimi, cui Satureia, Origanum, vel similia incocta sunt, affusi Pyritidi, vel lapidum Molariarum frustis candentibus; dein abiterfo sudore, compresso attritoque satis Tumori rursus Ceratum imponi. Tandem hisce aliquoties factis præcipit, ut tenuis Plumbi lamina arcuè Ganglio illigetur, qua ulterius consumatur. Sin vero his modis Ganglion non cesserit, nonnulli volunt ferro resecandum & extirpandum esse; Quorum sententia tamen minime subscribimus, si in manus pedisve articulo existat, ob tendines aliasque partes nervosas ibidem facile læsuras. Sed potius sectione Tumor aperiatur, atque viscoso educto humore, impositoque Balsamo Peruviano, aut Balsamo Sulphuris Terebinthinato, ulcus porro curetur. Jobus Mekeranus *Observ. Chirurgicæ* p. 60. prolixè docet, quomodo Ganglion in Carpo exiens Contusione curari queat. Viz. manus plana mensæ imponatur, hinc Cheirurgus manu in pugnum contractâ bis terve Tumorem vehementer contundat, donec cyllis induratur, humorque contentus effundatur, qui dein continuo articuli motu, accedente insuper crebra partis affectæ frictione, facile resolvitur: præsertim si hoc vel simile linimentum frequenter inungatur.

℞. Olei Ceræ, Terebinthinæ an. ʒij. ol. philosophorum ʒvj. vitellum unius ovi M. F. S. A. linimentum.

Ad Curationem Lupiz quod attinet: Materia hæc nec Resolutioni, nec veræ suppurationi facile cedit; sed ut humor evacuetur, tumor hic aperiendus est. Quod ut turò ac feliciter fiat, humoris magnitudo, situs, latitudo seu densitas, denique & basis seu fundamentum consideretur. Si igitur magnus sit tumor, vasis maioribus, partibusve nervosis ac tendinosis proximus, linendus is est ob periculum, quod ex Apertione facile consequitur. At si parvus sit, in quacunque parte fuerit, sæpe Resolvitur comprimendo, digitis saliva madefactis identidem fricando, frangendo tamen cyllim seu folliculum, quo includitur, ut hinc illinc effusus humor dispergatur, & dem naturæ ipsius beneficio discutiat, resolvaturque. Quod si Lupia in eo loco sit, in quo validam compressionem facere non liceat, ut in Facie, Thorace, Ventre, Gutturæ, similibus locis, emplastrum aliquod in Ganglii Curatione præscriptum apponatur, quod Resolvendi vim habeat. Scribit Riverius in *Observ. communicatis à Dionysio Pomareto*. Lupias Resolutione curatas fuisse foliis Acetosæ charta madida involutis, & sub cineribus coctis, quæ potinodum cum cineribus per cribrum trajectis incorporabantur.



tur in formam cataplasmatidis, calidè applicanda. Sin Lupia mediocris sit, neque in Articulo exillat, tollatur excisione, ut Atheroma, Steatoma, vel Meliceris. Quod si balin habeat angustiolem, intima illius pars ligetur, non aperiat, neque seletur; atque singulis diebus ligatura constringatur, donec augmentum ei omnino detrahat, sicque Lupia sponte decidat.

*J. Munnicki in Prax. Chirurgicæ.*

### Consultatio.

#### Pro Meliceride.

Triennium agitur, cum Illustriss. Palatino Polono tumor quidam sub ortus fuit in anteriori parte sinistri femoris, doloris expertus, concolor, prementi digito cedens, nullo tamen relicto vestigio; qui in amplam adeo molem lentim excrevit, ut in præsentia ab inguine usque ad genu, illi cruribus adhærens, protuberet, imitatur amplæ cucurbitæ, anteriori, & exteriori femoris parti appositæ; non sine manifesta motus cruris noxa; cuius causa variis ubique locorum consultis Medicis meam nunc quoque exposcit sententiam, cum de præsentis affeetus eientia, & natura, tum de medicis præidiis huic extirpando in usum revocandis. Quod Illustrissimi, & generosissimi Herois mandatis morem gerens, pro virili aggredior; quo eventus ipsius, & curationis ratio consuet. Est autem hic tumor morbus in aucta magnitudine, latens nexionem cruris, a pituita ortum ducens; hoc indicio, quod nullo dolore sit molestus, atque cuti sit concolor: quæ tamen pituita naturalis non est, cum non sit cedematolus, pressio digito cedens, sed præter naturam, non ex permixtione humorum heterogeneorum, sed ex conversione potius propriæ substantiæ in alienam; non quidem fluctuantem, in quam non raro facessere solet, ex Galeno; neque enim tandiu durasset affeetus cum tanto ponderis sensu; minus longè in serosam, & aquosam, particularis hydropis causam; tunc enim pelluceret cutis, tumor esset adeo expansus, sine fluctuatione; quinimo in corporis erectione pars tumida præ aquæ pondere ad interiora procumberet. Iuerit itaque pituita tenuior, & fluida in lentam, viscidam, tenacem, flatulentam, & serosam immixtam, conversam; cuius ratione tumor hic accendendus est tumoribus illis, quos Antiquiores Abscessus; Recentiorum vero barbarorum aliqui Ar. bum interpretes, exitures vocant, genitas ex humoribus, & aliis extremis heterogeneis folliculo conclusis: quorum triplex est genus, Meliceris, Steatoma, & Atheroma; quibus Recentiores addunt Testudinem, Lupiam, & Nartam, seu Napram, & Strumam. Qui quidem tumor struma non est, glandularum propriæ; Non Testudo, seu Talpa, capiti famularis; non Napta; cum hæc sit tumor carnis instar, durus, prementi digito non cedens; cuius generis præiens non est, quippe qui cedit, & est mollis; atque ideo neque Steatoma, neque Atheroma, sed meliceris censendus, illi non ab similis, quem Ambrosius Patrus Lupiam vocavit. 6. de Tumoribus præter naturam qui aliquando partibus adhæret fir-

mius, inquit ille: aliquando verò mobilis est; semper tamen venas habet exiles quidem in principio: processu vero temporis ampliores, quale nunc observamus: qui proinde abscessus est ex tenui pituita ortus, serosa & flatulenta immixta: a cerebro, ventriculo, & venoso genere sensim eo transmina, ac cysti seu folliculo conclusa, parti affectæ adhærens. Ex his patet, quis hunc affeetum maneat eventus, cum consensu præstantissimorum virorum, quibus & ego accedo, sit insanabilis: quippe qui discuti non possit, cum ob ejus amplam molem, tum ob fluxionis periculum, quod à localium calidiorum usu impendet, quorum ope resolvendus est, neque evacuari patefacto abscessu, & suppurata materia; metu scilicet ulceris, quod inmedicabile evaderet ex fluxione continua, & tortè cancriforme. Neque radicatus extirpari poterit, absque enormi sanguinis profluvio, ob venarum copiam & amplitudinem, non sine vitæ præsentis discrimine in ipsa operatione. *Benedict. Silvatic. Consil. & Respons. medic. Cent. 4.*

### Observationes.

#### Atheroma.

In genu sinistro 11. jam annos gestaverat tumor folliculi luforii minoris magnitudinem æquans 11. Stephanus à Calatio Capucinus, vir quæntæ in Deum pietatis, vel hoc argumento cognoscendus, quod cum letheseram hunc in articulo dissectionem celebratissimi Medici viro omnes ore pronunciasent: nihilominus hic tandiu privatus ea, quæ solo detaxis utrisque genibus fieri consuevit à Sodalibus sancti Nunis adoratione frequenti: facultatem hanc etiam cum tormento at discrimine vitæ maluit consequi, quam officio suo cedere, ac sanctarum exercitationum carere fructibus. Hujus igitur viri, tam pro desiderio gratificatus; cunctis ex ordine provisus, præcautionibusque his, quæ curationis cursum interturbare potuissent: rem instituto cominus, acuto scalpello cutem ample, quæ maxime extabat, infeco, dividendo quoad pateret membranam. Quæ subsecta circum, tandem in manus venit, & mediastina sanguinem reddidit subnigram foris vini subfluentem; cartilagineis ferme crustis internè oblitæ. Quæ vitæ utrisque quidem, & externa aliqua parte caruncula putres, & boleti formam referentes extupesciebant. In universum erat membrana uteri chorii modo densa, dura, crassa, quæ postquam est deterfa ministri manu, vellere intarcta, & ad caminum deposita, vendicata jam a putredine t. lis apud me ad hanc diem auervatur. Chirurgum ferme nihil incutatum est mali, nisi si paucum effusum sanguinem admemoraveris. Atque hæc de primo illo excisionis actu; ceterum quod ad reliquam curationem pertinet; in ulcere medicamentis primum digerentibus, mox expurgantibus recte percurato; paulatim accretæ caro vacuum orbem implevit, sanatusque est homo 40. dierum spatio sine ulla interitus offensa Deo bene favente: cui quidem auctori medicationis omnis relicitas accepta esto.



Neapoli urbe cunctis artibus bonisque florentissima ex honesta Coppularum familia juvenis fuit, ac modo est, cui Liberio nomen, ortum huic 16. jam annis super lævam mammam tuberculum principio pusillum pili instar, quod singulos in annos egeratum tandem excreverat in ovi gallinacei magnitudinem, concolor, mobile, æquale, duriculus, dolorem non inferens, nisi cum vehementer premeretur, toto decennio sollicitè chirurgicos, qui sunt in urbe omnes consuluit, requisivitque de tollendo vitio. Respondere alii, nihil ut adhibens rem naturæ committeret: quippe vitium irritare periculosum. Alii vel ut balsameo, vel appressa plumbea lamina excuteretur. Nulius e plerisque in multis chirurgiæ meminit, quam nemo non ex auctoribus hujus disciplinæ proponit. Denum me, ac sex e principibus medicis congregat domi, singuli, ut diceremus sententiam: scirrhum dixerunt quidam: quidam occultum cancerum, qui tentandus non esset. ad Hippocratis sententiam §. aphor. lib. 6. Tertii quidam Emphysem absurda quadam opinione: scirrhum ædematosum pronunciarere plurimi. Ego atque alter quidam, qui sententiam meam a consulente resciverat, licetoma pronunciamus. Consensere in id omnes, ut medicamentis tractaretur, chirurgiæ valere iussa. Ego contra chirurgiæ certum, atque unicum in hac re præsidium, ut professus fueram semper: ita & in dictione mea peroravi. Refutaverè omnes curandi genus, adhasitque homo alteri sententiæ, ut quæ leniora proponeret, verumtamen fatigatus diu remediis, victu tenui, sudoribus, decoct. sarsaparill. fonticulis, neque aliquid assequutus ex his, nisi longa laborum tædia, venit ad me festinè, succurretem: vitam odisse se præ noxa ista corporis. Tantum ne quid ferro agerem, certum se pati quidquid oporteret. Breviter: pyrotico cutem aperui, patuit cystis puerum ovi modo candicans, qua dissecta promptum fuit mere putridam fetidam, atque atrocrea cocta modo laminosam, sed crassa referentem substantiam late complentem infarctum suo amplexum omnem folliculi. Labor fuit in eximendis membranis fibris, quæ radicem instar hærebant: quibus tamen extirpatis, dies circiter quidraginta finita curatio est. Harere autem abscessus hujusmodi anormales plerumque nerveis & cartilagineis fibris observationes testantur, qualem contigit observasse, liquando in pedis digito medio, quales etiam fieri observatae fibra in abscessu Marini Caputi Vicarii, Archidiaconi vici Equensis viri spectatissimi: Similiter cartilaginearum fibrarum in abscessu respectarum exemplum habes. In R. P. D. Andrea Cancellero Cartusiano Monacho probatissimo, cujus rei nitorum ab amico fidelissimè conscriptam, huic nostro de abscessibus anormalis tractatui inserere placuit; est autem ex autographo talis.

Quam lepidè abs te compellari videor, Clarissime Simon, quam urbane, parum abest, quin dixerim ridiculè: sic revocasti ejectas jam pridem e domo tua philosophica argutas Curialium nugæ; quarum quanto major, & religiosior in hoc fucato seculo cultus, eo periculosior est usus, magno cum ingenuitatis oppro-

brio. Quid agis cum rhythmicis istis alloquiis? amicum, qualem me nosti, stoicum & rigidum (ut tua tibi regeram verba) rogas, precaris, blandimentis excitas? Me satum hominem tinguere, te Logodactylum, quo utroque vitio, sicuti revera vacamus ambo, ita cynice, ac libere effando, uterque nostrum, tali etiam suspitione liber est. Amicitia quidem sicuti animorum nexum facit, ita & bonorum omnium communionem. An fortasse nostræ Eutopiæ mores oblitus es; an amicitia transfuga videri vis? Absit. Quid igitur precario postulare, quod jure tuo tuum est? tua sunt mea studia, tui laborum meorum, si qui sunt, fructus, si quidem quod vivo, & spiro tuum est. Hac igitur eadem epistola nobilem illam, quam tam anxie effragasti, curationis ostracoli tumoris, a nostræ ætatis Chirone, Doctissimo inquam M. Aurelio Severino magno naturæ mystæ consecræ descriptam habebis, utinam tam erudite, quam vere: potero siquidem oculatus testis de re integra fidem facere, qui tunc temporis Chartusianorum hospes vixerim, quorum ut singularis est in bonarum artium, & musarum affectas studium & propensio, ita liberalitas ac munificentia compotem reddidit, ut cuncta exactissime adnotarem. Feracia sunt (ut hinc exordiar) Chartusianorum corpora, malorum complurium e tartaro ortum ducentium (tolera interim verbum hoc Paracelsum) sed tumorum in articulis excrecentiarum terroclima: an ob strictam vivendi regulam, qua caribus carne pejus, & angue abstinent? An ob notissimarum vigiliarum frequentiam, in quibus Deo placent diutissime recti, vel incurvi, sedentes nunquam; laboraverat pertinacissima meiceride in dextro genu R. P. D. Dionysius Coccia Cœnobita severioris vitæ addictus in clauetro, cui post aliorum Medicorum iudibria, auxiliares manus Severinus ipse dederat eventum felicissimo, cum V. P. D. Andreas Cancellarius alere se etiam in dextero genu tumorem non spernendæ magnitudinis, cujus natura ab anno 1632. numerabat; veluti per jocum affirmavit: sphericus is erat, cujus ambitus sesquipalmaris fili mensura comprehendebatur, omnino indolens, solo pondere religioso viro molestus, ut proinde mollium, & inermium Chirurgorum, quibus nunc Neapolis abundat, timiditate evitatus, nihil de illo extirpando cogiteret, quidquid Clarissimus Severinus pronunciareret de corruptionis periculo. Indulgit igitur proprio genu naturæ, sensimque & furtim molem illam adauxit adeo, ut operis veluti sumptuosi postmodum pertasa, cepit orbis, quem tam sedulo construxerat, ruinam moliri. Accersita igitur fermentatione magno illo separationis instrumento colorem & roborem, & dolorem etiam aliquem in sui auxilium convocavit, pusillum vero nullum, ob arteriarum deflectionem, quibus merito carent hujusmodi tumores Doctissimi Dureti sententiâ, ubi hæc urgere coeperunt, cepit etiam Chartusianus suæ salutis integritatem desiderare, ac medicorum conventus adire, ut præsentaneo, sed leni aliquo remedio savienti morbo obviam iret. Deslexit ergo ad comptos illos & mulieres Chirurgos, à quibus, ut pingues aliquas curationes impetravit, ita pinguem unguinum nollens reddidit



dit: adeo ut circa Februarii finem, anni 1640. pustulis aliquibus in tumore apparentibus ob vim adhaerentem corruptionis inceperit in eo floridus color occidere, & tenebrae ex inferiori Limbo obrepere sursum, & corpus molis totum febris incrementum sumpsit, stipata suis affectibus humorum gravedine, Stomachi debilitate, virium lapsu. Interim excavato foramine ab arthenicali intus congesto excremento in superiori parte materia ab illo emanavit, coloris quidem faciei vini similis, sed odoris adeo horribilis, & ut ita dicam, pestiferi, ut etiam adstantibus & ipsis Medicis statim atque in cubiculum ingrediebantur, aliqui peregrinis suffumigiis odoratum, nauseam, & capitis dolorem excitaret. Cutis in nigrum abibat ex aliqua parte intumescens. Tunc serio res suas agi animadvertit religiosissimus Pater, ac se ab inguentariis Medicis delusum, sicuti ingenue ab Excellentissimo Severino prae monitum agnovit. Interim R. Prior Joann. Baptista Aslantius incomparabilis in suis pietatibus, & zeli acciri Medicorum consilium voluit, in quo sex capita disceptavere, ut Neopolimosis est ad pompam; tritum enim tempus est trium horarum in exquirendis & conciliandis Galeni locis: quandoquidem in varias sententias itum est; putantibus aliis Atheroma, aliis meliceridem esse, cum tamen Excell. Severinus demonstrasset intumescens esse abscessum, de quo aliqua obiter Galen. 14. meth. post carbunculi curam: quod postea confirmavit eventus. Conclufum tandem à Senioribus, de aegro jam conclamatum esse, futurumque ut degenerante gangraena in sphacelum cito mors actaret toribus, vel minimo minus etiam ob alias causas aegrum lenta tabe liquatum iri. Praescripta sunt putida illa Arabum cordialia ad spirituum vim confirmandam, quae si postero die aliquo pacto restituta visa fuisset, poterat de foramine aperiendo e diametro prioris respondente cogitari. His medicorum conventus solutus est sub vespertinam diei quinti Martii, in cuius nocte subsequente efficacissime operante est plasmate ad interceptum gangraenae motum a Severino praescripto; praeter aliquorum Medicorum spem remissa est febris, & symptomata leviora apparuerunt, supererat ex Medicorum consilio toraminiis apertio, de qua cum Clarissimus Severinus, tanquam inefficaci praesidio iussis de causis etiam difficili malè sentiret: coram Reverendissimo Priore prius causam bene retexta, aegro assentiente magna cum promptitudine, atque animi alacritate decrevit, postero die regularem curam potentibus auxiliis inchoare. Mane igitur octavi diei Martii causticum, haud quidem ad planum femoris, sed superius ad duorum digitorum transversorum altitudinem toti tumori circumduxit, quod intra paucas horas egregiam operam praestitit, adeo ut die decimae materia extracta fuerint crustae adducti crassitiei excavato circumcincta vallo, quod sericeo filo per ligneum vecticulum constrictum ad diem usque decimum sextum tandem novacula omnino exequatum est exciso globuli tumoris superiori hemisphaerio, interiori candente ferro pluries adusto, sic nulla subsecuta est haemorrhagia; doloresque, adhibita prope genu quantum ferre potuit, calidissima testula cum

adstantium omnium admiratione sedati sunt, pependit amputatum culmen uncias quatuordecim. atque in ostr. costae carnis illius medio, quae nova. ula aciem obtundere potuit, observatus est sinus inaequalis, & cavitas minor, quidem quam putabamus, ex proportionem magnitudinis, in quo inultu. ga. ver. & foetidissimum illud virus. Constitit post resectionem, tumori non fuisse folliculum, ex quo Severini sententia triumphavit. Verum enim vero fuit inter Ministros chirurgus, qui subtilius rem disquisiverat, putans exactiori sua acri via se reperturum fuisse quicquam proportionale cysti, sed utcumque allaboraverit praeter ostr. colam carnem, quae variis fibris intertexta erat, ac veluti inaequalibus corticibus composita, nihil aliud notare potuit curiosus ille anatomicus; octiduo autem elapso ab hac prima operatione ex frequenti, & efficaci illitu saturnini butyri, & aliorum emollientium separata est a viva carne crusta digitalis crassitudinis. Interim bene se habente aegro in omnibus vivido suo naturali colore perfuso, & superfluo succulentia illa habitus, quae naturaliter praeditus is erat; Capinus de tam felici eventu omnes letari, & rem in tuto positam, beneque peractam existimare: Verum Clarissimus Severinus in subterelicta tumoris parte syrtes latere, hoc est, graves difficultates, & pericula mustitabat; nimium terreri seipsum, aiebat ingenue per rebellem illam duritiem in tumoris radice firmatam; adversus quam etiam validissima caustica ficulneum robur suum ostendebant. Verum nihil non cadendum tamen animo suadebat: deprompturum se efficacis Chirurgiae suae arma, quibus omnino futurum erat, ut caderet hostis. Vicissim ergo nunc causticis solidis, nunc liquidis, nunc actuali igne nostri seculi Hercules Lernæa Hydra tentavit, ac illa sui officii haud immemor cum supra os patellae iam deventum esset, ex rursus, in quibus tendones vel ad invicem, vel cum osse coeunt, vel unius noctis spatio fungosa capita emittebat, contra quae etiam Hermeticeorum illa Draconum spuma hebes videbatur. Sed tamen excogitavit Clarissimus Vir malo nodo, malum cuneum; ac liquore quodam, cuius nunc compositionem non scribo, superfuso & agitato, & spongiosa illa carne glutinosum humorem emungebat prius, inde arcano suo albo praecipitato desuper adperso saepius crustulas extraxit; tandem ad operis compendium ignito auro radicitus renascentem bestiam occidit; adeo ut non amplius pullularent capita. Detectus ex parte tendo latus est, ac non sine admiratione observatum est, ostr. costam carnem, & fungos intra tendonum fibras radices habuisse, & in medio patellae omnino labem ad os usque pertigisse; unde opus desquamationi vacare, quam egregie praestitit extractum Aristolochiae rotunda, euphorbii aqua portione commixta. Huiusmodi laboribus Aprilis & Majus menses insumpti, ac jam ulcus ad daleri magnitudinem, quod in prima sectione diametro spithamæ mensurabatur devenerat: curabatur autem emplastro styptico Paracelsi, cum sub nocte D. Joann. cuius festum est. Junii celebramus; descendens aeger lecto seipore non bene firmo innixus in pavimentum toto corpore



corpore illiit, ac genu affecto præcipue: unde & discissa sunt ulceris labra, & fluxione accersita recruduit ex parte malum; adeo, ut infundandum pertinacissimè fuerit usque ad vigesimam Augusti, qua die jam otii pertasus, & suæ ipsius salutis bene conscius Religiosissimus virè Monasterio D. Martini ad officii sui curam discessit, qui vivit nunc Paneraticè notus nullo impedimento notatus; Cum Martino Delrio sæpe dictitans, non pejus esse ab uno lictore morti addici, quam à centum medicis. Hæc est ipsissima curationis Historia. Utinam verò, amice, egregia illa Severini facinora, ut apud externos gloriam, ita apud Neapolitanos invidiam nunc excitassent, qua una torpere tanquam facino videtur Clarissimus vir ad sua ingrato mundo bona communicanda, maximo cum litterarum, & Hippocraticæ Medicinæ detrimento, cuius alioquin reparator esse posset. Cæterum tibi librorum helluoni, quid nunc in os ingeram non habeo; nam ut noli; & ut cum Scaligero dicam, Italiz nonnisi Mercaturæ, & forensium librorum chartæ excuduntur, at felicissima illa Germanorum præla, vel ob Martis strepitus quiescunt, vel ad nos sua non transmittunt, licet ad miraculum nunquam satis laudata ingenia teutonica inter bellorum turbines, & literas profiteantur, & in medicina exornanda defudent perpetui; quibus sicuti gratias pro tanto opere debemus, ita Italicæ gloriæ memores invidere etiam possumus. Vale, vir clarissime, qui sicut à me coheris unice, ita fac, ut abs te redamer æque. Neapoli nonis Januarii, Anno 1641. Marc. Aurel. Severin. de recond. abscess. natur.

Puellam quinque mensium curavi, cui ab ortu genitum fuit tuberculum ciceris magnitudine, parte interna palpebræ inferioris, prope angulum majorem oculi, quod spatio quinque mensium avellanæ molem æquavit, ex genere tumorum, quos nattas vulgo vocant; totus siquidem carneus erat, tenui folliculo involutus; quem propterea secui radicibus forfice, cum effluxu sanguinis ad unciam circiter, qui fuit suppressus bolo armena, sanguine draconis, oviq; albumine, cum filamentis tenuissimis, cui postmodum applicui aquam rosaceam cum ovi albumine conquantatam, & bolo armena in pollinem redacta; quibus spatio octo dierum fuit sanata ægra, in hunc usque diem incolumis. Petrus de Marchettis in Observ. Medico-Chirurg.

Anno 1666. Legionis Vice-Præfectus fere sexagenarius strenuus olim in bello miles Casareanus, nomine La Branche, ante 11. annos erupit atheroma in humero sinistro ad spinam vergens, quod tractu temporis in tantam excrevit molem, ut ovi asserini magnitudinem excederet; remedia plurima adhibita prohibere non potuerunt, quo minus in putrefactionem abiret, talem nimirum, ut ulcus ad basin se extenderet, quo venæ erosæ periculosa hæmorrhagiæ causa fuerunt, imò sæpe sæpius ad duas libras sanguinis affluxit, quare animo linquebatur æger, suasi itaque excisionem quam annuit Exc. D. Zuvelserus, præparato itaque corpore Medicamentis idoneis præscripta dieta, venâ sectâ, illud adior caustico, quod sæpius applicatum ultra quartam partem

basis non corrosit, quod mihi corpus aliquod durum & callosum subesse indicavit, reliquum ergo cultro exsecui, unde tres venæ obtruncatæ, ingentem hæmorrhagiam ciularunt, quæ non sine labore sistebatur; vulnus ut artis est, tractatum, spatio trium septimanarum sanatum fuit, partem abscissam inspexi, quæ constitit ex diversis involucris, primum simile erat corio porcino, alterum primo non absimile, reliquum semiputridum, ossicula mansa, & quasi lecohem, & male olentem materiam in se continentem. Dom. Joann. Pilas.

### Meliceris.

Juvenis quidam xiv. annorum ætatis, Reverendi & Doctissimi Viri, Dom. Jacobi Haberteri, p. m. quondam hujus urbis Divini verbi Ministri filius, cum 10. Augusti superioris anni pedem inter deambulandum leviter contorsisset, & ab initio circa curationem error à barbitonsoribus commissus fuisset, exortum primo dolorem maximum sequuta est inflammatio totius tibis, & ad coxam tere usque. Febris item maxima, inquietudines, nausea, cum virium prostratione supervenerunt. Tandem, videlicet 8. Septembris cum à barbitonsore suo derelictus & affectus pro deplorato habitus fuisset, ego quoque advocatus fui. Tum circum circa juncturam pedis novem inventi ulcera, & quidem nonnulla eorum in ipsam articulationem usque penetrantia: ex quibus ichorosa materia tam copiosè aliquandiu effluxit, ut mirum sit, unde in corpore tam extenuato & debili, tanta humorum colluvies provenire potuerit. Ligamenta, imò & ossa ipsa erosa erant. Os calcis (quod dicam, admiratione non vacat) in medio ex una in alteram partem, ut progressu temporis cognovimus, & vidimus, perforatum fuit, ac si aliquis terebello illud perforasset. Perforationem hancce ossis, cum durante curatione invenissem, funem ex uno in alterum latus per ipsum os traduxi, quo Ossa cariota extrahere possem. In medio tibis ulcus erat cuniculosum: ex una enim parte ad genu usque extendebatur, ex altera vero ad talum usque fere descendebat. Ab initio omnem adhibui diligentiam, atque indultiam, ut dolores quamprimum sedarentur: & vires (quæ adeo labefactatæ erant, ut mortem proximam esse, omnes putarent) reficerentur. Deus ita benedixit remediis, ut duos hosce scopos paucis diebus abolverem. Postea ulcera mundavi, ligamenta putrida, & ossa cariota, atque à virulenta illa materia contaminata, extraxi. Curatio perquam difficilis & laboriosa fuit. Omnia tamen (laus sit Deo) nunc in tuto sunt, etiamsi ulcus, quod, ut antea dixi, calcaneum perforavit, nondum penitus cicatrice sit obductum. Genu, quod propter magnitudinem in arbi, & retractionem nervorum, incurvatum erat, in pristinum statum restitutum quoque fuit. Articulus tamen pedis rigidus immobilisque permanebit. Id enim plerumque quod ante me nullus, quod sciam, observavit, ut in Meliceride, quando ligamenta & cartilagine ossium eroduntur: tunc enim mediante callo, coalescit junctura, fitque rigida, uti fusus, & quidem exemplis, Deo volente,



te, in tractatu meo de Meliceride ostendam. His vale, Vir Nobilissime, cum tuis omnibus, quos tecum quam demisse saluto. R. prim Bernæ 7. Junii 1623. *Guilielm. Fabric. Hildan. Obs. Chirurgic. Centur. 6.*

Petrus Antonius Rusus Amalphenſis V. jam annis ferebat dextera mamma meliceridem tam magno tubere, ut e put hominis æquallet. Hanc dum medici valetudinarii nostri secto vererentur attingere, intrepidus ego sectionem aggressus sum certus anatome in gracilis viri mamma corpore, nihil præter cutem, & adipem extare: acinde & fluctuatio sustulsum intro fluorem me docebat. Jam igitur huic exsecto tenuis ichor exiit mellis albi referens speciem, quo in dies exhausto finatus est homo non longior, quam mensis unius curriculo. Similiter honorarium stranerium Neapolit. num. Isabella nobilis obiletrici ex fratre nepotem 12. annos natu ex ingenti meliceride circa sinistram mamman inhaerente vexatum, cum plerique Medici pharmacia internis, & decocto sassa-parilli. & quotidiano sudore, quibus unice confidebant, adhibitis; nulla unquam parte juvissent: sola nos tumoris apertione sua prorsus integritati restituit. Res nota pervisaque tum torſoribus ad compita Spiritus sancti, tum Aloyſio de Gratia, & Francisco Laviano Medicis præstantissimis. Exemplum sunt hujusmodi, ut non possint esse graviora tum excessu magnitudinis, tum locorum perdifficili situ, tum viri gravitate, ac novitate. Quibus tamen nihil operantibus sunt homines integrè restituti. Quas ob res nisi verè sint impotentes, atque omnia tutam mentes; non est, quod similes, ac sæpe etiam minores operas relugiant nostri Chirurgici. *Marc. Aurel. Severin. de record. abscess. natura.*

Lingua pluribus morbis tentatur; soluta scilicet continuate, ac variis tumoribus, in quibus quandam curavi observatione dignum, meliceridis nomine, in Reverendo Patre Theatino, Hieronymo Capite Bovis Mutinensi, cui sub lingua, ubi venæ ranina, & tumores ranulæ dicti succrescunt, obortus fuit tumor, de genere quidem ranularum, non legitimus tamen, qui ex continuo affluxu materiæ, paulatim crevit ad magnitudinem ovi; sensim exporrectus perlatus dextrum colli, juxta jugulares venas, & carotides arterias, ad fauces usque infra tonillas, & œsophagum, qui asperam arteriam adeo graviter comprimebat mole sua, ut ni chirurgus quolibet mense, eo patefacto, materiam contentam efluxisset, periclitaretur æger intercepta respiratione, & impedita deglutitione, ad vitam plane necessariis. Multi vero tentarunt curationem sectione sola ipsius tumoris, cum patientis quidem aliquo levamine, non perfecta tamen valetudine; cum mense post circiter tumor in eandem magnitudinem excreverit, capus causa Reverendus æger, metu suffocationis, Patavium venit, & nec curæ se commisit, cui præscripto primum omni revulsionum genere, per totius corporis purgationem, & sanguinis missionem, statim deveni ad partem affectam, tumoremque cultro, longa satis sectione, in interiori parte patefeci, multis venarum ramulis datâ operâ disruptis, a ranulis diffusis, quo folliculus cont. besceret, intercepto

to nutrimento; in quem postmodum irmiti crassam, & longam turundam, imbutam ovi albumine conquassato, ad tumoris usque fundum; sequenti die alia facta sectione, & quædam ampla in collo exterius parte, qua delinebat tumor, illatis interim vas majoribus, turundam pariter indidi vulnere æqualem, intinctam ovi albumine, superaddito gossypio ulso, cum pulveribus ex sanguine draconis, & bolo armena, sanguini copiose satis fluenti sistendo. Sexto vero post die, nullo amplius periculo inflammationis imminente, intra os, & exterius in collo totum folliculum fermento candente inuſi; atque removendæ, ac detergendæ escharæ in parte externa digestivo ulso sum ex terebinthina, & butyro lotis aqua rosacea, vitello ovi, & oleo sambucino; parte verò interna, globulis melle rosaceo imbutis. Laudabili vero pure apparente turundam inuſi unguento ex Betonica, iisdem in dies decurtatis; Interius vero applicui filamenta iniperia pulveribus ex tuthia, cornu cervi ulso, & terra sigillata; quibus spatio quadraginta dierum æger omnino sanatus est, nunquam amplius recurrente morbo. *Petrus de Marchettis in Obs. Medico Chirurgic.*

Reverendus Theatinus Genuensis, ex familia Spinolæ, laborabat tumore colli, magnitudine ovi gallinacei, prope asperam arteriam, & venas jugulares. Habita consultatione cum viris Præclarissimis, statim unanimis, tumorem esse meliceridem, quo tamen dissecto nihil aliud effluxit, quam serositas quædam flavescens; quod vero mirum, separato folliculo à tegumentis communibus, eoque secto, quo melius radicitus educeretur; sub eodem deprehensus alius tumor, suo & ipse folliculo obductus: eadem materia repleto, alio minor, qui sectus tandem serositatem flavam effudit. Hic verò ita excipiebatur a primo folliculo, ut videretur veluti innatare materiæ illi inclusæ, quem cum transversum forſice secarem, ac simul ramulum jugularis externæ ad nutritionem ipsius tumoris exporrectum, quo facilius folliculum extraherem, maximo impetu sanguinis copia erupit, quem tamen facili negotio digito, gossypio ulso, & pulveribus adstringentibus suppressi, adeo ut ne ejus quidem guttula amplius efflueret, cum vero folliculi reliquum nec forſice, nec cultro auderem abscindere, & extrahere, propter venas & arterias subjectas, digestionem prius tentavi digestivo rosaceo; atque inflammationis metu, à sectione, applicui oleum rosaceum circum circa vulnus, & linimentum simplex. Facta digestionem, superſtite adhuc aliqua portione folliculi, tenuiori, & subtiliori ejus parti adhibui præcipitatum pulverisatum, crassissimæ verò portiunculam caustici, atque paulatim sine ulla effusione sanguinis ambos folliculos absumpsi; sarcoticis postmodum cavitate carne inducta, & cicatrice epuloticis obducta longitudine digiti indicis; quibus feliciter fuit sanitati restitutus æger, non sine præmissa totius corporis expiatione, ex methodi lege. *Idem ibidem.*

#### Steatoma.

Steatoma 4. librarum pondo 10. jam annos pro



pro insanabili destitutum de poplite pendulum excidimus Reverendo cuidam e Carmelitis novae formae sodalibus Sacerdoti, cui nomen Eugenio Castellano Hispano Madritensi pro insanabili tot annos a medicis permultis Europaeis destitutum, qui ponderis, quo fere deiciebatur, impatiens multa se mihi prece, atque obsecratione curandum commiserat: curaviq; secta ample cute, ac tubere cystico circumquaque resoluta, mox ulcere repurgato, & intra 40. dies obducto: intervenientibus ad eam rem Adamo Marchio Medico perdocto, Francisco Mosca, Francisco Romano, & Bartholomaeo Calova in nostro Incurabilium Nosocomio Chirurgis assiduis, ac multos annos exercitis.

Gratiae de Philippis virginum Deo sacrae in Caenobio Jesu Neapoli spectante Mario Schipano viro quidem non sine honore nominando, excutim est per me sub jugulum steatoma, quod selibram pendit: abscessus, qui sex jam annos nullo medicamentorum fructu continenter crescens sacram senuiani perpetuo torserat ac pene jugulaverat. *Marc. Aurel. Severin. de recens. abscess. natur.*

Cuidam sexaginta circiter annorum, Jean Girau de la Four nomine, robustissimo & optimo corporis habitu praedito viro, in ipso dorso, circa nudi vertebrae colli, paulatim steatoma in tantam molem excreverat, ut molestum esset agro onus hocce quamvis indolens, veluti colossicum, amplius gestare: quapropter ut ab ipso liberari posset, expertorum Medicorum & Chirurgorum auxilia imploravit. Vivebat autem eodem tempore Lausannae egregius quidam ac excellentissimus Medico-Chirurgus, Joannes Griffonius, olim praceptor meus fidelissimus, qui cum vocatus & ab agro & ab adstantibus supples rogatus fuisset, ut manum adhibere vellet, curationem hoc modo aggressus est. Primo optimam victus rationem instituit, & ut a vino omnibusque cibis potentia calidis, ad tempus quoddam ante operationem plane abstineret, iussit. Interim apoemata & purgamenta exhibuit, venamque secuit. Sic satis praeparato corpore, cutem ad radicem tumoris ad subjectam carnem usque circumcirca tumorem incidit. Postea totam illam partem tumoris, quae spinam versus tendebat, cum sua membrana unguibus separavit, & integre extraxit, & mox quae haemorrhagiam cohibent, vulnere: quod maximum erat, applicuit: deinde illud more aliorum vulnere feliciter sanavit. Finita operatione, trutinata excrecentia pondus librarum septem excedere reperta est. Vixit homo ille per multos annos sine ullo incommodo. *Guilielm. Fabric. Hildan. Observ. Chirurgic. Centur. 6.*

Elisabetha S. ex Palatinatu, aetatis praeterpropter annorum quinquaginta, steatoma praegrande per annos fere sexdecim gestarat, abscissionem huius ponderosi oneris expetuit, quae & anno 1659. die 21. Februarii Ratisbonae, praesentibus tribus Medicis à Davide Schaffnero, lithotomo & Chirurgo Augustano, feliciter peracta, ceterisque rite adplicatis, ab hoc molesto comite penitus illa liberata, nec quidquam ejusmodi hactenus illi recrevit, seseque optime habuit, cuncta munia sua liberè obiens. Steatoma hoc in podice lateris dextri non longè ab

ischia excreverat, magnitudine caput viri rotundissimi exsuperans, librarum pondere facile decem. *D. Jo. a. Heivogii.*

Vetula erat rustica sexagenaria cursoris plerumque operis destinata; haec a plurimis annis in latere super costis spuris tumorem aiebat puerili capite majorem, qui cum non tantum cursori pedumque velocitati, qua alias pollebat, officeret, sed & identidem hympelate afficeretur, magnopere laetoravit ut a tanto onerosa mole liberaretur. Increbuerat forte tanta B. Affinem meum D. Langelottum Chirurgum felicis specimina aliquot jam tum edidisse; itaque mulier fidens animi ad eum se contectae manus beneficium exoratura. Annis tumoris magnitudine, diviteque venarum, si in grandium, copia exterritus meum quoque poscit consilium; ibi ego in tam ampla tumoris radice, & venarum tum magnitudine tum copia periculum, quod putabam, prospiciens, curam dissuadeo. At illa iterum iterumque nuncium ejus sollicitans mori se nolle aiebat, quam cum mole ista tam onerosa atque incommota vivere. Ergo precibus & constantia mulieris mortem alias expectantis victus, periculo ejus curam recipit diemque sectioni dicit. Praeparata illa, velut ad mortem, animos cunctantem addit, & tantumdem sibi esse adjurat, si vivat sive moriatur, dum ab isto onere immunis esse possit. Itaque me inspectante praesentibusque duobus Chirurgis extirpationem aggreditur, cute neque injectam secundum longitudinem novacula discendi jubet; ibi tum ipse admotis digitis primoribus, quae poterat dexteritate, vesicam vel abscessum a cute solvit, cumque costis eum firmitus adfigi sentiret, forfice immisso radicem amputabat, integramque molem fere sine notabili haemorrhagia, quod stupendum erat, eximebat. Forte merus ex dolorum sensu evatus, qui & constantissimo cuique sub lenta operatione exprimi solet, sanguinis motum sustinuerat. Interim mulier ne hiscebat quidem, sed in Lipothymiam prona, quam dolor haud dubie intulerat, cardiaco revocari opus habebat. Quanta verò illa & quam huiusmodi plaga, dependentibus utrinque valli corii laciniis? vulnus styptico & defensivo obligatum compositis ad latus cutis laxae fimbriis, postridie resolvebatur; ubi cum vulnere oras explorant, fortè arteria rumpitur, copiosis se se iteratisque pulsibus in lucem efferens. Huic cauterium actuale vel decies adhibitum nihil profuit, donec Bodeti styptico occurreretur. Tum deinde abscissa magna laciniarum parte vulnereque per digestiva ad maturitatem perducto consui cutis, commissisque invicem labris intra quinque septimanas sanari coepit, famina nullis interim symptomatis in illa temperamenti duritie labefactata. Tumor siue abscessus exemptus quatuor fere libras aequabat, & si texturæ habeas rationem nihil aliud erat, quam compositum glandulosum pingue membraneum, intertextis copiosissimis inque superficiem satis manifestè expositis venis.

#### *Emphysema.*

Pro tumore ventoso in genu post universalia remedia



remedia consului, ut hoc cat. pl. s. ma. resolutivum ( etiam valens in materia phlegmatica ) apponeretur.

℞. sem. anis. subtilit. pulver. sem. fenic. cummin. c. cui ana qu. art. s. tar. t. bar. ʒj. succi e. m. i. subuci, & vin. aromat. an. q. s. decoquendo in cat. pl. s. ma., quo apostema illud ventosum resolutum est. *Petr. Forest. Obs. Chir. l. 3. Obs. 3.*

## Natta.

Nuper erumpentes si dentibus leviter compruntur Nattæ, sensim marcescunt & pereunt, quod bis observatum *Paravii*, semel in Nobili Lexmina, cujus erumpentem Nattam dentibus vicina mulier apprehendit; & semel in filia suavi jurisconsulti. *Thom. Bartholinus hist. r. 4. cent. 3.*

## Lupia.

Puella quædam laborabat tumore scirrhuso natis jugandis magnitudinis, superiorem metacarpii partem occupante, qui dissensus est meo consilio, adnota super partem affectam laminæ plumbeæ hydrargyro illita, eaque per octo dies gestata minor appruit, nec amplius est reverius. *Simeon Jacoz. obs. 9.*

Frater quidam Capucinus Lupiam habebat in genu, post longum tempus ad summam mollietatem tandem permutata fuit: cujus ratione aperitionem suadebam, ille vero renuit, inquit se Lupias huic amiles resolutione curatas vidisse totius ætatis charta niadida involutis & sub cineribus coctis; quæ postmodum cum cineribus per cribrum trajectis, incorporabantur in formam cataplasmatidis; quod ille per plures dies applicuit calidè, & tumor prorsus evanuit, quod ego valde miratus sum, & postea duas alias Lupias in eadem parte eodem remedio curavi. *Dionysius Pomaret. obs. 3.*

## Ganglium.

Honestâ quædam matrona aliquot annos in poplite in utroque crure tumorem gerebat, pugni magnitudinis in uno, & altero paulo majorem, concolorem, molestum potius quam dolorem afferentem, flexionem tamen articuli illius, & sic incessionem aliquo modo impediens: quem tumorem cum inspicerem, Ganglion esse judicavi. Plumbariis thermis, ut eos extirparet, aliisque remediis, sed sine fructu, usâ fuerat. Ad fortiora transeundum esse docui, illique primum hunc solum præscripsi.

℞. Lixivii, urinx, & vini an. pt. æq. adde ad mens. j. hujus liquoris, aq. vitæ ʒj. spir. juniper. ʒj. cum spongia intincta fortiterentur tumores calidè. Postea apponatur hoc emplastrum.

℞. Rad. bryon. irid. rec. an. lbss. bulb. lilior. ʒij. coq. in aceto fortissimo & contund. & pistentur: addendo olei lilior. ʒij. gummi ammoniac. in aq. vit. solut. ʒij. pulv. rad. ireos ʒij. redigantur in formam emplastri vel cataplasmatidis: continuabat solum & emplastrum in dies domum reversa, spatio trium mensium, unde admodum immutavit tumores, adeo ut licet aliquid adhuc appareret, tamen nullum fere impedimentum amplius adferrent. *Felix Plater.*

*ru observ. lib. 3. pag. 703.*

Juvenis quædam mulier Ganglion habebat in facie Cerasi magnitudine, intra oculum supra zygoma, quod intra mensem discutitum est, aquinota lamina plumbea hydrargyro illita & emplastro inhxâ, ut melius hæreret: eaque super Ganglion adnota, una cum emplastro, splenium satis solidum superimponebam, deinde fasciâ alligabam quæ semphalera à Galeno nominatur. *Samuel Formis Obs. 16.*

Mulier quædam ictum frontis passa est, quem tumor nullus subsecutus est, ante quindecim diem, quo tumor obortus est magnitudinis nucis juglandis, sed mobilis, nuncque dolebat, nunc mollescebat, nunc minuebatur, nunc augebatur, & sic per longum tempus cum maximo incommodo permansit: curatus tandem fuit aq. vitæ cum rutæ succo mixtæ admotione, linteisque fronti applicitis. *Petrus Borellus. Obs. 5. Cent. 1.*

Adolescens sedecim annos natus conquerebatur de tumore duro, indolenteque, qui, in superna manus dextræ parte situs, mole sua nucem avellanam adæquabat, eratque ejusdem cum cute sana coloris; atque jam tertius mensis erat, ex quo æger post laborem consuetum majorem hoc malo affectus est. Jacebat nempe tendo in superna manus parte, cujus tubuli ab in uto labore ita distorquebantur, ut humores, in circulatione multas obstructions pro obstaculo offendentes, stagnarent in tubulis tendinis, tandemque ab humoribus à tergo insequentibus propellerentur usque ad membranam illam, quæ tendinem involvit, ubi, efformata sibi cavitate, colligebantur & crescebant aliquatenus particule viscosiores, tenuioribus interim abeuntibus, & sic exortus est tumor, de quo hic ago, & qui ganglii nomine a plerisque appellatur. Ego pollice manus meæ tumorem hunc validè satis compressi, cumque hoc pacto extemplo evanescere vidi, dum scilicet vi compressionis humores tumorem constituentes protrudebantur iterum quaquaversum per tubulos tendinis; sed quia obstructions sic nondum sublatae erant, ideo recidivæ formidine tenebar, quapropter ad humores viscosos attenuandos & obstructions reliquas tollendas imposui emplastrum de ramis cum Mercurio, & strictam satis ligaturam, quæ impediebat, ne humores viscosi in consuetâ cavitate iterum, ut ante, congregarentur. Sed ubi tumor hic jam per aliquot annos duravit, tunc à pollice comprimente tolli non potest, sed adhibenda est ferula lignea, non dinetens ab illa, qua præceptores in castigandis pueris utuntur, nisi quod plumbi portio in illius medio infusa jaceat; & talis ferulæ unico ictu, ægroti facie à manu affecta in dorsum aversa, prorsus evanescere vidi ganglium, quod per quadriennium patientem vexaverat, cujus medela tunc brevi per emplastrum hic citatum & strictam ligaturam absoluta fuit. *Joan. May in Prax. Chirurg. ration.*

## ATROPHIA.

**A**trophia quam si latine recedere liceret in Nutritionem diceremus, est morbus quo



corpus paulatim emarcescit cum virium debilitate, hic autem non est mere privativum; sed imminutivum; notabilem scilicet non vero absolutam nutritionis defectionem significans: sic *apepsia* non integram coctionis privationem, & *aphaxia* non omnimodam pulsus abolitionem designat; sic etiam *amentes* vocantur qui parum non qui nihil mentis possident.

Triplex cum sit corporis substantia, adiposa scilicet, carnea & solida, videndum quam ex iis consumpta, *atrophia* denominationem proprie mereatur. Adipe carere possumus, nec tamen ideo tabidi vere dici; sic & partes solidæ, venæ scilicet in venulas, & nervi in villos abire possunt; atque etiam ossa aliquatenus minui, satis tamen notabili inde non confecto detrimento quò corporis moles sensibiliter detuneat; quapropter solâ substantia carnea vera ceneri debet *atrophia* sedes, illiusque pars affecta. Non negamus interim adiposam substantiam absolute liquari non posse, minus etiam solidas partes imminui, quin *atrophia* adsit, ac illud est morbi quem pertractamus prodromus, hoc vero ejusdem ut plurimum confectaneum, non verò morbus ipse.

*Atrophia* alia est *universalis*, in qua totum corpus marcescit, si cor excipias quod ad proportionem reliqui corporis non tabescit, alia *particularis* quæ huic aut illi membro in specie intigitur.

De *Atrophia* causa ut aliquid dicamus necessarium fuerit de naturali corporis nutritione, succis illi inservientibus, eorundem præparatione, vas deferentibus, atque applicatione pauca præmittamus.

Nutritio in plantis satis diuturno tempore intermittere potest vita interim incolunt, arborum namque furculi hieme vivunt sine alimento, imò bulbi plurimi e terra post flores emissos educti absolute exsiccantur, nec tamen suo tempore terræ denuò mandati minus vivaces hunc: At in animalibus nutritio & vita pari quasi passu ambulant, nec per effluvia continuo de se emissa deteri possunt quin necessarii deficient, ni detrimentum illatum per succos identidem suffectos resarciatur; hic itaque necessarii fieri debet quod in nave illa, Christophoro Colombo ducente, totum orbem circumagente, siquæ Victoria nomen demerita, confectum est; scilicet dum per tempestum injurias, ambientisque liquidi importunam actionem, aut ruinolam ad scopulos allisionem, tabulæ aliæque ut & alia ædificii quantumvis solidi munimenta deterebantur & confringebantur, ruina illæ resarciebantur novis continuo in partium deperditarum locum suffectis tabulis, trabibus, transtris atque tignis, unde in portum e quo primò exierat redeunda, integra quidem visa est, sed nihil prorsus ex iis lignis è quibus primò constructa fuerat, habens. Sic enim animalium corpora indefinenter renovari amant, inductis per alimenta continuo particulis in eorum locum quæ per sanguinis, humorum & spirituum motus tam naturales, quam violentos per vias, tum sensibiles deturbantur, tum per insensibiles avolant, nec non eorum quæ ab ambiente aere abripiuntur, &

corraduntur, sufficiendis. Persequantur jam alimenti illius tam necessarii omnes præparationes, imò quæ ejus legitimæ distributioni ac applicationi apta nata sunt paucis expendamus. Alimentum ore exceptum dentibus conteritur, & (saliva quasi fermento admixta) pinxitur, hinc per oesophagum in ventriculum detruditur, ut moras illic trahens per particularum novarum in rugis profundioribus cavi visceris resistendum, aliarumque per plura tunica ipsius interioris orificia exudantium, actionem colliquetur ac in pultaceum quid abeat, quod demum per varias fibrarum circumcingentium compressiones in intestina propellitur, ubi bili, succo pancreatico, ac etiam succo ex intestinalibus pluribus glandulis, per proprios cuicque canales depluentibus, admiscetur in ulteriorem perfectionem, & ut parte maximè excrementitia, (salibus scilicet terrestrioribus, viscidioribus & ad motum magis ineptis) per vias sedis præcipitata, depuretur, per tunicas intestinorum in vasa lactea tandem percolandum. Hic per adjunctam lympham, ex omnibus prope corporis partibus in vasa prædicta advectam, fluidius evadit, ut compressioni per motum intestinorum peristalticum, aliamque etiam ab ipsis abdominis musculis inductam, facilius obediens, in glandulas mesentericas filtrationi novæ destinatas, indeque in receptaculum suum promoveatur. Hinc tum per motus prædictos, tum etiam per productionum diaphragmatis ad lumbos usque pertingentium actionem perpetuam, adjuvante canalibus thoracici mechanica, in venam subclaviam elevatur, ibique sanguini confunditur pleno alveo per cavam descendente in ipsum cor quasi microcosmi nate postea conveyendum. Tum deinde per aortam indeque enatos ac productos arteriales ramos totum corpus perreptans, in partes & carnosas & alias solidiores diffunditur, illicque adjuncto succo nerveo, de quo alibi, per villos nervorum undique dispersos, influente, vigoratur magis, & non secus ac aurum mercurio amalgamatum, in poros metallorum deaurandorum commode ac prompte se insinuat, sic etiam succus hic, novo addito quasi instruo & stimulo per prædictos nerveos canales advecto, poros omnes quantumvis minutos pervadens, subtilitatem quam penetravit, faciliè accreiscit, si modo salium spicula ramosis & actionis sulphurum particulis obtusa illam ad sui excussorem non excitent, sed potius ut amico complexu suscipiantur, faciunt. Hisce peractis aquea portio quæ diuturno succo nutritio, eidemque in partes corporis omnes intrudendo, inservierat, spiritibus salino-sulphureis respirationem exercentur, partim per insensibilem transpirationem excernitur, partim per vasa lymphatica in venas ipsas ac propria receptacula abit, novis circuitibus peragendis parata; cruor vero à nutritione tenuius per venas abripitur, salibus axioribus ac minus nutritibus, ut & sulphuribus crassioribus ac terrestrioribus imprægnatus, quod scilicet per novæ in variis visceribus triurationes ac fermentationes de novo præparentur, aut si omni elaborationi legitime produs inepti fuerint, per repetitos circuitus in stercus, urinam, aut alias, foras excernendi, demandentur.



Hiscæ sic explicatis faciliè videre est *Atrophiam* & *Tabem* necessariò induci, si, vel alimentum deliciat per abstinentias longius protractas, easque tum voluntarias, tum etiam ab *Anorexia*, cujus causas supra vidimus, ortas; Vel idem alimentum in ventriculo & intestinis subigi minime potuerit, tum quòd terrestris esset, & totum quali excrementum, vel dentibus minus bene attritum ac saliva merti commistum in ventriculum prolaberetur succis fermentescibilibus, ipsius dissolutioni necessariis spoliatum, ac propterea crudum de ventriculo in intestina exiciens ulterioribus digestionibus ac depurationibus minus paratum fuerit, languideque & parce nimis per crustam intestinorum villosam in lacteas procederet; Vel in ventriculo legitime satis præparatum taleque ab intestinis exceptum, ibi viscidiori, pauciori, minisque activo succo pancreatico, intestinali, aut bilioso occurrat, unde potius colligentur varix ejusdem particulæ quam per inactam præcipationem sep. rentur, ut quod excrementum est infra propellitur, reliquum in canales lacteos tranſvenatur; imò si a purulenta materie continuo de ventriculo aut intestinorum ulcere manante, coinquinetur, aut per irritationem a salibus effertis, undecunque demum advectis, in hæc viscera inductam, totum quantum est purum ac impurum per se dem excidat; Vel crusta intestinorum villosa, per quam percolari debet, obstruata, aut aliàs ita alterata fuerit, quæ ipsi filtrando inepta evadat, proindeque fluxus caliacus oriatur; Vel lymphæ viscidior in lacteis illi admisceatur, quæ ejus motum potius remoretur, quam novos addat stimulos, ut propterea dum per glandulas mesentericas de novo filtrandum venit, illas non ita commode pervadat; imò si hæ glandulæ ita obstruata fuerint à salibus terrestrioribus, ut non tantum parum succi nutritii in percolationem ab ipsis perficiendam excipiant, sed etiam illum exceptum spiculis salinis nimium onerent, unde & paucior, & acrior chylus in sanguinem, & partes corporis omnes devehitur; Vel tumores grandiores, tum vasa lactea, tum canalem thoracicum comprimant, qui liberum succi nutritii per eosdem convehendi conſuetum impediunt, sicque sanguinem rorido illo succo maxima ex parte defraudent; Vel sanguis viscera quædam ita corrupta alluat quæ ipsi labem imprimant, quam chylo admixtus partibus omnibus quas pervadit necessariò inuret; Vel crassior fuerit sanguis, terrestrior, ac aqueo menstruo non satis dilutus ut in poros omnes se se insinuare; imò si acrior, ac particulis salinis ita onustus fuerit, ut depradandis & corradendis corporis partibus potius quam iisdem enutriendis habilis sit; vel succus nervus eo lentore ac visciditate peccet, quibus irretiendis potius particulis sanguineis, quam iisdem in poros partium promovendis, faciat; Vel partes corporis omnes succo nutritio defraudentur, propter ejusdem deperditiones, tum per hæmorrhagias largas atque protractas, tum per effusum venerem, tum per fluxus seminales ac gonorrhoeicos diutinos, tum per diabeticos affectus, tum per ulcera manantia, præcipuè juncturatum, unde humor abundans, Paracelsus Synovia

dictus, exit, tum per sudores immodicos, aliisque id genus, tactas.

*Particularis* membrorum *atrophia* causam suam debet, vel arteriis alimentum deportantibus, exsectis, quæ exsectio necessariò verbi gratia venit faciendâ in cura aneurismatis brachii, cruris &c. Si grandius illud fuerit, sanguisque eo aperto flupticis admotis compesci minime valeat; imò si eadem arteriæ vel obstruantur, vel comprimantur, tum à ligatura arctiore, tum à vicino tumore, tum ab osse quopiam loco suo dimoto. Vel nervis succum ultimæ alimenti applicationi necessarium non devehentibus, tum propter infarctos suos canales, tum propter eorundem continuitatem per excisionem, compressionem, aliisque interruptam; non mirum itaque si paralyti particulari, in qua afficiuntur proprie nervi, *atrophia* succedat.

*Tabes præterea dorsalis* quæ ad *atrophia* classem reponenda venit, duplex est, Una quæ ex seminali aut gonorrhoeico fluxu immodico, illoque aut voluntario, aut involuntario de quibus mox in *atrophia* universalis causis, verbo diximus, procedit. Altera quæ a dolore circa lumbos incipiens, gibbositatem, aut claudicationem non tantum inducit, sed etiam insignem in toto corpore, solo excepto capite, contabescentiam; cujus causa, ut opinor differit *Willisus*, proculdubio in hoc consistit, viz. quòd imprimis humor, sive materies quædam incongrua & morbiica cum succo nervæo per spinalem medullam descendens, in nervorum vertebralium ramis incurrit, proindeque ab initio ob fibras vellicatas dolor ferè continuus oritur; dein ob quasdam è fibris carneis resolutis, oppositam vehementius contractæ spinæ vertebrae quasdam distorquent, & denique siquidem spiritus animales nervos & fibras ad truncum & membra pertinentes haud uberi satis copia actuant, ob nutritionem frustratam, corporis emarcescentia succedit. *Additque præterea*; Profectò cum liquor nervus & spiritus animales e spina dorsali in totum corpus haud plene & liberè dispensantur, proinde marcor sæpè numero oritur. hinc abscessus & ulcera circa lumbos aut os sacrum excitata, quatenus liquorem nervæum abluunt nimis aut profundunt, *atrophia* in toto, aut saltem in partibus interioribus inducunt.

Signa *Tabis dorsalis* satis ex iis quæ mox attulimus patent; *Atrophia* item *particularis* *diagnos* per se nota est ac propterea explicatione nullatenus indiget; *universalis* vero ex sequentibus demonstratur, primò ea affecti etiam si cibis convenientibus cum appetentia utantur, non tamen sic reſcuntur, quin potius in dies strigoli magis nunt, usquedum nil nisi ossa, aridis carniū fibris hisque paucioribus & tenui obducta cute superint; cavantur præterea ut eleganter scribit Menjotius oculorum recessus, acuminantur nares, collabuntur tempora; retortarum ac rigidarum auricularum lobi invertuntur; malæ protuberant; buccæ quasi consuuntur; os patulum est, depressa labia ac dentibus affixa risus præbent imaginem; cervix nonnihil tortuosa est, gracilis & ad speciem longior, non versatilis, sed velut rigens & intentata; larynx prominet; claviculæ procul à



thorace distant, profundæ foveæ interjectæ; costæ perspicue diuidentur, earumque cum vertebris articulationes ac in sternum insertiones redduntur aspectabiles; ipsarum interstitia inania sunt, rhombi figuram secundum ossium circumductum præ se ferentia; curvatur cartilago xiphoides; operata scoptula tota se se aspectui offerentia expansas avium alas imitantur; eminent vertebrarum spinæ, & utrinque ad earum latera tergum, ut canebat Divinus Psalter, quasi vomere in longum fulcatur, hypochondria vacua & quasi excavata sunt, ac superius revulsa; epigastrium atque ilia dorso coherescunt; ad os sacrum & ilium pelvis ossæa cernitur, coccyx caudæ instar exeritur; artus omnes sunt aruidinacei cum articulis conspicuis ac nodosis; uno verbo ossium idea duntaxat remanet, horumque compages cute obducitur flava, exucca & rugosa, quæ præterea ita translucet ut subjectarum venarum livor sensibilis sit; ungues denique ut in feris avibusque rapacibus uncinantur, depasta digitorum pulpa quæ unguum est fulcimentum. Huicce iconi appendamus effigiem jejunæ famis apud Scytas, ut fingitur, habitantis, quam Ovidius ad vivum sic expressit, Metam. 8.

*Hirui erat crinis, cava lumina pallor in ore,  
Labra incana sunt, scabri rubigine dentes;  
Dura cuius per quam spectari viscera possent:  
Ossa sub incurvis extabant arida lumbis;  
Ventre erat pro venire locus, pendere putares  
Pellus, & à spina tantummodo crasse teneri.  
Auxerat articulos macies, genuumque tangebatur  
Orbis, & in medico prodibant tubere salii.*

*Prognosis* quod attinet, quandoquidem atrophia plures agnoscit causas quæ in variis morbis reperiuntur, de ea in specie illic dicetur, hic tantum de Atrophia in genere aliquid addemus, scilicet quod macies præternaturalis nocentior multo sit obesitate morbosa: quod contabescens sit præsertim in infantibus mala, siquidem illi plurimum ad corporis augmentum exigunt alimentum & rarior eorum textura, adipum carniisque consumptione amplius rarefscens, effluviis copiosioribus, atque ulteriori virium exolutioni viam liberiores facit. Marasmus qui ad *anxia* venit scilicet in quo non tantum carnes & partes solidæ sunt diminutæ, sed etiam arefactæ, & si ita loqui liceat quasi exulte, curari minime potest, ut enim plantæ ad tabem absolutam deductæ amplius non revirescunt, sic nec homines atrophia absoluta affecti recorporari queunt.

*Indicationes*, ut & *Curatio Atrophie* deducuntur & quasi emergunt à variis illius causis quas supra enarravimus, quandoquidem autem illæ causæ in variis morbis inde effectis occurrunt, non est quod hic de iis pluribus agamus, eò etiam minus quod, curationes generales &c. ex aliquot celebrioribus Autoribus pro more tradendas jam habeamus.

#### Curationes.

Atrophiam evacuationes acres & solutiones

non tollunt, sed exasperant quasi, tantum si collyries interiora viscera gravat, præsertim ventriculum, vomitus lenes sunt imperandi, præsertim ab aqua benedicta. Eius nimirum peculiaris vis hæc est, ut non tantum saburram eliminet, sed etiam ventriculum ad concoquendum instiget. Unde post aquæ Benedictæ ulum, semper videmus appetitum corroborari, augeique, licet aliquandiu ille sepultus, primum aut omnino nihil effecerit. Hoc itaque auxilium moderate institutum in principio hujus curationis multum prodest. Deinde humectantia imperanda sunt, quæ tamen ita imperari possunt, ut simul obstructions viscerum expediantur. Tartarus ergo vitriolatus cum decocto panularum & syrupis humectantibus, quales sunt syrupus violarum, tussilaginis, betonicæ sumptus, illas solvit. Externa in hoc casu laudabilia sunt in pueris. 1. Balneum ex decocto capitis & pedum vervecis in aqua fluente tamdiu ebulliendo præparatum, ut consumptis omnibus carnibus ossicula tantum possint eximi. 2. Decoct. cort. salicis rubræ in aqua fluminis. Hæc balnea præsertim in pueris maxime atrophie subjectis eam solvunt laudabiliter, si septies, octies, novies, in iis laventur, semel atque iterum de novo præparatis. In Balneis spinæ dorsæ vel ol. olivæ aut unguento aliquo Resumptivo tota inungenda est. In victu dentur humectantia, inscula & brodia, raro assa. Emulso amygd. dulcium cum aqua tussilag. & betonicæ. It. quandoque cum semine papav. albi & meionum maxime utilis est. In adultis Balneum aquæ dulcis, in quo cueres Corylorum, malvæ, bismalvæ, parietariæ, betæ, lactucæ, semen lini, ossicula item Vervecum confusa ebullierint, sæpius institutum, membrorum atrophiam pellit. Idem utile est lac Caprillum. Item aqua destillata ex sanguine suillo, ex plantis refrigerantibus & humectantibus narsice prodest. Aqua ista sic paratur.

24. Sanguinis suilli lb ij. frica manibus ut omnes fibræ auferantur, adde foliorum betonicæ, tussilaginis, rosarum rubrarum, malv. ana. m. j. fol. lactucæ m. ss. sem. melon. excort. ʒ j. aq. tussilaginis lb ij. destilla per alembicum ex B. postea aromatizetur cum tabulis manus Christi perlat. ad singulas libras ʒ iij. de hac aqua bibat sæpius. Sic lac humanum ex uberibus pæsis haultum mirifice prodest. N. B. his, qui ex sumpto philtro atrophie laborant, lac equarum auxilium est præstantissimum: semper tamen cum pauxillo sacchari exhibendum. Consumptionem corporis desperatam nihil scilicet proficientibus aliis remediis, hoc aliquando modo curavi.

25. Mellis virginici q. placet, invige ollam non vitreatam recentem intrinsecus, postea olla plantetur in acervum formicarum, ita ut officium ollæ tegatur cribro mediocriter laxo, & sic formicæ currunt per cribrum & incidunt in mel in eodem hæsitantes, atque sic nihil palearum vel impuratum aliarum intronmittitur. Supra collectarum formicarum s. q. funde sp. vini q. s. digere vase clauso in B. per unum atque alterum diem, dein destilla per B. primo lente, donec nimirum sp. vini prodeat, quo ablato, reliquum ebulliente B. destilla & reserva. Hujus



Hujus aquæ cochl. j. in qualibet septimana ter vel quater jeuno ventriculo cum pane tollo exhibitum, atrophiam corporis mirabiliter tollit. Interim vel totum corpus vel tantum partes distantes aliquoties eodem liquore inungenda sunt (manus, brachia, pedes) quod si nec curatio celerior succedat, tandem procede sequente modo: (hæc curamagnetica etiam in febribus valet) vide infra de aridura.

22. Ovum recens coque in urina consumpti (hominis) in olla nova, ut urina ovum plane contegat, ebulliendo, donec ovum indurecat. Quod ubi factum fuerit, remove ollulam ab igne, & ovum coctum hinc inde foraminibus perfora ligneolo acuto, ut foramina pertingerent vitellum, postea idem ovum perforatum in eadem urina reliqui coque semper vertendo ovum, donec urina plane consumpta fuerit: postremo ovum sic paratum sepeli in acervo lorumacum. Quamvis itaque ovum a formicis consumptum & exesum fuerit, mirabili *consumptio* consumptio corporis desinit, & nutritio subsequitur pristina elegans. Interim vero superioris liquoris usus non est negligendus. In Atrophia puerorum à Dracunculis (seu vernaculis in cute, juxta partes carnosas & musculosas a vitiatò nutrimento progenitis) si quæ comedunt, nihil tamen apponitur, hæc cura est approbata.

23. Radicis bryoniz ʒj. vel ij. coque in lixivio cineribus quernis parato in puliculam, qua pueris dracunculis laborantibus in loco calido (balneo) illine totum corpus & relinque aliquandiu, sic vermiculi per poros exerunt capita nigrescentia. Itaque universa cutis statim radenda est novaculis. Amputantur hæc ratione capita vermiculis consumptoribus (*Minister*) & causa vitiatæ nutritionis aufertur. Hæc verò operatio semel atque iterum repetenda deinceps fuerit, donec nempe certum extiterit, vermiculos omnes esse sublato. Exinde pueruli balneantur aliquoties in infusibus illis, de quibus supra dictum est, vel ex capitibus & pedibus vervecinis, vel ex corticibus salicum rubeis præparatis. *Joann. Hartman. Practic. Chymiatric.*

Balneum ex decoctione pedum vervecis prodest ob non uel. ginem, quam habent. Si metus sit venetici, Corylus addatur. Semen lini humectat, ut & semen althææ, ex nucibus cum semine fenugreci f. Emulsio. Quo & nuclei pini & pistacia pertinent. Quidam nuclei caprillo præterre voluit Lac sininum, sed lac humanum magis prodest interidum. Vid. Paulum, qui hoc modo convaluit. Unguentum *Lusitani* describitur in Praxi ejus admiranda lib. i. hist. pag. 107. & ita se habet.

24. Gummi tragacanth. arabic. ana ʒj. Infund. acet. rosar. diem & noctem. Postea addatur ol. viol. r. ʒi. butyr. recent. ʒss. camph. ʒj. m. in mortario cum lacte muliebri, ut fiat unguentum. Convenit porro aq. sang. suilli, cochlear. testudin. ostrearum. Syrupus de testudinibus, elect. resumptivum &c. Externe in arthrit. particulari convenit arcenum solis Felicis Uvurii, sp. lumbricor. terrestrium, formicarum. sp. vitriol. in quo rad. Aronis, raphan. armoraciz & sem. urti & insula suere, unguent. Agrippæ, nervin. August. It. Pingued.

humana, vulpina, lupina, ursina, canis, taxi, ol. stillat. juniper. taxi, cera, piperis. Quidam etiam addunt aliquid euphorbii. Pueri hujusmodi atrophiam laborantes è verbis mittantur in balneum, illinantur melle & spina crustæ panis fricetur. Si à ventriculo oriatur atrophia, corroborantia ventriculum profunt, ut ol. stomach. Cratonis. Non minus & empl. ejusdem & de tacamahaca convenit. Si ab hepate alentur aq. ex hepatibus, & ea quæ hepar roborant. Atrophia scorbutica singularem requirit curam, si enim vulgaria tantum adhibeantur, affectum non attingunt. Cum enim adsit sanguinis vitium, antiscorbutica postulantur. Datur quoque atrophia ex nimio fluxu mulierum albo. It. ex Gonorrhœa, quæ ex alio capite curanda. In atrophia mesenterica conveniunt ea, quæ profunt in hypocondriaca. Radix graminis hic bona est, quæ habet vim aperienti. Si humor cordialis absumitur, arefit cor & atrophia oritur, ut observavit D. Michael in puella, cujus cor ut pyrum erat arefactum. Prodest ergo electuarium resumptivum cum rob. passularum, aq. caponis cum syrup. de testudinibus. Unguentum resumptivum externe & pinguedo humana: emulsionem præparari possunt cum aq. destill. ex testudin. & amygd. dulc. nucl. pini & pistac. aq. Ferdinandi Epiph. nii, aqua contra atrophiam, aq. antihectica ex canceris Schroderi diligenter & recens destillata citra empyreuma. Decoctum & juscula ex sem. 4. refriger. pistac. pin. amygd. clysteres alterantes & nutrites & alia, quæ in febre hæctica prodesse solent, loco hoc quoque mutatis quidem mutandis commodè adhibentur. *Joann. Michael. Prax. Clinic. General.*

Aqua Cochlearum rectè destillata atrophiaz medetur, valenter nutrit, illa sæpe sapius felici cum successu semper sumus usi. Proposui- mus singulare remedium, & quo aliàs ipse summa cum languentium utilitate, felicissimoque successu sumi usus. Remedium hoc singulare ad impinguandum partim est à Cardano desumptum, & partim ex nostro Marte inventum, & à nobis aqua mirabilis dicitur, cujus hæc est descriptio, quæ mihi semper secreta fuit, nunc autem ad languentium commoditatem & studiosorum curiositatem, publicandam esse censui.

25. Sanguinis porcini juvenis & adulti nuper decollati lb ij. terebinth. Venet. lb j. liquirit. raf. lb ʒ. passul. m. v. ficum ping. numero 50. rad. ireos ʒ ij. pincar. mundatar. m. ij. fol. tabac. m. ij. micæ panis lb ʒ. destillentur in vase vitreo optimè obturato servetur, in loco frigidissimo. Mirabilis est hæc aqua sumpta ad ʒ ij. cum modico saccharo alb. per 15. dies: impingnat valde, & restaurat omnes hæcticos, etiam morituros, sed morituri postea redeunt ad consumptionem statim; est gustui grata, maximeque ac incredibilis efficaciz. Inter cætera quæ maciem arcent, sunt somnus longus, gaudium, lætitia, quies è contra, curæ, sollicitudo, anxietas, & nimia venus, corpora siccant. Cibi saliti & herbacei fugiantur tanquam parum nutrites, acetum maxime improbat, nam præter quam quod vitam breviat, corpora etiam exsiccat, approbamus aquæ dulcis Bal-



nea, inunctiones universales ex ol. amygd. d. rec. & pinguedine gallinæ cum rosaceo, & iuscula restaurantia. Si nactus fueris ægrotum aliquem divitem, & supra dicta remedia non juverint, tuto confugere poteris ad balneum lætis, quod tantopere laudat *Avic.* in macilentis, consumptis, hecticis, arefactis, & marasmo confectis. *Epiphanius Ferdinandus Hist.* 20.

### Consultationes.

#### *Atrophia in Pæro.*

Consultationem accepi pro Infante Illustriss. peregrinis equidem doctrinis ornatam atque illustratam, quibus tamen minime opus habuit exultimatio vestræ sapientiæ, quæ apud me cuilibet auctoritati præcellit. Quare & ego vobiscum censeo Nob. Infantem, sex abhinc mensibus in atrophiā paulatim perductum, adeo ut tandem marasimum frigidum reformidare debeamus. Hanc autem ab alimenti defectu provenire nullus est cui non constet; non quidem ratione objecti, sed facultatis aut instrumenti, alimenta quippe oblata, quantitate, qualitate, & ordine nutritioni accommodata, ab imbecilla tamen facultate coëctrice ventriculi probe coñci nequeunt; unde absoluta, non respectiva censenda, ab intemperie frigida & humida proveniens. Hæc autem non solum naturalis, sed potissimum ab impuro lacte, & destillatione a capite ad ventriculum magis adaucta; unde recte dicebat Gal. quod a cerebro valde humido ventris quoque consequitur humiditas; cuius propria passio solet esse diuturnum alvi profluvium. Verum quoniam non sola intemperie, sed organico quoque morbo affici Infantem Nobiliss. vobiscum suspicor; cum facile iam a lacte impuro, & facilius mox a solidioribus alimentis exhibitis; ac tandem a cruditatibus manifestis, quotidie in ventriculo genitis, obstructions in lacteis, necnon in mesentericis venis necessario subortas esse conjiciendum sit; ideo imminuta chylicationi accedit quoque alimentorum non probe elaboratorum interceptus transfluxus, cui succedit eorundem corruptio, ac proinde necessaria quotidiana per alvum excretio; unde ob vitium tum facultatis tum instrumenti diarrhæa sovetur, non tamen stomachi lis tantum, quoniam, si non lienterix, colicæ saltem passionis indicia hucusque apparuissent; ut propterea mirachialis, seu intestinalis proprie magis sit nuncupanda; quam flatu, umbilicum & partes illas distendentes a cruditatibus in iisdem locis, diebus aliquot suppressis elevati, abunde indicant. Hujus autem diarrhææ causas immediatas fovere potuerunt, & deinceps poterunt dolores, vigiliæ, inquietudines, gingivarum inflammationes, quæ dentibus erumpentibus, contingere solent; unde dicebat Hippoc. Alvi profluvia his esse familiaria. Quibus ita se habentibus, quid mirum si Illustrissimus Infans non nutriatur; sed quotidie gracilescat, cum alimenta primò imminutè concoquantur in ventriculo, mox in via perfectiorem elaborationem vix adipisci possint; transfluxu tandem eorundem ad hepar in-

tercluso.

Ut autem nos medicam opem seramus, primis viis cruditatibus satis emundatis obstructions omni industria sunt referendæ; ventriculus exsiccandus; jecur roborandum; nec dentitionis difficultas posthabenda; & congruis alimentis corpus nutriendum.

Quæ omnia sicut præstari possent in adultiori ætate; ita hæc tenella in dubium revocantur. Nihilominus quoniam audio plurima assumpsisse infantem, in o & vinum ablynthite, beneque se haberet ad oblata; ideo salutis ejusdem non est omnino abicienda spes.

Quare tribus aut quatuor continuis diebus, exhiberem niel rosac. simplex, vel etiam clarif. ad 3 ij. aq. cinnam. aspersum, mox aquam ex succo agrim. destillat. m, in quæ gutt. vj. auc. vij. sp. tartari ter quaterque retineati dissoluta fuerint, quotidie plures dies præberem, vel infunderem 3 j. rhæb. opt. in eadem aqua, vel in jure agrim. pentaphyl. & radic. gram. per noctem; eidem addendo gutt. spir. tart. matutinis horis pariter exhibendum. Et interim iuscula omnia, quæ cibis parandis conficiuntur, china optima & modico lentisco alterare. Neque quotidi nam ventriculi aromatizationem omitterem, unica guttula olei veri atque legitimi cinnam. vel rotula, vel vini, aut juris cochleari instillata, & a cibo exhibitæ; sicut & usus salis ablynthii, in gratiam quoque hepatis, non est posthabendus.

Dum verò hæc omnia intrinsecus administrantur, extrinsecus inunctio totius corporis, oleo amygdalino recenti uberiori, non est prætereunda, sicut & torum al domo, ung. roi. aliquot gutt. ol. lil. alb. affusis, erit inungendum. Ventriculo vero emplastrum me pluries expertum applicari poterit, paratum: ex mentha viridi contusa termento, pulveribus multiches, & rosar. cum vino malvatico, vel saltem albo generoso refinatum.

A quibus, obstructions diminutis, ad usum lactis, tanquam ad sacram anchoram, quamprimum coniugiendum erit; faciliorem enim quam cætera alimenta concoctionem admittit, & quia satis crassum, ventrem silit, valde nutrit, pauci est excrementi & huic ætati est alimentum familiare atque proprium. Quod si res bene cedat; a vino omnino erit abstinendum; ventriculo tamen semper aliquam corroboracionem conciliando. Dentitio autem erit promovenda, illinendo gingivas lacte canino, aut leporis cerebro. Quæ omnia felicem poterunt sortiri eventum, sub vestra prudentissima, & inculpata administratione, cui ideo omnia libentissime committo. *Joan. Keym. Fortis Consult. tom. I. p. 339. 3<sup>a</sup> seq.*

#### *Frigidus Marasmus Consultatio prima.*

Senium irreparabile nobis esse testatur quotidiana experientia, quoniam quotidie resolvimur, tum extrinsecus ab ambiente aere, tum intrinsecus a calore nativo. Et licet humidum instaretur; semper tamen deperditio siccior evadit, operationibus quidem aliquo tempore accommodatis, non tamen pro vita; prout humidum juvenis cum humido veri collatum; unde jure merito irridebat Gal. Philosophum quæ-



quendam, qui quadragenarius liberum scripsit quo docebat quomodo deum vitari posset; octuagenarius autem tactus, adeo consumptus fuit ut nium apud omnes concitaret. Sicut autem naturale est quod annis labentibus evenit nobis: ita præter naturam quod immature juvenilibus annis contigit, ut in Illustriss. Com. Pat. nostro, 29. annum agente, qui hypochondriaco affectu illegitimo pteus, non tamen subsecuto exsiccatório morbo, minusque nigro, aut corruptorio, ad gravem tamen adeo atrophiam, spatio mensium, modo perductus est, ut proprie magis marasmo eundem laborare affirmare possimus: cum humidi consumptio, ex siccitate adhucum fiat, nondum verò facta sit, tunc enim Tabes genuina proprie nuncuparetur, frigidus autem hic, non torridus, minusque syncopiticus habendus; cum sit citra febrem & lyncopen.

Nec senium ex morbo hic proprie vocandus; cum hoc ex cordis affectione promanare dixerit Philippus. Marasmi autem consummatum & tabidum non esse, facile nobis suadere potest ejus signorum absentia; hos enim caloris vitalis non perit, squalidum corpus non est, cutis circa frontem nondum sicca & obtensa, nec oculi adeo concavi, neque collapsa tempora. Et licet abdomen, ex hypochondriaca affectione, tum gracile tum depressum sit, præcordia tamen vehementer adacta & contracta non sunt, nec thoracis cutis sicca ac arida; & veluti corium digitis apprehensa produciuntur, necdum pulsus adeo rarus observatur.

Ortum verò duxit affectus hic ab hypochondriaca affectione, ex venis lacteis & mesentericis a crudo & copioso cibo obstructis procedente, non tamen pylorum primario & essentialiter afficiente; quæ ideo non legitima, ut illa a Gal. descripta, sed illegitima fuit. In omnibus tamen hypochondriacis semper solet Jecur accendi, cujus causa pylorus deinde in modica caliditate exurit, unde altitudines circa partes illas, necnon arteriæ pulsatio, compressione tacta, sicque ventriculus tere siccus esse solet, non solum quia ipsius calor ab immoderato jecoris fervore veluti extinguitur, sed quia turbatis somnis, profundis cogitationibus, necnon jugibus cruditatibus paulatim viscerum humidum substanticum absorbitur; quo deficiente, calorem quoque languescere necesse est, ob jecoris vero incendium succi alimentales una cum crudis, in nostro Pat. Illustriss. combusti quodam modo & liquati fuerunt, renum attractrice facultate non parum adacta: unde urina, tum copiosa, tum in superficie pingues diutius apparere; sicque partim ex primis concoctionibus male peractis, (cum naturalia instrumenta quanto sicciora, tanto ad nutriendum inepta magis sint, potissimum innato deficiente calore) partim ex liquatione, & insensibili per halitum succorum alimentarium resolutione, consumptis humiditatibus, tum ingominatis tum torridis, siccitas modo cambiū depascere non desinit.

Ideo sedulo agendum, antequam partem glutinosam corporis siccitas obsideat, & tabes suboriatur; tunc enim omnino desperata res

est: *Tabem enim curare nunquam speraveris, dicebat Gal. nam licet caliditas, si adju. remitti possit, remanet tamen siccitas, quæ senectutis ritu hominem interficit.*

In quem finem, Medicæ intentiones ex fonte I. ixtetico potissimum sunt desumendæ; est enim omnino munecandum, sed substantificæ, ut totum renutritur, moderate autem calefaciendum, majori namque calefactione egeret, si senium ex morbo adesset.

His itaque intentionibus satisfaciant alimenta. Quoniam verò cibus non se ipsum ad omnes corporis partes devehit, sed ab ipsis egenis trahitur, & partes invalidæ præ siccitate, sunt ad attrahendum infirmæ; ideo alimentum ut facile attrahatur, necesse est; hoc autem erit tenuium partium, & moderate calidum; cum tamen hoc parum admodum nutriet: crallum namque, viscosum, firmum & difficilis resolutionis debet esse, ut prompte assimiletur; ob hanc ideo contrarietatem non adeo facile alimentorum copia suppetit. Quare utrumque dumtaxat præstare poterit lac humanum, utpote quod magis alimino nutriet, præcipue si æger muliebrem mammam ore sugat, ut Euriphon, Prodicus & Herodotus Gal. præceptores censebant; idque quoniam lac statim mulctum, ut genitale semen, vim suam & facultatem amittit: cum præterea, ut non modo concoquatur, sed & distribuatur, ac partibus alendis assimiletur, natus ejusdem & spirituosus proprius calor, jam dictarum facultatum imbecillitati non parum prodesse possit. Quare, postquam postremis hisce diebus, lactis alimini uberiori vim naturalia instrumenta, in abdomine conclusa, abundè humectata & pervia reddita fuerint, statim Nutricius erit committendus I. at. Illustriss. ut altera interdiu, noctu altera lac ipsi præbeat, quarta, aut ad summum quinta quaque hora, & qualibet vice, antequam mammam sugat, sacchari fini cochlear degluriat. Quantitas verò lactis sit ad mammæ dimidiam exinanitionem.

Et quoniam aliorum alimentorum lac societate non gaudet, ideo per aliquot temporis spatium solo lacte contentus sit; bis tamen in die, tum mane, tum vespere, vini albi subdulcis & perumper aromatici semicyathus, cum ossa panis madefacta concedi potest, cum frigido marasmo conveniat.

Sed quia exsiccatæ sunt totius corporis partes, ac venæ, propter attractrice facultatis imbecillitatem, unde difficilis evadere posset etiam lactis distributio: ideo in hunc finem picationes ab Antiquioribus commendantur: quibus nos manibus oleo amygd. abundè munetis, cutis non solum: verum & musculorum contrectationes, & placidas evulsiones substitumus, iterum, vel tertiò in die adhibendas: Dum eodem tempore inunctiones ubiores præcipimus, (cum temporis inclementia balneum non admittat) ut autem oleum jam dictum penetrantius evadat, bulliat cum paucis malvatico.

Mense verò exacto, sola sufficere poterit nutritrix, lactis inopia substituendo prænam hordeaceam dilutam, cum emuls. amygd. dulcium, & nucleorum pineorum, cum pugillo sacchari, & cochleari instaurantis ex capone, in paucis



jure dissoluto his in die, quinta aut sexta quaque hora.

Et dum jam dicta omnia sunt, alvus clysteribus ex lacte & butyro, vel ex jure pingui & butyro, vel ex ol. amygd. & butyro, erit promouenda, & quandoque saccharo tino addito, sollicitanda. Somnus utpote maxime necessarius, erit conciliandus martio pane, ex amygd. & saccharo, cum ꝑ. sem. papav. ꝑ. pro qualibet libra, simul contulis; cujus dosis erit ad ꝑ. ij. quo non sufficiente, injiciatur clyster ex lacte, in quo dissoluta sit ꝑ. j. philon. Rom. rec. qui tamen non ultra tres horas aut quatuor contineatur. Et tandem, ad inhibendas pollutiones, quibus, ob renum & vasorum irbecillitatem, a calore contractam, obnoxius esse solet, hac inunctione illinatur renum regio.

Ꝟ. Ung. ros. Mes. ꝑ. ij. popul. ꝑ. j. ol. saturnini, id est de plumbo ꝑ. ij. camphor. ꝑ. ss. succi sempervivi, ol. nenuph. an. q. s. m. ref. in mortario plumbeo. Abdomini continuo applicetur lana oleo amygd. imbuta, addita exigua portione mastichini; interdum omenta suilla & vitulina iisdem oleis madefacta.

In cæteris Aer sit temperatus; utraque exuperantia, tum frigoris, tum caloris nocere potest. Nutrices selectioribus refrigerantibus & humectantibus cibis alantur abunde, vinumque dulce iisdem exhibeatur, substantiæ namque debet esse eorum victus ratio; etenim Galen. Alinis quoque victus rationem præscripsit. Quies quam maxime conducit: Animi pathemata arceantur. Et læto & præsentia animo vivat.

#### *Pro eodem Consultatio secunda.*

Iusta curatio præscripta & administrata refraganda, & tandem superanda atrophie universalis, quæ Pat. Illustriss. ad tabem, sine febre marasmodum scilicet frigidum perducere videtur, cum duorum mensium spatio nihil profecerit, cogitandi ansam nobis præbuit, ne in eadem persistentibus, marasmus qui non adest, tandem succedat. Ex duabus autem causis nos resolvencibus; considerata potissimum universalis diaphoretis, live insensibilis resolutio, qua non procedente, neque corporis nutritio neque alimenti appetentia fieri potest; cum totius exinanitionem sequatur exinanitorum desiderium naturale: huic verò succedat succio, dum vasa majora in centro à minoribus in circumferentia sanguinem attrahunt, ut necessarius appulsus sanguinis ad cor conservetur; quare exuguntur quoque venæ ventriculi, divinum cibi promptuarium à Gal. dicti, quam suctionem mox percipit ipse ventriculus; cui succedat tandem fames, appetitus animalis; & ita, quo copiosior facta fuerit totius habitus corporis resolutio & inanitio; eo majori, copiosiori & et stiori alimento indigebit corpus; morbosam namque tunc temporis evadit, & affectum illum constituit, à Gal. descriptum, his verbis. *Quandoque Pat. multos assumis cibos, qui neque crudi sunt, neque per alvum deiciuntur, neque plenitudinem efficiunt, neque etiam probe alere possunt; sed dissipantur, discurruntque celeriter.* Hocque nobis persuadet, quod sufficiens alimentum, lac nimirum Illustriss. Pat. præbatur, quod chylicationis nec imminutio, nec deprava-

vate elaborata signum exhibet, quodque sanguificationem satis idoneam subire concipiendum; quoniam totius calor probus est. Quod si, aut ob valorum exsiccationem ad partes non permearet, aut calor partium, ob imbecillitatem, hoc ipsum non actuaret; inutile certe in corpore retineretur, licque cachexia jam præludium adesset; quæ jam dicta cum in nostro casu non appareant, alimentum insensibiliter resolvi credendum; eo potissimum, cum caloris immodici & acrimonie alia signa non deint; frequentes nimirum nocturnæ pollutiones, cum simulacris jucundis; atque adeo ab irritata, non laxata facultate provenientes; & præterea molestæ ac contumaces vigilie, corpus dissolventes.

Quare deliberatum fuit, non solum alimentum qualitatem, verum & quantitatem esse alterandam; magis enim glutinosum, nec adeo facilis resolutionis debet esse, & quodammodo plenius; atque interim totius corporis obstructio continuo procuranda, pollutio inhibenda, & somnus conciliandus.

Quibus intentionibus satisfieri debere censemus, bis in die, lac naturali substituendo artificiale, ex jure pedum vituli, borraginæ alterato, quo extrahatur emulsiō ex amygdalis, nucleis pineis, & sem. melon. cum mouto saccharo. Quod si fortasse observetur ventriculus aliquo pacto gravari, addatur quoque cochlear aquæ cinnamomi ut frigiditati ejusdem & cordis prospiciatur; progressu vero dictum, addatur quoque unctio urinis pullæ, non omisso interim lactis muliebris usu, duobus aliis vicibus, intra diem naturalem, addito pane tino albo satis aromatico madefacto, ita ut quater in die alimentum assimiat.

Extrinsecus verò inungatur totum corpus ol. violaceo, addito quoque myrtino. Somno autem conciliando, injiciatur Clyster ex lacte, in quo Phil. Rom. rec. ꝑ. j. dissoluta fuerit; & tempora atque futura coronalis ol. nenupharino inungenda: hoc enim solo ad contumaces vigilias uti solebat Rhasis.

Ad nocturnas pollutiones sistendas, præberi poterit camphora; verum à proprietate pariter prodesse solet pulvis ossium lepiarum ad ꝑ. j. Mirabilis quoque censetur à Medicinæ scriptoribus tinctura corallorum chymica. Extrinsecus verò, cæteris incusum tentatis, præstat oleum ex seminibus hyoscyami expressum, quo illinantur pudenda, & potissimum perurium. Quæ tamen omnia ab Excellentiss. Viris præsentibus summa observatione administranda & ad libitum corrigenda.

#### *Pro eodem Consultatio tertia.*

Historia tum præteritorum tum præsentium de statu Illustriss. Com. adamus ab Excell. Viro descripta ac delineata, nos movere ad renovanda ea quæ possunt ipsum ad meliorem statum redigere qui quoniam in nutritione consistit, victus quoque potissimum alterationem desiderat: in quem finem, parumper immorandum præteritorum considerationi, & quærendum, cur à iusta alimentorum quantitate corpus totum instaurari, live carnis moles augeri non potuerit? quod dubio procul non aliunde



promanare potest, nisi quia alimentum in sanguinem non convertatur; vel quia sanguis à partibus suscipiatur quicquam, non vero assimilatur; qui rursus non. assimilari potest, vel quia ab earundem partium imbecilli calore non actuetur, vel quia sensibilibus & insensibilibus dissipetur, ac resolvatur. Virtus. primum non adeo credimus, qui copiosiora excrementa & cruditates in primis coctionibus accumularentur & observarentur, neque secundum, quoniam si sanguis copiosius produceretur, neque à partibus absumeretur, vix copioso sanguine turgida, hujus nobis signum aliquod præberent. Superest igitur, ut vel non actuetur ob imbecillitatem nativi caloris partium corporis, vel dissipetur. Quorum utrumque nostro calu concurrere credi potest, nec enim partes, caloris principio proximæ, satis humescunt atque nutriuntur, ita remotiores exsiccata magis apparent. Verisimilius tamen, quod, cum corpus totum rariæ texturæ, valde transpirabile & resolubile sit; sensibilibus ideo per sudorem & per h. litus insensibilibus alacritatem, non tam cito à caloris imbecillitate in partes conversum, continuo resolvatur, eoque facilius, cum propter vaporum & viarum exsiccationem, ægermine ad partes devehiri possit, quæ mora ipsi resolutioni commodum & opportunum tempus præbet.

Quibus ita habentibus, medicæ intentiones esse debent, alimenti quantitatem augere: qualitatem alterare; illud opportuno tempore devehere; & totius corporis porositates densare.

Et primò, si de quantitate loquamur, ea fuerit quantum ventriculi vires tolerare possint: si de qualitate, crassior & resolutionis difficilioris præscribenda erit; si de alimenti distributione, laxantibus quidem & humectantibus, sed & attrahentibus utendum. Et tandem cutis densitas ex cautione procuretur, quæ necessariam excrementorum resolutionem, & caloris nativi transpirationem intercipere nequeat.

Itaque lacti bis assumendo, ovum recens trenulum addiposce credamus: ea ulioni vero substitui potest. nam hordeaceam, ab Excellent. Viro propositam, e reducimus, cui addatur ea ulio amygd. more lernel. & pine. rum nuclei. cum pulli instaurante, cum qua tamen simul bullit vituli pes, omittis seminibus melonum & plantaginis foliis, à qua ebibat insultum vini odoriferi, potius generosi. Mox quibusdam exactis diebus, poterit minutim incidi pulpa pulli, & simul cum ptisna misceri, matificationi instituta; omisso tamen instaurante: quæ si à ventriculo bene tolerentur, matificatio erit augenda pullis nuper natis, & torbitiones minuenda; ita enim majoris durationis, magisque firma evadet ipsa nutritio, cum, *coram, quæ facile nutriunt, veloces quoque sint excretiones.* Totum verò corpus erit oleis consuetis mungendum; quæ inunctio si Viris Excellentiss. non sufficere videatur, paretur illitus totius corporis, manibus leviter faciendus, ex duabus partibus ung. ros. Mel. & tertia medulla crurum vituli, sic enim majori poros cutis obstruendi, nec exigua humectandi ac nutriendi vi pollebit. Sed interim aliqua attractione

omnino opus fuerit; quare loco molesti rum picationum, manibus amygd. oleo inunctis contrectentur cutis, & musculi cox. rum, tibiarum atque brachiorum, idque quinque horis ab assumpto cibo, quod tempus distributionis proprium est.

Et quoniam aliqua de vigiliis querela obauditur, & inunctiones capiti nocere ferunt, panis martius, utpote medicamentum à inentarium, à nobis proponitur, exigua quæritate assumendus. Quæ jam dicta salutaria fore speramus, Sapientissimæ Excellentiss. Virorum administrationis ope.

*Pro eodem Consultatio quarta.*

Si longè difficilior est humectare siccum, quam exuccare humidum, cum illud non simplicibus, sed materialibus qualitatibus remitti debeat; quid dicendum fuerit, quid cogitandum de substantiæ humiditate, quæ in hoc illusterrimo Comite jam fere ex toto fuerat absumpta? Unde Hippocr. multo magis, semper errores in tenuiori quam in paulo pleniori victu reformidavit, prout pariter exanitiones, quam repletiones ipsas; quia non adeo difficulter evacuantur, prout ægermine implentur corpora atque instaurantur. Rationi itaque contentanea, quinimo necessaria sunt, hæc paulatim & gradatim procedens in pristinum restitutio, dum de humiditate substantiæ reparanda, & prius de intemperiebus siccis, omnium pessimis, auferendis, semper huc usque actum fuit. Neque ideo mirandum si hyemali adventante frigida tempestate, aliqua symptomata emerferint, inofficiosa nempe alvus, sedimentum urinarum consuetum crassius atque limolius; & tandem somni breves: etenim primò ventris segnities, sicuti ex defectu biliosi excrementi sæpe provenire solet; ita casu nostro à congestis cruditatibus, ab ambiente frigido primò à capite in ventriculum expressis; mox & ab eodem refrigeratis visceribus, & ventriculo potissimum, productis (cum antiperistasis in istis gracilibus corporibus locum non habeat) aquarum proventu bilis facultas retrahit, imo & partim expultrix oblita & segnior reducta, alvum à proprio munere vacare coegit; cuius rei indicium præbere potest plumbeus ille color, instar non bene confectæ ptisanæ. Adauctis autem cruditatibus, & eodem tempore constipata diaphoresi, & insensibili consuetæ evacuatione necessario imminuta, quid mirum si sedimenta in urinis crassiora apparere ceperint? Tandem somni brevisitas melancholicis familiaris esse solet, quia siccitas primum locum obtinet in vigiliis excitandis; unde habet cum Hippoc. Gal. quod senibus facile vigilare sunt, cum quia senectus plena curarum, tum quia senes exsiccatum corpus habent, quibus nos addere possumus vigilandi consuetudinem, quæ in Illustriss. Viro, ab animi studiis, sive timore facile originem duxit. Quæ omnia licet à nobis parvi facienda videantur; in Illustrissimo tamen Juvene omnino negligenda non sunt, ne confirmentur, neve augeantur, & ne absque medicis auxiliis, anxius propria mala foveat.

Quare proba concoctio est adjuvanda, som-



nus conciliandus. Et quia illa non parum ab alimento concoquendo pender; ideo alimenta concoctu facilia, nec adeo crassi succi; quibus conficiendis ventriculus agendo non repariatur, sunt deligenda; atque ventriculo robur aliquod conciliandum; licet enim de nulla ejusdem querela fiat mentio; edulia tamen adhuc cruda dimittere credendum.

Pisanae itaque usus omnino rejiciatur, ut quae non nisi febricitantibus, astanti ventriculo, & hypochondriis, continuo conveniat, crassumque succum producat, pincis praesertim adjuncta; & vi deteriora praedita, reliquos quoque cibos a ventriculo citius, quam par est, expellat, hujus autem loco, assumat edulium aliquod ex ovis paratum, vel ex Apula pasta, vel ex oryza dilutiori, vel ex endivia & borragine in jure coctis, ovis additis. Nec caro pullae amplius confusa, sed conmansa assumatur, ut ita ventriculus magis uniatur, nec adeo ut a liquidis laxetur. Ita convenient caro tenerissima Volucrum sylvestrium, non tamen aquatillum. Pisces quoque saxatiles, & ova recentia. Vinum sit potius generosum quam tenue, nigrum, non tamen omnino meracum. Quod si inter coenam & prandium primis horis matutinis, paucis aliquo alimento opus fuerit, hoc sit jus pullae cum ovi vitello conquisitum; quod nonnunquam malva aut mercuriali alterari poterit, ad alvum emolliendam.

Aliqua quoque ventriculum roborantia in usu habenda, ut grana mastiches, hora una ante cibum integra deglutita; aut sal abynthii, aut ejusdem conserva; prout extrinsecus pannus coccineus ventriculo adinducendus, & gestandus, ut calor ejusdem proprius soveatur potius quam alienus accedat. Somnus vero accersendus auxiliis aliis a nobis propositis, & potissimum usu panis martii, qui parari poterit ex 3 ij. sem. p. pav. albi, pro qualibet libra amygd. & sacchari, ita enim unica sufficit uncia, a coena assumenda, suavis etenim, nec minus noxium praescribi potest familiare somniferum. Meditationes sub ingressum lecti ableganda, his enim praesentibus somnum conciliare impossibile foret. Quae in gratiam perfectae salutis, a nobis ex intimo pectore Viro Illustriss. optata, raptim, scripta fuere, a summa prudentia Viri Excellentissimi Adstantis melius disponenda.

#### *Pro eodem Consultatio quinta.*

Vicit ut Leo, Fortis, quia Gallum non hostem, sed amicum, in eo communionem habuit, qui arena sive campo potitus, Leoni gloriam comparavit, licet palma cum campo, Gallo debeatur; Utinam vero in mearum consultationum executione pro commilitonibus, Medicos ad erasantes, sive remediorum subversores frequentes non haberem, qui aut ignari, ne unguem quidem a praescriptis discedunt; aut arrogantes, praescripta mutare contendunt. Quare tibi potissimum, in omnibus quidem, sed praesertim in re medica pererudito, atque prudenti Comes Illustriss. pristinam sanitatem debebit.

Duo autem nobis supersunt in praesens consideranda; Urinae a naturali statu alienae, & vi-

etus ratio in ceteris observanda. Urina quidem, primo coloratiores, aliquando vero cum tela supernatante densa adeo ut quandoque pelliculam reterat. Crassior vero est ejusdem hypostasis, quae fere statim a mictione in media matula filamenta exhibet, & fundum petens, limosa, subrufa, conspicitur rubrum pollinem potius quam arenulam referens, quarum urinae conditionum unica causa est, nimirum imminuta concoctio, cum vitioso atque exuperanti calore; quae quoniam in omnibus partibus perficitur; ideo cruditates variae conditionis sese nobis exhibent, prout vel a jecore, vel a venoso genere, vel a partibus ipsis excrementitia cruditates superest ac secernitur, & quidem supernatans a partibus, filamenta a ventriculo & jecore; & a venoso genere limosum atque subrutum transmittitur quod & arenosum quoque in venis ipsis evadere posset, si major in ipsis vigeret caliditas, tunc vero parietibus matulae adhereret, atque adeo nunquam calculo cogendo idoneum; necesse quippe est arenosa in urinis subsidere, non autem limosa, nec arenosa parietibus adherere, ut calculum efformare sint apta; quae enim in renibus generantur arenulae subsident omnes. Lithiasin autem praecedere solet materia tartarea, & meendi aliqua difficultas; etenim lapis in vesica cogi non potest, nisi praecedente ejusdem insigni calore, a quo contrahitur ejusdem musculus; unde urina coercetur; Hippoc. *Vesica excalescit urinam non dimittit, sed retinet, & quod crassissimum & turbidissimum est, circumvolvitur & concrevit.* Ex quibus colligere est, coctiones omnes imperfectas & inanimatas esse; nam si perfectae forent, tanta alimentorum copia velocissime corpus, non modo nutrire, sed impinguare potius deberet.

Quare nutriendi modum, quoad quantitatem & ordinem saltem, si non quoad quantitatem, mutandum esse censemus. Et quoniam cum Avic. nil deterius quam comestio supra comestionem, ideo tempus diuturnius inter unam & alteram alimenti assumptionem erit interponendum; atque adeo ter die nutriendum, ita ut suavis mane lac sugat muliebre, ad summam dolin, cum saccharo, & statim ab eo sumat cochlear aquae cinnamom. Quinque vero aut sex horis ab assumpto lacte, prandeat, sitque prandium quandoque pristina hordeacea, cum ovi recentis vitello, quandoque panis, jure optimo linctus, quandoque edulium ex subtilissima pasta Apula paratum; mox pullum gallinaceum junorem comedat, bibatque vinum album, odorum, iterum aut tertio in prandio. Hora vero prima noctis, ad coenam se conferat, ex panatella cum emulsionem amygd. dulc. & pineorum, cum saccharo, & quarta parte, vel dimidia pulli junioris jam dicti, duabusque vicibus bibat. Interim mane surgat, & duabus saltem ante prandium horis, ambulans in cubiculo corpus exerceat; mox a cibo, hora transacta, decumbat, & hora 21. & 22. rursus surgat, & leniter ambulet, imò & in apricum nonnunquam inprodeat; calor enim nativus, sicut a motibus violentis resolvitur, a nullo torpescit, ita a moderato vivificatur, sique coctiones perfectiores & excrementorum excretiones, vel copiosiores vel promptiores



evadunt. Siti verò non semper indulgendum, sed oris collutionibus deinde vino albo tenui, quousque jecoris & renum calor accommodatis contemperari possit. Atque hæc potiora, reliqua Excell. Viro disjudicanda & statuenda committentes. *Joann. Raynaud. Foris Co Jul. 10m. l. Cent. 3.*

### Observationes.

Quidam Atrophia laborans mala citra summo pere appetens unum integrum & magnum 4. librarum pondere comedit, quod, ut scimus, commanducatum à quolibet sano difficillimè concoctionis est; tamen hic æger citro devorato meliusculè habere incepit & convaleuit. Induigant quidamque Medici ægrotum voluptatibus cum modo & mensura, multoties enim natura à nullo edocuit id quod est sibi utile maxime per appetit. *Dominicus Panarellus, Observ. 36. Pentecoste 2*

Vir quidam obesus & pinguis, ex febrili calore, & diuturna hepatis intemperie sicca, continentibus cutaneis meatibus, non nutritus in atrophiā incidit, cui, non proficientibus aliis remediis, 15. diebus continuus ad normam Galeni ad picationem applicuit: cujus usu ita impinguatum est corpus, ut paucis auxiliis adhibitis ad pristinum statum fuerit reductum. Picatores dicuntur illi, qui ferulis pice illitis partem debilem concutiebant, & sic motu & calore, sanguinem & nutrimentum ad partem attrahebant, & hac ratione membrum gracillimum impinguabant. *Zacutus Lusitanus. Obs. 136. lib. 1. Prax. Admirand.*

Anno 1591. mense Januario puer 13. annos natus, filius *Petri Von Werd*, civis Colonien-sis, ex variolis tumores aliquot ex lenta & viscida materia circa humeros, cubitum dextrum & genu contraxerat. Horum nonnullos, qui humeros occupabant; incidi, & procelius superiores scapulae (quos rostra porcuia vocant) extraxi: quo facto humeri nullo motu deperdito restituti fuerunt. Cubiti vero tumorem, quum ad id ine parentum cogerent preces, discutientibus medicamentis resolvi: sed non multo post, brachium usque ad humerum in atrophiā incidit, & ita delicatum est, ut periret motus omnis. Verum appetente vere, puerum denuo purgavi leni quodam medicamento pulegiagogo, qualia sunt Diacarthannum & Diaphenicum cum rhubarbaro. Deinde singulis diebus bis terve brachium decocto capitum, pecuni & intestinorum vervecis vel vituli, cum limbricis incocis, insuccare jussi, quoad pars inciperet rubescere. Tum præsto fuit famulus, qui parvo quodam instrumento excavato corneo, præcipua brachii vasa sugeret. Hinc totum brachium, humerum, collum, & pectus cum succo lumbricorum, & oleo amygdalarum dulcium simul mistis, inunxi. His Deo benedicente, brachium pristino restitutum fuit vigori. *Guilielm. Fabric. Hildan. Obser. Chirurgic. Centur. 1.*

Ante annes tres in Alsatiā ad puellam decem circiter annorum ætatis, atrophia cruris per annos aliquot laborantem, vocatus fui. Circa puellam hanc diverti barbitonfores occupati fuerant, omnemque lapidem moverant,

ut extenuationem illam partium musculosarum, ac claudicationem corrigerent. Ego cum primum denudatum crus inspexissem, dislocationem coxæ reperi, indeque Atrophiam propter compressionem vasorum, venarum imprimis, & articularum provenire, parentibus indicavi, & quid circa affectum huncce tentandum, aut præterea de eventu expectandum, sin ul significavi.

Ante dies 15. ad puellam duodecim annorum claudicantem, & atrophia cruris laborantem, vocatus fui. Hanc barbitonfores nostri per menses tres in Xenodochio curandam habuerunt: circa genu quidem, ubi sedem mali esse arbitrabantur, multa adhibuerunt medicamenta, sed frustra. Nec immerito: quandoquidem dislocatio in coxa, quam barbitonfores nunquam observarunt, & claudicationis, & atrophiz sola causa erat. Hæc fecit ignorantia artis Anatomicæ, simul & sordida negligentia. *Idem.*

Anno 1597. matronam 63. annorum curandam habui, illam, cum propter herniam intestinalem, in gangrenam degenerantem, præter modum extenuata & emaciata fuisset, reat illa febre, benecio lactis muliebris post Deum in integrum restitui, & ad 15. usque annos post curationem supervixit. Le gravissimo hocce arceam videat Lector *Observ. 33. Cent. 1.* singulis autem matutinis, absoluto somno, maximum hantum lactis ex juvencula, & optimo corporis habitu prædita, rustica, ad lectum ægræ emulcunt, ægræ propinavi. Deinde circa decimam prædebat. Aliud habeo exemplum memorabile de præstantia lactis muliebris. Dn. Jacobi de Tribus Paterniacensis noliolus, 4. annorum ætatis, post dysenteriam gravissimam dysenteria correptus fuit, quam secuta est periculosa atrophia, ita ut ossa vix cute obtegerentur. Jucula & quidquid assumebat, indigeste iterum per seceillum exercebat. Suasi ut mater infantem semestrem, quem lactabat nutrice alicui committeret, periculumque faceret, an atrophiā hancce ac summam extenuationem corporis, cum labefactione virium, lacte suo retinere posset. Mater consilium, infans verò papillis celeriter arripuit, & cum aviditate exluxit, omnemque cibum in posterum respuit. Hæc cum ego viderem, & de salute ægri ipse aliquam conciperem, singulis diebus regionem ventriculi, totumque abdomen sequenti unguento bis calide inungere jussi.

℞. Ol. Mastichis & myrrh. ana 3j. ol. nuc. moschat. Gum. Tacamahac. pinguisimi ana 3j. Terantur omnia lentissimo igne, percolentur & reserventur in vase vitreo. Hisce præstidius convaleuit, & per multos annos supervixit. *Idem.*

Tria fuere veteribus, juxta Oribasium, coll. lib. 7. cap. 16. cucurbitularum genera, vitrea, znea, cornea. Quorum priora trahunt per ignem; posterius citra ullum, solo oris sucu. Quæ cornea cucurbitula, licet nobis ferre in deluetudinem abierit, plurimi tamen etiamnum in Indis, sub torrida Zona habitantibus.

Qui curaturi dolorem colicum, Juvenis mihi notissimi, insudare primum ore clysterem, mox applicuere abdomini cucurbitulas cor-



neus. Quorum spiritu, per exile foramen, ore (ut Celsi verbis id efferam) educto: ocludere festinanter cavum id digito: Cum ut cuti immittitur inhaeresceret cucurbitula: tum ad eliciendum natum intestinis molestum. Quem certe tenebimus, hunc juveni, hac ratione, subducere barbari. Quapropter domum reversus, donavit me tali cucurbitula. Cujus periculum equidem aliquando facturus, selegi mihi (uti etiam fecit Fabricius Hildanus, cent. 1. obser. 80.) brachium ab atrophia consumptum. Cui imposui hanc cucurbitulam loco picis, ac resinæ: quibus legimus, in simili necessitate, usam fuisse, antiquitatem etiam nobilissimam. Attrahunt autem hæ cucurbitulæ potenter; & abducta aptissime cute, elevavit venas, & arterias, præ macie in se collapsas. Quibus iterum adaptatis, committant de novo quocunque, sanguis, ac spiritus. Quorum indeinens affluxus, nisi cotidie subiret: in locum eorum, quæ continenter ex corpore, decedunt; non solum non aleretur, sed emaceraretur necessario, membrum tali vitio infectum. Cui maciei nihil profectio salutarius est, hacce cornea cucurbitula. Præsertim si affigatur dextræ, juxta cursum venarum, arteriarumque illuc nutrimentum, ac vitam deferentium. Nautæ Juniori, effluxere, ex amplo brachii abscessu, tam frequens pus, & adeo copiosus liquor: ut subducto succo alimentali, & dissipato, plus æquo, calore vitali, conciderent venæ inanes: cessaret accretio: & tandem emacresceret brachium universum. Cui jam exaresfacto, ubi imposuimus aliquoties cucurbitulam corneam: vidimus ipsius suctu, tantum caloris, ac sanguinis, ad cutis extrema attractum: ut exsuccum illud brachium, non modò non aleretur iterum; sed adipisceretur denuò pristinum vigorem: inò tantum virum, ac roboris: ut potuerit deinceps quocunque iterum navigare, & in mari, nullo non fungi officio. *Nicol. Tulpium Observ. Medic. lib. 3. Obs. 49.*

Medicus meticulosus, veritus, ob imbecillitatem, venam ferire Catharina Geriz, acerbissime ex latere dolenti, auxit tantopere, febrem; utique inflammationem, in membrana costas succingente, conceptam; ut ex retorridi sanguinis æstu, ipsa non secus emarcuerit; ac si laborasset, immedicabili tabe. Quam etiam non obscure videbantur designare, sputa ita frequentia, ac sordida: ut copia, capacem pelvim; & fectore, spatiosum facile repleverint conclave. Re autem ipsius, jam plane desperata, & morbo, ultra quartum mensem, in ipsam fervente; apparuit ipsi, quod si ex machina Deus, excitando, nescio quod, crudorum ostreorum desudarium. Quod eo quoque lubentius concessimus, quo minus hactenus profuissent, portiones concinnatæ, ex humidis ac frigidis herbis. Qua spe etiam minimè excidimus. Vix enim comederat cruda hæc ostrea, quin protinus imminuerentur non tantum calor, ac febris: sed etiam usque eo perniciosissimus hic morbus: ut brevi integrè convaluerit. Extincto, ab algido, ac viscido ostreorum succo, pertinacissimo illo incendio: quo, procul dubio, conflagrasset miserrime universum ipsius corpus. Non temere itaque Celsus. Quos ratio non restituit, adjuvat temeritas. Neque certè inconsideratè

agere videtur, qui circumspicere cedit in turæ inclinationibus: & obliquat prudenter sinus, ubi non licet, rectum tenere cursum. Satiùs quippe est, anceps remedium experiri, quam nullum. Dubia namque spes, certa desperatione potior. *Idem. Obs. Medic. lib. 2. Obs. 8.*

Tabes dorsalis, seu *Spina ventris*, duplex est Hippocr. Altera ab immodica Venere, lib. 11. de morbis. Altera vero, à destillatione in spinam dorsi, lib. de glandulis. Quam utramque speciem lubuit Balduino Ronsæo lumbaginem vocare. Quamquam hæc vox designet Felto, solam lumborum imbecillitatem. Præterquam tamen in tabe dorsali videre est, cum dolorem continuum; tum marcorem insuperabilem. Quorum naturam minùs significanter cum exprimat lumborum imbecillitas: satius erit, stare ab antiquitatis sententia, quam temere ab ea desciscere. Dolorem autem hic parit, acida pituita; dilacerans magnopere vel membranam, quæ spinalem medullam proximè cingit: vel ipsos nervos inde oriundos. Sed si oblituratur venæ, aut arteriæ: sive à lumbis, sive à cervice huc delatæ: vel ob constringens frigus, à nimia Venere illis impressum: sive ob prolapsum crassioris pituitæ (cujus maximam copiam equidem aliquando illic conspexi) eripitur ægro, non modo consensus inter superiores, interioresque corporis partes: verum redditur præterea sterilis, propter interceptam, decedui seminis, materiam. Neque marcescit solum ipsa spinalis medulla, quæ oblituitur: sed contabescit utique cum illa corpus universum, communicato paulatim malo, hinc per nervos cerebro; illinc per arterias cordi; uti per venas Jecinori. Quorum nobilissimorum viscerum functione, evidenter læsa: torpet necessario corpus; marcescit animus; & consumitur infirmiter homo. In qua tergemina, nervorum, venarum, ac arteriarum via, invenire quoque est viam inducentem, vel febrem convulsionis vel convulsionem febri. Siquidem febris supervenit convulsioni; discutit (ut cum Galeno loquar) æstivans cordis calor, illud frigus: quod lenta, ac viscida pituita impresserat, nervis spinalis medullæ. Quod si vero convulsio sequatur febrem; vel exaruit spinæ medulla, præ febrili incendio; vel acris, fervidæ bilis, vapor, ab accenso corde, per arterias, illuc effusus, pupugit tam rigide sensiles ipsius membranas: ut ne sequatur exitialis nervorum contractio. Potissimum si vires exhauserit præcedens febris. De qua propterea satis circumspicere Hippocr. lib. 2. aph. 16. *ὅταν ἐκ τῆς πυρετοῦ ἀπέλθῃ ἡ νόσος, καὶ ἡ σπὴν ἀπέλθῃ, καὶ ἡ σπὴν ἀπέλθῃ, καὶ ἡ σπὴν ἀπέλθῃ.* Febrem convulsioni supervenire, satius est, quam convulsionem febri. Samueli Vespertio, elevabat impurus lien, tot vapores versus cerebrum: ut inde destillaverit iterum plurimum acrioris pituitæ, primum quidè in occipitium, ac cervicem; sed mox inde, in spinæ medullam: & potissimum in lumbos, ilia, ac coxæ articulum. Quorum partium humanis, dolor excruciatum ipsum tormento tam indefatigabili: ut amisso omni colore, ac decore, incidit in lentam febriculam: consumentem ipsum, morte adeo tarda, ac misera: ut ante ejus accessum, non semel exopraverit, languentem remittere animam, & reluctanti expuere spiritum: Quod ipsum etiam, in hoc morbo obser-



vavit, Auctor libri de glandulis: Sed ferendum fuit, quod non licuit mutare. Præsertim Labe hac, in penitus infixa, quam ut cesserit vel tempori, vel remediis etiam convenientissimis. Argumento certè evidenti, pervicaci, sacra hujus tituli, labi, auxilia medica esse, non solum infirma, sed autem dicere, nulla. Idem *Obs. Medic. lib. 3. Obs. 24.*

### Anatomica Inspectiões.

Puella annorum circiter sex secta fuit: Cum toto vitæ curriculo morbis fuisset obnoxia; præsertim vero tumoribus œdematosi circa articulos manuum, quibus apertis ossa corrupta in eam, nulla tamen fere materia aderat: Dein palpitatione cordis & asthma divexata, tandem *Atrophia* periit. Abdomine aperto, Omentum pinguedo absumpta erat, Intestinum cæcum, non lumbrici inlata, sed crassum, ex meris glandulis rubentibus compositum, duorum scilicet digitorum latum, in quo nihil nisi muci aliquid: Mesenterii glandula scirrhus, Hepar a naturali magnitudine recedebat, ut quod plus, nullo magnum esset, Ren sinister dextro multo major & durior: ventriculus chylo vacuus, sed flatibus distentus. In thorace verò Pulmones a convenienti colore recedebant: Pericardium distentum aqua refertum, Cordis auricula dextra prætumida, cui inerat materia quædam alba, membranosa, crassa, oblonga, in ipso autem dextro cordis ventriculo, materia pinguedini similis. *Ex Obs. Casp. Bauhni.*

In cadavere exenterato Nobil. C. A. B. hæc reperta, 1. Omentum glandulosum & adenibus undique refertum, adeo ut nulla ex parte membranosa apparet, crassum valde & tumidum: in parte dextra, circa regionem hepatis, putrefactum & lividum. 2. Hepatis parenchyma scyrrhosum, tumidum, varis que maculis nigricantibus & griseis distinctum. 3. Vesicula fellis humore nigerrimo & bile atra materiaque quadam tartarea, sabulosa & friabili turgescibat: 4. Ren dexter totus erat corruptus & putridus; sinister glandulis oui columbini magnitudinem adæquantibus undique oblitus & quasi obvolutus: Pulmones toti flacidi & variegati. 5. Partes circumjacentes proximè Hepatis gibbam partem, ut & renem dextrum putridum, plane erant corruptæ. 6. Cor, Lien, Uterus, Intestina & reliquæ partes naturales. *Tomæus lib. 6. Epist. 8.*

Quatuor annorum puer Marasmo extinctus obiit: Animi causa à me secatur cadaver, cujus hepar dum inspicerem, erat supra modum magnum: Habebat Abscessum propè venam cavam, circa partem gibbosam pure circumquaque obductam. Lienem boni coloris & integrum. Omentum nullum, aut vix conspicuum. Pulmones, mirum dictu, nullos; quorum loco erat vesicula membranosa statu repleta, venulis exiguis munita, originem sumens ab ipsa arteria aspera, quæ refrigerium afferre videbatur cordi. *Fontanus lib. 1. Respons. & curat. Medicin.*

Jacobus Knoll adolescens 17. annorum laboravit à puero calculo vesicæ, à cujus cruciatibus, accedente renum suppuratio-

ne, macie confectus; viribusque pene exhaustus è vita excessit. Cum juxta alia innum ventrem scrutando, ac duplicis vesicæ speciem contemplando, venam cavam dissecuissem, corpora alba, pituitosa seu fibrosa, cavitatem earum fere implentia reperi, qualia in diu decubuis & à morbis chronicis sublati sæpius vidi: statim cogitavi talia quoque sinu cerebri occupatura, cum quod uni majorum vasorum obtingat; alterum ab eo raro immune existat: Aperui itaque sinum tertium, in alterutro laterum occurrit corpus sive pituitosum sive fibrosum, certè non adiposum (prout quidam hæc corpora nominare solent) candidum, lentum, tenax, crassitie fere digiti majoris, circa torcular maxime, & tantum non tantam cavitatem implens: In cavitate hac tenacius erat quam in vena cava descendente, ubi ad levem attactum rumpebatur, secus ac aliàs de his pituitosis corporibus observavi &c. Totum hoc corpus pituitosum ex sinu tertio extraxi, cui haud ægrè omnes ejus appendices succedebant, numero magnitudini & fere longitudini valorum respondentibus, adeo ut plurimæ spithamæ longitudinem superaverint. præterea in ramulosos & filamenta, ad numerum propè vasorum divisibiles essent: Similia corpuscula pituitosa, in utraque carotide interna, propè intundibulum, notabilis magnitudinis aliquousque sursum scandentia inveni, non tamen tantæ longitudinis atque erant in venis tertii sinus, quod seu flaccidiora minusque tenacia forte abrumperentur: Adolescens autem hic nihil unquam apoplectici passus est, ac sæpius convellebatur: *Jacobus Wepferus Exercit. de Apoplexia.*

Uxor Jac. Bagolle paulatim morbo admodum intricato correpta fuit: Nunc enim palpitatione cordis; nunc dolore & torminibus ventris; interim tamen appetitus non multum prostratus fuit, ita ut pro more alimenta sumeret, quibus tamen parum nutriebatur: Tussiculâ quinetiam & dyspnœa laborabat; Cum circiter annos 4. vitam hanc calamitosam vixisset, ac sceleti fere instar extenuata esset, paulatim stupore & frigore in sinistra manu præcipue circa extremitates digitorum, correpta est; symptomata tamen hæc ab initio tam exigua erant; vix ut percipi possent, nec aderat tamen multo minus inflammatio, imò nec dolor ullus: Interea tamen extremitates digitorum, & tota manus paulatim, & (quod mirandum) absque dolore sphacelata & penitus emortua est. Ego, tribus septimanis post inceptam sphacelationem digitorum vocatus, brachium ad cubitum usque, simul & digitos, carbonum instar nigros, frigidissimos, & ita extenuatos, ut ossa vix tenuissima cute obtegerentur offendi; nulla tamen, ut dixi, aderat inflammatio neque dolor, imò nequidem in loco illo in quo calor nativus nondum penitus extinctus fuerat. Porro cum etiam per exigua recuperandæ sanitatis spes superesset, rogatus tamen ut brachium amputarem, quia malum adeo lento tardoque gressu incedebat vix ut percipi posset, visum ante operationem corpus præparare: Postea brachium supra cubitum, & quidem in parte sana, feliciter & fere sine dolore à sanguinis profusio abscidi, vulnus brevi digestum quidem fuit, adeo ut laudabile pus appareret, nihilominus circa 11.



post brachii abscissionem, gangraena denique truncum invasisit, ita ut paucos post dies e vita discederet.

In cadavere hae notatu digna observavi. 1. Abdomen serosi humoris plenum & extensum erat. 2. Mesenterium steatomati, multis scatebat. 3. Sub vena Portae, & quidem in ipso Pancreate, scirrhus admodum magnus conspiciebatur. Hoc principium & praecipuam causam hujus morbi, tam diuturni, tamque gravis fuisse rationi consentaneum est: quia enim vena Portae subjacebat, facile impedire potuit quominus chylus ad hepar perveniret, totumque corpus nutrirer, hinc viribus paulatim prostratis, & calore nativo diminuto, sanguinem optimum & laudabilem generare non potuit: Quare in juventute, & ante nuptias, debilis, pallida & palpitacionibus cordis obnoxia valde fuerat: in matrimonio tamen melius se habuerat & proles aliquot habuerat: Circa annum verò 1600. symptomata omnia ingravescebant, ita ut continuo de dolore ventris, & quidem ea in parte, in qua scyrrhus invenimus, conquereretur. Supervenerunt item dolores ventriculi & capitis, cum totius corporis imbecillitate, tussis continua, palpitacione cordis & appetitus imminutione: Itaque corpus ita sensim extenuatum fuit ut ossa vix cute obtegerentur: Attamen interim dum ita laboraret puerulum genuit, qui hoc anno 1608. bene se habet. 4. Hepar durum, pallidum, ac si elixatum fuisset, apparebat. 5. Pulmo dextra parte materia purulenta ac foetida; sinistra verò humore seroso imbutus erat. 6. Per totam Pulmonis substantiam scirrhii plurimi, colore lividi, in quibus materia nigra atramenti instar, contenta fuerat; conspiciebantur. 7. Lapidēs plurimi hinc inde per pulmonem, diversi coloris, parvi tamen omnes, reperiebantur. 8. Cor sanguine plane exhaustum, extenuatum, ideoque valde diminutum & parvum erat. 9. Arteria venosa in monstruosam amplitudinem extensa erat, humore seroso impleta; à quo quia simplici constat tunica, ita dilatata erat. *Fabric. Hildan. Cent. 1. Obser. 89.*

Cum Christiana Pickia, triginta novem annos nata, Gregorii Jetken Pittoris Thorunensis conjux, per tres fere hebdomadas male habuisset, & de Tumore abdominis cum continuo dolore conquesta esset, se gravidam esse à quibuldam mulierculis persuaderi passa est, inque isto errore hucusque permansit, donec malo in dies crescente, Georgium Grunach Chirurgum ad se vocavit, qui ei oleum anodynum cum chamamelino mixtum porrexerat, utque eo abdomen cum dolore tumidum quotidie inungeret, jussit, hoc facto, in somno, 3. ab inunctione nocte, scilicet 21. Junii anno 1674. materiae purulentae fere duae librae per umbilicum effluerunt, natura in ipso sibi umbilici centro parvulum foramen effornicante, & abdomen à congesta ista materia viriosa liberante, non sine magno fœtore viriumque insigni prostratione: Ego eadem die, hora pomeridiana ad eam vocatus, offendi debilem, in abdomine autem, circa regionem hepatis, duritiem aliquam cum dolore animadverti, urina nonnihil erat tincta, pulsus parvus & debilis, pectus purulenta saevie refertum, quam tussis crebra

prodidit, quae omnia atrophia artuum, praeterea superiorum, comitabatur. Appetitus cibi integer adhuc erat, Sitiique nulla eam interturbabat, singulis etiam noctibus placide dormiebat. Sed à 14. Junii durities ventris asparebat: Chirurgus inter in canaliculum plumbeum subtilissimum semper indidit, per quem dies noctisque coctum pus copiose emovere solebat, superimpositis emplastris idoneis: Ego ipi primum corroborantia praescripti, Lemae ob materiae purulentae in pectore contentae copiam, expectorantia. Die 26. Junii puris quantitas valde imminuebatur, ab hac quoque naturalem formam accurrente, sed post deligationem vulnuscule à Chirurgo mane hora 7. peractam, horrorem quandam percipiebat, tum etiam circa noctem subsequenter semper calorem p. n. aliquot horarum: A meridie puris quantitas major erat, abdomine ubique molli, pus autem per vasa umbilicalia foras erumpebat in qua etiam Chirurgus instrumentum ad medii digiti longitudinem immittere potuit, ad latera vero, in carnem inulciosam nullatenus. Unde facile dignoscere potuimus pus illud per venam umbilicalem, tumore mox concidente, ex hepate originem habuisse: Hunc venae umbilicalis sectionem Anatomici periculosam esse demonstrant, seu videre est apud Rivinum in *Enchir. An. tom. lib. 2. cap. 15. in cons. med.* Ideo etiam Eponiphilia medicamenta admodum umbilico purgare in nifelum est: Scitum etiam ex Hipp. Abiectionis ventris umbilicum esse terminum. Sed & aquam hydropicorum interdum per umbilicum erumpere, ejusque affectus esse graves hinc pater. Sic nos in praesenti coctum pus per abiectionem umbilicalem usque ad mortem fluere observavimus non tunc scilicet illud undaque ex visceribus putridis foras excurrente. Huiusmodi ulcus in mammae similitudinem, unum, alterum in multa natum exoriebatur, donec tandem totum corpus atrophia consumptum sceletoni repraesentabat, & tum misera illa die 29. Junii, hora media octava matutina placide obiit. A meridie hora media prima, cadavere à Georgio Grunach, Chirurgo, aperto, inventum pus & sanies foetidissimi odoris, in vasis umbilicalibus, quae ex hepate ulceroso scaturiebant & per umbilicum stillant. Hepar duritie & ulceribus tumidum, quinque libras civiles cum semine ponderabat. Peritonaeum, Mesenterium, Omentum, Pancreas; omnia plena puris, & vix non consumpta: Intestina etiam aliqua ex parte corrupta: Lien, Renes & Ventriculus bene constituti erant: Uterus purulenta materiae plenus & ulcerosus: Caro musculosa circa regionem Hepatis eidem adhaerebat: Diaphragma, Mediastinum, putrida. Pulmones à pure consumpti, maxime in sinistra parte, ubi nihil de parenchymate pulmonis conspiciebatur, in quo pleura sinistra tota consumpta erat. Dextri autem lateris superior pulmonis lobus nonnihil adhuc de substantia pulmonis habebat, flaccida tamen & ulcerosa: Bronchia pulmonum, quae adhuc salva erant, usque ad principium asperae arteriae versus palatum, pure scatebant. Cor saluum, sed flaccidum, ejusque capsula humore vacua: totum corpus plane consumptum



qui visceris illius parenchyma superesse diu non potuerit. *D. M. Jansoni Mercurii Gallo Belgici Tom. 2.*

Jurisperitus Parisiensis sicca tussi vexatus, Macie universali affectus & diarrhoea diuturna, post repetitas purgationes & venæ-sectiones me accersiri jubet. Eum attentè considero, & post colloquium aliquotque protractum, decumbere jubeo quo latera dextrum præsertim, commode pertractare liceret, suspicatus aliquid in jecore vitii. Admotâ manu, indolentem tumorem percipio nucis juglandis magnitudine, (sed forti digitorum impressione & profunda, proque partis sensus tolerantia) infra costas nothas in jecoris regione. Prognostico emissio, asserui tumorem illum ad capitis magnitudinem perventurum, imò majorem, quod eo loco situs esset, quo intus nequicquam remitteretur, ad extra vero augmento prohiberetur a caligatum cingulo & thorace. Ulteriore sanguinis missionem prohibeo, eo quod judicarem vitam tandiu productam iri quamdiu sanguinis penuria non adesset. Opinionem & prognosticum meum impugnavit veniesca, qui imaginariū esse tumorem objiciebant, iteratisque venæ-sectionibus ægrum vexabant. Post dies quindecim iterum advocor, atque ægrum in deteriorem statum deductum video, tumorem auctum & digitis palpanribus manifestum, globuli sphæritæ in magnitudinem æquantem. Mortem prædico, Chirurgi verò revocati, agnito tumore, sanguinis missionem perpetam iterum instituunt, sed paulo post mors succedit.

Apertum cadaver fuit à Riolano Chirurgo, qui solus, consultatione habita cum tribus Medicis ac duobus Chirurgis ampullatis, contendebat tumorem neque mesenterium neque pancreas obsidere, sed musculorum cuiusdam viscera colligatum adnatum esse. si enim aiebat, situm in pancreate aut mesenterio obtineret, ad motum corporis huc illuc nutaret, illius inclinationem sequutus, alvi excrementa cohiberet, quæ liquida & inconcocta dejiciebat æger: Obviam ergo illi secantise obtulit tumor pendulus & annexus lateris dextri musculis lumbis, magnitudine capitis vitulini, cui plurimæ adnatae erant cystides, aliæ materia puli simili refertæ, aliæ sebacea, aliæ lardum, aliæ niel referente, aliæ erant duræ, variæ consistentiæ & coloris ab invicem secretæ. Totum corpus exangue erat, sed plurima aqua reperta, ad mensuras duas Parisienses. *David Lagneau lib. de sanguinis missione p. m. 385.*

Puer duorum annorum erat macie ita confectus, ut vix cutis hæreret ossibus: Ad latus sinistrum, in musculo mastoideo exulceratio erat, quæ usq; ad ipsam jugularem venâ penetraverat, eamque corrodendo sic extenuaverat, ut puris subtilior materia percolasse per eam videretur: non exiguan namque ejus copiam sanguini permistam in dextro cordis ventriculo, corde aliàs sano & integro, inveni; quam, ut dixi, transcolatione eo pervenisse suspicatus sum: sed unde puris ejusdem crassiusculi, bene cocti, copia, item magnæ e regione in dextro latere, ad eundem muscolum, intus & foris sanum, penetraverit, ego divinando assequi non potui: *Lien præterea induratum erat & magnus, pendebat*

enim uncias septem & tres uncias quartas: Hepar contra, consumpto fere parenchymate, nonnisi quinque uncias & quadrantem ponderabat: biliosa id plenum erat materia, quæ propter obstructionem ductus communis in ilium redundaverat; *bilis interim drachmas undecim* [magnum pro ea ætate pondus] exæquabat: *Pancreas magnum erat & scirrhum*, quod in chronicis morbis sæpe contingere observavi: Succus etiam tam acidus, ut in duodeno bili admixtus, tamen adhuc insigniter eum saporem retineret; hac aciditate sua ita ventriculum & intestina perederat, ut dum inflare ea vellem, ad minimam distentionem ru perentur: Non immerito igitur *Clar. Franc. de le Boë Sylvius* in Praxi sua plurimorum morborum causas refert ad hanc succi illius aciditatem, *Theod. Kerchringius observ. Anat. 65.*

Venit mihi in memoriam apertio Virginis in Notozomio Leydensi, quæ cum macie contabescens occubuisse, præscripta ad terram *Do. Sylvii*, abdomen ostendit factum pinguedine, visceribus interea proximis nutrimenti inopia fatiscens & contractis. *Olav Borrichius observ. 92. Aëtior. Bartholinæ n. 1671. & 72.*

Haec plerosque Medicorum ignorasse ossa, quantumvis solida, quæli phlegmone & apostemate quoque corripì posse, Quicquid enim nutritur, crescit, aug. entatur ut in iuxus recipit, id quoque putrescere & apostemate aliquando turgere fatemur: Proinde *Avicenna & Galenus*, suo periculo edocti, postemate quoque dilendi asserunt: Et Hippocr. empyemate os sacrum computrescere quoque novit, ejus putredine & incredibili doloris tyrannide duos, Nob. *Warmhauser* in Neoburgo, & *Joan. Castnerum*, afflictum & diu in ceratosis tandem contabescere & mori huc oculis vidi. *Laëgius Epist. 42. Tom. 1.*

*Jo. n. le Fuzelier* Tabida matre natus, eo modo, eoque morbo & eodem tempore interiit quo ejus mater. In pulmonibus nihil memorabile reperitur quod mortem attulerit. Mirum quod ante mortem ei contigit; Decem antequam è vivis excederet diebus tumidum corpus fuit, Tumor fugax erat, repetebat ex intervallis. Unde hoc? Leucæ videtur esse: Tale quid in morbis funestis contingere solere agnovit *Hippocrat. 1. prorrh.* Leucæ, ait, oboriuntur (supple in morituris) in morbis funestissimis, ejusmodi est Phthisis. *Ballonius Parad. 39.*

Anno 1562. In mulieris cujusdam consistentis ætatis, quæ ad tantam maciem redacta erat, ut vix cute & ossibus hæreret, corpore quatuor lumbricos teretes spithamæ unius longitudine, in ipsum truncum venæ portæ se infusus, ac toti corpori alimenti aditum obstruxisse observavi: *Ex observationibus Adriani Spigelii.*

Quatuordecim annorum Virguncula à quatuor annis tabe incepit laborare, postea tussi & febricula correpta est: functionibus quotidianis obeundis satis vigilax. Cibi & potus valde appetens, per seique mensem ante obitum decumbens, moritur.

Mesenterium scirrhis ac steatomatibus duris undique plenum, præsertim circa vasa sanguinea: quædam ovi aserini magnitudinem superabant, aliæ nucem moschatam excedebant.



nea, inunctiones universales ex ol. amygd. d. rec. & pinguedine gallinæ cum rosaceo, & juscula restaurantia. Si nactus fueris ægrotum aliquem divitem, & supra dicta remedia non juverint, tuto confugere poteris ad balneum lactis, quod tantopere laudat *Avic.* in macilentis, consumptis, hecticis, arefactis, & marasmo confectis. *Epiphanius Ferdinandus Hist.* 10.

### Consultationes.

#### *Atrophia in Pæro.*

Consultationem accepi pro Infante Illustriss. peregrinis equidem doctrinis ornatam atque illustratam, quibus tamen minime opus habuit exultatio vestræ sapientiæ, quæ apud me cuilibet auctoritati præcellit. Quare & ego vobiscum censeo Nob. Infantem, sex abhinc mensibus in atrophiam paulatim perductum, adeo ut tandem marasimum frigidum reformidare debeamus. Hanc autem ab alimenti defectu provenire nullus est cui non constet; non quidem ratione objecti, sed facultatis aut instrumenti; alimenta quippe oblata, quantitate, qualitate, & ordine nutritioni accommodata, ab imbecilli tamen facultate coëctrice ventriculi probe cocti nequeunt; unde absoluta, non respectiva censenda, ab intemperie frigida & humida proveniens. Hæc autem non solum naturalis, sed potissimum ab impuro lacte, & destillatione à capite ad ventriculum magis adaugeta; unde rectè dicebat Gal. quod à cerebro valde humido ventris quoque consequitur humiditas; cuius propria passio solet esse diuturnum alvi profluvium. Verum quoniam non sola intemperie, sed organico quoque morbo affici Infantem Nobiliss. vobiscum suspicor; cum facile jam à lacte impuro, & facilius mox à solidioribus alimentis exhibitis; ac tandem à cruditatibus manifestis, quotidie in ventriculo genitis, obstructions in lacteis, necnon in mesentericis venis necessariò subortas esse conjiciendum sit; ideo imminuta chylicationi accedit quoque alimentorum non probe elaboratorum interceptus transfluxus, cui succedit eorundem corruptio, ac proinde necessaria quotidiana per alvum excretio; unde ob vitium tum facultatis tum instrumenti diarrhæa fovetur, non tamen stomachi lis tantum, quoniam, si non henterix, cæliacæ saltem passionis indicia hucusque apparuissent; ut propterea mirachialis, seu intestinalis proprie magis sit nuncupanda; quam flatus, umbilicum & partes ilias distendentes à cruditatibus in iisdem locis, diebus aliquot suppressis elevati, abunde indicant. Hujus autem diarrhææ causas immediatas fovere potuerunt, & deinceps poterunt dolores, vigilia, inquietudines, gingivarum inflammationes, quæ dentibus erumpentibus, contingere solent; unde dicebat Hippoc. Alvi profluvia his esse familiaria. Quibus ita se habentibus, quid mirum si Illustrissimus Infans non nutriatur; sed quotidie gracilescat, cum alimenta primò imminute concoquantur in ventriculo, mox in via perfectiorem elaborationem vix adipisci possint; transfluxu tandem eorundem ad hepar in-

tercluso.

Ut autem nos medicam opem feramus, primis viis cruditatibus satis emundatis obstructions omni industria sunt referendæ; ventriculus exsiccandus; jecur roborandum, nec dentitionis difficultas posthabenda; & congruis alimentis corpus nutriendum.

Quæ omnia sicut præstari possent in adultiori ætate; ita hæc tenella in dubium revocantur. Nihilominus quoniam audio plurima assumpsisse infantem, in o & vinum ablyuthite, beneque se haberet ad oblata; ideo salutis ejusdem non est omnino abjicienda spes.

Quare tribus aut quatuor continuis diebus, exhiberem mel rosac. simplex, vel etiam cianif. ad ʒ ij. aq. cinnam. aspersum, mox aquam ex succo agrim. destillat. m, in quæ gutt. vj. aut vij. sp. tartari ter quaterque rectine-ti dissolutæ fuerint, quotidie plures dies præberem, vel infunderem ʒ j. rhab. opt. in eadem aqua, vel in jure agrim. pentaphyl. & radic. gram. per noctem; eidem addendo gutt. spir. tart. matutinis horis pariter exhibendum. Et interim juscula omnia, quæ cibis parandis conficiuntur, china optima & modico lentisco alterarem. Neque quotidi nam ventriculi aromatizationem omitterem, unica guttula olei veri atque legitimi cinnam. vel rotula, vel vini, aut juris cochleari mistilata, & a cibo exhibita; sicut & usus salis ablinthii, in gratiam quoque hepatis, non est posthabendus.

Dum verò hæc omnia intrinsecus administrantur, extrinsecus inunctio totius corporis, oleo amygdalino recenti uberiori, non est prætereunda, sicut & totum abdomen, ung. roi. aliquot gutt. ol. lil. alb. affusis, erit unguendum. Ventriculo verò empi. strum à me pluries expertum applicari poterit, paratum: ex mentha viridi confusa fermento, pulveribus matthes, & rosar. cum vino melvatico, vel saltem albo generoso reformatum.

A quibus, obstructionibus diminutis, ad usum lactis, tanquam ad sacram anchoram, quamprimum confugiendum erit; faciliorem enim quam cætera alimenta concoctionem admittit, & quia satis erasum, ventrem silit, valde nutrit, pauci est excrementi & huic ætati est alimentum familiare atque proprium. Quod si res bene cedat; à vino omnino erit abstinendum; ventriculo tamen semper aliquam corroborationem conciliando. Dentitio autem erit promovenda, illinendo gingivas lacte canino, aut leporis cerebro. Quæ omnia felicem poterunt sortiri eventum, sub vestra prudentissima, & inculpata administratione, cui ideo omnia libentissime committo. *Joan. Kaym. Forst. Consult. tom. 1. p. 339. & seq.*

#### *Frigidus Marasmus Consultatio prima.*

Senium irreparabile nobis esse testatur quotidiana experientia, quoniam quotidie resolvimur, tum extrinsecus ab ambiente aere, tum intrinsecus a calore nativo. Et licet humidum instaretur; semper tamen deperdito siccus evadit, operationibus quidem aliquo tempore accommodatis, non tamen pro vita; prout humidum juvenis cum humido lueri collatum; unde jure merito irridebat Gal. Philosophum quæ-



quendam, qui quadragenarius librum scripsit quo docebat quomodo Senium vitari posset; octuagenarius autem factus, adeo consumptus fuit ut risum apud omnes concitaret. Sicut autem naturale est quod annis labentibus evenit nobis; ita præter naturam quod immature juvenilibus annis contigit, ut in Illustri. Com. Pat. nostro, 29. annum agente, qui hypochondriaco affectu illegitimo præius, non tamen subsecuto exsiccatorio morbo, minusque nigro, aut corruptorio, ad gravem tamen adeo atrophiam, spatio mensium, modo perducus est, ut proprie magis marasmo eundem laborare affirmare possimus; cum humidi consumptio, ex siccitate adhuc non fiat, nondum verò facta sit, tunc enim Tabes genuina proprie occuparetur, frigidus autem hic, non torridus, minusque syncopicus habendus, cum sit extra febrem & syncopen.

Nec senium ex morbo hic proprie vocandus; cum hoc ex cordis affectione promanare dixerit Philippus. Marasimum autem consummatum & tabidum non esse, facile nobis suadere potest ejus signorum absentia; hos enim caloris vitalis non perit, squalidum corpus non est, cutis circa frontem nondum sicca & obtensa, nec oculi adeo concavi, neque collapsa tempora. Et licet abdomen, ex hypochondriaca affectione, tum gracile tum depressum sit, præcordia tamen vehementer adducta & contracta non sunt, nec thoracis cutis sicca ac arida & veluti corium digitis apprehensa produciatur, necdum pulsus adeo rarus observatur.

Ortum verò duxit affectus hic ab hypochondriaca affectione, ex venis lacteis & mesentericis a crudo & copioso cibo obstructis procedente, non tamen pylorum primario & essentialiter afficiente; quæ ideo non legitima, ut illa à Gal. descripta, sed illegitima fuit. In omnibus tamen hypochondriacis semper solet Jecur accendi, cujus causa pylorus deinde in modica caliditate exurit, unde inflammationes circa partes illas, necnon arteriarum pulsatio, compressione tacta, sicque ventriculus tere siccus esse solet, non solum quia ipsius calor ab immoderato jecoris fervore veluti extinguitur, sed quia turbatis somnis, profundis cogitationibus, necnon jugibus cruditatibus paulatim viscerum humidum substantificum absumentur; quo deficiente, calorem quoque languescere necesse est, ob jecoris vero incendium succi alimentales una cum crudis, in nostro Pat. Illustri. combusti quodam modo & liquati fuerunt, renum attractrice facultate non parum adducta: unde urinae, tum copiosæ, tum in superficie pingues diutius apparere; sicque partim ex primis concoctionibus male peractis, (cum naturalia instrumenta quanto sicciora, tanto ad nutriendum inepta magis sint, potissimum innato deficiente calore) partim ex liquatione, & insensibili per halitum succorum alimentalium resolutione, consumptis humiditatibus, tum inordinatis tum torridis, siccitas modo cambium depascere non desinit.

Ideo sedulo agendum, antequam partem glutinosam corporis siccitas obsideat, & tabes suboriatur; tunc enim omnino desperata res

est; *Tabem enim curare nunquam poteris, dicebat Gal. nam licet caliditas, si adju. remitti possit, remanet tamen siccitas, quæ senectutis vitam hominem interficit.*

In quem finem, Medicæ intentiones ex fonte iustetico potissimum sunt desumendæ, est enim omnino humectandum, sed substantificè, ut totum renutritur, moderate autem calefaciendum, majori namque calefactione egeret, si senium ex morbo adesset.

His itaque intentionibus satisfaciant alimenta. Quoniam verò cibus non se ipsum ad omnes corporis partes devehit, sed ab ipsis egenis trahitur, & partes invalidæ præ siccitate, sunt ad attrahendum infirmæ; ideo alimentum ut facile attrahatur, necesse est; hoc autem erit tenuium partium, & moderate calidum; cum tamen hoc parum admodum nutriet: crassum namque, viscosum, firmum & difficilis resolutionis debet esse, ut prompte assimilaretur; ob hanc ideo contrarietatem non adeo facile alimentorum copia suppetit. Quare utrumque dumtaxat præstare poterit lac humanum, utpote quod magis alimino nutriet, præcipue si æger muliebrem mammam ore sugat, ut Euriphon, Prodicus & Herodotus Gal. præceptores censebant; idque quoniam lac statim mulcitur, ut genitale semen, vim suam & facultatem amittit: cum præterea, ut non modo concoquatur, sed & distribuatur, ac partibus alendis assimilatur, natus ejusdem & spirituosus proprius calor, jam dictarum facultatum imbecillitati non parum prodesse possit. Quare, postquam postremis hisce diebus, lactis alimino uberiori usu naturalia instrumenta, in abdomine conclusa, abundè humectata & pervia reddita fuerint, statim Nutricibus erit committendus Pat. Illustri. ut altera interdiu, noctu altera lac ipsi præbeat, quarta, aut ad summum quinta quaque hora, & qualibet vice, antequam mammam sugat, sacchari lini cochlear deglutiat. Quantitas verò lactis sit ad mammarum dimidiam exinanitionem.

Et quoniam aliorum alimentorum lac societate non gaudet, ideo per aliquot temporis spatium solo lacte contentus sit; bis tamen in die, tum mane, tum vespere, vini albi subdulcis & parumper aromatici semicyathus, cum ossa panis madefacta concedi potest, cum frigido marasmo conveniat.

Sed quia exsiccata sunt totius corporis partes, ac venæ, propter attractrice facultatis imbecillitatem, unde difficilis evadere posset etiam lactis distributio: ideo in hunc finem picationes ab Antiquioribus commendantur: quibus nos manibus oleo amygd. abundè munitis, cutis non solum: verum & musculorum contrectationes, & placidas evulsiones substituiamus, iterum, vel tertio in die adhibendas: Dum eodem tempore inunctiones uberiores præcipimus, (cum temporis inclementia balneum non admittat) ut autem oleum jam dictum penetrantius evadat, bulliat cum paucis vino malvatico.

Mente verò exacto, sola sufficere poterit nutritrix, lactis inopia substituendo potius nam hordeaceam dilutam, cum emuls. amygd. dulcium, & nucleorum pineorum, cum pugillo sacchari, & cochleari instaurantis ex capone, in paucis



lure dissoluto his in die, quinta aut sexta quaque hora.

Et dum jam dicta omnia fiunt, alvus clysteribus ex lacte & butyro, vel ex jure pingui & butyro, vel ex ol. amygd. & butyro, erit promocienda, & quæcunque saccharo tino addito, sollicitanda. Somnus utpote maxime necessarius, erit conciliandus martio pane, ex amygd. & saccharo, cum ʒ i β. sem. papav. ʒ i β. pro qualibet libra, simul contulis; cujus dosis erit ad ʒ ij. quo non sufficiente, injiciatur clyster ex lacte, in quo dissoluta sit ʒ j. philon. Rom. rec. qui tamen non ultra tres horas aut quatuor contineatur. Et tandem, ad inhibendas pollutiones, quibus, ob renum & vasorum irbecillitatem, a calore contractam, obnoxius esse solet, hac inunctione illinatur renum regio.

ʒ l. Ung. ros. Mes. ʒ ij. popul. ʒ j. ol. saturnini, id est de plumbo ʒ ij. camphor. ʒ β. succi sempervivi, ol. nenuph. an. q. s. m. ref. in mortario plumbeo. Abdomini continuo applicetur lana oleo amygd. imbuta, addita exigua portione masticchini; interdum omenta suilla & vitulina iisdem oleis madefacta.

In cæteris Aer sit temperatus; utraque exuperantia, tum frigoris, tum caloris nocere potest. Nutrices selectioribus refrigerantibus & humectantibus cibis alantur abunde, vinumque dulce iisdem exhibeatur, substantiæ namque debet esse eorum victus ratio; etenim Galen. Atinis quoque victus rationem præscripsit. Quies quam maxime conducit: Animi pathemata arceantur. Et læto & præsentis animo vivat.

#### *Pro eodem Consultatio secunda.*

Iusta curatio præscripta & administrata resfringenda, & tandem superanda atrophie universalis, quæ Pat. Illustriss. ad tabem, sine febre marasimum scilicet frigidum perducere videtur, cum duorum mensium spatio nihil profecerit, cogitandi ansam nobis præbuit, ne in eadem peristentibus, marasmus qui non adest, tandem succedat. Ex duabus autem causis nos res solventibus; consideranda potissimum universalis diaphoresis, sive insensibilis resolutio, qua non procedente, neque corporis nutritio neque alimenti appetentia heri potest; cum totius exinanitionem sequatur exinanitionum desiderium naturale: huic vero succedat suctio, dum vasa majora in centro a minoribus in circumferentia sanguinem attrahunt, ut necessarius appulsus sanguinis ad cor conservetur; quare exuguntur quoque venæ ventriculi, divinum cibi promptuarium à Gal. dicti, quam suctionem mox percipit ipse ventriculus; cui succedit tandem timor, appetitus animalis; & ita, quo copiosior facta fuerit totius habitus corporis resolutio & inanitio; eo majori, copiosiori & et fortius alimento indigebit corpus; morbo namque tunc temporis evadit, & affectum illum constituit, à Gal. descriptum, his verbis. Quandoque Pat. multos assumit cibos, qui neque crudi sunt, neque per alvum deiciuntur, neque plenitudinem efficiunt, neque etiam probe alere possunt; sed dissipantur, discurruntque celeriter. Hocque nobis persuadet, quod sufficiens alimentum, hoc nimirum Illustriss. Pat. præbetur, quod chylicationis nec imminutio, nec deprava-

vate elaboratæ signum exhibet, quodque sanguificationem satis idoneam subire consuevit; quoniam totius calor probus est. Quod si, aut ob valorum exsiccationem ad partes non permearet, aut calor partium, ob imbecillitatem, hoc ipsum non ageretur; inutile certe in corpore retineretur, sicque cachexia jam præludium adesset; quæ jam dicta cum in nostro casu non appareant, alimentum insensibiliter resolvi credendum; eo potissimum, cum caloris immodici & acrimonie alia signa non desunt, frequentes nimirum nocturnæ pollutiones, cum simulacris jucundis; atque adeo ab irritata, non laxata facultate provenientes; & præterea molestæ ac contumaces vigilæ, corpus dissolventes.

Quare deliberatum fuit, non solum alimenti qualitatem, verum & quantitatem esse alterandam; magis enim glucinosum, nec adeo facilis resolutionis debet esse, & quodammodo plenius; atque interim totius corporis obstructio continuo procuranda, pollutio inhibenda, & somnus conciliandus.

Quibus intentionibus satisfieri debere censuimus, bis in die, lac naturali substituendo artificiali, ex jure pedum vituli, borragine alterato, quo extrahatur emulsio ex amygdalis, nucleis pineis, & sem. melon. cum mucico saccharo. Quod si fortasse observetur ventriculus aliquo pacto gravari, addatur quoque cochlear aquæ cinnamomi ut frigiditati ejusdem & cordis prospiciatur; progressu vero dieum, addatur quoque melle utrens pulvis, non omisso interim lactis muliebri usu, duabus aliis vicibus, intra diem naturalem, addito pane, vino albo satis aromatico madefacto, ita ut quater in die alimentum assumat.

Extrinsecus vero inungatur totum corpus ol. violaceo, addito quoque myrtino. Somno autem conciliando, injiciatur Clyster ex lacte, in quo Phil. Rom. rec. ʒ j. dissoluta fuerit; & tempora atque futura coronalis ol. nenuph. rino inungenda: hoc enim solo ad contumaces vigilias uti solebat Rhasis.

Ad nocturnas pollutiones sistendas, præberi poterit amplius; verum à proprietate pariter prodesse solet pulvis ossium lepiarum ad ʒ j. Mirabilis quoque censetur à Medicis scriptoribus tinctura corallorum chymica. Extrinsecus vero, cæteris incassum tentatis, præstat oleum ex seminibus hyoscyami; expressum, quo illinantur pudenda, & potissimum peritum. Quæ tamen omnia ab Excellentiss. Viris presentibus summa observatione administranda & ad libitum corrigenda.

#### *Pro eodem Consultatio tertia.*

Historia tum præteritorum tum presentium de statu Illustriss. Com. ad amicum ab Excell. Viro descripta ac delineata, nos movet ad renovanda ea quæ possint ipsum ad meliorem statum redigere qui quoniam in nutritione consistit, victus quoque potissimum alterationem desiderat: in quem finem, parum per immorandum præteritorum considerationi, & quærendum, cur à iusta alimentorum quantitate corpus totum instaurari, sive carnis moles augere non potuerit? quod dubio procul non aliunde



promanare potest, nisi quia alimentum in sanguinem non convertatur; vel quia sanguis a partibus inscipiatur quidem, non vero assimilatur; qui rursus non assimilari potest, vel quia ab eorundem partium imbecilli calore non actuetur, vel quia sensibilibiter & insensibilibiter dissipetur, ac resolvatur. Vitium primum non adeo credimus, qui copiosiora excrementa & cruditates in primis coctionibus accumulantur & obervarentur, neque secundum, quoniam si sanguis copiosus produceretur, neque a partibus absumeretur, vix copioso sanguine turgida, hujus nobis signum aliquod præberent. Superest igitur, ut vel non actuetur ob imbecillitatem nativi caloris partium corporis, vel dissipetur. Quorum utrumque nostro calu concurrere credi potest, sicut enim partes, caloris principio proxime, satis humescunt atque nutriuntur, ita rem otiores exsiccatae magis apparent. Verisimilius tamen, quod, cum corpus totum rariæ texture, valde transpirabile & resolubile sit; sensibilibiter ideo per sudorem & per hilitus insensibilibiter alimentum, non tam cito a caloris imbecillitate in partes conversum, continuo resolvatur, eoque facilius, cum propter vaorum & virium exsiccationem, ægermine ad partes devehiri possit, quæ mora ipsi resolutioni commodum & opportunum tempus præbet.

Quibus ita habentibus, medicæ intentiones esse debent, alimenti quantitatem augere: qualitatem alterare: illud opportuno tempore devehere; & totius corporis potuitates densare.

Et primò, si de quantitate loquamur, ea fuerit quantum ventriculi vires tolerare possint, si de qualitate, crassior & resolutionis difficilioris præscribenda erit; si de alimenti distributione, laxantibus quidem & humectantibus, sed & attrahentibus utendum. Et tandem cutis densitas ex cautione procuretur, quæ necessariam excrementorum resolutionem, & caloris nativi transpirationem intercipere nequeat.

Itaque lacti bis assumendo, ovum recens tamen ulum addiposce credimus: ea usioni vero substituere præsumimus hordeaceam, ab Excellent. Viro propositam, e reducimus, cui addatur coctio an-ygd. more lernel. & pinetum nucel. cum pulli instaurante, cum qua tamen simul bulliat vituli pes, omisissis seminibus melonum & plantaginis foliis, a qua ebibat haultum vni odoriteri, potius generosi. Mox quibusdam exactis diebus, poterit minutim incidi puipa pulli, & simul cum ptisina misceri, matificationi instituta; omisso tamen instaurante: quæ si a ventriculo bene tolerentur, matificatio erit augenda pullis nuper natis, & sorbitiones minuenda, ita enim majoris durationis, magisque firma evadet ipsa nutritio, cum, *corum, quæ facile nutriunt, veloces quoque sint excretiones.* Totum vero corpus erit oleis consuetis inungendum; quæ inunctio si Viris Excellentiss. non sufficere videatur, paretur illitus totius corporis, manibus leviter faciendus, ex duabus partibus ung. ros. Mes. & tertia medullæ cerui vituli, sic enim majori poros cutis obstruendi, nec exigua humectandi ac nutriendi vi pollebit. sed interim aliqua attractione

omnino opus fuerit; quare loco molesti rum picationum, manibus an-ygd. oleo inunctis contrectentur cutis, & musculi coxarum, tibiarum atque brachiorum, idque quinque horis ab assumpto cibo, quod tempus distributionis proprium est.

Et quoniam aliqua de vigiliis querela obauditur, & inunctiones capiti nocere ferunt, panis martius, utpote medicamentum alimentarium, a nobis proponitur, exigua quantitate assumendus. Quæ jam dicta salutaria fore speramus, sapientissimæ Excellentiss. Virorum administrationis ope.

#### *Pro eodem Consultatio quarta.*

Si longè difficilior est humectare siccum, quam exuccare humidum, cum illud non simplicibus, sed materialibus qualitatibus remitti debeat; quid dicendum fuerit, quid cogitandum de substantiæ humiditate, quæ in hoc illustissimo Comite jam fere ex toto fuerat assumpta? Unde Hippocr. multo magis, semper errores intenuiori quam in paulo pleniori victu reformidavit, prout pariter ex inunctiones quam repletiones ipsas; quia non adeo difficulter evacuantur, prout ægermine implentur corpora atque instaurantur. Rationi itaque contentanea, quinimo necessaria fuit, hæc paulatim & gradatim procedens in primum restitutio, cum de humiditate substantiæ reparanda, & prius de intemperiebus siccis, omnium pessimis, auferendis, semper huc usque actum fuit. Neque ideo mirandum si hyemali adventante frigida tempestate, aliqua symptomata emerferint, inofficiosa nempe alvus, sedimentum urinarum consueti crassius atque limosius; & tandem somni breves: etenim primò ventris segnities, sicuti ex defectu biliosi excrementi sæpe provenire solet; ita casu nostro a congestis cruditatibus, ab ambiente frigido primo a capite in ventriculum expressis; niox & ab eodem retrigoris visceribus, & ventriculo potissimum, productis (cum antiperistaltis in istis gracilibus corporibus locum non habeat) aquarum proventu bilis facultas retracta, imo & partium expultrix oblita & segnior redacta, alvum a proprio munere vacare cogit; cuius rei indicium præbere potest plumbeus ille color, instar non bene confectæ pristinæ. Adauctis autem cruditatibus, & eodem tempore consilipadiaphoresi, & insensibili consuetæ evacuatione necessario imminuta, quid mirum si sedimenta in urinis crassiora apparere cœperint? Tandem somni brevitatem melancholicis familiaris esse solet, quia siccitas primum locum obtinet in vigiliis excitandis; unde habet cum Hippoc. Gal. quod senibus facile vigilare sunt, tum quia senectus plena curarum, tum quia senes exsiccatum corpus habent, quibus nos addere possumus vigilandi consuetudinem, quæ in illustiss. Viro, ab animi studiis, sive timore facile originem duxit. Quæ omnia licet a nobis parvi faciendi videantur; in illustissimo tamen Juvene omnino negligenda non sunt, ne confirmentur, neve augeantur, & ne absque medicis auxiliis, anxius propria mala foveat.

Quare proba concoctio est adjuvanda, som-



nus conciliandus. Et quia illa non parum ab alimento concoquendo pendet; ideo alimenta concoctu facilia, nec adeo crassi succi; quibus conficiendis ventriculus agendo non repariatur, sunt deligenda; atque ventriculo robur aliquod conciliandum; licet enim de nulla ejusdem querela fiat mentio; edulia tamen adhuc cruda dimittere credendum.

Pisanae itaque usus omnino rejiciatur, ut quae non nisi febricitantibus, æstuanti ventriculo, & hypochondriis, continuo conveniat, crassumque succum producat, pincis præsertim adjuncta; & vi deterforia prædita, reliquos quoque cibos à ventriculo citius, quam par est, expellat, hujus autem loco, assumat edulium aliquod ex ovis paratum, vel ex Apula pasta, vel ex oryza dilutiori, vel ex endivia & borragine in jure coctis, ovis additis. Nec caro pullæ amplius contrusa, sed conmansa assumatur, ut ita ventriculus magis uniatur, nec adeo ut à liquidis laxetur. Ita convenient caro tenerissima Volucrum sylvestrium, non tamen aquatiliū. Pisces quoque saxatiles, & ova recentia. Vinum sit potius generosum quam tenue, nigrum, non tamen omnino meracum. Quod si inter cenam & prandium primis horis maturinis, paucis aliquo alimento opus fuerit, hoc sit jus pullæ cum ovi vitello conquassatum; quod nonnunquam malva aut mercuriali alterari poterit, ad alvum emolliendam.

Aliqua quoque ventriculum roborantia in usu habenda, ut grana mastiches, hora una ante cibum integra deglutita; aut sal abiythii, aut ejusdem conserva; prout extrinsecus pannus coccineus ventriculo adinducendus, & gestandus, ut calor ejusdem proprius foveatur potius quam alienus accedat. Somnus verò accersendus auxiliis alijs a nobis propositis, & potissimum usu panis martii, qui parari poterit ex ʒij. sem. p. pav. albi, pro qualibet libra amygd. & sacchari, ita enim unica sufficit uncia, a cœnâ assumenda, suavis etenim, nec minus noxium præscribi potest familiare somniferum. Meditationes sub ingressum lecti ablegandæ, his enim præsentibus somnum conciliare impossibile foret. Quæ in gratiam perfectæ salutis, a nobis ex intimo pectore Viro Illustriss. optatæ, raptim, scripta tuere, a summa prudentia Viri Excellentissimi Adstantis melius disponenda.

#### *Pro eodem Consultatio quinta.*

Vicit ut Leo, Fortis, quia Gallum non hostem, sed amicum, in eo communionem habuit, qui arena sive campo potitus, Leoni gloriam comparavit, licet palma cum campo, Gallo debeatur; Utinam verò in mearum consultationum executione pro communionibus, Medicos ad erantes, sive remediorum subversores frequentes non haberem, qui aut ignari, ne unguem quidem à præscriptis discedunt; aut arrogantes, præscripta mutare contendunt. Quare tibi potissimum, in omnibus quidem, sed præsertim in re medica pererudito, atque prudenti Comes Illustriss. pristinam sanitatem debebit.

Duo autem nobis supersunt in præsens consideranda; Urinæ a naturali statu alienæ, & vi-

et ratio in cæteris observanda. Urinæ quidem, primò coloratiores, aliquando verò cum tela supernatante densa adeo ut quandoque pelliculam referat. Crassior verò est ejusdem hypostasis, quæ fere statim a mictione in media matula filamenta exhibet, & fundum petens, limosa, subrufa, conspicitur rubrum pollinem potius quam arenulam referens, quarum urinæ conditionum unica causa est, nimirum imminuta concoctio, cum vitioso atque exuperanti calore; quæ quoniam in omnibus partibus perficitur, ideo cruditates varix conditionis sese nobis exhibent, prout vel a jecore, vel à venoso genere, vel a partibus ipsis excrementitia cruditas superest ac secernitur, & quidem supernatans à partibus, filamenta à ventriculo & jecore; & à venoso genere limosum atque subruium transmittitur quod & arenosum quoque in venis ipsis evadere posset, si major in iisdem vigeret caliditas, tunc verò parietibus matula adhereret, atque adeo nunquam calculo cogendo idoneum; necesse quippe est arenosa in urinis subsidere, non autem limosa, nec arenosa parietibus adherere, ut calculum efformare sint apta; quæ enim in renibus generantur arenulæ subsident omnes. Lithiasin autem præcedere solet materia tartarea, & meienti aliqua difficultas; etiam lapis in vesica cogi non potest, nisi præcedente ejusdem insigni calore, à quo contrahitur ejusdem musculus; unde urina coercetur; Hippoc. *Vesica excalescens urinam non dimittit, sed retinet, & quod crassissimum & turbidissimum est, circumvolvitur & concrevit.* Ex quibus colligere est, coctiones omnes imperfectas & inanimatas esse; nam si perfectæ forent, tanta alimentorum copia velocissime corpus, non modo nutrire, sed impinguare potius deberet.

Quare nutriendi modum, quoad quæ utramque & ordinem saltem, si non quoad quantitatem, mutandum esse censemus. Et quoniam cum Avic. nil deterius quam comestio supra comestionem, ideo tempus diuturnius inter unam & alteram limenti assumptionem erit interponendum; atque adeo tertie die nutriendum, ita ut iunio mane lac sugat muliebre, adsummam dolin, cum saccharo, & statim ab eo sumat cochlear aquæ cinnamom. Quinque vero aut sex horis ab assumpto lacte, prandeat, sitque prandium quandoque prisana hordeacea, cum ovi recentis vitello, quandoque panis, jure optimo linitus, quandoque edulium ex subtilissima pasta Apula paratum; mox pullum gallinæcum junio comedit, bibatque vinum album, odorum, iterum aut tertio in prandio. Hora verò prima noctis, ad cenam se conferat, ex panatella cum emulsionem amygd. dulc. & pincorum, cum saccharo, & quarta parte, vel dimidia pulli junioris jam dicti, duabusque vicibus bibat. Interim manè surgat, & duabus saltem ante prandium horis, ambulans in cubiculo corpus exerceat; mox à cibo, hora transacta, decumbat, & hora 21. & 22. rursus surgat, & leniter ambulet, imò & in apertum nonnunquam inprodeat; calor enim naturalis, sicut à motibus violentis resolvitur, à nullo torpescit, ita à moderato vivificatur, sitque coctiones perfectiores & excrementorum excretiones, vel copiosiores vel promptiores



evadunt. Sibi verò non semper indulgendum, sed oris collutionibus deludenta, vino libo tenui, quousque jecoris & renum calor accommodatis contemperari possit. Atque hæc potiora, reliqua Excell. Viro judicanda & statuenda committentes. *Joann. Kaymuid. Fortis Co. Jul. 10m. 1. Cent. 3.*

### Observationes.

Quidam Atrophia laborans mala citria summo opere appetens unum integrum & magnum 4. librarum pondere comedit, quod, ut scimus, commanducatum à quolibet sano difficillimæ concoctionis est; tamen hic æger citro devorato meliuscule habere incepit & convaleuit. Induigant quidam Medici ægrotum voluptatibus cum modo & mensura, multoties enim natura a nullo edocet id quod est sibi utile maximo opere appetit. *Dominicus Panarelus, Observ. 36. Pentecoste 2.*

Vir quidam obesus & pinguis, ex febrili calore, & diuturna hepatis intemperie sicca, comitibus cutaneis maculis, non nutritus in atrophiā incidit, cui, non proficientibus aliis remediis, 15. diebus continuis ad normam Galeni ad picationem applicuit, cujus usu ita impinguatum est corpus, ut paucis auxiliis adhibitis ad pristinum statum fuerit reductum. Pictores dicuntur illi, qui ferulis pice illitis partem debilem concutiebant, & sic motu & calore, sanguinem & nutrimentum ad partem attrahebant, & hac ratione membrum gracillimum impinguabant. *Zacutus Lusitanus. Obs. 136. lib. 1. Prax. Admirand.*

Anno 1591. mense Januario puer 13. annos natus, filius *Petri Von Werd*, civis Colonienfis, ex variolis tumores aliquot ex lenta & viscida materia circa humeros, cubitum dextrum & genu contraxerat. Horum nonnullos, qui humeros occupabant; incidi, & procelius superiores scapulae (quos rostra porcina vocant) extraxi: quo facto humeri nullo motu deperdito restituti fuerunt. Cubiti vero tumorem, quam ad id ine parentum cogerent preces, discutientis us medicamentis resolvi: sed non multo post, brachium usque ad humerum in atrophiā incidit, & ita desiccatum est, ut periret motus omnis. Verum appetente vere, puerum denovo purgavi leni quodam medicamento phlegmagogo, qualia sunt Diacarthamum & Diaphœnicum cum rhubarbaro. Deinde singulis diebus bis terve brachium decocto capiti, pecuni & intestinorum vervecis vel vituli, cum lumbricis incoctis, insuccare jussi, quoad pars inciperet rubescere. Tum prælo fuit famulus, qui par. o quodam instrumento excavato corneo, præcipua brachii vasa fugeret. Hinc totum brachium, humerum, collum, & pectus cum succo lumbricorum, & oleo amygdalarum dulcem simul miltis, inunxi. His Deo benedicente, brachium pristino restitutum fuit vigori. *Gustelm. Fabric. Hildan. Obser. Chirurgic. Cent. 1.*

Ante annes tres in Alsatiā ad puellam decem circiter annorum ætatis, atrophia cruris per annos aliquot laborantem, vocatus fui. Circa puellam hanc diversi barbitonsores occupati fuerant, omnemque lapidem moverant,

ut extenuationem illam partium musculosarum, ac claudicationem corrigerent. Ego cum primum denudatum crus inspicissem, dislocationem coxæ reperi, indeque Atrophiam propter compressionem vasorum, venarum imprimis, & arteriarum provenire, parentibus indicavi; & quid circa affectum hunc tentandum, aut præterea de eventu expectandum, sin ul significavi.

Ante dies 15. ad puellam duodecim annorum claudicantem, & atrophia cruris laborantem, vocatus fui. Hanc barbitonsores nostri per menses tres in Xenodochio curandi habuerunt: circa genu quidem, ubi sedem mali esse arbitrabantur, multa adhibuerunt medicamenta, sed frustra. Nec immerito: quandoquidem dislocatio in coxa, quam barbitonsores nunquam observarunt, & claudicationis, & atrophiæ sola causa erat. Hæc fecit ignorantia artis Anatomicæ, simul & sordida negligentia. *Idem.*

Anno 1597. matronam 63. annorum curandam habui, illam, cum propter herniam intestinalem, in gangrenam degeneratam, præter modum extenuata & enacitata fuisset, rem illa febre, beneficio lactis muliebris post Deum in integrum restitui, & ad 15. usque annum post curationem supervixit. De gravissimo hocce affectu videat Lector *Observ. 33. Cent. 1.* singulis autem matutinis, absoluto somno, maximum hantum lactis ex juvencula, & optimo corporis habitu prædita, rustica, ad lectum agræ emulcū, agræ propinavi. Deinde circa decimam prædebant. Aliud habeo exemplum memorabile de præstantia lactis muliebris. Dn. Jacobi de Tribus Paterniacensis filiolus, 4. annorum ætatis, post dysenteriam gravissimam Lyenteria correptus fuit, quam secuta est periculosa atrophia, ita ut ossa vix cute obtegerentur. Juscula & quidquid assimebat, indigeste iterum per seceum excernebat. Suasi ut mater infantem semestrem, quem lactabat nutrici alicui committeret, periculumque faceret, an atrophiā hanc ac summam extenuationem corporis, cum labefactione virium, lacte suo regere posset. Mater conalium, infans vero papillis celeriter atripuit, & cum aviditate exluxit, omnemque cibum in posterum respuit. Hac cum ego viderem, & de salute ægri ipem aliquam conciperem, singulis diebus regionem ventriculi, totumque abdomen sequenti unguento bis calidè inungere jussi.

℞. Ol. Miltichis & menth. ana 3j. ol. nuc. moschat. Gummi. Tacamahac. pinguisimi ana 3j. Terantur omnia lentissimo igne, percolentur & reserventur in vase vitreo. Hisce prælatis convaleuit, & per multos annos supervixit. *Idem.*

Tria fuere veteribus, juxta Oribasium, coll. lib. 7. cap. 16. cucurbitularum genera, vitrea, znea, cornea. Quorum priora trahunt per ignem; posterius citra ullum, solo oris succu. Quæ cornea cucurbitula, licet nobis ferme in deluetudinem abierit, plurimi tamen etiamnum hodie Indis, sub torrida Zona habitantibus.

Qui curaturi dolorem colicum, Juvenis mihi notissimū, insudare primum ore clysterem, mox applicuere abdomini cucurbitulas corneas.



neas. Quorum spiritu, per exile foramen, ore (ut Celi verbis id efferam) educato; occlusere festinanter cavum id digito: Cum ut cuti immittere inhaeresceret cucurbitula: tum ad eliciendum natum intestinis molestum. Quem certe lenissime, huic juveni, hac ratione, subduxere barbari. Quapropter domum reversus, donavit me tali cucurbitula. Cujus periculum equidem aliquando facturus, selegi mihi (uti etiam fecit Fabricius Hildanus, cent. 1. obser. 80.) brachium ab atrophia consumptum. Cui imposui hanc cucurbitulas loco picis, ac resina: quibus legimus, in simili necessitate, usam fuisse, antiquitatem etiam nobilissimam. Attrahunt autem hæ cucurbitulæ potenter; & abducta aptissime cute, elevat venas, & arterias, præ macie in se collapsas. Quibus iterum adaptatis, committant denuo quocunque, sanguis, ac spiritus. Quorum indeminens affluxus, nisi cotidie subiret: in locum eorum, quæ continenter ex corpore, decedunt; non solum non aleretur, sed emaceraretur necessario, membrum tali vitio infectum. Cui maciei nihil profectio salutarius est, hacce cornea cucurbitula. Præsertim si affigatur dextræ, juxta cursum venarum, arteriarumque illuc nutrimentum, ac vitam deferentium. Nautæ Juniori, effluxere, ex amplo brachii abscessu, tam frequens pus, & adeo copiosus liquor: ut subducto succo alimentali, & dissipato, plus æquo, calore vitali, conciderent venæ inanes: cessaret accretio: & tandem emaceresceret brachium universum. Cui jam exarefacto, ubi imposuimus aliquoties cucurbitulam corneam: vidimus ipsius suctu, tantum caloris, ac sanguinis, ad cutis extrema attractum: ut exspectum illud brachium, non modò non aleretur iterum; sed adipisceretur denuò pristinum vigorem: inò tantum virium, ac roboris: ut potuerit deinceps quocunque iterum navigare, & in mari, nullo non fungi officio. *Nicol. Tulpus Observ. Medic. lib. 3. Obs. 49.*

Medicus meticulosus, veritus, ob imbecillitatem, venam ferire Catharina Geriz, acerbissime ex latere dolenti, auxit tantopere, febrem; utrique inflammationem, in membrana costas succingente, conceptam; ut ex retorridi sanguinis æstu, ipsa non secus emarcuerit; ac si laborasset, immedicabili tabe. Quam etiam non obscure videbantur designare, sputa ita frequentia, ac sordida: ut copia, capax pelvim; & tætoze, spatiosum facile repleverit conclave. Re autem ipsius, jam plane desperata, & morbo, ultra quartum mensem, in ipsam fervente; apparuit ipsi, quod si ex machina Deus, excitando, nescio quod, crudorum ostreorum desiderium. Quod eo quoque lubentius concessimus, quo minus hactenus profuissent, portiones concinnatæ, ex humidis ac frigidis herbis. Qua spe etiam minimè excidimus. Vix enim comederat cruda hæc ostrea, quin protinus imminuerentur non tantum calor, ac febris: sed etiam usque eò perniciosissimus hic morbus: ut brevi integrè convalesceret. Extincto, ab aligdo, ac viscido ostreorum succo, pertinacissimo illo incendio: quo, procul dubio, conflagrasset miserrime universum ipsius corpus. Non temere itaque Celsus. Quos ratio non restituit, adjuvat temeritas. Neque certe inconsideratè

agere videtur, qui circumspicere cedit in tunc inclinationibus: & obliquat prudenter sinus, ubi non licet, rectum tenere cursum. Satiùs quippe est, anceps remedium experiri, quam nullum. Dubia namque ipse, certa desperatione potior. *Idem. Obs. Medic. lib. 2. Obs. 8.*

Tabes dorsalis, seu *Spina ventris*, duplex est Hippocr. Altera ab immodica Venere, lib. 11. de morbis. Altera vero, à destillatione in spinam dorsi, lib. de glandulis. Quam utramque speciem lubuit Balduino Ronszo lumbaginem vocare. Quanquam hæc vox designet sesto, solam lumborum imbecillitatem. Præterquam tamen in tabe dorsali videre est, cum dolorem continuum; tum marcorem insuperabilem. Quorum naturam minus significanter cum exprimat lumborum imbecillitas: satius erit, stare ab antiquitatis sententia, quam temere ab ea desciscere. Dolorem autem hic parit, acida pituita; dilacerans magnopere vel membranam, quæ spinalem medullam proximè cingit: vel ipsos nervos inde oriundos. Sed si obstruitur venæ, aut arteriæ: sive à lumbis, sive à cervice huc delatæ: vel ob contrahens frigus, a nimia Venere illis impressum: sive ob prolapsum crassioris pituitæ (cujus maximam copiam equidem aliquando illic conspexi) eripitur ægro, non modo consensus inter superiores, inferioresque corporis partes: verum redditur præterea sterilis, propter interceptam, decedui seminis, materiam. Neque minores solam ipsa spinæ medulla, quæ obstruitur: sed contabescit utique cum illa corpus universum, communicato paulatim malo, hinc per nervos cerebro; illinc per arterias cordi; uti per venas Jecinori. Quorum nobilissimorum viscerum functione, evidenter læsa: torpet necessario corpus; marcescit animus; & consumitur infertibiliter homo. In qua tergemina, nervorum, venarum, ac arteriarum via, invenire quoque est viam inducentem, vel febrem convulsionis; vel convulsionem febris. Siquidem febris supervenit convulsioni; discutit (ut cum Galeno loquar) æstuans cordis calor, illud frigus: quod lenta, ac viscida pituita impresserat, nervis spinæ medullæ. Quod si vero convulsio sequatur febrem; vel exaruit spinæ medulla, præ febris incendio; vel acris, fervidæ bilis, vapor, ab æcenso corde, per arterias, illuc effusus, pupugit tam rigide sensiles ipsius membranas: ut sequatur exitialis nervorum contractio. Potissimum si vires exhaustis præcedens febris. De qua propterea satis circumspicere Hippocr. lib. 1. aph. 16. *ἡ φρενὶς ἐκ τῆς πυρετοῦ καὶ τῆς σπινῆς ἐκ τῆς φρενὸς ἐκ τῆς πυρετοῦ.* Febrem convulsioni supervenire, satius est, quam convulsionem febris. Samuelli Vespretio elevabat impurus lien, tot vapores versus cerebrum: ut inde destilaverit iterum plurimum acrioris pituitæ, primum quidem in occipitium, ac cervicem: sed mox inde, in spinæ medullam: & potissimum in lumbos, ilia, ac coxæ articulum. Quorum partium inmanis, dolor excruciatum ipsum tormento tam indefatigabili: ut amisso omni colore, ac decore, inciderit in lentam febriculam: consumentem ipsum, morte adeo tarda, ac miserâ: ut ante ejus accessum, non semel exoptaverit, languentem remittere animam, & reluctantem expuere spiritum: Quod ipsum etiam, in hoc morbo obser-



vavit, Auctor libri de glandulis: Sed ferendum fuit, quod non licuit mutare. Præsertim Labe hac, in penitiùs infixæ, quam ut cesserit vel tempori, vel remediis etiam convenientissimis. Argumento certè evidenti, pervicaci, sacre hujus instauræ, labi, auxilia medica esse, non solum infirma, sed ausum dicere, nulla. Idem *Obs. Medic. lib. 3. Obs. 24.*

### Anatomica Inspectiões.

Puella annorum circiter sex secta fuit: Cum toto vitæ curriculo morbis fuisset obnoxia; præsertim vero tumoribus œdematosis circa articulos manuum, quibus apertis ossa corrupta inveniri, nulla tamen fere materia aderat: Dein palpitatione cordis & asthma divexata, tandem *Atrophia* periit. Abdomine aperto, Omentum pinguedo absumpta erat, Intestinum cæcum, non lumbrici inerat, sed crassum, ex meris glandulis rubentibus compositum, duorum scilicet digitorum latum, in quo nihil nisi mucosum aliquid: Mesenterii glandula scirrhusæ, Hepar a naturali magnitudine recedebat, ut quod plus solito magnum esset, Ren sinister dextero multo major & durior: ventriculus cnylo vacuus, sed flatibus distentus. In thorace verò Pulmones a convenienti colore recedebant: Pericardium distentum aqua refertum, Cordis auricula dextra prætumida, cui inerat materia quædam alba, membranosa, crassa, oblonga, in ipso autem dextro cordis ventriculo, materia pinguedini similis. *Ex Obs. Casp. Bauhni.*

In cadavere exenterato Nobil. C. A. B. hæc reperta, 1. Omentum glandulosum & adenibus undique refertum, adeo ut nulla ex parte membranolum apparet, crassum valde & tumidum: in parte dextra, circa regionem hepatis, putrefactum & lividum. 2. Hepatis parenchyma scyrrhosum, tumidum, varis que maculis nigricantibus & griseis distinctum. 3. Vesicula fellei humore nigerrimo & bile atra materiaz quædam tartarea, sabulosa & friabili turgescibat: 4. Ren dexter totus erat corruptus & putridus; similiter glandulis oui columbini magnitudinem adæquantibus undique oblitus & quasi obvolutus: Pulmones toti flaccidi & variegati. 5. Partes circumjacentes proximè Hepatis gibbam partem, ut & renem dextrum putridum, planè erant corruptæ. 6. Cor, Lien, Uterus, Intestina & reliquæ partes naturales. *Tinnius lib. 6. Epist. 8.*

Quatuor annorum puer Marasmo extinctus obiit: Animi causa à me secatur cadaver, cujus hepar dum inspicerem, erat supra modum magnum: Habebat Abscessum propè venam cavam, circa partem gibbosam pure circumquaque obductam. Lienem boni coloris & integrum. Omentum nullum, aut vix conspicuum. Pulmones, mirum dictu, nullos; quorum loco erat vesicula membranosa statu repleta, venulis exiguis munita, originem sumens ab ipsa arteria aspera, quæ refrigerium afferre videbatur cordi. *Fontanus lib. 1. Respons. & curat. Medicin.*

Jacobus Knoll adolescens 17. annorum laboravit à puero calculo vesicæ, à cujus cruciatibus, accedente renum suppuratione,

ne, macie confectus, viribusque pene exhaustus e vita excessit. Cum juxta alia in eum ventrem scrutando, ac duplicis vesicæ speciem contemplando, venam cavam dilectissimam, corpora alba, pituitosa seu fibrosa, cavitatem earum fere implentia reperi, qualia in diu decubitus & a morbis chronicis sublati sæpius vidi: statim cogitavi talia quoque sinu cerebri occupatura, cum quod uni majorum vasorum obtingat; alterum ab eo raro immune exsistat: Aperui itaque sinum tertium, in alterutro laterum occurrit corpus sive pituitosum sive fibrosum, certe non adiposum (prout quidam hæc corpora nominare solent) candidum, lentum, tenax, crassitie fere digiti majoris, circa torcular maxime, & tantum non tantam cavitatem implens: In cavitate hac tenacius erat quam in vena cava descendente, ubi ad levem attactum rumpebatur, secus ac alias de his pituitosis corporibus observavi &c: Totum hoc corpus pituitosum ex sinu tertio extraxi, cui haud ægrè omnes ejus appendices succedebant, numero magnitudinis & fere longitudinis valorum respondentibus, adeo ut plurimæ spithamæ longitudinem superaverim. præterea in ramusculos & filamenta, ad numerum propè vasorum divisibiles essent: Similia corpuscula pituitosa, in utraque carotide interna, propè intundibulum, notabilis magnitudinis aliquousque sursum scandentia inveni, non tamen tantæ longitudinis atque erant in venis tertii sinus, quod seu flaccidiora minusque tenacia forte abrumperentur: Adolescens autem hic nihil unquam apoplectici passus est, at sæpius convellebatur: *Jacobus Wepserus Exercit. de Apoplexia.*

Uxor Jac. Bagolle paulatim morbo admodum intricato correpta fuit; Nunc enim palpitatione cordis; nunc dolore & torminibus ventris; interim tamen appetitus non multum prostratus fuit, ita ut pro more alimenta sumeret, quibus tamen parum nutriebatur: Tussiculæ quinetiam & dyspnœa laborabat; Cum circiter annos 4. vitam hanc calamitosam vixisset, ac sceleti fere instar extenuata esset, paulatim stupore & frigore in sinistra manu præcipue circa extremitates digitorum, correpta est; symptomata tamen hæc ab initio tam exigua erant, vix ut percipi possent, nec aderat tamen multo minus inflammatio, imò nec dolor ullus: Interea tamen extremitates digitorum, & tota manus paulatim, & (quod mirandum) absque dolore sphacelata & penitus emortua est. Ego, tribus septimanis post inceptam sphacelationem digitorum vocatus, brachium ad cubitum usque, simul & digitos, carbonum instar nigros, frigidissimos, & ita extenuatos, ut ossa vix tenuissima cute obtegerentur offendi; nulla tamen, ut dixi, aderat inflammatio neque dolor, imò nequidem in loco illo in quo calor nativus nondum penitus extinctus fuerat. Porro cum etiam per exigua recuperandæ sanitatis spes superesset, rogatus tamen ut brachium amputarem, quia malum adeo lento tardoque gressu incedebat vix ut percipi posset, visum ante operationem corpus præparare: Postea brachium supra cubitum, & quidem in parte sana, feliciter & fere sine dolore à sanguinis profusio abscidi, vulnus brevi digestum quidem fuit, adeo ut laudabile pus appareret, nihilominus circa u-



qui visceris illius parenchyma superesse diu non potuerit. *D. M. Janssonius Mercurii Gallo Belgici Tom. 2.*

Juriconsultus Parisiensis sicca tussi vexatus, Macie universali affectus & diarrhœa diuturna, post repetitas purgationes & venæ-sectiones me accersiri jubet. Eum attentè considero, & post colloquium aliquotque protractum, decumbere jubeo quo latera dextrum præsertim, cominodè pertractare liceret, suspicatus aliquid in jecore vitii. Admotâ manu, indolentem tumorem percipio nucis juglandis magnitudine, (sed forti digitorum impressione & profunda, proque partis sensus tolerantia) infra costas nothas in jecoris regione. Prognostico emisso, asserui tumorem illum ad capitis magnitudinem perventurum, imò majorem, quod eo loco situs esset, quo intus nequicquam remitteretur, ad extra vero augmento prohiberetur a caligatum cingulo & thorace. Ulteriore sanguinis missionem prohibeo, eo quod judicarem vitam tandiù productam iri quamdiù sanguinis penuria non adesset. Opinionem & prognosticum meum impugnavit venisectæ, qui imaginariū esse tumorem objiciebant, iteratisque venæ-sectionibus ægrum vexabant. Post dies quindecim iterum advocor, atque ægrum in deteriorem statum deductum video, tumorem auctum & digitis palpatibus manifestum, globuli sphaeriterii magnitudinem æquantem. Mortem prædico, Chirurgi verò revocati, agnito tumore, sanguinis missionem perperam iterum instituant, sed paulo post mors succedit.

Apertum cadaver fuit à Riolano Chirurgo, qui solus, consultatione habita cum tribus Medicis ac duobus Chirurgis ampullatis, contendebat tumorem neque mesenterium neque pancreas obsidere, sed musculorum cuiusdam viscera colligantium adnatum esse. si enim aiebat, situm in pancreate aut mesenterio obtineret, ad motum corporis huc illuc nutaret, illius inclinationem sequutus, alvi excrementa cohiberet, quæ liquida & inconcocta deiciebat æger: Obviam ergo illi secantis se obtulit tumor pendulus & annexus lateris dextri musculis lumbaribus, magnitudine capitis vitulini, cui plurimæ adnatæ erant cystides, alix materiæ pulvi simili refertæ, alix sebaceæ, alix lardum, alix niel referente, alix erant duræ, varix consistentiæ & coloris ab invicem secretæ. Totum corpus exangue erat, sed plurima aqua reperta, ad mensuras duas Parisienses. *David Lagneau lib. de sanguinis missione p. m. 385.*

Puer duorum annorum erat macie ita confectus, ut vix cutis hæreret ossibus. Ad latus sinistrum, in musculo mastoideo exulceratio erat, quæ usq; ad ipsam jugularem venâ penetraverat, eamque corrodendo sic extenuaverat, ut puris subtilior materiæ percolasse per eam videretur: non exiguam namque ejus copiam sanguini permistam in dextro cordis ventriculo, corde aliàs sano & integro, inveni; quam, ut dixi, transcolatione eo pervenisse suspicatus sum: sed unde puris ejusdem crassiusculi, bene cocti, copia, item magni e regione in dextro latere, ad eundem musculum, intus & foris sanum, penetraverit, ego divinando assequi non potui: Lien præterea induratus erat & magnus, pseudobat

enim uncias septem & tres uncias quartas: Hepar contra, consumpto fere parenchymate, nonnisi quinque uncias & quadrantem ponderabat: biliosa id plenum erat materia, quæ propter obstructionem ductus communis in illum redundaverat; bilis interim drachmas undecim [magnum pro ea ætate pondus] exarabat: Pancreas magnum erat & scirrhosum, quod in chronicis morbis sæpe contingere observavi: Succus etiam tam acidus, ut in duodeno bili admixtus, tamen adhuc insigniter cum sapore retineret; hac aciditate sua ita ventriculum & intestina perederat, ut dum inflare e. vellem, ad minimam distentionem ru. perentur: Non immeritò igitur *Clar. Franc. de le Boë Sylvius* in Praxi sua plurimorum morborum causas refert ad hanc lucci illius aciditatem, *Theod. Kerkringius observ. Anat. 65.*

Venit mihi in memoriam apertio Virginis in Nosocomio Leydensi, quæ cum macie contabescens occubisset, præscripta ad terram *Do. Sylvi*, abdomen ostendit factum pinguedine, visceribus interea proximis nutrimenti inopia fatiscens & contractis. *Olavi Borrichii observ. 92. Astor. Bartholini a. n. 1671. & 72.*

Fateor plerisque Medicorum ignorasse ossa, quantumvis solida, quæ si phlegmone & apostemate quoque corripì posse, Quicquid enim nutritur, crescit, augmentatur aut in auxilium recipit, id quoque putrescere & apostemate aliquando turgere fatemur: Proinde *Avicenna & Galenus*, suo periculo edoctus, apostemate quoque distendi asserunt: Et Hippocr. empyemate os sacrum computrescere quoque novit, cujus putredine & incredibili doloris tyrannide duos, Nob. *Wurmhauser* in Neoburgo, & *Joan. Castnerum*, afflictum & diu in ceratosis tandem contabescere & mori hucce oculis vidi. *Largius Epist. 42. Tom. 1.*

*Joan. le Fuzelier* Tabida matre natus, eo modo, eoque morbo & eodem tempore interit quo ejus mater. In pulmonibus nihil memorabile reperitur quod mortem attulerit. Mirum quod ante mortem ei contigit; Decem antequam è vivis excederet diebus tumidum corpus fuit, Tumor fugax erat, repetebat ex intervallis. Unde hoc? Leucæ videtur antur esse: Tale quid in morbis funestis contingere solere agnovit Hippocr. 2. prorrh. Leucæ, ait, oboriuntur (supple in morituris) in morbis funestissimis, cujusmodi est Phthisis. *Ballonius Parad. 39.*

Anno 1562. In mulieris cujusdam consistentis ætatis, quæ ad tantam maciem redacta erat, ut vix cute & ossibus hæreret, corpore quatuor lumbricos teretes spithamæ uanis longitudine, in ipsum truncum venæ portæ se insinuasse, ac toti corpori alimenti aditum obstruxisse observavi: Ex observationibus *Adrian Spigelii*.

Quatuordecim annorum Virguncula à quatuor annis tabe incepit laborare, postea tussi & febricula correpta est: functionibus quotidianis obeundis satis vigilax. Cibi & potus valde appetens, per sesqui mensem ante obitum decumbens, moritur.

Mesenterium scirrhis ac steatomatibus duris undique plenum, præsertim circa vasa sanguinea: quadam ovi anserini magnitudinem superabant, alia nucem moschatam excedebant.



Cibi ut comesti erant impermixti excreti fuerunt, ramosus calculus pondere sesquialterius, in dextro pulmone abicefus foetidus, membrana inclusus fuit: inciso tumore tanta puris copia effluxit ut clodrantem bis aquaret. Porro pulmones scirrhis ac steatomatibus repleti. Cor molle & flaccidum: cetera satis sana. *Steph. Blancard. Anatom. pratt. rational. pag. 153.*

Morbo admodum intricato quaedam mulier correpta fuit, nunc enim palpitatione cordis, nunc dolore & torminibus ventris vexabatur. interum appetitus non multum prostratus fuit, ita ut pro more alimenta sumeret, quibus tamen parum nutriebatur. Insicula quinetiam, palpitacione cordis, & difficultate respirandi laborabat. Cum circiter annos quatuor vitam sane calamitosam vixisset, ac sceleti sere instar extenuata esset, paulatim stupore & frigore in sinistra manu, praecipue circa extremitates digitorum, correpta est: symptomata tamen haec ab initio tam exigua erant, vix ut percipi possent: nec aderat tumor, multo minus inflammatio, imò nec dolor ullus. Interea tamen extremitates digitorum & tot. manus paulatim & absque dolore sphacelata & penitus emortua est. Istea brachium ad cubitum usque simul & digiti carbonum instar nigri erant, frigidissimi, & ita extenuati, ut ossa vix tenuissima cute obtegerentur, nulla tamen: de rat inflammatio, neque dolor; brachium postea feliciter supra cubitum amputatum est: nihilominus tamen circa undecimam horam post brachii abscissionem, gangraena denuo truncum invasit, ita ut paucis post diebus e vita discederet.

Cadavere dissecto, abdomen serosi humoris plenum & extensum erat. Mesenterium steatomatis multis scatebat. sub vena portae, & quidem in ipso pancreate scirrhus admodum magnus conspiciebatur. Hepar durum pallidum, ac si elixatum fuisset, apparebat. Pulmo dextra parte materia purulenta ac foetida, similis verò humore seroso imbutus erat. Per totam pulmonis substantiam scirrhii plurimi, colore lividi, in quibus materia nigra, atramenti instar, contenta fuerat; conspiciebantur. Lapides plurimi hinc inde per pulmonem diversi coloris, parvi tamen omnes reperiebantur. Cor sanguine plane exhaustum, extenuatum, ideoque valde diminutum & parvum erat. Vena pulmonalis in monstruosam amplitudinem extensa erat: nam humore aquoso fuit impleta.

Aegram hanc sanguinem habuisse admodum crassum, ex gangraena satis liquet: non enim ex inflammatione ortum habuit, sed ex sanguine in manu coagulato. Est mihi adhuc cognata, quae ante aliquot annos sanguinem suum seroso lacte aliisque ceteris ita corruperat, ut postea in febrim inciderit, ex cuius frigore, quo incipiebat, non tantum ungues nigredine commaculabantur, sed iste color per integrum annum sub unguibus latebat: unde igitur iste color? nisi à sanguine, ibidem loci coagulato. Scribit *Thucydides*, cum pestis Athenis saeviret, praeter alia symptomata etiam summas manus, summosque pedes invasisse: quibus nonnulli amissis liberabantur. Quomodo hoc aliter fa-

ctum fuisset, nisi ex sanguine coagulato & corrupto, in manibus pedibusque remanente: & hoc accidit iis, quibus frigidi temperamenti sunt. Revera nutritionis particeps esse non potuit, quoniam viscera abdominis omnia obstructa erant, imò ob Hepatis duritiem & scirrhositatem, bilis deficiebat, quae toti sanguini balsamum exilit, eique humiditatem, corporique optimam *Assimilationem* procurat: effluvia etiam a corpore decedentia maxima ex parte a bilis copia dependent. Deficiente quoque bile, chylus manet crassus & viscidus, scirrhositatesque mesenterii glandulis, lienis item, Hepatis, pulmonis, aliarumque partium adfert: pulmonibus hoc modo obstructis, respiratio impedita fuit, ex humorum acrimonia, eorumque vellicatione tussis excitata, pulmonumque *atrophia*, qui & phthisis appellatur. Serositates ex sinura pulmonum parte, necnon ex vena pulmonali, vasis lymphaticis ruptae fuerunt. Vena isthae laxioris texturae est, non ex una membrana, ut veteres voluerunt; verum industria huius seculi Anatomicorum, cum ex variis tunnicis constare, detexit. Hae vena pulmonalis tunica admodum laxa, & a reliquo vate soluta exiit, in tantum ut ubivis aperta per totum instaret, & quasi distinctum esset, plurimum extendi possit; unde suspicari licuit, hoc ductu peculiari lympham a glandulis subitratis secretam reduci: verum oborta obstructione, cum immensum usque posse distendi, ut in hoc cadavere liquet. Hinc facile percipiendum est, unde cordis palpitatio originem traxerit, nempe ab obstructa vena pulmonali: nam in Hydrope hoc, adeo ejus capacitas coarctabatur, ut sanguini per eam via defiegata fuerit, tum resiliere coactus cor se in modicè movere debuit. Omnis enim palpitatio fit a causa obstruente circa cor: quotquot mihi contingere cadavera, semper vel Polypum, vel sanguinem coagulatum, vernas, ossificationes, aut simile quid praeteri. *Idem pag. 225.*

#### ATRITI & ATRITAE

Vid.

#### IMPERFORATI.

#### ATRICES

Vid.

#### CONDYLOMATA.

#### ATTONITVS MORBVS

Vid.

#### APOPLEXIA.

### AUDITUS LÆSIONES.

ubi scilicet

*De Tinnitu Aurium, Obauditione, & Surditate agitur.*

**A**Ntequam de hisce affectibus aliquid dicamus, non inutile fuerit si Auditus rationes naturales, organaque illi interuentia paucis explicemus.



Aër tremulo atque undoso motu à corpore ſonoro actus, ab auricularum externarum mechanica antracuoſa & flexuoſis eminentiis donata, congregatur, ita ut ejus ad interiora impreſſio intendatur; hinc per antrum ſeu meatum auditorium, membrana, glandulis cerumen naturaliter vomentibus ſtrata ex parte objectum in anguſtum coactus, & ab ejuſdem inæqualitatibus & curvaturis novas reflexiones ac reſractiones, quibus vim majorem rurius acquirit, ſubiens, ad tympani pelliculam nexibilem, Myringem vocant, inferiori, ſeu interiori prædicti meatus extremitati ſubtenſam, pergit, illamque varie agitac & commovet; qui motus non tantum aëri in cavit. te tympani concluſo, illucque per canalem inde ad foramina narium interna decurrentem, adſportato, communicatur, ſed etiam oſſiculis pone tympani membranam ſitis, quæ malleum, incudem, ſtapedem ac os orbiculare vocant, quibus mediantibus, membranula duplex, ſcilicet alia quæ toramen rotundum, alia quæ ovale claudit utriunque labyrintho, ultimoque ejus recessu cochleæ dicto, præſtixum, ſuccurritur, ſicque per vibrationes in labyrinthi anfractibus continuatas impulſio ad uſque nervorum auditoriorum ramulos ibidem multipliciter implantatos devenit, per eoſque ad cerebrum uſque pergit variorum ſonorum ſenſationis occaſionem animæ exhibiturus.

Tinnitus itaque aurium fiet, ſi per particulas & glandulis in membrana partem meatus auditorii obveſtiente poſitis, vel aliumve, ſcilicet verbi gratia, abſceſſu vicino, aut aggeſta fluxionis materia aſſuentes; fermentatio oria- tur, aëri contento, imprimendo cuidam fremitui, unde tympani membrana leviter quatitur, apta; vel etiam ſi particula fermentefcibiles per aquæ ductum in tympanis cavum ruant, aut arterioſa quævis demum de cauſa validius pulſet, quæ aërem cõcluſum jactent, Vel ſi idem motus in ipſo labyrintho imò nervi auditorii ſubſtantia, aut ſpiritibus per ipſum decurrentibus à ſero peregrino aut ſucco nerveo degeneri inductus, adſit. Idem faciunt vermes in aure geniti ſuis ſuccuſſionibus, violentæ capitis plagæ & horridi frigores &c. Obauditio verò fiet ſi vel deficiat auricula exterior ſono excipiendo deſtinata; vel ex parte meatus auditorii obturetur, tum per corpora extranea, tum per cerumen aggeſtum, tum per turgentes membrana propriæ glandulas; vel tympani membrana craſſior atque humidior fuerit, imò in eo tenſionis gradu non reperiatur, qui variis aëris vibrationibus excipiendis ſit accommodus; vel aër tympani craſſius & quali nebulosus exiſtat, qui propterea vibrationes ab aëre exteriori advenientes, exquiſite non ſatis tranſmittat, quin potius varie eaſdem alteret; vel ſi mobilitas in oſſiculis tympani, cordarumque muſculoſorum ipſa agentium non ea ſit quæ feriendis membranulis, foraminibus ovali & rotundo affixis, neceſſaria eſt; vel ſi nervus auditorius ex parte obſtruatur, aut in aliquibus defi- ciat cavit. te labyrinthi: Surditas ab iſdem cauſis quæ in obauditione jam enarravi- mus, oriatur, ſi modò illæ graviores fuerint; imò ſi particula illic tantum fermentefcentes, hic corroſivum quid acquiſierint quo varius or-

gani partes lacerent & deſtruant.

*Signa* variarum auditus affectionum non opus eſt ut hic expendamus ad *prognoſim* itaque con- tinuò procedamus.

*Tinnitus aurium* febribus quibuſcumque ſuper- veniens materiz ut plurimum ad cerebrum ~~adipem~~ denunciat, febre autem curata, idem hic ſine uſu medicamentorum curatur. Idem affectus ut apoplexiam, epilepſi in aliisque co- matoſos cerebri morbos præcedit, ſic in co- rum decremento faulti eſt ominis, ſiquidem re- ſolutionem materiz morbum facientis denotat. Convaleſcentibus, ac poſt immoſas vacua- tiones, ut oculi vertigine tentantur, ita aures bombilare ſolent, nam exhaustæ partes ſtatuſ facile accuſant. Inveteratus aurium tinnitus, ſcilicet qui per biennium dur. vit, vix curari poteſt; uti etiam tinnitus ex frequentj percuffione in caput & tempora, propter in- ternam lacerationem.

*Surditas* ab ortu raro imò r. riſſime eſtatur, iſdem nihilominus loco aurium inſerviunt oculi. ſic D. Wallis Mathematicus Oxoniensis duos Nobiles Anglos .b. ortu ſurdos inſtituit ſo- lolabiorum motu, ut loquentes intelligerent & accurate reſponderent: ſic etiam Digby lib. de immortalitate animæ reſert de quodam Nobili Hip. no, qui ab ortu ſurdus, ut ne bombardam auribus aduſam atque exploſam perci- peret, ſimulque linguæ uſu privabatur; quem nihilominus dexteritas atque induſtria Sacer- dotis cujuſdam eo perduxit, ut poſt multos an- nos cum ſtupore omnium diſtincta admodum proferret verba, alioque ſecum colloquentes (ſolo aspectu) perfecte intelligeret, ut per inte- grum diem in crebro hominum contubernio verſatus, illorum ne verbulum quidem non ap- prehenderet, t. q. appoſite cunctis reſponderet.

*Surditas & Obauditio* a vitio membranae tym- pani confirmato vix curatur, ſi enim a tenſione ſua naturali remittat, idque nullo periret tempore non facile ad ſtatuſ reduceretur, ſed tantum ſic affecti, ſub quovis ſtrepitu ma- jore membranam prædictam violentiori ad in- teriora impulſione aliquomodo tendente, me- diocrem ſonum percipient, quo nullo tenus af- ficientur extra hos ſtrepitus conſtituti: Exem- pla quatuor ſic affectorum reſert Bohnius Cir- culo ſuo Anatomico phyſiologico; hinc ex Willio, tertium & quartum ex Tranſaction. Philoſ. Angl. petita. Prius ſon. in. eſt quæ ſur- da quidem, quæ mediū nihilominus in concavi tympani bellici ſonus aures ejus circumſtrepe- bat, aditantiū alloquia diſtincte capiebat, ceſ- ſante vero inanimore illo ſtrepitu ſtatim ob- ſurdeſcebat, cujus propterea maritus tympa- niſtam pro ſervo domeſtico conducebat, ut il- lo mediatore colloquia interdum cum uxore haberet. Alterum ſurdaſtri maris erat, qui pro- pe campanile degens, quoties plures campanæ ſimul reſonarent, vocem quamvis facile & cla- re audiebat, tacentibus illis ſecus. Tertium in Nobili à nativitate ſurdo obſervabatur, cui pariter temporaria ejuſmodi medela ſolatio erat, ſc. quandiu tympanum prope ipſum vio- lentiſſime pulſaretur, à tergo ſubmiſſius loquen- tium voces percipiebat, nec tamen clamantes ſtrepitu illo ceſſante. Ejuſdem quoque generis ſtudioſus quidam erat, qui ſurdaſter omnia



distinãe & commodè audiebat, quando in rheda velata per plateas velocius vehebatur; & cum amicis assidentibus colloquebatur.

*Surditas* in febribus superveniens urinã existente cruda delirium grave portendit, si verò in acutis & malignis febribus cum signis coctionis conjuncta sapius boni est ominis, & ipsi interdum aut hæmorrhagiæ narium, aut dejectiones biliosæ superveniunt. Delirium surditati superveniens infautius multo quid denotat, quàm surditas superveniens delirio; præcipuè si delirium hoc cum anxietate, vigiliis ac vomitu conjungatur. Quibus surditas cum gravitate capitis & hypochondriorum tensione, ac oculorum splendoribus adest, iis hæmorrhagiæ narium indicatur.

### *Curationes, Consultationes, ac Observationes ex variis.*

#### *Curationes.*

##### *Tinnitus Aurium.*

In tinnitu præstat vapor Absinthii & Verbenæ ex lacte, ut.

℞. absinthii crudi m. j. decoque in lacte vaccino; postea per tritorium, quod commode orificium ollæ intus decocti claudit, immitatur vapor decocti adhuc ferventis in aurem, absterge aure & purgata gestatur gossypium, quod aliquandiu cum moschata fuit conjunctum (moschus nimirum capiti amicus) imprimis viris, mulieribus vero ratione uteri minus tutus est. In tinnitu, sonitu, strepitu, sibilo multum præstat panis recens coctus minor, statim ex clibano sumptus, & inferiore crusta ablata, immissoque sp. V. bono, si ad aurem applicetur (interjecto circulo ligneo crassiore ad evitandam partis exustionem) ut vapor ille intro recipi possit. N.B. Continuetur curatio, donec cedat malum. Possunt etiam adhiberi sternutatoria præmissis universalibus. *Joann. Harmann. in Pract. Chymiatric.*

##### *Obauditis.*

In obauditione item fluctuatione, immittantur auri ol. amygdalarum amararum gutt. ij. iij. quæ postea emittantur: ab oleo luniperi abstinendū. Post universalia instituantur foris, præsertim ex corroborantibus caput, qualis est decoctum absinthii, verbenæ, in lacte vel etiam cum pane calente cum & sine sp. v. (si affectus lenior) foris ut antea applicato. Tandem, si non solvatur in B. immittatur in aurem turunda ex radice raphani affabre sculpta & per dies aliquot in sp. Vini macerata, ac in B. inter sudandum, in aurem immissa. Si neque hoc modo solvatur, eadem turunda tandem maceretur in oleo feniculi stillat. & eodem modo in Balneis usurpetur. Auri instilletur sæpe oleum carui & illinatur post aures. *Idem ibidem.*

Observatâ victus ratione, sæpe corpus infuso senæ purgetur: cum sena omnium sensuum organa præcipuè mundet, infusum ita fiat.

℞. Passul. ʒj. galang. incis. ʒj. decoq. in aq. puræ q. s. pro duabus dosibus. Infund. fl. borag. viol.

ana p. j. sol. senæ elect. ʒj. sicut in infusione per noctem, & mane calefiat, ac pro duabus portionibus exprimatur.

℞. Expressionis ʒiij. Syr. ros. solut. ʒj. mann. Calabrin. ʒvj. m. f. sic pro uno & ante o haultu. Caput deinde hoc apophlegmatismo expurgetur.

℞. Rosmarin. origan. salv. ruta, ana m. f. rosar. rubr. p. s. rad. zinzib. incis. ʒb. pyrethr. ʒij. coq. in thij. ad medietatis consumptionem. Coiat. adde acet. rosac. acerrim. ʒj. detur pro gargurmate quo mane os ablu. t. tuo modo evacuato capite, decoque in aqua & vino origanum, atque in decocto c. lido, spongia madefacta & expressa auri affectu adhibetur. Instilletur deinde per calamus una vel altera gutta aq. Cardui hoc modo destillata.

℞. Folior. cardui mundator. & siccor. m. j. aspergantur spiritu vini, & in vas vitreum quod bocciam appellant, imponentur; atque aq. Cardui q. s. affundantur; suppositoque Alembico vitro destilletur in arenâ, destillatum in vitro clauso servetur, cum uti volueris, parum de eo in argenteo cochleari calenat, in eorum aures in diversam partem caput decinet exiguo tempore, deinceps rursus elabi sinat, ut rem perpetuo lana xylinâ quæ odorem vel ex molcho, vel ambra contraxerit, concepta muniat: caput non refrigeret, & ne auribus ventus noleilus sit caveat, cum auri mundanda est, non confricat. unguento, sed in teolum molle intortum instat turunda imphn. t. atque hoc modo muniet. *Joan. Crato Conf. lib. 4.*

##### *Surditas.*

Ad surditatem & tinnitum valent succus raphani, piuguedo anguilla, axungia capræ, oleum amygdalarum amararum (piuguedo terpentis, succus expressus ex capra morsa ip. vini & sub cineribus cocta. Item.

℞. Capamagnam rubram in medio cavatam, cujus cavitatem reple oleo ruthæ, addendo pulverem cyperi, bacc. Lauri, anisi, cumini ana ʒj. Castor. pulverisat. ʒb. brilliant omnia super prunas ardentes, postea exprimantur, ferventur in phiola, de qua stillentur aliquot guttae in aures mane & vespere claudendo coctum moschato. In surditate non commata præmissis universalibus mirabiliter operatur essentia tellis humani cum sp. V. extracta (diu durat) & similiratione cum turundis Raphani inter sudandum applicata: tamen à proprietate mutata in hoc casu præstat fel perdicum, si cum oleo succini albi ana mixtum in aures guttatim immittatur (dos. gutt. iij. iij. ad plurimum) hæc, erò aliquoties sunt repetenda. *Joann. Harmann. Practic. Chymiatric.*

Succus hederæ depuratus cum vino albo potenti instillatus mirifice prodest, ut & absinthium cum aqua maris decoctum, ac per arundinem pro tomento adhibitum. Ova quoque formicarum contrita & cum succo capræ in aurem infusa, quam vetustissimam etiam surditatem persanant: item & caprillum fel vel lepore fel recens cum pari mellis portione mixtum, & in capræ corio tepesfactum, & in aurem immisum auditum mirifice restitui: quæ omnia topica



quæ liquare ac fundere humiditatem poteſt, at non quæ eidem dominari & abſumere valeat; & eo conſiderabilior evadit in hac ætate quæ neque puerilis, neque ſenilis eſt; ſurditatem enim min.ri ſolet, dum ad.ucta fluxione meatus auditorius obſtruitur, aut nervus auditorius, a quinto pari deſcendens, comprimitur, vel à viſcida materia dura membrana, meatum involvens, obſtinetur atque obtunditur.

Quare quamprimum ad medica auxilia eſt contigendum, ut præſentis tinnitus auferatur, & ſurditas arceatur præterquam quod a præſenti humida capitis intemperie non pauci alii affectus ſoboleſcere poſſent. Medica autem intentiones eſſe debent, humiditatem in auribus exiſtentem exiccare ſtatufque diſcutere. Secundo capitis humidam intemperiem, ut pote partis mandantis corrigere. Tercio totum expurgare. Quarto primas vias expiare, hac lege ut quod fuit primum in intentione, debeat eſſe ultimum in executione.

Et à fonte Chirurgico aliqua ſanguinis miſſio ex Jecoraria dextra eſt depromenda, ſi non ratione capitis & auris, ſaltem ratione totius & jecoris, ut facilius caloriſica & exiccantia medicamenta adminiſtranda tolerari poſſint.

Ex pharmaceutico fonte reliqua ſunt deſumenda medica præſidia, ut jam dictis intentionibus medicis ſatiſfaciamus, & primò Leniens exhibeatur ex manna clarif. & ſyr. roſ. ſolutivo, vel ex caſſia, electuario leni. & tartaro. Primum præparans quinquæ aut ſex diebus ſummo mane aſſumendum, ſit oxymel ad ℥iij. exigua aqua flor. citri diſſolutum; mox leniens medicamentum, ut ſupra, repetatur. Inde ad ulteriorem præparationem deveniendum oxymelte ſimpl. & ſyr. de betonic. in decoct. cichor. borag. agrimon. meliſſæ, ſalviæ & betonic. in qua octo aut decem diebus inſiſtendum; deinde Purgans exhibeatur ex elect. leni. diacath. vel diaphœnic. paratum. Vel ex infuſ. agarici, rhab. ſenæ & cinnamomi, addito ſyr. vel mell. roſ. ſolutivo, quibus ſuperbibenda præberi poterit aqua hordei ad ℥iij. vel muſſa diluta, aqua hordei parata.

Hac abſolutâ primarum viarum ac venoſi generis expurgatione, expurgandum erit quoque caput, quod præſtari poterit pilulis capiti coctiſ præparatis: additis quoque aureis & matricinis, tribus ſaltem vicibus quarto quoque die aſſumendis; intermediis verò diebus præparans erit exhibendum ex decoct. cichor. betonic. ſalviæ, ſtœchad. & majoranæ, addito oxymel. compoſ. ſyr. de betonic. & de ſtœchade. Interim ejuſdem capitis expurgatio Multiplicatoriis quoque erit procuranda, ex pulvere pyrethri, Gingib. nuce myſtiſica, n. aniche & cera parandis, maximus enim extat conſenſus & communicatio oris cum auribus. Ita purgato capite, humida ejuſdem intemperies eſt corrigenda & exiccanda, quod egregie præſtabit Decoctum ſudoriſicum ita parandum.

℥. ſarſaparill. elect. lign. viſc. quercin. veri ana ℥j. lign. ror. marin. ſant. l. alb. infuſ. per horas 24. deinde bull. ad conſumpt. dimidii, facta verò colat. ſerveſtur ad uſum pro duabus vicibus, matutino tempore hora una ante in-

greſſum hypocausti aſſumenda, addendo garr. ij. aut iij. quintæ eſſentiæ ror. marini; in cujus uſu perſeſſerit ſuprà triginta, imò uſque ad quadraginta dies: deinde reliſuis adde aquam quæ bull. ad conſumpt. tertiæ, addito colatuz ſaccharo, ut fiat potio conſueta. Decimo quoque die præbenda eſt potio ex mann. clarif. & victus ratio debet eſſe attenuans, licet non adeo tenuis; etenim præter panem biſcoctum, paſſulas & nucleos ſuſcos, concedatur tertio aut quarto quoque die caro aſſa palumbi ex turre, aut pulli junioris, aut vituli, mane tantum in prandio, cum omnimoda tamen à vino abſtinentia.

Dum jam dicta omnia ſiunt, poſt totius abſolutam expurgationem localia auribus admoveſſi poſſunt; inter quæ commendant acetum cum nitro & melle Oribafius atque Trallianus; Caſſoreum, crocum & nitrum cum aceto Paulus & Aëtius; Oleum de colocynthide & ſuccum cyclamin. Dioſcorides; nos verò tale experti ſumus efficaciff. uni remedium.

℥. Ol. amygd. amar. ℥ij. ſucci raphani ℥j. fell. capr. ℥ſſ. pulp. colocynthid. ℥j. m. maceſcentur in vaſculo terreo vitreato cooperto per noctem, deinde bull. ad conſump. ſucci & ſi fortis expreſſio panno lineo raro, quo madefacta turunda bombycina, in auribus noctu de more detineatur.

Sed quoniam hæc non niſi incunte vere peragenda erunt, ideo interim aliquo leviori Topico uti poterit, ita parando.

℥. Cœpam vulgarem excavatam & oleo amygd. amarar. repletam, in vaſculo terreo repositam, & oleo addatur pulvis cymini, bulliat autem quouſque Decocta ſit iſta cœpa, deinde ſi fortis omnium expreſſio, & turunda hac expreſſione imbuta in auribus noctu detineatur.

Jam dictis omnibus cautio in victis ratione erit addenda, ita ut Nobiliſſ. Patiens caveat à diuturna mora propè ignem, ſub radiis ſolaribus, neque caput ventis & aëris inclementiæ exponat; abſtineat à vaporofis omnibus, præſertim humidis, & ſuper omnia à lacticiſ omnibus; à lactuca, ab apio, ſcœniculo, vinis generofis, ab eduliis craſſis atque difficilis concoctionis; ab exercitiis tum animi, tum corporis, ventriculo pleno exiſtente, & alacri animo vivat. Joann. Raym. Fordis Conſult. Tom. 2. Cent. j.

Vir triginta duos annos natus poſtquam diu crapula ſe fatigaſſet, incidit in tinnitum aurium, quem poſtea, jam a ſex menſibus infeſtus eſt ſinistræ auris, primò gravis auditus, & deinde ſurditas. Huc jam acceſſit tinnitus & gravitas auditus auris dextræ.

Afficitur in hoc ægro utraq. auris ſecundum nervos auditorios; quod ex ſurditate, gravitate auditus, & tinnitu aurium eſt manifeſtum. Morbus ſinistræ auris eſt obſtructio vel compreſſio nervi auditorii ab humore pituitoso facta: quæ auditus privationem ibi inducens, ſurditas dicitur. Dextræ verò auris morbus eſt intemperies humida, craſſa & natulenta nervi auditorii; quæ imminutum auditum, & tinnitus ſonum, in ea excitans, gravis auditus & tinnitus aurium nuncupatur.

Cauſa



nus conciliandus. Et quia illa non parum ab alimento concoquendo pendet; ideo alimentera concoctu facilia, nec adeo crassi succi; quibus conficiendis ventriculus agendo non repariatur, sunt deligenda; atque ventriculo robur aliquod conciliandum; licet enim de nulla ejusdem querela fiat mentio; edulia tamen adhuc cruda dimittere credendum.

Pisanae itaque usus omnino rejiciatur, ut quae non nisi febricitantibus, astanti ventriculo, & hypochondriis, continuo conveniat, crassumque succum producat, piceis praesertim adjuncta; & vi deterforia praedita, reliquos quoque cibos a ventriculo citius, quam par est, expellat, hujus autem loco, assumat edulium aliquod ex ovis paratum, vel ex Apula pasta, vel ex oryza dilutiori, vel ex endivia & borragine in jure coctis, ovis additis. Nec caro pullae amplius contusa, sed comansa assumatur, ut ita ventriculus magis uniatur, nec adeo ut a liquidis laxetur. Ita convenient caro tenerrima Volucrum sylvestrium, non tamen aquatilium. Pisces quoque saxatiles, & ova recentia. Vinum sit potius generosum quam tenue, nigrum, non tamen omnino meracum. Quod si inter cenam & prandium primis horis matutinis, paucio aliquo alimento opus fuerit, hoc sit jus pullae cum ovi vitello conquassatum; quod nonnunquam malva aut mercuriali alterari poterit, ad alvum emolliendam.

Aliqua quoque ventriculum roborantia in usu habenda, ut grana mastiches, hora una ante cibum integra deglutita; aut sal absynthii, aut ejusdem conserva; prout extrinsecus pannus coccineus ventriculo adinducendus, & gestandus, ut calor ejusdem proprius foveatur potius quam alienus accedat. Somnus vero accersendus auxiliis aliis a nobis propositis, & potissimum usu panis martii, qui parari poterit ex  $\frac{3}{4}$  ij. seni. p. pav. albi, pro quolibet libra amygd. & sacchari, ita enim unica sufficiet uncia, a coena assumenda, suavis etenim, nec minus noxium praescribi potest familiare somniferum. Meditationes sub ingressum lecti ableganda, his enim praesentibus somnum conciliare impossibile foret. Quae in gratiam perfectae salutis, a nobis ex intimo pectore Viro Illustriss. optata, raptim, scripta fuere, a summa prudentia Viri Excellentissimi Adstantis melius disponenda.

#### *Pro eodem Consiliatio quinta.*

Vicit ut Leo, Fortis, quia Gallum non hostem, sed amicum, in eo commilitonem habuit, qui arena live campo potitus, Leoni gloriam comparavit, licet palma cum campo, Gallo debeatur; Utinam vero in mearum consultationum executione pro commilitonibus, Medicos adersantes, sive remedium subversores frequentes non haberem, qui aut ignari, ne unguem quidem a praescriptis discedunt; aut arrogantes, praescripta mutare contendunt. Quare tibi potissimum, in omnibus quidem, sed praesertim in re medica pererudito, atque prudenti Comes Illustriss. pristinam sanitatem debebit.

Duo autem nobis supersunt in praesens consideranda; Urinae a naturali statu alienae, & vi-

sius ratio in ceteris observanda. Urinae quidem, primo coloratiores, aliquando vero cum tela supernatante densa adeo ut quandoque pelliculam reterat. Crassior vero est ejusdem hypostasis, quae fere statim a nuctione in media matula filamenta exhibet, & fundum petens, limosa, subrufa, conspicitur rubrum pollinem potius quam arenulam referens, quarum urinae conditionum unica causa est, nimirum imminuta concoctio, cum vitioso atque exuperanti calore; quae quoniam in omnibus partibus perficitur; ideo cruditates variae conditionis sese nobis exhibent, prout vel a jecore, vel a venoso genere, vel a partibus ipsis excrementitia cruditas superest ac seccernitur, & quidem supernatans a partibus, filamenta a ventriculo & jecore; & a venoso genere lunosum atque subrufum transmittitur quod & arenosum quoque in venis ipsis evadere posset, si major in iisdem vigeret caliditas, tunc vero parietibus matulae adhereret, atque adeo nunquam calculo cogendo idoneum; necesse quippe est arenosa in urinis subsidere, non autem limosa, nec arenosa parietibus adherere, ut calculum efformare sint apta; quae enim in renibus generantur arenulae subident omnes. Lithiasin autem praecedere solet materia tartarea, & meiendi aliqua difficultas; etenim lapis in vesica cogi non potest, nisi praecedente ejusdem insigni calore, a quo constringitur ejusdem musculus; unde urina coercetur; Hippoc. *Vesica excalescit urinam non dimittit, sed retinet, & quod crassissimum & turbidissimum est, circumvolvitur & concrevit.* Ex quibus colligere est, coctiones omnes imperfectas & innumeras esse; nam si perfectae forent, tanta alimentorum copia velocissime corpus, non modo nutrire, sed impinguare potius deberet.

Quare nutriendi modum, quoad quae utritatem & ordinem saltem, si non quoad quantitatem, mutandum esse censemus. Et quoniam cum Avic. nil deterius quam comestio supra comestionem, ideo tempus diuturnius interponendum; atque adeo ter die nutriendum, ita ut summo mane lac sugat muliebre, adsumnam dosin, cum saccharo, & statim ab eo sumat cochlear aquae cinnamom. Quinque vero aut sex horis ab assumpto lacte, praudeat, sique prandium quandoque prisana hordeacea, cum ovi recentis vitello, quandoque panis, jure optimo linctus, quandoque edulium ex subtilissima pasta Apula paratum; mox pullum gallinaceum junorem comedat, bibatque vinum album, odorum, iterum aut tertio in prandio. Hora vero prima noctis, ad coenam se conferat, ex panatella cum emulsiōne amygd. dulc. & pineorum, cum saccharo, & quarta parte, vel dimidia pulli junoris jam dicti, duabusque vicibus bibat. Interim mane surgat, & duabus saltem ante prandium horis, ambulans in cubiculo corpus exerceat; mox a cibo, hora transacta, decumbat, & hora 11. & 12. rursus surgat, & leniter ambulet, imò & in aprium nonnunquam inprodeat; calor enim naturalis, sicut a motibus violentis resolvitur, a nullo torpescit, ita a moderato vivificatur, sique coctiones perfectiores & excrementorum excretiones, vel copiosiores vel promptiores



evadunt. Siti verò non semper indulgendum, sed oris colluvionibus deinde vino. lbo tenui, quousque jecoris & renum calor accommodatis contemperari possit. Atque hæc potiora, reliqua Excell. Viro adjuvanda & statuenda committentes. *Joann. Kaymuid. Foris Co Jul. 10m. 1. Cent. 3.*

### Observationes.

Quidam Atrophia laborans mala citra summo pere appetens unum integrum & magnum 4. librarum pondere comedit, quod, ut scimus, comanducatum a quolibet sano difficillime concoctionis est; tamen hic æger citro devorato meliuscule habere incepit & convaleuit. Induigeant quidam Medici ægrorum voluptatibus cum modo & mensura, multoties enim natura a nullo edocuit id quod est sibi utile maxime appetit. *Dominicus Panarolus, Observ. 36. Persecosse 2.*

Vir quidam obesus & pinguis, ex febrili calore, & diuturna hepatis intemperie sicca, comitibus cutaneis meatibus, non nutritus in atrophiam incidit, cui, non proficientibus aliis remediis, 15. diebus continuus ad normam Galeni ad punctionem applicuit: cujus usu ita impinguatum est corpus, ut paucis auxiliis adhibitis ad pristinum statum fuerit redactum. Picatores dicuntur illi, qui ferulis pice illitis partem debilem concutiebant, & sic motu & calore, sanguinem & nutrimentum ad partem attrahebant, & hac ratione membrum gracillimum impinguabant. *Zacutus Lusitanus. Obs. 136. lib. 1. Prax. Admirand.*

Anno 1591. mense Januario puer 13. annos natus, filius *Petri Von Werd*, civis Colonien-sis, ex variolis tumores aliquot ex lenta & viscida materia circa humeros, cubitum dextrum & genu contraxerat. Horum nonnullos, qui humeros occupabant; incidi, & proceßus superiores scapulae (quos rostra porcuina vocant) extraxi: quo facto humeri nullo motu deperdito restituti fuerunt. Cubiti vero tumorem, quum ad id ine parentum cogerent preces, discutientibus medicamentis resolvi: Sed non multo post, brachium usque ad humerum in atrophiam incidit, & ita delicatum est, ut periret motus omnis. Verum appetente vere, puerum denuo purgavi levi quodam medicamento phlegmagogo, qualia sunt Diacarthamum & Diaphœnicum cum rhubarbaro. Deinde singulis diebus bis terve brachium decocto capiti, pecuni & intestinorum vervecis vel vituli, cum limbricis incocis, insuccare jussi, quoad pars inciperet rubescere. Tum præsto fuit famulus, qui parvo quodam instrumento excavato corneo, præcipua brachii vasa fugeret. Hinc totum brachium, humerum, collum, & pectus cum succo lumbricorum, & oleo amygdalarum dulcem simul mistis, inunxi. His Deo benedicente, brachium pristino restitutum fuit vigori. *Guilielm. Fabric. Hildan. Obser. Chirurgic. Cent. 1.*

Ante annos tres in Alsaciam ad puellam decem circiter annorum ætatis, atrophiam cruris per annos aliquot laborantem, vocatus fui. Circa puellam hanc diversi barbitonfores occupati fuerant, omnemque lapidem moverant,

ut extenuationem illam partium musculosarum, ac claudicationem corrigerent. Ego cum primum denudatum crus inspexissem, dislocationem coxæ reperi, indeque Atrophiam propter compressionem vasorum, venarum imprimis, & arteriarum provenire, parentibus indicavi; & quid circa affectum huncce tentandum, aut præterea de eventu expectandum, sin ul signifi-

Ante dies 15. ad puellam duodecim annorum claudicantem, & atrophiam cruris laborantem, vocatus fui. Hanc barbitonfores nostri per menses tres in Xenodochio curandum habuerunt: circa genu quidem, ubi sedem mali esse arbitrabantur, multa adhibuerunt medicamenta, sed frustra. Nec immerito: quandoquidem dislocatio in coxa, quam barbitonfores nunquam observarunt, & claudicationis, & atrophie sola causa erat. Hæc fecit ignorantia artis Anatomica, sin ul & sordida negligentia. *Idem.*

Anno 1597. matronam 63. annorum curandam habui, illam, cum propter herniam intestinalem, in gangrenam degeneratam, præter modum extenuata & emaciata fuisset, rem illa febre, benecio lactis muliebris post Deum in integrum restitui, & ad 15. usque annum post curationem supervixit. Le gravissimo hocce affectu videat Lector *Observ. 33. Cent. 1.* singulis autem matutinis, absoluto somno, maximum hantum lactis ex juvencula, & optimo corporis habitu prædita, rustica, ad lectum ægræ emulcunt, ægræ propinavi. Deinde circa decimam prædebant. Aliud habeo exemplum memorabile de præstantia lactis muliebris. Dn. Jacobi de Tribus Paterniacensis noliolus, 4. annorum ætatis, post dysenteriam gravissimam Lynceria correptus fuit, quam secuta est periculosa atrophiam, ita ut ossa vix cute obtegerentur. Juicula & quidquid assunebat, indigette iterum per seecitum excernebat. Suasi ut mater infantem semestrem, quem lactabat nutricei alicui committeret, periculumque faceret, an atrophiam hancce ac summam extenuationem corporis, cum lactatione virum, lacte suo recinere posset. Mater consilium, infans vero populus celeriter atripuit, & cum aviditate exiuxit, omnemque cibum in posterum respuit. Hæc cum ego videtem, & de salute ægri sperem aliquam conciperem, singulis diebus regionem ventriculi, totumque abdomen sequenti unguento bis calide inungere jussi.

2. Ol. Mallichis & meith. ana 3j. ol. nuc. moschat. Gummi. Tacamahac. pinguisimi ana 3j. Terantur omnia lentissimo igne, percolentur & reserventur in vase vitreo. Hisce præstidius convaleuit, & per multos annos supervixit. *Idem.*

Tria fuere veteribus, juxta Oribasium, coll. lib. 7. cap. 16. cucurbitularum genera, vitrea, znea, cornea. Quorum priora trahunt per ignem; posterius citra ullum, solo oris sucum. Quæ cornea cucurbitula, licet nobis senne in deluetudinem abierit, plurimi tamen etiamnum sit ludis, sub torrida Zona habitantibus.

Qui curaturi dolorem colicum, Juvenis mihi notissimæ, insudare primum ore clysterem mox applicuere abdomini cucurbitulas corneas.



neas. Quorum spiritu, per exile foramen, ore (ut Celsi verbis id efferam) educto: occlusere lestimanter cavum id digito: Cum ut eum minuter inhaeresceret cucurbitula: tum ad eliciendum natum intestinis molestum. Quem certe tenebimus, huic juveni, hac ratione, subducere barbari. Quapropter domum reversus, donavit me tali cucurbitula. Cujus periculum equidem aliquando facturus, selegi mihi (uti etiam fecit Fabricius Hildanus, cent. 1. obser. 80.) brachium ab atrophia consumptum. Cui imposui hæc cucurbitulas loco picis, ac resina: quibus legimus, in simili necessitate, usam fuisse, antiquitatem etiam nobilissimam. Attrahunt autem hæ cucurbitulæ potenter; & abducta aptissime cute, elevant venas, & arterias, præ macie in se collapsæ. Quibus iterum adaperitis, committant denuo quocunque, sanguis, ac spiritus. Quorum indeiens affluxus, nisi cotidie iuberet: in locum eorum, quæ continenter ex corpore, decedunt; non solum non aleretur, sed emaceraretur necessario, membrum tali vitio infectum. Cui maciei nihil profectio salutarius est, hæc corneâ cucurbitulâ. Præsertim si affigatur dextræ, juxta cursum venarum, arteriarumque illuc nutrimentum, ac vitam deferentium. Nautæ Juniori, effluxere, ex amplo brachii abscessu, tam frequens pus, & adeo copiosus liquor: ut subducto succo alimentali, & dissipato, plus æquo, calore vitali, conciderent venæ inanes: cessaret accretio: & tandem emacresceret brachium universum. Cui jam exarefacto, ubi imposuimus aliquoties cucurbitulam corneam: vidimus ipsius suctu, tantum caloris, ac sanguinis, ad cutis extrema attractum: ut exsuccum illud brachium, non modo non aleretur iterum; sed adipisceretur denuo pristinum vigorem: inò tantum virium, ac roboris: ut potuerit deinceps quocunque iterum navigare, & in mari, nullo non fungi officio. *Nicol. Tulpius Observ. Medic. lib. 3. Obs. 49.*

Medicus meticulosus, veritus, ob imbecillitatem, venam ferire Catharina Geriz, acerbissime ex latere dolenti, auxit tantopere, febrem; utique inflammationem, in membrana costas succingente, conceptam; ut ex retorridi sanguinis æstu, ipsa non secus emarcuerit; ac si laborasset, immedicabili tabe. Quam etiam non obscure videbantur designare, ipse ita frequentia, ac sordida: ut copia, capacem pelvim; & lactore, spatiosum facile replevisset conclave. Re autem ipsius, jam plane desperata, & morbo, ultra quartum mensem, in ipsam fervente; apparuit ipsi, quod si ex machina Deus, excitando, nescio quod, crudorum ostreorum desiderium. Quod eo quoque libentius concessimus, quo minus huicenus profuissent, portiones concinnatæ, ex humidis ac frigidis herbis. Qua spe etiam minimè excidimus. Vix enim comederat cruda hæc ostrea, quin protinus imminuerentur non tantum calor, ac febris: sed etiam usque eò perniciosissimus hic morbus: ut brevi integrè convaluerit. Extincto, ab algido, ac viscido ostreorum succo, pertinacissimo illo incendio: quo, procul dubio, conflagrasset miserrime universum ipsius corpus. Non temere itaque Celsus. Quos ratio non restituit, adjuvat temeritas. Neque certe inconsideratè

agere videtur, qui circumspicere cedit si turæ inclinationibus: & obliquat prudenter sinus, ubi non licet, rectum tenere cursum. Satiùs quippe est, anceps remedium experiri, quam nullum. Dubia namque spes, certa desperatione potior. *Idem. Obs. Medic. lib. 2. Obs. 8.*

Tabes dorsalis, seu *Phrenitis dorsalis*, duplex est Hippocr. Altera ab immodica Venere, lib. 11. de morbis. Altera vero, à destillatione in spinam dorsi, lib. de glandulis. Quam utramque speciem lubuit Balduino Ronszo lumbaginem vocare. Quanquam hæc vox designet festo, solam lumborum imbecillitatem. i. raterquam tamen in tabe dorsali videre est, cum dolorem continuum; tum marcorem inuperabilem. Quorum naturam minus significanter cum exprimat lumborum imbecillitas: satius erit, stare ab antiquitatis sententia, quam temere ab ea desciscere. Dolorem autem hic parit, acida pituita; dilacerans magnopere vel membranam, quæ spinalem medullam proximè cingit: vel ipsos nervos inde oriundos. Sed si obstruitur venæ, aut arteriæ: sive à lumbis, sive à cervice huc delatæ: vel ob constringens frigus, à nimia Venere illis impressum: sive ob prolapsum crassioris pituitæ (cujus maximam copiam equidem aliquando illic conspexi) eripitur ægro, non modo consensus inter superiores, inferioresque corporis partes: verum redditur præterea sterilis, propter interceptam, decedendi seminis, materiam. Neque in recessit solum ipsa spinæ medulla, quæ obstruitur: sed contabescit utique cum illa corpus universum, communicato paulatim malo, hinc per nervos cerebro; illinc per arterias cordi; uti per venas Jecinori. Quorum nobilissimorum viscerum functione, evidenter læsa: torpet necessario corpus: marcescit animus; & consumitur infirmiter homo. In qua tergemina, nervorum, venarum, ac arteriarum via, invenire quoque est viam; inducentem, vel febrem convulsioni; vel convulsionem febri. Siquidem febris supervenit convulsioni; discutit (ut cum Galeno loquar) æstuans cordis calor, illud frigus: quod lenta, ac viscida pituita impreserat, nervis spinæ medullæ. Quod si vero convulsio sequatur febrem; vel exaruit spinæ medulla, præ febris incendio; vel acris, fervidæ bilis, vapor, ab accenso corde, per arterias, illuc effusus, pugnaret tam rigide sensiles ipsius membranas: ut inde sequatur exitialis nervorum contractio. Potissimum si vires exhauserit præcedens febris. De qua propterea satis circumspicere Hippoc. lib. 2. aph. 26. *ὁ πυρετός ἐν τῇ σπονδύλῃ κατὰ τὴν ἰσχυρίαν ἐστὶν πύρετος.* Febrem convulsioni supervenire, satius est, quam convulsionem febri. Samuelli Vespertio. elevabat impurus lien, tot vapores versus cerebrum: ut inde destillaverit iterum plurimum acrioris pituitæ, primum quidem in occipitium, ac cervicem: sed mox inde, in spinæ medullam: & potissimum in lumbos, ilia, ac coxæ articulum. Quorum partium humanis, dolor excruciat ipsum tormento tam indefatigabili: ut amisso omni colore, ac decore, incidit in lentam febriculam: consumentem ipsum, morte adeo tarda, ac misera: ut ante ejus accessum, non semel exoptaverit, languentem remittere animam, & reluctantem exspuere spiritum: Quod ipsum etiam, in hoc morbo obser-



vavit, Auctor libri de glandulis: Sed ferendum fuit, quod non licuit mutare. Præsertim Labe hac, in penitus infixa, quam ut cesserit vel tempori, vel remediis etiam convenientissimis. Argumento certè evidenti, pervicaci, sacra hujus vitæ, labi, auxilia medica esse, non solum infirma, sed ausum dicere, nulla. Idem *Obs. Medic. lib. 3. Obs. 24.*

### Anatomica Inspectiões.

Puella annorum circiter sex secta fuit: Cum toto vitæ curriculo morbis fuisset obnoxia, præsertim vero tumoribus œdematosiis circa articulos manuum, quibus apertis ossa corrupta in eam, nulla tamen fere materia aderat: Dein palpitatione cordis & asthma divexata, tandem *Atrophia* periit. Abdomine aperto, Omentum pinguedo absumpta erat, Intestinum cæcum, non lumbrici inerat, sed crassum, ex meris glandulis rubentibus compositum, duorum scilicet digitorum latum, in quo nihil nisi mucosum aliquid: Mesenterii glandula scirrhusa, Hepar a naturali magnitudine recedebat, ut quod plus solito magnam esset, Ren sinistè dextro multo major & durior: ventriculus cælo vacuus, sed flatibus distentus. In thorace verò Pulmones à convenienti colore recedebant: Pericardium distentum aqua refertum, Cordis auricula dextra prætumida, cui inerat materia quædam alba, membranosa, crassa, oblonga, in ipso autem dextro cordis ventriculo, materia pinguedini similis. *Ex Observ. Casp. Bauh.*

In cadavere exenterato Nobil. C. A. B. hæc reperta, 1. Omentum glandulosum & adenibus undique refertum, adeo ut nulla ex parte membranosa appareret, crassum valde & tumidum: in parte dextra, circa regionem hepatis, putrefactum & lividum. 2. Hepatis parenchyma scyrrhosum, tumidum, varis que maculis nigricantibus & griseis distinctum. 3. Vesicula fellis humore nigerrimo & bile atra materiaque quadam tartarea, sabulosa & friabili turgescerebat: 4. Ren dexter totus erat corruptus & putridus; sinistè glandulis oui columbini magnitudinem adæquantibus undique oblitus & quasi obvolutus: Pulmones toti flaccidi & variegati. 5. Partes circumjacentes proximè Hepatis gibbæ partem, ut & renem dextrum putridum, plane erant corruptæ. 6. Cor, Lien, Uterus, Intestina & reliquæ partes naturales. *Timus lib. 6. Epist. 8.*

Quatuor annorum puer Marasmo extinctus obiit: Animi causa à me secatur cadaver, cujus hepar dum inspicerem, erat supra modum magnum: Habebat Abscessum propè venam cavam, circa partem gibbosam pure circumquaque obductam. Lienem boni coloris & integrum. Omentum nullum, aut vix conspicuum. Pulmones, mirum dictu, nullos; quorum loco erat vesicula membranosa statu repleta, venulis exiguis munita, originem sumens ab ipsa arteria aspera, quæ refrigerium asserere videbatur cordi. *Fontanus lib. 1. Respons. & curas Medicin.*

Jacobus Knoll adolescens 17. annorum laboravit à puero calculo vesicæ, à cujus cruciatibus, accedente renum suppuratio-

ne, macie confectus, viribusque pene exhaustus e vita excessit. Cum juxta alia in eum ventrem scrutando, ac duplicis vesicæ speciem contemplando, venam cavam dilexissimè, corpora alba, pituitosa seu fibrosa, cavitatem earum fere implentia reperi, qualia in diu decubitus & a morbis chronicis sublati sæpius vidi: statim cogitavi talia quoque sinus cerebri occupatura, cum quod uni majorum vasorum obtingat; alterum ab eo raro immune existat: Aperui itaque sinum tertium, in alterutro laterum occurrit corpus sive pituitosum sive fibrosum, certe non adiposum (prout quidam hæc corpora nominare solent) candidum, lentum, tenax, crassitie fere digiti majoris, circa torcular maxime, & tantum non tantam cavitatem implens: In cavitate hac tenacius erat quam in vena cava descendente, ubi ad levem attactum rumpebatur, secus ac alias de his pituitosis corporibus observavi &c. Totum hoc corpus pituitosum ex sinu tertio extraxi, cui haud agere omnes ejus appendices succedebant, numero magnitudini & fere longitudini vasorum respondentibus, adeo ut plurimæ spithamæ longitudinem superaverint: præterea in ramulosos & filamenta, ad numerum propè vasorum divisibiles essent: Similia corpuscula pituitosa, in utraque carotide interna, prope infundibulum, notabilis magnitudinis aliquotque sursum scandentia inveni, non tamen tantæ longitudinis atque erant in venis tertii sinus, quod seu flaccidiora minusque tenacia forte atrumperentur: Adolescens autem hic nihil unquam apoplectici passus est, at sæpius convellebatur: *Jacobus Wepserus Exercit. de Apoplexia.*

Uxor Jac. Bagolle paulatim morbo admodum intricato correpta fuit; Nunc enim palpitatione cordis; nunc dolore & torminibus ventris; interim tamen appetitus non multum prostratus fuit, ita ut pro more alimenta sumeret, quibus tamen parum nutriebatur: Tussicellâ quinetiam & dyspnœa laborabat; Cum circiter annos 4. vitam hanc calamitosam vixisset, ac sceleti fere instar extenuata esset, paulatim stupore & frigore in sinistra manu præcipue circa extremitates digitorum, correpta est; symptomata tamen hæc ab initio tam exigua erant, vix ut percipi possent, nec aderat tamen multo minus inflammatio, imò nec dolor ullus: Interea tamen extremitates digitorum, & tota manus paulatim, & (quod mirandum) absque dolore sphacelata & penitus emortua est. Ego, tribus septimanis post inceptam sphacelationem digitorum vocatus, brachium ad cubitum usque, simul & digitos, carbonum instar nigros, frigidissimos, & ita extenuatos, ut ossa vix tenuissima cute obtegerentur offendi; nulla tamen, ut dixi, aderat inflammatio neque dolor, imò nequidem in loco illo in quo calor natus nondum penitus extinctus fuerat. Porro cum etiam per exigua recuperandæ sanitatis spes superesset, rogatus tamen ut brachium amputarem, quia malum adeo lento tardoque gressu incedebat vix ut percipi posset, visum ante operationem corpus præparare: Postea brachium supra cubitum, & quidem in parte sana, feliciter & fere sine dolore à sanguinis profluvio abscidi, vulnus brevi digestum quidem fuit, adeo ut laudabile pus appareret, nihilominus circa 11.



qui visceris illius parenchyma superesse diu non potuerit. *D. M. Janssonius Mercurii Gallo Belgici Tom. 2.*

Jurisperitus Parisiensis sicca tussi vexatus, Macie universali affectus & diarrhoea diuturna, post repetitas purgationes & venæ-sectiones me accersiri jubet. Eum attentè considero, & post colloquium aliquotque protractum, decumbere jubeo quo latera dextrum præsertim, commode pertractare liceret, suspicatus aliquid in jecore vitii. Adnota manu, indolentem tumorem percipio nucis juglandis magnitudine, (sed forti digitorum impressione & profunda, proque partis sensus tolerantia) infra costas nothas in jecoris regione. Prognostico enusso, asserui tumorem illum ad capitis magnitudinem perventurum, imò majorem, quod eo loco situs esset, quo intus nequicquam remitteretur, ad extra vero augmento prohiberetur à caligum cingulo & thorace. Ulteriore sanguinis missionem prohibeo, eo quod judicare vitam tandiu productam iri quamdiu sanguinis penuria non adesset. Opinionem & prognosticum meum impugnarunt venisectæ, qui imaginariū esse tumorem objiciebant, iteratisque venæ-sectionibus ægrum vexabant. Post dies quindecim iterum advocor, atque ægrum in deteriore statum deductum video, tumorem auctum & digitis palpanibus manifestum, globuli sphaeriterii magnitudinem æquantem. Mortem prædico, Chirurgi verò revocati, agnito tumore, sanguinis missionem perpetam iterum instituunt, sed paulo post mors succedit.

Apertum cadaver fuit à Riolano Chirurgo, qui solus, consultatione habita cum tribus Medicis ac duobus Chirurgis ampullatis, contendebat tumorem neque mesenterium neque pancreas obsidere, sed musculorum cupiam viscera colligantium adnatum esse. si enim aiebat, situm in pancreate aut mesenterio obtineret, ad motum corporis huc illuc nutaret, illius inclinationem sequutus, alvi excrementa cohiberet, quæ liquida & inconcocta dejiciebat æger: Obviam ergo illi secanti se obtulit tumor pendulus & annexus lateris dextri musculis lumbaribus, magnitudine capitis vitulini, cui plurimæ adnatæ erant cystides, aliæ materia pulsi simili refertæ, aliæ sebaceæ, aliæ lardum, aliæ niel referente, aliæ erant duræ, variæ consistentiæ & coloris ab invicem secretæ. Totum corpus exangue erat, sed plurima aqua reperta, ad mensuras duas Parisienses. *David Lagneau lib. de sanguinis missione p. m. 385.*

Puer duorum annorum erat macie ita confectus, ut vix cutis hæreret ossibus: Ad latus sinistrum, in musculo mastoideo exulceratio erat, quæ usq; ad ipsam jugularem venâ penetraverat, eamque corrodendo sic extenuaverat, ut puris subtilior materia percolasse per eam videretur: non exiguam namque ejus copiam sanguini permixtam in dextro cordis ventriculo, corde aliàs sano & integro, inveni; quam, ut dixi, transcolatione eo pervenisse suspicatus sum: sed unde puris ejusdem crassiusculi, bene cocti, copia, item magni è regione in dextro latere, ad eundem muscolum, intus & foris sanum, penetraverit, ego divinando assequi non potui: Lien præterea induratus erat & magous, pendeat

enim uncias septem & tres uncie quartas: Hepar contra, consumpto fere parenchymate, non nisi quinque uncias & quadrantem ponderabat: biliosa id plenum erat materia, quæ propter obstructionem ductus communis in illum redundaverat: *bilis interim drachmas undecim* [magnum pro ea ætate pondus] exequabat: *Pancreas magnum erat & scirrhosum*, quod in chronicis morbis sæpe contingere observavi: Succus etiam tam acidus, ut in duodeno bili admixtus, tamen adhuc insigniter eum saporem retineret; hac aciditate sua ita ventriculum & intestina perederat, ut dum inflare eum vellem, ad minimam distentionem ru perentur: Non immerito igitur *Clar. Franc. de le Boë Sylvius* in Praxi sua plurimorum morborum causas refert ad hanc succi illius aciditatem, *Theod. Kerckringius observ. Anat. 65.*

Venit mihi in memoriam apertio Virginis in Nosophorio Leydensi, quæ cum macie contabescens occubuisse, præscripta ad terram *Do. Sylvii*, abdomen ostendit factum pinguedine, visceribus interea proximis nutrimenti inopia fatiscentibus & contractis. *Olavi Borrichii observ. 92. Aëtii. Bartholini an. 1671. § 72.*

Fateor plerosque Medicorum ignorasse ossa, quantumvis solida, quæ si phlegmone & apostemate quoque corripì possent, Quicquid enim nutritur, crescit, augentatur aut inluxus recipit, id quoque putrescere & apostemate aliquando turgere fatemur: Proinde *Avicenna & Galenus*, suo periculo edocti, apostemate quoque distendi asserunt: Et Hippocr. empyemate os sacrum computrescere quoque novit, ejus putredine & incredibili doloris tyrannide duos, Nob. *Wurmhauser* in Neoburgo, & *Joh. Castellum*, afflictum & diu in ceratosis tandem contabescere & mori hisce oculis vidi. *Langius Epist. 42. Tom 1.*

*Jo. n. le Fuzelier* Tabida matre natus, eo modo, eoque morbo & eodem tempore interit quo ejus mater. In pulmonibus nihil memorabile reperitur quod mortem attulerit. Mirum quod ante mortem ei contigit; Decem antequam è vivis excederet diebus tumidum corpus fuit, Tumor fugax erat, repetebat ex intervallis. Unde hoc? Leucæ videtur autur esse: Tale quid in morbis funetis contingere solere agnovit *Hippocrates*. 1. prorrh. Leucæ, ait, oboriuntur (supple in morituris) in morbis funetissimis, cujusmodi est Phthisis. *Ballonius Parad. 39.*

Anno 1562. In mulieris cujusdam consistentis ætatis, quæ ad tantam maciem redacta erat, ut vix cute & ossibus hæreret, corpore quatuor lumbricos teretes spithamæ unius longitudine, in ipsum truncum venæ portæ se insinuassey ac toti corpori alimenti aditum obstruxisse observavi: *Ex observationibus Adriani Spigelii.*

Quatuordecim annorum Virguncula à quatuor annis tabe incepit laborare, postea tussi & febricula correpta est: functionibus quotidianis obeundis latis vigilax. Cibi & potus valde appetens, per seique mensem ante obitum decumbens, moritur.

Mesenterium scirrhis ac steatomatibus duris undique plenum, præsertim circa vasa sanguinea: quædam ovi asnerii magnitudinem superabant, aliæ nucem moschatam excedebant.



Cibi ut comesti erant impermixti excreti fuerunt, ramosus calculus pondere sesquicilicii, in dextro pulmone abieciis foetidus, membrana inclusus fuit: incilo tumore tanta puris copia effluxit ut dodrantem bis aquaret. Porro pulmones scirrhis ac steatomatibus repleti. Cor molle & flaccidum: cetera satis sana. *Steph. blancard. Anatom. pract. rational. pag. 153.*

Morbo admodum intricato quaedam mulier correpta fuit, nunc enim palpitazione cordis, nunc dolore & torminibus ventris vexabatur. interm appetitus non multum prostratus fuit, ita ut pro more alimenta iuaueret, quibus tamen parum nutriebatur. Iussiculâ quinetiam, palpitazione cordis, & difficultate respirandi laborabat. Cum circiter annos quatuor vitam sane calamitosam vixisset, ac secleri sere instar extenuata esset, paulatim stupore & frigore in sinistra manu, praecipue circa extremitates digitorum, correpta est: Symptomata tamen hæc ab initio tam exigua erant, vix ut percipi possent: nec aderat tumor, multo minus inflammatio, imò nec dolor ullus. Interea tamen extremitates digitorum & tota manus paulatim & absque dolore sphacelata & penitus emortua est. Iosteâ brachium ad cubitum usque simul & digiti carbonum instar nigri erant, frigidissimi, & ita extenuati, ut ossa vix tenuissima cute obtegerentur, nulla tamen deerat inflammatio, neque dolor; brachium postea feliciter supra cubitum amputatum est: nihilominus tamen circa undecimam horam post brachii abscissionem, gangraena denuo truncum invasit, ita ut paucis post diebus e vita discederet.

Cadavere dissecto, abdomen serosi humoris plenum & extensum erat. Mesenterium steatomatis multis scatebat. Sub vena portæ, & quidem in ipso pancreate scirrhus admodum magnus conspiciebatur. Hepar durum pallidum, ac si elixatum fuisset, apparebat. Pulmo dextra parte materi purulenta ac foetida, sinistra vero humore seroso imbutus erat. Per totam pulmonis substantiam scirrhi plurimi, colore lividi, in quibus materia nigra, atramenti instar, contenta fuerat; conspiciebantur. Lapides plurimi hinc inde per pulmonem diversi coloris, parvi tamen omnes reperiebantur. Cor sanguine planè exhaustum, extenuatum, ideoque valde diminutum & parvum erat. Vena pulmonalis in monstruosam amplitudinem extensa erat: nam humore aquoso fuit impleta.

Ægram hanc sanguinem habuisse admodum crassum, ex gangrana satis liquet: non enim ex inflammatione ortum habuit, sed ex sanguine in manu coagulato. Est mihi adhuc cognata, quæ ante aliquot annos sanguinem suum seroso lacte aliisque ceteris ita corruperat, ut postea in febrim inciderit, ex cuius frigore, quo incipiebat, non tantum ungues nigredine commaculabantur, sed ille color per integrum annum sub unguibus latebat: unde igitur ille color? nisi à sanguine, ibidem loci coagulato. Scribit *Thucydides*, cum pestis Athenis laviret, præter alia symptomata etiam summas manus, summosque pedes invasisse: quibus nonnulli amissis liberabantur. Quomodo hoc aliter fa-

ctum fuisset, nisi ex sanguine coagulato & corrupto, in manibus pedibusque remanente: & hoc accidit iis, quibus frigidi temperamenti sunt. Revera nutritionis particeps esse non potuit, quoniam viscera abdominis omnia obstructa erant, imò ob Hepatis duritiem & scirrhotatem, bilis deterebat, quæ toti sanguini balsamum exilit, eique fluiditatem, corporique optimam *Alph. 1770* procurat: effluvia etiam a corpore decedentia maxima ex parte a bilis copia dependent. Deiciente quoque bile, chylus manet crassus & viscidus, scirrhotateque mesenterii glandulis, lienis item, Hepatis, pulmonis, aliarumque partium adfert: pulmonibus hoc modo obstructis, respiratio impedita fuit, ex humorum acrimonia, eorumque vellicatione tussis excitata, pulmonumque *virus*, qui & phthisis appellatur, serositates ex sinistra pulmonum parte, necnon ex vena pulmonali, vasis lymphaticis ruptæ fuerunt. Vena isthæc laxioris texturæ est, non ex una membrana, ut veteres voluerunt; verum induritia huius seculi Anatomicorum, eam ex variis tunicis constare, detexit. Hæc vena pulmonalis tunica admodum laxa, & à reliquo vase soluta existit, in tantum ut ubivis aperta per totum iussit, & quasi distinctum esset, plurimum extendi possit; unde suspicari licet, hoc ducit peculiari lympham à glandulis subtratis secretam reduci: verum oborta obstructione, eam immensum usque posse distendi, ut in hoc cadavere liquet. Hinc facile percipiendum est, unde cordis palpitatio originem traxerit, nempe ab obstructa vena pulmonali: nam in Hydrope hoc, adeo ejus capacitas coarctabatur, ut sanguini per eam via denegata fuerit, tum resillire coactus cor se inmodicè movere debuit. Omnis enim palpitatio fit a causa obstruente circa cor: quotquot mihi contingere cadavera, semper vel Polypum, vel sanguinem coagulatum, vernies, ossificationes, aut simile quid præerit. *Idem pag. 225.*

#### ATRITI & ATRITÆ

Vid.

#### IMPERFORATI.

#### ATRICES

Vid.

#### CONDYLOMATA.

#### ATTONITVS MORBVS

Vid.

#### APOPLEXIA.

### AUDITUS LÆSIONES.

ubi scilicet

*De Tinnitu Aurium, Obauditione, & Surditate agitur.*

**A**Ntequam de hisce affectibus aliquid dicamus, non inutile fuerit si Auditus rationes naturales, organaque illi intercurrentia paucis explicemus.

Aër



Aër tremulo atque undoso motu à corpore ſonoro actus, ab auriculæ externæ me-  
chanica attrituosa & flexuosa emittentis do-  
nata, congregatur, ita ut ejus ad interiora im-  
preſſio intendatur; hinc per æntrum ſeu me-  
atuum auditorium, membrana, glandulis ceru-  
men naturaliter vomentibus ſtrata ex parte  
objectum in anguſtum coactus, & ab ejuſdem  
inæqualitatibus & curvaturis novas reflexiones  
ac refractiões, quibus vim majorem rurius ac-  
quirit, ſubiens, ad tympani pelliculam flexibi-  
lem, Myringem vocant, inferiori, ſeu interiori  
prædicti meatus extremitati ſubtenſam, per-  
git, illamque varie agitac ac commovet; qui  
motus non tantum aëri in cavitæ tympani  
concluſo, illucque per canalem inde ad torami-  
narium internæ decurrentem, adſportato,  
communicatur, ſed etiam oſſiculis pone tym-  
pani membranam ſitis, quæ malleum, incudem,  
ſtapedem ac os orbiculæ vocant, quibus me-  
dicantibus, membranula duplex, ſcilicet alia  
quæ torum rotundum, alia quæ ovale clau-  
dit utrumque labyrinthum, ultimoque ejus re-  
ceſſui cochleæ dicto, præſtium, ſuccutitur, ſic-  
que per vibrationes in labyrinthi anfractibus  
continuas impulſio ad uſque nervorum audito-  
riorum ramulos ibidem multipliciter implanta-  
tos devenit, per eoſque ad cerebrum ulque per-  
git variorum ſonorum ſenſationis occaſionem  
animæ exhibiturus.

Tinnitus itaque aurium fiet, ſi per particulas  
è glandulis in membrana partem meatus audi-  
torii obveſtiente poſitis, vel aliunde, ſcilicet  
verbi gratia, abſceſſu vicino, aut aggeſta  
fluxionis materiæ aſſuentes; fermentatio oria-  
tur, æri contento, imprimendo cuidam  
fremutui, unde tympani membrana leviter  
quætiatur, apta; vel etiam ſi particulæ fer-  
mentefcibiles per aquæ ductum in tympani ca-  
vum ruant, aut arterioſa quævis demum de cauſa  
validius pulſet, quæ aërem cochleum jactent, Vel  
ſi idem motus in ipſo labyrintho imò nervi audi-  
torii ſubſtantia, aut ſpiribus per ipſum decur-  
rentibus à ſero peregrino aut ſucco nerveo de-  
generi inductus, adſit. Idem faciunt vermes in  
aure geniti ſuis ſuccuſſionibus, violentæ capitis  
plagæ & horridi fragores &c. Obauditio verò  
hæc ſi vel deficiat auricula exterior ſono exci-  
piendo deſtinata; vel ex parte meatus auditorii  
obturetur, tum per corpora extranea, tum per  
cerumen aggeſtum, tum per turgentes mem-  
branæ propriæ glandulas; vel tympani mem-  
brana craſſior atque humidior fuerit, imò in  
eo tenſionis gradu non reperiatur, qui variis  
aëris vibrationibus excipiendis ſit accommo-  
dus; vel aër tympani craſſus & quali nebulo-  
ſus exiſtat, qui propterea vibrationes ab aëre  
exteriori advenientes, exquisite non ſatis  
tranſmittat, quin potius varie eaſdem alteret;  
vel ſi mobilitas in oſſiculis tympani, cordarum-  
que muſculoſorum ipſa agentium non ea ſit quæ  
feriendis membranulis, foraminibus ovali &  
forondo affixis, neceſſaria eſt; vel ſi nervus  
auditorius ex parte obſtruatur, aut in aliqui-  
bus deficiat cavitæ labyrinthi: Surditas ab iſ-  
dem cauſis quæ in obauditione jam enarravi-  
mus, oriatur, ſi modò illæ gravioreſ fuerint;  
imò ſi particulæ illic tantum fermentefcentes,  
hic corroſivum quid acquiſierint quo variis or-

gani partes lacerent & deſtruant.

*Signa* variarum auditus affectionum non opus  
eſt ut hic expendamus ad *prognofim* itaque con-  
tinuò procedamus.

*Tinnitus aurium* febribus quibuſcunque ſuper-  
veniens materiæ ut plurimum à cerebrum  
denunciat, febre autem curata, idem  
hic hinc uſu medicamentorum curatur. Idem  
affectus ut apoplexiam, epilepſi in aliisque co-  
matofos cerebri morbos præcedit, ſic in eo-  
rum decremento ſaulti eſt ominis, ſiquidem re-  
ſolutionem materiæ morbum facientis denotat.  
Convaleſcentibus, ac poſt immoderatas va-  
cuationes, ut oculi vertigine tentantur, ita  
aures bombilare ſolent, nam exhaustæ partes  
ſtatuſ facile accumbant. Inveteratus aurium  
tinnitus, ſcilicet qui per biennium durat, vix  
curari poteſt; uti etiam tinnitus ex frequentij  
percutione in caput & tempora, propter in-  
ternam lacerationem.

*Surditas* ab ortu raro imò rariſſime curatur,  
iſdem nihilominus loco aurium inſerviunt oculi.  
ſic D. Wallis Mathematicus Oxoniensis duos  
Nobiles Anglos ab ortu ſurdos inſervit ſo-  
liloquiorum motu, ut loquentes intelligerent &  
accurate reſponderent: ſic etiam Digby lib. de  
immortalitate animæ reſert de quodam Nobili  
Hſpno, qui ab ortu ſurdus, ut ne bombar-  
dæ ſuribus adnotam atque exploſam perci-  
peret, ſimulque linguæ uſu privabatur; quem  
nihilominus dexteritas atque induſtria ſacer-  
dotis cuiſdam eo perduxit, ut poſt multos an-  
nos cum ſtupore omnium diſtincta admodum  
proferret verba, alioque ſecum colloquentes  
(ſolo aspectu) perfecte intelligeret, ut per inte-  
grum diem in crebro hominum contubernio  
verſatus, illorum ne verbum quidem non ap-  
prehenderet, tæp appoſite cuicuiſque reſponderet.

*Surditas & Obauditio* a vitio membranæ tym-  
pani confirmato vix curatur, ſi enim a tenſione  
ſua naturali remittat, idque nullo perduret  
tempore non facile ad ſtatuſ reducet, ſed  
tantum ſic affecti, ſub quovis ſtrepitu ma-  
jore membranam prædictam violentiori ad in-  
teriora impulſione aliquomodo tendente, me-  
diocrem ſonum percipient, quo nullatenus af-  
ficiuntur extra hos ſtrepitus conſiſtenti: Exem-  
pla quatuor ſic anecdotorum reſert Bohnius Cir-  
culo ſuo Anatomico phyſiologico; bina ex  
Williſio, tertium & quartum ex Tranſaction.  
Philof. Angl. petita. Præſentia eſt quæ ſur-  
da quidem, quæ mediū nihilominus in concavi  
tympani bellici ſonus aures ejus circumſtrepe-  
bat, adſtantium alloquia diſtincte capiebat, ceſ-  
ſante verò immamore illo ſtrepitu ſtatim ob-  
ſurdeſcebat, cujus propterea maritus tympa-  
niſtam pro ſervo domeſtico conducebat, ut il-  
lo mediatore colloquia interdum cum uxore  
haberet. Alterum ſurdaſtri maris erat, qui pro-  
pe campanile degens, quoties plures campanæ  
ſimul reſonarent, vocem quamvis facile & cla-  
re audiebat, tacentibus illis ſecus. Tertium in  
Nobili a nativitate ſurdo obſervabatur, cui  
pariter temporaria ejuſmodi medela ſolatio  
erat, ſc. quādiu tympanum prope ipſum vio-  
lentiſſimè pulſaretur, à tergo ſubmiſſius loquen-  
tium voces percipiebat, nec tamen clamantes  
ſtrepitu illo ceſſante. Ejuſdem quoque generis  
ſtudioſus quidam erat, qui ſurdaliter omnia



quæ liquare ac fundere humiditatem poteſt, at non quæ eidem dominari & abſumere valeat; & eo conſiderabilior evadit in hac ætate quæ neque puerilis, neque ſenilis eſt; ſurditatem enim minui ſolet, dum aduſta inflammatione meatus auditorius obſtruitur, aut nervus auditorius, à quinto pari deſcendens, comprimitur, vel à viſcida materia dura membrana, meatum involuitas, obſtinetur atque obtunditur.

Quare quamprimum ad medica auxilia eſt contugendum, ut præſenſtimus auferatur, & ſurditas arceatur præterquam quod à præſenti humida capitis intemperie non pauci alii affectus ſoboleſcere poſſunt. Medicæ autem intentiones eſſe debent, humiditatem in auribus exiſtentem exiccare ſtatuiſque diſcutere. Secundo capitis humidam intemperiem, ut pote partis mandantis corrigere. Tertio totum expurgare. Quarto primas vias expiare, hac lege ut quod fuit primum in intentione, debeat eſſe ultimum in executione.

Et à fonte Chirurgico aliqua ſanguinis miſſio ex Jecoraria dextra eſt depromenda, ſi non ratione capitis & auris, ſaltem ratione torius & jecoris, ut facilius caloriſica & exiccantia medicamenta adminiſtranda tolerari poſſint.

Ex pharmaceutico fonte reliqui ſunt deſumenda medica præſidia, ut jam dictis intentionibus medicis ſatiſfaciamus, & primò Leniens exhibeatur ex manna clarif. & ſyr. roſ. ſolutivo, vel ex caſſia, electuario leni. & tartaro. Primum præparans quinque aut ſex diebus ſummo mane aſſumendum, ſit oxymel ad ℥iij. exigua aqua flor. citri diſſolutum; mox leniens medicamentum, ut ſupra, repetatur. Inde ad ulteriorem præparationem deveniendum oxymel ſimpl. & ſyr. de betonic. in decoct. cichor. borag. agrimon. meliſſæ, ſalvæ & betonic. in qua octo aut decem diebus inſiſtendum; deinde Purgans exhibeatur ex elect. lenit. diacath. vel diaphœnic. paratum. Veleſ infuſ. agarici, rhab. ſenz & cinnamomi, addito ſyr. vel mell. roſ. ſolutivo, quibus ſuperbibenda præberi poterit aqua hordei ad ℔iij. vel muſſa diluta, aqua hordei parata.

Hac abſolutâ primarum viarum ac venoſi generis expurgatione, expurgandum erit quoque caput, quod præſtari poterit pilulis caput. coctiſ præparatis: additis quoque aureis & malticinis, tribus ſaltem vicibus quarto quoque die aſſumendis; intermediis verò diebus præparans erit exhibendum ex decoct. cichor. betonic. ſalvæ, ſteœhad. & majoranæ, addito oxynel. compoſ. ſyr. de betonic. & de ſteœchade. Interim ejuſdem capitis expurgatio Milticatoriſ quoque erit procuranda, ex pulvere pyrethri, Gingib. nuce myſtiſica, n. aniche & cera parandis, maximus enim extat conſenſus & communicatio oris cum auribus. Ita purgato capite, humida ejuſdem intemperies eſt corrigenda & exiccanda, quod egregie præſtabit Decoctum ſudoriſicum ita parandum.

℞. Saſaparill. elect. lign. viſc. quercin. veri ana ℥j. lign. tor. marin. ſant. l. alb. infuſ. per horas 24. deinde bull. ad conſumpt. dimidii, facta verò colat. ſervetur ad uſum pro duabus vicibus, matutino tempore hora una ante in-

greſſum hypocauſti aſſumenda, addendo gutt. ij. aut iij. quintæ eſſentiæ tor. marini; in cujuſ uſu perſeveret ſupra triginta, imò uſque ad quadraginta dies: deinde reſiduis adde aquam quæ bull. ad conſumpt. tertiæ, addito colaturæ ſaccharo, ut fiat potio conſuetæ. Decimo quoque die præbenda eſt potio ex man. ciarac. & victus ratio debet eſſe attenuans, licet non adeo tenuis; etenim præter panem biſcoctum, paſſulas & nucleos ſuſcos, concedatur tertio aut quarto quoque die caro aſſa palumbi ex turre, aut pulli junioris, aut vituli, m. ne tantum in prandio, cum omnimoda t. men à vino abſtinentia.

Dum jam dicta omnia ſiunt, poſt totius abſolutam expurgationem localia auribus admoveſci poſſunt; inter quæ commendant acetum cum nitro & melle Oribasius atque Trallianus; Callorem, crocum & nitrum cum aceto Paulus & Aëtius; Oleum de colocynthide & ſuccum cyclamin. Dioſcorides; nos verò tale experti ſumus efficaciffimum remedium.

℞. Ol. amygd. amar. ℥ij. ſucci raphani ℥j. ſell. capr. ℥ſſ. pulp. colocynthid. ℥j. m. maceſcentur in vaſculo terreo vitreato cooperto per noctem, deinde bull. ad conſumpt. ſucci & ſi fortis expreſſio panno lineo raro, quo madefacta turunda bombycina, in auribus noctu de more detineatur.

Sed quoniam hæc nominiſ incunte vere peragenda erunt, ideo interim aliquo leviori Topico uti poterit, ita parando.

℞. Corpam vulgarem excavatam & oleo amygd. amarar. repletam, in vaſculo terreo reponam, & oleo addatur pulvis cymini, bulliat autem quouſque Decocta ſit ipſa corpa, deinde ſi fortis omnium expreſſio, & turunda hac expreſſione imbuta in auribus noctu detineatur.

Jam dictis omnibus cautio in victus ratione erit addenda, ita ut Nobiliſſ. Patiens caveat à diuturna mora propè ignem, ſub radiis ſolariſ, neque caput ventis & aeris inclementiæ exponat; abſtineat à vaporofiſ omnibus, præſertim humidis, & ſuper omnia à lacticiſ omnibus; à lactuca, ab apio, ſcœniculo, vinis generofiſ, ab eduliſ craſſis atque diſſiciliſ concoctioniſ; ab exercitiis tum animi, tum corporiſ, ventriculo pleno exiſtente, & alacri animo vivat. Joann. Raymund. Forſis Conſult. Tom. 2. Cent. j.

Vir triginta duos annos natus poſtquam diu crapula ſe fatigaſſet, incidit in tinnitum aurium, quem poſtea, jam à ſex menſibus inſecutus eſt ſiniſtræ auris, primò gravis auditus, & deinde ſurditas. Huc jam acceſſit tinnitus & gravitas auditus auris dextræ.

Afficitur in hoc ægro utraq. auris ſecundum nervos auditorioſ; quod ex ſurditate, gravitate auditus, & tinnitu aurium eſt manifeſtum. Morbus ſiniſtræ auris eſt obſtructio vel compreſſio nervi auditorii ab humore pituitoſo facta: quæ audituſ privationem ibi inducens, ſurditas dicitur. Dextræ vero auris morbus eſt intemperies humida, craſſa & natulenta nervi auditorii; quæ imminutum auditum, & tinnitus ſonum, in ea excitans, gravis auditus & tinnitus aurium occupatur.

Cauſa



Causa procatacica horum morborum est erapula, quæ hic vir se diutius agavit. Inde enim cruditas, & deinde pituitosi in toto corpore humores ex cruditate tuerunt geniti, qui in vasis cerebri contenti causam antecedentem; ex vasis verò in nervos & vicinas aurium partes postea effusi, continentem horum morborum, & symptomatum, constituunt causam. Dum enim hu. mores isti propter crassitiem suam, & debilitatum cerebri colorem, in status circa nervum auditorium convertebantur, impingebant illi vehementius in nervi istius fibrillas, atque etiam in tympanum, atque hinc motu suo excitabant tinnitus sensationem: si verò postea leviter circa aurem sinistram incrassati, & in nervorum sinistraz aulis cavitates impacti, primum nervorum fibrillas leviter ibi compresserunt, & obturarunt; atque hinc ortus est gravis sinistraz auris auditus: ab iis verò, postea in eadem magis auctis & incrassatis, tanta nervi auditorii compressio & obstructio est orta, quæ motum omnem, à sono nervis impressum, ad cerebrum deferri impediens, surditatem in ista aure excitavit. Humoribus vero ad nervum auditorium dextræ auris delatis, ibique partim in status conversis, & in nervi istius fibrillas vehementius impingentibus, tinnitus; in nervum verò nonnihil impactis, & fibrillis nervi iis nonnihil compressis vel obstructis, gravis auditus dextræ auris etiam supervenit.

Quoniam hic affectus jam lex duravit menses, & paulatim incrementum sumsit, metus est, ne ob diuturnam illam moram, materia ita nervo auditorio sinistro sit affixa, ut nunquam inde tolli possit, & surditas ibi maneat perpetua. Et quia cerebrum hic valde est affectum, metuendum, ne auctis humoribus, surditas etiam dextram aurem occupet.

Quia tamen hæc prædictio non est necessaria; ideoque Curationem inchoandam existimo. Eaque consistet in causæ procatacicæ, antecedentis, & continentis ablatione, intemperieque per contraria correctione. Primum itaque purgetur æger bis terve his pilulis.

℞. Pilul. cochlear. sine quibus esse nolo an. ʒss. scammon g. ii. camphyr. ros. sol. q. s. f. pilulæ Num. v. mane sumendæ. & singulis etiam mensibus admoveantur tribus diebus continuis cucurbitulæ sine scarificatione post aures ab auribus revellantur, & ex iis educantur. Utatur etiam mane & vespere lotionibus pedum, cum camomill melilot majoranæ, hyssopi, & roris marini decocto institutis. Nocturno verò tempore talem cucupham capiti imponat.

℞. Rad. irid. flor. ʒss. calam. aromat. cyperi, acori an. ʒj. folior. siccor. majoranæ, melissæ, salviæ, roris marini an. m. ʒ. flor. sthæcad. arab. spic. nard. an. p. j. cinnamomi, macis, caryophyll. benzoini an. ʒss. Omnia in pulverem redacta excipiantur cottone moschato, & cum panno serico interpuncto. f. e. a. Cucupha, noctu gestanda. Interdiu sub pileo in capite gerat cucupham ex corio Hispanico; quales jam in frequenti usu esse inter juvenes & senes observamus. Mane jejuniis, & vespere sub horam quartam, hoc utatur masticatorio.

℞. Rad. pyrethri, angelicæ, zedoariæ ana. ʒj. sem. staphid. agriz, napi nucis moschata, fol. senn. an. ʒss. pulverulentur & addatur parum

masticæ, ac cum ceræ q. s. formentur Globuli masticatorii: de quibus masticetur unus prono capite, frequenter expuendo. Noctu dormitum iturus auribus hanc aquam indat.

℞. Aq. fœnicul. sem. carui post olei extractionem remanentis ana. ʒj. spir. juniper. ʒss. Misce, & de hoc liquore multillet aliquantulum in aures, addendo semper guttam fellis carpionum; & postea sinat effluere, ac deinde indat auribus cottonem, in quo moschus fuit servatus, vel in quo moschi pulvis est dispersus. Mane suffitum etiam auribus excipiat per mundibulum, ex hoc calido decocto.

℞. Fol. huri, rutæ, origani, hyssopi, majoranæ ana m. j. absinth. mentastri n. m. ʒ. flor. stæchad. celticæ m. j. Baccar. lauri, juniperi ana ʒss. sem. anis. fœnicul. carui, cymini an. ʒj. Decoquantur in vin. alb. q. s. ad tert. part. consumptionem, & halitus calidus aure per infundibulum excipiat.

In ære versetur calido & sicco. Victus sit tenuis, & paucus: & famem aliquando sustineat. Vitet repletionem, & omnes cibos crassos & tenaces, quales c. lens & legumina. Cui condiantur semine anisi, fœniculi, cymini, petroselin. Potus sit vinum & cerevisia medicis. Exercitium sit moderatum. *Hent. Aeg. apud Theodor. Craanen in Observ. Medic.*

Hypochondriacus queritur de tinnitu aurium, putat se audire sonitum campanæ, vel strepitum aquæ, quandoque cessat, sed subito recurrit.

Hypochondriacus queritur de tinnitu aurium, & putat se audire sonitum campanæ ab humorum inordinata fermentatione hypochondriaci etenim sanguine gaudent fermentescibilibus. Causa est visciditas flatibus generandis apta, & variis obstructionibus conchiendis idonea. Hinc conveniunt stomachica acidum absorbentia, qualia sunt omnia anti hypochondriaci. Sal volatile C.C. bis vel ter sumi potest in septimana in prandio. Sic sudorifera hic erunt insignis effectus: Enemata etiam possunt applicari cum emolumento. Externæ sal tollus auribus applicetur. Scarificatio aurium singulis mensibus instituat, ut & v. sectio in pollice pedis, vel manus, & vesicatorium item nuchæ applicetur. *Joan. Jac. Waldseumidi in Prax. Med. ration.*

#### Obauditio.

Nobilis puer annorum 12. hæreditario catarrho obnoxius, incompositaque victus ratione usus, annis elapsis surdus evasit. Verum medicis remediis adhibitis inminutus est affectus, ita ut nunc surda per dici possit, magisque læditur quoad aurem sinistram, idque ex confluxu catarrhi ad aures, tympanum humectatis, atque ita repercussionem aeris impediens.

De sanitate perfecta spes luculenta est: quod conjectare licet ex juvenento à medicamentis etiam non admodum validis suscepto, reliquis sensibus satis bene se habentibus. Adde quod epileptici juvenentum ex mutatione aeris, & ætatis suscipiunt, multo magis hic affectus, qui levior longè est.

Primum itaque purgandum est totum corpus, tunc caput; iluxio divertenda, materia fluxa resolu-



reionenti, & tandem cerebrum exſiccandum, & roborandum. Venæſectio in hac tenella ætate non permittitur, cum imprimis morbus ſit potius frigidus. Neque opus erit hirudinibus. Fonticulis, purgato toto corpore, murtur brachio ſanctro: quem ſi reſpuat, recuperata ſanitate, occludere poterit. Non eſt opus alio fonticulo. Conſummatamen exiſtente aſſectu, inuictetiam poſſet coxæ dextræ; & tandem occipitio. Frictiones, & ligaturæ, tanquam reſuliorum præſidium locum habent: ſunt tempore matutino, & vespertino etiam, potiſſimum poſt ſonnum, cum linco alpero ſuffito thure, maſtiche, &c.

In corporis purgatione cogitandum eſt qua arte accipitur puer. Decus enim reſpueret medicamenta, cum abhorreat a dulcibus. Eſſet ad rem manna cum iure: ſed non admittet. Si aſſueſceret pilulis cum paratella, eſſent ex uſu pil. maſtiche, de Aloe, Alephangina &c. Si non poſſit, vel abhorreat, pilulis addetur Diacydonium, cum ſenna vel cremor Tartari cum iure gallinæ, vel Galli antiqui. Ex uſu eſſent etiam Bee, Carica, prun, &c. Si magna copia ſumantur, addito ſaccharo non depurato, vel melle: verum ab his fortaliſſe guttus abhorrebit. Preparatio fiet oxymel. ſ. ſyr. de betonica. &c. Si hæc non admittat, detur decoctum ex betonica, ſeminibus citri, rore marino, & lentula, floribus borraginis, & violarum: vel preparantium loco, victus erit, qui corpus ad purgationem diſponat. quales erunt capræ cum aceto, ſeniculum, alparagi &c. Purgatio erit inſtituenda blandioribus, non duriſſimis, neque ingratis ſaporis. Ad rem erunt mechoacan, jalappa, ſal, & cremor Tartari, pulvis myrobolanorum, nitrum, turbiſ &c. Ex aliquo horum parandi euaſt morſelli, cum iure, exempli cauſa: ſi ſumatur ſcru. j. mechoacan, vel jalappa, cum portione agarici trochiſcati, & ſaccharo in aliqua aqua ſoluto ex qua paretur morſellus, à quo juſculum aliquod ſumat, vel ſic medicamentum in ſimplici juſculo exhibeatur, vel cum conſerva cydoniorum, roſ. aut viol. &c. ſecundo purgetur corpus, iterum preparatione præmiſſa, iure alterato flor. rorimar. flor. lavendul. & cardui benedicti. Præterea purgantibus erit utendum pro diverſione: Diarræa enim tollit ſurditatem. Capitis evacuationo potius per os, quam per nares erit tentanda, propter meatum illum ab auribus ad palatum pertinentem. Hæc erunt modo leviora, modo generoſiora. V. lidiora hyeme ex maſtiche nempe attrita dentibus, cortices aurantiorum, limonium, fruſtum ſeniculi, vel ſemina eiuſdem anteo inclufa maſtecto aceto: vel poſtmodum erit ex nuce moſchata, origano & aliis maſticatorum. Præterea attingi poterunt radices ſaucium goſſipio maſtecto aqua ſita deſtillata ex cardo benedicto, & origano, ita ut repetatur deſtillatio, annis ſæcibus. Interim etiam per nares aliqua evacuationo tentanda erit: abſtinendo tamen à pulveribus, & valicioribus omnibus, quæ ſternutamentum excitare poſſunt, ſufficiet attractio ſucci betæ, parietariæ &c. Quod ſi ex ſuccorum attractione contingeret ſternutamentum, indantur potius cortices aurantiorum vel citriorum & limonium, & intus extraq; oleo amygd. dulcium inun-

gantur nares. His peractis de majori capitis exſiccatione erit cogitandum: quod præſtabunt aquæ Thermæles meritis iumpræ. A quibus tamen abſtinere conſultius cenſeo, cum quæ non poterit ſufficientem earum copiam perducere, tum quæ validius ſunt remedium, quam hæc ætas ſente poſſit. His præferrem decoctum columbæ turricolæ paratum ex ſalfa, canna, & ſalſatras. Sed præ cæteris probatur viſcus quercinus, & lusus, addendo etiam alia cephalicæ, flores ſcil. rorimarini, calendulæ, ſ. lvan, betonica m, quibus adduntur ſouchus, & cichorium. Detur hoc decoctum horis matutinis, à quo in lecto bene tegatur ad ſudorem inque. Pro inſenſibili capitis evacuatione, exterius erit perſundendum caput lixiſo alterato betonica, rore marino, & lavendula, vel aquis Thermalibus, ex quibus etiam fiet ſilicidium ſupra ſuturam coronalem, & in occipitio, necnon totum corpus in ipsis inuictetur. Aquæ ſunt non adeo calidæ, quales Aponenſes, neque emollientes quales ſunt B. ſicelæ: præferantur potius Læurenſes, & D. Petri. Tandem ſuffumgium per tubulum in aëres, & potiſſimum in ſinſtram erit admittendum, paratur ex aquis Aponenſibus, vel decocto ex vino albo, cum aceto, & radicibus cucumeris ſylveſtris, bryonia, & cyclaminis, addita betonica, ſuffus etiam per os duci poterit ex thure, & maſtiche, addito pulv. roſ. & ſantalorum. Capillis inſperguntur pulveres exſiccantes ex floribus lavendulæ, & calendulæ, additis roſis ſiccis, & portione agarici trochiſcati. Vel pilcolus paretur interſutus, ſuppoſito goſſipio, ex pulveribus Xiloſoes, betonica, & rorimarini, cum portione agarici trochiſcati. Item duci poterit ſupra caput cochleæ cum carbonibus: quæ ratione à pannis cera elici ſolet ſuppoſita charta. In aures inſtillantur Aquæ Cardui benedicti, & origani, Oleum amygd. amarar. cum ſp. rorimarini. Allium coſtum ſub cineribus ex uſu eſt. Ut & pinguedo illius Avit, quæ Strabo dicitur, vel pinguedo nequillæ, quæ ita ſolet parari. Sumitur Anguilla, & romatibus conditur, poſtea aſſatur, & pinguedo manans ad uſum coligitur. Tandem caput erit intrinſecus corroborationem, conſerva Anthos, betonica, & ſorum lavendulæ, ætate tempore, addita pauca conſerva roſacea. Vel ſunt morſelli ex ſpeciebus Diambæ, Diamoſchi, Diamargarit. frig. cum corall & ſaccharo in aqua borraginis, & betonica ſoluto.

In victu abſtineat a piſcibus, fruſtibus dulcioribus, acetariis, & lactucis potiſſimum. Abſtineat ab uſu vini copioſi & generoſi. Si poſſet omnino ab eo abſtinere, conſultius eſſet, cujus loco uti poſſet muſa aliqua medicata. Ventos fugiat, & potiſſimum Auſtrinos, præſertim capite aperto. Exercitia valida vitet, imprimis partium ſuperiorum. Quotidie alvus reſpondeat, vel ſpontè vel cum aliquo Diacydonio preparato. Aërem mutet in ſicciorum. Hæc dicta volui in ſalutem Illuſtriſſimi Patientis Bened. Silvæ. Conſil. & Reſponſ. Medic. Centur. ij.

Iuer duodecimi annorum laboravit ante triennium morbo Hungarico, hunc excepit auctus difficultas in hunc uſque diem durans, ut ea etiam quæ proferuntur à præceptoribus vix audiat.



Solent Febres malignæ judicari per ſurditatem, dum pori à fermento peregrino maligno obſtruuntur. Et hic quidem non eſt abſque periculo, quoniam non tantum diu duravit, ſed & obſtructio fortis eſt, & totalis ſere. Conveniunt verò 1. Purgantia v. g.

℞. Extract. diacartham. ℥ij. ſolve cum aq. ſerpill. adde rhabarb. pulv. gr. vij. ſyr. diaſer. Andern. ʒβ. Miſc. pro doſi. Dehinc iudorifera non negligantur, inter quæ conducunt Decoctum ligaeorum, &c. Pro corroboracione detur Spir. cephalicus, Tinctur. ſuccin. ſp. formicar. Aq. Anhaltina internè, ad gutt. ii. vel 15: Externa non ſint nimis acra, neque craſſa, nec frigida aut calida, ſed temperata. Commendantur verò Aq. Reg. Hungar. Aq. card. bened. de recenti herba ter vel plus deſtillata, cum goſſipio auribus indita, vel item Spir. Tartari ſaſſaſtratus. Vel & panis recens ex fornace extractus & cum aqua Anhaltina aſperſus & applicatus. Moſchata quoque non ſunt inſunæ ſortis auribus immiſſa. Vel Aq. acoviſtica Mynſ. aut formicar. ob ſal eorum volatile quod maguanimam efficit. Crato commendat axungiam ſerpentis, cum aq. card. bened. deſtill. & immiſſam. Pediluvia item non negligantur, & Potus Coffe diligenti ſit in uſu. Si omnis cura fruſtra adhibetur; videndum an mediante cornu audire patiens queat, quia per id propter flexuoſum aëris motum ſurdaſtri ſape optimè audiunt. *Joan. Walſchmidt in Prax. Med. r. allon.*

Mulier 36. annorum, temperamento pituitoso prædita, præterita hyeme catarrhis ſubinde laboravit, à quibus tamen circa principium menſis Februarii proſus immunis evaſit, ſed tunc per paucos dies de leviori gravativo capitis dolore conqueſta fuit, qui brevi evanuit, ſubſequenti magno aurium tinnitu, cum tanta auditus gravitate, ut vix altos clamores audire poſſet, quæ auditus gravitas cum tinnitu jam per tres menſes continuos remanſit. Reliquo alioqui corpore bene valet, & menſtrua ſtatis periodis fluunt.

1 Afficitur in hac ægra inſtrumentum auditus ſecundum partem internam.

2 Affectus duplex eſt: Auditus gravitas, & Aurium tinnitus. Illa eſt auditus imminutus ac difficilis, quo non niſi magni ſoni ab objectis externis moti audiuntur, leves verò non percipiuntur. Hic eſt ſonitus moleſtus inter ipſas aures, à nullo externo objecto excitatus.

3 Gravis auditus cauſa eſt humor pituitoſus verſus utriuſque auris interiora decumbens, & partim nervum acouſticum compreſſione anguſtando ſufficientem ſpirituum animalium influxum ad auris interiora prohibens: partim tympani liberum motum impediens. Hinc enim fit ut leves ſoni tympanum impeditum & incluſum aerem congenitum vix moveant, iſque ex illis motus ob ſpirituum paucitatem non percipiatur, nec ſenſorio communi communicetur: fortes verò ſoni tympanum & incluſum aerem fortius quidem commoveant, ſed motus tamen, ob ſpirituum paucitatem & nervi acouſtici anguſtiam, tantum leviter ſenſorio communi communicatus percipiatur.

4 Tinnitus ſeu ſibilus aurium fit à ſpiritibus vitalibus arteriolas aurium interiores tranſeun-

tibus, atque motu ſuo proximè vicinum, auri interiori incluſum, aerem congenitum ſimul etiam moventibus; cujus motus cum ob locum continentem à pituita, quæ verſus aurium interiora decubuit, anguſtatum, liberè neri nequeat, hinc dictus aer commotus continuo in tympanum impingit, ab eoque reperiſſus, in forma levis ſibili ſeu tinnitus ſenſorio communi offertur.

5 Per tres circiter menſes perdurarunt hi affectus, partim quia à pituitoso totius corporis temperamento fovetur cauſa proxima: partim quia pituita illa in parte affecta hærens ob craſſitatem & frigiditatem ægre diſſipatur.

6 Licet hi affectus per ſe non magnum vitæ periculum minentur, attamen metuetendum ne ingraveſcentes, tandem in abſolutam & incurabilem ſurditatem deſinant. Nam pituitoſus humor, qui ad auditus organum decubuit, paulatim augeri poterit, & diſſipatis tenuioribus partibus adeo increaſcere, ut poſtea nulliſtremediis attenuari & ruruſ diſcuti queat. Sitamen curatio quamprimum inſtituatur, ſpes eſt illum diſſipatum iri poſſe, quia paucus eſt, ut ex eo liquet, quòd nullus adit dolor tenſivus nec auditus omnino perierit.

7 Corpus igitur ſingulis ſeptimanis ſemel aut bis purgetur cum pilulis cochleis vel aureis, pulvere diaturbith, electuario hiera, aut diaphanico, vel inſuſione ex agarico, jalappa, aliſque phlegmagogis.

8 Ad totius corporis pituitam imminuendam, convenient decocta ſarſæparillæ, ſaſſaſtræ, & guajaci, quibus cephalica calida ſub nrem decoctionis adjicienda. Humores verò in cerebri ventriculis contenti evacuabuntur maſſicatoriis, erriis & ſternutatoriis. Deinde ad capitis corroboracionem præſcribenda erunt apozemata & condita cephalica modicè caleſcientia.

9 Ad diſſipandas reliquias in capite & parte affecta reſiduas, convenient tomentum ex cephalicis calidis ac diſcutientibus (betonica, roſmarino, majorana, ſalvia, cal. menta, thymo, chamæmelo, &c.) conſectum, & cum magna ſpongia, vel panno laneo ſapius calidè capiti adnotum: Poſt cujus uſum capilli mappis calidis ſunt exſiccandi, & caput contegendum cucuphâ ex cephalicis caleſcientibus conſuſa.

10 Poſtea ad incidendos, attenuandos ac diſſipandos pituitoſos humores in auditus organo contentos præparabitur huiusmodi decoctum.

℞. Rad. raphan. ſylveſtr. ʒiij. herb. thymi, betonicæ, hyſſopi, majoranæ, roſis marini, ſerpilli, ſol. lauri, flor. chamomill. meliloti, ana m. j. ſem. cumini, carui, levistici, ſcnicul. an. ʒβ. aquæ q. ſ. fiat ſ. a. decoctio. Inter coquendum, per inſundibuli ollæ inpoſiti tubulum vapor calidus modò in unam, modò in alteram aurem admittatur, ac poſtea cum ſpongiis decocto inuſis aures fomententur. Poſt tomentationem verò cum petiis ex bombace immittantur in aures duæ guttulæ olei aniſi, ſcniculi aut carui.

11 Plurimum etiam proderit hoc cataplaſma, inter duo liuteamina utrique auri nocturnis temporibus calidè inpoſitum.

℞. Herb. majoranæ, ſalviæ, flor. Chamomill. meliloti, an. m. j. ſem. naſturtii, cumini, ſcnicul. ana ʒiβ. pulveriſcentur, adde Ombos cæpæ.



caparum ſub cineribus aſſatos num. ij. rapam  
al. t. m. mediocrem num. j. t. r. m. ſem. ſanugr.  
3j. aquæ q. ſ. coquantur pauliſper, & addendo  
olei anethini, amygdalarum amararum, an. 3j.  
ſ. ſ. art. cataplaſma.

12 De die poterit loco cataplaſmatis utrique  
auri calidè admoveri talis ſucculus ſiccus.

13. Herb. majoran m. j. roſmaria. flor. cha-  
momili. an. m. ſ. ſem. cumini, fœniculi, ca-  
rui, leviſtici, an. 3j. ex his concius & groſſo  
modo contuſis, ſiant. ſ. art. in ſerico duo ſac-  
culi interſuti.

14 Si horum remediorum uſus aliquandiu  
continuatus manuſtatum levamen non inducat,  
nultum proderit fonticulos in cervice & bra-  
chii excitare, ut pituitoſa materia verſus au-  
res decumbere ſolita, per alias vias deduci  
& evacuari poſſit.

14 In victu ſit aer modicè calidus, & vitetur  
turbulentus ac ventofus, imprimis aquiloneus.  
Cibi ſint boni ſucci & facilis digeſtionis, con-  
diti cum majorana, ſolius lauri, ſerpillo, roſ-  
marino, betonica, ſeminibus carminativis, nuce  
moſchata, & ſimilibus. Potus ſit vinum tenue,  
& cerevicia mediocris notæ ac bene defœcata.  
Caveat ſibi ægra ab omnibus iis quæ caput re-  
plent, ut raphano, ſinapi, allio, capis, vino  
generoſo, nimia quantitate ſumpto, ſpiritu vini,  
&c. Etiam à repletionem, tam in cibo quàm in  
potu. Somnus non ſit nimius, & corpus medio-  
criter exerceatur. Alvus ſi ſponte quotidie  
non reſpondeat, arte laxa ſervetur. Fugiantur  
vehementiora animi pathemata. *Iſorand. de*  
*Diemerbroeck de morb. capit. Medicat. 20.*

#### Surditas.

Admodum Reverendus Pater animum agens  
vigefimum quintum, temperamentum ſecundum  
totum ad calidum & ſiccum vergentis, me-  
diocris habitus, calidioris verò jecoris, ſicut  
caput habens præcalidum & humidum, ideo-  
que excrementis abundans, quæ olim per nares  
copioſa excrebantur, moxque ſuppreſſa, aſſi-  
duis ſtudiis deditus, quintus jam agitur annus  
quo ſiniſtræ auris dolore correptus fuit, cui  
poſt aliquot dies ſuccceſſit excretio copioſa ma-  
terię magna ex parte purulentæ & foetidæ: qua  
excretionem remiſſus fuit dolor, perſeverante  
tamen materia non quidem adeo purulentæ ſeu  
catharrhali naturæ, modo albæ, modo flavæ: cujus  
expurgatio per aurem modo major, modo minor  
ſemper hucusque perſeveravit atque perſeverat,  
non ſolum cum diminutione, verum tandem cum  
totali auditus abolitione, quæ ab eodem Re-  
verendo Patre obſervata non fuit, niſi anno  
elapſo; dum dextera quoque auris eadem  
ſymptomata pati cœpit, & auditus quoque in  
illa diminui. Illud interim obſervatum fuit, quod  
præterito Autumno poſt abundantem in aure  
ſiniſtra materiæ excretionem conſertim ſecu-  
tam, auditum ſerè ex toto recuperaverat,  
quem tamen poſt tres aut quatuor dies rurfus  
amſit. Modo ſicut omnino ſurdus in ſiniſtra,  
ita ſurdus in aure dextera remanſit, & de  
agendis pro ſalute conſulit.

Surditas itaque abſoluta in aſtre ſiniſtra, &  
diminuta in aure dextera quæ Obſurditio, ſi-  
ve Barycoja à Gal. dicta fuit, cum perpetua  
materiæ fluxione, ſunt affectus quibus divexa-  
tur Reverendus Pater, ſymptomata audientis  
actionis abolitæ & imminutæ læſæ, necnon in

excretis immodicè fluentibus, quæ ſtitate pec-  
cantibus: quæ ſymptomata a ſymptomate alio  
originem habere, nempe à dolore: ſicdè om-  
nia poſtea a morbo m. nata magnitudinis, a tu-  
more nimirum in aſtre ſiniſtræ, eo, ut ſi aſtra ma-  
torio, non per congeſtionem, ſed per humorum  
affluxum excitato; qui tumor non quidem in  
interiori concavitate oſſis petroſæ, udi ma-  
nat aer quietus implantatus, & deſſique nervus  
auditorius, qui in interiori p. rte, ſimul cum  
dura membrana meatum involvit, & auditum  
perficit: etenim in illo cata. cu. aſſimo dolore  
continua quoque, ac venementiſſima febris  
accedit, difficilis atque periculosa, non raro  
& delirium, & mortem inferens, idque quo-  
niam, ut ait Gal. in Com. ibi reperitur nervus  
auditorius cerebro proximus: unde repetebat  
Hippocr. *Juvenes ſeptima occidit, & ſeniles ſicut*  
*delirio, ſeniores autem tardius.* Agitur inſtra meatum  
auditorium tumor fuit olim excitatus, & ſpatio  
aliquot dierum ſuppuratus atque abru. tus: cujus  
occaſione attracta & retenta luere aſtra capitis  
excrementa, quibus imbuta dura membr. aa  
tympani, ſicque madida reddita, non amplius  
ſonora, ſonos externos na cum ære implan-  
tato recipere, nec cerebro commune re va-  
let, unde ſurditas: quam non parum ſovere  
credimus ulcus ab abſceſſu diſſupto relicum,  
ſicut utrumque affectum à perpetua deſſila-  
tione à cerebro intemperato man. ite, & ſo-  
veri & conſervari credimus: caput enim jam  
valde excrementoſum quod per nares olim e-  
xonari ſolebat, ſuppreſſa per nares evacuatione,  
ad ſiniſtram primo, mox etiam ad dexteram  
aurem excrementa transmittere cœpit, & adhuc  
mittit; à quibus partim & auris dextere inter-  
na tunica madefacta, partim meatu ipſo au-  
ditorio ſemiobſtructo, tandem poſtremo hoc  
anno auditus ipſe non parum imminutus eſt. Et  
quamvis caput eſſentialiter à propria humida  
& calida naturali intemperie affectum ſemper  
ſuerit, imbecillius tamen ab applicationibus in  
ſtudiis ſemper eſt redditum, & ad ſuſcipiendos  
à jecore per venoſum genus tui vapores cali-  
dos, tui ichores biliſſos, qui propria ipſius  
capitis excrementa & ad augere, & calidiora at-  
que flaviora reddere, ſimulque liquare ac ſun-  
dere, ſicque ad fluxionem aptior, ſacere valent.

Surditas eſt affectus qui ratiō Curationem  
admittit, præſertim ubi conſummata fuerit,  
obſurditio verò in ſurditatem terminare ſo-  
let: & angetur difficultas in caſu noſtro ab ul-  
cere in ſiniſtra relicto. Atamen cum Patiens  
ſit juvenis, neque hucusque majora & propria  
expertus fuerit remedia, eradicatoria atque ge-  
neroſa; Purgatione proximo Vere perſicien-  
da, ſalus deſperanda non eſt, quæ Purgatio in-  
fra erit deſcribenda; & interim aliqua quoque  
agenda ad affectus incrementum inhibendum,  
aut ſaltem remorandum.

Quatuor igitur uſque ad feſta Paſchalia ante  
exactam Purgationem tunc temporis incu-  
dam, ſunt in uſum ducenda. Primum eſt Le-  
niens aliquod familiare bis in menſe aſſum-  
dum ad evaporationes à capite divertendas,  
quod eſſe poterit.

2. Elect. lenit. 3vj. aloës roſat. 3j. magiſter.  
Mechoacan. gr. vij. m. ſ. boli diſtribus horis ante  
cibum ſumendi.

Secundum erit alterans quotidie prima menſis



hauriendum, ut jecoris calor contemperetur, & erit jus c. rnis endivia alteratum.

Tertium erit Erthinum live Nasarium matutinis horis per nares more tabaci attrahendum, ad hoc ut materia ad nares tanquam ad proprium emulctorium revocetur, neque ab auribus divertatur, cujusmodi esse poterit.

℞. Pulv. majoran. rad. ireos Florent. an. ʒij. m. pro Erthuno.

Quantum erit Topicum in aures introducendum, quod primo incidentem & detergentem, deinde exiccantem facultatem obtineat, ut humor in auribus existens attenuetur, detergatur, & tandem ulcus exiccetur. Introducatur igitur turunda oxymelite squillit. intincta, praefertim noctis tempore: non enim sunt infundenda medicamenta, ne violenter tangatur meatus auditorius, ut admonerat Gal. sed turunda aut specillo lana obvoluto sunt introducenda. Aliquot vero transactis diebus, paratur tale medicamentum modo jam dicto in usum ducendum.

℞. Ol. amygd. amar. ʒj. fellis capræ ʒss. succiraphani ʒss. pulv. cymini ʒj. m. ref. ad ignem, & intincta turunda in aures introducitur. Vel

℞. Cap. m. vulgarem, excavetur & pulvere cymini impletur, deinde coquatur, & forti expressione succus extrahitur, turunda modo jam dicto in usum ducendus. Neque verendus est usus viduorum medicamentorum: etenim vehementissima medicamenta tolerant aures, ut docet Galenus.

Tandem pro ulceris exiccatione nullum praestantius excogitavit remedium ipse Gal. quam ferri scorium tritum, & sub radiis solaribus acerrimo aceto lavigatum. Tinctura quoque corallorum cum sale corundem, efficax erit.

Sed fontem mali tollere oportet, in quem finem Vere proximo prima via erunt expianda. Secundò Totum venosum genus expurgandum. Tertiò purgandum corpus. Quarto ejusdem intemperies, humida praefertim, corrigenda, atque tandem Topica auribus admovenda.

Et si primo Chirurgica remedia consideremus, necessaria erit sanguinis missio ex Mediana dextera, imò repetenda erit vel ex sinistra, vel ex haemorrhoidibus. Si Cauteria gestet in brachio & coxa, pro nunc custodienda. Ex Pharmacia reliqua sunt remedia deponenda, & primo Leniens erit.

℞. Pot. ex m. n. clarif. ʒvj. aq. flor. citr. parum, m. pro potu. Præparans sic in usum.

℞. Oxym. simpl. ʒij. mell. ros. simpl. aq. flor. citri ana ʒj. m. & sic pro aliis quinque. Deinde repetatur praescripta potio. Ut secunda incatur præparatio.

℞. Succis depur. & per arenam trajecti cicchor. borag. beton. an. ʒj. sal. tartar. fixi gr. x. decoct. cicchor. fouchi, beton. agrim. pentaphyl. meliss. ʒv. m. pro syr. & sic pro aliis septem. Inde purgantur humores in toto infusione rhab. agar. tol. senz, & cinnamom. integri, addito syr. & mell. ros. solutivo; vel electuario lenit. de succo ros. & diaphanic. quibus superbibat aquam Nocer. ad lib. ij. vel iij.

Purgato toto, debet quoque expurgari caput pilulis cochiis, aureis, & aggregat. ana ʒss. quibus pariter superbibat aquam Nocer. aut hordeaceam; quæ pilulæ quoniam bis aut ter

quarto quoque die sunt repetendæ, ideo intermedii diebus præbeantur succi jam praescripti, in decoct. cicchor beton. salvia, majoran. & stachados. Et eodem tempore matutinis horis caput erit quoque purgandum erthinis aut manicatoriis, Erthinum ita parandum.

℞. Pulv. majoranæ, ireos Florent. an. ʒij. nigell. ʒj. m. Malticatorium ita.

℞. Pulv. gingib. pyrethri ana ʒj. mastich. ʒss. sacchar. ʒij. ceræ q. s. & f. globuli.

Purgato toto & capite, ejusdem humida intemperies corrigenda sudorifico Decocto in hunc modum parando.

℞. Ligni vitci querc. veri, medull. guajaci, saltparili. elect. lig. rosmar. an. ʒj. aq. conum. lib. 4. m. f. infus. per horas 24. deinde bull. ad consumpt. dimid. & colatur. servetur pro tribus vicibus, hora una ante ingreditum hypocausti sumenda. In ejus sudorifico Decocti usu quadraginta diebus insilendum, & deinceps quoque die potio ex manna clarif. præbeatur. Pro potu vero consueto aqua hunc in modum paratur.

℞. Residuum, aq. com. lib. 15. m. bull. ad consumpt. tertia, in fine vero ciullit. add. cinnam. integr. ʒij. bull. parum, & colatur. adhuc ferventi adde sacchari albi ad gustum sat. pro potu consueto. Vicius autem ratio sit mediocris inter tenuem & crassam, attenuans tamen & exiccans. Absoluto sudore concave capitales erunt in usum ducendæ, & flor. rosar. ros. mar. beton. salvia, additis guttis quintæ essentia rosimarini; imò Confectio in rotulis ex quinta essentia ros. mar. sacchar. dissolvendo in aq. cinnamom. parari poterit, noctu in ore detinenda. Tandem Topicum in aures introducendum mediante turunda bombycina in parte superiori eodem intincta, ut paratur.

℞. L. omum colocynthid. infusum nitrate incisum, excavatum, & impletum oleo amygdalar. amar. aquæ vitæ, caryophyllor. ana ʒj. tellis caprin. ʒss. m. bull. lento igne in vase terreo ad consumpt. aquæ, deinceps f. omnium fortis expressio, cui add. moschi gr. v. & servetur ad usum.

His autem omnibus congruam vivendi rationem propositis intentionibus proportionè respondentem. Excellentiss. Viro Adstanti addendam relinquimus. Joann. Raymund. Ferris Consult. cent. j. Tom. ij.

### Observationes.

#### Tinnitus Aurium.

Quidam naturæ melancholicæ, 40. annorum, per aliquot septimanas, perquam molesto aurium tinnimento exagitatus, paucorum dierum spatium liberatus aliquot guttis spir. capnaic. Anhalt. cum bombace insertis: deprehendit illius effectum multo præstantiorem in cerebro roborando, & flatulenta ac vaporosa materia resolvenda, quam oleorum stillationum, quæ nimio calore magis officiant. Thomerus lib. 2. Observ. ult.

Tinnitus aurium alios sine dolore, alios cum dolore laborantes, etiam inter hos senem sexagenarium à tribus hebdomadis surdissimum lev. vi præmissis potu decocti tritolii fibrini, oleo trifolii



ſolii deſtillato, goſſipio ad aliquot guttas excepto, & auri indito quanquam late, & me in hoc aſſecui oleum C.C. efficacius deprehendiſſe. Faber quidam lignarius 30. annorum ad Michaelis feſtum 1674. dolore leviſſimo auriſ dextræ corripiebatur, qui tamen mox evanuit, effluente nihilominus magnâ puris ſætidî & ſanici vj. Nullus unquam capitis dolor præceſſerat, nullus parotidum tumor. Auditus interim planè hac in aure ſublatus. Nulla hactenus res ei commoda fuit præter frequentem ſuinum tubulo tabaci in morem hauſtum trifolii fibrini, huiusque ut & Cornu Cervi deſtillatum oleum goſſipio aure exceptum, poſt diligentem mundificationem per linteum aqua trifolii fibrini calida imbutum, potumque ordinarium cereviſiæ cui trifolium fibrinum inſuium eſſet, ut illi principio Aprilis 1675. præceperam. *D. Joſeph Langelotti.*

## Obauditiſ.

Pro auditûs difficultate juſſi eum aquam ex ſellibus auribus indere eaque interiora madefacere, nec diutiùs retinere, ſed poſtquam effluxit aures bombyce moſchatâ obturare. Aqua ex ſellibus deterſiva ita paratur.

℞. Rad. raphan. porr. cœpar. ann. ʒj. cyclamin. ʒß. helieb. alb. ʒj. fol. origan. ſicc. ʒiij. rutæ, majoran. an. ʒij. flor. lavend. ʒj. ſem. ſenicul. cumin. an. ʒj. bacc. laur. numero 15. contuſis addie teilis vaccin. ʒj. (forte ʒj.) vit. alb. q. ſ. ad pultem formand. deſtill. in B. M. & ſervetur aqua. Suffitum etiam excipiat ex decocto bacc. lauri, ſem. carui, rad. caryophyll. iridis, fol. rutæ, ſalv. beton. myrrhidis ſpondyli an. cum vino. *Felix Platerus Obſerv. lib. j. pag. 125.*

Dolore dentium intolerabili pridem cruciabatur Dn. Eraſmus Vindingius, Vir magnorum meritorum, qui neque noctu inducias dabat. Cum alia remedia fruſtrarentur ſpem nec levarent dolores, conſilium in arena cepit. Media nocte lecto ſe proripiens, dormientibus ſamulis, exiliendo ad menſam corpus agitavit concuſſitque propulſitque ex loco ſuo dolorem vel doloris cauſam, itatimque levato dolore ad quietem compoſitus, ex eo tempore ab iſto ſymptomate immunis fuit. Nuper idem conſilium Joanni Trochilli Procuratori Urbis de auditûs difficultate conquerenti ſuaſit ſelici quoque ſuccellu. Scilicet ſubſultu illo corporis ſeu, ut cum *Plauto* loquar, inſultura & deſultura; pellitur loco noxia materia, quæ vel dentes vel aures occupat. Non ignotum antiquis remedium hoc genus. Teſtis eſt *Oribæſius* l. B. Collect. Med. c. ʒj. qui ex Antyllo refert, exilire accommodatum eſſe diuturnis morbis capitis, thoraci, materiæ quæ ad partes ſuperiores propenſa fertur: ſaltationem quoque ad nares, quæ Lacanæ mulieres utebantur, caput purgare & ſiccare. Differre verò monet exilire à ſaltando: nam exilire eſſe curſui ſimile; quum eodem in loco corpus manet, poplites inſectendo & circumvehendo; ſultum verò eſſe ſermè crurum continuum. At ſubſultus quo Vindingius noſter Magnus ſuam odontalgiam diſcuſſit, pedibus ſurſum deorſum in eodem loco motis, corpus quoque deorſum ſurſumque concuſſit, & quæ dentes occupaverat, materia deorſum quoque

propulſit. Ita & diſcuſſit ex auribus ſive ſtutus ſive obſtruentes humores. Affinis huic eſt curatio: quæ quocunque corporis dolores exteriores & tumores, pugnis vehementioribus parti dolenti impactis domare annuum alium vidi; ut quaſi ſultibus molliores ſiant magis, quam ullis emplaſtris. Quæ de ſubſultu dixi, propriis Magni Vindingii noſtris verbis confirmabo, ſicut ipſe conſignavit. Ita verò ille.

Ante annos plus minùs quindecim poſtquam ſtato tempore cubitum ieram, aliquantum obdormiveram, acutiſſimus dentium dolor mihi ſomnum excuſſit, duravitque iſ aliquot horas, rumpo tandem patientiam: de lecto ſurgo, & me propinquæ menſæ applico & pulvinum in tenebris forte repertum nudis pedibus ſubdo, & manuum, quibus menſam apprehendi, ope ſubſilire incipio toto corpore, pulvino pedibus inſiſtens: cœpit ſenſim remittere dolor: poſtquam me ita ad octavam horæ partem exercue-ram, redeo cubitum & mox lenis ſopor occupat artus, nec ullum diſcutio ſomno ſenſi dolorem.

Accidit his diebus notiſſimum in hac urbe cauſarum Patronum Joannem Torchilli ſ. agentem cauſam apud conſtitutos à Rege Judices M. Wibe & me ob deſluxum humorum ad aures difficillimè audiri, quæ vel ab adverſæ partis Patrono vel à Judicibus dicebantur: cum dimitterentur diſceptantes apud nos quæſtus eſt ſe hoc aurium vitio pluſculos meſes laboraſſe. Rediit in memoriam quo modo ante annos quindecim dolorem dentium repulſilem: putaviſſe eodem modo audiendi difficultatem ex humorum in aures deſluxu ortam tolli poſſe. Docui eum rationem à me initam. Perſuit conſilio & cum iterum apud nos in eadem cauſa poſt aliquot dies compareret, ea audiendi facultate præditum deprehendimus ut quæcunque vel ab adverſa parte, vel teſtibus, vel iudicibus dicerentur haud difficulter auditu perciperet, ſine ulla vocis intentione. *Gottſchedi Chriſtiani Wicſleri.*

Juvenis ſtudioſus à ſeptennio aure dextrâ difficulter, & aliquando vix audit. Cura ejus ſic fuit inſtituta. Primo purgatus fuit pilulis anethinis, poſt ſcarificationes factæ ſunt circa ſcapulas & cucurbitula admota. Poſtea uſus eſt hoc topico, quod

℞. Spir. formicar. tartar. redif. ſaſſafrati an. ʒß. extr. cattor. ʒj. ol. ſuccin. ſeu ſpiritus gutt. x. m. Mixturam cum bombyce exceptam intrudat in aurem, & illibi per diem & noctem ſervet, applicato ſemper preſſus linteamine intenſe calefacto, pro impoſita medicina in actum tranſpirationis intimioris promovenda: *M. B. à Bernitz Faſc. Medic. Tur. 9.*

## Surditas.

Adoleſcens quatuordecim annorum Lendena-riensis me convenit, qui ab utero matris laborabat obſtructione alterius auriſ, à carne quadam denſa, nonnihil tamen circum circa eroſa, quæ aſſiduè ichorem purulentum cum tœtore effundebat, totumque meatum auditorium obſtruebat, uſque ad membranam tympani. Facta expiatione totius corporis, deveni ad operationem Chirurgicam, parato inſtrum-



mento inſtar voſſellæ intus cavo, prout Aqua- pendens ad polypos extrahendos effinxit, quo ſerramento ſæpius in aurem immiſſo, ſenſim ac ſenſim ſerè totam carnem luxuriantem eduxit; atque alio poſtmodum candente, per canulam inſinuato, particulas carnis ſuperſtites inuſſi, adhibitis medicamentis cruſtas removentibus; cum exſiccantibus induxi cicatricem, ſanitatique ægrum reſtitui, auditu incolumi, qui antea abſolutus fuerat. *Petrus de Marchettis Obſ. 28.*

Cum ſatis purgata eſſet mulier quædam ſurditate laborans, vetula quædam illi conſuluit, ut granum unum vel alterum moſchi opt. in bombace niſceret, & auri perpetuo imponeret. Hoc remedio præter omnium ſpeni ab omni ſurditate liberata eſt. Ego multos quidem, quibus auris ſanie longo tempore maderet, curavi ſolâ impoſitâ bombice vel cottone, in quo moſchus reſervatur, quod & aurem exſiccat, & ſimul ſurditatem tollit. Mulier quædam oleo murino (mures enim rec. natos ſine pilis mace- ratat oleo) utebatur cum miraculo ad aurium ſurditatem. *Gisbertus Horſſius* aquam ex illis diſtillabat & eam in aures immittebat. Arculanus medicus ſuo tempore inſignis in nono ad Al- manſorem ſcribit moſchu in cottone involu- tum, & in aurem poſitum egregiam prærogativâ habere in curando ſurditatem; ſed in mulieri- bus juvenculis ſuffocationi uteri obnoxiiſ nequaquam convenit. *Petrus Forſſus Obſ. 15. & ſchol. lib. 12. de Aurium Morbis.*

Judæus quidam Empiricus ſurdo medicamenta quædam ſuppeditavit quæ cum ego ſatis probem, volui ludioſis ea communicare. Ea hæc ſunt. Conciatur lixivium ut fieri ſolet ex cine- re juniperi, & fluviali aqua; lixivii capiat lb. ix. cui inſundantur per viginti quatuor horas ſer- pill. flor. chamæm. abſinth. matricar. an. m. β. baccar. lauri, rad. ireos an. ʒj. rad. aſari ʒiβ. contuſa inſundantur. Deinde eo lixivio abluat caput aliquoties.

℥. Succi portorum, ſucci abſinth. ol. amygd. amar. petrolei an. ʒβ. m. Deinde ea miſtura im- pleantur capæ duæ excavatæ ac earundem cor- tice tectæ; atque ita ſub cineribus calidis co- quantur. Coctis iis ſuccus exprimatur, qui ſæ- pe in aures inſtilletur.

℥. Aceti acerrimi lb. j. ſtercor. columb. rec. q. ſ. mixta hæc indantur in ollam novam, coq. ad mediet. conſumptionem. Deinde cooper- tam ollam cruſta panis larga in medio perfora- ta, & impoſito aptè emboto, auri ſubſiciat; at- que inde exhalantem vaporem in aures exci- piat, veſperi iturus dormitum, continuet ad duodecim dies, & quaternis quibuſque medica- mentum reiteretur. Hæc medicamenta poſt ri- tè purgatum corpus adminiſtrentur. *Reinerus Solenander. Conſil. 4. Seſſ. 1.*

Plurima gravis auditus ſunt remedia, neque ſemper obtemperat uni, ſed ex deterſo ritè tympano, & inſuſo liquore ſtatuſ diſcutiente, maximum plerumque percipitur emolumen- tum. Nihil utiliſ urina leporina, ſive ſeorſum ſeu cum ſpiritu vini auribus calidè inſtillata: cujus frequentior uſus multis opitulatus fuit & quidè præcipue Proxinetæ cuidam Amſtelreda- menſi, qui eo ſurditatis jam devenerat, ut neceſ- ſe foret; palimpeſto, ſive cartæ deletili inſcri- bere, ſi quid illi verbis communicatum vel-

les. *Nicolaus Tulpius Obſ. 15. lib. 4.*

Thonerus p. 117. obſ. gloriatur, ſe Eccleſiaſten ex tebre continua per metallum materia, u- ditus difficultate laborantem ſola aqua Antha- lina cum bombace auribus immiſſa, curaviſſe. De ſucceſſu etiam haud dubito, ſi materia non ut copioſa & ſi potiùs vaporoſa, quam muigni tenacitate & craſſitie pollens. Si enim hæc conſiſtentia prædita nervum auditorium occu- pet & a calore p. n. induretur, haud ita facile tollitur, ſed medico multum negotii facit, ut ſequenti obſervatione patebit.

Præſectus quidam aliquot p. gorum labora- bat febris continua maligna cum pleuritide ſpuria, quibus idoneis remediis ſublatis, febris lenta cum totali auditus abolitione ſequebatur, ita ut maximos clamores & penetrantiſſimos ſonitus, ne minima quidem parte perciperet, Criſtin hanc eſſe imperfectam ſive metallinam materiæ, nullius dubitavi. Cum autem de cepha- lalgia & dolore aurium ſimul conquerere retur, ab- ſceſſus futuros exiſtimavi & diſcutientia dolores mitigantibus additis applicavi. Quibus quidem dolores evanuiſſe, ſed ſurditas perſeverabat cū febricula lenta. Corpus purgavi decenter alte- rantibus ſubſequentibus. Febris ceſſabat, om- nia munia exequi potuit, ſanus alioqui præter auditum. Totus applicavimus, cucurbitulas dorſo & brachiis aſſiximus, caput decoctis her- barum lavavimus; aurium cavitati aquam Anthalinam & aliâ diſcutientia indidimus, & ſex- centa alia tentavimus omnia ſine levamine. Tandem ſumum tabaci ordinavimus & cucurbi- tulas poſt aures aſſiximus, quibus tandem per- ſectæ ſanitati reſtitutus eſt. *Gottſfredi Chriſtiani Wintleri.*

Clariffimus Dominus D. Gablovitzki, ſer- piè defuncti Epifcopi, Caroli Ferdinandi, Princ. Polon. & Succ. Medicus ordinarius, in ſympto- matica ſurditate, cum dolore Sac. Reg. Mai. Anno 1648. menſe Januario, auri ſiniſtræ ſuper- veniente, commendabat colocinthidis ponum, cum calefacto oleo amygdalarum amararum be- ne imprægnatum, poſt fortiſſime expreſſum. De expreſſo hoc oleo colocynthinato cum bomba- ce excepto, ponatur in aurem bis vel ter in- dies. Ex conſilio autem DD. Cnoſſelii obſer- vavi, auditum S. Reg. Mai. brevi poſt reſtitu- tum fuiſſe, ſpir. tartar. ſaſſaſtrato, leviter re- poſacto, & bombace excepto, atque in aurem poſito, ſuppoſitis ſtatim linteaminitus probè calefactis ad extra per dimidiam horam. Anno 1649. rediit dolor, cum ſurditate, ſtrepitu & fluxu excrementoſo, ubi Cl. Cnoſſelius denud præſcriptum remedium repetiit, ſed abſque le- vamine, unde & baſſamum hoc adhibuit, quod

℥. Spir. tartar. rectificatiſſ. ſaſſaſtrati, elixir. propriet. ſine ſpir. tartar. an. ʒβ. ol. hyperico- nis, ſuccin. an. ʒβ. ſimili dicto modo fuit adhibi- tum, & S. R. Maſteſtas ex reiterato uſu per tres dies iterum convaluit. *M. B. à Berniz ſaſc. med. Tit. 19.*

Medicus noſter, ac Chirurgus Cornel. Solin- gius nuper mecum literas quaſdam communi- cabat ad ipſum à ſatre Hercule Solingio Gorco- mini Eyl, alias Andel Workornium inter, & Hoef- dam ad aggerem ſito, rulticus quid. m 40. an- norum nomine Giſbertus, natus in civitate Campenſi habitavit, qui illuc anno 1666.



mutus, & surdus cum campanis quidam ( ut solent ejusmodi homines ) ad colligendas elemosinas dvenerat. Quem, cum laboriosus esset admodum vidua quidam, etiam surdastra, misericordia ducta hospitio excepit, ita ut ab eo usque tempore res perageret rusticas, in quibus diligentem se, solertemque præstitit. Postquam vero ibidem per biennium laboribus insudasset, ac aliquando solim quidam foderet, contigit, ut inter operandum campana audierit sonum quod digitorum suorum alimone talibus suis satis indicabat, & ab eo usque tempore auditum conservavit integrum. Duodecim autem post annis die 12. April. 1680. cum confortio cuidam interfuisset Dominica palmatum, ancilla heræ cui famulabatur, lecto ipsam incumbere rata pro more domum cecidit, lectumque perijt. Ille verò multa denarium nocte reversus, januam reperit clausam, quapropter vicini sui domum adiit, à quo communiore tunc temporis lecto destitutus ad fratrem dimissus est rogatusque fuit, uti mature domesticos excitaret lecturo die, qui Luna esset, nullo mune mercatum adituros Gordoricensis. *Ubi deum ergo in prædicto foenili decumbens vocem quidam, uti postea retulit, audit vel forsitan sibi audire visus est, vel somniavit, etiam nrem: surge, Gi. berie & loquere* ipse ergo surgens mox vicini domum adiit, cujus ostio frustra ter pulsato, Heræ fores pulsavit; tunc ancilla surgens rogabat, quisnam adesset, cui ille: ego sum *Gi. berius*; Deus mihi linguæ restituit uum: quod minus credens ancilla, diuulsiore que vitæ homines ad se suspicata, qui domum ingredi contentur, janua non aperuit. Coactus ergo fuit *Gi. berius* vicini sui domum repetere, cujus uxor, quæ interea surrexerat, ut se itineri accingeret Gordoricensi, strepitum quendam ante fores uauit, quapropter accurrens quis esset, rogavit; *Gi. berius* autem se nonnullam illa accedens cognoscentique exclamavit: Tunc ades, *Gi. berie*, & loqueris. Ille uem non sine amplexu respondit: *Deus mihi linguam restituit, ipsi sum nos, & g'ra.* Unde uxor stupefacta primo quidem loqui non poterat, sed tamen perumpet ad se rediens, quo pacto loquendi recuperasset uum, rogavit, quare ipse quicquid sibi accidisset, narravit. Adventante autem, quo uxor discederet, tempore, *Gi. berius* maritum adiit, eique rem significavit: omnium autem primo non uiderit illa se ad meas ( ita scribit *Hercules Soli gin* ) contulit ades, ut nonnulla emeret. Dum autem nos simul ( ita pergit ) pranderemus, intravit & *Gi. berius*, quem quidem unà ad prandium invitabam, sed verecundior ille ( uti videbatur ) abnuuit. Interroganti igitur mihi, quid mihi uenis ille ad comedendum accederet, vicini uxor, tui, dixit, causa pudore afficitur, ac mox singula exposuit, quæ ipse etiam confirmavit referens, quomodo primo in pagum pervenisset. Famulam autem quæ cum simul diu habitaret, postea uxorem duxit, sed cum ipsa diu in matrimonio non vixit, toto illo tempore valedudinarius admodum. Uxore itaque sine liberis relicta, satis cessit anno 63. mense Martio. Quæ relatio ( ut ait *Hercules Soli gin* ) non tantum verissima est, sed & centenis aliis testimoniis, si-

quidem opus foret, confirmari posset. *Cornel. Siapart. Cent. 2. Observationum p. 35.*

## AURIUM MORBI.

ubi scilicet

*De earum Doloze atque Inflammatione, Ulcere, Vermibus, Caruncula obstruente, Humiditate ac Fluxu, rebus externis immixtis & Parotide, agitur.*

**U**T Aurium morbos explicemus, nihil opus est partes has uelcribamur quæ tum idem mox ubi *Auditus Lesionibus*, dedimus.

*Dolor auris* saepe inflammatione, saepe absque illa oboriri solet. *Inflammatio* autem saepe est cum abscessu cumque consequente ulcere in meatu auditorio, aliquando etiam consequatur vûnera & contusiones.

*Ulcus auris* fit per rupturam abscessus in meatu auditorio partibusque maxime vicinis, vel per acrimoniam liquoris alicujus ex aure iustantis, aut ab extra in eam immixti ex eo autem ulcere prodire possunt *vermes* quales traxissime videntur in tali.

*Res extraneæ* variæ in aurem immitti possunt, scilicet. pisa, globi, nuclei, animalicula, velut ar. uex, grilli &c. de quibus vide in sequentibus.

*Caruncula aut excrescentia autem obstruunt* tum ab eisdem ulcere, tum etiam sine eo, quæ in eis in aliis corporis partibus ejusmodi excrescentias progigni videmus efformatur.

*Humiditas & fluxus aurium* vel a glandulis, membranam meatum auditorium ex parte obvellicantem, occupantibus pius nimium turgidis, unde scilicet serum copiosum depulit, quod tractu tenporis in purulentum quid uat, lacerata sc. & ulcerata prædictarum glandularum conpage per feri acrioris non tantum importunam alluvionem, sed quasi munditionem enascitur. Vel eadē etiam immixtis a partibus vicinis aliquando sufficitur per cauales cacos, aut viis quibus sibi excavat humor aggestus.

*Parotis* est tumor contra u turam glandulas quæ pone & circum aures sitæ sunt, quæque cerebri emunctoria vulgo dicuntur, occupans. Est autem vel *critica* vel *symptomatica*; illa à morbi præcedanei materia mitiucata quæ vi naturæ eo depulsa provenit; nec quæ sine ullo morbo præcedente, à causis iisdem quæ in omnibus aliis inflammationibus, quales supra ex parte in Augina, inter uerò sub inflammationis titulo, describere uis, efformatur. Rursum *Parotis* alia est *venenosa* & *persistens*, alia minimum.

De *Prognosi* istorum affectuum hæc habeto. *Dolores aurium* præcipue qui in ipsius meatu sentiuntur sunt semper violenti, si autem febri acutæ superveniant, illique accedant deliria, insomni, convulsiones, & leipothymia, infausi sunt sane ominis. *Inflammationem* si sequatur *abscessus* pessimum est; si uerò abscessus in *ulcus* terminetur, hoc difficillimum est curatu, propter materiam fassam e glandulis vicinis continuo suffectam quæ reuunionem ac cicatrificationem quam maxime prohibet. Si uerò ulcus in meatu ossis, sc. meatus auditorii parte tympani



uo viciniore posita fuerint, præterquam quod caviem prompte inducunt, difficilius etiam sanantur, quam quæ in ejusdē meatus parte anteriore collocantur, quia canalis ossis versus tympani membranā declivis est, & ubi in planum descendit fossam efficit notabilem, è qua pus difficulter eximitur. *Humiditas aurium* effluens à pluribus præservat capitis symptomatibus, uti in infantibus frequentius, & in adultis etiam, sed rarius, observatur.

*Vermes cum nimiam corruptionem denotent* nihil boni portendunt. *Res externa auribus immissa* maxima ut plurimum cum difficultate eximuntur, præcipue si profundius introducta, aut figuræ rotundæ fuerint, quia non facile arripi pro ejectione queunt. *Excrecentia fungosa* in cancrum quid frequenter abeunt, *cariosa* verò excisione curantur. *Parotis* febris die critico superveniens cum signis concoctionis, bona est, sin minus, mala, quæ vero per febris decursum, hac nullatenus remittente nascitur omnino est perniciosa. Si Parotis intrò repellatur, aut per se sine ulla prægressa evacuatione subito retrocedat, delirium imò phrenitis aliique cerebri inflammati affectus promptè oriuntur. Parotidem si nulla sequitur suppuratio malum est, ni larga hæmorrhagia aut alvi fluxus superveniat, hæc autem cum de alvi fluxu verba facimus, illumque parotidibus non suppuratis supervenientem faustum dicimus, de Parotide pestilenti hoc dictum volumus quæ cum alvi fluxu ægros enecat. Parotis sine malignitate Juvenes gravior exerceat quam senes, & curatu contumax est, si fuerit ab humore crasso, lento & viscido.

### *Curationes, Consultationes & observationes à variis Autoribus.*

#### *Curationes.*

#### *Aurium dolor & inflammatio.*

Premissis purgatione & venæ sectione, ad topica remedia confugiendum est: quorum omnium mox præscribenda efficacissima tutissimaque sunt ad mitigandum dolorem, cui quam maximè studendum est.

℞. Ol. rosac. omphacin. nymphææ, amygd. dulc. an. ʒss. succ. solatri depurati ʒj. m. omnia exacte & in aurem sensim instillantur aciu tepida, vel ad ept anferis in butiro recenti liquidus cum oleo rosac. in aurem pariter instilletur, mirificè dolorem omnem mitigabit. Ubi vero doloris causa frigido morbo accepta fertur, vel inflammatio ad suppurationem tendit, *Benedicti Victoris Argentii* emplastrum ex cæpa, foelicissimo cum successu administratur, quod hujusmodi est.

℞. Cæpæ sub ignis cineribus excoctæ num. j. butyr. rec. ʒij. ol. chamæm. & rosac. an. ʒj. croci ʒj. omnia simul contusa & probè subacta ad emplastri formam redigantur, quod temperatè calidum dolenti parti applicetur. *Joan. Zecchini Consult. 62.*

In dolore aurium folium hyoscyami vel tabaci prodest. Internè pulvis anodynus cum specifico cephalico saturni. & globulus, quò fera est consossa laudantur vulgò. Applicetur quo-

que oleum nucistæ cum moscho. It. pinguedo anseris cum lacte caprarum.

℞. Cæpæ m. sub cineribus coctam. butyr. recent. ʒij. ol. chamælin. rosac. an. ʒj. croci ʒss. mucilag. sem. cydon. cum aq. ros. q. s. f. Cataplasma. Prodest etiam oleum rosarum, cui lumbrici terrestres præpar. & loti incoquantur. It. oleum rosarum ʒij. cum acet. optin. ʒss. coq. ad 4. p. consumptionem, post add. laudan. opiat. vel extracti. opii cum spir. vitrioli vel acet. facti gr. iij. m. In causa frigida expertum se scribit Horstius oleum camphoræ præcussissimum fuisse remedium vid. *Forest. l. 12. obs. j. Joann. Michael. in Prax. clinic. general.*

In aurium inflammatione succus sempervivi præstantior est succo ranunculi, ob nimiam hujus acrimoniam. In affectibus aurium interne dentur medicamenta ex betonica, essentia lignorum, & tinctura lign. Tinctur. corallor. quibus miscantur specifica cephalica.

℞. Succ. lactuc. succ. nymphææ. succ. rosar. an. ʒj. m. Ubi materia ad suppurationem tendit, prodest decoctum lactis cum ficibus. Ad rupturam apostematis.

℞. Succ. sempervivi express. ʒij. lact. mulieb. ʒss. m. *Idem ibidem.*

Remedia ad dolorem auris maximè sensilem sedandum diversa esse debent, pro diversis morbi causis. Auspicanda ergo doloris curatio à causarum externarum, antecedentis item & continentis per contrarii ablatione. Si dolor proinde à frigore fuerit sortitus, contra frigus & procellis agiturum ærem deiecienda venit auris, applicatis super urem omnibus illis, quæ calefacere possunt; frigida cum acris & acida auribus sunt minue, ut & repellentia dicta topica applicata, ex quibus læpe majus damnum quam emolumentum ægris affertur, de quibus legi meretur Obs. 82. Ephem. German. Ann. 6. & 7. Præstat ergo species proomento sacculo inclusas cum lacte coctas auribus imponere. Ex gr.

℞. Herb. salv. calaminth. rosmar. meliss. hyssop. flor. chamomil. an. m. sem. fœnicul. ʒj. Dentur incisa pro sacculo. Panis quoque calidus cum sem. carui vel aneth. coctus & discissus auri applicetur sapis. Vel infundatur ol. amygd. amar. rec. cum guttula una vel altera ol. de garyophyll. vel carui, aneth. anis. & cum gossipio moschato auris obtinetur, quæ prædicta remedia sale abundant volatili valde penetrant, hæc e partes facile calefaciunt, poros & canales glandularum aperiunt, & circulationem humorum adjuvant: hinc & convulsionem spiritus formicar. Cum dolor verò sit à congestionem feri scil. acris & salis, qui chronicos & molestos affectus producere solet, hinc conveniunt spirituosæ, quæ tamen cum cautela applicanda sunt; nihil spiritibus auris magis alienum est, quam humor talis peregrinus: excipiat ergo in cum tñem sumus tabaci, vel ethure, mastiche, suecino, gumm. sandarac. Omnia hic quoque conveniunt remedia sale volatili alcalico prædit, aciditatem humorum ferrosorum destruentia, necnon amara, moschata, essentia scil. ad auditum Michaelis sequens.

℞. Fol. asar. m. iij. laur. herb. card. bened.



M. Rad. chin. rub. tinctor. an. ʒij. enul:  
campan. ʒij. baac. Laur. juniper. an. ʒʒ. rorif:  
huar.



mar. ʒʒ. sal. ʒij. sal. tartar. ʒʒ. coq. in vin. colat. ʒx. add. oxymell. scyll. ʒj. m. con-  
ducet quoque sal volat. ol. Cum abicellus fue-  
rit apertus, ad extergentia fugiendum, quæ  
non tantum obstructions referant, sed & muni-  
dant, inter quæ sunt aristol. raphan. rust. capræ  
& amar. ipsæ quoque rad. helleb. colocynth.  
imprimis absinthium in lacte coctum, & per  
injectionem adhibendum, flor. persicor. asarum,  
rosmar. chamomill. ut & ol. amygd. amar. ve-  
lut basis omnium oricorum extern. quæ omnia  
in ulceribus aliisque sordibus proncia sunt, &  
si ulcus valde putridum & foreolum sit, frustum  
spongiz imponatur, quod imbibit pus, ac arcet  
aerem ambientem, & præsertim indatur seq.

ʒ. Elix. vitæ ʒʒ. tinctur. castor. ʒʒ. foetid.  
an. ʒʒ. sp. volatil. sal. armoniac. ʒʒ. camphor.  
ʒij. m. tincturam aloës cum sp. vini paratam  
magnificatio, ad guttulas aliquot immittam,  
vel tinctur. myrrh. & si valde profundum fue-  
rit, balsamum viride nostrum proderit. Cum  
detersum fuerit ulcus, exsicccandum deinceps  
& ad cicatricem reducendum, ubi laudatur vi-  
num granatorum descriptum à *de Vigo*, sed  
cum auris sicca exspectat, possunt in formam pul-  
veris, vel sumi, vel balsami exsicccantia adhi-  
beri, quæ parari solent ex mastiche, succin. san-  
darac. & thure, aliisque *Joann. Dolans encyclopæd.*  
*chirurgic. rational. lib. 1.*

#### *Aurium Vermes.*

In vermibus aurium tum evocandis, tum  
extrahendis, quemadmodum etiam in vermi-  
bus narium & cerebri præstant unguentum ex  
axungia capri & oleo corylicum pauxillo mer-  
cur. præcip. vel mercur. dulci misium (gr. ij. ne  
fiat eichara) & in osticio aurium cum bomba-  
ce impositum *Joann. Hartmann. in prax. chymia-  
ric.*

Ad interficiendos vermes amara commen-  
damus auribus injicienda, ut succum absynth.  
flor. persicor. centaur. minor. decoct. colo-  
cynthid. vel etiam guttas aliquot olei amygd.  
amar. cum oleo tanacetæ, vel oleo diacolocyn-  
thid. maritati; item convenit oleum nucleo-  
rum persicor. cum essentia fellis perdicis vel  
lucii piscis maritatum, sel enim animalis ali-  
cujus hic optime conducet. Sequens mixtura  
oleosa non sine usigni adhibebitur juvamine.

ʒ. Ol. diacolocynth. ʒij. ol. nucl. persicor.  
ol. amygd. amar. an. ʒj. ol. ligni coryl. gutt.  
ij. Sic quoque urinosi hoc in casu conveniunt.  
Ephem. Gallor. anni 1677. commendant  
spiritum vini tanquam infallibile remedium  
contra vermes aurium. Ex remediis hæc illa  
quæ oleosa sunt & spissa, excellunt, & quidem  
eo nomine, quod insectorum rostellæ & pro-  
boscidæ obturent, atque ita eo momento suf-  
focent. Hic & omnia anthelminthica in Ency-  
clopæd. Med. jam dicta proderunt. Sæpe & alli-  
citur vermis imposito dimidio pomo excava-  
to, mox enim vermis ex aure properat in ca-  
vitatem pomi. Et cum acidum viscidum in cor-  
pore peccet ubi vermes hospitantur, hinc hic  
corrigendum est, in quem finem seq. vel simile  
decoctum præscribere soleo.

ʒ. Lign. sancti. ʒij. assafras ʒj. rad gen-  
tian. angelic. an. ʒʒ. bacc. laur. juniper. an.

ʒj. herb. centaur. cochlear. n. m. j. sal. tartar.  
vitriolat. ʒj. m. & coq. in s. q. feri lactis. Colaturæ  
ad ʒxxx. add. oxymel. scyllit. ʒj. vel delicatu-  
lus intund. vino & amara potant interponi.

ʒ. Elix. absynth. canph. ʒʒ. Elix. vitæ ʒv.  
Tinctur. corallor. ʒj. ol. assafras gr. xv. ol. au-  
rant. gr. x. m. assinantur 60. guttæ in vino  
mane stomacho; jejuno, dentur per septimanam  
bis pilulæ seq.

ʒ. Resin. guajac. ʒʒ. gumm. ammon. gr. iij.  
mercur. dulc. gr. iij. ol. assafras q. s. In infantibus  
quibus non multa exhiberi possunt, so-  
lum decoct. rad. contrayerv. vel chinæ condu-  
cet, & in vino malv. exhibeantur guttulæ 6.  
vel 9. seq. Mich.

ʒ. Elix. vitæ ʒj. sal. volat. oleosi ʒʒ ol.  
assafras gr. x. m. Externe conducet in uicere  
ipso seq.

ʒ. Elix. vit. ʒj. tinctur. myrrh. ʒʒ. Spir. sal.  
armoniac. ʒij. Extract. centaur. n. m. gen-  
tian. an. ʒʒ. canphoræ ʒij. ol. lign. sancti. m. Si vero  
alia animalia in aurem irrepserint, ea variis  
blandioribus elicienda sunt, vel lacte, vel oleo  
olivarium, scorpiion. Legimus exemplum in  
Ephem. ann. 4. obs. 30. quod grillus in aurem  
irreperit, & immixtis 8. guttis olei gallorum  
cum oleo olivarium parati, grillus in aure  
corpit. Simili modo aurium illa vespa seu sco-  
lopendra parva, portione pomi dulcis recens  
incisi & auribus admota elici potest, ut puer,  
ex suasu D. Riverii pilis caninis in globum  
convolutis & auri insertis allicitur, ut eisdem  
inhærens unâ cum iis eximatur. *Joann. Dolans*  
*Encyclopæd. chirurgic. rational. lib. 1.*

#### *Carcuncula Auris obstruens.*

Ad extrescentias fungosas & carnosas Auri  
adnatas vel innatas tollendas meretur legi  
Obs. cent. 3. *Fabric. Hildani*, ubi describit ex-  
crescentiam fungosam & scirrhosam, quæ me-  
tui innata erat post abscessum, antequam vero  
illam aggrediebatur, præparabat cum cura  
ægrî corpus, quo facto, quantum poterat, au-  
ferebat. Si excrescentia hæc magna est, & ex-  
tra meatum prodit, abscindenda est vel torcicis  
cuspidæ, vel cultello incisoria, vel etiam filo  
liganda, & dein abscindenda, ad sanguinem  
sistendum liquor stipticus usurpetur, & eichara  
inducatur, sed cavendum, ne membrana  
interna lædatur causticis. Eichara inducta appli-  
canda sunt aliquot guttæ olei olivorum vel amygd.  
dalar. ad eandem separandum. Alii illuminant  
unguentum fuscum Würtii. Deinceps deterfi-  
vis & mitigantibus remediis utendum, ut in-  
carnetur ulcus & cicatriscatur, subinde tamen  
multis ejusmodi remediis, quæ renascentiam  
fungorum impediunt, ut sunt omnia acidum  
imbibentia, ex. gr. C.C. vlt. pulv. myrrh. pom-  
phol. sacchar. vitriol. paululum cum vitrioli  
solutum in sufficienti quantitate decocti, alijus  
vulnerarii admodum proficuum erit, si inje-  
ctiones ex hoc liquore fiant in aurem, & tor-  
menti aliquantum hoc liquore imbutum in au-  
rem imponatur, & imprimis utile erit tormen-  
tum, si facile possit imponi, compriunt enim  
ulcus & excrescere carnem prohibet. Ad can-  
crosas excrescentias nulla cura superest, nisi  
ab initio pars superflua extirpetur & radici-



citius tollatur, tollitur enim fungus ex aure scirrhusus vel instrumentis vel ligatura vel caustico, & si hoc fieri nequit, cura palliativa utendum, & tantum majus incrementum impediendum, & hoc obtinere possumus, si quotidie parti affectæ inspergamus pulveres ex aristolochia, myrrha, saturno, saccharo, vitriolo, lapid. cancror. calce viva & similibus paratos, quandoque & opus est præcipitato, si hic non suffecerit, malum lethale est. In minori vero casu interna, imprimis diaphoretica remedia non negligenda, quæ jam ad nauseam usque superius diximus. *Joan. Dolani. Encyclop. Chirurg. lib. 1.*

#### *Aurium humiditas & fluxus.*

In fluxu aurium perpetuo, inque colluvie laudatur urina puerorum destillata, immissa in aurem ad gutt. aliquot etiam usque ad x. Relinquitur immissa urina aliquandiu (mane quotidie ventriculo jejuno) postea inclinato capite denuo emittitur. In hoc casu necessaria sunt purgationes capitis, vel medicamentis communibus, pilulis, vel etiam ex panchymago-go vegetabili. Item specifico purgante Paracelsi. Datur præterea decoctum guajaci pro potu. In pueris, qui propter humiditatem potissimum huic morbo obnoxii sunt, non deperandum ad curam, sed malum ætati crescenti relinquendum. *Joan. Hartmann. in Pract. Chymiatric.*

In aurium humiditate prodest externè essentia absinth. spir. urinæ non adeo acris neque sæpe rectificatus, oleum amygd. amarar. ol. stillat. absynthii, urina puerorum non destillata &c. *Joann. Michael in prax. clinic. general.*

#### *Res externa auribus immissa.*

Si corpora externa in meatum auditorium incidant, ante omnia hæc extrahantur, quod ut dextre fiat, perpendendum est, an corpora talia sint ut emoliri possint, sicut pisa, vel an dura sint, ut globi vitrei, plumbei, nuclei, &c. videndum etiam est, an corpora ista in meatu cartilagineo, an verò in meatu osseo lateant. Si corpora mollia sint & in meatu tantum cartilagineo, eò auferendum, ut frangantur, vel cochlear ab *Hildano obs. 4. cent. 1.* designatum pone ea adigendum, quod in parte flexili, qualis est cartilago auris, haud difficile fieri potest, atque ita eadem extra meatum protrahi: idem fieri potest circa corpora dura, quæ sunt in eodem loco, & cochleari vel terebello eximi possunt. Quod si verò corpora extranea in meatu osseo hæreant, illumque in totum adimpleant, difficillimum est ea cochleari vel terebello eximere; melius verò est incisionem facere pone aurem, & versùs ejus partem superiorem, id quod hoc loco satis tuto fieri potest, cum nullum ibi vas sit notabile, eo modo evitari quadatenus potest obliquitas meatus, & adhiberi terebellum cujus usus potissimum est in globis plumbeis extrahendis. Sed prius injicienda sunt ad vias lubricandas varia olea, præsertim vero amygd. dulc. & si nucleus vel pisum, in meatum osseum fuerit intrusus, qui propter figuram ovalem utraque sui extremitate posset adprehendi, utendum est instru-

mento descripto à *Fabric. Hildan.* quod tenaculum nominat, oportet autem ut in genina curâ conficiantur hujusmodi instrumenta, ex optimo chalybe, ut tenuia fieri possint, & si incurventur, ex seipsis iterum recta fiant. Sed cavendum in his operationibus, ne membrana tympani lædatur. *Joann. Dolani. Encyclop. Chirurg. rational. lib. 1.*

#### *Parotid.*

Parotidis curatio perficitur diætâ, quæ humoris qualitati in ciborum qualitate & consistentia contrarietur. Si ingens subit inflammatio & robur quæ sanguinis copiam indicent, sanguinis missio erit utilis, immò necessaria. Topicorum verò adhibendorum non debet hic simile esse judicium quod in reliquis tumoribus ut Galenus monet lib. 3. de comp. med. secundum locos cap. 2. nempe initio non est locus repercutientibus, si præsertim criticus fuerit abscessus, sic enim naturæ conatum sese morificæ materiæ impetu in eas partes expedientis impediremus. Multo vero minus repellendum est, si materia quæ eò defuit sit venenata, inde enim ejus funestus contingeret recursus ad partes nobiles. Quare chirurgus potius dabit operam ut attrahatur & proliciat humor ille. Quanquam si adeo inmanis fuerit fluxio, si dolor adeo acris, ut inde metus sit vagilarum & febris, quæ vires prosternerent ex usu futurum censet Galenus, resolventibus multis non nihil admiscere repellentium. Quare initio ejusmodi imponetur cataplasma.

℞. Farin. hord. & semin. lini an. ʒij. coquantur cum mulla aut decocto chamamel. addendo butyri recentis & olei chamam. an. ʒj. f. puls.

Vel. ℞. Butyri recentis ʒij. ol. chamam. & lilior. an. ʒj. unguent. di. lthææ ʒß. ceræ parum; fiat linimentum admoendum cum lana succida parotidi. Dolore mitescere ex usu erunt discutientia & resolventia paulò validiora. Ut.

℞. Rad. alth. & brion. an. ʒij. solior. rutæ; puleg. origan. an. m. j. flor. chamamel. melil. an. p. j. coquantur in hydromelite, pistentur, trahantur addendo farin. semnigr. orobi an. ʒj. pulv. ireos Florent. chamam. melil. ʒij. ol. anethini & rutacei an. ʒj. f. cataplasma. Quod si amplius resolvere fuerit consilium, uti poteris emplastro oxycroceo, de meliloto, diachylo ire. to. Si concreverit illic & induretur humor, convertes te ad ea medicamenta quæ capite de scirrho fuerunt præscripta. Quod si ad suppurationem tendat, sequens appones medicamentum.

℞. Rad. lilior. & capar. sub cineribus coctarum an. ʒij. vitellos ovor. numero ij. axung. suill. & unguent. basil. an. ʒj. farin. sem. lini ʒijß. fiat cataplasma. Suppuratione autem factâ materiaque probe evacuata, ulcus leniter tractandum erit, non irritandum affectæ partis ratione habita. Si verò tumor fuerit pestilens & contagiosus, adde theriacam & alia alexiteria pharmaca. *Joann. Vigierius Chirurg. lib. 1.*

In Parotide oleum fortidum Guajaci vel tartari juvat, si adest exulceratio, mollificetur locus, quo facto inspergatur pulvere menthæ (ulcere rupto) & ulcus sæpius eluatur aquâ menthæ, adhibito Emplastro convenienti, quale est

*Dia.*



Diasulphuris. *Joann. Hartmann. in praxi. Chymiatric.*

Parotides ubi suam habeant sedem, & quale sit earum, *ut in praxi*, tam nomen ipsum, quam etiam verba Authoris abunde significant. Sunt autem nihil aliud, quam inflammationes tumoris juxta aures erumpentis pariter ac doloris stipata scellitio, quæ ibidem in partibus adenosis seu glandulosis sunt; quarum quædam venenata qualitate ac malignitate sunt suspectæ, quædam vere non. Atque sic duplex parotidum occurrit differentia, ut sponte hoc liquet: Tertia species est, quando parotis frigidam causam agnoscens plane indolens exiit, sed nihilominus in abscessum demit, e quo tamen non pus, sed materia quædam duricula, & ad instar crassi cremoris, imò etiam tartarea & non raro calculosa egreditur. Certissimum autem est, quod parotis seu tumor hic inflammatus pone aures plerumque in laboriosis, hoc est maligais, pestilentialibus, ac purpuralibus febris supervenire soleat, dum Natura ad hoc emissarium superduos humores & quidem tunc corporis venenata, vel ut notanter loquitur Autor arsenicali aura (quæ Reigar alioquin dicitur) infectos à sede seu centro mali nunc tanquam circumferentiam transponit, & ad has ipsas glandulas expellit: Ubi nihilominus negari non potest, quod ex imperfecta crisi febris malignis parotides superveniant, quod tamen fieri tunc præcipue solet, si ab initio graviter compatiatur quoque cerebrum. Unde etiam nullum est dubium, quod febris malignæ solutio illa, quæ sit per Parotides, minus fida & secunda sit, nec semper salutem certo polliceatur, præsertim si non debite accrescat hujusmodi tumor, sed retrocedat potius ibi stibulans virulentia, id est, etiam si accrescat febris, attamen & altius ferocia non remittat, & magna insimul subsit prostratio, siquidem hujusmodi crisis per abscessus facta validum virtutis robur exoptare soleat. Magis igitur ob dictas causas quandoque lethales sunt excrecentes hi prope aurium regionem tumores, quam ipsæ febres malignæ, quibus superveniunt: Ex adverso autem salutares non immerito judicantur parotides illæ, si vires supersint, quò humor impactus rite resolvi ac suppurari mature queat.

De parotidibus illis, quæ malignitatis sunt expertes, hic verborum faciemus nihil, quod facile curari possint per res solventia ac maturantia seu suppurationem promoventia, vel etiam quod sponte non raro evanescere, ac levibus & interne duntaxat sumtis medicamentis, tam purgantibus, quam diaphoreticis, cedere soleant. Quum vero potius & valde accuratam sui curam deposuerint illæ parotides, sub quibus anguis latere, hoc est, quæ à venenata atque maligna provenire causa solent, ideoque album protinus calculum adjicimus Autoris sententiæ, quæ docet, perpetim fontem, unde parotides illæ scaturiunt, esse attendendum, atque proinde febris malignæ hos tumores causantis rationem, nobiliora alexipharmaca, quale est Bezoardicum minerale, ab Autore commendatum, studiosè præbendo, tunc potissimum habendam. Quæ methodo autem febris malignæ curatio rectè celebrari queat, suo

loco docebitur. In eo tamen ab Autore nullo discedere cogimur, dum purgationem in parotidibus à febre maligna oriundis, aut cum ea adhuc conjunctis commendat, quum notum cuius sit, quoniam purgantia in hoc casu sint exitiosa, & propterea planissime nullum habeant locum, quoniam non tantum vires alioquin tunc fractas extreme penitusque prosterant, verum etiam malignitatis virus à circumferentia ad centrum potius revocant, atque sic ad mortis necessitatem solemniter deducunt, sin vero statum declinationis aut convalescentiæ hic submuneat Autor, ubi vires ad se nonnihil redire suspicantur, & malignitatis suspicio nulla amplius subest, parotides verò adhuc præsto sunt, tunc (adhuc tamen sic medendi moderamine) cum indulgentia etiam nostræ id fieri patiemur, licet virtuosi clysteres tutius rectiusque tunc adhiberentur. Cæterum rectissime statuit Autor, repellentibus, seu repercutientibus, ubi malignitatis vigor dominatur, omnimode abstinendum, sed attrahentibus seu extrahentibus utendum potius, ac quidem talibus, quæ vim alexiteriam insimul obtinent. Neoterici Chirurgi hic nobis placent omnino, ac sincerum merentur adplausum, qui ut anthraces atque bubones omnes, sic & parotidum apparentes abscessus atque tantisper excrecentes celeriter ac nulla expectata suppuratione caustici sive actualis illius ac per unctionem celebrati, sive potentialis & per corrosivum facti (quorum hoc tolerabilius ac minus crudele est) administratione aperiendos dicunt, ut materia venenata & insustentabilis citissime & sine ulla mora à corpore amoveri ac educi queat, quoniam si hoc ipsum negligatur, ex diutina mora, dum ad partes principes levissima de causa retrogreditur, plerumque vitæ periculum & mortis repentinus multus imminet: Cui accedit, quod ob naturam insigniter tunc exhaustam suppuratio (quæ ad naturam, causam morificam pro commodiore expulsionem preparantis & edomantis conatum quoque pertinet) tardissime succedat, vel plane etiam expectare eam virulentissimus hospes, vitali officinæ crudeliter insidians, non soleat. Quæ curandi dexteritate observata, seu abscessus venenati apertione accelerata, Autores illi bona hæc testantur, multos plurimosque se hac ratione è faucibus Orci sic eripuisse. Deinde hoc quoque non negligendum, ut jam laudato medio aperti abscessus non statim conglutinantibus ac cicatricem inducentibus claudantur, sed aperti diutius servantur, donec malignitatis sævitia decreverit ac evanescere, adeoque cum bona veletudine in gratiam redire ægrotus incipiat. Quibus verò deproperata parotidum illa caustici beneficio apertura non arridet (sicuti cuncta cunctis placere non soleat, ac quemlibet suo abundare sensu notissimum sit) illis egregium & magneticum hic commendatum præsidium ibimus, cujus virtus uti est probatissima & fidissimis experimentis stabilita, ita etiam tutò & sub rationum favore nunquam non administrari poterit: Accipiatur nempe buso exsiccatas ac probè torridus, sic enim de volatilibus eius partibus, in quibus veneni tyrannis, præsertim vigere solet, indubitato consumtis & dispersis certiores esse quimus) isque



isque linteolo involutus apponatur loco affecto sive tumori maligno, ubi elapso aliquot horarum spatio valde opere bufo ita intumescit, ut quasi revixisse ob torvos cumprimis oculos, quos sic tumefactus ostendit, videatur; quo tacto, is confestim, quod veneno e corpore microcosmum visua magnetica attracto vehementer jam impragnatus ac turgidus revera tunc existat, removendus (vel potius profunde sepeliendus, aut etiam sulphureo funumigio à concepta virulentia liberandus, posteaque soli expolitus denuo exsiccandus) & alius retorridus statim substituendus, atque hoc toties sic iterandum, quoties hanc medendi technam, quæ non immerito inter arcana reponitur, necessitas effugiat. Emplastrum, quod beneficio ceræ ex balsamo sulphuris concicere docet, peculiarem possidet facultatem veneno potenter resistendi, venit nobis etiam comitat, non tantum funumigium cum sulphure institutum tempore petis conclavia egregie à virulentis sordidatibus sive effluviis depurare, verum etiam flores sive lac sulphuris, item alia quoque exinde parata remedia antidotis excellentissimis & inasculis valentibus accenseri. Quum ergo attrahentibus semper aliquid alexipharmaci commiscendum. Autor paulo ante consulerit, Emplastri hujus ex sulphure facti nobilitas sive nobilissima efficacia sua desubito luce resplendet, quam tamen fieri ex admixtione Mercurii vivi præstabiliorem nulli dubitamus; Cujus affecti causam amuleta cum argento vivo confecta reddere ac contemere statim poterunt, veluti hoc etiam in genere circa hæc remedia notum habere sufficiat, quod simile quodlibet suum consimile magnetica quadam adpetentia desideret & attrahat: Atque eatenus etiam mercurius currens cum emplastro sulphureo extra adhibitum malignitatem tumoris nondum aperti retundere dicitur, quatenus nempe virulenta miasmata, quibus tumor ille tunc refertus esse solet, valide attrahit, atque sic malignitatis ferociam imminuit, ac denuo penitus expugnat. *Ciristian. Langius in Patholog. animæ.*

In Parotide si malignitas adest & Parotis sine maturatione evanescit, tunc malum signum est & recidivæ metus. Hic E. usurpanda sunt malignitati resistentia, præcipue expellentia, v. g. C.C. sine igne ac. antimonium diaphoreticum. Externe vero oleum scorpionum. Alias est dolor manifestissimus. Prodest hic oleum chamomillæ destillat. ℞j. cum oleo hyosciami expr. ℞j. m. certissimum est in inflammatione. In Parotide omni cum & sine malignitate mirè prodest specificum cephalicum, cujus hæc est descriptio.

℞. Cinnabar. nativ. Armen. per sublimationem vel sexies vel ultra rectific. cinnab. antimonii toties rectific. ℞iij. secul. rad. Pæon. ℞ij. Mag. epilept. ℞β. mag. cordial. ℞ij. fol. aurium. j. m. f. specificum cephalicum. *Joann. Michael. in Prax. clinic. general.*

## Consultationes.

## Aurium Dolor.

Juvenis 28. annorum, robustus, plethoricus, intensissimo afficitur dolore dextræ auris, quo pene ad delirium adigitur. Adest febricula continua; distentionemque, gravitatem, ac calorem, pulsationemque, non tantum toris, sed etiam intus in aure percipit. Rubor & calor ad tempora & manum ulque percenditur. Interiora quoque auris aliquo modo tinnere & rubere conspiciuntur.

Afficitur in hoc ægro auris dextra secundum partes internas & externas; quod ex querela ægri, item ex rubore, tumore, pulsatione, & calore, circa aurem & in aure perceptis, est manifestum. Afficitur etiam cor & totum corpus; ut ex febricula colligitur.

Morbus qui ægrum affigit, est intemperies sanguinea & biliosa auris dextræ; quæ dolorem, tumorem, pulsationem, gravitatem, & tinnitum, in ea & vicinis partibus, item febrem continuam producit, a potiore symptomate *otalgia* græce, & *dolor auris* latine appellari solet.

Causa a recedens hujus morbi est plethora nostri ægri; pars vero ejus ad aures a corde propulsa, & ibidem propter poros ibi justo magis patentes, auris partibus internis & externis insinuata, ibique corrupta, & inde cum fervore ad cor delata, continens hujus morbi & symptomatum ejus est causa.

Dum enim humor sanguineus biliosus partibus istis insinuatus, nimia sua quantitate partes auris, & vicinorum membrorum replet & extendit, facit in iis tumorem, ruborem, gravitatem & distentionem; & ob arteriarum ex quantitate ista nimia elapsorum humorum pressionem, eorum pulsationem. Dum vero vehementi suo fervore, quem ab æthere materia, vehementius in poris ejus se agitante, accipit, membranas, nervos, aliasque acutissimo sensu præditas auris, temporum, & malæ partes, vehementissimè agitat, eumque motum ad cerebrum defert, intensissimum in iis partibus excitat dolorem, qui, ob suam vehementiam, ægrum nostrum ad insaniam pene redigit.

Morbus hic, ob doloris vehementiam, & acutum partium affectarum sensum & cerebri sympathiam, periculosissimus est. Metus enim est, ne delirium, lipothymiam, cerebri inflammationem, & convulsionem, aliaque gravissima inducat symptomata.

Celeri itaque & accuratissima curatione hic morbus est impugnandus; quæ in intemperiei & tumoris, per contraria ablatione, & doloris sedatione, consistet. Primò itaque tali clystere emolliente, refrigerante, & laxante, fiat corporis evacuatio.

℞. Rad. althææ, lil. alb. an. ℞j. herb. malv. bismalv. parietariæ, lactuc. an. m. j. sem. lini, fenugræci an. ℞i. coq. ex aq. commun. ad lib. j. colaturæ adde el. diaphœnic. di. prun. an. ℞vj. ol. violacei, camomill. an. ℞j. sal. commun. ℞j. M. f. Clyster, mox injiciendus.

Corpore expurgato, & horâ unâ atque alterâ intermissa, vena in dextro brachio aperitur, sanguisque liberaliter, ad uncias decem



præter propter, & clyster atque venæ sectio sequenti die reiterentur.

Interea temporis ad revulsionem humorum, ac intemperiem corrigendam, doloremque sedandum tale n.edicamentum auribus instilletur.

℞. Lactis muliebris recentem emulsi ℥ij. Albuminis ovi in liquorem agitati ℥ss. Milce & instillentur ut aures tepidè citra vehementem aures contractum. Oleum etiam rosarum cum succo plantag. & solani, si ardor ingens sit, instillari potest, præsertim si ei aselli vivi incocci & expressi fuerint: dolorem enim valde sedant. Tali etiam utatur totu:

℞. Malvæ, bismalvæ, violariæ, lactucæ, an. m. j. sem. cydonior. malvæ an. ℥ss. flor. camomill. melilot. an. p. j. flor. rolar. rubr. p. β. f. Decoctio, qua pars affecta leviter & tepidè, cum spongia madefacta & expressa, foveatur. Et post totum tale imponatur cat. plasm.

℞. Herb. malv. bis malv. charcolii an. m. j. farin. sem. lini, fenugræci an. ℥ss. medullæ panis candidi ℥ij. cum lacte vaccino F. C. cataplasma, tepidè cum lin. eis applicandum. Hoc cataplasma resolvit & si materia non potest, etiam suppurationem procurat. Si doloris summa vehementia urgeat, tale narcoticum adhiberi poterit.

℞. Opii Thebaici gr. iij. castor. croci an. gr. j. β. cum lacte muliebri q. s. lubigantur & in aures instillantur. Et sub tempus somni exhibeatur philonii Persic. ℥j. vel laudan. opiat. gr. iij. Ad suppurationem maxime commendatur tale cataplasma ex capra factum:

℞. Capram majorem Num. i. butyr. recent. ℥ij. ol. camonull. rosac. an. ℥j croci ℥j. f. Cataplasma, quod moderatè calidum parti adhibeatur. Facta suppuratione, æger in partem affectam decubabat, ut pus commodè effluat; eluatur auris tali remedio:

℞. Decocti hordei ℥iij. mell. rosar. ℥j. misce; & instilletur tepidè in aures.

In dicta ær sit temperatus, Cibus parvus, refrigerans. Potus cerevisia tenuis, & iulapium ex syr. de limonibus & aqua hordei. Motus vitetur; concilietur omni ratione somnus; atque ideo utatur lacte amygdalato cum syr. & sem. papav. albi. Alvus quotidie respondeat natura vel arte. Vitet omnia vehementiora animi pathemata. *Henric. Regius apud Theodor. Craanen.*

#### Aurium ulcus.

Licet quandoque contingat, ut cerebrum ab excrementitia materia per aures expurgetur, quæ in via pravum quoque potest odorem, atque colorem contrahere; idque absque ulla essentiali aures noxa, attamen hoc calu, cum jam quindecim abhinc annis, à diuturna mora sub radiis solaribus; acerbissimis doloribus aures dexteræ Illustriss. Pat. fuerit diu vexatus, quibus cum febre cessantibus, purulenta materia, non sine aliqua cruoris tinctura spontè excreta observata fuit, ideo inflammationem tunc in aures excitatam fuisse, eamque ab excalesfacto, atque fuso in capite sanguine, ad aures transmissam, manifestissimum est. Aures quidem ut pote naturæ debiles, facilius cæteris partibus fluxionem susceperunt. Ab in-

flammatione autem tunc temporis suppuratione, num ulcus perduraverit, necne, in historia desideratur, in qua de continuo materię effluxu nulla sit mentio, sed de hoc solum, quod tritus post annis à decocto & sudore, in aures sibilus supervenit, qui licet non continuus, temporis tamen progressu sensibilibus & molestior fuit redditus, cum audiendi quoque non levi difficultate; ubi enim aures intra se sonant externum sonum recipere nequeunt, ob vaporosam materiam ab aures intemperie, cum aliquo humore elevatam. Sed tandem, sex circiter abhinc mensibus, quibus Romæ degit Illustriss. Pat. bis fluxionibus à capite in eandem aures tentatus fuit, cum doloribus somnum quoque interturbantibus, qui materia maturata, eademque alba & cocta per aures excreta, cessarunt, cui effluenti portiuncula quoque membranosa immixta observata sunt, intermurmura bombycea immixta, nonnumquam cruore tincta extracta fuit. Quare de ulcere, à disrupto abscessu superflite non est quod dubitemus, non quidem in cochlea, neque in labyrintho, sed vel in tympano, vel in meatu auditorio, cum turunda immixta tingatur sanguine probabili indicio quod ad ulcus pertingat. Verum quoniam ab eadem materia in halitus conversa, ær impuratus continuo inordinate movetur, ideo continuus quoque sequitur aurium sibilus, cum auditu quoque diminuto, tum ob æris eiusdem confusionem, tum maxime ob instrumentorum & tympani potissimum humectationem; ac tandem quia omne recipiens debet esse denudatum quilibet conditione recepti.

Quæ ulcera sunt difficillimæ sanationis, potissimum verò si annua & profunda, idque tum ob excrementa perpetuo à capite manantia, quæ tamen ad sanationem, accuratam exsiccationem postulant, tum quia callosa sunt, cuius ratione eorum cicatrix prohibetur atque protrahitur. Attamen cum materia effluat satis concocta, & à paucis diebus melius se habere videatur Illustriss. Pat. salutis spes non omnino abijcienda.

Pro qua medicæ intentiones erunt, purgato toto & capite, ulcus detergere, exsiccare, sarcoticis implere, & cicatrice obducere. siquidem cum viris istis Excellentiss. soli naturæ opus non esse relinquendum existimo, cum naturalis alterius aures imbecillitas, alterius quoque imbecillitatem supponat.

Quæ re sanguinis missionem repetendam censeo, & quidem prima vice ex lateris affecti brachio, secunda verò ex hæmorrhoidibus, habitus melancholici habitus ratione. Caeterum quoque omnino brachio inurendum, & pedum lotiones familiariter ante cibum adhibenda, prout frictiones quoque scapulis & dorso, matutino tempore non negligenda.

Medicamenta verò erunt Lenientia, Præparantia, totum & caput Purgantia, ab aures Divertentia, & Roborantia. Leniens itaque sit pot. ex manna clarif. addita aqua flor. citri. Præparans sine diluto, quinque diebus, pro syr. maturino assumendum, erit iulap. acet. cort. citri aromatiz. ad ℥iij. cum cremor. tart. quilibet vice. Reperatur evacuatio syr. ros. sol. & de polyp. vel cass. lenit. & tart. Mox ulterior se qua



sequatur humorum præparatio, succis potius depur. quam syr. saccharatis, aut mellitis, qui hypochondriaci non adeo convenire solent. Quare præbeantur succi depur. sonchi, borragin. & betonic. an. ℥iij. in decoct. cichor. borrag. sonchi, eadiv. betonic. majoranz, addito ℥ss. tartar. vitriol. pro syr. & ita pro aliis septem. A quibus præparati humores expurgentur infus. agar. rhab. & sennæ, addito syr. ros. sol. vel elect. lenit. diacath. additi, piul. de tribus superbibat P. Illustriss. aq. Nocer. ℔b. ij.

Purgato toto, purgetur & caput pil. & er-rhinis. Pil. erunt cochæ, aur. & aggregat. epota semper ab iis aqua Noceræ, aut hordeæ, ne exsiccentur hypochondria, quæ tribus vicibus quarto aut quinto quoque die repetendæ, atque vacuis diebus, succi depur. assumendi, ut supra. Interim Errhinum suave erit parandum quo, more tabaci utatur ex pulvere rad. ireos, nigellæ & fol. majoranz. De capitis vero majori exsiccatione non loquor, utpote nimis operosa, quod tamen aliqua conserva capitali erit roborandum, sub ingressum lecti assumenda, è floribus betonicæ, salviæ, roris-marini, & a prandio, rosarum.

Tandem partis affectus, ulceris scilicet, curatio tentanda, atque omnium primò leviora mundificantia sint mel. ros. cum aq. hord. modica dissolutum, quo paulo validius erit mel scilliticum cum succo cæparum, sicut validissimum foret (quo tamen opus non est) Ægyptiacum melle dilutum, valida enim exsiccantia admittunt, imò postulant aures, quæ tamen non sunt infundenda, ne meatum auditorium attingant, sed specillum solùm lana obvolutum insinuandum.

Ulcus deterfum erit exsiccandum, in quem finem Galenus extollit scoriam ferri, in tenuissimum pollinem redactam, cum aceto fervefactam ad linimenti consistentiam, quale exsiccans medicamentum parari poterit hoc modo.

℥. Scoriz ferri subtili. ℥ss. vitriol. ʒj. m. bul. in aceto & vino, & eadem turunda intincta immittatur.

Carne denique impleendum, & cicatrice obducendum ulcus, in quam rem prius suffumigium in aurem præcipi poterit, ex mastiche, myrrha & thure paratum. Mox sarcoticum huiusmodi inducatur.

℥. Cerusæ, tuthiz præp. an. ʒj. rad. aristol. myrrhæ, sarcocollæ, aloes an. ʒj. rad. Ireos ʒj. m. f. pulvis & excipiat melle & succo agrestis, quo turunda imbuta intrudatur.

Quibus omnibus congrua victus ratio erit addenda. Hæc sint in salutem viri Illustriss. præscripta, quæ omnia si adhibere recuset, quod plurimum cesserit affectus, non deerunt selectiora & maxime opportuna eligenda. Ita Deus vota nostra secundet. *Joan. Raymund. Fortis Consult. & Respons. Med. T. I. Centur. 1.*

Illustrissima virgo annorum quatuordecim, temperamenti hepatis paulò calidioris; cerebri vero calidi & humididi, quarto ætatis anno ob luxuriantes in cerebro humores, aquosum per aures effluviū pati cæpit, quod cum à principio per Medicum ordinarium, & Adstantes minùs curatum esset, diuturnitate temporis symptomaticum evasit, ut novem abhinc annis materia fortens, sordida, corroliva, &

sæpius sanguinolenta excernitur, cum notabili auditus gravitate. Pro ejus symptomatibus Curatione, in vitis excretorum enumerandi, à diversis Medicis differenda tentata sunt. Atque in primis præter dietam convenientem, ad eundem Galeni 4. Meth. per Syrupum magistralium, humoris peccantis blandæ, & per clysteria à toto facta est evacuatio. Data post hæc catapotia aliquoties ex alto trahentia, celebrata venæ sectiones; dum etiam de revulsionem & derivationem materię, adhibita cucurbitulæ, cum & sine scarificatione, venatoria, fonticuli in brachio & nucha. Tandem etiam post plenariam corporis & capitis expurgationem, ad evacuationem causæ conjunctæ Masticatoriis & Errhinis pugnatum est. Theriac naturales sulphureæ cathartice, dum etiam ad locum affectum magis exsiccandum, præter Decoctum chinæ pro potu ordinario, Decocta sudorifera ex lignis cum corrigentibus usurpata fuere. Successit usus herbarum Thæe, ut omnium catarrhorum alexipharmaci. Nec ommissa quæ ab intus & extra corpus confortarent, illiusque mali partes mandantes, viscera nempe principalia. Minus neglecta, quæ vires blande detergerent & exsiccarent, ex succis agrim. absynth. vino, mell. ros. urin. pueri impubis &c. sed nec his proficientibus, ad fortiora quæ abstergerent, exsiccarent, carnem generarent, & cicatricem inducerent, descendit est, scilicet ad Decoctum liquorum, sarcocollæ, myrrhæ, aloes, croci metallorum, cum succis: pui, absynthii, agrim. oniz, centaur. min. quæ tepide in aurem infusa sunt; successere suffumigia ex gum. ladanio, sandaracha, sarcocolla, myrrhæ, olibano, omnibus terebinthina exceptis. Tandem ad ipsa etiam metallica adventum est, quæ commendat Galenus 3. de Composit. Medic. sec. loc. & Rhasis 9. ad Almanforem cap. 26. scoriam nempe ferri cum succo agrimon. centaur. minor. absynth. & aceti modico præparatam. Sed irritis omnibus, & symptomatibus, non tantum perdurantibus, verum cum dolore ingravescentibus, cum humorum suar copia non tantum membranas, sed & cartilagineas aurium partes distendat, membranasque musculorum suar acrimonia vellicet; verum etiam cum jam ulcus sordidum evaserit, ipsaque Natura omnes cerebri humiditates illuc ad parotidum glandulas deponat, putarem (salvosaniori judicio) hoc unicum superesse remedium, manuslem nempe atque chirurgicam operationem a perito Artifice faciendam, ne hæmorrhagia major, dolor aut inflammatio succedat; scilicet ut primò secundum longitudinem quatuor communia integumenta ad glandulas parotidas foveantur; postea instrumento ad operationem apto cum cautela eadem glandulæ eruantur, ne vasa majora, venæ scilicet, à jugularibus externis, & interioribus à carotidibus lædantur, & hæmorrhagia incurabilis & lethalis succedat. Quam ipsam Ambrosius Paræus timens glandulas hæc potius filo in fundo earumdem ligat, ut paulatim exsiccentur, flaccescant & sponte decendant. Glandulis hæc hoc modo erutis, cum nullus ibidem humor sese cumulare poterit, omnia præfata symptomata cessabunt: ipse vero humor ad ductuum salivalem principium



derivabitur, ac per eosdem expurgabitur. Et hęc Præclarissimi in arte consummati viri iudicio pensanda deferuntur.

Cum Hippocrates pronuntiaverit, quod *caput dolent & circumd. levis, si pus, vel aqua per nares, aures, ac per os effluit, solvitur dolus*. Ideo credendum naturam totum caput humiditibus scatens per aures olim expurgare tentasse, & intentum obtinuisse. Verum quoniam superstes mansit ejusdem humiditatis in capite reproductio, cum affectus ipse vel à Domesticiis, vel à Medicis neglectus fuerit: hinc factum est quod nova reproducta materia calidior & crassior, ad aures transmissa, erodendo, progressu temporis ulcus excitaverit, non in cochlea, nec in Labyrintho juxta tympanum, auditus enim non solum imminutus, sed olim ex toto abolitus fuisse: sed in meatu auditorio in quo præter cartilaginem & membranam, substantia quoque nonnihil carnea, sive potius pinguedinosa reperitur, in qua ulcus facilius heri & diutius conservari potuit. Hoc autem ulcus abscessum intantum torium non præcessisse credendum, quoniam de intensis doloribus cum febre Nobilissima Puella conquesta fuisset. Ulcus itaque in utraque parte intra aures modo multis abhinc annis Nobilissimam Puellam gestare, sive pati non est dubitandum, cui a capite calida & humida intemperie affecto, continuo catharrhalis ferola materia suggeritur: quæ tamen male olens non esset, nisi ex mora in ulcere ipso corrumperetur, & pravam odorem adipisceretur. Quoniam verò in transitu & aërem implantatum quod immodò turbatum fuisse necesse est, ideo sibilus, sive tinnitus: sicut tympani membrana madefacta, auditus imminutus sequutus fuit. Materiz autem fluxio ab utraque aure adeo copiosa, totque annis effluens, credibile non est quod à glandulis parotidibus ipsis auribus suppeditetur: sed pro certo habendum quod immediatè ad aures transmittatur: etenim adeo copiosa diurna si ad parotidas sese insinuasset, jam molles & tumefactæ tactu, imò & visu perciperentur. Et quamvis ab iisdem glandulis aures ipsæ materiz portionem aliquam susciperent, non tamen in glandulas, sed in cerebrum causa referenda esset, à quo non solum humectato, sed humidatibus referto tanta emanavit serositas, quæ in Infantula retenta faciliè Hydrocephalum induxisset.

Quare si huic inveterato affectui providendum sit, non est qui non videat capitis curam omnium primò habendam esse, illud ipsum ut mali fontem & ulceris somitem exiccando, & residuum fluxionis ab auribus divertendo, ut ulcus postea consolidari possit. Quod consequi quamvis difficillimum fore cernendum sit (propter diuturnitatem affectus) non tamen impossibile, quoniam appropriata præsidia non adeo legitime & perfecte administrata fuisse puto.

Primæ viæ itaque ab excrementis mundandæ. Secundò Totum corpus ab humoribus excrementitiis vindicandum. Tertiò caput purgandum. Quartò Capitis humiditas exiccanda & humida intemperies corrigenda. Quintò si aliqua materiz reproductio superesset, ab auribus divertenda: Atque tandem

ulcus, amoto impedimento, exiccandum & cicatrizandum.

Primam & secundam intentionem viro Doctissimo explendam relinquo; non omitteudo aliquam sanguinis missionem, saltem ex saphirina pedis, cum tempus initet iurgationis necessituz. Pro tertia, pilulas capitales aracelli propono ad 3℔. circa noctis dimidium à primo somno, more Tralliani, ter quarto quoque die exhibendas; & iisdem diebus cithinum ex pulvere majoranz, ireos & nigella paratum. Pro quarta intentione, Decoctum sudoricum pro egregio & unico remedio propono ita parandum.

℥. Ligni visc. querc. ver. ros. mar. an. 3℔. ligni guajaci pinguis rec. chux opt. an. 3℔. aqu. stillat. cichor. beton. an. ℔ ij. m. f. unus. per horas xxiv. deinde bull. ad consumpt. dimidui, & tacta colatura servetur pro trius vicibus, summo mane hora una ante ingressum hypocauli assumenda. Pro potu consueto,

℥. Residuum lignorum, aq. fontis opt. ℔. xij. m. bull. ad. consumptionem tertiz partis, in fine vero ebullitionis adde cinnam. integri 5℔. bulliant partim, & fiat colatura, cui adhuc ferventi adde frustula citri recentis, & sacchar. alb. 3℔. ut agitando fiat aqua suavis vulgo dicta Cedrata. Pro sudore provocando ingreditur hypocaulum, adeo ut caput principaliter sudet: alioquin tantum abest ut caput exsiccari possit, ut potius ab humoribus in toto suis magis magisque impleatur atque gravetur: & in hoc potissimum consistit rectus usus tanti remedii in quo delinqui solet cum incredibili præjudicio Patientum. Sudet autem quadraginta diebus mane tantum, minime semel in die, & primis diebus per horæ quadrantem, sequentibus vero usque ad horæ dimidium, & non ultra: sicut postea reliquum dimidium horæ sudabit in lecto. Maneat autem toto sudoris tempore semper domi non solum, sed in cubiculo, non hypocauli, sed hypocaulo proximo ab aëre & ventis custodito. Decimo quoque die præbeantur pilulæ capitales jam supra descriptæ, ea die omisso sudore. Victus non sit adeo tenuis, sed quotidie in prandio tantum concedatur caro assa pulli junioris, aut palumbæ ex turre præter panem biscoctum, nucleos pineos & passulas ad libitum; quandoque in coena permittatur prisana hordeacea probe cocta, addito saccharo.

Absoluto sudore (quoniam faciliè adhuc aliqua in capite humiditas reproduci poterit) idcirco ut ab auribus divertatur, & à capite extrahatur, setaceum occipiti erit affigendum, & serico laqueo per menses apertum conservandum: non enim glandularum parotidum extractioni subscribere possum, non solum ob rationes à me superius adductas (fluxio namque ad aures, etiam demptis glandulis, dubio procul perseveraret) verum quoque quoniam non sine vitæ discrimine barbara illa operatio administrari posset.

Interim ulcus detergendum & exiccandum, cum ulceris curatio vera sit exiccatio. Pro deterfione introduci poterit mel ros. simplex, aqua Tettuciana aut sulphurea dilutum, in cuius usu aliquot diebus insistendum quater in die auditorium meatum ablucendo. Mox pro exiccatio-



exiccatione, Metallica præsertim scoria ferri, a Galeno proposita, & a Paulo comprobata, efficax erit remedium: præterea ex ulu esse poterit vinum ita parandum.

2. Vitrioli rom. calcinati ℥ij. vini rubri ℥viij. succi cydoniorum ℥iv. m. f. infusio in loco calido per xxiv. horas, deinde f. colatura quæ introducatur mediante turunda bombycina. Præstantissimum quoque remedium ad hujusmodi ulcera contumacia est spiritus Mercurii dulcis, pariter turunda madefacta introductus.

Jam dictis omnibus congrua vivendi ratio erit addenda, ita ut caput ab inclementiis Ambientis, tam frigidis, quam calidis custodiatur & omnia vaporosa, tam frigida, quam calida interdiciantur, ut lactaria omnia, Lactucæ comeltio, fœniculi, cardui, fungorum, tuberum, Leguminum, vini meracioris potus: & a prandio usus Conservæ rosarum, a cœna vero e floribus betonicæ & rosifmarini instituat, alvusque aliquo familiari Medico mento bis in mense sollicitetur. *Idem Tom. ij. Centur. 1.*

#### *Aurium vermes.*

Proponitur casus generosi patientis Hungarici, annum ægutus 25. qui post febrem quotidianam sex continuos menses in pueritia affligentem anno 1619. annum ægens duodecimum conqueri cœpit de dolore sinistræ auris, quæ matutinis horis non audiebat, nisi post prandium. atque dolore hoc in dies magis ac magis intensante, oleisque variis non cedente, ad mulierem adiit, quæ ipsi eduxit vermiculos albos circiter decem, perseveranteque dolore, & fonticulo sinistro brachio anno 1642. multo, nihil juvante, iterum aurem applicuit ollæ, herbis & vino plenæ, cujus remedii usu eruperunt inde plusquam 20. vermes, mensem vivi qui fuerunt. Non ob id tamen convaluit: ac propterea multis applicitis non conferentibus, instillatis quineriam in utramque aurem tribus guttulis olei elixyr. Proprietatis, quotidie erumpebant vermiculi pilosi mortui: ac proinde cum perseveret dolor, cum continuo vermium susurro, auditui, studiis, & somno valde molesto, quærit, utrum hic Patavii habeatur oleum hoc elixyr proprietatis dictum, vel quid aliud, quod vermes enecare, caput roborare, & pristinam sanitatem ipsi restituere possit.

Cui satisfacturi, negare non possumus, vermes in auribus generari posse. Ubiunque enim adest materia putrida, ex ipsa vermes produci possunt; adesse autem potest in qualibet parte nostri corporis, quotiescunque calor extraneus dominatur calori nativo, ita ut ab eo terminari non possint passivæ qualitates, sed humiditas prævaleat. Habemus namque ex Aristot. 4. Meteor. putredinem esse corruptionem propriam, & nativam caliditatis in uno quoque humido, a calore extraneo factam. Quam ob causam vermes ut plurimum generantur in intestinis, quoniam in ipsis frequentissima est putredo. Generari tamen possunt etiam in ventriculo, in capite, thorace, & alibi, testimonio Avicennæ, Alzaravii, Benivenii, Gabucini, aliorumque plurium medicinarum Scriptorum, & præsertim Valesci de Taranta in suo Philonio,

statuentis dolores aurium aliquando fieri à vermiculis. Tandem autem perseverare hanc vermium generationem, totque adesse in capite vermes, ut strepitum interre valeant, somnumque, & studia interpellare, non tam facile persuaderi possumus, cum præsertim non reserat patiens, saniosam materiam jugiter fluere, ex qua statutis temporibus novi regenerentur vermes, atque ita dolor & strepitus perseveret, non obstante, quod sæpius & plures vermes fuerint extracti. Quin potius in eam concedo sententiam, quod adlit firma, & fixa imaginatio super hoc objectum, quam propterea ratio corrigere non valeat.

Utcunque tamen sit cum imaginarii affectus & ipsi medicis prædiis non raro tollantur, quatuor in casu præsentis peropportuna censemus. Primum quidem mentem ab hoc objecto divertentia, secundò corpus diligenter expur-  
ntia, tertio aures, & cerebrum exsiccantia, quarto & ultimo cordialia, & humori melancholico occurrentia.

Primæ intentioni satisfiet per sex res non naturales, & præsertim per intermissionem studiorum, sodalitates, & peregrinationes; secundæ, sanguinis detractione ex venis sedalibus semel in mense, repetitâ totius corporis expiatione per melanagoga, & capitis ipsius, per nasalæ, & masticatoriæ: attritionem namque dentibus factam juvare ad digerendam materiam ad aures noctu fluentem, colligitur ex perfectiori auditu post prandium, quam ante ipsum. Caput deinde, & aures exsiccanda per usum elixyr. non quidem proprietatis, sed *vite majoris & minoris* à Quercet. no descripti in Pharmacopœa Restituta: per fumum etiam tabaci ore exceptum ita, ut exsuffletur ex auribus, & per pulveres gentianæ, cori, scordii, & similia: ex quibus cum lauro parabitur lixivium pro capite; ac tandem præscribantur magnæ antidoti, ut puta Mithridatica conf. juleb. gemmatum, el. de gemmis, confectio Alchermes, & similia. Ad vermes in auribus Actius Tetrab. 2. sermon. 2. cap. 8. commendat hæc remedia: calaminthæ succum instillatum in aures, Veratrum album cum vino: colocynthidis decoctum, centaurii, & absynthii, cum vino; scordii tandem, & marrubii succum. Et hæc agenda duxi pro medela saltem animi, si non corporis, Reverendi patientis. *Benedict. Silvatic. Consil. & Respons. Medic. Centur. ij.*

#### *Aurium Fluxus.*

De hoc vide supra consultationem ex Joan. Raymund. Forti cap. de surditate.

#### *Parotidis.*

Patricius Illustriss. Juvenis 20. annum ægens, temperamenti totius, jecoris & capitis calidi & humidi, post varios errores in vivendi ratione commisos, & potissimum in exercitio parvæ pilæ, & meri potibus, incidit in febrem acutam, quæ ut biliosa, sed spuria, à Domesticis Medicis curata fuit, cujus hodie dies decima quarta numeratur. Et quoniam in toto febris progressu de dolore capitis conquestus fuit, & septima die nonnihil deliravit, &



undecima comatosus fieri cepit, decimæ quartæ initio glandula post aurem dexteram intumescere cum dolore visa est, qui tumor hodie, sub finem quartæ decimæ elevatus est ad ovi anserini magnitudinem, cum rubore & dolore, & adeo œsophagi musculos comprimit, ut difficilem reddat deglutitionem. Pulsus constant, suntque satis magni, frequentes, sed non adeo celeres. Urinæ potius tenuiores, nunc verò aquosæ substantiæ. Modo Parentes de agendis consulunt.

Et ego cum Viris Exce lentiss. censeo febre hanc fuisse biliosam, cum non exiguo sanguinis subdominio, qui iusto calidior, tum a vehementibus motibus, tum a meri potibus biliosior fuit redditus, unde febris synochus, *Quodammodo biliosa* Gal. dicta suborta fuit. In cujus curatione, quoniam natura à Medica manu opportunè adjuvata & sublevata fuit, & sanguinis missione, & alterantium atque evacuantium administratione, ideo usque in hunc diem, vitalis facultas viguit, nec naturalis dejecta est, licet animalis quodammodo turbata fuerit, cum septima die nonnihil Patiens deliraverit, & postea ad somnum præter naturam inclinaverit, cum enim venosum genus humoribus redundet non adeo crassis, adsitque fervidus calor, facultas expultrix validior eisdem in aliquam corporis partem detrudere tentans, caput calidum & humidum ad attrahendum proinde & suscipiendum opportunum nata, in eodem residuum redundantes humores deposuit, & ad cerebri emunctorium transmisit, & tumorem in eadem parte post aurem excitavit, qui Parotis propriè appellari solet, quæ licet nonnunquam fieri possit à multis, crassis & crudis humoribus, multo tamen tunc vehementior & acutior debet esse febrilis calor. Hujus autem imminuentis abscessus præcesserunt signa, nimirum capitis dolor, cum comate, quibus surditatem quoque addit Gal. licet hæc frigida potius naturæ & ætati accidat. Præsentem autem sicut demonstrant tumor & dolor, ita ejusdem causam, sanguinem scil. non adeo tenuem nobis significat calor cum rubore.

Si de eventu hujus febris loquamur, licet incertus sit, salutis tamen spes elucescit, cum Pat. sit Juvenis, valida virtus, & per abscessum terminanda videatur, cui abscessui modo nos maximè attentos esse oportet, nam licet superiores abscessus, inferioribus difficiliores sint, quia tamen non in principio, & intempestive, sed die critica hic apparuit, ideo fovendus aut adjuvandus: Parotides enim, si evanescant, recidivam imò sæpè mortem expectare oportet, ut contigit quoque Nicolai Concubinae ab utraque parte. In casu vero nostro saltem recrudescentiæ metus esset, quinimo, si non maturescant Parotides, nec ex navibus sanguis fluxerit, aut urina subsidentiæ copiosam & crassam habuerint, omnes pereunt. Quare circa abscessum hunc sermo noster potissimum versari debet.

In cujus curatione, licet nunquam repellentibus, sed attrahentibus potius utendū esse consulant, & Orib. & Aetius, nihilominus, si cum impetu irruat humor, nil curiosè agendum esse, jubet idem Aetius, imò Tral. notat quod si à sanguine fiat, attrahentibus faciliè suffocatio induci

potest. Quæ omnia à Gal. desumpserunt, dicente, non repellentia, sed potius attrahentia, aut saltem laxantia, vel natura bene agentis totum opus permittendum. Cum igitur hoc casu, natura bene & satis agat, ab attrahentibus abstinendum, & sola laxantia tuto adhibenda, nec ab usu butyri recedendum, *Concoquit enim, laxat, & digerit*, ut dicebat Gal. & licet Celsus quamprimum Parotidem aperiendam consulat, ab initio tamen nunquam id fieri debet, non nisi præsentem aliquam materiæ suppurationem, cui dum attendimus, si forte contingeret ut ab humorum affluxu, aut hodie vesperi, aut cras mane tumor in amplam molem adeo excreveret, ut & deglutitio, & forsan etiam anhelitus interciperetur, tunc ad sanguinis missionem per venam sectam, dubio procul erit deveniendum, ut nos docet Gal. Quinimo dum a sanguine Parotides hinc, statim venam aperiendam consulit Tral. ut arceatur suffocatio. Si vero crastina die eodem sit statu ipse tumor, Emplas. aliquod illi erit admovendum, quod laxandi, nonnihil attrahendi, & omnino concoquendi atque maturandi facultatem obtineat, quale esse poterit paratum ex Fol. Malv. in lacte v. ceno decoctis & contusis, addito butyro, adipe gallinæ, & Ol. amygd. cui vesperi fermentum quoque addi poterit, quinimo & farina cum Caricis ping. exemplo Paul. Quamprimum autem tumor erit aperiendus, ut monet Celsus, neque expectandum in superficie pus, ut aliqui inexperti, non enim attollitur priusquam deprimatur, & in sinus varios atque difficiles se diffuderit, præterquam quod si tarde aperiatur abscessus, materia antecedens in capite hæret, cum ei à conjuncta non cedatur locus, etenim intus existens prohibet extraneum. Ferro igitur aperiatur abscessus hoc casu, cum Juvenis sit Pat. vegetus nativus calor, & tumor sit phlegmonolus potius, & bile manitus, quam œdematosus, aut cum pituita. Neque semper ferrum adeo tutum, inclinante scil. ætate, nativo calore imbecilli, & febrili intensiori, atque humore, tumoris causa ad ingidum vergente, tunc enim ex vulnere Gangrena excitari posset cujus causa cautelicum ferro tutius substituitur.

De reliquis febris extinguendæ administrationibus non est quod loquar, utpote Viris Excel lentiss. perquam notis, quod scil. aperto abscessu à medicamentis evacuantibus atque divertentibus sit omnino abstinendum, & solis clysteribus utendum, sicut attenuantibus insistendum, usui nimirum copiosi Julap. Acet. neque ab alterantibus discedendum, habita scil. febrilis caloris ratione, congruam victus rationem jam præscriptam observando, quæ in præsentem casu dicta satis. *Joann. Raym. Foris Consult. & resp. Medic. T. 1. Cent. 1.*

### Observationes.

#### Auris Dolor.

Cum mulierem auris dolore intensissimo afflicta pilulis cochiis & aureis purgasset, & cucurbitulas scapulis cum scarificatione, & ventosam in Nucha apposuissem; hoc cataplasmate imposito miraculi instar ab omni dolore liberata est.



℞. Cyparum. j. sub cineribus ferventibus decoct. ol. Chamamel. ʒʒ. butir. rec. ol. aneth. an. ʒʒ. croci. ʒj. Contusa emplastri modo, auri dolenti appositae sunt, *Petrus Forestus Obs. 1. lib. 12. De aurium morbis.*

Auris dolorem ex inflammatione sic curavi. Premisso clystere emolliente & refrigerante, sanguinem detraxi ex vena cephalica ejusdem lateris: Postea, cum fervens esset inflammatio, ovi candidum tenue cum lacte muliebri tepidum infudi. Aliquantum etiam usus sum ol. viol. in quo aselli intuli sunt & expressi, modo etiam rosaceo solo, modo lacte admixto, aut albo ovi. Similiter extrinsecus lanam jam dictis imbutam imposui, cavendo tamen ne calcicerent. Pars quoque dolens hoc foku soveatur.

℞. Fol. Malv. bis malv. viol. lactuc. salic. an. m. j. sem. cydonior. malv. an. ʒʒ. nor. chamamel. melilot. an. p. j. flor. rosar. rubr. p. ʒ. F. decoctio, qua pars leviter & tepide cum spongia madefacta & expressa foveatur: Talis foku optime conveniebat, ut materia digeratur, & sic paulatim materia fuit resoluta sine abscessu. *Petrus Forestus. Obs. 5. lib. 12.*

Quidam autem dolentem ex percussione ita curavit: medullam panis albam calide tritam cum melle apponebat, quæ frequenter superposita dolorem sedabat. Particula etiam thuris infunditur in lacte, donec dissolvatur, & guttatum in aurem mittatur: Hoc enim illico dolorem tollit, ut expertum est. *Petrus Forestus. Obs. 7. in febr. lib. 12.*

Cuidam auris dolore cum apostemate & ulcere laboranti in consilium post multa frustra tentata Medicamenta, adhibitus, iussu, ut mane ac vespere in aurem lassarum 3. vel 4. guttas olei sulphuris tepidi, priore rejecto injiceret & postea in sano latere horas aliquot decumberet quod cum fecisset in dies, omnis dolor mitigatus, ulcus abstersum curatumque fuit paucis diebus, cum omnium admiratione. Cum eodem sulphuris Balsamo ad eundem modum administrato, sanavi auris dolorem intensissimum in alio. *Marinus Rulandus. Curat. 85. cent. 1.*

Divinus senex, lib. 2. epidem. sect. 6. sic prætatur: gravissimos aurium dolores affixa cucurbitula tollit. Hæc memoranda sententia summam attulit opem misero cuidam, qui ex dolore auris atroci male habens; omnibus præfidiis destitutus, vigil, debilis, & amens factus, continuo febriens, in horas moriturus sperabatur. Hic cum ex venæ sectione, cucurbitulis, coctis, humeris, collo affixis, revellentibus clisteriis, expurgantibus, cæterisque revulsoriis auxiliis, sicut & anodynis intra aurem inditis, nullam sentiret utilitatem, cucurbitula scarificata juxta aurium glandulas applicata, levatus est: extracto enim copioso sanguine, inflammatione resoluta, hujus auxilii beneficio omnino sanus permansit. *Zacchus Lusitanus. Obs. 69. lib. 1. prax. admirand.*

Notarius Proventium Oeconomiz Regiz nomine Michael Dam, inexplicabili dolore auris dextræ affligebatur, noctes diesque ducebat insomnes, ac vix dentium effugit. Humor quidam primo fluebat ex aure, sed postquam Chirurgus hujus loci emplastrum applicasset, & simul linteaminibus aurem bene munisset, de-

sist fluxus, continuatis interim & simul ex parte auctis doloribus. Medicus quidam accersitus opii usum pro sedandis doloribus inuenit, sed absque penitiori effectu, nisi quod ex memorati opii usu ægrotus dormire, insequentibus insomniis, horis duabus poterat, recedente mox dolore. Tandem ex iussu alterius amici, qui me consuluerat, assumpsit pilulas ex M. P. Ruff. & extract. Rharbarb. continuas quatuor diebus, mane & vespere, cum euphoria, remotis omnibus emplastris & linteaminibus. Pus incipiebat fluere copiose, successit levis purgatio, expulv. r. d. jalap. ʒj. cum rem. ʒj. lapp. gr. v. acuto, & sic post tres septimanas relictus est æger.

Vir magni nominis apud nos æque tali dolore gravi aurium infestabatur, unica nocte horrendissimo dolore capitis noctem totam insomnem, sed miserandam consumebat, quid ageret, vix sciebat, nam dolor videbatur modum excedere. Hic sepositis omnibus externis, quæ suadebantur (exemplo enim erat affinis præditus) statim consilio meo confugit ad pilul. quarum sequens est formula:

℞. Extract. helleb. nigr. cum sp. v. facti ʒj. mail. pilul. Ruff. ʒʒ. resin. jalap. gr. vi. m. f. l. a. pil. divid. in p. ij. æqu. l. M. ne prima parte Pilul. usus est, sedibus quatuor motis, cum alleviatione doloris; Itera die secundam partem iterum priori simile assumpsit sequentibus sex sedibus. A meridie incipiebat pus fluere ex aure, quæ deinde tantum externo leni linteamine munebatur, fluxus autem cum euphoria 14. diebus continuavit, & æger relictus est.

Vir quidam nomine Joh. an. Loubert, civis Risenburgensis in Prussia ducali, dolorem auris gravissimum sentit dextræ: quinque vel sex diebus continuavit dolor, & parum abfuit, quin sibi ipsi mortem consciveret æger. Confugit ad Mariz Lusitanum ibidem medicum qui omnem etiam cum pharmacopola ejus loci dant operam, ut relictus ægrum. Enipil. str. linteamina externa, foku & quæ necessaria videbantur, applicant, sed abique fructu, dolore quidem non aucto, interim tamen permanente in eodem, itaque tandem quærens auxilium tendit Marizburgum. Chirurgus hujus loci omnem movet lapidem, quo possit dolorem hunc blandè sopire, propriè *Laudan. Opia.* gr. iij. omni vespere, unde dormit quidem cum allevatione patiens, nihilominus effectu hujus exspirante, denuo uti prius dolor urget, donec post aliquot dies tandem tumor post aurem exurgeret, qui scarificatus, naturalem locum doloris mutat. Ab aure enim divertit ad lumbos, & rependo quasi ibi constrictionem causat, emplastris applicatis tendit deorsum in spinam dorsi, circa regionem renum, deinde eo de loco expulsus in sinistro genu se figit. Sudoriferis autem attenuatus non quidem ad nates solum, sed ad aurem ipsam, & quidem carneam ejus substantiam redit, ibique rependo ac coustringendo non quidem insignes dolores, sed tamen molestiam pariebat, ab aure autem iterum pugni magnitudine usque ad gulam ingens tumor se prodibat, ita ut suffocationem quasi nunticaretur. Interea fluit pus ex aure, & quidem satis copiose, patiens se doctum confert. Sequuntur domi



continuz lipothymiz, nemo præsens potest ferre auxilium: Moritur in Domino.

Ex his itaque recensitis casibus, facili negotio quilibet Medicus & Chirurgus colliget, externa applicata circa hunc affectum potius damnum inferre, quam prodesse, & tutius esse, sequi naturæ ductum, secundum Hippocratem, & quo vergat ducere, quam topicis figere, quod ad volatilitatem videtur esse progeneratum. Experientia etiam testatur, plus posse unica die in talibus casibus Medicum perficere internis specificis, materiam discutientibus, & ad expulsionem præparantibus, quam topicis repellentibus, quæ plus ab extra impediunt, quo minus materia peccans ad effluxum disposita suo tunc potiri queat. *Andreas Cnoeffelin.*

Virgo viginti annorum jam per quindecim septimanas egregie conquesta fuerat de auri dolore propemodum intolerabili, ac per totas aliquando noctes somnum prohibente; auris interea temporis multum puris bene cocti quotidie fundebat; complura jam medicamenta sine fructu fuisse adhibita. Accersitus ad omnes & quidem minimas circumstantias tam circumspexit, quam potui, attendebam, tandemque digitis meis perlenſi undulationem quandam puris profundè siti post aurem affectam; atque hic abscessus ab aliis non fuerat observatus, licet causa foret totius mali. Rem bene mecum perpendens facile intellexi hunc abscessum post aurem nunquam spontè, hoc est, absque externo artificio iri apertum non tantum ob profunditatem suam, sed præterea etiam, quia pus inibi contentum jam per aurem exitum sibi quaesiverat, quamvis valde sinuosum ac minimè sufficientem; quapropter mox imposui corrosivum salis acre, cujus eschara separatà ingens copia puris bene cocti prodibat ex arte-facto foramine, ac post illud tempus auris dolor & puris ex auris cavitate profluxus protinus in totum cessavit; foramen autem corrosivo inductum, omni pure per illud evacuato, intra duas septimanas prorsus coalluit, ac ægrotæ omnino restituta fuit pristina sanitati.

Hanc aperturam post aurem, nullâ morâ interjectâ, fieri debere existimabam, ne pus aliàs tandem os subjectum attingeret, illudque temporis progressu carie inficeret; quanquam pus bonum super osse aliquandiu moram neccens non necessariò semper inducat cariem, sicut id exemplo sequenti demonstrare mihi facile est.

Vir circa trigessimum sextum ætatis suæ annum tempore brumali ac aëre ventis haud parum agitato iter faciens brevi post sentiebat auris dextræ dolorem, ex qua deinde quotidie prodibat nonnihil puris, tuncque aderat doloris illius non mediocri levamen; postea, pure non ampliùs promanante, æger de summo iterum conquerebatur cruciatu, qui, noctu non rarò delirium produciens, jam per aliquot menses duraverat, nec ullis externis, internisve remediis obsecundabat.

Advocatus post aurem reperi tumorem longè latèque extensum, in quo pus contineri firmissime mihi persuasi, licet ob profundita-

tem loci, in quo pus delitescibat, palpaudo nulla animadverti posset undulatio; imposui igitur corrosivum, cujus eschara valde crassa separatà incredibilis puris copia profluxit; hoc autem pus jacuerat super os petrosum quod totum nudum exiltebat, sicut id specillo observare facile potui, ac interim tamen absque ulla fragmentorum ossorum separatione patiens intra sex septimanas prorsus sanatus est ac sanus postea permansit, non adhibitis aliis medicamentis, quam injectione idonea, bono digestivo, ac tandem, osse iterum contexto, tincturâ meâ antimonij, quam externè multis in casibus mirum in modum prodesse quotidie comperi.

Tympano auris ab ulcere eroso auditum superstitem permansisse legere datur apud Vo-piscum fortunatum Plempium in fundamentis Medicinæ p. 148. Præterea memini me conspexisse Rotterodami apud Jacobum Lodenſteyn, classis navalis Archi-Chirurgum, virum dextrimum, ossicula auditus omnia, quæ post ulcus ex aure pueri alicujus prodierant; sed puer hic eadem aure postea nunquam audivit. Novi Chirurgum, qui ad dentium dolorem auferendum urit aurem ferro ignito, sed ridicula ac inutilis videtur hæc operatio. *Myrin Prax. Chirurgic. rational.*

#### *Aurium vermes.*

Non in intestinis tantum, sed in omnibus prope corporis humani cavitatibus vermes generari observant Observationum scriptores. Fœmina quædam hic Posonii in suburbio habitans per longum temporis spatium capitis auriumque divexata doloribus, tandem Chirurgum accersit, petens auxilium, credere enim sibi aliquando sub dio dormienti aliquod animal in aurem dextram irrepsisse. Applicuit iste subridens cataplasma, & quæ nescio alia. Sed ecce cum quadam die de ingentibus lancinantibus doloribus conquereretur, aurem inspexit, vermesque deprehendit, quorum in mea & D. D. Zolicoferi, nunc Archiatr. Brogens. præsentia, complures extraxit albos, cum capitulis nigricantibus illis similes, qui in pyris vel avellanis nasci & inveniri solent. Inclusi tres chartæ bibulæ domum eos portaturus, & ad Microscopium examinaturus, sed cum illos eximere vellem in atrosa vel attrita charta, quamvis nihil præterea in illo sacco habuerim, nullum invenio nisi unicum extra eam in sacco, quò reliqui aufugerint, nescio. Videbantur autem vermes non irrepsisse, sed geniti fuisse ex ulcere, id quod fieri posse ex Observationibus constat. Mulier adhibitis fomentis ex herbis vermes necantibus & ulcus aurium (nam pus quoque & sanguis ex illis fluxerat) consolidantibus, convaleuit. Similes planè vermes annotavit *Hem. à Moinehen* Obl. 16. à *Th. Barth. Cultro Anat. Lyseri annexa.* Caroli Raygeri

#### *Caruncula Auris Obstruens.*

Circiter annum 1594. genere & virtute verè nobilis puella, Margarita de Martines, Nobilissimi



buissimi ac prudentissimi viri Du. J. Francisci de Martines, Domini in Bourgou & Pally, filii primogenita, ætatis annuum octavum agens, variolis correpta fuit; ex quibus eo gravius laborabat, quia pustulæ ad extremam cutem nihil ferè eruperunt. Porro quia materia variolarum non satis ad partes externas expulsa, puella quin etiam à teneris annis scabie in capite, & circa emunctoria, parum obnoxia fuerat, non diu post, nimirum anno 1595. qui fuit annus 9. ætatis, dolor in meatu auris dextræ præcipue acutus & pungens erat, ita ut tota illa pars faciei in tumorem elevaretur. Auri oleum chamæmelinum tepidum, doloris leniendi causâ, gossipio imponebant, faciemque eodem oleo inungebant. Post dies aliquot in ipso meatu auris ruptus est abscessus, ex quo primis quidem diebus materia subtilis, & loturæ carnis iussu, deinde pus crassum (spissumque) extillabat. Dolor capitis & auris paulatim cessavit, tumefactio quin etiam faciei evanuit, Tribus el. psis mensibus, iterum materia subtilis extillare cœpit, & deinceps continuò extillavit; absque tamen dolore: quapropter nulum ex hoc malo sibi accidere posse incommodum, cuncti arbitrabantur. Circa annum verò 1600. cum auditum paulatim diminui viderent parentes, atque hac de re solliciti essent, meatumque auris inspexissent, in profundo ipsius excrescentiam quandam carnosam & meatum plane obstruentem deprehenderunt. Interim tamen, etsi quotidie nonnihil materię subtilis extillaret, quia tamen neque dolor, neque aliud quodpiam adesset symptoma, puella quin etiam ratione ætatis tumida esset, & ab operationibus chirurgicis abhorreret, res de die in diem prolata fuit.

Anno verò 1604. cum excrescentiam illam carneam, ex meatu auris propullulantem, viderent parentes, attoniti ac perturbati fuerunt, protinusque medicos eosque doctissimos, imprimis verò Du. Marcum Offredum, & D. Andreæ Bonetum, apud Geneveses Medicinæ Doctores longè celeberrimos, hac de re consuluerunt, illi cum affectum difficilem esse, & manum diligentem requiri cognovissent, ut ego vocarer, suaserunt. Vigesimo itaque tertio Decembris 1604. cum in Perroy ad lacum Lemani, ad prædictum Dominum de Bourgo pervenissem, & aurem inspexissem, excrescentiam in ipso meatu auditorio, magnitudinis ingentis inveni. Hæc extuberantia dura, inæqualis, lividaque erat, & tympanum versus in apicem definebat, habebatque planè formam fungi, nondum tamen integrè conspici potuit.

Superficie sive extuberantia hujus fungi, uti postea dicemus ablata, quod reliquum erat, paulatim usque ad ipsius radicem quæ prope tympanum erat in conspectum veniebat; à forma itaque & duritie excrescentiam hanc fungum schirrosam appellare libuit.

Propullulabant præterea circa ipsius radicem duo parva germina, ex quibus proculdubio etiam fungi procreati fuissent, nisi angustia meatus auditorii obsuisset. Est tamen notandum meatum huncce dextrum alterò aliquomodo ampliorem apparuisse. Videbatur enim

dura illa excrescentia, interim dum accresceret puella, impedimento tui se quominus proportionem suam observaret, in actu, etc.

Porro cum ex colore livido & duritie affectum huncce difficilem esse, & periculo minime vacare vidissem, denuo ut prædicti Medici in consilium adniberentur, autor fui, ut itaque convocatis, & diligenter explorato & perquisito morbo, deliberatum fuit ut curatio propter maximum frigus usque in proximum vel protraheretur.

27. Itaque die mensis Martii 1604. cum iterum in Perroy pervenissem expurgato corpore, cucurbitulis cum multa nimia & scarificatione, pro diversione scapulis adhiitis, item setaceo per verticem tracto, imo cucurario pro cerebro comortando, & pulveribus capiti impurgendis in uum reocatis, iungobis in die linteum suave reduplicatum aqua nostra ad ulcera maligna (cuius descriptionem vide in Cent. 1. Obs. 1.) imbutum, reprie applicui: neque aliud quicquam usque ad mensem Majum cum fungo tene re volui: quo natura ante omnia ad ablegandas superfluitates cerebri versus setaceum sese anuefaceret. Interim tamen, uti & per totum curationis tempus, optimam vicus rationem observabat.

13. Maji ad ipsam reversus, purgato corpore, sanguine per mediam in dextram ad unguem 7. emisso, & apozematibus per tres dies continuos exhibitis, posteaque repurgato corpore per opiatam, toto curationis tempore per intervalla sumendam, ad fungi extirpationem transiendum fuit: ea autem quia, aut abscessione, aut eroentibus & causticis medicamentis, vel ligatura neri debebat, ante omnia nobis explorandum perpendendumque erat, quænam tutior & securior esset via atque methodus? Excisio adstantibus propter hæmorrhagiam suspecta erat, & ægra illam abhorrebat. Erodentibus quoque & causticis medicamentis malam illam fungi, qui externam partem auris adimplebat, absque periculo abluini minime me posse sciebam. Imprimis vero quia ex colore livido, duritie, & inæqualitate tumoris, malignitatem aliquam subesse apparebat, verebar ne ex usu medicamentorum causticorum magis irritaretur malum, & humior ille acris qui post applicationem causticorum ex ulceribus effluere solet, vicin partes simul exulceraret. Malui itaque ligaturam instituere. Singulari enim & ad hanc operationem perficiendam commodissimo à me excogitato instrumento quodam fungum istum satis profunde in ipso meatu auditorio amplecti & ligare me posse sperabam. Instrumentum autem hoc forceps fuit ex lamina cuprea aut argentea fabricatus, ita quidem scilicet ut per se apertum sit, extremitates tamen digitis facile comprimi ac claudi possint. Prædictæ extremitates quoque aliquomodo excavatæ esse debent, quò carunculam quæ lubrica est melius amplecti possint.

23. Itaque Maji, electo loco splendido agrum in sedem collocavi, & ita quidem ut radii solares in auris meatum penetrare possent. Postea caput, sive externam fungi extuberantiam filo apprehendi. Hujus enim filii beneficio



cio caput fungi suspensum tenebam. Interim funiculum cum seminodo intromisi, & cum stylo quodam exploratorio tam profunde, quantum fieri potuit intruxi. Deinde ambas extremitates hujus funiculi in extremitatibus forcipis praedicti facta, traxi. Postea instrumento tam alte quantum fieri potuit in meatum auditorium, & quidem ad utrumque latus fungi intromisso, extremitatibus funiculi ambobus indicibus apprehensis & fortiter tractis atque contrictis, fungum arctissime ligavi. Interim autem dum filum simul & instrumentum intrudatur, nimis filum extuberantiae fungi annexum clementer leviterque in altum trahet, idque in eum finem ut funiculus simul & instrumentum eo facilius & profundius intromittere possit. Facta ligatura instrumentum clementer extraxi; filum vero suspensum reliqui. Deinde linteum reduplicatum, & sequenti liquore insuccatum applicui.

℞. Aq. nostr. ad ulcera maligna ℥j. aq. ranae aquatilis. plantagin. rosar. ana ℥ss. semina cydonior. subtilit. pulver. ℥ss. C. C. uli, turiz, & plumb. uli ppt. ana ℥ss. M.

Monitum autem velim lectorem, funiculum in hujusmodi affectibus nullò modo (ut in aliis quidem corporis excrescentiis aliquando fieri solet) aqua forti insuccandum, multo minus arsenico illiniendum esse, propter gravissima quae inde sequuntur sympto nata; funiculum tamen, ut fungum paulatim abscederet, singulis diebus iterum immisso & adaptato instrumento, clementer contraxi, nodumque magis magisque constrinxi.

Cum extuberantia fungi ita ligata esset, paulatim flaccescere cepit, emanavitque ex illi humor foetidus & putridus, is vero ne in meatum auris internum desluit, quotidie ter quaterve peniculis & spongiis paratis, absterli. Deinde extuberantiae undique spongas in praescripto liquore madefactas iterumque fortiter expressas, supposui, idque in illum finem ut humorem illum putridum foetidumque absorberent exciperentque. Ita paulatim abscessa est extuberantia fungi, ita ut 17. ejusdem mensis absque dolore & haemorrhagia, excideret.

Sed quia fungum ad radicem ipsius propter angustiam meatus auditorii ligare non potueram, quod reliquum erat erodentibus, ut postea dicam, absumere cogebar: prius tamen, nimirum 14. dosim electuarii purgantis exhibui, quò optimè expurgata fuit agra. Ad majorem quoque humorum exsiccationem sequens exhibui decoctum.

℞. Radic. sarsapar. ℥j. Lign. sassafr. minut. dissecti ℥iij. radic. chin. in tenues orbiculos sect. ℥j.

Macerentur horas 10. in aq. font. tepida lib. iij. & coquantur ad duarum partium consumptionem. De colatura moderatè calida ad ℥iij. hora quinta matutina exhibui; interim dum utebar praescripto decocto victum utcumque tennem & exsiccantem observabat, à jusculis & fructibus horariis humidisque abstinebat, eorum verò loco uvis passulis & amygdalis tostis utebatur. Pro potu ordinario sequens decoctum praescripsi.

℞. Residuum praedict. decoct. passular.

liquirit. ana ℥ss. aq. fontis lib. vj.

Macerentur per horas 12. deinde coquantur ad unius tertiae partis consumptionem: paratur potio gustui grata, & romatisetur pauco coriandro preparato.

Hoc decocto, & victus ratione per mensem integrum utebatur, interim corpus per intervalla expurgabatur, & cucurbiturae scarificatae applicabantur.

Extuberantiae parte beneficio ligaturae excisa, quod reliquum erat usque ad 1. dicem prope tympanum sita, quomodo absumserim dicendum. Statim itaque postquam extuberantia exciderat, iterum agram ad radices solares in sedile collocavi: mox laminas parvas tenuissimasque e cera fabricatas, & aliquantum incurvatas undique circum circa carunculam imposui, idque in eum finem, ne medicamenta acris quae imponenda erant, meatum auditorium attingerent exulcerarentque, deinde penicillis ex spongiis paratis absterli humiditate, escharotici nostri ad magnitudinem capitis aciculae imposui: postea filamentis & spongiis meatum implevi, & linteum reduplicatum, nec non liquore superius descripto imbe; exterius auri superimposui. Medicamento quotidie bis, nimirum hora septima matutina & quarta pomeridiana, (ad candelam enim hujusmodi operationes minimè sunt tentandae) imposito. 18. ac 19. escharam induxi, illa vero ut abscederet, sequens medicamentum filamentis in eo intinctis, applicui.

℞. Muciag. sem. cydonior. extracta cum aequalib. partib. aq. arnoglossi. & ranae aquatilis. ℥ij. C. C. uli & prepar. turiz pp. lapid. calamin. an. ℥j. croc. mart. satur. calcin. an. ℥ss.

M. Fiat medicamentum ad instar. collyrii utcumque liquidi. Medicamentum hoc propter meam absentiam usque ad 4. Junii impositum fuit. Ibi n, uti & sequenti die, laminis cereis iterum invelita caruncula, denuò de praedicto escharotico bis in die applicui.

Sexta die ejusdem mensis repurgato corpore 7. 8. & 9. collyrium descriptum applicui. Decima eschara denuò exenta, laminisque novè impositae, escharoticum ea die ter, undecima vero bis iteravi.

Duodecima die mensis, quia eschara magna apparebat, neque pinguis ut imponerentur consultum mihi videbatur, cultello separatorio incurvato ad carunculas ex auri meatu excidendas aptissimo, eam excidi.

Excisa eschara, quia propter angustiam meatus auditorii, laminas cereas difficulter imponere mihi licuit, escharoticum applicare ausus non fui: globulum itaque lentis magnitudine ex filamentis contortum, sequenti pulveri immersum applicui, & spongiis collyrio supra descripto madefactis iterumque expressis, ductum auditorium adimplevi. Spongiae autem in purulentis auribus summo opere conveniunt, materiam enim purulentam ex profundo attrahunt absorbentque, partemque affectam ab injuria aeris vindicant.

℞. Pulver. praecip. optimè rectific. ℥j. lapid. bezoard. diligenter pulveris. turn. calcin. & abluti an. ℥ss. misceantur, haeque pulvis.

Decim sextae, cum beneficio speculauris ad tympanum usque ferè inspersissem, & nonnihil de



de radice fungi superesse probè cognovissem, sequentidie iterum laminis cereis, ea qua fieri potuit diligentius inhi, & medicamentum escharoticum applicui. Verum decima septima cum domum proficisci coactus essem, sequentem pulverem præscripsi, & me absente imponere iussi.

℞. Croc. mart. optimè pp. C. C. usti & pp. Saturni. calcin. & ablut. lapidi calamin pp. aa ʒiʒ.

M. fiat pulvis tenuissim. qui filamentis collyrio supra notato madefactis ulque ad tertium Julii impositus fuit. Quarta cum ad nobilem agrum rediissem, & radicem fungi nondum penitus absumtam esse, imò & præter radicem duo parva germina, adesse cognovissem, iterum pulverem ex præcipitato &c. & spongas madefactas imposui.

Sexta Julii speculi & radiorum solis beneficio, nonnihil puris in profundo meatu auditorii oculis se se ostendebat, in quo motus, velut diastole & systole arteriarum, conspici potuit. Abstergo pure, quia radicem mali nondum omnino ablutam esse observavi, iterum laminam ceream cui ex una parte nonnihil escharotici annexeram, ad radicem ipsam applicui, & spongas madefactas superimposui. Radicem præterea fungi cranio adhaerentem, imò ex ipso cranio originem traxisse, belle apparuit. Septima de eodem medicamento escharotico ad magnitudinem capitis aciculæ bis applicui.

Octava agrum expurgavi, post prandium, cum radiorum solis & speculi auri beneficio meatum auditorium inspexi, tum fungi vestigium nullum nobis apparuit, qua de re in posterum nihil, præterquàm patillos Andronis, syrupo de rosis siccis dissolutos, imposui. Postea tamen aliquot, cum in profundo uris, & illa quidem parte qua radix fungi fuerat, os depudatum invenissem, sequentem pulverem catagmaticum, melle rosaceo parum, que spir. vini, mixtum, per mensem fere integrum, me absente imponere iussi.

℞. Pulver. flor. betonic. rosar. an. ʒiʒ. rad. irid. florent. angelic. caryophyll. mallic. : n. ʒi. benzoi, styrac. calam. an. ʒiʒ. M.

Post mentem cum ad ipsam rediissem, nullum amplius ossis denudationem inveni: qua de re ut in posterum pro corroboratione partis affectæ, linimentum patillis Andronis, & syrupo de rosis siccis imponeretur, corpusque per intervalla expurgaretur, ac optima victus ratio observaretur consului. Sic Divino aspirante Numine pristinae sanitati restituta fuit, qua & ad hodiernum usque diem 24. Octobr. 1613. feliciter utitur, & quidem in matrimonio non infelici, proles præterea aliquot progeniit, & auditum, qui antea per annos aliquot deperditus fuerat magna cum admiratione multorum recuperavit. Tam provida & diligens est natura; præcipue si in juvenibus diligentia Medici intervenerit. *Guilielm. Fabric. Hildan. Obs. Chirurgic. Cent. 3. Obs. v. 1.*

#### Aurium Fluxus.

Habemus hic in vicinia, in Oppido Solingen, matronam piam atque honestam, quæ nunc vigesimum quintum annum ætatis prætergressa est, illa à juventute in hoc usque tempus

purulentas aures habuit. Extillat quoque materia, aliquando cocta & digesta, nonnunquam quoque subtilis & tenuis, & tum dolores adiungunt, aliquando & foetor percipitur. Cæcis exillente frigido & humido, de dolore brachiorum conqueritur: proculdubio propter nervum, quem ego ex nervo auditorio deorsum descendente observavi, uti ex obs. 4. Cent. 1. videre poteris. Inveni illam aliquoties, aures quinetiam diligenter inspexi; & ut plurimum ductus auditorios materiâ purulenta repletos reperi. Ante menses duos cum aures abstergerem, frustum cartilaginei senni putridi, ex ipso ductu auditorio extraxi. Id autem observatione dignum in hoc affectu occurrit, nimirum aerem, clausis naribus & ore, tam violenter ex auribus efflari & expirare, ut impositis pennis aut testucis illas expellat, & bullas in ipso pure excitet. Cuius rei ego aliquoties periculum feci. Interim tamen, quod admiratione dignum, auditum non multum depravatum esse, & exiguum molestiam sibi adferre malum hoc, ipsa ægra mihi retulit. *Guilh. Fabric. Hildan. obs. Chirurgic. Cent. 113.*

Admiratione dignus est casus venatoris cuiusdam, qui consili causa superioribus mentibus me accedens, inter cetera referebat, quod hac tenus ingentes capitis dolores, imprimèque auris dextra perpeßus fuerit, ubi tandem aperto abscessu, multum puris & saniei, una cum animalculis nigris quam plurimis, ex singulari putredine proculdubio genitis, effluerit. Ab hoc cruciatu tamen se liberatum esse dicebat, id tantum ægrè ferens, quod aurium fordes profundius extrahere cogeretur, simulque auriscalpium ad digiti longitudinem ostendebat, quod sine molestia hunc & inde auris in cavitatem agitabat, nec ullum dolorem vel etiam auditus difficultatem, quod maxime mirabar, percipiebat. Quid dicam igitur de usu Tympani: quodnam n. unus officulis auditus attribuendum erit: membranam hanc putredine corruptam & cum malleolo & incude, quæ sustinet, quis non opinabitur: &c. *Gregor. Herib. Obs. medic. lib. 9. Obs. v. 8.*

#### Res externa auribus immissæ.

Anno 1596. Puellæ Genævæ insinuatam fuisse pisum in auri meatum: quod cum mox excitaret dolorem, suadet vetula fovendam esse partem affectam spongia madefacta lacte calido. Ex hac humiditate accrescit pisum: inde hic dolor vehementissimus. Vocatus in consilium Clarissimus Dn. D. Andreas Bonetus, ejus urbis medicus celeberrimus, me advocandum jubet. Præparatis igitur omnibus necessariis, caput firmiter tenendum jubeo. Deinde supra scriptis instrumentis pisum sine violentia extraho. Extracto pise, spongia in decocto radicis chamomillæ, meliloti, & betonicæ madefacta, & quotidie aut quater applicata, sedatus est dolor, & brevi convalescit ægra. *Guil. Fabric. Hild. Obs. Chirurgic. Cent. 1.*

Rosæ filia quondam Roberti Chaperonis, annos 10. natæ, veruo tempore sui similibus colludenti, insinuatæ fuerat in concavum auris sinistra globulus vitreus instar pisi, cujusmodi puerorum carpis pro brachialibus accommodantur. Admonita mater Chirurgum advocat,



cat, qui globulum extraheret: frustra. Venit & alter, tertius item, & quartus, diversis tamen temporibus: ex his nemo juvit, quin imò altius inlinuatus est ab illis globulis. Exin desperavit mater de extractione: & quamvis c. sum filia, doloribus assiduus connecta, ægre terebat, Dei tamen & naturæ arbitrio permittendum statuit. Postea cum ledatus quidam esset auris dolor: sed tota illa pars capitis, usque ad futuram rectam, nocte dieque doluit, plus tamen minusve pro aeris constitutione: celo maxime humido ac pluvioso, quate est hyeme & autumnio, cruciatus urgebant. Accidebant præterea laxo brachio quasi stupores, usque ad digitos pollicem & indicem, progredientes ad lumbos usque, tibiam & pedem: & ut paucis dicam, totum latus sinistrum continuus iis ceu stuporibus linguebat. Transmutati sunt potius torpores in dolores gravissimos brachii, humeri, & cruris: idque, ut dictum est noctu & aere frigido & humido. Iussicula sicca assiduò aderat. Menstrua ex parte supprimebantur, & nonnulli semel lingulis trimentitios, aut parum fiebant. Quin etiam quatuor aut quinque sic dolebat, ceciderunt interdum epileptica convulsionones: ipsum quoque brachium in atrophiam incidit. Videns mater tam dira symptomata, varios adhibuit medicos, chirurgos & empiricos. & quoniam nullus auris dolor advenit (quippe maximi dolores obscurabant minimum) de symptomatis tantum querebatur, omnia primaria morbi causa. Nequicquam autem hæc omnia juvere, neque enim intermittebant dolores, aut symptomata ullum, imò augescebant. Tandem adit me anno 1595. mense Novembri. Purgavi ipsam aliquoties: inuixi præterea humerum, brachium, & reliquas partes dolentes, oleis anodynis & calidis: breviter, quæcunque necessaria ad hunc morbum videbantur, adhibui: frustra tamen, ut priores. Quoniam viderem morbum repugnare omnibus idoneis remediis, desperabam de salute. Latebat enim me istius morbi causa, nisi fortean ex catarrho foret.

Interim cogitanti mihi quid melius adhibere possem, ipsa nec opina capit recitare casum: nempe quod sibi ante octo annos globulus in aurem demissus esset. Hæc ego audiens, cœpi cogitare, eam esse morbi causam. Et quamvis illa valde repugnaret operationi, propter superiorum chirurgorum irritos conatus in recenti morbo, tandem tamen paruit. Tum ego feliciter extraxi globulum sine vi ulla, quamvis profundius, prope tympanum videlicet, excrementis & sordibus auris firmissime hærentem. Cessarunt illico dolores capitis, reliquarumque partium corporis, & subsequente nocte meliusculè habuit: sicque paulatim leni inunctione olei lumblicorum restituta fuit. Cessarunt inquam dolores, stupores, convulsionones epileptica, reliquaque omnia symptomata. Restitutum est quoque brachium: ita ut hætenus, Dei beneficio, bene se habeat. *Idem Obs. serv. Chirurg. cent. 1. Obs. 4.*

Anno 1610. Rev. viri D. Jone Merula, apud Aventicenses verbi divini ministri fidelissimi, filio duodecim annorum ætatis, nucleus ceræ in dextrum auris meatum inhius fuit. Hæc

de re, ut extraheretur nucleus, cum solliciti enent parentes, (quia ego Augustam Vindelicorum profectus) empiricum advocant. Is etiam mihi omnem suam diligentiam atque industriam adhiberet, nucleum tamen extrahere non potuit. Immo profundius intravit: idque non sine dolore & cruciatus: Est enim meatus auris exquisitissimo sensu præditus. In ista autem operatione, hamulo acuto usus fuerat, quo eucum auris dilaceraverat, ut sanguis sequeretur, atque operationem impediret. Remanuit it. que nucleus usque ad 14. octobr. cum pater puerum mihi adducere vellet, ac aurem inspiceret, nucleum ab ingressu auris undique pure immersum, animadvertit: illumque acie aciculiparvo cum negotio extraxit: Meatus enim auris materia purulenta, quæ nucleum extruserat, impletus erat. Postea brevi convaleuit.

Curatio hæc, atque expulsio nuclei ad votum successit: videatur, nunquam tamen hac methodo, æt naturæ opus planè relinquendum esse suadeo. Multa enim variegue symptomata ex suppuratione harum partium oriri solent. Cum enim ductus auris exquisitissimo sensu sit præditus, facile propter doloris vehementiam humores assuunt, atque membranam tympanum corrumpunt: Inde surditas. Non raro quoque os, quod exigua tantum membrana investitum est, ex huiusmodi suppurationibus cariem contrahit. Carnem item fungosam ex ductu auris, propter suppurationem exortam esse, & fungum scirrhosum procreare, ex præcedenti observ. apparet. Diligentia itaque adhibenda ut quicquid extranei auribus inhius est, protinus extrahatur. *Idem Obs. serv. Chirurg. cent. 11. Obs. 5.*

#### Grillus in aure.

Rusticus penes fornacem jacens, in scamno, non advertit in somno ingredientem grillum in aurem, quem tamen expergefactus ex clamore, ut dicebat, terribili statim percipiebat. Homo hic ferè ad insaniam redactus est, nec ullo modo potuit eum vel interimere vel extrahere: Venit tandem ad me, suadeo, ut infundat oleum scorpionis. Parat: sed sine fructu. Itaque iussi, ut afferat grillum vivum ex campo, allatum injicio oleo divarum, moritur in eo grillus. Hujus olei cum duodecim ferè guttas in aurem inmissem, paulò post grillus in aure mori cœpit, inter moriendum tamen, retrogradum quasi motum repentis insecti sentit æger; frustatum deinde cum multo pure grillum auris evomit cum restitutione ægri. *Andrea Cnoessii.*

#### Aranea aure contenta.

Quot, quantisque malis humana corpora tam internis quam externis, exigua quandoque premant, obruantque causæ, evidenter demonstrat, quod referre aggredior.

In Michaelis Digbaucher die 30. Decembr. anno 1682. sub tecto quodam nudo capite operantis aurem aranea quædam coloris tuscæ, inrepsit, quæ ipsum adeo torfit, ut non parum anxius; quod eam eximeret, omnem moveret lapidem



lapidem. Trium autem Chirurgorum ope hec, quam impiorata tandem ad Medicum, Chirurgumque notum Cornelium Solingium itur, qui, licet speculo sive instrumento dilatato, cavitate auris ampliata, araneam conspiceret non potuit capite leni tamen unguiculis hominem tam misere cruciantem, post quinque horarum moras, discedere coegit tenui quodam, planoque, ac lapidili in morem efformato cochleari u. s. Animadvertetur autem circa Araneam tunc post extractionem extinctam nonnihil saniet, ejus reliquiis exemptis, Solingius cum Arcæi balsamum cum Peruviano, & oleo hyperici, gummaque elemmi mixtum instillavit, ejus virium effectus tanti fuit, ut Michael postridie optime se habens, latusque non sine gratiarum actione a medico diceret. *Correl. Stappart. Observ. rarior. Cent. 2. Obf. 11.*

#### Parotis.

Nobilis quidam puer tumorem juxta aurem ori magnitudine, jamdiu habebat, in ambitu durum, inaequalem, in medio mollem, ubi preceps cedebat, ex quo materiam quandam in se deprenendi: dolor alioquin nullus, nisi quod pruritus interdum sentiebat. Corpore purgato, usus est sequentibus. Fortis habebat ex decocto rad. ireos, brionix, in dies bis. Postea applicabat sequeas emplastrum.

22. Gummi ammoniaci in aceto fortis. dissol. empl. diachyl. ireat, an. 5i. malaxentur; quo facto duodecimo circiter die, sponte se aperuit tumor, purulentamque & spissam admodum materiam copiose tota septimana reddidit, multumque subsedit. Reiebat adhuc in humiliore sede, exigua durities, cujus causa, cum Chirurgi maturantia adhiberent, tentaque immissa ulcus apertum servarent, idem tentæ fundo cum extraheretur, fabulosa materia penitusque terrea, grani nulli majoris inter adhærens apparuit, posteaque plusquam triginta ejusmodi grana terrea, ejusdem magnitudinis, aliquando etiam majora prodierunt; sicque repurgato ulcere, cessanteque duritie, ulcus consolidatum fuit *Felix Platerus. Obs. lib. 3. pag. 107.*

Anno 1599. mense Aprili quadragenariam & innuptam puellam Colonix Agrippinæ, abscessu post aurem sinistram (quem Medici parotidem nuncupant) laborantem vidi. Nulla adfuit in principio febris, neque lecto decumberet, imò domestica administrabat. Demum circa decimum quartum morbi diem, cum abscessus ad pugni magnitudinem excrevisset, & materia plane esset præparata, sed propter duritiem cutis diutius retenta, viam deorsum sibi petebat. Tum advocatus, inveni abscessum ex semet ipso ante aliquot horas ruptum: puellam verò febre, lipothymia, nausea & cibifastidio, vigiliis item, dolore dorsi & renum, laborantem: nihil tamen aut parum ex abscessu effluebat, neque pus sursum revocari potuit. Itaque paucos post dies è vita decessit: Ex quibus perspicuum est, in hujusmodi abscessibus, sive sint in emunctoriis, sive in vicinia non esse expectandum, donec sponte erumpant. *Guil. Fabric. Hildan. Observ. Chirurg. Centur. 1. Obf. 30.*

Verissimum esse quod asserto P. Alpia. l. 7. M. M. prælag. ult. (citante M. Aurel. Sever. de recond. Abic. nat. l. 1. cap. 29. ex quo etiam *Reverius* fortassis suum summat Theorema haurit. Med. l. 2. d. 2. cap. 3.) Abscessus post aures perpetuo sunt suspecti, nam tere super, cum tractis viribus & videntur novas morborum itextere causas; vel ex sequentibus patebit Historiis. Illustris Comes b. Hardég. 1, magnæ spei Juvenis intra 17. & 18. ni t. mor. annum morbillis corripitur Argentinx. a quibus cura medicorum extra periculum constituitur & liberatur die 12. vel 14. postquam jam necius valere visus in hypocaulo deambulare & licet domum de restituta sanitate exarare, coepit, subito in novam incidit febriculam cum virum omnium vigore ac prostratione, erumpentibus inopinato pone aures parotidibus, & licet omnia, quæ conducere videbantur, adhibita, nihilominus ille tertio vel quarto die in flore ætatis, ingenti suorum cum luctu obiit. Forte hæc Andegavi narravi Medico Urbis Nolodochio præfecto, cum ille manu me duceret ad lectum ægroti cujusdam, ecce, inquit, hic periculosissima febris continua laboravit, sed jam apparentibus motu naturæ critico illis tumoribus rectius se habet, & spero evasurum. Interrogatus ægrotus affirmabat, quæ medicus dicebat, nihilque jam sibi molestius esse siti & virium langore. Hæc n. ibi displicuere, in memoriam revocando illud *Hippocr. in Coactis*: qui morbi in malis signis levantur, & qui in bonis non remittunt, difficiles, ut & 1. *Apho. 27.* non si quid in morbo præter rationem hat levius fideendum &c. quippe Crisis, quæ sit ad partem principem (utpote caput) perpetuo suspecta. Reverti altero die inquisivimus in istum ægrotum, sed ille circa mediam noctem mortuus cum admiratione Medici, qui fidem observationis tum demum dedit. Hic *Posonii A. 1671.* in lepida puella undecim, credo, annorum mihi consanguinea, similes tumestas notavi Parotides. Laboravit illa præteriti anni autumno morbillis, sed inde legitime tractata penitus convaleuit. Circa initium autem præfati anni sine dolore apparere tumores in collo, concomitante lenta & levissima febricula, semper de nocte recurrente. Crevere in dies tumores, & aucta febris degeneravit in Hæcticam, insequente marasmo, quo totum corpus miserum in modum contabuit, ut cutis ossibus, hæserit donec mense Augusto vitam cum morte ingenæ matris viduæ cum luctu commutavit. Hi tumores nullis remediis ad suppurationem deduci poterant, semper duri ad tactum manentes.

Quartum adjungo, sed felicioris eventus Exemplum in Illustris cujusdam Comitæ, qui primo nominati consanguineitatis gradu attingebat, filio, Ottone Heurico. Convalescens hic *Posonii A. 1670.* ex morbillis tubercula circa ures, cum febre quidem intermittente, singulis tamen diebus circa vespere redeunte, afflictissimis parentibus priorem flebilem casum non ignorantibus. Ego vero nihil territus repetendo Alexiteria & Diaphoretica (residuum enim a morbillis judicavi malignitatem eo expulsam) & sub finem purgando ipsum feliciter per D. G. restitui. Est autem hoc morbi ge-




ius nostratibus imprimis in juventute, valde commune, & quandoque cum tali invadit signorum vehementia, ut meritò aliquem tempore imprimis contagii, & rei ignarum terreat, aut aliquid mali suspicari faciant. Remittit tamen ut plurimum intra 24. horas morbi vis, & tubercula sensim sine suppuratione evanescunt, ad quæ ne redeant præser-

vationis ergo communiter Cucurbitulas cum scarificatione adhibent. De Parotidibus in maligna febre earundemque cura vid. *River. in tr. de Febris cap. febr. pest. sub finem.*

#### AXILLARVM FÆTOR

De eo vide Caput de Fætores in genere & in specie.

*Finis Libri primi.*



BIBLIO-



BIBLIOTHECÆ  
MEDICO-PRACTICÆ  
LIBER SECUNDUS

*De Affectibus à Litera B incipientibus.*

BALBVTIES

Vid.

LINGVÆ VITIA.

BARTHOYA.

Vid.

OBAVDITIO.

in Audit. Læſion.

BATRACHIVM.

Vid.

RANVLA.

BATTARISMVS

Vid.

BALBVTIES in LINGVÆ

Vitiis.

BERIBERI.



ST Paralysis quædam species apud Indos familiaris, qua affecti genibus veluti nictando & elevando crura non aliter quam per saltus progrediuntur. Mulierem hic habemus eo afflictam morbo, diceres machinam arte confe-

ctam quæ vi elastica subinde moveatur. De illo jam olim Erasistratus sic autem *Jacob. Boninus Histor. natural. & medic. Ind. Oriens lib. 2. cap. 1.*

Affectus quidam admodum molestus homines infestat, qui ab incolis *Beriberii* (quod ovem sonat) vocatur. Credo quia, quos malum istud invasit, nictando genibus & elevando crura, tanquam oves ingrediantur. Estque species paralyticos, seu potius tremoris: nam motum sensumque manuum, ac pedum, immo verò aliquando totius corporis depravat, & tremere facit. Causa hujus morbi præcipua est crassus & lentus humor pituitosus, qui nocturnis temporibus, præsertim pluvio czlo (pluviz autem assidue cadunt ab initio Novembr. usque ad Maii initium) nervos corripit, dum nimirum homines diurnis caloribus defatigati, noctu omne tegmen & lodices à se rejiciunt; unde facillimè, jam in cerebro præcipue genitus, nervos iste humor phlegmaticus invadit. Nam noctes in his locis comparatione caloris diurni, frigidæ appellari possunt. In hoc casu artus prolongantur, non contrahuntur, insinuante se inter juncturas phlegmate, ita ut nervi & ligamenta inde laxentur. Quamvis autem hoc malum plerumque per gradus & pedetentim homines invadat, tamen aliquando valde subitum est, dum nimirum ho-

mines æstu defatigati, potum ex palma Indica copiose & affarini ingerunt non secus ac in Patria diebus canicularibus aliquando vidimus fieri, cum quis curru, aut alio aliquo vehementi motu, calefactus, potum cerevisiæ aut lactis pressi, nimis avide haurit, ita ut inde sæpe summum vitæ discrimen, immo ipsam mortem incurrat. Porro signa hujus mali aspectu obvia sunt. Adest enim spontanea corporis universi lassitudo; motus & lentus, præcipue manuum & pedum, depravatur, hebeciturque; atque in his plerumque sentitur titillatio talis quædam, qualis in Patria, frigida, & hiemali tempestate, manuum ac pedum digitos corripit, nisi, quod hic tantus dolor non admittit. Tum etiam vox aliquando ita impeditur, ut æger vix articulate loqui possit quod mihi ipsi accidit, dum hoc morbo laboranti vocis sonus per integrum mensem tam exilis esset, ut me vel proxime assidentes vix intelligerent. Adhuc præter hæc aliquando multo plura signa & symptomata, quæ tamen omnia tenacem & frigidum humorem sapinunt, sed præcipua enarrare sufficiat. Accingamus ad curationem itaque, quæ plerumque in longum trahitur; dum nempe humor iste lentus & frigidus ægrè discutitur: per se tamen, ut plurimum, lethalis non est: nisi musculos pectoris & thoracis invaserit, & hoc modo spiritus ac vocis viam intercludat. Verum hoc imprimis curandum est, ne (si ulomodo fieri possit te lecto affigas decumbendo: sed vel ambulando, vel equitando, vel simili aliquo motu validiore, omni conatu te exerceas: currere quidem impossibile est. Frictiones quoque fortes & dolorificæ summè necessariæ sunt, quas commodè hic servi Bengaleses, ac mulieres Malayæ adhibent. Nam nostra gens tali exercitio non alluevit,



ut nec balneis, quæ hic frequentia sunt. Fomenta atque infusiones conficiunt ex herba nobili *Lagundi* dicta, quæ folio quidem Persicariam refert, etque odoris suavis & aromatici. Certe nobis non tantum usum chamomeli & meliloti præbet, sed discutiendi & resolvendi viribus, iis, neco quidem iudicio præstat. Pedes & manus præterea inungendi sunt oleis caryophyllorum & macis, sed mixtis oleoroseo: nam sola adhibita nimis caustica sunt, & cutem facillimè eroderent. Habemus præter hæc nobilem Naphthæ speciem allatam ex Sumatra Javæ regno è regione in conspectu sita; quam *Miniach Tam nah* Indi vocant, oleum terræ significans; quod non secus ac nobis cognita naphtha, quod oleum petræ vocamus, e terra erumpat, vel ex rupibus in subiecta flumina præcipitetur. Hoc oleum à Barbaris in tanto pretio habetur, ut rex Achinensis, qui potentissimus istius insulæ est Tyrannus, sub capitali pœna istud devehire inde prohibeat: ita ut incolæ, nocte intempesta, si quæ nostra, aut Anglorum navis, eorum littoribus adpellat, ad nos istud furtim deferant. Hoc oleum partibus affectis illitum, miraculi instar ægros consolatur. Odore est potè gravi: tamen non fastidioso.

Sed cum hic morbus sit chronicus & longi temporis, nihil æque prodest quam decoctæ ex radicibus chinæ, sariaparillæ ac ligno guajaco; quæ blando & amico nostro corpori calore, frigidos istos & crassos humores, persudores & urinas egregiè discutiunt & evacuant. Interpositis tameli subinde commodis per alvum evacuationibus, inter quas principem locum obtinet extractum quod hic concinimus ex aloë & gutta Cambodiz dicta vulgò, corruptè apud nos gutta gamba.

Sanguinem mittere nefas: non enim plethora, sed cacochynia in vitio est. & quis sanguinem fontem caloris & thesaurum vitæ non esse intelligit?

Hujus affectus reliquæ potè commodè discutiuntur theriacha, mithridatio, &c. sudorem & urinam moventibus, ac nervos roborantibus medicamentis. Reliquas hujus mali molestias opportuna exercitatio, & valida naturæ vis sanabunt.

### Observationes.

Justus Auceps Juvenis peregrinandi cupidus, peragrato jam tum præcipuè Orientis tractu, sublitit tandem in regione Choromandella, ubi sol tantò interdum æstuat ardore: ut indigenæ ejus vitandi causa, cogantur maximam diei partem transigere in balneis frigidis. Quem exurentem fervorem utique declinaturus hic juvenis id negotii famulis suis dedit, ut se plumbo impositum, cottidie, id que sub dio, ac aëre patente, frigidâ affatim perfunderent. Quod certè irriguæ, ac intempestivæ lavationis genus, adeo non profuit, ut potius multum nocuerit. At juvenile vitium est animo non posse imperare. Obstipata itaque cute, & humoribus ab inordinato frigore impendio nimis in nervos percussis, contraxit illam paralytis speciem, quam India *Beriberi* sive *Ovem* vocat, qui morbus, ut minimum

habet periculi, curatur tamen difficilimè: uti suo exemplo docuit hic adolescens: qui propterea cum ipso domum reveritus, nobis animam dedit inquirendi in naturam hujus morbi.

Quem animadvertimus tantum discrepare à perfectâ, quantum conveniret cum imperfectâ paralyti. Corpus quippe erat quidem hebes ac languidum, artusque inertes ac delinæ, nequam tamen omni omnino motu destituti. Et quamvis ægro minime integrum fuerit cibum capere, nedum deambulare, licuit tamen ipsi in sedili sedere, obicium aliquem edere motum, inò in stupidis membris interdum persentiscente vagum, ac aberrantem illum titillationis sensum qui solet præcedere spiritus animales in nervos influxuros, ac jam jam per exigua eorumdem foraminula transitum querituros.

A qua utique imperfecta nervorum resolutione haud quaquam etiam dispar fuit curandi ratio. Convalescente ægro non minus prosperè remediis patriæ nostræ familiaribus, ac si illis ipsis usus fuisset, quæ morbo huic speciatim præscribit, qui Indiarum i. rasecto à medicinis fuit Jacob. Bontius method. med. cap. 1. ne quidem deficiente nobis pretioso illo terræ oleo, quod *Miniach Tinnah* Indis vocatur, & in insula Sumatra, cui præest rex Achinensis, adinitur olei petræ ex rupibus destillat. Cuius Indici olei frequens periculum à nobis factum, tum in frigidis affectibus, nervis ac musculis penitus insidentibus, tum etiam in suffocationibus uterius, quibus non minus opis adfert, quam oleum arte chymicæ succino elicium. Evacuandis autem pituitosis succis (in quibus potissima hujus morbi causa) operam in primis navarunt, cum cathartica convenientia; tum lignum guajacum, sassafras ac radix china; & extrinsecus unguentum, partim ex oleo terræ partim vero ex oleis castorei, ceræ, nucis myristicæ, caryophyllor. piperis, ac ligni rhodii; quorum omnium legitimo usu, non tam confirmatus, quam in pristinum valetudinis statum, integre restitutus fuit. *Nicol. Tulp. Observ. lib. 4.*

### Beriberi Spuriæ.

Verum depingit Tulpius *Observ. lib. 4. cap. 5.* spurium hoc nocentius quò gravius affligit. Expertus illud est nuper *Daniel Wichelhuysen* Batavus, quem funestum hoc malum tandem peremit. Is quinquagenario proximus, post sedecim annos in India Orientali exactos rediit, apud nos confedit negotiationi Eorū manum & consilia accommodaturus. Vix mensem hic transegerat, cum obstinata correptus urinæ suppressione, vesicæ simul stupente, & tractò in locietatem ob musculum communem podicæ. Transiit & in crus sinistrum stupor, & ad ultima pedis tensionem molestam exporrigit. Paucis post diebus notatur & in regione cordis dolor exquisitissimus, non ille cor ipsum divexans, sed inter musculos pectorales & sternum cum summo cruciatu obambulans. Inter hæc mala destitutus consilium postulat. Mihi statim visa illa *rundæpi* & rara & periculosa. Credita initio veticæ ægritudo, suppressio urinæ & narcosis cruris, à calculo per musculum psoas transeunte pendere, dolor autem pectoris à flatibus. Sed glut in eo sum, ut istuc



illuc curam vertam, crus sinistrum paralyti tentatur, & mox dextrum quoque simul cum vesica & podice, ascenditque malum illud & stupor partium ad usque diaphragma. Superiora heri nisi quod ex intervallo redirent immodici dolores musculorum circa cor, quos cum mihi describere frequenter pararet, ut erat vir sagax, & qui sensa animi clarissime alioquin exproiebat, agnovit præ varietate motuum, & inusitata doloris novitate, victum sese quominus ægritudinis illius morem modumque lingua expeditet, innuens tamen subinde vellicari partes diversis motibus, & tandem contrahi tanquam in nodum, cum interim exterius nullus tumor, nullus præter naturam calor apparet. Sed & suffocationis quædam species identidem, maxime noctu, admonerat ex flatibus haud dubie impetuosius, qui tamen solutio paroxysmo erumpebant nusquam. Cætera se bene satis habebant à capite ad usque diaphragma, ratio constabat, de ventriculi appetitu nulla querimonia. Illud gravissimum quod in progressu morbi sponte semper proflueret urina, ægro invito, & alvus constipata, vel ægerrime admotis clysteribus, quicquam excrementorum profunderet sine sensu ægre. Sæpe enim ignarus in propriis volutabatur purgamentis, unde natestribus locis subito gangræna correpta, quicquid etiam contra niteretur solers Chirurgus *Nicolaus Boius*, ad cicatricem nulla arte revocari poterant. Neque viva narium caro sentiebat scalpelli ictum, ne quidem ad ipsa coccygis ossa, nam & ibi gangræna nidulabatur. Tentata in solatium mali varia purgantia, sudorifera, specifica, salia volatilia, spiritus, unguenta, fomenta, alia non quidem nullo fructu, sed tamen non satis optato. Et quidem purgantia faciebant officium, quoties situs corporis exitum permitteret excrementis, alioquin quanquam illa in intestina copiose satis confluerent, non stimulabant ægrum, emortua parte per quam prodirent. Ab urina aspergine liberabat cum appensa vesica bubula labro ligneo præmunita, nam coriaceum sacculum prius adhibitu penetrarat liquor mordax. Sudor à decocto lignorum guajaci &c. prolicitus & sæpe cum euphoria. Propositum balnei usum impedierat gangræna. A cucurbitula circa pectus abhorrens, vesicatorium admittebat, unde per biduum musculorum ibi quies sequuta, sed quæ dolore post graviore penaretur. Quid multis? tantum effecere purgantia & decoctum guajaci, ut ægro ipsi (me adhuc dubio) spes sanitatis affulgeret, narranti redire in crus sinistrum paulatim titillationes internas, & motus non obscuri indicia. Dum hæc aguntur, nescio quis Auster empiricam aniculam in cubiculum ejus me inconsulto, introducit. Illa polliceri statim sanitatem, & unguentorum suorum præstantiam in cælum tollere. Credulus æger, qui à me audierat festinandum lentè, anicula celeritatem auxilii sui jactanti præbuit aures. Inungitur, fricatur, spe inflatur ad aliquot dies, me meo quotidie inculcante pharmaca, & medicatricis illius ignaro. Tandem æger plenior spe felicitis eventus, aperit mihi incognitum secretum; advenire bis in die feminam incuranda paralyti mirificam & crura sua atque femora ad horas tres inungere singulari quodam

unguento, nec illo unius generis, perfricare eam aliis genas, aliis crura, femora denique alio, istam varietatem temperamentorum omnibus medicis incognitam brevi admiranda præstituram. Dum in laudibus empiricæ prolixus est, observo angustias pectoris, & anhelum ægri concitatiores, subiungo quæ ita curam gerendam crurum ut malum in pectus non regurgitet. Sed cum is periculi securus, plus tribueret vocibus medicatricis ineptæ, quam meo præfatio, abstinui ipso non invito ab ulteriori visitatione & ille intra triduum ad plures migravit. *Tom. Bartholin.*

**BLACCIA.**

Vid.

**MORBILLI.****BLÆSITAS.**

Vid.

**LINGUÆ VITIA.****BOMBI. AVRIVM.**

Vid.

**TINNITVS AVRIVM.**

In Auditus Læsionibus.

**BORBORIGMVS**

Vid.

**FLATVS.****ROTIVM.**

Vid.

**BRONCHOCELE.****BOVINA AFFECTIO.**

Est morbus bobus utriusque sexus satis familiaris; nec ulis solis, sed etiam, Leonibus variisque aliis quadrupedibus, avibus item, piscibus &c. ut observat *Clar. Rhedi* in suo de Viventibus in Viventibus tractatu italicè conscripto. In eo autem vermis longior cutem inter & carnem perambulans, illam sæpe perforat, eadem ratione qua comedones & crinones qui infantibus tam graves & molesti sunt.

**BRANCHOS.**

Vid.

**CATHARRVS.****BRADYPEPSIA.**

Vid.

**DIGESTIONIS. LÆSIONES.****BRONCHOCELE.**

Bronchocele, Hernia gutturalis, aliis Struma, tumor est colli præternaturalis, magnus, sæpius æqualis, atque ut plurimum indolens.

Illius plures dantur differentiz; nam aliquando de steatomatum, aliquando atheromatum, aliquando meliceridum, genere est; aliquando verum existit sarcoma, cujus sc. materia est caro pro tempore hebes & stupida; aliquando



materiam tophosam, aliquando tartaream, aliquando gypseam, aliquando lapideam, aliquando ossa, aliquando filamenta & quasi pilos, aliquando carbonem & alia non minus prodigiosa concludit, ut nos ex parte vidimus, & alii ulterius se vidisse enarrant. Satis ex hisce patet nos de vera & genuina hernia gutturis seu tracheæ, (quæ rara admodum, & prope inaudita in praxi,) & a distentis fistulæ pulmonalis membranæ oritur, unde & vox & respiratio non parum impediuntur, imò etiam supprimuntur, verba non facere; neque etiam de tumoribus à dilatatis colli venis aut arteriis, in quarum illis mollietibus multa cum retrocessione materiæ per compressionem, in his vero pulsatio magna reperitur; sed de tumore grandiore colli à vario infarctu orto, vel sarcomate ibidem efformato. Tumor hic aliquando ita magnus existit, ut in totum ferme guttur expansum cernatur.

Causa conjuncta est pituita seu lymphæ viscidior, sale multo, particulisque terrestrioribus imprægnata, unde pro varia sua coagulatione & concretionem, varias etiam emittitur materiarum species. Hæc autem pituita a sanguine ad colli glandulas amandatur, postquam in eo ipso fuit collecta, propter causam aliquam antecedentem, vixit nimirum rationem illi cumulatæ aptam, aquarum pro potu ordinario usurpatarum specificam qualitatem, (propterea endemius est hic affectus, ex parte Sabaudis, Allobrogibus, & iis qui Alpes & Pyrenæos montes incolunt, qui aquis gelidis, quales de rupibus scaturiunt uti coguntur.) Ventriculi debilitatem cibis dissolvendis imparem, &c. Adde aliquando pro ejusdem pituitæ, ad partes glandulosas & membranas juxta laryngem sitas, derivationem, causam aliquam evidentem, nimirum vim factam partibus illis, vel præ vium inusu, in partu difficiliore, vel præ nimis clamoribus in diuturnioribus atque intensioribus doloribus, &c. unde lacerata compage glandularum, diductis earundem membranæ, & impetuosius lymphæ in ipsas dejectæ, non mirum si tum ipsius lymphæ, tum salivæ materiæ effusiones in viciniam fiant, quæ mora congelatæ, sensim magis ac magis indurantur, dum sc. evolante aquosiori motuique aptiori parte, terrestrior, quasi caput mortuum, in dies ulterius desiccatur, atque postea compressionem qua viciniam urget, dum circulationem in vasibus varii generis, vel omnino impedit, vel remoratur, magis ac magis continuo augetur. Rationibus mox enarratis alia etiam addi potest, sc. obstructio in ipso parotydum conglomeratarum aut globularum corpore, vel in vasorum salivarium truncis, aut earundem ramis aliquibus, enata; sic enim vel feri transcolatione per glandulas impedita, vel feri in glandulis transcolari, & ad os continuò derivandi, via obstructa, moras trahit illud serum, & moras trahendo inspissatur.

De parte amandante, non mihi sanè convenit cum quibusdam, qui e cerebro humorem depluere, per sibi ignotas vias, nullique unquam demonstrabiles, asserunt. Quale enim cerebro cum partibus colli exterioribus commercium, præter illud quod per spiritus animales peragitur? Concedam forsitan ex syste-

mate eorum qui succum tumentur nervosum, aliquando eo morbi deduci posse eum succum, ut non amplius spirituum animalium vehendorum officio, fungi valeat, sed potius fermenti sero coagulando apprimè inservientis vices gerat. Sic non tamen tota tumoris strumas constitutentis materia, e cerebro depluere dicatur; nam quis non videt morbo si itius muneris partem præcipuam, imò autem prope dicere integram sanguinem debere, qui dum sero nimium coagulabili imbutus, salibusque fixioribus & motui ineptioribus imprægnatus reperitur, aliquid sarcinæ suæ in glandulis per quas filtratur, necessariò deponit, præsertim si præ fermenti aliunde advecti vi, salium illorum, atque terrestriorum particularum, præcipitatio prius in glandulis fiat; sique, vel frigus externum, vel pororum immutatio per contusionem, aut alia id genus, præcesserint.

Prognosticon quod attinet, si tumor hic fuerit scirrholus, in cancerum quam facillimè abit, nec est quod aliquid per chirurgiam moliaris, quandoquidem sic heret tantum irritatio multa, quæ vitari & declinari totis viribus debet. Si ex tactu appareat, nec majoribus vasibus, nec nervis, nec profundioribus colli partibus adhærescere, nec interim tamen medicamentis cedat, est sanè quod aliquid per cultrum & ignem, nec frustra tentes. Si verò humor intercutaneus fuerit, nec profundius infiltratur, aut ejus in lagma nimis exsiccatum non reperitur, speranda ejus resolutio & absumptio, à medicamentis melioris notæ admodum.

Indicationum prima erit pituitæ in toto sanguine evacuatio aut correctio. Secunda novi ejusdem proventus per dietam, ventriculi corroborationem, sanguinisque & spirituum invigorationem, inhibitiō. Tertia fluxionis ad partem affectam repressio. Quarta materiæ in tumorem aggestæ emollitio, resolutio & discussio, sique rebellior fuerit, per ferrum & ignem, sive actualem, sive potentialem totalis extirpatio. Quinta, si tumor in scirrhum cancerum mutantem abierit, totis viribus humor est mitigandus & demulcendus.

Dixit itaque sit mediocriter sicca & attenuans, propterea vitentur ea omnia quæ sunt, vel aquosiora, vel crudiora, vel crassiora, vel viscosiora, vel sale, aut fumo condita, vel acidiora, coagulationibus quippe conficiendis nata; vitetur nimia desidia ut & nimius somnus, alvus servetur libera, sique illud per se non fiat, adhibeantur clysteria, aut alia id genus.

Remedia erunt & interna & externa; interna, præter purgantia, sunt varia. Bouche-rius Camberiacensis apud Nicolaum de Bleguy decoctum commendat, cujus duo cochlearia decrescente luna, mane & vespere sumenda.

℥. Spongiam puram, affunde spir. vini quantum imbibit, colloca in medio strigillarum coquillæ cupræ stanno obductæ, & manipulo radicis porri circumdæ, superpositoque cooperculo, admoveatur ignis validus, qui urgendus, quousque contenta in carbonem redigantur, demum in cacabum conjice, additis duabus aquæ fluvjatis pintis, cum una cotyla,



tyla, sulphuris communis uncias duabus, ebulliant, non igni in ponendo, sed ope decem, aut duodecim grandiorum silicum, in ripa luminis collectorum, & nunquam alias in usum ductorum: illos probe ignitos conjice in cacabum, relinquendo quousque desinat ebullitio: his exemptis transcoletur decoctum per chartam emporeticam, aservandum in lagena ritè obturata.

Non tam operoso artificio paratur vinum cuius efficaciam ego sæpius vidi.

℞. Salvia M. β. alumin. ʒij. spongiæ ustæ ʒij. infunde in vini bene maturi lb. ij. iunice quatuor aut quinque uncias, decrescente luna maturinis horis & iteretur pro exigentia.

Theveninus pulverem e borace venet. & spongia trita ad ʒj. in vehiculo apto sæpius exhibet.

Clariss. D. Johana. Jacob. Nozet Archiater Friburgensis apud Helvetios Celeberrimus, methodum curandæ herniæ gutturalis mihi amicissimè communicavit, quam hic inquirere pergratum lectori fuerit.

Primo, sequenti remedio corpus expurgat.

℞. Trochiscor alandh. extracti massæ pilular. cochiar. extracti agarici, ana gr. viij. mercur. dulc. g. xv. olei garyoph. lil. grt. ij. M. F. e. a. pilulæ pro una dosi in subiecto robustiori.

Secundò, corpore expurgato exhibet sapis tincturam è speciebus hieræ, & pulvere guttæ, cum spiritu vini extractam.

Tertiò, pro potu ordinario decoctum parat è guajac. sassafr. sars. parill. ligno aloetico, flor. lili convall. salv. beton. pron. & tili.

Quartò, cum per iter. tas medicamentorum jam memoratorum doses videt. humoris fontem aliquatenus exhaustum, secunda aut tertia quique die hora somni exhibet extractum opii spiritui apoplectico maritatum, ut sic fluxio reprimatur.

Quinto & præcipuè parat syrup. pro quo.

℞. Spong. finis. iii carbones non in cinerem ustarum & pulver. ʒiiij. syrup. ex decocto ligni aloës, fol. nasturtii aquat. flor. salvia, beton. & sem. ocymi ʒij. M. & capiat cochleare unum singulis diebus maturinis horis.

Pharmacopœa August. sequent. habet pulverem qui est Arnold. de Villa nova.

℞. Spong. combust. pilæ marin. tostæ, ossis sepis, piper. long. & nigri, zingiber. cinnam. sal. gemm. pyrethr. gallar. lap. spong. ana ʒj. pulveris. & misceant.

Clar. Josephus Donzellus in suo Theatro Pharmaceut. italicè conscripto commendat pulverem, pro quo.

℞. Spong. mar. spong. stipitib. rosæ canina adnascentis ana ʒij. ex iis incineratis fiat pulvis, cujus.

℞. ʒj. ciner. chart. bibulæ ʒij. cinnam. ʒij. corallor. rubr. pulverat. ʒij. M. F. pulvis, cujus hic est usus.

℞. Pulveris descripti ʒj. aut ʒij. infunde in vase vino albo pleno, macer. dies tres, dein tempore plenilunii sumantur omni mane huius liquoris ʒij. donec incipiat luna crescere, quo tempore eo abstinendum, plenilunio vero

subsequente reassumatur liquor ut prius.

Usui salium volatilium ego præcipue commendo, interque eos salen volatilem aromaticum & amarum meæ compositionis, cuius virtutes in hisce & aliis casibus non semel expertus sum.

Usurpentur præterea gargarismata, ductus salivales referantia, lymphæque & humorem salivalem coagulatum fundentia, quale v. g. hoc fuerit.

℞. Radic. ciclam. virent. verbasco. polypod. fol. beton. & rad. brionia ana bulliant in vino. Item multicatoria ex myrrh. radic. imperat. angel. mont. garyoph. &c.

Exterius applicabuntur, emplastrum de cineribus, balsamo sulphuris tach. mahacato prægnans; cataplasma e porris & baccis myrtill. vino incoctis; item e foliis & nucibus cupressi pulver. vino aultero incoctis, & pulvere limacum rubr. sinapisatis. Sale volatili ammoniaco spiritui vini artinciosè maritato, non sine fructu præterea tumor sæpius, sed p. rce tovebitur, ut & sale volatili verè oleoso e gummi carumæ extracto.

Si hisce omnibus non cessat malum ad Chirurgiam deveniendum, quæ eadem prius hic erit, quam in icrophulis describimus. Hocce in negotio tantum advertendum, an tumor fuerit aneurisina, quod intactum relinquendum; anque valis majoribus & nervis adhæreat; si enim nervus recurrens in hac excisione læderetur usum vocis perderet æger; ut illud abundè testantur historiæ ex Galeno, Avicenna, Anato Lusitano &c. cuius facile depromende; ut & propria experimenta in brutis animalibus sapissimè instituta; Clar. Isbrand, de Diermerbroeck historiæ præterea læti nervi recurrentis adfert, quam hic adducere non piget. Rusticus Hollandus, inquit ille, in conflictu quodam aurigarum vulnus cultro iniectum recepit. in colli latius dextrum circa jugulum. Vulnus à Chirurgo cito curatum fuerat. Post aliquot deinde menses ad me venit, rogans ut ipsi aliquod medicamentum præscriberem pro maxima sua raucedine, qua statim ab accepto vulnere laborare cepisset, & quam medicus ille, qui ipsum cum chirurgo tractaverat, nullis linctibus, tabellis, decoctionibus, aliisque medicamentis dispellere potuisset. Vox homini adeò exilis & rauca erat, ut vix, quid diceret, intelligi posset. Ego è vulnere loco animadverti nervum recurrentem transversim præcisum fuisse, per quem vocis efformandæ virtus deferretur, hincque mediam vocalitatem deficere; quod malum cum nullis remediis restaurari posset, ægrum pro incurabili dimisi.

### Observationes.

Observavi vinicolam post ingentem ex frigida & cœnosa aqua haultum in Bronchocele incidisse, quæ plurimum excrevit; deinde ex abscessu facto exivit Bufo vivus, quem meis ipse oculis vidi; fortasse seminalis virtus cum aqua ad colli membranas exsudans huius generationis causa fuit. Paulus de Sorbait in Miscell. Curia.

Paupercula 30. annos circiter nata, inde ab incurabilis insignem strumam in collo gessit,



ut vix respirare, nedum deglutire potuerit, nam tunc maximos dolores patiebatur, ægra fuit macie consumpta & pulum habebat parvum, languidum: consultum iudicatum est ægræ obstaculum ab organis respirationis & deglutitionis, dimovere. Struma itaque in parte molli & declivi profundius incisâ tundeat libram ferrosâ & glutinosâ materiæ foramen vulneris spongia præparata adimpletum & diapalma deligatum est, evacuata omni materia, massa carnea pugni magnitudinis comparuit, tam dura ut nec cathæreticis, nec causticis potentialibus nec igni actuali cedere potuerit, cultro quoque resecari ægre concessum, inventa fuere in massa hac quatuor ossa sibi coherentia, tam putida, ut adstantibus lipothymiam causata sint; ossicula minora ultra duodecim quoque inde exempta, ægraque perfecte restituta est. D. Joh. Muralt. in Miscell. Curios.

### BUBO.

#### Curationes, Consultationes & observationes ex variis.

##### Curationes.

**H**ippocrates magnas in emunctoriis sitas glandulas vocat *Bubones* traductio nonnunc ab affecta parte, quandoquidem illarum inflammatio *Bub.* nuncupari solet. Ita Galenus lib. 1. ad Glauconem cap. 1. & de differ. Feb. lib. 1. cap. 5. inquit *Bubo est Glandularum seu glandulosarum inflammatio* & lib. 2. de Meth. Med. ait, *Bubonem esse affectionem corporis Glandulosi, & quandoque pestiferæ febri associari.*

Est igitur Bubo inflammatio seu potius tumor præter naturam glandularum rubicundus, dolens, renitens, & ex impuro sanguine entice in illas expulso ortus. Hinc pars affecta in Bubonibus insunt plerumque Glandulæ pœne auriculas, sub axillis, aut in inguinibus sitæ, alias namque in aliis Glandulis vix unquam aut saltem raro Bubones fiunt.

Huiusmodi verò glandularum tumoris quedam dantur differentiz. Enimverò minor si sit tumor, minusque dolens, facile tamen suppuretur, *Phima* dici consuevit, sin ad Erysiipelatis naturam magis accedat, neque facile suppuretur quin potius discutiatur, *Phygethlon* appellatur. Si sub Maxilla existat *puma*; atqui post auriculas *parotis* nominatur.

Insuper Bubones alii critici sunt, alii symptomatici, & horum alii contagiosi, alii non contagiosi; alii pestilentes sunt, quia secuntur febres atqui vulgo *bubones maligni seu pestilentes* alii non sunt pestilentes qui *Veneræi seu Gallici bubones*, cum a gallica lue proveniant.

Generalis Ergo Bubonum causa est sanguis vitiosus, accescens, dictas in Glandulas naturæ robore expulsus; qui illic hærens cum propter abundantiam acidum sanguinis formam amiserit atque suppuretur tumorem hunc excitat.

Causa vero efficiens est partium internarum robur, quæ in Glandulas seu vera Emunctoria, vitiosos ablegant humores. Sed quod in Glandulis tantum bubones contingant, ratio est, non quod destinatione quadam naturæ cruoris secreta has in partes deferuntur; ac cum

vitiosæ particule ubique passim in sanguine scætent, in Glandulis seu partibus laxioribus velut in communi foco promptius aggeruntur præsertim cum sanguis illic ad arteriolarum extremitatem delatus, difficulter & non ita promptè suscipitur, ac refertur a venis, atque hoc circa glandulas fieri experientia, & hodiernorum anatomicorum observationibus liquido constare putamus: quare cum in locos glandulosos vitiosi in toto corpore scæcentes humores promptius, quam alias in partes deponuntur impunitatis velut nidus ibidem committitur.

Ita *pestilens bubo* fit, quando particule venenatæ & malignæ in glandulas pœne aures, aut sub alis, aut in inguinibus, aut in collo sitas, naturæ robore expelluntur.

Atqui *veneræus bubo* plerumque in Inguine fit, estque tumor, qui nec spontè, intusque vitio, nec ullo simplici attactu, congestive, aut corrupti aeris inductione, sed impuro duntaxat concubitu contrahitur atque a leo Efficiens ejus Causa haud immerito censetur maligna & venenata quædam labes, quæ coitu in penâ primum accepta, non numquam pustulis, tuberculis, & ulceribus ipsum compurecat, & sese manifestello prodit, antequam partium continuatione altius in corpus propagetur: non numquam verò, pene adhuc integro clanculum penitus sese innuans, intestinas partes primum afficit, sædatque, nullis adhuc notis extrinsecus conspicua, quæ si exigua infirmiorque est, corpus verò sanum & firmum, humorum vitium atque corruptela parva consequitur, quam natura suis facultatibus tanquam copius nix, in partes externas, Inguinum puta glandulas deponit, unde *Bubonem veneræum* nasci contingit.

Equidem varia hæc bubonum genera facile dignoscuntur, & signis à se invicem distinguuntur. Ita symptomatici, non tamen contagiosi bubones cognoscuntur, ex tumore, rubore, dolore, calore, tentione, renitentia, pulsatione quibus sæpe febris adest. In Critico bubone eadem ad sunt signa; Sed insuper adiungitur præcedens morbus, per erumpentem Bubonem morbi sublevatio, & dein ab eodem morbo liberatio.

Pestilentis bubonis signa sunt, quod conjuncta sit febris maligna Pestilens, malignis, symptomatibus, ut Nausea, Vomitu, Cordis oppressionem, animi deliquio, & similibus. quæ in Peste observari solent comitata: insuper si Aggrotans versatus fuerit in aere pestilenti aut in loco, in quo plures peste sunt correpti.

Veneræi Bubonis signa sunt, non solummodo tumor, dolor, rubor, calor & alia proposita, sed coitus cum persona gallica lue infecta nonnumquam & alia ad sunt luis venerææ, signa ut penis ulcera virulenta Gonorrhœa, dolores vagantes & noctu magis affligentes, pilorum desuivium &c.

Cæterum benigni Bubones periculosi non sunt, nisi tarde dissipentur aut suppurentur. Nam quanvis ex sua natura non sint periculosi facile tamen si diutius protrahantur, in fistulas abeunt; quæ non solum sunt difficiles curatu, sed sæpe periculosæ.

In genere Bubones citius maturantur sub axillis quam in inguinibus, & hic citius quam pœne aures.

Malignus seu pestilens bubo subitanè mortis



mortis non raro prodromus est; minus tamen periculosus est, qui præcedit febrem pestilentialem quam qui eandem sequitur. Qui in Lingua apparet, minus habet periculi quam pone Aures aut sub Alis. Etiam talis Bubo quominor est, eò periculosior.

Veneris Bubo lethalis non est, sed difficilis curationis idque non Bubonis, sed veneris infectionis ratione: est equidem salubris, eo namque mediante brevi sæpe curatur venera lues.

Cum igitur Bubonum species hoc modo distinxerimus, proponenda erunt & accommodata remedia. Sic in *Bubonibus benignis*, oris per modum *expulsionis*, antecedens causa primò est evacuanda, quem in finem lenis *Purgatio* sæpe admodum necessaria est. *Vena sectio*, nisi febris gravior aut Plethora exegerit, ne instituitur, quippe quæ sanguinem perturbare, atque adeò naturam in opere *expulsionis* impedire possit. Verùm sudoris provocatio in omni Bubone valde prodest.

Deinde ad conjunctæ materiæ correctionem & evacuationem, nec non symptomatum mitigationem conducunt resolutiva, imò & attrahentia, ac maturantia foris imposita: Repellentia vero non admoveantur, quæ vitiosos robusto naturæ conatu expulsos humores cohibere, adeoque interiora versus repellere solent, unde graviora oriuntur symptomata, atque non raro pallida mors succedit. Ita Hildanus *Cent. 3. Observ. 78.* se observasse scribit, ex intempestivo Repellentium ad Emunctoria applicatorum usu, mortis periculum sequutum fuisse.

Sed in dolorifico Bubone necessarium omnino est *dolorem sedare* ante quam ulla imponantur remedia, admo to hoc vel simili cataplasmate.

℞. Fol. Malvæ, Althææ an. M. j. β. coctis in aqua pura ad molliem, & minutim contusis adde Farinæ Hordei, althææ, Feni Græci an. ℥iβ. Vitellos ovorum numero 2. Croci pulv. ℥j. Butyri recent. ℥iβ. M. F. Cataplasma. Sedato paulisper dolore Attrahentia & suppurantia admovenda sunt V. G.

℞. Rad. Lilior. albor. rec. ℥iiij. caparum sub cinerib. assat. ℥ij. Malvæ, Althææ. Flor. Meliloti. an. mj. caricar. ping. confis. num. 10. Coctis in aqua pura ad molliem, & minutim contusis adde farinæ semin. lini, Feni Græci an. ℥ij. Olei, lilior. alb. ℥iβ. unguenti Basilici ℥j. M. F. cataplasma. Suppuratus Bubo quàm citissime aperiatur, ferro potius quàm cautico, atque apertus servetur, donec omnis materia fuerit evacuata, & dein aliorum ulcerum adinstar curetur. Viz. *Emplastrum Diachilum Cum Gummi* aut *demucilaginibus applicetur*: solo sæpe oleo *oliværum*, *raparum*, *camomilla* vel *liliorum alborum* curatur.

In *Venero* autem seu *Gallico Bubone* nec repellentibus utendum est, nec Resolventibus: verum omni opera curandum, ut quamprimum fiat curatio & suppuratio cum indices videamus, Bubones hi si maturescant & ad suppuracionem deveniant, sæpissime a lue venera evadere ægrotantes. E contrario in Gallico luem facite illos incidere, in quibus vel repellentibus, vel Resolventibus Bubones curare conamur.

Hinc nec venam secare, nec corpus purgare licet, quandiu ulla spes est Topiceis medicamentis eos curare posse.

Igitur ad malignorum humorum perfectam expulsionem si tardior ac imbecillior videatur natura, attrahentibus adjuvanda est imponendumque cataplasma v. gr. ℞. caparum sub cineribus. assat. ℥ij. saponis nigri, emplatri Diachili cum gummi an. ℥iβ. unguenti Basiliconis ℥j. Fiat ex his S. A. cataplasma.

Vel ℞. Rad. liliorum albor. sub cinerib. coct. ℥iiij. caparum pari modo coctarum ℥iiij. Axung. Porci ℥ij. croci pulv. ℥j. vitellos duorum ovorum M. F. S. A. cataplasma.

Verùm tamen cum talis Bubo pertinax sit nonnunquam *cucurbitula cum magna flamma* imponi solet.

Botallius *lib. de Lue venera cap. 10.* ad Gallicos Bubones maturandos, *Fritiones & cucurbitulas ventosas* valde commendat, nihilque his citius vel melius suppuracionem accelerare ait. Fricentur autem digitis simpliciter, vel recenti Butyro illitis, usque dum tumentes, & phlegmone obiti tactum amplius ferre nequeant; quo tempore suppurantia imponenda.

Fallop. *lib. de morbo gallico. cap. 91.* commendat motum, & mandat ut ludant gladio, vel pila parva, ut saliant, & motu isto fiat fluxio, ac promoveatur suppuratio.

Suppuratus hujusmodi Bubo mox aperiatur ferro potius quàm Cautico; *etiam semicotta existente materia.* Enim vero tardius facta apertura sæpe noxia est quod ampliorem quàm par est sibi sedem efficiat, venereum venenum vicinas partes inticiat, pessimaque symptomata inducat, ut exemplo demonstrat Hildanus *Cent. 5. Observ. 65.* Hic tamen omnibus nihil efficientibus, universa tum sanguinis tum Lymphæ malsa infecta, curatio porro instituat ut in Lue venera.

Similiter in *Pestilenti Bubone* nec venæsectio nec purgatio, (quidquid etiam contra adferant Adversarii) locum habet; sufficiunt sudorifera & Alexipharmaca ut in generali pestis curatione.

Extrinsicis nonnulli suadent Bubonibus hisce imponere discutientia, quos inter est Cl. Sylvius, qui *Prax. Medic. lib. 5. tractat. 2.* laudat Pestilentes Bubones in Principio discutere Litu *Olei Cornu cerui.* sed eòdè modus hic periculosus sit & incertus, ei non subscribimus; verum præstat per Attrahentia & suppurantia curationem instituire.

Quum Ergo Peste correpti duritiem cum dolore sentiunt pone Aures, in Collo, sub Axillis, vel in Inguinibus, mox ei applicetur *vesicatorium ex cantaridibus & fermento acris*, ut venenata materies naturæ robore expulsa foras ulterius protrahatur. Altero die admoveatur cataplasma Attrahens, & vehementer naturans.

Ex. gr. ℞. Rad. Lilior. Albor. rec. ℥ij. Fol. Ruta, Malvæ, Althææ, Scabiosæ an. Mj. Caricarum ping. confis. Num. 10. omnia in aqua pura colla in mortario contundantur additis tribus Bulbis caparum sub cinerib. assat. & farina Althææ, Tritici an. ℥vj. fermenti acris ℥iβ. Mellis ℥j. unguenti Basiliconis ℥iβ. Butyri rec. ℥ij. M. F. S. A. Cataplasma. Equidem



in secundo cataplasmate *Fimus columbini* fermentum acre & cæpæ possunt omitti.

Vel ℥. Rad. *Althææ*, cæparum sub cinerib. assat. an. ℥i℥. Fol. *stabiola*, malvæ, *Ruta* an. collis in aqu. communi ad molliem, & confusis, adde Emplastri *Diachyli* cum gummi ℥i℥. O. *scorpionum*, *Mirridatis* an. ℥℥. *Croci* puri. ℥j. M.F.S.A. Cataplasma.

Vel ℥. Capam unamqua excavetur, & cavitas impleatur *Theriaca* Vel *Mirridatis*; dein catia involuta sub cineribus coquatur, hinc Teratur cum oleo *Scorpionum* & fiat S.A. Cataplasma. Cui nonnumquam fermentum acre addi solet. Vel solæ cæpæ sub cineribus assata, confusæ cum pauxillo *Theriacas* & *Buiri* insulsi mixtæ cataplasmatiforma per biduum aut triduum imponantur.

Barbette hoc in casu vehementer laudat Emplastrum.

℥. Emplastri *Diachyli* cum Gummi, de *Mucilagibus* an. ℥℥. unguenti *basiliconis* ℥iij. semin. *sinapi. pulver.* ℥iij. M.F.S.A. Emplastrum.

Nonnulli Gallinam, aut Ranam viventem atque discissam parti affectæ applicant, sæpius eandem renovando. Alii Gallinæ aut columbæ viventis podicem deplumatum admovent. Quidam totum Bubonem sectione auferre conantur quod periculosum valdè, & nequaquam permittendum. Neque etiam cucurbitæ vel infra Bubonem vel ipsi Buboni appositæ conducunt, quoniam & in Peste & Pestilenti Buboni ex admodum damnosæ sunt. Tumor verò maturus mox scalpello incidendus, ut puri exitus pteretur: & quidem aperiendus est, priusquam omnino maturus sit, ut de Bubone venereo dictum fuit; cum citissime venenum sit educendum. Atque huiusmodi Bubo aliquandiu, quantum fieri potest, apertus servandus; dein ab omni sorde mundificandus & aliorum ulcerum ad instar porro tractandus: quem in finem summopere conducit *Digestivum* ex unguento *basilicone*, Melle, *Theriaca*, & *Balsamo sulphuris Terebinthinato*. *Joannes Mannliki Chirurg. lib. I. cap. 15.*

In bubone convenit emplastrum diachylon cum gummat. & mucilag. seminis lini. Si supurationem volumus naturare, addatur aliquid saponis Veneti. Empl. diachylon malax. cum oleo lumbricorum, chamomillæ, lini. Cataplasmatibus, addantur lumbrici, & gummata, v. g. *Tacamahaca*, ammoniacum. Ad attractionem quoque faciunt ficus, *fimus columbini*, parum de magnete arsenicali. Interne dantur diaphoretica & expellentia communia, antimonium diaphoreticum, tinctura bezoardica, pulv. bezoardicus, medicamenta omnia antimoniatæ, quæ valdè expellunt.

℥. Herb. uva inversa, flor. chamomill. flor. melilot. malv. an. m. j. Rad. *althææ* lil. alb. an. ℥j. sem. *alkekeugi* ℥iij. sem. lini foenugrac. an. ℥j. Coq. in f. q. aq. simpl. ad putrilaginem. F. l. a. Cataplasma. adde ol. *scorpion.* ol. *bufonum* an. ℥iij.

℥. Emplast. diachylon c. gum. ℥iij. malaxetur cum ol. *scorpionum*, *bufon.* an. q. s. Potest imponi cataplasma ex sola uva inversa: vel si recens haberi potest, contundatur, & succus expressus applicetur. Convenit etiam

unguentum *dialthææ*. Item fuligo, simisceatur cataplasmatibus & emplastris. *Joh. Michael. in Prax. clinic. general.*

### Consultationes.

Expendenti Aphoristicam Divini Hippocratis, qui nunquam erravit ex Macrobio, sententiam, quod scilicet ex Bubone febres omnes mala, præter ephemeræ, cum insisterem ad præclarissimum Virum Adrianum Spigelium, celeberrimum Anatomicum, & vivis sublaturum, cum bubone sub axilla sinistra anno 1631. annorum 47. non levis mihi scrupulus occurrit, numquid ex bubonibus fiant solæ ephemeræ, vel putridæ etiam; Ex Hippocr. enim sententiæ in Aph. proposito expressa luce clarius statui videretur, ex bubone putridas quinetiam febres fieri posse. Non enim dixisset: Ex Bubone febres omnes malæ præter ephemeræ, si ex Bubone herent solæ febres ephemeræ. Cui subscribentes omnes serè Medicinæ Scriptores, asserunt fieri posse ex Bubonibus non solum febres ephemeræ, sed etiam putridas. Atque de putridis id palam sit ex præsentis Spigeli morbo, a quo extinctus est, quem serè continuè observavi 63. dierum spatio quibus decubuit. Hic etenim Vir præclariss. ex indicis digiti punctura dolorem, & tumorem insignem in sinistro brachio passus est, cui successit abscessus, seu Bubo sub axilla, cum dolore adeo gravi, ut non solum brachium, sed & totum corpus immobile factum sit, cum febre acuta absque annotationibus manifestis, inappetentiâ, vigiliis & gravi virium langore. Vigesima sponte erupit abscessus, & multam saniei copiam triduum effudit subcruentam, foetidam, liquidam, à qua remisit dolor, adeo ut in latus affectum decumbere potuerit, quod antea fieri non poterat. Perlitit tamen febris vehementia, cum tensione, & dolore dextri hypochondrii ad claviculam usque: cui successit diarrhæa prunbiliosa, mox & saniosa, non dissimilis materiæ ex abscessu enarrantis, quod ansam præbuit dubitandi, numquid esset dysenteria, vel abscessus jecoris. Cum verò nulla præcessissent tormina, non ramenta, aut intestinorum erosiones, in jecoris abscessum conspirarunt sententiæ, cum præsertim præteritis annis abscessus ventriculi per vomitum expurgatus fuerit. Interim plura interna fuisse præscripta, cum durante febricula, cum dejectione materiæ saniosæ 63. die extinctus est. Dissecio cadavere, occurrit abscessus in concava jecoris, juxta prognosticum. Ex quibus patet, putridas, quin etiam febres ex bubonibus fieri posse. Quod præteritis annis observatum à me fuit in Nobili Margareta de Doctis fratris mei conjugæ, undecima extincta febre pestilentiali, cum bubone in inguine dextro suppurato, & aperto. Quod si Galenum consulamus primò de Differ. febr. ubi de Ephemeræ ex bubone, adstruit expressissimis verbis, solas ephemeræ ex bubonibus fieri, quæ hæc sunt: *Quæ ex bubonibus febres sunt, calefaciunt semper partes continuas, donec ad cor usque calor febrilis propagatur. Non pervenit autem ad ipsum putrida fuligo, sed ibi permanet, loco bubonis circumscripita, sola alteratione per continuum facta usque ad cor perveniens.*



veniente calore; eo prope modo quo in iis qui solis calore denruntur: ex quibus verbis, compertissimum redditur, ex bubonibus putridas fuliginis ad cor non elevari, atque ideo neque febrem putridam fieri. Accedit quod pulsus in febribus ex bubone sunt aequales, ex Gal. L. de Dignoscendis Pulsibus; cum in putridis sint semper inaequales. Pro solutione itaque contradictionis qua dissentire videtur Hipp. a Gal. non dixerim quidem cum Capivac. & aliis, febres ex bubone vel fieri à causa externa, & manifesta, & has esse ephemerās; vel à causa occulta, & esse putridas; quod videntur mutuati ex Gal. com. Aphor. citati; licet & eo loco non dicat Gal. Bubones qui sine causa manifesta ortum habuerunt, causas esse febrium putridarum, sed hoc solum; *Verisimile est, una cum viscerum inflammationibus accessiones suas habere.* prout in casu nostro, in quo licet bubo sub axilla factus sit à causa manifesta, punctura scilicet digiti, nihilominus febrem putridam annexam habuit eamque lethalem, propter hepatis abscessum: Quare statuendum est bubones factos à causa occulta non inferre putridas, sed significare noxam viscerum principum, ac propterea malas esse ratione signi, non ratione causae. Non enim excitant febrem putridam, quoniam putredo illa cor non subit per vapores putridos; ideoque ubi legitur in Aph. ex bubone febres, legendum, cum bubone febres omnes male, praeter ephemerās. Alii cum omnes possunt esse cum bubone, & non ex bubone. Quod & hac ratione confirmare licet. Putridus vapor in cor exhalans, & ab eo remota parte ignobili, non inducit febres malas; sed emunctoria sunt partes ignobiles, & inguinum partes distant a corde. Ergo ex se non possunt facere febres malas, sed solum eas significant, putridis etiam fuliginibus ad illud pertinentibus, ex Hipp. 2. 6. Epidem. 10. quod, *Abscessus veluti glandularum signum quidem sunt germina habentium cum aliorum, tum praecipue viscerum; maligni autem sunt hi.* Ubi intelligit per germina habentium, affectionem earum partium, cum quibus habent rectitudinem; atque ideo si bubones appareant retro aures, significant affectionem cerebri; si sub axillis, cordis; si in inguinibus, hepatis. Subiungit tamen, tum aliorum; quoniam non semper servatur haec rectitudo, ut in casu nostro, in quo jecur erat affectum, & nihilominus bubo factus fuit sub axilla sinistra, servata convenientia, & rectitudine, neque ratione situs, quia fuisset in parte dextra, neque ratione loci, quia erupisset in inguine, & non sub axilla sinistra: cuius tamen diversitatis causa provenit à punctura digiti valde dolorifica. Semper enim natura affluit medio sanguine, & spiritu in subsidium partis dolentis, propterea confluit ad sinistrum brachium, haesitque materia in glandula, & non ad manum, & digitum decubuit, duplicem ob causam, vasorum scilicet copiam in glandulas diffusorum, per quae iuit materia; secundò ob laxitatem praedictarum partium, cuius ratione expultrix materiam, quae confluit, inde repellere non potuit. Et haec de affectu proposito dicenda habui, omittam ejus curatione quod esset incurabilis & lethalis. *Benedict. Sylvae, Consil. & Respons. Medic. Cent. 3.*

Exhibita mihi morbi & symptomatum, eundem comitantium, historia & schemate quodam, meam de ipsius indole & ingenio tentantem, ut petitioni tuae morem geram breviter sed candide declarat. Et ne longius abeam; tumores illos in inguine prope pubem, & in perineo juvenis, nec non alium puellae sub axilla, & aliorum etiam in eius locis obortos, calidam ejusdem tuxionis solentem esse, extra omnem dubitationis aleam positum esse duco. Hippocrates, venerandus medicorum coryphaeus, inguina bubonum nomine insignit, & glandularum eo loci phlegmones sive inflammatores eodem nomine appellare solet; Tales sunt in dictis personis pululantes, tenente tumore conspicui, rubore persusi, doloris acuti effervescentes, in principio febriculam quandam, ephemeram seu diurnam, comitem nacti. Horum aliqui sunt simplices & benigni, nihilimò contagiosi; Alii vero maligni, & hi vel pestilenciales, vel venereis. Quod eos attinet, de quibus consilio, nec venereos esse, nec pestilentiae characterem praeferre judico. De illis non est ut aliquid addam. De his vero, etiam in pestilenti constitutione calitus nata bubones semper sint suspecti, attamen credo me satis firmas posse in medium proferre rationes, nullam inesse tumoribus istis pestilenti contagii notam. Nulla graesitur in vicinia pestis; nulla ejus, quod sciam sparsa sunt alicubi semina; nullum intercessit cum infectis rebus, vel personis commercium; tumores ipsi non sunt lethales, nec gravia, qualia in peste concipiuntur, adsunt symptomata. Quum primum enim de communi morborum causa pestiferis suis seminaria orta per pulmones aut alios quosvis meatus in arterias & venas irreperint, & sanguinem coinquinaverint, tum primum stomachus nauseat, & cibum averfatur, assumpta eructat, caput dolore affligitur, urgent vigilae & deliria, in aliis sopores, & comatosi affectus contingunt, animi deliquia accidunt, universa corporis moles lassitudine & somnolentia torpet, calor intra praecordia afluat, longè tamen mitior, quam in aliis febribus continuis per artus, velut in Hectica, expanditur. Nec enim tanta humorum putredine, quanta in ardente febre, Causone dicta, succenditur. Vitus quippe pestilentialis absque ulla putredine necare satis est. Unde accidit, ut plerumque pulsus & urina sint in principio sanorum simillima, sed lenta illa febris vaporulenta de hinc violenta vaporibus, quavis putredine perniciosioribus, cor, vitae fontem & domicilium, obsidet; unde pulsus artiarum exilis & imbecillis dispari motus tempore diastolen ejus & systolen meretur. Si vero cordis robur & vires constiterint, expultrix & vegetior est, tum noxios humores vel in principio adhuc crudos & incotos ad emunctoria protrudit, unde bubones pestiferi & anthraces, carbonum more urentes, nigri, petechiae quoque evasuntur, per quos natura vel se exonerat vel tanquam viribus exhausta in crisis conflictu succumbit. His & aliis signis pathognomonicis, quae sunt inseparabiles morborum comites & accidentia, substantialiter ut Galenus ait, illis adhaerentia, pestis ab aliis morbis discernitur. Horum cum nulla se in proposito casu se manifestent, zgro à pestilentiali



lensis contagii suspitione innumes & liberos judico. Faciē tamen fieri potest, ut tumores hujusmodi in pestulenti constitutione à benignitate sua degenerent & malignam naturam induant. Ordinarii sunt istiusmodi bubones & nunc in praxi mea haud infrequenter occurrunt. Vidi, quibus labore nimio defessis, longo itinere & inconsueta equitatione lassatis, artuum dolore gravatis, pruritu, scabie & ulceribus obsessis, & aliis, tumores istiusmodi eruperunt, subsistente nimirum materia copiosa, naturæ sibi consulenti vi ac robore ad brachia & crura expulsa, in inguinum & alarum glandulis & adenibus, recipiendis humoribus accommodatissimis. Tumores verò isti ortus sui primordia derivant à vitiosis succis, præcipue vero à sanguine vitioso, ex mala victus ratione in corpore congestis, qui postea a natura onere se levante, virtute expultrice cooperante, qua data porta, nunc in corporis ambitum, nunc ad principum partium emunctoria amandantur. Nempe quod in Oligarchia contigit, ut potentiores opprimant imbecilliores, in eoque totum onus deponant, idem in corporis æconomia contingit. Natura siquidem, provida rerum mater, semper custodit & desiderat principum membrorum salutem; Et hæc est tumorum dictorum idea, in quorum cura, cum non sint per modum crasseos, præcedente alio morbo, sed sponte sua oborti, sanguine cum copia sua, tum pravitate naturam ad expulsionem irritante, vena à principio secta profuisset; humoribus etiam accommodatis in eam rem præsidis sedulo expurgandis insudandum erat. Quibus neglectis, quid mirum, si dolores ingravescunt & cura protrahatur. Quoad partem affectam, solet sanguis influxus evacuari repellentibus & digerentibus. Illa non sunt tuta; metuendum enim, ne fluxio ad partes principes retrocedat. Hæc vero ruptis jam sponte tumoribus vana & minimè necessaria. Urgente saltem dolore Anodynus utendum, post ulcus ipsum probe mundandum, carne implendum & cicatrice obducendum, quod Chirurgus præsentī relinquo. Cavendum saltem, ne ulcus in fistulam degeneret, quod facile contingit, nisi ex artis lege tractetur. Sed de his satis. Scabie & pruritu detentus, secta cubiti vena, purgetur Apozone nate ex radicibus Oxylapathi, Fumaria, Sena, Liquiritia & Prunis Damaſcenis composito, adjecto syrupo Rosaceo solutivo, postea verò utatur sero lactis Fumaria medicato. *Frideric. Lossius in Consil. Medicin.*

#### Observationes.

Juveni cuidam 15. annorum Bubo & Apostema enatum erat sub alis sine febre. Perunxi mane & vespere oleo nostro sulphuris; ac desuper applicavi Emplastr. Diaphysphuris: quibus statim emollitum, maturatum, ruptum, mundificatum; & consolidatum fuit intra decem dies. *Martinus Rulandus curat. 3. cent. 4.*

Quidam natus annos 9. supra 10. habebat inguinum permagnam inflammationem, cum dolore, propter quam ægre movit pedes, non potuit stare, hunc ita curavi.

℞. Pingued. porci lbj. absinth. contus. q.

f. m. ac. F. pulticula; quam applicabam manè ac vespere per tres dies, unde tumor enatus, ac cum dolore dimmutus fuit. Post tres dies bubonem perit oleo sulph. & desuper imposui empl. diaphysphur. ex quorum usu intra quatuor dies rectissime convaleuit. Interea cum ambulare cepit, accepit talempotionem.

℞. Decoct. lenæ ℥ij. syr. c. rhabarb. ℥j. m. pro nautu qui magnopere protulit. *Martinus Rulandus curat. 28. cent. 8.*

De Sambuco venit in mentem quoddam remedium, quod tibi reticere non debeo, præsertim cum singulari modo aliud agens, in scripto libro meo reperirem, & certo experimento comprobatum legerim, accipiendi sunt fl. sambuci, cum his contundenda cruce, atque simus columbinus, vel piper. Si Sambucus non sit recens aliquid aq. sambuci admiscendum ac fingendum Cataplasma, idque Buboni applicandum; abjiciendum, posteaquam tribus horis jacuerit, in ignem, atque ter repetendum; non ratione carere videtur remedium & autor sanctè assignat, magno & manifesto successu se eum usum. *Jo. Crato Epistol. ad Camerar. lib. 5. consil. & Epistol. &c.*

#### BULIMVS

seu

#### APPETENTIA CANINA

Bulimus & Appetentia Canina apud omnes prope Medicos Autores idem sonant, interim tamen apud quosdam inter accuratiores eo distinguntur, quod *κυνεγία, λονγισία* seu Appetentia Canina sit insatiabilis edendi libido, per quam cibi avidè devorati statim, aut vomitu refunduntur, aut per alvum detruduntur. Quod vero *βελίμω* sit praevalida appetentia, sed paucò alimento sedabilis, ab extremo ambientis algore progenita, in cibi fastidium ac leipothymiam brevi desinens; Quodque propterea vomitus ac secessus quasi hentericus cum implacabili appetitu sit signum illius inseparabile; hujus verò leipothymia & appetentiae voracioris prompta cessatio, in anorexiam etiam abiens. Dum autem hic de Appetentia Canina & Bulimo scribimus non de belluina illa edacitate hominum, sanctæ, ut ludebat Comicus, saturitati litantium, quales fuere olim Bæoti, Mithridates rex Ponti, Heraclides, Milo, Gnatho, Philoxenus, atque præ cæteris Vitellius; sed de immani illa ac morbosa esurigine quæ tota corporea est, verba facimus; Denominationem habet Appetentia Canina à canibus & lupis propterea quod cum ea animalia intestina minus tortuosa gerant, voracitati magis sint dedita. *Βελίμω* verò vocatur ingens fames, quæ bovem veluti exæquat, hic enim particula *ω* rei cui adjungitur magnitudinem denotat.

Cum Bulimus & Appetentia Canina in fame aucta, illic quidem brevi cessatura, hic verò diutius persistura, posita sint, in earum causis exarandis, hic, nobis de fame in genere primò agendum foret, ut illud pensum supra titulo de Anorexia jam perfecimus; istic itaque tantum de famis auctæ causis quædam dicenda veniunt. Augetur autem fames propter acidum



acidi stomachalis in quo propriè ejus essentia querenda est, exaltationem præternaturalem, quæ eo devenire potest, ut, explicante Glissonio, in propriam matrem, tunc in scil. ventriculi, unde maxima ex parte promanavit, subinde inolet, eamque rodât ac sugillet. Hinc ventriculus, addit idem celeberr. Autor, querulus fit, & prodigi instar, omnia quam par est citius dissipat, digerit, dissolvit, absumit, nec repletus satiatur cibus; atqui novæ subinde prædæ innians, quasi inedia mox periturus nufere lamentatur, sumique inopiam cerebro jugiter inculcat. Fit autem frequenter ob nimiam ingluviem, ut sequatur vomitus, aut henteria. Subinde vero depleto tantillum stomacho, ad cibum de novo ingerendum, quasi nihil adhuc comeditilet, redit.

Aciditas descripta sufficitur ventriculo, vel à sanguine particulis salinis acidioribus abundanter nimis imprægnato, quibus præterea excipiendis, atque in visceris cavum transcolandis aptiores sunt glandulæ toti illius tunicæ mediæ inmixtæ. Vel extrinsecus advenit, sc. a cibus acidioribus saleque muriatico nimium saturatis, diutius usurpatis; aut ab ambientis aeris intusiori frigiditate, nivibusque corpus circumcingentibus, unde sc. nitrosum quid emanat, vellicando stomachi superiori orificio, ventriculoque ipso coarctando, ut quicquid acidi in propriis glandulis habet momento quasi expuat, quam maxime accommodum. Hæc autem ultima causa, cum merè occasionalis sit, brevi cessat, imò apostita sic facile inducitur, non adventante sc. per aliquod tempus acido quò, ipso expressionis momento, tota propè spoliata est ventriculi membrana nervea. Atque hæc ipsa est ultima causa quæ Bulimi propriam essentiam constituit.

De signis horum morborum non opus est multis verba facere; siquidem satis superque in mox exaratis explicantur, hic tantum adjungemus in absolutiorem Appetentiz Caninæ descriptionem quod de Eriichtone canit Ovidius Metam. lib. viij.

*Fuit ardor edendi.*

*Petque avidas fauces, immensasque viscera regnat.*

*Nec mora, quod pontum, quod terra, quod educat æv.*

*Poscit, & appositus queritur jejunia mensis.*

*Inque epulis epulas quarit: quodque ambibus esse;*

*Quodque satis poterat populo non sufficit uni:*

*Plusque cupis, quò plura suam demisit in album.*

*Uique fretum recipit de tota flumina terras.*

*Nec satiat aqua, peregrinosque cibibus amnes:*

*Uique rapax ignis non unquam alimenta recusat,*

*Innumerasque facies cremat: & quò copia major Est data, plura cupis, turbaque voracior ipsa est:*

*Sic epulas omnes Eriichtonæ ora prophæti*

*Accipiunt, poscuntque simul. Cibus omnis in illo*

*Causacibi est, semper que locus su inanis edendi.*

*De Prognosi hæc habeto. Canina appe-*

tentia dum obstructions parit, ac cruditates aggerit, insuperabilem vomendi & legendi consuetudinem interdum æstert, ac in hydropem, catarrholque fluxus tandem facessit. Deterior vero est si generalem confectetur corporis depravationem; at minus periculosa si fiat ab acido humore, per varia in dicta errata in stomachum inducto, etenim pluribus potest illud obtundi, de quibus infra.

Bulimus propter adjunctam leipothymiam perniciosus est, si alimenta præsto non sint quibus æger deperditas & exhaustas resumat vires, datis vero cibus aptis illi promptissime subvenitur.

Indicationes curativæ in Appetentia Canina sunt acidum infringere, tum per dietam, tum per medicamenta; cruditates aggestas expurgare; Obstructions referare; Ventriculum & intestina roborare. In Bulimo nihil aliud agendum venit, quàm leipothymiz ipsius confectaneæ alimentis vi cardiaca præditis prompte mederi.

De Curatione ipsa non habemus quæ superaddamus iis quæ jam adjicienda sunt.

*Curationes Consultationes & Observationes ex variis.*

*Curationes.*

Appetentiam caninam (hujus causa bilis præstina seu succus vitriolatus in ventriculo non ergo imperandus est vomitus, ne moto humore sequatur Cholera, nec dandi sunt succi vitriolati acidi, ne malum augeatur) tollit Essentia melissæ cum sp. vini extracta; cujus dos. cochl. j. misce cum aliquot gut. olei carui, præmittenda tamen sunt universalis, quæ succum vitriolatum seu bilem minuunt & per inferiora deducunt. Sic extractum Rhabarbari, mechoacaniz. It. pachymagogon vegetabile maxime hic laudantur. Vitelli ovbrum qui indurati, sæpius comesti à specinca proprietate acceptissimè solvunt Joann. Hartmann. in Prax. Chymiatricæ.

Villanovanus refert quendam hoc affectu percutum, panem calentem, amurca olei imbutum comedis & mulierem bovis liquatum adipem, cum pari calentis olei quantitate, duabus vicibus bibisse; & in tantum cibi fastidium utrumque incidisse, ut nihil per 3. dies comederint, & à priori affectu liberati sint. Narcotica medicamenta sensum ventriculi nimis exquisitum obtundendo, famem illam caninam possunt imminuere. Inter ea theriaca recens magis est ex usu, quia præter vim narcoticam, humorum etiam malignam qualitatem, quæ à nonnullis in hoc affectu subesse creditur, virtute alexiteriâ corrigere valet. Narcotica tamen rarò & non nisi summa urgente necessitate usurpanda sunt. Ambra grisea ad v. vel vj. gr. cum ovo sorbili sumpta non solum ventriculum roborat, sed etiam proprietate specifica huic prodesse creditur. Lazarus Riverrum cap. 2. lib. 9. prax. Med.

Curabitur famés aucta exhibendo ea quæ acidum succum in corpore temperant, infringunt, & emendant, ejusdemque augmentum præveniunt: potentissimè succum acidum



infringunt salia lixivialia, tum fixa, tum volatilia, ut & alia alterutro abundantia, corallia, margaritæ, oculi cancerorum, creta, lapis hæmatites, succinum, chalybis limatura, & similia. Eundem succum acidum obtundunt pinguis & oleosa omnia. Eum pariter temperat spiritus volatilis ex vino, aliusve paratus, eum denique diluunt & enervant aquea quævis copiose usurpata, abstinendum ab usu acidorum. Exempli loco sunt sequentia.

℞. Corall. rubr. marg. præp. an. ℥j. cretæ alb. ℥ss. sacchar. alb. ℥ij. M. F. pulvis in vj. doses dividend. & bis in die tribus saltem quatuorve post cibum assumptum horis ex vini potentioris cochleari assumendus, cui forma liquida magis arridet, capiat subinde sequentis misturæ cochleare unum.

℞. Aq. menth. ℥ij. aq. cochlear. tinctur. Cinnamon cum spiritu vini retincto per infusionem paratæ an. ℥ss. syr. absinth. ℥j. m.

Vel. ℞. ol. macis, granorum juniperi an. ℥j. m. in vitro. Hujus olei guttas ij. vel iij. sumiat æger aliquoties in die, ex vini malvatici, alteriusve generosi, aut præmixtæ misturæ cochleari. Utatur quoque fame auctâ pressus iusculis tum pinguioribus, tum ad gelatinæ consistentiam proximè accedentibus, nulloque acido conditis: nulla hæc purgantia præscribo, quoniam nulla sunt hæcenus mihi nota, quæ humores acidos educant blande *Franciscus Sylvius, cap. 2. lib. 1. Prax. Med.*

*Zachius* narrat vini generosi potu plurimos caninâ appetentiâ laborantes curatos esse. Fames canina ob lumbricumæ. cubitorum concitata, est teste Eodem. Succus naturalis aquatici maturino tempore per aliquot dies sumptus certissimè ventriculi vermes enecat. Si ergo est à vermibus, conveniunt medicamenta præcipitantia & narcotica. Vinum salviæ specificè prodest. It. essentia melissæ, pilulæ hæræ pieræ. Externè valet aloë & fel tauri in pultis forma. Essentia absinth. *Joann. Michael. in Prax. Clinic. general.*

In appetentiâ nimia. ℞. Conserv. Rosar. ℥j. tartar. chalybeat. ℥j. sæcul. aronis, ocul. cancer. an. ℥ss. m. f. conditum. Dosis ℥j. manè & vespere.

Vel. ℞. Conserv. Rosarum ℥j. chalyb. præp. ocul. cancr. an. ℥j. sal. absinth. ℥ss. m. f. bolus Dosis sit præcedenti similis, seu.

℞. Tartar. chalybeati, corall. rubr. margarit. præp. an. gr. 10. C. C. ust. ℥ss. m. f. pulvis pro una dosi.

Vel. ℞. Cremor. tartar. ℥j. lapid. hæmatit. ℥ss. ocul. cancr. cretæ alb. an. ℥j. sal. straxini gr. 15. m. f. pulvis pro 3. dosibus. *In India.*

℞. Terræ rubr. martis ℥j. lap. frigid. citrin. percar. præp. an. ℥j. m. f. pulvis pro 2. dosibus.

Vel. ℞. Conserv. Rosarum ℥j. terræ rubr. martialis ℥j. lap. percar. præp. matr. perlar. præp. an. ℥ss. m. Dosis manè & vespere ℥j. ad ℥ij. *Hermann. Nicol. Grimm. in Compend. Medic. chymic.*

### Consultationes.

Tabellarius quidam per dispositos. equos algidioribus ac fervidioribus anni temporibus,

diu noctuque iter faciens, annum agens 40. temperamenti totius & iecoris calidi & heceti, gracilis habitus, cum hyeme præterita, loca montosa, frigida, atque nivosa peragrasset, maturinis horis, frigidissimo stante Aquilone, perfrigerationis sensum in visceribus percepit, simulque cibum capiendi vehementi desiderio correptus, præ fame animo defecit, quinimò cum alimenta præsto non essent, paulo post rusticum quoddam tugurium ingressus in lypothymiam incidit, qua, ut ipse ait, periisset, nisi Rusticus hospes aceto cum aqua frigida inspersisset, & vinum in os infudisset, ignique ita etiam admovisset, moxque, vel ipso invito, & alimenta respuente, vino, lacte, & ovis vires Instaurasset. Quoniam autem hoc mali genus non semper Pat. corripuit, adeo ut solita itinera non amplius ingredi audeat, consilium ideo nostrum & auxilium petit.

Affectus, quo Tabellarius iste correptus est, ex ingenti vehementique fame, lypothymia, seu animi defectu syncopi proximo, & anorexia, seu ciborum averfatione consistere videtur, etenim ab initio vehementes cibi desiderium suboritur à quo animo linquitur, mox restitutus cibum prorsus averfatur: Quare Bulimos appellandus, quem magnam famem nuncupavit Paulus, Tral. & Aët. Gal. verò dixit, nil aliud esse quam animæ defectum, & Actuarius Bulimo detentos cibum averfari asseruit.

Malum hoc plerique medicorum cum fame canina solent confundere, cum tamen ipsum definiat Gal. quod sit, *Casus potentia ex frigiditate exteriori, qui à fame quidem inchoavit, sed non habet eam amplius adjunctam.* Ideo subdit *A fame Canina Hipp. differt.*

Fit autem hoc modo. Dum ab externa intensa ambientis frigiditate per os attracta, & per cutis etiam porositates insinuata ventriculus facile refrigeratur, ut pote pars non carnosa, sed frigida & membranosa, ab hac frigiditate vitio nondum inmodica, os ventriculi condensante, constringente, vellicante & irritante, vehemens excitatur ciborum appetentia, at in progressu eadem invalescente & præcellente, calor ipse extinguitur, unde non solum perit appetitus, verum & animi defectus ac lypothymia subsequuntur. Ex quibus apparet, quod in principio convenit quidem cum Canina fame, cum ambo ab ingenti appetitu incipiant, in canina tamen fame percurante, cessante verò in bulimo, prout illa in Diarrhæam, vel vomitum definit, hic autem in animi defectum & lypothymiam cuius causa à Professoribus in alimenti inopiam referri solet. Hinc dicebat Avic. *bulimos est fames membrorum, cum satietate stomachi, sicque membra semper famelica, & nutrimento indiga sunt, cum tamen stomachus illud ipsum respuat.* Attamen quoniam brevi adeo inedie tempore, membris omnibus alimentum deficere impossibile est, ac proinde corpus ad lypothymiam & animi defectionem perducitur, verisimilius propterea nobis videtur, quod ore ventriculi vehementer perfrigerato & affecto, illico cor in consensum trahatur. Nulla quippe pars nostri corporis æque ac os ventriculi in consensum ducit utrumque principium, nimirum cor & cerebrum.

Neque



Neque audiendus Arist. cui subscripserunt quoque Avic. & Trall. mox & Altimarus, & Mercurialis, Bulimi causam calidam esse statuentes, quod tanta frigiditas in nobis dari non possit ab ambiente frigido inducta, sed a calefacto ventriculo ob frigus ambiens, atque à calore dissipato, inanitionem fieri, exinanitoque ventriculo impotentiam succedere, qua dissipentur ac resolvantur spiritus, unde tandem frigiditas, non est, inquam, cum magnis istis sectatoribus Arist. audiendus, huiusmodi namque antiperistesis in corpore exangui, frigido ac membranoso admitti non potest, satis tamen hoc nobis sit, quod & ipsi frigiditatem in hoc affectu concedant atque adeo cum Gal. & Aetio conveniant. Neque subticendus error Trall. de suo Bulimo in illa muliere quæ cum multa atque immodica assumeret ac concoqueret, nunquam tamen saturabatur, quæ erosionem in ventriculo passâ, assumpta hiera vermem insignis longitudinis eiecit, à quo immoderata appetentia cessavit, Bulimosis namque affectus ille non fuit, quia nunquam in animi defectum vel lipothysiam incidit mulier; nec forsitan canina tames, quia neque vomitus, neque alvi dejectio subsequiebantur, sed Animal ut omnia alimenta absorbens, citra ullam ventriculi lationem. Mulierem ad cibum capiendum compellebat.

Affectus hic gravissimus est, parum enim abest à caliditatis extinctione, unde quamplurimis in hoc is deservis Bulimo correpti, momento temporis perierunt, quod evenisset quoque Patienti nostro, si procul ab incolis, ac proinde ab auxiliis in hoc malum incidisset. Neque adeo facilem futuram censemus expetitam præsertionem, prout incertam admodum curationem omnimur.

Certa tamen evadere poterit præsertio, ab itinere per loca frigidissima atque nivosa abstinere, alioquin cum gracilis corporis sit, rarique habitus, forsitan etiam ventriculus exquisito sensu præditus, verendum foret ne quoties intensa ambientis frigiditas ingrueret in bulimum incurreret. Nihilominus, ut ipsi morem geramus præsertionis gratiâ primò, mox & curationis, aliqua præscribemus.

Primò itaque iter facturus, ventriculum Oloris aut Mergi pelle, aut sacculo ex plumis lerdicis & anseris præmuniat, nec jeunè frigidissimo aëri insintinere se exponat, Ore caryophyll. aut frustulum nucis Myristicæ continuò verset, atque dentibus terat. Vasculum vitreum aut terreum, Aqua vitæ Juniper. aut Caryoph. plenum secum portet, ut urgente necessitate ejusdem haustu recreetur ita enim ab ambientis frigiditate ventriculo tutato, famem arcebit. & potissimum animi defectum.

Pro curatione verò omnium primò ab animi defectu Pat. revocandus. Secundo præsentissimum auxilium à cibis statim petendum ex Aetio. Tertiò ventriculus & totum calefacienda. Ac tandem appetitus excitandus.

Quibus explendis intentionibus iubet Gal. ut omnino totum corpus calefiat prope ignem illud fricando atque fovendo. Secundo, ut vinum exhibeatur. Et tandem cibi calefacientes ingerantur. Nec ullo modo audiendus Trall. qui frigidam exhibet, quod cum Arist.

credat bulimi causam calidam esse. Statim itaque frictiones, calefactiones, extremarum partium vincula, Capillorum vellicat ones, mox odoramenta præcipiunt Aetius & Paul. ex decoctione Pulegii in aceto, & pane calido, vel ex carne suilla assata, omnia tamen desumpta ab ipso Gal. Et licet odores nutrire posse negatum fuerit ab Arist. opposita tamen sententia fuerunt Hypp. & Gal. cum eo, licet ita conciliari possint, quod scilicet si pro simplici qualitate odorabili odor sumatur, non nutrit; nutrit autem si pro vaporosâ substantia ab odoriferis corporibus effluente usurpetur, cum enim qualitas odora sit accidens, nutrire non potest, nutritio namque fit ex rebus corporeis, quia est evacuati repletio, evacuatam autem corporeum est. Conciliantur quineriam, si dicamus cum Hypp. & Gal. odores spiritus tantum alere, non autem solidas partes, quod solum negavit Arist.

Restitutus autem Pat. solidioribus nutriendus, jure scilicet carni, vino, ovis sorbilibus, & iis quibus modica quantitate vis plurima inest. Vinum sit dilutum, meracum enim corpora exinanita atque imbecilla ad convulsiones ac deliria perducit. Utcunque autem nutritio Patienti, aliqua calefacientia, tum interna, tum externa administranda veniunt. Intrinsecus convenit aliquod cochlear Aq. Cinamom. Elix. vitæ in Aq. tot. Cit. Scorzon. vel cord. prima Sax. Parandæ quoque, & pro usu præsto habendæ Confect. Rotul., ex Oleo Anis. Caryophyll. Cinamom. Cort. Citr. Extrinsecus fovendus ventriculus decoct. Mentha, Absynth. Caryophyll. Cinnamom. vel saltem inungendus oleo nucis Moschatæ. Tandem ad appetitum restituendum plurima existunt, verum vi peculiari præ aliis pollet in hoc affectu acetum squill. in aq. buglossi. & quia afferunt Chymici, Bulimum fieri ex succi Vitriolati defectu, adeo abs re non fuerit, ad acida vitriolata confugere, ut est spir. vitriol. philosoph. in vino granatorum, vel cum tinctur. ros. exhibitus.

Victus rationem quod attinet, Cibi sint facilis coctionis, atque distributionis, ut citò nutrant, Italiani missio consilio, qui alimenta difficilis concoctionis proponit, à causa calida bulimum fieri falso persuasus. Et quia *Bo- rum quæ velociter nutriunt, veloces quoque sunt excretiones*: ideo *Et quibus semel, aut bis, & quibus plura ne in pauciora offerre oporteat*, considerandum. Unde Galen. in Com. monet, quod in defectu spirituum, parum & sæpe cibus sit offerendus. Quæ pauca, tum pro præsertione, tum pro curatione satis.

Joann. Raymund. Fortis Consult. & Respons. Medic. T. 1. Cent. 2.

Reverendiss. Canonicus 30, annorum temperamenti totius & jecoris calidi & siccis, ventriculi verò frigidi, gracilis & rari habitus, copiosis cibis, fructibusque & potibus nive refrigeratis semper usus, cum multis abhinc annis vorax quodammodo factus fuerit, & frequentibus Diarrhæis obnoxius, tandem anno abhinc, licet abunde, quinimo consueto plenius & avidius cibos assumat, nunquam tamen satiatur. Quod si aliquando plurimo alimento famem compescere tentet, in tantum ventriculi anxietatem delabitur ut vomere cogatur.



Quamobrem, ut ab hac insigni molestia atque incommodo vindicaretur, medicum petit auxilium.

Fames morbose, qua Reverendiss. Vir laborat ad amussim à Galeno describitur titulo Caninæ famis, & definitur ab eodem quod sit, Vehemens & indefinens ciborum appetentia, proveniens vel ab indefinenti sensu suctionis, vel ab alimenti defectu. Læditur os ventriculi, in quo sit appetitus, & licet Plantis quoque ventriculum non habentibus, competat fames, est tamen in his opus naturale, proveniens à suctione per partes facta, donec deventum fuerit ad ipsas radices, quæ postea appetitu Animalis non egent, ut indigentia prospiciatur præsentem scilicet alimento, Animalibus verò præter opus naturale, quod suctione sit, sensu quoque ejusdem suctionis fuit opus, appetitu videlicet Animalis, ut distans alimentum exquireretur, quod animale opus Appetitus propriè, sicut naturale Fames appellatur.

In casu itaque nostro indefinens est Appetitus hic Animalis, in ore ventriculi excitatus, non sine tamen præcedente nimia vasorum suctione. Quare utraque causa à Gal. jam recensita, ad hanc Caninam famem excitandam dubio procul concurrit. Et primo quidem alimenti defectus, quoniam utpote temperamenti calidi & siccitatis habitus, plurimum Pat. resolvitur, unde perpetua totius exinanitio, & inde necessaria suctio, dum venæ majores à venis partium exugunt, donec ad os ventriculi deveniatur, in quo tandem perficitur suctionis sensus, qui hoc casu adaugetur à copiosiori succi acidi portione, & continuus redditur ab intemperie frigida ipsius ventriculi, quæ constringendo, vacuando, vellicando perpetuò irrita sensum suctionis & appetitum ipsum Animalem, unde in Arte Med. dicebat quod frigidior natura ventriculi, ad appetendum quidem plurimum viget, ad concoquendum autem minimum. Quæ quidem intemperies naturalis eidem fuit, multum tamen adaugeta, tum à copia prægressa ciborum, unde frequentes contingebant Diarrhææ, tum vero maximè è gelidorum fructuum atque potionum consueti usu. Neque obstat quod temperatus ventriculus magis concoquat & appetat, quam calidus & frigidus, ut Gal. asseruit, tunc enim de naturali appetitu, & concoctione loquutus fuit. Nec rariter quod scribit Avic. *Et quandoquidem accidit appetitus Caninus, propter caliditatem superfluum in ore stomachi resolvablem & restaurationem requirentem, ob quas os ventriculi quasi semper sancticum fit*; Etenim caliditas hæc non concurrit, ut causa proxima Canini appetitus, sed ut remota, quatenus frigiditatem inducit: sicut enim dum caliditas tenuius humidum resolvit, siccitas superest, sitim excitat; ita dum resolvit humidum crassius, frigiditas inducitur, famis causa.

Verum quoniam copiosa adeo alimenta, nec ventriculus conficere potest, nec iis corpus universum eget, ideo necesse est, ut more Canum Pat. ad vomitum se convertat, sicut superioribus annis per alvum exonerabatur non secus ac Seleucidæ Aviculæ, in Asia, Locustas comedentes easdemque per alvum excrementes.

Affectus equidem non spernendus, etenim diuturnus calorem nativum adeo labefactat ut Concoctrice & Retētrice debilitatis in Hydropein, aut Celiacam passionem tandem deiciat, & nisi cibis succurratur, in hac potissimum calida & sicca temperatura, facili febres accendantur, quinimo si Pat. pravis utaturalimentis, febres pestiferæ, vel cutanei molestissimi affectus suboriantur. Et licet Virum hunc Reverendiss. hujusmodi affectu liberare non adeo facile fuerit, cum præternaturales, novas etiam morbosas radices egerit, quia tamen Medicis mandatis obtemperaturus est, salus speranda.

Cujus gratia causas contraria sunt opponenda, totius enim habitus quodammodo censandus, & intemperies frigida ventriculi corrigenda, quæ quoniam non sine acidæ pituitæ ope affectum hunc excitat, ideo hæc prius deturbanda, mox intemperies emendanda, atque tandem à proprietate juventia in usum revocanda.

Quibus explendis intentionibus, à fonte Chirurgico desumendæ inunctiones totius corporis densantes, ex Ol. Ros. & Viol. frequenter repetendæ.

Ex Pharmaceutico primò ratione acidæ materiæ, Lenientia, Præparantia, & purgantia conveniunt. Leniens sit Elect. Lenit. cum Hiera, vel mel. ros. sol. cum cremor. tartar. Præparans sine diluto, ut diutius in ventriculo moretur sic paretur.

℥. Mell. Ros. simp. Oxy. simp. Aq. vitæ caryophil. an. ʒj. m. pro syr. & sic pro aliis.

Vel ℥. Oxy. simp. Aq. cinnamon. an. ʒj. Salis menthæ gr. vi. m. pro syr. Purgans validum non sit, cum materia expurganda in ventriculo hæreat, unde nil Hiera picra præstantius quæ humores impactos dissolvit, expurgat, ventriculum calefacit, exsiccet & roborat. Quare.

℥. Spec. hier simp. ʒj. f. Elect. lenit. ʒvj. m. f. b.

Vel ℥. Pil. de hier. cum agaric. ʒj. Aleph. ʒʒ. m. reformentur pilulæ, cum vino aromat. & aur. Quod si fortasse hæc acidæ materiæ præparatio non sufficiat, prout nec expurgatio, repetatur hac ratione.

℥. Oxy. mel. squill. Syr. de Præssio, de Mentha. Aq. vitæ Caryophil. an. ʒj. m. pro syr. & sic pro aliis, quibus expurgatio Hiera picra, vel pil. succedat.

Frigidam autem ventriculi intemperiem corrigunt Diacyminum, Elect. Agreg. Avic, de Scoria ferri Haly, Theriaca ex Serapione, Diatrionpip. quo Gal. Septuagenarium spatium unius hedomadæ sanavit. Verum Hippocr. meraci vini potum proponit, dicens, quod *Famem thorexis solvit*. Quod genus remedii admittitur quoque in Com. à Gal. Efficacius autem reddi poterit vinum ipsum, si piper, aut spica nardi eidem addatur, & jejuno ventriculo calidum acervatim præbeatur, statimque cibaria pingua & oleosa exhibeantur. Extrinsecus quoque intemperiem frigidam corrigere poterit stillicidium ex Oleis, hoc casu parandum, prout in corporibus obesibus, Aquis sulphureis. Itaque.

℥. Olei Amygd. dul. Amar. an. ℥iij. Mastich. ℥j. vin. malvatici ℥jʒ. Nucum Myrist. contus. n. ij. Cinnam. integr. ʒʒ. Macis, Caryoph.

an.



au. ʒij. Fol. Menthæ rec. m. j. m. bulliant omnia ad consumptionem vini, & facta fort. express. serverur pro stillicidio, 20. saltem diebus administrando. Reliquo vero tempore, illi non poterit os Ventriculi ol. M. Ducis Etruriz, vel etiam Nucis Moschatæ per expressionem parato.

Tendem aliqua à proprietate juvantia non omittenda. Ita Caro Glirium à proprietate nauseam provocat, Essentia item melissæ cum Spir. vini extr. ad cochlear, vinum pariter salviatum.

Quibus omnibus congrua addenda victus ratio, quæ primo gelidi potus omnino mittendi. Servanda quoque propria ciborum quantitas, Gal. consuetos cibos, duplos & triplos permittit, eisdemque difficilis resolutionis proponit, cujusmodi sunt caro suilla, Cochlear, cancri, oryza cum lacte, Caseus, Pultes ex farina triticea; Ratio est, quia, *Eorum quæ velociter nutriunt, veloces quoque sunt excretiones.* Foveri autem potest affectus hic ab Aqua, & Vigiliis, hinc, *Aqua edax, Vigilia vorax.* Illa, quia refrigerando & exprimendò appetentiam generat & adauget, hæc verò, quia corpus digerit atque resolvit, ut Gal. in Com. Quæ pro hujus affectus curatione sufficiant. *Iidem ibidem.*

Juvenis 26. annorum, melancholicus, post longum multorum acidorum usum, incidit in ingentem famem, quæ quotidie sexies, septies & amplius cibum copiosum sumere cogitur. Post cibi sumptionem sæpe ventriculi sequitur dolor; quem deinde vel vomitus, vel magnus alvi fluxus, lipothymiam sæpius inducens, sequi solet.

Afficitur in hoc ægro ventriculus; quod ex ingenti illa fame, item ex ejus dolore, necnon ex vomitu, est manifestum. Afficiuntur quoque intestina, quod ex alvi fluxu, & cor, quod ex lipothymia insequente patet.

Morbus, quo hic æger torquetur, est intemperies quædam acida & valde acris ventriculi, quæ illam ingentem famem, tam copiosam frequentemque ciborum sumptionem, & ventriculi dolorem, vomitum, alvi magnum fluxum, & lipothymiam inducentem, producit, *Fames canina* vulgò appellari solet.

Causa procacitica hujus morbi fuit diutinus ille copiosorum acidorum alimentorum usus. Hinc vero copiosi acidi humores in corpore geniti, & cum sanguine per illud diffusi, antecedentem hujus morbi constituerunt causam. Pars verò eorum copiosè & perpetuò ad ventriculum delata, eumque acore & acrimonia sua magnà vellicans, facit ingentem illam tam copiosè & frequenter sumendi alimenti imaginationem. Cum verò illud assumptum rectè à ventriculo non concoquatur, & magnam acrimoniam præternaturalem adipiscatur, hinc oritur ventriculi morsus, spiritusque ita ex illa morsus vellicatione determinantur, ut illi fluentes, modò in ventriculi & intestinorum obliquè ascendentes fibras, vomitum; modò in obliquè descendentes, alvi fluxum, & lipothymiam, per spirituum & utilium humorum dissipationem & evacuationem, in hoc ægro pariant. Atque ita existit acidus ille humor, in ventriculo genitus, vel ad ventriculum delatus, continens hu-

jus morbi, & remota symptomatum ejus causa.

Morbus hic valde periculosus est. Ab eo enim sæpe celiaca affectio, vel hydrops oriri solet; & quia hic adest lipothymia, metus est, ne æger subito extinguatur.

Curatio itaque est acceleranda: eaque in causarum & intemperiei ablatione, bonæ temperiei reductione, consistet. Prunò itaque præscribatur tale vomitorium.

℞. Conserv. fol. asari ʒj. vin. alb. ʒiij. contundantur in mortario marmoreo, & exprimatur postea liquor, cui adde aq. cinnam. ʒß. F. Vomitorium, Vel.

℞. Salis vitrioli albi ʒß. aq. decoct. hordei ʒij. oxymell. simpl. ʒß. M. pro Vomitorio: Postea utatur tali Apozemate.

℞. Rad. acori ʒß. rad. Heleni ʒiij. Cort. citr. aurantior. an. ʒß. herb. menth. saly. puleg. rorismarin. m. j. absinth. m. ʒ. sem. anis. fenicul. coriandr. carvi. an. ʒij. Decoq. in vini G. l. lici q. s. ad ʒbiß. In colatura dissolue syr. de mentha ʒij. Aq. cinnam. ʒj. M. F. Apozema. De quo sumat æger haustum mediocrem, bis terve in die. Subinde etiam purgetur talibus pilulis.

℞. Pil. de hiera ʒj. rhabarb. ʒß. cum syr. de mentha F. Pilulæ No. v. vel vj. Postea utatur tali condito.

℞. Conserv. rosarum ʒiij. Diacydon. ʒj. nuces moschat. cond. No. ij. Corall. rubr. præpar. ʒj. spec. aromat. ros. Caryophyll. incis. an. ʒiij. Cum syr. cydoniorum F. Conditum, De quo æger aliquoties in die sumat magnitudinem castaneæ majoris.

Si æger in paroxysmum lipothymiz incidat, ad se erit revocandus exhibito cochleari aq. cinnam. odore panis vino madidi, & similia. In ingenti ventriculi morsu exhiberi potest theriaca, vel Mithridatium, requies Nicolai, vel simile.

In victus ratione Aer sit temperatus; æger quiescat & diutius dormiat. Cibi sint, qui tarde coquantur & distribuuntur, quales sunt cochlear, cancri, caro suilla, & bubula, oryza, & similes. Vinum & omnia attenuantia vitentur. *Henric. Regius apud Theod. Craanen.*

Juvenis 28. annorum, qui toto corpore satius, sed nonnihil melancholicus esse videtur, & duris, salis, acidisque alimentis oblectatur, nonnunquam repente maxima atque intolerabili fame corripitur, & nisi mox vinum aut cerevisiam fortiolem largo haustu bis terve bibat, ac nonnihil panis alteriusque cibi comedat: de visus aliqua obscuritate, cum levi vertigine conjuncta, conqueritur, adeoque protinus debilitatur, ut se sustinere nequens in lipothymiam incidat: è qua ad se nonnihil reversus, vino & pane dato iterum reficitur, ac postrefectionem aliquot diebus ab illa fame immunis manet. Hic affectus interdum tempore matutino, cum æger jejunius est, interdum horâ unâ aut alterâ post pastum ventriculo nondum inanita, eum invadit subito; nullâ præcedente nausea, nullo comitante vomitu.

Afficitur in hoc ægro ventriculus secundariâ partem superiorem, appellaturque ejus affectus *Bulimus*, qui est, *maxima fames præternaturalis, hominem subito invadens; cum debilitate & lipothymia.*



Causa remota fuit melancholica corporis dispositio, & talis dixta quæ lienis coctionem nonnihil vitavit, sicque multos acres acidosque humores, a liene male coctos (antecedentem causam constituentes) in corpore genuit, qui inde ad ventriculum delati, ejusque superiori parti prope stomachum adherentes, eam peculiari modo vellicarunt, & acida quadam intemperie ac constrictione famem vehementem induxerunt, sicque causa continens evaserunt.

Lipothymia subsequitur, viriumque prostratio, propter eximium consensum stomachi cum corde & cerebro, per nervos sextæ conjugationis, seu vagos, qui multiplici ramificatione stomacho ac superiori parti ventriculi inferuntur, hincque iis circa stomachum male affectis, mox per sympathiam afficiuntur cerebrum & cor. Hoc, quia ab eodem pari vago suos nervulos habet, & quam proximè stomacho incutit. Illud, quia ex eo nervi illi vagi progrediuntur, quorum mala circa stomachum affectione cerebro communicata, mox spirituum animalium motus & è cerebro effluxus turbatur, atque inordinatus fit, unde visus aliqua obscuritas & levis quædam vertigo oboritur; ac propter spiritus eandem ob causam pauciores in musculos influentes, corpus tremit, ægerque se sustinere vix potest, interdum concidit. Adde, quod propter eundem inordinatum & pauciores spirituum animalium influxum, etiam cor debilitetur & inordinate moveatur, sanguinemque arteriosum paucorem & inordinate ad cerebrum transmittat, unde & illud non convenienter dilatatum pauciores spiritus gignit, atque ex se propellit.

Æquè paucis horis post pastum, atque jejuno stomacho invadit hic affectus, quia quocunque tempore subacidus ille succus in ventriculum influit, & superiorem ejus partem vellicat, ingens illa fames oboritur. Succum autem illum aliquandiu post pastum influentem, non protinus ab alimentis in ventriculo contentis obtundi, sed iis sæpe innatare, sicque superiorem ventriculi partem vellicare, imo nonnunquam cum aliqua nausea ad os ascendere, docet unus.

Vino generoso aut cerevisia optima roboratur æger, affectusque mox mitigatur, quia talis potus spiritus, cum vitales, tum animales replet, & humorem acidum ventriculi tunicis adherentem diluit, imo & digerit ac concoquit, suæque admittance acerbam ejus vim refringit, unde fit ut semel sic sedata fames non statim redeat, sed aliquot dierum spatium opus sit, antequam alius similis collectus humor ad ventriculum feratur, cumque vellicet ut ante.

Nullis hic opus est signis diagnosticis, cum affectus se ipsum prodatur, & ex ægri relatu sciri possit. De eventu autem statuendum, quod periculosus existat, & metuendum sit, ne aliquando hac fame tali loco corripitur æger, quo potus & cibus ad manum haberi non potest atque sic horum defectu graviore lipothymia prostratus extinguatur.

Eapropter curatio quamprimum instituenda, jubendumque ut æger nusquam foras pro-

cedat, nisi pane vino generoso comitante, ut hostis subito invadentis vires talibus armis mox infringere, suasque collabentes vires protinus revocare possit.

Præterea corpus subinde clementer purgandum cum elect. hier. pscr. pilulis Ruffi, aliisque similibus, abstinendo à valde fortioribus. Si tamen æger facilis sit ad vomitum, non inutiliter exhibebitur vomitorium ex asaro.

Ad ventriculi & lienis corroboracionem, ac coctionis emendacionem præscribendum apozema.

℞. Rad. tamarisci, capparum, helenii, an. ʒvj. galang. ʒß. herb. chamædryos, cuscuta, eupatorii, scolopendriæ, melissæ, an. m. j. fol. laur. m. ʒ. cort. aurantior. ʒß. bacc. juniper. ʒvj. sem. fœnicul. ʒijß. passul. coriath. ʒijß. aquæ & vini, an. Fiat s. art. apozem. ad lib. iß. Eundem in finem etiam præscribendum conditum.

℞. Specier diamb. diarrhodonis abb. an. ʒ. j. rad. helenii, & cort. aurantior. condit. conserv. anthos, & flor. salvæ, an ʒß. Syrupi helenii q. s. fiat s. art. conditum.

In victu prohibenda alimenta duræ digestionis, salsa, acida, & acria: & præscribendi cibi eueymi & eupepti, ut carnes vervecinæ, aguinæ, vitulinæ, gallinæ, cuniculi, pisces saxatiles, &c. quorum juscula condienda sunt cum cheresolio, borragine, melissa, rosmarino, betonica, semine anisi & fœniculi, nucem moschata, gariophyllis, raphano rusticis, &c. Potus sit minime acidus, sed subdulcis, ut cerevisia bene defæcata, unius aut duarum septimanarum, & vinum mediocre. Versetur æger in aëre lucido, minime nebuloso: corpus mediocriter exerceat, nec somno nimis indulgeat, fugiatque iram & quolibet tristitia animi pathemata. *Librand. de Diemerbroeck de affectibus uni ventris. Medic. 1.*

Juvenula 30. annorum, melancholica, substrictis, cibos sallos, fumo siccatos, acres, acidos, aliosque duræ digestionis edere consuevit, per integrum annum ingenti fame laboravit, sine lipothymia. Quolibet edulia ingenti copia avidissime comedit, & mediocriter potum superbibat: repleto ventriculo fames non omnino cessat, sed aliquantulum mitiore vadit. Paulo post pastum omnia assumpta rursus evomit, quæ isto exiguo temporis intervallo adeo acida in ventriculo evaserunt, ut adstantibus valde acidum nidorem offerant, & ægra dicat illa sapore succi limonum aciditatem superare. His ejectionibus præ ingenti fame mox iterum edere cogitur, assumpta paulo post rursus evomendo. Atque dies noctesque modò edere, modo vomere posset, nisi res angustior domi subinde molestissimam abstinenciam & dolorosam famis perpeffionem injungeret. Interim paulatim emaciatur ægra.

Affectus hujus ægræ est *Canina appetentia*, id est, maxima fames, sine lipothymia, ab acida inferioris ventriculi intemperie procedens, quæ alimenta copiosa avidissime assumuntur ac non diu post rursus evomuntur raro per inferiora deturbantur) & iterum alia comeduntur, sine insigni famis diminutione.

Differt à bulino, quod in hoc adsit virium prostratio sine vomitu, sed multoties cum



cum lipothymia, in illo vomitus, sine insigni debilitatione.

Afficitur in hac ægra ventriculus, imprimis secundum interiorem partem: ejusque affectus ex relatu ægræ satis cognoscitur.

Causa continens est humor acidus ac viscidus, vitio lienis genitus, & in ventriculum infusus, ejusque tunica rugosa interiore parte firmiter innata, qui acuitate sua ventriculum simili intemperie afficiens ac peculiari modo vellicans, inducit appetitum vehementem ad sumenda alimenta in molestæ vellicationis remedium. Quibus cum ab eodem humore etiam valde acida constitutio imprimatur (sicut vinum quod in aceti vas infusum statim accescit) sicque vellicatio molestior fiat, mox è cerebro copiosis spiritibus ad ventriculi inferiores fibras determinatis, fit inferiorum tunicarum ventriculi contractio, sicque ope musculorum abdominis valida contentorum expulsio seu vomitio; qua quia dictus acidus humor ventriculi tunicis firmiter impactus, nec dissolvitur, nec ejicitur, imò potius à liene fovetur, fit ut post vomitum eadem ingens fames adhuc infestet & perduret.

Non adjungitur lipothymia, quia inferioris partis ventriculi non est eximius consensus cum corde & cerebro.

Quia hæc vehemens fames cum vomitione conjuncta, nutritionem debitam fieri impedit, non parvus atrophie, ac tandem dejectionis virium metus incumbit.

In curatione corpus subinde evacuandum, cum aloë, hiera picra, infuso agarici aliisve amaris: item vomitus bis terve promovendus cum foliis asari.

Postea deveniendum ad talia, quæ lieni & ventriculum corroborant & absterguunt, coctionesque promovendo acidas cruditates consumunt, qualia sunt illa modo ad bulimum præscripta, aliisque similia, ut & similis diæta, qualis bulimo dicata. *Idem ibidem.*

### Observationes.

Vir fere octogenarius, staturæ præcæ, gracilis, attamen corporis & animi viribus in hac ætate mirè vegetus, atque liberrimi genii, tum temporis, anno circiter 1632. conjugio tertio iterato liberos adhuc gignens, tanta ciborum aviditate gelliit, ut sæpius jurulentum cum capis, anguriis, foliis porraceis, brassicæ capitata vel caulilorum, & radicibus petroselinæ simul more Gallico incoctum acetarium, bonam partem petasunculi in oblonga ac tenuia frustra concisi, & saccharo conspersi, botellos aliquot lucanicos, alaudas aliquot sive anatem sylvaticam palustrem, atque arnum agnium in unico prandio omnia, magno cum appetitu, sine ulla stomachi noxa, simulque panis triticeæ portionem magnam peresiceret, potus vero non valde avidus fuit, *Helwigii.*

### BUTIGA

Vid.

### GUTTA ROSACEA

### GUTTA RUBEA.

## Finis Libri secundæ.





BIBLIOTHECÆ  
**MEDICO-PRACTICÆ**  
 LIBER TERTIUS  
*De Affectibus à Litera C incipientibus.*

**CACHEXIA & CACHOCHYMIA.**



Acochymiam Cachexiæ hic adiungimus ut causam suo effectui, dum enim Cachochymia Cacotrophiam inducit, hæc Cachexiæ mater est. Cachochymia autem nihil aliud est quam succorum nutritioni dicatorum varia

impuritas, aut simpliciter cruditas, unde pensum suum in totius corporis conservationem malè exequuntur. Cachexia vero ea est corporis à succis crudis, aliisque impuris nutriti, constitutio, quæ in vastam molem turgescit, varioque cutis colore tingitur, quandoque scilicet albo, interdum citrino, aut livido, interdum ex candido virescente.

Pars affecta in Cachochymia sunt succi nutritii variè depravati, imò etiam viscera unde iidem succi promanantes in totum corpus derivantur: in cachexia verò est totus habitus corporis.

Differentiæ, respectu Cachochymix in eo sunt, quod alia succis simpliciter crudis originem suam debeat, alia verò iisdem varia impuritate noxiis; Item quod alia sit cum labe viscerum, ventriculi præcipuè, intestinorum, hepatis &c. altera ab alimentis aquosioribus, crudioribus aliisque impuris, imò ab aere ambiente sine ulla viscerum labe gignatur. Respectu verò cachexiæ quod alia sit alba, alia citrina, alia livida &c. ut mox in huius morbi definitione verbò diximus.

De causis Cachochymix & Cachexiæ non opus est hic multa subiungamus illis quæ supra titulo de Atrophia, dum scilicet de succis totum corpus nutritientibus, eorumque etiam variis vitiis, diximus; Addeamus itaque tantum quod si lymphæ viscidior à suis non exugatur ductibus, & in habitum corporis diffundatur, primò Cachexiam, dein Leuco-phlegmatiam ipsam inducet. Imò si diaphoresis atque insensibilis transpiratio sive ab aere frigidiore orificia vasorum à glandulis cutaneis assurgentium constringente, sive eodem densiori & crassiori illa ipsa orificia obstruente, impediatur, fiet in ipsam sanguinis massam particulam aquæarum per totam corporis cutem secretandam refluxus, aut in cute aggestio,

quæ turgescitiam universalem pariet. Præterea si ab ulcere in quopiam e visceribus sedem suam habente sanguis coinquinetur, ille nutritioni exquisitæ ineptus redditur. Eo patto videmus sapissime, renum ulceribus cachexiam astare, pure scilicet in venas regurgitante.

Signa diagnostica ex superioribus satis facile est elicere, adjiciamus tantum in Cachexia faciem maxime turgere, quippe cujus cutis præ naturali laxitate phlegmaticam impuritatem combibat, illudque præsertim sub auroram propter demissum tota nocte in lecto caput, eoque in situ humiditatibus excipientis magis accommodum; Manus etiam & pedes potissimum sub vespere ampuantur. Totum præterea corpus non tantum subtrunescit, sed etiam gravatur & ad motum pigrius evadit, atque aliquatenus stupefit.

Senes in cachexiam frequenter incidunt, ea autem affecti vix evadunt; at pueri quibus non minus frequens est malum facile curantur, quia nativo calore abundant. Aetate florentes huic morbo raro sunt obnoxii, ut que in illud delabantur requiritur causa admodum valida, quæ sc. tam dilentaneam ipsorum vigori adferat passionem propterea nulla in aere ambiente, aut etiam alimentis per aliquod tempus usurpatis demonstrari possit, vix perferantur. Addeamus cum Aretzo quod hic affectus longo acquiritur tempore, & nec ab uno inducitur corporis vitio, nec ab uno prodit viscere, sed omnium est in deterius conversio; ita etiam tardè pellitur. Tempus quoque anni non unum hanc fert ægritudinem, neque uno finitur tempore; Verum autumnus eam concipit, hyems alit, ver ad fastigium perducit, æstas verò morbum jugulat.

Cachexia melancholica Elephantialis est prodromus, phlegmatica verò ac pituitosa Leuco-phlegmatix.

Indicationes è Curationibus mox afferendis ut & etiam Consultationibus adjiciendis satis elucescent.

*Curationes, Consultationes, Observationes & Anatomica inspectiones ex variis.*

*Curationes.*

Cum cachochymia principium sit gravissimorum morborum, & plerumque in icteritiam & hydropem transeat



transeat, uti superius dictum fuit, videat Chirurgus, ne quicquam eorum, quæ necessaria sunt, intermitat, ut itaque Medicum aliquem doctum, & in operibus medicis exercitatum, in consilium advocet, etiam atque etiam necesse est. Id tamen quia ubique locorum & præsertim in castris fieri non potest, in gratiam & ægrotum & Chirurgorum pauca hæc adscribere volui, quæ ut benevolus lector benignè interpretari velit, summo opere rogo.

A victus autem ratione curatio inchoanda est, quæ talis esse convenit, ut non solum corpus nutrire, verum etiam loco medicamento inferre possit. Aer, si fieri potest, temperatus sit, ad calorem & siccitatem aliquo modo vergens, adversissimus est frigidus, non solum enim poros claudit, & perspirationem impedit, sed & membrum, nervosque omni, quæ antea ab ichore excruciatæ fueræ, debilitat. Præcipue si ulcera adsuerint. Testatur id Hippocrates multis in locis, præcipue l. 5. aph. 17. 18. & 20. Aer præterea summè calidus, quia sanguinem & humores acres efficit, & infinitas facultates & vires partium dissolvit, viscidamque materiam visceribus inclusam exsiccat, obstructionsque magis magisque adauget, vitandus est. Quoad cibum, perpendendum est primò, ventriculum, omniaque viscera nutritioni inservientia propter præcedentes dolores, vigilias, & ætium febrelem, ad summam labefactionem & imbecillitatem redacta esse. Abstinere itaque æger ab omnibus, quæ difficulter concoquuntur & succum crudum crassumque generant, qualis est panis sine fermento, omniaque in sartagine, butyro aut oleo frixa. Noxia quoque est caro bubula & porcina sale condita, & in fumo siccata, caro item ferina præcipue leporina, cervina, ursina, aprina, & avium in aqua viventium, caseus item, lac & lacticia omnia, præter butyrum. Pisces salsi, & qui in stagnis & limo vivunt. Adversissima sunt legumina omnia, jure tamen lentium & pilorum uti poterit æger, ut postea dicam. Ab acetariis quoque & fructibus crudis & horariis abstinere. Nutrimenti enim nihil, multum verò excrementi procreant.

Secundo abstinere æger ab omnibus, quæ insigniter & præter modum sanguinem & humores excalefaciunt & adurunt, hujusmodi enim, siue medicamenta siue alimenta fuerint, non solum alvum siccam reddunt, verum etiam humores viscosos in venis mesaraicis, & hepate infarctos exsiccant, omniumque viscerum obstructions magis magisque adaugent. Sunt autem illa imprimis salamenta omnia, uti quoque aromata, & præcipue calida usque in tertium & quartum gradum, qualia sunt piper, zinziber, garyophylli, cardamomum, piper ut vocant Hispanicum, allium quoque, porrum, cæpæ, raphanus, & sinapi, nisi in exigua quantitate fuerint sumpta, nocent, inter aromata conveniunt cinamomum, macis, nux moschata, & crocus.

Tertiò consule caveat æger, ne glutinosi utatur cibus, ex viscosis enim cibus viscosus provenit chylus, qui postea venis tam lacteis, quam hepatis includitur, omniumque viscerum obstructions adauget.

Quartò extremitates & intestina animalium omnium, uti quoque caro vitulina & agniua (mucilaginosa enim succo prædita sunt) pilces absque squamis, aut qui in stagnis vivunt, caseus, lac & lacticia, præter butyrum in omnibus morbis longis; minime conveniunt. Quapropter non video, quomodo hujusmodi alimenta viscosa, præcipue extremitates animalium, absque insigni detrimento in fracturis ossium ægris offerri possunt. Ex eis enim chylus viscosus generatur, qui venas mesaraicas & hepar ipsum obstruit, sanguis verò, qui ex ipso producit, quia viscosus est, non nisi cum difficultate pro nutritione partium distribuitur, imminuto itaque calore nativo propter penuriam alimenti, sanguis ille viscosus in venis putrescit, variaque symptomata procreat. Cujus rei exemplum annotatione dignum vidi. Nobili cuidam juveni, & optimo corporis habitu prædito, ex familia Helvetica haud obscura oriundo, cum anno 1608. in Galliis os femoris in medio confractum & comminutum fuisset, cum ingenti contusione & dilaceratione musculorum, per multos menses lecto affixus permansit. Interim a Medico quodam docto, Chirurgo quin etiam doctrinæ & experientiæ claro, curatus fuit, & quidem ex arte, & eâ quâ potuit diligentia. Interim tamen, ut de gravissimis symptomatibus, quæ ab initio morbi supervenerunt, taceam, post multos etiam menses, ne dicam annos, propter obstructions gravissimas hepatis & lienis, febribus tertianis & quartanis, icteritiæ & similibus excruciatu fuit. Ego tandem cum in consilium adhibitus fuisset, & multa tam externa quam interna præsidia adhibuissem, & thermis piperinis aliquoties usus fuisset æger, restitutus fuit, & in hunc usque annum 1630. bona valetudine fruitur. Præcipuam autem causam obstructionis viscerum tantorumque gravissimorum symptomatum, ad usum alimentorum viscosorum referendum esse arbitror. Per menses enim novem & decem quotidie cibus viscosus usus fuerat. Quapropter ægris meis nutrimentis viscosis semper interdixi, nihilominus tamen fracturas multas & quidem maximas, etiam in magnatibus, feliciter & cum laude curavi. Hæc obiter & præter institutum, in gratiam tyronum monere visum fuit.

Quintò videat æger, ut ab omnibus cibus facile putrescentibus abstinere, uti sunt fructus horarii, videlicet Cerasa dulcia, pruna recentia, persica poma, cucurbitæ, melones, uvæ recentes, mustum & hujusmodi, qui concoctionem ventriculi impediunt, calorem nativum debilitant & imminuunt, succumque crudum & putridum procreant.

Postremò danda est opera, ne cibus aut potus cacochymicorum sit astringens & exsicicans, hujusmodi enim non solum alvum siccam reddunt, verum etiam vias constringendo, materiamque viscidam in visceribus exsiccando, obstructions adaugent, hujusmodi autem sunt legumina, caro ferina, de quibus in prima classe quoque dictum fuit, Noces quinetiam, amygdalæ, castanæ, mespila, corna, pruna sylvestria, sorba, uvæ & fructus omnis immaturus. Farina quoque avenacea, apud



apud nos usitatissima, propter torrefactionem, quia insigniter exsiccatur, minime convenit. Cotonea autem et si astringunt, post partum tamen sumpta summopere conveniunt, ventriculum enim corroborant, & digestionem promovent. Utatur itaque æger cibis quæ facili concouuntur, succum quinetiam laudabilem procreant, neque excrementorum proventum faciunt. Huiusmodi sunt carnes recentes, veluti bovina, vervecina, item caro Gallinarum, pullorum, alaudarum, columbarum, perdicum, ficedularum & avium in arboribus degentium. Conveniunt quoque ova recentia & ex ipsis præparata edulia. Cum carne concoquenda sunt herbarum, quæ intemperiem hepatis corrigunt. Quapropter si intemperies interiorum partium adfuerit calida, tunc lactuca, endivia, cichorium, spinachia, ceresolium, & portulaca conveniunt. Sin calor natus viscerum propter vehementiam ac diuturnitatem morbi prostratus fuerit, refocillandus est eis, quæ mediocriter calefaciunt, quapropter salvia, rosmarinus, majorana, folia & bacce lauri, & mentha, betonica, & huiusmodi cum carne cocta, conveniunt, macis quoque, crocus, cynamomum, nux moschata, cortices aurantium & citronum cibis additæ, calorem innatum refocillant. Instaurant quoque calorem innatum, & humidum radicale adaugent, vitella ovorum, si in jussulo carnis dissolvantur. Etiam si legumina nutrimentum crassum reddant, jussulo tamen pisorum & lentium, cum butyro recenti, sale, & nonnihil macis vel croci, cocto, uti poterit æger, uti quoque cremore hordei, & avenæ decorticate. Conveniunt & sorbituaculæ ex vitellis ovorum, cum vino & aqua præparatæ, addito saccharo, cinamomo & croco; tempore veris jussula herbarum recentium, veluti ceresolii, fœniculi, spinachiz, betonice, foliorum urticæ, & summitatum sambuci, præparata maximo cum fructu ægro in prima mensa aut (quod magis mihi probatur) per horam unam aut alteram ante prandium exhiberi poterunt. Diuretica enim sine damno cibis vix permisceri possent, alibi demonstravimus. Summopere quoque convenit succus, qui ex perna vervecinæ in veru piscocta, & cultro hinc inde pertusa & compressa, effluit. Vires enim labefactatas instaurat, & humidum radicale adauget, præcipue si nonnihil vini parumque aquæ cynamomi sine vino destillatæ, admiscueris.

Si æger magnopere acetaria appetit, poterit per intervalla uti cichorio, ceresolio, fœniculo, asparago, lupulo, mentha, gemmis geniste conditis, & capparibus. Ab eis verò quæ insigniter refrigerant veluti sunt lactuca, portulaca, cucumeres & melones abstinere.

Bibat vinum album, tenue, & quàm optime defecatum. Si generosum fuerit diluatur aqua aliquâ appropriata, aut quod efficacius, decocto veronicæ, saccharo, & cinamomo aromatizato. Si cerevisia uti voluerit, aut eis in locis, in quibus nihil præter cerevisia pro potu utitur, constitutus fuerit æger, videat ut illa sit bene cocta & defecata, non nimis generosa, vetuita vel acida. Vinum secundarium, uti quoque potus qui ex prunis & po-

mis sylvestribus, uvis immaturis, & granis oxyacanthæ sit, propter attritionem nimiam in modum nocet, si sitis maxime & vires prostrata fuerint bibat æger lac amygdalarum, non tantum enim sitim retinguit, verum etiam viscera humectat & egregie nutrit. Reinerus Solinander magni nominis medicus in cons. sect. 3. pro cachectico, vult ut quarta vel quinta, vel etiam sexta pars amygdalarum sit amara, & recte quidem, ita enim lac magis fiet medicamentolum, quandoquidem abstergit & mundificat præcipue, si ut tu det Solinander, cum jure furturum macrorum præparatum fuerit. In fine mensæ pomis aut piris coctis saccharo, aniso, aut fœniculo asperis, uti poterit. Conveniunt quoque cydonia cocta, & saccharo parumque cinamomi aromatizata aut Miva cydoniorum sine speciebus, vel sumat cochlearum unum pulveris nostri peptici itatim a patru.

℞. Panis albi tolli 3 ij. pulpæ cydoniorum exsiccatorum, cinamomi optimi, pelliculæ interior ventric. gallinarum, seminis anisi & coriandri præpar. ana 3 ij. Misce, & nat pulvis. Hæc de cibo & potu. Porro quia exercitatio digestionem promovet, exiguos meatus expurgat, & excrementa expellit, utilis est, telle Galeno de tuenda valetudine lib. 2. eam ante cibum administrare, dummodo moderis sit nec laboriosa. Vult autem Galenus duplicem concoctionem, videlicet eam quæ fit in ventriculo & eam quæ fit in vasis sanguinis peractam esse, ac denuo tempus cibandi instare. Post patrum tamen modice quoque corpus exercere convenit. Modica enim exercitatio, post inaptum cibum calorem nativum excitat & adauget, & concoctionem promovet. Si vero æger propter debilitationem partium, corpus deambulando aut equitando exercere non potest, frictions sunt administrandæ. In somno & vigiliis modus quoque est servandus. Intempestivæ enim vigilie concoctiones omnes impediunt, cerebrum siccant, mentem perturbant, & humidum radicale absumunt. Contra somnus immoderatus calorem nativum obtundit, & multos humores crudos gignit, corpusque ignavum reddit. Passiones animi quoque veluti sunt ira, metus & tristitia, æger quantum fieri potest, vitabit. Præter hæc operam quoque dabit, ut alvus quotidie ad minimum semel respondeat, id si naturæ & ciborum beneficio non fiat, sollicitanda est prunis laxativis vel clystere lenitivo cap. 19. præscripto. Vel imponatur suppositorium ex melle & sale coctum. Summopere quoque conveniunt pilulæ sequentes. Partes enim nobiles corroborant, obstructions viscerum tollunt, materiam viscidam incidunt, atque purant & alvum lubricam reddunt.

℞. Aloës purissimæ & ter aut quater succo gratiolæ imprægnatæ iterumque exsiccata 3 j. rhubarb. elect. 3 ij. turbit. gummosi, cremor. tartar. ana 3 j. gum. ammoniac. purissimi & dissoluti in aqua cinamomi 3 iv. confectio alkerm. 3 j. ol. cinamomi 3 ss. syrupi rosati solutivi compositi cum rhubarbaro, agarico & scennæ q. s. misce fiatque massa, de qua æger (si tantummodo alvum durum lubricam reddere cupit) sumat à granis 12. usque ad 3 j. aut 36.



per duas horas post cenam. Sin ampliorem evacuationem habere cupis, ad 3 ij. aut 3 j. deglutiet, ut postea dicetur. Hæc de victus ratione.

Sic instituta optima victus ratione corpus quantum fieri potest à pravis humoribus expurgandum est, verum enim verò quia materia peccans in cacochymia tenacissime visceribus inhaeret, difficulterque suo loco movetur, juxta mentem Hippocratis lib. 1. Aphorismo 22. coquenda & præparanda est apozemate aliquo convenienti, ante omnia tamen vias communes sequenti lenitivo expurgabis.

℞. Radicum polypodii q. liquiritiz, cichorii ana 3ß. cort. interiorum radicum frangulæ 3 j. veronicæ, flor. cordial. an. p. ß. sem. anisi 3 ij. foliorum sennæ 3 i ß. incidantur, contundantur, coquanturque in aqua, ut colatura redeat ad uncias duas in quibus dissolve elect. diacarthami. & diaphanice. cum rhabarb. ana 3 ij. cremor. tartar. 3 j ß. syr. de cichorio cum rhabarb. 3ß. misce fiat potio, detur in crepusculo matutino, cum custodia. Postridie, aut tertio die à purgatione, si plethora adfuerit. & vires permiserint, vena incidenda est, idque ex cubito ejusdem lateris de quo æger præcipue conqueritur. Si menses, aut hæmorrhoides suppressæ fuerint, venæ ad nalleolos incidendæ, aut applicentur sanguifugæ venis hæmorrhoidalibus. Sin tamen maxima adfuerit virium omnium prostratio atque imbecillitas, venæ sectio omittenda & ad humorum concoctionem progrediendum est, ubi sequens apozema.

℞. Cortic. interior. & flavarum, radicum frangulæ 3 j. radicum polypodii q. liquiritiz, lappati acuti an. 3 ij. asparagi, cichorii, fœniculi & petroselini an. 3 ij. herbar. & flor. betonicæ, veronicæ, cuscuthæ, scabiosæ an. m. ß. trium flor. cordialium & genistæ an. p. j. seminis anisi fœniculi an. 3 ij. Coquantur in s. q. aquæ purissimæ, ut colatura redeat ad 15 ij. clarificetur & dulcoretur syrupo de 5. radicibus q. s. hujus apozematis bibat æger per dies tres ad uncias duas in aurora, totidemque per horas duas ante cenam. Postea accipe de eodem apozemate 3 xij. In quibus infundantur, mace-rentur & coquantur s. a. sequentia. Foliorum sennæ 3 j. rhabarb. 3 iij. agaric. recent. trochiscati cremor. tartar. 3 i ß. cinnamomi elect. 3 ij. Maneant in-infusione & loco tepido per horas xii. deinde post unam aut alteram ebullitionem fortiter exprimantur addanturque, syrupi de cichorio cum rhabarb. 3 ij. aq. cinnamomi sine vino destillatæ 3 j. misce fiat potio purgans pro quatuor dosibus in aurora sumendis, cum custodia. Si primus haustus sufficienter operatus fuerit, alternis saltem diebus medicamentum sumatur, aut dosis diminuat, ut vires conservari possint. Quod si nimis segniter successerit operatio, postrema dosis acuenda est drachma una diacarthami, aut diaphanicone cum rhabarbato. Sic satis purgato corpore, poterit æger per dies aliquot quiescere, post paltum tamen nonnihil de suo pulvere peptico sumere, deinde apozema præscriptum iterandum est. Quod si apozema ingratum fuerit ægro soleo sequens præparare jusculum; quod propter singulares operationes tum in morbo regio, tum in reli-

quis omnibus obstructionibus viscerum jusculum Regium appello.

℞. Rad. apii 3 ij. petroselini, fœnicul. ana 3 iv. passular. exacinar. 3 j. croci 3 j. macis 3 ß. incidantur omnia & caponi aut Gallinæ, cui collum, pedes & alæ abscessæ sunt, infarciantur. Coquantur in aqua, donec caro ab ossibus separata, & jusculum ad doses sex consumptum fuerit. Caro cum suo sarcimento fortiter exprimatur, & fiat colatura, addito sale, quantum satis est; sumat æger per duas horas ante prandium, quantum libuerit. Adde quoque nonnunquam nonnihil cremoris tartari, aut salis nostri deoppilativi, ex cichorio, fœniculo, petroselino; hypericone, Eupatorio, & similibus herbis & radicibus aperitivis confecti. Si subacidus sapor ægro gratus fuerit, nonnihil vini aut aceti sambucini admisceri poterit. Si prostratio virium fuerit maxima, addatur nonnihil aquæ Cinnamomi sine vino destillatæ. Jusculum hoc excellentissimum est medicamentum, simul & nutrimentum in cacochymicis, quo ego sæpissime maximo cum fructu ægrorum usus fui. Sin ægro vinum aliquod aperitivum gratus fuerit, sequenti uti poterit.

℞. Rad. asparagi, brusci, ebuli, fœniculi an. 3 j. cinnamomi elect. 3 ij. macis 3 j. herb. betonic. agrimoniz & veronicæ an. m. ß. centaurii minoris, absinth. Pontici, card. bened. an. p. j. incidantur & contundantur fiatque nodulus, cui affunde vini albi & optime depurati 15 ij. De hoc vino bibat æger ad uncias tres aut quatuor, tribus horis ante prandium. Interim autem dum æger utitur aperitivis prædictis, subinde leniter leviterque expurgandum corpus. Ubi syrupum de rhabarbato à Solinandro tantopere celebratum, convenire, sæpissime vidi.

℞. Rhabarb. optim. 3 vj. fol. sennæ Alexandrinæ 3 x. mechoacan. albiss. 3 ß. flor. violar. recentium, s. prunor. sylvestrium, si haberi possunt, vel cotoneorum an. p. ß. cinnam. acuti interioris 3 j. zinziberis albi 3 ij. ß. aqu. betonic. cichor. bugloss. destillatæ in balneo Mariæ an. 3 iv. rhabarb. & Mechoacan. pulveribus irroratis aqua cinnamomi, infundantur omnia s. a. per noctem. Mane ebullitione & expressione facta, colentur & cum sacchari albissimi 3 v. vel sex, syrupi rosar. solut. 3 ij. misce fiat s. artemi syrupus. Detur ad uncias duas in exiguo haustu juris pulli non pinguis, cui paucæ passulæ demptis gigartidis, paucæ folia rosmarini & macis tantillum incocta sint, bibat.

Cæterum præter victus rationem & purgationem pravorum humorum, partes nobiles summo studio corroborandas esse, ratio ipsa suadet. Quia enim in præcedenti morbo propter vehementiam & diuturnitatem doloris, æstum item febrilem, vigiliis & decubitus, humidum radicale absumptum, calor quietiam nativus prostratus, & proinde facultates omnes mirum in modum imminutæ fuerunt, nisi refocillentur, frustra medicamenta adhibentur. Est enim robor naturæ, quod medicamentum ex potentia in actum vertit. Corroborabis autem imprimis viscera, si præscriptam optimam victus rationem observaveris, & pravos noxiosque humores (ex quibus



quibus continuo putridi vapores ascendunt, facultates omnes efficiunt) uti antea latis dictum fuit, evacuaveris: sine quibus corroborantia omnia nullius erunt momenti. Corroborat ventriculum & viscera nutritioni inservientia pulvis pepticus, antea præscriptus. Aut.

℞. Diacurcum, diarrhodonis Abbatis Aromat. rosat. an. ʒj. sach. r. dissoluti in aqua Cichorii ʒiij misce, hantque tabellæ addendo ol. cinanom. ʒss. de quibus utatur æger aliquoties in die præcipue ante & post prandium & cenam, ad ʒj. aut ʒij. Aut detur sequens Electuarium.

℞. Spec. Aromat. rosat. diacurcum. an. ʒj. cinanom. elect. ʒiss. cortic. citron, & rad. cichorii conditarum an. ʒj. cum s. q. syrupi conservæ cortic. citronum fiat Electuarium, de quo sumat æger ad magnitudinem nucis juglandis, ter aut quater in die, Aut:

℞. Conservæ flor. betonic. rosmarini, salvix, majoran. an. ʒss. specier. Dianthos ʒiij. cum syrupo de betonica fiat Electuarium. Aut.

℞. Spec. de gemmis, Latincantis Galeni an ʒij. confectiois Alkermes & de hyacintho an. ʒj. conserv. flor. bugloss. borraginis & melissæ an. ʒss. Cum syrupo conservæ cortic. citronum fiat Electuarium, sumatur ut præcedentia. Hæc de internis. nec omittenda sunt externa; ideo si propter dolorem & vigilias caput labefactum fuerit, præter optimam victus rationem & purgationem, etiam per intervalla cucurbitulæ scapulis applicentur. Quod si catarrhus ut scapulæ sit, cum impetu ad oculos aut pulmones deflexerit, setaceum in Vertice, aut fonticuli in brachiis efformandi sunt, cucupha quoque ex sequentibus parari poterit.

℞. Rad. iridis Florentinæ ʒij. Syracis calamitæ, benzoini, mastice, olibani an. ʒj. rosar. rubrar. summittat. majoranæ & fl. betonicæ an ʒij. moschi ʒss. Inciduntur & contunduntur omnia grosso modo pro cucupha intertexta, ut artis est. Corroborat sequens Linimentum, si carpi, & regio cordis eo inungantur.

℞. Ol. rosacei fragrantissimi ʒss. ol. cinanom. ʒss. ol. cortic. citronum ʒj. misce. Aut:

℞. Aq. borragin. bugloss. rosar. & melissæ, Aq. cinnanom. an. ʒj. acet. rosat. ʒss. confect. Alkerm. spec. Diamosch. dulc. an. ʒj. croci & caphuræ an. ʒj. misceantur, fiatque Epithema, carpi autem tantum modo in eo inbutis pulvillis, applicetur tepide. Mediantibus enim arteriis, vis ipsius facile ad cor perveniet. Si quis tamen de hoc epithemate regioni cordis applicare voluerit, non errabit, videat tamen, ut linteis calidis cooperiatur, frigus enim pectori & spiritibus vitalibus nocentissimum esse omnes sciunt practici. Ventriculum roborat & concoctionem promovet sequens Linimentum.

℞. Olei masticis, & menthæ an. ʒvj. gum. tacamahac. ʒij. Terantur lentissimo igne & percolentur. Postea admisce olei nucis moschæ per expressionem ʒss. ol. garyophyllorum ʒj misce, fiat linimentum, quo regio ventriculi usque ad umbilicum quotidie bis inungatur, & linteum calidum apponatur, aut applicetur sequens emplastrum supra alutam extensum.

℞. Gum. tacamahac. ʒj. ol. menth. &

masticis an. ʒss. Dissolvantur lentissimo igne, & per linteum colentur, postea admisce pulv. nucis moschatæ ʒij. g. ryophyllorum, & masticis an. ʒj. misceantur & cum cera nova q. s. t. coactum, applicetur ut dictum est. Hepar corroborat, obstrukcionemque languenter tollit sequens linimentum.

℞. Unguent. deoppilativi Iocsi, ol. lumbricor. an. ʒj. misceantur, natque linimentum, quo regio hepatis, totaque venter præter regionem ventriculi inungatur bis in die. Secunam enim concoctionem mirum in modum promovet. Unguentum deoppilativum Iocsi sequenti modo præparatur.

℞. Succi apii, enativæ, menthæ, absinthii, petroselinii vulgaris, valerian. an. ʒss. olei absinthii, menthæ an. ʒss. Cera citrinæ quantum satis sit misce & ad ignem fiat unguentum s. a. Viscerum obstrukciones liberat, eoque crebro in jecorariis utimur, additur quandoque pulveris calami Aromatici, spicz nardi, sing. ʒj. & olei cappatum aliquod sunt qui hoc modo etiam parant: ℞. Succi Ebuli ʒviij. Succi Apii, Petroselinii sing. ʒiij. succi Ablynthii & Iridis sing. ʒv. ol. co. natus ʒss. ol. lil. alb. ʒx. Ol. ablynth. & chamomelini sing. ʒvj. axungia anatis, & gallinæ sing. ʒij. Ierugiant omnia sin. ul. ad consumptionem succorum. Postea colentur & cum cera alba & paxillo aceti paretur unguentum. Hæc Iocsius de unguento suo aperitivo, quæ hæc inieciere libuit, tum (expertus loquor) propter medicamentis præstantiam, tum etiam quod optimus ille vir & de re medica tam bene meritus, olim mihi cognitus fuerit. Ego ceram non addo, ut facilius altiusque ad subjectas partes penetrare possit. Lien, si propter venenariam atque diuturnitatem morbi labet. Etatum, & obstruatum fuerit, hypochondrium sinistrum inungendum est sequentibus.

℞. Ol. de capparibus & rutacei an. ʒvj. ol. amygd. dulcium ʒi. misceantur. Aut.

℞. Succi cochleariæ & nasturtii aquatici an. ʒij. ol. lilior. amygd. amarar. an. ʒij. pinguedinis caponis & uræ an. ʒj. Coquantur lentissimo igne ad consumptionem ferè succi, in colatura dissolve Ammoniac. purissimi, & aceto scillidissoluti ʒvj. ol. nucis moschatæ ʒss. misce; Si intemperies calida renum adsuerit, inungantur lumbi, os sacrum, & regio renum linimento, antea capite de ardore urinx descripto. Hæc de cacochymia, de qua non nihil prolixè agere nolui. Est enim veluti scaturigo, ex qua lèteritia, febres erraticæ, quartanæ, & quæ plurima alia symptomata profluunt, de quibus omnibus si sigillatim agere vellem, opus excreceret, & multa jam antea dicta, repetenda essent, quod lectori ingratum foret. Itaque ubi diligenter quis curaverit cacochymiam, reliqua symptomata facile evitabit. Quod si tamen advenerint, Medicus consulendus est. Guil. Fabric. Hildan. lib. de Ichoro & Melicris.

Cachexia quælibet à quibusdam nempe causis procreata requirit resolutentia & corroborantia. Resolventia sunt omnia aperientia internorum viscerum. Sic nimirum omnis Oeconomia totius corporis depravata corrigitur.



figitur. Aperientia sunt tartarus vitriolatus, cremor tartari, Vinum Martis. Acidulae tum naturales tum artificiales: quae tamen omnia administranda sunt post praemissos vomitus, si illi commode fieri, & patientes terre possunt. Purgantia post illa universalia habent locum quaelibet, modo observentur observanda. Panchymagogon Crollii. It. specine. purgans paracelli & Mercurius dulcis hic praecipue laudantur, Extractum Elulae & ellebori nigri in pituitosa & Melancholia Hypochondriaca multum proflunt. Contortantia desumuntur ex communioribus quibuscumque hinc inde, praestat spir. vitrioli in conservato-  
larum, acetosa. florum borraginis, buglossae, violarum sumptus, Magisterium Corallorum, item & perlarum, ceteraque aquae Analepticae utilitate. Omnis porro Cachexiae felicissimum auxilium est pulvis Cachecticus supra descriptus. Itaque is solus praemissis solum vel vomitoriis, praecedente cura aliquando purgantibus sufficit: quantumvis nimirum pulveris cachectici usus alvum moveat sapienter, nihilominus convenientibus purgantibus interdum res expedienda ut scilicet in corpore collectae faeces, & ab usu pulveris cachectici quadantenus separatae penitus excernantur. In virginibus plerumque detectus melius ad Cachexiae causas accedit, unde ut illa deterior. Solet quidem in vetulis pulvis Cachecticus etiam venulas uterum aperire; sed obstructio interdum tam pertinax, ut a solo illo aperiri nequeat. Dextre itaque observato tempore usitato fluxus mentium, quod est juxta illum vulgatum verticulum:

*Luna vetula vetulas, juvenes nova luna repurgat.*

Praesertim ubi in cursu adhibita curae dolores circa lumbos & uterum animadversum fuerint. Ut igitur feliciter procedatur, menses moventia si-  
mul danda sunt, quibus infra de suppressione mentium. Talia sunt aqua alii destillata & oleum Sabinae. It. aqua asari, raphani, artemisiae rubrae

N. B. si ad pulverem Cachecticum addideris aequalem quantitatem chalybis praeparati illecoris anserum juniorum, & dederis priori quantitate, praesertim circa instans mentium tempus, & pallori Virginum & obstructioni mentium melius medeberis. Pertinacissimas obstructions mentium aperit lixivium e scorii seu recrementis reguli Antimonii ebulliendo tantum cum aqua communi praeparatum, & super ferrum vel silices candentes fustum, ut vapor per sellam perforatam ad naturalia contingat. Mercurialis in aqua cocta & pudendis applicata menses ciet. (Ex his scorii paratur oleum tartari Antimoniatum, si nempe in cella aëre frigido & humido exposita in deliquium abeant, profluit inde oleum Tartari copioso Antimonii sulphure impraegnatum, ingratum quidem saporis sed majoris efficaciae, non solum in mensibus retentis, verum etiam in tarda alui dejectione pertinacissimas quoque aliorum viscerum obstructions referat. In retentione menstruum taliter sapienter usus sui, magisterio martis aperitivo, ex limatura Martis cum succo acetosellae & pulpa tamarindorum facta, vide Mynsichti armenianarum chymicum. His omnibus postea dextre subjici potest vel addi sectio saphyrea definito tempore Quentium mensium instituta. Antimon. diapho-

ret. fixum ad expellendos menses etiam efficax est, si ejus dosis usitata quotidie cum guttis aliquot essentiae myrrhae in aqua artemisiae rubra exhibeatur. Haec autem omnia moderanda sunt ad praescriptum ipsius naturae & canones artis.

*Joan. Harmann. in Pract. chymiatric.*

Praestant hic crocus Martis aperit. cum salibus praeparatus. Item omnia medicamenta ex tartaro, crocus martis saccharinus, tinctura martis Zvv. essent. & extract. martis mynlichti, tinctura martis tartarifata, tinctura martis antimoniat. Diaphoretica inter excellit bezoard. minerale & martiale. Conveniunt etiam in hinc exiccantia, ut essent. liquorum. Acidulae artificiales principatum tenent in tollenda cachexia; naturalibus etiam acidulis melioris & facillioris operationis causa potest misceri vitriol. martis. It. Clyssus, si misceatur cum aquis appropriatis. Non debet statim heri purgatio, sed digestiva praemitti debent. Vel si purgandum, misceantur aperientia.

℥. Croc. martis aperit. cum salibus 3j. S. Digestivus pulvis. D. in triplo.

℥. Pulv. cach. Quercet 3ij. croc. martis saccharini gr. viij. M. S. Digestivus pulvis. D. in quadruplo.

℥. Tartar. chalyb. 3ß. faecul. aron. gr. vj. S. ut ante.

℥. Essent. aperit. Essent. martis liquid. an. 3ij. S. Digestiva Essentia. Dosis gutt. 10. vel 30. singulis diebus mane & vespere sumend.

℥. Tinctur. Martis Zvv. 3ij. S. Digestiva Essentia. dosis g. xxx.

℥. Acid. artif. lib. 3. syr. ros. 3ij. m. Dosis 2. vel 3. cochlear.

℥. Spir. aperit. Penori 3ij. Dosis g. 30.

℥. Herbar. eupator. agrimon. scolopendr. cuscuth. ceterach. an. p. ij. flores cichor. epat. rubr. genist. an. p. ij. rad. aperient. an 3ij. elul. prap. jalapp. an. 3j. elleb. nigr. prap. 3vj. agarici 3ij. santal. rubr. 3ij. cremor. tartar. 3ij. F. Nodus. Sumatur tempore matutino; sic enim praeparatur materia. Si lien sit in causa, splenetica sumantur.

℥. Fol. agrimon. cichor. Com. absinth. flor. cent. min. an. m. j. flor. bellid. cichor. genist. epatic. rubr. an. p. ij. rad. graminis, filicis an. 3ß. helleb. nigr. prap. jalapp. an. 3j. zedoariae, galang. an. 3ij. spicae, squinanthi an. 3j. Incis. & contus. grosso modo adspers. Essent. absinth. & tinctur. tartar. F. Noduli laxativi.

℥. Pulv. jalapp. 3j. scammon. sulphurat. croci mart. saccharin. an gr. vij. ol. stillat. maris g. j. Misce pro una dosi.

℥. Pulv. cathol. Quercetan. 3j. Extract. Martis, resin. jalapp. an gr. vj. F. Pilulae.

℥. Essent. lign. 2ß. Dosis gutt. 60.

℥. C.C. sine igne 3j. Bezoard. Martis gr. xv. M. F. pulvis pro una dosi. Acidulae quoque debent interdum portari, multum spirituum deperditur, ideoque artificialibus possunt corrigi, cavendum tamen ne nimium aquae infundatur. Vid. Kyper. de acid. artif. Joann.

*Michael in Prax. Clinic. generali.*

### Consultationes.

Illustrissima Comes temperamenti calidioris



jecoris, & totius: ætatis annorum 40. post varias animi perturbationes, mensiumque suppressionem, febricula lenta laborare cœpit, malo corporis habitu, palpebrarum, faciei, & crurum intumescencia, cum foveæ impresto vestigio, siti, inappetentia, & vigiliis. Quorum causa de agendis nos consuluit.

Ex prædictis itaque statuentes ipsam cachexia laborare ex labefactato, & imbecilliori reddito calido innato jecoris, cum excessu caloris præter naturam, & febrilis, ob prohibitam transpirationem ab obstructionibus utriusque hypochondrii, consultum duximus, quo ab hydrope imminente præservetur, expurgare primas vias, attenuare, incidere, & detergere humores peccantes, cum pituitosos, tum melancholicos, & biliosos, in corpore redundantes, ac deinde ipsos educere, jecur refrigerare, obstructions referare, & serositatem ex toto corpore sensibiliter, & insensibiliter evacuare, calidumque innatum jecoris roborare, revocato mensium cursu, quantum in nobis erit; quod tamen perarduum opus nobis visum est. Quas intentiones implere conati sumus, præstidiis Chyrurgicis, Pharmaceuticis, & Dieteticis.

Quoad Chirurgiam, non abs re primò censuimus parùm sanguinis educere, cum ob febrem, tum ob mensium suppressionem, & quidem istius ratione ex saphena. Verùm intumescencia cruribus, & pedibus, mensibusque jam annum deficientibus, in muliere cachectica, & quadragenaria, consultius duximus ipsum mittere ex venis sedalibus, quo fieret derivatio ad partes proximas.

In Pharmaceuticis, præcipuus medicamentum ex el. lenitivo, & speciebus hieræ picæ Gal. cum ʒij. mann. elect. Preparandis humoribus in ventriculo, syr. sine diluto fuerunt præscripti, ex syr. acet. simp. mell. ros. simpl. & syr. de corticibus citri. Repetito deinde leniente proposito, in usu fuerunt syr. magis aperientes ex syr. capill. ven. de quinque radicibus, & byzantino cum aceto, cum decocto agrimoniz, ceterach, capill. ven. betonic. sem. citri, & matricariz, alvo interim clysteribus sollicitata. A quibus cum jam febris negotium non faceretur, erat enim valde remissa, exhibuimus aquam Tettutianam, cum mell. ros. solutivo, biduum; ac deinde aquam B. Virginis potui, cum syr. capill. ven. in primò cyatho; ad lib. 6. 7. 8. 9, cujus beneficio sedata est sitis, & famies inducta juxta Hipp. effatum 4. in 6. Epidem. quod Aqua sit vorax; id est homines reddat voraces, & famelicos; quod non solum accidit ex potu frigida corrugantis os ventriculi, sed etiam ab eadem acida & parùm salia, qualis est B. Virginis quia deterget. Verùm quia difficulter permeabat ac propterea suspicionem injiceret majoris serositatum proveniunt in venoso genere, ideo ipsius potu supersedentes, exhibuimus succum cichorii optimè depuratum in jure columbæ, in quo macerata fuerat coma absinthii, cum unc. sem. succ. agrim. persistitque in usu ipsius plures dies, præmisso bolo ex trochiscis cypheos, alvus intermixta pilul. mastichinis, additis granis duobus elaterii; quarum usu quarta quoque die repetito, magnam aquæ vim deieciat,

cum perfecta virium tolerantia; ut propterea nulla fuerint validiora, cum vigeret æstas; quorum loco decoctum potius fuit in patria autumnino administrandum. Externis demum usus luti & aquis Thermalibus. illis quidem D. Petri abdomini applicatis, & immersione corporis unibilicotenus in aquis Aponitanis; quarum opere refecit crurum tumor. Atque hæc fuerunt hic administrata, cum iuculento juvenimento Nobili. patientis, accedente recta victus ratione, immo aliorum usu in patria ad autumnale tempus, ubi cura Viro-rum præclarissimorum primæ valetudini restituta fuit. *Benedict. Sylvatic. Consil. & Respons. Med. Cent. 3.*

Illustr. & reverendiss. Præsul, annorum 56. antehæc temperamenti calidi & humidi, nunc ad frigidum, & humidum vergentis, conqueritur de variis affectionibus, paucorum mentium spatio subortis tumorescil. duro scyrthoso in regione ventriculi, supra hepar, difficili respiratione in ascensu locorum acclivium tumore pedum, & crurum, totius corporis torpore ac legnitate, melancholia, ac tandem inappetentia. Quorum origo adferbitur liberaliori potumate præterita, post vitam sedentariam, cum continua mentis agitatione, & colubitam l. inguinis hæmorrhoidalis evacuationem. Nec immerito. Ab his enim omnibus causis labef. cratur adeo calor natus jecoris, & accumulatur cruditates, cum per suffocationem, tum per ejusdem distractionem, ut facilissimo negotio mutata intemperie calida in frigidam & humidam jecoris, ac aliorum viscerum, coarctata sit copia humoris serosi, & pituitosi in toto venoso genere qui deinde sicuti tumorem produxit in partibus subcutaneis Steatomati, vel Atheromati non absimilem, circa regionem ventriculi; ita dum inbuat musculos intercostales, respirationem impedit in ascensu per loca acclivia. Confluens autem idem ad pedes, & crura, prædictas partes tumescit; qui tumor forsan adematofus diffusus per totam musculosam substantiam partes omnes torpidas reddidit, & inappetentiam inducit ad os illapsus ventriculi.

Quocirca non immerito de agendis consultum. Maximum namque impendit periculum patienti Illustrissim. ab hydrope. Quare ut a præsentibus affectibus liberetur, & ab imminentibus præservetur, quatuor sunt agenda; expiandum est primo accurate totum corpus; digerenda postmodum sunt, & sensibiliter evacuanda serositates, quæ a variis partibus confluxerunt; tertio corroborandum est calidum innatum jecoris, & totius venosi generis; ac tandem revocanda sunt evacuationes, consuetæ. Quod fiet per evacuantia, alterantia, & symmetriam viscerum foventia.

Pro totius purgatione laudantur primò Lenientia ex el. lenitivo, & speciebus hieræ simpl. mox præparantia materiam in ventriculo eaque sine diluto; syr. de corticibus citri, vel ros. simpl. oxymel simpl. & syr. de betonic. cum unc. j. emuls. sem. citri, triduum; a quibus prædictum leniens, vel ipsius loco mel. ros. solut. & manna erunt ex usu. Secunda humorum præparatio fiet syrup. de betonica, de hyssopo, de prassio, & oxymel. scyllitico, additis



additis unc. iij. jusculi carnis alterati beton. borrag. origano; ac interea sanguis educatur ex venis sedalibus mediocri quantitate. Potum vero quinque syrup. repetatur purgatio addito agarico trochiscato, & tenui, habeatque oxymel scilicet in familiari usu. Hesperactis, exhibeatur, qua Tettutiana ad lib. 4. singulis diebus, prænissis uncis iij. mel. ros. solut. Mox ad validiora deveniendum, quæ erunt duplicis generis, primo hydrotica maturinis horis assumenda; puta radix mechoacan. radix jatappa, succus sambuci, summitates ebuli, mann. elect. & aliquando grana tria, vel quatuor elaterii. Diuretica demum vespertinis horis exhibenda, decoctum scilicet sassafras cum radicibus feniculi, asparagi, rusci, paratum cum columba turricola, instillatis quatuor vel quinque guttulis spiritus vitrioli, & salis. Non omittis externis serofitates educantibus, atque imprimis provocato sudore in hypocausto, vel in balneo aquæ sulphureæ.

Vitus sit tenuis, attenuans, & detergens; ac proinde intinctus ex petroselinio, cinnamomo, & aceto, conferet. Vomitus aliquando à cibo, cum succo raphani, & oxymel. Exercitium pedibus, si fieri poterit, sin minus, curru ex usu erit. Vigilet: abstinere tamen a negotiis. & pil. ex aloë familiares habeat, quo revocetur sanguis hæmorrhoidalis. Vino albo aromatico utatur paucæ copiæ, & tumori ventris adhæreat cer. tum oxelatum, subactum cum succo cyclaminis, & herbæ reginæ. Atque hæc Ill. patienti ex usu fore spero *Idem ibidem*.

Corpori quidem excalefacto quandoque dysenterici in succedere dicebat noster Livinus Senex, sed addebat, si purgatio acris, ideo & ego excalefacto corpori Adm. Rex. Patris addo, acrum humorum excretionem sequutam fuisse, bilioso nempe prægresso in venoso genere apparatu, qui facile congeri potuit, habita totius & jecoris temperamenti calidi & sicci, habitus gracilis, exercitii immoderati tempore calidiori ratione; unde Diarrhæam biliosam & acrem Dysenteriam associatam suppono, quam immaturè sistere est ita periculosum atque perniciosum, quam citius sanare Dysenteriam necessarium: quæ quoniam frequenter implicant, ideo non adeo medico facilis evadit Curatio, ut propterea de intemperiem calidam corrigentibus multo magis, quam de astringentibus sollicitum esse debere Medicum exclamaverit Trallianus; iis enim inopportune adhibitis, aut suppressa evacuatione multo pejora mala succedunt, aut saltem obstructionibus, viscera naturalia implentur & afficiuntur, à quibus augetur intemperies, & calor naturalis eorundem labefactatur atque immittitur; unde vitiantur concoctiones, & hæmatosis præsertim in hepate, indeque totius corporis nutritio.

Ita in casu nostro obstructiones præsentæ necessariò supponi non in solo hepate, verum & in mesenterio, & lacteis; quæ non solum chylo in ventriculo non integrè elaborato, transitum ad jam dictas venas, & mesentericas, & lacteas impediunt, sicque in via remorando corrumpuntur, & diarrhæa inde chylosa, multis diverso tempore variegata coloribus conserve-

tur; verum etiam pars illa chyli tenuior, quæ ad hepar pervenit, non adeo rectè elaborata ab inbecillitate ejusdem in pravum sanguinem vertatur, qui ad venas distribuitur, utpote nutritioni magna ex parte ineptus, primo totum vitiatum colore depravet, mox pars deterior ad extrema transmissa, eadem tumida reddat, sicque mali habitus, sive Cachexiæ principium appareat, quæ consistere solet in universi corporis pallore, extremorum tumore, & totius macie.

Adm. Rex. Patris status negligendus non est, ne Cachexia perficiatur, quæ Hydropicorum caput ab Avic. jure merito dicebatur. Ut autem arceatur, obstructiones referare omnino necessarium puto; deinde intemperies corrigere, & partium naturalium innatum calorem fovere: ita enim expeditus reddi poterit chylus transitus ad hepar & venas, sicque supprimi diarrhæa; concoctiones præterea perfectiores reddi, & ita totum corpus probè nutrir: unde deficientibus excrementis, & extremorum intumescencia necessariò cessabit.

Pro quibus explendis intentionibus, à fonte Chirurgico in præsens nulla est depromenda sanguinis missio ut quæ obstructionum proprium remedium non sit; iis tamen adaperitis, & suppressa prorsus diarrhæa, progressu forsitan, pro ea idâ intemperie jecoris remittenda, aliqua, sed parca convenire posset sanguiniseductio, situm temporis labefactati nativi caloris adhuc aliquod supersit indicium. Fundo ventriculi aliqua convenire posset levis illinitio, aut oleo M. D. H. aut oleo de cortic. citri aut de cinnamomo, sed legitimo. Reliqua totius abdominis regio iungi & tractari poterit oleo amygdal. in quo coma absinthii macerata fuerit.

Reliqua à fonte Pharmaceutico depromenda. Et quoniam dixi medicam intentionem esse præcipue referendis obstructionibus dirigendam, ideo statim ad rhab. usum confugiendum, quod ita poterit exhiberi, ut facilius permeet, minusque ventrem moveat.

℞. Extract. rhab. ʒ j. sal. tartar. nixi ʒ ss. m. ref. bolus, & summo mane præbeatur, cui post horam superbibat feri capr. aut asin. destil. cyathum, tribus verò horis ab assumpto sero prandear. Sequenti verò die bibat.

℞. Aq. stillat. de succo agrimon. ʒ iv. de succo cichorii ʒ iij. tartar. vitriol. gr. x. m. & præbeatur quatuor horis ante cibum. In horum autem alternato usu persistendum ad viginti dies saltem; ut mox rhab. infusum exhibeatur, eo fine, ut jecoris non solum cavam, verum & gibbam partem penetrare valeat, tuncque ita parabitur.

℞. Rhab. opt. maturi ʒ j. spicæ gr. iij. m. alligentur in panno lineo, & infund. per noctem in cyatho aquæ stillat. agrimon. & cichorii. Sequenti verò die bibat cyathum aq. stillat. agrimon. & capill. veneris, in quo dissolvantur gr. x. sal. tartar. volatilizzati, in quorum alternato usu pluribus diebus erit insistendum, si videbitur opus esse Excellentissimo Medico Adstanti.

Referatis autem obstructionibus, præberi poterit succus cich. depur. & per arenam trajectus ad ʒ iij. in jure pullæ cichorio alterato, in quo dissolvi poterit sal absinthii ad ʒ j. & in



hujus usu ad plures dies pergendum, dum iterum & ventriculi aliqua ratio erit habenda; in quem finem abstinentia omnia opportunissima erunt. Confectiones item, præsertim ex ol. legitimo cinnamomi; & hyemali tempore quandoque etiam magnæ Antidotus.

Quibus omnibus addenda congrua atque diligens victus ratio, mediocris quoad quantitatem, attenuans & aperiens quoad qualitatem, alimentorum facilis coctionis atque distributionis, exiguique excrementi, a Viro Excellentiss. omni diligentia præscribenda, cui reliquorum quoque omnium jam dictorum rectum & opportunum usum renitto. *Raym. Joan. Fortis Cent. & Resp. Medic. T. 2. Cent. 3.*

Matrona Illustrissima & Excellentissima quadragessimum annum agens, ex Patre podagrico nata, temperamenti à primo ortu totius, & jecoris calidi & siccī, capitis verò calidi & humidi, podagricis doloribus multis abhinc annis obnoxia, vitam sedentariam ducens, cum valde sæcunda fuisset, pluries concepit, & feliciter peperit, ac in postremis partibus adeo copiosum lochiorum, indeque probi sanguinis profluvium fuit subsequutum, ut exanguis Lipothymiis frequentibus prehenderetur cum evidenti discrimine vitæ. Reassumptis autem parumper viribus, iterum atque iterum nova parturiendi occasione, in eandem largam sanguinis effluxionem incidit, & iterum Menses decolores inde, nec statis temporibus apparuerunt, quo eodem modo perseverant, & ipsa quoque in toto decolor reddita, de ventriculo affecto conqueri cepit, & de redundante in eodem humiditate & anxietate a cibo præsertim, sequutis aliquando, licet cum difficultate, vomitibus ejusdem materiæ aquosæ & pituitosæ, ut plurimum insipidæ, nonnunquam etiam acidæ, accedentibus in toto abdomine rugitibus, hypochondriorum tensione, non tantum in epigastrica, verum & hypogastrica regione, Menstrua inordinata & variegato colore apparere cœperunt, Mulierque Excellentissima mortua fieri, cum cordis oppressione, capitis obtenebratione, gravedine, & nonnunquam sensu punctionis & lancinationis, dum calidas atque fuliginosas evaporationes ab hypochondriis ascendentes, caputque ferientes percipit; à quibus omnibus se levare affirmat, dum serositatis aqueæ copiam per urinam deponit, quod tamen non adeo frequenter accidit. Interim etiam ad ambitum corporis portio serositatis ejusdem defertur, pruritum excitantis; & pariter cum levamine aliquo ex scalpiti. Gaudet ambiente calido & calidiorum accessu: extrinsecus enim corpus frigidum habere sibi videtur, accedente quandoque etiam rigore, vel saltem horripilationibus citra febrem. Crura jam intumescere cœperunt, & dum Autumno præterito medicamentis adversus hujusmodi affectus pugnabatur, extemporanea principum omnium actionum abolitione cum motibus convulsivis correpta fuit, quod genus symptomatis quater aut quinque octo mensium spatio repetivit. Modo hoc mense Maio à Podagra non omnino immunis, cum tumore in cruribus foveam conservantibus, totiusque corporis pallore & macie, nec sine

metu recurrentis epilepsia, de agendis consultit.

Quamvis Matrona Excellentissima à primis annis biliosis febribus, moxque pustulis in facie circa os obnoxia fuerit, caloris exuberantis indicio, mirandum tamen non est, si in præsens frigiditatis signa supervenerint; liquidem ex immodicis sanguinis ex utero profluviis iterum atque iterum repetitis, naturalem calorem labefactari, quinimo & diminui necesse fuit, unde & Aristoteles dicebat: quod si multum sanguinis deficit, si nimium, omnino interit vita. Ita & sacra pagina animam in sanguine reponunt, dum pro anima calorem nativum sumpserunt, & sumebat Hippocr. ipse. Summa vero cum ratione idem dicebat quod si *Menstrua plura fiant, accidunt morbi*, quos enumerat deinde Gal. asserens, sequi vitium totius colorem, inappetentiam, læm concoctionem, pedum tumores œdematosos, virium languores; & peculiariter magis ad hominem protulit in Aphorismis, inquit, quod ex profluvio sanguinis calor nativus adeo debilitatur, ut cibi neque bene concoqui, neque in sanguinem transmutari, multoque minus distribui possint, quod confirmavit experientia in Excellentissima Matrona, in qua debilitato calore nativo totius corporis, & potissimum ventriculi atque jecoris, cruditates in illo, indeque obstructions subortæ sunt, unde hypochondriacæ affectiones, serositates in isto, & imperfectus sanguis, unde vitiatæ totius nutritiones; ad quæ omnia non parum conspiravit vita sedentaria, spontanea potius quam coacta. Nec horum desunt manifesta signa: cruditates enim frequenter percipit Excellentissima Matrona in ventriculo insipidas, etiam quandoque acidas, rugitus præterea in hypochondriis, & murmura, quinimo & fluctuationes, aqueæ serositatis quandoque per urinam copiosas excretiones, & ejusdem ad ambitum corporis transmissiones, pruritum & rigores, sive horripilationes, citra febrem nonnunquam cum sudore excitantes; quæ tamen non à sola positiva frigiditate congelante, verum & à jecoris calore temperamenti, & adscititio colliquante fieri credo, qui calor ævenibus semper major evadit, & ideo Gal. dicebat *Pueros esse ætate florentibus calidiores; ætate verò florentes esse pueri calidiores simpliciter*. primo loco de nativo calore, secundo de calore temperamenti loquutus; quos calores distinguere quoque voluit Hippocr. ipse; quinimo nativum calorem à calore adscititio temperamenti sæpe magnopere lædi nos docuit, dicens, quod *Anima nostra producitur usque ad mortem, si autem igne excanduerit, simul cum morbo anima quoque depascitur*. Ideo in casu nostro oblivisci non debemus temperamenti naturalis Excellentissimæ Matronæ, sed vigere credendum, labefactato licet calore nativo; & ideo ab illo non solum hypochondriacum & flatuosum affectum exiccatis cruditatibus primo in ventriculo genitis, moxque in lacteis & mesentericis venis stabulantibus, necnon cum sanguine ad Uterum transmissis, & obstructions facientibus ortum habuisse, sed & ab exusto quodammodo sanguine, in vasis illis stagnante, melancholicam quoque affectionem.



tionem fuisse superadditam; quibus praesentibus, exteriora frigent, iis quoque, quibus neque seronitates aquae ad ambitum corporis transmittuntur, neque tumores oedematosi in cruribus excitantur. Verum quod magis est, in casu nostro a melancholica, & facile quoque hysterica minera Autumno proximè praeterito medicamenti occasione agitata, elevati fuliginosi & acidi, si non acres vapores, caput petentes, & ad cerebri ventriculos sese innuantes, meninges irritantes, motus convulsivos in toto excitantur, & cum animalium actionum abolitione; dum ad illam ventriculorum concussionem spiritibus animalibus & motus inordinatus additus, & transitus liber fuit impeditus, unde sequuta privatio sensus, regularis motus & omnium facultatum abolitio, quae omnia epilepticam affectionem constituerunt; ut propterea observaverit Hipp. quod melancholici facillè fiunt epileptici, & e contra.

Quoniam verò vitiatam esse dixi Excellentissimae Mulieris totius nutritionem, & non solum immunitè, quia gracilior, quam antea, facta est, sed etiam depravate, quia decolor atque pallens reddita, cum crurum tumoribus oedematosis foveam servantibus; ideo ad Cachexiam tendere nullus est Medicorum qui non videat, sicut in cuexia sanguis optimus, color floridus, & caro mediocrius esse solet. Neque crurum intumescunt à toto venoso genere procedentes cum podagricis tumoribus à capite per spatia potissimum prodeuntibus, sunt confundendae, ut quae carnes, illi verò articulos occupent.

Status Excellentissimae Matronae est periculi plenus, cum à planta pedis usque ad verticem capitis non sit in ea sanitas; etenim motus progressivi proximam minatur impotentiam Podagra: Cachexiam & hydropem jecoris nativi caloris paupertas: affectum melancholicum hypochondriorum obstructions; indeque epileptiae perseverantiam capitis imbecillitas. Et quamvis jecur, ut minister Principi, cordi subministrare videatur, attamen ut vere Princeps, distribuendi facultatem obtinet.

Quare viscera naturalium intemperiebus primo incumbendum esse videtur, deinde capiti; at neutrum praestari potest, nisi ablatis obstructions, totoque venoso genere repurgato, nec dictorum ullum sine praecedenti primarum viarum expiatione; ideo omnium primo ventriculus & intestina ab excrementis mundanda. Secundo mesenterii, deinde jecoris obstructions referendae. Tertio venosum genus depurandum. Quarto etiam uteri vasa pervia reddenda. Quinto capitis humida intemperies corrigenda. Sexto calor nativus ventriculi, jecoris atque totius restaurandus; atque tandem viscera omnia una cum capite roboranda.

Quibus intentionibus confidenti animo satisfacere conandum remediis Chirurgicis, Pharmacenticis & Dieteticis.

Et inter Chirurgica consideratur sanguinis missio, quae tunc solum locum haberet, quando Cachexia ab aliqua consueta sanguinis evacuatione suppressa ortum duceret; in hac

verò opposito modo se habente, minime convenit. At quoniam totius massae sanguineae status est à nobis explorandus, ideo erit aperienda dexteri brachii vena media, sanguinis qualitatem observando, qui si niger & crassus exierit, ad 3 v. & non ultra permittendum ut exeat, si tenuis & pallens, statim supprimendus. Caetera praeterquam quod odiosa forent, suspecta quoque habentur.

A Pharmacia pro primarum viarum expiatione desumenda sunt lenientia, & erunt.

26. Pot. ex manna clarif. 3 vj. aq. cinnamomi 3 ss. m. pro potu. Praeparans autem ut hujusmodi.

26. Julap. acet. 3 ij. aq. flor. citri 3 ij. aq. cinnam. 3 ss. poll. cremor. tartar. 3 ij. m. pro syr. & sic pro aliis v. quos subsequatur idem Leniens ex pot. ex manna clarif. 3 vj. aq. cinnamomi. flor. citri an. 3 ss. m. f. potio. Inde secunda sequatur humorum praeparatio, & primarum obstructions referatio, parando Julapium, aut macerando in aceto & aq. agrim. radices feniculi, petroselinii, apii, graminis, sive asparagorum, & facta forti expressione, colaturae addatur sacchari albi q. s. ut fiat Julap. longum, ad 3 ij. quotidie septem diebus exhibendum, cui superbibat jus pulli junioris tenue, alteratum cichorio, borag. endiv. soncho, melissa, agrimonia. Septem verò transactis diebus paretur eadem potio clarif. addendo infusioni consuetae agar. trochisc. 3 ij. rhabarb. opt. turbit. an. 3 j. & aq. cinam. 3 ss. f. potio. His peractis, ut viscera, simulque massa sanguinea purificetur, ad usum syr. Ferneliani, qui syrupus cachecticus ab eodem nuncupatur, erit deveniendum; praebetur autem decem aut duodecim diebus, tertio aut quarto quoque die ad 3 ij. additis totidem uncis vini albi maturi, neque dulcis, neque austeri, tribus aut quatuor horis ante cibum. Diebus vero intermediis exhibeatur cyathus aq. stillat. de succo agrim. in qua dissolvantur tartar. vitriol. gr. xii. necnon salis artemis. & sabin. an. gr. v. quibus addi quoque possunt grana salis viperini. Et si fortasse à jam dictis assumptis calor molestus percipiatur, dimidia agrimon. praescriptae aequa portio misceatur aq. de succo cichor. sicque alternatim syrup. noster Fernelianus & aq. agrimon. sumatur usque ad xxiv. diem. Quo tempore decoctum sudorificum convenientissimum erit, nisi ab aestivo calore prohibeatur; hoc enim poterit humiditates excrementitias, in carne & interstitiis existentes absorbere, humidam capitis intemperiem corrigere, & visceribus naturalibus robur addere; ita autem parari poterit.

26. Visc. querc. veri 3 j. salix, medulla guajaci, Chinæ, rad. paeon. an. 3 ss. aq. stillat. cichor. beton. paeon. an. 3 ss. m. f. infusio per hor. xxiv. deinde bull. ad consumpt. dimidii, & colat. servetur pro duabus vicibus, cui praemittantur pulv. viper. gr. xv. & transacta hora ingreditur hypocaustum, ita ut caput cum toto corpore sudet. Alligetur autem in petia seorsim guajacum, & facta colatura, abjiciatur, ut aqua secunda suavior evadat, cui in fine ebullitionis addi poterunt frustula cinam. & citri rec. ut aqua vulgò Cedrata evadat. In hypocausto non sudet ultra horae di-



midium, perseveret autem triginta diebus & decimo quoque die portionem assumat ex manna clarificata; nec victus sit adeo tenuis, verum tertio quoque die, aut pullus junior, aut palumbus turticola assa concedatur. iunior & quandoque prafana hordeacea. Vinum quoque aliquando, sed raro, album, aqua secunda dilutum, concedi poterit.

Verum si ferreat nimis anni tempus, ita ut hypochondrii ingreditur periculosus videatur, parietur saltem ejus vice jus palumbae turticolae, aut galli jussoris, China, ligno ror. mar. lentisco & Chio, & radice peronix alteratum, cui praeputer poterit pulvis viper. ad gr. xx. ut qui extenuantis sit facultatis, citra insignem calorem ad cutem properans. Observanda tamen n. turz propensio, quae si ad urinam inclinare perseveret, ut antehac; ad ambitum corporis non est divertenda, sed quo vergit, eoducere oportet, viperino pulvere terebinthum substituendo quotidie ante praescriptum jus. Sudor autem cum primo decocto in aliud tempus opportunum magis erit differendum.

Interim ventriculi, jecoris & capitis ratio corroborans erit habenda; quare in usum ducat aetivum tempore salem absynthii; proderit enim & ventriculo, & jecori, sicut ejusdem succus condensatus, vel conserva. Temporibus vero frigidioribus, theriacus usus utilissimus erit. Pro capite vero sub ingressum lecti proderit Conserva e floribus betonic. ror. mar. laviz. Nec a proprietate juvantia adversus epilepticos insultus sunt negligenda; in quem finem praesto sint conservae e floribus lilior. convallium, peron. rutae capr. quibus miscetur pulvis ungulae alicis, salis crani humani, superbibendo haustum aq. peron. rutae caprariz, tot. citri, cord. Saxoniz.

Articulis quoque tum affectis, tum non affectis aliqua sunt administranda medica auxilia; & primo affecti & tumefacti manu illiniantur, & perfricentur tali linimento.

℞. Adipis anseris ʒij. adipis felis ʒj. ol. nucis mosch. expr. ʒij. salis alb. ʒss. m. ref. omnia ad ignem pro quotidiana inunctione. Non affecti vero roborari solent oleo antiquo salito; quod quoniam grave olet, ideo substituitur pro Matrona Excellentissima spiritus salis ʒj. quintae essentiae ror. mar. ʒj. quintae essentiae rosar. ʒss. m. & vola mandis guttulis aliquot inuncta fricentur articuli.

Hisce omnibus congrua erit addenda victus ratio, non quidem tenuis, sed nonnihil extenuans; circa quam observatione dignum erit, quod Matrona Excellentiorum objectorum violento, aut celeri motu sese moventium aspectum evitare debet, sicut odores, & bonos, & malos, motus quoque concitato totius corporis, sive in Navicula, sive in Rheda; pedibus autem domi, quo magis fieri poterit, corpus exerceat; a proprietate nocentibus abstineat, ut a vaporosis omnibus, tum calidis, tum frigidis, a carne hœdina, qualeis perdicibus, coturnicibus, ab anguilla, leguminibus, & reliquis, a Doctissimo & prudentissimo Medico adstanti considerandis, cui cetera omnia jam proposita, alteranda, mutanda & ad rectum usum revocanda libenter committo. Idem ibi.

Non hoc mihi sumo, V. C. ut de nobiliss. Matronae morbo ejusque causis judicare me rectius posse putem, quam tu ipse, qui hactenus curationi interfuisti. Quoniam vero hoc a me requiris in literis tuis, morem tibi gerere volui. Succumbit nobiliss. Matrona Cachexiae hydropicae, ni fallor, ad Anasarcam proxime vergenti non siue levi scorbuti subiacentis, qui corpora nostra sub omnium malorum larva clanculum aggredi solet, suspicione. Quanam fuerint a parentibus derivata generationis primordia, me quidem latet. Nec quicquam mihi constat de victus norma & vitae genere, quo ab ineunte aetate usa est, quae si minus profuerit, pro foeminarum more, luxui ut plurimum indulgentium, huic multorum capitum hydrae generandae potuit esse satis. His accedit multiprægnatio, cujus tempore plurima ex suppressis mensibus & diuturnis erroribus in corpore accumulatur excrementa. Video tamen naturam, industriam alioquin humani corporis opificem, effluxisse huic generosae Matronae infirmam corporis constitutionem ab ipso ortu, nec dum vel peritissimorum Medicorum opera & sedulitate ad meliorem statum redactam, sed & graviditatis tempore in pejus lapsam. Familiaris est affectus hic utero gerentibus, maxime vero iis, quae ante ingravidationem in eum viscerum vicio ruere proclives fuere, praecipue si foetus alimentum non satis attraxerit. Cujus exemplum proponit venerandus noster e Coo Senex in *Harpalida* sorore, cui quatuor vel quinque mensium spatium uterum gestanti pedum tumores exorti sunt oedematosi; oculi in orbem intumescabant totumque corpus velut pituita alba suffusum in tumorem elevabatur, accessit tussis sicca & orthopnea, interdum quoque spiritus suffocatio, adeo quidem ut perpetuum in lecto erecto corpore sedere neque decumbere ullo modo posset, sed si qua sonni capiendi urgeret necessitas, cum desidendo capere cogebatur. Dic sodes, an non generosa nostra hujus foeminae ipsissima est imago? Certe non est ovum ovo similis. Laborat illa magna viscerum nutritioni dedicatum, hepatis maxime, dyscrasia & imbecillitate, tum natura sua tum & victus erroribus acquisita & aucta, quorum merito sanguis generatur pituitosus crudus & serosus, qui in corporis partes evectus, illicque concrevens vitiatam substantiam pro utili apponit & assimilari nequit. Hinc corporis moles intumescens praeter naturam augetur, corpusque non ut antea promptum & alacre, sed grave & inertis; non robur viribusque pollens, sed effœtum, dissolutum ac quasi enervatum; non firmum & compactum, sed molle & laxum, non vivido colore florens, sed subalbido & pallido squalidum apparet, sanguine phlegmatico & seroso cutis substantia imbibito nec rite digesto, plurimis quoque excrementis in ipsis carnosissimis partibus luxuriantibus. Pedes tumor oedematosis infestat, qualis ex abundantia sanguinis pituitosi oriri solet. Sed & pectoris angustia plurimum urget, non quod pectus aut pulmo, quae tua est opinio, particulari hydropoe afficiatur, sed ob Diaphragmatis compressionem, necnon pituitam viscidam in bronchiis pulmonum collectam.

Non



Non iniicias iverim humores serofos, circa hepar in venoso genere collectos per uenun arteriosum in pulmones effundi, unde respirationis necessitas augetur compressis pulmonum bronchiis, quod malum insuper a vaporibus ab utero in partes spirituales in puerperio elatis non parum ingravescit. Ex his de aliis symptomatibus, si quæ restant, facile est iudicium. Et hæc sufficiat quoad affectus idæam proposuisse, qui generosam Dominam in tantum discrimen & vitæ periculum præcipitavit, cui debellando ne *Hercules* quidem suffecerit. Hactenus sapienter & magno iudicio hostem hunc insensissimum oppugnavi & juxta te desumptas indicationes remedia à Te assignata non improbo. Miror saltem omnes evacuationes hactenus omittas fuisse. Si meo consilio locus, purgarem ægram pulvere Mechoacanæ cum correctivis, quem tuto exhibere poteris etiam utero habenti. Hæc radix, ut nosti, vim habet melleam hepar aperiendi & roborandi atque ab hydropo præservandi, colorem etiam lividum faciei, ab intemperie & obstructione hepatis oriundo, emendandi. Poteris pulverem ejus adjecto sacchari tantulo ex aqua Absinthii, vino albo diluta propinare. Vidi matronam aliam hac radice in simili casu curatam. Hinc adijunge decoctum Palmæ sanctæ, adjecta lignis assasfras, portione, quod in corroborando stomacho, aperiendo hepate & præservatione ab Hydrope maxime est efficaciz. Quod si brodio potius delectetur, laudari jusculum gallinæ Chinæ, santalis, ligno assasfras, Mentha, Buglossio, Scolopendria, Nuce moschata, & similibus medicamentum. A passu vero utatur pulvere sequenti.

℞. Semin. Anisi ℥ij. sem. coriandr. Fœnicul. dulc. an. ℥j. Corall. rubr. præp. Cinnamom. ℥j. Cinerum pellicul. ventriculi Gallinæ lotor. in aq. Rosar. ℥j. sacchar. rosat. Tabul. ℥iij. Misc. s. Pulvis, cujus dosis Cochlearii. Hora somni devoret quantitatem juglandii Electuarii quod.

℞. Conserv. Rosar. rubr. Vitriolat. & flor. Cichor. an. ℥j. spec. Aromat. Ros. & Diarrhod. Abbat. an. ℥ss. syr. de Mentha & Corallor. an. q. s. Misc. fiat Electuarium. Tandem observet bonum victus legem, utatur cibis boni succi, facili concocionis, abstinendo à frigidis, crassis & lenis utque aquosis, quorum minutis Tu qui præsens, facile præscriperis. A partu de aliis erit cogitandum. Deus opt. max. hæc pau. ula ad nobilissimæ Matronæ recuperationem efficacia velit esse. Tu me ut facis am., Vale. *Frideric. Loff. Consil. 49.*

Vir quadraginta annorum, febris erraticæ diu fatigatus, & tandem ab ea liberatus, incidit in pectus & tibiæ inflationem; quæ deinde, per semora & tectas paulatim ascendens, totum corpus, faciem ipsam, palpebras, labia, ac gingivas occupavit. Color corporis ad factam albedinem declinat. Digni partibus externis impressi aliquandiu profunda in us relinquant vestigia. Urina est pauca & cruda. Pulsus debilior. Coctio ventriculi tarda. Corporis motus lentus & languidus.

Afficitur in hoc ægro totius corporis habitus; ut ad oculum patet. Item hepar, ventriculus, lien, & alix partes, chylosi & chylosi ac etiam sanguificationi inservientes;

quod totius corporis inflatio & tumor indicant.

Causa prima sive procatartica hujus morbi est febris erratica, quæ diu ægrum nostrum fatigavit. Hinc calor natus, primo quidem nihil fuit intensus; sed postea, ex dissipatione spirituum & oleaginosarum partium, huminitus: unde humores seroli & pituitosi, item vapores crudi & crassi copiose fuerunt in visceribus geniti: qui, in vasis cum sanguine contenti antecedentem huic morbo præbuerunt causam. Ji vero, propter debilem viscerum calorem cum reliquis sanguinis partibus non satis bene mixti atque ideo extra vasa in habitum corporis, cujus minor quam viscerum est calor, sese effundentes & illi qualicumque modo se agglutinantes continentem hujus morbi & symptomatum constituunt causam.

Nam serosa & pituitosa illa materia, circa viscera chyloleos & chymoleos ac sanguificationis existens, producit ibi intemperiem commemoratam. Extra vasa vero in pedes, propter longiorem à corde & reliquis visceribus distantiam, & seri gravitatem, effusa, facit ibi tumorem ædematosum, digitorum impressorum vestigia, ob partium molliem, aliquandiu retinentem. Hic, malo ingravescente, primum tibiae & femora, deinde totum ambitum corporis, item brachia & caput, in eoque faciem, labia & gingivas tandem occupavit.

Et quoniam serosa hæc materia, ob dictas causas, in habitu corporis hæret; idcirco pauca ejus quantitas ad renes deferretur; quæ eo deportatur est crassa & cruda, ac obstructos etiam ibi invenit poros; hinc urina etiam est pauca & cruda. Quia vero ab hoc sero & sanguine crudo ac frigidior calor ventriculi & cordis, jam antea à febre præcedente debilis magis magisque debilitatur: hinc pulsus est justo debilior, ac concoctio ventriculi, ut & aliarum partium, tarda. Et denique quia moles corporis ab hoc tumore est gravis, & spiritus animales, ob serosam hunc caco-chymiam, pauci; hinc motus corporis est languidus & tardus.

Ne itaque in lethalem leucophlegmatiam, vel ascitem abeat. Curatio quamprimum erit inchoanda: quæ consistet in causæ antecedentis & continentis ablatione, & intemperie viscerum & habitus corporis, per contraria, correctione. Primò itaque purgetur tali haustu.

℞. Diaphænic. ℥ss. Tartar. vitriolati ℥j. dissolve in aq. card. benedict. ℥ijss adde aq. cinnam. ℥ss. scammon. gr. viij. Misc. F. Potio, manè jejuno ventriculo exhibenda. Postea utatur hoc apozemate aperienti alterante; & purgante.

℞. Cort. rad. apii, ireos recent cort. ebulli an. ℥j. cort. bryon. ℥ss. cort. enul. campan. ℥iij. Herbat. tuscute, agrimoniz, ceterach; cardui bened. sum. r. an. m. j. absinth. vulgaris & Roinani an. m. ss. Flor. genist. sambuci cent. ur. min. an. p. j. Sem. anisi, fœnicul. carui, dauci an. ℥j. fol. senæ ℥ss. agatichi, rad. esulæ an. ℥ss. rhab. ℥j. Zinziber. cinnamomi, schenanthi an. ℥j. uvarum pass. ℥j. prunor. acidor. paria viij. liquiritiar. ℥j. de seq. ex aq. comm. & vin. alb. part. æqual. ad lib. i ss. & coquantur pro Apozemate, de quo bibat æger uncias quatuor;



manè jejunos. Ubi aliquoties purgatus fuerit, utatur his tabellis corroborantibus & intemperiem viscerum corrigentibus.

℞. Spec. elect. aromatici rosati, diarrhod. Abbatis, di. margar. frig. an. ʒiʒ. rasur. eboris, cornu cervi, an. ʒj. Ol. cinnamomi, caryophyll. an. ʒʒ. sacchar. albi dissoluti in aq. rosar. ʒiij. F. Tabellæ ʒiij. pondere; capiat unam hora ante prandium & cenam. Ventriculus & praeordia hoc soveantur linimento.

℞. Ol. nucis moschatae, absinthii, amygdal. amar. an. ʒʒ. ol. caryophyll. ʒj. cera parum. F. Linimentum quo regio ventriculi mane & vespere illinatur, & superponatur scutum ex bompae. Alvus si postea substiterit, moveatur subinde his pilulis.

℞. Aleos rosatae, spec. hier. simpl. rhab. agaric. trochis. an. ʒj. Cum syr. de absinthio q. s. F. massa, de qua capiat ʒj. horâ unâ ante cenam.

Cibus sit euchymus, ex pane triticeo, bene fermentato, carnibus gallinaceis, vervecinis, perdicibus, ovis sorbilibus; aromatibus moderatè conditus. Abstineat à multis jurulentis & sorbitionibus, multo potu; qui sit cerevisia & vinum album, mediocrium virium. Bis terve in die alatur quantitate cibi, quam facile conficere potest. Versetur in aëre mediocriter calido. Moderatè ambulando se exerceat. Bene dormiat; & tristiam fugiat. *Henric. Regius apud Theod. Craanen.*

### Observationes.

Colore ex luteo fusco deformata erat mulier quaedam, cum compressionis circa praeordia (ut cachectici solent) dolore. Imprimis verò de summa imbecillitate membrorum conquerebatur, urinae crudae & albae erant cum me consuleret, obstructions in venis meseraicis adesse judicavi, vinum hoc illi. Maii praecripsi.

℞. Rad. aperit. an. ʒiij. rad. rhapont. ʒʒ. cort. rad. sambuc. ʒj. absynth. ʒʒ. Chamæp. ʒij. summit. centaur. min. sem. feniculi. an. ʒj. sem. petrosel. ʒij. fol. sen. ʒiʒ. agar. ʒʒ. Zinzib. ʒj. limatur. chalyb. præp. instar castaneæ. lutum. in vin. alb. Mens. iʒ. bibat aliquot matutinis, cum ter bibisset, & nullam operationem sentiret, iussu in postremo haustu dissolvere El. de succo ros. ʒij. diaphan. ʒi syr. ros. solut. ʒj. bibit bonum hauritum & admodum purgata fuit: revera 18. Maii ordinavi sequens.

℞. Conserv. flor. cichor. fl. bugl. capil. ven. & rad. apii an. ʒj. pulv. pellic. stomac. & intest. gallinæ, ʒi. limatur. chalyb. præp. ʒiij. cum syr. de ʒ. rad. F. Electuarium, sumat instar castaneæ manè alternis diebus superbibendo ad ʒiʒ. aq. sequentis.

℞. Aq. cent. min. ʒiij. aq. Endivia ʒiij. misce. Hisce continuatis 1. Junii ad me veniens, urinamque salubri similem ostendens, successum medicamentorum laudabat, ut pote quæ nullam amplius in membris sentiret debilitatem, cibumque bene appeteret & concoqueret; faciesque melius colorata, genæque parum rubescentes, etsi fusco colore à natura praedita esset. *Felix Platerus, Observ. lib. 3. pag. 60j.*

Præterire non possum pulverem meum cachecticum, qui ob felices successus imprimis in interitum cachexia febre lenta comitata, utualis in nostris officinis factus est.

℞. Rad. & sem. prun. excortic. an. ʒj. ros. rubr. ʒʒ. nuc. mosch. parum tost. ʒj. baccar. lauri parum tollarum ʒʒ. spic. schizanth. Croci. an. ʒj. pellicul. ventriculi & intest. gallin. præp. ʒj. Croci martis aperitiv. ʒiʒ. cinnamom. ʒj. fiat omnium pulvis tenuissimus. *Idem Præf. Tom. 3. lib. 1. cap. 2. pag. 119.*

Admodum Illustris Domina Dorothea, Dom. Augultini Bero uxor post febrem continuam in duplicem tertianam inciderat: quam ætate, ventriculi frigida constitutio, viscerum, lienis & jecoris durities, melancolicarum obstructio, inappetentia, vigilæ, & similes affectus concomitabantur. Nobilis hæc Domina, ut naturâ satis delicata, & vulgatis remediis nauseabunda, ipsique & morbi diuturnitate defatigata, vitam in non exiguo discrimine trahebat, eò magis certè quod ad hydropem jam jam incipientem inclinaret. Hujus curationis difficultas & à parte subjecti, & à morbi natura periclitabar. Quocirca nobilissimæ ægræ nobilissimum hoc electuarium exhibuimus.

℞. Salis centaurii minoris ʒj. confer. rosar. & violar. an. ʒi. olei vitrioli gutt. x. Mixtis omnibus concinnabatur Electuarium, cujus ʒi. bis in die dabantur; cujus benecio brevi convaleuit *Petrus Peter. Observ. & curat. Centur. 1.*

Perillustris Dominus D. Marcus Aurelius Donatus Romanus, Bononiam venit, ut Cachexia jam pridem post diuturnas febres contracta mederetur. Ad hanc accedebat lenta febris, dolor & imbecillitas ventriculi, insignis virium prostratio, alvi stipricitas, & sinuaria; quæ omnia, solius specifice nostri stomachici usu, intra sesquidem sustulimus. Speciacum ejusmodi stomachicum insensibiliter suas vires exerit, aperit, dissolvit, & roborat: ter & quater in die in magnis morbis adhibetur, cum vino, conserva, aut quovis alio condito. *Idem Observ. & curat. Cent. 2.*

Incurabilem, & penitus deploratum Hydropem, Hamorrhagiam succedentem, quotidie experimur: nam in magno sanguinis effluvio, sit maxima caloris, & spirituum jactura; quemadmodum prava succorum concoctio, à qua phlegma & aqua. Sic contigit Doctiss. & optimo viro, Admodum Rev. P. Rossano, tunc collegii Bonon. P. Jesuit. Rectori, qui post longam, & continuam sanguinis fluxionem, in Leucophlegmatiam inciderat pedes, & tibias insigniter tumentes habens, cum insigni ventriculi imbecillitate; unde inappetentia, sitis, &c. Ad hamorrhagiam firmandam coral. Tinct. saccharo rosaceo miscebamus. Ad ventriculi, & aliarum partium naturalium robur conciliandum, specifico nostro stomachico, cum conserv. rosar. contenti fuimus, quibus gratissimis pristinam recuperavit sanitatem. Videant interim, si sciunt illi qui se jactitant cononice mederi, num cura hæc tuta, vera & legitima sit. Quid si medicamenta hæc ipsis non sint nota, an propterea non sunt canonica? Ejusmodi Aristarchis consulerem potius, ut naturæ miraculis sedulo operam daretur.



durent quàm inani, & infrugifero suo cachinnu. Sæpiissime demiror, quomodo ad sydera eorum peruenimus ab his, qui docti habentur, extollitur. Scio quantum apud mortales valeat exterior apparatus. Pauci sunt, qui docti sunt. Non in verborum strepitu, sed in factis, vera sapientia residet. *idem Obs. & Curat. Cent. 3.*

Doctor Geislingensis mensis Jun. An. 58. cum antea per tempus jam bene longum male haberet, dicto mensis & domi manere coactus est; Urinam mihi monstrat spiccam, conqueritur de extenuatione corporis, Inappetentia, siti, tussi perquam molesta, tumore item pedum sub vesperam edematoso; varia ipsi medicamenta communicavi, præsertim de nodulo purgante & obstructions referante per quatuordecim dies bibit, unde miram humoris peccantis faburam excrevit, nondum tamen quicquam levaminis periecit, sed potius rem in deterius ruere putavit, unde postea solis aperiens, tussique asperitatem mitigantibus, & in primis Elix. Propri. (unde multum levaminis accepit) succurri, ut non nisi iustaurante victus ratione opus habuerit; sed ob paupertatem rem suam curare nequies, & medicamenta, quibus adhuc opus habuisset, continuare aut non volens aut non potens, sensim demò in peius ruere, veramque Phthisin incurrere cepit, unde alterius Consilio Ulmæ vivens vitam usque in Septembr. protraxit, ubi totus consumptus tandem in vivis esse desiit. *Vin. Kriedli. in Observ. Medic.*

Comina quidam Geislingensis supra 15. annos 40. intempestive in su muliercularum instituta venæ sectione, mens. Februar. sensim vitioso colore & habitu, quemadmodum & tumore circa regionem ventriculi & ambòs pedes, tussi itidem sicca prehenditur consiliumque meum implorat, cui vino medicato sq. succurri.

Herb. marrub. alb. veronic. agrimori. capill. veneris, chamædr. an. m. s. rad. Helenu. iris n. 22. 3j. rhab. ver. sel. 3ij. esul. præp. 3ij. Cort. aurant. sic. rad. capp. r. an. 3ij. tamarisc. 3ss. tol. sen. f. s. 3vj. agaric. albiss. 3ss. passul. Corinth. 3iiss. can. hitul. calam. aromat. an. 3ij. tartar. albiss. 3i. Inc. & cont. q. o. m. ad ch. optimè evacuantem brevi & tumor dictus & vitiosus color evanuerunt, ita ut jam Deig. tia melius habeat. *Idem Ibidem.*

Matth. Christ. Speiser Pharmacopeus Geisl. peritissimus 40. annorum, optimæ anthrac constitutionis, per sesquiannum Cachexia prehenditur, quam ut ominabar ex potu frigido, dum sedulus in colligendis herbis ipsemet occuparetur, contraxerat: accedente victus ratione crassiore. Variis dicto tempore symptomatibus divexabatur, nimirum valido continuoque dolore capitis, perennibus detluxionibus ad fauces, nares, & pectus, Tussi ferina, hæmorrhagia vicibus interpolatis, Hæmoptysi, vomitu primo pituitoso horis matutinis post cibum, denique spasmo flatulento in cruribus admodum doloroso, & quidem tempore nocturno. Sæpius admonitus à me, ne dictos affecus ita incrementum sumere sineret, sed principis obstaret, medicationem namque postea fore difficillimam, nihilominus distulit & moras nexit, usque eo, ut negotiis ampliùs

obeundis planè esset inidoneus, quod mense Jul. Anno 1662. evenit: quo auxilium meum implorare cepit, sed prohi dolor! nimis sero; nam quamvis operam meam ultro obtulerim, natura tamen protinus prostrata, medicamenta ore assumpta mox iterum rejecit, imò et in ne clysteres quidem retinebat, ut voto nostro satisfacerent: Unde subitanea virium collapsio, ut pedibus amplius inambulare non posset, sensim indies consumeretur, & Lægis quæ supervenerant, hæmorrhagiis tandem exhaustus debilitum naturæ mens. Octobri solveret, cujus animæ, ut benè sit in æternum, calido apprecamur, Medicamenta quæ applicata fuerunt, maximam tamen in partem frustra uti dictum, sunt seqq. Cum urina quæ per longum tempus spicæ, tenuis, &c. cum multa spuma erat, obstructions viscerum indicaret, judicavi: 1. Lenitivis primas aperiendas vias: 2. Obstructions referandas: 3. Pleniore corporis vacationes quantum quidem possibile moliendas. 4. Partibus laborantibus prospiciendum. & 5. Roborantibus atque convenienti victus ratione viribus succurrendum.

Rad. scörzoner. polypod. qu. an. 3ij. bryon. rhabarb. an. 3ij. Herb. scolopendr. s. l. v. chamædr. Flor. acaciz. violar. prunul. ver. an. p. j. Fol. sen. Al. 3j. sem. Cartham. 3ij. passul. min. 3vi. Cort. rad. Cappar. aur. nr. nec. an. 3iB. Mac. Cinnam. an. 3i. Incis. & cont. q. o. m. ad nod. promens. dimid. vin. alb.

Magist. tartar. vitriolat. 3iB. sæcul. bryon. sal. card. bened. sal. absyntn. an. 3B. Magist. corall. rubr. 3ii. m. & divid. in part. viij. æqu. l.

Rh. b. sel. 3i. fol. senn. Al. 3iij. zinzib. 3j. Coq. in s. q. aq. font. col.

3iij. Mann. Calabr. 3iB. extract. Fanchym. Cr. 3iB. m. f. Potio.

Rob sambuc. 3iij. Mithridat. 3j. syr. de pæon 3ii. spir. lil. convall. 3i. Aq. hirund. cum Castor. 3ii. Aq. ceras n. q. f. m. f. Potiunc. Sed ut dictum ad primum haustum lenixivi mox vomitus sequutus, cum virium mira dejectiones quarum ut & sputi sanguinei causa vacuanti-tibus minùs tutò litari potuit; Urgentibus solum pro virili symptomatibus obviam itum. Anorexias causa aliquoties sumpsit Aq. acetos. Myns. c. vin. quæ.

Conserv. rosar. rubr. 3j. aq. rosar. 3iv. spir. vitriol. 3B. extract. tinctur. adde sacchar. alb. 3B. M. It. Elix. Propriet. Parac. c. conf. ros. rubr. Die 1. Augusti Clyster injectus, mox verò sine operatione rejectus.

Rad. Gramin. asparag. petrosel. an. 3j. herb. soldanell. Mercurial. an. 3vi. flor. sambuc. genist. anth. an. p. ij. agaric. alb. in pet. mechoacan. baccar. laur. an. 3iij. sem. fœnicul. carui an. 3ij. Coq. in s. q. aq. fontan.

Col. 3B. 3B. bened. laxat. lenitiv. flor. an. 3j. mell. ros. sol. 3B. ol. rutac. aneth. an. 3vj. sal. comm. 3j. m. f. Clyster Alius:

Spec. dec. Carmin. 3ij. fol. sen. Al. 3B. Coriand. præp. 3ij. tartar. alb. 3iij. Coq. in s. q. aq. font.

Col. 3x. Eleæ. Lenit. Fl. mell. ros. sol. n. 3iB. ol. Baccar. laur. 3j. m. Ad vomitum datus Pulv. Pumie & corall. rubr. an. 3B. m.

3. 62



quibus continuo putridi vapores ascendunt, facultates omnes afficiunt) uti antea latis dictum fuit, evacuaveris: sine quibus corroborantia omnia nullius erunt momenti. Corroborat ventriculum & viscera nutritioni inservientia pulvis pepticus, antea praescriptus. Aut.

℞. Diacurcum, diarrhodonis Abbatis Aromat. rosat. an. ℥j. sacch. r. dissoluti in aqua Cichorii ℥iij. misce, hantque tabellæ addendo ol. cinamoni. ℥ss. de quibus utatur æger aliquoties in die præcipue ante & post prandium & cenam, ad ℥j. aut ℥ij. Aut detur sequens Electuarium.

℞. Spec. Aromat. rosat. diacurcum. an. ℥j. cinamom. elect. ℥ss. cortic. citron., & rad. cichorii conditarum an. ℥j. cum s. q. syrupi conservæ cortic. citronum fiat Electuarium, de quo sumat æger ad magnitudinem nucis juglandis, ter aut quater in die, Aut:

℞. Conservæ flor. betonic. rosmarini, salvir, majoran. an. ℥ss. specier. Dianthos ℥iij. cum syrupo de betonica fiat Electuarium. Aut.

℞. Spec. de gemmis, Latincantis Galeni an. ℥ij. confectiois Alkermes & de hyacintho an. ℥j. conserv. flor. bugloss. borraginis & melissæ an. ℥ss. Cum syrupo conservæ cortic. citronum fiat Electuarium. Sumatur ut præcedentia. Hæc de internis. nec omittenda sunt externa; ideo si propter dolorem & vigilias caput labefactum fuerit, præter optimam victus rationem & purgantia, etiam per intervalla cucurbitulæ scapulis applicentur. Quod si catarrhus ut scapulæ sit, cum impetu ad oculos aut pulmones defluerit, setaceum in Vertice, aut fonticuli in brachiis efformandi sunt, cucupha quoque ex sequentibus parari poterit.

℞. Rad. iridis Florentin. ℥ij. styracis calamitæ, benzoini, masticeis, olibani an. ℥j. rosar. rubrar. sum. mittat. majoranæ & ll. betonicæ an. ℥ij. moschi ℥ss. Inciduntur & contundantur omnia gro. o modo pro cucupha intertexta, ut artis est. Corroborat sequens Linimentum, si carpi, & regio cordis eo inungatur.

℞. Ol. rosacei fragrantissimi ℥ss. ol. cinamom. ℥ss. ol. cortic. citronum ℥j. misce. Aut:

℞. Aq. borragin. bugloss. rosar. & melissæ, Aq. cinnamom. an. ℥j. acet. rosat. ℥ss. confect. Alkerm. spec. Diamosch. dule. an. ℥j. croci & caphuræ an. ℥j. misceantur, fiatque Epithema, carpi autem tantum modo in eo imbutis puluillis, applicetur tepide. Mediantibus enim arteriis, vis ipsius facile ad cor perveniet. Si quis tamen de hoc epithemate regioni cordis applicare voluerit, non errabit, videat tamen, ut linteis calidis cooperiatur, frigus enim pectori & spiritibus vitalibus nocentissimum esse omnes sciunt practici. Ventriculum roborat & concoctionem promovet sequens Linimentum.

℞. Olei masticeis, & menthæ an. ℥vj. gum. tacamahac. ℥ij. Terantur lentissimo igne & percolentur. Postea admisce olei nucis moschæ per expressionem ℥ss. ol. garyophyllorum ℥j. misce, fiat linimentum, quo regio ventriculi usque ad umbilicum quotidie bis inungatur, & linteum calidum apponatur, aut applicetur sequens emplastrum supra alutam extensum.

℞. Gum. tacamahac. ℥j. ol. menth. &

masticis an. ℥ss. Dissolvantur lentissimo igne & per linteum colentur, postea admisce pulv. nucis moschate ℥ij. g. ryophyllorum, & nucis an. ℥j. misceantur & cum cer. nova q. s. t. ceratum, applicetur ut dictum est. Hepar corroborat, obstruccionelque maligniter tollit sequens linimentum.

℞. Unguent. deoppilativi locsi, ol. lumbricor. an. ℥j. misceantur, natque linimentum, quo regio hepatis, totaque venter præter regionem ventriculi inungatur bis in die. Secundum enim concoctionem mirum in modum pronovet. Unguentum deoppilativum locsi sequenti modo preparatur.

℞. Succu apii, endivæ, menthæ, absinthii, petroselinii vulgaris, valerian. an. ℥ss. olei absinthii, menthæ an. lbss. Cera citrina quantum satis sit misce & ad ignem fiat unguentum s. a. Viscerum obstruccionem liberat, eoque crebro in jecorariis utimur, additur quandoque pulveris calina Aromatici, spicæ nardæ, ling. ℥j. & olei cappari liquidum sunt qui hoc modo etiam parantur: ℞. Succu ebulli ℥viij. Succu Apii, Petroselinii ling. ℥iij. succu Ablynthii & Iridis ling. ℥v. ol. cornuæ lbss. ol. lilalb. ℥x. Ol. ablynth. & chamomelini ling. ℥vj. axung. anatis, & gallinæ ling. ℥ij. Teruantur omnia in ul. an. consumptionem succorum. Postea colentur & cum cera alba & paxillo aceti paratur unguentum. Hæc locsi de unguento suo aperitivo, quæ h. c. interere libuit, tum (expertus loquor) propter medicamentum præstantiam, tum etiam quod optimus ille vir & de re medica tam bene meritus, olim mihi cognitus fuerit. Ego ceram non addo, ut facilius altiusque ad subjectas partes penetrare possit. Lien, si propter vehementiam atque diuturnitatem morbi labefactum, & obstruatum fuerit, hypochondrium sinistrum inungendum est sequentibus.

℞. Ol. de cappariis & rutaceis an. ℥vj. ol. amygd. dulcium ℥i. misceantur. Aut.

℞. Succu cochleariæ & nasturtii aquatici an. ℥ij. ol. lilior. amygd. amarar. an. ℥ij. pinguedinis caponis & urii an. ℥j. Coquantur lentissimo igne ad consumptionem fere succi, in colatura dissolve Ammoniac. purissimi, & aceto scillino dissoluti ℥vj. ol. nucis moschate ℥ss. misce; si intemperies calida reum adfuerit, inungantur lumbi, os sacrum, & regio reum, linimento, antea capite de ardore urii descripto. Hæc de cacochymia, de qua non nihil prolixè agere nolui. Est enim veluti scaturigo, ex qua lenteria, febres erraticæ, quartanæ, & quamplurima alia symptomata profluunt, de quibus omnibus si sigillatim agere vellem, opus excreceret, & multa jam antea dicta, repetenda essent, quod lectori ingratum foret. Itaque ubi diligenter quis curaverit cacochymiam, reliqua symptomata facile evitabit. Quod si tamen adveuerint, Medicus consulendus est. *Guil. Fabric. Hylsan. lib. de Ichore & Melicria.*

Cachexia quælibet à quibusdam nempe causis procreata requirit resolutia & corroborantia. Resolventia sunt omnia aperientia internorum viscerum. Sic nimirum omnis Oeconomia totius corporis depravata corrigitur.



rigitur. Aperientia sunt tartarus vitriolatus, cremor tartari, Vinum Martis. Acidula tum naturales tum artificiales: quæ tamen omnia administranda sunt post præmissos vomitus, si illi commode fieri, & patientes ferre possunt. Purgantia post illa universalia habent locum quælibet, modo observentur observanda. Panchymagogon Crollii. It. speciac. purgans paracelli & Mercurius dulcis hic præcipue laudantur, Extractum Esulæ & ellebori nigri in pituitosa & Melancholia Hypochondriaca multum proflunt. Contortantia defumuntur ex communioribus quibuscumque hinc inde, præstat spir. vitrioli in conservatoarium, acetosæ. Horum borraginis, buglossæ, violarum sumptus, Magisterium Corallorum, item & perlarum, cæteræque aquæ Analepticae utilitæ. Omnis porro Cachexia felicissimum auxilium est pulvis Cachecticus supra descriptus. Itaque is solus præmissis saltem vel vomitoriis, præcedente cura aliquando purgantibus sufficit: quantumvis nimirum pulveris cachectici usus alvum moveat sæpius, nihilominus convenientibus purgantibus interdum res expedienda ut scilicet in corpore collectæ feces, & ab usu pulveris cachectici quadantenus separatae penitus excernantur. In virginibus plerumque defectus mensium ad Cachexia causas accedit, unde ut illa deterior. Solet quidem in vetulis pulvis Cachecticus etiam venulas uterine aperire, sed obstructio interdum tam pertinax, ut a solo illo aperiri nequeat. Dextre itaque observato tempore ulitato fluxus mensium, quod est juxta illum vulgatum vericulum:

*Luna vetus vetulas, juvenes nova luna repurgat.*

Præsertim ubi in cursu adhibita curæ dolores circa lumbos & uterum animadversum fuerint. Ut igitur felicius procedatur, menses moventia si non danda sunt, quibus infra de suppressione mensium. Talia sunt aqua allii destillata & oleum Sabinæ. It. aqua asari, raphani, artemisiae rubrae.

N. B. si ad pulverem Cachecticum addideris æqualem quantitatem chalybis præparati scoriis aserum juniorum, & dederis priori quantitate, præsertim circa instans mensium tempus, & pallori Virginum & obstructioni mensium melius medeberis. Pertinacissimas obstructions mensium aperit lixivium scoriis seu recrementis reguli Antimonii ebulliendo tantum cum aqua communi præparatum, & super ferrum vel silices candentes fufum, ut vapor per sellam perforatam ad naturalia contingat. Mercurialis in aqua cocta & pudendis applicata menses ciet. (Ex his scoriis paratur oleum tartari Antimoniatum, si nempe in cella aëre frigido & humido exposita in deliquium abeant, profluit inde oleum Tartari copioso Antimonii sulphure imprægnatum, ingrati quidem saporis sed majoris efficaciz, non solum in mensibus retentis, verum etiam in tarda alui defectione pertinacissimas quoque aliorum viscerum obstructions referat. In retentione menstruum taliciter sæpius usus sui, magisterium martis aperitivo, ex limatura Martis cum succo acetosellæ & pulpa tamarindorum facta, vide *Mysicæ armamentarium chymicum*. His omnibus postea dextre subjici potest vel addi sectio saphæne definito tempore Quentium mensium instituta. Antimon. diapho-

ret. fixum ad expellendos menses etiam efficax est, si ejus dosis ulitata quotidie cum guttis aliquot essentia myrrhae in aqua artemisia rubra exhibeatur. Hæc autem omnia moderanda sunt ad præscriptum ipsius naturæ & canones artis. *Jean. Harmann. in Pract. chymiatric.*

Præstant hic crocus Martis aperit. cum salibus præparatus. Item omnia medicamenta ex tartaro, crocus martis saccharinus, tinctura martis Zvv. essent. & extract. martis mynichi, tinctura martis tartarificata, tinctura martis antimoniatæ. Diaphoretica inter excellit bezoard. minerale & martiale. Conveniunt etiam in hac exiccantia, ut essent. liquorum. Acidula artificiales principatum tenent in tollenda cachexia; naturalibus etiam acidulis melioris & facilioris operationis causa potest misceri vitriol. martis. It. Clysis, si misceatur cum aquis appropriatis. Non debet statim fieri purgatio, sed digestiva præmitti debent. Vel si purgandum, misceantur aperientia.

℥. Croc. martis aperit. cum salibus 3j. S. Digestivus pulvis. D. in triplo.

℥. Pulv. cach. Quercet ʒij. croc. martis saccharini gr. viij. M. S. Digestivus pulvis. D. in quadruplo.

℥. Tartar. chalyb. 3ß. sæcul. aron. gr. vj. S. ut ante.

℥. Essent. aperit. Essent. martis liquid. an. ʒij. S. Digestiva Essentia Dosis gutt. 20. vel 30. singulis diebus mane & vespere sumend.

℥. Tinctur. Martis Zvv. ʒij. S. Digestiva Essentia. dosis g. xxx.

℥. Acid. artif. lib. ʒ. syr. ros. ʒij. m. Dosis 2. vel 3. cochlear.

℥. Spir. aperit. Penoti ʒij. Dosis g. 30.

℥. Herbar. eupator. agrimon. scolopendr. cuscuth. ceterach. an. p. ij. flores cichor. epat. rubr. genist. an. p. ij. rad. aperient. an ʒij. esul. præp. jalapp. an. ʒj. elleb. nigr. præp. ʒvj. agarici ʒij. santal. rubr. ʒij. cremor. tartar. ʒij. F. Nodus. Sumatur tempore matutino; sic enim præparatur materia. Si lien sit in causa, splenetica sumantur.

℥. Fol. agrimon. cichor. Com. absinth. flor. cent. min. an. m. j, flor. bellid. cichor. genist. epatic. rubra an p. ij. rad. graminis, filicis an. ʒß. helleb. nigr. præp. jalapp. an. ʒj. zedoiræ, galang. an. ʒij. spicz, Iquinanthi an. ʒj. Incis. & contus. grosso modo adspers. Essent. absinth. & tinctur. tartar. F. Noduli laxativi.

℥. Pulv. jalapp. ʒj. scammon. sulphurat. croci mart. saccharin. an gr. vij. ol. stillat. mæcis g. j. Misce pro una dosi.

℥. Pulv. cathol. Quercetan. ʒj. Extra& Martis, resin. jalapp. an gr. vj. F. Pilulæ.

℥. Essent. lign. ʒß. Dosis gutt. 60.

℥. C.C. sine igne ʒj. Bezoard. Martis gr. xv. M. F. pulvis pro una dosi. Acidula quoniam debent interdum portari, multum spirituum deperditur, ideoque artificialibus possunt corrigi, cavendum tamen ne nimium aqua infundatur. Vid. *Kyper. de acid. artif. Joann.*

*Michael in Prax. Clinic. generali.*

### Consultationes.

Illustrissima Comes temperamenti calidioris



jecoris, & totius; ætatis annorum 40. post varias animi perturbationes, mensiumque suppressionem, febricula leuta laborare cepit, malo corporis habitu, palpebrarum, faciei, & crurum intumescencia, cum foveæ impreſſio vestigio, siti, inappetentia, & vigiliis. Quorum causa de agendis nos consuluit.

Ex prædictis itaque statuantes ipsam cachexia laborare ex labefactato, & imbecilliori reddito calido innato jecoris, cum excessu caloris præter naturam, & febrilis, ob prohibitam transpirationem ab obstructionibus utriusque hypochondrii, consultum duximus, quo ab hydrope imminente præſervetur, expurgare primas vias, attenuare, incidere, & detergere humores peccantes, cum pituitosos, tum melancholicos, & biliosos, in corpore redundantes, ac deinde ipsos educere, jecur refrigerare, obstructions referare, & serositatem ex toto corpore sensibilibiter, & insensibilibiter evacuare, calidumque innatum jecoris roborare, revocato mensium cursu, quantum in nobis erit; quod tamen perarduum opus nobis visum est. Quas intentiones implere conati sumus, præſidiis Chyrurgicis, Pharmaceuticis, & Dieteticis.

Quoad Chirurgiam, non abs re primò censuimus parùm sanguinis educere, cum ob febrem, tum ob mensium suppressionem, & quidem istius ratione ex saphena. Verùm intumescens cruribus, & pedibus, mensibusque jam annum deficientibus, in muliere cachectica, & quadragenaria, consultius duximus ipsum mittere ex venis fedalibus, quo fieret derivatio ad partes proximas.

In Pharmaceuticis, præcipuè medicamentum ex el. lenitivo, & speciebus hieræ pictæ Gal. cum ʒij. mann. elect. Preparandis humoribus in ventriculo, syr. sine diluto fuerunt præscripti, ex syr. acet. simp. mell. ros. simpl. & syr. de corticibus citri. Repetito deinde leniente proposito, in usu fuerunt syr. magis aperientes ex syr. capill. ven. de quinque radicibus, & byzantino cum aceto, cum decocto agrimoniz, ceterach, capill. ven. betonic. sem. citri, & matricariz, alvo interim clysteribus sollicitata.

A quibus cum jam febris negotium non faceretur, erat enim valde remissa, exhibuimus aquam Tettutianam, cum mell. ros. solutivo, biduum; ac deinde aquam B. Virginis potui, cum syr. capill. ven. in primò cyatho, ad lib. 6. 7. 8. 9, cujus beneficio sedata est sitis, & fames inducta juxta Hipp. effatum 4. in 6. Epidem. quod Aqua sit vorax; id est homines reddat voraces, & famelicos; quod non solum accidit ex potu frigida corrugantis os ventriculi, sed etiam ab eadem acida & parùm salsa, qualis est B. Virginis quia deterget. Verùm quia difficulter permeabat ac propterea suspicionem injiceret majoris serositatum proveniunt in venoso genere, ideo ipsius potui supersedentes, exhibuimus succum cichorii optimè depuratum in jure columbæ, in quo macerata fuerat coma absinthii, cum unc. sem. succ. agrim. perstititque in usu ipsius plures dies, præmissis bolo ex trochiscis cypheos, alvus interim laxata pilul. mastichinis, additis granis duobus elaterii; quarum usu quarta quoque die repetito, magnam aquæ vim deieciat,

cum perfecta virium tolerantia; ut propterea mita fuerint validiora, cum vigeret ætas; quorum loco decoctum potius fuit in patria autumnino administrandum. Externis deſum̃ usumus Luti & aquis Thermalibus. illis quidem D. Petri abdomini applicatis, & immersione corporis umbilicotenus in aquis Aponitanis; quarum opere sedit crurum tumor. Atque hæc fuerunt hic administrata, cum iuculento juvamento Nobiliss. patientis, accedente recta victis ratione, immo aliorum ut in patria ad autumnale tempus, ubi cura Viro-rum præclarissimorum primæ valetudini restituta fuit. *benedict. Sylvatic. Consil. & Respons. Med. Cent. 3.*

Illustriss. & reverendiss. Præsul, annorum 56. antehac temperamenti calidi & humidum, nunc ad frigidum, & humidum vergentis, conqueritur de variis affectionibus, paucorum mensium spatio subortis tumores scil. duro scyrthoso in regione ventriculi, supra hepar, difficili respiratione in ascensu locorum acclivium tumore pedum, & crurum, totius corporis torpore ac legnitate, melancholia, ac tandem inappetentia. Quorum origo adscribitur liberaliori potuitate præterita, post vitam sedentariam, cum continua mentis agitatione, & colubitam linguinis hæmorrhoidalis evacuationem. Nec immerito. Ab his enim omnibus causis labefectatur adeo calor natus jecoris, & accumulatur cruditates, cum per suffocationem, tum per ejusdem distractionem, ut facillimo negotio mutata intemperie calida in frigidam & humidam jecoris, ac aliorum viscerum, coarctata sit copia humoris serosi, & pituitosi in toto venoso genere qui deinde sicuti tumorem produxit in partibus subcutaneis Steatomati, vel Atheromati non absimilem, circa regionem ventriculi; ita dum inbuat musculos intercostales, respirationem impedit in ascensu per loca acclivia. Confluens autem idem ad pedes, & crura, prædictas partes tumescit; qui tumor forsan adematofus diffusus per totam musculosam substantiam partes omnes torpidas reddidit, & inappetentiam inducit ad os lapsus ventriculi.

Quocirca non immerito de agendis consultum. Maximum namque impendet periculum patienti Illustrissim. ab hydrope. Quare ut a præsentibus affectibus liberetur, & ab imminentibus præſervetur, quatuor sunt agenda; expiandum est primo accurate totum corpus, digerenda postmodum sunt, & sensibilibiter evacuanda serositates, quæ a variis partibus confluxerunt; tertio corroborandum est calidum innatum jecoris, & totius venosi generis; ac tandem revocanda sunt evacuationes consuetæ. Quod fiet per evacuantia, alterantia, & symmetriam viscerum foventia.

Pro totius purgatione laudantur primò Lementia ex el. lenitivo, & speciebus hieræ simpl. mox præparantia materiam in ventriculo eaque sine diluto; syr. de corticibus citri, vel ros. simpl. oxymel simpl. & syr. de betonic. cum unc. j. emuls. sem. citri, triduum; a quibus prædictum leniens, vel ipsius loco mel. ros. solut. & manna erunt ex usu. Secunda humorum præparatio fiet syrup. de betonica, de hyssopo, de prassio, & oxymel. scyllitico, additis



additis unc. iij. jusculi carius alterati beton. borrag. origano; ac interea sanguis educatur ex venis fedalibus mediocri quantitate. Postuium vero quinque syrup. repetatur purgatio addito agarico troscenicato, & lenni, habeatque oxymel scillicum in familiari usu. His peractis, exhibeatur quæ Tertutiana ad lib. 4. singulis diebus, præmissis unciis iij. mel. ros. solut. Mox ad validiora deveniendum, quæ erunt duplicis generis, primo hydrotica naturæ horis assumenda; puta radix mechoacan, radix jalappæ, succus sambuci, summitates ebuli, manni. elect. & aliquando grana tria, vel quatuor elaterii. Diuretica denum vespertinis horis exhibenda, decoctum scil. cassapias cum radicibus fœniculi, asparagi, rusci, paratum cum columba turricola, instillatis quatuor vel quinque guttulis spiritus vitrioli, & salis. Non omittis externis serositates educendibus, atque imprimis provocato sudore in hypocausto, vel in balneo aquæ sulphureæ.

Victus sit tenuis, attenuans, & detergens; ac proinde intinctus ex petroselinio, cinnamomo, & aceto, conferet. Vomitus aliquando à cibo, cum succo raphani, & oxymel. Exerctium pedibus, si fieri poterit, sin minus, curru ex usu erit. Vigilet: abstineat tamen à negotiis, & pil. ex Joë familiares habeat, quo revocetur sanguis hæmorrhoidalis. Vino albo aromatico utatur paucæ copia, & tumori ventris adhæreat cer tum oxelæum, subactum cum succo cyclaminis, & herbæ reginæ. Atque hæc Ill. patienti ex unũ fore spero *Idem ibidem*.

Corpori quidem excalefacto quandoque dysenterici in succedere dicebat noster Livinus Senex, sed addebat, si purgatio acris, ideo & ego excalefacto corpori Adm. Rex. Patris addo, acrium humorum excretionem sequutam fuisse, bilioso nempe prægresso in venoso genere apparatu, qui facile congeri potuit, habita totius & jecoris temperamenti calidi & sicci, habitus gracilis, exercitii immoderati tempore calidiori ratione; unde Diarrhæam biliosam & acrem Dysentericam associatam suppono, quam immaturè sistere est ita periculosum atque perniciosum, quam citius sanare Dysenteriam necessarium: quæ quoniam frequenter implicant, ideo non adeo medico facilis evadit curatio, ut propterea de intemperiem calidam corrigentibus multo magis, quam de astringentibus sollicitum esse debere Medicum exclamaverit Trallianus; iis enim inopportune adhibitis, aut suppressa evacuatione multo pejora mala succedunt, aut saltem obstructionibus, viscera naturalia implentur & afficiuntur, à quibus augetur intemperies, & calor naturalis eorumdem labefactatur atque imminuitur; unde vitiantur concoctiones, & hæmorrhoidis præsertim in hepate, indeque totius corporis nutritio.

Ita in casu nostro obstructiones præsentès necessario suppono non in solo hepate, verum & in mesenterio, & lacteis; quæ non solum chylo in ventriculo non integrè elaborato, transitum ad jam dictas venas, & mesentericas, & lacteas impediunt, sicque in via remorando corrumpatur, & diarrhæa inde chylola, multis diverso tempore variegata coloribus conserve-

tur; verum etiam pars illa chyli tenuior, quæ ad hepar pervenit, non adeo rectè elaborata ab imbecillitate ejusdem in prævum sanguinem vertatur, qui ad venas distributus, utpote nutritioni magna ex parte ineptus, primo totum vitiat colore depravet, mox pars deterior ad extrema transmissa, eadem tumida reddat, sicque mali habitus, live Cachexiæ principium appareat, quæ consistere solet in universi corporis pallore, extremorum tumore, & totius macie.

Adm. Rex. Patris status negligendus non est, ne Cachexia perficiatur, quæ Hydropicorum caput ab Avic. jure merito dicebatur. Ut autem arceatur, obstructiones referare omnino necessarium puto; deinde intemperies corrigere, & partium naturalium innatum calorem fovere: ita enim expeditus reddi poterit chylus transitus ad hepar & venas, sicque supprimi diarrhæa; concoctiones præterea perfectiores reddi, & ita totum corpus probè nutriti: unde deficientibus excrementis, & extremorum intumescencia necessario cessabit.

Pro quibus explendis intentionibus, à fonte Chirurgico in præsens nulla est depromenda sanguinis missio ut quæ obstructionum proprium remedium non sit; iis tamen adaptatis, & suppressa prorsus diarrhæa, progressu forsitan, pro ea idâ intemperie jecoris remittenda, aliqua, sed parca convenire posset sanguinis educio, situm temporis labefactati nativi caloris admodum aliquod supersit indicium. Fundo ventriculi aliqua convenire posset levis illinitio, aut oleo M. D. H. aut oleo de cortic. citri aut de cinnamomo, sed legitimo. Reliqua totius abdominis regio inungi & tractari poterit oleo amygdal. in quo coma absinthii macerata fuerit.

Reliqua à fonte Pharmaceutico depromenda. Et quoniam dixi medicam intentionem esse præcipue referendis obstructionibus dirigendam, ideo statim ad rhab. usum confugiendum, quod ita poterit exhiberi, ut facilius permeet, nunulque ventrem moveat.

℞. Extract. rhab. ʒj. sal. tartar. fixi ʒ ʒ m. ref. bolus, & summo mane præbeatur, cui post horum superbibat feri capr. aut asin. destil. cyathum, tribus verò horis ab assumpto sero prandeat. Sequenti verò die bibat.

℞. Aq. stillat. de succo agrimon. ʒ iv. de succo cichorii ʒ iij. tartar. vitriol. gr. x. m. & præbeatur quatuor horis ante cibum. In horum autem alternato usu persistendum ad viginti dies saltem; ut mox rhab. infusum exhibeatur, eo fine, ut jecoris non solum cavam, verum & gibbam partem penetrare valeat, tuncque ita parabitur.

℞. Rhab. opt. maturi ʒj. spicz gr. iij. m. alligentur in panno lineo, & infund. per noctem in cyatho aquæ stillat. agrimon. & cichorii. Sequenti verò die bibat cyathum aq. stillat. agrimon. & capill. veneris, in quo dissolvantur gr. x. sal. tartar. volatilizati; in quorum alternato usu pluribus diebus erit insistendum, si videbitur opus esse Excellentissimo Medico Adstanti.

Referatis autem obstructionibus, præberi poterit succus cich. depur. & per arenam trajectus ad ʒ iij. in jure pullæ cichorio alterato, in quo dissolvi poterit sal absinthii ad ʒj. & in



hujus usu ad plures dies pergendum, dum intestinum & ventriculi aliqua ratio erit habenda; in quem finem abinthita omnia opportunissima erunt. Confectiones item, præsertim ex ol. legitimo cinnamomi; & hyemali tempore quandoque etiam magnæ Antidorus.

Quibus omnibus addenda congrua atque diligens victus ratio, mediocris quoad quantitatem, attenuans & aperiens quoad qualitatem, alimendorum facilis coctionis atque distributionis, exiguique excrementi, a Viro Excellentiss. omni diligentia præscribenda, cui reliquorum quoque omnium jam dictorum rectum & opportunum usum renutto. *Raym. Joan. Fortis Cent. & Resp. Medic. T. 2. Cent. 3.*

Matrona Illustrissima & Excellentissima quadragesimum annum agens, ex Patre podagrico nata, temperamenti a primo ortu totius, & jecoris calidi & sicci, capitis verò calidi & humidi, podagricis doloribus multis abhinc annis obnoxia, vitam sedentariam ducens, cum valde fecunda fuisset, pluries concepit, & feliciter peperit, at in postremis partibus adeo copiosum lochiorum, indeque probi sanguinis profluvium fuit subsequutum, ut exanguis Lipothymia frequentibus prehenderetur cum evidenti discrimine vitæ. Reassumptis autem parumper viribus, iterum atque iterum nova parturiendi occasione, in eandem largam sanguinis effluxionem incidit, & interim Menses decolores inde, nec statim temporibus apparuerunt, quo eodem modo perleverant, & ipsa quoque in toto decolor reddita, de ventriculo affecto conqueri cepit, & de redundante in eodem humiditate & anxietate à cibo præsertim, sequentis aliquando, licet cum difficultate, vomitibus ejusdem materiæ aquosæ & pituitosæ, ut plurimum insipidæ, nonnunquam etiam acidæ, accedentibus in toto abdomine rugitibus, hypochondriorum tensione, non tantum in epigastrica, verum & hypogastrica regione, Menstrua inordinata & variegato colore apparere cœperunt, Mulierque Excellentissima mœsta fieri, cum cordis oppressione, capitis obtenebratione, gravedine, & nonnunquam sensu punctionis & lincinationis, dum calidas atque fuliginosas evaporationes ab hypochondriis ascendentes, caputque ferientes percipit; à quibus omnibus se levati affemat, dum serositatis aqueæ copiam per urinam deponit, quod tamen non adeo frequenter accidit. Interim etiam ad ambitum corporis portio serositatis ejusdem defertur, pruritus excitantis; & pariter cum levamine aliquo ex scalpitu. Gaudet ambiente calido & calidiorum accessu: extrinsecus enim corpus frigidum habere sibi videtur, accedente quandoque etiam rigore, vel saltem horripilationibus citra febrem. Crura jam intumescere cœperunt, & dum Autumnus præterito medicamentis adversus hujusmodi affectus pugnabatur, extemporanea principum omnium actionum abolitione cum motibus convulsivis correpta fuit, quod genus symptomatis quater aut quinquies octo mensium spatio repetivit. Modo hoc mense Maio à Podagra non omnino immunis, cum tumore in cruribus foveam conservantibus, totiusque corporis pallore & macie, nec sine

metu recurrentis epilepsiz, de agendis consultit.

Quamvis Matrona Excellentissima à primis annis biliosis febribus, moxque pultulis in facie circa os obnoxia fuerit, calor exuberantis indicio, mirandum tamen non est, si in præsens frigiditatis signa supervenerint; liquidem ex immodicis sanguinis ex utero pronuviis iterum atque iterum repetitis, naturalem calorem labefactari, quinimo & diminui necesse fuit, unde & Aristoteles dicebat: quod si multum sanguinis deficit, si nimium, omnino interit vita. Ita & sacræ paginæ animam in sanguine reponunt, dum pro anima calorem nativum sumpserunt, & sumebat Hippoc. ipse. Summa vero cum ratione idem dicebat quod si *Menstrua plura fiant, accidunt morbi*, quos enumerat deinde Gal. asserens, sequi vitium totius colorem, inappetentiam, læm concoctionem, pedum tumores œdematosos, virium languores; & peculiariter magis ad hominem protulit in Aphorismis, inquit, quod ex profluvio sanguinis calor nativus adeo debilitatur, ut cibi neque bene concoqui, neque in sanguinem transmutari, multoque minus distribui possint, quod confirmavit experientia in Excellentissima Matrona, in qua debilitato calore nativo totius corporis, & potissimum ventriculi atque jecoris, cruditates in illo, indeque obstructions subortæ sunt, unde hypochondriacæ affectiones, serositates in isto, & imperfectus sanguis, unde vitiatur totius nutritiones; ad quæ omnia non parum conspiciavit vita sedentaria, spontanea potius quam coacta. Nec horum desunt manifesta signa; cruditates enim frequenter percipit Excellentissima Matrona in ventriculo insipidas, etiam quandoque acidas, rugitus præterea in hypochondriis, & murmura, quinimo & fluctuationes, aqueæ serositatis quandoque per urinam copiosas excretiones, & ejusdem ad ambitum corporis transmissiones, pruritus & rigores, sive horripilationes, citra febrem nonnunquam cum sudore excitantes; quæ tamen non à sola positiva frigiditate congelante, verum & à jecoris calore temperamenti, & adsciticio colliquante fieri credo, qui calor juvenibus semper major evadit, & ideo Gal. dicebat *Pueros esse ætate florentibus calidiores; ætate verò florentes esse pueri calidiores simpliciter*. primo loco de nativo calore, secundo de calore temperamenti loquutus; quos calores distinguere quoque voluit Hippocr. ipse; quinimo nativum calorem à calore adsciticio temperamenti sæpe magnopere lædi nos docuit, dicens, quod *Anima nostra produciitur usque ad mortem, si autem igne excanduerit, simul cum morbo anima quoque depascitur*. Ideo in casu nostro oblivisci non debemus temperamenti naturalis Excellentissimæ Matronæ, sed vigere credendum, labefactato licet calore nativo; & ideo ab illo non solum hypochondriacum & statuosum affectum exiccatis cruditatibus primo in ventriculo genitis, moxque in lacteis & mesentericis venis stabulantibus, necnon cum sanguine ad Uterum transmissis, & obstructions facientibus ortum habuisse, sed & ab exulto quodammodo sanguine, in vasis illis stagnante, melancholicam quoque affe-



tionem fuisse superadditam; quibus praesentibus, exteriora frigent, iis quoque, quibus neque seronitates aquae ad ambitum corporis transmittuntur, neque tumores oedematosi in cruribus excitantur. Verum quod magis est, in casu nostro a melancholica, & facile quoque hysterica minera Autumno proximè praeterito medicamenti occasione agitata, elevati fuliginosi & acidi, si non acres vapores, caput petentes, & ad cerebri ventriculos sese innuantes, meninges irritantes, motus convulsivos in toto excitantur, & cum animalium actionum abolitione; dum ad illam ventriculorum concussionem spiritibus animalibus & motus inordinatus additus, & transitus liber fuit impeditus, unde sequuta privatio sensus, regularis motus & omnium facultatum abolitio, quae omnia epilepticam affectionem constituerunt; ut propterea observaverit Hipp. quod melancholici facile sunt epileptici, & e contra.

Quoniam verò vitiatam esse dixi Excellentissimae Mulieris totius nutritionem, & non solum immutè, quia gracilior, quam antea, facta est, sed etiam depravate, quia decolor atque pallens reddita, cum crurum tumoribus oedematosis foveam servantibus; ideo ad Cachexiam tendere nullus est Medicorum qui non videat, sicut in cuexia sanguis optimus, color floridus, & caro mediocrius esse solet. Neque crurum intumescenz à toto venoso genere procedentes cum podagricis tumoribus à capite per spatia potissimum prodeuntibus, sunt confundendae, ut quae carnes, illi verò articulos occupent.

Status Excellentissimae Matronae est periculi plenus, cum à planta pedis usque ad verticem capitis non sit in ea sanitas; etenim motus progressivi proximam minatur impotentiam Podagra: Cachexiam & hydropem jecoris nativi caloris paupertas: affectum melancholicum hypochondriorum obstructions; indeque epileptiz perseverantiam capitis imbecillitas. Et quamvis jecur, ut minister Principi, cordi subministrare videatur, attamen ut vere Princeps, distribuendi facultatem obtinet.

Quare viscerum naturalium intemperiebus primo incumbendum esse videtur, deinde capiti; at neutrum praestari potest, nisi ablatis obstructionibus, totoque venoso genere repurgato, nec dictorum ullum sine praecedenti primarum viarum expiatione; ideo omnium primo ventriculus & intestina ab excrementis mundanda. Secundò mesenterii, deinde jecoris obstructions referendae. Tertio venosum genus depurandum. Quarto etiam uteri vasa pervia reddenda. Quintò capitis humida intemperies corrigenda. Sextò calor natus ventriculi, jecoris atque totius restaurandus; atque tandem viscera omnia una cum capite roboranda.

Quibus intentionibus confidenti animo satisfacere conandum remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis & Diæticis.

Et inter Chirurgica consideratur sanguinis missio, quæ tunc solum locum haberet, quando Cachexia ab aliqua consueta sanguinis evacuatione suppressa ortum duceret; in hac

verò opposito modo se habente, minime convenit. Ac quoniam totius massæ sanguineæ status est à nobis explorandus, ideo erit apertenda dexteri brachii vena media, sanguinis qualitatem observando, qui si niger & crassus exierit, ad 3 v. & non ultra permittendum ut exeat, si tenuis & pallens, statim supprimendus. Cauteria praeterquam quod odiosa forent, suspecta quoque habentur.

A Pharmacia pro primarum viarum expiatione desumenda sunt lenientia, & erunt.

℞. Pot. ex manna clarif. 3 vj. aq. cinnamom. 3 ss. m. pro potu. Preparans autem ut hujusmodi.

℞. Julap. acet. 3 ij. aq. flor. citri 3 ij. aq. cinnam. 3 ss. poll. cremor. tartar. 3 ij. m. pro syr. & sic pro aliis vi quos subsequatur idem Leniens ex pot. ex manna clarif. 3 vj. aq. cinnamom. flor. citri an. 3 ss. m. f. potio. Inde secunda sequatur humorum praeparatio, & primarum obstructionum reseratio, parando Julapium, aut macerando in aceto & aq. agrim. radices feniculi, petroselini, apii, graminis, sive asparagorum, & facta forti expressione, colaturae addatur sacchari albi q. s. ut fiat Julap. longum, ad 3 ij. quotidie septem diebus exhibendum, cui superbibat jus pulli junioris tenue, alteratum cichorio, borag. eadiv. soncho, melissa, agrimonia. Septem verò transactis diebus paretur eadem potio clarif. addendo infusioni consuetæ agar. trochisc. 3 ij. rhabarb. opt. turbith. an. 3 j. & aq. cinam. 3 ss. f. potio. His peractis, ut viscera, simulque massa sanguinea purificetur, ad usum syr. Ferneliani, qui syrupus cachecticus ab eodem nuncupatur, erit deveniendum; praebetur autem decem aut duodecim diebus, tertio aut quarto quoque die ad 3 ij. additis totidem uncis vini albi maturi, neque dulcis, neque austeri, tribus aut quatuor horis ante cibum. Diebus vero intermedus exhibetur cyathus aq. stillat. de succo agrim. in qua dissolvantur tartar. vitriol. gr. xii. necnon salis artemis. & sabin. an. gr. v. quibus addi quoque possunt grana salis viperini. Et si fortasse à jam dictis assumptis calor molestus percipiatur, diu diu agrimon. praescriptæ æquali portio misceatur aq. de succo cichor. sicque alternatim syrup. noster Fernelianus & aq. agrimon. sumatur usque ad xxiv. diem. Quo tempore decoctum sudorificum convenientissimum erit, nisi ab æstivo calore prohibeatur; hoc enim poterit humiditates excrementitias, in carne & interstitiis existentes absorbere, humidam capitis intemperiem corrigere, & visceribus naturalibus robur addere; ita autem parari poterit.

℞. Visc. querc. veri 3 j. salis, medullæ guajaci, Chinæ, rad. peron. an. 3 ss. aq. stillat. cichor. beton. peron. an. 1 lbj. m. f. infusio per hor. xxiv. deinde bull. ad consumpt. dimidii, & colat. servetur pro duabus vicibus, cui praemittantur pulv. viper. gr. xv. & transacta hora ingrediatur hypocaustum, ita ut caput cum toto corpore sudet. Alligetur autem in petia seorsim guajacum, & facta colatura, abjiciatur, ut aqua secunda suavior evadat, cui in fine ebullitionis addi poterunt frustula cinam. & citri rec. ut aqua vulgò Cedrata evadat. In hypocausto non sudet ultra horæ 4.



midium, perseveret autem triginta diebus & decimo quoque die potionem assumat ex manna clarificata; nec victus sit adeo tenuis, verum tertio quoque die, aut pullus junior, aut palumba turticola assa concedatur. imò & quandoque prisa hordeacea. Vinum quoque aliquando, sed raro, album, aqua secunda dilutum, concedi poterit.

Verum si ferreat nimis anni tempus, ita ut hypocausti ingressus periculosus videatur, pareretur saltem ejus vice jus palumbæ turticolæ, aut gallinæ, China, ligno ros. mar. lentisco & Chio, & radice pœoniæ alteratum, cui pramitti poterit pulvis viper. ad gr. xx. ut qui extenuantis sit facultatis, citra insignem calorem ad cutem properans. Observanda tamen n. turæ propensio, quæ si ad urinam inclinare perseveret, ut antehac; ad ambitum corporis non est divertenda, sed quo vergit, co ducere oportet, viperino pulveri terebinthum substituendo quotidie ante præscriptum jus. Sudor autem cum primo decocto in aliud tempus opportunum magis erit differendum.

Interim ventriculi, jecoris & capitis ratio corroborans erit habenda; quare in usum ducat æstivo tempore salem absynthii; proderit enim & ventriculo, & jecori, sicut ejusdem succus condensatus, vel conserva. Temporibus verò frigidioribus, theriacæ usus utilissimus erit. Pro capite verò sub ingressum lecti proderit Conserva è floribus betonic. ros. mar. laviz. Nec à proprietate juvantia adversus epilepticos insultus sunt negligenda; in quem finem præsto sint conservæ è floribus lilior. convallium, pœon. rutæ capr. quibus misceatur pulvis ungulæ alcis, salis crani humani, superbibendo haustum aq. pœon. rutæ caprariz, tot. citri, cord. Saxoniz.

Articulis quoque tum affectis, tum non affectis aliqua sunt administranda medica auxilia; & primò affecti & tumefacti manu illiniantur, & perfricentur tali linimento.

℞. Adipis anseris ʒij. adipis felis ʒj. ol. nucis mosch. expr. ʒij. salis alb. ʒss. m. ref. omnia ad ignem pro quotidiana inunctione. Non affecti verò roborari solent oleo antiquo salito; quod quoniam grave olet, ideo substituatur pro Matrônæ Excellentissima spiritus salis ʒj. quintæ essentiz ros. mar. ʒj. quintæ essentiz rosar. ʒss. m. & vola manus guttulis aliquot inuncta fricentur articuli.

Hiscæ omnibus congruæ erit addenda victus ratio, non quidem tenuis, sed nonnihil extenuans; circa quam observacione dignum erit, quod Matrôna Excellentiorum violento, aut celeri motu sese moventium aspectum evitare debet, sicut odores, & bonos, & malos, motus quoque concitatos totius corporis, sive in Navicula, sive in Rheda; pedibus autem domi, quo magis fieri poterit, corpus exerceat; à proprietate nocentibus abstineat, ut à vaporosis omnibus, tum calidis, tum frigidis, à carne hædina, quales perdicibus, coturnicibus, ab anguilla, leguminibus, & reliquis, à Doctissimo & prudentissimo Medico adstanti considerandis, cui cætera omnia jam proposita, alteranda, mutanda & ad rectum usum revocanda libenter committo. *Idem ibidem.*

Non hoc mihi sumo, V. C. ut de nobiliss. Matrônæ morbo ejusque causis judicate me rectius posse putem, quam tu ipse, qui hactenus curationi interfuisti. Quoniam vero hoc a me requiris in literis tuis, morem tibi gerere volui. Succumbit nobiliss. Matrôna Cachexiæ hydropicæ, ni fallor, ad Anasarcam proxime vergenti non sine levi scorbuto sublatentis, qui corpora nostra sub omnium malorum larva clanculum aggredi solet, suspicione. Quamnam fuerint à parentibus derivata generationis primordia, me quidem latet. Nec quicquam n. hi constat de victus norma & vitæ genere, quo ab ineunte ætate usa est, quæ si minus profuerit, pro foeminarum more, luxui ut plurimum indulgentium, huic multorum capitum hydræ generandæ potuit esse satis. His accedit imprægnatio, cujus tempore plurima ex suppressis mensibus & diutæ erroribus in corpore accumulatur excrementa. Video tamen naturam, industriam alioquin humani corporis opificem, effinxisse huic generosæ Matrônæ infirmam corporis constitutionem ab ipso ortu, nec dum vel peritissimorum Medicorum opera & sedulitate ad meliorem statum reduci, sed & graviditatis tempore in pejus lapsam. Familiaris est affectus hic utero gerentibus, maxime vero iis, quæ ante ingravidationem in eum viscerum vitio ruere proclives fuere, præcipue si fortis alimentum non satis attraxerit. Cujus exemplum proponit venerandus noster è Coe Senex in *Harpalida* sorore, cui quatuor vel quinque mensium spatium uterum gestanti pedum tumores exorti sunt oedematosi; oculi in orbem intumescabant totumque corpus velut pituita alba suffusum in tumorem elevabatur, accessit tussis sicca & orthopnæa, interdum quoque spiritus suffocatio, adeo quidem ut perpetuò in lecto erecto corpore sedere neque decumbere ullo modo posset, sed si qua sonni capiendi urgeret necessitas, eum desidendo capere cogebatur. Dic sodes, an non generosa nostra hujus foeminae ipsissima est imago? Certe non est ovum ovo similis. Laborat illa magna viscerum nutritioni dedicatarum, hepatis maxime, dyscrasia & imbecillitate, tum natura sua tum & victus erroribus acquisita & aucta, quorum merito sanguis generatur pituitosus crudus & serosus, qui in corporis partes evehitur, illicque concretescens vitiatam substantiam pro utili apponit & assimilari nequit. Hinc corporis moles intumescens præter naturam augetur, corpusque non ut antea promptum & alacre, sed grave & iners; non robur viribusque pollens, sed effœtum, dissolutum ac quasi enervatum; non firmum & compactum, sed molle & laxum, non vivido colore florescens, sed subalbido & pallido squalidum apparet, sanguine phlegmatico & seroso cutis substantiæ imbibito nec ritè digesto, plurimis quoque excrementis in ipsis carnosiss. partibus luxuriantibus. Pedes tumorædematosus infestat, qualis ex abundantia sanguinis pituitosi oriri solet. Sed & pectoris angustia plurimum urget, non quod pectus aut pulmo, quæ tua est opinio, particulari hydropæ afficiatur, sed ob Diaphragmatis compressionem, necnon pituitam viscidam in bronchiis pulmonum collectam.

Non



Non iniicias iverim humores serofos, circa hepar in venoso genere collectos per uenam arteriosam in pulmones effundi, unde respirationis necessitas augetur compressis pulmonum bronchiis, quod malum insuper a vaporibus ab utero in partes spirituales in puerperio elatis non parum ingravescit. Ex his de aliis symptomatibus, si quæ restant, facile est iudicium. Et hæc sufficiat quoad affectus idæm proposuisse, qui generosam Dominam in tantum dileximen & vitæ periculum præcipitavit, cui debellando ne *Hercules* quidem succederet. Hactenus sapienter & magno iudicio hostem hunc infensissimum oppugnavit & juxta abs Te desumptas indicationes remedia à Te assignata non improbo. Miror saltem omnes evacuationes hæcenus omittas fuisse. Si meo consilio locus, purgarem ægram pulvere Mechoacanæ cum correctivis, quem tuto exhibere poteris etiam utero habenti. Hæc radix, ut notti, vim habet mirificam hepar aperiendi & roborandi atque ab hydropse præservandi, colorem etiam lividum faciei, ab intemperie & obstructione hepatis oriundo, emendandi. Poteris pulverem ejus adjecto sacchari tantulo ex aqua Absinthii, vino albo diluta propinare. Vidit matronam aliam hac radice in simili casu curatam. Hinc adjuuge decoctum Palmæ sanctæ, adjecta lignisassafras portione, quod in corroborando stomacho, aperiendo hepate & præservatione ab Hydrope maximè est efficacis. Quod si brodio potius delectetur, laudariim jusculum gallinæ China, santalis, ligno assafras, Mentha, Buglossa, Scolopendria, Nuce moschata, & similibus medicamentum. A pastu verò utatur pulvere sequenti.

℞. Semin. Anisi ʒij. sem. coriandr. Fœnicul. dulc. an. ʒj. Corall. rubr. præp. Cinnamom. ʒj. Cinerum pellicul. ventriculi Gallinæ lotor. in aq. Rosar. ʒj. sacchar. rosat. Tabul. ʒiij. Misc. f. Pulvis, cujus dosis Cochlearii. Hora somni devoret quantitatem juglandii Electuarii quod.

℞. Conserv. Rosar. rubr. Vitriolat. & flor. Cichor. an. ʒj. spec. Aromat. Ros. & Diarrhod. Abbat. an. ʒʒ. syr. de Mentha & Corallor. an. q. s. Misc. fiat Electuarium. Tandem observet bonam victus legem, utatur cibis boni succi, facili concocione, abstinendo à frigidis, crassis & lenis atque aquosis, quorum minutias Tu qui præsens, facile præscripseris. A partu de aliis erit cogitandum. Deus opt. max. hæc paucula ad nobilissimæ Matronæ recuperationem efficacis velite esse. Tu me ut facis am., Vale. *Frideric. Loff. Consil. 49.*

Vir quadragesima annorum, febris erraticâ diu fatigatus, & tandem ab ea liberatus, incidit in pectus & tibiæ inflationem; quæ deinde, per femora & testes paulatim ascendens, totum corpus, faciem ipsam, palpebras, labia, ac gingivas occupavit. Color corporis ad sædam albedinem declinat. Digni partibus externis impressi aliquandiu profunda in istelinguant vestigia. Urina est pauca & cruda. Pulsus debiliior. Coctio ventriculi tarda. Corporis motus lentus & languidus.

Afficitur in hoc ægro totius corporis habitus, ut ad oculum patet. Item hepar, ventriculus, lien, & aliæ partes, chylosi & chylosi ac etiam sanguificationi inservientes;

quod totius corporis inflatio & tumor indicant.

Causa prima sive procacitica hujus morbi est febris erratica, quæ diu ægrum nostrum fatigavit. Hinc calor natus, primo quidem nimis fuit intensus; sed postea, ex dissipatione spirituum & oleaginosarum partium, imminutus: unde humores serosi & pituitosi, item vapores crudi & crassi copiose fuerunt in visceribus generati: qui, in vasis cum sanguine contenti antecedentem huic morbo præbuerunt causam. Ji vero, propter debilem viscerum calorem cum reliquis sanguinis partibus non satis bene mixti atque ideo extra vasa in habitum corporis, cujus minor quam viscerum est calor, sese effundentes & illi qualicunque modo se agglutinentes continentem hujus morbi & symptomatum constituunt causam.

Nam serosa & pituitosa illa materia, circa viscera chylosos & chymosos ac sanguificationis existens, producit ibi intemperiem commemoratam. Extra vasa verò in pedes, propter longiorem à corde & reliquis visceribus distantiam, & seri gravitatem, effusa, facit ibi tumorem edematofum, digitorum impressorum vestigia, ob partium molliem, aliquandiu retinentem. Hic, malo ingravescente, primum tibiae & femora, deinde totum ambitum corporis, item brachia & caput, in eoque faciem, labia & gingivas tandem occupavit.

Et quoniam serosa hæc materia, ob dictas causas, in habitu corporis hæret; idcirco pauca ejus quantitas ad renes deferretur; quæque eo deportatur est crassa & cruda, ac obstructos etiam ibi invenit poros; hinc urina etiam est pauca & cruda. Quia verò ab hoc sero & sanguine crudo ac frigidior calor ventriculi & cordis, jam antea à febre præcedente debilis magis magisque debilitatur: hinc pulsus est justo debiliior, ac concocione ventriculi, ut & aliarum partium, tarda. Et denique quia moles corporis ab hoc tumore est gravis, & spiritus animales, ob serosam hunc caco-chymiam, pauci, hinc motus corporis est languidus & tardus.

Ne itaque in lethalem leucophlegmatiam vel ascitem abeat. Curatio quamprimum erit inchoanda: quæ consistet in causæ antecedentis & continentis ablatione, & intemperiei viscerum & habitus corporis, per contraria, correctione. Primò itaque purgetur calihaustru.

℞. Diaphanæ. ʒʒ. Tartar. vitriolati ʒj. dissolve in aq. card. benedict. ʒiij. adde aq. cinnam. ʒʒ. scammon. gr. viij. Misc. f. Potio, manè jejuno ventriculo exhibenda. Postea utatur hoc apozemate aperiendi alterante, & purgante.

℞. Cort. rad. apii, icos recent cort. ebuli an. ʒj. cort. bryon. ʒʒ. cort. enul. campan. ʒiij. Herbo cuscute, agrimoniz, ceterach, cardui bened. fum. r. an. j. absinth. vulgaris & Romani an. m. ʒ Flor. genist. sambuci cent. ur. min. an. p. j. Sem. anisi, fœnicul. carui, dauci an. ʒj. sol. senæ ʒʒ. agarici, rad. esulæ an. ʒʒ. rhab. ʒj. Zinziber. cinnamomi, schenanthi an. ʒj. uvarum pass. ʒj. prunor. acidor. paria viij. liquiritiæ rasæ ʒj. decoq. ex aq. comm. & vin. alb. part. æqual. ad lib. iʒ. & colesatur pro Apozemate, de quo bibat æger uncias quatuor;



manè jejunus. Ubi aliquoties purgatus fuerit, utatur his tabellis corroborantibus & intemperiem viscerum corrigentibus.

℞. Spec. elect. aromatici rosati, diarrhod. Abbatis, diamargar. frig. an. ʒiʒ. rasura ebarris, cornu cervi, an. ʒj. Ol. cinnamomi, caryophyll. an. ʒʒ. sacchar. albi dissoluti in aq. rosar. ʒiij. F. Tabellæ ʒiij. pondere; capiat unam hora ante prandium & cenam. Ventriculus & prae cordia hoc foveantur linimento.

℞. Ol. nucis moschatae, absinthii, amygdal. amar. an. ʒʒ. ol. caryophyll. ʒj. cera parum. F. Linimentum quo regio ventriculi mane & vespere illinatur, & superponatur scutum ex bombace. Alvus si postea substituerit, moveatur subinde his pilulis.

℞. Aleos rosatae, spec. hier. simpl. rhab. agaric. trochil. an. ʒj. Cum syr. de absinthio q. s. F. massa, de qua capiat ʒj. hora una ante cenam.

Cibus sit euchymus, ex pane triticeo, bene fermentato, carnibus gallinaceis, veruecinis, perdicibus, ovis sorbilibus; aromatibus moderate conditus. Abstineat à multis jurulentis & sorbitionibus, multo potu; qui sit cerevisia & vinum album, mediocrium virium. Bis terve in die alatur quantitate cibi, quam facile conficere potest. Versetur in aere mediocriter calido. Moderate ambulando se exerceat. Bene dormiat; & tristitiam fugiat. *Henric. Regim apud Theod. Craanen.*

### Observationes.

Colore ex luteo fusco deformata erat mulier quadam, cum compressionis circa praecordia (ut cachectici solent) dolore. Imprimis vero de summa imbecillitate membrorum conquerebatur, urinae crudae & albae erant cum me consuleret, obstructions in venis meseraicis adesse judicavi, vinum hoc illi 9. Maii praescripsi.

℞. Rad. aperit. an. ʒiij. rad. rhapont. ʒʒ. cort. rad. sambuc. ʒj. absynth. ʒʒ. Chamap. ʒij. summit. centaur. min. sem. fenicul. an. ʒj. sem. petrosel. ʒij. fol. sen. ʒiʒ. agar. ʒʒ. Zinzib. ʒj. limatur. chalyb. præp. instar castaneæ. Imund. in vin. alb. Menl. iʒ. bibat aliquot matutinis, cum ter bibisset, & nullam operationem sentiret, jussu in postremo haustu dissolvere El. de succo ros. ʒij. diaphanic. ʒi syr. ros. solut. ʒj. bibit bonum haustum & admodum purgata fuit: revera 18. Maii ordinavi sequens.

℞. Conserv. flor. cichor. fl. bugl. capil. ven. & rad. apii an. ʒj. pulv. pellic. stomac. & intestin. gallinae, ʒi. limatur. chalyb. præp. ʒiij. cum syr. de ʒ. rad. F. Electuarium, sumat instar castaneæ mane alternis diebus superbibendo ad ʒiʒ. aq. sequentis.

℞. Aq. cent. min. ʒiij. aq. Endiviae ʒiij. misce. Hisce continuatis 1. Junii ad me veniens, urinamque salubri similem ostendens, successum medicamentorum laudabat, ut pote quæ nullam amplius in membris sentiret debilitatem, cibumque bene appeteret & concqueret; faciesque melius colorata, genaeque parum rubescentes, etsi fusco colore à natura praedita esset. *Felix Platerus, Observ. lib. 3. pag. 603.*

Præterire non possum pulverem meum cachecticum, qui ob felices successus imprudens in utinam cachexia febre lenta comitata, usualis in nostris officinis tactus est.

℞. Rad. & sem. prun. excortic. an. ʒj. ros. rubr. ʒʒ. nuc. mosch. parum tost. ʒj. baccar. lauri parum tostatum ʒʒ. spic. schizanth. Croci an. ʒj. pellicul. ventriculi & intestin. gallinae præp. ʒj. Croci martis aperitiv. ʒiʒ. cinamom. ʒj. fiat omnium pulvis tenuissimus. *Idem Pract. Tom. 3. lib. 1. cap. 2. pag. 119.*

Admodum Illustris Domina Dorothea, Dom. Augustini Bero uxor post febrem continuam in duplicem tertianam inciderat: quam nausæ, ventriculi frigida constitutio, viscerum, lienis & jecoris durities metastasarum obstructio, inappetentia, vigiliae, & similes affectus concomitabantur. Nobilis hæc Domina, ut naturæ satis delicata, & vulgatis remediis nausæabunda, ipsisque & morbi diuturnitate defatigata, vitam in non exiguo discrimine trahebat, eo magis certe quod ad hydropem jam jam incipientem inclinaret. Hujus curationis difficultas & à parte subjecti, & à morbi natura pendebat. Quocirca nobilissimæ ægræ nobilissimum hoc electuarium exhibuimus.

℞. Salis centaurei minoris ʒj. confer. rosar. & violar. an. ʒi. olei vitrioli gutt. x. Mixtis omnibus concinnabatur Electuarium, cujus ʒiij. bis in die dabantur; cujus beneficio brevi contulit *Petrus Peter. Observ. & curat. Centur. 1.*

Perillustris Dominus D. Marcus Aurelius Donatus Romanus, Bononiam venit, ut Cachexia jam pridem post diuturnas febres contracta mederetur. Ad hanc accedebat lenta febris, dolor & imbecillitas ventriculi, insignis virium prostratio, alvi stipticitas, & similia; quæ omnia, solius speciei nostri stomachici vii, intra sesquimensem sustulimus. Speciacum ejusmodi stomachicum insensibiliter suas vires exeret, aperit, dissolvit, & roborat: ter & quater in die in magnis morbis adhibetur, cum vino, conserva, aut quovis alio condito. *Idem Observ. & curat. Cent. 2.*

Incurabilem, & penitus deploratum Hydropem, Hamorrhagiam succedentem, quotidie experimur: nam in magno sanguinis effluvio, fit maxima caloris, & spirituum jactura; quemadmodum prava succorum concoctio, à qua phlegma & aqua. Sic contigit Doctiss. & optimo viro, Admodum Rev. P. Rossano, tunc collegii Bonon. P. Jesuit. Rectori, qui post longam, & continuam sanguinis fluxionem, in Leucophlegmatiam inciderat pedes, & tibias insigniter tumentes habens, cum insigni ventriculi imbecillitate; unde inappetentia, sitis, &c. Ad hamorrhagiam firmandam cor. l. Tinct. saccharo rosaceo miscebamus. Ad ventriculi, & aliarum partium naturalium robur conciliandum, specifico nostro stomachico, cum conserv. rosar. contenti fuimus, quibus gratissimis pristinam recuperavit sanitatem. Videant interim, si sciunt illi qui se jactant cononice mederi, num cura hæc tuta, vera & legitima sit. Quid si medicamenta hæc ipsis non sint nota, an propterea non sunt canonica? Ejusmodi Aristarchis consulerem potius, ut naturæ miraculis sedulo operam darent.



ducent quàm inani, & intrugifero suo cachinno. Sæpiſſime demoror, quomodo ad ſydera eorum perantiſſimus ab his, qui docti habentur, ex tollitur. Scio quantum apud mortales valeat exterior apparatus. Pauci ſunt, qui docti ſunt. Non in verborum ſtrepitu, ſed in factis, vera ſapientia reſidet. *idem Obſ. & Curat. Cent. 3.*

Sator Geiſlingenſis menſe Jun. An. 58. cum antea per tempus jam bene longum male haberet, dicto mente & domi manere coactus eſt; Urinam mihi monſtrat ſpiceam, conqueritur de extenuatione corporis, Inappetentia, ſiti, tuſſi perquam moleſta, tumore item pedum ſub velperam ædematoſo, varia ipſi medicamenta communicavi, præſertim de nodulo purgante & obſtructiones referante per quatuordecim dies bibit, unde miram humoris peccantis ſaburram excrevit, nondum tamen quicquam levaminis perſenſit, ſed potiùs rem in deterius ruere putavit, unde poſtea ſolis aperientibus tuſſique aſperitatem mitigantibus, & in primis Elix. Propri. (unde multum levaminis accepit) ſuccurrit, ut non niſi inſtante victus ratione opus habuerit; ſed ob paupertatem rem ſuam curare nequiens, & medicamenta, quibus adhuc opus habuiſſet, continuare aut non volens aut non potens, ſenſim de viâ in pejus ruere, veramque Phthiſin incurrere coepit, unde alterius Conſilio Ulmæ vivens vitam uſque in Septembr. protraxit, ubi totus conſumptus tandem in vivis eſſe deſiit. *Vim Kiedli. in Obſerv. Medic.*

Comina quædam Geiſlingenſis ſupra 15. annos 40. intempeſtively in ſu muliercularum inſtituta venæ ſectione, menſ. Februar. ſenſim vitiolo colore & habitu, quemadmodum & tumore circa regionem ventriculi & ambòs pedes, tuſſi itidem ſicca prehenditur conſiliumque meum implorat, cui vino medicato ſq. ſuccurrit.

Herb. marrub. alb. veronic. agrimon. capill. veneris, chamædr. an. m. ſ. rad. Helenu iridis n. 22. 3j. rhab. ver. ſel. 3ij. eſul. præp. 3iij. Cort. aurant. ſicc. rad. capp. r. an. 3ij. tamaric. 3ß. rol. ſen. ſ. ſ. 3vj. agaric. albiſſ. 3ij. paſſul. Corinth. 3iijß. caſt. htiul. calami. aromat. an. 3ij. tartar. albiſſ. 3i. Inc. & cont. q. o. m. ad ch. optimè evacuantem brevi & tumor dictus & vitioloſus color evanuerunt, ita ut jam Dei gratia melius habeat. *Idem ibidem.*

Matth. Chriſt. Speiſer Pharmacopeus Geiſl. peritiſſimus 40. annorum, optimæ antheæ conſtitutionis, per ſequiannum Cachexia prehendiſſetur, quom ut omnabar ex potu frigido, dum ſedulus in colligendis herbis ipſemet occuparetur, contraxerat: accedente victus ratione craſſiore. Variis dicto tempore ſymptomatibus divexabatur, nimirum valido continuoque dolore capitis, perenniſſibus deſluxionibus ad fauces, nares, & pectus, Tuſſi ſerina, hæmorrhagia vicibus interpolatis, Hæmoptyiſi, vomitu primo pituiſoſo horis matutinis poſt cibum, denique ſpafmo ſtatulento in cruribus admodum doloroſo, & quidem tempore nocturno. Sæpius admonitus à me, ne dictos aſſectus ita incrementum ſumere ſineret, ſed principiis obſtaret, medicationem namque poſtea fore difficillimam, nihilominus diſtulit & moras nexit, uſque eo, ut negotiis ampliùs

obeundis planè eſſet inidoneus, quod menſe Jul. Anno 1662. evenit: quo auxilium meum implorare coepit, ſed prohi dolor! nimis ſero; nam quamvis operam meam ultro obtulerim, natura tamen protinuſ proſtrata, medicamenta ore aſſumpta mox iterum rejecit, imo etiam ne clyſteres quidem retinebat, ut voto noſtro ſatiſfacerent: Unde ſubitanea virium collapſio, ut pedibus ampliùs inambulare non poſſet, ſenſim indies conſumeretur, & largis quæ ſuperveniant, hæmorrhagiis tandem exhaustus debitu naturæ mens. Octobri ſolveret, cujus animæ, ut benè ſit in æternum, calide apprecamur, Medicamenta quæ applicata fuerunt, maximam tamen in partem fruſtra uti dictum, ſunt ſeqq. Cum urina quæ per longum tempus ſpicea, tenuis, &c. cum multa ſpuma erat, obſtructiones viſcerum indicaret, judicavi: 1. Lenitivis primas aperiendas vias: 2. Obſtructiones referandas: 3. Meniores corporis vacuationes quantum quidem poſſibile molindas. 4. Partibus laborantibus proſpiciendum. & 5. Roborantibus atque convenienti victus ratione viribus ſuccurrendum.

℞. Rad. ſcórzonæ. polypod. qu. an. 3ij. bryon. rhabarb. an. 3ij. Herb. ſcolopendr. Civ. chamædr. Flor. acaciæ. violar. primul. ver. an. p. j. Fol. ſen. Al. 3j. ſem. Cartham. 3iij. paſſul. min. 3vi. Cort. rad. Cappar. aur. ut. ſicc. an. 3iß. Mac. Cinnam. an. 3i. Inciſ. & cont. q. o. m. ad nod. promeſ. dimid. vin. alb.

℞. Magiſt. tartar. vitriolat. 3iß. ſœcul. bryon. ſal. card. bened. ſal. abſynth. an. 3ß. Magiſt. corall. rubr. 3ii. m. & divid. in part. viij. æqu. li.

℞. Rh. b. ſel. 3i. ſol. ſenn. Al. 3iij. zinzib. 3j. Coq. in ſ. q. aq. font. col.

℞. 3iij. Mann. Calabr. 3iß. extract. Panchym. Cr. 3iß. m. ſ. Potio.

℞. Rob ſambuc. 3iij. Mithridat. 3j. ſyr. de pæon 3ii. ſpir. lil. convall. 3i. Aq. hirund. cum Caſtor. 3ii. Aq. ceras n. q. ſ. m. ſ. Potiunc. Sed ut dictum ad primum hauſtum lenixivi mox vomitus ſequutus, cum virium mira dejectiones quarum ut & ſputi ſanguinei cauſa vacuantibus minùs tutò litari poſſuit; Urgentibus ſolum pro virili ſymptomatibus obviam itum. Anorexiæ cauſa aliquoties ſumpſit Aq. acetof. Myſt. c. vin. quæ.

℞. Conſerv. roſar. rubr. 3j. aq. roſar. 3iv. ſpir. vitriol. 3ß. extract. tinctur. adde ſacchar. alb. 3ß. j. M. It. Elix. Propriet. Parac. c. conſ. roſ. rubr. Die 1. Auguſti Clyſter injectus, mox verò ſine operatione rejectus.

℞. Rad. Gramin. aſparag. petroſel an. 3j. herb. ſoldanell. Mercurial. an. 3vi. flor. ſambuc. genift. anth. an. p. ij. agaric. alb. in pet. mechocan. baccar. laur. an. 3iij. ſem. ſœnicul. carui an. 3ij. Coq. in ſ. q. aq. fontan.

Col. ℞. 3ß. j. bened. laxat. lenitiv. ſlor. an. 3j. mell. roſ. ſol. 3ß. ol. rutac. aneth. an. 3vj. tal. comm. 3j. m. l. Clyſter Alius:

℞. ſpec. dec. Carmin. 3ij. ſol. ſen. Al. 3ß. Coriand. præp. 3ij. tartar. alb. 3iij. Coq. in ſ. q. aq. font.

Col. ℞. 3x. Eleæ. Lenit. Fl. mell. roſ. ſol. na. 3iß. ol. Baccar. laur. 3j. m. Ad vomitum datus Pulv. Pumia. & corall. rubr. an. 3ß. m.

℞. 3j.



℞. Gelat. Cydon. q. s. pulv. ros. rubr. N. Mosch. mastich. an. ʒiij. C. vin. alb. & aceri an. q. s. f. Cataplasma. Ad hæmorrhagiam, qua d. 21. sept. ʒxviij. sanguinis effudit.

℞. sperniol. compos. gr. iij. dentur. C. syr. de Ros. sicc.

℞. Aq. plantag. burs. pastor. urticæ an. ʒj. acet. rosar. acet. fl. papav. errat. an. ʒß. nitr. præp. ʒß. compos. sperniol. gr. ij. m. ad frontem, nucham & Carpos. Luum com. cum acet. subact. dictis locis indentuit appos. Ad oris siccitatem fauciumque, præ qua amplius loqui non poterat.

℞. Mucilag. sem. Psyll. & malv. cum aq. malv. p. an. ʒj. syr. violar. ʒß. ʒij. m.

℞. Rosar. rubr. flor. malv. arbor. herb. salv. malv. an. m. j. rad. liquirit. ʒß. passul. min. ʒvj. Inc. coq. m. f. q. aq. font. col.

℞. lb. s. mellis ros. col. ʒj. nitr. præp. ʒj. m. pro Gargarism. Vomitionum causa parat. Cataplasma.

℞. Ferment. secal. lb. s. pulv. fol. absynth. ros. rubr. an. m. ß. mastich. bol. Armen. balust. malicor. an. ʒj. C. succ. menth. & ol. cydon. q. s. m. Cucurbitula etiam sat ampla apposita. 7. Octobr. media nocte sanguis rursus è naribus ita largiter profluxit, ut sili non posset; rediit etiam hæmophthisis quæ grumofum rejecit sanguinem, unde sibi jamjam ultimum instare diem dixit, cujus antea aliquoties memor fuerat, nimirum si hæmoptysis recidivaret, sibi moriendum esse; duravit 24. horas, cum ultima fatalis intaret, qua integris sensibus & rationis usu placide expiravit. *Idem ibidem.*

Andr. Benters Sartoris Ulm. filiolus annorum 2. achoribus antehac laborans, sed iisdem subito disparentibus, m. Octobr. 1663. pedibus valde intumescit ad abdomen usque, subsequente gravitate pectoris, & spiritus difficultate, cui seq. med. præscripti, & illis dicta symptomata, intra 14. dies, divina adjuvante gratia propulsavi.

℞. Pulv. Gialapp. gr. xv. gumm. gutt. correct. gr. v. cholog. l. gr. ij. syr. violar. & Julep. ros. an. ʒiß. m. f. Lambile ad osul.

℞. Pulv. C.C. phil. cal. ʒij. ol. carui destill. gutt. i. m. & dent. ad chart. dos. iij. quar. singulis diebus unam capiat. Iro potu bibit Dec. C.C. *Idem ibidem.*

### Anatomice Inspektiones

D. Trenti cadaver apertum fuit, qui diuturno morbo Cachectico ad hydropem vergere videbatur: de eo constituerant consilia Jo. Dom. Sala & Benediclus Silvaticus, quorum hic abscessum in Hepate, ille in Corde divinabat, quia plerumque in lentis eiusmodi morbis, ad Cachexiam vergentibus, Cordis aliquis solet esse abscessus, & pulsus in hoc erat interruptus: Cor tamen in aperto cadavere nihil noxæ contraxerat, Hepar pallidum, quasi coctum, Lien verò rubicundus sicut Hepatis instar: Pulmonum sinister inflammatus & fere putridus. Th. Bartholinus *Observ. 67. Cent. 3.*

Puellula sexennis, cum ante facie tumida, alba inflataque suspecta fuisset valetudinis, tandem decumbere verè cœpit 5. Novembr.

1626. concurrentibus siti, calore, laterisque dextri sub costis veris dolore itemque pedum intumescencia: urina turbida, cum hypostasi, excremento gallinarum simili. Die 6. Novembris, tamen tumor ventris nondum esset conspicuus, & facie tamen leucoplegmatica, pedibusque tumentibus, Hepatis labefactionem, ipsumque hydropem ante portas esse prædixi: Die 9. Novembr. urgebant inquietudo, tussis, compressio & dolor pectoris circa costas: Die 17. Novembris urina paulo rubicundior; citrina sed sabulosa, crassa; venter tumidus & valde transparens ac lucidus: Regio Lienis dolens inuncta oleo de cappar. venter vero aq. vitæ cum spir. juniperino: Die 18. Novembris inquietudo magna, ventris tumor auctus, Die 19. ex assellatione iterata detumescens est; sitis & potus cupiditas ingens, febris lenta & comes: Die 21. debilitas magna, latus sinistrum, imò manus pesque tumida: dextrum vero extenuatum: rejecit bis scretu saniem cruentam & retorridam, quæ ex pulmonibus esse videbatur: Omnibus in pectus vergentibus, circa medium noctis expiravit.

Die 18. Novembr. ad petitionem parentum, quibus Puellam hydropem obijisse persuaderi haud poterat, corpusculum apertum, prognostico a me præmisso, fidem fecit, itaque à mucronata cartilagine facta ad pubem usque, & lateraliter incisione tranversa, statim conparuit.

Hepar valde magnum, idque ex parte corruptum, maculisque infectum, e quo tanquam è fonte, promanarat Hydropisis. 2. Abdomen seatebat materia serosa multa; colore caruleo viridique infecta, quæ effundebatur cum tactore: 3. Lien integrè, præter opinionem sanus: 4. Ejusdem integritatis Renterque: 5. Intestina lucida, aquosaque humiditate repleta. Aperto Thorace, 6. Cor integrè sanum. 7. Pulmones verò intus extraque corrupti, fetidique atque purulenti, unde Tussis, Febricula, Hæcica Laterisque dolor punctorius. Siquidem ergo Pulmonibus atque Hepate lethaliter affectis causa morbi mortisque pateret, caput apertum non fuit. *Joan. Perr. Loriculus lib. 4. cap. 3. Observ. 4.*

Mercatoris filia frequenter hæmorrhagia obnoxia, ac proinde Cachexia fere consumpta in febrem biliosam continuam incidit &c. Post mortem aperitur. Abdomen ichore fetido repletum: Omentum putretactum, Lien atque Hepar scirrho laborabant, cor duplo majus, bubulum ceterens, invenuntur: Et circa valvulas dextri ventriculi Calculus ex tartaro concretus, instar minoris castaneæ compressioris &c. *Gregor. Horstius lib. 4. Observ. 48.*

Dom. de Claigni, Canonicus Parisiensis, velut Leucoplegmaticus erat, lapidosus mortuus est: An lapidosi ita fieri possunt? Ita, *Fernelius* cap. 12. lib. 6. i. athol. annotavit suppressionem & regurgitationem cujusdam materici purulentæ à renibus ad venosum genus id genus symptomatis inducere potuisse. *Ballonius Epidem. & Ephem. lib. 2. pag. 243.* Revehant venæ emulgentes sanguinem à nutritu renum, quem arteriæ important, residuum in cavam: Hinc præculdubio in renum ulceribus, si quando obstructio vtreteris capite pus colube tux, ut



per urinas evacuari nequeat, id sensim una cum sero perveniam emulgentem in cavam redundans, sanguinem totum, habitumque corporis inquinabat: *Hignorus in Anat.*

Amedeus Faber lignarius, 40. annos natus biennio variis per intervalla morbis, Dolore capitis, Ictero: viscerum obstructionibus, imo etiam Cachexia, postremum etiam dolore Ischiadico laboravit, tandemque aucta febris cum paraphrenitide extinctus est. In cadavere hæc fuere observatione digna: 1. Omentum inflatum & corruptum. 2. Intestinum Colon præter consuetudinem *artum circa lilla sinistra*: 3. Inter collum vesicæ & intestinum rectum, tuberculum scirrhosum, unde sæpe dysuria & iscuria. 4. Sub musculo psoa sinistro, cui Ren incumbit, quique in cruris anteriorem partem fertur, ingens atheroma, ultra duas libras puris crassioris continens: ibidemque tres aut quatuor lumborum vertebrae, ita carie affectæ ut earum frustula coram adstantibus extraxerim digitis & attriverim. 5. Intestina vermibus scatentia. 6. Tumor scirrhosus, suppuratus, & instar theatomatis, magnitudine duorum pugnorum, ortus ab inferiore parte pancreatis, intestinum duodenum circumdederat, sic ut peritonæo tectus alterum quasi ventriculum mentiretur, materia per ramos venarum portæ in ipsum pancreas defluentes, affluebat. 7. In Hepate scirrhoso apostemata exigua multa. 8. Lien totus corruptus multos continebat calculos. 9. Pulmo inflammatus multis refertus glandulis. 10. In superficie sterni, ad clavicularum conjunctionem, atheroma ovi magnitudine. 11. Apostema sub ala dextra, inter pleuram & costas maximi pugni magnitudine, & graveolens, cujus purulenta materia, 4. 5. & 6. costam exederat: atque adeo non modo divulsæ erant costæ a vertebra, sed & summa parte, quæ vertebrae funguntur, usque adeo carie corruptæ ut facile eximi digitique fricari possent. 12. In cranio dura mater inflammata. 13. Inter meningas & cerebrum ichor multus. 14. Plexus choroides inflammatus. 15. Circa cerebri basin & cerebellum semilibra sanguinis & amplius e jugularibus internis affluerat. *Fabritius & Hildanus cent. 1. Observatione 71.*

Erant apud nos mulier Cachectica, in cujus vesica fellea deprehendimus humorem serosum pallidumque minimè amarescentem, sed insipidum potius dulcique proximum. *Glisson. Anat. Hepatis cap. 39.*

Vir an. 42. natus ab ineunte ætate parum firmæ valetudinis, decolor, capitis in pulmonem defluxionibus, sed iis nec falsis sed acribus, vehementer obnoxius, quum ad nativam corporis imbecillitatem accederet ratio victus negligentior & vita sedentaria, studiis occupata, mense Septembri anni 1660, primum in cachexia cum oedemate pedum & difficili respirazione incidit: urinæ, quas prætenues, pallidas & copiosissimas prius reddere solitus erat, paulatim imminutæ sunt. Difficultas spiritus, cum sensu ponderis, utrinque ad latera thoracis, supra costas spurias, sic paulatim ( præcipue si altior duceretur anhelitus ) augebatur, ut sub finem Decembr. jam decumbere neque in latera posset: si in lecto se converteret, humoris aliquid in thorace fluctuare percipiebatur:

ac proprius admota aure, rei cuiuspiam leviter bullientis seu stridor aliquis obaudiebatur qui nec ægrum ipsum latebat: eo plane modo ut Hippocr. de Hydrope pulmonis prodidit. Itaque dies & noctes tantum non residere surrecto thorace cogebatur: Tum sensim venter, quoque in tumorem assurgebat, & tussis aspera, eaque sine stercore, prorsus sicca, si ve tenuantia si ve inspissantia remedia tentarentur, infestabat: Porro ad quemvis corporis motum mirè anhelitus crescebat angustia, ut æger protinus suffocari atque animo linqui videretur: Sub his pulsus, præsertim vesperi, lentam quandam febriculam, Tum urinæ sedimenti pulvereum albicans ostendebant: neque appetentia cibi omnino dejecta erat, neque sitis magna: A medicamentis purgantibus plus visus est lædi quàm juvari, Sectionem thoracis, in quaspes aliqua collocanda erat, magis ferre quam mortem ipsam formidabat, Mense Martio, postremis aliquot morbi diebus, cepit cruenta quædam extus flere.

Cæterum inciso corpore, nullum in pulmonibus vlcus deprehensum est: thorax verò univcrsus aqua cruenta, quam quis haud anepthè carniū assimilaret, repletus fuit: ventri inferior ( ut ascitis solet ) aqua hævescente suffundebatur: In dextro pulmone tres ceruebantur lobi teretes, fastigiati crassitie & longitudine digitum superantes: Hepar albicabat & duriusculum erat: reliqua viscera nihil ad oculum vitii ostendebant. *Schenckius ex Manxellii Observationibus.*

Quadragenarius à biennii tempore incidit in capitis dolorem, icterum, sæpe, ischuriam, viscerum obstructiones & dolorem ischiadicum, postremo febri, cum paraphrenitide diem clausit.

Inspecto cadavere. Omentum corruptum & inflatum. Colon in latere sinistro admodum contractum & coarctatum. Intestina vermibus plena. Inter vesicam & rectum intestinum tuberculum scirrhosum creverat. Circa femoris dextri Trochanterem, apostema fuit, continens libram puris: hinc redundantibus musculorum & ossium ligamentis erosio femoris luxatio. A postica renis iuniori parte sub musculo lumbari atheroma fuit, e quo plus quàm duæ libræ puris effluebant: Vertebrae tres quibus incumbibat, carie exesæ & contritæ erant. Pancreas circa partem duodeni, ipsum intestinum scirrhoso atheromate ita obsedebat, ut alterum ventriculum mentiretur. Jecur exiguis scirrhosis apostematibus plenum. Splen totus corruptus & calculosus.

Pulmones inflammati ac glandulosi tumoribus referti. Sternum circa clavicularum junctionem, atheromate ovi magnitudine obsessum fuit. Sub axilla dextra, inter pleuram & costas ad pugni maximi magnitudinem abscessus graveolens fuit, cujus aciditate quarta, quinta & sexta costa carie non tantum afficiebantur, sed a vertebra divulsæ sunt.

Elevato cranio meninx crassa fuit inflammata. Ad lavam falcis regionem tumor scirrhosus & latus in tenui meninge erat. Cerebrum lymphæ flava turgebat. Ad basin semilibra sanguinis inventa.

Hic homo ab omni parte corruptus & obstructus: in capite scirrhosus præcedentem indicat inflammationem, unde dolor biennialis.

Obstru-



Obstructiones in Hepate impedimento fuerunt, ne bilis ad vesiculam fellis aditum haberet, unde contigit eam in sanguine remansisse, cutimque colore aureo infecisse. Ischuria à tuberculo inter vesicam & rectum intestinum orto quia ab eo vesica premebatur.

Apostema circa Trochantorem ischiadicum dolorem procreavit. sic omnibus visceribus & glandulis obstructis myriadam mala creare vere. *Steph. Blancard. in Anat. pract. rational.*

### CACOSITIA

Vid.

### FASTIDIUM CIBORVM & ANOREXIA.

### CADAVERVN EXAMINATA

Vid.

### RESENTIATIO.

### CADAVERE GONDITVRA.

ex Variis.

**E**X corruptione, & intenso foetore, non Erarò observando in tumulis Magnatum, Principum, imò & Regum, etsi summum adhibitum sit studium cadavera incolumia servandi, colligere mihi licuit inanem illum successum avaritiæ solum aut inscitæ adscribendum esse illorum qui condiendi vel balsamandi curam suscepunt. Ideoque non inutile fore credidi si hoc capite publici juris facerem medicamenta & methodum, quæ non raro usus sum in balsamatione Cadaverum nonnullorum utriusque sexus, imò & principum; eo tunc ut qui famæ consulunt, omnemque operam nentant quo eventus votis respondeat id consequi valeant ut cadavera quæ à corruptione vindicare student, per plurima secula citra corruptionis metum perennia esse queant.

Hoc loco immoraturus non sum circa modum condiendi cadavera antiquis assuetum Aegyptiis, aliisque nationibus quæ de re nonnulli quædam scriptis tradidere, ac inter cæteros Petrus Belonius, Maynensis, Tractatu edito Parisiis anno 1555. de medicato funere. Etsi enim hodie supersint non obscura indicia industriæ antiquorum in balsamatione cadaverum personarum illustrium; ac in variis Autoribus occurrat series præcipuorum medicaminum ad id opus ipsis familiarum non adscriptæ tamen sunt doses, neque ratio legitima quæ ipsi usi fuere.

Neque etiam disquiram varias Authorum sententias circa munus nomen quandoquidem nihil quod animum curiosum expleat invenire est, id verò novisse sufficiat vocabulum mumie iudicium fuisse, modo cadaveribus medicamentis aromaticis, imbutis & conditis; modò illis quæ arenis in lybiæ desertis obruta ab æstu solis æresacta fuere; modò liquori è monumentis vel tumulis in quibus magnatum cadavera condita jacebant exudanti, ac in sepulchris exsiccato, adeo ut duritiem æqualem corporibus balsamatis æmuleretur.

Missis ergo antiquorum sententiis, imò neotericorum, statuo, quando quidem cadaverum corruptio non alia ratione contingit quàm ab excessu exuberantis in illis humidi, quod

adauguet ær ambiens, in primis curæ esse debere ut absumatur humidum illis innatum, prohibeatur que accessus & introitus ambientis: A calce viva quidem quicquid superfluum in corpore ablumi potest, imò quodammodo præpediri aeris admissio; At eum destructoria & caustica vi poleat, quæ molliores corporum mortuorum partes absumenda essent, solo superstitie sceletro, ejusmodi auxilium inutile est, nisi solorum ossium custodiendorum curæ incumbat: Adservari quoque ad aliquod temporis spatium possent cadavera exenterata benedictio muræ plurimo sale prægnantis; vel etianinum in spiritu vini eadem reponi, si modo vas idoneum præsto esset accurate obturabile; At cum id ipsum perenne esse nequeat, requiruntur autem media stabilia, nec caduca, nemini non gratum futurum spero si hoc loco tradantur.

Id porro mihi curæ cum semper fuerit corpora defuncta figura externa salva tueri, præsertim vultus; imò præstare si concessum esset ut in perpetuum durabilia essent, ideo semper prohibitus fui ab usu pulveris coriariorum, cinerum, calcis, quibus plerumque abutuntur qui turpi lucro inhiant, conscientie vero & famæ nequaquam attendunt, posthabitis querelis & exprobrationibus de infelici & improspere successu ipsis morientibus: Etiam si enim prædictus coriariorum pulvis ex se sat aridus, idoneus videatur absorbendo humori redundantium partium quibus admovetur, destitutus nihilominus est quavis utili dote quam secum transferre queat in cadavera; ipse vero putredini obnoxius quam tandem contrahit ab humido quod absorpsit. Cineres quod spectat, etsi sal ipsis commixtum aptum videatur conservandis cadaveribus, non sufficienti tamen hoc illis inest quantitate quæ id præstare valeat, ac procul dubio dominium in illud obtinet colligatio sensim contingens partium mollium cadaverum, imò dissolventis potius cuiuspiam vice fungitur ratione partium carnosarum aut pinguium quas attingit, quàm remedia corruptionem prohibentis: Calcem cur exulare iusserim rationem ut reddam nulla impellente necessitas, satis fuerit tradidisse media, ratione & experientia duce à me optima confirmata, quorum ut copiam omnibus facerem iussit Dominus d'Aquin.

Etiam si forsan spes assurgere posset cadavera labis immunia conservari posse si includantur feretro plumbeo, obvoluta pulvere composito ex partibus æquis Myrrhæ, Aloës & salium, specifica vi donatorum profuse verò affatim insperso pulvere, coque optimo vini spiritu humectato, feretri autem commissuris accuratissime occlusis, eademmet autem methodo usus fuerim erga cadaver illustris matronæ, ex ipsius ante obitum iussu, ratio tamen omnium probatissima hæc esto.

In cranii postica parte, seu occipitio, excavandum foramen magnitudinis volæ manus, aut circiter, per quod cerebrum eximendum est, cranii autem cavitas, pulvere inferius describendo opplenda, demum foramen occludendum, adposita parte inde exempta; futuræ ope panniculum carneum divisum & à cranio divulsam data opera, conjungendo.

Cutis



Cutis, & partis adiposæ illi subiectæ incisio faciendâ a summo sterno ad umbilicum extremum; eadem vero cutis transversim quoque dividendâ ad sesquipedalem circiter longitudinem, quæ in aperto ponat regionem jecoris lienis & ventriculi, cunctisque his a sterno cadaveris novacula liberatis, inciso & a collis separato sterno, hinc inde in locis cartilagineis eodem sterno ad vultumque adducto, eximantur lingua, o. pli, pulmones, cor, jecur lien, ventriculus, intestina; partesque omnes corporis cavitatibus conclusæ detrahantur: Dux etiam vel tres altæ incisiones secundum brachii longitudinem faciendæ ac utriusque furæ, in gis aut minus penetrando pro ratione corporis, obesioris aut strigosioris. Necessariæ eadem divisiones cutis, sed profundiores & numerosiores, in natibus & femoribus: Similes requiruntur secundum longitudinem a summo dorso ad nates excurrentes, novacula etiam partes adiposæ a carneis separandæ: Quinque etiam aut sex in collo faciendæ, quæ item per longitudinem in unaquaque pedum planta & manuum vola: Occurrere possunt corpora adeo obesa, carnibus & adipē farta, ut locus sit detractioni superflus carnis & adipis; visceribus commiscendæ; sed prætermitti potest illa ablatio, dummodo nihil præternatur illorum quæ requiruntur ad corporis conservationem.

Sanguis & serum, si quæ forte in corporis cavitates influxerint, aliasve partes novacula adaperas, spongia sedulo absorbeantur & abstergantur; Singulæ designatæ partes generoso vini spiritu madescant, ac demum leviter optimo salis spiritu imbuantur, magnetis vices subitura, qui aciditate sua attrahens tum salia fixa tartari, & tamarisci, tum volatilia in aromatis latentia, ex quibus pulvis componendus est, eorum intimiorem conjunctionem effecturus est ac magis idoneos redditurus qui cadaveri coaptentur: universa demum hæc capacitas, cunctique excitati hiatus, tota intercapedo cutis adiposæ, carnis & ossium, sicuti & cranii spatium ac panniculi carnei nec non oris cavitates, faucium, buccarum, narium & orbitæ oculorum, impleantur pulvere sequenti.

#### *Pulvis ad implendas Cadaverum cavitates*

℞. Myrrh. Aloës an lib. xvi. Sal. tart. tamar. asphalti, summit. siccar. absint. scord. & centa. min. radicum siccar. imperat. gentian. angel. carlin. aristol. rot. aa lib. 3. cardani. vulgaris, piper. nigr. zinziber. an. lib. 4. cinnam. caryoph. labdani & acori veri aa lib. 2. F. ex a. omnium pulvis ad usum.

Quantitas præscripta hujus pulveris modum non excedet, si corpus balsamandum magnum fuerit, ac præsertim si cuncta viscera condienda sint. Media tamen pars satisfactura est si corpus condiendum parvum fuerit; At pulveris nunquam cadaveris conditorem parcum esse decet, sed sedulo indagando cunctas cavitates novacula divisas, omnino illæ adimplendæ & per vini pulvis adigendus quantum cutis illius poterit esse capax. Demum irrotatione facta externæ partis pulveris optimo vini spiritu, quod utcumque concorcorari queat & coa-

lescere, adductaque hinc inde cure, & suturis conjuncta; omnium inflictorum vulnerum, accurate universum corpus inungendum erit balsamo Peruviano, cui aspergenda est pulveris sequentis quantitas sufficiens, ut inde exurgat quædam crusta densa, spissitudinis transversi digiti, corporis universam superficiem obtegens.

#### *Pulvis ad Cadavera loricanda.*

℞. Styr. benzoin, ireos Florent. aa lib. 4. summit. major. flor. aurant. lavendul. tamahac. odor. an. lb ij. lign. rhod. acor. veri aa lb j. M. F. c. a. omnium pulvis crassior ad usum.

Universo corpori pulvis ille inspergendus, sed successivè, postquam scil. pars quæpiam balsamo Peruviano inuncta fuerit, adeo ut undique suffusum sit corpus, & circumquaque ad spissitudinem transversi digiti; sicuti jam supra innui. Demum, involutum cadaver tela cerata, ac commissum feretro plumbeo cuius committuræ optime ferrumentur, proculdubio ad distissimas regiones transferri poterit in secula seculorum durable-adversus omnem corruptionis metum tutum.

Si Cadaver ad aliquod tempus feretro non inclusum adservandum fuerit, imò per plures hebdomadas exhibendum vultu patulo, in lecto ad pompam extracto, vestibus indutum, cheirothecis, tibialibus & calceis instructum præparanda erit tela incerata alba, odorata, dividenda in longissimas tenias, tres aut quatuor digitos latas quibus seorsim obvolvenda brachia, femora, tibie; demum universum corpus, oblique illas supra pulverem circumducendo, quo pacto Cadaver non secus ac corpus vivens indui poterit capillos depromendo, vultumque prodendo, dummodo spississime spiritu vini optime rectificato eluatur; imò lintea eodem spiritu imbuta, quo tempore non exhibetur cadaver admoveantur. Potest & supponi capiti cervical pulvere aromatico descripto oppletum, minora itidem pulvinaria lateribus & pedibus supponenda. Telæ incerata hæc est compositio.

#### *Tela Cerata Aromatica.*

℞. Cere alb. lbvi. olei express. nucis mosch. oleorum stillat. lavend. cortic. arant. & citr. aa 5 ij.

Ceræ igne lentissimo liquatæ permisceantur olea, illisque tela linea imbuatur pro usu jam dicto.

Minutim prius dividatur cera alba, lentissimo igne colliquescat in sartaguncula itanno interius obducta, superna parte latissima, inferna in conum vergente, demum commistis oleis æqualiter & undique imbuitur tela alba & rarissimæ texturæ.

Cerebrum quod spectat, omnesque interiores corporis partes, imò carnes & adipēs quæ detrahendæ sunt, re visum fuit; condiri hæc poterunt priore pulvere insperfo. Eapropter probe elotis intestinis, longisque ac altis incisionibus cordi inflictis, pulmonibus, jecori, lienis, & renibus, adparatoque doliolo plumbeo dimenso, hujus fundum pulveris portione cooperiendum, irrotatisque omnibus partibus



optimo vini spiritu, hæc in doliolo scorsim collocandæ, pulvere ubique superaddito; sedulo quoque vulnera cordi, jecori &c. indicta eodem pulvere infarcienda, partium repolitionem successive continuando, pulvere atatim injecto, quoad omnia inclusa fuerint, ac doliolum pulvere omnino oppletum sit. Postmodum dolioli commissuræ accuratè ferruminabuntur; quo pacto cunctæ illæ partes in massam coagmentabuntur, non minus ipso doliolo durabilem. Cor balsamatum, sicuti superius dixi, pyxidi plumbeæ dimensæ committi potest, scorsimque custodiri. *Moses Charas in Pharmacop. Regia.*

Gero tandem morem voluntati tuæ & amico desiderio, quo antehac, ut, si quid mihi de balsamationibus (liceat sic loqui Tecum) observatum esset in antiquitate, pro re nata communicarem amicè instabas. Quamvis enim notum quàm sit mihi curta suppellex, nec diffitear, aliorum scrinia compilare speciem quandam plagii literarii esse de quo nuper *Thomasius* Professor Lipsiensis, pluribus ex professo egit: malo tamen periculum subire iudicii temerarii quàm non stare promissis, præsertim cum is demum sit fructus lectionis cujuscunque, ut quid inde prout usus fert, decerpere & arguendo quod præ manibus est tractando, accommodare. Quo nomine minimè inculcandi vel plagii vel negligentiz in proferendis aliorum dictis, qui per quos profecerint aperte profitentur, atque alienis laboribus tum utuntur, ubi de suo nil melius possunt adferre, maxime quando de ejusmodi argumento disquiritur, quod fide testium est confirmandum. Potuisssem autem hac descriptione publica abstinere, (unde fortè notam falsis in alienam messem missæ incurram) nisi tanti fuisset publice profiteri, me dolere vicem tuam, qui cum privata industria operi incumbas ad humani generis commoda pertinente, non absque valetudinis detrimento & rei familiaris, dum sumptus in experimenta facis, dispendio: necdum tamen reperisti quæ luberent, aut dignum labore præmium rependant. Sed hic te ipsum commodis tuis obstitisse, mihi videor observasse, qui arcanum illud condiendi cadavera & à putredine conservandi, à *Bilsiq.* Anatomico celeberrimo, acceptum atque variis tentaminibus ad majorem perfectionem excultum, hætenus tecum servasti: vel potius fortunis tuis intercessisse fati, partum obitu *Bilsi*, partim & præcipue incendio illo motuum bellicorum, quæ te *Sylvæ Ducis* relinquere coegerunt, cum maxime in eo esses, ut, post editum publicè, in theatro *Sylvæ Ducis*, specimen, fructum caperes laborum. Bene tamen est quod in portu aliquo appulisti & cathedræ redditus in Academia in-alyta, ubi sub auspiciis Maximi Principis doces, cujus non minima virtus est, fovere comatus honestos & inter arma quoque ad literas respicere. Neque dubito, quin, ubi operam dederis, ut isti tui conatus magis innotescant, live Regiz Societari Anglicanæ, sive Academicorum Curiosorum per Germaniam collegio, inventurus quoque sis patronos plures, quæis cum communices istud secretum, ne secum intermoriatur. Aut ubi visum fuerit

Deo, reddere Belgio lacerato quietem, habebis ibi qui justo ære redimant arcanum, magis in Medicina vestra potissimum usus, ad detegenda beneficio sectionis incruentæ, etiam minutissima cadaverum, & ostendendos ductus varios, qui multorum Anatomicorum oculos hætenus effugerant, aliæque quæ Prof. Lovaniensis Gutschoven in sua declaratione supra pag. 25. exposuit. Licet enim *Bilsi*, quoad in vivis fuit, multos habuerit antagonistas, & hos quoque inter magnum *Bartholinum*, quem in epistola quadam, ad *Salsium* Medicum Roterodamensem, nisi fallor, edita, potissimum ipsi objecisse memini. quod quæ in figuris ostenderet seu schematicis sectionum anatomicarum, non posset in ipsis cadaveribus demonstrare: ab obitu tamen ejusdem *Bilsi*, cujus tu locum imple, livorem quævisse arbitrator. Accessit & alia causa scribendi ad te publicè, ut hæc eo lubentius legeres & facilius dijudicares. In quo securus sum iudicium Academicæ Gallicæ, quæ ut membra hujus eo commodius possent examinare ideam illius erigendæ, hanc voluit clam typis excudi, & exemplaria inter examinatores distribui, ut mens minus occupata legendo, ad iudicandum eo liberior esset, prout autor anonymus Relationis de Academia Gallica pag. 20. refert. Quod si & tu probas, habeo quod censoribus opponam, qui hanc descriptionem publica: mini vitio vertent, defendendam faciliè virorum clarissimorum exemplis, nisi & hoc ipsum pars criminis foret, horum vestigiis quadantenus instituisse, quorum malo negligentiam quam aliorum obscuram diligentiam imitari. Ut ergo ad rem deveniam, quamvis minima vox (quomodo solet cadaver exsiccatum, certa ratione conditum & corruptionis expers, vocari) Persica sit notante *Kirchero Oedipi Egyptiaci* Tom. 3. pag. 396. tamen constat apud omnes, Egyptiis hunc cadavera condiendi ritum deberi, quippe etiam in sacris memoratum, Moli antiquissimo scriptori Gen. c. 26. ubi de cadavere Jacobi & Josephi agit, Nam quod *Patricides* Patriarcha Alexandrinus in Chronico suo narrat, Adamum ipsum testamento filiis suis præcepisse, ut ab obitu suo corpus suum myrrha, thure & cassia conditum in spelunca abdita ponerent, prout *Houinger. Sinæm. orient. pag. 116.* & ex illo *Heiddegger Histor. Patriarch. Exercit. 4. S. 71.* observant: id nimis audax commentum est. Nos gloriam hujus inventi Egyptiis relinquemus, quorum istam consuetudinem inter alios veterum fusè descripsit Herodotus lib. 2. cujus narrationem *Thucydides* deducit *Athanasius* ille *Kircherus* in stupendo opere *Oedipi Egypti.* tom. 2. syntagmate 13. quod est de *mumis* cap. 3. Sect. 1. & pluribus circumstantiis ex *Diodoro Siculo* imprimis explicat tom. 1. ejusd. *Oedipi* synt. 2. cap. 2. pag. 123. Utrumque audire juvabit istum condiendi modum Egyptiæcum describentem. Herodotus quidem l. 2. sic fatetur. Sunt certi ad hoc ipsum constituti, qui hoc artificium fistitant: qui, cum ipsos cadaver portatum est, ostendunt eis qui portaverunt exemplaria mortuorum lignea, pingendo assimilata. Et eorum unum accuratissime fabricatum esse vident [cujus ego nomen si nuncupavero, haud faciam



ciam sanctè ) alterum illo inferius & vilioris pretii tertium vilissimum. Quibus expositis scissantur ab eis ad quod exemplum velint effingi mortuum suum. Ibi ubi de pretio conveniunt, illi ne avertant. At in rebus in ædibus hunc in modum diligentissime condunt corpus. Ante ostium incurvo ferro cerebrum per nares educunt, ut quæque partem educentes, ita locum ejus medicamentis explentes. Dehinc acutissimo lapide Æthiopico circa illa conficiunt, atque illac omnem alvum protrahunt. Quam ubi repurgant & vino Phœniceo eluunt, rursus odoribus confusis proluunt. Tum alvum complentes contusâ myrrinâ purâ, & cassiâ & aliis [excepto thure] odoribus, iterum consunt. Ubi hæc fecere, saliant nitro abditum septuaginta dies. (Kircherus habet: Saliant intro abditum septuaginta dies: cum tamen in Græco sit: *μεγαλὸν ἔσω ἀπὸ τοῦ ἵππου ἰδμεναι*. Nam diu salire non licet. Exactis septuaginta diebus, cadaver, ubi abluerunt, nardode byssini totum incisile foris involvunt gummi illinentes: quo Ægyptii glutinis loco perunque utuntur. Eo deinde recepto, propinquæ lignæ an hominis effigiem faciunt, in qua mox intrent mortuum, inclusumque ita reponunt. Eos autem qui mediocria volunt, minimum lugientes, sumptum ita apparant. Clysterem unguine quod e cedro gignitur complent: deinde ex hoc alvum mortui ipsam neque scindentes, neque extrahentes, sed per fecitum, prehensio viz posterioris hiatus, inferciunt: & tot quot dextis diebus sale condunt. Quorum dierum ultimo cedrinum unguentum quod prius ingesserant, ex alvo egerunt, quod tantam habet vim ut una secum alvum atque intestina intacta educat. Nitrum autem carnes tabefacit, mortuique tantum cutis & ossa relinquuntur. Ubi ista fecere, ex quo sic tradidere mortuum nihil amplius negotii suscipiunt. Tertia conditura hæc est qua adornantur eorum mortui. Qui tenuiori sunt fortuna, ablutionis ventrem absterguunt, arefaciuntque sale septuaginta per dies, deinde trahunt deportantque. Hæc Herodotus. Nunc verò etiam Diodorum Siculum audiamus. Is l. 1. c. 5. de Ægyptiis loquens sic inter alia scribit: Sepulchrorum tres habebant species, sumptuosas, mediocres, & humiles. In prima argenti talentum exponebant, in secunda, minas viginti, in ultima pauciores sumptus fiebant. Qui funera mortuorum curabant, eo exercitio a majoribus tradito, funeris impensam curaretur funus. Primus Grammaticus (ita enim appellatur) posito humi corpore, signum circa illa describebat, quantum à sinistra parte incidere: Deinde qui dicitur scissor habens lapidem Æthiopicum, quantum lex sinebat, latus aperiebat, subitoque cursu à persequentibus, qui atabant, lapidesque cum execratione in eum jacentibus, fugiebat. Existimabant enim odium inhære, quicumque amici corpus vulnere illato violaret. Curatores vero corporis, hos salitores appellant, honore estimationeque digni habebantur. Versantur enim cum sacerdotibus (in Kircheri mendosè est utebantur) templaque pariter ingrediebantur. His penes cadaver altitibus, unus per

scissuram corporis interiora præter renes & cor educerat, quæ singuli alter vino Phœniceo e rebus odoriferis lavabat, deinde corpus totum primum e cedro tum aliis pretiosis unguentis ungebant dies amplius triginta, myrrha deinde atque cinnamomo, cæterisque rebus linebant, quæ non solum id servare diuturne, sed odoriferum reddere valerent. Curatum cadaver cognatis tradebant defuncti, ita singulis ejus partibus, etiam superciliorum palpebrarumque pilis integrè servatis, ut omnis corporis species, dormientis more, integra perduraret. Ex quibus *Diodori Siculi* verbis æque ac loco *Herodoti* apparet, qualis istius condituræ ratio quondam apud Ægyptios fuerit, qui cadavera sic condita non solum in locis quibusdam subterraneis & cryptis artificiose structis (quas *Kircherus Synagm. 13. de munis c. 4.* ex relatione *Titi Livii Burattini* Architecti Regis Poloniæ & *itinerario Petri à Valle* describit & cælo sculptas exhibet) diligenter servabant, sed & domi secum habebant atque ad posteros trans mittebant, ut aspectu progenitorum suorum oblectarentur simul atque ad virtutem incitarentur. Quæ etiam cadavera, non solum in mensas inferebantur, ut mortalitatis convivias admonerent, sed & pignori locabantur, magnâ debitoris infamia nisi solveret, & certâ pœnâ ut sepultura careret, prout hæc ex *Luciano de lustu & Diodoro Siculo* rectè probat *Kirchmannus de funeribus Rom. lib. 1. cap. 8.* Quamvis autem hæc condiendi ratio ab Ægyptiis originem traxisse videatur, ad alias tamen quoque gentes transit. Nam apud Judæos obtinuisse, ex funere Servatoris constat de quo *Joan. 19. 39. 40.* Sic tamen, ut exinde simul appareat, citra ullam exenterationem aut cadaveris violationem, lotum fuisse hoc, undum atque involutum ejusmodi tegumentis quæ tincta erant succo aut unguento, quod ad conservationem cadaveris fiebat. Hoc enim sibi illa *Scriptura* volunt, de quibus Evangelista, *Idem dicit, idem est, id est, idem est.* Nec alia fuerunt illa Lazari lintea, nempe *angia, & cinnamomum*, quibus involutus productus sepulchro. *Joan. 11. 44.* ut *Petri à Valle* bene conjecit. De Græcis & Romanis idem probat *Kirchman. l. c. c. 7.* ut & de Christianis indefinitè ex *Tertulliano, Clemente Alex. & Minutio Felice cap. 8.* de Italis vero aliisque id colligitur per exempla quæ *Zacchias Medicus Romanus Questionum Med. Legalium lib. 4. tit. 1. quest. 10.* ex *Kornmanno* de miraculis & propria observatione recenset, qualia de cadavere Cardinalis Angli quod Romæ in templo S. Cæcilie trans Tiberim post annos trecentos inventum undiquaque integrum: de cadavere Alexandri Tartagni Icti quod post annos 159. sic Bononiæ repertum: & Bonifacii VIII. Papæ, quod incorruptum permansit annis post obitum trecentis. Quæ inter omnem tamen fidem exuperat quod ex *Kornmanno* idem habet, in urbe Hispaniæ Valentie post bis mille & supra annorum lapsum repertum fuisse integrum cadaver Adoniram Servi Salomonis cum epitaphio Hebraico. Quomodo enim hoc in Hispaniam pervenit? nisi dicere velint & illud navigio impositum, atque sic de Jacobo Compostellano fabulantur, vid. *Pet. de*



*Natalibus Catalog. Sanctorum lib. 6. c. 13.* Id autem tuum magis usum spectat, Patruelis amantissime, quibus simplicibus in condendis cadaveribus veteres fuerint usi, paucis notare. Cum *balsamatio* dicatur vulgo hac conditura, videri posset *balsami* præcipuum fuisse usum. Atqui licet aliquis quoque fuerit, uti ex inscriptione Hisp. nica potissimum, quam *Kirchmann.* citat & in qu. diserte opobalsami sit mentio, planum evadit, alia tamen longe prævaluerunt, ut sal, nitrum, cedrus, alphaltus seu bitumen, mel, cera, myrrha, gypsus & c. lx, quæ omnia adhibita fuisse idem *Kirchmann.* l. c. ex autoribus confirmat. Salis quidem hic tantus usus, ut hoc solo hæc conditura apud Aegyptios intra 70. dies fuerit perfecta, uti ex *Herodoto* notatum. Nec potuisset *Eunapius* salita martyrum corpora in *Æd. s. u.* ridere, nisi sal etiam Christiani hanc in rem adhibuissent. De nitro idem *Herodotus* auctor est, tantum ejus esse in tabefacienda carne vim, ut mortui tantum cutis & ossa relinquantur. Uude ossum *Josephi* sic conditi sit mentio *Exod. 1. 19.* quæ Israelitæ ex Aegypto secum asportarunt. Cedrum verò unguenti efficacia non solum ex supra dictis constat sed ex istis quæ *Plin.* tum lib. 24. cap. 5. de cedri succo, tum lib. 13. c. p. 13. de libris Nunc Pompilii Regis Rom. habet, qui post annos plusquam quingentos integri reperti, sic ut adhuc legi possent, quæ mvis ex charta essent. Causam enim, cur tunc hos libros non attigerint, hanc ex Hemina reddit, nempe quod libri fuerint cedreæ. Quid autem de bitumine dicemus, cum *Joan. Nardius* Medicus It. lus, citante *Kirchero* tom. 2. *Ordip. pag. 398.* post mumias quasdam dissectas, eas solum gummi conditas deprehenderit, quod nihil aliud olerent aut saperent, hujusque vestigia etiam in ipsis ossibus extarent. Sed ut bitumen per intimam corporis substantiam imbibitum in durum & consistentem consistentiam degeneraret, idem *Nardius*, ad stipulante *Kirchero*, sic f. tum exillimat. Asphaltum & fluidum bitum in sen naphtham sin ul in congruo lebeæ conjuncta fuisse. Quæ ubi igne cogentes disfluxissent, bituminoio huic balneo immersum fuisse cadaver in eoque tantum diu maceratum, donec id altè inbibisse conjicerent hunc liquorem. Neque tunc ignem cadaveris adipi aut carnibus pepercisse, quibus liquecentibus, insigne ucturium arescenti bitumini accessisse. Mitto cetera, mel, ceram, myrrham, gypsum & calcem, & solum noto, nullis usum apud Babylonios majorem fuisse, atque hinc forte cadaver quoque Alexandri Magni isto conditum, licet Hippocent. urus quoque sic conditus ex Aegypto allatus & cadaver Agesipolis Ducis Spartani pariter in melle conditum Lacedæmonem fuerit reportatum: ceræ verò apud Persas: myrrhæ apud Palæstinos: gypsi & calcis, apud Aethiopes. Judæos aloen quoque adhibuisse testatur locus Joannis Evangelistæ antea citatus, ubi Nicodemus mixturam myrrhæ & aloës quali centum librarum legitur attulisse ad funus Servatoris. Idem de Aegyptiis posterioribus *Salmasius* portendit, licet nulla ejus apud Herodotum mentio, atque ex Aëtio probat, qui hanc condi-

turam *quædam* vocet, ejus species in c. m. re adhibere aloë, myrrhæ, gummi, sarcocollæ, acaciæ & opobalsamum. Quin & cadaver in oleo condita, arguendo eum monumentum. Beil de quo *Ælian. lib. 13. c. p. 13.* ejus cadaver in urn. vitreæ oleo non penitus repleta jacebat. Ex quibus omnibus, in tuum erit, ut utuelis conjunctissime, facta collatione cum istis quæ ingenio Bilii inventa colligere, utrum methodo admodum diver. in hac conditura nū fuerint veteres, & majori sumptuum compendio. Certe postulatum Bilii, de sex illi bus forenorum, sibi pro condiendo cadavere Comit. H. utreppæ solvendis, immane fuit, cujus t. men forte potior pars in premium laboris & operæ ob meritatem. rtis credo fuit petita. Ide de viginti duobus forenorum millibus cenfeo, quibus & artem, & quinque illa cadavera artificiose condita, Regi hi. p. niarum & ordinibus Brabantia vendit. re arbitror secretum tuum pretio bis mille imperialem æstimare. Quibus ut aliqu. ndo potar. tis, voleo, sed quamdiu hæc arma curant, ubi tot cadavera cæcorum conputrescent passim & ærem inheunt, ubi artes hæc potissimum vigent quæ in perniciem generis humani inventa, parum habes quod exspecies. Bono tamen sis animo. Labor qui nunc te occupatum tenet, proderit olim. Neque is talis, de quo scrupulus possit harere, si ad cadavera humana extendatur, cum inter casus recentiores facile prius *Vet. Hist. Lucif. Part. 1. lib. 3. pag. 249.* eum approbet, paucis limitationibus adjectis, quæ te non tangunt. Ego hac tumultuariâ scriptione amorem meum erga te volui testari & simul conatus tuos aliqu. tenus adjuvare. Quamvis enim hæc mei fori non tunc, gaudeo tamen, quoties licet publico de augmentis scientiarum & artium bonarum incrementis gratulari, adeoque cum pl. cuissent illa quæ auctore *Bilii* Roterodami erant edita, sponte mea ac lubens operam dedi, ut hic cum appendice recuderentur a mendis plurimis repurgata. Sed nolui descriptionem quinque cadaverum quæ pag. 16. habetur in calcem illustrior rejicere, ut fieri del. uisset ex ipsius Bilii præscripto pag. 32. quoniam parum in eo situm, sive illa ante, sive post historiam legeretur. Atout ergo inveni, ita suo eandem loco reliqui. Tu quæquid hujus est opellæ a me impensum, id in eam quam soles partem, id est, optimam accipe, atque porro, Deo benedicente conatibus nonnullis strenuè rem, in usum rei Anatomicae & Medicæ, faventibus quibuscumque bene publici amantibus gere, atque id ut possis, quamdiutissime vale. Dabam Marpurgi Cattorum a. d. 22. Martii anni 1678. Ex Epist. Samuel. A. drea ad Tobiam Andr. & c. de Balsamationibus veterum in suis libri continentis opera quadam Ludovici de Bili.

Cum in præcedentibus nobis, de partibus humani corporis, sermo fuit etiam, ad curiosorum satisfactionem, methodum balsamandi cadavera eorumque partes ad conservationem in aliquot centenos annos & ultra proponemus.

Conservatio igitur cadaverum duplex esse potest, nempe mediante liquore, aut sicca Balsama-



samatione. Ea quæ sit mediante humido, fit cum cadavera eorumve partes ab una regione in aliam, absque ulla corruptione aut decoloratione transmitti debent: nam igitur muria vel lixivium fortissimum ex marino sale & alumine antiquum sufficit; cadaveri in capulo picato jacenti superfundatur hic liquor, adeo ut bene immergatur: atqui hoc modo ex longinquis regionibus in alias, sine ullo fœtore aut corruptionis indicio transferri possunt; imò sectioni anatomicæ, non inepta erunt quia inter disseccandum minime fœtent. Aliquando, quod mirum, infantes eo modo conditos accepimus, qui vivum adhuc colorem retinuerant; non secus ac si in cunis dormiverant. Optimè hæc methodus instituitur, cum aliud negotium sit, & cum occasio disseccandi tibi commoda non fuerit, in aliud tempus differatur. Alter conservandi modus est, quo cadavera in oleo terebinthinæ conduntur; atque hoc modo per aliquot annos in pristinum statum perseverant. Attusione spiritus vini conservari possunt, imò simore veterum incedas melle condiantur. Verum in melle, aloë, myrrha, similibusque Balsamis cadavera deformia fiunt, in spiritu verò vini sensim consumuntur. Optimum ideoque est, ut cadavera mediante spiritu vini primò tincturam suam evomant. Spiritus iste iterum rectificatus reasundetur, tincturamque de novo extrahas, qui rursus destillatus iterumque reasusus, tamdiu rectificari potest, donec nullam amplius tincturam imbibat. Accipe tunc spiritum vini rectificatum, cui admisce spiritus scilicet armoniaci cum calce viva destillati partem quartam aut quintam: hanc mixturam cadaveri superfunde: atque hoc ritu diutissime conservantur. Ita generationes ex ovo, quæ singulis diebus conspiciuntur, conservantur, quæ omni anni tempore repræsentari curiosis possunt. Imò si hac methodo incedas, semper & singulis diebus discipulis instructionem dare potes, absque ulla Anatomica synopsi. Elucata omni tinctura sape affudi spiritum ex myrrha, olibano, mastiche, succino & spiritu vini destillatum, quem ob eximium in Medicina usum, spiritum matricalem voco. In hoc spiritu optimè dephlegmato conservantur pulli, angues, lacertæ, limaces marini & ejusmodi alia, sine ulla coloris deperditione. Si tibi contingat integrum cadaver à corruptione præcavere, per os & œsophagum aqua calida siphone immittenda, ut nimirum materia, aliàs facile corruptura, ex ventriculo & intestinis foras per anum emandetur: idque tamdiu continuandum, donec aqua pura & limpidæ exeat. Postea spiritus vini magnâ quantitate immittatur, ut nempe hoc modo omnis aquositas relicta, absorberetur. Porro arteriæ quoque & venæ majores aperienda, iisque aqua quoque calida tamdiu injicienda, donec omnis sanguinis rubedo exire desinat, & aqua tantum clara prodatur: deinde, ut supra, spiritus vini immittendus, ut particule aquosæ ab hoc spiritu elutrientur. Operatione hac prævia multum spiritus paritur, alias ingenti spiritus copiam opus fuisset, quod mediante aqua jam fieri potest *Sandapila plumbei* aut *Sianna*, ne spiritus exhalet ad id opus requiritur, si integrum conservari de-

beat cadaver: verum si partes quædam conservandæ sint, vitra omnis generis requiruntur, quæ venicis firmiter satis obturari possunt.

Post Balsamandi modum in humido, alter sequitur siccus: Quando contingat ut totum cadaver Balsamationi sicæ exponatur, potissimum ad faciem & manus advertendum, ne colorem vivum perdant. Aqua igitur calida & vino adusto, ut supra expositum cadaver eluendum; postea limpidus terebinthinæ spiritus cui pigmentum aliquod album admixtum fuit, de novo immittendum ut præcaveatur, ne cadaver siccum flavedine tingatur. Hujus liquoris, immisio in singulis ferè membris ubi arteriæ aut venæ manifestæ sunt institui debet. Cadaver hoc modo præparatum, altioribus domi-partibus exponatur, sitique debito membra disponantur: replendæ tunc omnes arteriæ & venæ cera parum miniata, ut corpus nempe vividum acquirat colorem: Hæc ceræ injectio fit, ne corpus siccatum aridum fiat, verum ut membra debitam expansionem servant. His peractis sensim siccetur cadaver ventis expositum, singulis diebus tamén adeundum, ne quid mali accadat. Facies interim & manus cosmetica vernice oblinendæ, ne flavescant nimis. Oculorum orbi, vitreis oculis, ejusdem coloris ac vivus nabit, replendæ, quamvis cilia claudi possint, & tunc mortuum, quasi dormientem conspicias. Genæ, labia, similesque partes rubore vivo pingendæ: vivus enim color, quoad possumus, imitandus est.

Exsiccatum hoc cadaver, ita ut nihil humidi in se contineat, ab omni parte vernice illinendum est, ut nempe ab aëris injuriis præcaveatur. Fiat igitur mixtio ex aloë terebinthina & mastiche, quibus simul colliquis nonnullis cerussæ admisce, ne color fiat flavus. Hisce ita peractis: arcæ lignæ, ad præservationem comparatæ, munia imponatur, ne ab omni aëris immunditie lædatur. Quamvis hoc ritu cadavera præservari possint, melius tamen erit, ut viscera, facile corruptibilia, eximantur: exempli gratiâ, si capitis cutis cruciali modo incidatur calvariaque serra eleveatur, cerebrum facile corrupturum, exinetur: cavitas, post debitam exsiccationem eadem vernice obducatur: replendæ interim cavitas Aromatis, gummisque bene olentibus: imponatur deinde calvaria, cutisque jam resiccato filo serico consuatur. Porro ipsum cerebrum condiri potest, ut postea dicemus & cavitati loco aromaticum; imponi. Simili modo & Thoracis & abdominis contenta eximi possunt, & balsamo indurari, ut nimirum postea suo loco locentur: verum si licitum sit intestina sepeliri, cavitates aromatis replendæ, & cutis dissecta resuenda.

Si quis solummodo musculos condire studeat, cutis decorticanda. Omnes muscoli arte anatomica a membranis solvendi, ut discipulis omnes totius corporis musculos exhibere possis. Solutis omnibus musculis, tamdiu aqua calida eluantur, donec nihil cruenti amplius appareat, postea spiritu vini irrorandi, ut omnis item aquositas imbibatur. Postea cadaver ante foramen modicè calidum ponatur, ut pedetentim exsiccetur, deinde oleo terebinthinæ quotidie



musculi intingendi, donec omnes partes penetraverit. Hæc olei penetratio fit, ut partes ab omni corruptione præserventur. Exsiccatum postea oleo, musculi aliquoties ab invicem separandi sunt, ne mutuo adhæreant. Interim erigatur corpus hoc modo ut erat in vivis, ita nimirum ut musculi posteriores & anteriores faciliè conspiciantur. Induratis jam præ siccitate musculis, illitio iterum ut vernice ex oleo terebinthinæ & mastiche facta, ne externæ aëris injuriæ quippiam lædant: Si enim omnia providè peracta fuerint, hoc modo cadavera in aliquot centenos annos conservari possunt.

Minorum infantium cadavera ad siccitatem usque concinne Balsamo indurari, vitrisque crySTALLINIS includi possunt, ut, post mille annos ita conspiciantur, ac si recens essent conditi. Hoc igitur incede modo: infantis aut embryonis corpusculum per octo aut plures dies vini spiritui immergatur: sed recens spiritus singulis diebus affundendus. Infanti majori autem intestina siphonibus purga, eique terebinthinæ oleum superaffunde. Interim vernix ex oleo terebinthinæ, mastiche, succino, copal &c. præparanda: eaque sit ita spissa, ut, si ab igne movetur, in rigidum ferè vernicem rigescat. Hæc, calida in vitrum amplum, ad magnitudinem fœtus accommodatum, infunditur. Lepidæ huic vernici embryon balsamandum immergitur, ut in medio vernicis spatio obrigescat, vernixque instar succini diaphani apparebit. Mirum sane, quod magnitudo maximi hoc modo non condiantur, cum id paucis sumptibus & brevi tempore fieri possit.

Locuti jam sumus de modo, quo integra cadavera Balsamo condiantur, nunc de viscerum Balsamatione particulatim agemus. Venterculus, intestina, imò vesica urinaria, uretheres, Cystis fellea, omniaque ea quæ fistulosa aut membranacea sunt eadem methodo præparantur: nempe, primò aqua à fordibus purgantur, deinde spiritus vini ad aliquot digitorum eminentiam superfunditur, perque dies nonnullos infunduntur, ut omnis nempe aquositas extrahatur. Hisce peractis vento distendi debent, & quemadmodum vulgares vesicæ exsiccari. Postea fenestricula in stomacho vel intestinis fiat, partem nempe cultello fenestellæ in modum conscindendo, ut interiores parietes oculis pateant, tunc omnes æqualitates, & inæqualitates, ut sunt valvulæ conniventes, rugæ & plicæ, necnon glandulæ miliares ob oculum sistuntur. Posthac eadem vernice intus & extus obliantur, ne acari & teredines partes corrodant.

Lien illiæso aqua tepida per arteriam lienalem immittenda donec per venæ portæ ramos nihil cruenti redeat, tunc lien, ob sanguinis peruriam, planè albus apparebit. Injiciatur tunc sæpe vinum adustum eique per aliquot dies immergatur, ut supra. Lien deinde inflandus ut spiritus exeat, iterumque terebinthinæ oleo imbuatur. Omni jam liquido liene efflato, venæ portæ vinculis constringenda, & arteria insuffletur, & ligetur. Lien hoc modo ad siccitatem induratus, vermis eodem modo ab omni corruptione custodiendus est. Post exsiccationem

membrana quæ lienem investit, scalpello acutissimo faciliè abscinditur, ut interior substantia, arteriarumque distributio cominus conspiciantur.

In Balsamando jecore, immittenda per portam venam aqua tepida, necnon per arteriam hepaticam, tunc omne sanguinolentum per venam cavam exhibet: deinde spiritus vini & postea oleum terebinthinæ injiciatur, ut supra. Interim quoque fellea cystis purgetur, insuffletur & exsicceatur ut ante de ventriculo & intestinis dictum. Sic quoque insufflandum est jecur per vasa sua, illque extrinse ligatis, exsiccationi exponantur, verniceque obducantur. Eodem modo & renes condiri possunt. Oculis inamœnum non est, venas esse cera nigra & arterias rubra repletas, ut nempe earum ramificatio eo distinctius conspiciatur.

Omentum exsiccatum, byssum aut carbasum, refert, quibus se mulierculæ ornant. Primo per aliquot dies spiritui vini immergatur, leviterque sicceatur. Verùm quia multi ductus adiposi per illud excurrunt, idem amyli farinæ aut sutturibus immergendum, tum ab omni pinguedine liberabitur.

Pulmonum Balsamatio haud ita facile fit, quia difficile vento replentur, insufflatis enim pulmonibus, omnis aer elabatur. Si enim pulmones eximantur è corpore plurimi meatus, post vasculorum lymphaticorum abruptionem relinquuntur, per quos aer & mercurius exeunt. Præparatio per aquam calidam, pulmonum arteriæ injectam, deinde per spiritum vini, oleumque terebinthinæ, eodem modo ut supra fit. Postea, ligatis omnibus vasis sanguineis, pulmones vitro largioris colli immittantur. Trachea tunc hoc modo in vesicæ alioque medio ita accommodatur, ut flatus tam in alperam arteriam immitti possit: vesica hæc ex cujus medio trachea dependet, supra vitri os ita expanditur & circumligatur, ne aeris momentum intrare vel exire queat. Verùm antequam vesica ligetur, alius quidam pulmones inflare oportet, ne scilicet post contractionem iterum subsideant. Omnibus jam optime ligatis inflatisque arcè trachea est construngenda: tunc nullus, nec per tracheam, nec per vesicam, aëri aditus & reditus patebit. Deinde exsiccationi exponantur, & vernice obliantur, sicque pulmones expansi manebunt.

Cerebrum cum immissione humidorum non ad totum penetratur, immergendum tantum est spiritui vini, & eousque renovandum, donec nulla tinctura aut aquositas extrahatur. Superfunditur deinde oleum aut spiritus terebinthinæ, donec penetraverit oleum: postea vernici servidæ aliquoties immergatur, & papyro oleo olivarum madidæ, ut exsicceatur, cerebrum imponendum.

Mirum in modum, vasa sanguinea capillaria per omnes corporis partes excurrentia videbis, modo ea cera miniata aut alius coloris impleas exempli gratia, si quis vascula pulmonum renella conspiciere cupiat. Primo, ut in præcedentibus dictum, pulmones ab omni sanguine liberandi sunt, & postquam omnem humiditatem expresseris, arteriæ cera liquida, eaque miniata, mediante siphone repleatur.



verum nigra cera implenda est vena, viridi arteria bronchialis, alba vero trachea. rursus deinde omnes membranae & testiculæ, ex quibus pulmonum substantia contexta sit & aqua frigida tandiu eluantur, usque singulis diebus, donec omnis materia puerida eintat. Tunc apparebunt omnes arteriarum venarumque nec non tracheæ ramusculi, iuxta arbuticuli.

Jam quod omnia, nulla fere arte opus est, cum duritie sui seipsa satis præservare possunt. Vt in hoc versatur totius cardo ut ab omni carne, membranis, tendinibus, & præsertim pinguedine liberentur, nitoremque eburneum acquirant atque hoc ut sola coctione, tunc non tantum multum medullæ extrahitur, sed & externa euitello deradentur: postea per aliquot dies calcis aquæ imponenda, deinde supra eminentias arenosas circa maris litus infolentur, tunc post aliquot tempus eboris nitorem acquirunt. Postea terebra versatili, seu verticillo circa articulationes perterebrantur, & invicem filis æneis junguntur, ut sensim in sceleton erigantur. Os sacrum porro, omnesque vertebrae ut in vivis erant virgæ ferreæ vel capreæ accommodantur, quibus caput, cum cranio, pro virgæ transitu, perforata, imponitur, atque sic omnia cochleari instrumento firmantur. Interior virgæ pars tripes esse debet, ut totum sceleton virili magnitudine erigatur. & sustinetur. Quæ ulterius ad sceleti erectionem pertinent, melius quis conspiciet si Anatomias publicas & privatas consulat. Atque hoc modo corpus integrum, ejusque partes Balsamo præservatæ privatim & singulis momenti curiorum, discipulorumque oculos siltere possunt: nam cadavera recens denata ubique præsto non sunt. Inque anatomis publicis specialiora ita quoque non representantur, quin prius scetorem contrahant. Atque hæc de Balsamandi Methodo, qui plura desiderat, me adeat rogo. *Steph. Blancard. in fine sua Anatomia.*

## CÆCITAS.

**D**E Cæcitate non opus est in specie agamus, illud siquidem perficietur Tractatu generali de Visione ejusque vitiis suo loco inferendo Nunc sufficiat *Consultationes* quasdam atque *Observationes* à variis Autoribus adduxisse.

### *Consultationes.*

Illustriss. & Reverendiss. D. ætatis annorum 43. temperamenti calidi & sicci jecoris, & totius corporis, ut ex rurs capillis, corporis gracilitate, & venarum latitudine perspicuum est; Cerebri vero calidi, & plus æquo humidi, ut ex destillatione salsa, & visione confusa constat mense Julio anno 1643. repente incidit in duplicatam visionem simplicis objecti, magisque in scalarum descensu, quam in ascensu, spatium fere duorum annorum, à quo nullis adhibitis sponte illico evanuit affectus, qui tamen rediit mense Augusto anno 1646. eodem prorsus modo trimestri spatium durans, quo tempore duplicata objecta non amplius cernebat,

sed visio adeo defecit, ut in præsentia sit fere abolita, præterquam quod quandoque ignea objecta, quandoque obscura & alia videre videtur, nullo extrinsecus in pupillis apparente vitio. Accedit quod sæpe, & fere continuo splendores & veluti coruscationes quasdam intra oculos observat. Quibuslibet vero aeris calidioris & frigidioris injuriis diurnis, & nocturnis, capite tecto & aperto se exposuit, cum imprimis e loco calido in frigidum migraverit, & ad ignem diu moratus sit, dormieritque in cubiculo ventis exposito, ad focum quandoque totum diem moratus. Sæpius de hoc affectu consultatio habita fuit à primariis Medicinæ professoribus, multaque medica præsidia irrita fuere. Propterea de agendis consultitur.

Quod ut pro virili fiat, supponam cum Viro Præclarissimo ad nos scribente, partem affectam esse oculos, cum læsa sit visio, affectumque esse in internis partibus. Extrinsecus enim oculos intuentibus nullum apparet in pupilla vitium: quinimò spectantium imago in ea conspicitur: Visionemque dupliciter esse læsam, hinc quidem depravatam, cum ratione duplicata visionis, qua laboravit, tum ratione splendoris, & coruscationis præsentis; hinc vero imminutam, & fere omnino deperditam, cum nonnisi proxima, & obscure videat; ut propterea si non sit perfecta cæcitas, Latine *Cæta serena*, & Græcis *Amaurosis* dicta, saltem sit valde imminuta visio, *Amblyopia* vocata. Quænam autem pars oculorum sit per se primò læsa, tunc clarius assequemur, quando prædictorum affectuum causam adæquatam in medium afferemus. Quare primò constituimus causam duplicatæ visionis; secundo coruscationis & splendoris; & tertio cæcitatæ, vel imminutæ visionis.

Duplicatæ autem visionis in casu nostro duas causas producere possumus; quarum prima esse potest divisio spirituum visoriorum in nervis opticis, ubi coeunt in unum, juxta sellam sphenoidis, eaque facta à vaporibus ad spiritus visorios pervadentibus ac ipsos dissperscentibus. Alia causa est pupillæ situs non in eodem plano, qui provenire potest à latione musculorum rectorum oculos attollentium, vel deprimentium. Primam causam assignavit Galen. lib. 10. de Uiu partium cap. 14. querens causam conjunctionis nervorum opticorum, consultatis aliorum opinionibus, duas protulit causas ex propria sententia. Quarum prima est; si quando inquit alter oculorum clausus sit aut omnino mutilus, & in alterum supersistere spiritus consulant, quod experientia facile comprobatur; clauso enim oculo, statim alterius pupilla dilatatur, eodem denovo aperto, in statum naturalem redit; altera, quod visoria facultate sic duplicata, visus acutior fiat. Cui opinioni subscripsit Mercurialis in suis Prælectionibus de Oculorum affectibus cap. 1. statuens primo, judicium visus fieri in ea nervorum opticorum decussatione, quam videmus in Anatome, ad quos cum plurimi vapores pertingant, spiritus ab iis dividuntur in duas partes, à quibus deinde in duobus locis unius rei species offertur sensui communi, atque unicuique objectum geminum videtur: quod confirmat exemplo aquæ, in



qua Solis imago apparet; si enim baculo discindatur, apparebant duæ Solis imagines. Cui opinioni ego quoque in consultatione alias habita de hoc affectu subscribendum censui, confirmata ab Andrea Laurentio, & aliis pluribus rationibus. Licet profitear, me hac in re post consultationem conscriptam, & Romam transmissam non parùm hæsitasse, cum circa partem affectam, tum circa causam effectricem. Quoad partem affectam, numquid scilicet duplicata visio proveniat à læsione nervorum opticorum, ubi in unum coeunt, ut asseruit Gal. 10. de usu partium cap. 14. jam cit. & Avicenna prima primi doct. 5. Summa 5. cap. 2. quibus subscribunt plures Medicinæ Scriptores. Quinque enim rationibus iisque validissimis confirmari potest, affectum hunc non provenire à vitione nervorum opticorum, ubi in unum coeunt. Quarum prima est hæc. Uniuscuique partis organicæ actio provenit à parte illa similari, quæ est præcipua in organo, teste Gal. 8. de Usu part. cap. 5. ubi ipsum primum, & præcipuum visus instrumentum nominatur; quod confirmat primò de causis Sympt. 2. Ergo visio fieri debet in crystallino, & non in coitu nervorum opticorum. Secundo: eadem ratio est aliorum sensoriorum, quæ & oculorum. Sed alia sensoria habent nervos sensui dicatos separatos, ut apparet in auribus, quæ tamen non recipiunt sonos duplicatos. Ergo neque oculi recipere duplicatas visiones, licet optici in unum non coeant. Tertio: si species separatim receptæ à nervis opticis duplicatam visionem facerent, etiam id præstarent separatim receptæ in primo sensorio post coitum opticorum: tunc enim denuo separantur. Atqui recipiuntur unitæ. Ergo & ante conjunctionem separatim receptæ uniri possunt. Quarto: primum & præcipuum videndi organum debet esse perspicuum, & splendidum; alias neque ab interno lumine per spiritus influente, neque ab externo illustrari posset; lumen enim est *altius perspicui* ex Arist. 2. de Anima 7. Sed nervi optici non sunt perspicui. Ergo visus organum esse non possunt. Quintò & ultimò id confirmatur ex Anatome. Refert enim Andreas Vesalius lib. 4. de Humani corp. Fab. cap. 4. se in cadavere dissecto invenisse nervos opticos se junctos, & consanguineos defuncti interrogasse, numquid conquectus fuisset de læsa visione. Nec minorem habet difficultatem assignata causa: hoc fieri scilicet ex divisione spirituum visoriorum, facta in illo nervorum concursu à vaporibus cum impetu ad ipsos pervadentibus. Quod ebriorum exemplo ab Arist. proposito 3. Problem. 10. probari posse videtur; nec non & aquæ, in qua Solis imago apparet, baculo discissa in qua conspiciuntur duæ Solis imagines, ut inquit Mercurialis loco citato. Quod etenim à vaporibus spiritus animales agitantibus recipi possint objecta depravatè mota, negandum non est: hoc enim observatur etiam in vertigine. At quod fiat duplicata visio, & non multiplex, vix mihi persuadere non possum, eoque minus, quod in Illustriss. & Reverendiss. patiente duos annos ferè continuos perduraverit affectus, cum alias vaporosa materia semper mobilis, affectum permanentem, & semper sui similem producere non possit tam longo

temporis spatio molestum. His rationibus sane non nullius rei adductus quis dicere poterit, causam duplicatæ visionis neque referendam esse in vapores spiritus discindentes, neque fieri in concursu nervorum opticorum, cum præcipuum visionis instrumentum sit crystallinus, ex omnium cum philosophorum, tum Medicorum sententiâ, cumque affectus biennio perseverans à vaporosa materia fieri non possit humida verò facta obstructione immutatum, non depravatam visionem inducere potuerit, prout factum videmus. Atque ideo partem affectam statuimus esse pupillam ipsam, non in eadem planitie positam, sed alteram altera eminentiorem. Sic enim objecta duplicata recipiunt, ut experientia comprobare quilibet in se ipso potest, attollendo alterum oculorum digito, in quo casu pars affecta non erunt nervi optici, ut existimant aliqui, asserentes ab ipsis oculis sursum deorsumque moveri posse. Nervi namque optici inserviunt sensationi non motui oculorum, cui potius dicati sunt nervi secundæ conjugationis. Præcipuum tamen motus organum est musculus, ut propterea pars principaliter & essentialiter affecta possit statui musculosa substantia: non tamen quilibet musculus oculum moventes: nam laterales pupillam ad latera trahentes duplicatam visionem non efficiunt, ut illustrissimo apparet, quoniam servatur pupilla in eadem planitie: at duplicata visio fit quando visoriorum conorum axes non sunt in uno eodemque plano positi. Hoc autem provenit, quando musculi attollentes, superbi vocati, vel deprimentes, humiles dicti non moventur æqualiter prout in præteriti casu forsitan factum fuit, colloquato scilicet humore ab ambientis caliditate, cum mense Julio prima vice, tum Augusto postea, qui ad oculos confluent, laxitatemque maiorem inferens alterutri musculorum deprimentium, ac proinde inæqualem depressionem efficiens, geminatam visionem, & eam magis in descensu, quam in ascensu scalarum producit. Quam causam à Gal. quoque propositam video Lib. 4. de Locis Affect. cap. 2. dum tractat de motu vitiatò musculorum oculos moventium, his verbis: *Porro in oculorum perversionibus, si ad alterum angulum fiat conversio, illa se permanebit cernendi facultas; si vero aut sursum, aut deorsum, in obliquum quoque convertiantur, quid quid ipsi obiectis, id omne duplex esse videbitur.* Hæc Galenus. Quæ repetit primo de Sympt. Causis 2. in principio. Ex quibus luce clarius constat, Gal. utrique opinioni adhæsisse; ut propterea ego in hanc deveniam sententiam, priore antea proposita non neglecta. Et hæc de duplicatæ visionis causa satis. Neque obstat exemplum ab aqua desumptum baculo discissa, in qua Solis imago apparet duplicata. Hoc enim provenit ab objecto in diverso plano Solis imaginem representante sicuti à speculo in plures partes fracto, repræsentantur plures inspicientis imagines absque ullo vitio visoræ facultatis, & ipsius oculi: in ebriis autem obiectorum confusio, ut & aliquando in iratis, ob agitationem spirituum. Splendoris autem, & coruscationis causam esse statuo crassitiem, & impuritatem spirituum visoriorum proveniente à vaporibus heterogeneis in corpore



exuperantibus, cum ignis, ex temperamento, & diurnum. mori. prope ignem, & in loco calido, tum pituitosis, a cerebro transfusis. Hinc emittit, ut spiritus ipsi humorem albugineum non incedentes retrocedant in crystallinum, atque splendores, & albas visiones emittant, per reflexionem. Cum hoc tamen a prædictis humoribus obstructione facta in nervis opticis vel absoluta cæcitas, vel imminuta vix inducitur, in perfectam tandem cæcitatem terminanda.

Affectus namque diurnitas, oculorum inbecillitas, & irrita plurium remediorum administratione, ex methodo præscriptorum à Viris præclarissimis omnem fere sanationis spem adiungit.

Imittenda tamen humorum qui confluxerunt sensibilibus, & inenarrabili evacuationi, diversioni inventum, totum expiantibus, & jecoris, ac cerebri intemperies corrigentibus, Chirurgicis, Intra-acuticis, & Dieteticis.

Quoad Chirurgica, præter hæmorrhoidum resectionem jam factam, & cucurbitularum applicationem, non abstinere à venæ sectione in hac ætate, & hoc temperamento; cum vix laedatur non ex solutione, sed concussatione relictum spirituum. Delatæ jam factum, & uterum in ista, auriumque perforatio propina summopere probantur.

Frequens alvi dejectio prodesse potest, ex Alexandro Benedicto, historiam referente nonnumquam, qui cum aliquandiu nihil visissent. repentina alvi dejectione visionem receperunt, Vomitoria & errina in oculorum affectibus testatur Hollerius tanquam ad oculos trahentia, quod admittitur quidem impuro excremento corpore, & capite catarrho laborante: at præcipua accuratissima totius, & capitis expiatione utrumque ex usu futurum censere, & præsertim valida sternutatoria, ad repellendos humores, qui confluxerunt, præmissa fomento oculorum ex vino albo alterato, *euphrasia*, *scordio*, & *sosnigræ*. Nec abs re futurum censere in morbo fere incurabili, ulcuscula retro aures excitare aut vesicante appposito ut lacte tithymali & facta diversione, ulcus etiam medix fronti inurere: cum habemus historiam apud Alexandrum Benedictum cuiusdam Germani octogenarii, qui ab equo corrente in terram excussus, frontem sibi confrexit, & dum curaretur visionem recuperavit. Nec omittendum censeo collyrium a Mercuriali propositum, tempore Antonini Imperatoris ab oraculo edictum, paratum ex sanguine galli albi, & mellis. Rationi namque consentaneum iudico,

Et hæc cum congrua victus ratione ritè administrata proponenda censui, additis quæ jecur, & totum corpus refrigerare valeant, atque caput exsiccare absque majore ipsius incallescencia. *Benedictus Sylvatic. Consil. & Respons. Medic. Cent. II.*

Vir quidam dragenarius & fortis, crapula nimis addictus, cum per aliquot tempus levi aliqua vertigine cum molesta gravedine conquestus fuisset, tandem ipsi visus bidui spatio adeo imminutus est ut nihil prorsus videre, imò ne lucem quidem percipere amplius potuerit; & exinde omnino cæcus remanserit. Oculi ta-

men bene sese habere videntur, in iis enim nihil mali, nec decoloratio, nec sustinuit, nec aliud quid præter naturam apparet, dæget quidem a crapula per liquoris tempus abutitur, sed ren ariet cæcitas. A vertigine autem & gravedine maxima ex parte liberatus est. Reliquo alioqui corpore mediocriter bene valet.

Affectio nostri ægri est cæcitas seu abolita visio. Huius mali causa antecedens est pituita in cerebri ventriculis collecta, quæ inae ad nervos destuens eosque obstruens, atque sic spirituum animalium ad oculos influxum, & objectorum visibilium perceptionem impediens, causam continentem constituit. Collecta autem fuit in cerebro ex crudis vaporibus & humoribus e nimia crapula genitis, & ad caput delatis; ibique ob partis frigidioris naturam nec satis coctis, nec dissipatis, sed magis iucratissimis. Ab illis crudioribus humoribus per arterias carotides ad plexum choroidem delatis eoque angustissimos meatus hic illic aliquantum obstruentibus, primo verticofus spirituum transitus laesus, ac vertigo generata est. Cui accessit maxima gravedo, a crassissimis viscosisque humoribus quos natura per os cribiforme evacuare nitebatur. Verum cum illi ob copiam & crassitiam non satis cito evacuati potuerint, pars eorum ad nervos opticos decubuit, eosque obstruxit. Oculi interea bene se habent, quia nulla in iis est intemperies aut prava conformatio; nec visus abolitus est propter oculos male dispositos, sed propter defectum spirituum animalium, factum ab obstructione viarum per quas ad oculum destuere debent, scilicet nervorum opticos.

Hi nervi tantum in suo principio obstructi sunt a dicto pituitoso humore, qui in principio medullæ latioribus poris se aliquantulum insinuavit: credibile tamen non est illum humorem ulterius nervos ingressum esse, cum ob ejus crassitiam & pororum in nervis angustiam id fieri vix possit. A vertigine & gravedine postmodum maxima ex parte liberatus est æger, quia destitit a crapulis & consuetis potationibus: unde cruditates in valido corpore magis magisque excoctæ sunt, sicque imminuta est causa antecedens, quæ dictorum affectuum continentem causam fovebat, atque hinc etiam a natura paulatim consumpta est continens. Remansit tamen cæcitas, quia humor crudus nervorum poris infixus, tam ratione propriæ crassitiei & viscositatis, quam ratione densitatis & angustiae pororum in nervis, neque excuti, neque consumi potuit: & licet ab antecedente causa amplius non foveatur, tamen ratione sui, & partis cui inhaeret ibi remanere, & continuam illam obstructionem facere potest.

Hæc cæcitas curatu difficilis erit, quod humor nervis opticis impactus non facile discutitur. Quia tamen malum recens est aliquam sanationis spem exhibet, si modo convenientia remedia quam primum adhibeantur.

In curatione primo corpus purgandum his pilulis.

*℞.* M. ssz pilularum lycis, cochlearum an. 3ss. cum pauxillo syrupi de stachade, fiat pilularum novem. Quarum loco etiam dari potest si pul-



pulveris diaturbich. cum rheo. Quia sanguis in hoc ægro redundat, post die a purgatione aliquantum sanguinis detrahendum. Quo facto, post biduum vel triduum rursus est purgandum. Postea bibat æger ter de die haustum hujus apozematis.

℞. Radic. cori, valerian. fœnicul. helen. an. ʒss. herb. betonic. euphrag. serpill. majoran. rosmarin. fol. lauri an. m. j. flor. chamomill. stæcad. an. m. s. sem. fœnicul. carui, an. ʒij. bacc. juniper. ʒss. passul. mund. ʒij. aq. q. s. coquantur s. a. & fiat apozema ad fʒss. Hoc assumpto illud ipsum apozema fiat purgans, addendo fol. sen. mund. ʒss. rhab. opt. agaric. albiss. an. ʒij. sem. anis. ʒij. cinnamomi ʒj. Tunc æger ex eo tantum semel de die haustum sumat. Corpore satis purgato, & sanguine convenienter extracto, hoc errhinum sæpe in nares attrahat, ut pituita in cerebro contenta evacuari possit.

℞. Succ. majoran. fœnicul. an. ʒss. betæ ʒss. misceantur pro errhino.

Ad diversionem & simul revulsionem cucurbitulæ dorso & scapulis, cum & sine scarificatione apponenda: vesicatoria etiam post aures applicanda: vel, quod efficacius erit, cervici setaceum adhibendum, aut fonticulus in ea excitandus.

Ad dissipationem reliquiarum in cerebro, & imprimis in nervis opticis contentarum, & capitis corroboracionem, fiat sæpe oculorum, frontis, verticis & temporum fomentatio cum hoc decocto.

℞. Herb. fœnicul. majoran. rutæ, betonicæ, rosmarin. euphrag. flor. chamomill. melilot. stæcad. an. m. j. sem. anis. carui, levistici an. ʒij. aq. q. s. coquantur ad fʒij. pro fomento. Post solum imponatur capiti cucurbitula ex cephalicis calefacientibus & attenuantibus confecta. In aures quoque cum petiis ex bombace immittatur gutta una aut altera olei fœniculi.

His peractis in ipsos oculos etiam instillanda talia, quorum incidens & attenuans vis usque ad nervum opticum penetrare potest, quale est hoc collyrium.

℞. Succ. fœnicul. ʒj. chelidon. rutæ, an. ʒss. misceantur. Illud postea acrius fiet, addendo succi raphani sylvestris ʒij.

In victu sit aer modicè calidus. Cibi sint boni succi & facili digestionis, conditi cum majorana, feniculo, betonica, rosmarino, euphrag. semine fœniculi, anisi, aliisque similibus: abstinendo ab aliis, cepis, sinapi, aliisque quæ caput replent. Potus sit cerevisia mediocris, bene defæcata, & vinum tenue: fugienda omnia vina generosa & quilibet potus fumosus; nec munus repletio tam in cibis quam in potu. Somnus & exercitia sint mediocria. Alvus bene respondeat, & fugiantur animi pathemata. *Isbrand. Diemerbroeck De Morbis Capitis Medic. 19.*

### Observationes.

Adolescens 14. annos natus, & phlegmatici habitus, cum æquali sponsonem fecit, posse se sternutare ad libitum, imò etiam centies. Deposito pignore cœpit ex innodica titillatione irritatis naribus sternutare, circiter centies &

amplius. Exin protinus correptus est dolore capitis & hebetatione visus, qui etiam sequenti die deperditus fuit, citra tamen inflammationem oculorum aut febrim. Convocatis mecum clarissimis doctissimisque viris, Jano Antonio Saraceno, & Andrea Boneto, decretum est, ut purgato corpore setaceum adhiberetur collo, uti & scapulis cucurbitulæ: atque his usus revulsionibus, visum paucos post dies recepit. Hinc apparet quantum hallucinentur, qui in nervorum opticorum obstructione, aliisque morbis oculorum, erithina & sternutatoria præcipiunt & adhibent. Materi enim quæ à vehementi motu ex cerebri ventriculis ad nares trahitur, & circa os cribrosum accumulatur, transiens prope nervos opticos, ratione propinquitatis eos magis magisque obstruit. Objicitur, purgationem universalem præmittendam erithinis: sed nunquam ita potest exonerari cerebrum, quin tantum materiæ supersit, quantum ad hanc exiguum nervorum opticorum capacitatem obstruendam satis sit. *Guilhel. Fabric. Hildan. Observ. Chirurgic. Cent. 1.*

Aulicus quidam Serenissimi Principis ac Domini Dn. Philippi Landgravii Hassiæ, &c. Conradus nomine, natione Helveticus, cum ad oculum sinistrum ictu baculi percussus esset, in ipso momento visum amisit. Protinus dolores exorti sunt, & inflammatio aliqua Adnatæ supervenit, quæ symptomata tamen brevi, adhibitis medicamentis quibuidam remiserunt; verum visus restitui non potuit, etiam si multis, & præclaris quidem uteretur Medicis ac medicamentis. Ego cum anno 1617. ex Hassiæ rediens, & Fridbergi apud Clarissimum & Doctissimum virum Dominum Georgium Fabrum ibidem Castri Imperialis Medicum celeberrimum, amicum meum intimum per dies aliquot moram traherem, jussu Principis sui ad nos venit, quinta decembris, & an, & quibus remediis curari possit, ex nobis perquisivit. Cui de affectu suo, sequens Judicium nostrum ad Principem suum (qui omnem movit lapidem, ut visum recuperare posset) deferendum dedimus.

Non subscripti notum facimus omnibus, quod cum honestus vir Conradus ad nos venisset, & petiisset ut affectum suum oculi sinistri dijudicaremus anque curabilis sit ipsi indicaremus, ex inspectione cognoverimus: Primo ex ipso, quem in oculo recepit, tunicam uveam ita disruptam atque dilaceratam fuisse, ut spiritus vitivi (qui disperguntur) non amplius res objectas inter se distinguere possint. Secundò propter contusionem & inde consequutam inflammationem, humorem Aquæum aliquo modo incrassatum atque inspissatum esse, ita ut res objectæ ad humorem Crystallinum veluti præcipuum & primarium visionis instrumentum, pervenire non possint. Porro quia utrumque symptoma corrigi non potest, præcipue primum, verisimile nobis videtur incurabilem esse affectum. In fidem veritatis præsentem credimus, propiusque manibus subscripsimus Fridbergi Wetteraorum, 5. Decembr. 1617.

*Georgius Faber M. D. Guilhelm. Fabric. Hildanus. Idem cent. 5.*



Puellus quidam 4. annorum ætatis, M. Jacobi de POseat civis Moratensis Aventicorum filius, cùm 20. Maii hujus nati, turbæ infantulorum, qui eærum quendam quatuordecim annorum exagitabant, adlitteret, & cæcus ille bacillum ex una parte acutum in turbam projiceret, puerum prædictum inter omnes innocentissimum attingit, vulnusque ipsi ad sinistram palpebram superiorem intulit. Cecidit mox in terram puer ille, cibumque indigestum evomit, nec ququam cibi aut potus in tertium diem retinere potuit. Accersito barbitonore ejus loci, frutulum pinguedinis extra vulnus propendens reperit, quod filo serico ligatum post dies aliquot fornice abscidit, vulnusque intra quindecim dies, nullis inmissis turundis cicatrice obduxit. Sic salva omnia esse videbantur, sed perperam; post menses enim aliquot, quum parentes observassent, vulum hujus oculi abolitum esse, puerum mihi Bernam adduxerunt 20. Augusti anno 1627. ubi revera hoc oculo cæcum esse infantulum, cognovi. Interim tamen oculi partes extimæ (quantum quidem oculari inspectione cernere potui) omnes illas erant. Imo ne motus quidem depravatus erat, cum tamen muiculus attollens, quem & superbum vocant, proculdubio latus fuerat. Cæterum vulnus hoc, inter cranium & oculum ad nervum opticum usque penetrasse, pinguedo, quæ ex ulcere propendebat, testis est: an vero materia aliqua cruda, circumsciret nervum confluxa, ibidemque retenta, nulla enim inmissa fuit turunda, nemini, nisi Deo notum est. Interim tamen junioribus Medicis & Chirurgis suadeo, ne utrum turundarum in vulneribus profundis, præsertim confusis, ut nonnulli inepti barbitonores, rejiciant negligentque, qui potius vulnus tantisper apertum retineant, donec satis expurgatum fuerit. *Idem Ibidem.*

Digna Ursina Francisci Camerini sartoris uxor, in via delchiavadore commorans, annum 30. suæ ætatis agens, a tribus mensibus oculorum suffusionem contraxerat, cum acerrimo & acutissimo dolore: cui ut subveniret alter Medicus, multa toto illo tempore incalium remedia dederat. Imprimis purgationes reiteratas, julepos & syrupos capitales, & alterantes, pilulas etiam plures reiteratas, coctias, de agarico, lucis, & similes; phlebotomias, sanguisugis, cucurbitulis, frictionibus, & aliis medicis tormentis minime omissis, imò pluries repetitis evacuationibus semper præmissis; cauteriis in utroque brachio concitatis, atque in nucha setone. Quid? misellam tot crucibus dilaniatam, mortem potius quam vitam optetere vidisses. Medicos, Pharmacopæos, & chirurgos perhorrescit ipsa, & eorum quæque non remedia, sed venena appellat: nec sine causa, nam his invitis, morbus semper invasit, & ad morbi sævitiam, loco remedii, cruces & flagella addita fuerunt.

Quis non mecum malam mortalium sortem ingemiscat? Videre proximum langoribus, & doloribus dilaniatum, & auxilii loco graviores morbos, flagella, & cruces ipsi imponi: O cæcasmementes! Quid vobis confert titulorum honos, & gloria? Petenti panem dabitur ne scorpiones? Absit, nobis præfixa chari-

tas in omnibus nostris prævaleat semper. Itaque diris his malis afflictam sequenti methodo, brevi sublevavimus.

Nauseabundo ventriculo, tot remediis perperam adhibitis fracto & dejecto tanquam partipublicæ, sine qua nulla corporis actio perfecta esse potest, stomachicum pulverem nostrum ad aliquot dies dedimus: eo sensim prava symptomata a remediis malorum Medicorum suscitata evanuerunt. Roborato ventriculo, decoctum cholagogum, & cephalicum ad 20. dies accepit, a quo cæcitas, & dolor penitus recesserunt, atque pristina sanitati restituta fuit; nec a decennio post curam, ullum vitæ incommodum persensit *Petri Peter. Obs. Et Curat. Cent. 2.*

Vir olim splendidus, sed id temporis, inops, exceptus hilariore convivio, incaluit usque adeo a vino: ut instar musti, dolia sua rumpentis, quoquo versus exitium molirentur humores, plus nimio in ipso concitati. Quærentes exitum, modò per vomitum, modò per defectionem alvi; modò vero per nares; & quibus ut effusè perfluxit sanguis: sic doluit impense caput: cum febre intensa, præcordiis æstuantibus spiritu gravi; oculis flammigis; & mente tam vehementer perturbata: ut vel cæcus vidisset, bilis ipsi summo-perè turgere.

Cujus impetuosum, quò infringeremus, raptum, infudimus illico Clysterem; & ex soluta prius brachii vena, propinavimus medicamenta, cum cathartica, tum intemperiem corrigentia. Quorum ope, inhibita quidem fuit, sed non tam strictè, effera hæc vis; quin converterit se nihilominus, in nervum opticum inducendo illi pessimam illam cæcitatæ speciem: quam *ἀπὸ τοῦ οὐλοῦ* nominant Græci. In qua, licet omnia oculo sunt pura, nihil tamen vident ægri. Vide Galenum comm. 11. in prorrh. cap. 11. & Aetium tetr. 11. serm. 3. cap. 48.

Cui pertinacissimo vitio, quantumvis protinus, animosa, cum Roberto Verhoevio, ac Nicolao Fontano, obviam itum: cum per ferum candens; tum per stibium potui datum; utique per cucurbitulas scarificatas; Iterum tamenta valida; filum, per cervicem, trajectum; & sanguisugas; affixas non minus temporum, quam oculorum venis. Nequit tamen redintegravit visus: sive ob morbum penitus jam impressum: sive ob vehementiam alicujus veneni: quod æger asseverabat medicis a se adsumptum. Cujus, licet voluerit, exactam haberit rationem: nequit tamen eò unquam perducere, ut ejus exprimeret naturam; nedum a quo datum: satagens clam potius mustitare, quam palam detegere, injuriam sibi illatum. *Nicol. Tulpius Observ. Medic. cap. 32.*

Honesta foemina nondum quadragenaria ex oculis, & halitu, & accubitu mariti, ex lue venerea recens convalescentis, fauces asperari sibi sensit, tonsillas erubescere, & ulcusculis hinc inde obsideri. Advocatus imperitus magistræ tyro, non expurgato prius corpore, aqua mercuriali fauces quotidie illeivit, & in paucis hebdomadibus ulcera omnia ad maleficam cæ-



caticem perduxit. Verum cum verò itagnans adhuc in glandulis faucium impurus humor, cum viam amplius per clausas tonsillas non inveniret, infelici metastasi in utrumque ægræ oculum sese violentius effudit, & ita paulatim invaluit, ut licet omnia in adversum moliente chirurgo oculario, quem re cognita suasi consulendum, malum in funestam cæcitatem degeneraret, nec vel fontis Helenæ collyrio, nec aliis utcumque generosis cederet remediis. Tanti est methodum in medendo vel ignorare, vel negligere. *D. Olai herichii.*

Anni proxime ad exitum currentis die Nov. 3. adfui Nobil. Virgini, natæ 25. annos, quæ circa erat; Palpebris clausis oculi intorti dorsum ad angulos internos decumbabant, nihil prorsus videntes: Gutta serena videbatur ex cerebri narcosi, vel humiditate ejus partis, unde nervi oculorum motori & visori orinuntur, ut & Paralysis oculorum: Præter voluntatem subinde oculus movebatur, sed leviter; concussum fuit ea parte cerebrum à janua cadente. Ipsum quoque cranium inæquale, sinum ostendit circa suturam lambdoideam. Antequam hoc oculorum vitio comprehensa est, copioso sero stillarunt oculi, pulque ex naribus fluxit, ut de cerebri abscessu suspicionem dederit. Cum prorsus visu privetur, metusque sit imminentis vel apoplexiæ vel epilepsiæ *D. Henrichus à Mönichen* Regius Medicus; qui curæ ejus præerat, me una cum celeberrimis Viris *D. Simone Pauli* & *D. Olao Borrichio*, ad consilium vocavit. Communi consensu ad evacuandos humores serosos cerebrum inundantes, caputque exsiccandum & roborandum præscriptæ Pilulæ cephalicæ, lucis, cochis, panchymagogicæ, Crolli, cum resina jalappæ: emplastrum de betonica raso bregmati impositum, & subinde pilulæ de succino Cratonis exhibitæ, aliæque hisce indicationibus inservientia. Post usum horum medicamentorum commotus aliquando uterus, ad vomitum concitavit ægram, quo concusso cerebro, medicamentis præscriptis, roborato, oculi converti sensim, exsiccati scilicet liquoribus nervos laxantibus, coeperunt, pupillæ ad rectam lineam erectæ, palpebræ aperiri, & mox obscure, tandem clarius objecta discernere, magna omnium admiratione, qui perpetuam cæcitatem ipsi ægræ prædixerant. *Thomas Bartholinus.*

*Ex verrucâ in oculi sinistri palpebrâ male curatâ cæcitas.*

Cujusdam quæstoris in Episcopatu Camenensi uxor, myrmeciam, sive verrucam glabram & sessilem in oculi sinistri palpebra multis annis aiebat, nullo adhibito remedio, siquidem molestiæ & doloris erat experta.

Obtulit tandem se quidem ultro Cheirurgus Castrensis opem exigua herbula pollicitus; succo nimirum ex esula recenti expresso verrucam illinivit, simulque linteolum eodem succo imprægnatum oculo clauso sub vespertinam palpebræ unposuit; noctu totius oculi tumor & inflammatio suborta tam atroci cum dolore & cruciatu, ut de vita desperaret ægra. Accersitus ad leniendos immanissimos cruciatus, lac muliebri instillavi oculo, idemque & palpebræ cum

petiis duplicatis tepidè applicui. Fronti autem & temporibus epithema ex repellentibus induxi. Mox ad inflammationem coercendam, aperta in cubito vena, sanguinem ad uncias septem detraxi. Hinc alvum enemate convenienti provocavi, aliæque revulsionum mediæ adhibui. Dolore nihilominus perseverante & immane quantum sevientie cataplasma anodynum tepidè imposui.

24. Pomor. dulc. num. iij. coque ex aq. ros. & plant. q. s. ad molliem, trajiciantur per criorum, pulpæ adde sacchar. albi. 3 ij. camphoræ gr. xi. croci gr. v. M. F. Cataplasma. Hujus uls sæpiusculè repetito immanissimi dolores mitigati, postmodum ex toto remiserunt; quin & ipse tumor sensim disparuit; Oculus vero à mordaci & erodente thyminali succo insigniter læsus in calamitosam cæcitatem concessit. *Baldass. Tineus Casuum Medicin. lib. i.*

*Cæcitas ex ulcere pedis rheumatico intempestive curato.*

Henricus Manteuffel Hæreditarius in Trinicke multis annis ulcere rheumatico pedis sinistri affectus, doloris & molestiæ à fluxu & pruritu sæpe excitatis pertæsus, consolidationem à Cheirurgo petiit, in qua cum frustra per totum semestre occupatus fuisset artifex, tandem ope cujusdam vetulæ, paucorum dierum spacio ulceris oclusionem obtinuit.

Elapso mense uno atque altero in capitis dolores incidit adeo vehementes ut de vita desperaret, paulo post exæcatus est; exinde quolibet mane multum viscidæ ac flavescents fœtidæque materiæ frequenti expuitione cutuissim rejecit, conquestus se quamdiu jejunus esset, eundem fœtorem in ore percipere, quem olim ex ulcere pedis.

Ex intempestiva ulceris diuturni & fluentis oclusionem cæcitatem hanc subortam nullum est dubium. Cum enim longo jam tempore natura aliueverit humores noxios ad pedem deturbare, & per apertum in eo ulcus evacuare, facile fieri potuit ut oclusa via ad partes superiores, ipsumque cerebrum, regurgitaverint, & in principium nervorum opticorum effusi, cæcitatem induxerint; quod ipsum & fœtor quem inger à somno in ore percipit, similis illi quem ulcus olim in pede exhalavit, manifestè indicat. Præmissa itaque, cum universali totius, tum particulari capitis evacuatione, revulsionumque remediis, omni conatu allaborandum censui, ut oclusum ulcus in pede iterum aperiretur, quod cum alio modo obtinere non possem, fonticulum in pede affecto excitavi, sed exiguo cum fructu: Quod enim inde promanabat, nec quantitate, nec qualitate, ulceri continuè & assatim olim fluenti respondebat. Quare denuò omnis generis evacuationes, revulsionem & derivationes institui, exhibitis etiam quæ caput & cerebrum roborarent, materiamque nervis opticis impactam discernerent & absumerent. Tandem & decantatum illud fluxionum remedium, quod setaceum vocant, perforata cervice applicatum, nihilque eorum quæ ad calamitosum hoc malum avertendum facere poterant, intermissum: Sed parum ex voto, nisi quod immanissimi capitis dolores miti-



mitiganti, excitate in hunc usque diem perseverante. *Idem ibidem.*

*Cacitas incantamento curata.*

Anno 1629. Miles quidam gregarius in fortalitio ad portum Colbergensem novissime extructo a Cæliarianis, excubias agens, subito & quasi in momento obæccebatur; nullo corporis, capitis, aut oculorum præcedente morbo, aut vi, vel casu externo. Adductum a Commilitonibus ad me hominem, de corporis constitutione, sanitate & morbo, de victu, de externis aliisque ad causæ investigationem pertinentibus interrogavi, sed nihil eorum quæ excitatem adeo repente & subito inducere possent,prehendi: Oculos itaque accurate inspexi, nec in his quicquam vitii animadverti, omnibus eorundem partibus & coloribus, quin & ipsa pupilla naturaliter constituta. In mentem venit quod de suffusione subito exorta, scribit Heruelius lib. 5. pathol. cap. 5. & de nervorum opticorum obstructione ab agitatibus in cerebro humoribus repente excitata Sennert. lib. 1. Medic. pract. part. 3. sect. 2. cap. 37. Sed & hæc videbantur ad præsentem casum parum facientia. Ut tamen ægri præcibus & Illustriss. Domini, Baronis de Funikirchen sub quo stipendia merebat, satisfacere, tentanda quædam in recenti malo artis præsidia duxi. Et primo quidem ea quæ totum corpus, postmodum quæ caput & cerebrum particulariter purgarent, exhibui, idque repetitis vicibus: Mox & revulsiones institui, phlebotomiam, cucurbitulas scarificatas, vesicatoria, capitis lotiones, topica convenientia, & id genus alia adhibui: Cephalica etiam & ophthalmica quæ caput roborarent & humores noxios absumerent, discuterent & expellerent, præscripsi. Sed frustra omnia. Supervenit tandem, me inscio, verula quædam saga, digitoque saliva obducto palpebras & oculos contrectavit, verba quædam semitertiata submurmurans: Quo facto, subito & quasi in momento visum recepit: Sed periculoso admodum auxilio si Dion credimus, quide passione Domini sermone nono scribit, *beneficia demonum omnibus esse nocentiora vulneribus.* Unde Chrysostomus statuit, *potius mortem homini Christiano obundantem, quam vitam ligaturis vedundam; sanat enim corpus ut animam sibi devinciat diabolus.* Idem ibid.

## CALCULUS.

**C**alculus est corpus durum, tartareum, cephaceum, aut etiam solidius, è multis quasi pelliculis ut plurimum concinnatum, & in omnibus corporis cavitatibus, ac partibus generabile.

Omnes corporis partes, ac cavitates calculi sedes esse possunt, sed hic præcipue de calculo renum ac vesicæ urinariæ verba facturi sumus.

Differunt inter se calculi, quod alii sint duriores ac solidiores, alii vero molliores ac in pulverem facile reducibiles, alii angulosi, triangulares, quadrati, asperi &c. alii rotundi,

laeves &c. calculi renum ut plurimum sunt triangulares ac angulosi, calculi verò vesicæ urinariæ sunt structuræ compactioris & magis rotundi.

Causa calculi secundum Galenum, aliosque veteres est succus pituitosus ac viscidus, calore exsiccatus ac induratus. Hoc est succus crudus atque crassus causa est calculi materialis, qui si visciditatis sit expertus ita ut ejus partes invicem cohzere nequeant, in moleculas arenularum corpus formantes, compingetur, si verò lentus, mucosus & glutinosus fuerit in lapidem conglobabitur. Calor verò secundum eisdem calculi est causa efficiens, illeque non naturalis, sed immoderatus quo scilicet mediante particulæ succi prædicti liquidiore exhalant, atque reliquæ non secus ac lateres in fornacibus siccati indurantur. Verum primò ex succo pituitoso quantumvis indurato ut & amurea exsiccata quis unquam apides, aut aliud quid quàm crustulas enatas videret? Imò rarum est lapides reperire in ipsis pituitæ præcipuis officinis; quid ergo opinabimur eam vias urinarias affectantem, & per renum seccernicula minutissima transcolatam, in ejusdem visceris pelvi aut canalibus ex ipso in vesicam lotium deducentibus, ureteribus ductis, imò in ipsa vesica urinaria in calculos compaginari? Quidni potius filtro suo adhærebit illudque ad instar particularum quæ fontium lapidescentium vim faciunt, in lapideum quid semper commutabit? Aut si in seccerniculis illis dilutior sit, quomodo quæso in ipsis loti stagnis, pelvi scilicet, & vesica urinaria densabitur atque resiccabitur? Dices hoc fieri vi caloris præternaturalis ibidem conclusi, in eoque positam esse calculi causam efficientem; Sed hæc sunt mera verba; Nam primò si calor satis intensus in renum pelvi, aut vesica urinaria daretur qui succum pituitosum in lapideam substantiam concoquere valeret, quomodo ille idem in visceris substantiam non ageret, eamque deassando perderet, siquidem secundum eisdem calormitior ac totus naturalis in ventriculo nidulans, dissolvendis carnibus aliisque multò solidioribus, iisque in pulcritudinem dissolvendis par est; Secundo detur talem calorem adesse qualem illi fingunt; quomodo in pituitam multo sero tenui dilutam agat adeo, ut à menstruo illo secedens murio particularum suarum amplexu in durum corpus compaginetur? Quis potius quotidie non videt saliva in lixivis fortioribus partesque glutinosas iis itidem ut & ipsi urina innatantes, vi caloris suspendi ut liquorem continentem minimè conturbent; imò urinas etiam turbidissimas aliasque omnes quàm purulentas, igni expostas clarescere.

Recentiores quidam, inter quos Celeberr. Menjotius, volunt calculi humani causam eandem esse quæ lapides in macrocosmo gignat, scilicet salinum quid terrestres particulas complectens in lapideam substantiam abire dicunt. Quod explicaturus mox citatus Menjotius, 'a', inquit, ingenita proprietate corporum omnium gluten est & quasi fermentum; ideoque pacis & amicitia symbolum censetur. Hinc conchilia, ovorum testæ, cornua & ossa animalium concretionem suam sali, qui multus ex



illis arte educitur, ferunt acceptam; hinc animalium duris cibis vescientium foeces uberri-  
mo continent sale, ac sterces canis ossivori an-  
ginosum tumorem strenue discutit. Latercu-  
li & tegulae non ex quavis terra vi ignis co-  
quantur, sed ex terra sale referta; ideoque  
viscida & cohaerente quam vulgus pinguem,  
sicut salem quo terra fecundatur, pinguedi-  
nem vocat; sed improprie: hæc namque fer-  
tilitati potius officeret: Lapis etiam ille  
osteocolla dictus, habens pro domicilio, præ  
ceteris Germaniæ locis, Heidelbergensem  
tractum, qui pondo semidrachmæ ossa fracta  
ferruminat, totus fere resolvitur in salem: li-  
gna tantò sunt solidiora, quantò plùs sunt sa-  
le onusta, ut fagus, quercus, guaiacum, ebe-  
num quod aquæ demergitur. Lacrymæ in-  
super quæ paululum salis, in tenuissimas tor-  
mentur arenulas, quibus seu pulvisculo, gen-  
arum limbi ac cilia asperguntur, oculi ædus  
dicuntur Hippocrati; in o cervorum lachry-  
mæ vertuntur in lapillum quem venatores ad-  
versus serpentum ictus morsusque curiose re-  
condunt. Tandem lapidum non natura micro-  
ta est, plantasque summittit ejusdem indolis par-  
ticipes. Sic prope Arelatem in campis Her-  
culeis (Crantiam vocant) inter congeriem  
lapidum incredibilem, herba enascitur, quæ, ut  
pote multo sale gravata, mirum in modum  
pecora sugiuntur. Hæc ille, quibus addimus  
hanc sententiam eo facilius excipi posse, quod  
non eadem incurrat incommoda quæ de pitui-  
ta mox diximus, non enim necessario nitro  
suo renum scilicet fibrosæ seu potius vasculo-  
sæ substantiæ adhaeret, sed liberius eandem  
permeando in chrystallos, arenulas sentimque  
grandiores lapides concrevit, quo n.odo vi-  
demus quotidie salium nitrosorum particulas,  
rimulas ac porulos rupium pervadentes, in  
ipso egressu in lapideum quid abire, illudque  
modo opacum, modo pellucidum, modo hoc,  
modo alio etiam colore tinctum. Interim ta-  
men spondum sic satis patet, quid in ipsis re-  
num aut vesicæ atris salinam hanc materiam  
ad coagulationem promptam disponat, nec  
enim ex omnibus rupibus stillans in chrystal-  
los abit, sed in quibusdam tantum, in quibus  
scilicet specifica vis inheret, quæ egressui pa-  
ratam materiam salinam congelationi aptam  
faciat, at æter conclusitur specifica qualitate  
imbutus ac imprægnatus. Itaque hic cum  
Helmontio non tantum l. linum aliquod prin-  
cipium in genere, at illud duplex statuimus li-  
xiviosum unum aliud acidum quorum concursu  
massa efformatur, quæ quandoque, dum sci-  
licet succum crudorem seu pituitosum com-  
plectitur albida est, quandoque, dum l. ngui-  
ne per venulas stillante seroque excepto tin-  
gitur, rubra evadit. At quandoquidem ma-  
teria illa lixivialis in urina naturaliter consti-  
tuta, nuda non reperitur, ut in illam agere  
valeant spiritus acidi advenientes, quod ad  
coagulationem prædictam necessarium est; prop-  
terea omnes homines calculo non sunt obno-  
xii, ut aliàs proculdubio contingeret, sed  
illi tantum in quibus hæreditaria, aut aliunde  
acquisita dispositio fermentum in renes  
induxit miscellæ urinae naturali destruendæ ei-  
demque quasi putrefaciendæ aptum, unde

pars lixivialis atque sal urinae volatile sui ju-  
ris factum, cum in acido in omnibus cor-  
poris nostri partibus facile reperibili, intimius  
cohaerescit. Hæc exemplo spir. urinae volatilis  
cum spiritu vini, ac potius spir. sulphuris aci-  
di cum oleo tartari per deliquium &c. illu-  
strare necessarium non est.

Causæ calculi externæ, sunt primò Ingu-  
vies, & præcipue alimentorum crassiorum,  
dyspeptorum, saliorum, saccharatorum, terre-  
strum, crudorum succoque lapidifico tur-  
gentium, qualia sunt pyra, ovorum indurato-  
rum, lactisque propter caseosam partem admi-  
scam, at undantior usus. Hisce omnibus ad-  
de panem azymum aut male coctum, e tru-  
mento pulverulento nec rite repurgato conte-  
ctum, nec non biscotum ac nauticum, imò  
ejusdem crustarum crebrum uinum, præterea  
aquæ canosæ pluribusque salibus prægnantes,  
vinæ generosæ ac in terra lapidosa nata, ut  
eti in turbida, somnum diuturniorem & a cibo,  
tergi ad ignem obversionem, lupinum in culci-  
tra decurritum, exercitationes a pascu, balnea  
intempetiva, vitam deandem, ventris astri-  
ctionem, venerem immodestam, tristitiam  
uberem læulentorum humorem fontem, &  
alias de quibus *Memorius Dissertatione de Ne-  
phritide*. Ex hisce omnibus patet puerulos at-  
que senes calculo esse præcipue obnoxios de-  
bere propter crudorum & indigestorum suc-  
corum salibus crassioribus onustorum in utrif-  
que saburram, illic quidem per ingluviem, hic  
verò per debilitatum ventriculum partesque  
digestionibus variis inservientes, accumula-  
tam.

Signa Diagnostica Calculi renalis traduntur  
apud Menionum capite de Nephritide, Et mul-  
lerum in Collegio Practico capite de calculo  
renum & vesicæ, Lucam Tozzi Medicinæ Pra-  
cticæ lib. 1. c. p. de renum dolore & nephritide:  
sed cum distincte admodum et paucis verbis  
a Jo. n. Groenevelt Dissertatione lithologica  
describantur non opus erit aliunde ea expecta-  
mus; Illa itaque ex ipso sic habeto.

1. Dolor circa regionem lumbarem fixus  
omnino & stabilis, obtusus quidem, & gravan-  
tis ponderis sensum inferens, cum in ipso re-  
num parenchymate, obtusiore ut pote sensu  
donato, calculus stabulatur, at ubi in caput  
ureteris sese insinuavit, acutus, lancinans,  
omniumque crudelissimus.

Quinque jam annis circum circa elapsis,  
ægroratus quidam Ischuria laborans, consilium  
nostrum imploravit (urinam nullam emittebat)  
nisi quod vomitu sursum excernebatur, (urina-  
lem quoque odorem exspiratio præ se ferebat)  
quo continuato maxime debilitatus fuit, con-  
sultis aliis non imæ notæ Medicis, multis re-  
mediis usi fuimus, sed frustra, vitam tandem  
cum morte mutavit; corpus ejus cum dissectum  
fuerit, pelvis renis dextri majori calculo fuit  
oppleta, cujus pars inferior, papillæ in mo-  
dum protuberans, ureterem omnino obstrue-  
bat; capiti ureteris sinistri acutus calculus  
adeo exactè erat infixus ut renes utrique suo  
officio fungi nequiquam potuerint, atque adeo  
expiravit.

2. Spinam inflectendi difficultas, compressis  
scilicet distentisque ejus nervis aut musculis.

3. Calo



3. Calor lumborum molestus prurium.

4. Stupor tenoris crurisque ē directo, ob impressionem (ā calculi grandioris pondere) ulculi, & dicti, vel nervi in omnes crura musculos divaricati.

5. Testiculi retractio e regione affecti renis, valorum (quæ a renibus ad testes vergunt) sus superiora adductionem.

6. Nausea & vomitus propter consensum cet renium cum ventriculo, qui fit non tam facile, ut volunt, peritonæo, cuius membrum utrumque viscus participat, quam quibus ob communem illum nervulum, a stomachi sexti paris ræno, in propriam & internam renium tunicam implantatum.

Urina plerumque cruenta, laceratilis, pertisque a calculi asperioris atteritio, venulis, per renis substantiam dispersis quin & quandoque, præsertim circa initium tenuis, aquosa, & parvâ copîa prodierit propter renis a calculo obstructionem, quos vero per ureteres in vesicam demittitur, tunc crantz, turbidæ & aquosæ ut plurimum pæcernuntur.

7. Calculos per urinas excretos, ut & arenas (in quæ valorum lateribus adherent, se quæ sit. tum matule fundum petunt) unde ægroti notabile levamen sentiunt, inter præcipua signa recenseri veliem.

ed quia tanta est similitudo nephritidis cum dolore colico, ut non solum sæpissime empiricum, sed & Medicum rationalem falli contingat, distinctionis ergo hæc signa notari velles.

Si supra renes sit dolor, non ad renes sed ad intestina pertinet.

Dolor Nephriticus extrorsum vergit, nec ab eo loco unquam discedit, nisi cum soporibus, e nudo suo excussus, delabitur in ureterem.

Colicus verò sæpissime peregrinatur, locum mutat, & per omnem intestinorum circuitum oberrat, inque pæcinem declinat.

Nephritici a sumpto alimento melius, colici vero pejus habent. *Hæc ille.*

Conveniunt interim Autores nil prorsus certi e signis prædictis decerni posse, sed dubium semper relinquit, an arena, an phlegma grumæ sanguinis, an pus crassum an natus ureterem subeuntes dolorem nephriticum procreent, de quibus ipso de Nephritide capite. In ulteriorem vero nephriticorum dolorum a colici distinctionem hæc adjecimus ex Menorio. Dolor colicus pro coli positione ascendere potius videtur, nephriticus descendere secundum ureterum ductum. Colicus dolor supernis infernisque vacuationibus, seu naturalibus, seu artificialibus, vel mitigatur vel prorsus desinit; ni forsitan ejus materia geminis intestinorum tunicis involuta fuerit ac intricata: Nephriticus paululum equidem concedit, quod depletis intestinis non ita coarctentur renes, verum minus quam colicus, constitit lapidis stimulo. Colico dolori associatur quidem vomitus, sed non ut in nephritico biliosus & æruginosus post pituitolum. Ob intestinorum cum ventriculo continuitatem, nausea, vomitus, cibi fastidium, dyspepsia, similiaque symptomata in colico dolore magis

vigent: in nephritico verò, propter renium cum lumbis connexionem, corporis flexendi erigendique impotentia magis urget; crura etiam torpet e directo, quod clicum est a colico cruciatu. Per colicos dolores fæces, & quandoque etiam flatus resistunt; per nephriticos urina aut tenetur aut vitiosa emittitur. Denique laxatis vis per fœtus & cataplasmata, nephriticus dolor multum remittit; colicus tantillum quidem lentescit, sed illico invalescit, diffusis a calore humoribus, adaugetoque statuum proventu, ex Aetio. Porro omittendum non est nephritico dolori colicum, cum que ut plurimum a bile solere complicari.

Signa Diagnostica Calculi Vesicæ ex Helidæo pro certis habentur si post meiendi desiderium etiam adsit desiderium excernendi fæces intestinorum: & si ægri dum humi ponderosum quid tollere volentes se inclinant in vesicæ regione sentiunt puncturam. Deinde si inter mingendum supprimatur urina, æger vero pedibus in altum sublatis postmodum liberè mingat. Omnia autem prope calculi vesicalis signa sic accuratissime describit Clariss. Joan. Gronevelt in sua Dissert. Lithologica. 1. In principio, cum calculus adhuc minor est, fit, ut calculosus excreta jam urina, obtusioris dolorem in glande sentiat, qui dolor a glande per urethram vergit ad vesicam, eodem modo ac si stranguriam pateretur. Asperitate enim sua quamvis calculus minor sit vesicæ tamen cervicem pungit, adeoque dolorem glandi infert, qui dolor a glande revertit ad vesicam.

2. Calculosus anteriorem virgæ ferè partem semper, præcipue verò urinam redditurus, digitis fricat, comprimit, trahit, ac mulget, & hinc sic quoddam infantem calculosum semper manum brachis admoveant, & vellicando membrum virile, dimidia ferè parte solito longius faciant.

3. Si gravior sit calculus, dolorem tunc gravativum sentit calculosus, ac si grave quoddam pondus infimo ipsius ventri ac intestino recto inter ossa pubis incumberet, eaque deorsum deprimeret, dolorem patitur tunc præterea circa umbilicum, quia fundo suo per urachum umbilico jungitur vesica.

4. Si calculus meatum urinarium non omnino obstruit, natura ad expellendam urinam sæpius irritatur, sed frustra; aliquando effluit paululum; aliquando continuo volenti volenti urina emittitur, dolore interim semper ægrum affligente.

5. Sursum elevatis pedibus, capite ad terram demisso, sæpius evenit, ut calculus ad vesicæ fundum delabatur, urinaque liberiolem exitum nanciscatur.

6. Extra paroxysmum videmus non raro calculo afflictum crura sua transversim complicare, eo enim modo calculus aliquo modo e collo vesicæ sursum elevatur, ita ut urina exitum liberiolem habeat.

7. Urina detenta, acris & ardens, præ doloris magnitudine, quam excitat, spiritus ad virgam allicit, sicque virile membrum in infantibus æque ac adultis, tenditur & erigitur, non ex venereo quodam appetitu & libidine, ut aliàs quis crederet.

8. Ex consensu sphincteris ani & vesicæ, ob



nervorum, quos ab uno ramo recipiunt communionem & colligentiam, *simultaneos desiderandi* sciendique calculo afflicti habet conatus. sed iritationes illæ frustaneæ sunt, & si quid excernatur, parum est, idque cum cruciatus; in infantibus sæpius summius sit intestini recti prolapsus.

9. Calculosi plerique continuo sitiunt, & sæpius multum potum appetunt, quia, quamvis parum urinae singulis vicibus excernunt, ob frequentem tamen ac crebram excretionem multum urinae emittunt, & sic serum sanguinis absuntur, quod natura quidem compensare, adeoque interiora viscera in conveniente suo temperamento ac symmetria naturali conservare illudet: ob continuos porro dolores, vigilæ & inquietudines oriuntur, salsum in illis acrius redditur, sanguinis etiam massa magis in dies incalescit, unde multum ac crebrum refrigerium requiritur, aliquando etiam léterici, Hydropici, similesque affectus sequuntur.

10. Ab opiatibus assumptis melius sese habent calculosi, à diureticis vero potentioribus in pejorem vergunt intemperiem.

11. Hippocrates (Aphor. 79. Sect. 4.) vesicam calculo laborare ex urinis hoc modo judicat *ὁ νόστος ἐν αὐτῇ φανερὰν*, &c. Joann. Zechius in Consult. Med. libr. consult. 58. per *φανερὰν* intelligit sabulum crassum, coenolum excrementum (narium veluti mucum) matula fundo tenaciter adhærescens, quod calculi majoris in vesica, & diu illic concreti signum est pathognomonicum.

12. Certum est cum digitum in anum puero rum intrudunt, vel catheterem per urethram in vesicam adultorum immittunt, & explorant sæpius, calculus an sit, vel quoruplex sit, magnus an parvus, unus vel plures, multum enim interest Medico hæc exacte novisse.

Huc quoque causarum antecedentium consideratio spectat, nim. temperamenti, diætæ quam habuit æger, symptomatum quæ subijt; hinc dubio enim crudelem fuit passus dolorem, si calculus sit magnus, durus, & inæqualis, porro an sacculo inclusi sint calculi, & vesicæ membranæ cum eo adhærescant, cognitum quamvis sit necessarium, difficillimum tamen, nisi cathetere vel digito investigetur. *Atque hæc ille.*

Signa autem hæc nunc plura, nunc pauciora, vix imò nunquam omnia, si in eodem individuo reperiuntur, & etiam illud contingeret non minus interdum forent fallacia; quia aliquatenus sunt æquivoca, & aliis vesicæ, partiumque vicinarum morbis communia. Rarus est casus illust. Calauboni, in quo concursus aderat omnium prope signorum enarratorum, interim eorundem causa non in oculis, qui tantum minimi & exquisitè rotundi, in vesicæ rugis profundioribus visi sunt; sed partim in corpore caroso meatu urinarii radicem occupante, & foris intrò resistente, partim & præcipue in vesicæ hernia, quæ quasi in sacculum aberat capacitatis ad vesicam sextuplæ, prout hæc omnia luse, nec minus doctè describit D. de Mayerne in historia vesicæ monstroræ magni Calauboni, quam proprio nomine divulgavit Brouardus; & nos Bibliothecæ Anatomicae Vol. 1. pag. 187. & sequ. inseruimus. Signa iuvoca quod spectat, ea non

sunt alia quam exploratio per specillum in viciniam immittitur, vel digitos in anum: ut v. l. lierum, vulvam introductos; nec etiam in infidendum quasi nunquam prius sceleret; Clar. Von Hammen in Epistola ad Clar. Chlin. de mendaci vesicæ calculo enarratio dicit se in viro sexagenario v. riis calculosis cruciatibus afflicto, corpus durum per specillum in vesica invenisse, quod dum evocare sectionem tentaret, illud non calculum sed vesicæ tumorem esse vidit, quem tamen fructum illafo cui adhærebat vesicæ sphincter, educere licuit. Præterea speculum etiam lit quando lapidem contentum non adiunt, cujus rei historiam raram profert Benerovaticus in Epistola ad Beverovicium abnobili Veneto, qui stranguria laborans cum confidentia materiæ tartareæ, diureticis refrigerantibus & lacte caprillo quasi sanatus, æteteri immisso nullum præsentis calculi quum præbuit, & postea & curru & equo sine ulla molestia iter habuit; dum vero tandem factus obiret, vesica aperta calculum magnitudinis ovi gallinacii, nec mucositas, nec membrana aliqua involutum, in suavitæ commoustravit. Sæpè etiam in inhabitis t. l. consiliis ille qui inter urinam & aerem per catheterem se insinuantes, oritur; nam eo addito crederes in corpus aliquod extraneum & durum allidi.

Quam autem infida sit etiam ipsa calculi per specillum, seu catheterem exploratio, obis aliquando satis constitit in Marrona apud Nostros Nobili, quæ cum diu alicuiusmodi doloribus, non tantum afflicta, sed quasi contrita fuisset, de Clariss. Medicorum Ordinariorum sententia (renuentibus licet aliis) calculo vesicæ laborare creditum est, tunc ea propter exploratio a peritissimo Lithotomo e Vicinia advocato instituta, qui prima vice calculum sibi occurrere, sed mucos, seu membrana vestitum asseruavit, ita ut opinatus ierit calculum vesicæ parietibus impactum, & immobilem, membrana ejusdem interiori contriti; post tamen aliquas injectiones detergentes, exploratorio instrumento rursus adhibito, idem ille jam in calculum nudum, in quem etiam cum sensibili atque evidentissimo sono allideret, se incidere pronunciavit; Sic itaque omnia ad extractionem in tempestate commoda methodo ordinaria peragendam parantur; interea tamen moritur Aegra, præ morbo inducias dare nescio, & cruciatus novos, quasi totidem malignos, atque numis funestos sætus in dies pariente. Cadaver, me absente, quamvis prius aliquoties consulto, à Dexterrimo Chirurgo D. Jacobo Coudougnant, statim de Nobilis M. tronæ Mariti petitione, præsentibus D. Medicis Ordinariis, aperitur, cumque ad vias urinarias recta perventum esset, ren dexter calculo minoris castaneæ magnitudine, multoque pure, scilicet ad uncias circiter octo, obseium reperitur, vesica verò urinaria omnino vacua, & per fibras suas, propter iritationem præcedentem, ita contracta, ut in cavitatem suam vix sabam majorem admitteret. Reputab. ne prædicti Clar. Medici laceratam fuisse vesicam, licque contentum calculum in abdominis cavum erupisse;

verum



verum perquisitione diligentiori facta, contrarium tandem perceptum: revera vesica lunicum aliquatenus lacerum deprehenderunt, & duplicaturæ peritonæi uniusque adherentem; scilicet ichor ille qui continuo e rene, ut supra dictum, inlato depluens, urinæ in vesicâ immiscebatur, non tantum dysuriam creabat, sed etiam a prædictæ vesicæ parietibus imbibitus, eas sentit & ærit, & vicinæ præter naturam univit; sic videmus præputium balano, pleuram pulmonum lobis, aliasque partes per serosos & corrodescentes humores sæpius invicem neci, & aliquando nihi in cane a Cl. Viri. Domino Zvivy Glareano Helvetico Medicinæ tum Candidato, nunc Practico apud suos Celeberrimo & Anatomico eximio, apud me exacto videre contigit costas aliquot inferiores per laticum prius imictum disruptas, sanienque interius stillantes, medio prope diaphragmati intime adhaerente, vulnere aliàs absolute sanato; ut & in eodem majorem hepatis superficiem partem peritonæo undique alligatam, propter vim illi visceri factam in ictu præmemorato, unde ex eo serosus ichor transudavit qui glutinis vices egerit. Sed ad rem revertamur, & explicemus quid causæ fuerit, cur peritus atque veridicissimus Lithotomus de calculi vesicæ præsentia tam confidenter cum Medicis assidentibus, pronuntiavit, exploratione dexteriter per specillum facta? Supper hoc recurrendum credimus ad ea quæ mox attulimus, nec amplius verbum addere necessarium credimus.

Prognosis Calculi renum & vesicæ ex mox citato Joan. Groenevelt hæc est.

Pueri, inquit Hippocrates 6. Epidem. maximè vesicæ, senes renum calculo magis sunt obnoxii. Et aphor. VI. renum & vesicæ vitia in senibus difficulter sanantur.

Litans a parentibus in sobolem, primigenia seminis labe, omnem ferme, quamvis alioquin generosissimam spernit eluditque medicinam tam prophylaxeos quam curationis ergo adhibitam, unde Aretæus multo difficilius esse putavit, renes aut vesicam, dispositionibus calculi obnoxia, artis beneficio ab illis generandis impediri, quam uterum secunditate luxuriantem a concipiendis fortibus.

Vesicæ calculus pharmacorum respectu curationis difficilior quam qui in renibus est; si vero chirurgiam spectemus, longè sæpè facilior; aliquando tamen, doloribus ad spinæ musculos extra vergentibus abscessu facto, illac calculos excretos, & ulcus consolidatum fuisse, constat. Calculus vehemens & periculosus est malum, inflammationes, exulcerationes, dolores atroces, vigilias, febres, urinæ suppressionem, aliæque gravissima symptomata inferens.

Si calculus non sit magnus sed parvus, non in corpore cachectico, nec humorum ad calculum generandum magna copia adsit, non hæreditaria ad illum dispositio, bona, contraria vero si adfuerint, mala exinde prognostici habienda est.

Si calculus sit satis magnus & durus, æger operationi chirurgicæ, quamvis periculi plenæ, si ab eo liberari velit, sese subiciat necesse est.

Quod si lapis sit inusuetæ magnitudinis & ponderis qualem in plurium præsentia eduximus e cadavere N. 1. juxta Nosocomium S. J. qui 19. uncias & tres drachmas pendebat, tales pro desperatis habendi sunt, & maxime, dum vivunt attingendi.

Qui calculum live folliculo inclusum live solum vesicæ membranæ tamen annexum in suo gestat corpore, in eodem prædicamento versatur, ut & tenes debiles, pueri & infantes, minori ætate, sed infirmi.

E contra, si vires consent ægis, viscera bene sint disposita, calculus non sit nimis magnus, quamvis sint plures, implorato Dei auxilio, operatio animose aggredienda, & de ejus successu bene sperandum est.

Felicius & securius ejiciuntur & extrahuntur calculi in mulieribus, quam in viris, quia brevem & amplum habent urinæ meatum.

De Indicationibus & Curatione vide quæ sequuntur.

### Curationes.

In cura Calculi ab initio Clyster injiciendus leniens & flatus discutiens, ne scilicet natus & excrementa in intestinis contenta renes comprimant & dolores augeant. Flatus dico, quia calculoli plerumque generant flatuum copiam propter ventriculi imbecillitatem. Fortes autem clysteres & diuretica, solaque solutiva ab initio devitanda, quia humores agitant, qui agitati ad renes decumbunt & dolorem augent. Diuretica vero serosos humores ad renes dirigunt, unde dolor quoque augetur. Statim quoque regio renum inungatur oleo sequenti:

℞. Ol. scorpion. part. j. terebinthin. part. β. superposito Emplastro, quod.

℞. Cerati infrigidantis Galeni ℥iij. ung. rosæ. camphorat. ℥ij. Opiat. ℥ij. extensa tur super alutam, qua regio renum tegitur. intra corpus assumat olei An. gal. rum. ducium ℥ij. in jussulo aliquo cum euentia Croci g. vj. ipsius ℥β. ut via laxentur. His peractis, si patiens Plethoricus fuerit, vena secari potest, ne sanguinis multitudo ob dolorem & tensionem in partem dolentem ruat ac dolorem augeat. Offerri etiam potest dosis laud. n. opiat, imo, si dolor sit vehemens, ex eo fieri potest Emplastrum renibus applicandum: actur etiam syrupus de mucaginibus cum emulsione 4. sem. frig. majorum: hinc exhibeatur bolus ex Cassia recans extracta. Et si dolor non remittat, fiat balneum in quo æger sedeat usque ad brachia.

℞. Rad. malv. althææ an. ℥ij. flor. chamomill. melilot. an p. iij. rellæ bovis p. vj. sem. fenicul. ℥viij. lini ℥iij. bacc. juniper. m. iij. Coque in f. q. aquæ pro balneo, in quo contineatur per horam 1. vel 2. Post 2. horas si non remittat dolor, parum se moveat ambulando per cubiculum, & iterum ingrediatur balneum, in eo sedens assumat gr. vj. olei oculorum cancerorum (quod præparatur sequenti modo:)

℞. Pulv. cancerorum ℥v. olei tartari per deliquium facti ℥vj. mista diger. ntur in B. vel bimo equino per 15. dies, postea coagula ma-



etiam in phiala in aënam locata, tandem pulveris, pulverem cum spiritu vini extr. he in 10. mani olei spississimi abstrahendo inde sp. Vini redige, dosis a gr. iij. ad vj. in aqua petroselin vel ononidis cum syrup. de nucisagibus ʒiʒ. aut si cares oleo isto:

℞. Oculorum cancerorum preparato. um, trochiscor. de Alkekengi opt. pulveris totum an. ʒiʒ. detur cum syrupo dicto: potest etiam cataplasmati loco applicari regioni Renum Nefrurium in lacte coctum.

Hinc ad ea, quæ proprietate quadam Calculum pellunt, accedendum, quæ omnia dolore prius presente in balneo asserenda, in quo aget, ut dictum, commoretur, præmissa tamen, si inducias patiatur dolor, purgatione leni, quæ sit apozemate aut syrupo aliquo.

℞. Fruct. alkekengi ʒʒ. rhabarb. elect. trochisc. de agarico an. ʒj. nuc. mosch. ʒʒ. Decoque in f. q. aq. comm. ad ʒvj. colaturæ adde syrup. de ʒ. radicibus, de cichorio cum rhabarb. ana ʒiʒ. ℞. Apozema pro duabus dosibus. Medicamenta quæ proprietate quadam contra hunc morbum faciunt, sunt: 1. Aqua Antinephritica.

℞. R. d. rellæ bovis ʒʒ. in iuviti concisæ macerentur in vini generosi ʒiʒ. per 3. dies. Deinde exprimantur & colentur. In colatura macerentur, Rad. petroselin. eryngii, p. rietariz, herb. herniariz, f. xifragiz cum toto an. ʒiij. fruct. alkekengi, granor juniper. con. quasi t. an. ʒiij. sem. fenicul. urticæ, melonum, nulli solis an. ʒij. Omnia incisa in dicta Colatura macerentur per 4. dies, fortiterque exprimantur, expresso adde succi portulac. ʒiʒ. destillentur per Alembicum. Dosis Coch. ij. tum præservacionis, tum curationis ratione. 2. Commendatur sequens, quum aq. Luckero-rum aliqui nominant.

℞. Rad. liquiritiz ʒij. petroselin. ononidis, pimpinellæ an. ʒiʒ. enulæ ʒj. fol. heder. terrestr. m. iij. sem. fenicul. urticæ an. ʒvj. succi heder. terrestris ʒv. præmissa per 3. dies infusione destilla, aqua. servetur, cui syr. de Caryophyllis vel de Canelli pro conimento admisceri potest, dosis ut præcedentis. Huc spectat oculor. cancerorum oleum supra descriptum. Ut autem reliquæ & mucus in renibus & vesica existens expurgetur, & dictæ partes corroborentur nodulum sequentem in vino maceret, & singulis diebus matutinis h. nilum, nodulo tamen expresso, assumat. Nodulus sit talis.

℞. Lign. cassiæ nephriticæ an. ʒiʒ. rad. polypod. petroselin. n. ʒij. restæ bovis, pum-pinel & f. nguisorbæ an. ʒiʒ. sparag. acid. nostr. an. ʒij. irid. Florent. ʒʒ. turibth albissimi ʒij. herb. rorini. r. fragariæ, saxifragiæ, pimpi-neill. an. m. f. flor. rosar. borragin. an. p. j. le-min. anis. fenicul. sileris montani an. ʒʒ. fruct. alkekeng. Nut. vi. cinnâm. elect. ʒʒ. macis ʒij. Contusa ligentur in sindone rubro. F. Nodulus in ʒiij. Vini per tres dies macerandus. Alternis quoque diebus capiat ʒʒ. terebinthinæ lotæ in aqua Halicacabi & interdum cum syrupo sequente aut etiam in vino calido cum spiritu terebinthinæ ʒʒ. It. ad libitum tempore matutino in usu habet Morculos Imperatorios, quibus ol. nuc. mosch. destillat. insillet gutt. . ad iij. S. rhipus fiat ex syr. ʒ. radicib.

ʒiij. è lupulo ʒij. aq. petroselin halicacab. an. ʒiʒ. Capi t cochl. j. vel ij. cum spiritu Terebinthinæ ʒʒ. Si à potione dicti jam noduli: l-vus non sit libera, aliquo ex superioribus dictis syrupis, aut alio ad placitum purg. nre leniter purgetur. Si lignum Nephriticum verum haberi possit, maceretur ʒʒ. in vino per 7. dies, vinumque libatur mane: ab eo assu: pro se exerce. t aget. Ad miraculum, si repetatur, renum calculosam dispositionem emendat, eos contortando & materiam lapidis sine molestia eaucendo. Celebre Nephriticum paratur ex capitulis illis callosis, in fructibus Cynosbati live rosæ caninz innafer solitis, Germanis *Schlafpfel*. capitella ita per medium dissecta callosa sunt, ac in centro corum plerumque reperiuntur Vermiculi viij. Itæp ratio ut exsiccat & pulverisatis, exemptis tamen vermibus, in modum extracti cum spiritu vini præparatur.

*In Calculo vesicæ.*

• Lithontripticon famosum ex millepedibus describitur in notis ad Crollium: quo resolu calculum ovi magnitudinem excedentem. Methodu medendi calculo tradit Merc. tus Tom. 3. lib. 4. cap. 10. Præter ista omnia maxime utile est ut quolibet anno expurget humores crudos cum cassia & Terebinthina. Post purgationem venæ sectio. & post urinæ procuracionem Evacuatio etiam singulis mensibus potest institui. Hujus (supra dicti) speciei administratio est talis: 1. Purgetur patiens calculi velle purgante conveniente. Præstat in hoc calu speciem purgans Paracelsi, acres purgationes reliquæ hic minus locum habere possunt. 2.

℞. Pulv. Oniscorum a ʒʒ. ad ʒiij. spir. vini; a ʒj. ad ʒiʒ. (biliois mectur tantum sp. vini) juris Cicerum tubeorum ʒj. m. Hanc mixturam exhibe totam, deinceps singulis diebus p. tienti mane jejuno ventriculo, quinque nempe horis ante passum: ita tamen, ut semper ante sumptionem speciei Enema molliens & lene sine acrimonia purgantium capiat (nisi nimirum alvus libera:) usum hujus speciei excipit febris, ac deinceps per totius curæ cursum uratur dictâ convenienti & molli, ne usquam alvus obstruatur, (ab initio ne detur vinum ante diem 16.)

Post assumptum specificum sequitur Calor fere totius Corporis præter naturam. It. sitis molesta & dolores circa pubem sentiuntur. Medicamentum hoc lapidem Vesicæ vi quâdam invadere solet: quapropter omnia calida diligenter evitentur, & nonnumquam lapidis prunellæ aliquid in aqua fragorum aut fl. fabarum. It. Julapium ex illis aquis cum syrupo violaceo & guttis iij. vel iij. spir. vituoli exhibeatur. Diebus primis urina inprimis progreditur admodum crassa & exigua, sequentibus v. diebus utpote 9. 10. 11. &c. copiosius, calor remittit, dolores sistuntur, & universa substantia calculi comminuta in minimas partes progreditur. Urina nimirum toto cursu curæ collecta, si bulliendo, exsicceetur, tandem prodit quantitatem calculi; denuò in lapidem convertibilem, si cum solutione Tragac. vel Ichthyocollæ conformetur.

N. B. interdum in hac cura opus est, ut aliquando dies unus atque alter vacuus sit ab hac



hac medicina, & quiescat pateriens propter vires colligendas, idque in tenerioribus locum habere potest. Hoc tamen hic observandum, ut medicamenta interdum per Catheterem in venter mittantur, & iterum statim in B. locetur, inungitur post Balneum calide percreta & perinæum ol. scorpionum amygdalarum an. r. ru. n. axungia cuniculi, & gallinarum ana ʒij. succi parietarie ʒij. Lapis vesicæ confirmatus jam sit, & ad aliquam magnitudinem jam pervenit, vix alia ratione curari potest, quam sectione. Poterit tamen tractari supra dictis, præsertim in mulieribus, in quibus via laxior & recta.

*Tinctura antinephritica & splenetica.*

℞ Niri purif. part. ij. Tart. part. j. trita in f. regine decrepitate. contulis iterum in M.B. calido mortario attrunde tntu n Aq. fraxini vel cardui benedicti. aut alterius cuiusvis aquæ specificæ, quantum ad solutionem necessarium, nec plus, quod observa & coletur. Colaturæ adde tartar. opt. crud. pulv. & in vase amplo ligneo colloca ne quid fermentatione, quæ sequitur, effluens pereat; Extrahatur tinctura Tartari rubicundissima; Coletur denuo & servetur usui cuius non satis laudandus, ad calculum enim & affectus lienosos præsentissimum & expertum est remedium, statumque optime dispellit, principio prædicti ad ʒj. datum. *Joan. Hermann. in Præf. Chymiatric.*

In calculo renum, in Diæta radices petroselinæ & herba ejus, si exinde juscula parentur, cavet, ne calculus augeatur. Cratō p riter in his affectibus cynosbati fructus commendat. Oleum amygd. dulcium recens dilatat ureteres. Conveniunt etiam gran: juniperi in ci o. Communientia sunt lignum Nephriticum; Dicitur etiam santalum coruleum, quia aq. tingit colore caruleo & flavo pro diversitate diversitatis ad lucem ponatur, videtur flavum, si verò in umbra, caruleum, alias non potest distingui ab alio. Santalo. Porro aq. fragorum coruidentemque syrupus, emulsiō ex sem. 4. frig. majoribus, semen violarum, ut & pediculi violarum, qui mira hic præstant cum aliis abjiciantur. Fortioribus pellentibus semper addenda sunt laxativa in calculo usitata, ut cathol. terebinthinatum Mynsichti, ejusdem pilul. terebinthinatæ, syrupus nephrocatharticus. Clysteres ad curationem prolunt emollientes, additis carminativis & specificis; V. S. Ego non adhibeo, nec aliquid juvare posse arbitror. Laxant alias vias syrupus de althea Ferneli, de mucilagibus, f. r. violarum ex floribus cum folliculis, ubi semen in est, quod purgat & pellit calculum. Externe ol. amygd. dulcium lubricat; Miscetur cum succo citri. Magisterium tartar. vitriolat. debet misceri cum salibus appropriatis, vel dissolvatur cum brodio in quo petroselinum coctum fuerit, conterit enim frangitque calculum. Lapis spongiæ, lycis & judæicus huc pertinent, ex quibus ego habeo peculiarem liquorem. Aq. Nephritica porro, crystallus, lapis percarum, ova struthionis & sal ex hisce. Cortices ovorum excusis pullis. De lapide Nephrit. vid. *Vuizerus & Laurembergius.* Si dolor est acutus, additur aliquid de laudano opiato, tam externe quam interne, v. g. unguent. anodyn. Myns. aliis specifi-

cis additum. Si adest urinae suppresio prodest cataplasma Cratonis, additur etiam aliquid de oleo scorpionum vel nucl. melpheorum. sanguis hirci ad *Hermann.* commendatur, inungitur per aliquod tempus herbis nephriticis & diureticis. It. lepus combustus nene martio & sanguis eodem tempore collectus. Semen urticæ, saxifragæ, bardanæ, mili folis, genistæ, violarum. It. sal genistæ, stip. tabarum, ononidis, stercoreis columbini huc pertinent. It. essentia nephritica ex vegetabilibus cum spiritu glomorum cynosbati fructus, glomi in ulsiunt do. ores, Infundantur vino & excitant somnum; est ingrediens Essentia mea nephritica. Est. ocul. cancr. & cineres eorum. It. Claretum juniperi, quod præparatur ex rob cum spiritu juniperi.

Alvus in calculo semper sit aperta. In Paroxysmo proficiat clysteres:

℞. Herb. viol. parietar. malv. an. m. j. rad. althææ ʒij. flor. malv. chamomill. an. p. ij. Coq. in f. q. aq. com.

Col. ℞. ʒviij. in quibus dissolve C. s. s. pro clyst. ʒij. ol. lil. alb. ʒj. scorpion simpl. ʒij. m. f. l. a. Enema.

℞. Herb. ononidis, heder. terrestris, parietarie, virg. aureæ an. m. j. Rad. ononidis bardanæ an. ʒ. sem. althææ ʒij. flor. sambuci, genistæ an. m. ʒ. Coq. in f. q. aq. communis.

Col. ℞. ʒvj. unguent. clymat. call. pro clyst. ʒj. sal. genistæ ʒj. vitell. ovorum N. j. antimon. cum vitriol. nxati ʒj. m. f. Clyster. pro ditioribus addi potest oleum amygd. dulcium. Purgantia:

℞. Pil. de terebinth. ʒij. Dos. ʒʒ. ad ʒj.

℞. Pil. de terebinth. Myns. ʒij.

℞. Terebinth. cum aq. malv. & vitell. ovi in liquorem redacta ʒij.

℞. Sem. viol. purpur ʒij. c. f. q. aq. saxifrag. F. Emulsiō. Edulcoretur julepo rosato vel viol. Est secretum Hartmanni etiam in urinae retentione vel suppressione valens.

℞. Tartar. vitriolat. ʒj. salis genistæ gr. viij. scar. ros. gr. vij. m. pro una doli. In Paroxysmo.

℞. Unguent. dialth. ʒj. ol. amygd. dulc. perlicor. expressor. an. ʒʒ. M. f. unguentum.

℞. Ol. lil. alb. amygd. chamomill. an. ʒʒ. ol. scorpion. simpl. ʒij. m. Potest etiam addi ol. Bullat. chamomillæ & ceræ.

℞. Unguent. nephrit. Myns. ʒʒ. ol. nephrit. ʒij. m.

℞. Ol. anethi ʒij. ol. scorpionum ʒij. ol. capparum ʒj. axung. caninæ vel porcine ʒij. succi rad. bardanæ succ. urticæ an. ʒij. Coq. lento igne ad consumptionem humorum. Valet etiam in suppressione urinae.

℞. Herb. malvæ, parietarie, heder. terrestris, saxifragæ an. m. ij. flor. chamomill. hyperici, genistæ, sambuci an. m. j. rad. ononidis, bardanæ, althææ an. ʒi. sem. urticæ, sem. genistæ an. ʒj. incis. & contus. D. S. species pro Balneo.

℞. Ol. amygd. dulc. rec. express. ʒj. Potest sumi cum brodio canis, in quo radix petroselinæ cocta fuerit.

℞. Sem. 4. fragul. major. an. ʒij. violar. saxifrag. an. ʒij. Nucl. pericar. ʒij. c. f. q. aq. ononidis, saxifrag. an. l. l. a. Lapid. pericar. parum Julepo violato.



℞. Aq. ononid. saxifrag. malv. an. ʒj. Symp. Fernel. de alth. ʒij. Ubi dolor acutissimus & vigiliz.

℞. Pulv. anodyn. gr. xii. magist. nephrit. gran. x.

℞. Aq. malv. ʒij. syr. Dialth. Fernel. ʒβ. Laud. opiat. gr. ij.

℞. Extract. nephritic. gran. vj. Laudan. opiat. gr. ij. M. F. l. ulaz.

℞. Conserv. heder. terrestres ʒj. mag. ocul. cancer. mag. l. pid. nephrit. an. gr. ij. Laudan. opiat. gr. ij. cum syr. dialth. F. Bonus. Extra P. roxymum.

℞. Lign. nephrit. ʒβ. Dos. gutt. xx.

℞. Tinctur. contra calculum ʒβ. Dos. gutt. 30.

℞. Essent. nephrit. veget ʒvj. Dos. ʒj. ad ʒβ.

℞. Vin. malvat. juniper. ʒj. yr. de althæa ʒij.

℞. Rob. juniper. rob. cynosbatos an. ʒij.

℞. Magist. nephrit. ʒij.

℞. 1. rtar. vitriol. t. ʒi β. f. l. stip. fabarum, sal. genissæ, sal. ononidis, sal. sterc. columb. an. ʒβ. m.

℞. Lign. Nephritici ʒij. Infund. aq. ononid. saxifrag. contra calculum. usit. an. ʒij. Stent in loco calido, postea utrentur. Tingtur hæc aqua à ligno cæruleo colore, vid. *Hornungia M. arica & Disput. Renodet.*

℞. Tereb. aq. parietar. sapius lotz ʒβ. sal. ovor. struth. ʒj. pulv. liquirit. ʒβ. cinamom. ʒβ. c. f. q. aq. Nymph. F. l. ulaz instar pisorum. *Joan. Michael. in Prax. clinic. general.*

In calculo vesicæ commendatur sal tartari dissolutum in aq. petroselinæ; sed melius dissolvitur in aqua quadam composita lithontriptica. Millepedes, variis præparantur modis, sed optimus est, qui fit spirit. salis. Si calculus vesicæ obstruit urethram, aliquando jurat, si æger pedibus tollatur, & ita fortiter commoveatur. Conveniunt autem hæc medicamenta superius in calculo renum laudata. Hic vero fortiora non possunt.

℞. Afell. præp. cum sp. sal. ʒj. spir. juniper. ʒij. juris cicetum ʒβ. m. Est experimentum Laurenbergii.

℞. Tereb. citrii. cum succo citr. lotz ʒβ. spec. lithontriptic. ʒi β. scam. rosat. ʒij. M. F. l. a. Pilulæ.

℞. Tereb. cum aq. saxifrag. lot. ʒij. magist. Nephrit. ʒj. m.

℞. Herb. herniar. saxifrag. an. m. j. Glom. cynosbat. num. iv. rad. eryng. ononid. bardan. an. ʒij. F. l. a. Nodulus.

℞. Sal. tui columb. sal. stip. fabarum an. ʒij. sp. sal. ʒj. M. *Idem ibidem.*

In dolore nephritico, obstructione & calculo renum & vesicæ.

℞. Rad. Althææ, lilior. alb. an. ʒj. Herb. malv. saxifrag. branc. ursin. flor. chamomill. melilot. an. m. f. sem. anis. ʒβ. fœnicul. lini an. ʒj. coq. in f. q. aquæ communis, colat. ʒij. adde extract. cass. ʒj. Tereb. in vitell. ovor. solut. ʒβ. ol. anethim. ol. scorpion. an. ʒj. m. f. enemæ.

℞. Extract. cass. ʒβ. pulv. thab. ʒj. tinctur. tartar. ʒj. ol. amygd. dulc. ʒj. misc. f. Bolus.

℞. Pulp. cass. ʒβ. extract. liquiritiz ʒβ. sal. essent. tartar. gr. vi. Laudan. liquid. tartar. gr. ij. aq. fœnicul. ʒij. m. f. potio. *In India.*

℞. Conserv. flor. cassæ ʒij. pulv. thab. ʒj. pulv. liquirit. ʒj. lap. percar. præp. ʒβ. ol. amygd. dulc. ʒj. misc. f. Bolus.

Vel ℞. Aq. petroselin. fœnicul. an. ʒij. liquoris l. pid. Hematit. ʒβ. l. udi. n. liquid. tartarist. gr. v. Syr. fœniculi, liquiritiz an. ʒβ. misc. dolis coale. r. j. bis in die.

Seu ℞. Aq. Morungæ, fœniculi an. ʒj. sp. sal. ammoniac. sp. lign. ebenon. gr. xv. syr. perlar. ʒβ. misc. detur cochleatim.

Vel ℞. Marmeladæ antinephriticæ. ʒj. Dosis ʒj. ad ʒij. mane & vesperi cum aq. fœniculi.

In calculo renum & vesicæ.

℞. Spir. sal. ammoniæ c. acidi ʒj. Dosis à gutt. x. ad xv. in aq. Saxifragiz.

℞. Liquor. lapid. Ham. tit. ʒj. essent. juniper. ʒβ. misc. dolis gr. xv.

Vel ℞. Tartari vitriolati ʒβ. ocul. canceror. gr. xv. sal. succin. volat. gr. v. sal. stipit. tabarum ʒβ. misc. f. Pulvis pro j. doli.

Seu ℞. Nitri vitriolati ʒβ. lapid. perc. præp. ʒj. succin. præp. ʒj. m. f. Pulvis pro i. doli.

Sive ℞. spir. urin. hirc. ʒβ. essent. Hyperici ʒj. syr. liquirit. ʒβ. aq. Hyperici ʒij. misc. dolis cochlear, bis in die.

℞. spir. sanguinis hirci ʒβ. vini Alkekengi, ʒij. misc. pro i. dosibus.

℞. Spir. sal. saturatiss. ʒj. Dos. gr. x.

℞. Marmelad. Antinephriticæ. ʒj. Dosis mane & vesperi ʒj. ad ʒij. *Herm. Nicol. Grinn. in Compend. Medico-Chymic.*

In mictus sanguinei a calculo renibus impaeto remedium & languinem satis copiosum è brachio mitti curabam, & post purgationes universales, medicamentis refrigerantibus & insectantibus, variis generis in usum revocabam; Diatam interea his consentaneam adhibens, liquores acidos, acres, & attenuantes sollicite devitans. Cum autem neque ista, neque alia permulta, quæ numerare longum esset, quicquam prodesse, & motuens calculum quem grandior eme supicabar quam ut expelli posset, aquis chalibeatis ad exitum sollicitare, tandem spe rei bene gerendæ pro us amissi, idque eo potissimum nomine, quod observarem senes aliquot mihi notos, sibi mortem accersisse, dum hujusmodi remediis incassum morbi curationem indolentur. Steterit itaque sententia non amplius tentare, at vitato tantum quam potui maximè corporis motu, ab hoc affectu mihi cavere. Tandem verò animo fortè recolens, quàm mirè nonnulli deprædicent seminis *Fraxini* vim lithontripticam subiit cogitare quòd si semen ejusmodi virtute polleret, omnino verisimile esset *Mannam* Fraxinæ adhuc plus posse. Cum manna quam habemus, docente Botanographo nūmo Domino *Joan. Ray* post alios scriptores, neque Mel Aëreum est, nec Ros aliquis Cœlestis, sed liquor potius, tamè foliis, quàm è truncis & ramis Fraxinorum in Calabria nascensium, exudans, de cujus rei veritate idem dum in Italia peregrinaretur certior factus est ab eruditissimo Medico, qui ex ramulis & foliis linteis a se curiosè contextis Mannam (qui est succus ita concretus ut dixi) sapius collegit. *Fil. Joan Ray Catalogum plantarum Angliæ* experimentum itaque facturum, Mannæ ʒij. in feri



lactis ſb ij. ſolutæ hauſi, pauxillum ſucci li-  
monum ſubinde, dum purgaret, deglutiens;  
quo & Catharticum acuerem, quod ſegnius  
operari ſolet, & ventriculo minus ingratum  
redderetur. Ab huiusce remedii uſu vix dici  
queat quantum ego levaminis circa Renum  
regionem perceperim; licet enim antea non  
ſemper dolerent Renes, tamen pondere quo-  
dam gravativo & moleſto ſenſu afficieban-  
tur. Quod cum ita feliciter mini ceſſit, idem  
Catharticum ſingulis Hebdomadis itato quo-  
dam die ad menſes aliquot continuos in uſum  
revocabam, & poſt ſingulas Catharſeos vi-  
ces melius me habuiſſe planè ſum expertus,  
donec tandem etiam rudiorum Currus con-  
quaffationem ferre potuerim; ab hoc ſympto-  
mate prorfus liberatus uſque ad veris tem-  
pus jam proximè elapſum. Quo apparente,  
cum per prægreſſam hyemem fere omnem Po-  
dagrâ laboraſſem, & præ nimia corporis ad  
motum inhabilitate, quieti & ~~amicis~~ magis  
quam aliàs tolebam, indulgiſſem, rediit de-  
nuo ſanguinis mictus. Hic ego an ad Catharſin  
me iterum reciperem hætebam dubius, quo-  
niam nuperis hiſce annis onui corporis ſub-  
ſtantia in Podagrâ ſedem & fomitem quaſi  
perverſa, Catharticum, quantumlibet lenè,  
diutinum Podagrâ paroxyſmum certo certius  
accerſebat. Tandem animo ſuccurrebat quod  
ſi Paregoricum ſingulis noctibus poſt purga-  
tionem adhiberem, quo tumultus à Cathar-  
tico excitatus ſedaretur, poſſe me priſtinam  
methodum Mannæ ſemel in hebdomada ca-  
piendæ tuto reſumere. Uncias itaque duas  
cum ſemiſſe in ſeri lactis ſb ij. diſſoluta manè  
hauſi, & ſerò guttas xvi. Laudani liquidi in  
Cereviſiâ tenui dormiturus adjeci. Et Man-  
nam & Laudanum dicto modo repetens bis  
in ſeptimana ad ſex vices. Poſtea verò man-  
na ſemel in ſeptimana tantum uter, hu-  
morum illuvie jam ita copioſe à Cathartico  
ſubductâ, ut à Podagrâ minis metuendum  
erat. Cum tamen mea mihi ratio planè di-  
ctaverit, quod ſi facultate aliqua, ſive diſſol-  
vente, ſive alio quovis modo Lithontripicâ  
ſuerit inſignita Manna, omnino eſt necesse ut  
Medicamentum, quale eſt Laudanum, valdè  
aſtringens, remedii, in quo ſpem collocave-  
ram, efficaciam ac vim quadantenus infrin-  
gat; ſatius eſſe duxi Hypnoticum miſſum fa-  
ci; cum jam ſemel in ſeptimana alvum ſol-  
viffim. In qua Methodo jam ad menſes ali-  
quantulum perſiſto eundem ſeptimanæ  
diem ubique Catharſi dicans; nec me ab hoc  
meo more, ex quacunque data anſa dimo-  
veri patior. Licet à prima huius remedii doſi  
dolor qui in dorſo erat, remittebat uti prius,  
tamen non ita diu poſt repetita Catharſis  
Podagrâ ſignum dedit; quod nunc Artu-  
bus, nunc viſceribus, bellum corpis indicere;  
at hac morbi tentamina Laudanum fortiter  
repreſſit. Cum hæc mihi medendi ratio hæ-  
tenus bene verterit, in eadem perfeveran-  
dum mihi eſſe iudico, tam ad præcaven-  
dum mictus ſanguinis recurſum, quam ad  
imminuendum aliquantulum ipſius Podagræ  
fomitem, (cujus radicalem curationem jam  
à me poſſe obtineri planè deſpero, rariores

paroxyſmos eoſque breves ac tolerabiles ſo-  
lum exoptans) ſubductis per hæc intervalla  
ſordis illis humoribus, qui à depravata co-  
ctione prima huiusce morbi origine, in corpore  
ſenſim accumuluntur, donec tandem ſummum  
depravationis gradum adepti, in Podagrâ pa-  
roxyſmum actum deſinant, ex occasione vel ſo-  
lito majoris ſive animi ſive corporis agitatio-  
nis & motus, vel cauſæ alterius cujuſlibet, unde  
dicti humores ad fluxum incitantur. Purg-  
tionem itaque quod attinet (modo catharti-  
co, mannâ ſcilicet, & ſecundum methodum  
ſuprà à me traditam ſubducatur alvus) jam  
retractanda mihi eſt ſententia illa mea quam  
in ſcripto de Podagrâ olim evulgaveram: nem-  
pe Podagrâ affectis minimè conducere, ut vel  
initio, vel in declinatione, vel per Paroxyſ-  
morum intervalla purgentur.

-----Nec ſi miſerum fortuna Sinonem

*Finxit, vamon etiam mendacemque improbaſſi-  
get.*

Nondum enim in mentem mihi venerat, Pa-  
roxyſmum quem à tumultuante cathartico ex-  
citandum metuebam, exhibitio ſub noctem  
Hypnotico prohiberi potuiſſe.

De Regimine victus ratione, quæ utrovis  
horum affectuum laborantibus competere mi-  
hi videntur, (quando nihil eorum præterire  
velim quæ iſtis uſui eſſe poterint qui uſdem,  
quibuſcum ego, morbis conſiſtantur) hæc  
addo mane lecto exſurgens, decoctionis ſolia-  
rum Tea cyathum unum alterumve exicco;  
dein curru ad meridiem uſque geſtatus, & do-  
mum reverſus, quovis ciborum genere nihi  
grato & cupepto modicè (id enim ante om-  
nia ſemper, & diligenti cum cura tenendum  
eſt) me reſicio; ſtatim à prandio per ſingulos  
dies vini Canarini plus aliquid quarta parte  
cibræ (ſeu Pintæ) vulgaris ad promovendam  
ciborum in ventriculo concoctionem, & ad Ar-  
thritidem à viſceribus procul arcendam, hau-  
rire ſoleo. Præſus iterum Rheda vector, &  
quoties per occupationes meas non deſineor,  
Rus peto, aeris ſalubrioris inſpirandi gratiâ,  
ad milliaria duo vel tria. Cereviſiâ tenuioris  
hauſtus mihi pro cæna eſt: ſed & hunc repeto  
etiam in lectulo, me jam ſonnum compoſitu-  
rus; idque eo ſine ut hoc Julapio ſuccos acres  
calidoſque in renibus ſtabulantes, è quibus fit  
calculus, refrigerem ſimul ac diluam. Ego ve-  
rò & hic & inter prandendum cereviſiâ te-  
nuem lupulatam, cereviſiâ non lupulatâ, quan-  
tumlibet tenui, ac miti, præferendam cenſeo.  
Licet enim non lupulata, mollitie ac lubricita-  
te qua pollet, ad ſubducendum calculum jam  
in Renibus concretum magis faciat; attamen  
Lupulata, ob levem illam ſtypticitatem quam  
impertiunt Lupuli, minùs facit ad ſabuli vel  
materiæ calculoſæ generationem, quàm facit  
non lupulata, cujus & viſcidior eſt ſubſtantia,  
& lutulentior: Quo die catharſi deſungor, ex  
Pulli carnibus Prandium mihi eſt; vinum ta-  
men Canarinum pro more meo ſuperbibō. Mi-  
hi curæ eſt, præſertim hyeme, ut lectum tem-  
poriùs petam: quo nihil magis conſert ad  
con-







putavi nephriticos temerè calidis siccisve medicaminibus fatigandos esse, quippe qui cruciatuum biliosique sanguinis emervescencia plus satis incalescant. Nimirum oleosa illa, aut spirituosà, quæ tot nominibus celebrantur, initio quidem & nondum inflammato sanguine solliciteque usurpata, pulchre quidem conducunt, sed progressu temporis, quando biliosi fermenti acrimonia sanguinem tenetque pervasit, non bilem tantum accendunt, sed vias quoque, quas laxare oportebat, nimium exsiccant. Profecto, si indicantium in illa Empirices invalecentis autoritate aliqua adhuc vis est, nulla etiam post curiosum examen magis convenire morbo illi possunt, quam aquea, dulcia, pingua, & quibus aliquid inest nitrosi, aut si quid renali fermento affinius urinæque juvat secretionem: In quo casu cum omnibus numeris absolutum sit Ioresti Belgæ, Practici Celeberrimi, decoctum, dubitem ego, an quid convenientius morbo huic excogitari possit; Mihi certè in plurimis felicissime cessit ejus usus. Reperias autem ibi primò aquam cæteræ virtutis veliculum, quæ etiam mucosum pelvis involucrum diluio solvat, materiamque præbeat seri. Reperias mucilaginosam, æthæque semina, dulce caricarum sebeten & glycyrrhizæ delinimentum, hordeum denique & ciceres quæ cum nitrosa continent & abitergente facultate, & secretionem adjuvant seri, nutantisque fermenti renalis vires corroborant. Quibus si deinde juscula adjungas vitulina, acido citri, oleo amygdalarum dulcium, manna tabulata, & syrupo de althea Fernelii, parte etiam vini Mosellani delibuta, jam haberi puto quod omnibus chemicorum arcanis, ipsi imprimis Aroph & Samech Paracelsi saltum facere possit; Nam cum hæc unum, aut summum alteri indicationi, illa ex æquo omnibus respondent. Non negaverim interim si caloris immune corpus obrigerit, miseri illis posse spiritus antinephriticos ardentes, balsama & sulphura terebinthinata, ac certâ & circumspectâ dosi. Vidimus enim prodigo istorum usu, ubi arenulæ & calculi expectabantur, tristi augurio sanguinem e renibus deluxisse fustum & colligatum, quod ipsum etiam ab intempestivo usu diuretici Language profectum vidi. Quare etiam auctor esse soleo, ubi in calidum temperamentum incidit hic morbus, ut acidis potius tartareisque, quam spirituosis sulphureisque ceteretur, spiritu nimirum nitri, illo adeo nunc etiam probato, tartaro vitriolato, chrySTALLIS & cremore tartari, illâ quoque ex plurium acidofaltnorum corporum conjugio orta Amelungi tinctura antinephritica, tot olim elogiis famigerata, quò intelligitur biliosum sæpe fermentum totam hanc scenam instruere, & victâ renum siccitate sero quoque liberiùs eundi facultatem esse. Pulveres fixi atque absorbentes tum demum conducunt, quando acidum ærius fermento junctum renali, secretionem fluidi moratur impeditque, ne calculus diluio seri ad vesicam deduci possit, & ut in hisce peculiaris est lapidum cancri efficacia plurimis effectu testata, merito etiam in usum vocantur, etiam tum, cum bilis effervescit, namque & illud nitrosum volatile, quo & ipsi per-

funduntur, huic temperandæ alchêre respondent. Mucuginosi pulveres qui ex seminis malvæ, althææ, nili solis, gummi tragacanthino, cerasino, cujus commendatio apud nonnullos maxima est, & liquiritia concutuntur, viarum potius asperitatem fermentique renalis acrimoniam delinunt, quam ut gaudeant peculiari lithonriptica. Pilulæ ex succo liquiritiæ, terebinthina, oculis cancrorum, sale juniperino, succinato acido volutini, tartaro vitriolato aliisque pro necessitate componuntur & ipsæ officium faciunt, etiam magis protuturæ in exquisitis doloribus, si tantulo opii condiantur; neque enim hoc semper aut numquam esse debet. Ut tamen dicam, quod res est, non adeo Medicinis illis specincis, neque viis aut alteris dosibus, evertitur calculi tentum, nimis toti sanguini, nimis universæ constitutioni infixum, sed toto vitæ ordine & ductu, imprimis quotidiani potus qualitate usque continuata. Hinc præter potum bene compositum cerevisiæ, hordeatæ magis quam siliginæ, tenues quam crassæ, molliculæ & pingues, quàm diobolares & aquæ, inter Germanicas Goslaricenis, Belgicas Leodientis, utraq; metallicum quid redolentes, inter medicatas juniperina, icolopendriata, petroselinata, dauci seminibus, liquiritia aliisque, dum fermentationem sustinent, peritus, vel excogitatus remediis palman præcipiunt. Et verò non spernendus quoque ille jam ab aliquot retrò annis celebratus theæ potus, n. ultis nominibus, tum maxime fluidi aquei calorisque beneficio probatissimus. Veronicæ potus & ipse magno compendio in eodem medicinz usum vocari posset. In Belgio Hispanico rubecolæ sylvestris pulvis, velut specificum, in maximo est pretio, amplissimisque elogiis venditur, si & ille in calida bibatur. Aquis etiam thermalibus calculos nonnullos felicissime propulso vidi; illâ enim quotidianâ thermopotatione plerumque in renes abeunte viz in immensum ampliantur, & cum perpetuum eas occupet diluvium, calculi olim fixi pertinaciusque hærentes, etiam supra fidem magni facile loco facile angustis canaliumque poris excutuntur. Vidi tamen etiam, ne quid ab omni parte tutum esse credas, qui nullis unquam doloribus renum calculi vexati intempestiva aquarum Emulsionum potatione gravissimè & decretorie ex nephritide laboraverint. Naniq; lætaverat in hisce calculus, qui nondum penitus solutus, qui aliàs Naturæ labor est, lentus ille & paulatinus, copioso aquarum diluvio subitius præcipitari loculisque suis excuti, nunc etiam in periculosiores dolentesque situs figuræque, mox tamen succedente novo diluvio mutandas, conjici cœpit; adeo ut aliarum rerum, ita calculi quoque videtur expectanda maturitas, quædam, id verò est Naturæ concurrentis solertia. A Pyrmontanis viro ex hypochondriis ægrotanti etiam calculos nunquam ante creditos, ab alvo magna copia propulso scio, tot olim purgantibus, quod diluvio isto carrent, frustra propinatis. Nicol. Putm. in Obsrv.

Operæ pretium erit vesicam cathetere explorare, an Calculus sit doloris causa necne, & quantus sit, si adsit: ne si molis sic magis, frustra



frustra patiens Lithontribis fatigetur. Hoc enim casu si lithotomix se nolit exponere, ut atroces cruciatus demulceantur, & urinæ viz leniantur, Medico unice nitendum est. Hisce intentionibus inserviunt sequentia.

℞. Fol. beton. m. ij. malv. violar. parietar. an. m. j. flor. chymamel. & melilot. an. p. ij. sem. fenugr. ʒβ. f. omnium decoctio in sero lactis recant. Cap. de colatura ʒβ j. in qua dissolv. cathol. elect. lenitiv. an. ʒ j. syr. violac. sacchar. alb. an. ʒ ij. mucilag. sem. altheæ extract. in aq. hord. ʒ iij. m. f. Clyster. Instituitur quoque Purgatio lenis. Perinzum foveatur sotu sequenti.

℞. Rapor. ʒβ iij. raphan. totius ʒβ ij. rad. lil. alb. alth. symphyt. maj. an. ʒ iv. parietar. totius, malv. argentin. virg. aur. saxifrag. nasturt. betul. an. m. ij. chan. æm. m. iij. bac. car. juniper. ʒ iij. sem. alkekeng. mil. sol. an. ʒ i β. f. Sacculi, quibus decoctus in aq. font. foveantur perinzum & pubes calide mane & vespere per horam integram. Ex istden. urgente dolore, parietur *Semicupium*, et. in addito lacte vel oleo pro necessitate. Balneum quoque instituitur ex ingredientibus semicupii auctâ quantitate, in quod ingrediatur bis in die; & post tertium balneum sumat in ipso balneo haustum infra descriptum e succo parietariz, &c. addendo lap. prunell. ʒ j. aut amplius pro necessitate ad ʒ i β. aut ʒ ij. si calculum expellendi spes sit.

Cerevisia medicata sit talis.

℞. Filic. facmin. ʒ viij. alth. symph. an. ʒ v. cort. med. ulm. nucis moschat. an. ʒ iv. fol. siccor. pariet. equilet. veronic. mar. an. m. iij. flor. malv. utriusque, nenuphar. cum semin. an. p. iv. sem. malv. cydon. an. ʒ i β. Coq. in alz rec. galen. vj. ad duos, addendo ejusdem cerevis, ferment. galen. iv. infund. per noctem, & coletur per setaceum manè: liquori affuso in doliolo adde q. f. ferment. cerevis. cum ʒ viij. gum. Arabic. sinatur fermentari ad perfectam depurationem, & lagenis lapideis indatur ad usum.

Opiata sequens multum levaminis xgro ferre poterit.

℞. Conserv. flor. malv. ʒ iv. medull. sem. melon. ʒ j. pulv. rad. symph. maj. glycyrrhiz. an. ʒ j. pulv. oil. mespilor. ocul. cancr. mandibul. lucii an. ʒ iij. pulv. virg. aur. sem. alkekeng. milii solis an. ʒ ii β. gum. Arab. ceras. prun. an. ʒ ij β. cum syr. de alth. f. *Electuarium*. Dos. quantitat. nuc. juglandis manè, super hausto cerevis. medicat. momento, dilato prandio ad 4. horas. Convenit quoque (in arenulis vel calculis minoribus) in ipso semicupio haustus sequens.

℞. Succ. depurat. parietar. ʒ ij. vin. alb. ʒ j. succ. limon. ʒ β. ol. amygd. dulc. rec. ʒ i β. m. f. Haustus.

Aut ℞. Cancror. fluviat. numero ij. terantur in mortario marmoreo cum vin. alb. & extrahatur cremor, cui adde syr. viol. de alth. an. ʒ vj. crystall. mineral. ʒ j. m. Crystallus rupis in succo urticæ specificum est. Pulv. lithontripticus item exhiberi potest ad ʒ j. qui talis est.

℞. Rad. alth. & glycyrrhiz. an. ʒ j β. virg. aur. ʒ iij. rad. ononid. ling. avis an. ʒ j. nucl.

mespilor. ʒ j. sem. aquileg. ocymi, milii solis, alkekeng. spatulæ scetid. an. ʒvj. sem. violar. Martiar. ʒx. ocul. cancror. præp. cum sp. vitriol. & sp. vini, lap. Tiburon. cryit. rupis præp. an. ʒ ij. grillor. præp. cum malv. ʒ j. m. f. pulvis ut alkool. Et si velis, cum triplo syrup. de alth. & nephro cathart. (supra in cap. de Calculo Renum descript.) in aqua proportionem mixtor. f. Opiata, cujus dosis a ʒ j. ad ʒ iij. superbibend. haustum cerevis. medicat.

Si ulcus adsit, primò deterg. injectione ex aqua hordei & melle rosaceo. Aut sit hujusmodi, de qua injiciatur ʒβ. quavis vice quater in die, ut pertingat ad vesicæ fundum & latera.

℞. Ros. rub. sol. melilot. an. m. j. fol. agrimon. apii, prunell. veronic. utriusque sancul. consolid. maj. an. m. j. rad. aristoi. rot. ʒ iij. surfur. macr. hord. integr. an. m. β. cancror. fluviat. clibano exsiccet. & pulv. num. vj. Coq. in vin. alb. aut sero lact. q. f. Ad Colaturam ʒβ ij. adde sacchar. cand. syr. de ros. siccis aut mel. ros. an. ʒ iij. urin. puer. impub. ʒβ j. m. f. Injectio.

Ad ulceris consolidationem talis fiat injectio.

℞. Glycyrrhiz. Hispan. rec. ʒ ij. rad. alth. symphit. maj. an. ʒ x. fol. beton. aquaticæ equilet. an. ʒ i β. veron. mar. bugul. prunell. hyperic. totius, persicar. maculat. an. ʒvj. uor. malv. rosex ʒv. sem. malv. psyll. cydon. an. ʒ ii. gum. Arabic. verm. terrestr. siccor. vesic. bubul. siccat. an. ʒ iv β. f. pulvis crassiusculus, de quo sumatur ʒ j. aq. hord. ʒβ ij. Coq. ad medias l. colatura, cui adde æq. part. lact. vaccin. rec. & f. Injectio bis in die tepidè. Pilulæ mez lenientes in vesicæ aut renum ulcere & calculo, tales sunt.

℞. Oliban myrrh. mastich. an. ʒ iij. glycyrrhiz. rad. consolid. maj. sicc. an. ʒβ. crem. tart. ʒ ij. croci ʒ j. camph. ʒβ. antim. diaphoret. ʒ j. f. pulvis & cum tereb. aq. ros. lot. q. f. f. massa pilularis. Dos ʒ β. mane superbibendo haustum cerevis. medicat. Paulatim augeri potest dosis ad ʒ j.

℞. Gum. guajac. natural. ʒ iij. mastich. oliban. part. alb. benzoin. sandarac. gum. anim. an. ʒ ij. santal. alb. ocul. cancr. an. ʒ j. terebinth. Cypr. coctura indurat. ʒ β. succin. alb. præpar. ʒ iij. f. alkool excipiend. f. q. balsum. Peruv. nigr. & f. massa pilular. Dos ʒ β. ad ʒ j. superhaust. cerevis. medicat. haustu.

In ulcere Renum & vesicæ, in quo cum maximis inter meymendum cruciatibus mucus viscidissimus excernebatur, D. Deodatus, irritis aliis omnibus remediis, salivationem provocabat per Mercurii dulcis iteratam exhibitionem in vetula generosa fere nonagenaria, omnia sedata fuerunt symptomata: ita ut quæ moribunda erat & cui cutis vix ossibus hærebat, per annum vixerit satis sana. Recurrente tamen morbo, senectute oppressa tandem supremum obiit diem.

In juniore subjecto iterata exhibitio Mercurii in parva quantitate, etiam sine pyralismo, proculdubio profuisset. Quotidie ponunt exhiberi gr. vi. viii. x. calomel. vel de de Mercurio nigro sive Æthiope minerali. Rationalis est hæc



hæc via propter revulsionem, præter Mercurialem vim quæ alias ulcerationes internas & externas perficit.

N. B. Non dubito quin possit prodesse hæc via in tartaro lutofo sine ulcere, revellendo & evacuando blenniam quæ vel in stomacho generata, vel in cerebro, fugitur à Mefaricis cum substantia aliment. & postea separatur in renibus & defluit in vesicam.

Apes siccatæ in pulverem redactæ propinentur ex vino albo, urinam paulo post provocant. Num. iij. sufficiunt ut plurimum. In seipso Ischuria laborante sapius expertus est Hibernia Primas Armaghanius.

Quidam (nomine *Dinkinson*) laborans caruncula in urethra, Ischuria correptus, partim à tumore carnis inflatione, partim à grandiori arenæ grano meatum jam pene occlusum penitus obstruente, de vita desperans, & confidit inops, assumpto siphone seu syringâ itanneâ (quod instrumentum ipsi tunc erat ad manum ad injectiones faciendas in urethram & vesicam) aerem saltem ex vacuo syringæ corpore in meatum impulit cum aliqua violentia. Sic dilatato ductu, successivè multum aeris intravit vesicam, qui ne erumperet, quoties siphonis apicem live fistulam extrahebat ad novum aerem captandum, arcte digitis premebat urethram. Tandem satis oppleta vesicâ, laxato & remoto obice, flatus cum impetu erumpens, arenam expulit, & prorupit urinâ satis copiosa maximo cum levamine. Deinceps quoties aliquam experitur difficultatem, recurrit ad sacram anchoram cujus nunquam fallacem experitur effectum.

Ego vellem insufflare ex folle parvulo duplici, qualis est organor. aerem in tubum argenteum satis brevem & majusculum, urethræ prius inditum & circumligare virgâ serico molli sine ullo dolore; atque ita & urethram dilatare & opplere flatu vesicâ, &c. vel uti vesicâ vento tumida eodem modo quo clysteres injiciuntur.

In calculo majori, ubi ejusdem exclusionis nulla spes est, si *Lithotomia* se subicere æger velit, post operationem modo sequenti tractari potest. Operator quidam scotus alias ignarus, post extractionem lapidis vulnere & velicæ hoc pacto prospicere solet felicissimo cum successu. Ægrum jubet obambulare passus aliquot, ut velicâ a muco, grumis sanguinis, & rellitibus lapidis frustulis aut arenulis liberetur (quam intentione in debilibus supplere poterit injectio detergens calidè facta in vesicam immediate post absolutam operationem). Postea facit ut per horæ quadrantem sede r in semicupio tepido parato ex decocto cortic. quercus tam valido, ut ejus guttula ungui superposita non diffuat. Semicupium illud seq. die & tertio repetit: quo remedio proficitur sanguinem sisti, vulnus claudi, & partem insigniter corroborari. Deinceps usque ad perfectam curationem vulnere prospicit mixtura ex decocto prædicto, melle purissimo & terebinth. veneta, quod suum balsamum vocat, & pennâ illinit. Cortex autem (*Tann diellus*) petatur à coriariis. Terebinthina faciliè cum cæteris jungitur, si aliquid vitelli ovi crudi addatur.

Si post *Lithotomiam* restet involuntarium urinae

profluvium, convenit decoctum vulnerarium & astringens & intus ex gummatibus pericellam perforatam receptus.

Si *Gangrana* Lithotomiam sequatur, vulnere adhibeatur totus ex leora. abumini. centaurea minor. &c. vulnere denigrato adhibeatur unguent. Ægyptiacum cum spir. vini. Cavendum ne vulnus acri sapius exponatur. Aperta teneatur vesica turundâ lineâ balsamo digestivo inuncta. Fiant injectiones vulnerariae & detergentes per tubum œsophago vel intestino pulli obiectum in vesicam per vulnus. Intus tumantur decocta vulneraria. Clysteres lenientes injiciantur alternis diebus. Urinæ deorsum occludatur vulnus per turundam siccam expice, mastiche, veruccæ, thure, sarcocolla, &c. quæ aquæ appulsam non sentiant. *Theodor. de Mayer. l. praxi.*

In omnibus ferè partibus corporis possunt calculi nasci, vesica, renibus, utero, solliculo fellis, intestinis, pulmone, hepate, in externis partibus corporis; addo quod etiam in monte, & sub cute, instar duri tumoris natum, extectumque tuile legimus. Verum in duabus iis valde communiter est, & magis ordinè nascitur: renibus nempe & vesica. Eorum vero, qui intus in membris, & visceribus nascuntur, nullus est per chirurgi inexcusabilis præter eum, qui in vesica nascitur: ideo sectio calculi lithotomia dicta versatur tantum circa extectionem calculi velicæ; Calculus enim reum pharmacia curatur, non vero chirurgi. Etiam si Rousettus doceat, cum etiam per abdomen posse excindi, sed stultum nimis mihi tenet. tumque videtur, & merito deridendum, & ideo de tali sectione nihil dico.

Quoad calculum vesicæ, ille potest per Chirurgi in duobus modis eximi, vel cum sectione, vel sine sectione; In mulieribus propter cololum vesicæ brevius, & quia in iis facilius est manus Chirurgi: & per puerum, cuius ad ventrem accellius, potest aliquantulo sine sectione extrahi: in viris non ita; saltem ars cum hic & viris educendi non est nostris Chirurgis Europæ cognita.

Est tamen bene aliqua ars cum educendi, modo non sit nimis magnus. Illam describit Prosper Alpinus in lib. de Medicina Ægyptiaca, quum ait novisse Chirurgos Arabiæ, & Ægypti, & se propriis oculis vidisse, eam fuisse practicatam in aliquibus principibus Ægypti viris, & per eam vidisse educi calculos magnitudinis olivæ, & quendam Arabem sic uni duci Ægypti, se præsentem, multos calculos extraxisse. Ratio artificii consistit in eo, quod illi membri virilis cavitatem, & colli vesicæ insufflatione plurimi aeris valde dilatent sicut per eum tam magnus calculus possit transire, Meatu sic dilatato, faciunt ut fuga vacui exsucto aëre, lapis per virgam magno impetu esseratur, virgam dilatari posse, non debet mirum videri, quandoquidem ea tota est nervosa, carnea & pelliculosa, & promde bene dilatabilis. Etenim si os uteri quod adeo connivet; ut calamus non possit in eum imponi, quodque constat substantia cartilaginea, dura, & non faciliè dilatabili possit tempore partus ita dilatari, ut per eum exeat foetus tam magnus; & crassus; Quare non posset subitanea membræ



virilis tam mollis in tantum dilatari, ut unus lapis posset per ipsum exire? modus facienti non est omnibus Chirurgis idem. Unus modus est talis. Capiunt ligneam cannulam longitudine octo digitorum, latitudine unius pollicis, quam virgæ cannali admovent, tum fortiter insufflant, & ne flatus ad anteriora perveniat, altera manu extremum virgæ retinunt, tum foramen cannulae claudunt, ut interim virgæ canalis latior fiat, & intumescat. Eo facto, digitum in anum imponunt, & lapidem paulatim ad canalem virgæ & ad extremum ejus deducunt, & cum præputio lapidem appropinquasse sentiunt, cannulam virgæ à foramine fortiter impetuque renovent, sic ut magna dexteritate lapis evolet. Alius modus est hic. Habent multas cannulas, unam majorem altera, factas è substantia quadam cartilaginea valde dilatabili, in modum musci instrumenti syringæ appellati. Harum graciliorem in virgæ canalem primo intromittunt, quousque ad vesicam pervenerit: moxque ore insufflando, ipsam dilatant quantum maximè possunt. Postea capiunt paulo crassiorē, eamque ibidem immittunt insufflandoque eam dilatant ut primam, postea eodem modo imponunt, & tertiam, & quartam omnium maximam. Et cum sic virgam dilataverunt, ut viam satis magnam esse putent, ut per eam calculus possit transire, digitos in anum imponunt, & calculum ad collum vesicæ, ubi majoris cannulae extremitas pervenit, & usque ad ipsum deducunt: tum altero cannulae meatu ore excepto, spiritum fortiter retrahendo calculum simul: trahunt tanto impetu, ut si calculus aliquando major sit, quam ut foramen exire possit sæpe in frustra rumpatur. In mulieribus adultis potest etiam calculus eximi sine suctione modò non sit valde magnus, id est, modò sit illius quantitatis, ut possibilis sit per foramen colli vesicæ transire. In mulieribus autem facilius eximitur, quia via non est longa, & est recta & ob humiditatem magis explicabilis. In viris non potest, quia via est nimis longa & flexuosa: Exprimatur autem per extrusionem, digitis tamen: Chirurgus enim duos digitos anteriores in genitalia tam profundè imponit, eos sursum versus vesicam innectendo, quousque calculum tangat, tunc cum inter duos digitos quasi comprehendendo adducit, trahendo in collum vesicæ, & continuatione quadam trudit, donec vel exeat, vel adeo ad extremum cannalis promotus, ut forcipe in eundem meatum imposita apprehendi, & erui possit. Si via sit angustior, quā ut calculus commodè transire possit, debet fomentis emollientibus soveri, & in balneo emolliente ad umbilicum imponi, ut partes laxentur, & in viam urinariam debent imponi forcipes dilatatorii, oleo liliorum uncti, ut ea ratione amplior evadat, sed rarius sine sectione eximi potest.

Hæc sectio etsi sit valde periculosa, & multos ex ea mori contingat, constat tamen experientia quotidiana, quod per eam etiam multi sanentur, & evadant, & quovis sit periculosa, tamen quia impossibile est magnum calculum aliter curari, quia intolera-

bilem affert cruciatum, ita ut homo libentius moriatur: Et quia tandem bene mortem infert, ideo ægrum melius est dubia cum spe, quam ita perpetuo, & diuturno cruciatu & certæ morti relinquere.

Periculum in multis consistit imprimis in eo, quod in peritonæo sint multæ inguines venæ, & arteriæ, & imprimis vicinæ hæmorrhoidales; hinc periculum est, ne his incisis, vel per dilatatoria, & alia quæ immittuntur instrumenta laceratis, fiat hæmorrhagia lethalis. Sunt præterea ibi nervi, musculus sphincter, intestinum rectum, vasa spermatica, tendines, & substantia vesicæ, quæ omnia hæc operatione offendi possent, unde varia pericula oriuntur. Imprimis si vesicæ corpus scindatur à novacula, aut laceretur à calculo, aut instrumentis quæ immittuntur, est lethale: fit enim infirmitas, convulsio & postea mors. Si intestinum rectum scindatur, periculum est fistulæ, & inde etiam mortis. Denique in illarum partium nervosarum tanta divexatione, per torsæ instrumentorum in illa scissione, dilatactione, catheteris impositione, crebro denique attactu & laceratione, maximum est periculum inflammationis febris, virium debilitatis, & mortis: præcipue, cum ipsa jam antea prægresso calculi attritu vesica plerumque sit exulcerata & inflammata. Tandem, ut omnia recte successerint, periculum est, ne post extractum calculum maneat defectus detinendi urinam, quod fit propter musculum colli vesicæ læsum, vel ex vulnere fistula maneat, & per eam intolerabili foetore, & magnis aliquando doloribus, tota vita urina effluat. Sæpe enim fit, ut vulnus inflictum consolidari non possit, vel urinae acrimonia erodente, vel vulnus in ulcus convertente, ac pure illac exitum querente: vel quia vulnus non est bene curatum à Chirurgo: vel quia intus putredines aliquæ, & sordes sunt relictæ, quæ non patiuntur vulnus claudi: vel quia interstitium illud in peritonæo, vel vesicæ corpus tacta sint, quæ conglutinari nequeunt.

Non est autem hæc sectio in omni ætate æque periculosa. In pueris enim, & mulieribus est facilius, in viris contra. In pueris enim carnes humidæ sunt & laxæ, & ideo facilius conglutinantur, & robustus calor nativus resistit injuriis corpori illatis. Et secari possunt minori molestia, & sectione minoris, quam vocant, apparatus, quæ hic paucioribus instrumentis, sicut audemus. In mulieribus autem propter viæ urinariæ brevitatē, laxitatē & rectitudinem, operatio egrius facilius. Hinc minus molestiæ his infertur. Potest enim in his calculus immixtis per genitalia digitis tangi, apprehendi, adduci & extrudi, catheter brevior & rectior est, fit minore dolore, faciliusque imponi potest. In viris omnia contra se habent.

Celsus dixit, non ante nonum, nec post undecimum, ætatis annum licitam. Verum experientia quotidiana docet, & Chirurgi præclarissimi scribunt, usque ad 60. ætatis annum licitam esse, & usque in illum quamplurimos, & cum felici successu feliciter curari,

ante



ante annum autem 9. & post 60. non esse secandum. Nam ante 9. annum, ætas nimis tenera est, & duo digiti Chirurgi non possunt sine maxima violentia in anum imponi, quod pro sectione necessarium est. Post annum sexagesimum habitus corporis est nimis siccus, & calor nativus nimis imbecillus, hinc vulnera parvum nervosum non consolidantur, & imbecilla constitutio non habet tantam violentiam, sed periculum gangraenae adfert.

Modus sectionis non est idem, sed pro ratione ætatis, sexusque varius. Aliter in pueris, aliter in adultis, aliter in viris sectio est instituenda. Præter hæcenus usitatam sectionem exortus est Franciscus Roussetus, qui in lib. suo de partu caesario scribit, videri longe securiorem, & faciliorem sectionis rationem futuram, si venter, aut abdomen à latere sub umbilico aperiatur, & imposita per foramen manu vesicæ corpus vulneretur, & inde calculus eximatur. Sed illa ratio non valet. Vesicæ enim vulnus lethale est, & non potest consolidari: & quamvis aliquando legatur consolidatum, est tamen rata avis, & temerarium nimis foret. Et quia illam rationem nemo secutus est, de ea non agimus.

Ordinaria autem sectio fit in perinæo. In ea rectè administranda totum artificium consistit, ut scissio fiat in exortu colli vesicæ & in carnosâ parte ejus, ut ipsa membranosa vesicæ substantia non vulneretur, nec ab instrumentis, quæ postea inducuntur, aut calculo egrediente non dilaceretur. Denique ut vitentur magnæ venæ, ac tendines ac partes nervosæ: sic enim ut convulsio & hæmorrhagia, quæ in tali opere sunt timenda vitentur. Si in carnosâ illa parte colli vesicæ sectio fiat, & vesica non tangatur, facile vulnus curatur. Dux sunt differentiarum principales hujus sectionis, una vocatur Celsistica, vel Guidoniana, quam docuere Celsus, & Guido, quæ vocatur à practicantibus sectio minoris apparatus: eo quod fiat facili modo, sine multo instrumentorum apparatu. Nam tantum ponuntur digiti in anum, & sit simplex sectio super ipsum calculum, & ejusdem digiti in ano, existentibus, vel tantum calculus per vulnus extrahitur, vel cum cochleari Chirurgico, aut simplici tenaculo extrahitur. Altera vocatur sectio Mariana, quam docuit & primus scripsit Marianus sanctus Barolitanus, ex doctrinâ Joannis, sui præceptoris, famosi Chirurgi, & practicantibus vocatur sectio majoris apparatus, & ideo, quod illa sit valde laboriosa, & fiat ope multo plurium instrumentorum. Nam in ea primum imponitur catheter ad calculum explorandum, tum alius catheter, qui habet sulcum, & rimam, qui vocatur itinerarium ad hoc, ut super eum fiat sectio: tum instrumenta, quæ vocantur ductores, ut dicant, & quasi viam monstrant tenaculis, & cochlearibus ad calculum apprehendendum: immittendum tamen verticulus, seu instrumentum ad tentandum, quo loco vesicæ calculus sit, tum dilatatoria ad

foramen, si opus sit explicandum; tum tenacula diversi generis ad calculum apprehendendum, aut frangendum, tum cochlearia ad evertendum frustula aut arenulas. Sectio minoris apparatus locum habet in pueris secandis, propterea, quod in illis digitis in anum immixtis calculus tangi, & apprehendi potest, & sic extrahi. Et ideo non debet multis instrumentis quæri & apprehendi. Sectio majoris apparatus locum habet in adultis & maxime in viris, in quibus propter corporis magnitudinem ductus ad vesicam est longior; & ideo digiti in anum immixti non possunt ad calculum pertinere, & ideo cum sic nec digitis explorari nec apprehendi nec extrahi potest, debet explorari, quæri, educi magna instrumentorum & molestiæ varietate.

Cum itaque secandi sint diversi; primum loquor de modo calculi pueris excindendi. Antequam itaque puer sectioni exponatur, primo cognoscendum, an calculo laboret: Hoc cognoscitur ex communibus signis, & symptomatis calculi: secundo per impositionem digitorum in anum: Itaque curandum est, ut puer saltet vel currat, vel apprehensus per medium duobus brachiis est concutiendus, ut calculus decidat deorsum ad collum vesicæ, tunc sedenti corpore erecto, ne calculus recidat, duo digiti anteriores dextræ manus oleo amygdalino, liliorum aut rosato juncti in anum pueri sunt immittendi quam profundissime; & antrosum versus ventrem seu vesicæ situm, (nam vesica intestino subjacet) inclinando, & tangendum, an ibi calculus jaceat, & quam sit magnus, ut pro ratione magnitudinis sectio fiat, & explorandum an non sit tam magnus, ut non possit educi. Si enim enet valde magnus, non deberet cura tentari, quia non posset sine vesicæ laceratione extrahi, unde mortis præsens periculum esset: aut si tentetur, non debet fieri sine prædictione summi periculi, ut honor operantis maneat salvus. Quare exploratione prædictæ, vel diu ante facta, ad sectionem transeat.

Celsus dicit non omni tempore sectionem posse fieri, sed tantum in vere. Hodie vero omni sit tempore; tamen, si sit hyems, curandum, ut fiat in cubiculo calido, nam puer jacet nudus, & sic refrigeraretur, ac rigeret, quod esset malum. Secundo quia vulnere facto frigus ad vesicam perveniret, frigus autem membranosis partibus est inimicum. Puer prius alvum exoneret, & parum comedat, ut sit fortior, & errat sive concutiatur, ut calculus cadat ad collum. Tunc debet vir aliquis fortis in humili sede sedere, lumini obversus, & puerum in gremio suo aversum, ac mediocriter supinum, coxis ejus super viri cruribus, ponere. Dico, mediocriter, nec in totum, ut sic liberius possit respirare. Tum vir curvatos, ac retractos pueri poplites manibus apprehendat, & fortiter teneat, ac diducat, sic enim puer non poterit se movere & agitare. Secundo ea



ratione vesica deorsum trahitur & in angulum redigitur. Tum Chirurgus duos, non ut ante dextræ manus, sed simultræ digitos unctos in pueri anum imponat, & dextra manu ventrem inferiorem fortiter comprimat, ut illa compressione calculum a vesicæ fundo deorsum subter os pubis in ipsius cervicem detrudat. Ne autem ita fortiter comprimendo puerum lædat, & ventrem ac vesicam debilitando disponat ad facilem inflammationem, ventrem prius linteo aliquo tegat, subter verò digitis illis in anum immisissis calculum apprehendat, & quantum fieri potest à tergo attrahat, & antrosum nimirum in vesicæ cervicem promoveat. Eo adductum digitis iisdem timent, ne regrediat. Tum circito obitante elevato notet Chirurgus vel oculo vel linea cum atramento facta, locum secandum. Locus est in perinzio inter testiculos, & anum, duobus digitis transversis ab ano, non in recta linea, aut in medio, sed à latere sinistro; Nam in medio est quoddam interstitium; q. quia est nervosum non debet tangi. Debet ergo locus esse paululum ad latus distantia unius grani hordei ab illo interstitio, nam si illo sectio fiat, tunc rectè sectio incidet in carnosam partem colli vesicæ, & in ipsum calculum. Tunc secandum est novacula utrinque acutâ, super ipsum corpus calculi, tam profunde, donec novacula ipsum calculum subiectum tangat, & scindat. Foramen debet esse proportionatum magnitudini calculi, jam acutè tacti & explorati. Ordinarium est longius duorum digitorum transversorum; Nonnulli sectionem faciunt cum novacula ignita in viris, uti post audiemus, sed hoc locum non habet in pueris, in quibus ob humiditatem teneræ carnes quodammodo liquarentur: Cavendum tamen est, ne rectum intestinum vulneretur: quia ut notat Parvus fieri potest, & solet, ut dum calculus ad cervicem vesicæ e fundo educitur, illud intestinum replicetur, tum enim inconveniens sequeretur: Nam feces per vulnus exirent, & urina per anum, & maneret fistula. Vulnere factò, digitis, qui in ano calculum comprehendebant, jam suaviter per vulnus est extrudendus: & si non poterit digitis semper bene uncini, seu cochlearia Chirurgica, ad eam rem facta, per foramen desuper inducenda sunt, ut à tergo eum comprehendant, & comprehensum valde educant, dum jam extractus est, si quæ sordes, aut sanguis grumulosus in venis putetur contentus, fistula tenuis argentea perforata in vulnus est imponenda, ut per ipsam effluere possit. Aliqui una sutura vulnus coniungunt, alii non: alii etiam fistulam talem non imponunt. Inde medicamenta sanguinem sistentia, & conglutinantia sunt super imponenda, & pueri pedes sunt colligandi, ut labra vulneris coniungantur, & sic facilius consolidentur, & ne puer pedes divaricando faciat labra inepta uniri, denuo dehiscere; Inde vulnus more reliquorum vulnorum est curandum.

In viris autem jam adultis secandi ratio est talis. Quando signa sese ostendunt, calculi in vesica existentis priusquam ad sectionem eatur, ante oculos est habenda certitudo, ne sectio fiat huiusmodi, signa enim medica sæpe fallunt. Itaque cathetere est opus. In pueris id exploratur, digitorum in anum impositione: nam illi catheterem ob viam angustiam, & carnis molliem non ferunt. In viris id digitorum immensione fieri non potest, propterea, quod propter partium magnitudinem digiti usque ad collum vesicæ, & locum calculi immitti non possunt. Ager ergo in sede parum altiore collocetur, corpore in posteriora nonnihil declinato, & sinistra apprehensio ejus membro, catheter secundum artem in canalem imponatur usque ad vesicam, ibi titillando, & cathetere quoquoque modo, exploretur, num in vesica calculus sit, Partim enim tactu, partim sono catheteris contra calculum acci, ibi esse comprehendetur. Quod si verò non tangatur, non ideo sequitur eum ibi non esse: potest enim fieri, ut, etsi calculus in vesica sit, tamen à cathetere non percipiat. Ideo si nihilominus signa naturalia cum sequentia multa & fortia sint, non ideo debet sectio omnino omitti. Contingit autem, catheterem non tangere calculum, vel quia multo limo & viscida pituita est obductus, vel quia propriae membranae & vesiculæ includitur, sicut aliquando fit: tum enim catheter non figitur contra calculum, quia est rotundus, & etiam quia catheter est parum curvus, ideo aberrat à latere calculi, & quia calculus est obductus limo, non sentitur ejus durities, aut sonus; conclusio ergo, quod sectio sit facienda. Ager multis ante diebus est purgandus, & si plethoricus sit, etiam phlebotomandus, & prisana aut aqua cocta potandus, ut minus sit obnoxius inflammationi, & febri. Dico multo ante, quia si immediate ante sectionem illam fierent, esset nimis debilis. Docent aliqui, ut aliquot diebus ante venter, & perineum fomentetur decoctis emollientibus: sed ego non probò hoc, quia illa ratione partes incallescunt, & videntur disponi ad faciliorem inflammationem, & fluxum recipiendum. Munc diei sectionis alvum evacuet, vel natura vel clistere. Tum sæpe descendat e, gradibus vel cursiter vel saltet, ut calculus cadat in collum vesicæ. Eo factò, ager in mensa, aut scamno stabili semisupinus collocetur: & collo ac dorso pulvinaria supponantur; natibus verò lintheamina multa ad sanguinem excipiendum; poplites incurventur, & contrahantur, calcibus ad nates diductis: tum fascia tres digitos lata malleolis injecta pedes deligentur, ejusdemque capitibus sursum ad cervicem adductis, manus ambae ad suum quoque genu vinciantur; Ita revincto debebunt quatuor viri fortes assistere, qui brachia & pedes ejus & totum corpus fortissime contineant, ut illa movere, corpulse aut nates attollere nequeat, sed maneat in eadem sem-



semper quiete, & corporis situ, ne operatio impediatur. Deinde per canalem virgæ debet imponi argenteus catheter ordinarius, quia non est absolute rotundus, sed una parte externa parum retulum habens sulcum seu fossam, in quam acies novaculæ incidendis recipitur. Ille catheter vocatur, itinerarium, & debet imponi iuxta ad vesicam, ut calculum si heri possit, teneat. Imponitur autem propter illum tuum, ut nimirum sectio fiat contra ipsum, ut tanquam director manus Chirurgi ostendat, ubi sit secandum, & constituit terminum novaculæ incidendis, ne ipsa ulterius in subdita corpora pervadat. Et ideo habet sulcum, seu tollant, ut in eam novacula incidat, & ibi ligatur, quæ novacula alioqui aberrare à rotundo cathetere nec ligi posset, & sic in inferius subdita corpora penetraret. Ille ergo catheter seu itinerarium relinqui debet, ulterius cruribus à ministris assistentibus diductis, scrotum attollatur, & locus sectionis notetur atramento. Locus debet à latere esse: à latere sinistro, ut ante, septi seu lineæ, quæ est in perineo, ubi itinerarium, in vesicam immisum, seu catheter, intulit, ut scindas ultra ipsum septum, duorum digitorum ab ano interstitio. Nam septum illud cum sit callosum & exangue si secaretur, vulnus non posset bene consolidari, & remaneret fistula: si etiam propius anum sectio fieret periculum esset, ne mox, dum calculus revelleretur venarum hæmorrhoidaliū aliqua disrumpere, unde difficilis hæmorrhagia, vel sphincter musculus, aut vesicæ corpus dilaniaretur. Vulnus debet esse tam longum, quam erit pollex transversus; postea enim per instrumenta adhuc potest bene dilatari. Vulnere tacto debent per illud imponi duo alia specilla, quæ à se invicem diducta vulnus etiā diducant. Hæc instrumenta ideo imponantur, ne perdatur via & ingressus in vesicam: nam vulnere facto, prout muscoli varie contrahuntur, & unus venit ante alium, fieret, quod foramen clauderetur, & instrumenta ad calculum extrahendum non possent bene imponi, & via ingrediendi ad vesicam esset perditā: ideo illa duo specilla imponantur, quia illis impositis, non potest via perdi, quia inter illa possunt instrumenta immitti, & quando inter illa immittuntur tunc recta ducuntur in cavitatem vetricis, & quia sic illa specilla sic ducunt quodammodo instrumenta calculum extrahentia recta ad vesicam, ideo vocantur ductores. Illi autem ductores recta in vesicæ cavitatem imponantur, mediante cathetere qui in canali est, & usque in vesicam pertingit; secundum enim longitudinem corporis catheteris ductores imponuntur. Ductoribus impositis, non est amplius opus ullo cathetere, sed debet extrahi, tum inter ductores debet imponi verticulum seu specillum aliud, habens in extremitate globulum, ne lædat vesicam, ad tentandum, ubinam sit calculus. Eo scito, inter duos ductores debent imponi tenacula, ad calculum apprehendendum, & extrahendum. Si calculus sit major, quam ut per foramen commodè possit educi, debet foramen per instrumenta quædam dilatatoria dicta dilatari, &

facta dilatactione extrahi. Si apprehensus & utrinque adductus, calculus adhuc extrahi nequeat, similiter manus digitis in anum immisissis à tergo promoveri & extrahi debet: & simul per tenacula dextra extrahi, sic enim una manu trudente, & altera trahente facilis educetur. Si nec hoc sufficit & calculus tam magnus indicetur, ut sine vesicæ laceratione extrahi non possit, putetur, erit imponendus forceps dentatus, qui vocatur rostrum corvini, ad calculum apprehendendum, & intringendum in plures partes ut per partes extrahi possit. Si trahi non potest, delistendum ab opere & calculus reliqui debet: præstat enim calculum relinqui, quam Chirurgum cum vi extrahendo esse causam subitæ mortis ægrotantis. Etenim tamen, relicto calculo, oportet foramen semper relinquere apertum, ut urina per ipsum educat; sic enim æger adhuc potest supervivere, & quidem sine magnis cruciatibus, ut postea dicemus: quod præstat, quam ej sic violentam mortem inferre. Si extrahatur, videndum, an sit integer, & adhuc subsint alii. Si sint frusta, vel arenula, illa debent extrahi, per aliud quoddam instrumentum impositum, quod curriculum appellatur, quod est iuxta oblongi cochlearis. Quando adhuc calculus subsit, debet illo eodem specillo in extremo globulum habente de quo ante mentio facta est tentari, & eodem modo, ut prior extrahi. Hæc ubi facta sunt, si vulnus videatur esse magnum, debet sui, & in ipsum debet imponi uno, aut altero die tubulus argenteus foraminatus, ut per eum concretus sanguis qui adhuc in vesicæ hæret, possit adhuc evacuari; Interim medicamentum consolidans ex sanguine draconis, bolo, ovorum albumine, oleo rosato, pilis leporinis, & similibus debet superponi. Non est malum etiam vulnerarias potiones per os exhiberi, & decoctum anodyni, & moderatè refrigerans, & detergens, per vulnus in vesicam tepidè injici, quo ardor vesicæ, ex prægressis per instrumenta contusionibus excitatus temperetur & sordes eluantur. Interim pedes ægri debent colligari, & vulnus sicut alia vulnera curari. Quod si sordes, aliquæ arenulæ, aut grumi sanguinis in vesicæ collum incidentes meatum obstruant, & urina exitum impendant, debent cathetere intus cavo, per canalem immisso removeri; Et debet catheter in canali relinqui per dies aliquot, donec sordes per vulnus sint purgatæ, ut sic canalis virgæ maneat liber, & utina per catheteris cavitatem effluat. Sed notandum in hac sectione, quod plerique omnes doceant, eam faciendam cum novacula ignita: & hoc securius est, eaque ratione, & convulsionem, & hæmorrhagiam quæ supervenire possunt, magis evitari.

Ratio sectionis in mulieribus adultis, ac conjugatis est talis. An calculus in iis subsit, exploratur, digitis non in anum, sed in cunnum immisissis, & antrosum versus situm vesicæ incurvatis. Exploratur etiam per minimū catheterem; sed catheter in illis debet esse rectus, & minimè, ut in viris curvus, & debet esse brevior, quia meatus urinaris in illis & rectior & brevior est quam in viris; & im-



ponitur minori molestia, & dolore, eo quod in iis canalis sit laxior. Ex quibus patet, quod modus explorandic. scilicet in iis sit longe facilior, quam in viris. Cum conuulserit eos, calculo laborare, compotitis in scamno, ut de viris dictum, catheter ille, qui itinerarium dicitur, & testulam habet, seu tana in canalem urinae imponi debet, sic ut rima extorsum vergat, & ut novacula in eam incidere possit. Iud itinerarium quoque debet esse rectum & brevius quam in viris. Tum super pudenda, inter canalem urinae & os pubis, & non in perineo uti de viris diximus, facienda sectio est, sic, ut novacula itinerario respondeat, & in ipsum incidat. Tunc digitis sinistrae manus in cervicem uteri immisiss calculus ad vulnus protrudatur, & vel uncis vel tenaculis extrahatur. Notandum monet Paræus, q. vulnus in mulieribus tam magnum neri non possit, neque tanta dilataatio licita sit quam in viris. Unde si æque dilaretur, contingeret, ipsam vesicam dilacerari, ex qua remaneret urinae incontinentia. Reliqua eadem sunt, quæ in sectione viri.

Cum puella secari debet, si est infra 7. aut 10. annos, debet secari, sicut pueri masculi, digitis in anum, non autem in genitalia, sicut in mulieribus immixtis, & tota reliqua sectio est minoris apparatus; in iis propter ætatem digiti sine magna violentia in genitalia immitti non possunt. Locus sectionis idem est qui in magnis mulieribus: si secandæ sint virgines provectoris ætatis, possunt illam digitorum in genitalia immersionem tolerare. Itaque præstat eas sic secare, quam digitorum in anum immersionem; facilius enim, ac securius tum sectio procedit; propterea quod uterus vesicæ sit vicinior, quam rectum intestinum.

Verum quia omnis extractio calculi est valde periculosa, præcipue in senibus, qui sunt imbecilli, propter tot contusiones, quas vesica debet pati: a digitis, catheteribus, ductoribus, verticulis, everticulis, tenaculis & uncis, unde inflammatione sequitur: Et quia periculum est ne, dum extrahitur, vesica dilaceretur, vel si asper sit calculus, vesicæ hæmorrhoidales vel aliz lacerentur, unde lethali hæmorrhagia sequetur: Et quod maximum est periculum, ne dum calculus apprehenditur, & extrahitur, una etiam substantia vesicæ cum eo apprehendatur, extrahatur, & dilaceretur: Ideo aliqui docti viri invenere aliam rationem sectionis, qua calculus non extrahitur, sed relinquitur. Hæc sectio in valde senibus locum habet maxime, propterea, quod illi debiles sint, & non tam bene possint extractionem ferre; ad hoc quod illi jam fere ad terminum vitæ pervenerint, & ideo non debeant hanc molestiam quæ ab hac sectione remaneat, tam diu quam juvenes tolerare. Locum etiam habet, ubi calculus est valde magnus, ad eod ut sine periculo dilacerationis vesicæ, & mortis non videatur extrahibilis. Hæc sectio dubio procul minus est periculosa, quam præcedens; nam etsi ipsum vulnus quidem sit periculosum, tamen ex magna parte non est tam periculosum, quando tantum sit vulnus simplex & nihil aliud quam quando insuper sit calculi extractio. In hac ergo sectione sit vulnus, sicut supradictum

usque ad vesicam, sed multo minus quam antea, & calculus non extrahitur, sed relinquitur, sed curatur, ut vulnus nunquam claudatur, sed ut occalescant labra eius, & maneat semper apertum, ut sic urina per illud perpetuo nuere possit. Ideo primis diebus imponitur tubulus argenteus foraminatus, ne claudatur, quousque labris obducis ipsum per se maneat apertum. Hæc sectio non est equidem perfectum calculi remedium, quia calculus ipsum non auferre, sed est tamen valde utilis; etenim auferre & minuit præcipua symptomata quæ calculus adducit. Nam imprimis tollit periculum suppressionis urinae, quod a calculo quotidie imminet, quia sic facto foramine potest urina per illud semper exire sine periculo suppressionis ejus: nam si calculus ante illud foramen cadat, leuiter illo remouetur, & suppressio tollitur; si vero illud caderet ante canalem vesicæ, occluderet ipsum, sic ut urina exire non posset, nisi cum maximo dolore, & periculo imponderatur. Et ut imponatur, sæpe calculum non potest removere. Deinde tollit illum intolerabilem cruciatum in reddenda urina, quam calculus semper faciebat: propterea, quod cum urina exeat per vulnus in cuius labris callosis non est ullus sensus, & sic non fit dolor, antea vero exibat per ductum urinarium & virgam in qua est acutissimus sensus, & ideo excitabatur immensus dolor. Tercio etiam quia præcaveat mortem, quæ ante certo esset secutura: nam vesicæ ulcus, & inflammatio, quæ semper calculum comitantur, possunt facilius curari injectionibus in vesicam per foramen factis, quam ante poterat: alias autem periculum mortis erat, sicuti etiam ab urinae suppressione, cuius periculum, ut dixi, hac sectione tollitur. Verum quidem est quod sectio cum extractione calculi esset melior, quam hæc, si esset æque facilis: sed est longe periculosior. Præstat ergo habere aliquod remedium moderatum cum securitate, quam majus cum periculo maximo est. Etiam verum, quod hæc sectio habeat magnum inconveniens, quod scilicet non o tota vita debeat laborare involuntario per vulnus urinae stillicidio: sed melius est hanc molestiam ferre quam in periculum vitæ incidere: Atque hæc est tota de calculi sectione doctrina. *Thom. Fien. de præcipuis artibus chirurgicis controversiis tractat. 9.*

Dieteticis atque pharmaceuticis remediis jam breviter excussis, superest ut ultimum illud, scilicet chirurgicum jam exponamus.

Vesicæ sectionem, si plethora, vel nimius sanguinis æstus adsunt, ex usu posse esse statuimus.

Cucurbitulas in regione lumbari positas, in dolore nephritico calculum unum vel plures ad vesicam derivasse, experientiâ sapientis observatum.

Si vesicæ lapis major sit quam ut expelli queat, nec defectu requisiti ad id medicamenti resolvi possit, si atrocitas morbi nullis medicamentis succumbat, tunc duriori nodo durus adhibendus est cuneus.

Circulatores plerumque enim omnes ridemus hic & Empiricos, qui calculum vesicæ medicamentis ore assumptis terere fabulantur: idem evincunt, literæ paucis jam elapsis diebus ad nos dare.



J. G. Eques Auratus.

JOANNI GROENFELDIO,

M. D. S. D.

**C**UM mihi in mentem venit, cum quo mihi res impræsumptuarium agenda est, viro nempe eruditione & experientia notissimo, confisus spero, quod non me arguas vel ingratas induas, vel imprudentia, cum de salute fuis sollicitus essem, liberrissime enim vellem, ita me inveniēte paterno affectu, & naturali curâ, ut qui Tyrannidem tantam subiit, modo lenissimo sanaretur, idcirco sanè spes mihi affulsu major, quod inveni quendam (qui vult, ut fuit, qui in Arthritide & Hydropse curandis, & nuper perime quoque in comminendo calculo, summus voluit esse mysta, solâ spe lucri, fractis omnibus pudoris repagulis, abentia jam diu fronte fuit induit) qui affirmavit intra viginti dierum spatium se potuisse frangere & expellere calculum per medicamenta intus assumpta, etiamsi calculus tantus esset, ut pugni magnitudinem excederet: sed ab! quanta de spe decidi cum filio meo, cum fallacia & impudentia ignorantis Empirici miserè fallebamur, & filius meus adhuc subit totam calculi gravissimam.

Ad Te itaque, tanquam ad asylium, confugio, opem implorans vestram, ut teneres an calculum in vesica concretum invenire possis, & si invenias, ut eandem adhibeas curam quam (cum bono Deo) habuisti, respectu fratris ejus Senioris, quem biennio abhinc per Lithotomiam à calculo liberaisti, & manes adhuc in perfectâ valetudine.

Dent prætor ut res publica bono Te diu velis prosperam esse & valere.

## Nostra Responsio.

Eximie Domine,

**A**ccepi Literas à Te 1. Martii 1684. datas, quibus certior factus sum de bona valetudine filii Tui, natu majoris (quem non ita pridem à calculo liberasti.) Sed me statim dolor aggressus est, cum lucris istissem percepi, filium tuum juniorem eodem malo oppressum esse, quo prius senior afflictus fuit, quem (vestra me invitante Dominatione) hodie visui & calculum inveni, jugi & magnitudine excedentem, solidum etiam & confirmatum.

Quoad istum, cujus audaciâ fuisti seductus, bene novimus Thrasonem esse vanum, & qui gloriari solet de rebus impossibilibus & extra sphaeram activitatis humanae positis, nec erubescit de rebus etiam turpissimis; qui nihil honoris vel ingenuitatis habet, nihil quoque ipsi detrahi potest. Ingentem ostendimus talium impostorum gregem, perniciosam hominum sacem, qui ruditate & incitiâ suâ imponentes, & in circulis civitatum versantes, vanissimo verborum strepitu panaceæ miracula jactant. His verò mendacibus, & inanibus Medicastri præstaret tacere, quam in detrimentum proximi nociva remedium crepitacula credulis obtrudere. Ten Rhyn Tractat. de Arthr.

Quod ad nos atinet, talem licentiam nobis nunquam assumemus, ita in altis & contemnendam &

supprimendam duximus.

Id nobis stipulatus iure nobilissimus ipse Galenus, Medicorum Princeps, qui asserit quod in medicamentum integris viribus vesicam attingere non potest, atque si concedamus attingere posse, vis medicamenti infringitur, tum amplitudine vesicæ, tum involucri & pituitâ multâ quâ circumvolvitur.

Itaque jam tandem ad ultima remedia progredimur quæ si tentanda sunt, exequio iunctuend. est (de qua vid. Pareum Schultetum, Hildanum, Cornelium Celum, etc.) diebus vero aliquot antea, victu corpus preparandum est, ut modicos s. lubricosque cibos & minime glutinosos assumat, & inter hæc ambulandi exercitatione utatur, quod magis calculus ad vesicæ cervicem descendat, ut ipse Celsus.

Cujus rei ubi fides est, pridie id corpus tenui victu nutriendum, & tunc loco calido curatio adhibenda est, quæ diversis modis ordinari potest.

**PRIMUS** apparatus vocatur minor, ægri continet, & in quo omittitur præparatis index & medius digitus manus sinistra in anum immittuntur, dextrâ manu venter interior versus vesicam deprimatur. (à violenta compressionem hic summo opere cavendum, hinc enim atrocissimi dolores, inflammationes, imò ipsa gangrena)

Ex quibus evenit, ut in angustum compulsa vesica facilius capi possit, quo capto in perinæo super calculum fit incisio, digitisque, si minor sit lapis extrahitur, si vero major, hamulo extrahitur.

Minimè festinanter hac in re agendum, sed ita, ut quam maxime tuto id fiat, nam læsa vesica nervorum distentiones cum periculo mortis excitat.

**SECUNDUS** est Hildani, qui fit hoc modo: omnibus præparatis Medicus catheterem, (non talem intelligo, quali ad urinam suppressam utimur, sed qui sulcum seu fossam habet. vid. Parzum, lib. 17. cap. 44.) in vesicam immittit super calculum, tum novacula media sui parte obvoluta, incisionem facit ad catheterem usque, postmodum super catheterem sive iterarium per vulnus conductorem immittit, catheterem, ut virga sit libera, extrahit, conductorem, si sit opus, vulnus dilatat, tumque per latus conductoris cochlearia immittit, extracto conductore, immissoque in anum digito, hamulo prehendit & extrahit (Tortorem) calculum, sive integrum, sive frustulatum, si nempe major justo aut tenerioris compaginis fuerit.

**TERTIUS** modus, quando modo præcedenti vulnus est inflictum, super conductorem tenaculam immittit, quo extracto prehendit Medicus calculum, & sic eum extrahit, quod locum habere potest, cum lapis hamulo extrahi nequeat.

**QUARTUS** operandi modus Lithotomia Franconia appellatur, ab Auctore Petro Franco, fit hoc modo:

Incisione præcedenti modo factâ circa extractionem calculi nihil molitur Lithotomus nisi calculus in vulnere compareat sed vulnus more solito ligat, post aliquot dies (nisi calculus sua sponte per vulnus excidat, quod sibi



in sua praxi aliquoties accidisse dicit inventio-  
nis hujus Auctor (Petrus Francus) calculum ex-  
trahere, quando æger est valde debilis, ut ju-  
dicat Hildanus.

**QUINTUS** Modus est cum calculus est tam  
magnus, ut per vulnus in collo vesicæ factum,  
transire non possit, nisi substantia membranea  
vesicæ, vel ejus sphincter laceretur: quod Au-  
thor Petrus Francus non proponit, ut ipsum  
aliquis imitaretur. sed in casu tanquam des-  
perato, coactus precibus parentum infantis,  
in quo operationem instituebat, fecit.

Æger erat infans bimulus, qui calculus ovo  
gallinæ non minorem in suo gerebat corpusculo  
(in adultis hanc operationem locum non  
habere vult notari Auctor) sectionem institue-  
bat in inguine & superiore ossis pubis parte,  
ut fere partus cæsareus sit, & sic secundum vesi-  
cæ transfodiebat, & extrahere calculum.

Infans quamvis maxime debilitatus, fuit re-  
stitutus, & vulnus sanatum: tale Hildanus  
alibi in suis observationibus quoque com-  
memorat exemplum.

**SEXTUS** & ultimus modus fit instrumento  
quod excogitavit Hildanus: tacta eo modo  
(uti dictum) incisione, immitte per vulnus  
suum instrumentum super calculum, illud quan-  
do est immisum dilatari potest (instar instru-  
menti quod Speculum matricis vocamus) post  
dilatationem conatur Medicus calculum ap-  
prehendere apprehensumque extrahere.

Parisiensis ille Lithotomus, cui Collot nomen  
est, plurimos hoc modo satis feliciter secuit,  
ex cuius ut & aliorum curiosa inspectione tan-  
tum protegit Tractatuli hujus Auctor, ut hunc  
cum cæteris quoque Operationis modis ag-  
gressus fuerit, & adhuc quotidie peragat.

In foemineo Sexu, sive sit Virgo, sive nupta,  
longè minori negotio, & citra sectionem ma-  
gnamve sanguinis effusionem, hanc operatio-  
nem instituere & peragere licet: quia vesicæ  
fora ten in pudendo statim occurrit visui, su-  
fficit solum catheterem immittere, & infra ejus  
sulcum dilatatorium instrumentum indere, de-  
nique forcipe lapidem extrahere: Interdum  
tamen ob calculi nimiam quantitatem in vesicæ  
orificio parva incisio facienda est, à qua nihi-  
lomius, ut & à nimis violenta dilatatione,  
periculum metuendum est, ne læso spinthære,  
sequatur involuntaria urinae emissio.

Jam sequitur, ut, extracto calculo, aga-  
mus, qua ratione sit regendus æger, non sta-  
tim ille in lectum erit reponendus.

Si valens fuerit corpus, nec magnopere  
vexatum, sinere oportet sanguinem fluere, quo  
minor inflammatio oriatur.

Tunc desiderare debet in semicupium, ita ut  
à genibus ad umbilicum aqua teneat (cætera  
vestimentis circumdantur) quo sanguinis hæ-  
morrhagia sistatur.

In corpore imbecilliori hæmorrhagia statim  
sistenda erit, agglutinanda aliquando cucur-  
bitula & inguinibus & coxis, & super pubem, si  
sanguinis fluxus cohiberi nequeat, qui si cohi-  
bitus, æger resupinus in lectum collocandus est.

Venter interim inferior ab umbilico ad lum-  
bos itidem & pudenda, oleis convenientibus  
paululum calefactis optime unguatur.

Vulnere linteolum duplex vel triplex, astrin-

genti medicamento madens, imponatur; ce-  
nula aliquando vulnere immittitur, qua arenu-  
la & sanguis extravasatus potiusquam con-  
modius expurgetur, per illam & siphon quoque  
immitte potest, quo, necessitate urgente, ve-  
sica tyringetur, sicque continuo excutitur,  
quicquid præter naturam in ea continetur.

Si apothymia superveniat, cardiacis remo-  
veatur, ægerque placide ad quietem reduca-  
tur, ac si somnus non obrepat, anodinis in  
tioribus promovendus.

Sicque, si vires ferant (hæc ipsa Celsus  
tradit) interpolitis viginti quatuor horis, bal-  
neum iterum ingrediendum, & pro virium  
constitutione in eo demorandum, si sudor ali-  
quis erumpat, spongia detergendus erit.

Inter hæc si somnus blandior æqualisque res-  
piratio adsint, si lingua sit madens & modica  
sitis, & venter inanius sedit, & mediocri-  
cum modica febre dolor, curationem felici-  
ter procedere, certum est.

Denique, quantum possibile est, & cibis &  
medicamentis alaborandum est, ut natura,  
quæ saluberrimum balsamum suppeditat, cor-  
roboretur sicque vulnus consolidetur.

Omnibus itaque, ad renum & vesicæ calcu-  
lum pertinentibus hucusque breviter descriptis,  
unum superest, nempe modus eximendi cal-  
culum ex urethra quem breviter describemus.

Contigit aliquando, ut calculus exiguus &  
vesica excludatur, in urethra tamen illapsus,  
ibidem sistitur, urinaeque iter occludit.

Quo in casu omnia remedia tentanda & ap-  
plicanda, quæ apta nata sunt calculum educere  
absque ulla incisione.

In horum numero Primò occurrunt medica-  
menta diuretica, emollientia, fomentationes,  
insestus in balneum, qui sunt relaxantis quali-  
tatis, quorum ope calculum non in nimiam quan-  
tatis eduximus ex urethra ingeniosissimi ad-  
modum Viri, Equitis Aurati, & Regi à rebus  
castrensibus Architecti.

**SECUNDUS** modus est extensio urethrae  
per statum, ligando eam virgæ partem, quæ  
juxta pubem est, eodem modo, quo frequenti  
usu fuit apud *Aegyptios*, urethra nempe ita di-  
latata, liberior exitus calculo patet.

**TERTIUS** modus sugendo efficitur, cum  
maximo conatu spiritum trahendo, lapis simul  
adhuc.

**QUARTUS** modus est comminuendi calcu-  
lum, ope tenaculæ & specilli (de quibus vide  
Parzum, Hildanum, Schultetum) qui cum suc-  
cessu sæpius efficitur, ideoque maxime lauda-  
dus est.

Hæc verò si frustranea sint, ultimò tandem  
fiat incisio: inter Authores summa disputatio  
est de loco, in quo incisio hæc facienda est.

Quidam eligunt partem lateralem, caven-  
do, nè inferiorem secando, fiat fistula; aliqui  
partem inferiorem, ne corpora nervosa offen-  
dantur.

Quod ad nos attinet, utrumque modum  
tentavimus, curam invenimus faciliorem, ne-  
que ullum ægris fuisse detrimentum percepi-  
mus, cum incisionem facimus in parte nervo-  
sa laterali: incisione facta, calculus unco subti-  
lissimo & tenerrimo educi potest.

Quibus jam peractis, vulnera post extractio-  
nem



nem calculi (sive vesicæ sint, sive urethræ) curanda supersunt, de quibus abunde descripserunt Practici, ideoque & ea impræsentiarum mittimus. *Joan. Grænevelt in Dissert. sua Libolog.*

### Consultationes.

Ex enarratis symptomatibus Illustriss. & Excellentiss. D. Marci Procuratorem divexantibus, dolore scilicet quodam continuo gravante in sinistra parte lumborum, & suberuentis urinis ex levi quocunque motu, iisdem que a validiori, & concitatiori cruentis omnino, quæ postmodum incidentes hypostasim habent sanguinis fæci non dissimilem, dum autem abstinet a quocunque motu, inclarescunt, & sanguis similes effluunt, dubium occurrit, utrum causa non habeant æstusum renum calorem, ut censent Virorum Præclarissimorum aliqui, in consilium de affectu acciti; an calculum renibus impactum. Ego verò liberè, & incunctanter pronuntio, & statuo, hanc urinarum varietatem cum gravitate sinistræ partis lumborum non posse fieri ab immoderato renum calore, duplicem potissimum ob causam. Primo, quia gravitatis sensus continuus in rene sinistro ab intemperie induci nulla ratione potest: sed vel à materia suo pondere gravante, ut propterea prodiderit Hipp. ubi de renum calculo Primo in 6. Epid. 6. quod *in rene dolor gravis*; vel à partibus adjacentibus, quæ comprimuntur, ex Gal. in Comm. Secundo, & id patet, luculentius ex urinis illis variis, quæ motu cruentæ evadunt, quiete vero inclarescunt: siquidem quando affectus ortum ducit ab intemperie, illa vigente, dura hic; qua vicissim recedente, & ipse cedit, nulla superflite molestia, nisi denuo convalescit intemperies, cum nulla sit ratio, quod ex levi quocunque motu incallescant adeo renes, ut venæ referatæ sanguinem effundant. Propterea pro comperto statuendum, affectus præsentis causam esse calculum in rene sinistro, cum quantitate continua in regione sinistri renis prematur. *Ubi enim dolor, morbus* qui quidem calculus inæqualis, & scaber est, non lævis, & veluti marmoreus, ut ajunt: alioquin renis substantiam non abraderet; quod contingere existimo ex quolibet corporis motu; magis tamen & minus, prout concitator est & minus violentus: quod quidem aliud est calculi signum ab eodem Hipp. l. cit. memoratum his verbis: *sanguinolentum mejuat*. Neque facessit negotium, quod Vir Illustriss. stuporem non observet in femore è regione partis affectæ ab eodem Hipp. propositum; quoniam in eam molem non excrevit, ut ex venæ cavæ, & arteriæ magnæ descendentes compressione, spiritus, & sanguinis ad infernas partes affluxum interciperet. Vomitus autem comitatus est pituitosæ materiæ multâ copiam ab assumpto medicamento, & injecto clystere. Sicuti enim hæc in ventriculo coacervata, & ad renes decumbens, si ab ipsorum expultrice cavitate ampla patentium exturbetur, nullam, vel levem saltem infert molestiam, ita si ipsis infusa fuerit, atque adhæserit artibus, ita ut ab expultrice non possit inde extrahi, &

expelli, tunc novam à venâ cavâ suscipientes, continuo partium ductu coacervatur, discussisque partibus tenuioribus in calculum concrevit, etiam si renes immo dico calore non æstuent, ex Gal. in prædicti textus Commento.

Utrum autem ipsi exirpando, & excludendo potius *aquarum Thermalium*, & in primis B. Virginis ex usu sit futurus, quod deinde queritur; censuerim equidem non inutilem hanc futuram, si liberè permeaverit, quæ expurgandis humoribus in renibus coacervatis, quæ calculi incrementa prohibendo. Quod vero ipsum jam concretum ad vesicam propellere possint aquæ illæ, non admiserim, si in eam molem excreverit, ut ureteres subire non possit, quod vereor. Neque unquam competeri diuretica lapide frangentia, dummodo non coaluerit ex pluribus arenulis compactus. Has etenim secernere, & expurgare fateor. Quod innuit Hipp. sequenti textu: *Quiescere non confert, sed exerceri non repleti. Juvet res hel-leboro purgare, poplitis venam secare, cicutibus urinam purgare, attenuare, & emollire*. Hæc enim cuncta conferre possunt cum præervationis loco, à calculo, confluyente materia ad renes, tum curationis arenularum, antequam in legitimum calculum obdurescant: quem, quando jam concrevit, incurabilem censeo; ut propterea quolibet medico præsidio diuretico supersedendum sit, præter solam rectam victus rationem, humorumque in corpore redundantium expurgationem, vomitu, & per alvum institutam. Acque hæc responsi loco ad prædicta querita abunde fuerunt. *Benedict. Sylvatic. Consil. & Respons. Medic. Cent. 3.*

Accuratè usque adeo à Viris Excellentissimis expensus est affectus hic, quo paucis ab hinc mensibus Perillustri Dominus, integræ alioquin valetudinis, divexatur, ut quod addam non habeam. Ne tamen sententiam rogatus detrectare videar, hanc paucis proferam. Cum igitur, si excrementum sanguinem cum lotio, si pondus in perinæo, si dolorem, & mordacitatem, si acrem illam ab urina effusa superflitem meiendi voluntatem perpendimus, dubium nullum sit, quin pars affecta sit vesica. Hoc solum superest inquirendum, an à calculo, an verò à falsa pituita memorata dependeat accidentia. Equidem ut verum fatear, levior licet illa in dictis partibus, continua tamen molestia, ponderis aliquis sensus in perinæo, atque supra enarratorum accidentium exacerbatio ab ascensu, descensuve scalarum aut exercitio violentiore; necnon & sanguinis cum urina permixtio, cum vel equo, vel curru vehitur. de calculo præsentis mihi gravem injiciunt suspensionem, ne dixerim id præter omne dubium esse atque luculenter comprobari ex rubris illis, albisque arenulis, ac mucosa illa in urina hypostasi, calculo perquam familiari, ut & ex sanguine excreto, qui à falsæ pituitæ fluxu laud ita facile contingit. Accedit corporis habitus, ætatisque senilis: præterquam quod & cathetere ipso à perita manu insinuat id facile explorari possit. Neque à mea me abducit sententia, quod Vir perillustri duos necdum, aut certe non am



plius, menses his malis opportunus fuerit: quod temporis spatium angustius videatur, quam ut eo concrefcere calculus possit. Non enim ignorant Viri illi Excellentissimi sæpenumero calculum, copiosa in primis pituita obdusum non quo tempore primum coalescit, sed nonnisi grandiore jam factum excruciare patientes. Quod observatum à me est in quodam nollro nobili sex abhinc annis; qui ne vel levissima quidem prius vesicæ molestia affectus, ex equi citatiori cursu, sanguinem cum lotio cepit effundere, ac frequenter deinceps meiendi voluntate, non absque cruciatu sollicitari; tertio autem post mense instituta sectione, quod constanti sententia calculum adesse pronunciarem, duo mole ovi gallinacei me iudicio falsum non fuisse prodiderunt. Frustra quinetiam objecerit quis quod perillustis hujus Viri molestia paucis admodum usque levissimis medicamentis cesserit. Evacuatis siquidem, aut contemperatis humoribus ad partem affectam decumbentibus, delitescit nonnunquam adeo malum, ut derepente se quis incolumem, atque ab omni prius calculo immunem existimet. Quod contigit nuper Illustissimo atque Reverendissimo Candiæ urbis Archiepiscopo, qui cum crescente Luna atrocissimis earundem partium doloribus excrucietur, eadem decrecente usque adeo dolore vacabat, ut Medicorum non pauci à mea de calculo sententia recederent: quum nihilominus alii amplexabantur, donec tandem calculus cathetere deprehensus est. Quod si purgante medicamento perinæ illud pondus, mordacitas, meiendi voluntas, ac reliqua partium illarum noxa usque adeo cesserit, ut quindecim aut viginti dies dolore prorsus vacaverit, adscriptum & ego memorata accidentia falsa pituita à capite, & ventriculo ad partes illas, natura forsitan. ut alia de causa imbecilliores decumbenti. Quod si juxta vota contingeret, ut de salute perillustis ægri firmior esset spes; in errorem tamen cum præceps sit lapsus, ab eo quammaxime cavendum. *Idem. ibidem.*

Vir Nobilis annorum 58. temperamenti calidi, & humidi, ad melancholicum vergentis, ventriculum frigidum sortitus, catarrho opportunus, conqueri cepit x. ab hinc annis de doloribus nephriticis quotannis recurrentibus, cum urinis non raro cruentis, ab excreto tamen calculo inclaretcentibus. Ab accurata verò totius corporis purgatione, aquæ potissimum Tertutianæ usu instituto, anno 1641. ac sequenti, diarrhæa gravissima, & tantum non lethali correptus, biennii spatium nullum excrevit calculum, cujuscumque ferè doloris nephritici expertus. Anno verò 1645. novis doloribus divexatus, non tamen gravibus adeo, ejectis octo calculis, paucis diebus ab illis immunis fuit: mox anno 1646. invalescente iterum dolore, cum ventris pondere infra umbilicum & acri meiendi voluntate, non sine consensu extremæ glandis calculum fabæ mole expulit, qui in extrema glande hærens, instrumento chirurgico inde evulsus est: superstita tamen ventris pondere: quod de alio calculo suspicionem auxit licet à perito chirurgo cathetere factò periculo nihil se prodiderit;

superstite nihilominus frequenti meiendi voluntate, atque cum antehac ab exercitio validiori urina cruenta efflueret, nunc & absque illo quin etiam hujusmodi conspicitur, supprimiturque brevi temporis spatio, sponte postea manans. Cum vero ante hoc tempus dolores 20. & plurium dierum spatio convalescerent, nunc octo, vel x tantum, triduo circiter id contingit, cum excretionem materiæ catarrhalis; accedente ab aliquot annis destillatione catarrhi ferè continua, cum raucedine, corporisque lassitudine, tunc potissimum, quando meiendi voluntas sollicitat, ut propterea meum literis poposceret consilium, cum Parmam anno 1647. ad curam Sereniss. Cardinalis Farnesii immortalis memoriæ accitus essem cui tunc mentem aperui, suspicari me scilicet de novo calculo, quamquam à lithotomo non deprehenso, cum Excellentiss. Medici Placentini curæ ipsius præfecti prædicta symptomata ad catarrhum falsum referrent, in quibus tuit præstantissimus Medicus Lodovici; iis fortitan adducti rationibus, quod catarrhi destillatio sit manifestissima, nec ardor urinae continuus, quinimo plures dies molestia vacans, atque potissimum, quod lithotomi peritissimi effugerit nianum. Cum tamen ego mente recolerem præteritos affectus, plures calculos antehac ejectos, urinae suppressionem sæpe recurrentem, & illico sponte recedentem, absque materiæ alicujus excretionem, & insigni molestia, qua afficitur non solum curru vectus, in lectica, & dum pedibus ambulat, cum mictione cruenta, pro comperto à veteri calculum adesse in vesica, non in renibus, ut sensuit Excellentiss. Archiater Neapolitanus. Si enimque sanguinem meiat, aut grana, aut fillicidium urina patitur, & dolor in i nium incidat ventrem, pellem, & perinaum, ad vesicam loca laborant; ex Hipp. 4. Aph. 60. Cum tamen tunc Nobilis patiens Parmam concessisset, consilium rogaturus Excellentiss. Medicor. Aulicor, aliorumque ad curam Sereniss. Cardin. Farnesii accitus, eadem constans fuit omnium sententia; atque periculo iterum factò à lithotomo Sereniss. Principis, calculus se prodidit, ab agro tandem admittis, ut propterea cum toleratis sententiis multa in medium proferrentur, unanimi tandem consensu determinatum fuerit quod à Gal. sancitum est 5. in 6. epidem. scilicet. vesicæ solam manus operationem admittere. Quod sapius experientia comperi, potissimum vero in Illustri & Reverendiss. Joan. Bello, Canonico Patavino & publico magni nominis Moralis Philosophiæ Professore vesicæ calculo laborante, qui duos annos continuos plura medica præsidia tamquam compertissima libitranmissa frustra adhibuit, calculo sectione extracto ovo gallinaceo mole pari, integro omnino. Cum autem anni tempus calidum vigeret, deliberatum hanc operationem differendam esse ad autumnum quo tempore eam lithotomus Placentiam accitus administravit, eduxitque calculum, & Nobilem Patientem pristina valetudini restituit. Hæc enim dummodo peritam manum fortiatur, in patiente alioquin boni habitus, & integritatis virum, semper est tutissima; ea lege, ut fiat potius amplior, quam angustior, cum non satis



constet de calculi magnitudine. Si enim angustior fuerit, dilacerantur partes in extractione calculi, atque ita suborto ulcere, febris quandoque interitum accelerat; quod contigit prædicto Rever. Bellono.

Cæterum dubium superest elucidandum, quæ ratione hac ætate procreta, & in primo senio procreari possint calculi in vesicâ, cum proditum fuerit ab Hipp. in 6. Epid. 15. quod *Le pte à mictione pueri magis*: ubi Gal. in commento. *Scimus autem inquit, pueros quidem in vesica calculos sibi procreare, in renibus autem ætate procreatos. Causam vero huius rei assignans Hipp. in textu, subiunxit; Vtrumne quod calidiores. quod explicans. Gal. in commento hæc habet. Pueris itaque, qui calorem nativum multum habent, & validas functiones, materia crassiuscula ad renes pervenit, atque ob id facili ad vesicam colatur, functionum robore non parum ad crassiusculi penetrationem conferente. Vesica vero cum frigida sit, quod nervosa, & pauca sanguinis exilis, & magna in sui capacitatis, concrevit hic & coagmentatur. Ex quibus patet obiter, calorem nativum ex Hipp. & Gal. diversum esse à temperamento. Ratione namque temperamenti, calidiores sunt juvenes pueris, si sermo fiat de temperamento corporis viventis, quæ vivens est. Ille namque quo propior principiis est generationis, eo vegetior est. Ex primo enim Aph. 14. *Qui crescent plurimum habent de calido innato*, ut ex his constare videatur, calculos in vesica procreari in pueris, non verò in adultis. Propterea statuimus solutionis loco, calculos in vesicâ vel concrevere immediate, vel coagmentari ex eorum rudimento in renibus jam concluso: in pueris verò in ipsa concrevere immediate quod expressit Hipp. *à mictione* id est ex materia superflua post mictionem; in adultis autem procreari in renibus ante mictionem, sed in vesica non raro hære, vel ob crassitatem, vel ob expultricis imbecillitatem, atque tunc in vesica coagmentari, & grandiores heri, ob adhæsum materiam crassam, & viscidam. Quæ superpondii loco fuerint. Idem ibidem.*

*De Præservatione à calculo post sectionem. Pro Reverendiss. Marino Cerchiari, Veneto.*

Nephritidem esse morbum hæreditarium, palam facit luculentissime Reverendiss. patiens, magni nominis Concionator, & Dominicani Cœtus Provinciæ præfectus, quippe qui parente natus est à pubertate ad 48. usque ætatis annum, quo obiit, stranguriæ, & arenularum excretionum maxime opportuno, ut & duo ipsius fratres. Quo propterea affectu patiens Reverendiss. boni alioquin habitus, staturæ mediocris, & temperato propior, ab adolescentia excruciarî cœpit. Dominicanorum liquidem cœti adscriptus 10. ætatis anno, arenulas excrevit, atque cum in Hispaniam studiorum causâ equo iter faceret, nocturna, diurna que invita pollutio illi suborta est, cujus ratione vel in sella sedens, vel in tabula decumbens somnum captare coactus fuit cum vero juxta sacri Cœtus normam rigidam, & severam piscibus, & ovis uteretur, atque studiis assiduo invigilaret, lanceis vestibus anictus, continuo fere pruritu in extremo pene divexatus

est. Anno verò ætatis 18. in Italiam redux, publico docendi & concionandi muneri cum operam addidisset, Cznobiorum quintiam curâ ipsi demandata magna sollicitudine, nominis sui fama nec sine neglectis medicis præsidii, & propria salute polthabira Dei cultui, & Dominicano Cœtui, doloribus Nephriticis atrocissime triduum excruciatu fuit, anno ætatis 58. Quibus iterum novenniò post invadentibus, Venetiis concionatus calculum parvum eiecit; hunc per vices Venetias Veronam, & aliò concionandi causâ profectus, curru vectus, non solum invitis pollutionibus, sed & doloribus nephriticis atrocissimis, stranguriâ continua, frequentique micendi desiderio divexatus, urinam effudit crassam, & cruentam, cujus ratione Patavium redux consilii causâ, cum meam de vesicæ calculo mentem aperissem, affectu spreto, quanquam ex levi quolibet motu cruentum quid miceret, concionaturus. Venetias reversus, quatrinduo post doloribus admodum urgentibus, intermisso munere illo, de calculo certior factus, nulli alii remedio, præter sectionem cessuro, mense Aprili proxime præterito illam tandem admisit, quæ exentis septem calculis figuræ rotundæ quibusdam, aliis quadratæ, avellane mole, excepto ipsorum altero minuto, obducta cicatrice 40. post diebus, immensi affectu liber evasit. Cum tamen durans arenularum mictio suspicionem, nec immeritò, illi injiciat de nova calculi concretionem, in aliis non raro observata, ad nostram confugit opem.

Quo itaque præservetur Patiens Reverendiss. morum probitate, & sublimi doctrina præstans, brevibus præmittam quæ generationem calculorum cum renum, tum vesicæ spectant. Tria verò omnino concurrere ad eorum in renibus concretionem censeo, Materiam, Efficientem causam, & ea sine qua non. De Materia verba faciens Gal. 3. in 6. Epid. Text. Comm. 15. hæc habet: *igitur urinarum crassities creandorum calculorum prima potissimaque causa est*: sive coacervetur ex incomposita vicinis ratione, aut ex imperfecta chylicatione, ob imbecillitatem ventriculi, destillatione à capite, cibis crassi succi, lacte caseoso, atque vinis nigris, crassæ substantiæ: de quibus fuscè Galenus 2. & 3. de Alimentorum Facultatibus; qui propterea cap. 16. ejusdem tertii libri statuit, ab omnibus crassiusculis cibis coherescere calculos in renibus. Ex immodico quintiam exercitio statim à cibo, tanquam causa potissima pueros calculosæ affectioni opportunus esse, prodidit 3. in 6. Epid. 15. Comm. secundum: causa princeps est Efficiens, calor nempe densans, cogenique materiam crassam renibus impactam, discussis scilicet partibus tenuioribus. De qua idem Galen. Lib. de dignoscendis, & curandis Renum affectibus cap. 2. ubi dedita opera agit de causis calculi, his verbis. *Ideoque simpliciter à calore fit in nobis calculus*. Licet enim concretio non minus fiat à frigido, quam à calido, non propterea censuerim cum Valesio in Epidem. calculos utramque causam agnoscere. Nunquam enim in corpore intensa adeo frigiditas viguit, quæ condensare & obdurare possit. Quanquam non eo inficias, quod calor agens possit esse inten-



sior, & remissior. Si namque materia vitiosa crassior fuerit, densari, & obdurefcere potest etiam a calore renino. Quod docet Gal. 3. in 6. Epidem. 15. *Igitur, inquit, urinarum crassities procreandorum calculorum prima potissimaque causa est.* Quibus non negat mediocrem caliditatem ad huiusmodi materiam cogendam abunde esse; ut hoc nomine in vesica, & intestinis concrefcunt calculi, quibus etiam seues sunt opportuni, in quibus tamen non viget calor: quanquam si tenuis materia ad renes confuxerit in tephaceam & calculosam materiam cogi non possit, nisi ab eorum caliditate immodica. Præter verò dispositionem ratione materiae crassæ & efficaciam agentis, renium nempe caliditatem, angustia vasorum in ipsis, & eorum imbecillitas accedat oportet, ex Gal. 5. de Sanit. Tuenda 7. quod, *quitalas habens venas, a cibis crassi succi non laduntur: nec inmerito, quia cum omnis actio fiat per contactum permanentem, hic desideratur in iis quibus venæ non sunt amplæ, hærente materia in renibus quæ potius liberè præterlabente, & cum urin. etulsa.* Quod mihi contigit observare in Illustriss. & Reverendiss. Hercule de Sancto Bonifacio, qui octogenario major, urinas semper profundit, copiosæ pituitæ viscidissimæ immixtas, ad libram circiter, tenaciter adeo hærentis fundo matulæ, ut & ea inversa, effusa urina, ab illius fundo penderet; cum tamen nullæ unquam fuerint de calculo querelæ toto 10. annorum spatio, & quod excedit, quibus ad ipsum invili. Quæ viarum angustiam, cum expultricis imbecillitate censeo esse dispositionem hæreditariam, non facultatem quandam petrinæ; quæ aliquorum est sententia, cum etiam in aliis partibus concrefcant calculi: neque scilicet cum aliquem tartareum, ut existimant alii; cum hoc non crearet quilibet terrestris materia, atque non raro potiores a calculo immunes degant, licet vinum fuerit fæculentum, & tart. reum. Sicuti enim ex gibbis gibbi, ex luscis luscis, alique ex aliis huiusmodi nascuntur, facultatis formatricis vitio a semine, ex Gal. 6. Aph. 18. ubi de podagra sub ipem Comm. ait: *Accedit ad has causas relatas, ob quas plerique nunc podagra infestantur, quod parentes. & avus multis podagricos habuere, in quibus scilicet semen erat corruptum, atque ideo posteris maiorem conciliavit partium imbecillitatem.* Ita renes male conformari censeo, & imbecilliores reddi a senæ vitio. Cum enim angustiora sunt vasa hæret materia crassa, aut in renium cavo, ut frequentius in tenuibus illis meatibus in carunculas papillares patentibus, qui urinam transmittunt in vteretum ramos, per illorum substantiam divaricatos; atque ita in calculum concrefcit, affluente sensim nova materia; ex primo in 6. Epid. 6. Quod si quærat quis, quomodo procreentur in vesica, quæ ipsos sæpius concludi patet experientia: hoc referat responsum, fieri dupliciter: primario & per se, ex materia crassa, & terrestris a renibus ad vesicam illabente: secundo ex arenulis, aut calculis minoribus ad vesicam propulsis; ubi hærentes, ex allapsu novæ materiae crassæ, & glutinosæ, atque ejus adhæsu, grandescunt. Primus generationis modus fuit a Gal. memoratus 3. in 6. Epidem. 15.

explicante Hipp. verba. *Lapis a mictu pueris magis.* Dum enim dicit lapidem a mictu fieri, innuere voluit non excibere lapidem a renibus cum urina, sed coagmentari in vesica post mictum; id est, ex materia prolabente cum urina. Quod clarius patet in alia versione. *Post mictum concretio pueris magis.* Ideo Galenus in illo Comm. addit. *Veritas hæc est, calculos pueris. ob urinæ crassitudinem in vesica procreari.* Porro *urinas crassissimas a pueris reddi, ab omnibus a. to nos medicis concessum est;* inquit Gal. Quod clarius expressit, dum ait; *crassas enim urinas ex cerni, & evidenter apparet, & rerum testimonio declaratum est.* Huiusmodi namque crassitudo multa collecta, & in unum coacta, cum semel aliquando non oportet excreta intus diutius manserit, coagmentandi, concrefcendique initium caput, eoque principio facta, facit postea quicquid iterum crassum in vesicam illabitur priori agglutinatur, majorque inde tephaceus calculus redditur; quemadmodum extra corpus, & in calidis aquis sponte nascuntur, & in vasis ubi calida aqua quotidie lapis concrefcere cernitur. Hæc Gal. Quod confirmat 2. Progn. 75. his verbis: *Propter importunos, & exuperantes cibos copia purior colligitur humoris crudi vocati in corporibus puerorum.* Is igitur per renes expurgatur quotidie, atque etiam per urinarios meatus in vesica collectus interdum calculos in ea gignit; omniumque luculentiss. me 3. Aphor. 26. ubi dum collocat Hipp. calculos inter morbos puerorum, Gal. in Comm. ait: *Lithiasis vero, id est calculi in vesica generatio proprius est puerorum morbus; atque adducens rationem addit. Propter edacitatem, & ingentem crudos humores non paucos conservantium, ex quibus crassior pars urinae cum urinis ad vesicam comportata, fit lapidum gignendorum materia. accedente causa altera, caloris scilicet copia.* Nec alia ratione procreantur calculi in puerulis lactantibus. Quod autem calculus in illis concrefcit ex lacte, patet ex Libro de Morbis Hipp. vel Polybi potius, ubi hæc habentur: *Cæterum calculi morbi principium oboritur a lacte, ubi puer lac impurum sugit.* De loco demum concretionis eorum hæc addit: *Et ubi fixerit lac non putrum, sed terreum, & pituitosum, & habuerit puer venas de ventriculo ad vesicam amplas, & attrahentes, si quid in lacte non purum fuerit, id quo vesica fruitur, lapis fit.* Hoc confirmat quæ etiam Hipp. Lib. de Aere, Aquis, & locis: ut propterea plus satis probatum fuerit, lapidem primo, & immediate quandoque in vesica procreari posse. Quæ fuit etiam Arist. sententia 3. de Historia Animalium 13. cum ait: *Defunctis nihil humoris in vesicam transmittitur; ac vivis non solum humor, sed etiam sicca quedam excrementa descendunt, ex quibus calculi conficiuntur.* coagmentatur secundo in vesica lapis ex lapillis a renibus ad vesicam exturbatis, & in ea hærentibus, atque ex novæ materiae allapsu coalescentibus. Quod patet in Reverendiss. nostro patiente, ex cuius vesica exenpti fuerunt septem calculi, quorum alter in operatione obtritus, minutum alium in sinu veluti exhibuit diversi coloris, a materia ipsi accrescente, & agglutinata. Quod idem palam fecit alius ex cadavere alterius Adm. Rev. ejusdem ætatis exentus mole magnæ c. stanæ, attritus, qui & ipse minutum in medio protulit in conspectum varii coloris: quod



quod me iudice, est indicium inculentum concretionis ipsorum in diversis locis. Quamquam enim concedi possit, calculum etiam in vesica procreatum posse in se complecti alium minutum in eodem concretum, superinducta veluti lamina, vel pluribus per adhæsum novæ materiæ; non tamen fuerit diverſi coloris, cum semper calculi venter sint albicantes, renum vero tere semper n. vescant; ut propterea cum minuti illi sint davi coloris, & cortice albi, itatuendum sit, ipsos e renibus in vesicam excidisse: quod peripicuum fit magis ex alio n. d. aucto calculo in Reverendiss. Patre exempto Ilavii coloris, quod nondum excrevisset novæ materiæ adhæsum. Qua in re observanda Hippoc. sententia lib. de morbis, ubi de vesicæ calculo; *Pateris ejicis aliquando lapides duos, aut etiam plures minores eodem modo procreatos.* Quod si dicat, calculos à renibus ad vesicam prolapsos esse quandoque plures, eosque secretos, qui seorsum concreſcentes, plures in vesica calculos efformant; atque ideo mitum non est quod in Patre Reverendiss. inventi sint septem, ex quibus unus nondum incrementum suscepit. Quod autem in calculo vesicæ minutus alius deſeſcere possit, luculentissimè patet ex calculis in vesica teſtea, ubi concreſcunt non transiſſi à renibus, sed ex minorum quodam in ipsa rudimento, qui per adhæsum novæ materiæ augentur. Quod oculata ſide confirmatum in calculo vesicæ ſelleæ, Illustriss. & Reverendiss. M. Antonii Cornelli Episcopi Patavini, ejus cadavere me preſente diſſecto, qui penes me est, pluribus conſpectus. Dubium hic tamen occurrit, cur pueri ſint opportuni magis calculi vesicæ, renum vero adulti, cum tamen illi ſint iſtis calidiores, in quibus propterea frequentius concreſcere deberent in renibus, qui vesicæ ſunt calidiores, partes ut pote carnoſæ, pluribus venis & arteriis perſuſæ, cum hæc ſit exanguis. Quod ego quoque obſervavi in Sereniſſ. Archiduce Joanne Carolo, Sacræ C. M. natu maximo, ad cujus curationem accitus fui. Solutio eſt, quod caliditas calculi efficiens cauſa ſit potius æris, & mordax, quæ magis viget in adultis, cum pueri calido innato abundant, humorum concoctioni, & robori ſaculatum naturalium accommodato magis. Quod propterea humores crudos ad renes conſtuentes concoquit, qui ab expultrice valida à renibus ad vesicam poſtmodum propelluntur, in qua deinde ſi remorentur, denſantur, concreſcunt. Quod in Sereniſſ. Archiduci non contigit, quoniam hæreditariam v. ſorum anguſtiam, & expultricis imbecillitatem ab utero materno contraxerat, Sereniſſima ipſius matre calculoſa extincta: ut hoc nomine nec humores crudos attenuare, & concoquere, nec coſtem à renibus exturbare peruerit. Quæ præmittenda duxi ad calculorum eſſentiam, & cauſas.

Præſervationem quod ſpectat, ſupponendum eſt, tanquam veriſſimum Hipp. ſaneitum 6. Aphor. 6. Renum, & vesicæ vitia in ſenibus diſſiciliter ſanari: quod clarius 8. in 6. Epid. Text. Comm. 25. proprio teſtimonio confirmatum, cum ait: *Vitia renum poſt annum quinquageſimum ſanata non vidi.* Quanquam enim tolli poſſint objecta aliena actu lædentiſ, morboſæ

tamen affectiones confirmatæ & diuturnæ removeri non poſſunt. Parcant G. J. manes in Comm. Ego namque in calculis ſemper obſervavi, quod licet ſectiōe exempti fuerint ex vesica, & obduſum vulnus, vel iterum concreuerint; ut contigit Reverendo Piazolæ, ex Benedictinorum cœtu; vel effluxerit ſemper materia corrupta, ut in Illustriss. & Excellentiss. Marchione Riario, Venetiis ſecto, & a me curato obſervavi: vel impedimentum perſiſterit in congreſſu Venereo, ut accidit Illustriss. equiti Livio Zabarellæ, me præſente ſecto; vel continua ſuperſites fuerit arenularum excretio; quod obſervatum in hoc Reverendiss. noſtro patiente: ut juxta Hippocratem de ſola præſervatione cogitandum ſit.

Hæc autem in eo potiffimum ſita eſt, ut prohibeatur novus humoris vitioſi proventus. In morbis enim ex materia quamquam ſint hæreditarii, cum intenſa caliditate, deſiciente materia vitioſa, calculus nunquam procreabitur. Tribus vero potiffimum medicis præſidiis hoc præſtabimus.

Primum, & potiffimum eſt, ut cibis attenuantibus, & facilis coctionis utatur, pane ſcilicet bene fermentato, ſaliamenti cibi loco, melle, moderatè tamen mediocriter ſalitis, vini tenuis ſubſtantie, albis, non dulcibus: miſſis cibus craſſi ſucci, carnibus bubulis, ſuillis vervecinis, aut oleribus, piſcibus, præſertim paluſtribus, & teſtaceis; laganis item, & legumibus præter ciceres, atque caſeo, maxime vero antiquo. A cibo ſemel ſaltem in hebdomada abſtineat, & mediocri utatur exercitio; non tamen ſtatim à cibo, quo tempore intermittat etiam ſtudia. Quod ſi quandoque cruditates in ventriculo abundant, curius decumbat, & dormiat manu ventriculo poſita. A cibo vomitum ſemel in hebdomada ſaltem cieat, oxymel ſcilicet dummodo ab eo non ſit valde alienus. Quod ſi contingeret, aſſumat drach. i. pil. de hiera cum agar. hora ante cenam: atque quotidie deſcendat alvus vel ſponte, vel ſuppoſitorio, vel clyſtere; vel uſu pilul. ex aloë lota cum ſucco roſarum, vel cremore tartari cibus aſperſo. Bis autem in anno purgationem univerſalem molietur, Vere, & Autumno, cum aliqua ſanguinis eductione ex ſalvatella dextra; quo tempore uti quin etiam poterit diureticis ad emundandos renes, & vesicam: in quem uſum accommodata eſt Terebinthina Veneta, cum ſpiritu ſalis, cremore tartari, & aquis diureticis, octidui ſpatio: à quibus tamen aliis temporibus abſtinendum cenſeo, ne crudos humores, cibosque non concoctos devehant ad renes. Quæ præſervationis loco abundè fore cenſeo. Faxit D. O. Omnipotens ut cedant ad vota. *Idem ibidem.*

Illustrissimus Adoleſcens vigefimum quintum annum ægeus, temperamenti totius & jecoris calidi & humidi, carnoſi habitus; dum diebus elapſis ad inviſendas Italie urbes una cum ſociis iter faciebat, dolore vehementi in latere ſiniſtro, à rene ad abdomen ſeſe extendente correptus fuit, cum mingendi & egerendi inclinatione, imò & irritamento, qui paucis horis remiſit; ſed ſequenti die rediit vehementior, cum iſdem ſymptomatibus, addito etiam vomitu & inſigni ad vomendum



irritamento. Cessavit iterum dolor, sed tertio die reverus est, dum in rheda iter faciebat, intolerabilis ita, ut extrarhedam pedibus incedere atque currere coactus fuerit. Veronam tandem perveniens, Clysteres praescripti fuerunt, & cassia exhibita, cum nonnullis mutationibus, quibus nonnihil quievit dolor, ita ut rursus iter capere eidem permisisset: nunquam tamen, nec arenulas, minulque calculos per urinam excrevit, imo nec urinae ipsae turbidae observatae fuerunt, sed tenuissimae semper & pellucidae. Cum autem Patavium pervenerit; doloribus immunis, de agendis consulit, Venetiis domi suae exequendis.

Nephriticis doloribus divexatum fuisse Illustriss. & Excellentiss. Adolescentem, non est quod dubitemus, si signa ab Hipp. recentita consideremus, dolorem gravem scilicet in regione renis dextri, cum vomitu & urinae illucido. Et quamvis arenulae in urinis non subsiderent, id nihil obstat: quando enim Hipp. dixit, quod *Quibus in urinis arenosa subsident, iis renis, aut vesicae calculi laborant*, vult nobis innuere, quod arenulae calculi praesentiam confirmare possint; unde & Gal. dicere solebat, quod dum dubitatur, utrumne dolor nephriticus sit, an potius colicus, subdit, quod *si arenula aut calculi in urinis subsident, tollitur omnis questio*: non tamen e contra, arenulis non apparentibus, calculos non adesse sit affirmandum. Arenularum autem carentia, calculi non tephacei, sed densioris, & maioris substantiae suspicionem praebet, sicut magnitudinis, esse meatibus non proportionata: quod si parvus esset, multo angustiores forent existimandi ipsi meatus, papillae nimirum, cum nunquam antea hoc affectu tentatus fuerit: etenim cum multo tempore intermittant dolores & redeant, calculum aut in renis cavitate, aut in infundibulo reperiri credendum, dolorem excitantem quotiescunque virescens ingredi tentat. Quare licet & in praesens dolore vacet Nob. Adolescens, calculum tamen gestare pro certo habentium, & idcirco Curatione indigere, executione intentionum ab Hipp. propositarum dum dicebat, *Juvenes Venetropurgare, poplitea incidere vena, aut melle dare, toruare, & mollire*.

Quibus intentionibus ut iustitiae, abs re non erit Leniens repetere ex electa leni. & c. et. vel portionem ex mannâ clarificata, ut tutior evadat Diureticorum usus. Mox in casu nostro ordinem ita servandum censeo, quod primo Emollientia & Laxantia praemittantur, ut meatus dilatari atque laxari possint. Secundo sequantur Diuretica ad impellendum calculum ipsum; quibus non sufficientibus, tandem ad Lithontrica, tenuantia ab Hipp. dicta, deveniendum. Neque interim de sanguine mittendo cogitandum nisi in minente renis inflammatione: tunc enim poplitis vena cum Hipp. incidenda & cum Gal. vena brachii in Elethoricis pro revulsione, sicut cum Hipp. pro derivatione.

Pro prima igitur intentione, post assumptum Leniens, usum Ierebinthinae nostrae venetae propono, liquiritiae rasura retonnata, cui post horam superbibat jus tenue pullae, foliis malvarum, violariae & parietariae alteratum. Quo

eodem tempore mane & vespere pars affecta toveatur magna spongia tali decoctione calente inbuta, & expressa.

℞. Fol. malvarum, parietariae, chamae. eri, anethi, meliori. n. m. j. rad. Alnæ, m. alb. raphani m. 3j. Iemenci, pui. n. 3ss. aq. co. m. 3℔. contund. incid. & m. luum. ad coctum tertiz pro fotu. A. ot. veto spongia, statim mani tur pars manu, oleis li. 3b. & de scorpionibus inuncta. In horum emollientium & laxantium usu plures dies immorandum, nisi dolores revertantur & urgeant: tunc enim tomentationes & inunctiones non omitendo, ad impellentia medicamenta diuretica deveniendum & esse poterunt sal tartar. volatilizatum ad ʒj. in aq. Illiat. ononid. & parietariae, addito succo limonum. Pariter in ignem vim permeandi & impellendi habet spiritus tartari alcalizatus, ad gutt. xij. vel xv. in eadem aqua; quae medicamenta, non cedente calculo, nec remittente dolore, sunt repetenda.

Pro tertia intentione explenda, efficacissima semper fuit essentia crystalli, a semidrachma usque ad drachmam integram in jam dictis aquis offerenda: sic & magisterium oculorum Cancrorum. Et tandem omnibus incussim tentatis (quod futurum esse non credo) ad succi capae albae, per expressionem extracti, aq. Illiat. p. rietariae, vim malvarum suavis. n. ʒiv. m. f. potio urgentibus doloribus, nec ceteris medicamentis cedentibus, propinanda. Haecque pro Curatione: nam de Iervervatione alias erit iter no, dum causa quoque materiales, efficientes, & line qua non. examinanda erunt.

His jam dictis congrua vivenditatio est addenda, victus enim mediocriter tenuis esse debet & facillime concoctionis: augentur enim dolores, ut ait Hipp. cum cibo impletur. vinum pro potu coarctato concedendum, album, tenue, & succulace. Exercitium quammaxime continet; & i. eo Hipp. repetit, quod *Exerceri coarctat, & q. desicere*. Sicut pro evacuatione sollicitanda frequentes debent esse clysteres, praesertim oleo de limo parati, ut qui dolores quoque sedare valeat. Quae omnia Illustrissimo & Excellentissimo Adolescenti a summo Deo salutaria precor. *Joan. Rayn. Form. Cos. & resp. Med. m. T. 2. Cent. 2.*

Eques Illustrissimus, ex Patre Nephritico natus, Calculosus & ipse calculos enim alias, & non exiguae magnitudinis, nephriticis progressis doloribus, per urinam excrevit; quatuor ab hinc mensibus circiter calculum in rene sinistro gestat fors. n. neglectum, quia in renis cavitate contentus, cruciatus conuictos non intulerit, sed tantum in ipso rene dolorem gravem, sive gravativum, ita & Hipp. nominatum: ut propterea, neglecta quoque facile congrua vivenditatio, progressu ad tantam molem increverit, ut p. pills egredi non potuerit, & ideo dolores exacerabantur, quibus papilla contracta, egressum non admittet, & ideo dolor gravativus manebat. Et quoniam aut in rheda, ut equit n. do, calculum a descensum a rene usque ad m. pro ovari, indistincte vni go creatur; idcirco & Illustrissimus ipse hoc deceptus, assonante, Equo gr. d. tum corrente iter fecit, ut ad aqua s. vi triol. tas. epot. ulas perveniret, quo violento motu







summoperè dubitandum, cum jam nuper excreti figurati fuerint, ita ut fragmenta exillimari non debeant. Interim tamen utriusque affectus symptomata & excreta diligenter observanda, ut veritas innotescat. Virium autem prostrationem totam hepati soli tribui posse non video: vitiata namque hæmatosis ipsa, ad Cachexiam, indeque ad Hydropem Patientes ducere solet. Quare adderem ego sanguinis inquinamentum ab aquæ vitriolatæ retentione introductum, cujus causa spiritus vitales qui ex ipso probo sanguine generari debent, reproduci non possint: non excludendo tamen jecoris labefactionem, obruto à copia aquarum ejusdem nativo calore, nisi concurrat forsan etiam in rene tumoris eruptio, cum *A tuberculi intus ruptione exolutio contingere solet*, ut monet Hippoc. Quare adhuc in vitæ discrimine versamur, cum pro viribus reparandis massæ sanguinæ purificatio requiratur, quæ non nisi hydragogis medicamentis, à vitium imbecillitate non permissis, procurari potest; præterquam quod calculi excretio adhuc tentanda restat, quam difficiliorem reddere posset renis ulcus, ab abscessu disrupto relictum.

Quibus omnibus consideratis, urgentiori dubio procul est incumbendum, viribus nempe reparandis, sine quibus cætera remedia incassum, imò cum præjudicio administrarentur: illis etiam reassumptis, ut dicebat Celsus, Medicinæ dabitur locus: & hic observandum venit Hippoc. præceptum, *Quibus semel, aut bis, plurane, an pauciora offerre oporteat*, considerandum esse; & præterea Galeni Commentum, in quo monet, viribus existentibus imbecillibus, parum & sæpe cibum esse offerendum, qui sit boni succi, facillimæ concoctionis ac distributionis, & pauci excrementi. Et quoniam *facilius est implere potum, quam cibum*, ideo convenire poterunt, præter jura carniū in quibus sint dissoluta lutea ovorum recentium, nonnunquam restaurum pulli, quandoque contusum; addantur quoque emulsiones amygdalarum dulc. recent. & pistaciorum. Proderit quoque vinum aromaticum modicè exhibitum. Semper ante cibum aliquod Cardiacum proficuum erit, ut Julapium genuatum Mag. Due. in exigua aqua totius citri, aut florum ejusdem; species quoque Diahyacynthi in aqua scorzonæræ. Interdum bolus ex Alchermies & hepate lupi paratus. Caro quoque viperina, cum reliquis carnibus ebullita, vim quandam balsamicam, & calori nativo nostro analogam obtinet.

Quamprimum vero Curationem vires permittant, ab aquæ educatione erit incipienda, & interim renis status observandus, ut opportuna medela adhiberi possit: non omitrendo tamen Clysteres naturam ipsam ad aquam educendam excitantes. Quæ pauca subdidi, à sapientibus viris examinanda. *Idem ibidem.*

#### Calculi Renum in Puero.

Princeps Excellentissimus Puer duodecim annorum, ex Patre valetudinario & immaturè defuncto natus, temperamenti ad calidum & siccum vergentis; hepatis calidioris, me-

diocris habitus, liberè vivens, imò edulius crassi succi de more utens, & immodicis exercitiis deditus; usque ad decimum annum ætatis suæ semper valetudinarius, frequentibus nempe febribus obnoxius, cum alvi constricta stypticitate. Præterea somni turbati, cum spectris terrificis quandoque ei contingunt, ita ut clamoribus expurgiscatur, nec præteritorum quicquam recordetur. Caput ejus frequentissime gravatur, & per nares nonnunquam catharralis materia copiosa & crassa expurgatur, quæ detenta, nares ita obstruit, ut dormiens ore adaperto respirare cogatur. Duobus tamen abhinc annis sanitate satis laudabili frui cœpit: verum renum dolores accesserunt, per intervalla frequenter recurrentes, quos solvit mictio calculorum rotundæ figuræ: qui si diebus aliquot (integra hebdomada) retineantur, dolores vehementiores & acerbiores afferunt, donec calculus consueto major per urinam excretus fuerit: à cujus mictione profus à doloribus immunis & alacris manet. Et cum frequenter repetat hujusmodi affectus, à Te Vir Doctissime, præsertionem implorat.

Quod Excellentissimus Princeps duodecimum suæ ætatis annum agens, statim natus, usque ad decimum annum multis & variis ægritudinibus conflictatus fuerit, mirum videri non debet, cum hæreditariam à Patre valetudinario pravam totius corporis dispositionem sortitus fuerit, & præsertim capitis intemperiem calidam & humidam, quæ idipsum excrementosum reddidit, & destillationibus valde obnoxium; præterea jecur jussu calidius cum fervore, atque eorundem pravam diathesin & calculosam dispositionem; & propterea dicebat Galenus, quod *Catarrhus omnium morborum fons, & soboles esse possit, cuius vitium corpus languere solet*; quod facile desumpserat ab Hippocrate asserente, quod *destillationes à capite magno radio atque molestianaturam frangunt*, potissimum verò in Excellentiss. Puero, cerebri emundatorium, nares scilicet, angustum habente. Quare cum à perenni destillatione in ventriculum ciborum coctiones imminuta secutz fuerint, biliosis humoribus à calido jecore genitis immixta, & massam sanguineam inquinantes, fermentata frequenter & putrefacta, febres modò acutas, modò chronicas præteritis annis excitarunt; sed tandem ad renes transmissæ live deductæ, extra consuetudinem & valde immaturè in calculos albi & flavi coloris, marmoreos potius, quam topheos converti cœperunt, suggerente renibus materiam prava vivendi ratione, nimirum crassis, concoctu difficilibus & excrementosis alimentis, quibus delectatur; præterea vehementibus & intemperativismotionibus corporis; & diureticorum, nempe granorum juniperi & feniculi in potu, abusu, quo materia pro calculis producendis ad renes quotidie ducitur: præsertim vero cum alvi stypticitate, dicente Aëtio; quod *Si alvus bene subierit, pauciora lotia prodibunt*. Rarissima equidem in Puero calculosa conditio, quam semel tantum hucusque mihi vidisse contigit, & semel se videre potuisse asseruit Cardanus: Pueris enim propria & familiaris esse solet calculorum in vesica pro-



productio, unde Hippocr. dicebat, *Post milium concretio Pueris magis*, cum quoniam calidiores. Et modum alibi explicat, dicens, *Quorum alvus ardens, ac seruida luerit, si. & vesica. Ita excelsa, urinam non dimittit, & quod crassissimum & turbidissimum est, concervant, & dum voluitur, concrevit; quod exire sæpe solet etiam inf. antibus ex impuro lacte Nutricis pravis alimentis connutritæ. Et quoniam licet calor intensius velicæ, una cum cruditatibus, in Pueris Lithiasin generat, ita ab eodem in adultis ratione ætatis in renibus adaucto, nephritis excitari solet: ut propterea docuerit Gal. Lac Pueris in vesica, Adultis in renibus calculos generare, sic & magis casum; idque quoniam ad calculorum productionem concurrat calor, ut causa efficiens, & humorum crassities, ut causa materialis. Cum autem calorem huiusmodi excedentem in renibus Pueri non habeant, ut calculum producere valeat, examinanda à nobis est causa huius raritatis, si excellentissimo huic Pueri præservatio est præscribenda. Hanc igitur à mala vasorum & renum conformatione hæreditaria, ab Excellentissimo calculoso Patre contracta, pendere pro certo est habendum, quæ consistit in amplitudine vasorum emulgentium, & in renum densitate atque ureterum angustia: ut ideo renes facile à jecore per ampla superiora vasa cruditates multas suscipiant & attrahant, sed subinde ob propriam densitatem easdem non dimittant & retineant, sicque diurentæ, etiam à moderato calore in calculos convertantur: quam causam tetigit & ipse Gal. dum dixit, *Succi crassi non in omnibus calculos generant, quibusdam enim densiores, & per angusta sunt ora vasorum, quibusdam contra; quod idem alibi ita confirmavit, omnia crassi succi in renibus calculos generant, dum transitus latos non habeant: Et hæc causa ab Oribasio quoque recepta fuit, imò & à Recentioribus ferè omnibus, dum Fonsæca protulit, quod Calculosa & hæreditaria renum dispositio, etiam cum paucis renum calore præsentem materiam, est sufficiens ad calculorum in renibus generationem; & idcirco ut causa sine qua non ab universali Medicorum schola recepta fuit. Ita in casu nostro juges cruditates, partim à capite in ventriculum descendentes, & coctionibus officientes, partim à ciborum superingestionibus, Pueris consuetis genitæ, ut causa materialis; calor verò & Jecoris, & renum, ut causa efficiens; & potissimum naturalis calculosa dispositio, in emulgentium amplitudine, & renum atque ureterum angustia consistens, causa sine qua non appellata, concurrunt in Excell. Pueri Principe ad calculorum in renibus intensivam & immaturam procreationem.**

His autem ita sese habentibus, cum caput & renes ope medica indigeant, urgentiori prius incumbendum nos docet Galenus, ipsaque ratio dicat: capitis enim exiccatio & catarrhalis materię extirpatio tutius in juvenilem ætatem differri potest, quam calculorum inhibitio: evidens enim periculum imminet, ne diutius aliquis calculus in renibus detentus, & major consuetus factus, non amplius in vesicam descendat, sed manens in renibus, Principem miserè interficiat, ut contigit Ex-

cellentissimo Patri defuncto. Alterum imminet periculum, ne in vesicam delapsus, propter canalis Urethrę angustiam, in eadem moretur, per additionem grandior hat, & pro extractione incisione sit opus, cum velicæ calculus manuum duntaxat opera curari possit.

Hoc igitur anni tempore, nempe proximo mense Maio purgatio erit incunda, primas vias expiando. Secundo Venosum genus ab excrementis depurando. Tertiò caput quoque purgando. Quartò jecoris & renum calorem contemperando, & vasa angusta dilatando; atque tandem causæ materialis reproductionem inhibendo, & ipsam à renibus divertendo.

Pro prima intentione explenda, primò potio suavis leniens præscribenda, ex man. clarif. cum tartaro, aut syrupo ros. solut. aureo. Inde sex aut septem sequentibus diebus cruditates in primis viis existentes, ita præparanda.

℞. Julap. acet. simpl. syr. de cortic. citri. aq. flor. citri an. ʒj. m. pro syr. & sic pro aliis: Aut singulo mane exhibeatur.

℞. Cremor. tartar. sacchari albi an. ʒß. & dissolvatur in modico jure carnis, corticibus citri alterato. Inde alterum ex præscriptis Lenientibus repetendum.

Pro secunda verò intentione, ulteriora præparantia erunt usurpanda.

Ut ℞. Decoct. in jure paratæ cich. borag. endiv. meliss. betonie. agrim. ʒv. oxymel. simpl. syr. de beton. an. ʒj. m. pro syr. & sic pro aliis septem. Interim primis diebus jecorina dextera erit aperienda, sed sanguis parce mittendus. Transactis jam dictis diebus, purgans huiusmodi erit exhibendum.

℞. Rhabarb. opt. ʒj. agaric. trochisc. fol. sem. an. ʒij. cinnam. integr. ʒß. aq. agrimon. q. s. m. f. infus. per hor. xii. & facta forti expressione, colaturæ adde syrupo rosat. solut. ʒiv. clarificentur omnia cum cremor. tartar. & f. potio brevis, cui, incepta evacuatione, superbibat aquæ hordeac. vel feri caprin. depur. ʒvj. & duobus horis ab assumpto sero prædeat.

Inde ad tertiam intentionem explendam deveniri poterit pilulis capitalibus.

℞. Extracti pilular. cochiar. ʒj. aurearum ʒß. reformatur pilulæ, & tribus interpositis diebus ab assumpta superscripta potione, præbeantur summo mane, & repetantur. Intermediis verò diebus reassumat syrupos præparantes præscriptos: & aliquod errhinum manè tantum in usum ducat, suave, non violentum.

Ut ℞. Pulv. majoran. ireos an. ʒij. nigell. ʒj. m. f. pulvis per nares attrahendus.

Quartæ intentioni ut satisfaciamus, aquis acidulis omnino opus erit, non tantum ferreis sed vitriolatis, quales sunt in Valle Solis nascentes, quæ primis tribus diebus cum vehiculo dejectorio syrupo ros. solut. aut mann. clarif. erunt præbendæ, sequentibus verò diebus quindecim cum aliquo vehiculo diuretico, quamvis rarò eodem indigeant: posset autem esse spiritus tartari pluries rectificatus; harum autem usus duobus sequentibus annis repe-



tendus, leviori tamen præmissa corporis expurgatione. Terminato autem aquarum usu, magnopere contere poterit lac aluminum ad quadraginta dies, quod inter genera lactis prerogativam habet refrigerandi, renēs emolliendi, imo & tophos in renibus dissolvendi, ut testatur ipse Galenus, & cum eo ceteri Medicinæ Principes: nec caput implet, quia celerrimè per corpus digeritur. Præbeatur autem statim milium, summo mane, à quo somnus nullo modo permittatur, incipiendo ab unciis quatuor cum semiochleari sacchari, & ascendendo usque ad novem, cum integro sacchari cochleari. Quo tempore aquarum & lactis, statim à cœna deglutiat Excellentissimus Puer duo aut tria grana malliches integra: à prandio vero contere poterit conserva absynthii, quam si ob amaritudinem respuat, sal absynthii in exiguo vino dissolutum supplere poterit.

Verum ut postremæ intentioni satisfaciat, sat non est roborare ventriculum, si quotidie oneretur crassis cibis excrementosis & difficillimæ concoctionis: & ideo Valescus de Taranta scripsit, ridiculum esse medicamenta Calculosis præscribere, non præmissa congrua vivendi ratione. Quare si primò aërem consideremus, neque hypocausa, neque repentinæ mutationes à calido ad frigidum, & e contra, capiti convenire possunt. Si secundo alimēta; inter carnes suillæ prorsus ablegandæ, bubulæ & ceteræ annosorum animalium, & aquatiliū rarò usurpandæ; pariter extremitates, ut pedes & capita, omittendæ. Inter pisces, soli saxatiles eligendi, & a conchyliis atque ostreaceis omnino abstinendum. Lacticinia omnia & edulia ex lacte & pasta parata, sunt fugienda, & caseus præsertim. Legumina omnia vitanda, hordeo & oriza exceptis. Inter fructus, fraga, pepones, persica, heus nonnunquam permitti possunt. Inter olera, prorsus abstinendum ab usulactucæ, à feniculo, selino, carduo, radice raphani, fungis & terræ tuberibus. Inter condimenta interdicitur usus aromatum, pauco cinnamomo & pipere ruditer confuso exceptis; neque conceditur succus citri & limonum, quoniam diuretici sunt: hoc enim documentum est quàm maxime observandum, quod dum Calculosi actuali calculo, in renibus existente laborant, tunc, primis viis ab aliquo medicamento expiatis, omnia diuretica & urinam ducentia opportuna sunt: e contra verò extra accessionem, dum agitur de præservatione, nullo modo sunt admittenda, quoniam ducunt materiam, cruditates scilicet ad renes pro calculis producendis: ut propterea approbare nequeam usum quotidianum granorum juniperi, minusque feniculi in vino, nec aliorum diureticorum, quoniam confunditur ita Curatio cum præservatione, & præservatio cum Curatione, in quem errorem incidunt quoque non rarò Medici ipsi; & ideo in hunc huius reprobantur etiam vina Moselana, Rhenana, utpote valde diuretica, ita & cerevicia lupulata. Præservatio enim à calculo requirit, ut cruditates non generentur, & genitæ à renibus divertantur, & per alvum ducantur. Tertiò somnus largior esse debet, sed nocturnus, non tamen dormiat in plumis: & si decubitus supinus

consuetus fuerit, subternatur linteolo portio corii vervecini. Quarto exercitium sit moderatum, & ventriculo non repleto, ita præcipiebat Hippoc. Labores ante cibum. Quintò Alvus lubrica servanda, prunis Damascenis aut Hungaricis; vel passius in vino subdulci tenui decoctis, & saccharo asperitis, prima mensa comantis; & ut magis divertantur cruditates à renibus, & per alvum educantur, semel in mense, unica hora ante prandium assumere poterit.

℞. Elect. lenit. ʒss. Mag. Mechoac. gr. vii. aut pilul. mastich. ʒj. m. t. boli. eandem alacri animo ut indulgeat Princeps Excell. permittendum, neque ad nimia & intensa studia sollicitandus, sed geniales conversationes admittendæ, quæ tamen in vivendi ratione errandi occasionem non præbeant. Quæ omnia faxit Deus, ut salutaria evadant. *Idem ibidem.*

#### Vesica Calculus.

Cum à naturæ primordiis Vir Illustrissimus non adeo probam partium principalium & inservientium temperiem sortitus fuerit, jecore namque iusto calidiori, capiteque humidiori, atque ventriculo frigidiori præditus fuit, ideo varia & heterogenea excrementa a jam dictis partibus jugiter produci necesse fuit, quæ quoniam à natura e corpore externi vix credi potest, idcirco mala inde exorta fuisse mirum non est, præsertim addita libera vivendi ratione: intemperantes enim in diutinos morbos incidunt, à quibus postea tota vita sese explicare nequeunt, inter quos Nephritidem & Arthritidem, sive Podagram enumerabat Galenus, quorum alterum, Arthritidem scilicet superioribus, nimis fuit expertus Vir Illustrissimus, quo cessante, insurrexit alter, nephriticus videlicet, cui statim Lithiasis successit; non enim desuerunt crudi & crassi succi à ventriculo naturaliter frigido, & à continuis applicationibus adhuc frigidiori reddito, addito quoque, improporcionado objecto: quæ cruditates ad varias corporis partes transmissæ, & præsertim ad artus, articulares quoque dolores pariebant: ad renes vero tandem convertæ ab igneo eorumdem calore, tanquam à causa efficiente assatæ, & à vasorum naturali conformatione detentæ, in arenulasque convertæ, à glutinosa materia coactæ, tophaceos calculos prouexerunt; qui dolores nephriticos excitant. Cessarent autem, dum diureticorum medicamentorum ope à renibus depulsi in vesicam; & tandem per urinam ejecti visi suere; sed non omnes, quandoquidem actionem mingendi depravet in, quæ ab illo tempore quoque Virum Illustrum. attingit & torquet, ab aliqua causa musculi irritante provenire dubio procul asserendum, de qua quoniam Sapientes & Excell. Viri isti propriis & necessarius experimentis certiores facti fuere, non est quod dubitemus; siquidem conjecturæ primò calculum in vesica reperiri satis aperte nobis significabant, cuius præsentiam non semel, sed bis sensus ipse tactus comprobavit: calculum enim mense Aprili præterito à primis nephriticis doloribus in reus papillis mansisse, & vehementis motus in rieda occasione in cavitatem delatum fuisse pro certo habendum



dum, qui ibi sine dolore adservari potuit, sicut cum dolore ad vteros delapsus, exquisitissimo leni praeitos, Diureticorum ope in vesicam cecidit, sed in rene antea crassiores factum exitum non invenisse censendum. Quare in vesica quotidie a superadditis cruditatibus involutus & grandior redditus, dum, quod turbidissimum, coarctatur, circumvolvitur & concrevit, sui ipsius etiam quotidie majora nobis praebeat indicia; etenim ab initio mictio molesta & frequentior apparuit, in progressu stranguriosa, adeo ut dolor adfuerit in mictione cum urinae stillicidio, vesicae ardore, & quandoque arenosae materiae excretionem, omnia signa lapidis vesicae, ab Hipp. proposita; quibus accesserunt & ponderis sensus, & inquietudo, & ani lenescimus, & haemorrhoides, quae omnes conjecturae eundem confirmantur, accedentibus praeterea experimentis diureticarum aquarum, & motus vehementis in rheda, a quibus nocumentum evidens reportavit Illustriss. Patiens, atque tandem sensu ipso iudice facto, & candela in vesicam introducta, & digito in anum immisso, conjecturalis cognitio sensata & mathematica reddita est.

Agitur igitur de calculo in vesica actu existente, nec adeo exiguo, eo quod nunquam urinam supprimit, a vesica removendo; & idcirco pars curativa in praesentia a nobis consideranda venit, de praeservatione alias cogitandum, & posteaquam diureticis aquis, prudentissime a Viris Excellentiss. propinatis, educi non potuit, Lithonripticis vero fidere in experti Medici certum indicium sit, idcirco non nisi manu opera curari posse pronuntiare Hipp. alioquin praeter urinae suppressionem, doloribus, febriculis, ulceribus, colliquationibus contabescere solent Patientes. Et quoniam visus hoc remedii genus potius inspirationem divinam quam Medici consilium requirat, ut propterea Hipp. nobis consilium dare prohibeat, imò Avicenna vetet quoque Medici praesentem. Nihilominus viriliter ego & ex corde agens, virile quoque & unicam curationem, dissectionem consulo, utrumque congruas condiciones ad huiusmodi operationem tutiorem reddendam effugiant; concurrunt enim in praesens anni tempus opportunum, lapidis magnitudo conveniens, cum nec grandior, neque exiguus nimis requiratur pro faciliore extractione, quam & vires, & aetas permittunt, nec prohibent nimia gracilitas, aut febricula, aut ulcus in vesica; quae sicut modo non adsunt, ita superventura valde suspicandum. Neque praeter excrementorum in primis viis existentium per alvum evacuationem, alia precedens corporis expurgatio necessaria mihi videtur, cum jam sanguis non semel ex haemorrhoidibus satis sponte effluerit, qui nova sanguinis missionis pro inflammatione arcenda occasionem auferret.

Quod si fortassis veram hanc atque legitimam Curationem non admittat Vir Illustrissimus, palliata erit substituenda; pro cuius institutione non adeo facile Medico erit medicas elicere intentiones, cum ex una parte calculi augmentum inhiberi debeat: idque crudorum excrementorum a viis urinariis ad al-

vum diversione procuretur: ex altera vero cum calculus angulosus, aut inaequalis coniciatur, nec aequalis & nimis cruciosus reddi possit sine cruditate accusu, nec praeterea dolores demulceri possunt, nisi Anodyna diuretica ad afflictae vesicae ducantur, contraria exoriri videntur intentiones; in quo casu, quoniam, cum Galeno, urgentiori est incumbendum, ideo posteriori intentioni satisfaciendum, prior tamen non omnino neglecta. Et idcirco Diureticis demulcentibus statim utendum, quae ad vesicam quidem pervenire, sed a vesica excrementa impellere minime valeant, ne calculus magis a suis tunicis expolietur, extrema quoque non omittendo.

Interna Anodyna possunt esse & injecta, & assumpta; & inter injecta alia per intestina alia per Vrethram, per intestina enim parantur Clysteres cum exiguo lacte bubulo, in quo dissoluta fuerit drachma philonii Romani recentis; detentamque ad duas tresve horas vespertinas vesicae sensum adeo obstupefaciunt, ut dolor tota nocte magnopere remittatur, & somnus concilietur. Per Vrethram vero licet medicamento injicere difficile videatur, cum vesicae collum habeat anfractus ad modum S. attamen per fistulam indirecte perforatam medicamenta injiciebat Galenus; & ideo lac asininum, vel caprinum in quo globulus opii torrefacti nocte infusus fuerit; aut Laudanum Nepentes, ad demulcendos dolores, injici & prodesse poterit. Per os vero sumenda duo propono mihi familiaria remedia, quorum alterum est serum asininum destillatum, appposito globulo opii torrefacti rostro Alembici, ut in transitu obtupecientem facultatem acquirat, cujus dosis erit ad ʒx. addito syrupo de ibisco; & ut facilius ad vesicam perveniat, ex eodem emulso quoque sem. melonum, sed valde diluta, parari poterit. Alterum vero ita parabitur.

ʒi. Fol. malv. rec. m. iv. viol. m. ij. radic. anionidis, liquiritiae an. ʒij. sem. melon. mundat. lb. ss. passularum ʒj. incid. incid. contund. contund. & adde aquae Noceriae lb. xv. succi limonum ʒij. m. macer. omnia per horas xij. deinde fiat fortis expressio, in qua dissolve flor. cass. rec. extract. ʒij. ponatur in Alembico vitreo, & B. M. destilletur, & praebeatur ad lbj. vel paulo minus, addendo, si placeat, syr. de ibisco, vel julap. viol. ʒj. mirabilis enim experta est, ad vesicae & renum dolores demulcendos.

Extrinscus quoque in sessiones & inunctiones fieri solent; sed ut nimis operosae, iisdem fomenta substituere consuevi, bis saltem in die admovenda, magna spongia imbibita, & non expressa, decoctione malvae, viol. nymph. radic. althaeae, liquir. hord. & foenugraeci; quibus, urgente dolore, capita quoque papaveris albi addi poterunt. Fomentis vero succedant illinitiones ex unguento malv. & populeo oleo violac. reformatis, vel oleo nenuph. & viol. simul mistis; quibus, dolore urgente, addi quoque potest exigua portio olei jalsquiani.

His autem addenda erit congrua victus ratio, inter attenuantem & incrassantem media, ne incrassante nimis: urgeatur calculi moles, & attenuante acuantur nimis urinae & haemorrhoides.



media quoque debet esse inter tenuem & plenam, ne tenuiori vires deficiant, neve pleniori excrementa cruda in corpore redundant, & ad vesicam tanquam ad partem affectam confluant: moderata quoque in calida & frigida, ne frigiditate nativus calor elanguat, caliditate vero acriores reddantur urinæ: demulcenti autem facultatem obtineat: nec ullo modo diuretica alimenta sunt admittenda, ne humorum sarcina ad vesicam ducatur. Quæ sapientibus Viris pro salute, aut meliori statu Pat. Illustriss. quam eidem à D. O. M. enixe precor, sat superque sint dicta.

#### *Vesica Lapis.*

Illustrissimus Vir annum agens quadragessimū tertium, temperamenti calidi & sicci, Patre natus Nephritidi & Arthritidi obnoxio, à primis sue vitæ exordiis fere morbosus, cum in ipsa pubertate rebellis hypochondriaca affectione, quæ adhucnum perdurat, affectus fuerit, frustra variis adhibitis medicamentis, & inimitabili victus servata ratione, tertius annus excurrit, ex quo cum urina cœpit ejicere areolas & minutos calculos, nullo tamen doloris, aut difficultatis sensu, nisi circa renes levi passione. Ante duos annos apparuerunt urinæ magis turbatæ & sabulosæ, quæ per aliquot dies Nob. Aegrum noctu maximè affligerunt, de quibus tamen soli naturæ relictum fuit opus, à quo tempore postea sapius in urinis ipsis modo calculi observati sunt, non sine gravi Patientis molestia; qui tandem de sua salute sollicitus, præterita Aestate, congrua præmissa corporis expiatione, ad renes & vesicam emundandam aquam B. V. meo consilio sumpsi; quæ licet feliciter e corpore educeretur, tecum nihil evenit: purissima enim semper exivit, ut toto assumptionis tempore nil prorsus nisi aqua ipsa & naturale lotium vitum sit; à qua postea per duos menses integre fere convaleuit, extirpato penitus dolore, licet aliquis minutus calculus aliquando apparuerit. Menfe præterito Septembri Patavio redux, quo delia vectus erat, frigida satis aeris constitutione in maximum inferioris ventris dolorem incidit, qui ipsa sanatione, quæ Hipp. certissimum iudicium est colicus fuit: qua occasione in alvi artificiosis depositis, materiam multam, mucosam, necnon biliosam dejectam fuisse, sed magis & intolerabilius successit malum, reum scilicet intensissimus dolor, qui lentè ad inferiora delapsus, vterum loco prius afflicto in ipsa vesica hæsit, & præcipue circa ejusdem orificium, qui etsi, cum jam Illustriss. Aegri corpus familiaribus medicamentis pro tempore de more sumptis satis expiatum esset, ulu lerebimth. etiam Venetæ in aqua malvarum lotæ, superbibito aquæ hordei, vel malvæ calicis, aliquod levamen visus sit acceperit, hisce diebus post violentum corporis exercitium, confecto pedestri itinere per loca alpestris spatio fere quatuor miliarium, adeo invaluit, ut continuis cruciatibus noctu diuque Ager divexetur tali dolorosa lotii excretionem, ut præ ejus immanitate Vir alioquin patientissimus & tolerantissimus, altius exclamare cogatur, urinam ipsam, summa cum difficultate semper & gutta-

tim destillante; quam licet Aeger nixu expellere conetur, paucissima semper exit immixta pituita, & lacteo colore perfusa; in quo deplorabilis conditionis statu modo acutum & pungitivum, modo adurentem urinarum exitum nominat Aeger, & aliquando necendum intolerabile experiri conqueritur, vigiliis etiam & animi sollicitudine fere consumptus, non sine symptomaticæ febris, licet levis, præsentia. Ad cujus horridi hostis perturbantem devincendam, nos hic varia experti sumus, dum ipsam causam non negligentes, ad ipsum symptoma, ut magis urgens, manus medicas admovimus, ne soli causæ in-unibentes, spreto Galeni consilio, in ipso symptomate prius Aeger periret. Unde multa ad ipsum dolorem directa sunt, tum interna, tum externa. Propinato scilicet repetite ol. amygd. dulc. extr. sine igne, assumpto cum succo limonum, modo solo, modo in sero capr. destillato, necnon ipso sero caprino cum sem. melonum, & aliquando ipso malvarum jure; exterius verò vesicæ regionem fovendo petiis lacte imbutis, & unguento ros. malv. illito, necnon per siphonem injecto in vesicam ipsomet lacte, aut malvarum decoctione. Quæ omnia quamvis dolorem demulcere jure debuissent, irrita hucusque sunt, perseverante miserabili Aegri cruciatu. Unde ad idum Laudanum Nepenth. devenimus, cujus effectum expectamus, cum hoc vesperti tantum præscriptum fuerit. Tali rerum discrimine & uterioris perniciem metu, ad instanti. Virum contigit, ut salus ipsa, quæ verè vita est, si possibue sit, redimatur.

Utinam stranguriosa urina in isto Illustriss. Patientem non nephritica esset, sed totum corpus per ipsam expurgaretur, ut nobis inuere videtur mucosa materia, quæ jugiter cum urina excernitur. At contra hoc decretum plura nimium testimonia reclamant, & calculi præsentiam in vesica ferme attestantur atque confirmant, dum præterita & præsentia examino. Est enim e Patre Nephritico natus Vir Illustriss. temperamenti calidi & sicci, olim & in præsens hypochondriacus, ac si dicamus multis cruditatibus catens, & quod magis est, tribus ab hinc annis Nephritidi obnoxius, quinimo duobus superioribus annis urinas minxie sabulosas atque turbatas, cum arenulis modo, modo cum calculis; ut propterea summa curatione aquas B. V. tua consuluerit prudentia, argumenta omni fide majora pro Lituali confirmanda: sicut tandem omnem quæstionem tollunt nephritici dolores menfe Septembri ingruentes; quorum occasione à renibus ipsis calculus in vesicam decidit, & facile inæqualis & angulosus, nec adeo minimus, ut qui ad vesicæ colum una cum urina perveniens, expultricem quidem quam maximè irritare, at nunquam ecernipotuerit; unde frequens & dolorosa mingendi cupiditas, unoque verbo Stranguria secuta fuerit, non parum fovente difficilem urinæ exitum musculi contractione, quæ sit occasione doloris; Stranguriam verò magnopere adauxit iter illud postremo per aspera loca factum, quod veritatem jam dictam prorsus & omnino confirmat, præsertim si addamus quoque urinas in præsens luteas apparere. Neque huic veræ opinioni obviare potest



potest mucosa materia, quæ continuo cum urina excernitur, siquidem hæc calculi in vesica existentis, perpetuo comes esse solet, dum, partim a dolore a calculo in vesica excitato; partim progressu, & a calculi pondere cruditates à superioribus partibus ad vesicam ipsam alliciuntur. Nec minus obstat quod, dum Illustriss. Vir huc atque illuc, sursum ac deorsum dimovetur, lapis vesicæ dolorem non inferat; est enim ille calculi grandioris effectus, præter quam quod sphincteri vesicæ (ut asperum & inæqualem) adhærere, magnopere suspicandum, cum incessantes molestias & dolores acutissimos ferè continuo suscitet atque conservet; quos adeo cruciosos nullo modo excitare posset sola mucosa materia, quantumvis acris, aut salsa nisi ab eadem ulcere excitato. Tenesini ad instar. Sed jam dictis omnibus accedet quoque (nisi calculus foras expellatur) simul cum mucosa, materia quoque tartarea & alba, quæ lapidi vesicæ, sicut arenulæ calculo renum, propria esse solet.

Quibus ita se habentibus, totis viribus nitendum ut calculus ipse aduc exiguus existens, auxiliis medicis extrudatur, alioquin brevi vel inflammationem, vel saltem ulcus in vesicæ collo excitare poterit; & præterea grandior factus, non nisi manuum opera curabitur, cum Lithontryphica spernat, tum ob propriam duritiem atque soliditatem, tum ob loci distantiam, quæ ideo à calculis in renibus admittuntur, & quia friabiliore sunt, & quia citius ad renes medicamenta perveniunt. Interim doloris ratio est habenda, ne vigiliis, cruciatibus atque febriculis perseverantibus vires deficiant, & Tabe tandem vir Illustriss. conficiatur.

Nostram autem intentionem ut assequamur, ex consuetis fontibus remedia sunt depromenda; Et in chirurgico nullum habere locum sanguinis missionem censeo, cum causæ morbificæ nihil prodesse, viribus valde obesse possit; ideo Hippocrates sanguinis missionem suavit in Nephriticis doloribus, juvene existente Aegro, ratione imminentis inflammationis. Reliqua igitur in hoc fonte remedia sunt examinanda & administranda nempe infusiones in aqua dulci sol. malv. viol. nenuph. pariet. necnon althææ à summa tua Prudentia propositæ; quibus substituitur fomentum, magna spongia eadem decoctione imbuta, & quodammodo excavata, ut Perinzo & pudendis adaptari possit; cui decoctioni, sævientibus doloribus, capita quoque papau. erunt addenda, Fomentis autem succedant inunctiones ex ung. malv. & popul. vel ex oleo viol. & nenupharino. Pariter per syphonem injiciatur medicamentum aliquod anodynum, ut lac asinum, vel aqua solatri cum emulsione sem. papau. vel aqua Cassiæ. Dolores quoque demulcere poterit clyster ex lacte vaccino, in quo drachma Philonii Rom. rec. dissoluta fuerit, ob consensum & contiguitatem quam habet intestinum cum ipsa vesica.

Hinc ad Pharmaceutica remedia sedulo deveniendum, quæ quidem vesicæ ardorem contemperare, & dolores nonnihil remittere valeant, sed potissimum horum symptomatum causam respiciant, quæ cum sit calculus, ut

moribus quoque in numero t. g. p. n. sui extensionem exposculat. Idcirco ut ductus urinarii magis patefiant magisque aperiantur in aqua stillata me in superiori scripto proposita, aliquot diebus erit propinanda, cui macerationi addi quoque poterit succ. limon. ad ℥ij. vel iv. tum ut magis diuretica evadat, tum ut facilius in maceratione ingredientium facultates extrahantur. Et si eandem magis anodynam reddere velimus, syrupo de ibisco, syrupum de papau. substituere possumus; & remissis quodammodo doloribus, magis diuretica reddatur, addendo sp. tartar. rectif. gutt. xij. aut xv. Aquæ autem stillatitiæ descriptio talis erit.

℥. Fol. malv. viol. nymphææ, parietar. an. m. ij. rad. ononid. ℥ij. liquir. ℥j. sem. melon. mundat. anguriz an. ℥ij. sem. papau. albi ℥ß. aq. Noceræ lb xij. succi limon. ℥ij. incid. contund. & macer. per diem naturalem, deinde f. fortis expressio, & colaturæ adde flor. cass. rec. extr. ℥ij. m. destill. B. M. &c.

℥. Ejuſdem aquæ lb j. syr. de ibisco ℥j. m. pro matutin. potu. Aliquot transactis diebus, aquas Nocerianas de more propinandas esse arbitror, ut in redundanti illa aquosa humiditate calculus ipse, si adhæreat sphincteri, removeatur, & veluti innatans, una cum aqua ipsa foras extraducatur, ut non semel in praxi observavi, calculis exiguis existentibus: me namque non latet grandioribus diuretica, & aquas præsertim huiusmodi, atque ferratas non prodesse, sed obesse posse, quas experiendas propono, cum unica spes in lapidis expulsionem posita sit. Vehiculum ideo in hunc finem satis validum esse debet, ut vehementior quoque insequatur impulsus, quale esse poterit, Terebinth. ad ℥j. vel sal tart. volatiliz. ad gr. xv. aut xx. Dum verò mingitur aqua, omni artificio utendum, ut lapillus quoque cum aqua extraducatur; quare Paciens ipse manu penis extremitatem sibi adstringat, ut intumescat, sicque calculus Urethram facilius ingredi possit: deinde assatim manus à pene removeatur, ut confertim exeat urina, aut aqua ipsa. Præterea dum mingitur aqua, repentinis quoque infussionibus jam dictis felici cum successu usus sui. Quæ jam dicta omnia materiam quoque mucosam abstergere & abluere, collumque vesicæ ab ulcere tueri valebunt; (si fortæ, quod saxis Deus, calculus non adesset; præterquam quod jecoris, renum calorem, & humorum acrimoniam moderare atque demulcere poterunt.

Quod si res pro voto non succedat, rursus ad Anodynorum usum erit confugiendum, & jam præscriptis addi potest aqua stillat. ex emulsione quatuor semin. frigidorum, additis etiam sem. papau. albi, vel syrupo ejusdem. Atque tandem ad lactis asinini usum quotidianum de more erit ducendus Vir Illustriss. totumque corpus oleo amygd. quotidie inungendum. Et ratio victus substantificè humectans, ab eximia tua virtute præscribenda est; sicut reliqua omnia melius dirigenda & corrigenda, prudentissimo atque in Arte versatissimo iudicio tuo libepter committo. Idem ibidem.



fior, & remissior. Si namque materia vitiosa crassior fuerit, densari, & obdurescere potest etiam à calore renino. Quod docet Gal. 3. in 6. Epidem. 15. *Igitur, inquit, urinarum crassities procreandorum calculorum prima potissimaque causa est.* Quibus non negat mediocrem caliditatem ad huiusmodi materiam cogendam abunde esse; ut hoc nomine in vesica, & intestinis concretescent calculi, quibus etiam senes sunt opportuni, in quibus tamen non viget calor: quoniam si tepuis materia ad renes confuxerit in tephacem & calculosam materiam cogi non possit, nisi ab eorum caliditate immodica. Præter verò dispositionem ratione materiz crassæ & efficaciam agentis, renium nempe caliditatem, angustia vasorum in ipsis, & eorum imbecillitas accedat oportet, ex Gal. 5. de Sanit. Tenda 7. quod, *quidam habent venas, à cibis crassi succi non adunantur: nec immerito, quia cum omnis actio fiat per contactum permanentem, hic desideratur in iis quibus venæ non sunt amplæ, hærente materia in renibus, quum potius liberè præterlabente, & cum urin. effusa.* Quod mihi contigit observare in Illustriss. & Reverendiss. Hercule de Sancto Bonifacio, qui octogenario major, urinas semper profundit, copiosæ pituitæ viscidissimæ immixtas, ad libram circiter, tenaciter adeo hærentis fundo matulæ, ut & ea inversa, effusa urina, ab illius fundo penderet; cum tamen nullæ unquam fuerint de calculo querelæ toto 10. annorum spatio, & quod excedit, quibus ad ipsum invisi. Quum viarum angustiam, cum expultricis imbecillitate censeo esse dispositionem hæreditariam, non facultatem quandam petrificam; quæ aliquorum est sententia, cum etiam in aliis partibus concretescant calculi: neque succum aliquem tartareum, ut existimant alii; cum hoc non careat quilibet terrestris materia, atque non raro potiores à calculo immunes degant, licet vinum fuerit foeculentum, & tert. renin. Sicut enim ex gibbis gibbi, ex luscis luscis, atque ex aliis huiusmodi nascuntur, facultatis formatricis vitio à semine, ex Gal. 6. Aph. 18. ubi de podagra sub ipem Comm. ait: *Accedit ad has causas relatas, ob quas plerique nunc podagra infestantur, quod parentes, & avus multis podagricis habuere, in quibus scilicet semen erat corruptum, atque ideo posteris maiorem conciliavit partium imbecillitatem.* Ita renes male conformari censeo, & imbecilliores reddi à semine vitiato. Cum enim angustiora sunt vasa hæret materia crassa, aut in renium cavo, ut frequentius in tenuibus illis meatibus in carunculas papillares patentibus, qui urinam transmittunt in vtererum ramos, per illorum substantiam divaricatos; atque ita in calculum concretescit, affluente semper nova materia; ex primo in 6. Epid. 6. Quod si quærat quis, quomodo procreentur in vesica, qua ipsos sæpius concludi patet experientia: hoc referat responsum, heri dupliciter: primario & per se, ex materia crassa, & terrestri à renibus ad vesicam illabente. secundo ex arenulis, aut calculis minoribus ad vesicam propulsis; ubi hærentes, ex allapsu novæ materiz crassæ, & glutinosæ, atque ejus adhæsu, grandescunt. Primus generationis modus fuit à Gal. memoratus 3. in 6. Epidem. 15.

explicante Hipp. verba. *Lapis à mictu pueris magis.* Dum enim dicit lapidem à mictu heri, innuere voluit non excubere lapidem à renibus cum urina, sed coagmentari in vesica postmictum; id est, ex materia prolabente cum urina. Quod clarius patet in alia versione. *Postmictum concretio pueris magis.* Ideo Galenus in illo Comm. addit. *Veritas autem est, calculos pueris. ob urinæ crassitudinem in vesica procreari.* Porro urinas crassissimas à pueris reddi, ab omnibus à nos medicis concessum est; inquit Gal. Quod clarius expressit, dum ait; *crassas enim urinas excerni, & evidenter apparere, & verum testimonio declaratum est.* Huiusmodi namque crassitudinem multa collecta, & in vinum coacta, cum semel aliquando non oportuit excreta intus diutius manserit, coagmentandi, concretescendique vitium capio, eoque principio facta, facit postea quicquid iterum crassum in vesicam illabitur priori agglutinatur, majorque inde tephacens calculus redditur; quemadmodum extra corpus, & in calidis aquis sponte nascuntibus, & in vasis ubi calefit aqua quotidie lapis concretescere cernitur. Hæc Gal. Quod confirmat 2. Progn. 75. his verbis: *Propter importunos, & exuperantes cibos copia purissima colligitur humoris crudi vocati in corporibus puerorum.* Is igitur per renes expurgatur quotidie, atque etiam per urinarios meatus in vesica collectus interdum calculos in ea gignit; omniumque luculentissimè me. Aphor. 30. ubi dum collocat Hipp. calculos inter morbos puerorum, Gal. in Comm. ait: *Lithiasis vero, id est calculi in vesica generatio proprius est puerorum morbus; atque adducens rationem addit. Propter edacitatem, & ingruentem crudos humores non paucos coacturam, ex quibus crassior pars urina cum urinis ad vesicam compoñitur, fit lapidum gignendorum materia, accedente causa altera, caloris scilicet copia.* Nec alia ratione procreantur calculi in puerulis lactantibus. Quod autem calculus in illis concretescit ex lacte, patet ex Libro de Morbis Hipp. vel Polybi potius, ubi hæc habentur: *Cæterum calculi morbi principium obortur à lacte, ubi puer lac impurum sugit.* De loco demum concretionis eorum hæc addit: *Et ubi succrit lac non putum, sed terreum, & pituitosum, & habuerit puer venas de ventriculo ad vesicam amplas, & attrahentes, si quid in lacte non putum fuerit, id quo vesica struitur, lapis fit.* Hoc confirmat quum etiam Hipp. Lib. de Aere, Aquis, & locis: ut propterea plus satis probatum fuerit, lapidem primo, & immediate quandoque in vesica procreari posse. Quæ fuit etiam Arill. sententia 3. de Historia Animalium 15. cum ait: *Defunctu nihil humoris in vesicam transmittitur; ac vivus non solum humor, sed etiam sicca quedam excrementa descendunt, ex quibus calculi conficiuntur.* coagmentatur secundo in vesica lapis ex lapillis à renibus ad vesicam exturbatis, & in ea hærentibus, atque ex novæ materiz allapsu coalescentibus. Quod patet in Reverendiss. nostro patiente, ex cuius vesica exempti fuerunt septem calculi, quorum alter in operatione obtrit, minutum alium in sinu veluti exhibuit diversi coloris, à materia ipsi accrescente, & agglutinata. Quod idem palam fecit alius ex cadavere alterius Adm. Rev. ejusdem ætatis exemptus mole magnæ constantæ, attritus, qui & ipse minutum in medio protulit in conspectum varii coloris: quod



quod me iudice, est indicium inculentum concretionis ipsorum in diversis locis. Quamquam enim concedi possit, calculum etiam in vesica procreatum posse in se complecti alium minutum in eodem concretum, superinducta veluti lamina, vel pluribus per auxilium novæ materię; non tamen fuerit diverſi coloris, cum semper calculi vesicę sint albicantes, renum vero tere semper navescent; ut propterea cum minuti illi sint navi coloris, & cortice albi, itatuendum sit, ipsos e renibus in vesicam excidisse: quod perspicuum sit magis ex alio naviro calculo in Reverendiss. Patre exempto navi coloris, quod nondum excrevisset novæ materię adhaerui. Qua in re observanda Hippoc. sententia lib. de morbis, ubi de vesicę calculo; *Parens ejicit aliquando lapides duos, aut etiam plures minores eodem modo procreatos.* Quod si dicat, calculos a renibus ad vesicam prolapsos esse quandoque plures, eosque secretos, qui seorsum concreſcentes, plures in vesica calculos efformant; atque ideo mirum non est quod in Patre Reverendiss. inventi sint septem, ex quibus unus nondum incrementum suscepit. Quod autem in calculo vesicę minutus alius deſitescere possit, luculentissimè patet ex calculis in vesica fellea, ubi concreſcunt non transmissa renibus, sed ex minorum quodam in ipsa rudimento, qui per adhaerui novæ materię augentur. Quod oculata fide confirmatum in calculo vesicę fellea, Illustriss. & Reverendiss. M. Antonii Cornelii Episcopi Patavini, ejus cadavere me presente dilecto, qui penes me est, pluribus conspectus. Dubium hic tamen occurrit, cur pueri sint opportuni magis calculi vesicę, renum vero adulti, cum tamen illi sint istis calidiores, in quibus propterea frequentius concreſcere deberent in renibus, qui vesica sunt calidiores, partes ut pote carnoę, pluribus venis & arteriis perfusę, cum hæc sit exanguis. Quod ego quoque observavi in Sereniss. Archiduce Joanne Carolo, Sacre C. M. natu maximo, ad cujus curationem accitus fui. Solutio est, quod caliditas calculi efficiens causa sit potius æris, & mordax, quæ magis viget in adultis, cum pueri calido innato abundant, humorum concoctioni, & robori facultatum naturalium accommodato magis. Quod propterea humores crudos ad renes continentes concoquit, qui ab expultrice valida a renibus ad vesicam postmodum propelluntur, in qua deinde si remorentur, densantur, concreſcunt. Quod in Sereniss. Archiduci non contigit, quoniam hæreditariam v. forum angustiam, & expultricis imbecillitatem ab utero materno contraxerat, Serenissima ipsius matre calculosâ extinctâ: ut hoc nomine nec humores crudos attenuare, & concoquere, nec eosdem a renibus exturbare potuerit. Quæ præmittenda duxi ad calculorum essentiam, & causas.

Præſervationem quod spectat, supponendum est, tanquam verissimum Hipp. sanctum 6. Aphor. 6. Renum, & vesicę vitia in senibus difficulter sanari: quod clarius 8. in 6. Epid. Text. Comm. 25. proprio testimonio confirmatum, cum ait: *Vitia renum post annum quinquagesimum sanata non vidi.* Quamquam enim tolli possint objecta aliena actu lædenti, morboſe

tamen affectiones confirmatæ & diuturnæ removeri non possunt. Parcant Gal. maies in Comm. Ego namque in calculis semper observavi, quod licet sectione exempti fuerint ex vesica, & obaudum vulnus, vel iterum concreverint; ut contigit Reverendo Piazzolę, ex Benedictinorum cœtu; vel effluerit semper materia corrupta, ut in Illustriss. & Excellentiss. Marchione Riaro, Venetiis secto, & a me curato observavi: vel impedimentum perſiſterit in congressu Venereo, ut accidit Illustriss. equiti Livio Zabarellę, me præſente secto; vel continua superſites fuerit arenularum excretio; quod observatum in hoc Reverendiss. nostro patiente: ut juxta Hippocratem de soli præſervatione cogitandum sit.

Hæc autem in eo potissimum sita est, ut prohibeatur novus humoris vitiosi proventus. In morbis enim ex materia quamquam sint hæreditarii, cum intensa caliditate, deſiciente materia vitiosa, calculus nunquam procreabitur. Tribus vero potissimum medicis præſidiis hoc præſtabimus.

Primum, & potissimum est, ut cibus attenuantibus, & levis coctionis utatur, panis scilicet bene fermentato, salamentis cibi loco, melle, moderatè tamen mediocriter salitis, vinus tenuis substantię, albis, non dulcibus: nullis cibis crassi succi, carnibus bubulis, suillis vervecinis, aut oleribus, piscibus, præsertim palustribus, & testaceis; laganis item, & legumibus præter ciceres, atque caseo, maxime vero antiquo. A cibo semel saltem in hebdomada abstineat, & mediocri utatur exercitio; non tamen statim a cibo, quo tempore intermittat etiam studia. Quod si quandoque cruditates in ventriculo abundant, citius decumbat, & dormiat manu ventriculo pposita. A cibo vomitum semel in hebdomada saltem cieat, oxymel. scilicet dummodo ab eo non sit valde alienus. Quod si contingeret, assumat drach. i. pil. de hiera cum agar. hora ante cenam: atque quotidie descendat alvus vel sponte, vel suppositorio, vel clystere; vel usu pilul. ex aloë lota cum succo rosarum, vel cremore tartari cibus asperso. Bis autem in anno purgationem universalem molietur, Vere, & Autumno, cum aliqua sanguinis educatione ex ſalvatella dextra; quo tempore uti quinetiam poterit diureticis ad emundandos renes, & vesicam: in quem usum accommodata erit Terebinthina Veneta, cum spiritu salis, cremore tartari, & aquis diureticis, occludui spatio: a quibus tamen aliis temporibus abstinendum censeo, ne crudos humores, cibosque non concoctos devehant ad renes. Quæ præſervationis loco abundè fore censeo. Faxit D.O. Omnipotens ut cedant ad vota. *Idem ibidem.*

Illustrissimus Adolescens vigesimum quintum annum ægis, temperamenti totius & jecoris calidi & humidis, carnosus habitus; dum diebus elapsis ad invisendas Italicæ urbes una cum sociis iter faciebat, dolore vehementi in latere sinistro, a rene ad abdomen sese extendente correptus fuit, cum mingeudi & egerendi inclinatione, imò & irritamento, qui paucis horis remisit; sed sequenti die rediit vehementior, cum iisdem symptomatibus, addito etiam vomitu & insigni ad vomendum







motu calculus renem contundens, nec exire valens, phlogosin, & fors. n. eti. au. legitimam inflammationem in ipso rene excitat, quam necessario febricula sublecut. fuit, ad cuius adventum & sitim cum lingua hœcitate, & ventriculi. natropam; & totius corporis maciem, quæ omnia antea a calculi præsentia procedebant, adacta fuisse mirandum non est. In deterius autem lapsu sequenti illustr. censeo, ob aquæ vitriolatæ assumptæ retentionem, quæ sanguini immixta, eundem inquinare, & corrupta corrumpere quoque potuit. Nec retentionis causa in aquas ipsas, quæ n. vis. nondum satis a Sole confectas, est referenda, sed in renem angustiam: conflictatus enim a lapide ren ipse affectus, contrahitur, & in consensum trahit renem alterum non affectum, ut propterea difficilis & imminutus valde aquarum transitus fuerit.

Quibus ita se habentibus, exiguam spem superesse, nullus erit in arte veritatus qui non videat, tum quia calculi excretio tot congruis remediis incassum tentata fuit, tum quia febris symptomatrica, nempe a rene affecto, a me exstima. ta, inflammationem suppurandam minuitur, & interim necessaria Lithonriptica prohibet; & ideo febrî (si perseverat) & reni afflicto, tanquam urgentiori, & veluti causa sine qua non, incumbendum est: mox ad ipsum calculum dirigenda Curatio.

Adversus febrêm & renis afflictionem, pugnandum Evacuantibus, Refrigerantibus, Repellentibus & Derivantibus. Adversus calculum, Diureticis, Laxantibus & Lithonripticis, habita tamen semper virium ratione. Quibus omnibus sequenti ordine satisfaciendum esse puto, ut primo aquæeductio iterum atque iterum procuraretur blandis medicamentis, ut est portio ex mænna clarif. aut flos cassi. cum Magill. Mecho. c. superpræbendo jus malvis vel hordeo alteratum. Inde aperiatur saphæna lateris affecti, hæcque juxta Hippocratis doctrinam *Veratro purgare, poplium venam incidere*, idque quopiam, non constantibus viribus, revulsio a vena superiori ipsi derivationi præmitti non potest. Interim extrinsecus refrigerantia, sed cum exigua substrictione apponenda, ut simplex unguentum rosac. Mesues, cui progressu addi poterit etiam malvinum.

Victus autem ratio debet esse substantificæ humectans, renutrens, vireque non solum conservans, sed etiam, non inhibente inflammatione, ipsas adaugens.

Ablata febre & inflammationis suspicione contra calculum vires medicæ erunt intendendæ, Hippocratis præceptis obtemperando, nimirum vias urinarias mundando, ductus laxando, & lapidem ipsum frangendo: quas intentiones nobis insinuavit sub illis verbis, *Urinarios mundare, attenuare atque mollire*. Et quoniam propriis remediis primæ & secundæ intentioni a Viris Excellentissimis satisfieri non potuit, nempe post expertam ventris expiationem, diureticis atque laxantibus, & demum aquis ipsis vitriolatis; ideo ad tertiam intentionem deveniendum esse mihi videtur: dum enim calculus præ magnitudine vias, nempe papillas ipsas, quamvis enolli-

tas atque laxatas, pervadere non potest, tota vis Curationis in ejusdem calculi tractatione, aut erosione & imminutione posita est, nunquam tamen laxantibus & aperientibus omittis. Quare ad Lithonriptica contugendum: inter quæ selectiora & efficaciora apud nos experta sunt, sal tartari volatilizatus ad ʒj. in aqua ononidis; Magisterium oculorum cancrorum pariter ad ʒj. vel in eadem aqua, vel in aqua & thecis sabauin. Essentia crystalli montani ad semidrachmam in aqua p. n. erarix; atque tandem succus capæ albæ, per expressionem extractus, ita parandus.

ʒj. Succus coarum alb. aq. pariet. vin. malvasii suavis an. ʒiv. m. pro pote. Et quoniam jam dicta Lithonriptica non quoties, sed tertio aut quarto quoque die sunt repetenda, ideo diebus intermediis Laxantia & Aperientia non sunt omittenda, ut Cerebinthina Cypria tota nocte detenta in aqua mala mli, ad ʒj. quæ reformetur cum senadrach. pulver. osium mespilorum, & huic superbibat cyathum aquæ malvarum, vel jus malvis alteratum, addito succo limonum. Extrinsecus quoque solenta mane & vesperi sunt in usum ducenda, quæ Balnei vicem supplebunt, magnam spongiam reni apponendo, imbutam & lemi expressam, decoctione sol. malv. chamæmeli, parietar. saxifragæ, n. eloti, radic. althææ, lil. alb. sem. lini & foenugræci; Et urgentibus doloribus apponatur omentum vituli, oleo anygd. & de leorpionibus imbutum, quibus addi poterit etiam liliaceum pro inunctione, post amotam spongiam facienda.

Sic fracto aut comminuto calculo, tunc locum habere poterunt aquæ vitriolatæ, ad ipsum educendum, & renes atque urinarios meatus mundandos.

His autem omnibus congrua vivendi ratio erit addenda, a viris Excell. Adstantibus præscribenda: quibus & cætera omnia melius dirigenda committo.

#### Appendix ad antecedentem Consultationem.

Post perscriptam consultationem, ad me pervenit relatio Præclarissimorum Virorum de statu equitis Illustrissimi, a priori diverso, cujus diversitas in duobus consistere mihi videtur, nimirum in doloris renis remissione, & in virium subitanea prostratione. Levaminis causam non in solam calculi mictionem, sed in materiam pituitosam partim, si non purulentam, saltem analogam puri, excretionem referendam esse crediderim ego, cum dolor in rene perseveraverit, etiam calculo in Urethra existente: utinam ex disrupto in rene abscessu inflammatorio materia jam dicta alba, & forsitan purulenta, pituita immixta, non effluerit, ut non sine ratione dubitari potest, cum repente dolor evanuerit, aut item remissus fuerit. Nec obstat remiss. febris, & pulsus fere ad totalem Apirexi impeditus, cum doceat Divinus Senex, quod dum p. m. d. c. i. t. u. r, d. o. l. o. r. e. s. & febris magis sunt, quam pure jam confecto. Quoniam vero sequenti die urinx sæculentæ & fere subercentæ apparuerit; ideo calculum excretis multo majorem adhuc in rene reperiri



summopere dubitandum, cum jam nuper excreti haurati fuerint, ita ut fragmenta exillimari non debeant. Interim tamen utriusque affectus syn.ptonata & excreta diligenter observanda, ut veritas innotescat. Virium autem prostrationem totam hepati soli tribui posse non video: vitiata namque hæmatosis ipsa, ad Cachexiam, indeque ad Hydropem Patientes ducere solet. Quare adderem ego sanguinis inquinamentum ab aquæ vitriolatæ retentione introductum, cujus causa spiritus vitales qui ex ipso probo sanguine generari debent, reproduci non possint: non excludendo tamen jecoris labefactionem, obruto à copia aquarum ejusdem nativo calore, nisi concurrat fors. In etiam in rene tumoris eruptio, cum *A tuberculi intra ruptione exolutio contingere solet*, ut monet Hippoc. Quare adhuc in vitæ discrimine versamur, cum pro viribus reparandis massæ sanguineæ purificatio requiratur, quæ non nisi hydragogis medicamentis, à vitium imbecillitate non permissis, procurari potest; præterquam quod calculi excretio adhuc tentanda relictat, quam difficiliorem reddere posset renis ulcus, ab abscessu disrupto relicum.

Quibus omnibus consideratis, urgentiori dubio procul est incumbendum, viribus nempe reparandis, sine quibus cætera remedia incassum, imò cum præjudicio administrarentur: illis enim reassumptis, ut dicebat Celsus, Medicinæ dabitur locus: & hic observandum venit Hippoc. præceptum, *Quibus semel, aut bis, plurane, an pauciora offerre oporteat*, considerandum esse; & præterea Galeni Commentum, in quo monet, viribus existentibus imbecillibus, parum & sæpe cibum esse offerendum, qui sit boni succi, facillimæ concoctionis ac distributionis, & pauci excrementi. Et quoniam *facilius est implere potu, quam cibo*, ideo convenire poterunt, præter jura carniū in quibus sint dissoluta lutea ovorum recentium, nonnunquam testurum pulli, quandoque contusum; addantur quoque emulsionēs amygdalarum dulc. recent. & pistaciorum. Proderit quoque vinum aromaticum modicè exhibitum. Semper ante cibum aliquod Cardiacum proficuum erit, ut julapium gemmatum Mag. Duc. in exigua aqua totius citri, aut florum ejusdem; Species quoque Diahyacynthi in aqua scorzonere. Interdum bolus ex Alchermes & hepate lupi paratus. Caro quoque viperina, cum reliquis carnis ebullita, vim quandam balsamicam, & calori nativo nostro analogam obtinet.

Quamprimum vero Curationem vires permittant, ab aquæ educatione erit incipienda, & interim renis status observandus, ut opportuna medela adhiberi possit: non omitteudo tamen Clysteres naturam ipsam ad aquam educendam excitantes. Quæ pauca subdidi, à sapientibus viris examinanda. *Idem ibidem.*

#### Calculi Renum in Puero.

Princeps Excellentissimus Puer duodecim annorum, ex Patre valetudinario & immaturè defuncto natus, temperamenti ad calidum & siccum vergentis; hepatis calidioris, me-

diocris habitus, libere vivens, imò eduliis crassi succi de more utens, & immodicis exercitiis deditus; usque ad decimum annum ætatis suæ semper valetudinarius, frequentibus nempe febribus obnoxius, cum alvi constricta stypticitate. Præterea somni turbati, cum spectris terrificis quandoque ei contingunt, ita ut clamoribus expurgatur, nec præteritorum quicquam recorderetur. Caput ejus frequentissime gravatur, & per nares nonnunquam catharralis materia copiosa & crassa expurgatur, quæ detenta, nares ita obstruit, ut dormiens ore adaperto respirare cogatur. Duobus tamen abhinc annis sanitate satis laudabili frui cæpit: verum renū dolores accesserunt, per intervalla frequenter recurrentes, quos solvit mictio calculorum rotundæ figuræ: qui si diebus aliquot (integra hebdomada) retineantur, dolores vehementiores & acerbiores afferunt, donec calculus consueto major per urinam excretus fuerit: a cujus mictione prorsus a doloribus immunis & alacris manet. Et cum frequenter repetat hujusmodi affectus, a Te Vir Doctissime, præsertionem implorat.

Quod Excellentissimus Princeps duodecimum suæ ætatis annum agens, statim natus, usque ad decimum annum multis & variis ægritudinibus conflictatus fuerit, mirum videri non debet, cum hæreditariam à Patre valetudinario pravam totius corporis dispositionem sortitus fuerit, & præsertim capitis intemperiem calidam & humidam, quæ idipsum excrementosum reddidit, & destillationibus valde obnoxium; præterea jecur justo calidius cum fervore, atque eorundem pravam diathesin & calculosam dispositionem; & propterea dicebat Galenus, quod *Catarrhus omnium morborum fons, & soboles esse possit, cujus vitæ totum corpus languere solet*; quod facile desumpserat ab Hippocrate asserente, quod *destillationes à capite magno radio atque molestia naturam frangant*, potissimum verò in Excellentiss. Puero, cerebri emundatorium, nares scilicet, angustum habente. Quare cum à perenni destillatione in ventriculum ciborum coctiones imminuta secutz fuerint, biliosis humoribus à calido jecore genitis immixta, & massam sanguineam inquinantes, fermentata frequenter & putrefacta, febres modò acutas, modò chronicas præteritis annis excitavit; sed tandem ad renes transmissa live deducta, extra consuetudinem & valde immaturè in calculos albi & flavi coloris, marmoreos potius, quam topheos converti cœperunt, suggerente renibus materiam prava vivendi ratione, nimirum crassa, concoctu difficilibus & excrementosis alimentis, quibus delectatur; præterea vehementibus & intempestivis motionibus corporis; & diureticorum, nempe granorum juniperi & feniculi in potu, abusu, quo materia pro calculis producendis ad renes quotidie ducitur: præsertim vero cum alvi stypticitate, dicente Aëtio; quod *Si alvus bene fuerit, pauciora tota prodibunt*. Rarissima equidem in Puero calculosa conditio, quam semel tantum hucusque mihi vidisse contigit, & semel se videre potuisse asseruit Cardanus: Pueris enim propria & familiaris esse solet calculorum in vesica pro-



productio, unde Hippocr. dicebat, *Post miclum concretio Pueris inanis, cum quoniam calidiores*. Et modum alibi explicat, dicens, *Quorum alvus ardens, ac servida fuerit, si & vesica, ita excoalsata, urinam non dimittit, & quod crassissimum & turbidissimum est, coarctatur, & dum voluitur, concrevit; quod exire saepe solet etiam infantibus ex impuro lacte Nutricis pravis alimentis connutritz. Et quoniam sicut calor intensus vesicæ, una cum cruditatibus, in Pueris Lithiasin generat, ita ab eodem in adultis ratione ætatis in renibus adaucto, nephritis excitari solet: ut propterea docuerit Gal. Lac Pueris in vesica, Adultis in renibus calculos generare, sic & magis casum; idque quoniam ad calculorum productionem concurrat calor, ut causa efficiens, & humorum crassities, ut causa materialis. Cum autem calorem huiusmodi excedentem in renibus Pueri non habeant, ut calculum producere valeat, examinanda à nobis est causa huius raritatis, si Excellentissimo huic Pueri præservatio est præscribenda. Hanc igitur à mala vasorum & renum conformatione hæreditaria, ab Excellentissimo calculoso Patre contracta, pendere pro certo est habendum, quæ consistit in amplitudine vasorum emulgentium, & in renum densitate atque ureterum angustia: ut ideo renes facile à jecore per ampla superiora vasa cruditates multas suscipiant & attrahant, sed subinde ob propriam densitatem easdem non dimittant & retineant, sicque diurentz, etiam à moderato calore in calculos convertantur: quam causam tetigit & ipse Gal. dum dixit, *Succi crassi non in omnibus calculos generant, quibusdam enim densi renes, & per angusta sunt ora vasorum, quibusdam è contra; quod idem alibi ita confirmavit, omnia crassi succi in renibus calculos generant, dum transitus latos non habeant: Et hæc causa ab Oribasio quoque recepta fuit, imò & à Recentioribus ferè omnibus, dum Fonsæca protulit, quod Calculosa & hæreditaria renum dispositio, etiam cum paucis renum calore præsentem materiam, est sufficiens ad calculorum in renibus generationem; & idcirco ut causa sine qua non ab universali Medicorum schola recepta fuit. Ita in casu nostro juges cruditates, partim à capite in ventriculum descendentes, & coctionibus officientes, partim à ciborum superingestionibus, Pueris consuetis genitæ, ut causa materialis; calor verò & jecoris, & renum, ut causa efficiens; & potissimum naturalis calculosa dispositio, in emulgentium amplitudine, & renum atque ureterum angustia consistens, causa sine qua non appellata, concurrunt in Excell. Pueri Principe ad calculorum in renibus intempestivam & immaturam procreationem.**

His autem ita sese habentibus, cum caput & renes ope medica indigeant, urgentiori prius incumbendum nos docet Galenus, ipsaque ratio dicat: capitis enim exiccatio & catarrhalis materiz extirpatio tutius in juvenilem ætatem differri potest, quam calculorum inhibitio: evidens enim periculum imminet, ne diutius aliquis calculus in renibus detentus, & major consuetus factus, non amplius in vesicam descendat, sed mauens in renibus, Principem misere interficiat, ut contigit Ex-

cellentissimo Patri defuncto. Alterum imminet periculum, ne in vesicam delapsus, propter canalis Urethrae angustiam, in eadem moretur, per additionem grandior hac, & pro extractione incisione sit opus, cum vesicæ calculus manuum dumtaxat opera curari possit.

Hoc igitur anni tempore, nempe proximo mense Maio purgatio erit incunda, primas vias expiando. Secundo Venosum genus ab excrementis depurando. Tertiò caput quoque purgando. Quartò jecoris & renum calorem contemperando, & vasa angusta dilatando; atque tandem causæ materialis reproductionem inhibendo, & ipsam à renibus divertendo.

Pro prima intentione explenda, primò potio suavis leniens præscribenda, ex man. clarif. cum tartaro, aut syrupo ros. solut. aureo. Inde sex aut septem sequentibus diebus cruditates in primis viis existentes, ita præparanda.

℞. Julap. acet. simpl. syr. de cortic. citri aq. flor. citri an. ʒj. m. pro syr. & sic pro aliis; Aut singulo mane exhibeatur.

℞. Cremor. tartar. sacchari albi an. ʒß. & dissolvatur in modico jure carnis, corticibus citri alterato. Inde alterum ex præscriptis Lenientibus repetendum.

Pro secunda vero intentione, ulteriora præparantia erunt usurpanda.

Ut ℞. Decoct. in jure paratz cich. borag. endiv. meliss. betonic. agrim. ʒv. oxymel. simpl. syr. de beton. an. ʒj. m. pro syr. & sic pro aliis septem. Interim primis diebus jecorina dextera erit aperienda, sed sanguis parè mittendus. Transactis jam dictis diebus, purgans huiusmodi erit exhibendum.

℞. Rhabarb. opt. ʒj. agaric. trochisc. fol. sem. an. ʒij. cinnam. integr. ʒß. aq. agrimon. q. s. m. f. infus. per hor. xii. & facta forti expressione, colaturæ adde syrupi rosat. solut. ʒiv. clarificentur omnia cum cremor. tartar. & f. potio brevis, cui, incepta evacuatione, superbibat aquæ hordeac. vel feri caprin. depur. ʒvj. & duobus horis ab assumpto sero prædeat.

Inde ad tertiam intentionem explendam deveniri poterit pilulis capitalibus.

℞. Extracti pilular. cochiar. ʒj. aurearum ʒß. reformentur pilulæ, & tribus interpositis diebus ab assumpta superscripta potione, præbeantur summo mane, & repetantur. Intermediis verò diebus reassumat syrupos præparantes præscriptos: & aliquod errhinum manè tantum in usum ducat, suave, non violentum.

Ut ℞. Pulv. majoran. iræos an. ʒij. nigell. ʒj. m. f. pulvis per nares attrahendus.

Quartæ intentioni ut satisfaciamus, aquis acidulis omnino opus erit, non tantum ferreis sed vitriolatis, quales sunt in Valle Solis nascentes, quæ primis tribus diebus cum vehiculo dejectorio syrupi ros. solut. aut mann. clarif. erunt præbendæ, sequentibus verò diebus quindecim cum aliquo vehiculo diuretico, quamvis rarò eodem indigeant: posset autem esse spiritus tartari pluries rectificatus; harum autem usus duobus sequentibus annis repe-



tendus, leviori tamen præmissa corporis expurgatione. Terminato autem aquarum usu, magnopere conterre poterit lac aluminum ad quadr. ginta dies, quod inter genera lactis prerogativam habet refrigerandi, renēs emolliendi, amo & tophos in renibus dissolvendi, ut testatur ipse Galenus, & cum eo ceteri Medicinæ Principes: nec caput implet, quia celerrime per corpus digeritur. Præbeatur autem statim mulctum, summo mane, à quo somnus nullo modo permittatur, incipiendo ab unciis quatuor cum semicochleari sacchari, & ascendendo usque ad novem, cum integro sacchari cochleari. Quo tempore aquarum & lactis, statim à cena deglutit Excellentissimus Puer duo aut tria gran. maltiches integra: à prandio vero conterre poterit conserva absynthii, quam si ob amaritudinem respuat, sal absynthii in exiguo vino dissolutum supplere poterit.

Verum ut postremæ intentioni satisfaciat, sat non est roborare ventriculum, si quotidie oneretur crassis cibis excrementosis & difficillimæ concoctionis: & ideo Valescius de Taranta scripsit, ridiculum esse medicamenta Calculosis præscribere, non præmissa congrua vivendi ratione. Quare si primò aërem consideremus, neque hypocausta, neque repentinæ mutationes à calido ad frigidum, & è contra, capiri convenire possunt. Si secundo ali menta; inter carnes suillæ prorsus ablegandæ, bubulæ & cæteræ annosorum animalium, & aquatiliū raro usurpandæ; pariter extremitates, ut pedes & capita, omittendæ. Inter pisces, soli saxatiles eligendi, & à conchyliis atque ostreaceis omnino abstinendum. Lacticia omnia & edulia ex lacte & pasta parata, sunt fugienda, & cæcus præsertim. Legumina omnia vitanda, hordeo & oriza exceptis. Inter fructus, fraga, pepones, persica, heus nonnunquam permitti possunt. Inter olera, prorsus abstinendum ab usulactuæ, à fœniculo, selino, carduo, radice raphani, fungis & terræ tuberibus. Inter condimenta interdicitur usus aromatum, pauco cinnamomo & pipere ruditer contuso exceptis; neque conceditur succus citri & limonum, quoniam diuretici sunt: hoc enim documentum est quàm maxime observandum, quod dum Calculosi actuali calculo, in renibus existente laborant, tunc, primis viis ab aliquo medicamento expiatis, omnia diuretica & urinam ducentia opportuna sunt: è contra verò extra accessionem, dum agitur de præservatione, nullo modo sunt admittenda, quoniam ducunt materiam, cruditates scilicet ad renes pro calculis producendis: ut propterea approbare nequeam usum quotidianum granorum juniperi, minusque fœniculi in vino, nec aliorum diureticorum, quoniam confunditur ita Curatio cum præservatione, & præservatio cum Curatione, in quem errorem incidunt quoque non raro Medici ipsi: & ideo in hunc finem reprobandur etiam vina Moselana, Rhenana, utpote valde diuretica, ita & cerevicia lupulata. Præservatio enim à calculo requirit, ut cruditates non generentur, & genitæ à renibus divertantur, & per alvum ducantur. Tertio somnus largior esse debet, sed nocturnus, non tamen dormiat in plumis: & si decubitus supinus

consuetus fuerit, subternatur linteolo portio corii vervecini. Quarto exercitium sit moderatum, & ventriculo non repleto, ita præcipiebat Hippoc. Labores ante cibum. Quinto Alvus lubrica servanda, prunis Damascenis aut Hungaricis; vel passius in vino subdulci tenui decoctis, & saccharo aspersis, prima mensa comansis; & ut magis divertantur cruditates à renibus, & per alvum educantur, semel in mense, unica hora ante prandium assumere poterit.

℞. Elect. lenit. ʒss. Mag. Mechoac. gr. vii. aut pilul. mastich. ʒj. m. t. boli. tandem alacri animo ut indulgeat Princeps Excell. permittendum, neque ad nimia & intensa studia sollicitandus, sed geniales conversationes admittendæ, quæ tamen in vivendi ratione errandi occasionem non præbeant. Quæ omnia faxit Deus, ut salutaria evadant. *Idem ibidem.*

#### Vesica Calculus.

Cum à naturæ primordiis Vir Illustrissimus non adeo probam partium principalium & inservientium temperiem sortitus fuerit, jecore namque justo calidiori, capiteque humidiori, atque ventriculo frigidiori præditus fuit, ideo varia & heterogenea excrementa à jam dictis partibus jugiter produci necesse fuit, quæ quoniam à naturæ corpore excerni vix credi potest, idcirco mala inde exorta fuisse mirum non est, præsertim addita libera vivendi ratione: intemperantes enim in diutinos morbos incidunt, à quibus postea tota vita sese explicare nequeunt, inter quos Nephritidem & Arthritidem, sive Podagram enumerabat Galenus, quorum alterum, Arthritidem scilicet superioribus, nonis fuit expertus Vir Illustrissimus, quo cessante, insurrexit alter, nephriticus videlicet, cui statim Lithiasis successit; non enim defuerunt crudi & crassi succi à ventriculo naturaliter frigido, & à continuis applicationibus adhuc frigidiori reddito, addito quoque improporcionado objecto: quæ cruditates ad varias corporis partes transmittæ, & præsertim ad artus, articulares quoque dolores pariebant: ad renes vero tandem convertebantur ab igneo eorumdem calore, tanquam à causa efficiente assatæ, & à vasorum naturali conformatione detentæ, in arenulasque conversæ, à glutinosa materia coactæ, tophaceos calculos produxerunt, qui dolores nephriticos excitant. Cessant autem, dum diureticorum medicamentorum ope à renibus depulsi in vesicam; & tandem per urinam ejecti visi fuere; sed non omnes, quandoquidem actionem mingendi depravetam, quæ ab illo tempore quoque Virum Illustrissimum affligit & torquet, ab aliqua causa musculi irritante provenire dubio procul asserendum, quæ quoniam Sapientes & Excell. Viri isti propriis & necessariis experimentis certiores facti fuere, non est quod dubitemus; siquidem conjecturæ primò calculum in vesica reperiri satis aperte nobis significabant, cujus præsentiam non semel, sed bis sensus ipse tactus comprobavit: calculum enim mense Aprili præterito à primis nephriticis doloribus in reus papillis mansisse, & vehementis motus in rieda occasione in cavitatem delatum fuisse pro certo habendum



dum, qui ibi sine dolore adservari potuit, sicut cum dolore ad vterus delapsus, exquisitissimo sensu praeditos, Diureticorum opus in vesicam cecidit, sed in rene antea crassorem factum exitum non invenisse censendum. Quare in vesica quotidie a superadditis cruditatibus involutus & grandior redditus, dum, quod turbidissimum, coarctatur, circumvolvitur & concrevit, sui ipsius etiam quotidie majora nobis praebuit indicia; etenim ab initio mictio molesta & frequentior apparuit, in progressu stranguriosa, adeo ut dolor adfuerit in mictione cum urinae stillicidio, vesicae ardore, & quandoque arenosae materiae excretionem, omnia signa lapidis vesicae, ab Hipp. proposita; quibus accesserunt & ponderis sensus, & inquietudo, & ani tenesmus, & haemorrhoides, quae omnes conjecturae eundem confirmarunt, accedentibus praeterea experimentis diureticarum aquarum, & motus vehementis in rheda, a quibus nocumentum evidens reportavit Illustriss. Patiens, atque tandem sensu ipso iudice facto, & candela in vesicam introducta, & digito in anum immisso, conjecturalis cognitio sentata & mathematica redacta est.

Agitur igitur de calculo in vesica actu existente, nec adeo exiguo, eo quod nunquam urinam supprimit, a vesica removendo; & idcirco pars curativa in praesentia a nobis consideranda venit, de praeservatione alias cogitandum, & posteaquam diureticis aquis, prudentissime a Viris Excellentiss. propinatis, educi non potuit, Lichonripticis vero fidere in experti Medici certum indicium sit, idcirco non nisi manu opera curari posse pronuntiavit Hipp. alioquin praeter urinae suppressionem, doloribus, febriculis, ulceribus, colliquationibus contabescere solent Patientes. Et quoniam hoc remedii genus potius inspirationem divinam quam Medici consilium requirat, ut propterea Hipp. nobis consilium dare prohibeat, imò Avenzoar vetet quoque Medici praesentem. Nihilominus viriliter ego & ex corde agens, virile quoque & unicam curationem, dilectionem consulo, antequam congruas conditiones ad huiusmodi operationem tutiorem reddendam effugiant; concurrunt enim in praesens anni tempus opportunum, lapidis magnitudo conveniens, cum nec grandior, neque exiguus nimis requiratur pro faciliiori extractione, quam & vires, & aetas permittunt, nec prohibent nimia gracilitas, aut febricula, aut ulcus in vesica; quae sicut modo non adsunt, ita superventura valde suspicandum. Neque praeter excrementorum in primis viis existentium per alvum evacuationem, alia preecedens corporis expurgatio necessaria mihi videtur, cum jam sanguis non semel ex haemorrhoidibus satis sponte effluerit, qui novae sanguinis missionis pro inflammatione arcenda occasionem affert.

Quod si fortassis veram hanc atque legitimam Curationem non admittat Vir Illustrissimus, palliata erit substituenda; pro cuius institutione non adeo facile Medico erit medicamentis elicere intentiones, cum ex una parte calculi augmentum inhiberi debeat: idque crudorum excrementorum a viis urinaris ad al-

vum diversione procuretur: ex altera vero cum calculus angulosus, aut inaequalis coniciatur, nec aequalis & minus cruciolus reddi possit sine crudipatum accursu, nec praeterea dolores demulceri possunt, nisi Anodyna diuretica ad afflictae vesicae ducantur, contraria exoriri videntur intentiones; in quo casu, quoniam, cum Galeno, urgentiori est incumbendum, ideo posteriori intentioni satisfaciendum, priori tamen non omnino neglecta. Et idcirco Diureticis demulcentibus statim utendum, quae ad vesicam quidem pervenire, sed a vesicae excrementa impellere minime valeant, ne calculus magis a suis tunicis expolietur, extrema quoque non omitendo.

Interna Anodyna possunt esse & injecta, & assumpta; & inter injecta alia per intestina alia per Vrethram, per intestina enim parantur Clysteres cum exiguo lacte bubulo, in quo dissoluta fuerit drachma philonii Romani recentis; detentamque ad duas tresve horas vespertinas vesicae sensum adeo obstupefaciunt, ut dolor tota nocte magnopere remittatur, & sonus concilietur. Per Vrethram vero licet medicamento injicere difficile videatur, cum vesicae collum habeat anfractus ad modum S. attamen per fistulam indirecte per tota medicamenta injiciebat Galenus; & ideo lac asinum, vel caprinum in quo globulus opii torrefacti nocte infusus fuerit; aut Laudanum Nепentes, ad demulcendos dolores, injici & prodesse poterit. Per os vero sumenda duo propono mihi familiaria remedia, quorum alterum est serum asinum destillatum, appposito globulo opii torrefacti rostro Alembici, ut in transitu obstupefacientem facultatem acquirat, cujus dosis erit ad ℥x. addito syrupo de ibisco; & ut facilius ad vesicam perveniat, ex eodem emulsio quoque sem. melonum, sed valde diluta, parari poterit. Alterum vero ita parabitur.

℥℥. Fol. malv. rec. m. iv. viol. m. ij. radic. anonidis, liquiritiae an. ℥ij. sem. melon. mundat. lb β. passularum ℥j. incid. incid. contund. contund. & adde aquae Nocerianae lb xv. succi limonum ℥ij. m. macer. omnia per horas xij. deinde fiat fortis expressio, in qua dissolve flor. cass. rec. extract. ℥ij. ponatur in Alembico vitreo, & B. M. destilletur, & praebeatur ad lbj. vel paulo minus, addendo, si placeat, lyr. de ibisco, vel julap. viol. ℥j. mirabilis enim experta est, ad vesicae & renum dolores demulcendos.

Extrinfecus quoque in sessiones & iunctiones fieri solent; sed ut nimis operosa, iisdem fomenta substituere consuevi, bis saltem in die admovenda, magna spongia imbibita, & non expressa, decoctione malvae, viol. nymph. radic. althaeae, liquir. hord. & fenugraeci; quibus, urgente dolore, capita quoque papaveris albi addi poterunt. Fomentis vero succedant illitiones ex unguento malv. & populeo oleo violac. reformatis, vel oleo nenuph. & viol. simul mixtis; quibus, dolore urgente, addi quoque potest exigua portio olei ulquiani.

His autem addenda erit congrua victus ratio, inter attenuantem & incrassantem edia, ne incrassante nimis; urgeatur calculi moles, & attenuante acuantur nimis urinae & humores.



media quoque debet esse inter tenuem & plenam, ne tenuiori vires deficiant, neve pleniori excrementa cruda in corpore redundant, & ad vesicam tanquam ad partem affectam confluant: moderata quoque in calida & frigida, ne frigiditate natus calor elanguat, caliditate verò aciores reddantur urinæ: demulcendi autem facultatem obtineat: nec ullo modo diuretica alimenta sunt admittenda, ne humorum sarcina ad vesicam ducatur. Quæ sapientibus Viris pro salute, aut meliori statu Pat. Illustriss. quam eidem a D. O. M. enixè precor, sat superque sunt dicta.

#### *Vesica Lapis.*

Illustrissimus Vir annum agens quadragesimum tertium, temperamenti calidi & sicci, Patre natus Nephritidi & Arthritidi obnoxio, à primis sue vitæ exordiis ferè morbosus, cum in ipsa pubertate rebelli hypochondriaca affectione, quæ adhucnum perdurat, affectus fuerit, frustra variis adhibitis medicamentis, & inimitabili victus servata ratione, tertius annus excurrit, ex quo cum urina cœpit ejicere arenulas & minutos calculos, nullo tamen doloris, aut difficultatis sensu, nisi circa renes levi passione. Ante duos annos apparuerunt urinæ magis turbatæ & sabulosæ, quæ per aliquot dies Nob. Aegrum noctu maximè affligerunt, de quibus tamen soli naturæ relicum fuit opus, à quo tempore postea sæpius in urinis ipsis modo calculi observati sunt, non sine gravi Patientis molestia; qui tandem de sua salute sollicitus, præterita Aestate, congrua præmissa corporis expiatione, ad renes & vesicam emundandam aquam B. V. meo consilio sumpsit; quæ licet feliciter e corpore educeretur, tecum nihil exivit: purissima enim semper exivit, ut toto assumptionis tempore nil prorsus nisi aqua ipsa & naturale lotium vitum sit; à qua postea per duos menses integrè fere convaluit, extirpato penitus dolore, licet aliquis minutus calculus aliquando apparuerit. Mense præterito Septembri Patavio rediit, quo delicta vectus erat, frigida satis aëris constitutione in maximum inferioris ventris dolorem incidit, qui ipsa sanatione, quæ Hipp. certissimum iudicium est colicus fuit: qua occasione in alvi artificiosis depositionibus, materię multæ, mucosæ, necnon biliosæ dejectæ sunt; sed magis & intolerabilius successit malum, renum scilicet intensissimus dolor, qui lentè ad inferiora delapsus, vterum loco prius afflicto in ipsa vesica hæsit, & præcipue circa ejusdem orificium, qui etiam cum jam Illustriss. Aegri corpus familiaribus medicamentis pro tempore de more sumptis satis expiatum esset, usu Terebinth. etiam Venetæ in aqua malvarum lotæ, superbito aquæ hordei, vel malvæ calice, aliquod levamen visus sit accepisse, hisce diebus post violentum corporis exercitium, confectio pedestri itinere per loca aspestiva spatio tere quatuor miliarium, adeo invaluit, ut continuis cruciatibus noctu diuque Ager divexetur tali dolorosa lotii excretionē, ut præ ejus immanitate Vir alioquin patientissimus & tolerantissimus, aliud exclamare cogatur, urinam ipsam, luxuria cum difficultate semper & gutta-

tim detillante; quam licet Aeger nixu expellere conetur, paucissima semper exit immista pituitæ, & lacteo colore perfusa: in quo deplorabilis conditionis statu modo acutum & pungitivum, modo adurentem urinarum exitum nominat Aeger, & aliquando incendium intolerabile experiri conqueritur, vigiliis etiam & animi sollicitudine fere consumptus, non sine symptomaticæ febris, licet levis, præsentia. Ad cujus horridi hostis pertinaciam devincendam, nos hic varia experti sumus, dum ipsam causam non negligentes, ad ipsum symptoma, ut magis urgens, manus medicas admovimus, ne soli causæ in umbentes, spreto Galeni consilio, in ipso improprie prius Aeger periret. Unde multa ad ipsum dolorem directa sunt, tum interna, tum externa. Propinato scilicet repetite ol. amygd. duic. extr. sine igne, assumpto cum succo limonum, modo solo, modo in sero capr. destillato, necnon ipso sero caprino cum sem. melonum, & aliquando ipso malvarum jure; exterius verò vesicæ regionem fovendo petiis lacte imbutis, & unguento ros. malv. illito, necnon per siphonem injecto in vesicam ipsomet lacte, aut malvarum decoctione. Quæ omnia quamvis dolorem demulcere jure debuisse, irrita hucusque sunt, perseverante miserabili Aegri cruciatu. Unde ad idium Ludanum Nepenth. devenimus, cujus effectum expectamus, cum hoc vesperitantum præscriptum fuerit. Tali rerum discrimine & ulterioris perniciem metu, ad retardand. Vitum confugit, ut salus ipsa, quæ verè vita est, si possibile sit, redimatur.

Utinam stranguriola urina in isto Illustriss. Patientem non nephritica esset, sed totum corpus per ipsam expurgaretur, ut nobis munere videtur mucosa materia, quæ jugiter cum urina excernitur. At contra hoc decretum plura nimium testimonia reclamant, & calculi præsentiam in vesica ferme attestantur atque confirmant, dum præterita & præsentia examino. Est enim e Patre Nephritico natus Vir Illustriss. temperamenti calidi & sicci, olim & in præsens hypochondriacus, ac si dicamus multis erudit. tribuscatens, & quod magis est, tribus ab hinc annis Nephritidi obnoxius, quinimo duobus superioribus annis urinas minxit sabulosas atque turbatas, cum arenulis modo, modo cum calculis; ut propterea summa curatione aquas B. V. tua consuluerit prudentia, argumenta omni fide majora pro lituitati confirmanda: sicut tandem omnem quæstionem tollunt nephritici dolores mense Septembri ingruentes; quorum occasione a renibus ipsis calculus in vesicam decidit, & facile inæqualis & angulosus, nec adeo minimus, ut qui ad vesicæ collum una cum urina perveniens, expultricem quidem quam maximè irritare, ac nunquam eernipoterit; unde frequens & dolorosa mingendi cupiditas, unoque verbo stranguria secuta fuerit, non parum fovente diacnem urinæ exitum musculi constrictione, quæ sit occasione doloris; stranguriam vero magnopere adauxit iter illud postremo per aspera loca factum, quod veritatem jam dictam prorsus & omnino confirmat, præsertim si addamus quoque urinas in præsens lacteas apparere. Neque huic veræ opinioni obstare potest



potest mucosa materia, quæ continuo cum urina excernitur, siquidem hæc calculi in vesica existentis, perpetuo comes esse solet, dum, partim a dolore a calculo in vesica excitato; partim progressu, & a calculi pondere cruditates à superioribus partibus ad vesicam ipsam alliciuntur. Nec minus obstat quod, dum Illustriss. Vir huc atque illuc, sursum ac deorsum dimovetur, lapis vesicæ dolorem non inserat; est enim ille calculi grandioris effectus, præter quam quod sphincteri vesicæ (ut asperum & inæqualem) adhærere, magnopere suspicandum, cum incessantes molestias & dolores acutissimos ferè continuo suscitaret atque conservet; quos adeo cruciosos nullo modo excitare posset sola mucosa materia, quantumvis acris, aut salsa nisi ab eadem ulcere excitato. Tenesmi ad instar. Sed jam dictis omnibus accedet quoque (nisi calculus foras expellatur) simul cum mucosa, materia quoque tartarea & alba, quæ lapidi vesicæ, sicut arenulæ calculo renum, propria esse solet.

Quibus ita se habentibus, totis viribus nitendum ut calculus ipse aduc exiguus existens, auxiliis medicis extrudatur, alioquin brevi vel inflammationem, vel saltém ulcus in vesicæ collo excitare poterit; & præterea grandior facies, non nisi manuum opera curabitur, cum Lithontryphica spernat, tum ob propriam duritiem atque soliditatem, tum ob loci distantiam, quæ ideo à calculis in renibus admittuntur, & quia friabiliores sunt, & quia citius ad renes medicamenta perveniunt. Interim doloris ratio est habenda, ne vigiliis, cruciatibus atque febriculis perseverantibus vires deficient, & Tunc tandem vir Illustriss. conficiatur.

Nostram autem intentionem ut assequamur, ex consuetis fontibus remedia sunt depromenda; Et in chirurgico nullum habere locum sanguinis missionem censeo, cum causæ morbificæ nihil prodesse, viribus valde obesse possit; ideo Hippocrates sanguinis missionem suavit in Nephriticis doloribus, juvene existente Aegro, ratione imminenti inflammationis. Reliqua igitur in hoc fonte remedia sunt examinanda & administranda nempe infusiones in aqua dulci sol. malv. viol. nenuph. pariet. necnon althææ à summa tua Prudentia propositæ; quibus substituitur fomentum, magna spongia eadem decoctione imbuta, & quodammodo excavata, ut Perinzo & pudendis adaptari possit; cui decoctioni, sævientibus doloribus, capita quoque papau. erunt addenda, Fomentis autem succedant inunctiones ex ung. malv. & popul. vel ex oleo viol. & nenupharino. Pariter per syphonem injiciatur medicamentum aliquod anodynum, ut lac asinum, vel aqua solatri cum emulsione sem. papau. vel aqua Cassiæ. Dolores quoque demulcere poterit clyster ex lacte vaccino, in quo drachma Philonii Rom. rec. dissoluta fuerit, ob consensum & contiguitatem quam habet intestinum cum ipsa vesica.

Hinc ad Pharmaceutica remedia sedulo deveniendum, quæ quidem vesicæ ardorem contemperare, & dolores nonnihil remittere valeant, sed potissimum horum symptomatum causam respiciant, quæ cum sit calculus, ut

moribus quoque in numero t. g. p. n. sui extensionem exposculat. Idcirco ut ductus urinarii magis pateant magisque aperiantur in aqua stillat. a me in superiori scripto proposita, aliquot diebus erit propinanda, cui macerationi addi quoque poterit succ. limon. ad ʒij. vel xv. tum ut magis diuretica evadat, tum ut facilius in maceratione ingredientium facultates extrahantur. Et si eandem magis anodynam reddere velimus, syrupo de ibisco, syrupum de papau. substituere possumus; & renuissis quodammodo doloribus, magis diuretica reddatur, addendo sp. tartar. rectif. gutt. xij. aut xv. Aquæ autem stillatitiz descriptio talis erit.

ʒ. Fol. malv. viol. nymphæ, parietar. an. m. ij. rad. ononid. ʒij. liquir. ʒj. sem. melon. mundat. anguriz an. ʒij. sem. papau. albi ʒß. aq. Noceræ lb xij. succi limon. ʒij. incid. contund. & macer. per diem naturalem, deinde f. fortis expressio, & colaturæ adde flor. cass. rec. extr. ʒij. m. destill. B. M. &.

ʒ. Ejusdem aquæ lb j. syr. de ibisco ʒj. m. pro matutin. potu. Aliquot transactis diebus, aquas Nocerianas de more propinandas esse arbitror, ut in redundanti illa aquola humiditate calculus ipse, si adhærere sphincteri, removeatur, & veluti innatans, una cum aqua ipsa foras extrudatur, ut non semel in praxi observavi, calculis exiguis existentibus: me namque non later grandioribus diuretica, & aquas præsertim hujusmodi, atque ferratas non prodesse, sed obesse posse, quas experiendas propono, cum unica spes in lapidis expulsionem posita sit. Vehiculum ideo in hunc finem satis validum esse debet, ut vehementior quoque insequatur impulsus, quale esse poterit, Terebinth. ad ʒj. vel sal tart. volatiliz. ad gr. xv. aut xx. Dum verò mingitur aqua, omni artificio utendum, ut lapillus quoque cum aqua extrudatur; quare Patiens ipse manu penis extremitatem sibi adstringat, ut intumescat, sicque calculus Urethram facilius ingredi possit: deinde assatim manus à pene removeatur, ut confertim exeat urina, aut aqua ipsa. Præterea dum mingitur aqua, tepentibus quoque infusionibus jam dictis felici cum successu usus fui. Quæ jam dicta omnia materiam quoque mucosam abstergere & abluere, collumque vesicæ ab ulcere tueri valebunt; (si forsitan, quodtaxit Deus, calculus non adesset, præterquam quod jecoris, renum calorem, & humorum acrimoniam moderare atque demulcere poterunt.

Quod si res pro voto non succedat, rursus ad Anodynorum usum erit confugiendum, & jam præscriptis addi potest aqua stillat. ex emulsione quatuor semin. frigidorum, additis etiam sem. papau. albi, vel syrupo ejusdem. Atque tandem ad lactis asinini usum quotidianum de more erit ducendus Vir Illustriss. totumque corpus oleo amygd. quotidie inungendum. Et ratio victus substantiæ humectans, ab eximia tua virtute præscribenda est; sicut reliqua omnia melius dirigenda & corrigenda, prudentissimo atque in Arte versatissimo iudicio tuo libenter committo. Idem ibidem.



sior, & remissior. Si namque materia vitiosa crassior fuerit, densari, & obdurescere potest etiam à calore renino. Quod docet Gal. 3. in 6. Epidem. 15. Igitur, inquit, *urinarum crassities procreandorum calculorum prima potissimaque causa est.* Quibus non negat mediocrem caliditatem ad huiusmodi materiam cogendam abunde esse; ut hoc nomine in vesica, & intestinis concreverint calculi, quibus etiam senes sunt opportuni, in quibus tamen non viget calor: quanquam si tenuis materia ad renes confluerit in tephaceam & calculosam materiam cogi non possit, nisi ab eorum caliditate immodica. Præter verò dispositionem ratione materiz crassæ & efficaciam agentis, renium nempe caliditatem, angustia vasorum in ipsis, & eorum imbecillitas accedat oportet, ex Gal. 5. de Sanit. Tenda 7. quod, *qui latas habent venas, à cibis crassi succi non laduntur: nec immerito, quia cum omnis actio fiat per contactum permanentem, hic desideratur in iis quibus venæ non sunt amplæ, hærente materia in renibus quæ potius libere præterlabente, & cum urinæ effusa.* Quod mihi contigit observare in Illustriss. & Reverendiss. Hercule de Sancto Bonifacio, qui octogenario major, urinas semper profundit, copiosæ pituitæ viscidissimæ immixtas, ad libram circiter, tenaciter adeo hærentis fundo matulæ, ut & ea inversa, effusa urina, ab illius fundo penderet; cum tamen nullæ unquam fuerint de calculo querelæ toto 10. annorum spatio, & quod excedit, quibus ad ipsum invili. Quæ viarum angustiam, cum expultricis imbecillitate censeo esse dispositionem hæreditariam, non facultatem quandam petrinæ; quæ aliquorum est sententia, cum etiam in aliis partibus concreverint calculi: neque succum aliquem tartareum, ut existimant alii; cum hoc non crearet quilibet terrestris materia, atque non raro potiores à calculo immunes degant, licet vinum fuerit fœculentum, & tartareum. Sicuti enim ex gibbis gibbi, ex luscis luscæ, abique ex aliis huiusmodi nascuntur, facultatis formatricis vitio à semine, ex Gal. 6. Aph. 18. ubi de podagra sub typem Comm. ait: *Accedit ad has causas relaxas, ob quas plerique nunc podagra infestantur, quod parentes, & avus multa podagras habere, in quibus scilicet semen erat corruptum, atque ideo posteris maiorem conciliavit partium imbecillitatem.* Ita renes male conformari censeo, & imbecilliores reddi à semine vitiatò. Cum enim angustiora sunt vasa hæret materia crassa, aut in renium cavo, ut frequentius in tenuibus illis meatibus in carunculas papillares patentibus, qui urinam transmittunt in vretetum ramos, per illorum substantiam divaricatos; atque ita in calculum concreverit, affluente sensim nova materia; ex primo in 6. Epid. 6. Quod si querat quis, quomodo procreentur in vesica, quæ ipsos sæpius concludi patet experientia: hoc referat responsum, heri dupliciter: primariò & per se, ex materia crassa, & terrestris à renibus ad vesicam illabente. secundo ex arenulis, aut calculis minoribus ad vesicam propulsis; ubi hærentes, ex allapsu novæ materiz crassæ, & glutinosæ, atque ejus adhæsu, grandescunt. Primus generationis modus fuit à Gal. memoratus 3. in 6. Epidem. 15.

explicante Hipp. verba. *Lapis à mictu pueris magis.* Dum enim dicit lapidem à mictu heri, innuere voluit non excibere lapidem à renibus cum urina, sed coagmentari in vesica post mictum; id est, ex materia prolabente cum urina. Quod clarius patet in alia versione. *Post mictum concretio pueris magis.* Ideo Galenus in illo Comm. addit. *Veritas autem est, calculos pueris.* ob urinæ crassitudinem in vesica procreari. Porro urinas crassissimas à pueris reddi, ab omnibus à se nos medicis concessimus; inquit Gal. Quod clarius expressit, dum ait; *crassas enim urinas excerni, & evidenter apparet, & verum testimonio declaratum est.* Huiusmodi namque crassitudo multa collecta, & in urinam coacta, cum semel aliquando non oportuit exiret inius diutius manserit, coagumentandi, concreverundique initium capio, eoque principio facta, faciliè postea quicquid iterum crassum in vesicam illabatur priori agglutinatur, majorque inde tephaceus calculus redditur; quemadmodum extra corpus, & in calidis aquis spontè nascentibus, & in vasis ubi calefit aqua quotidie lapis concreverit cernitur. Hæc Gal. Quod confirmat 2. Progn. 75. his verbis: *Propter importunos, & exuperantes cibos copia purissima colligitur humoris crudi vocati in corporibus puerorum.* Li igitur per renes expurgantur quotidie, atque etiam per urinarios meatus in vesica collectus interdum calculos in ea gignit; omniumque luculentissimè me 3. Aphor. 26. ubi dum collocat Hipp. calculos inter morbos puerorum, Gal. in Comm. ait: *Lithiasis vero, id est calculi in vesica generatio proprius est puerorum morbus; atque adducens rationem addit.* Propter edacitatem, & ingruentem crudos humores non paucos coartatissimum, ex quibus crassior pars urinæ ad vesicam compoñitur, fit lapidum gignendorum materia. accedente causa altera, caloris scilicet copis. Nec alia ratione procreantur calculi in puerulis lactantibus. Quod autem calculus in illis concreverit ex lacte, patet ex Libro de Morbis Hipp. vel Polyhi potius, ubi hæc habentur: *Ceterum calculi morbi principium oboritur à lacte, ubi puer lac impurum sugit.* De loco demum concretionis eorum hæc addit: *Ei ubi suxerit lac non putum; sed terrenum, & pituitosum, & habuerit puer venas de ventriculo ad vesicam amplas. & attrahentes, si quid in lacte non putum fuerit, id quo vesica struitur, lapis fit.* Hoc confirmat quoniam etiam Hipp. Lib. de Aere, Aquis, & locis: ut propterea plus satis probatum fuerit, lapidem primo, & inmediate quandoque in vesica procreari posse. Quæ fuit etiam Arist. sententia 3. de Historia Animalium 15. cum ait: *Desunt illi nihil humoris in vesicam transmittitur; ac vivus non solum humor, sed etiam sicca quedam excrementa deseruntur, ex quibus calculi conficiuntur.* coagmentatur secundo in vesica lapis ex lapillis à renibus ad vesicam exturbatis, & in ea hærentibus, atque ex novæ materiz allapsu coalescentibus. Quod patet in Reverendiss. nostro patiente, ex cuius vesica exempti fuerunt septem calculi, quorum alter in operatione obtrititus, minutum alium in sinu veluti exhibuit diversi coloris, à materia ipsi accrescente, & agglutinata. Quod idem palam fecit alius ex cadavere alterius Adm. Rev. ejusdem ætatis exentus mole magnæ c. stanæ, attritus, qui & ipse minutum in medio protulit in conspectum varii coloris: quod



quod me iudice, est indicium iuculentum concretionis ipsorum in diversis locis. Quamquam enim concedi possit, calculum etiam in vesica procreatum posse in se complecti alium minutum in eodem concretum, superinduta veluti lamina, vel pluribus per auxilium novæ materię; non tamen fuerit diverſi coloris, cum semper calculi vesicę sint albicantes, renum vero tere semper navescant; ut propterea cum minuti illi sint navi coloris, & cortice albi, statuendum sit, ipsos e renibus in vesicam excidisse: quod peripicuum sit magis ex alio naviro calculo in Reverendiss. Patre exento illi coloris, quod nondum excrevisset novæ materię adhaerere. Qua in re observanda Hippoc. sententia lib. de morbis, ubi de vesicę calculo; *Patens ejicit aliquando lapides duos, aut etiam plures minulos eodem modo procreatos.* Quod si dicat, calculos à renibus ad vesicam prolapsos esse quandoque plures, eosque secretos, qui seorsum concreſcentes, plures in vesica calculos efformant; atque ideo mirum non est quod in Patre Reverendiss. inventi sint septem, ex quibus unus nondum incrementum suscepit. Quod autem in calculo vesicę minutus alius deliteſcere possit, iuculentissimè patet ex calculis in vesica testis, ubi concreſcunt non transmissi à renibus, sed ex minorum quodam in ipsa rudimento, qui per adhaerentiam novæ materię augentur. Quod oculata fide confirmatum in calculo vesicę testis, Illustriſſ. & Reverendiss. M. Antonii Cornelii Episcopi Patravini, ejus cadavere me presente dissecto, qui penes me est, pluribus conspectus. Dubium hic tamen occurrit, cur pueri sint opportuni magis calculi vesicę, renum vero adulti, cum tamen illi sint istis calidiores, in quibus propterea frequentius concreſcere deberent in renibus, qui vesica sunt calidiores, partes ut pote carnosę, pluribus venis & arteriis perlusę, cum hæc sit exanguis. Quod ego quoque observavi in Sereniss. Archiduce Joanne Carolo, Sacre C. M. natu maximo, ad cujus curationem accitus fui. Solutio est, quod caliditas calculi efficiens causa sit potius æris, & mordax, quæ magis viget in adultis, cum pueri calido innato abundant, humorum concoctioni, & robori facultatum naturalium accommodato magis. Quod propterea humores crudos ad renes confluentes concoquit, qui ab expultrice valida à renibus ad vesicam postmodum propelluntur, in qua deinde si remorentur, densantur, concreſcunt. Quod in Sereniss. Archiduci non contigit, quoniam hæreditariam v. forum angustiam, & expultricis imbecillitatem ab utero materno contraxerat, Serenissima ipsius matre calculosâ extinctâ: ut hoc nomine nec humores crudos attenuare, & concoquere, nec eosdem à renibus exturbare potuerit. Quæ præmittenda duxi ad calculorum essentiam, & causas.

Præſervationem quod spectat, supponendum est, tanquam verissimum Hipp. laudatum 6. Aphor. 6. Renum, & vesicę vitia in senibus difficulter sanari: quod clarius 8. in 6. Epid. Text. Comm. 25. proprio testimonio confirmatum, cum ait: *Vitia renum post annum quinquagesimum sanata non vidi.* Quamquam enim tolli possint objecta aliena actu lælentis, morboſe

tamen affectiones confirmatæ & diuturnæ removeri non possunt. Parcant Gal. maies in Comm. Ego namque in calculis semper observavi, quod licet sectione exenti fuerint ex vesica, & obduciunt vulnus, vel iterum concreverint; ut contigit Reverendo Piazzolę, ex Benedictinorum cœtu; vel effluerit semper materia corrupta, ut in Illustriſſ. & Excellentiss. Marchione Riario, Venetiis secto, & à me curato observavi: vel impedimentum perſiſterit in congressu Venereo, ut accidit Illustriſſ. equiti Ludio Zabarella, me præſente secto; vel continuaſuperſtes fuerit arenularum excretio; quod observatum in hoc Reverendiss. nostro patiente: ut juxta Hippocratem de sola præſervatione cogitandum sit.

Hæc autem in eo potissimum sita est, ut prohibeatur novus humoris vitiosi proventus. In morbis enim ex materia quamquam sint hæreditarii, cum intensa caliditate, deficiente materia vitiosa, calculus nunquam procreabitur. Tribus vero potissimum medicis præſidiis hoc præſtabimus.

Primum, & potissimum est, ut cibus attenuantibus, & faciliſ coctionis utatur, pane scilicet bene fermentato, salientis cibi loco, melle, moderatè tamen mediocriter salitis, vius tenuis substantię, albis, non dulcibus: nullis cibus crassi succi, carnibus bubulis, fœulis vervecinis, aut oleribus, piscibus, præsertim palustribus, & testaceis; laganis item, & legumibus præter ciceres, atque caseo, maxime vero antiquo. A cibo semel saltem in hebdomada abstineat, & mediocri utatur exercitio; non tamen statim à cibo, quo tempore intermittat etiam studia. Quod si quandoque cruditates in ventriculo abundant, cautius decumbat, & dormiat manu ventriculo pposita. A cibo vomitum semel in hebdomada saltem cieat, oxymel. scilicet dummodo ab eo non sit valde alienus. Quod si contingeret, assumat drach. 1. pil. de hiera cum agar. hora ante cenam: atque quotidie descendat alvus vel sponte, vel suppositorio, vel clystere; vel usu pilul. ex aloë lota cum succo rosarum, vel cremore tartari cibus asperso. Bis autem in anno purgationem universalem molietur, Vere, & Autumno, cum aliquo sanguinis educatione ex ſalvatella dextra; quo tempore uti quinetiam poterit diureticis ad emundandos renes, & vesicam: in quem usum accommodata erit Terebinthina Veneta, cum spiritu salis, cremore tartari, & aquis diureticis, octidui spatio: à quibus tamen aliis temporibus abstinendum censeo, ne crudos humores, cibosque non concoctos devehant ad renes. Quæ præſervationis loco abundè fore censeo. Faxit D.O. Omnipotens ut cedant ad vota. *Idem ibidem.*

Illustriſſimus Adolescens vigesimum quintum annum agens, temperamenti totius & jecoris calidi & humidis, carnosus habitus, dum diebus elapsis ad invisendas Italię urbes una cum sociis iter faciebat, dolore vehementi in latere sinistro, à rene ad abdomen sese extendente correptus fuit, cum mingeudi & egerendi inclinatione, imò & irritamento, qui paucis horis remiſſit; sed sequenti die rediit vehementior, cum iſdem symptomatibus, addito etiam vomitu & insigni ad vomendum



irritamento. Cessavit iterum dolor, sed tertio die reverus est, dum in rheda iter faciebatur, intolerabilis ita, ut extrarhedam pedibus incedere atque cunire coactus fuerit. Veronam tandem perveniens, Clysteres praescripti fuerunt, & cassia exhibita, cum nonnullis mutationibus, quibus nonnihil quievit dolor, ita ut rursus iter capere eidem permiserit: nunquam tamen, nec arenulas, minusque calculos per urinam excrevit, imo nec urinae ipsae turbidae observatae fuerunt, sed tenuissimae semper & pellucidae. Cum autem Patavium pervenerit; doloribus immunis, de agendis consulit, Venetis domi suae exequendis.

Nephriticis doloribus divexatum fuisse Illustriss. & Excellentiss. Adolescentem, non est quod dubitemus, si signa ab Hipp. recensita consideremus, dolorem gravem scilicet in regione renis dextri, cum vomitu & urinae stitilicidio. Et quamvis arenulae in urinis non subsideant, id nihil obstat: quando enim Hipp. dixit, quod *Quibus in urinis arenosa subsident, is renes, aut vesica calculo laborant*, vult nobis innuere, quod arenulae calculi praesentiam confirmare possint; unde & Gal. dicere solebat, quod dum dubitatur, utrumne dolor nephriticus sit, an potius colicus, subdit, quod *si arenula aut calculi in urinis subsident, tollitur omnis questio*: non tamen e contra, arenulis non apparentibus, calculos non adesse sit affirmandum. Arenularum autem carentia, calculi non taphacei, sed densioris, & marmoris substantiae suspicionem praebet, sicut magnitudinis, esse meatibus non proportionata: quod si parvus esset, multo angustiores forent existimandi ipsi meatus, papillae nimirum, cum nunquam antea hoc affectu tentatus fuerit: etenim cum multo tempore intermittant dolores & redeant, calculum aut in renis cavitate, aut in infundibulo reperiri credendum, dolorem excitantem quotiescunque veteres ingredi tentat. Quare licet & in praesens dolore vacet Nob. Adolescentem, calculum tamen gestare pro certo habendum, & ideo Curatione indigere, executione intentionum ab Hipp. propositarum dum dicebat, *Juvenes Venae purgare, poplitea incidere ut variis modis, tenuare, & mollire*.

Quibus intentionibus ut sitis fiat, abs re non erit Leniens repetere ex electo lenit. & t. r. vel potionem ex manna clarificata, ut tutior evadat Diureticorum usus. Mox in casu nostro ordinem ita servandum cenleo, quod primo Emollientia & Laxantia praemittantur, ut meatus dilatari atque laxari possint. Secundo sequantur Diuretica ad impellendum calculum ipsum; quibus non sufficientibus, tandem ad Lithontriptica, tenuantia ab Hipp. dicta, deveniendum. Neque interim de sanguine mittendo cogitandum nisi inminente renis inflammatione: tunc enim poplitis vena cum Hipp. incidenda & cum Gal. vena brachii in Aethorici pro revulsione, sicut cum Hipp. pro derivatione.

Pro prima igitur intentione, post assumptum Leniens, usum Ierebinthinae nostrae venetae propono, liquiritiae rasura reformatae, cui post horam superbibat jus tenue pullae, foliis malvarum, violariae & parietariae alteratum. Quo

codem tempore mane & vespere pars affecta toveatur magna spongia tali decoctione calente inbuta & expressa.

*℞.* fol. malvarum, parietariae, chamae, celi, anethi, meliori. n. m. j. rad. Alnax, lin. alb. raphani. m. ℥j. tenuiori, . pii . ii. ℥ss aq. co. m. ℔ xij. contund. incid. & m. linal ut ad consuet. tertiam pro foru. A. ora vero spongia, statim mini tur pars manu, oleis lin. alb. & de scorpionibus inbuta. In horum emollientium & laxantium usu plures dies in moram non, nisi dolores revertantur & urgeant: tunc enim fomentationes & inunctiones non omitendo, ad impellentia medicamenta diuretica deveniendum & esse poterunt sal tartar. volatilizatum ad ℥j. in q. stilat. ononid. & parietariae, addito succo linonum. Pariter unguem vim permeandi & impellendi habet spiritus tartari alcalizatus, ad gutt. xij. vel xv. in eadem aqua, quae medicamenta, non cedente calculo, nec remittente dolore, sunt repetenda.

Pro tertia intentione explenda, efficacissima semper fuit edentia crystalli, a semidrachma usque ad drachnam integram in jam dictis aquis offerenda: sic & magisterium oculorum Cancrorum. Et tandem omnibus incassum tentatis (quod futurum esse non credo) ad succi capae albae, per expressionem extracti, aq. stilat. p. rietariae, vini malvatici lavis. ii. ℥iv. m. f. potio urgentibus doloribus, nec ceteris medicamentis cedentibus, propinanda. Haecque pro Curatione: nam de Irviatione alias erit iter, dum e. u. s. quoque materiales, efficientes, & line qua non. examinanda erunt.

His jam dictis congrua vivendi ratio est addenda, victus enim mediocriter tenuis esse debet & facillime concoctionis, augentur enim dolores, ut ait Hipp. dum cibo i. piatur. vinum pro pocu consueto concedendum, album, tenue, & subduce. Exercitium quammaxime contemnit, & ideo Hipp. repetit, quod *Exerceri eo. venit, ac q. nescere*. Sicut pro evacuatione sollicitanda frequentes debent esse clysteres, praesertim oleo de hno parati, ut qui dolores quoque sedare valeant. Quae omnia Illustrissimo & Excellentissimo Adolescenti a summo Deo salutaria precor. *Joann. Raym. Fortis Cons. & resp. Medicum. T. 2. Cent. 4.*

Eques Illustrissimus, ex Patre Nephritico natus, Calculosus & ipse calculos enim alias, & non exiguae magnitudinis, nephriticis progressis doloribus, per urinam excrevit; quatuor ab hinc mensibus circiter calculum in rene sinistro gestat foris. n. neglectum. quia in renis cavitate contentus, cruciatus consuetos non intulerit, sed tantum in ipso rene dolorem gravem, sive gravativum, ita & Hipp. m. a. u. patum: ut propterea, neglecta quoque facile congrua vivendi ratione, progredi ad causam moiem increverit, ut papillae egressi non potuerit, & ideo dolores exacerabantur & quibus papilla contracta, egressum non admittet, & ideo dolor gravativus manebat. Et quoniam aut in rheda, aut equit ando, calculorum descendunt a renibus in vesicam pro roveri, indistincte virgo creditur: ideo & Illustrissimus ipse hoc deceptis axioma, Equo gradum currente iter fecit, ut ad aqua s. vitriol. eas epotandas perveniret, quo violato motu



motu calculus renem contundens, nec exire valens, phlogosin, & fors. n. eti. in legitimam inflammationem in ipso rene excitavit, quam necessario febricula subsequitur, tunc ad eius adventum & sitim cum lingua siccat. et, & ventriculi natropam; & totius corporis maciem, quæ omnia antea a calculi præsentia procedebant, adaucta tunc mirandum non est. In deterius autem lapsum equitem Illustri. censeo, ob aquæ vitriolatæ nimiam retentionem, quæ sanguini immixta, eundem inquinare, & corrupta corrumpere quoque potuit. Nec retentionis causa in aquas ipsas, quævis nondum satis a Sole confectas, est referenda, sed in renem angustiam: conflictatus enim a lapide ren ipse affectus, contrahitur, & in consensum trahit renem alterum non affectum, ut propterea difficilis & immutatus valde aquarum transitus fuerit.

Quibus ita se habentibus, exiguum spem superesse, nullus erit in arte veritatus qui non videat, tunc quia calculi excretio tot congruis remediis incassum tentata fuit, tunc quia febris symptomatrica, nempe a rene affecto, a me existimata, inflammationem suppurandam minuitur, & interim necessaria Lithontriptica prohibet; & ideo febris (si perseverat) & reni afflicto, tanquam urgentiori, & veluti causa sine qua non, incumbendum est: mox ad ipsum calculum dirigenda Curatio.

Adversus febrem & renis afflictionem, purgandum Evacuantibus, Refrigerantibus, Repellentibus & Derivantibus. Adversus calculum, Diureticis, Laxantibus & Lithontripticis, habita tamen semper virium ratione. Quibus omnibus sequenti ordine satisfaciendum esse puto, ut primo aquæ eductio iterum atque iterum procuretur blandis medicamentis, ut est portio ex manna clarif. aut flos cass. cum Magist. Mecho. c. superpræbendo jus malvis vel hordeo alteratum. Inde aperiatur saphæna lateris affecti, hæcque juxta Hippocratis doctrinam *Veratro purgare, popliis venam incidere*, idque quoniam, non constantibus viribus, revulsio a vena superiori ipsi derivationi præmitti non potest. Interim extrinsecus refrigerantia, sed cum exigua substructione apponenda, ut simplex unguentum rosac. Mesues, cui progressu addi poterit etiam malvinum.

Victus autem ratio debet esse substantificæ humectans, renutrens, viresque non solum conservans, sed etiam, non inhibente inflammatione, ipsas adaugens.

Ablata febre & inflammationis suspicione contra calculum vires medicæ erunt intendendæ, Hippocratis præceptis obtemperando, nimirum vias urinarias mundando, ductus laxando, & lapidem ipsum frangendo: quas intentiones nobis insinuavit sub illis verbis, *Urinarios mundare, attenuare atque mollire*. Et quoniam propriis remediis primæ & secundæ intentioni à Viris Excellentissimis satisfieri non potuit, nempe post expertam ventris expunctionem, diureticis atque laxantibus, & deum aquis ipsis vitriolatis; idcirco ad tertiam intentionem deveniendum esse mihi videtur: dum enim calculus præ magnitudine vias, nempe papillas ipsas, quamvis emolli-

tas atque laxatas, pervadere non potest, tota vis Curationis in ejusdem calculi fractione, aut erosione & immutatione posita est, nunquam tamen laxantibus & aperientibus omittis. Quare ad Lithontriptica conueniendum: inter quæ selectiora & efficaciora apud nos experta sunt, sal tartari volatilizatus ad ʒj. in aqua ononidis; Magisterium oculorum cancrorum pariter ad ʒj. vel in eadem aqua, vel in aqua c. thecis labarum. Essentia crystalli montani ad semidrachmam in aqua p. nieta; atque tandem necesse capz alba, per expressionem extractæ; ita parandum.

℞. Succu caparum alb. aq. pariet. vin. malvasii suavis an. ʒiv. m. pro potu. Et quoniam jam dicta Lithontriptica non quotiane, sed tertio aut quarto quoque die sunt repetenda, idcirco diebus intermediis Laxantia & Aperientia non sunt omittenda, ut Lichetintina Cypria tota nocte detenta in aqua malvasii, ad ʒj. quæ reformetur cum semidrach. pulv. er. ossium mespilorum, & huic superbibat cyathum aquæ malvarum, vel jus malvis alteratum, addito succo limonum. Extrinsecus quoque somenta mane & vespere sunt in usum duccendi, quæ Balnei vicem supplebunt, magnam spongiam reni apponendo, imbutam & lemi expressam, decoctione sol. malv. chamæceli, parietar. saxifragis, n. eliori, radic. althææ, lil. alb. sem. lini & fenugreci; Et urgentibus doloribus apponatur omentum vituli, oleo amygd. & de lecorpionibus laburum, quibus addi poterit etiam liliaceum pro immutatione, post amotam spongiam facienda.

Sic fracto aut comminuto calculo, tunc locum habere poterunt aquæ vitriolatæ, ad ipsum educendum, & renes atque urinarios meatus mundandos.

His autem omnibus congrua vivendi ratio erit addenda, à viris Excell. Adstantibus præscribenda: quibus & cætera omnia melius dirigenda committo.

#### Appendix ad antecedentem Consultationem.

Post perscriptam consultationem, ad me pervenit relatio Præclarissimorum Virorum de statu equitis Illustrissimi, à priori diverso, cujus diversitas in duobus consistere mihi videtur, nimirum in doloris renis remissione, & in virium subitanea prostratione. Levaminis causam non in solam calculi mictionem, sed in materiam pituitosam partim, si non purulentam, saltem analogam puri. excretionem referendam esse crediderim ego, cum dolor in rene perseveraverit, etiam calculus in Urethra existente: urinam ex disrupto in rene abscessu inflammatorio materia jam dicta alba, & forsitan purulenta, pituita immixta, non effluerit, ut non sine ratione dubitari potest, cum decedente dolor evanuerit, aut si item remissus fuerit. Nec obstat remissio febris, & pulsus fere ad totalem Apirexi improductus, cum doceat Divinus Senex, quod *dum parva sunt, dolores & febres magis sunt, quam pure jam confesso*. Quoniam vero sequenti die urinæ sæculentæ & fere suberuentæ apparere; idcirco calculum excretis multo majorem adhuc in rene reperiri



summopere dubitandum, cum jam nuper excreti figurati fuerint, ita ut fragmenta exillimari non debeant. Interim tamen utriusque affectus synptomata & excreta diligenter observanda, ut veritas innotescat. Virium autem prostrationem totam hepati soli tribui posse non video: vitiata namque hamatosis ipsa, ad Cachexiam, indeque ad Hydropem Patientem ducere solet. Quare adderem ego sanguinis inquinamentum ab aquæ vitriolæ retentione introductum, cujus causa spiritus vitales qui ex ipso probo sanguine generari debent, reproduci non possint: non excludendo tamen jecoris labefactionem, obruto à copia aquarum ejusdem nativo calore, nisi concurrat forsitan etiam in rene tumoris eruptio, cum *A tuberculi uris rptione exulatio contingere solet*, ut monet Hippoc. Quare adhuc in vitæ discrimine versamur, cum pro viribus reparandis massæ sanguineæ purificatio requiratur, quæ non nisi hydragogis medicamentis, à virium imbecillitate non permissis, procurari potest; præterquam quod calculi excretio adhuc tentanda restat, quam difficiliorem reddere posset renis ulcus, ab abscessu disrupto relicum.

Quibus omnibus consideratis, urgentiori dubio procul est incumbendum, viribus nempe reparandis, sine quibus cetera remedia incassum, imò cum præjudicio administrarentur: illis enim reassumptis, ut dicebat Celsus, Medicinæ dabitur locus: & hic observandum venit Hippoc. præceptum, *Quibus semel, aut bis, plurane, an pauciora offerre oporteat*, considerandum esse; & præterea Galeni Commentum, in quononnet, viribus existentibus imbecillibus, parum & sæpe cibum esse offerendum, qui sit boni succi, facillimæ concoctionis ac distributionis, & pauci excrementi. Et quoniam *facilius est implere potum, quam cibum*, ideo convenire poterunt, præter jura carniū in quibus sint dissoluta lutea ovorum recentium, nonnunquam restaurum pulli, quandoque contusum; addantur quoque emulsiones amygdalarum dulc. recent. & pistaciorum. Proderit quoque vinum aromaticum modicè exhibitum. Semper ante cibum aliquod Cardiacum proficuum erit, ut julapium gemmatum Mag. Duc. in exigua aqua totius citri, aut florum ejusdem; species quoque Diahyacynthi in aqua scorzonæræ. Interdum bolus ex Alchermes & hepate lupi paratus. Caro quoque viperina, cum reliquis carnibus ebullita, vim quandam balsamicam, & calori nativo nostro analogam obtinet.

Quamprimum verò Curationem vires permittant, ab aquæ educatione erit incipienda, & interim renis status observandus, ut opportuna medela adhiberi possit: non omitteudo tamen Clysteres naturam ipsam ad aquam educendam excitantes. Quæ pauca subdidi, à sapientibus viris examinanda. *Idem ibidem.*

#### Calculi Renum in Puero.

Princeps Excellentissimus Puer duodecim annorum, ex Patre valetudinario & immaturè defuncto natus, temperamenti ad calidum & siccum vergentis; hepatis calidioris, me-

diocris habitus, liberè vivens, imò edulij crassi succi de more utens, & immodicis exercitiis deditus; usque ad decimum annum ætatis suæ semper valetudinario, frequentibus nempe febribus obnoxius, cum alvi conlucta stypticitate. Præterea somni turbati, cum spectris terrificis quandoque ei contingunt, ita ut clamoribus expurgatur, nec præteritorum quicquam recordetur. Caput ejus frequentissime gravatur, & per nares nonnunquam catharralis materia copiosa & crassa expurgatur, quæ detenta, nares ita obstruit, ut dormiens ore adaptato respirare cogatur. Duobus tamen abhinc annis sanitate satis laudabili frui cœpit: verum renū dolores accesserunt, per intervalla frequenter recurrentes, quos solvit mictio calculorum rotundæ figuræ: qui si diebus aliquot (integra hebdomada) retineantur, dolores vehementiores & acerbiores afferunt, donec calculus consuetum major per urinam excretus fuerit: à cujus mictione prorsus à doloribus immunis & alacris manet. Et cum frequenter repetat hujusmodi affectus, à Te Vir Doctissime, præsertionem implorat.

Quod Excellentissimus Princeps duodecimum suæ ætatis annum ægens, statim natus, usque ad decimum annum multis & variis ægritudinibus conflictatus fuerit, mirum videri non debet, cum hereditariam à Patre valetudinario pravam totius corporis dispositionem sortitus fuerit, & præsertim capitis intemperiem calidam & humidam, quæ idipsum excrementosum reddidit, & destillationibus valdè obnoxium; præterea jecur justo calidius cum fervore, atque eorundem pravam diathesin & calculosam dispositionem; & propterea dicebat Galenus, quod *Catarrhus omnium morborum fons, & soboles esse possit, cujus vi totam corporis languere solet*; quod facile desumpserat ab Hippocrate asserente, quod *destillationes à capite magno radio atque molestia naturam frangunt*, potissimum verò in Excellentiss. Puero, cerebri emundatorium, nares scilicet, angustum habente. Quare cum à perenni destillatione in ventriculum ciborum coctiones imminutæ secutæ fuerint, biliosis humoribus à calido jecore genitis immixtæ, & massam sanguineam inquinantes, fermentatæ frequenter & putrefactæ, febres modò acutas, modò chronicas præteritis annis excitavit; sed tandem ad renes transmissæ sive deductæ, extra consuetudinem & valdè immaturè in calculos albi & flavi coloris, marmoreos potius, quam topheos converti cœperunt, suggerente renibus materiam prava vivendi ratione, nimirum crassæ, concoctæ difficilibus & excrementosis alimentis, quibus delectatur; præterea vehementibus & intemperativis motionibus corporis; & diureticorum, nempe granorum juniperi & feniculi in potu, abusu, quo materia pro calculis producendis ad renes quotidie ducitur: præsertim vero cum alvi stypticitate, dicente Aëtio; quod *Si alvus bene subierit, pauciora lora prodibunt*. Rarissima equidem in Puero calculosa conditio, quam semel tantum hucusque mihi vidisse contigit, & semel se videre potuisse asseruit Cardanus: Pueris enim propria & familiaris esse solet calculorum in vesica pro-



productio, unde Hippocr. dicebat, *Post multum concretio Pueris magis, nam quoniam calidiores* Et modum alibi explicat, dicens, *Quorum alvum ardens, ac servida fuerit, si & vesica, ita excalescitur, urinam non dimittit, & quod crassissimum & subdissimum est, concrementum, & dum voluitur, concretum;* quod evenire saepe solet etiam infantibus ex impuro lacte Nutricis pravis alimentis connutritis. Et quoniam sicut calor intensius vesicæ, una cum cruoribus, in Pueris Lithiasin generat, ita ab eodem in adultis ratione ætatis in renibus aducto, nephritis excitari solet: ut propterea docuerit Gal. Lac Pueris in vesica, Adultis in renibus calculos generare, sic & magis calidum; idque quoniam ad calculorum productionem concurrat calor, ut causa efficiens, & humorum crassities, ut causa materialis. Cum autem calorem huiusmodi excedentem in renibus Pueri non habeant, ut calculum producere valeat, examinanda à nobis est causa huius raritatis, si Excellentissimo huic Pueri præservatio est præscribenda. Hanc igitur à mala valorum & renum conformatione hæreditaria, ab Excellentissimo calculoso Patre contracta, pendere pro certo est habendum, quæ consistit in amplitudine valorum emulgentium, & in renum densitate atque ureterum angustia: ut ideo renes facile à jecore per ampla superiora vasa cruditates multas suscipiant & attrahant, sed subinde ob propriam densitatem easdem non dimittant & retineant, sicque diurentur, etiam à moderato calore in calculos convertantur: quam causam tetigit & ipse Gal. dum dixit, *Succi crassi non in omnibus calculos generant, quibusdam enim densiores, & perangusta sunt ora valorum, quibusdam è contra: quod idem alibi ita confirmavit, omnia crassi succi in renibus calculos generant, dum transitus latos non habeant:* Et hæc causa ab Orisasio quoque recepta fuit, imò & à Recentioribus ferè omnibus, dum Fonsæca protulit, quod Calculosa & hæreditaria renum dispositio, etiam cum paucis renum calore præsentem materiam, est sufficiens ad calculorum in renibus generationem; & idcirco ut causa sine qua non ab universali Medicorum schola recepta fuit. Ita in casu nostro juges cruditates, partim à capite in ventriculum descendentes, & coctionibus officientes, partim à ciborum superingestionibus, Pueris consuetis genitæ, ut causa materialis; calor verò & Jecoris, & renum, ut causa efficiens; & potissimum naturalis calculosa dispositio, in emulgentium amplitudine, & renum atque ureterum angustia consistens, causa sine qua non appellata, concurrunt in Excell. Pueri Principem ad calculorum in renibus intempestivam & immaturam procreationem.

His autem ita sese habentibus, cum caput & renes ope medica indigeant, urgentiori prius incumbendum nos docet Galenus, ipsaque ratio dicat: capitis enim exiccatio & catarrhalis materię extirpatio tutius in juvenilem ætatem differri potest, quàm calculorum inhibitiō: evidens enim periculum imminet, ne diutius aliquis calculus in renibus detentus, & major consueti factus, non amplius in vesicam descendat, sed manens in renibus, Principem miserè interficiat, ut contigit Ex-

cellentissimo Patri defuncto. Alterum imminet periculum, ne in vesicam delapsus, propter canalibus Urethræ angustiam, in eadem moretur, per additionem grandior hæc, & pro extractione incisione sit opus, cum vesicæ calculus manuum dumtaxat opera curari possit.

Hoc igitur anni tempore, nempe proximo mense Maio purgatio erit incunda, primas vias expiando. Secundo Venosum genus ab excrementis depurando. Tertiò caput quoque purgando. Quartò jecoris & renum calorem contemperando, & vasa angusta dilatando; atque tandem causæ materialis reproductionem inhibendo, & ipsam à renibus divertendo.

Pro prima intentione explenda, primò potio suavis leniens præscribenda, ex man. clarif. cum tartaro, aut syrupo ros. solut. aureo. Inde sex aut septem sequentibus diebus cruditates in primis viis existentes, ita præparanda.

℞. Julap. acet. simpl. syr. de cortic. citri. aq. flor. citri an. ʒj. m. pro syr. & sic pro aliis: Aut singulo mane exhibeatur.

℞. Cremor. tartar. sacchari albi an. ʒß. & dissolvatur in modico jure carnis, corticibus citri alterato. Inde alterum ex præscriptis Lenientibus repetendum.

Pro secunda verò intentione, ulteriora præparantia erunt usurpanda.

Ut ℞. Decoct. in jure paratæ cich. borag. endiv. meliss. betonic. agrim. ʒv. oxymel. simpl. syr. de beton. an. ʒj. m. pro syr. & sic pro aliis septem. Interim primis diebus jecoris dextera erit aperienda, sed sanguis parçè mittendus. Transactis jam dictis diebus, purgans huiusmodi erit exhibendum.

℞. Rhabarb. opt. ʒj. agaric. trochisc. fol. sem. an. ʒij. cinnam. integr. ʒß. aq. agrimon. q. s. m. f. infus. per hor. xii. & facta forti expressione, colaturæ adde syrupo rosat. solut. ʒiv. clarificentur omnia cum cremor. tartar. & f. potio brevis, cui, incepta evacuatione, superbibat aquæ hordeac. vel feri caprin. depur. ʒßj. & duobus horis ab assumpto sero præbeat.

Inde ad tertiam intentionem explendam deveniri poterit pilulis capitalibus.

℞. Extracti pilular. cochiar. ʒj. aurearum ʒß. reformatur pilulæ, & tribus interpositis diebus ab assumpta superscripta potione, præbeantur summo mane, & repetantur. Intermediis verò diebus reassumat syrupos præparantes præscriptos: & aliquod erthinum manè tantum in usum ducat, suave, non violentum.

Ut ℞. Pulv. majoran. iroos an. ʒij. nigell. ʒj. m. f. pulvis per nares attrahendus.

Quartæ intentioni ut satisfaciamus, aquis acidulis omnino opus erit, non tantum ferreis sed vitriolatis, quales sunt in Valle Solis nascentes, quæ primis tribus diebus cum vehiculo dejectorio syrupo ros. solut. aut mann. clarif. erunt præbenda, sequentibus verò diebus quindecim cum aliquo vehiculo diuretico, quamvis raro eodem indigeant: posset autem esse spiritus tartari pluries rectificatus; harum autem usus duobus sequentibus annis repe-



tendus, leviore tamen præmissa corporis expurgatione. Terminato autem aquarum usu, magnopere conterre poterit lac alinum ad quadr. ginta dies, quod inter genera lactis prærogativam habet refrigerandi, renes emolliendi, imo & tophos in renibus dissolvendi, ut testatur ipse Galenus, & cum eo ceteri Medicinæ Principes: nec caput implet, quia celeritè per corpus digeritur. Præbeatur autem huiusmodi mulctum, summo mane, a quo somnus nullo modo permittatur, incipiendo ab uricis quatuor cum semicochleari sacchari, & ascendendo usque ad novem, cum integro sacchari cochleari. Quo tempore aquarum & lactis, statim à cena deglutiat Excellentissimus Puer duo aut tria grani mastiches integra: à prandio verò conterre poterit conserva absynthii, quam si ob amaritudinem respuat, sal absynthii in exiguo vino dissolutum supplere poterit.

Verum ut postremæ intentioni satisfaciat, sat non est roborare ventriculum, si quotidie oneretur crassis cibis excrementosis & difficillimæ concoctionis: & ideo Valescus de Taranta scripsit, ridiculum esse medicamenta Calculosis præscribere, non præmissa congrua vivendi ratione. Quare si primò aërem consideremus, neque hypocausta, neque repentina mutationes à calido ad frigidum, & e contra, capiti convenire possunt. Si secundo alienitas inter carnes suillæ prorsus ablegandæ, bubulæ & ceteræ annosorum animalium, & aquatiliū raro usurpandæ; pariter extremitates, ut pedes & capita, omittendæ. Inter pisces, soli saxatiles eligendi, & a conchyliis atque ostreaceis omnino abstinendum. Lacticia omnia & edulia ex lacte & pasta parata, sunt fugienda, & caseus præsertim. Legumina omnia vitanda, hordeo & oriza exceptis. Inter fructus, fraga, pepones, persica, ficus nonnunquam permitti possunt. Inter olera, prorsus abstinendum ab usulactuca, à fœniculo, selino, carduo, radice raphani, fungis & terræ tuberibus. Inter condimenta interdicitur usus aromatum, pauco cinnamomo & pipere ruditer contuso exceptis; neque conceditur succus citri & limonum, quoniam diuretici sunt: hoc enim documentum est quā maxime observandum, quod dum Calculosi actuali calculo, in renibus existente laborant, tunc, primis viis ab aliquo medicamento expiatis, omnia diuretica & urinam ducentia opportuna sunt: e contra verò extra accessionem, dum agitur de præservatione, nullo modo sunt admittenda, quoniam ducunt materiam, cruditates scilicet ad renes pro calculis producendis: ut propterea approbare nequeam usum quotidianum granorum juniperi, minusque fœniculi in vino, nec aliorum diureticorum, quoniam confunditur ita Curatio cum præservatione, & præservatio cum Curatione, in quem errorem incidunt quoque non raro Medici ipsi; & ideo in hunc finem reprobantur etiam vina Moselana, Rhenana, utpote valde diuretica, ita & cerevicia lupulata. Præservatio enim à calculo requirit, ut cruditates non generentur, & genitæ à renibus divertantur, & per alvum ducantur. Tertiò somnus largior esse debet, sed nocturnus, non tamen dormiat in plumis: & si decubitus supinus

consuetus fuerit, sublegetur linteolo portio corii vervecini. Quarto exercitium sit moderatum, & ventriculo non repleto, ita præcipiebat Hippoc. Labores ante cibum. Quintò Alvus lubrica servanda, prunis Damascenis aut Hungaricis; vel passius in vino subdulci tenui decoctis, & saccharo asperis, prima mensa comantibus; & ut magis divertantur cruditates à renibus, & per alvum educantur, semel in mense, unica hora ante prandium assunere poterit.

℞. Elect. lenit. ʒss. Mag. Mechoac. gr. vii. aut pilul. mastich. ʒj. m. t. boli. Tandem alacri animo ut indulgeat Princeps Excell. permittendum, neque ad nimis & intensa studia sollicitandus, sed geniales conversationes admittendæ, quæ tamen in vivendi ratione errandi occasionem non præbeant. Quæ omnia faxit Deus, ut salutaria evadant. *Idem ibidem.*

#### Vesica Calculus.

Cum à naturæ primordiis Vir Illustrissimus non adeo probam partium principalium & inservientium temperiem sortitus fuerit, jecore namque iusto calidiori, capiteque humidiori, atque ventriculo frigidiori præditus fuit, ideo varia & heterogenea excrementa à jam dictis partibus jugiter produci necesse fuit, quæ quoniam à naturæ corpore excerni vix credi potest, idcirco mala inde exorta fuisse mirum non est, præsertim addita libera vivendi ratione: intemperantes enim in diutinos morbos incidunt, à quibus postea tota vita sese explicare nequeunt, inter quos Nephritidem & Arthritidem, sive Podagram enumerabat Galenus, quorum alterum, Arthritidem scilicet superioribus, natus fuit expertus, Vir Illustrissimus, quo cessante, insurrexit alter, nephriticus videlicet, cui statim Lithiasis successit; non enim desuerunt crudi & crassi succi à ventriculo naturaliter frigido, & à continuis applicationibus adhuc frigidiori reddito, addito quoque, improporcionado objecto: quæ cruditates ad varias corporis partes transmissæ, & præsertim ad artus, articulares quoque dolores pariebant: ad renes vero tandem convertebantur ab igneo eorumdem calore, tanquam à causa efficiente attractæ, & à vasorum naturali conformatione detentæ, in areolasque convertebantur, à glutinosa materia coactæ, tophiaceos calculos produxerunt, qui dolores nephriticos excitant. Cessant autem, dum diureticorum medicamentorum ope à renibus depulsi in vesicam; & tandem per urinam ejecti visi fuerunt; sed non omnes, quandoquidem actionem mingendi depravata, quæ ab illo tempore quoque Virum Illustrissimum attingit & torquet, ab aliqua causa multum irritante provenire dubio procul asserendum, de qua quoniam sapientes & Excell. Viri isti propriis & necessariis experimentis certiores facti fuerunt, non est quod dubitemus; siquidem conjecturæ primò calculum in vesica reperiri satis aperte nobis significabant, cuius præsentiam non semel, sed bis sensus ipse tactus comprobavit: calculum enim mense Aprili præterito à primis nephriticis doloribus in reus papillis mansisse, & vehementis motus in rheda occasione in cavitatem delatum fuisse pro certo habendum.



dum, qui ibi sine dolore adservari potuit, si-  
cut cum dolore ad vterus delapsus, exquisi-  
tissimo sensu praeditos, Diureticorum opo in  
vesicam cecidisse, sed in rene antea crassio-  
rem factum exitum non invenisse censendum.  
Quare in vesica quotidie a superadditis crudi-  
tibus involutus & grandior redditus, dum,  
quod turbidissimum, coacervatur, circum-  
volvitur & concrevit, sui ipsius etiam quoti-  
die maiora nobis praebet indicia; etenim ab  
initio mictio molesta & frequentior apparuit,  
in progressu stranguriosa, adeo ut dolor adfue-  
rit in mictione cum urina stillicidio, vesicae ar-  
dore, & quandoque arenosa materiae excre-  
tione, omnia signa lapidis vesicae, ab Hipp.  
proposita; quibus accesserunt & ponderis sen-  
sus, & inquietudo, & ani tenesmus, & ha-  
emorrhoides, quae omnes conjecturae eundem  
confirmant, accedentibus praeterea experi-  
mentis diureticarum aquarum, & motus vehe-  
mentis in rheda, a quibus nocumentum evi-  
dens reportavit Illustriss. Patiens, atque tan-  
dem sensu ipso iudice facto, & candela in ve-  
sicae introducta, & digito in anum immisso,  
conjecturalis cognitio sensata & mathematica  
reddita est.

Agitur igitur de calculo in vesica actu exi-  
sente, nec adeo exiguo, eo quod nunquam  
urinam supprimit, a vesica removendo; & id-  
circo pars curativa in praesentia a nobis con-  
sideranda venit, de praeservatione alias cogi-  
tandum, & posteaquam diureticis aquis, pru-  
dentissime a Viris Excellentiss. propinatis, edu-  
ci non potuit, Lithonripticis vero fidere inex-  
perti Medici certum indicium sit, idcirco non-  
nisi in manu opera curari posse pronuntia-  
vit Hipp. alioquin praeter urinam suppressionem, do-  
loribus, febriculis, ulceribus, colliquationibus  
contabescere solent Patientes. Et quoniam hoc  
remedii genus potius inspirationem divinam  
quam Medici consilium requirat, ut propterea  
Hipp. nobis consilium dare prohibeat, imo  
Avenzoar vetet quoque Medici praesenti. m. Ni-  
hilominus viriliter ego & ex corde agens, virile  
quoque & unicam curationem, dissectionem  
conulo, antequam congruae conditiones ad  
huiusmodi operationem tutiorem reddendam  
effugiant; concurrunt enim in praesens anni  
tempus opportunum, lapidis magnitudo con-  
veniens, cum nec grandior, neque exigua  
nimis requiratur pro faciliore extractione, quam  
& vires, & aetas permittunt, nec prohibent  
nimia gracilitas, aut febricula, aut ulcus in  
vesica; quae sicut modo non adsunt, ita super-  
ventura valde suspicandum. Neque praeter ex-  
crementorum in primis viis existentium per al-  
vum evacuationem, alia precedens corporis  
expurgatio necessaria mihi videtur, cum jam  
sanguis non semel ex haemorrhoidibus satis  
sponte effluxerit, qui novae sanguinis missionis  
pro inflammatione arcenda occasionem au-  
fert.

Quod si fortassis veram hanc atque legiti-  
mam Curationem non admittat Vir Illustris-  
simus, palliata erit substituenda; pro cuius in-  
stitutione non adeo facile Medico erit medi-  
cas elicere intentiones, cum ex una parte cal-  
culi augmentum inhiberi debeat: idque cru-  
dorum excrementorum a viis urinaris ad al-

vum diversione procuretur: ex altera vero cum  
calculus angulosus, aut inaequalis conjiciatur,  
nec aequalis & nimis cruciolor reddi possit si-  
ne cruditate accursu, nec praeterea dolores  
demulceri possunt, nisi Anodyna diuretica ad  
afflictam vesicam ducantur, contrariae exoriri  
videntur intentiones; in quo casu, quoniam,  
cum Galeno, urgentiori est incumbendum,  
ideo posteriori intentioni satisfaciendum, prio-  
ri tamen non omnino neglecta. Et idcirco  
Diureticis demulcentibus statim utendum, quae  
ad vesicam quidem pervenire, sed a vesica ex-  
crementa impellere minime valeant, ne calcul-  
us magis a suis tunicis expolietur, extrema  
quoque non omittendo.

Interna Anodyna possunt esse & injecta, &  
assumpta; & inter injecta alia per intestina  
alia per Vrethram, per intestina enim parantur  
Clysteres cum exiguo lacte bubulo, ut  
quo dissoluta fuerit drachma philonii Romani  
recentis; detentamque ad duas tresve ho-  
ras vespertinas vesicae sensum adeo obstupe-  
faciunt, ut dolor tota nocte magnopere re-  
mittatur, & somnus concilietur. Per Vrethram  
vero licet medicamento injicere difficile videat-  
ur, cum vesicae collum habeat anfractus ad  
modum S. attamen per fistulam indirecte perfo-  
ratam medicamenta injiciebat Galenus; & ideo  
lac asinum, vel caprinum in quo globulus opii  
torrefacti nocte infusus fuerit; aut Laudanum  
Nepentes, ad demulcendos dolores, injici &  
prodesse poterit. Per os vero sumenda duo  
propono mihi familiaria remedia, quorum alter-  
um est serum asinum destillatum, appposito  
globulo opii torrefacti rostro Alembici, ut in  
transitu obtupecipientem facultatem acquirat,  
cujus dosis erit ad ℥x. addito syrupo de ibisco;  
& ut facilius ad vesicam perveniat, ex eodem  
emulsio quoque sem. melonum, sed valde dila-  
ta, parari poterit. Alterum vero ita parabi-  
tur.

℥℥. Fol. malv. rec. m. iv. viol. m. ij. radic.  
anonidis, liquiritiae an. ℥ij. sem. melon. man-  
dar. ℥b. s. patularum ℥j. incid. incid. contund.  
contund. & adde aquae Noceriae ℥b. xv. succi  
limonum ℥iij. m. macer. omnia per horas xij.  
deinde fiat fortis expressio, in qua dissolve flor.  
cass. rec. extract. ℥ij. ponatur in Alembico vi-  
treo, & B. M. destilletur, & praebeatur ad ℥bj.  
vel paulo minus, addendo, si placeat, syr.  
de ibisco, vel julap. viol. ℥j. mirabilis enim  
experta est, ad vesicae & renum dolores demul-  
cendos.

Extrinscus quoque in sessiones & inunctio-  
nes fieri solent; sed ut nimis operosa, iisdem  
somenta substituere consuevi, bis saltem in die  
admovenda, magna spongia imbibita, & non  
expressa, decoctione malvae, viol. nymph. ra-  
dic. althae, liquir. hord. & fenugraeci; quibus,  
urgente dolore, capita quoque papaveris albi  
addi poterunt. Fomentis vero succedant illini-  
tiones ex unguento malv. & populeo oleo vio-  
lac. reformatis, vel oleo nenuph. & viol. simu-  
latis; quibus, dolore urgente, addi quoque  
potest exigua portio olei yulquiani.

His autem addenda erit congrua victus ra-  
tio, inter attenuantem & incrassantem, etia,  
ne incrassante nimis: igeatur calculi moles, &  
attenuante acuantur nimis urinae & humores.



potest mucosa materia, quæ continuo cum urina excernitur, siquidem hæc calculi in vesica existentis, perpetuo comes esse solet, dum, partim a dolore a calculo in vesica excitato; partim progressu, & a calculi pondere cruditates a superioribus partibus ad vesicam ipsam alliciuntur. Nec minus obstat quod, dum Illustriss. Vir huc atque illuc, sursum ac deorsum dimovetur, lapis vesicæ dolorem non inferat; est enim ille calculi grandioris emiculus, præterquam quod sphincteri vesicæ (ut asperum & inæqualem) adherere, magnopere suspicandum, cum incessantes molestias & dolores acutissimos ferè continuo suscitet atque conservet; quos adeo cruciosos nullo modo excitare possit sola mucosa materia quantumvis acris, aut salsa nisi ab eadem ulcere excitato. Tenesmi ad instar. Sed jam dictis omnibus accedet quoque (nisi calculus foras expellatur) simul cum mucosa, materia quoque tartarea & alba, quæ lapidi vesicæ, sicut arenulæ calculo renum propria esse solet.

Quibus ita se habentibus, totis viribus nitendum ut calculus ipse aduc exiguus existens, auxiliis medicis extrudatur, alioquin brevi vel inflammationem, vel saltem ulcus in vesicæ collo excitare poterit; & præterea grandior factus, non nisi manuum opera curabitur, cum Lithontryphica spernat, tum ob propriam duritiem atque soliditatem, tum ob loci distantiam, quæ ideo à calculis in renibus admittuntur, & quia friabiliores sunt, & quia citius ad renes medicamenta perveniunt. Interim doloris ratio est habenda, ne vigiliis, cruciatibus atque febriculis perseverantibus vires deficiant, & Tunc tandem vir Illustriss. conficiatur.

Nostram autem intentionem ut assequamur, ex consuetis fontibus remedia sunt depromenda; Et in chirurgico nullum habere locum sanguinis missionem censeo, cum causæ morbificæ nihil prodesse, viribus valde obesse possit; ideo Hippocrates sanguinis missionem suavit in Nephriticis doloribus, juvene existente Aegro, ratione imminentis inflammationis. Reliqua igitur in hoc fonte remedia sunt examinanda & administranda nempe infusiones in aqua dulci fol. malv. viol. nenuph. pariet. necnon althææ à summa tua Prudentia propositæ; quibus substituitur fomentum, magna spongia eadem decoctione imbuta, & quodammodo excavata, ut Perinæ & pudendis adaptari possit; cui decoctioni, sævientibus doloribus, capita quoque papau. erunt addenda, Fomentis autem succedant inunctiones ex ung. malv. & popul. vel ex oleo viol. & nenupharino. Pariter per syphonem injiciatur medicamentum aliquod anodynum, ut lac asinum, vel aqua solatri cum emulsione sem. papau. vel aqua Cassiæ. Dolores quoque demulcere poterit clyster ex lacte vaccino, in quo drachma Philonii Rom. rec. dissoluta fuerit, ob consensum & contiguitatem quam habet intestinum cum ipsa vesica.

Hinc ad Pharmaceutica remedia sedulo deveniendum, quæ quidem vesicæ ardorem contemperare, & dolores nonnihil remittere valeant, sed potissimum horum symptomatum causam respiciant, quæ cum sit calculus, ut

moribus quoque in numero t. g. p. n. sui excusationem exsolat. Idcirco ut ductus urinarii magis pateant magisque aperiantur in aqua stillat. a me in superiori scripto proposita, aliquot diebus erit propinanda, cui macerationi addi quoque poterit succ. limon. ad ℥ij. vel xv. tum ut magis diuretica evadat, tum ut facilius in maceratione ingredientium facultates extrahantur. Et si eandem magis anodynam reddere velimus, syrupo de ibisco, syrupo de papau. substituere possumus; & remissis quodammodo doloribus, magis diuretica reddatur, addendo sp. tartar. rectif. gutt. xij. aut xv. Aquæ autem stillatitiæ descriptio talis erit.

℥. Fol. malv. viol. nymphaeæ, parietar. an. m. ij. rad. ononid. ℥ij. liquor. ℥j. sem. melon. mundat. anguriz an. ℥ij. sem. papau. albi ℥ß. aq. Noceræ lb xij. succi limon. ℥ij. incid. contund. & macer. per diem naturalem, deinde f. fortis expressio, & colaturæ adde flor. cass. rec. extr. ℥ij. m. destill. B. M. &.

℥. Eiusdem aquæ lb j. syr. de ibisco ℥j. m. pro matutin. potu. Aliquot transactis diebus. aquas Nocerianæ de more propinandas esse arbitror, ut in redundanti illa æquola humiditate calculus ipse, si adhæreat sphincteri, removeatur, & veluti innatans, una cum aqua ipsa foras extrahatur, ut non semel in praxi observavi, calculis exiguis existentibus: me namque non later grandioribus diuretica, & aquas præsertim huiusmodi, atque ferratas non prodesse, sed obesse posse, quas experiendas propono, cum unica spes in lapidis expulsionem posita sit. Vehiculum ideo in hunc finem satis validum esse debet, ut vehementior quoque insequatur impulsus, quale esse poterit, Terebinth. ad ℥j. vel sal tart. volatiliz. ad gr. xv. aut xx. Dum verò mingitur aqua, omni artificio utendum, ut lapillus quoque cum aqua extrahatur; quare Patiens ipse manu penis extremitatem sibi adstringat, ut intumescat, sicque calculus Urethram facilius ingredi possit: deinde assatim manus a pene removeatur, ut confertim exeat urina, aut aqua ipsa. Præterea dum mingitur aqua, repentibus quoque infusionibus jam dictis scilicet cum successu usus sui. Quæ jam dicta omnia materiam quoque mucosam abstergere & ablueri, collumque vesicæ ab ulcere tueri valebunt; (si fors. n. quod saxis Deus, calculus non adesset, præterquam quod jecoris, renum calorem, & humorum acrimoniam moderare atque demulcere poterunt.

Quod si res pro voto non succedat, rursus ad Anodynorum usum erit confugiendum, & jam præscriptis addi potest aqua stillat. ex emulsione quatuor semin. frigidorum, additis etiam sem. papau. albi, vel syrupo ejusdem. Atque tandem ad lactis asinini usum quotidianum de more erit ducendus Vir Illustriss. totumque corpus oleo amygd. quotidie inungendum. Et ratio victus substantificè humectans, ab eximia tua virtute præscribenda est; sicut reliqua omnia melius dirigenda & corrigenda, prudentissimo atque in Arte versatissimo iudicio tuo libenter committo. Idem ibidem.



*Pro Calculo Renum.*

Szvimmo huic morbo per recti in victis rationem occurrendum est. Removeatur igitur a mensa ciborum varietas, & cruda quæ delectant cum periculo. Uvas passim majores una cum acinis dentibus comminutas, in prima mensa comedat, vel quod tutissimum est, & in multis magno uessu approbatum, aliquot nuces avellanas ad ix. vel x. perpuratas ante prandium vel cenam comedat, compertissimum enim habemus non paucos scavis cruciatibus calculi diu affectos, usu avellanarum liberatos. Ab hoc malo præservat radix eryngii, caro Cynosbati cum saccharo in modum Electuarii redacta: Item succus veronicæ cum saccharo spissatus, cui semina viol. admisceantur. Hæc tutissima & usu atque experientia comprobata sunt remedia. Coniulo etiam ulum Rei cum carne pasularum per setaceum cribratarum, vel morsulos e Rhabarbaro. Plurimum enim hepar atque renes juvant, & ventriculum tamen non lædunt, ut etiam roborent, foris multa adhiberi possunt, sed duo mihi maxime probantur. Primum hoc unguentum.

℞. Succum malvarum, & misc. lento igne cum adipe cunctuli præsertim eo quod ad renes reperitur. Hoc sæpe inungantur lumbi. Secundo, misceatur unguentum rosaceum Mesues cum oleo amygd. amar. & utatur ut prius. Addam laudatum a peritissimis Medicis, cuius usus singulis annis in vindemia est. Accipiantur vinacei prælo expressi, atque adhuc calentes ex uvis maturioribus & maturis horis, ac ante cenam dimidium horæ renibus quinque diebus apponantur. Hoc remedium excellentem Medicum authorem habet, & rationi maxime consentaneum est: cum enim in renum affectione à calculo, tenuare atque molliere Hippocr. jubeat, & vinacei moderato suo calore materiam tenuem, substantiam etiam renum molliorem reddant, ut calculi per eam facillime transeant, & robur attingente facultate addant, sane non video quid ad rectam præservandi rationem in isto usu Vinaceorum, nisi immodicè forte renes sint calidi, desiderari queat. Applicetur etiam parti dolenti hoc cataplasma, quod refrigeratum statim rursus in stragula calefiat.

℞. Malv. parietar. virid. an. m. iij. raphani sine radícula, petroselin. cum toto an. m. j. coq. in f. q. aqu. puræ & additis tribus copis, ac oleo amygd. dulc. q. s. f. Cataplasma. Deinde contunde cum oleo scorpionum amygd. amar. ad formam emplastri extendatur, ac renibus si dolor est renum, vel vesicæ applicetur, nam calculum frangit atque emolliat. In gravi renum dolore & calore hoc emplastrum ut facilius calculum elidat, prodesse sæpe animadverti.

℞. Cancros numero ix. bulliant in q. s. aquæ puræ vel lactis, & contundantur ac rursus coquantur, succusque exprimatur. Eo succo imbuatur panis albi medulla & additis duobus ovorum vitellis, butyr. rec. & ol. viol. q. s. commisce omnia in mortario, & extendantur in panis lineo, & renibus ac venteribus applicentur.

Intra corpus ad viarum lenitionem & calculi attenuationem, prodest decoctum rad. arth. & petroselin. cum herba Veronicæ addito melie, vel saccharo, vel butyro rec. vel ol. an. gd. d. decoctum etiam hederæ terrestris cum veronica, ononidis etiam radices optimæ sunt, ad Balnea autem & infusus nequaquam deveniendum, nisi illa non contrulerint, & corpus luerit clysteribus vacuatum; tunc enim si graviter viis impactus calculus hæreat, nec prædictis remediis cedat, is locus esse posset.

Ja. Crato Consil. 17. lib. 5.

*Pro Calculo Renum ad Abbatem querendam.*

Si tibi ætas constans est, & vires firmæ, habitusque corporis non plane longitudine morbi & dolorum acerbitate attritus & collutus, omnino tibi autor sum, ut cures internam brachii venam aperiri, ejus nimirum quod e directo respondet magis anetro reni: Eam vero quantitatem denu velim, quæ præsentis medico, consideratis cum iudicio rebus omnibus necessaria visa fuerit, paucis deinde internatis diebus, aperies venam in poplite, aut circa talum iterutrum, si alter ex renibus plus altero laboret: aut venis circa talum in utroque pede apertis, si ex aquo renes sint affecti, sanguinem demes: quarum prior avertit humorem a parte dolente, & evacuat: posterior magis a loco affecto educit: Ex posteriore evacuatione hæc, nihilum quam solent morbo hoc laborantes levare, quod ego frequenti experientia cognovi: primum quæ ex Hippocrati didici 6. Epidem. Sect. 1. Aphorism. 5. Post hanc sanguinis evacuationem (mihi vehementer dolores præsentis aia remedia imponere nos cogant) velim corpus evacuare non una vice sed reiteratis, idque interpositis diebus, aliquando duobus aut tribus, aut paucis prout visum fuerit præsentis & curationem administranti, medico, qui hoc ex virium corporis tui cognitione, & nocentium in corpore humorum multitudine facile dignoscet. Præscribo hic in eum usum pulverem solativum, qui sine detrimento optime educit eos humores, qui solent calculo materiam præbere, divertit humores a renibus, eosque expurgat. Estque hæc pulvis in Galba hæc multis probatus, qui eo se subinde a gravissimis renum item & coli doloribus liberant. Pulvis hic esto.

℞. Fol. Sen. ʒ ij. rhab. opt. ʒ i. (fortè ʒ ʒ.) turbit. ʒ i. hermodact. ʒ ij. gr. v. polipod. ʒ ʒ. cum n. om. zinzib. mili. fons, laxitrag. sem. Gemilæ an. ʒ j. f. omnium pulv. subtiliss. dos. ʒ ʒ j. ad ʒ i ʒ. in vino albo; etiam in ipsis gravissimis doloribus cum juvamento & tuto exhibui. Si verò dolor male & graviter hæbeat, is hoc modo tolli a me solet, singulis diebus per os velim hæc potionem mane epotari, & aliquando vesperti ante cenam reiterari.

℞. Nucleos Persicos numero xiv. succ. liquirit. ʒ j. lactis sem. frigid. m. j. extract. ex aq. malv. vel capill. ven ʒ ii ʒ. mixtis omnibus, contulis nucleis, & dissoluto succo; f. potio, vel hujus loco exhibeatur hic pulvis, quem ego expertissimum habeo.

℞. Cinn-



℞. Cineris leporis integri combusti in furno s. A. partem decimam (lepus succocari debet, ne vel sanguinis gutta ex eo pereat) saxifrag. ʒʒ. baec. laur. ʒ ij. sem. viol. fructus integr. rappa may. an. ʒ j. tol. quercus ʒ ij. Pulvis subtiliss. dos. ʒ j. in vino albo mane jejunio veneri ulo. Verum multo erit efficacior, si sequenti aquarum mistura dissolvatur, quæ hoc modo fit.

℞. Aq. ex stercore bovino M. io mense destillata ʒ v. vin. malvatic. vel albi potentis, quot per 24. horas raphanos incisos in vase vitreo intulerit ʒ ij. 2q. fragor. destil. ʒ j. succ. aurant. vel limon. ʒ ij. M. F. potio in aurora.

Ut Palato gratius sit medicamentum admisceri potest paululum Syr. Capili. ven. Hac sunt remedia quibus ego in ea dispositione semper sum magno cum successu usus. Externis applicari debent quæ leniter discutiunt, quæ laxant, quæ dolores mitigant, laudo maxime si dolores vehementes sunt, aliquando balneum aq. dulcis, aliquando infusiones in oleo. aliquando fomenta ex decocto parietar. alim. malv. chanar. melil. cap. ven. beton. lemn. fenug. lini, coriandri, fenicul. & petrosel.

His quædam subjungam paratu facilia, quæ in promptu esse possunt, quibus etiam aliis, hunc morbum perfecte curavi, imprimis maxime laudo usum frequentem nucleorum persicorum, vel si haberi non possunt amygd. amar. do edendos 10. vel 12. mane in principio prandii, vel paululum ante illud, vinum album imbecille, in exigua quantitate superbibendo. Item probatus est mihi pulvis cusp. virgæ aureæ vel artemisiæ, vel calam. aromat. pondere ʒj. in vino albo in aurora exhibitus; sed sit ipsorum frequentior usus. Item accipio radices Althææ elotas & exenteratas ut ita dicam, infundo vino albo: dein destillo, ex aq. destillata propino tempore doloris cyathum dimidium, & juvantur. Item accipio aliquando columbum juvenem, deplumo, abscondo caput, pectus integrum cum a is aufero, crura item & coccygis omnia, excutioque intestina omnia, relinquo solum dorsum ipsum & quod ipsi interius adhæret, exsiccō in furno in cratere ligneo, pulvero, eumque ad ʒj. vel ʒ ij. exhibeo in vino albo non sine magna utilitate. Aster troglodytes ferè ab omnibus, licet male dictus regulus, quocunque modo exhibitus, me experiente, juvat calculosos. *Reverius Solinader. Consil. 15. Sect. 1.*

℞. Liquirit. ras. rec. ʒij. lapid. judaic. ocul. cancr. an. ʒj. sem. milii sosis rhab. opt. an. ʒ iv. sem. fenicul. ʒ iij. mastic. cinamom. ʒ lang. an. ʒj. macis, caryophyll. an. ʒ j. gran. juniper. ʒ ij. mithridat. ʒ iʒ. conserv. ros. ʒ v. add. gran. alkekengi deglubator. numer. xii. vini malvatici ʒbiv. indita in vitrum relinquuntur per dies 10. tum coletur, hujus vini capiat mane cochlearia 12. vel 14. aut per se, aut in alio aliquo convenienti liquore, ut aqua graminis, alkekengi vel capili. ven. solet hic liquor calculum & renibus exterminare. *Reverius Solinader. Co. s. 1. Sect. 5.*

### Pro Calculo vesicæ.

Quoniam medicamenta lapidem combinentia, nihil ferme operantur ob lapidis grandioris duritiæ, unica Chirurgia superest, quæ eum detrahendo miserum ægotantem a tam gravibus tamque assiduus molestiis, a doloribus pene intolerabilibus liberare possit. Sed cum hoc opus maximum sibi junctum habeat, periculum, potissimum in senes molliore corpore & Cachymia laborante, jure optimo clarissimi viri recusant hoc præsidii genus. Sed cum ex gravi morum virorum decretis, in præcipiti casu magis ex usu sit, ac longe minus, præsidium aliquod generorum, licet anceps, administrare, quam remittere ægum morti, omnino ad ægotantis statum præsentem & futurum attinentibus, diligenter summaque opera expensis, in eam venio sententiam, ut ad cervicis vesicæ, incisionem deveniretur; parva facta sectione, eo consilio, ut lacerato musculo Sphinctere per vulnus licet parvum admodum, urina perpetuo involuntarie sensim præterlaberetur. Hoc enim opere peracto, dolores prius cessare solent, ut in nonnullis a me fuit observatum, ac præsertim in Nobilissimo quodam *Savonense*, de *Heartu* annu. agente 72. qui deinceps felicem seniper duxit vitam. Siquidem in reddenda urina, geminæ ob causas, dolores excitabantur, tum quoniam in urina egressura in petu calculus quasi proditurus dum dimoveretur affectus per res lacerando ingenuissimos perit cruciatus, tum etiam quia sub mictionis finem, Sphinctere musculo sese colligente & contringente, in causa est ut subjæctæ partes nonnullæ ulceratæ a duriori lapide premantur vellicanturque, at nunc utraque doloris causa confertim apertio loco cessat, quandoquidem neque urina ibi colligitur, sed sensim continuo educitur, neque commemorati musculi compressio astrictioque amplius locum habet, modo i. posita tenui argentea aut plumbea fistula vulnus apertum aservetur, quasi in fistulam callosam abeat. Profecto cum ars naturam imitari studeat, observaverimque ego non semel in lithiasi affectis, disrupto ea in parte ablatu sponte nato, ob causas jam dictas, dolores molestiasque omnes in urina reddenda cessare, a natura edoctus, opus hoc non potui non semper celebrare: nostrum autem novum hoc consilium, qualecunque fuerit, si apud aliquem authorem modernum hujus ætatis reperias, scias velim id totum a me accepisse. *Joannes Zechlin. Consil. 58.*

### Observationes.

#### Pro calculo Renum.

Quum calculo renum laboraret mulier quædam cum intolerabili dolore ob retentam urinam vocatus ego in auxilium, hæc subsequencia remedia adhibeo.

℞. Parietar. virid. m. iv. cum butyro recenti & oleo anethino, & exiguo scorpionis adjecto, cataplasma fiat. Clytere prius immisso



mulo, pectini apponebatur, continuo bibebat ex decocto sequenti.

*M.* Sem. mair. alth. an.  $\mathfrak{z}$  iij. cicer. rubr.  $\mathfrak{z}$  iij. caric. ping. numero ix. sebest. numero viii. sem. 4. rigid. maj. an.  $\mathfrak{z}$  ij. hord. mund.  $\mathfrak{z}$  ij. liquirit. ral.  $\mathfrak{z}$  vj. F. decoctio in aq. pluvialis lb. iv. ad lb. ij. Colatura ad libitum utebatur, post cujus uinum minxit, & lapillos multos eiecit perfectamque valetudinem consequuta est. Mulieri cuidam cum parere non posset, Medici aditantes oculos cancerorum pulverisatos dederunt, & hoc modo urinam provocabant. *Petrus Forestus, Observ. 25. lib. 24.*

Nobilis quidam cum calculo laboraret, & dolor in rene & uretere illum lancinaret, post injectum enema sumpsit oleum am. gdalarum d. cui succus limonum immixtus erat, & pectini apponebat sacculum ex cumino, quibus praesidiis calculus expellebatur. Idem alio tempore cum exiguum nostrae destillationis (de qua supra dictum est) prae gustasset miraculi instar calculos urina cum lotio reddebat. *Petrus Forestus, Schol. Observ. 25. lib. 24.*

#### Pro calculo Renum.

Sexagenarius quidam ob reprobum alimenti uinum, in calculum renum incidit, hic praeter purgationes varias, paratas praesertim ex rebusinthina abietina, cujus vi mucilaginosam per alvum pituitam excernebat usu assiduo aquae concoctae cum ligno illo Indico, quo aqua caeruleum diutius colorem contrahit, & vocatur a Monacho Nephriticum, biennio sanus evasit. Postea exasperato malo, suppressit omnino urina, adsunt ureterum & renum cruciatus inmanes; vocantur de novo Medici: quorum consilio, enematis emolitur alvus, expungantur excrementa, discutuntur flatus, munitantur unguenta, fomenta, & emplastra: superiores & interiores venae secantur, ano hircines admoventur, balneum applicatur oleagineum, lapidem comminuentia auxilia imperantur, omnia licet utilia, citra commodum tamen celebrantur, nam aucta gravitate in lumbis, & per 18. dierum spatium retenta urina, per intervalla jam epilepsia vexabatur, demum cum nulla essent praetermissa, quae calculi comminutionem pollicerentur, & aeger conclamatus esset, toto corpore tumidus, diroque dolore in ilium regione oppressus ex praescripto medicorum oleum amygd. d. rec. paratum cum guttulis balsami permixtum lambere coepit: cujus auxilii ope, aliquantulum recreatus, per sedem viscidum humorem, & per urinam arenulis minutissimas excrevit, & in eodem auxilio persistens, cum urina cruenta, calculum purpureum, oblongum, asperum, durissimum, nucleo dactyli magni similem, excrevit, libereque jam urinam reddens, majorem quantitatem amygdalini usque ad  $\mathfrak{z}$  iij. & balsami usque ad  $\mathfrak{z}$  lb. assumens. De eadem dierum spatio 65. calculos emisit, duos, ciceris forma & magnitudine, tandem restauratis viribus sensim & sine sensu convalescere coepit. Hujus etiam solius auxilii beneficio in postero praeservatus fuit. Nam jejunio ventriculo amygdalini  $\mathfrak{z}$  lb. 6. balsami guttulis permixtum absorbebat; cujus praesi-

dii ope sabulosam urinam excernens in multos annos vitam produxit, magna ergo est balsami pro hoc morbo & aliis frigidis curandis virtus vis atque potestas: cujus usum se liberaliter virum quendam qui erat in conditione mortis a lapide gloriatur. *Avenzoar. lib. 2. Theor. Tract. 1. cap. 7.*

Si verum balsamum desit, ejus loco utere Stacte. i. Myrrhae pretiosissima gutta, vel Orientali, aut eo quod ex Peruvianis in uis affertur solet, quod mirabiles praestare utilitates veterum & juniorum diligentissimi literis commendaverunt. Memini me pluries calculos magnos renum cavo tenaciter impactos, usu utilitatis aquae ex nicotiana viridi extractae in potum exhibitae per urinam deturbasse. Si ea desit ejus decocto utere cum utilitate multa. *Zacharius Lusitanus, Observ. 66. lib. 1. Prax. Admirand.*

Sexagenarium immunem a renum calculo servavi annos 16. (cui alioqui obnoxius erat) largo salis marini usu, quod deinceps in multis confirmavi *Joan. Helmontius. Tractatus de Lithiasi cap. 3.*

Consiliarius quidam cum per quindenae singulas soleret misere calculi dolore decumbere, usus deinceps cerevisiae cui semen dauci incoctum est, liber a calculo per aliquot annos vixit. *Idem Tractatus de Lithiasi cap. 1.*

In Monasterio prope Bruxellam fontes spirant aliquot, qui saxa parieti apponunt, unico namque & securi saepe saxa adnata decutunt. Ibi monachi quaeuntur se strophas sive tormina pati, nisi semine d. uci cerevisiae incocto utantur quotidie, odor enim seminis dauci, odorem saxatilem domat & comprimit. *Idem Tractatus de Lithiasi cap. 1.*

Baro quidem nostras dum per aliquot annos in sua Anglia legatione, pluries calculis renum summo cum dolore inestatus fuisset, meque suadente, uteretur bis hebdomadatim liquore Aroph. *Paracelsi* (quod sonat Aroma Philosophorum) per 18. deinceps annos a lithiasi liber. Tandem anno 8. defungitur, ejusque cadaver dissectum ne arenulam quidem aut Lapillum ostendit. *Idem Tractatus de Lithiasi cap. 7.*

Rarissimum diureticum ex lapide cancerum colligitur etiam vulnerarium ac febrifugum: modo resolvatur in formam pristini lacis quod quam sit excellens & potens, vix cuiquam quam perito persuaderi potest. *Jo. Helmontius Tractatus de Lithiasi cap. 7.*

#### Pro Calculo Vesicae incipiente in puero quinque annorum.

In consilium adhibitus, hoc modo cum ipso processit. i. Institui optimam victus rationem, nimirum ut aer sit calidus, p. nis bene fermentatus & coctus, non recens, neque nimis durus. Jusculis utatur carnum caltratorum, pulorum, gallinarum, aut caponum, quibus aliqua rosamarinum, salvia & majorana, nonnullaque salis ratione saporis addi poterit, radi. es tamaruli, petroselin. & quaecunque urinam insigniter movent, succum indigestum simul ad venas melaricas ac hepares cum ducunt, ex quibus obstructions viscerum, & materia calculosa augetur



getur. Viscidi, glutinosi, crassi, & qui difficilis sunt digestionis cibi nullo modo sunt offerendi, uti nec salii, & qui papere, zinzibere, caryophyllis, raphano, cepis & ejusmodi rebus conditi sunt cibi. Legumina quoque oriza, triticeus crudi, pisces, caseus, l. c. & lacte concretiscaulis summopere vitandi. Vino utatur albo, & tenui decoct. agrimon. & veronica diluto. Postea corpus sequenti potiuncula expurgavi.

℞. Rad. fœnic. petrosel. eryng. marin. an. ʒij. fol. agrimon. veron. cuscut. an. m. s. sem. anil. ʒj. coq. in aq. ad consumptionem tertiae partis, in colat. ʒij. dissolv. syr. ros. compos. cum rhab. agar. & iena ʒv. elect. diacartham. ʒb. M. l. potiuncula sumenda quatuor horis ante prandium.

Purgato corpore sequentem præscripsi, syrupum magistralen, de quo singulis diebus duas horis ante prandium ex cochleari sumebat ʒj. observata interim optima victus ratione & per intervalla expurgato corpore, nunc præscripta potiuncula, nunc pulv. rad. mechoac. ʒij. sumptis cum iuculo carniuum, syrupi autem hæc est descriptio.

℞. Rad. fœnic. petrosel. gran. in. saxifrag. eryng. marin. an. ʒj. fol. agrimon. veron. hermar. capill. ven. cuscut. an. m. j. l. s. cordial. genist. & l. thianem. an. p. j. sem. mili. solis bisulav. anil. & sem. ʒ. frigid. may. an. ʒij. liquirit. ras. & uvarum p. l. exacinat. an. ʒij. l. decoctio ad consumpt. tertiae partis, adde l. cen. miscellan. lb. ʒ. mell. puri & despumari lb. ʒ. l. s. A. Syrupus, aromatizetur pulv. cinnam. el. ʒij.

Per menses quoque aliquot sequenti semicupio ex rad. herb. & sem. emollientibus, laxantibus, lenientibus & flatus discutientibus per intervalla utebatur.

℞. Rad. & fol. malv. rad. fœnicul. petrosel. eryng. marin. an. ʒij. herb. parietar. viol. veronic. fior. chamam. melil. genist. sambuc. an. M. j. sem. tornugræc. l. in. an. ʒj. sem. petrosel. anil. fœnicul. genist. an. ʒij. coq. in q. s. aquæ pro semicupio. Ex simili quoque decocto, quotiescunque alvus non respondebat, addito vitello ovi, parumque elect. bened. l. xativ. & ol. rutæ. enemata præparavimus, & exhibuimus. In tum ventris, & perineum non ei solum balneo egresso, verum etiam singulis diebus semel aut bis sequenti unguento unximus.

℞. Ol. Scorpion. Amygd. amar. an. ʒj. ol. lil. alb. & ung. diath. an. ʒss. M. hac unguentum.

His adhibitis remediis Dei singulari beneficio, paulatim convaleuit, neque posthac ullum mali hujus vestigium sensit. *Guil. Fabrit. Hildanus Obs. 71. Cent. 3.*

#### Pro calculo Vesicae.

Multa usurpavit remedia toto anno per intervalla ac tandem calculum excrevit nucis avellanæ magnitudinem æquantem, sed figuræ oblongæ olivari referentis: at verò tantâ difficultate, ferebatur per virgæ canalem, ut intra 36. tantum horas a vesicæ orificio ad balani radicem pervenerit, ubi meatum angustiores inveniens, nullo modo cum pervadere potuit,

atque adeo necessum fuerit balani incisione illum extrahere, quæ in parte inferiori, propè frænum celebrata est, remedia quibus præcipue calculi exclusio adscribitur, talia fuerit.

Post evacuationes universales, usus est per mensem integrum pilulis ex salibus bacc. hedera & nasturt. aquat. crystallo tartari & minerali part. æqualibus cum terebinth. in massam pilul. redactis. De qua sumebat ʒj. mane singulis diebus; Postea vero per novem dies lumpsit aquæ ceparum albar. in vino albo destillatarum ʒij. cui addebatur sal ex capite mortuo elicitum, & nono die prædicti calculi excretio contigit. *Lazarus Rizzinus Observ. 14. Cent. 4.*

Puero mercatoris cujusdam 7. annorum calculo vesicæ laboranti, Lithotomus Italus hac sectione lapidem eximere volens, digitum sinistræ manus medium butyro inunctum in podicem immisit (quæ ratio calculum inveniendi omnium est optima, & tutissima) ac dextrâ manû ventrem inferiorem in regione pectinis premeus, digitoque podici introso calculum propellens, illum ex vesica in cervicem illius unpulit: ubi cum ob magnitudinem subsisteret, & tactu supra podicem deprehenderetur, illic sectione factâ supra lapidem cochleari ferreo mox exemit, quæ si minor fuisset, per meum penis facile exprimi vel exungi potuisset *Felix Platerus Obs. lib. 3. pag. 64.*

*Barthol. Turriani In Jatro 6. lib. 4.* Vesicæ calculum sectioni destinatum fregit propinato pulvere crystalli, vel potius substantiâ ejusdem resolvable: ut autem Crytallus solubilis, si vel minimum novies in fornace figuli calcinetur, tunc abit in friabilem substantiam, & in cella positus liquecit, olei tartari mistar, vel lapis crystalli ignitus septies extinguatur in aq. vel spiritu urticæ minoris.

Vesicæ calculus contrahitur emplastro ex corpa alba cocta pectini imposito teste *Jo. Provotio med. Patavino, Schroederus* commendat urinæ spiritum, vel e calculo humano factum, quem & ego sæpius probatum reperi *Wolfgangus Hoeferus Herc. Med. lib. 3. cap. 4.*

*Gerardus boer.* Medicus doctrinæ & experientiæ præclarus, Molinæ quendam vesicæ calculo laborantem aquâ Persicaræ destillatâ ad integram sanitatem perduxit, de eâ haurium singulis matutinis exhibendo *D. Robertus Boyle*, in aureo suo libro *de Utilitate naturalis Philosophiæ, parte secundâ, sectione tertiâ.*

#### Pro calculo Vesicae.

Calculum in vesica existentem durum & antiquatum frangere nemo potuit: Molliorem, tophaceum, friabilem, recentem cum difficultate frangemus in juvene, non in senæ, ubi aperti sunt meatus, non adstricti, ubi vires validæ sint, & ægrotus medico pateat, medicusque suo munere perfungatur: at etiam si conditiones adint hujusmodi, raro tamen hoc opus medicamentis absolvitur. Ego bis in hanc usque diem fractum vidi, primum casu, non deliberatione, atque matura consultatione additâ. Casus fuit, filium Zaneni Pontionii hypographi Remæ expurgandum susceperamus. Doctissimus quidam Medicus, & ego, ut po-



Ac tunc ad ipsam sectionem accederet ( Jam enim cum Nurino artifice de pretio convenerat ) tentaret ante omnia remedium generatum a Medicis Venetis, tu Florentinis excogitatum, cumque nullam consequeretur utilitatem, secari cupidus, sacerdotem jussit ceceras, ut sua prius Ecclesie sacramentis, si ex sectione moreretur, minz lisset corruptum. Religiosus fuit ex societate Jesu, qui audita confessione ab aegroto, & cognito morbo proponit illi Pharmacum, ut dicebat magis usus, ac quo & in seipso, & in aliis periculum fecit, experiri placuit, neque facti poenituit. Eodem remedio in renum calculo usus sum bono semper successu, vidi enim circuitus illos nephriticos fuisse, non sine assensuum adhibitione sanatos. In affectu vesicæ nunquam sese mihi obtulit occasio experiendi, nisi semel, sed æquali cum superioribus eventu, variato tamen exhibendi modo. Describam primum Pharmacum ab ipso Jesuita traditum, mox vero aliud, sed imprimis illud remedium approbo, quia nihil deesse video, quod possit ad hujusmodi opus perniciendum exoptari: vniuerso simplicium egregium, componendi rationem exquisitam conspicio, ac eo magis probo, quod pro basi continet antidotum, in quo summa vis inest ad frangendum calculum. Hæc autem Jesuitæ pharmacum est.

℞. Pulv. millepedum præp. ʒj. ad summum ʒiij. aq. vitæ ʒvi. juris cicer. rubr. ʒix. vel ʒxx. capiat calidum horis ante prandium 5. eneniate utebatur emolliente ante medicamenti potum; instituebat simul emollientem victum: effectus medicamenti fuit; hor. rum duarum spatium, totum corpus incallescere, angustiebatur aegrotus, uriebat, ac fere loco stare non poterat, aliquando circa pubem dolores urgebant, urinx horæ quinta coeperunt crassiores reddi, sed non multæ. Secundo die a pharmaco contingebant eadem, sed urinx copiosiores, & crassiores. Tertiò sabulum apparuit ultimum, septimo tandem adeo plenz sabulo vitæ sunt, ut recte quis diceret, eas nihil esse quam sabulum aqua dissolutum, omni in meliorem statum redigebantur, ita ut qui proximè incidi debebat, liber ab omni malo nono fuerit die; & hic adhuc vivit, ab eo morbo Dei benignitate liber.

Ego vero juvenem annorum 18. calido & sicco temperamento curaturus, cuxi minuendam quantitatem aq. vitæ, & ubi singulis diebus datum alteri tunc antidotum, huic alternis dari jussi, ac pro refrigeratione totius corporis aquam fragariæ, & sabulum ad ʒx. propinabam, intermedio die cum gutt. vi. ol. calcanthi & ʒj. Julepi violati, hoc autem modo Pharmacum indicabam.

℞. Pulv. assellor. præp. ʒj. aq. vitæ ʒij. decoct. cicer. rubr. ʒviii. M. S. & capiat tepidum 6. horis ante cibum, sed cum excalescere in igne Pharmacum, ubi non erat aqua vitæ, verum ubi ab igne remotum erat; miscebatur. Dedit medicamentum in Balneo decoctionis herbarum emollientium, universalibus præcedentibus, præparantur millepedes ad renum & vesicæ calculos hoc modo.

℞. Assellorum quam volueris quantitatem, vinoque albo generoso abluito diligenter, mox

in ollam conficito novam vitream, lutoque illam incrustato, deum in furno exsiccatur ita ut possint in tenuem pulverem redigi. tum vero infunde vini ejusdem generosi quantum poterunt imbibere, & rursus exsiccato ac tertio rabi ito & exsicco ut supra, quarto vero pulverem irrorato hoc qui sequitur liquore.

℞. Aq. fragor. ʒij. spirit. viol. ʒiij. iterum pulvis exsiccat. & tenuissime contritus in vase vitreo, aureo, vel argenteo uti servetur. quod ad ipsam incisionem attinet, si hat ignis cultis, multo locilius succedet hanc rationem secandi, ita per hanc, adhibebat Romæ quidam ex meis discipulis, ac omnes fere sanitati restituebat. *Lioratus Aug. mo Epist. & Consult. Tom. 2. lib. 2. Epist. penult.*

*Wilhelmus Laurembergius Professor Rossobienfis*, ut ipse de se refert provecia jam ætate calculo vesicæ laboravit, qui cum varias molestias exhiberet, & nucem ponticam æquare deprehenderetur, ac citra sectionem exire non posse putaretur: ipse vero periculosissimo huic auxilio sese subicere nollet, de aliis remediis cogitare cepit, primò ergo liquorem illum nephriticum celeberrimum magnopere apud Principes in pretio & usu habitum expertus est, qui ita paratur.

℞. Salistartar. alb. ʒj. affund. aq. petrosel. lbj. M. & per chartam bibulam transcolebatur, & liquori color croceus corticibus aurantiorum concilietur, usurpavit etiam gemam illam Indicam, Igiada Hispanis dictam, ad calculum frangendum celeberrimam: sed utriusque remedii nullam vim deprehendit, ergo inter reliqua quæ ad calculum comminuendum commendantur, Pharmacum ex assellis experiri voluit, ad imitationem Augeni in hunc modum.

℞. Pulv. assell. præp. ʒj. spirit. Juniper. ʒij. Juris cicer. rub. ʒx. M. Quo mane sumpto, prima & secunda vice a sumpto medicamento tribus aut 4. horis quandam pectoris compressionem percepit, & quasi inaniens animi deliquit, ut necesse haberet theriacæ ʒj. potioni adnoscere, atque ita remedio hoc totos 5. dies usus est. Sed toto hoc spatio ne minimum quidem sabuli expurgari reperit, itaque alia addenda ratus, sequenti medicamento usus est.

℞. Assel. præp. ʒij. lepor. præp. sang. hirci præp. spong. rol. sylvestr. sem. Viol. purpur. an. ʒj. spec. Lithontrib. ʒij. M. F. antidotum. Hujus antidoti accepit ʒij. decoct. diuretic. ʒx. spirit. Juniper. ʒij. quod medicamentum ubi mane hora 5. hausisset, secundâ vice post horas pius minus 4. sub pubis ossæ ad regionem ostii vesicæ magnos sentire cepit dolores. Paulo post parum urinx profuebat, & cum ea lamellæ exigue instar squammæ piscis subrubæ, quæ licet aliquam visciditatem habere viderentur, ad tactum tamen in sabulum resolvebantur, ita ut n. anillo appareret tunicam vel crustam esse a majore calculo solutam. Cujus medicamenti unum cum continuaret, interdum tertio, interdum quarto, nonnunquam quinto die, hujusmodi mellæ crassiores, & fragmenta sæpe grandiuscula profluxerunt, & præsertim ubi lavacro aquæ dulcis utebatur, cum verò & a calculo & ab ejus fragmen-



tis, orificium vesicæ esset laceratum ad leniendum dolorem medicamentis utilis est, atque ita horum medicamentorum usu septimum annum spatium a calculo libero liberatus est. Decoctum muceticum hoc fuit.

℞. Rad. Liquirit. ʒij. alth. graminis, ononid. an. ʒij. bacc. rui. haicacab. numero xx. cicer. rub. ʒij. u. r. par. ʒj. sem. 4. trigid. Mai. an. ʒj. hord. pii. coq. in aq. alkekengi, ononid. fragor. Ho. tabatum an. 16 iʒ. colatur. adde syr. de alth. ʒij. *Daniel Sennertus Pract. lib. 3. part. 8. sect. 1. cap. 1.*

Pistor quidam habebat filiol m, quæ læpius cruentum mēiebat, medioque hlo tulpenitebatur totum: erat autem pallidum cum multo ledi tunc æ glutinoso, heque septimum vixerat annu n. Viscera quædam narrat pistori, idem nbi olim contrigisse, iussit adteri vesicam tauri embryonis noncu n nati; vesicula ista plerumque repleta est liquore saporis non quidem utinalis, sed alieni, cu us singulo mane bibit ʒij, cum totidem vini albi. Apud aliquot puehas pauperes idem ex embryone hirco tentatu n ac felicius adhuc successit. *Joan. Helmontius tract. de Lithasi Cap. 7.*

*Ingens calculus ex inciso vesica fundo, in nobili Muliere extractus.*

Vesicæ vulnera quia sunt ut plurimum exitiosa, non immerito inter lethalia censet Hippocrates; attamen læsa vesica convalescere, cum aliis, tum etiam mihi ex sequenti historia compertum est.

Nobilis matrona Urbana Proux, vidua Danielis Hugonini, Vivicensis patritii, biennio miserrime cruciata est calculo in vesica. Ego tandem adhibitus, partim cathetere in vesicam immisso, partim unposito in matricis collum digito, calculum ovi gallinacei magnitudine leni, a quo continuus, usque acutissimis doloribus amiciebatur; vires plane prostratæ erant, unde ægra pariter cum adstantibus de vita desperabat. Pluries rogatus, ac tandem vicinis ipsius decumbentis & ænium precibus, ut calculum extraherem; ante omnia cum totum corpus, tum imprimis partem affectam præparavi hunc in modum: trinito levi quodam medicamento ægram purgavi: vires quantum potui, cibis euenymis, itemque portionibus cordialibus, & epithematibus restauravi. Deinde dolores, quoad heri potuit, emollientibus & anodynis vesicæ regionii apposis, & syphone in ipsam injectis, sedavi. Tum leviculum ulcus ipso vesicæ summo in collum matricis ad uteri orificium intrans, deprehendi; quod calculus sua cum asperitate, tum pondere eroset, quodque una cum calculo, quoties recta staret ægra acie digiti indicis in collum matricis immissi facile deprehendere poteram.

Die igitur 18. Julii 1738. apparatus omnibus ad operationem necessariis, ipsaque ægrotâ in sede parturientis collocatâ, vesicam oleo amygdalarum dulcium, syphone immisso implevi: (sic namque reddebatur lubrica; & ab lapidis asperitate viniciebatur) deinde ipso ulcere nonnulli partim digiti operâ lacerato, per rim cistelli acie ad vesicæ collum inciso, ac per ipsum immissi tenacula, & idoneo unco, calculum (ut dixi) ad ovi gallinacei magnitu-

dinem citra vim, hæmorrhagiam, doloremque magni eduxi. Ab operatione, ventrem, & totum augmen defensionis gratia, oleo rosaceo & myrtino unxi. Pessarium ex stupis, albumine ovorum imbutum, matricis collo indidi, triduo aquam plantaginis cum oleo amygdalarum dulcium (ad dolores sedandos) tepide injeci. Postmodum decocto petroselin. alp. rai, brusci, rierbar. herniariz, saxifragiz, & seminum petroselin, genistæ, & auli cum melle rosaceo mitto, vesicam quotidie ablui. Sic Divino auxilii nullis supervenientibus symptomatibus, restituta & persanata fuit & ad annum 1741. incolumis supervixit. *Guil. Fabr. Hildan. Observ. chirurg. Cent. 1. Obs. 68.*

*Calculus ingentis magnitudinis ex vesicâ hominis extractus.*

Calculos ingentis magnitudinis ante menses aliquot mihi ostendit Dn. Daniel Episcopus Beruensis, lithotomus excellens, quos ipse diversis temporibus ex calculosis extraxerat. At ego calculum, qui magnitudinem ovi gallinacei multum excedit, ex vesica nobilis matronæ extraxi anno 1798. 18. Julii, quæ & ad annum 61. usque supervixit.

Anno 1602 prima Novembris Andream Vitellum, oculistam & lithotomum intrepidum, mihi quæ olim cognitum; Hattungiz in comitatu marchiz, calculum monstruosæ magnitudinis cineritii coloris, in æqualem ac n ex multis lapidibus compactus fuerat, & ad uncias viginti duas pendentem, ex vesica juvenis cujusdam, viginti annorum ætatis, Joann. Groten nomine, extraxi, Magister Eberhardus Stelucks, ejusdem oppidi chirurgus, vir probus & inde dignus (in cujus præsentia Vitellius calculum istum extraxerat) anno 1612. cum Hildena Hattungiam proleceus essem; præsentibus multis aliis hujus operationis testibus fidelissimis, mihi retulit. Sed in ipsâ operatione quæ & longa & laboriosa, imprimis vero dolorosa fuerat, æger animam Deo reddidit. *Guil. Fabr. Hildan. Observ. Chirurg. Cent. 4. Obs. 51.*

Valentinus Vogler Heidelbergensis, antehac ludii moderator, grammateusque in Schroetzingen & Munster ad flumen Noli in Palatinatu inferiore, quadragenarius, ante annos octodecim videlicet circa annum 1608. stranguis, & difficultate inter mingendum cum maximo cruciatu ventris, laborare cepit, sine ulla tamen causa, ut ille quidem testatur, externa. Stranguria illa, & dolores ventris, cum in duodecimum annum perseverassent, & magis magisque adaucti fuissent, tandem ante annos sex plane substitit urina, nec amplius per penem effluxit, sed hinc inde per Scrotum, & e regione pubis ulcera fistulosa sibi efformavit, per quæ ab eo tempore urina sine insigni molestia & dolore effluxit. Horum ulcerum, uti heri solet, jam nonnulla claudabantur, jam nova exoriebantur. Superiore præterea ætate, cum Novus & ingens quidem abscessus ad sinistram latus scroti exortus fuisset, Basileam venit, ubi iterum multos, ingentisque sustinuit dolores. Tandem 16. Junii cum ruptus fuisset, multumque puris effluxisset, calculus in conspe-



cum venit, qui & post dies aliquot à Dn. Martino Wirzio Basileensi, Lithotomo, & amico meo singulari, sine ullo negotio ex vulnere post ruptum abscessum relicto tenaculis & hamulis, direttore ac præsidente clarissimo viro Dn. D. Thoma Platero, celeberrimæ Academix Basileensis Archiatro ac Professore Practico Ordinario, extractus fuit. Calculum ab initio pondus octo drachmarum excessisse nobis retulit, jam vero, utitu ipsemet vidisti, vix drachmas quinque pendet, est enim porosus, & cineritii coloris, itaut facile crediderim, ab initio ipsum, veluti punicem aquâ imbutum fuisse. Calculum mihi reliquit, quem inter rariora mea reservo. Ego verone ingratus erga pauperem huncce exulem essem, viatico ipsum muneravi. Porro ab eo tempore, quo extractus fuit calculus, tota fere urina per illud ipsum ulcus, à calculo factum, effluit, sine dolore tamen, interim præter ulcus hoc, sex adhuc reperiuntur ulcera ad ductum urinarium penetrantia. Unum in pube, tria circa radicem penis, & principium Scroti, versus dextrum latus, & duo in Scroto ipso. Perinæum integrum & sanum est, neque antehac nālè affectum fuisse, constanter affirmavit, urinam quoque se nunc retinere posse, nec guttulam quidem involuntarie effluere dicit. Quum vero summopere molestum ipsi esse viderem, urinam nonnisi depositis caligis reddere posse, vel spongiâ, aut linteaminibus ipsam colligere coactu esse, sequens vasculum, olim Coloniz, pio ægro quodam amico meo à me inventum, ex cupro fabricandum feci, ipsique dedi. Hujus vasculi beneficio urinam ita excipit, ut hæ guttula quidem ad caligis exsillet.

Ceterum de loco generationis hujus calculi nobis perquirenda: est, in vesicâ ipsam generatum fuisse, vix credam; quo modo enim tantus lapis ex vesicâ per ipsum ductum urinarium usque ad radicem penis pervenire potuisset, sine insigni læsione partium, quas transtulit? Et quia perinæum nunquam in hoc viro male affectum fuisse, & tactus ipse, & ocularis inspectio (lubrica enim sunt omnia) fidem nobis fecerunt, & æger constanter asseruit, sequitur, calculum non in vesicâ, sed in ipso loco ubi extractus fuit, concretum fuisse. Id verò quomodo acciderit, non facile est scire causam enim externam hujus mali nullam ex ipso expiscari potui. Quædam tamen, quæ mihi in mentem nunc veniunt, adscribam: quæ si non vera, verisimilia tamen esse mihi videntur. Arbitror autem, ipsum ab initio morbi (hæc sine dubio nobis propter verecundiam celavit) excoriatione quadam, & postmodum c. ruicula laborasse, & proinde urinam sæpissimè retentam fuisse, donec tandem exorto abscessu circa radicem penis, relictus sit sinus & ex eo varii ductus & ulcera fistulosa, quemadmodum & te præsentem, sex circumcirca Scrotum & in ipso Scroto reperi. Toties itaque & quotidie collecta; imò & plerumque ad tempus retenta urina, in sinu ipso circa Scrotum, nihil video quod obstare potuisset, quò minus hoc in loco æque ac in vesicâ, concressere potuerit calculus, imò & forsan facilius. In vesicâ enim in sita illa facultas expultrix continuo operatur, & quod nocuum est extrudere conatur, quod circa

Scrotum minimè fieri potuisse, tibi notum est. Cur quæso in hoc sinu calculus generari non potuisset, cum & in Atheromate circa temporalem muscolum genitam fuisse materiam lapideam superiori anno hic mihi videre contigerit *Gust. & Abr. Hildan. Observ. Chirurg. Cent. 6. Obs. 57.*

### De calculo in vesicâ

Inter complurimos à calculo per me liberatos mihi in mentem venit Illustriss. D. Gregorius Malvetius, qui viginti annis elapsis in calculum vesicæ incurrit. Alios præter me consuluit Medicos, qui omnes calculo vesicam laborare asserunt. Hac de re medicamenta plurima frustra ipsi præscripserunt. Ad nos tandem venit, maxime cum ab illis intellexisset solam superesse incisionem, quam toto pectore reformidans, undique conquerere remedia instituit. Nos ipsi duo præscripsimus, in quibus ejus salutem repositam esse assero, & in eorum usu persistat: primum fuit herniaria cum betonica in jussulo carniū cocta, bibit quotidie jussulum ad tres vel quatuor menses; at cum ipse astrologiæ deditus esset, subexplorato, & benevolis siderum positu plantas eas colligi curavit. Secundum fuit astacorum Ruviatidum lapis de quo quotidie in vespertis 3ss. accipiebat cum succo Limonum. His duobus taliter sine convaleuit. Quid mirum si quindecim annis à sanitate elapsis sanguinem expuere coepisset, cujus occasione Patavio Medicos consuluit, sed eum ad propriam Civitatem remittunt, ubi post aliquod tempus in manifestam phthisim incidit: tunc quæ pluribus in hac re habitis consultationibus, extremum diem tandem clausit, quamvis sexagesimum quintum annum ægeret. Hic affectus raro senes adoritur. Unde quidam Medicus ad Eminentem cathedram erectus, morbum hunc non esse phthisim asseribat, quod ex Hippo. intellexisset, post trigessimum quintum raro advenire.

Admodum Rever. Pater, moribus & vitæ integritate clarus, P. F. Antonius Vernitius Franciscanus annos 45. natus, post varia tormenta, & infinita remedia pro calculo in vesicâ atterendo, me acceriiri curavit. Re citra spem habita, & potius de morte, quàm de vita cogitans, ad extremum coniugiendum esse statui, ne ipsum sine remediis perituum relinquerem: saltem itaque vitrioli subtilissimum, & ad extremam puritatem adductum ipsi statim exhibui cum jussulo carniū. Hora post ipsum assumptum vomuit & excrevit calculum satis magnum, ex quo confestim ab omni dolore liber evasit.

Vetula quædam annorum 60. in via quæ dicitur *il Borgo della Paglia*, longo tempore à calculo in vesicâ cruciabatur. Post multa remedia incassum adhibita, Lithotomus ad eam conducitur, qui cathetere calculo exploratō, de mercede paciscitur. At illa non tam expensas timens, quam operis sævitiam sic diu incurata manebat, ac vitam nimis insulam ducebat. Quum verò minus de salute cogitaret, ecce calculus ad orificium externum vesicæ se profert. Ad eam perductus consultum, ut sequenti mane pro viribus per civitatem deambularet, & ubi non sufficerent vires, aliquem secum perdu-



ceret cui per viam inuiteretur, & antequam egrederetur domo, pudenda bene mingeret oleo scorpionum: quod ad uaguem exequitur, unde vix domum reuera, calculum prædurum ovi Gallinæci magnitudine exheruit, non sine admiratione, à quæ excretionem libera penitus evaluit. *Prævia Poterius Observat. Cent. 3. & seq.*

#### *De calculo renum.*

Tanta est nephritici doloris affinitas cum dolore coli ut non raro peritissimos Medicos ambo deludant. Talis fuit is, quem nuperrimè patiebatur Admodum Rever. D. P. M. Joann. Evang. de Juncis, in celeberrimo canobio D. Francisci, ipse enim quindecim diebus atrocissimo dolore ventris premebatur. Locus doloris erat circa regionem renum per vretes se extendens, cum frequenti nausea, & vomitu, urinz erant multæ & tenues. Curationem aggredimur per communia, tanto magis; cum tres essent vocati ad curam. Prima die subducta aluo clystere emolliente accepit pluries de spec. Elescoph. quod statim evomuit. Sequenti die pulpa castæ cum Diaphenico adhibetur quod pariter per os rejecit. Interea fortis cum carminativis, bacc. lauri, Junip. menthæ, calament, majoranæ, absinth. tornug. lino, cymino, camomill. & melil. Est ejusmodi fortis oleis discutientibus, & aperientibus inungebatur, clyst. quoque discutientes cum decocto carminat. elect. de bacc. lauri, Benedict. laxat terebint. & similibus, frequenter reiterabatur. Cum dolor magis sæviret, s. pientissimè à seniore Medico balneum olei communis præscribitur: stat per horam in dicto oleo, à quo cum nihil levaminis percepisset, imò dolor vehementior redditus videretur, consultationem inter nos inire cepimus rem esse conelamatam videbamus. Vitrioli salem propono, & in his morbis verum esse rhizotomum. Abnuunt alii duo Medici, sed s. gacissime; nam ab assumpto tribus horis cessat omnis dolor. In quo satis videre est boni & legitimi Medici esse, Chimica remedia non spernere, indocti soli vituperant quæ ignorant. *Idem Observat. & curat. Cent. 3.*

#### *Calculus vesicæ cervicem deferens.*

Joanni Trassato tantum negotii, in senectute accessit calculus vesicæ: ut non modo vix unquam mingeret sine acerbo urgentis urinz cruciatu, verum rarissime quoque deambulet, sive subdilo sive in porticu, sine evidente doloris sensu, ob calculum vesicæ cervicem, miserandum in modum excarnificantem, donec tandem doloribus ac punctationibus cessantibus, libere denuo urinam reddiderit, adeptus non solum copiam agendi iterum negotia, à quibus aliquandiu abstinuerat, verum etiam quocumque proficiscendi periurè atque sanissimus.

Quam inopinatam rerum faciem, ut summè admirabatur Ager, sic non levem conjecturam movit Medicis, calculum stationem suam, ex qua tam atrox intulisset bellum, seu remediis sive tempore deseruisse. Indeque turbas recedisse, pacemque corpori tandem concessam, à qua tamen sententia æger adeo fuit alien-

nus; ut potius crediderit, se nihil unquam à calculo, verum omnia ab iudurato aliquo tumore, cujus pondus etiam num circa anum perentisceret, pepestum fuisse. mansitque ipsi hæc opinio ad extremum vitæ habitum. Facto vivendi line per omnimodam urinz suppressionem, ubi integrum quinquennium satis comode habuisset. & producta ab anatomico in lucem veritate, quæ hætenus delituerat spissa caligine sepulta. Cujus beneficio vidimus durum aliquem tumorem prope velicæ cervicem situm, in causa fuisse, quominus profluxerit ipsi lotium, sive sponte sive meatu quoque per catheterem reterato, idque ex vesicâ, aqua, id temporis, maxime repleta, quod mulicatum tumoris genus, instar carunculae tunica inclusæ, ante velicæ exitum propendens, uti huic ægro exitio fuit, sic etiam clanculum aliorum vitis insidias struxit; ignorantibus Medicis quo referrent exitialem suppressæ urinz causam; ea enim fuit tumoris forma, ut elevata à cathetere, illud tamen ita complecteretur, ut nihilominus impediretur urinz effluxus, in quod haud leviter admirari licuit impervestigabilem Dei s. pientiam, cui numquam desunt ministri quibus animam ex hoc ergastulo ad meliorem evocet vitam.

Sed quid dicemus de calculis, qui primum maximum, deinde verò nullum excitant cruciatum? erant hi duo, & quidem satis ingentes, in principio, atritu suo vesicæ cervici molesti, mox vero pondere suo adeo extenderunt sequacem vesicæ membranam ut paulatim descenderint, ad quatuor transversos digitos, à prior statione; provoluti quasi in sacculum vesicæ adhaerentem in cujus receptaculo, etiam calculum suum dicitur conclusum habuisse, Vir incomparabilis eruditionis Isaacus Casaubonus, fuitque hæc loci mutatio verissima Causa illius levaminis, quod æger percepit postremis vitæ annis deficientibus Deo optimo maximo nunquam auxiliis, quibus etiam sine medicorum ope, ab intricatissimis morbis vindicet miserum hominis vitam. *Nicol. Turpinus, Obs. lib. 4. Cap. 45.*

#### *Calculus Vrethra.*

Filio Rectoris Campensis succreverant ab incunte ætate, in medio urethræ ductu, plurimi calculi qui illum paulatim distenderunt, ad instar pugni puerilis, adeo ut singuli distinctè manu palparentur; illato tamen ne minimo quidem impedimento urinz exituræ, quem tumorem sexto demum ætatis anno ablaturus Chirurgus, aperuit scalpello colem, prope lineam intermediam; in musculis urethræ dilatationi dicatis; eductisque inde quinque & viginti calculis, instar maximorum pisorum, perduxit vulnus ad cicatricem, puerumque ad pristinam sanitatem, ante diem sextum, sine ullo fistulæ metu, nedum pervio hiatu, per quem invito efflueret vel minima urinz guttula, usque in decimum post sectionem annum. *Idem Obser. lib. 4.*

#### *Calculus per lumbos excretus.*

Juriconsultus natus patre calculoso, eidem-



que cruciatui à puero obnoxius, vixit aliquandiu miser, & tum quidem hoc miseris, quod calculus à rene per lumbos expulsi reliquerit ibidem vicus callosum, produens perpetim urinam ac pure, & quidem mixtu tam perenni ac diutino, ut nec tempore nec remedii, nedum aquis spadanis aut theriacis Aquasgramentibus ullam persentiret opem, quia potius, occluso per lumbos exitu, ac derivato deorsum sordidissimo pure, inciderit tandem in febrem acutissimam, quæ ipsum miserandum in modum occidit.

Cui fortuitæ calculorum per lumbos eruptioni, forte innixa est sectio illi, qua Ronsetus tagit, per scalpe lumbi, calculos ex renibus elicere, sed recte, an perpetam, viderint illi, quibus notus est cum ipsorum renum, tum calculorum inter concretorum sitis, qui ut non semper sunt uniusmodi, sic discrepant interdum evidenter formâ, loco, numero, ac magnitudine: dispersisque radicibus per renum carnem insident nonnulli penitus ipsorum substantiæ; quam ut sine omnimoda ipsius dilaceratione inde extraherentur: quid quod, dissectis tubulis ad papillares processusive glandulas serum provinentibus, necenariò consequatur, perenne illud, quod jurisconsultum hunc pessumdedit, Ullcus, quod non minus molestem arbitror, quam ipsum calculum, in renibus permanentem, ne quid jam dixerim de lumborum nervis, vicinis venis ac larga peritonæi incisione, quorum omnium anceps eventus facile plus damni quam emolumenti afflictiis daret. *Idem eodem libro.*

*Urina transiens renis calculo per sedecim dies obstructa.*

Plurima reliquere nobis doctiores exempla diuturnæ urinae obstructionis renum calculis exorta, nullus tamen eorum, quod sciam animadvertit accidisse, ut urinae cursum prædicta causa per sedecim dies stiterit, nisi tamen illud anno 1661. in Mauricio Gerardi Boichuæ moderatæ vitæ homine, ac septuagenario, valido tamen etiamnum, ac sano videre contigit. Is per horas aliquot cursum vacuus, in agere secundum Mosani flumen, ac descendens, ut urinam excerneret, eandem sanguinolentam vidit: Ac, quoniam lapis rhædæ agitatione, corporisque hinc orto motu mobilior, minusque adstrictus factus exinde sensim in inferius vergeret, omnis omnino lotii retentionis causa fuit, ac sextodecimo denum die transiit lotio patuit, postquam varia emollientia tam interna, quam externa clysterum videlicet, fomentorum, balnearumque &c. à diversis Medicis illi præscripta, atque adhibita essent, quo etiam tempore calculum ille oblongum emisit, qui nuclei pini magnitudine par erat. Interea tamen per illos dies ipse præ nimia oppensione, urinaeque impedito exitu hanc et salissimam aliquoties vomitu eiecit. *Cornel. Stalpart. Obser. rarior. Cent. 1. Obs. 31.*

*Calculus per vicus prope inguen emissus.*

Mense Junio 1660. cum Chirurgo H. Dorlé, intellexi filium J. Brouwer decem annos

natum, ad quem vocatus eram, per aliquot dies nihil omnino lotii excernere potuisse, nec tamen tunc quidem ulla notabilia calculi renum deprehendimus ex accidentibus indicia, cui licuisset urinae retentionem attribueret: Nulla insuper aderant signa, quæ vesicæ proderent calculum, quoniam Chirurgus, al quoties immisso ad facilitandum lotii transitu cathetere, nihil omnino obstaculi, duritieive senterat. Postquam itaque puer hic dies aliquot satis miser transigisset, in dextra parte prope scrotum, nec procul a virgæ radice, versus inguen abscessus apparuit, qui non ita diu post versus partem anteriorem rumpebatur: hæc tamen antequam herent scroti, nec non penis cutis præputiumque ita intumuit, ut in videre hoc necesse habuerimus, ut apte ad urinae transitum promovendum intromitti posset catheter, tandem verò Calculus phæcoli instar, variegatoque colore, ut solet in minor, prodit; puer autem tam per Virgam, quam per foramen prope inguen continue trious etiam post annis lotium excrevit, quamquam hoc sensim minutum, ac tandem sanatum fuerit. *Idem ibidem.*

*Calculus per inguen prodians.*

Vidit frater meus *Joan. Stalpartius vander Wiel*, ut & Chirurgus *Arnoldus de Wilde* in Hagienæ quidam quiddecim annorum adolescentem, cui post diuturnum dolorem, cujus causa erat ureteri inhaerens calculus, tandem vicus in inguine ortum est, per quod ille exiens ægrum dolore liberavit, fistulâ tantum ibidem superstita, per quam continue guttatim urina stillabat. *Idem ibidem.*

*Calculus vena Thoracica.*

Calculus quem nobis aliquando obtulit arteria aorta, corpori inclusa, illum nunc demonstratum venit vena Thoracica foris obvia, cujus os, ab interno abscessu reformatum, apertumque novum hunc hospitem non secus complexus fuit, ac scapula ille tumor, in quo te sit, Joanne Schenkio lib. v. Ferrandius senior contexit simillimum calculum, a sanguine firmiter concretum.

Jano Mulerio integrum trionnium à suppurata pleuritide divexato, tandem exortus fuit, circa extimam ulceris oram, prædurus tumor, continens in se, sphericum, ac inæqualem calculum, insidentem arcu vena thoracicae externæ, cujus magnitudo, ut nuci avellanae, sic forma fuit finissima racemo uvarum corinthiacarum, quibus calculus hic rotundis, splendidantibus, ac atris suis acinis adeo fuit æqualis, ut vix ovum ovo videri similis possit. Exorto procul dubio nigro illo colore, ex adusto venæ sanguine; uti alba, quæ inferius obducebantur, crusta à candicante puris recremento.

Agedum Chirurge, faciant te interdum inveterata ulcera, ludisque non raro operam in tumoribus duris, ignavis, loco puris, aliquando calculum in se maturefcere. Vis filium Ariadnum, cujus ductu felici iter ex hoc labyrintho evades, sequere quod propolui exemplum & considera attente, nam illicus hic



hic hospes clandestinè alicubi delitescat. *Ni-  
vol. Tulp. Observ. Medic. lib. 4. cap. 22.*

### Calculus.

Rutgero Schorer, filio, parvus calculus cum summis doloribus per ureterem ad vesicam descendit, inde vero paulò post in penis mecum expulsi. cum ob magnitudinem transire non posset, mediæ urethræ inhaesit, atque urinam totaliter obstruxit. Variis modis illius extractio tentata fuit, sed frustra; tandem autem cum ad doloris immanitatem etiam partis inflammatio accedere animadvertetur, eundem sectione extrahere necesse fuit, quod propter curæ aliquantum sursum versus glandem attracta, Chirurgus Urethram in latere loco ubi calculus subsistebat, sectione aperuit, atque inde calculum extraxit, quod vulnusculum postea facili negotio rursus consolidatum fuit, puellor nullum incommodum inde retinente. *Isbrand. de Dismembr. Observat. & Curation. Medic. 73.*

### De Calculo Renum.

Civis Bergensis conquerebatur de dolore dorsi e regione renum, vomuit, urinae retentio aderat, & difficulter nec sine dolore aliquid ejus excernere poterat. Adhibui enemata, dedi lithonriptica varia, balnea, & fomentationes institui. Dolorum quidem acerbitas mitigabatur, & sentiebat calculum magis magisque descendere, permansit tamen in urethra, per ostidium & eo diutius. Deinde ex improviso omnes dolores evanescere, urina libere nuebat, appetitus rediit, sed nullus excernebatur calculus, ita ut dubium nobis esset, an unquam calculus adfuisset, sed signorum syndromen, animi tritina ponderans, & quod ante aliquot annos etiam calculum excrevisset, calculum adhuc latere persuasus sum. Quid sit, per 10. dies integra fruitur sanitate deinde subito recrudescit dolor cum ischuria; dedi diureticum cum lithonripticis, & excrevit tum demum calculum magnitudine fabæ. Qui proculdubio tam diu hospes fuit in vesica. Idem ante biennium dolore nephritico affigebatur, descendebat calculus in vesicam ubi adhuc latet, & interdum liberum transitum urina impedit; cum verò id sine dolore fiat, medicinam non admittit: Et si ipsi prædixerim, calculum quotidie augmentum capturum, & olim ipsi causam mortis præbituram. *Got. Christ. Winkleri.*

### Insolita calculi in corpore transeuntis via.

Femina hujus urbis, Reverendi cujusdam Amici filia anno 64. de summa deglutiendi difficultate conqueri cepit, cum vehementi in collo dolore. Huic sperma ceti cum ol. amygd. dulc. camphora & syr. ex viol. &c. commistum; ad minoris cochiearis capacitatem noctu assumere præcepi, dolor non nihil tenuit. Altero mane repetiit eandem mixturam, non ita diu postea quidpiam, à collo ad dextram sub diaphragmate latens, tanquam in globum sclopeta-

rium veloci motu transire sensit. Emplastrum tripharmacum ad bidui tempus ibi impositum habuit. Exinde pari velocitate dolor ille ad pubem descendit, ibique moratus, donec postunctiones & cataplasmata tres calculos pisa superantes ex vesica ejecit, nullo hæcenus subsecuto incommodo *Joun. Georgii Volcaneri.*

### Effectus pathematum animi in Calculo.

Illustris quidam legatus Batavi calculo rehum afflictus, & moræ curæ permittus, cum ægrius potaret pharmaca, hoc gravus aliquandiu cruciabatur, sed in mediis doloribus postquam superveniens tabellio latum nuntium e patria attulisset, e vestigio produxit sponte calculus; & nobilissimum ægrum sollicitudine duplici levavit. Hæc in latis, quid in tristibus possint, nunc intuebamur: *Dorothea Mutha* vidua aum honestissima secum dormiens, & jam diu nullos calculi labores experta, cum à famula per tumultum excitaretur ob incendium vicinis domibus imminens, subito gravissimos renum cruciatus sensit, à quibus expediri non potuit, nisi excluso denum grandiori calculo. Non formavit hic metus calculum, sed quietum loco suo excussit: non ibi læticia ejecit lapillum, sed valè ampliavit ut facilius ejiceretur. Adeo stringit, arctatque fornido, aperit hilaritas. *Olaf Norrichii.*

### Quid faciat aliquando immanitas doloris à Calculo induci.

Dolui ex animo, cum ex *Antonio Guainerio* aquæ *Gabelcheverum* legerem, Vitum quendam bonum, cum diu dolores calculi crudeles patientissime sustinueret, tandem victum acerbitate cruciatuum animam suam infesto Dæmoni committente, modo à doloribus liberaretur. Mitius fortasse magnus ille Macedo, sed tamen vehementissime doluit, cum auctore *Carrione*, epoto jam Herculis scypho, repente velut telo confixus ingemisceret, & ferrum posceret in remedia. Parum absuit ab honorato quodam viro nostrate, peregrinationibus claro, similis fortuna: is postquam diu luctatus esset cum infelici stomacho; omnia cibaria per vomitum rejiciente aliisque doloribus hypochondria vago, sed acerbissimo cruciatu affligentibus, aliquando cum ex lege amicis ægrum inviserem, præsentem medico ordinario ad utrumque conversus, inquit, quod graviter sauciat conscientiam meam occidi hominem & manus innoxio sanguine inquinavi; proinde iterum iterumque per omnia vos sacra obtestor, ut Regi mox atrox crimen meum aperiatis, ne diutius justum supplicium eludam, & animæ periculum adeam desperabundus. Nos circumspicere omnia, notare vultum ægri, habitumque, & cum constaret eum sanæ mente ex meditato ita loqui, ambigere, utrum doloris impatientia hæc verba dicaret, an vulnus conscientie. Abegantes premere illa silentio constituimus, & alia v. t. e. in circumstantias facti operosius inquirere, ne vel amico, vel veritati deesse videremur. Reddebat ergo post dies aliquot, & de statu ægri perentia-



Et or. Ille vultu sereniori, inducias, inquit, hodie experior, non ita acriter me laniant dolores, cum adules superiorem diebus, ea fuit tormentorum savities, ut quancunque laniem malle, quam eandem ulterius sustinere, proinde studio dixi (ita me superiorem mente) commissam a me eodem, ut vel pulchro supplicio domesticum hunc & quotidianum tortorem evaderem: De militaribus ingenis hic ego nihil, ut quibus non infrequens est gladio vel sclopeto imperare doloribus suis quoties aliquanto diutius acerbiusque perseverant. *Olei Borrichii.*

*De Olei succini nimis largiter hauri noxa.*

Optimè apud nos existimationis Juvenis Mercator *Christophorus Meisen* *verapianus*, nephriticis doloribus sapienter fere oppressus, *Meisen* me rogat, quo necessitate urgente in absentia medicato uti possit. Recomendo *Oleum succini*, cujus aliquot subinde assumere guttas non abs re fore inculcabam. Annuit, neque ingratum sibi hoc remedium fore respondet. Post septimanarum aliquot decursum obvius mihi fit in platea, & pro communicato consilio grates agit prolixas: scutulam mihi monstrans variis repletam calculis, minis fabuli instar, medius cicerum magnitudinem referentibus, & maximis pisa æquantibus, plerisque utem acuminatis. Ecce, inquit hosce hostes omnes una profligavi opera, compendii reifaciens; tu aliquot me guttas assumere voluisti, ego medium & amplius cochlear oleo isto repletum vice una exhaui, firmiter credens, ex parva dosi parum me Levaminis sensurum; ex copiosa autem majus me emolumentum habiturum: nec fefellit me mea opinio, nam uno impetu, non quidem sine dolore, illi in quam monstrum excrevi quantitatem. Male, Respondeo, tu consulisti sanitati, & certam temeritatis tuæ certo augurio penam lues; ex inordinato enim & impetuoso diuretici hujus vehementis usu, vesicæ orificium ita laxum deprehendes, ut nullis remediis impressa hæcce labes corrigi valeat. Et quamvis in prognosi hac me errasse maluissem, tamen Eventus docuit, certissimum satis fuisse hocce præsagium; nimirum brevi post tempore exulceratam esse vesicam, signa monstrabant non obscura; namque urina cum dolore excernebatur, eadem cruenta primum apparebat, post crassum album, matulæ lateribus firmiter adhærens sedimentem sese monstrabat, quod sæpius cum & sine dolore in copia excernebatur, quæ copia ad eam tandem crecebat molem, ut mediam matulæ partem non semel adimpleret: & cum potentissimi illius diuretici usui labes vesicæ impressa esset, inflammatio tandem loci affecti accedebat, cum febre continua intensa, unde maxima pectoris anxietas oriebatur, quam extremorum mox in frigidatio ob Nervosorum partium læsionem, hanc mors post paucorum dierum decursum excipiebat *Johann. Schmidii.*

*Calculo laborans puer immunis factus febre pestilenti accedente*

Morbum morbo curari insolens non est. Hydropem febris sanat exsiccatione humorum,

& volvulum copiosa urina 6. Aph. 44. & capitis dolorem aph. 51. Ita & febris pestilenti us absumere potuit in puero calculosam materiam illâ ætate fluidiorem. Observatum multis a peste convalescentibus vocem dulcissimam fuisse exsiccatis faucibus. Si bubones adfuerint, multorum in corpore puerili malorum evacuatio letuta. A calculo verò liberatum puerum post hac securum esse jubere, nisi dispositio hereditaria adsit. Induciarum enim erunt, nulla pax. *Th. Bartholini.*

*Veronica usus in calculo.*

Ut gutta cavat lapidem non vi sed sæpe cadendo, ita non raro medicamenta simplicia & viliora subinde assumpta effectum relinquunt plane mirandum, cujus schemata oculis meis exhibuit ante aliquot septimanas, *Ulysses*, tutoris cujusdam vidua, quæ calculum per 16. annos intene aluit sinistro qui tot cruciatibus illam afflixit, ut viribus omnibus assumptis, nihil sceleton vivum repræsentaret, & ob summum crucis stuporem, & reus dolorem in illo latere per totum illud tempus nunquam dormire potuerit. Tandem consulenti assentientis, quotidie *Decoctum veronica*, & quidem initiis magna dosi pertractum aliquem temporis assumpsit, quo effecit, ut *Calculus* priorem relinquendo Nidum, alium querens ad vretes protrusus fuerit: ubi infirmitas anxietates excitans, ipsam inter nortis & vitæ discrimen contulit, tandem tandem assumpto largiori *Decocti veronica* dosi, vesicæ receptaculo fuit ubi miseram stultitiam & difficultate urinae diu vexavit, donec ab usu præ superiori nominato decocto, & ejus fomentatione, natura hacenus dormiens, expergefata, maximis & iis conatibus, quibus animas a foetu se liberare conatur, excitatis, Hospitem peregrinum cuspide expulit, qui tandem vi ipsa ægra per collum vesicæ extractus fuit, & quidem non absque summa illius læsione, & copiosa hæmorrhagia. *Jochimi georgii Elseri.*

*Calculus panis silicis in vesica pueri medicamentis fractus & expulsus.*

Puellus sex annorum, senatoris Helsingburgensis filius, calculo vesicæ tentatus, alia atque alia suavitum amicorum & parentum deglutiens, quibus nihil pronicientibus ab Agyta, qui commodum in urbem advenerat, & intra triduum promiserat liquefactum iri calculum, recipit potionem medicatam acerrimi saporis, factorisque ingrati; & postridie reddit non calculum, sed urinam oppido cruentam, variis hinc inde filamentis ex interiori vesicæ tunica abralis distinctam. Perseverante autem plures dies urina sanguinolenta, nullo autem calculo in conspectum veniente, proripit se circum foraneus & ægrum miserabili ejulatu omnia replentem deserit. Puellus deinde inter dolores hos Hafniam delatus mox indei committitur. Adverto inter meiendum intolerabiles cruciatus, video strigmenta innatantia urinae filamentorum, & tunicarum minutarum specie, agnosco crassius subinde in lotio sabulum. Igitur nullum ab acerbis præsidium mutandum ratus, balneum



Samum sulphuris terebinthinatum, & oculis cancer. crudis in alkohol redactis, cumque saccharo remittis in pulveris forma temperatum offero ad plures dies, eo consilio, ut læsa partes vesicæ (si tamen coalescere ex unquam possint in loco tam acre lotium perpetuo sentiente) sensim coeant, & calculus nihilominus attereretur. Quo effectum id quidem, ut gl. res. & minutiora quædam calculorum frustilla alternis fere diebus externerentur, & urina non cruentaretur amplius, dolor tamen in meiando vix tantillum interquiescebat. Ventum igitur ad terebinthinam ipsam aqua virgæ aureæ, & plantaginis elotam, ut glutinando aptiorem, quam & aliquandiu cum pulv. ocul. canceri in morsellos (quos vocant) coactam usurpavit, successu nondum satis exoptato. Tandem diu propinatus ex lap. judaic. lap. Lyncis, crysall. mont. & ocul. cancer. pulvisculus ad novissimè præstitit ut Calculus magnitudinæ juglandis minoris, silicæ duritiei in frusta fabis aqua contractus exierit, certas tracturæ notas secum asserens. Læsa tamen membrana vesicæ interior nondum plenè coaluit, nec fortassis bona inde coalesceret unquam, ob continuu lotii erodentis affluxum, ut vel hinc constet, quod meretur agyrtarum natio, quæ ita impune per mortes & vulnera ad divitias grassatur *Olivi Bartheolii.*

#### De mirabili calculi vesicæ cura.

Calciuum vesicæ pergrandem, & duos lotiones cum dimidio aliquotque granis æquantem pondere, attulit mihi femina quinquagenaria Eckelsurdana, quem cum rarè commendent circumstantiæ, æquum ratus ut illas quoque curioso vultu adspectui exhibeam. Misera illa consilium rogans, quæ nimirum ratione vitam jam tot molestiis tractam paulo liberiores ab his agere posset, conquiescit initio est se totos annos duos immanes circa Epigastrium dolores sensisse, nec tamen vel proprio aut aliorum instinctu cognovisse, quid ibi male lateret, sed imprimis propter angustiam rei familiaris, medicorum opera uti non potuisse. Tandem cum impendente vere melius, & cæli temperatio aura spiraret, suaseret vicinæ, ut animi relaxandi causa, una ad navem onerariam noviter constructam pertenderet, in quod facillè consentiens, quantum vires permittebant, comitatum secuta, & ad or. in navis perveniens, cum illam sublato pede transcendere vellet, divaricatis cruribus medio Epigastrio in rude lignum impingit, insidens ei instat eorum, qui equo veniunt, quo casu fere examinata, & a vicinis domum deducta, tantis cum doloribus circa inferiorem ventrem conflictari cepit, ut omnes eam statim enorturam crederent, sed ipsa illa jam ultimis confecta laboribus natura tamen victricis beneficio adjuncta, corpus aliquod solidum cum tanto fragore & tonitru, ac si lapidem fulminarem nubila emitterent, naturalibus est ejaculata. Quo sonitu percussæ assidentes mulierculæ, propius se lecto admovent, & quid agræ accidisset, quarunt, quæ ut de dolore dextri femoris querebatur, lodice & stragulis retractis, quo suppetias ferre laboranti possent, reperiunt

ibi calculum ingentem in pedem explosum *Joëlis Langelotti.*

#### De Autolithotomo.

Non ut novi aliquid proferam, sed ut pridem à Præillust. Dn. *Nicolao Tulpio.* observationum suarum medicarum L. 4. C. 31. divulgatam de Autolithotomo Historiam confirmatam magis redderem Picturam cultri atque lapidis una cum authentico Testimonio, Belgicè idiomaticè Amstelodami tunc edito, nuper vero nihil à plurimum Rev. & clariss. Dno. *Petro Veldio*, Pastore meritissimo Belgicæ hujus loci congregationis, communicato, qui hoc ipsum exemplar dicti Testimonii ab ipso met Dno. Henrico Muon. Ultrajecti acceperat, pro Ephemeridum curiosarum exornatione si exhiberem, minime curiosis lectoribus ingratum fore existimavi, quod ita se habet.

#### Genuina Relatio.

De Mirando nec unquam audito facinorè *Joann. Janssonii* de Doot Fabri Amstelodamensis, qui semetipso selesissima sectione liberavit à calculo præmodum magno, hic depicto; quod inscriptione propria fabri & sequentibus actis Notarialibus confirmatur.

Comparuit coram me *Petro de Bary*, Notario publico curiæ Hollandicæ, Amstelodami agente, & contestatus est sequentia *Joann. Janssonius de Doot* junior, faber hujus Urbis, habitans in vico Engelsche Steegh dicto; ætatis circiter 30. annorum, & veris verbis jurato coram nobis instinctu Do. Henrici Miron Ultrajectini narravit atque professus est, quod verum & veritati consonum esset, quod testatum iret, diu multumque temporis se gravissimas ægrotudines & tormenta à calculo passum, jam tum his sectionem perpassum esse; quinto Aprilis proxime elapso, cum dolor intensissimus, supra modum gravis, nec perferendus esset, seniet cultro vetusto ac ferè præfracto ipsi calculum excelsisse; Ea in operatione referebat neminem adfuisse præterquam discipulum, qui solummodò cultrum una cum aceto & similibus procurasset itidem contestatus est calculum ponderatum esse, & deprehensum, quod quadrantem unius libræ penderet. porro retulit, se ex charta affinxisse atque petentibus a se dedisse calculi magnitudinem & formam juxta cum delineatione supra dicti cultri, quo sectionem perpetraverat: simul asseverans verosimiles picturæ Calculi inscriptos, propria suâ manu se scripsisse, meditatam esse & composuisse. Omni bona fide acta sunt Amstelodami presentibus *Nicolao Blyenberch*; & *Arnoldo van Erp* loco testium ultimo Madi 1651. *Salom. Greiseltij.*

#### De Calculo Vesicæ feliciter exciso.

Fœmina quædam Bergensis, vidua, patre calculoso, imò calculi doloris atrocitate tandem è vivis sublato, genita, patiebatur hand inconsoletam alias dolorem Nephriticorum acerbita



bitatem, & durante, affligenteque illa calculum descendere sentiebat per ureterem dextrum in vesicæ cavitatem. Ille antecessorum & succensorum non carebat caterva, & inter illos, sex fabæ majoris magnitudine numerabantur. Hic verò per septem integros annos in vesicæ capite, te moram trahens, sæpius summis doloribus molestinus fuit, ita ut misera ad omnem motum, præcipue concitatiores inepta esset. Varia hac annorum intercapedi ne experta est remedia, sed sine alicujus emolumenti perceptione. Septennio hoc elapso, acrius & renitibus, haud sine doloris sensu deiecit calculus, qui septennem magnum & molestum hospitium suo abscondito extruxit; hic exitum querens collum vesicæ occupavit, urinaque transitum liberum incepit. Ego tum primum accersitus, omnibus viribus eo contendi, quo calculi compagem, quoquo modo tam internis, quam externis medicamentis dissolverem, persuasus ab ægrâ, me, & semetipsam fallente, calculum in duo frustra ruptum esse. Cum itaque quotidie haud per riam arenularum copiam, cum urina, quam vix eâ quantitate, quam cochlear caperet, una vice emittebat) excerneret, hujus curationis scopo, mensibus duobus intiri. Accessit interim febris, imò lipothymia & convulsiones, omnia tamen medicamentis præscriptis & exhibitis manus victa; præbuere. Tandem spe calculum comminandi frustratus, obstetricem Lugicensem expertam, Olaviæ apud Serenissimum Ducem tum temporis degentem, accersivi, quæ calculum catheteris ope explorans, ipsum natis juglandis putamini viridi memæ magnitudinis & duritiei scilicet esse, pronuntiavit; mover illum suo loco, digitorum & olei amygd. d. per syringam immixti adminiculo, sed sine levaminis sensu. Ad extremum itaque remedium, scilicet sectionem inclinans, de viro hujus artificii gnaro & experto sollicitus fui, sed neminem, qui huic operationi sufficeret, vel illum sustinere auderet; reperire potui; donec tandem post trium mensium continua tormenta Urbani Joannis Hölst, Chirurgi Uratislaviensis expertissimi dexteritas nobis commendata fuit. Eidem itaque mox inde accersito Chirurgum nostrum culicum Fredericum Springerum, adjunximus, cum utroque de sectione colli vesicæ intra vaginam uteri deorsum faciendâ deliberrantes; cum vero *Semerius* l. 3. p. 8. sect. 2. cap. 2. excretum videret calculum à femina ovi gallinæei magnitudine, & *Fabritius Hist. danica libro de Lith. ves. cap. 22.* Extractionem, si possibilis sit; per collum vesicæ summo opere suaderet, illam prius tentare volumus, nihilominus ad sectionem, si opus non succederet, parati. Itaque in N. D. die 29. Octobr. anno 1675. cum ægrâ 4. annum intrasset, precibus ad Deum suis, præseunte nobis viro admodum reverendo, celsissimoque *Dr. M. Joann. Christ. Leschio* Parocho ac Seniore Bergensi meritisimo, manè h. 10. rem aggredientes, speculum uteri vaginæ ipsius indicimus, collum vesicæ haud continendæ amplitudinis invenimus: Calculum in eo delitescentem deprehendens præfatus Chirurgus, torcipe arripit, & spem bonam ad extrahendum absque

sectione calculum præbet; sed frustra, et tribus vicibus, summâ cum ægrâ debilis constantia & Chirurgi industria id tentaretur. Cum itaque misera lipothymia corripere, ab opere desistere coacti sumus. Manè diei sequentis rem aggredi non ausi sumus, propterea quod uteri vagina valde tumefacta, ægrâque summo opere debilitata esset, itaque hac ut refocillationi operam dedimus, & tumorem, dolorumque tomentationibus sedavimus, lectionemque in crastinum distulimus. Invitavimus quoque hac die ad comitium *Dr. D. Lohm. Jernum*. Archiatrum Serenissimi, nunc proli dolori denderatissimi nostri principis, & cum niter sectionem crastinâ lucet, & quidem in inferiore parte colli vesicæ instituendam concludimus.

Etiam enim *Fabritius Hist. danica l. cit.* hanc sectionem dissuadeat propter metum incontinentiæ urinæ subsequatur ex læsione sphincteris, tamen putavimus consultius esse manum instituere in illa parte, ubi minus periculi vitæ immineret, etsi molestim quandam relinquere. Nam in superiore parte vesicæ membranam substantiam lædi, ipse *Fabritius* tacetur. Huc accedit, quod propter ossis pubis obitaculum, calculus non ita commode extrahi possit. Novam etiam forcipem cum dentibus aculeatis cudi curavimus, ut armius calculum apprehensum tenere, & in eo vetigia figere possit, ne ut antea elaberetur. Itaque, 31. Octobr. manè h. 10. iterum convenimus, & precibus ardentibus suis, ægram valde debentem & dubiam salutis decenter ligavimus. Prognostico in omni eventum nos munivimus, & sectionem per manum Chirurgi præfati Urbani Joannis Hölst præfato modo institimus quam summa cum ægrâ constantia facta, forcipem novam a *Dr. Springer* accipit, calculum e. arripit, summo conatu illum extrahere nixus est, sed rem perficere non potuit; ægrâ valde anxio, & præ dolore clamorem alta voce edente, quâ anxietate nos omnes affecti fuimus, vix dici potest, modo hanc, modo aliam animo volutantes causam impedimenti. Tandem Chirurgus forcipem retrahens, animadvertit illam non probe induratum fuisse, & ideo incurvatum calculum non tenuisse, eam rejiciens, alteram accipit, calculum arripit, & feliciter extrahit. Exilarata ægrâ nobiscum, vinctulis soluta, & vulnus debito modo deligatum est, sine ullis lipothymias vel magna sanguinis profusione. Calculus pendens 3jss. incisi, forma fere æquabat renem vervecinum. Tempore operationis ægram refocillavi convenientibus cordialibus externis & internis. Febris prægressa adhuc comitabatur ægram, imò vires majores acquirebat, tremor quoque & deliquium animi die tertio accessere. Præcipitantia plura prioribus addidi, & enema applicari curavi, unde melius habebat. Cum die 3. calor adhuc perseveraret, & compressio ventriculi accederet, julapio confortante ipsam reñci, enema reiterari, & ol. menth. ventriculi regionem hujus curavi, quibus adhibitis remiserunt illa symptomata. Dies septimus gravis admodum ipsi erat, cum summa virium debilitate, & ventriculi compressione; sed die octavo excrevit cum sabulo copioso cal-



calculos duos, quorum unus l. b. m. minorem a. u. b. t. quos l. remans descendit & præcucio. unum symptomatum causam existisse, putavi. Hos sequebantur die nono, & sequentibus membranaceum quid, de quo deditavimus, utrum vesica forte forcipe abstraxit tunica interiorum membrana cal ulum in voveus eider? Die decimo præter spem & opinionem menstrua, præterito mense suppressa, satis copiose redeuntia, pelum & canalem e vesicæ collo extrudere, ita ut saltem fomentationibus uti potuerimus. in hinc undecim nigror obortus est, per tres quadrantes horæ durans, subsequente calore p. n. Sed reitertis antea percriptis, iterum evanescere hæc symptomata. Dum itaque vires recollegisset, & vulnus magis magisque coalesceret, hoc decoctum vulnerarium præscripsi.

℞. Rad. Pyrol.

Consol. farac. an. ʒ j.

Herb. Betz. alb. & rubr.

Alcham.

Artemis. rub.

Sanic.

Agrimon. an. m. ʒ.

Herb. Beton.

Veron. an. m. ʒ.

Flor. Borrag.

Bugl.

Nymph. alb.

Acac. an. p. j.

Hord. m. j.

Coq. in f. q. aq. f. ad f. b. ij. col. dulc. syr. pomor.

Sic vulnere conglutinato, urina tamen prædicta incontinentia remanente, iniectione in collum vesicæ facta sphincterem contortare tentavimus, sed frustra, incipiente Decembri diabetica fere affectio cum febre & hydropis afficitur principio eam infestabant, quæ tamen omnia remediis methodica dexteritate præscriptis evanescere. Anno 1676. Initio Februarii, febre continua putrida affligebatur cum dolore hypochondrii dextri, ita ut venam secare necesse fuit, quem ab Apoltemate in hepatis parte gili a oborto, accidisse inde putavimus quod deinde per urinæ ductus pus longo temporis intervallo excretum est, accedente iterum Hydrope. Hydrops quidem aperiensibus & purgantibus usurpatis evanuit, sed pus tamen per urinam identidem exercebatur.

Interim novus calculus è rene dextro mense Maio descendit, haud sine dolore, locumque magni sui antecessoris occupat, metum ne in ipsius magnitudinem cresceret incutiens. Variis ipsum aggressus sum remediis; tamen continuo usu *Tinctur. tartar.* die decimo octavo, Junii expulsus est. Ablegavi illam deinde ad thermas Landecccenses, quæ in tantum profuerunt ut non saltem ab apostemate hepatis, sed etiam ab urinæ incontinentia maxima parte liberata, adhuc sana degat. *Grosf. Christ. Wincleri.*

*Calculus vesica insignis feliciter excretus.*

P. P. anno 1670. die 16. Maii, venit ad me à Pago Muschenheim prope *Burubacum* mulier 50. annorum, querens se magnum circa ingui-

na & in emissione urinæ sentire dolorem, urinæ erant mucilaginosa. Ego de calculo vesicæ judicare incipio, præscribo ipsi leni purgans pulverem lythontripticum & fomentum externum. Quid sit? cum continuasset usum medicamentorum præscriptorum per 6. dies, excernit calculum asperum, & quod durum, nullam per excretionem in meatu utinario sentit lesionem. Comprobavit casus hic eo ipso, facinus, asserto Medicorum, in mulieribus quam viris, ob viarum propinquitatem, calculos vesicæ posse excerni, ponderavit calculus ʒ ʒ.

SCHOLIUM.] continile exemplum in foeminis facilioris calculi exitus videre licet apud *Borel. Cent. 2. Obs. 22.* ubi puella excrevit calculum ovi anserini magnitudinis, & forma calculum instar ovi gallinæ apud *Tob. Bartholin. Cent. 1. hist. 71. Joan. Ant. Ciceron.*

*Calculus vesica sponte dissolutus.*

I. M. Vidua pietate & honestate maxime conspicua post perpellos aliquot annorum decursu ingentes a lithiasi dolores, eorum tandem sævitia delassata, nullo remedium genere, quamvis sollicitè usurpatorum, proniente gangrena etiam partes obscenas occupante anno M. D. C. LXXV. 16. Cal. Junii, ætatis verò septuagesimo, succubuit. In cujus demortuo corpore abdominis sectione ad litem vitæ hostem inquirendum impetrata, quæ singularia 13. Cal. Junii observaverim, brevier notare hic libuit. Dissectis itaque ventris interioris integumentis, remotisque, intestinis, cum ad vesicam parare statim viam, qui manus commodabat, Chirurgum jussim, ventrem fundum lividum & anteriorem ejus partem putridam ac levi manus adpulsu disruptam deprehendi, magno fetore ex ea procedente, immixtamque dextram firmiter adeo obidente, ut arte nulla elui potuerit, sed per integrum quattriduum, antequam penitus evanesceret, adhæserit. Calculum tamen, quem adesse debere, signa prægesta edocuerant, nullibi invenire potui, fragmentis saltem aliquibus minoribus manui occurrentibus, quæ quidem & ipsa primo statim conatu mox in litem, partem & arenulas soluta fuerunt. Hinc uram illam, ex putrescente vesicæ subit. n. r. ortam, calculi compagem penetrasse & dissoluisse, suspicatus sum. Adhuc autem revera calculum, præter memorata modò fragmenta, perpellos sæpius per aliquot annos dolores nephritici, arenulorum & calculorum minutiorum, excretio, pondus & gravedo circa pubem ac perinæum, stranguria & insignis in murgendo difficultas, necnon materis viscidæ, fibrosæque cum urina emissio, abundè evincunt. Quæ sane signa à sagacioribus Practicis considerata magnam de calculi præsentia certitudinem multoties præbuisse, imò majorem, quam peritorum alias Lithotomorum doloricam per catheterem explorationem, quin nunquam infellisse quosdam (quantum ex institutis post obitum sectionibus colligere licuit) hactenus non una vice observavi. Eiusdem verò comminationem post mortem denum accidisse, exinde suspicari licet quod in urinis, ultimis n-



te obitum diebus excretis, nec limi, nec arenularum indicium comparuerit. Num ex hoc possibilitas inveniendi medicamentum lithontripicum quodammodo probabilis reddi queat, alii iudicent. Mihi adferuisse hoc non a motum videtur. Haud quidem me latet, de talis modi Pharmaci existentia multos praclaros Medicos dubitare, & vulgari illa, quae passim in libris commendantur, vel etiam illa, quae tanquam arcana à plurimis magni æstimantur, parò effectum speratum sortiri, non omnis tamen planè deneganda esse videtur experientia, cui hac in parte ubique credendum, sic edocente; quae tamen exempla cumulare hic supersedeo, unico illo, magis ad rem faciente, contentus, quo *Philipp. Salmuth. Cent. 1. Observ. 23.* describit, popularem quendam suum, per sesquiannum à Medicis tanquam calculosum (persuadentibus ita signis pathognomonicis) curatum, tandem materiae planè argillaceae ingentem copiam per urinam excrevisse ac postea optime se habuisse, memorat. Nec incongrue *Joan. Freitagius* apud *Horsium* consultat. & *epistol. lib. 2. sess. 19.* Calculum vesicae frangentia medicamenta dari ita tuens, quid repugnet, inquit, *Non video, cum aequè deur sal resolvens, quam coagulans?* Quae sane *diapys* resolutoria agere eo liberius potest, quo laxior calculi compages existit, quam maiorem in corpore esse, & frictiorem demum evadere, ubi e vesica extractus liberiori aeri committitur, mihi persuadeo; cum omnes, quotquot expendere hactenus licuit, calculos, postquam e corpore exempti, pondere majori fuisse praeditos, & facilius in lamellas separari potuisse, observaverim, quam ubi aliquandiu aeri expositi fuerint, sic enim, exhalantibus sensim humidis eorum particulis, leviores atque ad separationem lamellarum ineptiores comparuerunt. Ut ideo *Joan. Bapt. Helmontii* decreto non simpliciter subscribere queam, dum *c. de Lithiasi §. 19.* tam durum recenter extisum & madidum pronuntiat, quam erit hic à seculo aservatus. Ceterum in cadavere hoc nostro nec renes indici abire debent; quorum dexter sinistro superior, praeter communem naturam in homine ordinem, in situ comparuit, quamvis nec lienis adfuerit insolita magnitudo, nec hepatis magnitudine naturali caruerit, quae alias depressiorem sinistro locum dare, altiore vero dextro permittere potuisset. Uterque aliis quoad substantiam notatù dignus. Dexter quippe totus consumptus, ut praeter membranolum aliquod crassiusculum corpus à membrana adiposa ortum ducens, nihil, & nec guttula puris, vel unica arenula comparuerit, ac primo intuitu abesse planè visus fuerit. Quam consumptionem latitans quondam in illo rene calculus, & asperitate sua ipsum vulnerans inuicere potuit, quod vulnus dein in ulcus, renis substantiam depascens abiit, pure una cum calculo per ureterem in vesicam deposito, & cum urina dein ejecto, simile exemplum in *Praxi Barbetiana; lib. 4. cap. 8.* legitur de viro triginta per annos Nephritide detento, in quo post mortem dissecto renis sinistra substantia tota consumpta fuit reperta, ita ut praeter crassam membranam, nihil superfuerit, huiusmodi quod attinet, ipse quidem formam ex-

ternam naturali similis, substantiâ densius ac vegetus, iusto tamen minor existit. Dilectus autem copiosam flavescentem pinguedinem circa pelvim & ductus sive tubulos renales exhibuit. Qualem pinguedine interitum renem etiam *Beatus noster sachsus*, teste celeberrimo *D. D. Joan. Daniele Majore* in *memor. Sachs. cap. 1.* conecutus fuerat. *Luce Scrochii, Luc. fil.*

#### *Calculus extemporaneus.*

Calculos in corpore humano generari pervulgatum adeò est, ut nulla propemodum corporis pars sit, quae illos aliquando non dederit; calculum autem extra corpus in momento & quasi ex tempore generari inter raro contingentia merito numeramus. Contigit tamen anno 1574. mense Maio Nicopis in Halstria in filiola bimula civis & coriarii ejusdem urbis, quae cum aliquot diebus pessime habuisset doloremque ejulando prodidisset cum urina emisit materiam albam mucilaginosam, quae ita tim ab aere externo in subilavum oblongum riguit calculum, quem adhuc servat Pharmacopaeus loci *Christophorus Hartmannus*, duritiae quemvis alium æquantem *Joan. Henric. Brechtfeld.*

#### *Calculus vesicae, putaminis ovorum instar, frustillatim excretus.*

Reverendiss. & Illustr. Pr. I. G. C. de H. E. R. sapissime questus est de dysuria pergravi, verum suadente me, cum ingruentem affectum sentiret, praemisso mox clymate conveniente, assumpsit aliquoties in brodio, vel jussulo quoddam guttulas aliquot spiritus terebinthinae, vel spiritus putaminum ovi struthiocameli, urina exinde non ducebat facilius fluebat, sed & interdum frustra magna ovorum putaminis instar una recidebantur, acri cum dolore. *Helwigii.*

#### *Calculus monstrosus in femina vidua.*

Femina quaedam vidua ætate plusquam 40. annorum, continuis doloribus cum urinae stillicidio, & aliis molestiis fuit tentata, ex quibus symptomatibus calculi vesicae suspicionem habuit, ideo sese famati *Lithotomi & Chirurghi Regni supremi D. Friderici Wred.* (qui in arte sua nemini est secundus) curationi commisit. Is ex certis suis indiciis prius habitis, singulari arte & industria, & absque magno incommodo & dolore, Lapidem extraordinaria figura, ex officio cervicis velicæ extraxit, bonamque istam foeminam à suo incommodo doloroso liberavit quae etiam adhuc sana in hanc diem hic *Wartoviz* vivit. Lapis extractus ex omni parte & loco, virili membro cum glande, praeputio, scrotulo, & in illo interstincta sutura ita erat similis, ut omnes qui illum huc usque viderunt in admirationem sint deducti propter lepidam lapidis formam. Ego ipsemet, cum Magnif. *D. Wred* mihi illum prima vice in Camera regia monstraret, lapidem tanquam rem extraordinariam Ser. Regi *Joan. Casimiro*, Domino Clementissimo ostendi, qui illum etiam vidit, & non sine admiratione manibus tractavit. Quod imaginatio in illa foemina ad hanc figuram cooperata sit



sit sunt qui hoc omnino credant, forma autem & magnitudo illius lapidis (qui coloris quasi Cinamomei est, parum rufescentis) in adjecta tabula in fig. 1. conspicitur. *Martini Bernhardt.*

*Calculus vesicae ingentis molis in Patre quodam Soc. I.*

Serenissimæ reginæ Cæcilie Renatæ Confessionarius Rev. Pat. *Schenhovius* Soc. Jes. sexagenario maior à multis annis intolerabili dolore ardoris & stillicidii urinae, aliisque gravissimis symptomatibus, ita cruciatus & viribus exhaustus fuit, ut potius mori, quam ulterius ita vivere, & pati sapissime desideravit, proinde post medicamenta innumera prius adhibita & tentata, consilio ante cum aliis Medicis habito, sese tandem *Mag. of. D. Fridericus Wied.* (cujus in præcedente Obs. mentio facta est) sectioni subiecit: ubi peracta illa, *Lapis* stupende Magnitudinis, coloris obscuri rufescentis, fuit inventus, longitudine, forma, ac crassitie talis, qualis in debita tabula No. 2. ostenditur. Quem ex relatione Domini Lithotomi ab anno trigesimo, ortum suum habuisse, & in hanc magnitudinem excrevisse, ex certis suis notis & argumentis, quæ habere se dicebat, intellexi. Quoniam verò post ipsam peractam operationem vesica ex una parte inventa fuit canerosa, brevi post irruente gravi gangrena, obiit. Lapis exemptus, & purgatus in spiritu aliquo acido resolutus, & spagirico more in liquorem potabilem redactus, tanquam medicina interna contra Calculum *Illustr. & Excell. Domini Palatini Polocensis* filio lo puero septem annorum, quotidie in certa dosi & in ventriculo idoneo fuit adhibitus, qui ab eo jam totus consumptus est. *Martini Bernhardt.*

*Calculus à scroto prolapsus.*

*Vesicae calculus* per Epigastrium fuisse educum notavit Fr. Sanchez in observ. Medic. oper. pag. 370. pariter post gravissimos dolores & *vesicae* pueri Scamici quadrimo anno 1628. calculus in Scroto fuisse protrusum exinde suppuratione facta eundem foris rejectum, remanente fistula perquam urina continuo exsudavit, refert Th. Barthol. Cent. iv. hist. 8. Non absimilem casum *Silesia* paucis ab hinc annis exhibuit in viro robustissimo, cujus ingens Calculus à Natura per Scrotum fuit protrusus. Ad Majorem vero hujus historici idem instrumentum publicum Magistratus Tescnensis sigillo firmatum addicere placet, quod integram Historiam luculenter exponit, & ex bibliotheca rarissima *Nostriana Generos. L. Baro. Othonis à Nostri.* Capitanei Ducatum Suidnic. & Javoriens. sumtibus comparato (in qua Calculus iste humanus una cum aliis Natur. artisque mirandis asservatur) communicatum.

Nos consul & Senatores Ducalis Urbis Tescnensis in *Silesia* superiore per præfentes literas attestamur, & notum facimus, quod infra nominato Die Generos. Dn. Dn. Casparus à Boreck Baro in Tuvorekau, & Rostropiz, Dn. in Ropiz & Brodizdit. S. Cæs. Mai. Consiliarius, & capitaneus Ducatus Tescnensis ad

nos miserit quendam suorum subditorum ex pago Ropiz nomine *Michæl Leinweber* ætatis 45. annorum, qui ingentem Calculum excrevit pondere 12. lotos (live 5vj.) æquantem, ex balneatoris nostri relatione. Motum excretionis nobis post institutum examen in pleno consensu in curia sequentem inde dignum narravit, ante biennium sese sensitisse primum Calculum illum & molestiam, cum urina fuisset excernenda, ex illo tempore semper dolorem gravativum in pube perleverasse, potius tamen anno 1664. brevi tempore ante Mensem dolorem intensiorem factum, adeo quidem, ut scrotum ipsum intumuerit, ut omnes opinarentur Herniam accessisse; unde singulis diebus cum adipe urino bis inunctionem instituit, unde & humor aliquatenus remisit. Post mensem duabus septimanis, antequam calculus egredieretur, intensissimos sensit dolores, parum de cibis assumpsit, præter panem & butyrum, rarissime etiam cerevisia usus est, nisi aqua limpidissima, durantibus doloribus, in scroto abscessus factus est cum foramine quantitate Nucis juglandis æquante, & per tres septimanas in eodem permansit statum, tandem cum post Meridiem urinam emittere tentaret, Calculus per foramen illud perripuit, & dum in terram delaberetur, fistulo exinde diffracto disrupit, ægro ob doloris vehementiam lipothimiam correpto, cui tamen uxor aditans suppetias tulit. foramen in scroto cum pinguedine caponis inunxit, & ad hoc unguento ex picæ, & adipe veteri sanationem tentat: foramen quidem non penitus clausum, sed ferè adhuc pili magnitudinem æquat. Urina ut à principio Morbi, sic etiam Nunc quoque per ordinatum penis canalem prorumpit, nec dolorem ullum amplius sentit. *Ad instantiam Generos. Dn. Capitanei pro majori confirmatione huc attestatum nobis nostra sigillo munitimus: Tescini actum 23. Mart. 1665.*

*De Calculo per scrotum ex refo.*

Circa festum S. Michaelis anno 1674. nostratis Pharmacopœi ad rubrum conerum, duorum annorum filiolus dysenteria aliquot diebus laboravit, urinam non nisi cum difficultate & in minima quantitate reddens inguinibus & scroto distentis ac duris existentibus calculum hic subesse statim prædixi, jussi applicari clysterium emolliens cum multo oleo scorpionum, quibus jam ante adventum meum sepius usus erat, & altero die dedi laxativum ex *Extract. Urtic. arb. Norib. cum aqua frag. tinct. tart. & spir. sal.* quo accepto tam male se habuit infans, continuo clamabundus, ut clamorosa morte, ceu nostri ajunt, moriturum eum crediderint adstantes. Reiteratum clysteria, & applicata fomenta externa de *Meli. alib. malv. pariet. & saxifrag. semin. lini. sanigr. & capis alb. rei.* quo dolor parum cessavit, quiescente quidem ad horam unam vel alteram infante, sed in eodem vigore manente affectu, Catheterem abhorrebant pater & adstantes, cæteroquin nullum supererat auxilium, jamque in septimum diem penitus suppressa urina, quæ jam ante, ut dicebatur, à tribus septimanis parcenec sexta parte potui respondens, fluxit. Tentavi candela cerea, vel explorare calculum, vel viam facere.



re yrinæ, sed irritò conatâ. Ita ad extrema redactus misellus, abdomine jam mirum in modum tumido, nihil amplius videre videbatur, nihil deglutiebat, pedes ac manus tantum parumper movens, dentibusque stridens metuebamus ne cum Epilepsia ultimam nobis diceret vale, Ita in agone prope constituti parvuli explorato inguina & scrotum, cum jurato hujus Civitatis chirurgus *Alexandro Schele*, invenimus hocce in sinistra parte aliquatenus mollius quam antea, in primis in loco quodam, nuntii Hungarici magnitudine. Decrevimus hic lancetta aperturam facere, ne plane prognosticis relinqueretur æger, annuit pater, succedit feliciter, vix enim chirurgus instrumentum intra cutem adegit, ecce profluit urina, instar loturæ carniæ, non admodum saturata, ad sextarium unum; Vulnus clausum, & instanti adhibita confortantia. Redu post tres horas, jam melius se habebat, & tunc per Emplastrum ligaculumque seri efluxit copia, ut in lectulo super expansum corium quasi itignaret. Aliquot diebus elapsis, paulo intra vulnus unum à nobis factum sponte natura molitur perturam, & intra tres dies, cum emplastrum removere vult chirurgus, una extrahit calculum Pisi majoris magnitudine. Detumuit abdomen, ægrotus melius in dies valet sed lotium nunquam per locum legitimum, sed semper per hancce aperturam iuxit, quare omnibus modis prospectum, ne in consuetudinem abiret, sed sensim tamen coalluit, per loca legitima successive profluente urina. Dedit apud *Dacolum Foresti* cum herbis vulnerariis, nihil autem magis conduxit, quam *Spiritus salis cum syr. de alib. fern. sumtum*. *Caroli Raygeri*.

*De calculis Pisiformibus per perinaum sponte excretis.*

Puer duodecim annis major dolore vesicæ ponderoso, at sine suspitione calculi diu laboravit; tandem insperato auctis doloribus circa perinaum tumor sese prodit in ulcus, quod videbatur, desiturus; sed tamen nullis sive emplastris, seu limentis ad maturitatem adduci potuit donec tandem remedium seposita cura sponte in ulcus transfret rebillis hactenus tumor. Cum autem certo die pisi, in carnem appositis largius indulisset protervus puer, pruriginem in perinao sentit intolerabilem, quam ut coerceret, digitos, unguesque admovit, qui cum graves parti incumbere, nonnihil etiam lacerarent, enollitum jam humorem facile disrumpunt. Aperto sine dolore vulnere, quod minime puer credebatur, retractam manum pone sequuntur globuli, quos ille viginti numero excipiens ipsa illa comesta pisa esse putabat, adeo forma & magnitudo erat sin illis: sed excussis diligenter sphaerulis, apparuit lapillos esse pisiformes, Albos, & superficie glabra velutque exposita. Traditi postea sunt chirurgus, cujus curæ sanandum vulnus committebatur, quique ilicò lapillos tam insolenti casu productos mihi ostendit, vulnerisque conditionem explicuit. Acta res anno 1671. Lugduni in Batavis *Joannis Nicolai Pechlini*.

*De flagri funiculo à vesica à Lithotomo extracto.*

Duobus abhinc Mensibus sese obtulit curandus dysuria & stranguria detentus *frater Josephus* ex Iurre vulgò dicta Ceceona comitatus, uderi, laicus capucinus, cumque in pectus ruere ex iis quæ lixiviosæ urinae particulas edulcorare, salinosulphurearum portionum exaltationem compescere valeret, atque ex eo quod renum gravitate, simulque veteris dextri dolore paulo antea fuerit oertatus, incongruum concipere haud sinit, patientem vesicæ lithiali laborare. Unde à chirurgo facta exploratione per catheterem indubitato lapidem adesse autumavit.

Non Apollinem ab æthere, ut jaculis transfigeret, neque Neptunum ab æquore, ut tridente domaret, neque herculem e terra, ut clava contunderet, imploravit Patiens, sed expertissimum, & non latius laudabilem *D. Jo. Rainaldum Bonajum* ex castris Nursiæ vulgò dicto *Jo. proci*, qui ex animi pietate adque mercedis subsidio, ut sectionis opus aggrediretur, libentissime huc se contulit prout diligenti m. nu. 15. Kal. Novembrii secum adduxit.

Sectionis executioni una nocte intentur, præter diversos capucinos, *D. Michael de gelmo de Benedictis* in arte chirurgica peritissimus, cumque Lithotomis vesicæ colum rescunderet, atque illius latebras scrutaretur, non nisi hujus formæ materiam arenulis circumvolutam deprehendit, cumque eam instar funiculi efformatam primo incutu judicarem, observaturus quæ materia vere constaret, vino abluendam suasi, quæ ablutione cum arenola materia exciderit, funiculum esse mea confirmatur opinio, & ex eo quod chirurgus admiratione captus, adnotaturus in erat funiculus, cum dilato in capite, verum ene flagri funiculum, æquæque hunc longitudinem, & rotunditatem, etiam nunc relictum, omnes summa admiratione contemplantur. Examine facto, an unquam patiens cum deglutiverit, tantum recordatur se quondam in case Junii præteriti intatiabili quadam bibendi licentia, tam avide manibus horis aquam & e puteo hautam ore haurire in mult. perpotasse, non sine periculosa deglutienti amentate visum ei fuerit.

Prout tali pacto probatissimum suspicor funiculi trantum ad ventriculum, hic difficillimum intuetur iter a primis viis ad vesicam. Non me latet, Anni semen simulque carbonem & pilos (*Hist. Cent. 3. Observ. 51.*) fuisse cum urina excretos; Pulmonis frustulum (*Idem Cent. 2. Observ. 30.*) cum urinis emissum, Grana Alkekengi (*Idem Cent. 2. Observ. 73.*) per urinarias vias demandata. Fungi frustulum (*Nicol. Flo. in Schenck lib. 3. Observ. 12. de uris.*) cum lotio deportatum, ossicula, (*Fel. Plat. de Med. c. 10.*) cum alimentis assumpta, & cum urinis excreta; ex diabetica passione totum (*Amatus Lus Cent. 2. cur. 94.*) quod assu-mebatur per urinas fuisse exportatum, (non loquor de diversorum animalium per urinas excretionem, cum captu facilior sit modus eorum generationis vel in renibus, vel in venteribus, vel in vesica, prout vult testantur Testi-



testimonia) at later, quo ductu iter fecerint ad vesicam.

Non enim volatile est, per mēstaraicas ad venam portam, à venâ portâ ad hepar, ab hepate ad cavam, ex hac ad emulgentes venas, & sic ad renes ureteres & vesicam, prout transitum fuisse acum deglutitam (Jul. Cels. Claud. resp. med. lib. 1. resp. 40.) & per urinam transmissum, quondam somniatum fuit, nam præterquam in quod impossibilis sit aditus funiculi per hepar, adhuc tamen non concedimus transitum cavæ ad emulgentes venas, cum a quo introiit sanguinis motus in orbem, (Harvæus de circuli fung.) habeamus, motum in venis esse à circumferentia ad centrum, adeoque à minoribus ad majores, simulque edoceri, iter sit res e massa humoralis eliminandas, ut præcipitatione facta per ureteres deponantur, non per venas emulgentes, hæ enim sunt renæ, sed per arterias emulgentes (Harvæus, Th. Bartholin. Valerius, Willis, Sylvius de le Doe, (Narleton.) transitum obtinere.

Neque reor recurrendum ad intestini & vesicæ perforationem, prout transitum fecisse præfatum Acum, fuit affirmatum, eadem enim fabulosum id de funiculo asserere.

Cum vero alius non possit esse transitus ad renes quam per arterias emulgentes, non admittimus funiculi motum per Galaxiam viam, nempe quod per lacteas venas ad cisternam chyli pervenerit, ita ut per thoracicas lacteas ad subclavas, ab his adveniam cavam, à venâ cavâ ad dextrum cordis ventriculum, & hac per venam arteriosam ad pulmones, ab his iterum per arteriam venosam ad sinistrum cordis ventriculum atque ex hoc per arteriam descendente ad emulgentes arterias transitum obtinuerit: non enim sine regimini vitalis æconomia interrupta per anfractuosis hos sinus aditum sibi funiculus parasset, sed probabilē suspicarer transitum à primis viis ad renes per venas lacteas, taliter enim ut funiculus, ad cisternam chyli inter renes, & capsulas atrabilarias situatam (Pequet.) delatus non per Thoracicas lacteas iter cum chilo fuerit profectus, sed breviori tramite, nempe per furculos lacteos, e dicta cisterna chyli in arterias emulgentes insertos (Th. Bartholin. Cent. 6. de lact. Thorac.) transitum fuerit ingrossus.

Per hos furculos enim (idem Bartholin. Cent. 8. de ven. lact.) serum ad renes transfertur ibi à chilo separatum, vel ad capsulas atrabilarias sero melancholico destinatas traducitur.

Hinc cum ad dictam chili lacunam & partibus inferioribus limpha progrediatur, sive eam constituamus (Th. Barth. de venis. limphat.) excrementum tertie concoctionis; sive credamus partim, (Sylv. de le Doe prax. Med. lib. 10. cap. 49.) fieri ex spiritibus animalibus per nervos delatis, partim ex sanguinis aqualiore parte, eaque acidiori in glandulis conglobatis à massa humoralis secreta; sive concludamus (Gu. Narleton. de Oecon. anim. exerc. 9.) ac halitibus cum sanguinis arteriosi, cum succi nutritii, per nervos delati componi, & si non inficiamur, multum prodesse, vel cordis ætum temperare, vel sanguinis volatilitatem facilitare, vel sanguinis coagulationem inhibere, &

nucationem ejusdem promoveri, probabilissimam suspicarer limphæ supernæ secretionem & per urinaris vias translationem.

Per hunc breviorē tramitem, sine diabetica passione, paulo à potu vinâ oligophora, clareta, lacrymæ urbaverana vinâ, vulgo raspei & similia per urinam excreti conjecturæ fas esset: per eandem vias aquam nucerinam aliquando immediate à potu deportari toto concludendum; nam cum ea sæpius uantur, ut terrefcentium particulorum massæ humoralis morbosa efflatio compescatur [ejus aqualitate partes sanguinis sulphureæ diluuntur, & ratione boli, seu terræ sanitz, quæ unguuntur, partes bilis obtunduntur, & ab ea abripiuntur] fructu neus ejus usu, compertur, cum recto tramite à cisterna chyli, non per thoracicas lacteas ad cor, ut cum sanguine circulante transitum obtineat, sed ad renes detertur. His obiter dictis, redeamus unde degressi sumus.

Neque dijudicandus difficilis: citus ab emulgentibus arteriis ad renes, à renibus per ureteres ad vesicam, nam renum substantia (ex Belin. refer. Will. de l' harm. rat. sect. 4. cap. 1.) nec Parenchymate est inugata, ut hepar, lien, nec fibris carnis constat, ut cor, si recentioribus nates habenda, sed tubulorum membranaceorum aggeriem componere videtur, ita ut per eos ductus, licet exiguos, facilis fuerit redditus motus funiculo, cum experientia doceamur, calculos non exigua magnitudinis à renibus ad vesicam deferri per ureteres, quæ vasa duos digitos posse admittere (Th. Barth. lib. 1. c. 19. anat. ref.) testantur Anatomici.

Sed cum renum substantia dura sit, compacta, & densa, adhuc non obstat, cum non solum renes sinus habeant, in sinibus substantia laxa & cavernosa est, (Th. Barth. lib. 1. cap. 17. Anat.) sed sinus ipsi membranacei exstant ex ureteribus in renum cavo expansis & dilatatis, quominus funiculus per unam ex renibus transitum obtinuerit.

De lactearum exiguitate major difficultas: alit non solum affirmandum in vivente corpore meatus longe patentiores esse & ampliores, quam in defuncto, prout quend in munie legitur, dum apri radices per urinas excretas deprehenderit (ex Jul. Alex. refer. Schenck lib. 3. Obser. 10. de urin.) cum non desint etiam, qui quadruplo majores (Joan. Fort. Cent. 4. Conf. 30. tom. 2.) esse pronunciant; sed concludendum, naturam sine doctore (Hippocr. lib. de alim.) sibi invenire vias (lib. 6. epid. sect. 5. text. 1.) quæ licet oculorum visum effugiant (id. de art.) ea tamen mentis acie comprehenduntur.

Interim si incongrua vobis videbuntur, quæ rodi minerva meditata iterum, libentissime ea submitto, ut purgantissimæ judicicii vestri censura meliora redeantur; optarem tamen, ut si quis vestrum arcem Palladis comenauerit, atque Apollineis innixibus verum funiculi excogitaverit iter, de eo per epistolam certior factus, tanquam ab Esculapio sano in sonnis de prompto beneficio mereretur dignari favore. Valete. Idert 4. idus Nov. 164.

Observationem hanc communicavit Illustriss. Dn. Antonius Magliabechius M. D. Hieronymus Bilibescurius, an. 1632. M. Mart.



*Calculus vesicae ab imperio Medicaestro in urethram protrusus lethalis.*

Notum est calculos renum precedente quadam urinae putredinali resolutione per concursum salium diversorum generari, & quicquid in hac actione comprehendunt, in ejusmodi co-phacum corpus coagulari, calculos ueni vesicae ut plurimum a renibus per ureteres in vesicam derivari, & saepe tantum ibidem sumere argumentum, ut per vias naturales eliminari nequeant: varia proinde pro feliciore horum exclusionis excogitata sunt remedia tam Pharmaceutica, quam Chirurgica, in quibus adhibendis plerique omnes impostores atque Medicastri suam jactant peritiam, sed intelix sapius successus summam istorum prodit imperitiam: Quod apparuit nuper in cive quodam nostrate nepiritide & calculosa dispositione laborante, quae postposito Medico consilio, illiusmodi Aegypti curae se commisit, & numerato pacis pecuniae dimidio (qui lucus pro emungendo a simplicioribus argento ipsis frequens est, & quasi proprius) varia medicamentis suis forma potionum & pulverum urinam pellentium, & calculum frangentium ab impostore propinatum assumpsit; hinc calculus non sine acerbissimis doloribus versus vesicam impuiterem elsi protrusus, quem cum digito ano immisso certius explorasset, tanta violentia versus urethram promovere tentavit, ut hinc dolores non solum graviores, sed & major urinæ reddendae difficultas, atque inflammatio periculosior succederent, quae symptomata deinceps ita invaluerunt, ut nebulo male sibi conscius aliquoties in auxilium vocatus non modo non comparuerit, sed & Nuncio a ministro accepto, patientem dehinc in agone versari, fuga sibi salutem quaesiverit, ægumque ante aliquot dies satis robustum & sanum morti tradiderit; hinc re hac ad medicos loci delata & examinata, jussu Magistratus cadaver est apertum, inque urethrae radice calculus asper, enucentis quibusdam insignitus, magnitudine denti molari medioocri, binas radices inferius acuminatas representanti, haud dissimilis, per violentas protrusiones membranarum, nervosisque partibus summe inflammatis profundius inhxus, & versus anteriora immobilis repertus est, qui omnium malorum, etiam mortis consecuta, author extitit. *D. Jean. Laurentii Febr.*

*Sectio calculi vesicae in viro quater celebrata.*

Furthæ Noricorum mercator quidam eximius Iulius *Lersch* calculo vesicae laborans, ingravescens subinde doloribus ob suppressam toties urinam, spem tandem salutis certam in sectione posuit; quam in se suscepit *Georgius Gentnerus* Lithotomus, si quis alius circumspicere & in ea arte insignis. Prima proinde vice anno 1674. 2. Octobris die, implorato Divino auxilio, novaculum perinæo admoventi passus fuit, duabus pene cum dimidia horis exactis, prægrandem enixus est, post vehementes saepe tractus, calculum, non sine larga subsequente hæmorrhagia, summaque virium jactura &

universi corporis debilitate, difficilem hanc efficere curationem arenulae, per vulnus subinde effluentes, quæ multum consolidationem vulneris retardarunt. Lapis exemptus formæ adpictæ cum sex dragmibus uncias tres adæquavit. *Gentnero* adstitit manus porrigens auxiliatrices *Georgius Prodmanon* Chirurgus nostræ civitatis celebris practicus. Aliquandiu exinde patiens levamentum quoddam sensit, quamvis per vulnus continuo quædam manarent guttulae, indubii non debita, propter arenulas coalescentiæ testes, unde nova paulatim incommoda circa vesicam illius suborta integram polliceri restitutionem non potuere.

Ingruente anno 77. cum doloribus gravativis & pungitivis atrocibus ille denuo, urinæ roties redeunte suppressione, nimium urgere-tur, ad iteratam refugere sectionem, priore eandem Lithotomo maximopere dissuadente, victus tamen intensis doloribus, 20. Januarii post mediam noctem coactus fuit, & secundam hanc operationem a dicto *Georgio Prodmano* pati, quam præfente sola sua conjuge in genua devota, cum juvene *Chirurgo*, dum herico proflus animo itinerarium catheterem sua manu direxit, fortiter sustinuit; Re feliciter & ex voto peracta, acutus ego illico fui, lymphonatum venementiæ obviaturus, quæ exoptato remediorum usu & successu paulatim evanescere, meliusque ille se deinde quam antehac habere cepit. Lapillorum exinde exemptorum ingens n ultitudo uncias duas cum duabus dragmibus pondere æquabat, formæ obscuræ, grylæ cortices illi æmulabantur contractos, subsequente multoties insigni tenacis & sat viscidæ pituitæ copia, cui crebræ se jungebant itatulentæ, patienti satis molesta. Solatio ipsi fuere injectiones decocti hordei cum vitello ovi, oleo ovorum & Hypericonis misti; Aqua citrata cum cinnamomo & saccharo, & decoctum chinæ uti restinguendæ suffecit; alvo cum enematis subinde servata lubrica.

Vix Biennium peractum est, licet se pluribus præservare lithonripticis studuisset, denuo tamen gravissimis divexatus calculi symptomatis tertiam admittere adactus fuit sectionem, quæ anno 78. 9. Januarii die, intra sesqui horam felici *Prodmani* dextra, me duobusque ejus ministris præsentibus fuit finita. Dura satis & quasi pultacea cum cochleari fuit exempta, uncie unus & duarum dragmarum pondere, massa; quæ paulo post in tophum induruit, symptomatis non tantopere eundem exercen-tibus. Tertio vero post sectionem die peniculus vulnere immixtus ad articuli digiti longitudinem nigrescere visus fuit, non citra gangrenæ metum quem ope injectionis ex seminibus frigidis præparatæ aliquoties repetitæ sustulimus, felici cum successu & veloci. Flatibus iterum in vesica tentari mire cepit, ut sapius ligaturæ solutionem desiderarit, us tamen nulla resistere arte potuimus, latente eorundem in vesicam ingressu intra sex septimanas denuo ambulare cepit, impetrata paulatim pristina valetudine, & quam antehac longe meliori, ut se in portu navigare summe fuerit latatus, supremo pro tali clementia persolutis munimi gratias.

Sed ut vix aliquid ab omni beatum esse parte potest



potest, ita & optimam hunc virum per binos  
tatem annos spes recuperata ex integro sanita-  
tus, satis in laetavit. Anno liquidem 81. 4.  
februarii Nephriticis rursus victus dolori-  
bus, diris refectionis non abstergitus, denuo  
id officii exequente prodinzano anime suo,  
me juxta cum quibus indutris præsente, se  
tali Encheiren in vicio iterum submitte animo,  
quæ ad quinque notæ quadrantes exercita felici  
cum supremi Nummi auspicio iterum fuit pe-  
tracta. Calculi complures ad 3ij. 3j. post illam  
exempti tuere sectionem, doloreque ille inte-  
rius tertio die post injectionem in vesicam  
olei ovorum & Hyperici cum melle Rosato,  
saccharo, & julepo rosato quietem sentit. Quinto  
exiguus, quem sexto duo majores secuti  
sunt. reliqui. Decimo omni cessare sympto-  
mata, præter salivationem post usum Mercurii  
dulcis cum Cinnab. n. tiva & ocul. caner.  
præparatis permitti; pro lenienda aluo adstri-  
cta aliquoties ab ipso assumpti, quæ per plu-  
res dies satis ipsi fuerat molesta. 11. Mar-  
tis circa plenilunium tantam virum jacturam  
persensit, ut omnes de ipsius vita conclama-  
tum esse crediderimus. Sed post hæc ad melio-  
rem redire cepit statum, ut sequente x. Apri-  
lis in templo iterum comparuerit, pro tanto  
beneficio Deo opt. Max. ex intimo cordis sui  
penetrati agens gratias. Subsequenti luce in  
vicino suo orto noviter constructo cum ami-  
ci se recreavit, domumque cum iisdem commodè  
satis reverens fuit. Duodecimo vero aprilis cir-  
ca vespere inolenti correptus fuit horripila-  
tione, lectumque suum repetiit, quæ duravit  
ad quinque horas; remittente dein paulatim  
rigore, ætium perbreve sentit. Pretiosa  
satis in salutem Dn. ægrorum ordinata fue-  
re medicamenta sed incassum omnia. Toties si-  
quidem reversus fuit horror iste, interpolatis  
tamen, non certis vicibus, qui omnem elusit  
opem operamque quo ad delatatum, con-  
sumptumque tandem ad obitum deduxit pa-  
tientem, qui rto post decimum die 27. aprilis  
rarum pietatis & patientiæ Exemplar longio-  
re ætate dignissimum.

Post luctuosum ejus ex vitâ discessum, vo-  
luntati præ deluncti, ut calamitosum ejus aperi-  
rentur corpus, parentes; omnia ferè in natura-  
li suo statu viscera deprehendimus. Stomachus  
quippe cum hepate & intestinis absque navo  
comparuere. Lien penitus corruptus marcebat,  
lexique compressione pulvis instar dissolvebatur.  
Ren similiter dextro longe major disruptus totus  
putridus, exiguis calculis conspersus, vrete-  
rem duplo altero majorem ostendebat, per  
quem acrior transluens urina dolorem non  
saltem ejus loci, de quo vivus continuo con-  
questus fuit, arguebat, quin & orificium ve-  
sicæ prope sectionem rubens plane & quasi gan-  
granosum præsentabat. Iulmo sinister quoque  
altero major fuit deprehensus, nullo alio præ-  
terea observato corporis partium incommodo.

*Imber Calculorum urinosus.*

Senex quidam genere nobilis, olim etiam  
opibus potens, nunc religionis causâ exilio  
mutatus, miseraque & Dionysiana fortuna  
contentus, Calculi renalis impetum ter ex-

pertus erat gravissimum; toties tamen Deo vo-  
lente decocti Forestiani ope liberatus. Hic  
cum post ultimum morbum corpus refectionis  
amicum certum ruri inviseret, jamque medio-  
criter vino potus donum curru repeteret, eve-  
nit via propemodum media, ut urina vehe-  
menter urgeret, quam cum intempestivo pu-  
dore adactus in illa aliorum præsentia mittere  
non auderet, accedit, ut præ nimia urina in-  
stantis violentia amigam rogare cogeretur tan-  
tisper detineret. Itaque curru descendens,  
cum nihil præter urinam expectaret, illa sub-  
sistere paulum; mox oborta capitis vertigine,  
& majore merendi conatu una explosione, quæ  
& auditu poterat, juxta cum urinis imber pro-  
rupit calculorum non tam doloris, quam mo-  
lestie ejusmodi, sensu notabilis. Colligit er-  
go iuncto sparsos in orbem calculos, instar glan-  
dularum sclopeto emissarum, non unius omnes fi-  
gura nec magnitudinis; unum tamen supra  
quam crederet, in centro magnum, quem  
ceteri indebita quantitate & numeri ambi-  
bant: collectos in conum papyraceum domum  
reverti; insolitum portentum mihi exhibiturus,  
ut qui morbo ejus sepiuscule adjueram. Nu-  
merum ego calculorum deprehendo esse supra  
triginta, præterquam quos terræ limus grami-  
naque absconderent; Variam inde illorum ma-  
gnitudinem, aliquos papaveris, aliquos ce-  
rum, unum, & illud in centro medium, tenuis  
cucurbituræ forma & magnitudine: quæ sane  
mirum est una explosione sine manifesto dolo-  
ris sensu prorupisse; cum alias minima etiam  
frustilla cori negotium facessere soleant. Color  
& superficiei levitas indicio erant, jam diu  
eos in vesica hæsisse, detrita per muraticum  
seum tinctura, quæ renalibus calculis adesse,  
ut plurimum solet. Atque ex hoc conjicias licet,  
quantum sæpe natura, arte, fortuna, consilio  
præstet. Equidem futurum erat, ut hi Calculi  
nec exquisitissimis remediis cederent, quos  
nunc natura vino & unctione adjuta, facile  
jecit omnes; Nimirum cum natura temporis  
sit servantissima, & una omnia optime nove-  
rit horum momenta, cum sibi relinquatur, sæ-  
pe felicius expedit morborum semina, quam  
si edelis coacta: hæc namque, cum sine discri-  
mine urgeant atque insistent, intempestivius na-  
turam exercent, & momentum illud, quo &  
ipsa operi se accingit, vel prævertunt, aut re-  
linquunt. Id quod in Calculi ejectione, proin-  
de ac in partu, tam est manifestum, quam in  
ullo affectu cum non ante remedia facit profici-  
ant quam conjurata venerit in subsidium Na-  
tura, tum etiam Empiricis sæpe, seminisque me-  
dicæ gloriæ reportantibus. Ego autem  
existimo, non in alio magis Medici boni pru-  
dentiam consistere, quam in temporis aut  
momenti illius æstimatione, quo natura jam  
ipsa solvere se gestit: siquidem illa obluctante  
nimis. De unctione autem censendum est,  
eam si modica est, & æqualis, natura & cal-  
culis pellendis idoneam esse; sin immoderata,  
ex fortuna pendere, num utilis sit, vel noxia.  
Certè intempestiva vel vectio, aut Equitatio,  
plurimis etiam damnum adtulit quod expul-  
sum sede sua non incommoda calculum in trans-  
versum egerit, angulisque acutis Membra-  
na nervæ, arteriisque violenter alliserit. Quæ



quidem in illo, pro nota duritie, sucta tormenta, sed molestant admodum isenurion jamjam ni lapis amoveatur, jugularum excitantes, in eum ergo urum, quo unque iter laceret, virgam sibi adscierat comitem juniperinam, hanc pro necessitate morbi vesicæ manittebat, iterumque extimebat, donec vel e leuli aut urinx sequerentur. Accidit utem, ut cum Dantisco subec menavigaret in navi ab ischuria & calculi objectu male affectus solitam virgam intruderet, viamque urinx panderet sed jam subec, jam in via Hamburgum versus eodem incommodo oppressus, acieio quama nus levitate bacillum profundius adegit & tandem abrupt; ite que magna ejus pars in urethra relicta novam homini sollicitudinem pariebat. Ereptit tamen pedes Hamburgum, & in officinam Chirurgi hominum indicio deuctus opem manus implorat. Chirurgus temeritate & invictum hominis animum miratus, cum nullum in coeclu: orem animadverteret, & in illa urethra toties impune vexata latitudine grastandi immunitatem habere videretur, post radiosam manuum operam aliquoties frustratam, tandem forcipe exili libas arripit fragenti, illudque oportune deducit. stupendum erat, nullo adeo sensu præditum hominem fuisse, ut neque ad forcipis cedentisque bacilli tarditatem vel vocem mitteret, sed credo calculi istis & dysuriæ doloribus duratum facile etiam illum spernere potuisse. Notum alias, quanta sit plerunque dolorum vel ad cerei, aut catheteris missionem violentia, deprecantibus statim molestum benecium agris

Dei & hoc mirandum, potuisse post tot sollicitationes sphincterem quoque quiescere, & urinam retinere, quamvis viciatum illum ex parte fuisse subinde recurrens stranguaria, nunciam calculus excitaverit, argumento erat. Observavi autem illam Finorum, Livonum, & vicinarum gentium patientiam, si cum illa tractus nostri, ut plagæ comparatur, incredibilem esse, ut quæ ad dolores, mortisque app. ratum fere non contremiscat. Utrum fluidi animalis in illa gente motus sint tardiores, an vero ipsa cutis callosior sensum non facile transmittat, censeat quisque pro ingenio. Certe melior fuit hominis inepti fortuna, quam Medici Lagthæ apud Janum Nicium Erythræum, ut qui in tuto hamulorum uniusque remedio usus sphincterem resolverit, perpetuoque urinx profluvio imprudentiæ pœnas dedit. *Joan. Nicol. Pechlin. Observ. Physico Medicar. lib. 1.*

#### *Mirabilis Calculorum sectio in Octogenaria.*

Inter omnes corporis affectus, qui hominem misere infestare solent, haud infimum locum obtinet calculus vesicæ, hoc malum quantumvis in Batavia nostra admodum frequens, rarissimo & inaudito tamen modo, sese nobis nuper obtulit in octogenaria, præ dolore admodum enaciata, & a viginti annis propendentiam Uteri perpessa, cum intolerabili mingendi difficultate, & cruciatibus, ita ut

ægra emori maluerit decies, quâ ob hoc diutius perpeti, præsertim postreus duobus annis.

Tandem mense Maio 1681. me vocari jussit, de uteri propendentia, & mingendi difficultate conquerens. Mirabar vetulæ querelas, quoniam nunquam a loco uteri prolapsura colere solent mulieres, verendumque esse adjecti, aliquid mali, præter uteri prolapsum, hætenus in alta nocte latuisse. Hisce auditis, noster visum, & ulteriorem explorationem (hæc quæ us nihil certi asseverari poterat de a scinditi morbi essentia) non tenuit, ostenditque mihi uteri, juxta paulo majoris prolapsum, Palpitando hunc uterum, calculos lentie putabam, nec fefellit, quamvis cit a calculorum formam deceptus: videbatur enim tenuiores lumen c. iculox (belgice Leyeu) qui post incisionem reperti sunt angulon & cralle.

Non autem interim certe determinare poteram, utrum locum haberent dicti calculi in ipsa uteri cavitate, an vero inter ejus membranas, vel in aliqua vena portione. Videbatur quidem uteri locum occupare, qui totus quantus e corpore propendebat, sine ulla vena portione (ut nobis videbatur) Hisce vitis & exploratis, calculorum extractionem proposuimus. Accersuntur Magistri, Petrus Adrianus, & Andreas Boekemaanus, de re Chirurgica bene meriti, qui eandem quoque operationem commendabant, proximo die mittendum. Operationem in sequentem diem dilatum iri misera illa vetula audiens lamentari cepit, exclamans, o me miseram, non reversuri eris, relinquetis me &c. quibus quærelis permoti, ilico operationem institimus, sola incisione, secundum uteri propendentis longitudinem; extraximusque momenti temporis ipso, calculos quadraginta & duos, partim solutu nentis, partim solis digitis.

In hac operatione non admodum doluit ægra, eaque peracta, & hoc opere exonerata, atroces ilico evanuerunt dolores, quos tot annis passa fuerat, & satis comode vivere cepit, in ipsa sectione præter guttulas sanguinis aliud liquoris promanabat e vulnere, hæc suspicabamur, velicam quoque esse in propectu; nec falso, nam sequenti die hoc penitus investigantes, & siphonis ope liquorem per meatum urinarium injicientes, eum vulnere exire reperimus. quod, ut & lotium sequentibus diebus per vulnus stillans, nobis manifestavit, calculos dictos vesicæ portioni simul cum uteri mole prolapsæ, inhæsisse.

Hoc urinx stillicidium haud exiguo nobis fuit obstaculo in vulneris curatione quæ tamen, (gratia Deo ter opt. max.) brevi peracta fuit, sequenti methodo.

Aliquot diebus post balsamo Arcei illitum vulnus; labia ejus artissime adducta sunt emplastro diapalnia tantulum terebinthinæ, ut magis adhereret, recipiente, quod emplastrum scissum fuit, super impositis spiculis, & ligatura convenienti.

Quum autem hic faciendi. odus expectationi non satis ceret, propter urinx stillicidium continuum, & emplastri relaxationem, loco emplastri excogitavit Magister Boekemaanus anulum e plumbo, cujus extremitates recur-



vatu filo attrahebantur, unde labia vulneris tam arcte claudebantur, ut nihil urinae amplius stillaret, & sic intra triduum coniunguntur vulnus.

In hoc affectu nonnulla consideranda, i. o. miranda occurrunt. 1. Uterum e corpore propendentem secum rapuisse tantam vesicæ portionem, quod rarissime (si unquam) antea visum est, quantumvis partes sint circa oscula continuæ.

Crediderim hoc in illa vetula accidisse propter difficultatem mingendi, a calculorum copia ortam, unde conatus urinam reddendi fuere continui, & quidem tanti, ut per coactionem dictam impediri non potuerit.

2. Quod moles e corpore propendens, & nil præter uterum mentiens, ob calculorum magnitudinem & numerum, nullam inæqualitatem; nec aliam formam sit adepta, supernicies enim admodum erat æqualis, & figura uteri naturalis.

3. Admirationi est, calculos omnes eandem ferè obtinere formam; & adeo æquales esse superficie, ac si essent planati.

4. Vulnus ad consolidationem pervenisse, quamvis parti vesicæ membranæ milicium, per quod urina assiduo stillabat.

5. Considerandum est, non omnes calculos in illa vesicæ portione, quæ uterum invellens simul e corpore propendebat, hæsisse; non enim satis ampla ratione magnitudinis & numeri calculorum, sed nonnullos in ipsa operatione ab altiori & profundiori vesicæ parte descendisse dubitandum non est.

6. Inauditum lithotomiam in Muliere adeo annosa cum tanto successu, esse institutam, in mulieribus calculi dilatatione urethræ quidem extrahuntur; at perquam rarum est, sectione vesicæ idem periculi. *Frider. Ruyschius in Observ. Anatomico Chirurgic.*

#### *Calculi tussi rejecti.*

Dum pectoris hic vitia recensco, præteritam alibi calculorum pulmoneorum historiam adferre lubet. Mula sane res, nullam adeo esse corporis partem, quam non petrica illa idea infanet; & cum in perpetua viscerum succussione solidum concrefcere posse difficile creditum sit, jam nec pulmones, reciprocis uique agitati motibus, a receptu solidi, lapideique concretum immunes apparent. Migrare sane aliquando & in illam partem vis petrica solet, novoque Phænomeno spectantium oculos confundere. Studiosus Anglus, disciplinæ olim mæx concretus, diligens valde & sedentarius, cum operas suas vel occitfallendi causa aut exspectatione melioris sortis Residenti cuidam Anglo locasset, eique ab epistolis esset, nimia industria, vitæque partim jucundæ tædio, in tussiculam primum mox ingravescentem, usque tamen siccam, prolapsus est; hæc ipsa cum quatuordecim demum dies frustra laborantem fatigasset, tandem post iteratas tusses vehementiores solidum rejecit ore frustillum, quod cum attentius exigeret, deprehendit lapillum esse inæqualem undique & crenatum, loci, in quo hæserat, formam referentem.

sed neque excreto eo malacia; conti-

nuo enim infestabat alia post aliam tussis eaque semper sicca, donec elapsis aliquot diebus alterum extulisset lapillum. Nec cum tamen quies, insurgente iterum tussi, ex qua tandem rejectio tertio post aliquot dies calculo convaluit. Exinde nullum lentis incommodum e Gambrius ad Anglos feliciter transfretans, etiam nunc post biennium moram navatæque Praxi medica operanti, commodè agente. Erat alias Nephriticis doloribus oculorumque inflammationibus obnoxius, sed a quibus illo tempore immunes vixit. Tussi sicca occurrebat quidem lentis illis viscosisque succis, Symplo puyubino, quædam &c. quibus etiam nihil mitigaretur, oblita tamen per viscosa dulcia interna Tracheæ superficiei hæsiros alias angulorum asperitate calculos auspiciato rejecit. Hic vero non levis scrupulus cogitantibus oboritur, unde & quando iam calculi in pulmonum bronchiâ sese inseruerint. Limosum pituita viscum arefcere planè, negotiumque tussiculosis tacescere vidimus, & nullum inde calculi periculum; ideam aut fermentum lapidum um errore quodam per diversa corporis vagatum pituita bronchiâ tandem incubuisse credent haud dubie, quos archetypidem subtiliumque rerum veneratio incellit. Cum autem nulla alia evadendi via sit, alterum in re perplexa eligendum, & quidem virtuti cuiam lapidinis in tam repentino Lymphæ coagulo hoc facilius accedo, quod nunquam ante in pulmoneus quidquam senserit inconmodi, & postquam semel invadere tussis experat, non ante illa desierit, quam ejectis, quos subito vis aut halitus Gorgoneus contraxerat, lapillis. Quodum vero fuerit coagulationis subjectum, perinde incertum, vero tamen similis ipsam illam lympham interiora bronchiorum obtingentem, ut glandis quibusdam suis ortum debet, ab halitu coagulante subito deprehensum in fibrillas, ut neri alias in cryptis solet, coivine formamque ab annulata illorum ramorum bronchialium textura collapsuque alternato accepit. *Joan. Nicol. Pechlin. Observ. P. 1. §. 1. medic. lib. 2. Observat. 4.*

Ante tres circiter annos, Geneva, in Hospitali, paupercula quædam puella annos 15, nata, atrocissimos lumborum, pectinis, & perinæ dolores impulabat, tum de urinæ difficultate, & suppressione multum querebatur, quædam autem die cum symptomata omnia ingravescere visa essent calculum unum fabam crassitæquantem, subrufum, solidissimum, ponderosissimum, uno verbo, silecem in lumbis cipa collectum omnino referentem egre ut videbatur excrevit. Plures dein tales calculos etiam multo majores, per aliquot dierum intervallum obitetricantibus mulierculis enixa est. Donec casus insolentia in pulsus, simul & dolum suspicatus Medicus Hospitalis ordinarius nos una cum Chirurgis, qui rem penitus scrutarentur, accessit. Inquisitionem primo, pudoris & futuri doloris prætextu recusabat illa, sed mox, fore ut Chirurgis etiam imponeret confidens, se ad examen ut par erat composuit. Diductis vulvæ labiis, & nymphis, Urethræ toramen nullatenus dilatatum apparuit. Immisso cathetere nullus deprehensus in vesicâ calculus. Postquam explorata est vesica, Chirurgus vaginæ ingres-



sum apice digiti, virginitatis ocellum violare metuens, leviter primo attingit, at cū frustra per agnovisset, digitis altius adactis, ovolum lapideum columbino similem e vaginæ fundo extrahit. Nequitiam fateri cogitur mendica, virgisque impostura expiatur. Sane si improba hæc, unum aut alterum subdititium calculum prius diebus reddidisse contenta, visitatione, & inspectione fraudis apertè convicta non fuisset; tunces fluxatilibus similes, etiam in vesica quandoque succrevisse, non pauci hodie affirmarent. *Ant. Bibliothec. Auzo. Tom. 1.*

#### *Anatomica inspectiones.*

Eas fuscè vide descriptas capitibus de ischuria, dysuria, stranguria, ardoribus urinæ &c. Hic itaque tantum quædam.

#### *Historia vesicae monstruosa magni Casauboni.*

Summus & Clarissimus Vir Isaacus Casubonus corpus gracile & siccum a natura sortitus erat, temperamento ex biliolo in melius inclinatum plurimum declinante. Ignei vigoris & celestis originis animam continebat in gule ergastulum, quod exili, nec importuna mole haud grave, hospitem sui plane juris esse sensit. Hinc factum, ut literis dedicissimum mens parvam admodum habuerit domicilii sui rationem, ita vir magnus non impalluit nodò, sed penè inaruit chartis. Paucis vel ferè nullis magnis morbis obnoxium transiegit illud quod Deus ipsi indulsit ætatis curriculum. Et castigata corporis exsucci conformatio, fecit ut ea non senserit, vel leviter expertus fuerit incommoda, quæ vitam sedentariam, ut plurimum, consequuntur. Arenosam aliquando labant in æpuluere renes, non sine aliquo vetricis inter merendum ardore, nihil tamen citatundigant, vel quod sedant, aut merentem in postulare operam. Calum, solumque mutavit sæpius, ab urbibus, & principibus viris doctrinæ non vulgæ ris nomine humanissime invitatus, & exceptus honorificentissime, ut pateat ipsum non iam alluvie vicinis legi. Tandem a Jacobo primo Britanniarum rege accersitus, in florentissimo illo regno vixit per triennium. Pensum a maximo rege accepit grave, at humeris, qui antiquorum nodis, atque ænigmatis solvendis innutriti erant, non impar. Theologicum aggressus opus, in Baronium ultra annum insudavit. Hinc abstrusioris suæ eruditionis specimini edendo, annum in varia distrahi, & pungentibus agitari non novum, ubi de asserenda veritate & pariter de fæne discriminare agitur, præsertim in polemico scribendi genere. Quot Evolvit illo temporis spatio patrum antiquorum volumina? Quot horas in musæo Epularum inmemor, veluti raptus in *terris*, trivis vir optimus, qui terram calcans pedibus, celo mente affixus erat. Quot insomnes transegit noctes? ut accuratissimum illud opus cuderet, & luci tandem daret, quod nunc in antiquitatis depravatores, quantumvis purpuratos prostat? Hic paulatim vires immuni corpus magis ac magis extenuari, dissipari spiritus, & debilitari calor natus functionum omnium opifex, quibus cessanti-

bus, vel saltem facultatum latione depravatis, excrementorum quotidiana germinatione incrementum proventu, partes obrui, & naturam tandem fatiscere necesse est.

Duodecimo circiter ante obitum mense, qui vel ante quieverat; vel fugaci presentia obitio saltem molesti fuerant, inter merendum punctoria dolores, & urinæ ardores redivi, coeperunt virum tægere, prius longioribus intervallis, novaque præsertim importuni, ita ut dum emmerumperent somnum, & expectatum adigerent ad matutina. Rubrarum arenularum proelio, causa istius irritationis statuebatur; neque ullis poterat æger incommodis a studiis avelli, una tandem ardore difficultatem patiens lubinde lutebat gradum, & non citandebatur, nisi mediocri saltem usu, itaque incurvato corpore & facie pronata, tanta quando expulsiis irritatio, ut qui parce olim, vel semel, tota nocte solum urina emittere, intra paucos menses bis, ter, quater, quinque, sexies, & tandem innumis vicibus cogebatur cum iniem surgere. Periculis dolor, grave quoque merens pondus, inter merendum elui exoneratæ cupiditas. Excandentem urinam conturbatur dolor, cum per totum canalem retrahere, tum nunc in glande, cuius semus erat quasi in litore acuminum simul pungentium lugens in dorso aliquando calor, ad quem levissimum vellem sæpius deponere cogebatur. Urinæ ut plurimum pallidæ cum mucoto sedimento, post Equitationem, vel violentius exercitum ambulationis cum arenosis granis crassioribus, vel tenuioribus lapillis rotundis, præduris plurimis, quorum nonnulli granum tritici, plerique nulli magnitudine æquabant. Ita symptomatum syndrone medicis calculi in vesica latentis suspicionem iniecit. Quem cum cathetere explorare nullo, nullus mirum cito in ventem eoratis, sed ita præclusa via, ut apperere videretur, ut eorum obsiderentur infima. Inter numerotum istum symptomatum concurrens, quæ vel athletico corpori perambulando, satis erant, sexto ante latorem diem, in parte hypochondrii sinistra, inter albam lineam (seu ventris regionem supra pubem) & mæ, efflorescere cepit tumor, intar jugi, nodis primum, qui paulatim auctus ad pugni magnitudinem vel potius latitudinem excrevit, cesinens in obtusum acumen; Molliter, & qui in cunctatione, quæ contrectationem sequebatur, aquam subelle certo indicabat. Sicuti uber inter tuffendum vel respirandum, musculorum abdominis motus materiam sub eisdem contineri, tumoris circumscriptio, eandem non in ventris cavitate vagam, sed in quadam cyti concludi arguebat. Si durius impressa manu tractaretur tumor, vesica in consensum tracta dolebat, & micturiebat æger. Id quod a partium vicinis, & vesicæ inter duas peritonæi tunicas sepultæ, cum tumore connexionem fieri credebatur. Subsistebat nonnunquam, & paucis post diebus ad pristinam redibat dimissionem. In misero illo statu vitam languidam mensibus aliquot traxit, donec instante, ultima & fatali hora, sic acceleratus fuit viri piissimi interitus, ut sereno die animi recreandi, & corporis gratia exercendi, Rheda vectus, decem angli-



Anglica miliaria percurrit. Reversus domum noctu minxit frequentissime, aucti dolores, aucta dysuria, cum stranguria, urinae cruentae cum sedimento mucoso, quod maxime tenacis & vitreae pituitae simile aliquid puris admixtum habebat. Inuadit inter mictendum desidendi cupiditas, exclusi calculi exiles quam plurimi, aucta uno verbo omnia. Inuasit febris, quae antea per intervalla inaequalia, licet levis, non tamen sine aliquo horrore, & inordinatis rigoribus occupaverat. Pugnatum iis quae acrimoniam lotii demulcere, mictum incidere, eique facilem lenitionem viarum exitum procurare valebant; Vano sane labore. Siquidem urinae tunc olidae, turbidae, instar lixivii, aut cerevisiae, profluxerunt, sine levamine: cum mictionem novum exciperet illico mictendi desiderium. Ardorem internum sibi molestissimum dicebat æger, & calidissimae reddebantur urinae, etiam ad tangentis manuum: mucus erat dimidi lotii pars, aliquando etiam quicquid reddebatur, mucus erat tam tenaci filo cohaerens, ut vix divelli posset, & ex matula in pavimentum lubrico & continuo contextu efflueret. Notatu autem dignum, quod post redditam ingentem istius albugineae pituitae quantitatē, hoc symptoma per duos vel tres dies inducias dabit, nova Egestionē facta denuo ut ante recurrens. Tam diu cruciatusbus excarnificatum tenue corpusculum ad dies 20. duravit, continua febris tabefactum, perpetua effluentis lotii, & fusae alui vacuatione, pumice siccius redditum, urinae foetore, quem ipse oris spiritus redolebat, infectum. Donec tandem felix animula sui carceris impatiens, cui ab ipsis conformationis primordiis, iniquis conditionibus alligata fuerat, vocante supremo rerum conditore, ad suam migrans originem, corpus humo, articeis lacrymas, litteratis raram Eruditionem, omnibus probis eximiam pietatem imitandam reliquit. Die veneris Kal. Jul. 1614. ætatis anno 57. lecto autem cadavere, post exquisitam singularium partium perscrutationem, sequentia fidelibus oculis objecta fuerunt. Vrethrae inditus catheter argenteus nulla arte, nulla vi, valuit in vesicam adigi, ita ut secta per perinæ longitudinem vrethra manifeste apparuerit *emarginatus supra*, meatum occupas, foris intro resistens, sed ab interna parte foras obsequentius, collo vesicæ appositae adlites glandulae, prostatae dictae, quadruplo majores quam naturalis ferret conformatio, vesicæ corpus contractum, crassum, & admodum spissum, interna sui parte rugis quam plurimis & veluti cuniculis exculptum, quorum cavernulae lapillis infinitis rotundis scatebant: collum interius, quod declive levi canaliculos in ulla protuberantia naturaliter in vrethram desinit, introrsum tumens, elatum instar podicis gallinae, vel colli interioris uteri; ita ut in ambitu esset veluti sulcus, seu cavitas, per quam circumduci poterat digitus, cuius magnitudinem facile admittebat colli orificium, per vrethrae retractionem sursum factam formatum, quae virgæ in attrigendo incurvationem invehebat. ad sinistram latus perforatum fuit vesicæ corpus, & per rimum rotundo foramine, quatuor digitorum apices admittente, in saccum sive *ex quo* vesicæ, vel additamentum ve-

sicam quæ urina turgens capacitatis erat ad vesicam sextuplæ. Habuit sacculus iste tunicas tres seu membranas, cum vesicæ membranis continuas, spissas admodum, (nequis *induratus* comminiscatur) cum insignibus nervis, venis & arteriis, situs talis, ut totam *intermedia* partem sinistram occuparet, usque ad ossa tium, instar vesicæ, in ipsa peritonæi duplicatura latitans. Figura ejus inæqualis, ita ut infra foramen infima sacci pars propenderet plurimum, sicuti superior peritonæo affixa firmius, multum supereminerebat, utraque vesicæ lotio turgens plenissime. At in additamentum fundo, infra foramen pensili ingens saburra putruerit olidimuci sive Phlegmatis vitrei, quod cum tanto nisu & dolore à misero ægro profundebatur. Vesica ipsa neque ulcerata, neque inflammationis præseferens vestigium. Additamentum interterni membranæ erosa variis in locis, atque ob inæquationem rubra, livida, nigra, gangrena proxima, quæ mortis certissima, & inevitabilis causa fuisse videtur. Vieteres latius, urina turgida; similiter instar sacci tunicas gliscibat profundius, uterque autem desinebat in vesicam veram, paulo supra collum. Rex dexter totus purulentus, latus similiter. Partes ceteræ sanæ, exceptis pulm. onibus, quos corruerat & demgraverat terina & perennis fluxio à capite in ipsorum bronchia & substantiam, continuo stillans, quem prodebat ordinaria tussicula, & in ultimo hoc morbo consueta raucedo ingenuinata, etiam usque ad aliquam difficultatem vocis edendæ.

Vitiosa istius conformationis in numero, situ, & meatu monstrum, quomodo doctorum animus exercendis satis est atque amplum aperit campum disquisitioni medicæ; in hac lubet exspatari planitie, cum ut credant *interdum* quotidie nova occurrere, quæ sub antiquorum specie nobis imponere possunt, & conjectura acumen fallere, tum ut in observando, doculi, in prædicando, & judicando cauti, in operando religiosi, atque periculosa festinatione alienissimi esse ediscant. tamen cum ignotam fuisse tot malorum causam, & deceptos medicos omnes, quorum alii calculum prægrandem adesse, alii ulcus in vesicæ, quidam tumorem aquosum, partem inter mucus, & peritonæum exillentem, occupare autumabant. Rara non sunt artis, & in conjecturis quantumvis artificialibus, parum est induci. Errorem suum confiteri ingenuum est in rebus inauditis, & nulli visis decipi non turpe observata, (licet prognosi potius quam therapie idonea) posteris pandere non inglorium.

Equidem ab ipsis conceptionis primordiis vim plasticam in hoc subiecto inolevit utique & gravi errore lussisse arbitror, dum concurrente nitia ad vesicam fingendam à parentibus decidua materia, eam cum *capite* & cum foramine, in hoc additamentum ducente formavit. Eodem plane modo quo henes, & testiculos duos & tres, sextum quoque digitum non semel vidimus. Ita semina confusorum, & sanguinis materni affluentis superflua quantitas, una cum vegeto calore, formas e potestate oblate materiae educente monstragignit. Porro credibile est istud additamentum primis annis vel exile admodum fuisse, vel etiam ipsi vesicæ,



sic agglutinatum, ut vel nihil excipere, vel exceptum statim refundere in naturalem alveum valeret. Incrementi autem, seu dilatationis ipsius primordia tum capisse verisimile est, cum vir pius penso gravissimo nimium intentus, dies, noctesque libris assidens per multos menses transegit, tum siquidem lotii reddendi inmemorem quotidie, imò quavis hora reddebat animam naturalibus ad sublimia avocatio. Ita ut à corpore veluti abstracta mens, nec incommoda sentiret, neque munus necessarii vacare, vel ad corporis vilia officia se demittere dignetur. Si in quibus mens agrotat, dolorem non sentiunt, quidni vesicæ pondus negligitur? quoties interventioribus studiis calor & spiritus ad rationis arcem vi quadam rapti, totum cerebrum sibi vendicant, neglectis, nisi quantum ad vitam sat est, ut ita dicam, ignobilioribus partibus. Id videre est, non tantum in melancholicorum, sed impia religiosorum, nec non in amantium sacrum. Jam vero motus principium quantumvis debile, sat est ad incrementum. In dies aucta fuit ista dilatatio, viresque acquisivit cundo, & concavum istud corpus membranosum ductile, & facili extensionis, repletionem crevit, inter peritonæi tunicas deorsum versus primo, ni fallor, ob contenti fæculenti pondus, deinde sursum suum natum dimensionem ad lævam hypogastrii primo extuberavit levius, deinde ingeni erupuit tumore; quod videlicet ad interiora dilatatio obice ossium ilium, & pnbis impediretur, quæ ad laterum mollitudinem erat facillima, neque verò impune tulit istam extensionis libertatem ipsa naturalis vesica, cujus membranas cum additamenti tunicis continuas, his licentius expansis in se retrahi & tandem corrugari necessum fuit. Sed quod gravius est, cum fibrarum transversarum & obliquarum beneficio, succedat quantitate gravius lotii expulsio, partis autem organicæ perfectio in legitima conformatione consistat, solutionem illam continui, actionum læsio, quæ inutilem vesicam reddit, consequuta est, itaque per ureteres à calidissimis renibus ex toto corpore emulcum serum deducebatur quidem in vesicam, sed cum ea nisi inæqualiter in se comprimere non posset, ad expulsionem partem naturalem, partem voluntariam, antequam meiendi inceperit voluntas. Saccum seu *infern* oportebat impleri, etiam usque ad molestiæ importunum sensum, & consecutione necessaria, in dies paulatim magis ac magis dilatari; hinc factum est, ut intra paucos menses à dilatationis principio in magnam excreverit amplitudinem, quam excrementi quantitas, & facultatis imbecillitas æquali passu quotidie invalescant. Interioris membranz vesicæ corrugatio urethram intro traxit, & collum ipsum corrugatum in formam podicis gallinæ expulit, quæ causa una ex multis erat difficultatis in meiando, unica autem, ni fallor; incurvationis virgæ in arrigendo, cum urethræ membrana nimis sequax, cavernosa corpora in arcum reflexa retineret. Idem ab inflammatione tumorem abbreviantem procurante in gonorrhœa contingere solet. Calculos in vesicæ rugosæ cuniculis infinitos creavit urinz tartareum sedimentum. Ea siquidem & naturaliter in hoc subiecto, plurimo turgebat sale; & illius terræ

portionis separatio, sive tartari coagulatio, promovebatur mora, quam excrementum præ languore, inio impotentia expultricis ob organi vitium, in cavitate lacere cogebatur, proinde ac sui ipsius inspuationem, & non ogeorum ab heterogeneis separationem, vi caloris nunquam tentantis experiri.

Cur vero in inio lactitundo nullus calculus etiam prægrandis, cum ei generando plurima materia suppeteret, coagulationi etiam proxima? nempe quod in inio euripo utus lævi, non cuniculoso, perpetuus quam esset urinz meatus & reniculus zitus, cujus fluctibus pars eluebatur.

At ut generetur per additionem partium calculus, quiete opus est. Adde quod desunt illi concretioni tempus, ei siquidem mors existentiam paripuit. Ulcus velicæ qui statuerant, decepti fuerunt excreto purulento, confusi, quod a rene dextro putri, iudai. mato, & calorem intolerantem lumborum excitante, pronebat. Ulceratus sanè erat saccus; saluginosi tartari, & lotii putris & statione fæculenti, amurex acumine. Quæ materia cum in hujus additamenti declivi atque intra foramen multum propendente, & demisso fundo diutius stagnans hæretet, erosionem pariebat, à qua immunitis erat vesica, per quam momentaneus saltem dabatur, ob ejus angustiam transitus. Mucum autem live mucil. gnosum phlegma, seu saccem tartaream plurimam continebat *infern* velutinens, actionisque omnis expers additamentum, quod præter eam separationem, quæ ab ipsa urinz substantia nebat etiam conactione suæ substantiæ membranosz fundebat viscidum excrementum, non minus quam ipsa vesica vel calculo irritata, vel urinz mordaci sale corrosa, eodem planè modo, quo puncti limaces, salivam ex proprio corpore in se contracto, expressione rejiciunt, viscida esse solent spermaticarum partium, imprimis verò membranarum excrementa. His positis, & diligenter perpensis, hanc obscurum est, quænam fuerint symptomatum causa, quibus vir tantus ad acerbam & crudelem necem excommunicatus fuit. Sed cur inter meiendum oleti sciendi cupiditas, quæ ut plurimum calculi grandioris vesicam occupantis est signum pathognomonicon? cur non incumbens pondus, quod si faci conjecturâ, vel oculatissimis medicis imposuit? Nempe ab ingenti prostaticarum tumore, quorum corpus inter meiendum intellinum rectum premebat, & gravitate molestum naturam ad exonerendam alvum sollicitabat, idque eò violentius, quod pari nisu per musculorum abdominis introrsum factam contractionem comprimendo, urina & crassiores forces exprimantur. Tumor autem istarum glandularum, an fuit naturalis in homine, cui vasa spermatica ampla, & qui plurimos suscepit liberos? An potius cum fecit urethræ contractio, colli vesicæ violenta sursum attractio, quæ latitudini addit quod demit longitudinis? an dolor, calorve, quorum proprium est ad partem affectam trahere, multò magis glandulas, quæ laxæ, molles, spongiosæ, recipiendum prone, ad expellendum sunt ineptissimæ? Tot tantorum malorum hydræ non potuit non consequi mors, quæ multorum accidentium populo-



sa cæterva stipata, lento pede virum feliciter  
extingui dignissimum, tandem jugulavit, hæc ha-  
be, clarissime vir, à tuo Brouardo. Autor *Biblior.*  
*Anat. Tom. 1. ab Autore max memorato qui historiam*  
*hanc à Clar. Theodoro de Mayerne, us creditur, ex-*  
*scripsit.*

*Dominici Drelinconre ad Dominum Vallot Episto-*  
*la Prior.*

*In quâ de Calculi & caruncularum vesicae*  
*extractione agitur.*

Adsum, vir Amplissime, fidem meam libe-  
raturus: cum autem Regis absentia, quomi-  
nus præsens præsenti te alloqui possim, im-  
pedi, scripto rem conficiam.

Normanus cystotomiam modo passus est.  
Calculus extractus tres uncias iusto pondere  
pendit longus & latus est, ut ovum gallinae  
maiusculum at non ita crassus, nec ita rotundus  
fundo, vesicæ, latere suo depressiori. durabit, &  
ibique carunculis innumeris, quæ forcipibus  
accessum omnino præcludebat, veluti circum-  
vallabatur. Oppugnandum itaque fuit vallum  
istud, duæque carunculae quæ operatori majori  
impedimento erant, extirpandæ fuerunt.

Reliquæ prudenter relictae sunt usque ad sup-  
purationem, quæ e sper vulnus sensit, & tu-  
tius quàm violenta & subita avulsione t. etum  
fuisse auferret. Dux ita carunculae, avellanae, vel  
testiculo pueri x. aut xii. annorum similes  
sunt: hbrisillas verò in basi sua validas, & subru-  
bentes habent, quas ipsarum radices voco,  
quibusque vesicæ uniebantur. Porro duræ &  
scirrhoræ sunt, atque adeo lubricæ ut vix digi-  
tis contineri possint. Cylti, seu tunica rubi-  
cundissima & validissima arctè annectuntur.  
Earum interior pars, tunica cornea, ubi ner-  
vum opticum circumdat, magis alba & du-  
rior est: eas aculis vel patellæ tendui, seu  
potius *lupæ* seu nodo minori durissimo, & gan-  
glio comparo. Dura enim illa & nervosa vesicæ  
corpora filamentorum myriadibus, quibus *ten-*  
*dines conflare prius relexi*, carent. At solidita-  
tem coriaceam, & nodosam non secus ac *lupæ*,  
& ganglia durissima nactæ sunt.

In harum altera cavitatem ovalem admira-  
tus sum, in qua calculus niger & durus, ut gra-  
num tritici secundum longitudinem filum,  
crassus & longus, nidulabatur, sed ad operatio-  
nem nostram redeamus.

Post integrum seniliorum, quod in extir-  
pandis duabus his carunculis consumptum est,  
calculus ab omnibus, quibus vesicæ clavo ve-  
luti affixus erat obicibus, liberatus est: alias  
enim, nisi remota fuissent impedimenta, fru-  
stra forcipibus, tum aduncis, tum rectis, ten-  
tabatur: apprehensionem usque & usque elu-  
debat, quæ forcipes ipsi incurvabantur, sed  
tandem digitis eo intrusis, ut in placenta ab  
uteri parietibus separatione usu venit, à vin-  
culis quibus alligabatur, dexterè solutus est,  
atque ita totus apprehensus, & ut pariter con-  
verti, tandem eductus est.

Quod si in hoc casu repente & primò ag-  
gressi expugnari non potuit, non ideo mino-  
ri laude dignus D. Hieronymus Collot, cujus  
constantis solertia, ægri patientia non parùm  
adiuta, reclamantibus licet omnibus, opera-

tionemque in aliud tempus differre suadenti-  
bus, audacter nihilo secius extractus est.

Si post cruciatum, & durationem, & gradu  
adeò enormes, patiens à febre, singultu vomitu,  
tussi, delirio, abdominis inflatione, gangrana & aliis  
id genus pessimis auguris, immunis sit, erit  
quo Deo benedicat: sed partibus illis membra-  
nosis ferro divulsis & devastatis, aërique tam  
diu expositis perniciosi fore ut non accidant  
symptomata, in seue potissimum, cujus vires  
tam longa, tanque dolorifica operatione  
exolutæ, vix mihi persuadeam. Necesse tamen  
omnia ex arte peragam, rem totam, de  
cætero, supremo vitæ & mortis arbitro com-  
mittens Paris. 18. Augusti 1603. ex translatione  
Autorum *Bibliothec. Anatom. Tom. 1.*

*Ejusdem ad eundem epistola posterior.*

*Vesica, ejusque caruncularum, callorum, tar-*  
*tari etc. descriptionem continens.*

Pretiosa benevolentia tua notas, eo quo  
debebam grato animo, accepi, vir amplissi-  
me, us non melius respondere queo, quam  
continuatione historiae, cujus progressum &  
finem audire tantopere gestis. Omnia cum  
prognostico meo perfecte quadrant: uno ver-  
bo, nè te auxilium diutius detineam; bonus  
ille vir 24. ab operatione die, 63. ætatis anno,  
fatus functus est.

Suppurationem tam lento gradu venire æ-  
gre admodum ferebam, undecima enim dun-  
taxat die, idque adeò parvè & leviter ut nullus  
inde spei radius affulgeret, apparuit. Varia ad  
paucitatem & tarditatem illam conferebant;  
nanique urina quæ copiosè & jugiter a vulnere  
manabat, una cum frequentibus nostris in-  
jectionibus, partes omnes incisus indefinenter  
lavabant, ac prompè laudabilis suppuratio-  
nis materiam sentim auferbant. Adde quod  
calor natus a spirituum exhaustionem debili-  
tatis, in operatione adeò molesta, & longa,  
nullam digestionem in partibus illis nervosis,  
& à vitali leatitudine remotis, facere poterat,  
in seue potissimum, qui ventriculus suum  
plus æquo onerabat, & qui à tussi perniciosa  
& molestissima, sine intermissione, affige-  
batur: etenim præter sensibile illudicium hu-  
moris cujusdam viscidii & copiosi tussim irritan-  
tis, ejus pulmones violenter aliunde succutie-  
bantur; partim, scilicet ab humore alio, in  
bronchia altius jam adactio, partim etiam  
propter admirandum pulm. oadum cum vesica  
contensum, qui nervorum & cerebri & spina  
ortorum utrique parti communium, atque hic  
incisione laesorum, ope h. Eo res redactæ  
erant, ut si hinc per aliquot temporis momen-  
ta, malacia fruerentur, procella illinc diu  
& cum maximo impetu nos ageretur: Siquidem  
vix tussis gravissima cessaverat, quum alvi flu-  
xus, quo vires, multo magis quàm ab ipsa  
pulmonum commotione, deterebantur, in-  
grediebatur. Duo illa symptomata simul in agri  
perniciem dixisses conspiravisse, sibi enim  
mutuò suppetias ferebant, nec ab uno eorum  
liberabatur patiens, quin ab altero illico etiam  
vehementius vexaretur. Verum comparatione  
facta, tussis diarrhoea crudelior hostis erat, cum  
illa somnum exulare juberet, vulnus irritaret,  
ab



ab eoque calorem omnem naturalem & amicum diverteret, ut illius loco ignem extraneum & perniciosum introduceret; præterquam quod sputa adeo viscida erant, ut nulla arte incidere aut detergi possent: diarrhoea vero; etiam vires prostraret, peccus, ex parte saltem, levabat, & universalis evacuationis loco erat.

Cor nullatenus affectum videbatur, nisi respectu febris; quæ per vices vehementer accensa, non parum negotii mihi faciebat; incensum enim si medicamentis & alimentorum susceptione extinguere conarer, nativum partium omnium ignem manifeste suffocabam. fortiori itaque cedenlum erat, multumque de mea se veritate remittendum, quia defuncti voracitas ordinaria me diutè exatè liantes transgredi cogebat: in ò febre sensibilibiter immum, quotiescumque paulò largius comederet observabam; quippe eibus ingestus calor illum ignem & destruentem, à quo alioquin contumebatur, occupabat.

Non multum turbabat, & ex quo tussis inducias quadatenus dabat diarrhoea quominus dormiret non obstitabat; somnum enim soluta alvus, si non lecti lectum inquinantis frequens excretio, non interrumperebat: paucus autem ille somnus ipsi manifestè proficiuus erat, excitatus siquidem, validior semper, & omnibus sensibus liberior apparebat. Sed ad Cystotomiam redeamus.

A primis diebus abdomen tensum admodum, serotumque sero turgidum erat plures & in eo ecchymoses apprebant. At cum hæc symptomata huiusmodi operationem frequentat satis sublevarentur, ad ea minus attendebam quam ad vulneris labia, quæ penitus livida, sicca, & sensu privata (non tamen dura in ambitu, ut in ulcere, quæ in subitumida essent) apparebant. Variis olei rosati supra in anum ventremque & per totum embrochationes, variasque ex vino aloë, spiritibus, tritolochna rotunda, myrrha, aloë, & theriaca injectiones pro vulnere præscripsi. Unde, Deo benedicente, totum abdomen, totumque serotum pristino statui restituit. Quia ipsa bichara, forficem cupide leviter amota, a vivo abiecit: non secus ac cantherii eruita a carne subiecta decidit. In omni huiusmodi versabamur die; tumque, duat. xas, ut jam supra dixi, suppuratio primum viscit. Ablata eruita hac nigra & incombili, vividus color, sensus exquisitissimus in vulnere deprehendebatur. Interiora non ita ut prius abdita erant, cannula, & forcipes haud ita agere introducebantur, quia nimium, Eschara delapsa, si nus longe apertius erat, quam dum ipsius labia crassissimis crustis obducebantur. Caruncularum etiam in vesica relictarum corpus hac effere, atque earum radices suppurari ipsequebat, ad eo ut multo minus, quam antea spatium occuparet. In ò sex ex illis diversis diebus exierunt, quo factum, ut tanto facilius, in velle is fundum penetraremus, fortissimum odorem omnes hæc caruncula spirantes. Has tan eu diligenter lustravi. Duabus primis, supra descriptis non erant absimiles, nisi quod ne nullum includerent calculum. sed tartaro albisimo, & durissimo (in nonnullis locis, veluti totidem colliculi pro-

minentes) incrustarentur.

Postquam duarum eschararum, sexve caruncularum delapsus spatium nulli dedisset, oculis vesicam lustravi, & profunditatem ejus penetravi, in eaque multa corpora rotunda, consue accumulata, observavi. totidem carunculas (cum enim digitum, ne patienti horrorem incuterem, intro adigere non audebam; rectius judicare non poteram) credebam; atque earum, ut in sex prioribus videram, supurationem expectabam. Verum Etsi ægro meo diligentissime, & juxta omnes artis canones, medicinam fecerim, mihi, nihilominus secius nudius tertius, vesperi, ereptus est.

Abdomen lividum, peritonæum lividius, at omentum lividissimum erat, duosque ut id obiter dicam, cæcos tumores in inguinibus formabat, quos hic Epiplocelas, eodem jure ac si in seroto fuissent, nominarem. Verum usus tyrannus est, eique ideo me submitto.

Totum cadaver impense foetebat, renes nihilominus, & quæ ab eis pendunt examini, subieci: sed cum in duobus his urinæ cribris nihil singulare observaverim, ad vesicam transeo. Ejus membrana interna levis omnino, & integerrima erat, nec ullatenus dilacerata, vel ulceribus erosa, nisi quo in loco incisa fuerat, toto scilicet cervicis ipsius tractu, & profundius inter extremitates veterum.

Accurato hoc examine, tam si qui ulcus in vesica antequam incideretur, fuisse putabant, quam qui vesicam in operatione dilaceratam credebant, mendacii arguantur. Nam præterquam quod nullum hic ulceris præcedentis vestigium nobis apparuit defunctum nullas unquam urinas purulentas, sed vel simpliciter omphacium colore referentes, vel instar albumini, ovi viscidas & tenaces excrevit certe nescit. Ulcus autem sine pure imaginari non possum. si etiam vesica in operatione perstricta & lacerata fuisset, vel forcipes, vel calculus ipse nbris vel laciniis onanti vili fuissent: addo horrores vehementes, febre & delirio stipatos, convulsionesque horrendas quales sæpius in his casibus vidi, ægrum dubio procul à tertia die, e medio sublatura fuisse, nec possibile nobis futurum tandiu procrastinare, & & cum fato, cujus diem factam ad 14. usque distulimus, litigare; sed ad cadaver redeamus.

Vesica quanquam interius lævis, pluribus in locis nodosa, & inæqualis erat, tuberculis, nempe, duris & callosis hinc inde prominentibus, (quales sunt manuum calli, aut pedum clavi, vel potius ganglia circa nervos) scatebat. Dura enim illa & prominula corpora, substantiam admodum compactam, & in soliditate æque ac in albedine sua uniformem nacta erant.

Cæterum V. A. Materix cujusdam albæ, grumulis refertæ, & ut tartarum album friabilis, cumulos, cum singulari attentione expendendo lassari non potui. quod vero admirationem meam omnino superavit. Tartarum illud Scirrhusæ vesicæ substantiæ non tantum aggestum, sed cum ea veluti ferruminatum erat. Verum Tartarum cum dolii veteris asseribus arctius non unitur, quam mucilago hæc petrificata



his vesicæ callis agglutinabatur; adeo ut eam sine dexteritate, & violentia divellere non potuerim. Idcirco vesica mihi specum, seu potius fodinam, e qua lapides aut mineralia eruebant, representabat. Et re vera secunda erat fodina, quæ novos lapides perpetuo produxisset, recensque in horrida illa tupe eorum in dies auxisset.

Hic non subitit, V.A. quin oculis vidi, & digitis tetigi, id quod non paucis, qui in iis quæ ignorant ceteris doctiores haberi volunt, pro nugmento est. Caruncularum nimirum adhesionem, & connexionem, quæ nec in propria matrice unquam videram, nec a nativo solo unquam evulseram, observavi, & primo intuitu, balani canis *apud ægyptios* ideam, in imaginatione mea excitavit; at paulo post, illas honestius & forsitan aptius cum uvula, seu gurgulione, vel potius cum corde pulli gallinæcei comparavi. Quærit, nilubet, Vir Amplissimus comparationem minus claudicantem. Rem clarè jam describam.

Præter Callos & tactatum vesicæ, corpuscula quædam rubra, & firmissima vidi quæ in basi lata erant, paulatimque angusta evadebant, donec in acumen coloris vividi, & rubentis desinerent: acumen illud nullibi adhaerebat, basi verò vesicæ artissime alligabatur innumeris fibris, quæ, ceu totidem radices, corpusculis his vitam & nutritionem largiebantur. Qualemunque, ea ut sine vesicæ detrimento extirparem, adhibuerim diligentiam, incassum laboravi, eorum enim radices vivæ, & profundæ erant, illa tamen scriptorii scalpelli cuspidè avulsa, in spiritum terebinthinæ conservo.

Singulare quid, præterea, quod ex auditu non tantum noveram, at oculis nunquam usurpaveram, admiratus sum; maximam scilicet, copiam corpusculorum extraneorum, quæ inter vesicæ fibras ita irreperant, ut inde admodum tumens & scirrhosa esset, vesicam, utut tribus, constantem membranis; naturaliter tamen satis tenuem, & flexilem esse, atque ubi, nec multum extensa, nec multum contracta est, vix ad dimidii coronati argentei crassitudinem accedere, prætereaque ductilem omnino esse melius me nemo novit. V.A. Hæc tamen, nulla omni hyperbole, & secundum mensuram justam, 15. lineis Geometricis, quæ pollicem unum cum quadrante conficiunt, crassa erat, illam mulieris prægnantis, vel quæ recentè pepererit, uterò assimilavi, cum hoc tamen discrimine, quod hæc vesica adeo firma & dura, in toto suo corpore, erat, ut cornu ad ignem emollicum referre videretur. Eam sane nec comprimendo minuire, nec trahendo extendere quitussum; uterus verò licet à graviditate tumidus, mollis adhuc, est digitisque cedit.

Vesicam istam, transversam incidi, ejusque interiorè substantiam vasis, infinita diversæ magnitudinis perspicilla, admittentibus, trajectum offendi. Quantumvis igitur dura esset, poris & canalibus ubique perforata erat: Durities enim neque numerum neque magnitudinem pororum, aut meatuum excludit; nostra siquidem Diploë, nostræque Epiphytes (ut pumices, & corallia taceam) de duritie, æque ac de poris, certatim disputare videntur.

Quemadmodum vasa spermatica & Hypogast-

rica uteri, juxta embryonis incrementum inflantur, & crassescunt; ita venas & arterias vesicæ hypogastricas, ut carunculis alimentum (quod inde tanquam e placenta uterina, h. uriebant) suppeditarent, omnes dilatatas, atque expansas fuisse putavi.

At cum viderem tot canaliculos earum numerum ordinarium longe superare, ad ita contigisse credidi, qui scilicet singuli capillarum vasorum ramuli, ob exilitatem oculorum aciem in statu naturali fugientes, plurimum in hoc subiecto intumuerant, ut miseræ huic matrici, sanguinis proventum solito uberiores adveherent.

Finire non possum V.A. Quin prius vesicam istam, imminutam simul & auctam fuisse, annotem. Extendi enim non poterat, ut sana, ad justam urinæ quantitatem continendam, solebat. Contrahi item non potis erat, ut contrhebatur, prius quam tor lapillis, tartaro, callis, & carunculis impediretur. Iusto etiam tam enormem, de qua loquutus sum, crassitudinem non fortit. in fuisse, contentumque fibrarum ejus naturaliter se habuisse; ut prius tamen agere impossibile ipi erat; siquidem funum tot extraneis corporibus, illum, dom constringebatur, ut urinam expelleret, lædentibus, repletum erat.

Ino putaverim Carunculas illas potissimum quarum viventem truncum resecai, cum animata, & sensu exquisitissimo præditæ essent, dolorem inter merendum, intendisse; quippe quæ tunc temporis omnes invicem colliderentur, omnium siquidem c. pita sibi invicem occurrebant, vel mutuo irretiebantur.

Paucis ut absolvam, matricis harum caruncularum, & capacitatem & crassitudinem tibi melius representare non potes V.A. quam si digitorum apices jungendo, gallinæ pedicem inuteris, tum eos; hoc modo junctos, quam maxime fieri poterit, tenendo, ad volam, & radicem manus adduxeris, cavitas quam efformabis, vesicæ c. pacitatem referet: At digitorum, & præsertim metacarpi, crassitudo, ejusdem vesicæ (a me diverso modo incisæ, & in oleo terebinthinæ limpidissimo conservatæ) crassitudinem denotabit.

Nullus dubito, quin longior hæc Epistola patientiam tuam fatigaverit Ego verò ad te scribendo, nondum lassatus sum, sed urget tempus, meque concludere cogit. &c. Paris. 22. Septemb. 1663. Ex tradit. Arch. Bibliothec. Anatom. Tom. 1.

#### Calculus Renum.

Plumarum venditor emortuus ob renum ac pectoris vitia, habuit in utroque rene insignem calculum: disp. argenteum se quadruplici ramo, intus crucis per universum renem: adeo ut non potuisset inde eximi, nisi decerpisisses frustulam totum ipsius parenchyma. Viderint igitur illi, qui satis speciose docent, ex incisis renibus calculos eximere: quam turpi ignominia prostituerent & se & artem suam; siquidem aliquando inciderent in calculum tam limiter renibus innatum. Sed in thorace vidimus, tres aquæ libras, pulmonem costis adnatum, & cor, non tantum pericardio suo destitutum; sed exprimens præterea, externa sui parte, naturam pal



palescentis sevi. Quem colorem ipsi, procul dubio, impresterat aqua in thorace contenta uti luce clarius videre est, in eorum muculis, quos occidit, vel *adipemuratum*, vel *adipemuratum* Nicol. Tulpus *Observ. Medic. lib. 2. cap. 44.*

*Calculus ureterem obstruens.*

Quam utile foret agris, quemcunque curari, tam gloriosum utique esset Medicis singula futura predicere, sed l. tent sepe penitus morbi, & pertinaces ipsorum causæ, adnectuntur nonnunquam acutius corpori, quam ut possis semper vel intelligibiliter prælagire eventum, vel integrè expellere qualemcunque morbum.

Margarita Nicola, vidua quadraginta annorum, infecta aliquandiu, à dolore lumborum, procidit tandem in crudele calculi renalis tormentum, cum vomitu, febre, mensibus inordinatis, urinae difficultate, & interdum tanta ejus suppressione, ut totos octodecim dies, nihil loti reddiderit: unde exibat ipsi, ex sero fursim recurrente, primum sopor, sed mox tam gravis nervorum contractio, ut cogeretur vitam cum morte commutare.

Dissecio autem cadavere apparuit ren sinister, ut extrinsecus lividus, ac tumidus: sic intus frequenti aqua, & pluribus calculis infarctus. Quorum maxime innuaverat se, aucto suo apice, tam longè in ureteris principium: ut id integrè occluderetur; neque permitteretur illac descendere quicquam loti; licet potui darentur plurima aquam ducentia.

Ban enim tum foret latiore, quam ut permearet commodè, angustum hunc ductum, necesse fuit, quo plus urgeretur ab affluente sero, tanto quoque impensius intercludere transitum urine à renibus descendenti. Præsertim cum oppositi renis ureter, non minus utique occluderetur, à latiore aliquo lapide, instar operculi, ipsius principio imposito. Quæ duo obstacula conspicue omnibus ostensa, vendicant artem ab ignominia; & inculcarunt efficaciter.

*Non esse in Medico, semper relevetur ut ager.*

Sed dicat quis: quem terminum ponunt Medici, morti exsurgenti à suppressio lotior: aut non alios citius, alios vero occidit tardius? valentia corpora ut interdum excurrunt diem vigesimum: sic attingunt infirma vix septimum, vel octavum. Certum est, aliquos durasse ad undecimum, & tamen ex toto iterum convalescere, sed post illum diem, equidem certè videri neminem enavigasse, periculosum hoc syrtium æquor.

Quamvis enim cedat dolor, & fluat iterum lotium; reddidit tamen diuturnior illa mora urinam interea loti, usque adeo acrem, & vesicam ita effictam: ut ne præstantissimis quidem medicamenta possint ab interitu vindicare naturam, hæc ratione, non fictè, ac simulatè, sed plene emortuam. Nicol. Tulpus *Observ. Medic. lib. 2. cap. 45.*

*Renum & vesicae ulcus cum vesica calculo.*

Adolescens unde vigesimum annum natus à

longo tempore de vehementi dolore circa renis sinistri & vesicæ regionem, cum vomitu assiduus, & dolorifica urine excretionis quævis moritur.

Abdomine aperto ingens scotor apparuit. Exterius in superiore venter parte mollius, aut pugnè adæquans, luteo in ejus medio, pus conclusum ren sinistèr plane exulceratus purulentum illud in vesicæ sinistèr deposuisse videbatur. In ipsa vesicæ pro urina calculus rotundus, & nimis asper sequi unciam pendens. Interior tunica exulcerata.

Ab obstructionibus in renibus, aut vesicæ membranæ, inflammatio: ab inflammatione elicit unde & dolor. Vomitus ei abortus est, quia nervi intercostales cum renibus & vesicæ magnam connexionem habent, adeo ut si nervi renales convulsantur, etiam & ventriculi. Vesicæ textura ex duabus tunicis tendinosæ seu membranosis constat: intra ejus duplicaturam binæ fibrarum musculosarum series inveniuntur: quibus inflammatis pus facile intra tendinosas tunicas effundi potuit, unde sacculus purulentus. Calculus ante in vesicæ, an vero in rene cretus sit subitandum: credo tamen cum a rene primo descendisse & in vesicæ augmentum sumptisse, qui & vesicam forte nimis irritans ad instantandam adiegit. Stephan. Blaneard. *Anatom. pract. ration. Cent. 1. Obs. 43.*

*Calculosus senex aperius.*

Senex ultra sexaginta annos natus, sæpè febricula, pepsia, vitium imbecillitate &c. corripitur. Tandem odiosa tædiosa vita deposuit. Inspecto abdomine vesica calculum pyriformem continebat, admodum durum, ac in medio pervium, per illud oramen urine exitum habebat: quatuordecim uncias pendebat. Mirum, cum per totam vitæ ductum nunquam de calculo, dolore, gravitate aut suppressa urina quæsitum fuisset.

Ob perforatum calculum, urina nunquam sustulit, ideoque à doloribus maximis liber fuit. Ceterum non à calculo, verum ex scorbutico sanguine tandem obijt. Stephan. Blaneard. *Anatom. pract. ration. Cent. 1. Observ. 94.*

*Calculosi dissectio.*

Calculosus à febre lethali extinguitur. Hic bis decem ante annos de dolore luteum intolerabili conquestus est, vitiosa sæpe per diuresin excrevit. In cadavere exenterato ren sinistèr fuit consumptus, verum ejus loco calculus ramosus inventus: dexter fuit colore magis citrino, & lubusco; uretheres admodum capaces. Vesica distenta, & hydatidibus obsessa, magnum continens calculum. Ventriculus sanguine concreto exterius aspersus. Stephan. Blaneard. *Anatom. pract. ration. Cent. 2. Obs. 82.*

*Calculosi Anatome.*

Cujusdam, qui diu laboraverat calculo, cadaver aperitur, in ejus vesicæ septem reperti sunt calculi nucis moschatæ majoris magnitudine, ita ut simul ferè libram mercatoriam æ-



Quarent. *Stephan. Blaneard. Anatom. pratt. ration. Cens. 2. Observ. 96.*

*Ex calculis in uretere harentibus, ischuria lethalis.*

Quàm deplorabile malum sit vesicæ calculus, nemini ignotum; multo tamen adhuc crudelior affectus, calculus renum, si tantæ sit magnitudinis, ut ureterem transire nequeat; quia in hoc casu nil valet ars Medica, nil quoque Chirurgia prodest. Exemplo sit Chirurgus quidam Amstelodamensis anno 1682. qui a longo tempore nephriticus, multos calculos excreverat: denique in ischuriam spuriam incidens [ à quo semicupii beneficio semel liberatus à nobis fuerat paucis ante diebus ] & vehementissimis ventris, crurumque doloribus, & vomitu materiæ nigricantis, correptus, vitam tandem cum morte commutavit.

In cadavere aperto, reperi præter duos calculos in rene dextro, unum in uretere sinistro magnitudine & formâ olivæ exiguæ, cujus superficies innumerabilibus calculis & arenulis obfessa erat, qui omnem transitum urinx denegarunt.

Pars hujus ureteris suprâ calculum, propter calculorum transitum admodum erat dilatata, infra eundem verò naturalis capacitatis, at rubicundior justo ab inflammatione excitata. Renem ejusdem lateris monstruosæ magnitudinis, ut & ureteris maximam partem a quo humore obfessum inveni; cujus liquoris motum sæpissimè percepit æger, quum sese moveret, ut nobis indicabat *Frider. Ruyschius Obser. anatomico-chirurg. p. 20.*

*In Puella trienni calculi insolita magnitudinis.*

Puella tres annos præter propternatus, plus quam quinquaginta calculos excreverat, inter quos multi fuere magnitudine pisi minoris, ex relatione Domini Doctoris Bronckhorstii Medici Amstelodamensis, dum viveret, celeberrimi. Quantis cruciatibus miser ille fuerit vexatus, facilis est conjectura; neque cessarunt. Aperto dein cadavere, inveni renis sinistri pelvim admodum dilatatam, calculoque ingentis magnitudinis (pro ratione scilicet ætatis, quam obrem hanc recensere historiam mihi animus fuit) obfessam. *Frider. Ruyschius.*

*De insignibus renum calculis.*

Infans trimulus, ortum ducens à parentibus nephriticis, statim post partum magnâ vexabatur siti, præprimis noctu: accesserunt tormina ingentia, cum diarrhœa, & magnâ virium prostratione: dejecit autem ab initio serosa bile mixta; sub finem verò merè serosa & albicantia instar lactis coagulati, albumine ovorum similia, appetitus tamen nunquam prosternebatur: annum agens dimidium, incepit gradiri, incuriâ verò ancillæ factum est, ut in spinam dorsî caderet: ancilla tandem malum quod evenit consistente, de vertebrarum lumborum luxatione metuerunt parentes, remediisque decemibus, fasciacione præsertim huic in finem

usque sunt: nihilominus tractu temporis pedum quasi paralyti laborare videbatur: casum hunc in misello octo septimanas post excepit febris continua, ex quâ vires quidem recepit, persistente tamen toto ætatis decursu atrophîa totius corporis, pedum maxime. Tandem motus inordinatos in ipso animadverterunt parentes, unde nostram opem implostrarunt: vocati anti-epilepticiis pugnâvimus, hisque quæ nervorum genus demulcent, quibus licet cessare primum convulsiones viderentur, post octiduum tamen recurrerunt. Ab hoc tempore observant urinam parcius fluere, & nonnulli magnum dolorem, quem gestibus patefecit, ulque dum erupentibus unâ exanthematis ac pustulis ulcerosis, convulsiones ingravescentes, missellum interemerunt.

Licentiâ à parentibus nobis factâ, cadaver præsentibus aliquot vicis præstantissimis, quâ licuit diligentia lustravimus. In inamo ventre, ventriculum cum intestinis unitatum deprehendimus: hepar naturalis magnitudinis & molliciei, nisi quod color ad p. n. parum accesserit. Vesicula felle copiosâ bile distenta fuit: lien naturalis, epiploon verò consumtum. Mesenterium glandulis præditum albicantibus, mollibus usque plurimis. Ren dexter naturalis erat, nihil in se continens alieni; in rene autem sinistro deprehendimus materiam sabulosam, carunculis papillaribus inerrantem; ad ipsum autem ureteris ostium calculus situs erat oblongus, acuminatus, silicis duritiei, membranisque tenaciter involutus, adeo ut lancettâ ipsum separare necesse habuerimus: in ventre medio pulmones putridi fuerunt, & corrupti, atque tamen materiâ purulentâ. *Joan. Jac. Harder. Apicarii. Observ. 58.*

*De Calculo renali lumbos perforante.*

Quod si auxiliares Chirurgorum Medicorumque manus operanti naturæ, quam *Joan. Bapt. ab Helmond Archem* vocat lib. de Anura 8. 3. & 4. succurrerent magis, quam imprudenter, imò sæpius ex incertitia, fieri observamus, plures sanitati restituerentur ægotantes, quam nunc sepulturæ exhibentur.

*Franciscus de Haas*, Juvenis temperamenti boni, at, ob continuos dolores, quodammodo siccioris, ab anno ætatis decimo sexto ad trigessimum octavum gravi dolore nephritico, & urinx excretionem purulentâ, laboravit, varia ad doloris mitigationem, arenularum exclusionem, ulceris renalis curationem, adhibuit, magno cum successu, remedia, et in fonticulus in femoris parte interna ad genu produciens, quo hoc effectum, quod & dolor per aliquot annos remiserit, & urinx excretio purulenta.

Anno uno cum dimidio ante obitum subito recidivam passus est æger, quæ gravis adeo ipsi fuit, ut sceletum magis quam homini similis videretur. Unde Medicis *Tabes dorsalis* eum laborare probabilius visum, quam renum exulcerationem, Antifebrilia hinc omnis conditionis exhibuerunt, lumbisque linimenta appropriata applicaverunt.

At provida natura affectum hætenus occultum brevi manifestum reddidit, dolore afficiebatur intolerabili lumborum parte internâ, proxime



xime ad oram ossis Ilium, sine omni protuberantia, intumescencia, aut crassitie; quæcunque applicabantur *Emplastra*, aut *Cataplasmata*. *Aro-dyna*, *Astragalin*, nihil effecerunt. Tandem *ulcerculum*, subæ magnitudinis, rubicundum, inferiore magis loco; ac ille qui doloris, se exhibebat. Hoc cultro acutius aperto puris viscidus, cinerei, aliquomodo fætidus, plus quam libra semis effluebat, & hæc puris dicitur evacuatio, licet non semper eadem quantitate, ad vitæ finem perdurabat.

Exercitio hæc purulentâ controversiis variis inter Medicos Chirurgoſque occasionem dedit. *Euerius* qui purulentam hanc materiam ab occipite deorsum defluere ad foramen statuerunt, eamque, antequam perforatio a nobis instituta, collectioni ansam dedisse. Sententiam hanc confirmabant plurimum quæ à fratre ægrotantis *Theodoro de Ham*, *Consiliario*, proponebantur. Hic ante biennium dolore cervicis, capitis, lumborumque, longo tempore laboraverat, qui *Empyemate* terminabatur; similem affectum etiam in hoc ægrotante dari, & sibi & nobis persuadere conabatur, maxime cum etiam purulenta quædam, sanguini sæpius mixta, quandoque expectoraret, *Asthmaticus* satis; magis ea propter pectoris pulmonisque rationem haberemus, quam dorsi, lumborum, renumque, rogavit, curationem certam, qualis integra obvenerat sibi, etiam fratri promittens.

Medici *Alii* nobiscum nullam partem aliam internam accusari hic debere crediderunt, quam *renem dextrum*, huiusque lesionem doloris in ægrotante causam esse, idque magis, quod accurata observatione notatum esset, puris copiam in urinâ urinali recepta imminutam esse, quoties ejus perforamentum factum evacuatio largior. Imò credibile omnino nobis habebatur, ulcus purulentiam exhibens, supra muſculum glutinum majorem, ad ossis illi dorsum occurrens, ex pure, a rene dextro ad muſculum serratum, & scierolum delatante, ortum fuisse.

Concludebamus adeoque; ægrum notitum *Calculo renali cum exulceratione laborare*, licet pulmonum malam constitutionem adeo haud negaremus, naturamque, morborum sæpe medicaricem, perforatione aliqua pari exitum procurasse, qua de re legi possunt quæ habentur apud *Fonſan*, *exemp. 42. fol. 117. Tulpium Obs. 4. cap. 27.*

Antequam finem imponeret vitæ æger nollet, præterquam quod dolores dorsi, lumborum, pectoris, & stomachi, gavisissimi valde debilitarent, febri correptus est continuâ ardente, cum vomitu purulento continuo; ad hæc tincturam benedictam propinavimus, at sine notabili successu. Agonizans ut Deo omnipotenti animam, sic medicis Chirurgoſque corpus obtulit.

Aperto cadavere, præsentibus *Amplij. Dn. de Ham Consiliario*, fratre defuncti, *Viris* celeberrimis *Dn. Guſtelmo Piſone*, *Dn. Francisco vander Schagen*, Medicis & *D. Georgio van Loon*, Chirurgo, variisque aliis, Pulmonem invenimus sanum, sine ulla inflammatione aut purulentia, parvum & mollem.

Ventriculo puris cinerei, & aliquomodo fætidis notabilis satis copia continebatur.

Hepar bene se habebat, nisi quod convexa

ejus pars inflammationis notas exhiberet.

*Ren sinister* satis bene constitutus, ac dexter in totum consumptus, locum ejus occupante materia callosa, cui hærebant calculi aliquot, quorum maximus, dorsi exulceratione præmissa, viam sibi loco ulcerato, fecit, penetrante parte acutius, relicta intra costas spurias parte amphiore.

Dissectio hæc docet nos, muneris nostri esse naturæ providæ succurrere. Quod si apertio quædam a nobis fuisset instituta loco altiore, eo scilicet qui renem est, qualem instituisse *Magdalena* legimus *obs. paræ sextâ*. *Magdalena* *his*, si nullo licet successu, non dubito quin calculum majorem extrahere licuisset.

#### *De Calculo ureterem renis dextri obstruente.*

Dissectio cadaveris *Magdalene van de Graef* valde contristavit non solum Medicos Chirurgoſque, sed & adstantes alios, consanguineos, amicos, quod, ejus ope, contemplari liceret, & interiorum viscerum constitutionem visam, miseræ vitæ authorem, & curationis impossibilitatem.

Quod enim in cadaveris hujus apertionem aggreſſus fuero, non solum desideria taceant medicorum variorum, qui ægrotanti manus auxiliares præbere omni ope allaborant; sed & nostra: sic enim tunc nullus dubitabam, quin ejus conditionis hostis ille fuerit, qui miserè adeo hæcenus vexaverat demortuum, quæve causa, quod; quæcunque magno numero, usurpata media, nihil omnino levaminis attulerint, constare queat.

Non unus sed duplicis hostis insultus sustinere, coacta fuit ægra nostra, quantum ex ventris imi apertione notare licuit.

Dissectis *Ventris integumentis communibus*, musculisque abdominis diffusis, peritonæum occurrebat durum valde, imò cartilagineum omnino, forsitan, quo aquæ graviore sustinentæ commo-dius interviret; per annos enim sex aut septem ex feri hic collecti copia tumidum circumgeſtaverat ventrem. Imò intra peritonæi duplicaturam ferum hoc in hac ægrotante collectum esse, sententia medicorum variorum fuerat; jam antequam venter aperiretur.

Peritonæo dissecto feri quantitas ea, quæ est viginti quinque librarum, effluit, haud ne magna, siquidem comparatur quantitati illi, quæ in aliis solet observari, forsitan quod, vel per vias occultas; vel per seccum aut urinationem, imminutum fuerit.

Ablatâ hinc etiam aquâ eâ quæ in cavo ventris continebatur, peritonæum interiore superficie nigrum observavimus, quasi sphacelatum.

Omentum nigrum itidem, & fere corruptum.

Intestina corrugata, contumaculata.

Hepar tuberosum, grave, contractum, variis locis mucro incrustatum.

Vesicam bilariam tubera hepatis primò occultabant, at mox bilis exiguum quantitatem continens se exhibuit.

Ventriculus vacuus erat, laxus, mucro obdus-tus.

Lien exterius gravis, crassus atque ingens, ac interior & coloris erat boni & consistentiæ debite.



*Vesica urinaria* urinx nihil continebat, mucosa crusta, similiter ac partes reliquæ, obducta.

Hydrops hic imi ventris, ex tristitia, levi à causa inducia, ortum habens, subito invaserat ægram, unde varia hominum judicia effugere haud potuit, uno hanc, altero aliam subitanei hujus incrementi ventris causam adferente; & cum vidua esset satis formosa, annon gravida esset occasio dubitandi multisdata.

*Potio Monachodamensis* sutoris, valde hic loci decantata, calida, acrisve aquosi humoris plurimum educebat at febrem continuam ægrotanti inferebat.

Post varia adhibita medicamenta, meam implorare cepit opem ægrotans, quam in alio quodam subjecto à me institutam viderat *Abdominis paracenthesin*, in suo instituere summo opere flagitans, sic enim curari se posse sibi persuaserat. At ego, operationis hujus inconmoda exponendo, ab intento desisteret, effeci; aquam enim, ventre contentam, successu temporis viscera omnia, hepar, lienem, ventriculum, intestina, omentum unprimis, eo quod tenerum, pingue, facilisque corruptionis, corrumpere, adeo ut tonum naturalem amittant, imò tunicam eorum exteriorem variis locis vi sua corrosivâ auferre quale quid in brutis iis videmus quæ in aquis diu detenta fuerunt, certum esse dixi, hinc metum esse, siquidem paracentheseos ope educeretur ventre contenta aqua, mucosam visceribus inhaerentem, adhaerentemque magis acrem, foetidumque humorem cumulari eundem dehinc citius putrescere. Distinguenda adeoque corpora esse eorum, docui, quibus ventris apertio instituenda; ut enim successus aliquis, incertus licet, expectandus, ubi paracenthesis hæc peragitur in hydrope recenter oborto, visceribus ab illuvie serosa minus alteratis viribusque corporis minus destructis, ita nullus, ubi inveteratum malum, interiora corrupta, vires deperdite.

Videns ægrotans nostra hoc auxilio se destitutam, annon aliud quid excogitari possit inquirere cepit, ego, ne nihil egisse viderer, plaustro medicamentis onusta licet jam oblata, ad seri aliquam evacuationem promovendam *Vesicatorium* pedi dextro applicavi, *Emplastrum* itidem exlicativum & corroborans abdomini, loco tamen illi maxime cui subjacet hepar. Præter hæc *condium* sequens singulis diebus, aut alternis magnitudine juglandis assumendum, confici curavimus.

*℞. Elect. Diaphan. ʒj. β.*

*Rad. Jalapp. ʒj. β.*

*Gutta gamb. ʒj*

*Macis gr. vj.*

*M. F. Conditum.*

Multum profuit, addò ut Ecclesiam adire, tempore vario, concederetur, neutiquam tamen in totum ab illuvie serosâ ventre congesta, variè mobili, adeoque nec respirandi difficultate, liberari potuit. Misere capropter hostis hujus impetus sustinere coacta usque dum secundus, qui nephritis, accessit, ad cujus ablationem medicorum operam de novo implorare necessarium fuit.

*Renem* in cadavere, qui hosti secundo ja-

nuam aperuerant, extraordinariæ erant figuræ, dexter imprimis, magnitudinis, crassitieque excedentis, interius calculis nonnullis exilibus refertus.

*Sinistro* infundibulum erat insigniter amplum, à quo ad ureterem via satis patens, cui digitum inserere indicem licebat, quale exemplum *Pareus* adfert lib. 17. cap. 31.

*Ureteris* hujus in medio calculus hærebat re- res, quem ex rene deorsum descendisse certo nobis persuademus, quarto maxime ante mortem die, quo urinam largiter usu medicamentorum excrevit, quæ jam per dies viginti tres (horrendum dictu) suppressa fuerat.

Consideratione dignum, ex seri sanguinis diuturna adeo retentione nullam cerebro inducitur huile alterationem fere quæ in tali casu supervenire solet, adeoque ægrotantem, sanam mentem, sine ulla extraordinaria somnolentia, aut febre graviore, interjisse.

In anatome nostrâ procedentes *Renem* accessimus *dextrum*, de quo non est quod multa hic proponamus, alius enim hic se exhibebat calculus cui æquiparandum proponit *Nobilis Tulp. observ. lib. 2. cap. 45.* differt tamen noster ab eo qui *Tulpio* in *Margareta Nicolai* repertus, quod crassior, & imitatur epistomii foramen valis claudens renis pelvi impositus. Obstat cum hoc similiter ac illud quod *Tulpius* invenit, conspicuè omnibus ostensum, vindicavit artem ab ignominia, & inculcavit efficaciter.

*Non esse in medico, semper relevetur ut ager.*

Superest hoc loco monemus, insecta ea *cantharidas*, *millepedes*, *locustas*, *cicadas*, similisque conditionis alia, diureticis annuerata, non statim ac urinx excretio impedita est, usurpanda, cum plus sæpius damni quam commodi ægrotanti adferunt, eo quod ejusmodi animalculorum minutissimo satis sunt virium etiam crassissima, attamen fluxilia, mucum scilicet, calculos, arenulas, & ejus generis alia, ureteres transire valentia, penetrandi, expellendique. *Job à Meckrem in Observ. Chirurg.*

*Mors à lapidibus asperam arteriam premensibus.*

Vir quidam laborabat maximâ anhelitus difficultate: non tamen tussiebat, non excreabat, nec ulla vel Asthmatis vel Orthopneæ, vel phthyseo, aut vulgati alicujus pectoris vitii aderant symptomata. Medici curabant eclegmatis, syrupis, & similibus morbum non obsequentem, æger tandem febre superveniente abiit ad plures. Causa autem morbi, & mortis postea sese aperto corpore aperuit, & sic clarè omnibus appositam figuram intuitibus apparebit. Lapidēs varii varique figuræ iis quibus picti sunt, locis immediate asperæ arteriæ incumbentes, ita eam oppresserant, ut tandem hominem præfocaverint: cætera enim interiora nihil contraxerant vitii. Ita sæpè, quæ latent in corpore, medicantes latent. Quo magis risu digna eorum videtur arrogantia; qui medendi rationes ad Mathematicorum calculos voluit exigere, & medicos ridere, si for-



si forte ex ignorantia rei prorsus extra ordinem sese offerentis mediis ordinariis fuerint uni, ad eum morbum depellendum, quem illi prudenter, quumvis non certo subesse existimabant. *Theod. Kerckring. specul. Anat. Obs. 22.*

*Lapis in cerebro repertus.*

Joannes Nicolai Westphalus 14. annorum adolescens, id ætatis inter rationis, stultitiæque cœmix traduxerat; semper somnolentus, semper capite obtuso: ut, si quid ageret, quod hominem laperet, potius ex ereperet, cuiusdam rationis scintillis, quam ex vero ejus usu proficisci videretur. Is cum obiisset 8. Junii anni 1667. operæ nihil pretium facturum videbatur, si in e. usam constitutionis hujus inquirerem, & quid repererim; ubi, candide lector, audiveris, vide sis prudens facias de ejusmodi semistultis judicium.

Substantia cerebri omnino erat flaccida, pia mater, quod in hydrocephalicis fieri amat, ita laxè cerebro erat circumjecta, ut nullo negotio ab eo posset separari; cerebrum, non ut in hominibus sit, cerebellum magnâ ex parte obumbrabat, sed ab eo recedens, ut videre est in ovibus; nudum cerebellum primo aspectu oculis subiciebat, Glandulæ pinealis ne vestigium quidem natura elaboraverat, an forte, quia non decreverat homini huic indulgere istud (quod hic fieri quidam putant) animæ corporisque colloquium; an camphoræ instar æri expositæ, in nihilum redacta? an denique resoluta erat instar salis ab humido? ratiocinantur alii in quaslibet partes; ego nihil nisi quod vidi & tetigi, aut alio sensu percepi in medium profero: inter quæ aqua salissima, quæ priores duos ventriculos satui hujus plus media parte repleverat, quorum dexter etiam inclivum servabat calculum colore albicantem, qui medicâ itatera exanatus grana pendebat tredecim, quem & hic, quæ apud me asservatur specie, videndum præbeo. *Theod. Kerckring. specul. Anat. Obs. 33.*

*Lapis in corde repertus.*

Puella undecim annos nata vehementer de anxietate & angustia quâdam circa regionem cordis querebatur: ubi mors eam doloribus liberaverat, curiosè in causam horum & mortis inquirens, repertum in corde lapillum ejus, quem in figura notavi formæ & magnitudinis, ponderis granorum 14. colore autem & reliquo habitu referentem perfectissimè cum lapidem, quem inter medicamenta rariora ex India asportant, & Bezoardicum dñunt. Notet Lector curiosus, contra ac sentiebat Galenus, jam indefessâ Anatomicorum indagatione in corde non unum reperiri tumoris genus, imò glandulas, carnem, ossa, pinguedinem, & interdum ulcera; ut observat Civitatis nostræ & Medicinæ lumen Nicol. Tulpius, quo testimonio jam locus hujus calculi est probatus. De formæ autem similitudine cum bezoardico lapide idem accuratissimus observator dicit viginti novem calculos in una Senatoris Amstelodemensis vesica repositos, formâ, glabritie, ac levitate ita prope accedentes ad lapidem bezoardicum,

quem fert India Orientalis, ut facile, vel accuratissimo imposuissent Aromatario. Interim notetur & hoc, in omnibus terè corporis partibus reperiri lapides, rarissimos tamen repositos esse in corde qui repererint. *Idem ibidem.*

CALENTURE.

Mutatio climatis, & ejus effecta valde sensibilia sunt in corporibus nostris, quando appropinquamus *Tropicis*: docebant ibi accideret (quemadmodum animadvertere licet ex itinerario *Parchasi*); morbi in navibus nostris circa id tempus; & simul ac transgressi sunt nautæ *Tropicum* ititiam suam cell. nitor explodendo tormenta, pro sancto adventu eoque. Non potui discere ex veteris nautis aliam rationem diversæ conditionis sanitatis, cui nostræ naves nunc sunt obnoxie, ratione eorum, quæ majores nostri experti sunt, quàm hanc: solenne est nautis nostris & vectoribus, in lebotomia in itinere uti ante id tempus.

At illa non est adhibenda, precipitanter, nec omnibus sub eodem gradu latitudinis; nam studiosè observavi in navibus nostris alterationem corporum nostrorum alterato climate, & comperi, sanguinem *Anglorum*, qui constat ex partibus crassioribus, & extrahitur ex nutrimento magis substantiali, videlicet, Carno, quàm in aliis regionibus tenuiori, & pulsus in quibusdam evadere tumidos, plenos & rapidos: in aliis lentos, attamen magis tumidos & plenos quàm ante. Quidam sentiebant coctionem in carne; in quibusdam erat torpor & oppressio spirituum: & post sudant, quæ conditio eo persequitur tantum ut supra dixi. Ex hac agitatione humorum facile est observare rationem, cur majores nostri morbo afficerentur, & quàm necessarium ut sanguinem emittere, quando quis talia symptomata in corpore suo sentit. Nautarum post sanguinis emissionem pori aperiuntur, & sudor infertur; & hoc modo focii nostri in itinere *Jamaicam* verius, salvi adveniebant. Quibusdam curavi venam secare, sub 32. grad. albis sub 28. aliis sub 14. & 23. grad. Et in omnibus navibus nostris non nisi tres mortui sunt. In navi nostra quo afficiebantur morbo famioio dicto *Calenture*: de cujus morbi progressu nihil dicere valeo: nam hoc modo prilline restituebantur sanitati. Cum uno illorum colloquebar, & ille subito per phantasiam imaginabatur sibi videre, videlicet frondes mari innatantes, quod revera erat colore *caruleo*: postea in admirationem trahebatur, pulchrorum lignorum, quæ prope nobis instituta imaginabatur. Mox ego præbui illi Eneticum ex *Vitro Animonii* in vino *Hispæensi*; & simul ac operationes suas illud exercuerat, omnes illæ phantasie evanescebant.

Noctu dedi illi conservam rosarum rubrarum vitriolarum, salei absinthii & diascordium: proximo mane venæ-sectionem passus est in brachio; & à meridie incipere. Cibus ejus erat pulmentarium cum cremore *Tartari*; & pruna coquendo macerata. Nihil cum febri commune habere morbum observavi; pulsus ejus erat depressus, lentus & æqualis, tempore



ramentum iusto frigidius; nihilque caloris sentiebat, nec discolor erat lingua, nec sitiebat. Alter nihil imaginabatur præter viridaria pomorum aurantium & citreorum, & rogabat serio admodum scapham quâ litus peteret; adeo ut forte præcipitem mari se dedisset nisi ei in vigilantiis fuisset. *Symptomata* eadem erant quæ in priori; nisi quod ejus corpus videretur esse multo frigidius; quamquam nullum internum sentiret frigus. Vomere cum feci, & caput ejus bene habebat, simul ac vomitorium dolores stomachi inducebat, seu quod nondum operatum fuerat. Dietam similem huic & alteri præscripti, & tantum venam ejus secui in brachio. Phlebotomiam illis tantum adhibui ex cautella (nam aliâ bene constituti videbantur) & ut promoverem transpirationem & sudorem: quæ ex votis eveniebant.

Dubio procul sedes hujus morbi est in stomacho, & partibus vicinis, in quibus prima concoctio periclitatur: & admodum probabile est, præcipuam ejus causam esse malam dietam, edendo durante itinere nimium cibi salis; salinis vaporibus ex stomacho peculiari modo efficiendo cerebrum.

Quod attinet ad curam per vomitum, non nunc exponam, qua ratione emetica operationes suas exercent, sufficit morbi sedem fuisse in & circa ventriculum; & tam in calidis regionibus, quam calidis anni stationibus, Regiam Hippocratis locum habere; *Ætate per superiora*. Nunquam observavi ullum utilem effectum simplicium etiam cathartici, quoad fui in Indus, nisi in morbis chronicis: neque fere ulla adhibui, (postquam frequentia tentamina me cautum reddiderant) præter pilulas *Antimoniales*, vel *mercurium vitæ*, vel *infusiones vomitorias*. Et hac methodo præservavi optime naves nostras, & effeci properas illas curas, quas arbitror neminem antehac vidisse in *Jamaica*. Verum est, inter vilioris conditionis homines in aliis navibus, quando venimus in *Barbados*, prævia inquisitione me plurimos invenisse *Hydropicos* & *Scorbuticos*: & simul ac eo veni, omnes qui aliqua ratione male habebant, vomere & purgare curavi, *Mercurio vitæ*, *vomitaria infusione*, & *Cambodia* quibus mediis, & uno prandio cibi recentis, & quibusdam citreis missis, omnem inordinatam colluviem sustuli; ita ut tres duntaxat morerentur, prout ante dixi in toto itinere. Neque dubitarem rursus, ope divini, eo ducere longe majorem hominum numerum similibus mediis & cura. Ex *Observ. Domini Stubbet in Atl. Philos. Reg. Societ. Angl. anno 1668.*

### CALLUS MANUVM.

Vid.

### MANUVM CALLUS

in Manuum morbis.

### CALVITIES

Vid.

### PILORVM DEFLUVIUM.

### CANAROSIS.

Præter architectonicam significationem quâ

concamerationem denotat, apud Medicos illam designat ossis ac præcipue cranii fr. curam quæ cameræ similem figuram efficit. De hac autem vide fracturas in genere, & in specie vulnera capitis cum fractura.

### CANBYCA MEMBRATA.

Est species bubonis vel tumoris ulcerosi ad inguinum, vel juxta genitalia siti. Cum autem signum sit luis venereæ; & etiam ad bubones referri debeat, de eo non est quod hic specialius agamus.

## CANCER.

*Curationes, Consultationes, Observationes & Anatomica Inspectiones ex variis.*

### Curationes.

**C**ancer, *Carcinoma* Græcis, Arabibus *Saïan*, quibusdam *Canceris* sui humor appellatur; ut inquit Paulus Aegineta lib. 4. cap. 26. a similitudine quam habet cum cancro fluviatili, quoniam circa malum hoc venæ turgescent, & instat pedum canceri animalis intenduntur. Quidam vero hoc nomen desumptum asserunt, quod ab his, quas occupavit partibus agre avellatur, veluti cancer aquaticum animal, qui si quid pedunculis suis ceperit, id haud facile avellitur: insuper hujusmodi tumor canceri animalis colorem præ se fert, qui est lividus atque cinereus. Igitur Cancer tumor *strotundus, durus, inæqualis, coloris lividi, aut subnigri, magnæ & eminentes circumquaque habens venas, dolore coloreque gravis, aspectu teter & horribilis.*

Species hujus affectus duæ sunt, etenim cancer est vel non exulceratus qui proprie *carcinoma* audit, vel exulceratus, ilque *phagedæna* Græcis appellatur. Quæ autem a cancro affici possunt sunt omnes corporis partes, imprimis laxiores & fungosæ, quales sunt mulierum mammæ: Unde Galenus lib. 2. ad Glauc. cap. 10. sic ait. Cancrosi tumores in omnibus consueverunt fieri corporis partibus, sed præcipue in mammillis mulierum, quæcumque sua naturali purgatione privantur. Et Corn. Celsus. lib. 5. cap. 28. Id vitium fit maxime in superioribus partibus circa faciem, nares, aures, labia, mammæ feminarum &c.

Quoad canceri seu carcinomatis causas, eas quique Autores peculiare ac speciales huic tumori explicando assignant. Galenus tanti mali causam putat naturalem melancholiam, quæ sanguinis sæx ipsi dicitur, lib. de tumor. præter nat. cap. 7. & lib. 2. de critib. cap. 12. vel bilem atram redundantem, quæ si in universo corpore existat superflua, Elephantiasin, uni autem parti inherens, cancerum excitari contendit. Galeno se se opponit Demetrius Prax. lib. 5. part. 1. cap. 20. canceri causam dicens atram bilem, in qua humor melancholicus naturalis, vel bilis flava degeneravit. Illam quippe adhuc naturalem, & nondum adustam, potius

Scyrrhum



Scyrrum, quàm cancrum producere affirmat: primam nihilominus occasionem Cancroso Tumori humorem melancholicum præbere posse non negat, atram interim & adustam accusans bilem in venis hærentem propter crassitiam suam & per Exiles meatus non penetrantem, quandoque mitiorem, minus calidam & acrem, quandoque calidiorē & acriorem, illam *Cancrum non ulceratum*, hanc vero *ulceratum* gignentem. Bilem atram, quam defendit huius mali causam humorem dicit calidum & siccum, acrem, salum, cuncta erodentem, & corrumpentem; adeoque non frigidum & siccum, hoc est, humorem verè melancholicum. Avicenna *Melancholiam adustam*; Oribasius *Bilem ferussatam*. Tagulius *sanguinis fecem*; Aquapendens, Parcus, & plures alii *Bilem atram*, imò omne id, quod sanguinem adustum ac melancholicum generare aptum est, accusant. Atque hæ præcipue sunt antiquorum de cancri generatione sententiæ. Verisimilius equidem nos putamus, *Proximam seu continentem cancri causam esse Humorem Acido salinum, & Austerrum, intra partem aggestum*; & quo humor hic majorem vel minorem habet acrimoniam, hinc cancrum produci vel ulceratum, vel non ulceratum.

*Austerrum*, hoc est, acidum acre potentius ac valentius accusamus, sive relictum ex alio Tumore nimis tarde, negligenter, vel malè curato, quapropter facile in *magis austerrum* delinere potest, adeoque in Scyrrum, hinc in cancrum degenerare; qui tandem ob summam & pertinacem austeritatem vim corrosivam nactus exulceratur, & planè incurabilis evadit.

Atqui *causa aecedentes seu Remota varia esse possunt*; omnes nimirum quæ huiusmodi acido-acrem & austerrum humorem quovis modo generare, & in corpore augere possunt: tales sunt *aër impenitus Calidus*; *vitioli admodum & crassissimi & potius ut allium, cæpa, Legumina, Carnes salitæ, & fumo siccatae, Vina acida; vigilia immodica; animi passiones vehementes, præsertim, Ira*. Quibus accedunt *Viscerum quorundam obstructio; mensium, Hamorrhoidum, aliarumque consuetarum evacuationum suppressio*.

Cancer porro in sua origine, cogniti quidem difficilis est, at curatu facilis. Sed in progressu facile cognoscitur, difficile autem curatur. Itaque in principio, vix, nisi à sagaci & erudito medico vel chîrurgo dignoscitur; nam ut inquit Galenus, *Met. Med. l. 14. c. 9.* quum primum oriatur, accidentia habet minutissima, & maximè confusa; tuncque parvus est, & dolens tumor, qui postmodum auctus majorem in molem accrescit, non decrescen- te interim dolore, insuper durus est, tactui renitens, lividus, plumbeus, inæqualis, venis circumcirca turgidis quasi inflammatus; ad hæc si talis Tumor sit in parte suspecta, in mammis putà; labiis, naribus, lingua aut Pudendis de cancri præsentia vix amplius dubitatur. Dein à syrrho distinguitur imprimis dolore: Etenim vetus scyrrhus indolens est, cancer autem continuò dolorem facit, atque tum scyrrhum in cancrum degenerare conjicimus, quum incipiat acriter dolor. Verum cancer exulceratus cognoscitur facile, ex ulceris sceditate, labiis crassis, tumidis, livi-

dis, inæqualibus, erosio, saniem seu potius ichorem foetidum & copiosum eructantibus, acriter dolentibus, atque sanguinem frequenter fundentibus.

Cæterum Cancer, sive sit non ulceratus, sive sit ulceratus, gravis est morbus atque perniciosum malum, tum ratione symptomatum, tum causarum, difficiliorique curationis; huc tamen illo longè gravior est affectus, quod confirmat Hippocrates. *Sect. 6. aphor. 38.* quibus cancri occulti adiunt, non curare melius; curationem citius intereunt, non curati longiori tempore vivunt. Ratio est, quod cancri non exulcerati, impositis medicamentis facile exacerbari, hinc exulcerari queant.

Incipientem Cancrum se curasse affirmat Galenus *lib. 2. ad glauconem*. Sed quum in molem creverit insignem, citra Cheirurgiam non esse sanabilem; huius quippè mali tanta ferocitas, tantaque lævitas, ut vehementissima quæque respuat medicamenta, quin illis irriteretur potius, & excandescat, quam ulla ratione curetur: hinc detestabile nomen, noli me tangere, sortitum est malum hoc, quod intactum relinquendum sit, & cura tantum palliativa curandum.

Ad Curationem itaque huius affectus quod attinet; abstinere in primis ægotans, ab us omnibus, quæ humorem acido-acrem, & austerrum generare, atque in corpore augere possunt. Dein istius modi humor, antecedens cancri causa è corpore educatur, *Purgantibus Medicamentis* per intervalla exhibitis. Interim *Phlebotomia* si nihil contraindicet, quoque celebretur. Præterea in Mulieribus menstrua, si sint suppressa, provocanda. Hamorrhoidum fluxus, quibus fuit familiaris, promovendus: necnon aliæ evacuationes suppressæ excitandæ: viscerum obstructions referandæ ut, sic aciei & austeri generatio, quantum quidem possibile, prohibeatur. At verò cura cancri *Chirurgica* duplex est una fucata seu palliativa: altera vera seu legitima. Cura Palliativa topica tantum applicat Medicamenta ad inhibendum mali impetum. Sed Legitima consistit in extrahendo, tollendoque omni eo, quicquid est cancrum in parte affecta. Atque scitè hic animadvertit Hildanus *Cent. 6. Observ. 82.* nullum fere affectum hodie in Cheirurgia occurrere, in quo majores committuntur errores, quàm in curando Cancro. Dum enim vident Tumorem durissimum, curationem adhibere volunt methodicam, ideoque medicamenta imponunt calida, humida, emollientia, & quàm periculosos hæc sint in curando hoc morbo, quotidianè docet experientia, & exemplis confirmat Hildanus. *Cent. 1. Observ. 89.* Enimvero Pharmaca emollientia atque pus moventia si imponantur magis utique excitant, & acriorem reddunt humorem cancrum, ut tandem omnia exulceret, erodatque. Et quoniam vicinæ partes ab emollientibus admotis relaxantur simul, atque dilatantur, facile deinde dispergitur, vicinæque partes invadit illa acrimonia; quæ est fermenti ad instar, quod sanguinem, lympham, aliosque humores inficit, & sibi similes, hoc est, acres ac austeros reddit: quapropter Hippocrates merito hocce suum decretum Posteris reliquit *Aphor. 38. Sect. 6. Qui-*



*bus Cancri occulti nascuntur, non curare praestat.* quod intelligendum de curatione Methodica, quae contrarius periclitatur; nequaquam de resectione vel ulsione, quae tota, ut Galenus testatur, sunt canceri remedia. Curati enim subito intereunt scilicet per imposita Emollientia, quae protinus exasperare solent cancerosum tumorem, non curati vero diutius vivunt, nisi cum curatione methodica, per topica emollientia atque pus moventia, sed in futurum solummodo palliatione.

Igitur occulti Canceri, si penitus exscindi nequeant, non methodica, sed palliativa tantum cura sunt tractandi, ne exulcerentur. Cancer namque Occultus latet saepe diu sine offensâ: sed irritatus exedit cutem; eaque sponte, sive Curantis imperitia, adaperita, coercetur deinceps nullis repagulis; sed instar saevientis ferae depascitur quicquid obvium. Et quo liberius exhalet v. por. in inclusis eo impetius quoque affluit humor, tumorem adaugetur. Ad cuius intima siquidem penetraret circumdatus aer a tuncis antea exclusus, insequitur ilico & major putredo & uberius partibus atfecta luxuries. Blanda quippe remedia ut nihil proficiunt, sic nocent si non certa. & quo prius purus, eo penitus descendit vitis; secat itaque mature, vel blandire prudenter. Et si lubet, auct. C. Celsum, qui lib. 5. cap. 28. hac habet, pierique nullam vim adiuvendo, qua tollere id malum tentant. sed imponendo tantum lenia medicamenta, quae quasi blandiuntur, quod minus ad ultimam senectutem perveniunt, non prohibentur. Ita scribit Hildanus *Cent. 3. Observ. 86.* matronam cancro occulto in dextra mamma per quadraginta annos laborasse, absque dolore & vilo incommodo. Et Refert Ampliss. *Tulpius Observ. Med. lib. 2. cap. 47.* quandam in sinistris temporibus quinquaginta amplius annos durum ac inaequale carcinoma, sine ullo ulcere, ullave gravi noxa tulisse, cui post tot annos exulceranti cum levamine imponebatur hoc ceratum.

℞. Olei Rosacei ℥ij. ceræ albæ ℥vj. Plumbi ulsi ac loti ℥ss. Oleum cum cerâ liqueat & addito plumbo agitentur sex horas in mortario plumbeo, ut fiat ceratum. Ejus loco, & hoc applicari potest.

℞. Olei Rosacei ℥viij. Teratur in mortario plumbeo, cum pistillo plumbeo, donec crassescat & plumbi colorem acquirat, tunc admisceantur exacte Cerussa, Lythargyri an ℥j. & detur usui.

Enimvero ulceratum cancerum, & etsi non attingendum plurimi existimant, cum tamen inhumanum sit, agrum etiam tali morbo laborantem deserere, Palliativa cura mitigare conemur: quae saltem detur operâ, ne plagadana facile proserpat, dolorque ut leniatur, atque minore cum molestia vitam ducere possit Patiens. Hoc efficiunt medicamenta quae imposita moderate siccant atque acidum, & Austerum imbibunt, edulcorant. Talia sunt quae nunc proposuimus. Et scribit insuper ampliss. *Tulpius loco citato*, se feliciter canceris ulceratis admoventi vidisse pulverem concinnabarum ex plumbo liquefacto cum Mercurio vivo; quod Medicamentum Amalgama Mercurii dici consuevit.

Aquapendens, Chalmetrus, & alii pro cancro live non ulcerato, live ulcerato naris luidibus extolunt, unguentum de *Ranis viridibus*, cuius haec est descriptio.

℞. Ranas virides in aquis puris degentes; eas coniecto in vas necne vitreatum multisque exiguis foraminibus in fundo perforatum, oraburo impleto, hinc vas ne quid exhalet, indugenter obvincto, cui alterum exorta terra conciliatum supposito, ignemque in ambitu accendito; dein Oleum euliquorem implentem conigito, atque cum ranarum pulvere exacte mixto pro unimento sunt qui *Aquam cancerorum Fluviatiliam* luc commendant. Alii oleum & cochleis destillatum laudant. Nonnulli *Aquam Ranarum* naris infusis prodesse scribunt, cuius descriptio apud *Hildanum lib. de ag. gren. & sponcelo cap. 19.* ita habetur.

℞. Ranas aquatiles, easque suspende in cucurbita vitrea; ita tamen, ne iuxta attingant, neque comburantur, & aqua extillans gravem odorem acquirat. Accensio igne aquam in arena clementer extrahe, ac ad usum reactiva. Interim ne removeatur ignis, priusquam omnino exticcata fuerint rana, nec alia anipius extillet aqua. acutus post ardeant. Chenurg. observ. 36. ad cancerum occultum & ulceratum laudat ceratum oxylium, & unimentum simplex in mortario plumbeo agitatam, quorum descriptiones citat observ. 37.

℞. Olei communis veteris ℥j. aceti vini, lithargyri an. ℥ss. Misceantur ad ignem lentum, donec cerati acquirant consistentiam.

℞. Succu solati, Olei Rosacei an. ℥xx. coq. s. a. ad consumptionem succi, tunc add. Cerussam, lithargyri an. ℥ss. M. S. A. in mortario unguenti. Ex his nunc sequens componitur.

℞. Cerati Oxylii, unimenti simp. is an. ℥j. Olei myrtini ℥j. misceantur cum in mortario plumbeo pro unimento. Cancro occulto imponi quoque potest hoc emplastrum.

℞. Emplastri Diaphanophlegos ℥j. Plumbi ulsi ℥ss. argenti vivi calcinati ℥ss. misceantur exacte, & fiat in cortio emplastrum. Vnde *Chenurgus*, ut cancro non ulcerato imponatur lamina Plumbea, argento vivo linca. Refert *Petrus de Marchettis observ. chirurg. 29.* se cancerum nasi ulceratum curasse ungento albo camphorato, in mortario plumbeo ducto, nullo alio adhibito remedio, atque sic normum, si miliumve medicamentorum usu cancer non ulceratus, atque incipiens aliquando curatur. Ulceratus vero ad multos annos eodem in statu servatur. Equidem *Chirurgia* omnibus palnam praecipit ad eradicanum malum cancerosum; eaque huiusmodi tumorem, tum in principio, tum in augmento exscindere, ac sectione perita penitus auferre potius est. Hinc *Avicenna* caneros minores radicibus exscindit, crassioresque sanguinem facta sectione, circumquaque exprimit, locum postea actuali cauterio inurens, ut mali cancerosi reliquiae porro absintantur, membrum corroboretur, & haemorrhagia sistatur.

Igitur detestabile hocce malum, si manum *Chenurgi* emagitet; ac iudire potius vitæ periculum, quam misere semper vexari, consilium ducat agrotans; affectus erit considerandus, ejusdemque locus, nunc commode secio



sectio institui possit. Tunc enim comprehendendus totus tumor, qui lato & acutissimo cultro, quam celerrimè & promptissimè heri poterit, radicitus amputandus est. Non autem, dissecta vasa sunt adurenda, sed imponenda potius medicamentum sanguinem colubentia,

Sed cancerum sectione etiam si benè curatum, anno aut biennio post, in loco viciniorè sæpius reverti, praxis docet quotidiana. Nihilominus tamen non semper contingit, ut idem malum revertatur, atqui curatus aliquando manet hic morbus. Videantur C. Celsus lib. 5. cap. 23. & Hildanus Cent. 3. Observ. 87.

Nonnulli cancerum extirpandum censent admotis causticis; sed in re ejusmodi, quæ acriter medicamenta repellit, hisque irritatur, ea curandi ratio dubia est, & periculosa, uti scitè ait Vigerus *Prax. Chirurg. lib. 10. cap. 12.* & Hildanus *Cent. epistol. 40.* hac de re sic scribit: extirpatio quæ sit cauterio actuali, vel medicamentis escharoticis, siue quovis simili medicamento erodente mihi suspecta est, quia experientia docuit, cancerosa ulcera hujusmodi remediis exacerbari, atque peiora fieri.

Sectionem vero & manum Chirurgi si renuant ægri, vel non admittat tumor ob profunditatem, vel exulcerationem, cura tantum *Palliativa* ob vitam saluciorè & nè malum ulterius serpendo, partisque erodendo majorem inferat dolorem, instituatur, de qua abundè nunc dictum est. *Joan. Munnich. Chirurgia ad prax. hodiern. accommodata. lib. 1. cap. 23.*

Cancer mammillarum in mulieribus plerumque subsequitur mensium obstructions aut si alia causa procacitica suum initium habuerit, sæpe tamen menses subsistunt, & malum fit deterius.

Non exulceratum satius est intactum relinquere, hoc modo nihil proficientibus auxiliis, seu malum exasperantibus. Mitius sit, si menses in primum statum vel a natura, vel medicamentis revocari redeant, si per ætatem id licuerit, aut si corpus alias cacochymum purgantibus, & mundificantibus reddatur purius.

In mundificantibus præstat specificum purgans Paracelsi. It. Mercurius dulcis, & alia melanagoga cum chymica, tum vulgaria.

Ulcera tum firmissime sanantur, primo, aqua fuliginis mundificante, donec nempe fiat eschara. Secundo, valet oleum arsenici fixi in aqua plantaginis distemperatum, donec nempe mundificetur ulcus, & eschara sponte vel axungis adjuncta cadat. Quod si fibrosæ radices per cavitates hinc inde disseminatæ fuerint, vellellis evellantur prudenter.

Interne sæpius magisterium ocul. cancerorum in aqua empetri aut Persicæ exhibeatur.

Externe mundificato ulcere, & cancro mortificato, consolidantia ex oleo, balsamoque sulphur. ejusque emplastro procurentur.

Hæc autem cura celebris est in ulcere cancroso vel carcinomate tantum incipiente. Si esthione non accesserit, seu si ulcus sordidum, & cavernosum redditum fuerit, præsertim, si in thoracem usque propagatum, rarissime sanatio ulla locum habere potest. Præstat post mundificantia sæpius ulcere aspergere pulverem de cuticulis ovorum intectis pullo- rum exclusorum.

Lactis redundantiam auferunt maximè folia cicutæ, vel menthæ apposita It. Calcationem lactis solvunt, felicis operaberis, si menses linuunt, itaque vel a natura vel arte movendi.

Lac promovet semen feniculi sæpius coarsum. It. radix feniculi gestata ad præu. 3; ulvis crysalli lapidis tenuissimus intio semel atque iterum pondere 3ss. vel etiam 3j. datus in aqua feniculi a proprietate quadam lac augere videtur. Scilluræ man millarum tollit axungia cochlearium, de qua supra de hiis labiorum. Item capipomæa.

Cancer est tumor in aqua his aspectu teter, aliquando cum dolore; non enim accipit a cancris. Hoc vitium fit in omnibus humani corporis partibus cum internis tum externis, quæ a natura purgationem habent, quod rari & laxæ sint, quæ crassissimam materiam melancholicam promptissime excipiant. Generatur ex melancholico humore effervescente, qui, si sit acrior, exulcerationem efficit.

Sunt cancerorum differentia speciales. Nam quidam ulcere carent, quidam exulcerantur. signa sunt tum or, magis phlegmone nigricat absque tanta caliditate, venæque in habitu intumescunt, quoniam sanguis inutilis a profundo attrahitur, ideoque varicosæ venæ recidunt tur.

Color canceri cinericius, sublividus, ad purpureum vergens, tactu durissimus, pungentes interdum dolores inducere solet, & maxime in maxillis, mammillis, in aliquid usque corporis partibus dolorem infert, in aliquid usque non.

Diversificatur tum ratione loci, tum ratione materię cum sunt humores mixti, melancholici atque biliosi simul; ratione loci in facie, in labiis, in naso, in fronte, in manibus, digitis, ut experientia me docuit.

Hæc partes immunes sunt ab omni dolore; in manibus autem dolorem pungentem habet, in virili parte quoque dolores habere solet.

Nascuntur aliquando in labiis, naso, in angulis oculorum, in fronte, & in tota faciei parte, ut plurimum quasi verrucæ in forma ciceris, postea dilatantur, & cresunt sicut ungues cum labiis callosis & invertis, solent sanguinem vel quiddam virulentum emittere, in fronte solent ut plurimum corrodingo se dilatare.

Aliud genus, seu species nullo modo, ad ulcus pervenit, sed tumor, scirrhusque durus, lividus & nunquam ulceratur, & quotidie augetur. Imo ut plurimum in collo, hepate, splene, in vulva, in matrice nasci solent, raro in aliis corporis partibus, neminem vidi nisi Patavii in naso cujusdam mulieris.

Primum hujus vitii genus si ulceretur, jugiter erodit, & profundum suffodit, sanem putridissimam emittit, & dolorem abominandum creat, qui sufferri vix potest.

Incurabilis est, qui habet radices seu venulas varicosas, quæ sanguinem e profundo attrahunt, in partibus thoracis, alius est curabilis.

In curatione canceri 1. Instituantur victus ratio, in qua vitanda, quæ succum melancholicum generant, utendum præfati hordeo, malva, atriplice, betæ & omnibus, quæ bonum gene-



rant sanguinem, & coctū facilem bibendum, vinum tenue, album, non vake antiquum.

Vacuatio primum tentanda sanguinis missione, modo vires & ætas permiserint.

Vena in gibbo media secanda, & primo menses provocare, post humorem peccantem evacuari oportet.

Si hamorrhoides in viris, quibus emanare consuevere, suppressæ sint, recludantur.

Purgantia erunt epithymum, fenna, poly-podium, serum lactis, & huiusmodi composita diasenna, diabuglonum, pilula, de lapide lazuli.

Post hæc humorem, qui in partem decubuit, repellere, vel discutere, ad hæc particulam, ne quid humorum at undantia eadem committit, hrmare oportet cum aliquo repercussivo circa locum affectum: post imponendus pulvis benedictus ab altissimo mihi datus ad utilitatem generis humani.

Hunc ordinem servare oportet medicum: mane jejuno medicus semper cum sputo bombacem apponat. Si cancer est ulceratus, accipiat pulverem, ut aspergunt farinam super pulces cum parantur in farragine; & cum prædicta bombace tegat ac cum sputo liniat circumcirca, ut adhæreat, cum adhæret, nunquam cadit, nisi una secum radices eradicet. Solet hoc ut plurimum inferre dolorem interpolatè, quando humor acris & mordax non potest purgari per ulcus (etiam alioquin sit tumor magnus eo tempore, nec removendum medicamentum, nec aliquid supra apponendum, sed circum oleo rosaceo illinendum, & postea dimittendum usque dum per se cadat) quando ille humor acris purgatur per ulcus, nullum dolorem infert, postea purgatur sicut alia ulcera. Sed ego semper usus sum pulvere incarnativo, mundificativo, & digestivo solum ex terebinthina & vitellis ovorum cum unguento de lithargyro, & mumia, ut infra scribam.

Semper advertendum, ne aliquot radices remaneant, & si remanserint, iterum imponendus pulvis. Extant alioquin, dum adsint radices varicosa, unus cancer super alium quasi strumæ, tunc oportet iterare pulverem, usque dum strumæ omnes evellantur, & isti canceri sunt difficilioris curationis, cum sint in thoracis partibus, quia inter thoracem radices habent. Multas mulieres curavi solo hoc emplastro, dum erat in fieri ulcus.

℞. Ammoniæ in acet. solutæ, & exquisitissime purgavi succum illum malignum tali modo, quod non huebat ad locum affectum (expertus sum in mammillis) & sæpè iteravi ad perfectam curationem. Hoc emplastrum post consolidationem ulceris per aliquot dies apposui, & feliciter curavi nonnullos. Pulveris benedicti conficiendi ratio.

℞. Pulveris in signo A. ʒij. B. ʒj. C. ʒij. Subtilissime quantum sufficit impalpabilis reddatur super Porphyritem, servetur in loco bene clauso, nè humiditatem recipiat, & quanto magis inveteratur, tanto pretiosior est. Ante annum ad usum non erit bonus.

A Accipe in Mense Junio Julio, & Augusto radices dracunculi majoris (qui eo tempore folia siccantur, & tota radix remanet in terra) radicem illam scinde in plures particulas, sus-

pende in loco, ubi spirant venti, cum siccatae sunt, serva illas ad usum in conciciendo pulvere. Quando itæ radices non haberi possunt, in earum vicem radices dracunculi minoris, qui dicitur Aron, sed melior major dracunculus, qui dicitur dracuntium.

B Sandarachæ ab antiquis à vulgo dicta arsenicum album, calcinosum, non splendens, quam vitrum, non rubeum quod in se habet quandam malignitatem, sed album calcinosum non habet tantam malignam qualitatem; præpara sequenti modo.

℞. Illius q. v. subtilissime pulveris per 15. dies de tertio in tertium, appone aquam vitæ in loco calido, ut recipiatur illius virtutem, & cooperiat aquam vitæ, ad illum pulverem post triduum iterum nova aqua vitæ apponatur, & illa quæ prius adiut, abijcienda. Misce semel cum aqua, & tunc erit præparatum.

C. ℞. Fuliginem, quæ reperitur in caminis (supra de contortantibus de oleo fuliginis) non antiquam neque annosam, sed quæ habeat in se saluginem, quia solet reperiri quasi tela araneorum, & hæc non est bona, & prudens operator poterit considerare sua diligentia, & ut supra, componit pulverem. Pulvis incarnativus, & mundificativus.

℞. Olibani, sarcocollæ, mastichis, myrrhæ, aloës, mumia, aristolochiæ utriusque ana ʒij. mercur. præcipit. cum aqua calcinata compositi ʒi ʒ. i. Pulvis. Ego ulus sum præcipitato facto cum sale amalgamato, in nobilibus unguento sequenti.

℞. Lithargyri auri ʒij. mumia ʒi ʒ. subtiliter pulverisat. cum oleo rosaceo; & acet. rosac. i. unguentum in mortario plumbeo unguentum quo uti soleo, tale est.

℞. Lithargyrum, affunde oleum, & agitentur per quadrantem horæ, postea adde acet. rosaceum, & sic agitentur postea iterum solum, semper agitando, & fermentando per 3. vel 4. horas. & erit optimum compositum.

(Radice cicuta sub cineribus asato, & calidam applica, continuando per aliquot dies cancerque excidet, experimento probato) *Joan. Harbmannus in Pract. Chymiatr.*

Cancer non ulcerati curatio consistit præcipue in universali regimine (particulari tamen minime omisso) quod omnino tale erit, quæle in curatione scirrhi docuimus, tum quod ad aeris delectum, tum quod ad ægroti vivendi rationem attinet. Nempe humorem sirupis, julepis, apozematis præparandum esse. Purgatio quidem blanda, & modica erit, ut humores minis agitentur sed sæpè si sit opus iterabitur, sanguis ex adversa parte ad refrigerandum, itemque ad sedandum & mitigandum dolorem, utiliter detrahi poterit: adhibebuntur cardiaca, & quæ cor atque præcordia corroborant medicamenta, ob malignos, vitiososque vapores, qui e tumore attolluntur, & eas partes offendunt. Sæpenumero quidem bibet & comedet, sed parum admodum. Somnus perutilis est, ideoque nisi naturæ sponte obrepit, arte conciliandus. Dandaque inipruris opera, ut hamorrhoides viris, menstrua autem mulieribus fluant. Proritentur hamorrhoides acrioribus balanis, linteis asperis, & foliis tucum, vel admoveantur hirudines. Mulieribus vero mane



ante exitum è lecto fricentur crura, & tibiz, per semihoram præmissa purgatione.

Regimen vero particulare versatur duntaxat, aut in tumoris palliatione impediende quominus ille incalcescat, augeatur, & invalescat, aut certe in tota illius ablatione & amputatione.

Tumoris Palliatio topicis remediis fiet, quæ refræmandi, mitigandi, & sedandi humoris, tumoris, & violentiæ facultatem, virtutemque habebunt. Nam tota spes curationis consistit in repellentibus, & resolventibus, atque leviter repellentibus, humor crassus, & contumax non cedit, multo minus leviter resolventibus patitur se discuti. Venementer repellentibus partes quidem tenuiores dissipantur, sed crassiores manent. Itaque mediocriter repellentibus, & resolventibus superficialioribus incipientes cancrios gloriaturs Galenus se perfunctum, profundos aut inveteratos, aut omnino non attingit aut duntaxat, dolorem ut demulceret, & incrementum prohiberet suscepisse. Remedia vero mediocriter repellentia, & digerentia sunt succus solani, pompholix lota quæ tuchia vugo dicitur. Galenus q. simpl. supra cætera commendat plumbum ultimum & lotum; nam metallica lavari debent, ut acrimonia deponant. Plumbum autem humoris melancholici acrimonia moderanda & sedanda vim habet. Ex his tribus unguentum in officinis paratur, quod diapompholigos appellatur, cujus penuria permittit Gal. ut utamur emplastro diacalcitneos quod vulgo di. palma nuncupatur, dissoluto succo solani, & oleo rosato, aut.

℞. Ol. rosat. sine igne confecti ʒ viij. teratur in mortario plumbeo, pilillo plumbeo, donec crassecat, & plumbi colorem acquirat, misce cum litharg. & cerulæ scorsim contritæ ana ʒ j. fiat unguentum. Oleum de ranis, & de limacibus non tantum dolorem lenit, sed etiam mediocriter repellit & resolvit. Si placeat pulvis ranarum aut testarum cancri cerato Galeni vel succo solani permisceatur. Vel.

℞. succi solani. & ol. rosac. an. ʒ iv. pulv. ranar. ustar. & testar. cancri an. ʒ iij. tutiæ, & plumbiusti loti an. ʒ iß. agitentur simul in mortario plumbeo, fiat unguentum. Crystalli pulvis à quibusdam commendatur præsertim in ulceratis. Tenella fraxini folia in aqua coquantur, decoctio pars foveatur, & ex residua paretur cat. pl. sina. Quod sequitur sæpe, & feliciter est à me usupatum.

℞. Theriac. veteris ʒ j. succi cancrorum ʒ ß. succ. lactuc. & olei rosat. an. ʒ iß. vitell. dvor. sub cinerib. coctor. ij. caphuræ ʒ ß. agitentur in mortario plumbeo & fiat unguentum. Vel.

℞. Ol. rosat. & ceræ albæ an. ʒ ij. succ. graior. & sol. solani ana uncias duas plumbiusti loti, & cerul. præparatæ ana ʒ j. thuris, mastich. an. ʒ ij. fiat en. plastrum molle. His autem remediis leniter utendum est, nec calefaciendum quidquam, fricando leniter tumorem, omnemque illius ambitum, deinde solo linteo, eoque lenissimo & tenuissimo cum tegeudo.

Alterum vero caput, quod est de cancriosi tumoris ablatione, aut amputatione, diligenter considerandum est, videndumque, an tutò id fieri possit, ut si corpus malè habitum non fuerit,

si cancer perexiguus, & in aliqua ignobili parte, proculque a magnis vasibus & nervosis partibus fuerit, auferendi igitur illius erit ratio.

Tumor ille totus, primum corripendus, & cum omnibus suis radicibus, acutissima novacula adhibita penitus amputandus est quàm ceterissime & promptissime heri poterit. Deinde permittendum, ut venula illa, quæ alimentum illi suppeditabant, libere & abunde fluant, & causæ illius antecedentis nihil omnino supersit, unde recidiva non possit. Quo quidem facto cauterium actuale quod cæteris hac in re aptius est & efficacius (quippe promptius, minusque doloriterum, omnemque virulentiam & malignam qualitatem dissipans & consumens, parti affectæ applicandum est; Tum accelerandus crustæ casus, & recenti butyro in mortario plumbeo diu agitato quodammodo provocandus: ea autem ubi deciderit, nisi aliud quoddam symptoma acciderit, tractandum erit ulcus, ut cætera, quorum curationem suo loco trademus.

Nonnulli cum extirpandum censent causticis, sed in re ejusmodi quæ acris remedia repellit, hisque irritatur, ea curandi ratio dubia & periculosa est. Itaque standum consilio Hippocratis, præstat cancrios occultos non attingere, sic enim in longius vita protrahitur, satis est si humor melancholicus per intervalla purgetur, ut nullatur incrementum, non neglecta ventr. sectione, quæ ardorem contemperet & dolorem demulcet. Utatur lacte asinæ, aut capræ; utatur etiam carnibus viperar. serpentium præparat. & s. letheriacali, ut in eleph. n. talis curatione. *Joan. Vigierius Chirarg. magna lib. i.*

Cancer ulceratus cum apostemoso multa habet communi, ut tumorem, duritiem, dolorem: multa particularia, ut labia tumida, dura, inversa. Continua scilicet cruciatu tenuem & aquosum, nigrum aut fulvum gravissimè olentem, quæ nullum est præsentius venenum. Denique ulcus est ipso aspectu horrendum, cuius differentie sunt lupus, & non me tangere. Ide est cancer cruralis, hæc in facie ab imo terrens sursum. Verum in tibiis terpit cito, tantis in facie, nisi medicamentis irriteto, unde nomen habet. Cancro crus occupanti vulgus quotidie gallinæ carnes apponit, quarum hauriente tumor morbi mitescit. saniet malitiam benignitas carnis lenit, serpigio sistitur, & vicinorum partium exesio retardatur.

In aliis partibus tam externis ut mammis, & generalibus, quàm internis, utero, retinet nomen generis addita parte affectæ; minus depascitur & dolet qui hæc à pituita salsa, putri, convertit in atram bilem. Maxime omnium furit qui fit à flava bile pro ulationis gradu in atram degenerante. Repurgato humore atrabiliario, nullo sanguine, constitutis vitæ legibus, si quis affectum hunc patiatui, nec morbus magnus & obfirmatus alte jam radices egerit, totus cancer extirpetur. Nam si minima portio relinquatur, solito deterior renascetur. Guido suadet, ut abscessio carcinomate c. fo. u. lento sanguine è vicinis partibus diligenter expresso, locus uratur: alii caustica, eaque non levia, sed vehementissima loco ulationis usur-



pant. In quibus primas laudes habent arsenicum sublimatum, cuius usum sæpe docuimus; interim vicinæ partes defensivo aliquo munienda, ne dolor, fluxionem & inflammationem accersat intra triduum scarrham producat, quæ remota, & placato dolore ulcus in modum exterorum percutitur.

Iam vero extinctum cancerum intelligens, cum subjecta caro laudabilis apparebit, nullaque inde sanies putrida dimanabit. Inter omnia remedia laudo & probo sequens.

℞. Radic. serpentar. Maio mense vel Junio collectam, in taleolas transversum amectat, filo lineo trajectam, & ad umbram exsiccata, nec parietem attingat, redigatur in pulverem tenuissimum, cuius lumen quantum volueris, adde arsenici crystallini partem tertiam, fuliginis camini parum, misceatur optime, pulvis servetur in pixide lignea. Carcinoma ulceratum prius seu transforetur in formam crucis, inspergatur pulvere supradicto, & fiet scarrha, quæ circa diem duodecimum decidet per se: tande a uteris emplastro sequenti.

℞. Galban. opopon. sagapen. an. ℥iv. ammoniac. bdellii an. ℥ij. in aceto distillato solvantur, soluta exprimantur, & ad acetum consumpt. evaporentur. & ad emplastr. consistentiam coquantur.

Postea ℞. Olei chamæm. ℔ij. ol. hyperic. ℔j. ol. laurini ℥iv. ol. theseb. ℥j. petrolei ℔j. ceræ novæ ℔ij. ponantur simul cum prædictis gummi. & coquantur perfecte igne lento. Postea adde litharg. ℔ij. aristol. utriusque, olibani, mastich. myrrh. elect. corall. rubri & albi an. ℥iv. lapidis calamin. ℥vj. karab. ℥j. stor. antimon. ℥iv. salis vitriol. nu. iij. canphoræ an. ℥ij pulveranda pulverentur, & cum supradictis lento igne misceantur, continue movendo, dum fiat massa emplastri, de qua torquentur duo emplastra debite magnitudinis, unum cancro mane impone alterum vespere mutando quilibet vice utrus, & abstergendo cum panno lino molli & intra paucos dies curabitur.

Hoc emplastrum omnibus ulceribus etiam scrophulosis medetur, absque ullo alio medicamento, neque inveniri potest ulum præstantius in curatione cancri.

Quod si consistat in parte interna, ut utero, vel quæ excindi non possit, aut æger sectionem, & unctionem refugiatur, contenti in cura palliativa, quæ morbi impediatur incrementum. Victus conveniens imperetur, qui æterius tui fervorem contemperet, ut pituita, serum lactis, caro vitulina. Corpus per intervalla repurgetur, sanguis mittatur, hæmorrhoides viris si substituerint, mulieribus menses provocentur. Topica sunt linimentum ex succo solani agitato pitullo plumbeo, in mortario plumbeo, addendo parum camphoræ: aut succi penuria utere aqua solani destillata, eaque camphorata. His intincta lintea sæpe applicentur cancro: vel misce plumbum utrum, unguento de cerusa: benefaciant quoque unguenta de minio, de cerusa, de tertia, de plumbo, diapompholigos, lamina plumbi illita argento vivo, aut.

℞. Plumbiusti & loti, tuthiæ, & thuris an. ℥v. olei absynth. ℥j. olei rosar. ℔β. ceræ ℥i. succi solan. q. s. ad unguent. crassitiem. Dolorem

lenit cataplasma ex foliis cichor. & papav. aut ex toms acii, tritis cum panno ol. rotaceo. Vel.

℞. tuthiæ Alexandrinæ ℥ij. pulv. cancr. or. flu. lat. in furno adutor. litharg. arg. an. ℥ij. antm. on. plumbiusti an. ℥iβ. succ. plantag. galitrici, solani, politrici, centmod. alleuiæ an. ℥vj. alum. rochæ ℥iβ. prius colatis iuccis. bulli ut omnia simul usque ad consumptionem succorum, deinde pulveriscentur subtiliter, & duc. nter in mortario plumbeo, donec colorem nigrum acquir. nter & utere intra cancerum ulceratum, ponendo insuper unguentum pompholigos magistrale.

℞. tuthiæ ℥ij. mirobal. citrin. lith. rg. plumbiusti an. ℥j. calcis decies extinctæ in aqua hordei ℥ij. cerusæ ℥vj. terræ sigill. ℥iβ. aceti ℥iv. succor. plant. sol. n. an. ℥ij. b. bulliant omnia simul usque ad consumpt. succor. & aceti, deinde pistentur & ducantur in mortario plumbeo per tres horas, & utatur modo jam dicto. Vel.

℞. Muccag. sem. psylli, lini, sænugr. extract. in aqua ros. & plant. q. s. ex his tepidis fiat forus: Vel.

℞. Rad. alth. ℔β. coquantur in hydrom. & trajiciatur, addendo ol. ros. parum, nat cataplasma: vel.

℞. Stercoris bubuli ℔iv. herbæ roberti, plantag. sempervivi, hyosciami, portul. lacuc. enativ. m. j. caneros lloviat. x. ponantur omnia sin ul, & destillentur alembico plumbeo, liquor servetur usui, atque de eo fiat injectio frequens in partem, vel si partis situs peraliferit, inde caneros ipsius ulcera abluantur, & lina carpta insucc. ta subinde renovanda apponantur: sic enim inflammationis acrimonia, & vis obduntur, & dolor sedatur: vel.

℞. Litharg. & cerusæ an. ℥j. terantur in mortario plumbeo, donec reducuntur ad consistentiam lumentis vel unguent. vel.

℞. Plumbiusti loti, po. phang. thuris an. ℥ij. absynth. pont. ℥iβ. o. ro. ℥ij. ceræ ℥vj. succi solan. q. s. nat unguentum in mortario plumbeo cum pitullo plumbeo. Theodorici emplastrum ad caneros ulceranda.

℞. Olei rosar. compl. ceræ albæ an. ℥iβ. succor. granat. & sol. n. an. ℥ij. cerusæ lotæ ℥j. plumbiusti loti & tuthiæ præpar. an. ℥β. mastich. ℥ij. nat emplastrum molle: vel.

℞. cinereb. vet. ℥j. succi canerosi ℥iβ. succi cicutæ & olei rosar. an. ℥iβ. vitellos ovorum cinerib. cocorum num. ij. c. phur. ℥β. pistentur omnia in mortario plumbeo, nat unguentum: vel.

℞. Spumæ argenti, ælung. porci recentis, ceræ albæ an. ℔β. olei boni ℥iv. vitell. ovorum allatorum num. iv. nat unguentum. *Jan. Vignani Chirurg. magne lib. 2.*

Curatio cancri, quæ quidem feliciter usus est a magno quodam viro mihi communicata, talis est.

℞. Rad. serpentar. maj. mense Junio collectæ, transversim incisæ, & filo lineo trajectæ, & ad umbram exsiccata, suspensæ ne parietem attingat, in subtilem pulverem redactæ quantum volueris, cui adde arsenici non splendens tertiam partem, fuliginis camini parum, & bene commisce. & subtilissime pulveriscentur, & serventur in pixide lignea. Si ulcus sit valde putridum, arundinaceo cultro scalpendum est,

ut



ut parum sanguinis exeat, & pulvis subtiliter inspergendus, atque gossipium saliva madefactum, superponendum, protestandumque est, quod per diem & noctem unam, dolorem molestem excitabit, atque pars intumescet, sed quanto tumidior evadet, eo melius non est removendum medicamentum, sed faciet escharam, quæ sponte per se post octavam diem cadet, si post escharam elapsam, immundum remanebit: ulcus munditia cum melle rosato, succo apii, & parum farinæ hordei, vel unguento iudis, & superponatur unguentum de turia. si vero aliqua radix remaneret, rursus appone pulverem prædictum, & pro removenda eschara nihil addes, sed naturæ permittes, sed autequam aggrediaris curam, purga corpus competenti purgatione, & rectam victus rationem præscribe. *Carolus os levinus* in epistola ad *Laurent. Scholzum* lib. 3. Epist. *Craconis* & aliorum med. à *Schozio* Edit.

Placet hic canceri ablationem & veram ab amico mihi communicatam, subungere.

℞. Arsenic. lb. subtiliss. pulverati pt. i. rad. ari pulveratæ part. iij. fuligin. parum, ut in trium horum mixture, pulvis modice cinereus, vulgo græcus nat, qui ad usum servandus, & quò vetustior, eo melior evadit, ac in quintum ulque annum durat. Hic pulvis exulcerato cancro ad crassitiem dorii cultri, cavendo ne bonam carnem tangat, inspergatur, in medio tamen paulò spissius, ob mediam canceri radicem, communiter reliquis majorem. huic asperso pulveri gossipium extensum, & saliva bene madidum, ut cum pulvere eo melius adhaereat, alias nihil operabitur, imponatur. Inspergendus autem pulvis, postquam æger jam passus fuerit, & exulceratus cancer, nullis alijs quàm ligneis instrumentis tangendus. In adhibitione hujus pulveris cautez aliquot notandæ veniunt. Ob diversos effectus ejusdem, alijs enim dolorem creat, alijs non item, penetrat usque ad venas seu radices canceri, illique firmiter adhaeret, ut sine ruptione harum adimplius nequeat; quare seu el tantum inspergendus, quia ejus vis, donec omnia seculum aulerat, durat. Interea nulla alia medicamenta imponenda, quia hoc sine noxa fieri non posset, nisi in ambitu circumcirca, ad latitudinem 2. digitorum transversorum, defensiva, seu potius repellentia & inflammationem impediens, quale hoc esse potest.

℞. Boli annen. ol. ros. an. q. f. aceti ros. parum misce. solet quandoque ob penetrationem & vim medicamenti, ruptio venarum, canque effusio magnæ sanguinis copiz, & simul materiz flavæ & acis, subsequi, quæ ubi contigerit, nullum medicamentum præter lintea duplicata imponenda, & quoties madida, renovanda; fluxio enim hæc ultra unum aut alterum diem non extenditur, hacque omnis auferitur dolor, his factis expectanda canceri sua sponte cadentis, a sanâ carne separatio, quæ contingeret intra 18. aut 20. dierum spatium: minima namque rupta radix ante hoc tempus, vi illata, totius curæ reiterationem minatur, separatione hæc secuta ulcers sequens pulvis inspergendus.

℞. Thuris puriss. mummiz, malthic. aloes Sarcocoll. an. 3j. opopou. opt. 3ß. laventur

omnia aq. plantag. & ros. fiat pulv. tenuiss. qui acrior reddi potest aucta thur. malthic. myrr. & sarcocoll. qu. nitrate, pulvere crasso imposito ulcers, tale unguentum supra telan. extensum imponatur.

℞. Lytharg. auri 3ij. mumm. ol. ros. 3iß. aceti ros. parum: pulverata in mortario plumbeo agitata incorporentur, & si diutiusculum adhuc sit unguentum, adhibito ol. rosac. i. olius reddatur. Hæc 1. semel. in die applicare usque ad plenam ulceris consolidationem sufficit, emanabit ex eorum usu, primis diebus, materia viticola, tenax & alba, quæ in dies optime exteigenda, usque ad absolutam curam, quæ auxiliante. Deo, his omnibus rite administratis promittitur. *Felix Platerus* Practic. Tom. 2. cap. 17. pag. 731.

Hic est pulvis quo *Antonius Fuchius Italus* multos cancrios per *Germaniam, Poloniam & Angliam* non sine admiratione curavit, atque inde non exiguum lucrum fecit, & ob id Medicus cancrorum vulgo nominatus fuit. *Rodericus a castro* lib. 1. *De morbis Mulierum* cap. 21. & 22. & *Daniel Sennertus* Practic. lib. 4. part. 3. sect. 1. cap. 7.

Vir quidam meis diebus in tractu Juliacensi cancrum quemlibet sanabat insperfo pulvere indolente, atque tum demum emplastro incarnante solidabat; cujus ars secum sepulta est. *Joann. Heurnius* Tractat. de *Idæa morbo*.

Si Parvus est cancer camph. & non vult cedere, non dentur corroliva torciora, sed inhibentia tantum, ne ulterius serpat v. g. Saturno, nam saturnis medicamentis omnium optime hic curatur affectus. Spiritus & oleum fuliginis mure quoque hic prouunt.

Dentur primo purgantia, & sanguinem purificantia v. g. Elixir. & Elix. hedebo. i. nigri, medicamenta ex antim. tart. sat. Elixir. & i. ur. sat. Tinct. solari cumiat. elient. sal. an. on. elient sal. funi.

Inter specifica convenit persicaria solanum, virga aurea, plantago, herba cancri rad. serpentaria, aronis sal. calcis decoct. calcis (medicamenta enim ex calce & lugeine omnium sunt optima) aqua poniorum putridorum spir. oleum & sal fulig. ranc. calcinatæ, bufones, calcem stercus vaccinum recens. Emplastrum linguare *Fennel* Empl. de cancribus *Fabritii Hilda.* i. quod misceatur in mortario plumbeo, quo aliquid tart. adhaereat. *Scherzerus* in *Epist.* puichra tradit de pulv. benedicto. Arsenicum præpar. cum oleo arsen. profunt. Unguenti nob. Mynsichti, Empl. Saturni. ejusdem empl. de carne bubula ejusdem.

In cancro exulcerato mirè commendat *Bartholus* in *Encyclopadia*, aquam latrabilem, quæ paratur ex cane lacte matris adhuc utente in MB. destillato *Joann. Michael.* prax. clinic. gener.

### Consultationes.

De tumore cancroso incipiente in Mamilla sinistra pro Nobili Matrona Ravennate ad Excellentiss. D. Cæsarem Rossetum Forojuliensem.

Sicuti luculenter & accuratè scriptis mandasti, vir clarissime, naturam & causas tu-



moris occupantis mamillam sinistram Nobilissimæ patientis; ita pro eius curatione ad rem adeo cuncta propoluiſti, ut nihil à quolibet vel in arte verſatiſſimo his addi poſſit.

Quamobrem meam ſententiam rogatus, negare non poſſum, durum tumorem, inaqualem magnum, indies incrementum ſuſcipientem, cum aſperitate cutis varii coloris, & laniationibus quidem per vices in præſentia frequentioribus, tracto in conſectum jugulo & axilla ejuſdem lateris, eſſe ſcirrhum illegitimum, ſive non excluſum in glanduloſo corpore prædictæ manulæ, à melancholia prædominante productum, ad atra. bilis naturam vergente, cum putrefactione pituitoſæ materiæ ac proinde à carcinomatiſ ſeu caſſeri non excluſerati natura parum degenerantem, præſertim cum in ſuperiori loco ad partes externas ſerpat, & cutis aſperitatem producat. Nec difficile fuit Matronæ Nobiliſſimæ in prædictum affectum incurrere, ubi primum viro fuit orbatæ, cum quo antea fecunditate gauderat. Hic autem humor nunc in majori copia genitus eſt in jectore, alioquin præcalido, poſt inſignes animi perturbationes, & longè minori quantitate ſtatuſ quoque tempore per uterum expurgatur, cum quia ceſſant puerperia, & lactationes alias frequentes, tunc quia menſes ipſi ſunt imminuti: unde facilè confluxit ab utero, & à toto corpore ad mammam ſiniſtram, tanquam partem melancholico ſucco magis redundantem, per venas quæ in ipſa ſunt valdè patentes, propter frequentem ſanguinis fluxionem ad mammas conceptionis & lactationis tempore; ſitque inde tumor & quidem durus propter repletionem à materia terreſtri & ſicca. Immunitionis autem menſium cauſa licet antehac eſſe poſſet oſculorū venarum conſtrictio, ob marorem, & animi perturbationes, nunc ſane eſt obſtrictio producta à ſanguine craſſiore, & magis ſæculento reddito, propter cauſas prædictas, & temperamenti mutationem hac ætate quæ juventutis limites exceſſit, concurrente quietiam cuncta, & pituitoſa materia à frigido ventriculo genita, & per otium, ac vitam ſedentariam majori copia congeſta.

Cum autem hæc ita ſe habeant, difficiliſſimum ſane fore reor præſervare Matronam Nobiliſſimam ab imminente cancro & longè magis eandem ab affectione præſenti liberare, propter refractariam, & rebellem naturam prædominantis humoris, niſi menſes liberalius fluxerint, ipſis enim liberiùs fluentibus, præcavendi canceri ſpes aliqua aſſurgere poſſet.

Quare primò & poſitiſſimum curanda eſt libera menſium expurgatio, quò intercipiatur fluxio. 1. materia jam fluxa digerenda: ac tandem ejuſdem regeneratio prohibenda, refrigerando jectur ventriculum que roborando. De capite enim non eſſem valde ſollicitus, quandoquidem cenſeo illud aſſici potiùs per conſenſum ab infernis partibus, quam per eſſentiam. Prædictis autem intentionibus ſatisfacimus Medicis præſidiis ex Chirurgiâ, Pharmaciâ, & Diætâ depromptis.

Quare inter chirurgica laudatur primò venæ ſectio ſaphenæ dextri pedis, vel venæ ſub poplite, ſi apparuerit tanquam utero proximæ

à quibus ſanguis educatur ad uncias decem circiter, præmiſſo fomento, & frictione, ad faciorem ſanguinis craſſi evacuationem. Mox aperiat ut interna jecoraria ſinistri brachii proſervatione à parte affecta, ſingulisque menſibus tundenda erit ſaphena dextri pedis, vel aperiantur venæ hæmorrhoidales, ſi intumuerint. Perſiſtat in frequenti crurum & pedum lotione cum lixivio dulci, alterato malva, alibea, floribus chamæmeli; matricaria, artemiſia, & origano, urgente affectu; applicentur duo vellicantia internis femoribus, & aliquot dies in ulcus ſerventur, ipſique juvenibus, eidem loco duo fonticuli mutantur.

Inter Pharmaceutica, præferantur aloetica cum flore caſſia recens extracta, & Diaſenna. Præparentur humores ſyrupis de pomis, de ſucco borraginis, de cichorio, cum decoctione cichorii, borraginis, lupulorum, capillorum veneris, & agrimonie. Urgentur rhabarbaro, agarico, & ſoliſ ſenna intus in decocto Cordiali; addito ſyrupo de polypodio compoſito, violato ſolutivo & manna. Repetatur huiusmodi præparatio ſyrupo de ſumaria compoſito, de chycorio cum rhabarbaro, & oxymelite compoſito, cum decoctione matricariæ, ſumariæ, capillorum veneris, cichorii, ceterach, & agrimonie; præmiſſo bolo ex trochiſcis de myrrha & de eupatorio. Purgetur deinde corpus eodem medicamento, addita decoctioni radice hellebori nigri. His peractis, inſiſtendum eſt iis quæ menſes provocare poſſunt: in quem uſum præſcribatur decoctum ex radice chinæ, ſalia parilla, & modico ſaſafras, paratum cum gailo juniore flagellato, & exenterato, ſalito decocto, in ſufficienti aquæ quantitate, in qua intundantur ligna prædicta diem naturalem, additis radicibus ſaniculi, Petrolei & aſparagi, ad conſumptionem mediæ dietæ, quibus accedant ſub linem cichoreum, capuli veneris, borrago, malva, & meliſſa; ſumatque ſingulis natutis horis, uncias quinque prædicti juris in aurora, anulis octo, vel decem guttulis chalybis potabilis, & uncia una ſucci citronii depurati, præmiſſo bolo ex ammoniaco, & trochiſc. de myrrha. Cum hoc viginti, & plurimum dierum ſpatio uſa fuerit, intrem erit ſerum lactis caprini optimè depuratum, cum cremore tartari, & ſucco linonum, exhibitum alternis vicibus, cum decoctione epithymi Meſues, & emulſione ſeminum quatuor frigidorum majorum ad libras duas qualibet vice dies duodecim. Quod ſi ipſum deſici non contingat, addantur uncie tres manna electæ in eo diſſolutæ. Externa localia ſint, quæ accuratiſſimè fuerunt propoſita à viro præclariffimo: ſcilicet ego libenter ſane ſubſcribo, prout laudo illam vicinſ rationem, quæ ab eodem rectè inſtituta eſt hoc addito, quod ſi nupſerit, ſummo tutum ipſi juvenienti. Benediſt. Sylvauc. Conſil. & reſponſ. Medicin. Cent. 11.

De tumore duro, dolorifico Mamilla dextra.  
pro Illuſtriſſ. Comit. Sarega Veronenſi.

Illuſtriſſima & Elegantiſſima Matrona, tem peramenti calidi, & humidum annos n. 46. boni habitus, poſt numeroſam prolem feliciter in luminis oras editam, varias animi perturbationes perpeſſa, ceſſantibus menſtruis purgatio-



gationibus, sex abhinc mensibus, conqueri cepit de parvo quodam tumore mamillæ dextræ, avellanæ magnitudinem non excedente duro, ad validam compressionem dolorifico, & per vices vellicante ac pungente, qui deinde in maiorem molem excrelcens, inaequaliter expansus, maiorem dolorem intet, cum livido cutis colore, venarumque circumexcurrentium nigricante turgentia, pro cuius curatione plura fuerunt nactenus frustra administrata. Propterea de agendis consulit.

Quod ut hat, primo natura præsentis tumoris proponenda, ejusque causæ in medium adducendæ, quo postmodum statuamus an curari possit necne, & quibus præsidiiis. Ex enarratis itaque compertissimum est, tumorem hunc non esse ædenatosum, quia durus, et si non scirrhosum, quia dolorificus, non erysipellaceum, quia in magnam molem excrevit; neque pneumonoden, quia progressu temporis vel discussus, vel suppuratus fuisset, atque ideo alterius generis esse non posse, quam cancrosum; cum sit durus, dolorificus, inaequalis, cum venarum circumpositarum turgentia nigricante, cutisque proximæ livore.

Hujus proinde affectus causa est sanguis crassus, ac atrabilis, genitus à jecore terreo, congestus per annu pathemata, magisque exutus, cum per uterum statutis temporibus non expurgatus fuerit, prout antea, fluentibus menibus, magisque in puerperiis; idque cum ob ejus crassitiam, osculorumque venarum adstrictionem à prædictis perturbationibus animi, tum & obstructionem ab eadem sanguinis crassitie inductam: qui propterea ad mammas transmissus per venas epigastricas ampliores, & laxiores, redditus à partibus præteritis frequentioribus, in mamilla dextra jecori proxima, & forsitan umbellio, humorem cancrorum produxit, accedente incomposita victus ratione.

Quibus sic habentibus, quid de hoc affectu prædicendum sit nos docuit Hippocr. 6. aph. 8. dum prodidit, caneros occultos melius esse non curare; curam enim inquit, citius pereunt, non curati diutius perdurant. Per caneros occultos, non illos tantum intelligens, qui sunt in penitioribus partibus sed etiam qui non sunt exulcerati, ut optime explicavit Gal. in co. 1. Quocirca ex Hippocratis sententia, incurabilis est affectus. Quæ de re fusius differens Galenus in commentar. statuit, caneros ipsos curari non posse nisi sectione vel ustione. Hæc enim sola, inquit cancro facto comparata sunt remedia: quoique autem caneros ejusmodi cura magis sunt aggressi irritasse, brevique homines necasse; ulcera namque cancrofa ad cicatricem perducere non potuerunt, sed homines affligentes curatione, ad mortem usque excarnificaverunt. Incurabilis propterea pronunciandus præsens affectus; quinimo irritatus citius exulceratur. Non tamen solo prognostico sunt relinquendi ægroti, quò saltem prohibeatur majus incrementum, & exulceratio.

Hoc autem ut fiat, divertenda est fluxio, consulendo toti, temperando malam humoris peccantis qualitatem, & ipsum alio divertendo; non omisiss levioribus quibusdam localibus subadstringentibus, ne præcepto adeò fluat humor ad partem affectam. Quare purgetur diligenter totum corpus per lenientia,

præparantia, & purgantia melanagoga, & à longinquis partibus trahentia: in quem usum extractum *Helicbati nigri* primas partes obtinebit, cæteris Viro præclarissimo notissimis, brevitatæ gratia silentio transmissis.

Sanguis interim cum ex Saphena utriusque pedis, tum ex venis sedalibus alternis vicibus erit educendus, singulisque mensibus ex venis sedalibus mittetur, quò si fieri possit, natura assuescat huic evacuationi.

Contemperandus interea erit sanguis internis & externis atque inter internis, *serum lactis caprini* optime depuratum summo opere conteret diureticum potissimum redditum cum emulsione sem. melonum & syrup. capillorum exhibitum cum cinere cancrorum fluviatilium, tanquam à proprietate juvantium aliquando etiam dejectiorum redditum cum infusione foliorum *Jenna & Epithimi*, pergendum in usu ipsius quindecim dies circiter, dummodo libere permeet, ab ipsius usu *lac ipsum asinum* singulis maturis horis exhibetur ad unc. iij. circiter, pro tolerantia ventriculi cum modico *saccharo* & buccella panis eo imbuta, perstittendo in usu pulveris *canerorum* propositorum 20. & plures dies ea cautione adhibita quam potulat lactis usus, quo colloquatur, & non accescat in ventriculo; atque ideo cauta sit parca, & prandium tumetur quinque ab illo horis. Atque hæc pro diversione, & alteratione satis. Dubium est de localibus, utrum scilicet repellentia sint administranda. Hinc enim præscribenda viderentur, ad intercipiendam maiorem fluxionem, cum observemus intumescere in dies partem affectam, indicio manifeste continuæ fluxionis, quæ propterea aliò repellenda videtur, parque affecta subadstringentibus roboranda ne adeo sit opportuna fluenti materię: ex alia vero parte habemus Hipp. præceptum supra relatum *Caneros occultos melius esse non curare*, imo Galen. 3. de Medicament. compositione secundum loca, capite de Parotide, scripsit. in Parotidibus curandis non esse repellentia medicamenta adhibenda, sed potius attrahentia & evocantia; cum tamen Parotides nant in partibus glandulosis retro aures, non aliam ob causam nisi quia repellentia possunt retrudere materiam ad cerebrum. Quanto magis igitur abstinendum in humore cancrofo mamillæ cordi proxima ab his quibus materia faciliè repelli potest, vel saltem impingi, & inculcari magis in parte affecta ob crassitiam, atque ita acrior reddita exulcerationem celerius inducere. Quare statuendum cenico, quod si esset us in principio morbi fiente (ut ita dicam,) tunc non esset abstinendum à levioribus quibusdam repellentibus, permixtis cum levioribus digerentibus. In quem usum uti soleo *Oleo rosato completo*, agitato in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, ad mediocre consistentiam. Hujus enim linimenti beneficio non semel superavi caneros incipientes, repulsa, & resoluta materiam peccante, ad validiora autem repellentia neque in principio neque in progressu deveniendum erit; non in principio: quoniam densata magis spongiosa mamillæ substantia sanguis non raro recurrit ad uterum, ubi generatur cancer, ut ego aliquando observavi: minus in progressu, quoniam accelerant exulcera-



tionem, prout accidit Illustrissimæ nostræ patienti, cui ego aliquot dies Patavii dedi operam, qua postmodum in spem erecta perfectæ curationis à comite Bruschio Medico celeberrimo Mantuano, Mantuam concedens, variis, usæ est remediis à quibus ulceratus fuit cancer. Reversa demum Venetias, mulieri empiricæ se commisit, brevique temporis spatio fato functa est. *Beneditus Sylvaticus consult. & respons. Medic. Centur. 2.*

*Tumor cancriformis in mamma dextera.*

Illustrissima Matrona annorum quinquaginta, temperamentis & totius & hepatis præcalidi, cui nondum erant suppressæ purgationes, sed tantum imminutæ, mense Februario, & paulo ante in tumorem durum mammae dexterae incidit, rotundum, inæqualem, cum aliquo dolore dum comprimeretur, & quandoque citra, cum vellicationibus & lancinationibus internis usque ad jugulum & maxillam dexteram, cui per vices addebatur insignis ardor, & incendium. Et quia brevi incrementum suscepit, ut tumorem ei incuteret, consultuit Medicos externos, quorum aliqui tumorem cancro finitimum statuere, aliqui scirrhum spurium, vel cancrum occultum cuius causa esset lymphæ spuria, acido acris, sive serum concretescibile; alii imperfectum cancrum seu proprius tumorem cancriformem à sanguine melancholico adusto; alii esse Cartanæ Hispaniæ, quid medium inter cancrum & scirrhum, alii imminenti cancrum. Quæ opiniones licet primâ facie diversæ possent dici, intimius tamen perscrutanti parum vel nihil differre, quisque cognoscere poterat: cum in curatione parum vel nihil fuerint diversæ, quoad partem chirurgicam, instantibus mentibus, secta fuit vena in talo: semel medio tempore educus est sanguis ex brachio, à quâ evacuatione insignis percepit levamen, ita ut consueto tempore natura aliquid sponte eduxerit. At quia sequenti mense non apparuere, repetita fuit evacuatio per talum, nec amplius apparentibus, & cum aequali dolore, hirudines venis sedalibus applicitæ sunt, quæ optimè contulere. In fine mensis Augusti partibus infernis inustum fuit cauterium, & frequentes scilicet pedum lotiones: decretumque fuerat balneum, alteratum malvâ, violis, parietariâ, & similibus usque ad thoracem, verum temporis conditio vetuit. Quoad partem Pharmaceuticam, assumpsit jus alteratum malvâ, indiviâ, cichorio, lupulis, addito syrupo de pomis simpl. & acet. simpl. aromatizat. aquâ florum citri: & post sex aut septem dies, assumpsit cassiam cum cremore tartari, & sic per 20. vel 22. dies repetendo singulis sex vel septem diebus eandem cassiam, unâ semper cum ℥ ij. feri caprini depurati. Hisce transactis, ad novam præparationem devenit, ex decoctione in jure sine sale, fol. fumar. lupulorum, cichorii, sonchi, sem. citri, cum succis malvarum, endiviæ, borrag. & pomorum, & singulis quinque vel sex diebus cassiam deglutiebat cum extracto senæ & rhab. & post duas horas serum caprinum depuratum: & sic per multos dies incessit, & ultimo cassiam assumpsit, cum extracto senæ, & extracto hellebori nigri. Deventum postea fuit

ad serum caprinum, quod per aliquot tantum dies assumpsit, quia se valde tumeneri, eo assumpto, experiebatur. Nec ad aquam nocerianam devenit, est, tantam molem aquæ timens, unde postea lac alinæ assumere cepit 17. Junii, in cuius usu adhuc progreditur, repetendo per vices cassiam cum cremore tartari (illo tamen intermisso per 10. vel 12. dies) & per totum præsentem mensem progredi decrevit; ab hisce purgationibus se magis vegetam experitur, & ad obeundas actiones magis agitem: ut plurimum dolorem in loco affecto non persentit, per vices quidem, verum raro, aliqualem calorem ex internis partibus elevatum sentibiliter percipit. Post aliquot dies, cum levi dolore, & fere momentaneo premeretur, adiutavius quod ambæ papillæ intus recluduntur, ut supra ipsas rima quædam observaretur: dilatata vero rima, partis læsæ excoriatio quædam superficialis apparuit, quæ simplici unguento de plumbo brevi fuit exiccata, ut nihil modo appareat, nec de dolore aut calore ulla querelâ. Pro duritie mollienda & discutienda remedia querit, quia reor ipsi non undequaque esse tutum huiusmodi remedia pro nunc adhibere, potius quid per se purgatio profecerit, observarem; tempus enim consilium dabit, & an salutare sit futurum aliquod decoctum ex arte, à Viro celeberrimo audire pergratum mihi fuerit.

De nomine tumoris Matronam Illustrissimam septem abhinc mensibus molestantis ambigendum non est. Etenim relictis novatorum terminis, utpotè fisco & plerumque dolo infectis, nos Hippocrati atque Galeno adherentes, tumorem jam dictum, atrabilem naturam redolentem, rectè atque propriè cancriformem nominabimus, non autem cancrum, quoniam non à puro atrabili humore, hoc est, non ab atrabile superassata, & prorsus præter naturam existente, verum & à portione melancholici humoris naturalis, licet inutilis, & forsitan etiam non sine aliquâ pituitosâ mistura provenisse credo; ut propterea medicamentis jam administratis non parum cesserit, sicque morbum & morbi causam, ut dicebat Hippocrates, ostendat sanatio, & præterea non adeo abundare melancholiam præter naturam significavit excoriatio, jam in læsa mamma sequutâ, & statim medicamento exiccante appposito agglutinata, cum tamen ulcera à vera atrabile insanabilia ab eodem Hippocrate censentur. Quod ipsa quoque confirmat quotidiana experientia, & idcirco non adeo malè senserunt aliqui in relatione adducti, quod idem tumor sapiat etiam naturam scirrhi. Siquidem à melancholia naturali valde exiccata, at non exusta scirrhus ipse gigni solet, cui dum pituitæ ac pituitosi sanguinis portio associatur, non amplius scirrhi sed scirrhi tumoris nomen acquirit.

Et quamvis de nominibus certare inutile quandoque Galeno visum fuerit, utile tamen evadit, quotiescunque natura morbi ejusque causa ut in casu nostro in nomine continentur.

Ex his autem adductis metiri difficile non est, quanto recessu à naturali statu, ab optima scilicet temperie distet tum sanguis in toto, tum hepar, & cor mulieris illustrissimæ; omnia namque iusto calidiora, non verò calidissima



ma esse censendum; alioquin & ætas bilis atræ forax, & menstrua purgatio prorsus suppressa cancerum legitimum atque exquisitum produxissent.

Sunt hujusmodi affectus valdè contumaces, & periculi pleni: partem enim mollem atque spongiosam, ubi semel crassus humor apprehenderit, difficile attenuari, resolvi, & destrui potest: quinimo alium advenientem humorem facile admittere solet; eoque faciliùs in hac illustrissima aliquam in mammis malam conformationem à natura sortita, & præsertim hæc ætate consueta menstruorum expurgatione destituta & ideo non exiguum asserret auxilium Illustrissimæ Matronæ Medicus ille qui tumorem hunc, partim cancerosam, partim scirrhosam naturam obtinentem, in scirrhum perfectum totum permutari curaret, quod facilius, quam resolvere ego non semel expertus sum.

Interim ab inceptis minimè desistendum; siquidem quæ administrata juvant, repetita fiant, dicebat ille, & ideo perpauca jam administratis mihi restant addenda: videlicet ut humor peccans à parte affecta revellatur, & divertatur, imò & evacuetur, 2. ut ejus acrimonia atque aciditas contemperetur. Tertiò ut viscerum intemperies calida moderetur. Quarto ut tumor ipse potiùs repellentibus & refrigerantibus, quàm solventibus, & calefacientibus tractetur. Quintò à proprietate juvantia non negligenda; atque tandem doloris ratio semper habenda, ut qui attrahendi vim obtineat.

Quibus intentionibus ut satisfacere conemur, in fonte Chirurgico statim considerata venit sanguinis missio, quæ sicut opportunissimè à viro doctissimo jam bis terque administrata fuit, ita præsentī autumnō omninò deferendam non esse arbitror, ex pede scilicet aut hæmorrhoidibus, imò etiam ex brachio; si jam ex eodem eductus sanguis, crassus, & niger observatus fuerit.

Cauterium custodiendum: pedum lotiones non omittendæ, & tumori medicamenta infra describenda applicari poterunt.

Ex fonte quoque Pharmaceutico aliqua erunt depromenda, & repetenda remedia, tum alterantia, tum electivè purgantia, antequàm hybernū tempus accedat; quibus semper succedant potiones refrigerantes, antea quoque tempore propinatæ. Et quoniam hyeme adventante, lac proprias vires atque doctes ratione pascuorum amittere solet, ideo imposterum supplebit lac arte factum ex ʒij. sem. melon. mundat. & ʒss. sem. angur. & cucurbitæ, cum jure pullæ extractum, cui addatur sacchari albi coënscent: vel fiat emulsio ex iisdem seminibus in aqua stillat. aut borag. summo mane quotidie assumenda, & in usum diuturnum ducenda.

Quoniam verò, ut suprà dictum fuit, intentio nostra dirigi debet adversus naturam cancerosam, utpote magis urgentem atque molestam, non autem sic contra scirrhosam, quæ in nostro casu desiderabilis est, idcirco à quocumque decocto attenuante, tum exiccante, tum emolliente abstinendum esse opinor, quale esse posset, ex salsaparilla, radice althææ & li-

quiritiæ, in aqua stillat. borag. & virgæ aureæ paratum: hoc enim nonnisi humori scirrhoso carcinomatosa natura carenti convenire posset, ut propterea emulsionis jam præscriptæ usus vice decocti multo magis mihi arrideat.

Potius venturo tempore hyberno, terminato emulsionis usu, in ulum ducere poterit Matrona Illustrissima medicamen aliquod à proprietate juvans, pulverem nempe cancer. fluviat. ad ʒj. singulo manè per mensem in aqua virgæ aureæ & cardui sancti.

Et interim topica erunt administranda, alia tumorem, ejusque causam, alia dolorem respicient: & primi ordinis erit tale linimentum.

℞. Succ. solani, virgæ aureæ, malvar. anarum, virid. an. ʒj. pulv. pompholygis, cancer. fluviat. cerusæ camph. an. ʒj. olei rosat. compl. ʒj. olei de plumbo ʒi β. m. ref. & adservetur in mortario plumbeo. Pro doloribus vero.

℞. Olei rosat. compl. ʒij. de vitellis ovorum ʒj. de plumbo ʒss. aq. stillat. ex albuminibus ovorum ʒij. m. refor. & adservetur in mortario plumbeo. Lac quoque è mamma muliebri multum, imò & tumori statim aspersum dolores egregiè solet lenire.

Quibus jam dictis omnibus congrua erit addenda victus ratio Medicis jam dictis intentionibus proportionata; quæ ab Excellentissimo & Eruditissimo Viro erit præscribenda, cujus summæ prudentiæ, etiam reliqua omnia opportune disponenda libenter remitto. *Joan. Raym. Fortis Consultat. & respons. Medic. tom. 2. Cent. 1.*

#### Cancer exulceratus in mamilla.

Tumor carcinomatofus primò sine ulcere, atque tandem ulceratus, non solum diligenti calamo delineatus, verum & doctissimo penicillo depictus ab Excellentissimo Viro in transmissâ paginâ, offertur mihi potius considerandus, quam curandus, & potiùs protrahendus atque leniendus, quàm auferendus; in quem finem recensendæ sunt causæ à viro præstantissimo in Historia annotatæ, natura nempe illustrissimæ mulieris, virilis potius quàm femineæ ad omnes operationes aptissima atque promptissima, & ideo justo calidior, tum in hepate, tum maxime in corde, indeque in toto arterioso atque venoso genere, unde calidioris, & in progressu exusti sanguinis necessarius proveniens, nec purgationibus mensuris satis defœcatis; quam quoniam à massa sanguinea natura nunquam tentare destitit, ideo ad partem, substantia in mulieribus imbecillior, tandem detrulit, ad mammam scilicet quo ab arteriis impulsus, nec à venis reassumptus, utpote crassus, adustus, & ideo ad nutritionem ineptus, in parte relictus, humorem cancerosum excitavit, exiguum primò, sed tandem ad ovi magnitudinem evectum. Et quoniam acribilaris sanguis in dies peiorem conditionem & acridinem acquisivit, ideo tandem tumor ipse ulcus contraxit, non solum dyspeptoticum & cacopæthe, verum etiam cætho de & verbo cancerosum. Neque ab hoc decreto nos abducere valet purulenta materia aliquando visa, cum impossibile non fuerit, portionem aliquam carnis non cancerosæ in pus cessisse, quod



tunc melioris conditionis ulcus nobis repræsentaret: si apparere & effluere perseverasset.

Quibus ita se habentibus, vera & legitima hujus curatio alia esse non potest, quam partis amputatio, cum eundem inhiatatum non esse ex scriptis conicere possim; & licet barbara videatur, barbaries tamen sere semper salutaris evadit, terrinca quidem velum apud nos rarissime in perniciem delinens. At quoniam rarissimi quoque à mulieribus præsertim delicatioribus admittitur hoc remedii genus, id vero pro palliativa curatione instituenda, sanguinis impuritas, quoad fieri potest removenda; ejusdem acrimonia atque aciditas demulcenda; viscerum calor contemperandus & à Chirurgica manu ulcus congruis modò detergentibus, modò ulteriorem corruptionem inhibentibus, modò anodynus tractandum, congrua præscripta vivendi ratione.

Quibus intentionibus satisfaciendum erit, suis loco & tempore, parca & potius repetita sanguinis missione. Præterea succorum endiviæ atque boraginis per arenam depuratorum, in jure cichoraceis & nialvâ alterato, per hebdomadis exhibitione; iteratâ interim humoris melancholici electivâ educatione hellebori extracto, & senæ, nonnunquam castæ immixto, seroque lactis depur. ad libras superhaulto; atque tandem lactis asellæ druturno usu: quibus addere placet pro mamma tuendâ, & ad putrilaginein separandam, oleum antimonii caute administrandum, superimponendo aliquod magneticum attrahens, cui succedat usus olei mercurii dulcificati; sunt enim egregia medicamenta, sed hæc caubus cum grano salis administranda.

Quibus omnibus ratio victus addatur refrigerans & humectans, adeo ut lactaria omnia in usum ducantur: fructus & olera concedantur refrigerantia, pisces saxatiles non pronibeantur; vinum sit album, non dulce, non generosum, & si quandoque sitis urgeat, bibat aquam boraginis, vel ex boragine, & pomis dulcibus destillatam. Hæcque pauca Viro sapienti sufficiant. *Joan. Raym. Fortis consultat. & respons. Medic. tom. 2. cent. 2.*

Fœmina 30. annorum temperamento melancholica, jam à duobus mensibus, tuberculum habet in mamilla sinistra magnitudinem avellanæ adæquans, tactu durum, parum dolens, sed dum comprimitur, dolorem exhibet puncturæ, velut ab acus punitione profectum. Jam per sex menses ipsi subsistit menstruorum fluxus.

*Pars affecta* in hac ægra est *mamilla sinistra*; quod ex tactu patet, quo tuberculum illud durum in mamillæ sinistræ carne glandulosâ percipitur.

*Morbus* quo hæc ægra laborat, est tuberculum atrabilare recens, quod *cancer incipiens* appellari solet. Ille ex duritie & dolore puncturæ, post compressiones, in ipso percepto; & præterea ex mensibus per semestris suppressis, cancerum sæpe producere solitis, est manifestum.

Potest hic cancer dici *manifestus*, quoniam tactu facile deprehenditur, atque etiam *oculatus*, quia non est ulceratus.

*Procatartica* hujus morbi *causa* est menstruorum suppressio, ante hunc affectum per aliquot menses tacta; inde enim humores pravi, qui singulis mensibus et ut evacuandi, in corpore nonnæ ægræ fuerunt retenti, lique per totum corpus duruli præbuerunt *antecedentem* huic morbo *causam*. Pars vero eorum ad mamillam sinistram delata, ibique poros plus juno apertos inveniens & per eos sese in glandulosam mamillæ carnem effundens, ac ibidem crassescens, acrimoniamque atrabilem & duritiem per particularum tenuium dissipationem, crassarum & acrium vero retentionem & coctionem adipiscens, continens hujus duri tuberculi, & ex compressione, puncturæ doloris sensationem præbentis, hoc est, *cancer incipiens* ita *causa*.

Est *metu*, ne tuberculum hoc in cancerum inveteratum, imò ne in carcinoma, sive in cancerum exulceratum, degeneret.

*Cura* itaque circumspecta, & prudens quam primum est adhibenda *eaque primum* consistit in mensium provocatione, & corporis expurgatione, & *deinde* ubi illa rursus auxerint, in tuberculi excisione, & mamillæ consolidatione, sed quia ægra talem curandi rationem forsan haud admitteret, idcirco mensium provocationi, & corporis evacuationi studebimus, & tuberculi incrementum impedire conabimur.

Primo itaque præscribatur tale apozema menses, sanguinemque expurgans.

℞. Rad. valerianæ, aristolochiæ, hyoniz, gentianæ, cyperi an. ʒvj. tol. abrotani, artemisiæ, marrubii albi, matricariæ an. m. j. melissæ, majoranæ, salviæ, rutæ an. m. ʒ. sem. rutæ, anioni, nigellæ, agni casti, anisi an. ʒj. flor. camomill. abrotani, matricariæ, centaur. min. an. p. j. decoq. in æq. part. aq. com. & vini albi, sub lixivio additis, addendo in fine decoctionis sol. tenuæ ʒi ʒ. turbith. ag. r. trochisc. mechoacanæ, jalappæ, an. ʒj. in colatura dissolve syr. de artemisia, de nylopo an. ʒj. m. f. apozema de quo sumat quotidie ʒij, vel iv. jejuna, idque reiterari postea poterit.

Vena sectio hic etiam erit adhibendâ, primum in brachio, & deinde circa tempus quo menses fluere antea solebant, in talo.

Dum hæc aguntur, ipsi mamillæ tale adhibeatur unguentum.

℞. Suc. ci plantaginis, solani, gerani, robertiani, symphyti an. ʒij. ol. rosar. omphacini ʒij. sub radiis solaribus simul agitentur in mortario plumbeo, donec ut gluten crassescant.

Vel ℞. Ol. rosati completi, lactis an. ʒj. tutiæ præp. pulveris ʒj. agitentur in mortario plumbeo ad consistentiam unguenti.

Alii lat. inam plumbeam argento vivo oblitam adhiberi volunt. *Vitus* sit humectans & attenuans: alimenta euehynia ex pane benesementato, ovis forbilibus, pullis gallinæis, carnibus vitulinis, vervecinis, vitentur salsa & acria. *Henric. Regius apud Theod. Craanen Medica: lib. 4. cap. 20.*

Fœmina 20. annorum postquam menses ipsi inordinate & parce aliquandiu fluxissent, percepit sibi in dextra mamilla paulatim quoddam tuber subnasci durum & subinde dolens. Ejus emollitio & discussio multorum remediorum



rum usu per sesquiannum hactenus frustra fuit tentata. Jamque illud ad ingentem magnitudinem excrevit, & frequentibus punctionibus acuta sensationibus ægræ est molestum. Tuber hoc nec pectoris ossibus, nec musculus, firmiter annexum sentitur.

*Parti affecta in hac ægrâ est mamilla dextra, uti ex visu & tactu est manifestum. Morbus qui eam attingit, scirrui mamillæ dextræ, ad canceri naturam jam vergens.*

*Causa præsternitica hujus morbi est mensium inordinatus & parvus fluxus, antiquius durans; hinc enim, cum sanguis a suis excrementis non satis emundaretur, cacocymia multa melancholica in hujus ægræ corpore fuit genita, quæ antecedentem hujus morbi constituit causam. Hujus vero pars in mamillam dextram, propter poros ejus ibidem præcæteris magis patentes, copiosius sese effundens, eamque sua copia & crassitie distendens, & in tumorem ætrodens; duratque suapartium intra coactione, & dolore pectorum suarum. Crimonia ipsi conciliatus, continens hujus morbi, ejusque doloris, & incrementi est causa.*

Cum hoc in tumulis medicamentis, etiam in operibus, hactenus cerneret; incrementumque tum tumoris, tum doloris, perpetuo intercurrandum sit factum; metu est, ne hic tumor lentissimus, majorem malignitatem continens, in perfectum cancerum, imo in carcinoma, degeneret.

Atque ideo, cum hoc tuber nullam firmam cum ossibus pectoris, vel nullulis pectoralibus connexionem haberet, ad contrariam veniendum culeo, eaque hac ratione erit instituenda.

Primo apprehendat Chirurgus mamillam dextram manu, digiti que se paulatim magis, in gilique contrahenti us premit. Apprehensum tunc versus interiora, atque in tantum ut cutis mamillæ exteriori apresso, & propulso tubere tensa appareat. Hoc facio, incidenda mamilla incisione rectâ in ipsum tuber penetrante; tuberque deinde acutâ scissâ transigendum, & ope acus falcatæ intus, & digiti Chirurgi apprehensæ, ipsum tuber cum mamilla, a pectore versus exteriora aliquantum protrahendum. Tumque ut mamilla toris minus deformetur, ipsum tuber scirruiosum a sanis & vicinis partibus magna circumpeccione cultro separandum, & penitus eximendum; ita ut nulla tumoris vel n emibranz, eam forsan involventis, pars super sit. Hæmorragia postea aptis remediis est sistenda, & graque ad lectum deferenda, & porro ulceris sanatio per apta remedia ex arte procuranda. *Henric. Regius apud Theodor. Crauen. Medicat. lib. 4. cap. 21.*

### Observationes.

#### Pro cancro labrum superius obidente.

Vir quidam *Montpeli* degens circâ finem hiemis correptus fuit exiguo tuberculo labrum superius obidente, quod in dies incrementum capiens in tumorem cancerosum tandem degeneravit, in auxilium vocatus, curationem sic aggressus sum.

Rad. Bugl. & cichor. an. ʒj. fol. agri-mon. borrag. ceterach. & veronic. an. m. ss. coq. cum pullo gallinæ eo, in coct. dissolv. crem. tartar. ʒj. l. juleculum quod capiat manè per 12 dies in quarto quoque juleculo dissolv. sequentis ʒij.

Succor. rec. express. & per residentiam depurator. borrag. bugl. in nar. cichor. ib. ij. succ. veronic. & pomor. redolent. an. ib. j. tenu. mund. ʒvj. epithym. ʒij. rhab. el. & agar. rec. trocn. an. ʒj. zincib. & c. ryophill. an. ʒj. infund. & decoque ut artis est, donec colaturæ supersint quart. v. in quibus dissolv. sacch. albi q. r. v. fiat syrupus perfecte coctus, potissime doni juleculorum adde extract. hellebor. nigr. ʒss. cap. t. cum regimine, hoc medicamentum summa cum vehementia ægrot. ntem expurgavit, non solum per alvum, sed etiam per vomitum, verum eodem die tumor valde diminutus, pp. fuit, & doloris, expertus.

Post hunc juleculorum usus est balneo tepido per triduum; in unguis hæmorrhoidibus admortæ; causticum utrique tibiæ aut um; scitum l. eis cum epithymo per mensem usque paratum, & balneum iterum a singulis septimanis.

Post 15. dies ab assumpto extracto hellebori nigri idem re medium iteratum est, eadem doni cum diaprum solutivi ʒij. cujus operatio fuit priori similis, & eodem die tumor minuitur apparuit.

Topica omnia tumorem exasperabant, excepto unguento ex r. vis viridibus, quod maxime utatur ab Aqu. penicente, Chalmetzo & ams, & in hoc anectu purissimum præstatit: ita ut minus curationem duobus præsertim re-necius tribuendam esse existimem, extracto scil. hellebori nigri, & unguento de r. vis viridibus, non parum tamen contulit syrupus magistralis, quo bis in septimana utebari.

Intra mensem a curationis principio cutis portio suppurata est, & sponte aperta. cum pure satis laudabili, ulcers & tumori universi. Amovebatur continuo unguentum prædictum, & sensim tumor minimus ac tandem lentim resolutus est, & vicus ad cic. tricem perductum. Unguenti de r. vis composicio hæc est.

Ranas virides in aquis puris degentes, q. v. in vas fictile vitreatum, multique exiguis foraminibus infundo pertusum conducto, earumque ora butyro impleto, vas ac quid exhalet luto diligenter obluato, & cooperito, cui alterum effossa terra conclusum superposito, ignem in ambitu ad destillandum accendito oleum seu liquorem illum stillatitium colligito, & cum pulvere ranae uniuscuique, ut fiat linimentum. *Lazarus Rivierus Observ. 97. cent. 1.*

#### Pro cancro ulcerato.

Filia *Geropii Becani Medici Antuerpiensis* natus in sinistris temporibus 50. amplius annos, durum ac inæquale carcinoma; sed sine ulcere, ullave gravi noxâ, verum incrementum paulatim, post tot annos, tum dolore, tum pruritu, si e ex adversâ mariti sui fortuna, sive ab atrâ. Ille eo uberius effusa, imposuit tumori improprie, ex consilio empirici, nescio quæ adurentia medicamenta, quibus cutem erodentibus, concitabatur



tabatur non modo malum haecenus quietum, sed degenerabat brevi in carcinoma ulceratum cum labus inversis, crusta cinerea, sinu deformi, tubere inaequali, colore livido, sanie cada-verosa, dolore, vigiliis, animi deliquiis, ardore, pruritu, aliisque conclamati canceri notis, cui nulla cum prodesset medicina, applicuit tandem blandiens hoc ceratum, quod usus comprobavit, qualicumque carcinomati summe utile.

℞. Ol. rosat. ℥ij. corz alb. 3vj. plumb. usti ac loti 3ss. oleum cum cera liquefacti & addito plumbo, agitentur 6. horas in mortario plumbeo, ut fiat ceratum. Præter quod vidimus ulceratis canceris ab aliis feliciter admoveeri pulverem concinnatum ex plumbo liquefacto cum mercurio vivo, cui siquidem tantillum mercurii vitæ imperferis, rediges omnia in pulverem friabilem ulcerato cancro ad prime utilem. *Nicolaus Tulpium cap. 27. lib. 1.*

Famula quædam compescuit malignum carcinoma in femore, ingentis molis, ultra annum 17. solo plumbi unguento, cujus litu, nihil simili tumori utilis. *Nicolaus Tulpium cap. 51. lib. 4.*

Nobili cuidam, & electæ mulieri propè castellum *Nervium* degenti tota pars faciei dextra, cancro eoque ulceroso oblecta fuit diutissime, & saxis exagitata cruciatibus, a Medicis frustra petitis auxiliis; tum *Gallis & Italis*, tum etiam *Germanis & Hispanis*, exterisque aliis quibusque vulgaris cuiusdam barbitonioris remedio hoc sequenti, & euporisto persanata fuit. Iullos illa *Gallinaceos* in partes tenues & latices concidebat, quas sapiuncule commutando, interdum admovebat affectæ parti. Ab unico tandem eoque præstanti remedio, reliquis quibuslibet frustra, (ut diximus) tentatis, curationem recipiens, pristinam valetudinem recuperavit. *Mauritius Cordax, comment. 7. in lib. 1. Hippocrat. de Morbis mulierum.*

Alii admoveant carnes pullorum columbinorum sectas & adhuc tepidas. *Lazarus Riverius cap. 12 lib. 2. Prax. Medic.*

Vetula quædam mulier cancerum habebat in mamma sinistra, quem per 13. annos gestaverat, in quo exigui tumores cancroli adnatebantur, qui multo acerbiores dolores excitabant, propterea quod exulcerati fuerant, quam tota canceri ipsius moles, qui tamen exigui tumores sublati sunt frequenti applicatione aquar. pap. rhaad. plantag. & rosat. cum elle ros. permixtar. ab initio, deinde solis aquis admotis.

In alia etiam muliere ulcus cancerosum in mamma patiente, idem remedium ulcus protinus sustulit, & ad cicatricem perduxit. *Samuel Formius Obser. 21.*

Quædam mulier quinquagenaria laborabat cancro in mamma sinistra, ulcerari incipiente. Juvenis Chirurgus extraneus sequens remedium admovit.

℞. Aq. fortis 3j. sublimati crudi 3iv. sal. ammoniac. 3ij. arsenic. 3j. ponantur omnia in alembico & destillentur ad siccitatem, addendo aceti destillati par pulveri pondus, destilletur iterum acetum, donec materia ad pastam consistentiam redeat: primò cancerum diligenter abluebat vino calente, cum linteis eo imbutis, & fortiter fricabat, ut pars irritaretur. Deinde

extendebat pastam supra plumaceolum sextuplo minorem ipso tumore, quod remedium supra partem relinquebat per 24. horas, & fiebat eschara plumaceolo sextuplo major, ita ut cancerum omnino absumeret, & decisa eschara, ulcus carne implebatur, & ad cicatricem perducebatur. Quod si dicta eschara tumorem universum non abstulisset, sed quædam illius radices subsisterent, illas absumebat pulvere præcipitati rubri cum alumine usto permixti: ad ulcus verò carne implendum, linteis tantum detractis, utebatur. Hoc notatu dignissimum est, quod admoto parti medicamento febris accendebatur, vomitus & alvi nuxus excitabatur, & urina fluxus provocabatur, quæ symptomata per bidduum aut triduum perieverant, natura irritata a venenata medicamenti delectata qualitate.

Eodem remedio cancer in nasi extremitate obortus, qui nasi apicem exederat, in quodam milite curatus fuit. *Samuel Formius Obser. 20.*

*Ficus cancerosus in oculi dextri orbita, cum gravissimis capitis symptomatibus feliciter extirpatus.*

Anno Domini 1596. Calendis Augusti, accivit me *Laufanna Lutrium* Generosus *Claudius Lutriacus*: ejus loci, & totius Vallis proprietæ dictæ majori: quoniam diro & funesto morbo constrictabatur, is fuit tumor prominens, scirrholus, in cancerum degenerans, cum symptomatibus internis & externis longe gravissimis.

Hic cum à natura, tum à variis morbis, Febris, casus, luxationibus, fracturis &c. haud parum fuit catharris obnoxius: maxime quum accederet, more patriæ victus largior cum amicis & hospicibus: in quos fuit perpetuo liberalissimus; itaque anno 1580. quum fuisset hyems humida, & levis, haud dubie corporis universi partes oppletæ sunt humoribus excreantibus, qui à jecinis calore sursum ac imprimis ad caput sublatis, ceperunt divexare hominem. Incunte enim anno 1581. circa Februarii finem, æger correptus est hemiplegia ad dextrum latus, & frustra adhibitus nutritum, diuque medicus; siquidem humor capite conclusus, evacuationis quæ sita viâ, impetum fecit in oculum dextrum. Hinc vehementissimus dolor, & inflammatio. Et sic superiora symptomata, dolor capitis, febris, inquietudo, vomitus, lipothymia, aucta sunt potius quam immutata. Nec, ut aiebat æger, prædiis, revulsione, derivatione ve ullâ potuit isti humoris affluxus: quin imo congestio tanta facta est, ut tandem erosa sit, vel potius putrefacta oculi membrana prima, conjunctiva dicta.

Hic verò brevi eaque necessaria digestionem annotandum, supra decem hebdomadas non solum dolorem adfuisse gravissimum, sed & cerebrum motum atrectanti perceptum fuisse, quæ sagittalis & coronalis suture concurrunt: auditos etiam sonitus & cranii crepitationem quendam, perinde ac si lignum maderetur. Id ego tum accidisse autumno, quum cranii suture ob dolorem, inflammationem, & copiosum in cerebro



cerebro humorem disjuncti sunt, & verum fuisse mihi persuadeo; cum ex amplissimi viri aegroti relatu, & generosi Gabrielis a Blon y Baronis a Chatelet &c. ejus generi assiduo presentis, tunc quod ipse tale quid observari in viro honestissimo apud nostrates germanos inferiores.

Hic ex gravissimo morbo & febris ardente cum dolore capitis acutissimo habuit futuras adeo disjunctas, ut per interitum illud cerebri, systole, & diastole facile deprehenderetur. Ubi via facta est ad conjunctivam, longo tempore exstiliavit copiosus humor tumque prius & dolores, & reliqua symptomata mitigari ceperunt. Urgentibus doloribus adhibitus erat cervicis letaceus tunniculus, sed quem ut nimis doloricium & incommodum (ut qui circa sextam vertebra, & ubi nervi eminentiores sunt, adhibitus esset) post 15. dies detrahi iussit. Claufo vulnere impreitum est ibidem potentiale cauterium: sed & hoc ulcus, ut nimis dolorificum claudendum fuit. His frustra tentatis optavit ager, humori morbosco dani exitum, excitato ulcere in dextro brachio, beneficio potentialis Cauteri. Tumdemum partim ob lebrum ante dictam, quæ pletosque humores superfluos absumperat, ipsumque adeo corpus exliccarat, atque extenuarat, partim propter evacuationes inunde iteratas, partim denique quod cauterium ita ad brachium fluxionem averteret, oculus coepit arescere. Et quoniam tres oculi humores, ruptis conjuncta, & cornea membranis, effluerant, festim etiam concidere, & contractæ sunt ipsæ membranæ; atque ita oculus depedita naturalis magnitudine & rotunditate, simul quoque in imam orbitam contractus est, & coeuntibus palpebris clavius ab anno 81. ad 95. citra symptomata ullum, nisi quod singulis annis suade recurrebant, & oeduxus, & capitis dolor.

Anno demum 95. quum in diata modum non servasset, rediit capitis & oculi dolor, priore tamen levior; ideo fortè quia membranæ, & reliquæ oculi partes etiamnum dilatata erant, vane poterat humor sine vi influere. Etenim quæ semper sunt mutationes, partim dolorificæ sunt. sic igitur affluente magis, magisque humore, in cap. citatem conjunctivæ, proprius humoribus deturta & contracta, ipsa paulatim intumuit. Tum vero palpebræ quindecim annis clausæ, denuo apertæ sunt, & oculus adeo intumuit, ut post semestrem palpebras superaret, spatis per totum oculum venarum ramis lividis, crano, adulto & melancholico sanguine turgentibus. Tum æger ingravescens in dies & morbo & symptomatis, undelibet prælidia conquerere coepit, inter quæ adhibuit medicamentum, quod adeo irritavit morbum, ut subito accreverit oculus plurimum. Exin, ut initio dictum est, vocatus sum ab ægro Lustrum in ejus ædes. Laboravit ille hemerania ad dextrum latus: oculus ovo anserino major extra palpebras prominebat, partemque faciei cooperiebat.

Durus autem, scyrrhosis, lividus, & cancerosus erat, aderatque magna oculi & vicinarum partium inflammatio: præter capitis dolorem, oculi quoque dolor acutissime pun-

gens, in parte exteriore potissimum hominem male habebat. quod quis miretur quomodo ex tumore duro, & scyrrhoso tantus dolor excitatus fuerit, in promptu sunt causæ. Primum enim tunc formabatur cancer, fiebatque humor corrosivus & acris, ac proinde velicans & calefaciens vicinas partes. Deinde invalescente morbo violentius humor iruebat in conjunctivam, quæ est exquisito sensu prædita. Doloris verò in extrema parte, ut plurimum graviore quam in intima, causâ fuit oculus quadratum, & undique scabrosum, quod interius ad conjunctivam latens (uti ab operatione compertum) eam perpetuo premebat, & pungebat. Accessit & febris, itemque hæmorrhæ, hipothymia, & vomitus. His ego symptomatibus cepti statim occurrere. Itaque post præscriptam legitimam vicus rationem, sub vesperam iussi lenientem clysterem injici. Post die purgatum fuit corpus sumptis quibus unens syrupi rosacei laxativi cum rhubarbo, agarico, & iena, infus & decoctis in aqua betonicæ, grimonis, & euphrasie. Sequentibus diebus propinatum fuit julapium sequens.

2. Aquæ borraginis, acetosæ, & betonicæ ana unc. ij. syrupi de succo citriorum, & granatorum ana unc. ij. misce pro tribus dosibus.

A purgatione fuit secta vena cephalica, respondens parti atrectæ, & missus sanguis ad uncias circiter sex. Pans post diebus, admove hircudines venis jugularibus sub aurem ad idem latus, nec non & scapulis cucurbitulas modo siccas, modo cum scarificatione. Eades lavi decocto herbarum calidarum, rosamarinis, salvia, majoranæ, origani, menthæ, cum sale &c. Su debantur & frictions, seu cum his incleat sanguis, subtilisque, collidus, & erodens evadat, sensui abstinendum, contentus memor. tis revulsionibus: maxime quum æger libens iteraturus esset sæpius superiorem purgationem, per syrupum rosaceum compositum & similia, quibus peccantem humorem subdixi. Ita mitigata imminuitque sunt paulatim symptomata. Statim etiam partem atrectam ablui gossypio, imbuto stillatitiâ quadam aqua, quæ nunc potest advenire ejusdemque partis cancerum. ejus hæc est descriptio.

3. Radicum scrophulariæ majoris, herbarum geranii pruni Dioscoridis, hoc est, herbarum Roberti ana M. ij. amoglossæ majoris, solani, buglossæ sylvestris, boraginis, ortulacæ, euphrasie, betonicæ ana. Mj. ranaum aquatiliū & album. ovorum diu agitata, ana num. 12. seminis cydoniorum, & foeni græci aliquantum conquisitorum, an. unc. j. His seminibus affunde aquarum rosarum & euphrasie, ana lib. j. incidantur omnia. & conquisantur, destillenturque in alembico plumbeo. Et quoniam ingens fuit fluxus, præter revulsionem admove fronti sequens unguentum ad fluxionem intercipiendam.

4. Farinæ hordei unc. ij. pulveris rosarum rubearum, myrtillorum, balsamiorum, nucum cupressi, & florum betonicæ, ana Drachm. ij. Acaciæ Drachm. j. cum oleo rosato, pauca cera & aceto, fiat unguentum.

Hoc defensivum adhibui tribus vel quatuor diebus, ad sistendum fluxionis impetum: deius super



superfedi; ne plus satis refrigeretur caput. Hac methodo sedavi ad tempus tum capitis, tum ulceris dolores acutissimos, ceteraque symptomata, crescente nihilominus in dies tumore.

Aliquantò post rogatus sum ab ægro, ut sibi fuisset morbi naturam declararem, libereque aperirem, quæ præviderem pericula omnia, ac simul quæcunque ad sanitatem optima viderentur præsidia, proponerem. Tum ego coram clarissimo Alberto Rolcio D. Medico celeberrimo, in ædibus Claudii Marionis, fidelissimi ac diligentissimi pharmacopæi & civis Lausannensis; ita disserui: Generose Domine, siquidem adeo exoptas & jubes coram declarari quæ ad morbum tuum attinent, etiam præter Medicorum institutum in consultationibus id sum factururus, dicam tamen libere & coram quæ sentio.

Ad quemvis morbum tollendum, caput est nosse ipsum morbum. Tuus iste ab essentia definitus nihil aliud est quàm Scirrhus illegitimus, seu potius canerosus: quippe qui definit in cancerum occultum, & latentem, hoc est, non exulceratum. At ex figura Celsus *scirrhus* vel cum latius, exitum oculi nominat. *Aquarius* *malum*, id est, malum vocat. Ego à figura nunc ab essentia scirrhosum & canerosum, cognomino. Scirrhus propriè medicis dictus est tumor durus & indolens, qualis hic ante annos aliquot. Verùm postea humor conjunctiva membrana concludus, & ita quasi conculcatus, ut nulla potuerit fieri transpiratio, tandem accensius est, & acrior atque malignior redditus: sicque formatus est Scirrhus illegitimus, seu potius canerosus. Hoc indicant non modò duntius, inæqualitas, dolor, color lividus, seu potius plumbeus, sed maxime venæ crassiores toto tumore sparsæ, atro sanguine, adusto, & melancholico turgentes. Et quamvis nondum exulceratus sit tumor, periculum est tamen, ne temporis progressu sanguis, & humores melancholici accensi, tantum malitiæ attrahant in locum affectum, ut tandem (proh dolor) ex his tunicis, fiat cancer ulceratus, adversus quem medicamentis frustra pugnetur.

Hujus & similium morborum causa triplex, primitiva, antecedens, conjuncta. Primitiva medicis est exterior, potè in victus ratione, aliisque non naturalibus, aere, motu, & quiete, somno, & vigilia, animi pathematis excretis & retentis. Plerumque enim si supprimantur solitæ evacuationes, ut mensium, & hamorrhoidum, fit magna congestio humoris melancholici: unde hic morbus. Nascitur etiam ex vulneribus, contusionibus, fracturis, in primis verò erysipelate & miliarum tionebus perperam curatis: quum scilicet ipsarum materiam frigidiorum applicatione in duritiem concrevit, aut quum solis calidis, non etiam emollientibus, tenuior portio dissolvitur, crassiore subsistente.

Antecedens causa est humor melancholicus, item splenis imbecillitas, qua fit ut ex officio suo sanguinis portionem sæculentam ex jecore non alliciat. Huc quoque plurimum facit ipsa jecoris constitutio, sive id natura proclive est ad generandum atræ bilis copiam, sive nimis

calidum & biliosum, unde coquatur nimis, & aduratur sanguis, nec non & alii humores.

Conjuncta causa est, humor in locum affectum congestus. Tres istæ causæ hic concurrunt. Nam quum generosus Dominus habitu sit non mediocriter biliofus, bilis assidue præbuit materiam humori melancholico, siquidem cholericus humor summâ adulatione tandem etiam vertitur in atram bilem. Adde victus rationem, in qua haud parum peccavit Dominus largius potans, uterque cibariis crudis & concoctis difficilibus, uterque aromatatis, cæpis, aliis, porris, raphanis &c. Hujusmodi primitivam causam concursu, excitata & corroborata est antecedens: unde humor ille qui ab anno 81. supererat ex inflammatione indurata in oculi membranis, quæ occasione accrevit. Cumque superavi tumores fere induant in locum affectum, natura sese, quantum potuit, exoneravit in eum locum. Tunc conjuncta causa in istam, quam videmus in longitudinem, aucta est: & perget, inquam, nun occurratur us, quæ ultra proponemus, auxilium.

Quoad signa: tametsi initio canceri sicut herbæ germinantes difficile cognoscantur, auctore Galeno, nihilominus tumor ille sat liquido intelligitur canerosus; contra eos qui merum esse scirrhum apud generosum Dominum contenderunt. Canceri cognoscuntur eo, quod sint præauri, inæquales, lividi, sparsis circa tumorem crassioribus venis, atro sanguine turgentibus.

Sæpe etiam adest intemperies calida, sive calor, & inflammatio cum dolore pungente & pruriente. Si fuerit exulceratus cancer, exit lubrilis, & foetida sanies. Ista autem hic videntur pleraque omnia. Non quidem pervenit cancer ad summam malignitatem, sed ad eam properat, brevi perventurus. Aulus enim est inguis loco amato, inclitus tandem contrahet (& jam caput) malignitatem tunc, ut quæ hactenus nunc operata sunt præsidia, sedandis doloribus, repræsentando non modo, & minuendis symptomatibus omnibus, ac cum infirmitate futura sit ad repaumentum non orbem, & prohibendum, ne exulceretur, & occupet reliquas lactei partes, sicque fiat. (dissimulat nunc) hoc est, ulcus canerosum, in lacte perquam malignum & inmedicabile. ad duo exodens inas per partes affectas, nec sibi potens, ut movet ætius.

Nunc de curatione. Hæc perfici solet tribus potissimum: victus ratione, evacuatione humoris antecedentis, & Chirurgicis auxiliis. Victus & ceterorum non nunc curatum, quæ sit ratio, jam sæpe ex me audivit Dominus: vitanda nimium ciculenta dura, vaporosa, & quæ facile corrumpuntur: cujusmodi sunt carnes sale aut fumo inveteratæ, tubula, iunda, ferina & similes: item aves aquaticæ. Utendum bona verucina vitulina, hæcina, pullis, capis, perdicibus, turdis &c. Piscibus abstinentium non forte, ut non nimis appetitui indugeatur, his ut liceat sub initium praudenti non in causa, itaque adjectis paucis aliis cibis. Sunt autem pisces carne terrena præditi: veluti perca, trutta &c. In aquatilibus optimi sunt ganama-ri nunc aromatis. Aromata enim omnia vitan-



da, piper, zingiber, garyophylli &c. item capræ, porrum, allia, raphani, synapi, & quæcumque vim habent, caletiacendi nimis sanguinem: legumina, fabæ, lenticulæ, pisa, phaseoli, &c. plurimum nocent: item caseus & quævis lactaria opera. Vespertina iuscula potissimum noxia: vinum item vaporosum. Bibendum autem album, maturum, & modicè potens. Diurnus somnus, potissimum statim à cæna, noxius: aer item nimis calidus, aut summe frigidus vitandus.

Secundam sanationis partem diximus, positam in evacuando humore antecedens, quod ubi fiet, spectanda erit Domini habitudo biliosa, & intemperies calida, cum Obstructione jecoris: ideoque purgandum cholagogis, habita tamen partis affectæ ratione. Quem in usum mire placet syrupus rosaceus compositus cum rhabarbaro, agarico & senna, quotæpe usus est æger, cum decocto betonicæ, euphrasie, agrimonie, &c. salubriter etiam usus est præscripto à me diaphræuico in tabellis, & electuario de surge rosarum. At ex Hippocrate ante purgationem præparandus est & coquendus humor apozematis aperientibus, qualia poterit præscribere D. D. Roscius, phlebotomia, cucurbitulæ, & hirudines sæpe utiles, imò necessariæ ad hunc orbem, tum ut evacues, minuasque causam antecedentem, humorem videlicet melancholicum, tum ut derives loco affecto. Opportunum his verum tempus, authore Hippocrate, quibuscumque inquit, venæ sectio, vel medicatio convenit, hos vere purgare, vel venæ secta vacuare oportet. Aperienda vena brachii ad latus partis affectæ, cucurbitæ, scapulis, & clunibus applicanda. Hirudines applicentur, quo modo jam applicuimus magno Domini bono, modò sub aures ad jugulares venas, modò ad hæmorrhoidis ano, prout medico videbitur, idque urgente demum necessitate. Tum verò sentim emittendus sanguis propter male constitutum jecur, quod cum sit jam dudum debile, scirrhum, & obstructum, dubium non est, quin nimia aut importuna phlebotomia plurimum sit nocitura.

Tertia & postrema tollendi morbi ratio, posita in operatione chirurgica in curando videlicet loco affecto. Porro hujus morbi sanatio chirurgica duplex est: una palliativa, seu fucata: altera vera. Palliativa est, quam hæcenus adhibuimus, & commodo victu, & purgato sæpe corpore ad deducendum humorem, siue causam morbi antecedentem, atque etiam inhibendo ejus impetum exterioribus applicationibus, qualibus huc usque sumus usi. Sed quum hæc curatio tandem futura sit inualida, ad reprimendam morbi vehementiam, & perfectè sanandum ægrum, operæ pretium fuerit, proponere veram & legitimam sanationem.

Quum igitur legitima sanatio tumoris præter naturam, authore Galeno, fiat extrahendo tollendoque quicquid adest in parte affecta: videndum, quot modis tolli possit tumor, siue excrecentia ista, & quæ tollendi tutissima ratio? Jam ante ex me audiit Dominus, id faciendum vel resolventibus, vel erodentibus Pharmacis aut ipsa manu. Quoad resolventia, quum tumor sit durissimus, credibile est, nullo re-

solutum iri medicamento nisi prius emolliatur. At vero præterquam quod hujusmodi prædura materia, tam diu (quindecim videlicet annis) congesta, emoluri nequit, periculum est, ne ex isto emollientium usu tumor subito contrahat summam malitiam, uti testatur Galenus, & nos in tractatu de Gangrena confirmavimus, exemplo Scirrhi in jecore inveterati. Hic enim adhibitis emollientibus, statim versus est in cancerum exulceratum, ex quo mors; ex hac ergo methodo nihil sperandum. erodentia verò mihi perquam Periculosa censentur. Nam cum prominens hic tumor sit durissimus, credibile est benigna medicamenta irrita futura: quin potius, ut summa durities adest, sic vehemens requiritur medicatio, cuiusmodi est, quæ vi septicorum, & escharoticorum fieri solet. At vero ut lenibus non afficitur cancer, sævissimum malum, sic irritatur, & ingravescit, vel tantillum acerbis & vellicantibus ut ante expertus est æger. Porro quum pars affecta sit cerebro proxima, oculus videlicet, in quem, ut radicitus tollatur morbus, penetrandum est altius ad nervum opticum erodentibus Pharmacis, haud dubie illorum vis communicabitur membranis cerebri unde maxima & periculosissima exorietur inflammatio, siquidem magna intercedit sympathia & necessitudo inter oculi tunicas & capitis, ut infra liquebit ex oculi anatome. Ergo ne sic quidem sanari potest æger.

Superest, quam diximus, chirurgica operatio, ut simul & semel extirpetur, quicquid vitiosum est. Hæc autem omnium minime periculosa, meo quidem iudicio. Primum, quia solide conjicio, me facile posse radicitus malum extrahere, quantumvis alte latens in oculi orbita, nempe ad ipsum usque opticum nervum, cujus & pars amputanda. Deinde quia venarum & arteriarum vasa ibi, tenuia sunt, & quasi capillaria: ideoque nullum hæmorrhagiæ periculum. Denique licet altius incidendi sint nervi, opticus, & qui secundæ conjugationis est, nullum tamen periculum: siquidem nervis perfecte incisis in transversum, eorum extremitas contrahitur, ipsique integuntur carne, sicque desinit illorum functio, nec ære aut medicamentis lædi possunt. Unum hoc timendum, ne quum ægri corpus jam dudum cacoethymum sit, ac ætate jam provectiore ad annum videlicet accedens quinquagesimum sextum, facile accendatur intemperies in partibus intimis, simulque excitentur febris, capitis dolor aliaque id genus symptomata. His ut occurras, laudabili victu utendum, purgationes usurpandæ, secunda vena, applicandæ cucurbitulæ, & cætera revulsionum ac derivationum species, sicque tuta erunt omnia, si modò benedixerit Deus Opt. Max. cui pro generoso Domino vota nuncupamus.

His auditis, partim quod exhorresceret æger, partim quod dissuaderent nonnulli, absurde & imperite ipse facientes, fore, ut quicquid ex oculo prominebat sponte excideret, visum est pergere in curatione palliativâ. Hæc verò etsi sedantur dolores, nihilominus tamen excresebat fungus indies. Nascebantur quoque tubercula & varices lividæ ad pili magnitudinem, merum quandoque sanguinem emittentes,



ejusmodi hæmorrhagiam etiam probabant nonnulli, ut quæ agrum & partem affectam levatura videretur, ego contra constanter affirmavi, ita in dies magis, magisque debilitatum & refrigeratum in jecur jam pridem obstructum, durum & scirrholum ac tandem illectum in sanguinem, alioque humores ad caput & faciem; uti sane accidit 13. Julii. Reverso enim generoso Domino a brevi peregrinatione, ex qua incaluerat ei caput, itemque corpus universum, tubercula illa & varices oculi cœperunt sanguinem profundere, tanto impetu ut 13. & 14. diebus ejus mensis, impleta sint sanguine scutella septem, præter eum qui perlit in linteris, spongias, vestibus & singularum scutellarum sanguis à me appensus, præsentibus G. Dn. ægroto, Nicolao Gantino, Francisco Croserano & Jo. Glaronio, fuit unciarum decem & semis: quod quidem in verum est, quàm dictum mirabile. Paulo post ager impenitus debilis, imminente altero profluvio me accersivit ejusdem mensis die 15. Quum primum advenio, scitatum quàm malum contegebatur, resolvo: cum cœpit sanguis longe majore quàm unquam antea, in impetu præfluere: id quod, nisi fuisset testis oculatus, ægre credidissem, quum sint oculi venæ fere omnes capillorum instar exiles: sed hæc contra in hoc bono viro varicum instar dilatate conspiciebantur. Attamen insperso pulvere nostro, sanguinis sistendi vi prædito, cujus descriptio habetur in libello nostro de gangrena c. 19. illico suppressus est ita sanguis, ut deinceps non nisi parcissimus fluxerit. Ab hoc profluvio declinantibus sensim viribus, & ex crescente in dies oculo, non nisi miserrima eaque propinqua mors expectabatur, quum tandem generosi viri Gabriel in Blonay, Baro à Chattelart, & Dominus Philippus Ceritiatus, Dom. à Deneri, ejus generi, cum aliis nobilibus & honestissimis amicis statuerunt aduocandos eruditissimos & peritissimos quosque Medicos, & chirurgos, quorum deliberationi & sententiæ sese ager subiceret. Annuente ægro, accitit Geneva clarissimus & doctissimus Janus Antonius Saracenus Philosophus eximius, Medicus Regius, Lausanna item doctissimus D.D. Albertus Roscius, senex experientissimus. His me tertium adjunxit ager benevolus, ut si opus esset chirurgica operatione, hanc ego persicerem. Die Julii 20. iuxta consultationem, proposui quæ infra suo loco.

Inita consultatione, commemoravi apud clarissimos Doctores Medicos duos, quæ ante apud agrum & D.D. Roscium in ædibus & præsentia Marionis Lausannæ proposueram: iterum concludens, sola manus opera plenissime sanari posse ægrotum. Cumque ex nova quorundam sententia sperasset ager, commodè incisum in caucrum religatum serico, necesse habui meas contra sæpius allatas rationes subicere hunc in modum.

Primum: quod mali radix à ligaturæ relinqueretur: siquidem quæ facta est morbi renovatio, liquidò constat & etiam esse in orbita, adeoque altius ad opticum usque nervum. Ligatura autem quum id solum apprehendat, quod prominet à palpebris, relictum est quicquid orbita continetur, sicque irrita futura esset operatio. Etenim id quod relinquetur, illico

proferet novum fungum priore maligniorem.

Secundo quod fieri possit, ut rumpatur vena aut arteria quæpiam importuno tempore, puta nocte; & sic ager vel exigua sanguinis jacura & vestigio moriatur, quum tanta jam sit tanta profusio.

Tertio: quod ex ligatura futurus esset gravissimus dolor, totis quindecim diebus & ultra: propterea quod conjunctiva in qua utret ligatio ut pote à pericranio deducta nullo sensu sit prædita, quo ex dolore, ut nihil dicam de cerebri læsione, sequeretur humorum affluxus ingens in partem affectam. Adde quod ager jam dudum debilis & extenuatus nos dolores & inquietudines, tolerare non posset.

Quarto: quod pars oculi supra ligaturam, dum corrumpetur, fatore suo gravissimo læsura foret partes principes, & ipsæ, adstantibus intolerabilis futura. Relinquitur mentio, quam spero a nobis jam dextre tacum iri, propitio numine, ut leviores sint cruciatus, & nulla aut minima hæmorrhagia. Quod ambigitur, queat ne morbus radicatus erui spero id quidem faciunt. Quippe jam prius excogitavi instrumenta quædam, quibus oculum tuto & agiler ab ipsa orbita recessum extraham. Præterea quæntuluscumque ille qui percipitur motus, apprehenso tumore necio nonnulli mobili, spem facit hunc non hære, perionio, cui si adhereret, certe enet immobilis. Imò & ex eo intelligitur, reliquam esse aliquam pinguedinis & musculorum ambientium portionem inter oculum & os; ex quibus operatio tanto facilior, tutior, & felicior expectatur. Quod hæmorrhagiam, ego certe non nihil moveor, cum subit animo nuper à sanguinis illa profusio, nobis notissima. Attamen venæ in oculo tenuissimæ non videntur largum emissuræ sanguinem, si incidantur ad balium: & potest diligente manu inhiberi erumpens sanguis, quem post tantum profluvium non est verum simile nuntium futurum. Denique hæc dubie ex ægri metu & horrore major pars sanguinis reverteretur.

Consultissimum tamen fuerit extrema ligaturæ arcissime, brachia supra cubitum, tibias supra genua, idque horæ dimidio ante operationem, ut nimirum molita & contringente hac ligatura, sanguis avertatur ad illas partes, & procul ab iis, in quibus futura est operatio. Atque hoc meum est de hoc morbo ejusque chirurgica extirpatione iudicium. Vos Medici videte, & de nostris iudicate, Doctores clarissimi.

Hic Medici, postquàm discessissent de morbo & medicamentis universalibus, nostra omnia comprobarunt, & decreta est man extirpatio per incisionem. D. Saracenus rem detulit ad ægri necessarios & amicos, quotquot aderant. Illi audito tum præsentis & quidem lunestissimæ mortis periculo, tum & nationis spe per oculi extirpationem, facile assenserunt, multoque libentius ager ipse inquam.

Tum postquàm prædixi merenda symptomata, decreta est in proximè sequentem diem Lunæ, qui in Augusti Calendas incidebat, operatio. Interea præscripta est ægro victus ratio congrua, ad reparandas vires & perditas superiore sanguinis profusio. Præscriptus & illi



ad diem sabbathi decimum nonum] Calendas Augusti laxativus potus.

℞. Tamarind. electorum, foliorum senz oriental. mundat. ana ʒ ij. uvarum passarum mundat. ʒ j. epithymi. sem. anisi, fœniculi, ana ʒ β. cichorii, agrum. ceterach. polytrichi, ana p. j. fiat decoctio ad ʒ iij. in qua colata macera rhabarb. elect. ʒ i β. cinnamomi electi gra. 7. in expressione dissolve syrupi violati ex 9. infusionibus & manz granatz ana ʒ j. misce: fiat potio.

Sequente die Dominico, & die lunæ, manè ante operationem, exhibitus est potus cordialis sequens.

℞. Aquarum buglossæ, violarum, rosarum, melissæ, ana ʒ j. syrupi corticum citri & de succo acetosæ ana ʒ j. confect. alkermes ʒ j. pulv. diambz ʒ β. misce fiat potio pro duabus dosibus.

Exterius super corde ante & post operationem applicitum est scutum sequens.

℞. Florum trium cordialium ana p. ij. melissæ, majoranz, ana m. β. seminis & corticum citri, seminis ocymi, ana ʒ ij. pulv. elect. diambz, margar. frigid. pulv. elect. e gemmis ana ʒ iij. pulv. diamoichi dulcis, & diambz, ana ʒ β. croci ʒ j. excipiantur gossypio, & cum syndone rubra fiat scutum interpunctum pro regione cordis.

Ante & diu post operationem, unctus est stomachus hoc unguento.

℞. Cerati stomach. Galen. ʒ iij. pulv. aromat. rosati ʒ j. garyophyll. & nucis mosc. ana ʒ β. olei nardini & mallichini, ana ʒ β. fiat linimentum pro regione stomachi, ante cibum.

Aliud unguentum pro stomacho, aliquandiu applicitum post operationem factam.

℞. Olei mallichini & de mentha, ana ʒ β. olei nardini & de absinthio pontico ana ʒ iij. cerati stom. gal. ʒ ij. ladani & olei de nucis mosch. an. ʒ j. pulv. arom. ros. & ligni aloës, ana ʒ j. pulv. garyophyll. & ambræ griseæ ana ʒ β. cum cera nova q. s. fiat unguentum, quo calide illuminatur regio ventriculi ante cibos, bis die.

His ita præscriptis, amici qui aderant studuerunt agrum recreare, quantum fieri potuit. At ille magnanimus & sanitatis avidissimus constantiæ suæ magis quam alienis verbis solabatur; nisi quod statò die nonnihil teritus est D. Roerii excusatione per literas factâ, veritus nimirum, ne quid ille mali præfagiret: quod tamen ita dissimulavit, ut non nisi ab operatione resciri potuerit: adeo urgebat ipse operationem.

Itaque præmissis solennibus precibus pro felici successu, & tribuenda ægro patientia ac viribus, ipsemet sumpto recente ovo & cyatho vini, cathedram accommodatam sibi delegit, & ultro sedit: ita ut quum mollis quispian cathedræ alligandus foret, necesse duntaxat habuerim, adstantium duobus brachia, tertio caput committere. Dum crumenâ ex utraque parte apertâ, ad hanc operationem à me inventâ, totam excrescentiam, sive ficum tam altè quantum fieri potuit, versus nervum opticum apprehendi & inclusi, crumenulamque constrinxi, & sinistra meâ nonnihil attraxi. Crumenâ hæc sit ex corio tenerrimo ex supernâ parte

annexi sunt orbiculi, ex filo æneo facti ad excipiendos funiculos.

Vulgus Chirurgorum loco crumenæ, ad has, aliasque excrescentias, scirrhos, atheromata, theatomata, & similia excidenda, excrescentiæ, sive tumori, filum duplicatum acu incurvata trajiciunt, sed perperam, aqua enim sive humor in oculo, aut quovis alio tumore contentus, protinus effluit, & membranz concidunt, hæcescitque tumor, difficilim inque efficit operationem, sed de his forsan alias plura.

Sic apprehenso, & crumena incluso fungo, cœpi sub palpebra superiore ad majorem oculi cantum, instrumento, (quod ipse inveneram, & nominatim præpararam ad eam operationem) separare conjunctivam: adactoque ferro ad opticum usque nervum, percurri oculi ambitum, quæ erant separanda dissurgens, eodemque instrumento opticum secui tum & cum qui secundæ conjugationis est, & tam dextre (sine jactantia ut dicam) me gessi ut vix decem passus fierent, dum ficus ille cancerosus, totam oculi orbitam implens, & in faciem latè prominens, intactis palpebris, radicitus erutus sit.

Est autem cultellus veluti lenticulare obtusus, ne in operatione cranium lædatur. Cuspis enim ipsius nonnihil extuberat, sed ex illa solummodo parte, quæ in operatione cranium respicit. Altera vero pars, plana & æquidistans est; præterea nonnihil incurvatus est cultellus, sed eodem plane modo, quemadmodum cultri quibus excavantur cochlearia lignea, incurvari solent.

Sed quia cuspis cultelli in forma lenticulare, ut dixi, obtusa, necesse est, ut phlebotomo, aut novaculo, per ipsam adnatam parva hac utensio, quo cuspis cultelli saltem per ipsam adnatam intrudi possit, & reliqua omnia facile à cranio separentur.

Ut autem cultellarius instrumentum hoc apte atque concinne fabricare possit, necesse est, ut Chirurgus ipsemet exemplar sive specimen ex plumbo ea qua fieri potest diligentia adornet. Id verò facile efficit, si longitudinem ac latitudinem exactè observaverit. Quantum autem incurvandus sit cultellus, facile cognoscet, si interim, dum specimen ex plumbo parat, cranium hominis suâ carne denudatum ad manus habueris. Hoc modo ego, cum operatio hæc mihi facienda erat, processî. Summa autem adhibenda est diligentia, ut quam aptissimè fabricatum sit instrumentum; in hoc enim totum ferè negotium operationis situm est. Si enim aptum & bene scindens fuerit instrumentum, feliciter succedet operatio: infelicitèr verò, si minus aptum fuerit, ut fusiùs dicturus sum, quando de instrumento quo Dom. Georgius Bartisch in hac operatione utitur, agam.

Porro etsi adnata tunica, quæ præcipuè incidenda erat, exquisitissimo sensu sit prædita, non usque adeo tamen dolorifica fuit operatio. Agitatio ægri nulla, nisi lingua quum ter, quaterque Deum inclamavit.

Injeci illico copiose pulverem nostrum ad sanguinem sistendum lib. de gangrena, & spha-celo cap. 19. scriptum; stupas quinetiam al-



humine ovi madefactis, & prædicto pulvere conspersas, oculi capsulam implevi, ita ut vix vix dux sanguinis extillarint. Ideoque nihil opus fuit actu, aut cauterio argenteo quod proprie prepararam, propter loci affecti nobilitatem & præstantiam.

Deinde involuta fasciis orbita, & defensivis ad frontem & collum circumcirca adhibitis, æger ipse se abluit, & voluit ire pedibus in lectum, trigrata circiter passus ab operationis loco. Nos prohibuimus, & sella detulimus. Mirum tam diuturno morbo, tanto sanguinis profusio, & vix tam provento, ægrum sic subsistisse, nisi Deus, cui laus & gloria, cum corroborasset.

Tumoris magnitudo ad nervum opticum usque patebat. In tumore post operationem dilecto, invenimus osiculū, & mole & figurā dimidiatam fabam representans, ubique tuberosum, prope minorem oculi canthum. Hic varia iudicia. Alii in tumore natum dixerunt, quod densa & dura integeretur tunica, quæ mihi scelerotica esse videbatur. Alii diuturno defluxu carie affectum cranium censuerunt, indeque cariosum osiculū sponte natura separatum, sensim membranam illam penetrasse, atque illud callo deinde obductum fuisse. Verò mihi similis videtur, id osiculū e cranium illuc penetrasse, quā in ipso tumore natum. Primum enim ad orbitam oculi pertinuisse patet. Deinde materia intra quam illud repositum est instar atramenti nigra erat, nihilque aliud quā sanguinis fœx. At necesse est, quod ex materia aliqua gignitur, ejus colorem referre: osiculū autem album fuit ac proinde non ibidem genitum. Tertio ex progressu curationis facile fuit animadvertere, e cranium illud delapsū, siquidem percipiebatur cicatrix nonnulla cava, ad minorem canthum: qualis esse solet, ubicunque est visus deperditio, teste Hippocrate. Residuum tumoris duabus diversis substantiis constabat. Nam pars ea quæ extra orbitam prominebat, instar fœcis atramenti fuit, satis densa, fortis membranā involuta, quam autumno ex conjunctiva & cornea membranā ita coalluisse.

Pars verò orbitā contenta, dura fuit & scirrhosa, colore livido. Hos ego fuisse puto oculi oculos, qui quidem nequaquam conspici poterant agnoscere, utineque membranæ, quia plane occaluerant cum aliqua alia materia residua, ex priore illa inflammatione anni 1571.

Ipsa operationis die non est resectum vulnus metu hæmorrhagiæ: at postmodum tantum applicatum ex decerptis linamentis digestivum sequens.

℞. Terebinth. lotæ in aqua betonice ℥ij. gummi elemi dissol. in oleo rosaceo ℥j. adde vitell. ovorum num. 2. croci ℥j. misce: fiat digestivum. Insuper admove emplastrum basilicum. Inunxi totum caput & collum oleo myrti. & rosato: fronti & collo defensivum applicui: nec aliter processit; quoad facta esset vulneris digestio. Sequenti die, Saracenus relicto longiore scripto, in quo victus ratio tum in rem præsentem, tum etiam in futurum conveniens, tradebatur, domum repetens mihi rem omnem commendavit. Ego sex diebus

continuavi digestivum & basilicum: exim digesto vulnere pro digestivo adhibui mundificativum sequens.

℞. Terebinth. lotæ in aqua betonice ℥ij. gummi elemi dissol. in oleo rosaceo ℥j. radic. aristol. rotunda. iridis nor. ana ℥ij. cum melle rosaceo fiat mundificativum.

Tum applicui emplastrum de betonica, eoque lapsio incarnavi vulnus: cicatricem nullam priveri licco, ex cerula, lithargyro, cornu cervi ulto, alumine & radicibus iridis, super inducto empl. diapalma. Vicus rationem æger adeo accurate & libens observavit, ut supra decimum quartum diem vino sibi temperavit, contentus præfana, cui adjectum erat paucum coriandrum præparatum, aut etiam oxysaccharum, cui inter parandum indebatur tantillum cinnamomi: atque sic adductis tandem concinne palpebris, a lico cancroso, ejusque omnibus symptomatis, vir genere & virtute, in primis verò pietate nobilissimus per-sanatus est.

Porro quoniam locus multum diuque affectus ac pro indebilis, ut plurimum obnoxius sit defluxionibus à valentioribus partibus transmissis, ideo ut ne deinceps novi exorirentur in facie affectus, ac in parte nuperrime sanata, auctor ægro fuit, ut clauderetur ulcus, cauterio excitatum in brachio dextro, quod progressu temporis inferius descenderat, & circumcirca callosum evaserat, & novum applicui superius ac propius venam cephalicam 21. Augusti. Porro in eundem usum & ad majorem præcautionem suavi, setaceum ad cervicem trapezi legitimo loco, qui est à prima vertebra ad tertiam, nec inferius. Adhibuit quidem tuerat anno 81. ineunte morbo, sed male ad sextam cervicis vertebra, ubi eminentiores sunt nervi, quā superius ad caput: hinc acutissimus dolor, ob quem adeo excitatum ulcus post mensem claudendum fuerat. Ille consilium nostrum admisit, & consultus Saracenus literis, eandem sententiam scriptis confirmavit. *Guilielmus Fabric. Hildan. Observ. Chirurg. Cent. 1.*

Ratione officii à serenissimo Principe ac Domino Dn. Philippo Ludovico Comite Palatino Neoburgico &c. mihi in patria demandati inter alios alumnos Illustris scholæ Laviuganz, mense Febuario curandus ad me venit amicus meus consanguineus Sebaldu Agricola, superintendens Neoburgici piz memoriz suus, adolescens pius, doctus, sanus alias, aspectu & corpore nobilissimus, sed nimia severitate alter Cato: hæreditario quasi malo sermonem nunquam articulatum explicabat, lingua crassa, ex copia humoris affluentis ab humiliori cerebro, ob quod etiam pater ipse p. m. continuis distillationibus obnoxius, neglecto consueto ligni guajacini decocto, feliciter ab illis usurpato, tandem apoplexia mox percussus obiit.

Filio prædicto (sequentia omnia feliciter referenti) in extremitatis lingue magis dextra parte, ineunte ætate, tuberculum valde exiguum ab initio erupit. Mox ad ciceris, postea fabæ, tandem neglectum, ad c. st. næ minoris, majorisque quantitatem, absque omni dolore, insigni tamen duritie, sensim excrevit,



ita tamen ut fili instar majoris hujus tuberculi radicem per linguæ comprellæ substantiam ego cum Chirurgo tactu sparsim deprehenderim. Eadem magnitudine mente februario subsistit; præcedentibus autem ineuntis hyemis mensibus, non solum bubo frigidus, indolens, induratus ovi instar asserini magnitudine, quæ erupit, eadem quamvis remeius exceptus, ad ægri usque hueni vitæ pertinax quievit: æquæ cum scrophulis forsitan cancroso malignitate rebellis futurus fuisset (si vitam longius æger pertraxisset) verum etiam in glandula post aurem dextram sita, parotis frigida at mollis prominebat. Uno & altero die sensim amandata, ad emunctoria dictæ saltem partis sub mandibula inferiore, & musculis ossis hyoidis ac linguæ, sensim longa serie in *scrophulas* & scrophulas terminabantur. Hoc modo singulis fere septimanis ineuntis hyemis, ad ineuntem in qua obiit ætatem, imprimis luna crescente, parotis recens, frigida, mollis iterum, tandem ad emunctoria suo mandibula in scrophulas semper desivit tam induratas, ut in calculos abiisse materiam, tactu putiles, tamque ingentes, ut cum scrophulis sinistrae partis ex eadem parotidibus enatis, sibi que obviis, tandem totam illam cavitatem, quæ est in colli totius sub mento ambitu, impleverint.

Crescentibus sic in dies scrophulis, suæque valetudinis curandæ negligens, denum coactus mense februario me consuluit: illius natura, linguæ, & colli tumoribus aliisque ex ægri relatione consideratis statim suspicabar tubercula hæc cancroso proditisse: mihi enim tunc in mentem veniebat venerandi illud Galeni: cancroso scilicet esse omnia, quæ ab atrabiliario succo induruerint. Propterea non esse vulgares, sed malignos tumores pronuntiabam, atque prius alteri Medico, hoc ipsum malum dijudicandum offerat, ipsi mandavi. Illo tum peregre abiente, aliquandiu ne nihil agere videretur, aliquid remediis leniendo coactus egi. ob intensissimum enim frigus, quod tempore Bacchanaliorum, duravit, malum in dies augebatur, cum scrophulis lingua in magnum tumorem suffocationis periculo non solum elevabatur, verum illud ipsum tuberculum linguæ canceronem, eodem die vidi cum pustula, prope venam, sub lingua raninam dextram atro sanguine turgentem, quam æger sæpius exerendo linguam tumidam, dentibus fricando aperuit, quæ evacua, ne instante nocte omnia augeantur, avertebam humorum affluxum: inde etiam ex præscripto colutorio, & irrigatione oleo ligni juniperini seu corylini facta, sicque per os derivando materiam, paucis horis lingua plane detumuit. Altero die syrupus cum decocto dialente exhibitus, ut sudorifera sequentibus diebus assumpta, feliciter ac magno ægri levamine operabantur. Postea alter Medicus, me absente (cujus tamen adventum ad veram & methodicam hujus ægri curam suscipiendam prætolabar) fere per mensem, præmissis etiam purgationibus linguæ tuberculo imposuit digestivum, sed omne incassum, sic enim digerendo utraque in dies latius serpsit. Quare alter Medicus suam patientem incurabilem, nisi malum sectione auferatur, proclamabat, & absque ullis remediis desperatum, neque unquam

attingendum putabat. Eodem tempore altius ego inatri, ob huiusmodi medica ope exulceranti, non modo rogatus, verum imprimis christianorum (qua membris fide & dilectione nobis annexis omnibus ad mortem usque open terre iubemur, cum in desperationis admirabilem salvando Deum viderim) commotus, mea pauca, & certa remedia repetii. Erat enim cancerosus adhuc lacertosus, & viribus validus, bene & comedebat & dormiebat. Quapropter ex præsentibus signis quam minime curatio eradicatoria certo sit speranda præfagiens, curam palliativam, quæ canceri augmentum prohiberi, aliaque symptomata demoliri queant, amplectendam suavi; ultioni aut sectioni, quam senior Medicus suadebat, semper merito contradixi, ab Hippocrate & Galeno lect. 6. Aphor. 38. fideliter admonitus, pars enim affecta nunquam gangrenosa manifeste apparebat, quam alter Medicus suspicabatur, ut jam de hoc curandi modo præsertim hic periculosissimo, & cum summis exposito nihil dicam, quo saltem ulcus ablatum fuisset, latente per amputatæ linguæ substantiam maligna radice.

Decimo ergo Martii rogatus, primum præscripsi convenientem dietam: deinde cum sufficientissime à nobis binis Medicis perpuratum corpus fuisset, talibus evacuationibus supersedi, leviores tamen, jubente ægri natura, non negligendo.

Deinceps venam salvatellam aperiri jussi; postea sudorifera, occulta virtute cancro inimica, alternis diebus (quod tempus si neglexit, recens parotis statim erupit) citra molestim præbui.

Sequebantur colatoria, optimè partes ejus carcinomati vicinas defendentia. Denique exulcerato linguæ cancro aquam absterforiam ex stillatitiis plantaginis, cardui & ligni heracolini, nec non polinem ulceri impergendum ex carduo benedicto, nicotiana & trociscis à viperis, magno emolumento ægri ordinavi. Præterea adhibitis prædictis, post novam cataplasma ex saccharo cando, uoribus sulphuris & theriaca cum oleo ligni Heracolini ad ultam consistentiam redigendo, nunc cubus, nunc panis cerato ulceratæ linguæ imponi, & per famulum aut chirurgum usurpari curavi; qui ambo in administratione remedium diligenter erant; bis enim plerumque singulis diebus si non peregre advocatus, affectum tangendo ipsis adfui. Miror autem sæpius Berckmannum famulum, quo meliorem nunquam apud ægros optarem, noctu patienti accubans, interdum cancroso indutrie meis remediis tractando, tam ingentem foetorem sustinere potuisse absque manifestato damno. Sic in dies Clarissime Dn. Fabrici, cataplasmatibus operatio mihi ardebat, cujus vim in his & similibus affectibus admirandam oriri puto ex oleo ligni heracolini sive corylini, hujus virtutem nobilem indies curando laude experior.

Intante Maio, cancer exulceratus in dies omnium admiratione tumore mollior, fædo & sordido ulcere mitior, imò labris primum crassus tumidis, duris, postea etiam nodosis, inversis, elatis, ac profecto aspectu horridis, subsidens & evanescens apparuit: ita, ut interius



nunc sanguinem melancholicum (at per aliquot intervalla) guttatim ad lbj. nunc saniem ichorosam, foetidam, & cadaverosam, ac quandoque atram eructaverit: venulis atro cruore & melancholica foete deoneratis, tumor evanuit: ac malignitate extincta ulcus saniem laudabilem fuit, in exulceratae linguae cavitate deteria caro non livida, sed rubella, proba & sana sensim succrevit: ita ut jam cicatrix obducenda foret, nisi simulam literarum instar Cadmodum parvum cum natura etiam studio apertam aliquantulum reliquerim.

Quum sic rem in vado esse sperassem, in lateris ejusdem scrophulae sub mandibula inferiore, quas in dies auctas antea scripsi, tumore serpentes intro ad linguam sese intinuerunt, ibique sub lingua in cancerum manifestum terminabantur, quem dudum metuebam, quemque foras elicere, & aperire summo studio, praesertim cum colore in rubro nigricante id simulaverit, laborabam, at hic tunis (ut in proverbio) nihil attraxit, sed linguae frenum partim exedendo, labro albicante, nodoso; sensim magis inverso, demum cruento, tandem exulcerato, paucis diebus ita rebellis factus est, ut sibi incumbentem & faneiscentem linguae extremitatem, cataplasmate insuper interposito, tamen per ligamentum & venam raninam furians, iterum non quidem magno aut manifesto, ut antea, ulcere inquinaverit; atque totam linguam, praesertim te discedente magno & pertinaci tumore, oris fere cavitate adaequaverit, geminum ac contiguum malum, quasi datatim alternis vicibus materiam sibi administrans, repullulando cito, late admodum germinabat: hypochondrium utrumque imprimis dextrum valde prominebat, quodve principio mitis curae solium prominens accusabam, at cancerosus idem, quasi ipsi sit congenitum, & absque dolore exulabat: petus elevatum, tuberculis nodisque totum cum tumentibus venis perspergebatur. Dolor prius dextri, dein utriusque hypochondrii, primum subacutum austerus homo nolebat, rogatus etiam mihi, illum suspicanti, indicare: postea tam vehemens, ut cruciatum diutius absque leniente remedio, se ferre non posse clamaverit. Dolorem enim acutissimum, pungentium velut acicularum sensum inferentem, nunc unum, nunc utrumque hypochondrium, nunc ad claves usque interioreque homioplatis, & humeros, etiam frequenter brachium, coxendicem, & totum pedem, ejusdem scilicet & dextri lateris pervadere, ager conquestus est, a quo tamen vacationem saepius habebat, ob mitigantia a me miserante praescripta. Miserabiliter enim dolore agitata, tremula membra vidi. Tandem in dies effluxu aucto, nec avertendo, nec derivando cessante, prius uvulam inflammata, fere aequae malignitate cancerosa, infectam aspeximus, quo aspectu prohibiti, quamvis strenue ego & chirurgus ubique laboraverimus, tamen oris cavitate adaequata tumida lingua ob vestigia sibi a dentibus impressa ita secundum dentium seriem plane exulcerabatur, ut superiores dentes per exesam linguam inferioribus conjuncti fuerint. O miserandum spectaculum! O ingentem scroterem, quem toleravimus.

Tecum omnes suffocationem metuebamur, quam tamen Deus prohibuit: tandem cum nullo alimento frui posset, & potu vires vix retinebantur, succedente frequenti *anorexia*, unde horis ante meridianis bis alvum cito exoneravit, post magno deliquio animi commotus illius curator recitabat orationem Dominicam, quam agonisans patientissimus Job qualitercunque mustitando ad finem ulque lequens, voce amen clausit, & confirmavit atque sic placidissime in Christo Salvatore 3. Junii solis die obdormivit.

Vesperis suadebam tecum sectionem cadaveris, cum prius saepissime matri explicuerim, te mihi consentire, malignitatis hujus cancerosae radicem ex hepate (omnibus signis sic annuentibus) & germinasse & propterea viscera inspicienda esse, at illa cum suis mulcerulis hac de re, quasi hoc committere plane iniquum foret, incipientibus, rigide denegando mandavit. *Valentinus Rylandus in Guelm. Fabric. Hildan. Obser. Chirurg. cent. 3.*

Superiori mense Octobri una cum viro clarissimo, atque Doctissimo Dn. Andrea Weickio, Medicinae doctore, convictore meo gravissimo, solodurimatronam, non ex obscura familia oriundam, invisi, laborat illa cancro occulto in mamma dextra, quem ante annos quadraginta, cum infantem ablactaret, ex lacte in grumos, concreto contraxit. Supervenerat autem tum temporis ex abundantia lactis, nec non retentione mensium inflammatio quae sedata tuberculum ad magnitudinem fabae remanserat. Quod neglectum ab initio, per annos fere quadraginta in ipsa mamma delituerat, absque tamen dolore aut ullo incommodo. Nunc vero ante annos tres, cum decrepita aetas appropinquaret, ita accrescere & dolere coepit, ut tandem non solum totam mammam occuparet, verum etiam sub axillam usque sese extenderet. Tumor iste non uique adeo elevatus, inaequalis tamen est, & undique nodulos durissimos, ac lividos, venulisque infinitis nigricantibus circumdatos habet. Tumor ac noduli isti adeo sub axillam versus vergunt ac retracti sunt, ut papilla, quod notandum, fere sub ipsa axilla recondatur; Hinc fit, ut brachium quoque dextrum propter musculum brachium pectori adducentem, in consensum trahatur. Totum enim brachium, imo & manus ipsa tumore praecipue ex pituita, cui tamen multum bilis atrae admixtum (oedema scirrhus appellat Medici) ab initio morbi per annos fere quadraginta, ut dixi, nullus fuerat dolor in ipsa mamma, nunc tamen continuus est, qui quidem, in acutus & pungens, mox vero remissior, in ipsum tamen brachium, mediante predicto musculo sese extendit. Dolorem autem ac intumescensionem brachii, vena-sectione, ab imperito barbitonfore in ipso cubito, ante mentes octo facta, non parum auxit. Cum enim antea dolor brachii esset exiguus, post vena-sectionem adeo auctus est, ut brachium nunc officio suo fungi amplius non possit, tantopere attraxit vena-lectio.

Ego etiam affectum in decrepita haec matrona (septuagesimum cum annum aetatis praetergressa est) plane incurabile esse, adstantibus significaverim, quia tamen agra, post Deum spem



speciem maximam in medicamentis, quæ adhibetur esse, posuit, nonnulla morbum palliandi causa præscripsi. Imprimis vero optimam victus rationem institui. Deinde corpus sequenti potione expurgavi.

℞. Radicum q. x. acuti, scrophulariæ majoris, polypodii q. Cortic. interior. radic. frangulæ an. ʒiʒ. Herb. cuscutz, tamariz, scabiosæ, ceterach an. M. ʒ. sem. anisi & feniculi an. ʒij. foliorum senæ ʒiʒ. liquiritiæ rasæ ʒiʒ. hac decoctio in aqua, ut colatura redeat ad ʒviij.

Hujus colaturæ accipe medietatem, cui admisce syrupi rosati solutivi comp. cum rhubarbaro, agarico & sena ʒj. Misce, fiat potio, detur in crepusculo matutino, leniter hac portione expurgato corpore, posttridie venam malleoli dextri incidi, sanguinem (revulsionis causa) ad uncias circiter quatuor extrahi, & postquam per diem unum aut alterum a venæ sectione quievisset, alteram dosim præscripti decocti, cui conf. hamech, ʒij. syrupi rosati solutivi compositi ʒj. admixta erant, propinavi. Brachium autem ut sequentibus oleis quotidie bis inungeretur jussi.

℞. Ol. lumbricorum, vulpini an ʒij. ol. Scorpionum ʒj. de vitellis ovorum, & amigd. lar. dulcium an. ʒiʒ. spicz ʒiʒ. misce. His usque nunc maximo cum fructu utitur oleis, dolor enim & intumefactio brachii remittunt, mamma in eodem statu persistit, tumor non accrescit, nec dolor adest, sequens tamen emplastrum applicat.

℞. Empl. diapomphol. ʒij. diapalm. ʒj. plumbi ulsi & loti, lapidis calaminaris an. ʒv. cum l. q. olei rosacei & succi geranii fiat l. a. unguentum.

Porro Clarissime Dn. D. Toxou, vix credas quam exitiosum in cancerosis ulceribus sit unguentum Ægyptiacum, ego expertus loquor, superiori enim anno 1606. ad matronam, hic in vicinia cancroso, necnon immenso ulcere in mamma dextra laborantem, vocatus fui, Chirurgus, qui curationem suscepit, ut foetorem istum castigaret, & carnem quæ in cancerosis ulceribus continuo excrevit, ablueret, de tertio in tertium diem aut etiam, alternis diebus, unguentum Ægyptiacum applicuit, inde ulcus in continenti adeo malignum factum est, ut intra breve temporis spatium mammæ ad costas usque eroderet, agræque extingueret, integram historiam suo loco quoque videbis. blande itaque hujusmodi ulcera sunt tractanda. *Guilhelmus Fabric. Hildanus Observat. Chirurg. Cent. 3.*

Matrona hic in vicinia, ex nobili familia oriunda, postquam quinquagesimum annum ætatis prætergressa esset, nec amplius utero gestaret, menses quinetiam subsisterent tuberculo ad papillam dextram corrupta fuit. Tuberculum hoc etiam ab initio durum, & aliquo modo nolitum esset attamen quia exiguum & indolens, neque ipsa ægra, neque adjacentes, h. e. de re usque adeo solliciti erant. Anno vero ineunte 1606. quum accresceret, & dolore capisset, chirurgus quidem in consilium accessit fuit. Is cum emollientia & pus moventia per mensem ferè integrum adhibuisset, paulatim acuto dolore, ruptum est tuberculum. Sed nihil præterquam aliquid saniei,

loturæ carnis instar, extillavit. Mox verò malignum, dolorificum, fetidumque ulcus sequutum est, ego 6. Julii ejusdem anni cum advocatus essem, matronam nunc supra modum extenuatam & debilem inveni. Ulcus quod foetidissimum, adeo erat malignum, ut totam mammam ad iterum & sub axillam, costasque ferè usque eroderet, idque spatio quatuor mensium, nimirum à principio Mensis martii (quo tempore ruptum fuerat tuberculum) usque ad mensem Julium perregerat. Dolor item maximus, inquietudines, febricula, continua nausea, & cibi fastidium aderant. Ex quibus omnibus, quum ipsam in evidentissimo mortis periculo versari cognovissem, manum adhibere recusavi, donumque reddi. Non diu post meum discessum animam Deo pie, placideque reddidit. *Guilhelmus Fabric. Hildanus Observat. Chirurg. Cent. 3.*

M. tionam Nobilem, consultissimam & Doctissimam Viri D. Joh. Moulteri J. U. Licentiatum, & illustr. Principis ac Domini D. Guilhelmi Juliac. Clivens. & Montensium &c. Ducis Consiliarii Uxorem Dusseldorpiæ circa annum 1583. cognovi, laboraverat illa per annos aliquot cancro non exulcerato in mamma, quum verò præstantissimum virum Dn. Cosmum Slotanum, meum præceptorem plurimum honorandum in consilium adhibuisset, certis quibusdam medicamentis, cum per os exhibitis, tum etiam exterius adnotis, merentem tumorem ita retardavit, ut ipsum absque dolore, & insigni incommodo per multos annos, & quidem ad finem usque vitæ suæ, patienter tulerit; neque unquam ad ulcerationem pervenerit. *Guilhelmus Fabric. Hildanus Observat. Chirurg. Cent. 3.*

Joannes ausder Esfi, Hildens in patria, quum in ultos annos tumore scirrhotico in sinistro cune laboraret, ad consilium vocavit barbitorem Dusseldorpiensem, qui nulla habita ratione, multis unctionibus & cataplasmatibus tumorem ad suppurationem provocare studebat. Hinc exorta inflammatione, & dolore acutissimo, novaculam tumori inaxit: sed nulla præterquam aliquid sanguinis adusti effluxit. Dolor in dies factus est vehementior, ita quidem, ut nullo modo sedari potuerit, ulcusque intra paucos dies totum cunem invaserit, h. e. in altum elevatis, invertis & callosis. Incredibile est, quo dolore ipse excruciatus fuerit. Ego illum aliquoties cum clarissimo Dn. Doct. Reinero Josuandro illustr. Princip. Clivæ, &c. Medico & Cosmo Slotano, ejusdem principis chirurgo præstantissimo invenimus. Quamvis autem nos summo studio in hoc incumbere, ut dolores aliquo modo lenirentur, frustra tamen omnia tentavimus. Tandem enim ipse in ea miseria & cruciatu decessit 17. Maii 1581.

Domini Polerius, civis Lausannensis, vir ingenio & virtute præstans, mihi que annos, tumore cancroso ad magnitudinem ovi gallinacci circum circa papillam sinistram, per multos annos vexatus est. Dusseldorpii ipsi aliquando Medici, ut tentaret tumorem paulatim emollire, & discutere emplastris de mucilaginis, de meliloto, & similibus: sed quantum ejusmodi medicamenta tumori ad-



movit statim exortus est dolor, & inflammatio, ita ut illi abstrahere, & frigidum aliquod medicamentum applicare, coactus fuerit. Sedato dolore, ac inflammatione, denuo applicuit emollientia; sed ut antequutus est dolor. Tandem, quum ipsemet experientia explorasset, hunc dolorem atque inflammationem ex horum emollientium usu manare, ab eis plane abstinuit, diuque postea superstes fuit. *Guilhelmus Fabric. Hildanus Observat. chirurg. Cent. 1.*

Anno 1600. Vetula Lausannensis cancro exulcerato ad concursum futurarum sagittalis, & Landoideæ laborans, in consilium me adhibuit, ulcus dolorificum, sordidum, foetidum, inæquale, labia verò dura, & ad pugni magnitudinem elevata erant. Preparato corpore, cum optima victus ratione, tum purgationibus & venæ sectione, præsentem Reverendo viro Dn. Joanne Rhetorio in schola Lausannensi linguæ sanctæ professore longe excellentissimo, Claudio Marione, Dav. Clerico, multisque aliis, abrais crinibus, totam istam exulceratam massam, & quicquid nobis malignit. te ista contaminatum videbatur, ad cranium usque excidi. Cranium. quin etiam, quia cariosum, post dies aliquos scalpbris abrais. Deim pulverem catagmaticum quotidie inspersi, vulnusque more aliorum vulnerum capitis, cicatrice obduxi, convaleuit, & multos annos supervixit, tandemque plane decrepita peste obiit.

Quidam prope Lausannam, cui membrum virile infungum cancrorum, ac plane monstruosum excreverat, necnon exulceratum fuerat, cum auxilium à me petisset, membrum virile, & quicquid ita infectum, in ipso ab domine incidi. Hic similiter convaleuit, & ad multos supervixit annos. *Guilhelmus Fabric. Hildanus Observat. Chirurg. cent. 3.*

*Verruca in summo Balani existens, tandem in Horrendum fungum cancro, am degeneravit ubi de abscissione membri virilis agitur.*

Pierre Perrod faber ferrarius ex pago Cresciacensi prope Lausannam, ætate quadragenarius, vitæ rusticus, temper. m. nto melancholicus, à teneris annis verruca in summitate glandis lentis magnitudinem vix excedente, laboravit. ex qua in calibatu, nonnisi aliqua collisione facta, dolorem non sentit. in matrimonio autem propter coarctationem, quæ ut à coitu, magnum & continuum cepit sentire dolorem, ita ut per tredecim annos à congressu uxoris abstineret. Successu verò temporis accrevit dolor, verruca in monstruosum cancrum, magnitudine infantis capiti recentem nati, nihil cedenti, degeneravit. Penis in carnis massam inæqualem, & lividam transformatus erat: factor tantus aderat, ut familiares & amici consortium ipsius terre nequiverint. Ulcera etiam non pauca, e quibus urina hinc inde effluebat, hunc fundum cancrorum circumambi- verunt. Morbo itaque indies in deterius vergente, tam empiricos quam rationales adhibuit medicos atque chirurgos, sed absque fructu. Ab his omnibus cum æger tandem pla-

ne pro desperato atque incurabile iudicatus esset, in maximo quietiam discrimine vitæ verteretur, & cuncti ad commiserationem commoverentur, ut sibi opem porrigere vellem, petiit. Reverendus itaque pietate simul & doctrina ornatissimus senex Dn. Petrus Pagenus, verbi divini minister fidelissimus, author fuit, quod factò prius prognostico coram amicis & adstantibus, curationem aggressus sim. Affectum autem cum diligenter examinatum, in extremo esse deprehendi. Cancer enim jam radices suas ad ipsius abdominis musculos usque fixerat. Quapropter extremum remedium, hoc est, ipsius membri abscissionem, potius tentare malui, quam hominem tanta calamitate fractum atque afflictum, in ejusmodi miseriis diutius derelinquere. Quod igitur ipsam curationem attinet, hoc modo processit. Primò instituta optima victus ratione, corpus sequenti potiuncula leviter purgavi. R. Herbarum lumaræ, scabiosæ, cuscute, ceterach. an. M. ß. sem. anisi ʒʒ. foliorum lenæ ʒij. nat decocti ut colatura redeat ad ʒij. in quibus dissolve confectionis Hamech ʒij. syrupi rosati solutivi compositi cum Rhabarbaro, agarico, & Sena, Aquæ cinamomi distillatæ absque vino ʒj. Misce, fiat potio, detur in crepusculo matutino.

Postero die venam brachii sinistri incidi, & uncias sex sanguinis extraxi. Deinde ad majorem humorum præparationem, & evacuationem sequens Apozema exhibui.

ʒ. Radicum cichorii cum toto. Radic. Lappati acuti, Petroselinii, Polypodii, Scrophulariæ majoris, corticum tamarici, & interiorum radicum frangulæ an. ʒj. herbarum agrimonie, veronice, scabiosæ, cuscute, Ceterach. Polytrichi, Gerani an. M. j. Trium florum cordialium, Geniste, & sambuci ana p. j. Liquiritiæ, & uvarum panular. ex cinatæ. an. ʒj. fiat decoctio in s. q. aquæ, ad consumptionem tertiæ partis in lb. j. & colatura inundantur & macerentur l. a. foliorum senæ mundat. ʒij. rad. elleborinæ, hoc est, saniculis fam. luchiæ, polypodii an. ʒj. agarici recentem trochiscati ʒij. rhabarbari optimi ʒij. hæc s. a. potio pro quatuor matutinis. Hæc expurgato corpore, & exonerata venæ, decima julii anno 1601. ægrum in sedem collocaui, & præsentem clarissimo & doctissimo viro Dn. Joanne Rhetorio, in schola Lausannensi Hebraicæ linguæ professore celeberrimo, Claudio Marione, pharmacopæo exercitissimo, Davide Clerico, aliisque multis qui etiam nunc vita fruuntur, membrum virile in ipso abdomine abscidi. Postea pulverem meum, ad sanguinem sistendum, itupis, albumine ovi madefactis, applicui; ac linteis reduplicatis & oxycrato inbutis, inguina & scrotum involvi, fasciisque colligavi. Quibus factis servos constitui, qui per vices manu madef. cu oxycrato, itupas cum pulvere continuo continerent, ne sanguis erumperet. Cauterium enim actuale hoc in casu summe periculosum erat, tum quod meatum urinarium obstruat, tum etiam vesicæ & circumjacentium partium inflammationem facile exciteret. Vulnus sic in hoc primo apparatu ligatum in alteram diem usque intactum reliqui. Tum primis diebus applicato digesti-



vo, ventre circumjacentibusque partibus vulneris ol. Rosarum & Myrtillorum inunctis; item applicato defen.ivo uno ventris, vulnus curavi more solito. sic Dei beneficio plenissime convaluit.

Pro urinx autem canali, hoc subsequens instrumentum ex Ambr. Parzo lib. 23. cap. 9. substitui, quo tam commodè statim post absolutam curationem utebatur, ut parum uno nihil vel oblitacui vel doloris inde sentiret. Vitæ etiam suæ munia feliciter, & firma sanitate ovisset, ita ut omnes, qui ipsam antea viderunt, admirarentur.

Porro quam nonnulli cancerum, in una parte excisum, in altera renasci existiment, notandum est hominem huncce per multos annos vixisse, & corpore ita validum iuvare, ut negotia rusticana, & opitium suum absque ullo impedimento exercebat, urinam quoque libere, & quidem sine titula illa, qua in principio usus fuerat, non solum redderet, verum etiam ipsam non secus ac si virginitatem & integram habuisset, longè expelleret. Retulit præterea mihi aliquoties, se sapissime ad venerem incitari. Obiit tandem circa finem anni 1611. dum ego in Belgio enim, qualis autem fuerit postremus illius morbus, lætæ me. *Guilhelmus Fabric. Hildanus Observat. Chirurg. cent. 3.*

*De Excisione tumoris cancerosi ad radicem dentium ocularium.*

Genere, virtute, doctrina, sed præcipue pietate Nobilis vir Dn. Wilhelmus Vom Scheidgenus Juris U. Doctor. & Serenissimi principis ac Domini Dn. Wilhelm, Jul. censuum, Cliventium & Montemium &c. Ducis consiliarius prudentissimus, & Satrapa in Solingen &c. a multis annis tuberculo ad radicem dentium ocularium huius lateris laboraverat, quod ex defluxionibus vehementibus ad dentes ortum suum traxerat. Tandem quum accrescere & dolere cœpisset, majora incommoda evitaret ex consilio Dn. D. Guleni Wieri, eiusdem Principis Medici celeberrimi, Colonia in ar. em vicinam, una cum clarissimo viro Dn. Joann. Cosmo Slotano, Medico Colonienii (Dn. Wierus enim propter occupationes gravissimas circa principem, curationi interesse non potuit) accersitus fuit. Anno 1593. ubi curationem sequenti modo instituit. Tuberculum autem magnitudinem juglandis adquebat prædurum, lividum, & inæquale erat, & partim gingivæ, partim quoque Labio adhaerebat; ita quoque ut exterius extuberantia quædam appareret. Dolor quoque pungitivus atque signa quæ cancerum comitari solent, aderant. Porro quia a multis annis catharris ad dentes obnoxius fuerat Nobilissimus æger, ne facia operatione, defluxiones negotiorum nobis lacesserent, constitutum fuit inter nos, ut ante operationem posset, præpararetur; qua propter in primis sequens apozema, ad humorem præcancrem incindendum, & præparandum, exhibuimus.

℞. Radic. cichorii cum toto m. j. Radicum petroselinæ, foeniculi ana ʒij. Polypodii q. ʒβ. corticem frangulæ ʒj. Cortic. Cappari &

Tamarisci an ʒj β. Herbar. Sclopendriæ, veronice, betonice, fumariz, scabiosæ, ana. m. β. flor. boraginis, bugiosæ, rosmariu betonice. Summitatum thymi & m. ior. ana. p. j. Seminis anisi, foeniculi an. ʒij. coriandri præparat. ʒj. Passulorum cornitharum ʒβ. decoquantur in q. aquæ & tertia parte vini ad consumptionem medietatis. Hujus Apozematis accipe ʒij. β. in quibus infundantur, & m. cerentur per noctem: rhabarberi electi ʒj. Agarici recenter trochiscati, & turbit. gum. con an. ʒij. solior. senæ mundato un. ʒj. Sem. anisi, & solior tartari, ana. ʒij. Maceant per noctem in infusione, in loco tepido, mane post levem ebullitionem fiat sortis expressio, cui adde Syrupi de polypodio ʒj. aquæ cinamomi ʒβ. misce, fiat potiuncula. Sic purgato corpore, per dies aliquot de præscripto apozemate bis in die, minimum tribus horis ante prandium, totidemque ante cenam, haustum bibit, tandemque j. n. jam præscriptam potiunculam reiteravimus, cucurbitulas quinetiam. Primo siccas, tandem cum scarificatione applicuimus: sic præparato, & evacuato corpore per vias manifestas, sudorem quoque per aures 14 diutinus, sequenti decocto.

℞. Ligni sassafras optimi ʒij. ligni Guajaci rad. sassa parila an. ʒj. cinamomi ʒβ. Trochiscantur in poculum itanneum aut terreum, & affunde aquæ claræ lb. iij. Claudatur quàm diligentissime velica madida primo, demum linteo, ne quid expiret. Tandem hac decoctio per horas sex aut octo in duplici vase. Non utem illico appetendum est poculum, sed expectandum, donec per se sit refrigeratum. Hujus decocti sumpsit ad uncias quatuor pro vice, & bis in die. Post sudorem corpus iterum expurgavimus sequenti purgatione.

℞. Rad. polypodii quercini, cortic. rad. frangulæ, Tamarisci, & capparorum an. ʒj. ceterach. fumariz, scolopend. an. p. i. nor. Bugiosæ, boraginis, violarum, an. p. β. seminis anisi, foeniculi, an. ʒβ. solior. senæ Alexand. select. ʒβ. Decoquantur in aqua fumariz & scabiosæ, ut colatura redeat ad ʒij. in quibus infundantur & maceantur l. a. Rhabarbari, Rad. mechoacæ, agarici trochiscati ana. ʒj. Zingiberis & sem. anisi an. ʒj. Maceant per noctem in infusione, in colatura fortiter facta dissolve. Electuarii rosarum Mellis ʒij. Syrupi de polypodio ʒj. Diacennæ Brasavoli ʒβ. Aquæ cinamomi ʒij. misce & detur in crepusculo matutino. Interim autem dum decocto sudorifico utebatur, frequenter os sequenti Gargarismate abluibat, idque ut enim huius, ut partes defluxionibus obnoxie ante operationem corroborarentur.

℞. Rosarum rubear. m. j. flor. malvæ hortensis, m. β. Cortic. granatorum. ʒij. Balsam. stor. Gallarum immatur. an. ʒj. flor. betonice scabiosæ, an. p. j. Radic. scrophulariz ʒj. β. decoquantur in lb. iij. vini rubri & lepuici, ad tertiam partis consumptionem. Colaturæ adde Mellis rosacei ʒij. Diamoronis, Mellis violacei an. ʒj. misce. fiat gargarisma.

Ex præscriptis herbis quoque minutissime incisis, Sacculos duos præparavi, quorum alter latus erat pollicem unum, longus duos aliter ejus



erat latitudinis. ut superius labium, nasum & genam coeperet. Sacculos istos vino rubro & iustico incocto, tepide applicare iussi & quidem continuo.

Satis preparato corpore, tam optimâ victûs ratione, quam præscriptis remediis, ægrum in sedem collocavi, capite parumper retrorsum versus nucham reclinato. Tum nuntium retro ægrum constitui, qui ambabus manibus non solum caput tenebat, verum etiam indicibus digitis superius labium in altum elevabat. Hoc factò, acui incurvatâ, filoque reduplicato apprehenso tumore, ipsum paululum attraxi, & cultello separatorio, ad ipsam mandibulam usque feliciter excidi.

Exciso tumore sequentem pulverem ad sanguinem sistendum, cum stupis albumine ovi madefactus imposui, & fasciâ ligavi.

℞. Farinæ volatilis ℥β. boni orientalis, terræ sigillatæ an. ℥iv. pulveris albuminum ovorum sole exsiccatorum ℥j. pilorum leporis minutissime incisorum ℥j. corallorum præparator. ℥ij. misce. fiat pulvis tenuissimus. Sequentibus diebus oleum de vitellis ovorum, cum paucis croci mixtum, filamentis vulnere imposui. Digesto satis vulnere, sequenti gargarismate os sapissime abluere iussi.

℞. Flor. betonicæ, rosarum, folior. alchymillæ, saniculæ, pyrolæ, scabiosæ, an. p. ij. coquantur in aq. ℥ij. ut colatura redeat ad ℥bi β. in quâ dissolve mellis rosati colati ℥iij. misce fiat gargarisma. Circa finem curationis sequentem pulverem vulnere inspersi, & laminam plumbi tenuissimam applicui.

℞. Lutiæ præparatæ, pulveris grammæ, aluminis ulii, an. ℥j. misce. Hisce remediis sanitati restitutus, & ex evidentissimo periculo liberatus fuit, ita ut ad annum 1611. supervixerit. Quo anno circa finem Rattings pie & placide obdormivit, & pro calamitosâ hacce vita beatorum sedem sibi elegit, cum annum septuagesimum præegressus esset.

Cæterum dum circa vulnus occupatus essem in universalibus nihil prætermisum fuit, quotiescumque enim alvus astricta erat, clysteres injecimus, cucurbitulas quinetiam cum levi scarificatione applicuimus; singulis quoque diebus paulò ante prandium, ad nucis juglandis magnitudinem de sequenti electuario sumpsit.

℞. Conserv. flor. betonicæ, salviæ, rosmarini, & flor. scabiosæ, an. ℥j. specierum dianthos, aromatici rosati, & de gemmis frigid. an. ℥ij. misce. & cum syrupo conservæ corticum citræ f. electuarium.

Post pastum aut mivâ cydoniorum, aut semine anisi, & fœniculi condito utebatur. Cucupham præterea ex sequentibus pulveribus præparavimus, quâ per annos aliquot usus fuit.

℞. Florum betonicæ, rosmarini, stæchados, rosarum rubrar. an. m. j. summitat. majoranæ m. β. sem. coriandri præp. ℥ij. ligni aloës ℥j. masticis, thuris ana ℥i β. specier. diamolchi dulcis ℥iv. nucis moschatæ ℥i β. caryophyllorum ℥i β. granorum kermes ℥ij. misceantur & contundantur grosso modo pro cucupha, sequens quoque vinum medicatum præscripsimus, de quo per intervalla paulò an-

te prandium haustum bibebat.

℞. Flor. rosmarini, betonicæ, lil. convallium, primulæ veris an. m. ij. summitat. thymi, majoranæ, flor. stæchados, borag. bugiosæ, an. m. j. radic. iridis florent. ℥j. galangæ ℥ij. ligni aloës ℥ij. cinnamoni, nucis moschatæ an. ℥vj. radic. caryophyllatæ ℥ij. liquiritiæ ℥iv. incidantur omnia grosso modo, propicianturque in dolium, pro mensuris 12. aut 13. vini optimi & depurati. Pro corroboratione gingivarum seq. dentifricio usus est.

℞. Corallor. præpar. rosarum rubeat. an. ℥j. thuris, cornu cervi ulii & præpar. cancerorum præp. ana ℥ij. sanguinis draconis b. lautiorum ana ℥j. margaritar. præp. ossis sepiæ an. ℥i β. rad. iridis florent. ℥i β. aluminis ulii ℥j. misceantur, hâque omnium pulvis subtilissimus.

Ignosce, quæso, candide lector, si forsitan nimis prolixus fuerim. Fecit id magnitudo morbi: magnitudo inquam. Gingivarum enim & labiorum canceri, nisi universalia rite & ex arte adhibita fuerint, incurabiles, ut plurimum esse solent. Hæc quia empirici, & circumforanei, in excisione canceri labiorum non observant, mirum non est, si ut plurimum malum recrudescat, & in peius evadat. Qui itaque operationes hujusmodi cum laude & utilitate ægri perficere cupit, videat primò, ut corpus ægri ante operationem diligenter sit præparatum, ubi præsens observatio, tyronibus veluti exemplar, & idcirco inservire poterit: deinde diligentiam adhibeat, ut malum cum suis radicibus & in parte sana extirpetur, quandoquidem minimâ remanente portione mali, frustranea erit operatio, ut alibi fufius demonstravimus. *Guilielmus Fabricius Hildanus Observat. Chirurg. Cent. 5.*

#### *De excisione tumoris cancerosi, in malâ existentis.*

Anno 1594. Coloniz Agrippinæ Viduam Magilt. Henrici Sartoris, ad portam leporinam habitantem curandam habui. Laboraverit illa per multos annos tuberculo canceroso in malâ dextrâ, quod magnitudinem nucis avellane haud excedebat. Durum erat, lividum & inæquale, exterius tamen nihil apparebat. Præparato satis corpore, tam victûs ratione, quam reiteratis purgationibus, & venæ-sectione, ægrum in sedem collocavi: deinde nuntios duos retro constitui, quorum alter caput tenebat, alter indicibus digitis in os immisis, & ambobus pollicibus e regione tuberculi politis, malam invertibat. Sic satis in conspectum veniente tuberculo; illoque acui incurvatâ ac filo apprehenso, cultello separatorio, excidi. Postea eodem modo, uti in præcedente observatione dictum fuit, processu, curationemque feliciter absolvi.

Binas hæc observationes in cum finem scripsi, ut junioribus Chirurgis animum adderem, ut in cancerosis tumoribus in ore existentibus, facili desperent, & ab officio desistant, dummodo ipsos apprehendere, & radicitus extirpare possint. *Guilielm. Fabric. Hildanus Observat. Chirurg. cent. 5.*



*Tumores duri, rebelles, canceri formes.*

Occasione tumorum dictorum memoriam subit aliud genus horum, quod insidias sanitati, & vita itruit, & caute tractari desiderat, quorum aliquot dabimus exempla. Puella 15. annorum cui menses nondum fluxerant, sub pondere majori collapsa, ad basin scapulæ dextræ tumore corripitur duro, renitente, luto, & profundo, citra dolorem ullum, non tamen citra molestiam in movendo brachio. Tractata aliquandiu a Chirurgo solo, successu sanitatis nullo: quin in dies malum adaugeri observabatur. Consultu ex methodi legibus alterando & purgando correximus humorem peccantem melancholicum, vel atrabilarium potius; exterius vero, noscentes mali naturam, sola defensiva topica ex empl. diaphoret. diapomphol. aliisque saturninis concessimus; prognosi facta, si neglectam tractaturi essent malum ipsum; causa vero avertenda subinde per purgantia, diaphoretica, & sanguinem defecantia, operam daturi, tolerabimus in futurum, contrarium vero casu, quo majori studio eradicationi incumberent, eo citius malum exasperatum iri. Annuntur enim aut revera sunt hi ipsi canceri occulti quos non curare, puta externis illis alias in curatione tumorum veri consuevit; melius est; curati enim quoad hunc primum, & intentionem citius intereunt acri, morbo exasperato, & vitalibus principiis infesto, non curati vero longius vitam trahunt teste Coo 6. aphor. 38.

Neglecto hoc, ut fit, salubri monito, circumforaneum consuevit, qui pacta mercede ferro aperit tumorem, eoque licet magis, magisque exurgente post aliquot hebdomades turpet, ut fit, ulcedit, alibi imiles structuras fraudes. Inde ad caruncem curandi delertur, provinci, ubi cum etiam eructata, exarescente corpore aliquo, domum ferenda in via moritur. Nil supererat, quam ut incantamentis apertius acceptum terrent malum, quod post obitum factum tamen. Donum enim illato, mense Maio, cadavere, sonos & sibilos adstantes percipiunt in tumore, ultra dimidium dorli occupantes occurrunt, & angues ubi latere suspicientes rogant, ut tumorem inspicerent. Factâ dissectione, & hor plurimus, putredinem jam subiens, conjunctâ fermentatione sensibili, sibilorum causâ patuit, partibus carnosissimis nunc de tono suo dejectis.

Vir primarius fracto pede sinistro paulò supra talum, alias hypochondriacus & scorbuticus eminenti gradu, paulò maturius, jubente officio amico a curatione solitis occupatur negotio. Succedente tempore supra locum olim affectum sentit tuberculum non tam profusum ob auditum ibi magis os tibie, quam eminens & non adeò molle. Eadem serè luditur fabula. Adhibitis topicis, datis internis, nil proficitur, leviori interim viso malo, quam ut produceretur curatio; verbo aperitur tandem tumor suadente id extraneo medico, nil nisi sanguis effluit; inde vero labia vulneris sensim dilatantur, protuberat materia velut fungosa, frustra quibusvis adhibitis. Tumor serpit ulterius, & cum omnino statum subit, quem describit

*Lamæverde prompinar. Chir. Obs. 16.* Reliquum corpus intermi hecticum subit itatu n, cum pulsu ordinario frequenti, donec consumptis viribus placide obdormiret.

Sectione examinatus pes post mortem obtulit fracturam nonnisi laxius coherentem, imò ceu scaturiginem omnis hujus mali, callo omni absumpto. Mechanicus propè femur dextrum consimili tumore corripitur, qualem superius descripsimus. Post apertionem improvidam, reliquis licet nihil juvantibus, nil nisi merum sanguinem stillat, & imminui & consolidari renuit, donec ad ipsum abdomen facto progressu vehit sphacelo afficeret consuetudine interstina, summo cum fetore, & consumptum totum corpus reliquum fatis tandem cederet.

Alius in sinistro thorace tumore ejusdem commatis, sed dolorifico affectus, eandem subiit fortunam, nisi quod post mensem integrum consolidationem admiserit ulcus à vulnere, per apertionem facto, merum itidem stillante sanguinem. *Georg. Wolff. Wedel.*

*Carcinoma femoris.*

Ida, famula Regneri Neckii, amici nostri, percussa vehementius, sensit ex inopinato illo terrore, nescio quem sibi oriri dolorem circa genum; cum tumore tenoris, in dies usque eo invalescente, ut post annum septimum videretur, pluriam medicorum calculis, si non excedere, saltem suo pondere, accedere quæ proximè ad illam strumam, quam ibidem loci olim vidit Antonius Benivenius, ponderantem sexaginta libras observ. 14.

Quam molem hæc virgo septem annis antea tulit tam animosè, ut nemo domesticorum, nedum quisquam extra familiam, animadvertit unquam, quicquam vitii, in ipsius incessu. Verum erosa paulatim, summâ tumoris cute, intumescens ipsius venis; interescens magis pruritu, & carne magis livescens; nequit ipsa malum suum diutius clam habere, sed coacta id detegere, imploravit tandem pudibunda ac merens opem medicam.

Expetens obuiæ, tumorem hunc scalpello sibi amputari. Qui tamen pervenerat jam tum eo incrementi, ac malignitatis, ut nemo id auderet. Quocirca, licet invisissima, circumferebat tamen quocumque locorum insensibilissimum hunc hostem, incedens interea temporis per amphissenam nostram urbem non minus expedire, ac si femori nihil omnino ponderis inhæssisset. Conspescens interim mangium hocce carcinoma, ultra annum septimum decimum, solo plumbi unguento. Cujus litu, nihil simili tumori utilius.

Dissecus utem post obitum hic tumor ac bilanci impositus, ponderabat tantummodo præter omnem opinionem, ob fungosam suam substantiam, libras sexdecim; foris quidem glaber & æqualis, sed intus steatomate, gypseâ pituitâ, induratis calculis, dilatatis venis, ac sinuosis serobiculis, vera levitatis causa, impendio nimis repletus. Latitans extrinsecus sub extimo senioris musculo.

Aliquot annis post oblata nobis fuit, ibidem loci in alia quâdam virgine, longè major excre-



excreſcentia, adæquans ambitu ſequiulnz longitudinem, exorta, partim ex fiſſo ob graviorem h. p. l. i. u. m, ſemoris oſſe, partim vero ex venis, & arteriis uſque adeo dilatatis, ut tumorem prius commemoratum ludum ac jocum dixiſſes, præut huius fuerit circumferentia. *Nico. Tulpii Obſerv. Medic. lib. 3.*

Senem ſalodienſem, octoginta quatuor annorum, laborantem cancro exulcerato in labro inferiori oris, magnitudine medii ovi gallinacei, curavi; quem licet prænonuiſſem, morbum fore inſanabilem, amiſit tamen, imò rogavit, ut ipſum ſecarem. Præmiſſa itaque totius corporis purgatione, hunc novacula uidente radice uſuſ reſecui, ſanguine cum impetu erumpente quem ad decem circiter uncias datâ opera eſuſum, abſque ulla poſtmodum inuſſione, verum goſſypio tantummodo uſto, pulveribusque aduſtingentibus firmavi. Digerentibus vero prius medicamenti aliquot dies uſus, ex ipſo vulnere optimum pus emanavit indicio, totam ſubſtantiã cancri eſſe ſublatã, atque unguento poſtmodum ex ceruſa camphorato, ducto in plumbeo mortario, ſpatio viginti dierum cicatricem induxi, incoluni ægro tres annos abſque ullâ moleſtiã: à quibus novus cancer ſubortus in faucibus, ex quo brevi ſpatio temporis obiit, præter meam omnem opinionem qui exiſtimabam ex ætate humiorem melancholicum adultum iterum ſuccreſcere non poſſe, novi cancri in alio loco cauſam; prout ſere ſemper contingere ſolet omnium authorum ſententiã, quod ſcilicet cancer in aliqua parte avuſſus, in altera progreſſu temporis tuboriatuſ; firmabatque meam opinionem, quod in praxi viderim mulierem ſeptuaginta annorum, ſamulam Collegii Divæ Catharinæ, cancro exulcerato naſi laborantem, cui præcripiſi idem unguentum ex ceruſa, potius ad dolorem ſedandum, quã curatiõis cauſã, quæ tamen præter ſpem menſis ſpatio nullo alio remedio adhibito, fuit perfectiſſimè ſanata, vixitque multos annos eadem firma valetudine; quod cenſui contingiſſe ratione ætatis, prout in ſene illo futurum rationi conſentaneum erat. Et quamvis hæc curatio non ſolum à me ſit in uſum revocata, ſed à plerique, ut dixi, autoribus, quia tamen raro contingit, caneros exulceratos omnino ſanari, nec amplius ſuboleſcere, ut in ſemina illa, idè hanc obſervationem alii adſcribendam cenſui, quamvis in ſene illo cancer in faucibus triennio poſt repullularit, quod forte non continget, ſi quolibet ſexto menſe remedia adhibita fuiſſent, humorem melancholicum ſpectantia, eundemque expurgantia. *Petrus de Marchett. in Obſerv. Chirurg.*

Alium quoque quadraginta annorum circiter in Noſocomio Sancti Franciſci Bataviæ laborantem cancro exulcerato labii inferioris, magnitudine ovipalumbi eodem modo quo ſuperius ſanavi, à principio tamen præſcripta vere & autumnò purgatione humoris melancholici, atque ejuſdem alteratione refrigerantibus, & humectantibus; quanquam idem quatuor poſt annos in eodem Noſodochio ex febre maligna obierit, cancro tamen in nullâ alia parte corporis ſuborto; ut propterea aliquando non ſit omninò abjicienda ſpes ſanationis iſtorum morborum: dicti ſiquidem patientes

medicorum præceptis ſi obtemperaveſſent, forſitan non obuiſſent. *Petrus de Marchett. in Obſervat. Chirurg.*

*Fungus cancroſus in interiori matricis colli parte.*

Honeſta quædam Vidua hic Hagæ habitans, quadraginta circiter annos habens, temperamentique calidi, ac ſicci, nec non atræ, (quam jam olim dixere) infeſtata bile, de tumore quodam extra corpus propendente mihi queſta eſt, quem non parum incommodi ſibi adlerre, quoque velut ſtimulis aſſiduè ſe pungi dixit, ſextore inſuper ingenti illum abundare, ac inſtantibus catameniiſ, extendi, amplioremque multo fieri aſſeruit.

Quamobrem non parum ſollicita meam imploravit opem. Ipſe autem ſuaſi, uti, præparato, prout deceret, corpore, quicquid hoc eſſet humoris (malignum namque perſpexeram) Manuali Chirurgi opera tolli juberet. Cum itaque (neque enim alium mali finem videbat) conſentiret, rem cum fratre *Joanne Stalpario vander Wiel*, nec non cum tunc quidem Chirurgo, nunc autem & Medico *Cornelio Solingio* communicavi, perpendique. Tumorem itaque hunc exacte perſpectum fungum, ſive colli matricis excreſcentiam cancroſam, eſſe comperiimus, anteriori quidem parte l. tiorem; poſteriori vero anguſtiorẽ. Statuimus idcirco baſin huius excreſcentiæ, ſi contingere daretur, valido cingere filo, ac quotidie paulo ætius vincire, ut, ſiquidem heri poſſet, tumor à ſanã parte ſepararetur. Rem it. que aggreſſi duplici fili circuitu anteriorem, craſſioremque excreſcentiæ cinnimus partem; Chirurgus autem, quod utramque manum, eodem tempore vagina non admitteret, digitis ſentire eo uſque promovit filum, ut baſin attigſſe crederet. Tum vero ob vir anguſtias præpediebatur vinculum contrahendi facultas. id tamen ut perficeretur, nihil comultius duximus, quã ſi utramque fili extremitatem craſſiori, humiori que alligaremus ſpecillo, ut hoc contorto, illud contraheretur, coarctaretque excreſcentiam; hoc autem ita ſucceſſit, ut illa intra quatuor, vel quinque dies alimento deſtituta protinus decideret. *Cornel. Stalpari. Obſervat. rarior. Cent. 1.*

*Cancer in urinario ſamina meatu.*

Anno 1672. cum Chirurgo *Cornelio Solingio* vocatus fui ad mulierem hic Hagæ commorantem, quæ urinas excernere nequens de maximo pudendorum dolore conqueretur. Nobis autem, ut obſtructi lotii inveniremus cauſam, cathetere utendum fuit, cuius ope ſatis commode urinam depropiſimus: ac tum quidẽm cancroſum in urethra ulcus latere comperiimus, quo illa pene tota exefa erat. Illa autem nunquam niſi dicti instrumenti adjuvento lotium egerere valuit, ac non multo poſt miſera admodum vita exceſſit. *Cornel. Stalpari. Obſervat. rarior. Cent. 1.*



*Cancer Ossis.*

Cornelius Celsus lib. 8. cap. 10. asserit fracturæ ossium, præter inflammationem, ac distentionem nervorum interdum quoque cancerum intervenire. Ecquid verò per cancerum ibidem loci intelligitur, varix variorum sunt conjecturæ, neque minores sententiarum conflictus. Verisimile tamen non est, verum hic designari cancerum, nedum sphacelum perpetram excogitatum, at si quis conjecturæ locus, videtur hæc vox adumbrare callosum illud tumoris genus, quod plenique sequitur calamitosus ossium fractus, vel immedicabilem illam eorundem molitiam, quam imprimit ossi acida pituita, solidam ipsius substantiam plane corrumpens. Cujus perniciosissimi tumoris natura, quantumvis haud parum discrepet a genuino cancro, in eo tamen cum ipso convenit, quod uterque nullis cedat remediis, conspiretque perinde in perniciem egrorum.

Vicentius Balthus, Vir infirmæ ætatis, vixit aliquandiu miserandum in modum, ob humeri os, intra annos 15. quater extractum, quod paulatim increfcens, sive ex viscido conculsi ossis succo, sive sanguine eò uberius affluente in eandem devenit molem, ut ne pectus, nec scapula immodicum ipsius pondus fuerit amplius ferendo, excitatis, non solum maximis nervorum doloribus, verum etiam summa spiritus difficultate, ob luxurians pondus, thoracis motum continenter impediens, cum indefatigabili vigilia. Quibus e salebris quo evaderet, usus fuit consilio variorum Chirurgorum, quorum alii tumorem emollire, atque in pus convertere; alii contra luxuriam ipsius arctiore fasciâ coercere; ac nonnulli vitiatum os serrula præcidere adnixi fuere.

Sed omnes succe in infelici. Venæ enim ac arteriæ hujus tumoris atiores erant, quam ut pollice humano potuerint obturari. ac proinde magis impedimento, quam auxilio tuere fecit. Mortemque adeo non distulisset, quam maturaret expectatio in provincie instituta.

Facto autem vivendi huc, docuit an tunc, omnia, sub cute, visci crassitiem, ac steatomatis indurisse naturam, parumque discrepasse à materia veri canceri, cujus nomen fortassis propterea, huic ossis vicio, haud male impositum ab indutrio hoc auctore. Ipsa vero ossa erant non modo, a se invicem sejugata, verum quasi in alio mutati in confecta, ac præ irriguo madore adeo tenera, flaccida, ac mollia: ut instar ceræ scalpello facillime conciderentur.

Quam eandem alienationem ossibus utique imprimit acida, ac in aliqua quædam pituita, per habitum corporis effusa, quam interdum quinquaginta vidimus occupasse loca, ac depascere tantum non solida ossa; verum etiam carnem, membranas, nervos, ligamenta, aut quicquid illi obvium. Parum interim, aut nihil proficiantibus remediis, quibus infensissimum hunc hostem satagimus domare, sive sponte ex latebris suis prodeuntem, sive à variolis in arenam hanc productum. *Vide Fabrii Hildani Censur. 4. Observ. 69. Nicol. Tulp. Ob. lib. 4.*

*Cancer contagium.*

In artibus (inquit seneca) magis utilia, quam subtilia querenda, cujus effati rationem utinam haberent illi quibus epulis jucundius, quidvis in controversiam trahere, ignari, multum altercando veritatem amitti, saltem magis inumbrari, quam illustrari. Quantum enim in providis juvenum sentibus imponit verborum venocinum, tantum nautæ movet exercitatus. propositis duntaxat, quæ neque studenti proluant, neque ignorantibus nocent, e quorum numero qui exenient, acriter disputantes. Utrum cancer ulceratus sit eminus contagiosus. o Medicos vere umbratiles! ecquid enim venimilius quam tenue, ac fervidum, urentis canceri virus, contagium suum non magis prope, quam longinque dispergere? Quis exhalationi ipsius linum præstituit? Quis cancellos posuit, intra quos permaneret coercitus, volatilis ille spiritus? Adriani Lambertæ, provecæ ætatis, post devoratum aliquot annorum molestant, ulceratum mamma carcinoma, ad eum pervenit putredinis gradum; ut halitu suo inhaeret tunniculam, continenter operam ipsi navantem, & quidem eo majore labe, quo diutius suppetias tulerit, ac familiarius cum illa vixerit; e quibus conceptæ perniciæ scintillis tandem exortum ingens incendium: quod ipsam non minus quam Dominam suam pessumdedit. Insidente utriusque pectori, ac alis, tam fædo, ac inæquali ulcere, ut aliquandiu animi penderem, ultra illarum graviore excarnificaretur scævita.

Quid quod mihi ipsi, solus scetentis hujusmodi carcinomatis intuitus, præter insignem cordis defectum, aliquando guttur usque eò exulceraverit, ut non mercurio præcipitato tantum, verum etiam fornice quotidie opus fuerit, ad auferendas crustas à depescente veneno in faucibus excitatas, in quibus vel cæco appareret ulceratum cancerum non solum comminus, verum etiam eminus contagium suum disseminare, ac proinde satius eie, idem habere experimentis indubitatis; quam incautæ juventuti illudere, trivolis arguens, atque excogitatis captiunculis, ne dicam subtiliter disserendo aditum intercludere, quominus perspicax mentis acies dirigatur ad melioris usu abunde comprobata. *Nicol. Tulp. Observat. Medicar. lib. 4.*

*Anatomica Inspectiones.*

Mulieri viduæ in mammilla sinistra tumor sensim excrefcens prodit durus, quem alii scirrhum, alii cancerum esse indicabant, qui cum diu durasset, tandem in abscessum conversus & suppuratus in ulcus abiens sanatus est, relicta cicatrice admodum inæquali, labiisque duris &c.

Hæc tandem plurimus morbis labefactata è vivis excessit &c. mamma sinistra quæ scirrhus laborarat, circa radicem scirrhosa, ut & circa papillæ radicem scirrhus erat; candidus, glandulam representans. In costis vena lata nigricans latebat. *Plateri Observation. libro secundo pag. 503.*

Nob. Matr. in sinistra mammilla laesa est; verum quia parum, aut nihil inde doloris sensit,



tanquam levius vulnus neglexit. Subsequentibus inde diebus loco affecto tumor quidam indolens fere succrevit, qui tamen citra negotium Chirurghi indultus sublatu est, eratque succentumpe temporis complures pulsulae sunt, quae in ulcera tandem ternuuntur: sollicita Matrona de cancri successione Medico, sed Paracelsico se concredidit, qui deleterius pharmacis potionatam necavit. Mammas mortuae crucis in modum divisi, quarum caro dura admodum nigrescens, sed non omnis putrida conspiciebatur. In utero dissecto materiam albam, lapidefactam, adeoque durissimam, ut vix cultro discendere licuerit, invenimus. *Ex clar. D. D. Georgii Garveri observationibus.*

Infanticida femina sextâ à partu septimanâ capite patratum scelus expiat. Sinistram mammam ex lacte coagulato apostema occupavit, quod ipsa natura exiguo facto foramine cepit expurgare. Glandulis ad pectoralem musculum usque remotis inter has & musculum dictum magna puris copia sinum efformavit, illâso musculo. *Tb. Bartholinus cent. 1. histor. 92.*

#### *Ulcus & cancer colli matricis.*

Quaedam matrona cum bimestri spatio mensium suppressione laborasset, tandem exortus est dolor & inflammatio partium genitalium. Morbo propter verecundiam neglecto, abscessus & ulcus in collo matricis secutum est. Adhibito matricis speculo, ulcus callosum foetidum, inaequale lividumque & ut brevi dicam cancriforme inventum est. Postea auctus dolor, aucta febris, inflammatio, Vigilia, cibi fastidium, & syncope & paucos post dies è vita discessit.

Cadavere dissectio, totum uteri collum planè cancriforme & exulceratum erat. Menstrua ex sanguine nimis crasso saepe supprimuntur, forte fortuna sanguis depluendus in colli vasculis substitit, praesertim in substantia ejus glandulosa; eundem hoc malum aliquando invadit mammas, glandulas salivales, aliasque partes glandulosas, interim ibi, corrupto sanguine, inflammatio, cancer, & ulcus factum. Cancer nihil aliud est quàm glandularum sphacelus, cujus scilicet vicinas partes non raro quoque depopulatur. *Stephan. Blancard. Anatom. pract. ration.*

#### *A gula carcinomate mors.*

Cuidam succrevit humilis ac latus tumor, insidens firmiter lateri tracheae paulo supra jugulum. Hinc respiratio & deglutitio impediuntur, ita ut ne gutta liquoris pertransire poterat, tandem emaciato corpore morti succubuit.

Denudata post obitum cute, ad instar carcinomatis, colore plumbeo, & radicibus undique diffusus tumor, praesertim circa gulam, intus adeo concreverat, ut vix aciculae majoris glandem admitteret.

Laboravit cancro glandulae alicujus ad tracheae latus communiter residentis: saepe glandulae immensum usque excreverunt, quae partes vicinas premunt ut hic, si enim trachea & oesophagus liberum habuissent aeris transitum, nec deglutitio, nec respiratio laesa fuissent; cancer gangraena est alicujus glandulae. *Stephan. Blancard. in anatom. pract. ration.*

Vix annis 22, horribili cancro in genâ seden-

te infamabatur, vorante eo pro more serali, ut tandem pomum aurantium mediocre sua cavitate monitrose hiantè laudè zgre caperet; erat ei alioquin status corporis commodus, ut male habentis partis principis labes post multum examen argui a me vix potuerit. Hujus affectus incurabilis cura frustra sperata chirurgi data fuit. Cancrum autem ex Hippocratis citato sacro melius est non curare, quam curare, curari enim, ut inquit, citius intereunt, id noverat Poeta inquitens.

*Curando fieri quaedam peiora videmus.*

*Ulcerâ, quâ melius non tetigisse fuit.*

Post mensis circiter unius conatus studiosos & pro re nata prudenter audaces, repentina morte zger, abique ulla incitante causa perit. Subitum reitumescere monstrum Chirurgum sollicitè movit, ut corpus secandum peteret, sic ut sensuum judicio pateret causa tamen insolens casus miserrimi, ut id obtinuit, me rei curiosè impatienter avidum officiose ad spectaculum rogavit. Apparuit statim cadaver parvis punctis, quae pulicum morsus imitarentur, rubris quibusdam, aliis lividis, multis subnigris, ubique pictum; & dum ad sectionem omnia studiosè disponuntur, animadverti sensibilibus se explicare eas, novorumque nec non simulium productione augeri: rei insolentia stupore aliquo commovit mirantem animum, sed cum tacite nec cum ipso dubius discuterem, notavi maculas eas in vesicas surgere separata ab adhaerentibus cute, ut quaedam nuces avellanas, aliae noces juglandes, aequarent, aliae vero ovis gallinaeae magnitudine omnino non cederent, servato semper eodem colore, sed simul cum omnia curiosè lustrarem, ulcus intuens vidi id fervente spuma repleti, & propius admotus audivi insuper iratum in eo murmur, atque sibilum non tacitum, utpote qui ab omnibus in hypocausto percipi facile potuit. Asperi Chirurgum, ut ille me, utrique plus stuporis quàm discursus erat, id ipsum imitatione fecit adstantium turba; mullitare dein dubie omnes, timere tacitè, seseque cubito & pede modelle monere, aliisque tum oculorum, tum capitis, vel pro genio aliarum partium, gestibus invicem imperio loqui. Ego interim furtim abrepto pallio me secretè huic comœdiae, ut suspicabar, non fida, subtraxi; cum illi loco imperantem Tribunal Plebis pie & ex officio monui, ut quàm diligentissime cadaver suspectum terræ daretur, idque loco quod fieri posset remoto, altoque sepulcro perderetur, ne suspecti virus effluviu aere omnia ambiente imbibitum, & passim ab hominibus respiratione miserè haustum, contagione, nec non deinde horribili propagatione l. te omnia contaminaret; insuper variis suffimentis, & aliis alexipharmacis illi domui prospexi. Sed ubi per cato animo rem licuit otiose ruinare, didici. Chirurgum, ut nulli perniciam vi superiore frangeret, ulcus irrigasse liquoribus urentibus, qui conspueratis carnes edeterent, & intinuis adhaerentem malignitatis characterem, cum ferro secanti non parceret, ustione expungerent, eos autem à copiosis venulis erosione libi utib. hibitos, universae massae sanguineae circulationis lege d. tos fuisse: inde tantâ effervescenti phreneticè ten. pest. t. de repente exortari, quam ferre delicatè cor citra momentaneam perniciem nequiverit, perditis nempe



nonpe spiritibus beneficiis & modestis, suppressaque barbare ebullitione religiosa vitalis ignis parente, quæ cum perenni similis materis fabricatione & effluvio sollicitè alit & fovet, ut vorax ignis parvum, exempli gratia, candelæ sibi vicinum absorbet & perdit; inde volatilitatione nimia tenuis & volubilis sanguis venis locale se extricans, primo cutem triplici colore tædavit, postmodum, ut sensu aliqua quantitate fuit conglomeratus, eam in altum cõggit: hinc pariter ex prurienti fervore in caneroso ulcere, nata spuma, natusque sibilus. *Ex commun. Dom. Norret Archiatr. Frising. apud Helvet.*

## CANIS RABIDI

## MORSVS

Vid.

## VENENA.

## CANTARIDVM VENENVM.

Vid.

## VENENA.

## CANITIES

Vid.

## PILORVM MORBI.

## CAPILLI.

Vid.

## PILI.

## CAPILLITIVM

Vid.

## TRICHIASIS.

## CAPITIS DOLOR.

Vid.

## DOLOR CAPITIS.

## CAPITIS HYDROPS

Vid.

## HYDROCEPHALVS.

CARBUNCULUS, seu,  
ANTRAX.

**C**arbunculus seu Carbo ita dictus, quia extinctum carbonem refert, vel, (ut alii volunt) quia illius color in ambitu instar Carbunculi Lapidis obscuro rubore splendet, Nominatur etiam Anthrax ab *ἀσπράς* in Carbonem mutuo, quia occurrit affecta pars extincta quasi & in Carbonem mutata; hinc Arabibus Ignis persicus & Pruna nuncupatur, quia non male refert exultionem cum pruna ignita factam; vel ut mavult Galenus, quia vicinæ partes vehementer inflammantur, & quasi uruntur.

Nonnulli inter Anthracem, Carbunculum, & Ignem Persicum aliquam statuunt differen-

tiam, cum tamen re ipsa nihil differant neque Veteribus ullum discrimen fuerit cognitum: & Avicenna in curatione ignis Persici eadem prescribit medicamenta, quæ Galenus in carbunculi curatione commendat. Verum nulli alia hic obtinet differentia, quam quod modo major, modo minor, quandoque magis, quandoque minus malignus sit Carbunculus.

In cognitione autem Carbunculi graviter hallucinatum est inter Medicos. Galenus namque ulcerum ordinem Anthracem annumerans in *commun. ad Hipp. Aphor. 43. Sect. 6.* ait Anthrax est ulcus crustolum, cui *conjuguntur multi partium circumstantiam feror.* & alibi: Carbunculus est ulcus crustum cito cum valida Plegmone circumstantium partium arum inducens. Hunc Galeni definitionem sequitur Paulus Aegineta *lib. 4. cap. 25.* Cui perique posteriores Medici subscripserunt. Verum enimvero si Carbunculi essentiam curiosius indagemus, observabimus has definitiones ipsi non satis proprie accommodari. Etenim Carbunculus non est partis alicujus exulceratio, sed potius ejusdem Necrosis seu Nderatio a particulis acri-salinis lixivialibus inducta. Est igitur Carbunculus partis alicujus gangrena, dum in fieri est; vel ejusdem Sphacelus, dum in facio est, quorum neutrum ulceribus annumerari potest. Sphacelum esse, & non ulcus, inde liquet, quia nulla naturæ vi edomari, & in us converti potest Carbunculus, quod posset, si ulcus esset; sed integer a vicinis partibus separatur.

Præterea in causis Carbunculi adhuc gravius erratum est. Galenus *lib. de Tumor. pr. nat.* dicit, Carbunculos excitari, cum sanguis tanquam fervens & inflammationi propinquus cutem exurit. Haud secus Aquapendens *Oper. Chirurg. part. 2. lib. 1. cap. 27.* scribit, Carbunculum fieri a fluxione ferventissimi sanguinis ad partem. Paulus Aegineta *lib. 4. cap. 17.* & Mercurialis de Peste *cap. 18* putant, illum causari à crassi & adusti humoribus. Actuarius *Mein. med. lib. 2. cap. 12.* credit eum oriri à sanguine Melancholico fervente. Fernellius *crassum torridumque sanguinem.* Forcellus sanguinem corruptum, servidum cum succo melancholico vel atrabile; Carbunculi causam statuunt. Sed à veritate longissime aberrant, & illi, & quotquot Hæcenus illorum sententiis subscripserunt medici. namque Carbunculus, seu Anthrax, est partis alicujus vel incipiens, vel periecta mortificatio aut corruptio, a particulis acri-salinis lixivialibus, ac venenatis, critice in illam expulsis, orta; unde excitatur Tumor maxime adurens, & nigram crustam habens.

Ut plurimum autem ab exili pustula, in ambitu inflammata, & dolente, interdum à pluribus parvis Pustulis, quæ postea in unam vesiculam coeunt; aliquando tunc Pustula incipit Anthrax. Dein pars affecta dolorem sentit pungitivum, & quasi constringitur; hinc paulatim magis magisque corrumpitur ac nigrum vel cinereum acquirit colorem, partes, quæ proxime Carbunculum circumstant, alterantur, haud secus ac in gangrena fieri solet; etiam valde inflammantur, acriterque dolent, quas natura, antequam mortificationis labes in illas quoque proserpat, suppurat, atque hæc mediante suppuratione corruptam & emortuam



particulam, viz. Carbunculum à sanis separat,  
ejicitque.

Omnis Anthrax sua natura periculosus est, præsertim tempore pestilenti, quique niger est, parti principi vicinus, magnus & subito evanesceus. Minus vero lethalis est Carbunculus, qui primum ruber, dein citrinus apparet. Qui livescit aut nigricat, neminem tere non jugulat.

In curando Carbunculo *purgantia* valdè mihi suspecta sunt, imò suspecta magis *vena sectio*. Sed *Sudoriferis & Alexipharmacis* solummodo insistendum, quibus particulae venenatae acrisalutem domentur & per habitum corporis expellantur. Topica vero *Medicamenta* ne repellant, sed potius foras irabant. Itaque Locus affectus alte scarificetur, atque ne sanguis corruptus concreascit, liberiusque ut enluat, foveatur *Spiritus vini in quo dissoluta Theriaca*; deinsuperponatur Cataplasma.

℞. Farinæ seminis lini ʒiſs. coq. cum ſ. q.  
lactis dulcis recentis, & addendo croci pul-  
veris ʒ6. Vitellum unius ovi, Mellis q. ſ. F. S. A.  
Cataplaſina.

Sed quoniam Anthracis curatio exigit, ut quamprimum *promoveatur suppuratio & exitiosa mali prohibeatur propagatio*, præians remedium sæpe est, ut *candente ferro pars affecta inuratur*. Neque enim dolor metuendus, quia caro, mortui non sentit, hisque adurendi est, dum omni ex parte sensus doloris adsit. sunt tamen qui eo horrendo nimis ( ut dicunt ) præsidio abjecto, *Cancerium potentiale*, aut *Vesicatorium* eligunt, quod utrumque etiam conducit, quoties aut fortia satis videntur, aut alio medio uti non licet. sæpius namque multisciorum adstantium voluntati obtemperare cogitur Medicus, etiam cum damno ægrotantis.

Hoc in casu Vigierius chir. lib. 1. cap. 9. ad malignitatem & virulentiam Carbunculi corrigendam, illud laudat remedium.

4. Calceis vivæ, & non extinctæ ℥i. saponis  
q. s. tormentum ut formam unguenti solidi, &  
hæc emplastrum, quod Carbuntulo applicetur  
per duas, tresve horas.

CL. Sylvius *praxeos medica lib. 4. trakt. 2. §. 690.* testatur, nihil se hactenus novisse, quod potentius ac certius, citiusq. serpentem Carbutulorum mortificationem sistat, quàm *Buizum Arimani*, si circumcirea illinatur parti affectæ, ad miraculum enim tunc sistitur partium omnium corruptio serpens, ac omnia depascens.

Ac vero Escaræ separationem promouet  
inunctum *argentiū basilicon*, vel *Buzyrum re-*  
*cens*, vel id quod sequitur.

24. Butyri insulsi ʒiβ. unguenti Basiliconis  
ʒβ. Theriaces ʒj. Vitellum unius ovi M.F.S.A.  
Linimentum.

Barberte ad crustæ separationem commen-  
dat Emplastrum.

24. Theriaces, Mithridatii an. ʒβ. Therebin-  
thina, Fermentis acris an ʒij. Mellis Rotarum  
ʒiβ. Butyri rec ʒij. Vitrioli albi ʒj. Fulvignis  
ʒiβ. Saponis nigri ʒiij. Croci pulver. ʒiij. Vi-  
tellos trium ovorum M. F. S. A. Emplastrum.

Nonnulli in principio curationis, omnia scarificatione, Carbunculo imponunt *Folium Brasicae rubrae assatum*, oleo raparum immixtum; ac postea hanc vel similem applicant Iuliculam, ca-

pius eam permutando.

℞. Rad. consolida mai. pulver. fol. Scordii  
pulver. an. ʒij. Farinæ Lim. Tritici, an. ʒʒ.  
coq. paulatim in aqua pura, ut mucilagines  
solvantur & compositio ad pulcritudinem crassioris  
consistentiam deveniat, cui adde Mellis, The-  
rebinthinæ, Unguenti Apostolorum an. ʒiij.  
Picis Liquidæ, unguenti Basiliconis an. ʒij. Croci  
pulverificati ʒj. Vitellum unius ovi Miscceantur.

*Velpix Navalis* & *Liquidis* equalibus partibus  
mixta, forma *Emplastri* impendant, aut *Emplastri* sunt.  
*D. achylus* cum *Gummi*.

Carbone leparato, & exempto, Ulcus aliorum ulcerum instar curetur, diligenter sc. abstergendo; quem in hunc admodum conducet *M. duplicatorem ex apio*, cujus hæc est descriptio.

24. Succī foliorū apī depurati lbj. vel  
ejus loco Absynthii, Plantaginī, Crassulæ an.  
ʒiij. Thuris, Myrrhæ, Maltichis an. ʒij. There-  
binthinæ ʒiij. Farina hordei, Fabarum, Orobi  
an. ʒiijß. Mellis optimi lbjß. coq. sin uls. A.  
ad spissitudinem mellis, & sit utri. Vel loco  
hujus mundificativi

℞. Fol. Scordii. pulv. ʒij. Vitellum unius  
ovi, Mellis, Therebunthinæ, unguenti, Aposto-  
lorum an ʒß. Misceantur.

Potest quoque hic usurpari *unguentum fuscum felici Warizii*. Sed notandum ulcera hæc nimis cito occludenda non esse, quin potius aliquandiu aperta servanda, ut venæ et materies probe expurgetur. *Joann. Munnick, chirurg. lib. 1.*

*Pro Carbunculo Benigniore.*

Primò secetur vena è directo partem affe-  
ctam respiciens. Deinde supra locum affectum  
scarificatio rectè accommodatur, plagis ob  
succi crassitiem altioribus. Sunt qui præcipiunt  
ipsos scarificatos in cruentae ulceris exitu  
esse facientes: ipsas verò incisiones aqua laeva  
calente statim perfundunt, ne in illis sanguis  
coeat, & concreseat, sed foras egeat. In-  
terdum etiam erodens medicamentum im-  
ponunt; cuiusmodi est Arsenicum, quod ea inter  
cetera principatum obtinet. Cæterum  
laboranti particula valde repellentia haudqua-  
quam admoventi debent. Adhibenda quidem  
sunt remedia, quæ modicè reprimendo, etiam  
dissipare & digerere possint, cuiusmodi est  
cataplasma ex amigdalâ quod sic paratur.

℥. Arnogiosif. lentium . panisfarinacei. an.  
part. æq. coq. in aqua his galla. *Aur.* addit.  
Alii ex foliis plantag. coctis, lente cocta, pa-  
ne clibanite, & ol. romæ. conficiunt. (Panis  
clibanites ex *galeno* erat valde laudatus, quo-  
niam iumenta coctus diligentia, ita ut omni sui  
parte crustam referret) ut vero radicibus car-  
bunculus disicclatur ab adjacentium commer-  
cio, hoc sequens sprobatur.

℞. Malum puniceum acidum; malum puniceum dulce, horcei Mj. fol. plantag. Mj. coq. in posca, donec rumpatur hordeum, & contundantur. Postea acide pulpam mali cydonii sub prunis cocti, vel alterius mali acidi, & ℞. Emplastrum. Item nucis avellanz veteris vel etiam non veteris medulla carbunculos maturat, & rumpit. Alii nucleos juglandis viridis idem posce contusos cum carnibus cydonio.



L13



mens ac propè intolerabilis orificii ventriculi sinistri præcordiorumque in genere dolor, cum gravissimis quandoque aliis symptomatis, cordis nimirum palpitatione, animi deliquio, nausea, vomendi concitu intensiori, immoderato sudore thoracis in specie, cervicis, & capitis nec non & febre inordinata ac symptomata, imo epilepticis etiam insultibus. Dicitur autem hic morbus *Cardialgia*, aliisque nominibus a Cardia desumptis insignitur; quia etiam si vox illa unde ethymologia hujus morbi deducta est Cor proprie significet, interim tamè quia sinistri orificii ventriculi dolor cor in concitum trahit, ac lypothymias, syncopes, virum exolutiones aliaque cordi propria symptomata procreat, propter nervos illic abundantisissimos & in rete densissimum divaricatos cum cordis nervis communicationem habentes, seu potius propter maximam sensibilitatem a nervorum copia ortam, cor, quasi pars princeps, ab ejus affectionibus, ut & ab aliis omnibus vehementioribus in toto corpore excitis, ita lædatur, ut illud prius & præcipue necesse credas.

Pars itaque affecta nec est Cor, nec ejus capsula, Pericardium dicta; sed orificium ventriculi sinistri, superius n. le. forit. in dictum. Quæ pars ita nobilis est ut si vel levissimo vulneri attingatur mors necessario sequatur, imò exemplum habeat Bartholinus de reu illius regioni fortiter inlucto qui lethalis fuerit: unde etiam illic animæ sedem collocaverat Helmontius. In exterioribus autem scrobiculus cordis illi respondet. *Causa proxima* est inhiæsis læsio sinistri stomachi orificii; vel per flatum in visceris cavo oberrantes illudque cum suis orificiis summi cum molestia distendentes; quales flatum sunt familiæ in febrium intermittentium paroxysmorum principio; vel per excrementa quæcumque acida in stomacho stibulantia illic que fermentescentia, ac in specie pituitam viscidam & acidam quæ ventriculo ejusque orificio sinistro imò inter ipsius tunice nervæ fibras agglutinata, illum rodit & quali perterebrat. Huc referri etiam possunt bies illæ quarum alia porracea, alia æruginosa dicitur, in quibus acidum intensius, vel à pancreate vel aliunde advectum reperitur; Vel per lac quod acorem contraxit, unde interitus qui hoc vescuntur alimento familiaris est cardialgia, ut & adultis qui dum lac frequentius ebibunt ab acidis intensioribus tamen non abstinere, Vel per vermes ab intestinis in stomachum evectos, illiusque orificium moribus suis affligentes. Observationes etiam habentur particulares eorum quorum anus assumpta solutione cosmetici mercurialis loco emulsionis amygdalarum, alius arsenico propinato, alius inrudine cum potu deglutita, alius devorat. anguilla viva &c. cardialgiis vehementioribus fuisse vexati, donec materiam hæc aut malignitatem, aut pondere suo molesta & ventriculo vi remedium fuissent deturbata.

Variat autem hic morbus, symptomataque; nunc pauciora nunc plura habet adjuncta, prout causa illius effectrix intensior aut remissior fuerit. Aliquando enim acidum prædictum austeritate etiam peccans eo erit in gradu, ut anxietates tantum stomachi quæ sunt cum angustia in partibus scrobiculo cordis & præcordis sub-

jectis, cum inquietudine, & jactitatione ac volutatione in læto, ac veram cardialgiam procurare non valeat. Aliquando eo acrimonia humor acidus, atque acris (in quo morbi causa,) evectus est, ut morbum atrociorum, imo si intinuit viceris membranis adhaerit, ut a locis suis continuo in stomachum elevetur ut depuat, peritiamorem; aliquando vero nec ita acris nec ita egrotus tunc ita perpetuus ut symptomata sua quam maxime ac minus durabilia induat.

*Signa diagnostica* ex supra dictis satis innotescunt; attendendum tantum ne cardialgia proprie dicta cum simpto- tatis illis quæ de reu vel ab aliis partibus, per concitum oritur, confundatur. Videndum præterea ne dolor ille qui in concitum parte ventriculi subit et quandoque sentitur pro cardialgia vera habeatur, de quo præterea in pluribus signis, injecto etiam quod utroque impuenter cingere satius constabit.

*Prognostica* verò quod spectat, sciendum est *Cardialgiam* per se & simpliciter leve esse malum, sed si acerbior ac duratior fuerit, propter symptomata adjuncta ea affectos in non leve periculum conjici, præcipue si moribus epilepticis aliisque gravioribus associetur. *Symptomata* præterea *Cardialgia* quæ a febribus malignis originem trahit male temper est omnis.

*Curationem & Indicationes Curativas* vide in sequentibus & variis Autoribus abunde explicatas.

### *Curationes, Consultationes, & Observationes à variis.*

#### *Curationes.*

Curatio hujus affectus pro eorum varietate maxime est varianda si enim ab anarum partium affectibus oritur, morum affectuum therapia adhibenda est. si vero in ipso ventriculo causa stabuerit, dolor vel à flatu, vel ab humoribus acris & viscosis, vel ab inflammatione, abcessu aut ulcere procedit.

Quia flatu generatur curandus est remediis discutientibus, & evacuandis flatum ne illam materiam, cum etiam pituitam & quædam concitantur.

Ac Primum inprimis est clyster emolliens, & laxans, cui statim succedat alter carminans & discutiens ex decocto fol. origani, & lamiæ, pulegii, rutæ, centaurei minor. sem. anis. fœnic. dauci, cumini, & similium. In quibus dissolvatur benedicta laxativ. ol. anethinum, rutæcum, mel anthosatum. si dolor perseveret, ex oleo rutæ aut nucis & vini generosi aut Hippocratiæ partibus æqualibus clyster est componendus. addendo quæ vitæ ʒij. vel paratur clyster ex vino alao cum oiei junperi, aut cinami. aut caryophylli. chynice extracti gutt. viii. qui miraculi instar liberat. Iocundè admoveatur totus sequens regioni stomachi.

℞. Rad. cypri, galangæ, calami aromat. ana ʒij. fol. mentha, origani, pulegii, anis. or. uz, hyssopi, salvia, ana m. j. se n. anis. cumini, carui, dauci & baccar. lauri, ana ʒij. flor. camom.



monill. meliloti, anthos, & lavendulæ, ana p. j. contundantur, & incidantur, includanturque duobus sacculis, qui bulliant in vino generoso, dein expressi, ventriculo, & toti ventri alternatim admoveantur.

At in materia nimis frigida potest parari fortis sequens, maxime laudatus a Foretto, ut qui reliquis remediis non conferentibus, ægrotum a dolore citissime liberaverit.

℞. Rad. althææ ꝑ̄ β. rosar. rubr. flor. cham. summitatum absinthii, ana m. j. coquantur in aqua communi, & chamæm. ad lb. j. sem. in fine addendo vini rhenensis opt. aquæ rosac. & acetii, ana parum; fiat fortis.

Solutorum fiat illius ex ol. rutaceo, & anethino mixtis cum aqua vitæ, quibus aliquid addatur ol. lavæ, aut caryophyll. chymice extracti.

Post inunctionem admoveatur emplastrum de bacis lauri; vel ejus loco cataplasma ex melle & semine cumini.

Interim dum hæc sunt, si nausea adsit, excitabitur vomitus blandiori vomitorio, aut catharticum exhibebitur puritatem evacuans.

Purgato corpore exhibetur ol. amygdal. amar. recenter extracti, & cum vino albo mixtum; aut vinum Hippoc. aqua clareta, vel aqua cinnam.

Julepus sequens ad dolorem sedandum, status discutiendos, pituitam detergendam, & ventriculi roborandum efficacissimus est.

℞. Sol. absinthii vulg. centaurei minor. & agrimon. an. m. sem. coquantur ad ½ v. in colat. dissolv. sacch. albi ꝑ̄ j. capiat mane per biduum.

Anatus Luitanus valde commendat aquam e florib. chamæm. destillatam, tanquam præcipuum, leniendis ventriculi & intestinorum doloribus, auxilium; ejus ꝑ̄ ij. calide exhibeantur. Vel in aqua illius penuria, decoctum flor. chamæm. usurpari poterit, maxime laudatum a Foretto: qui se mercatorem quandam, ingenti stomachi dolore affectum cum insigni clamore, hoc solo decocto semel exhibito, curasse refert. Quo epoto, cum suis ructibus in sudorem solutus est, & incantamenti instar omnis dolor evanuit, ut nullis aliis præsidis opus fuerit. Ex hoc. utem decocto, cum semine anethi parato, aut etiam agarico, vel radice asari; dissolvendo oxymel, syrupum acetosum, aut rosatum solutivum, parari potest vomitorium ab initio morbi exhibendum, quod evacuando mitigare dolorem poterit.

Docet Galen. cucurbitulam ventriculo admodum illius dolores citissime resolvere instar incantamenti. Hæc tamen cautio adhibenda est, ut nihil aut parum humoris crudi in ventriculo lateat, alioquin dolorem intendit.

Utiliter etiam ad moveri potest eidem parti panis recenter e furno extractus, per medium sectus, tum per se, tum pulveribus aromaticis conspersus.

Tandem dolore pertinaciter adhærente, consurgendum est ad balneum ex decocto herbarum emollientium, & calefacientium, quod tutissimum & efficacissimum est; status enim diffundendo, & per poros apertos resolvendo, a dolore liberat. Quod citius efficietur, si in ipso balneo remedium aliquod discutiens ægro exhibeatur. Concurrente enim utroque præsidio, tum

interno, tum externo, opus rite peragitur.

Balneum esse debet valde calidum, ut facilius status discutiantur, & humores crassi colligantur.

℞. Quod si propter doloris vehementiam clysteres vel injeci, vel retineri nequiverint, in ipso balneo catharticum propinandum est, & in eo per horam integram aut dimidiam immorandum, donec vis cathartica ventriculum, & viscera attingat.

Aliquando autem, ubi ex doloris vehementia periculum imminet, ad narcotica est contugendum. Quibus prudenter exhibitis, admirandus non raro subsequitur effectus. Nonnulli etiam cum purgantibus narcotica permiscunt, ut simul & dolor sedetur; & materia peccans educatur; quale est medicamentum Eliuzi a Foretto laudatum, quod sic habet.

℞. Diaphen. ꝑ̄ β. phlonii rom. ꝑ̄ ij. cum aqua vel decocto chamom. fiat potio.

Dolore prius sublato, in his qui ei sunt obnoxii semel aut bis in mense purgatio iteretur. ut proxima flatuum causa auferatur: tum remedia roborantia usurpentur. Quæ si in laxa concoctionis curatione proposita sunt.

Qui vero ab illo dolor excitatur, curandus est humoris peccantis evacuatione, vomitorio blando, aut cathartico medicamento, aut clysteribus sequentibus, emollientibus quidem, non acerbis, aut calefacientibus.

Postmodum demulceatur humorum acrimonia julepis refrigerantibus & incitantibus, emulsionibus seminis frig. major. lacte recenter mulcto, oleo amygdal. dulcium recenti, vitellis ovor. & similibus.

Interim non omittantur opiata, aliaque roborantia, in superioribus curationibus descripta.

Ac tandem necessitate urgente, ad narcotica confugiendum est.

Extrinsecus admoveatur cataplasma ex mica panis in lacte decocta, additis vitell. ovor. & croco.

Vel admoveatur panis recenter ab igne extractus, per medium sectus, & in aceto madefactus.

Vel foveatur eadem pars decocto flor. cham. viol. & nymphae; aut quod multo præstantius, demergatur æger in balneum aquæ tepidæ, id enim ad hujus affectus curationem præcipuam vim obtinet.

Dolore sedato; si forte reverti contingat, æger purgabitur bis in mense, & viscerum intemperies calida corrigetur vicu refrigerante, & remediis convenientibus.

Qui vero dolor sit ab inflammatione, abscessu, vel ulcere, remediis in sequenti curatione proponendis oppugnabitur *Lazar. Rivier. Pract. Medic. lib. 9. cap. 10.*

In cardialgia incipiente vel paululum durando curanda, vomitus, si promoveri possit utramque absolvit paginam. Vomitus ergo ab aqua bened. Gilla Theophrasti procuratus facillime solvit.

Inveteratum præsertim. pud senes, tandem aufert (von itiones apud senes non satis tutæ) syrup. de chamom. melius est arcanum de cham. præsertim romanæ, si in aqua menthæ quotidie exhibeatur usque ad declinationem morbi.

Forinsecus applicentur epithemata ex emollientibus & dolorem auferentibus chamomilla, malva. Præstantissimum est in hoc casu oleum chamomillæ sapphiricum Turnheuseri



(quoc fit, si floribus chamomillæ addatur ali-  
quid tererebinthinæ cyprinx in aqua dissolutæ, &  
postea per vena. m. destilletur.) in aqua men-  
thæ vel chamomillæ, aut floribus sambuci,  
aut foliis prunellæ sylvestris datum gutt.  
iii j. v. vj. *Joann. Hartmann in Prax. Chymia-*  
*æ.*

Ad curandos hos stomachi dolores sola pur-  
gatio nostra antimonialis sufficit, purgatioque  
sic à causis illis præternaturalibus ventriculo,  
roborandus est oleo anis. aut cinamom. vel  
aqua cinamom. sive sequenti etiam electuario.

℞. Corticis citri conditi contuli & aqua  
cinamom. dissoluti ℥v. olei anis. ℥j. olei cina-  
mom. ℥ss. Mosch. & Ambr. an. gr. vj. M. f. Ele-  
ctuarium, quo post purgationem utatur æger  
ad quantitatem ℥ss. iunino mane jejuno ven-  
triculo. *Joann. Petr. Faber. in Pains. og. Spagir.*  
*ex Langii Pathologia a. umata.*

Si a malignitate ortus fuerit iste stomachi do-  
lor, illis remediis ex voto expeditur, quæ  
putredinis excellentiæ potenter refulunt, &  
animatam eam desubito mortificant. Sin vero  
ab acrimonia nidorulenta seu aciditate humo-  
rum putrilginosa provenerit, præsentissimum  
exhibebunt adiumentum, ea quæ vim tam mas-  
cule præcipitandi, quam etiam radicis re-  
crementa illa expellendi habent, quam ob  
causam emeticum hoc famigeratum ex antimo-  
nio confectum fund menti loco præmitten-  
dum erit, & postea præcipitantium usus, quo-  
rum nomina (ut sunt veluti gratia pulvis Mar-  
chionis, sperma ceti, m. gitterium eboris, coral-  
lior. oculor. cancr. lincura tart. ri & c.) jam me-  
moriter nobis ex superioribus constant, subji-  
ciendus. His it. observatis fragrantia & aro-  
matica etiam ut pote quibus arcem ventriculi  
singulariter delectatur, specifice convenire & d.  
propriatum habere locum præriter concedimus;  
unde illa quoque medicamenta, quæ autor  
curando huic affectui consecravit, omnino mul-  
tùm tunc pollere confirmamus. Oleum enim  
anisi egregiè discutit excrementitii humoris  
impactum vitium, atque subramilitiam in ven-  
triculo collectam blande ejicit, imò stomachi-  
cum per se audit. Citri cortices putredinem  
oppido compescunt, eamque si animata sit illa,  
ex sententia fugant. Aqua chamomill. &  
oleum stillat. ejus singulares tunc sibi vindicat  
laudes, quòd affectissima virtute dolores ni-  
tigare valeat; unde etiam extrinsecus & qui-  
dem in dorso præcipue utpote cuius oras  
stomachus potissimum occupat (quod Practi-  
co bene notandum) regio ista Oleo chama-  
melino, cui guttula quedam, de distillato ejus-  
dem oleo sunt instillandæ, exopto cum fructu  
iungi solet. A vulgo contra hoc in. lum utilitatis  
sine expecti unguentum potabile quod butyrum  
rubrum alioquin vocatur, solet. Quoscribi-  
culum cordis iungunt n. ulierculæ; imò ad  
intra etiam inutiliter non accipiendum porri-  
gunt: Habet enim efficaciam efficaciter dissol-  
vendi ac discutiendi, sicuti etiam castoreum &  
sperma ceti tanquam nobiliora ingredientia  
istius remedii præstantiam f. ventibus argu-  
mentis affatim statumant. *Ex Langii uni-*  
*madversionibus in eundem.*

*Hypochondriorum inflatie, seu Cardialgia cura-*  
*tur usu enematum carminativorum ex De-*

cocio carmin. &c. Præter clysteres ta. ea ad  
natus discutiendos aq. camanati. a. Lomere-  
lii prodest, vel semen anisi grono mo. so in. i  
su. n, ut videre est apud *Hecurium Camner. t. in*  
*Aphor. Hippocr.* Externe eniplastrum card.  
Schoderi cum oldetili. Augener. Potell. etiam  
m. laceri cum ol. chamomillæ, quod est angu-  
lare secretum. Mulieres unguentum rubrum  
commendant, sed præfertur ei unguentum  
prædictum cardi. cum. *Pro purgandi. pueri.* Non  
datur præstantius medicamentum Mechoac. mia,  
quæ educit simul vermes, sine odore, & spo-  
re est, datique commode potest in pinte. *J. an.*  
*Michael in praxi cy. n. gener.*

*In Cardialgia: impt. is removenda causa i. ri-*  
*tans aut l. dens stomachum, sive sit interna sive*  
*externa. placandus est dolor tam appropriatis ex-*  
*pertis quam internis istis Opiatis.*

Primo quidem ad removend. s. causas notum  
est quod optima sint vomitoria, quæ Am. tus-  
lulianus, Faber, & omnes auctores ubi ne-  
cessarium commendant, præ cæteris tamen vo-  
mitor. Antimon. præcellunt, quæ m. l. aut d. q. ve-  
nedicta Hartm. un. aut Kulandi. Vc. quidam so-  
lent commendare, si v. m. ab. m. l. i. s. a. da-  
tur in poculum vomitorium Kulandi, cuius des-  
criptionem habebitis in collegio Joub. omiano  
L. Mich. en. admodum eleg. us. hoc pocu-  
lum.

Post vomitoria se offerunt purgantia. Cate-  
rum quoniam purgantia & ipsa ventriculo ini-  
mica facile possunt exasperare stomachum propte-  
rea convenientissimum est, ut istam Opiata  
addantur, ut etiam opi. ta omniu. humorum  
excretionem sistant, & etiam hyper. atantes  
removeant, nihilominus tamen convenienti-  
bus purgantibus nulla eadem blande & a. m. iter,  
nec adeo vehementer operari faciant. Huius rei  
alias horrenda prostant vestigia; nam ut pluri-  
mum habuerunt hanc torm. u. m.

℞. Elect. Diaphanæ. ℥ss. (quod etiam pur-  
g. t) Philon. rom. n. ℥j. (ex capitulis p. p. a-  
ver.) misc. fiat Electuar. quod purgat l. m. d.  
& simul dolorem sistit, de quo videt. *Pozell.*  
*Riverium in sua praxi ac Scholzius. t. n. 1. 1. 1.*  
114. Verum quoniam talia Electuaria sunt n. l. l.  
eos. comm. odiosa modernis præscribitur talis  
torm. ula, quæ etiam in colica est. pro. cu.

℞. Mass. pulul. Aloephong. c. scam. gr. xv.  
v. ℥j. Laudan. opiet. gr. ij. c. f. q. l. m. d. Ab-  
sinth. F. l. a. Pilul. Parg.

Certum est quod admodum convenienter  
possint p. m. f. ex. opiata c. m. purgant. hui. observa-  
vata cautela, ut si volumus purgare tunc tem-  
poris, quando ada. f. enus opium admodum pur-  
gantis nonnulla. ugemus, ne supprimatur  
omnino minor purg. ntis dosis. Conveniunt  
purgantia opata imprimis, iis qui labor. ne. f. m. e-  
st. m. d. v. r. b. m., ut mulieribus, quæ ex le-  
vi purg. tion. *sup. o. cancr. uterina* sunt. ol. n. o. d. i. e.  
Ite. n. convenit talis n. m. tura. f. i. q. a. m. d. a. l. t.  
solutionis alar, quæ admodum repertur. n. r. u. r. quos  
gr. vj. scam. moa. o. c. u. r. purgat. i. m. r. s. e. m.  
remora. i. n. i. c. i. t. u. r. purgant. i. t. c. o. n. t. i. n. e. t. h. æ. m. i-  
stura i. i. d. e. m., quæ acridis. ut. c. o. n. o. l. i. s. s. u. c. c. i. s.  
abund. ut in specie scorbutico. d. i. p. o. n. o. d. i. c. i. s.  
eis: in his enim ex medicam. entis purgantibus  
ob succos crudos & acidos supereminat satis  
horrenda & gravia Abdominis tormina, hoc ne  
fiat



fiat commodè permisceatur Opium, aut saltem die uno aut altero cum digestivo præmittitur. De hac Miltura vid. uicæ agentem Hoferum in Hercul. med. p. 124. sicuti moderni Belgæ Sylvius & ejus discipuli utuntur tali miltura Opii cum purgantibus. Poterius curavit aliquando Cardialgiâ aliis omnibus reluctantem per suas Pilulas Catholicas cent. 1. cur. 24. habet exemplum de dolore ventriculi intensissimo periodico quotannis certis temporibus, certisque diebus redeunte qui aliis quàm plurimis irritis tandem à Poterio curatus fuit per pilulas catholicas quæ sunt hæc, & prostant in Pharmac. spagir. vid. ejus cent. 1. cur. 24.

℞. Aloës succotrin. ʒʒ. myrrhæ ʒ ij. mastich. ʒj. croc. orient. ʒij. magnes. saturn. meteorisat. ʒ j. cum tyropo rosar. solutiv. f. massa cujus dosis a gr. ij. ad 24.

Valde commendat has pilulas. Magnesia saturata meteorisata, sunt flores antini. correcti ita ut per inferiora purgent: magnesia saturata est antini. per meteorisationem intelligit flores. Aliàs si cardialgia oriatur a flatibus aut exhalationibus ex effervescencia humorum in intestino duodeno obvia; (Nam succus pancreaticus & bilis committi dum effervescunt, halitus acres in stomachum mittunt, uti contingit in febribus intermittentibus) in tali casu injiciatur clystma ex carminativis, ex iis nempe quæ flatus discutiunt & blandè intestina abstergant. Exemplum talis clysmatis sit hoc.

℞. Radic. angelic. ʒʒ. fol. origan. puleg. calaminth. an. m. j. flor. chamom. roman. aut vulgar. m. ʒ. sem. anis. fenicul. dauc. an. ʒj. baccar. laur. ʒij. egregiæ sunt carminativæ, coqu. in f. q. aqu. simp. colat. ʒ ix. add. electuar. de bacc. laur. lenitiv. an. ʒ ʒ. v. ʒvj. olei destill. anis. fenicul. chamom. an. gr. v. vitell. ovor. num. j. misce pro clysmate injiciendo tepide.

Riverius habet *clysmata* in tali casu ex solo vino albo cum oleis destillatis carminativis parata, quæ non sunt inelegantia.

Quæstio est *an ven. scil. conveniat*: quæ negatur, per se enim nihil adfert adjumenti in cardialgia tollenda; ergo quando profunt exempla curatarum cardialgiarum per ven. scil. sunt potius exempla casualia, quàm ex lege artis exhibita; exemplum tale habet Riverius cent. 1. observ. 44. de dolore vehementi ventriculi & lienis regionem occupante, aliis omnibus irritis ven. scil. tandem fuit curatus. Pertinent hæc etiam exempla Thoneri in observ. p. 135. de dolore ventriculi immensi & ingenti in pletiorico aliis irritis ven. scil. subito incantamenti instar curato, idque propterea quia tantum adfuit suspicio inflammationis stomachi quæ tamen non est sufficiens. Aliàs *quæ conveniunt in cardialgia remedia*, quæ post purgantia ventriculum placant & dolorem sedant, sunt *aromatizata blanda*; præ cæteris radix angelicæ & enulæ campan. fenicul. caryophyllatæ. Denique herba chamomillæ vulgar. & romanæ, quæ sunt expertissimæ in cardialgia, & non habent remedium in hoc passu illis conferendum: imprimis flores harum camomill. conveniunt. Sanè Amat. *Lusit. cent. 5. cur. 59.* vix sufficienter potest commendare aq. camom. destillatam in

cardialgia si ad ʒ iij. propinquetur; decoctum camomill. vulgaris seu expertissimum commendatur à Foresto; essentiam paravit D. Mich. ex floribus cum spiritu vegetabili carminativo, spiritu vini a specificis seu simplicibus carminativis abstracto, quæ essent. a gr. 20. ad 30. propinata in affectibus stomachi & cardialgiæ erit convenientissima & elegantissima. Solet etiam destillari ol. saphirinum ex chamomilla vulgari & romana cujus paucæ guttæ cum vino interiorius assumptæ, cum aut oleo nucis moschatæ destillato, exterius illatæ admodum sunt convenientes ad tollendam cardialgiâ. Post chamomillam conveniunt hyssopus, summitat. anethi & ordinaria mentha, item flores anthos seu rorismarini & flor. Verbasci, qui sunt singulariter anodyn. Hinc etiam cortices citri, & aurantium & ex his parata elexyria: elexyr. citri & aurant. Ex his simplicibus destillatæ aq. chamomillæ, flor. sambuci. hyssopi, & cinnam. conveniunt.

Vinum abintestines similiter est utile, uti etiam ad dolorem acrem vinum in quo decoquitur nux moschata, quod admodum commendatur à Stockero in praxi ad dolorem acrem. Spiritus vini seu spirit. anisi experimentum est Lindani, qui insigniter commendat spirit. stomachalem Mynlichti & itidem est expertus essentiam chamomill. a ʒ ij. ad ʒj. in urgente casu potest propinari Elixir mentha. Si percipiatur simul ardor in regione stomachi, tunc commodè permisceantur his appropriatis temperate acida, quæ ardorem retrahant, quæ interest rob & syrupus cydoniorum it. lyropus acetositate citri, it. spirit. vitrioli, & similia. Denique interne olea destillata sunt admodum convenientia. De oleo chamomillæ dixi. huic simile est ol. carui & succum destillatum de quo postmodum: it. ol. anisi & cuminum.

Subsequuntur denique ea quæ dolorem tollunt sentum imminuendo in stomacho, qualia sunt papaverina: veteribus in usu fuit pilonum romanum ad ʒj. item pilulæ de cynoglossa ad ʒʒ. modernis in usu est laudanum opiatum cum decocto flor. chamomillæ usurpatum.

Cæterum sit formula contra dolorem stomachi.

℞. Aqu. chamom. destill. ʒ iij. succi cydonior. ʒj. essent. chamom. roman. ʒij. elixir. menthæ ʒ i ʒ. olei destill. chamom. gr. vj. laudan. opiat. gr. iij. Syrupi de huiusmodi ʒvj. dos. cochl. ij. m. f. miltura dolor sedans.

Vel ℞. Essent. flor. chamom. roman. ʒij. menth. spirit. anisi an. ʒj. anodyn. f. solut. opii in spir. vin. ʒj. perinde enim est sive in forma sicca sive liquida adhibeatur. f. essent. dolor sedans, dos. ʒo. ad 40. gr.

Elegans casus est quem habet Thonerus in observ. p. 136. de dolore ventriculi pletiorico, qui fuit curatus per ʒij. a. olei anygd. dulcium in jure Galli propinato, quo facto intra 3. horas acicula per vias urinarias fuit excreta, & exinde dolor omnis subito disparuit. Facit hoc etiam quando oritur dolor ex deglutitis frustis vitri, & conveniens est ut usurpetur puipa ex milio aut oryza facta, eaque non nimis fluxilis, sed aliquantisper spissa, quæ absorbetur absque sub



subsequente potu: sic enim fit, ut huic pulsi involuta lruia vitri vel aciculæ aut similes res acutæ citra noxam ex ventriculo per pylorum diambantur. Iuani Ithomerus citato loco duo exempla habet curatorum a vehementissimo totius abdominis itemque ventriculi dolore per v. gr. ol. carui destill. & eodem loco habet exempl. doloris stomachi, qui per intervalla præterit a cibo assumpto, usque ad scapulas se extenderit, qui dolor insignis subito fuit curatus v. gr. ol. destill. succini.

Sic Zacutus Luitan. l. 2. Med. Princ. histor. §8. Observat. 10. habet de importuno ventriculi dolo e, potu vini absinthitis curato. In doloribus ienum aut etiam in doloribus stomachi, in dejectione virium elegantes sunt istæ Pilulæ Poterii, quas recenset in cent. 3. cur. 30. ita.

℞. Ambre gryfæ gr. ij. mosch. croc. orient. an. gr. j. opii thebaic. rit. præp. gr. iv. misc. f. l. a. pilulæ, quæ in semibus & viribus dejectis sunt convenientissima.

Idem Poterius citat. loc. curat. 31. habet exemplum doloris ventriculi aliis omnibus irritis tandem decocto ligni sassafras per 20. dies curati.

Quod attinet externa inter hæc sunt imprimis olea; ol. chamomill. destillatum & insutum, matich. nucis mosch. nardinum: it. ol. stomachale Cratonis. Hinc balsam. peruvianus ut & ol. destill. macis, caryophyllorum, & guttulæ quædam olei destillati cinnamomi.

Modus præscribendi est hic. ℞. Ol. chamom. dest. 3 j. balsami peruvian. 3 β. ol. mac. caryoph. an. 3 β. vel gr. xv. nuc. moschat. expr. q. l. misc. f. balsamus. Quo unguatur regio stomachi.

Poll olea usitata sunt emplastra regioni stomachi applicata: quæ inter elegans est emplastrum carminativum Mynsichtii: it. si suspicio sit flatuum emplastrum de baccis lauri.

Reliquis externis omnibus præferenda tacamahaca, in forma emplastri regioni stomachi applicata. Experientiam hujus certam factam videbitis in Poter. cent. 3. cap. 32. Et quod etiam fuit in frequenti usu D. Michael. Præscribitur vel simpliciter ita.

℞. Tacamahacæ, q. v. subigatur in mortario calido inducatur super alutam & obducatur syndone rubra in forma emplastri stomachalis.

Melius videtur si tacamahacæ & ceroti stomachalis ana miscantur, & cum ol. stomachali Cratonis subigantur in formam emplastri.

Ipsè Poterius in ejusdem Pharmac. Spagyrica excellens nobis præparat emplastrum stomachicum ex tacamahacæ hæc formâ.

℞. Ol. mastich. destillat. 3 β. menth. absinth. nuc. s. moschat. caryophyll. an. 3 j. gummi. tacamahac. 3 i β. ceræ citrin. 3 iv. misc. hæc cerotum de quo accipiat q. s. pro scuto stomachali.

Quæ dicuntur de tacamahacæ eodem & similia dici possunt de gummi carannæ, quod & ipsum in similibus casibus est elegans. Alias videatur quod attinet naturam gummatissimæ carannæ & tacamahacæ, Monardes de simplicibus commentario in Clusump. 318.

Formæ itidem externæ applicantur in cardialgia, siquæ duplici sub forma: aut ut species coquantur in aqua & aceto aut in vino, & istud decoctum pannis linteis triplicatis aut quadruplicatis applicetur stomacho: vel ipsæ species insuntur sacculo, coquantur parumper in aqua vel vino, & ita sacculus applicatur regioni stomachi subinde renovandus.

Forma potest esse talis quem commendat inter alia Forcetus in lib. 18. tit. 22.

℞. Absinth. com. & roman. flor. chamom. rosar. rubr. menth. ana m. j. semin. sumach. myrtillos. an. 3 β. flor. melilot. p. ij. coq. in f. q. aqu. commun. colat. 16 β. adde species. diarthod. abbat. 3 ii β. aromatic. rosar. 3 j. aqu. rosar. 3 ij. acet. rosacei 3 β. ebulliant. nat. solus pro ventriculo. Sacculi sunt meliores ita.

℞. Flor. chamom. roman. comar. absinth. herb. menth. majoran. an. m. j. sem. anis. fœnicul. carui. dauci. an. 3 v β. baccar. junip. contul. 3 β. concis. & contul. impietur sacculus interpassatus region. stomach. applicand. vel siccus, vel coquatur in vino aut aqua & applicetur subinde renovando.

Si vero sit cardialgia à refrigeratione corporis externa, & inde ortis flatibus, tunc conveniens est simplex quidem, sed admodum bonus sacculus Montagnanæ descriptio hæc.

℞. Milu cribrati. m. ij. furturum m. iij. salis commun. m. j. misc. f. sacculus qui calefactus imponatur: in colica quoque est elegans.

Superius dixi quod Valeriola in l. 1. obser. 7. refer. et historiam intensissimæ, & molestissimæ cardialgiæ factæ ex haustu meræ sublimæ, qui casus cum sit singularis & non inelegans ejusdem remedia paucis communicabo. Præscripsit tormentum exterius.

℞. Fol. hyoscyam. alb. absinth. roman. an. m. 6. mastich. 3 iij. crytall. purissim. 3 j. coq. in olei rosar. violati, liliacæ, anethini an. 3 iv. vini rubri 16 β. colent. & hoc remedio applicato mirum levamen percepit. Interim postmodum præscripsit hanc potionem.

℞. Crytall. purissim. 3 j. (ratio quoniam acidum mercur. sublim. arripit crytallum & enervatur) theriacæ elect. 3 ij. butyri recent. 3 j. (ad demulcendam acrimoniam mercur. sublim.) aqu. decoct. hordei q. l. misc. f. potio pro aliquot vicibus.

NB. Hyoscyamus externè & crytallus internè perfecerunt totam curam: Nam crytallus externè in fomento nihil præstat, neciturque ejus auctor hypothese vulgari. Michael Ettm. in Collegio Practico.

### Consultationes.

#### De Cardialgia, & Icteria pro Nobiliss. Patienti.

Ex iis quæ fusè & accuratè enarrati sunt à Nob. Patienti, luce clarius constat, Virum Nobilissimum dolori acutissimo, & molestissimo obnoxium esse, instanti os ventriculi, qui aliquando desit in cardiacam passionem, ad dor-



dorium sæpius molesto, ubi magis delitescit illud.

Hic autem dolor antehac originem duxit à flatulenta materia, genita propter labetactam coctionem ventriculi, ob intemperativum, & diuturnum exercitium, deinde etiam & biliosa, portacea, ut ex excretis per vomitum apparuit, regurgitante à jecore ad ventriculum, ob impedimentum ejus effluxum ad intestina, ratione obstruktionis poris tellei à materia crassa, & pituitosa, quam jecur præcalidum trahit à ventriculo incoctam; ex quo fit, quod icteritia supervenire soleat cum fecibus albicantibus, & urinis tinctis, accedente febre, ob illius bilis accensionem, & corporis fædo colore, ob effusionem ejusdem, tunc primum cessante, quando prædicta materia, vel sensibilibiter evacuatur, vel insensibilibiter resolvitur: non negando aliquem contumacem ichoris melancholici acidum sapientis qui dolores acutiores intert, cum præsertim referat Nob. patiens se myrachioli affectui utcumque esse obnoxium.

Affectus equidem non contemnendus, quippe qui majora mala portendere potest, cardiacam scilicet diuturniorem, cum gravi virium languore calculum in vesica fellea vel quid hujusmodi.

Ideo summo studio incumbendum est hujus curæ. Et quia originem habuit, & aliquot post annis recurrit, convalescatque ob errores in victu, & præsertim exercitio intemperativo, ac immodico, sub celo humido, nocturno, & frigido, prima & princeps cura consistit in recta victus ratione, cibis scilicet boni succi, & facilis concoctionis & vino oligophoro, non valde generoso, moderata quietate, atque abstinendo, cum ab exercitio intemperativo, tum à mentis studio in negotiis, atque diuturno scribendi officio, duas saltem horas ab assumpto cibo.

Ac interim alvus continuò lubrica est conservanda familiari usu pilulæ de tribus cum rhubarb. semel saltem in hebdomada; non ommissa blanda totius corporis purgatione vere, præsertim verò autumno, atque jecoris refrigeratione frequenti usu jusculorum cicchorii, & ventriculi corroboratione cum diacydonio, vel gelatina ex cidoniis, aut succo granatorum statim à cibo. Sic enim præservabitur ab affectibus præsentibus. *Benedict. Syzaniæ. Consil. & Respons. Medic. cent. 1.*

*De Cardialgia, Tussicula sicca, colica, aliisque symptomatibus. Pro Illustriss. & Reverendiss. D. Petro Gembischi Episcopo Cracoviensi, & Duce Serviensi.*

Quamquam de variis morboris affectionibus, elapsis annis conquestus fuerit Illustriss. & Excelliss. D. Petrus Gembischi, Dominus meus semper Colendiss. de arthritide nimirum, nephritide, colica, tussi, hæmorrhædia, & aliis: tres tamen sunt præcipui, Viris Præclariss. Excellenss. Principis curæ præpositis Manus negotiorum facientes, nobis per litteras Excell. D. Laurentii Smieschoviz significati, cardialgia, tussicula sicca non raro invadens, & dolor co-

licus valde molestus: à quibus licet hoc tempore sit prorsus immunis, inculcata corporis salubritate usus toto itinere Cracovia rati-vium, cogitandum nihilominus est de medicis præidiis, quæ à prædictis affectibus, vel etiam gravioribus Illustriss. & Excellenss. Principem præferuent.

Quod ut fiat, statuendum censeo, cardialgiæ antehac graviter infestantem Exc. D. à materia provenisse, cum biliosa, à fervido jecore ad ventriculum transmissa, tum in ipsomet ventriculi corpore & fundo genita, simul mixtis, & ad os ventriculi exquisitissimo sensu tactus ob nervos sextæ conjugationis à natura donatum, assatim affluentibus, ibique infarctis, nec nisi agre deturbatis. Quæ enim sensum fiunt, dolorem non inferunt. Colicos autem dolores heri reor à flatibus ex prædicta minera à jecoris fervore elevatis, & intestini coli tunicas violenter distendentibus; diuturnaque illam tussiculam à duplici causa excitatam tussisse tenui nempe materia à capite c. lido & humido ad asperam arteriam destillante, & quæ non minoris momenti est, languine crassiori à jecore ad pulmones transmissio.

Hæc etenim materia, sicuti statutis temporibus à jecore per ramos mesentericos, vel splenicis ad internas venas hæmorrhoidales transmissa, per ipsas expurgatur, non tunc quibuscumque torminibus inferioris ventris hanc excretionem prænuntiantibus, ita per ramos venæ cavæ ad pulmonum venas delata, & inæqualiter per ipsas diffusa, tussim siccam non difficili negotio excitare potest. Atque hinc fit, quod cohobito sanguine hæmorrhoidali tussim hanc gravius invadere fuit observatum à Viris Excellenss. necnon & ab Excellenss. Principe.

Quæ cum ita constituta sint, sperare jure merito possumus. Exc. D. in dies melius habiturum, quotiescunque persistet periodica hæmorrhoidalis fluxio, congrua victus ratione in sex rebus non naturalibus non neglecta, levioribusque quibuscumque Medicis præidiis administratis. Quod si forte sisteretur sanguis hæmorrhoidalis, periculum immineret, ne in tabem convertatur affectus, nisi arte pateat ipsi via, juxta dictum. Hippoc. Apho. 12. *Diuturni ac curanti hæmorrhoides, nisi una quæpiam servetur periculum aqua inter eam aut tabis impendit.* Quemadmodum cardialgia in cardiacam passionem, & colica in nephriticam, paralytim, aut volvulum non raro mutatur, cum maximo ægrorum periculo. I propterea, quamquam Princeps Excell. nunc bene habeat, & inculpat. sanitate fruatur, non omittenda sunt aliqua à prædictis gravibusque malis ipsum præservantia.

Intentiones autem cum curativæ, tum præservativæ eo colliment, ut præmissa universali totius expiatione, purgetur peculiariter caput & thorax, divertatur fluxio à pulmonibus, vel ad articulos olim dolentes, quando graviores urgebunt affectus, exsicceetur caput, & ventriculus, jecorisque fervor contemperetur internis & externis refrigerantibus, accedente congrua victus ratione.

Ad quæ præstanda locum habebunt leviora, nunc quidem familiariter, & generosiora remedia proximo autumnali, & subsequente ver-



no tempore administranda. Leviora erunt frequentiores alvi subducciones, modo cum clysteribus lli. & lxc. Principi familiaribus, modo cum pil. aloeticis lotis succo ros. ad 3j. statim antè cœnam, dum præteritum propius abest tempus nuxionis hæmorrhoidalis, dummodo non excedat. Tum enim aloë ventrum orincia. periente supersedendum cujus loco erunt ex usu pil. de trib. cum rhubarb. ad drachm. i. hora ante cibum; utrumque enim bilem evacuat, a ventriculo diverget, status discutiet, & ipsum roborabit: a quibus superbibat jusculum alteratum cichorio, si ab eorum usu incaloscantiam aliquam majorem observaverit. Secundum familiare remedium erit capitis expurgatio quolibet mane, horam magis opportuna, cum per n. res succo malæ attracto, & turunda ex corticibus citri, vel aurantiorum, vel radice cyclaminis intra nares dentata: tum per os, attrita mastiche, capiti namque & ventriculo ex usu erit, divertendo, interceptiendo, & roborando. Verum quia maxime Illustriss. & Excellentissimus Dominus solet materiam crassam tussi expectorare, non erit incongruum assumere duo, vel tria cochlearia oxymel. simplicis, parati ex melle Hispano, cum syrup. de corticibus citri; imo & cochlearia aquæ ardentis cum baccis juniperi aliquando uti poterit matutinis horis pro ventriculi corroboracione; in quem usum proderit zingiber conditum. Caute tamen his utendum, ne jecur magis incalascet. Caput singulis diebus post pectinationem exsicccandum, factâ frictione cum spongia sicca: & hyberno tempore cucuphâ caput teget consuta cum pulveribus exsiccantibus ex roremarino, cornu cervi, ulio, corticibus ostreorum ultis, punice, ligno aloës, & agarico.

Exerceat corpus: cibus utatur boni succi, non deo aromatibus conditis, non pinguibus, non oleosis, non butyrolis. Vinum bibat oligophorum, non generosum, neque copiosum; atque semper a cibo sumat quid subaltringens, puta diacydonium sine aromatibus, vel gelu cydoniorum, vel saccharum ros. antiquum, vel duo cochlearia aquæ menthæ actu frigida supersedendo ab arduis negotiis saltem duas horas a cibo, & horam a somno. Interea vindemiarum tempore vinum medicatum sibi parandum curet, ex visco queremo, lentisco, menthâ, & absinthio. Aërem fugiat impense calidum in hypocautis, vel impense frigidum, & ventis peritatum. Et hæc in familiari usu habere poterit.

Generosiora autumno, & vere administranda sunt corpus totum purgantia, præmissâ humorum præparatione, sanguinisque eductione ex jecoraria dextri brachii, necnon ex hæmorrhoidibus, si spontè non nuxerint, sineque particularia caput pargia supra præscripta; inuraturque fonticulus sinistro brachio, ac deinde si Pat. vii moratus fuerit, usui erunt aquæ Lettitiæ triduum, ad lb. iv. singulis diebus, cum vehiculo; deinde aquæ refrigerantes Beatæ Virginis in agro nostro, vel Villenses in Lucensi, vel & Nocerianæ omnium maxime temperatæ, quas bibere poterit 10. vel 12. dies: sicuti & extrinsecus fieri poterit stillicidium ventriculo cum aquis calidioribus, munito jecore unguen-

to santal. & cum temperatioribus in acivis qualitatibus, ipsimet capiti supra futuram coronalem.

Quorum medicamentorum vicem implebunt in patria decocta exsiccantia calefacientia: lixivium itidem exsiccantia, conservæ ex uor. ros. marini, de floribus cichorii, & de absinthio pontico, aliaque hujus ordinis, Viris illis doctissimis perquam notissima: hoc tamen supposito, quod succedanea viribus semper cedunt principalibus, & naturalibus. Et hæc pro incolumitate hujus principis mei amantissimi indicanda duxi. Faxit Deus ut ad vota succedant. *Benedict. Sylvatic. Consul. & respons. Medic. cent. 2.*

*De Cardiacâ passione ex dolore oris ventriculi, ob interceptum assumptorum descensum pro Perillustri & fortissimo Militum Præfecto Domino Ambrosio.*

Annus nunc est, cum Perillustri Præfectus temperamenti calidi & sicci ætatis consistentis, post varios exantlatos labores, & usum generosi purgantis, conqueri cœpit de dolore circa os ventriculi in assumptorum descensu, adeo gravi, ut aliquando deficiat, cum sudore & frigiditate totius, atque dolore continuo ad vertebrae dorsum, modo graviore, modo leviori, continuo tamen. Observatque ingravescere affectum ex vini potu, faciliusque assumpta descendere post somnum, glutinosa tamen atque panem jusculo, aut vino imbutum omnium difficillime; hincque subsequi inignem corporis maciem, viriumque languorem. Appetit tamen, & concoquit deglutita, & dejectiones sunt plurimæ albicantes; atque sanularis ipsius cibus est lac, quod facilius descendit in ventriculum. Adest tumor durus, sine dolore, extuberans infra mucronatam cartilagineam, suo collis mendosis humiliter lateris. Variis remediis frustra hactenus a Viro Præclarissimo tentatis de agendis consult.

Nos igitur morem gerentes perillustri patienti, statuendum primò, censemus partem præcipuè affectam esse orificium supernum ventriculi, cum dolor invadat, quando per ipsum delabuntur assumpta, in ventriculum ipsum admittenda: duplicique morbosâ affectione cum affici observo: quorum prima est morbus in mala compositione, angustia scilicet, ob quam assumpta, dum non permeant, gravant, & vellunt orificium ipsum, adeo exquisito sensu præditum, ut dixerit Gal. nullam nostri corporis partem acriori sensu pollere: qui nunc potissimum viget, ob vomitum, & alia accidentia ab assumpto antimonio: ut propterea non raro succedat dolor ipsius acutissimus, cum sudore frigido, & insigni virium languore, verbo, cardiacâ passio, non tantum sic dicta, propter consensum cordis, ratione vicinæ, quo nomine etiam cardiogmos & cardialgia vocantur alii dolores oris ventriculi, cum leviores, tum graviore, cum a causa externa, tum ab interna, os ventriculi afficiente: sed etiam propter sudorem & virium imbecillitatem, quo sensu usurpatum nomen cardiacæ passionis a Cornelio Celso lib. 3. de re Medica cap. 19. his verbis:



Cardiaca est totius corporis imbecillitas cum sudoribus propter oris ventriculi languorem. Quinimo hic non upaudus venit hic affectus, qui ad Tyticopen proximè accedit, propter totius corporis refrigerationem. Quas omnes ob e uas tyncope confunditur cum Cardiacæ pallione a Celio Aureliano 1. Acutorum cap. 30. Dolor autem hic in calu nostro hic in ore ventriculi, ab assumptis cum liquidis tum solidis: magis vero ab illis, quoniam sunt tenuitate sese magis insinuant in fibrosam & musculosam substantiam ipsius: atque inter liquida magis officit vinum, quoniam penetrat magis, & tenuioris est substantiæ, prout & acetum; nimis autem hac molestum est propter epicrasticam & anodynā ipsius scilicet cutem: facilius descendunt assumpta post somnum, quoniam ab eo hebetatur sensus oris ventriculi: atque difficilius deglutitur panis maceratus, quam siccus, quia ex humiditate glutinosum quid illi accedit, ejus ratione insinuat veluti, ac propterea agere descendit.

Causa hujus angustix est tumor durus, scirrhus, doloris expertus, in ventriculo genitus potius ex humore melancholico in perillustri patiente predominante, ut ex situ partis affectæ, & actionibus lais patet. Utrum autem in interna vel externa ventriculi tunica hæreat, non ita in propatulo est. Crediderim tamen in externa tunica situm, cum appareat insignis protuberantia exterior, atque ex compressione musculorum lumborum dolor continuus in illa parte foveatur, ut dum ita comprimetur vitatem ventriculi, propter orificium superum ipsius, angustix propositæ causa est, ob quam retetere patiens, quod si modicam assumptorum copiam excesserit, majori molestia afficitur; nisi statuimus esse atheroma quoddam ex dura & veluti lipidosa materia, ut fieri solet in membranis corporibus, a quo cum comprimantur rami illi arteriæ aortæ descendentes, caliaci dicti, mirum non est, si circa ipsum tumorem adit continua pulsatio; non secus ac in hypochondriaca observari solet pulsatio aortæ descendentes circa umbilicum.

Hicque sic habentibus, necessario extenuari debet corpus, deficiente alimento: dejectiones ut plurimum sunt albicantes propter lætis copiam, licet nonnunquam sint biliosæ, imo & aliquando successit diarrhæa, propter cruditates in ventriculo genitas. Peritit tamen in ore ventriculi fames, cum propter exquilitum magis corrugationis senium, tum ob majorem suctionem a toto propter alimenti defectum. Et hæc de præsentis affectus eidentia, atque causis dicenda habui, in casu perobsuro, & difficili, & ut censeo prorsus incurabili. Removeri enim non potest impeditus descensus assumptorum, nisi extirpetur tumor, & inquam causa sine qua non.

Quod ut fiat, materia illa vel insensibiliter digerenda est, vel sensibiliter evacuanda. Pro insensibili ejus resolutione necessarium duco, duram illam emollire, & attenuare, ac deinde caloricis & exsiccantibus digerere. Pro evacuatione sensibili, præcedat opus est suppuratione, seu ipsius tumoris in abcessum conversio, ejus disruptio, & materiæ in pus conversæ sensibilibus evacuatio: ac tandem deterfio, exsic-

catio & cicatrice facta obductio. Atqui neutra intentioni satisfacere potest per medica præsidia sapius jam usurpata toto anni spatio a Medicis doctissimis, cum Mantua, ubi degit patiens perillustis, tum Patavii, ubi ex Medicorum etissimorum consilio usurpata fuerunt validissima emollientia cum interna, tum externa, cerata in primis, & emplastra, cum pinguedinibus, & gummatis emollientibus, stillicidia item ex oleis emollientibus, lica thermalia bituminosa atque omnia permixta cum subatringentibus, ratione symmetrix, & roboris partis affectæ, juxta Gal. præceptum: a quibus tamen nulla tumoris emollitio fuit observata: sine cujus ope neque resolutio, neque suppuratio speranda est. Quare solo prognostico committendus æger.

Quod si tumor esset externus ita, ut certiores fieri possemus an vere sit scirrhus, vel atheroma, tentari posset ipsius extirpatio operatione manu facta. Verum hanc prohibent reconditus ejus situs, sub partibus principibus & apprimè necessariis, a quibus qualicumque manuum operatione interdicatur. Propterea sat tutum putamus si vita in longius protrahi possit alimentis boni succi, & nutrientibus parum & sæpè assumptis; observando interim numquid natura ad validiores operationes nobis aditum patefaciat: præscribendo vini loco adeo molesti nullam dilutā, coriandro conditam, vel cerevitiā non parum nutrientem: vel vinum ex ceratis aut ex passulis in co ebullientibus paratum, minus detergens, nec ita facile sese insinuans in fibrosam substantiam oris ventriculi. *Benedict. Sylvæ. Consul. & Respons. Medic. Cent. 1.*

#### Cardialgia legitima.

Juvenis Mercator 30. annum agens, temperamenti totius & jecoris calidi & sicci, gracilis habitus, vini potor egregius, superioribus annis biliosis diarrhæis frequenter obnoxius, duobus abhinc annis, videns omnino suppressis tertianis febribus exquisitis bis in anno corripitæ cepit, sed quod gravius, cum tanta ventriculi erosionem, morfu atque dolore, ut etiam ad impatientiam feratur, licet ultra febris principium non daret, sed unius horæ spatium esset, vomitu, atque alui dejectione subortis, materiæ biliosæ, flavescens & copiosæ. Invaluit autem hic affectus tertio quoque die, cum ipsa febre, 4. aut 5. paroxymis solvi solet. Modò ætivo hoc tempore hesternā die denuo invaluit febris, cum eodem symptomate, a quo, ut alias, unius horæ spatium, prout a febre ante horam duodecimam erat liberatus est. Febris autem cum rigore corripuit, quem secutus est calor vehemens acris & mordax cum pulsu magno, celeri & frequenti, urina subflava, & vomitu, atque per alvum dejectione biliosæ materiæ. Quare de agendis tum in acceptione, tum extra eandem nostrum consilium exposcit.

De febris genere non est quod dubitemus, biliosa namque est, ut attestatur invasionis modus, cum rigore scilicet, oris ventriculi morfu, flavibilis vomitu, ac dejectione, pulsu magno, celeri, atque frequenti, calore acris



& mordaci, urinaque subflava cujus indicium certius quinetiam præbent temperamentum totius & jecoris calidum & siccum, anni tempus æstivum, prægressus immoderatus vini usus, tandemque suppressæ biliosæ diarrhææ. Quoniam vero eodem modo & tempore, quo præterita, hæc febris accessit, tertiana propterea exquisita, cum illis statuenda est, præsertim cum accessio duodecimam horam non excesserit, neque hucusque secunda die novus paroxysmus invaserit.

Sævum autem symptoma, quod febrem comitatur, oris nimirum ventriculi morsus quod casu nostro, ut principale potius quam superveniens ad se curationem trahit, Cardialgia vera atque legitima nuncupandum à parte affecta. Symptoma sc. in actione animalis tactrice depravatè læsa, os enim ventriculi Antiquis Cor vocatum, vel cum Gal. ob cordis viciniam, vel cum Ætio ob sæva symptomata, quæ oris ventriculi læsionem sequuntur, cujus dolor, mordaci (licet Archigenes dolorum proprietates exprimi non posse falso existimaverit) ob exquisitum sensum, quo ad ciborum appetentiam a natura donatum est copia propterea nervorum à sexta conjugatione contextum. Ita autem distinguitur à passione Cardiacâ, in qua fit dissolutio solida substantiæ oris ventriculi, cui syncope solet succedere, quæ tamen etiam sine ullo dolore fieri potest. Distinguitur quoque à Cardiogmo, in quo passio parùm durat, cum ab humoribus tenuioribus biliosis in ventriculo effusis, non vero ejus ori adhærescentibus ut in Cardialgia, proveniat. differt etiam ab anxietate, quæ & sine dolore, & sine vomitu, sed cum sola quadam instabili inquietudine fit, quæ ab infarctu frigida materiæ procedit ab angore, inquietudinem brevioris tantem inducente, ut qui ab habitu putrido, & aura venenata ad os ventriculi elevata dependeat. Ab attritione ventriculi, in qua affectio observatur, cum ventris torminibus, profluvio, ac tanta pulsus alteratione, ut febricitare Pat. videantur, licet non febricitent, ut Gal. observavit in Antonino Imperatore, in quo cibus corrumpēbatur, ejusdem portione in status conversa. Tandem distinguitur ab astrictione Ventriculi ab Ætio solo descripta, quæ contingit superno, infernoque ventriculi ore ita adstrictis ob siccitatem, ut nec flatus nec vapores erumpere possint, qui propterea accensi febris speciem exhibent, quæ affectio demum cedit coctione absoluta, & cibo descendente.

Causa autem hujus affectus, humor biliosus est acris & mordax, continuum solvens, ab intemperie calida & sicca jecoris genitus, non parùm etiam eandem fovente copiosiori vini potu, qui humor cum præteritis quidem annis in venis congestus ab irritata natura per alvum extruderetur, ut in Eudemo, ejusdem evacuatione suppressa febris tertiana statim invaserunt, quarum principio eadem bilis commota, ad alvum partim transmissa, partim regurgitans ad ventriculum, & crassiori parte ori ejusdem adhærens morsu Cardialgicum dolorem excitat, qui recedit dum exiguo temporis spatio irritata expultrix eandem vomitū rejicit.

Affectus equidem gravissimus, ob sæva & perniciofa symptomata, quæ illi interdum succedunt: Cardiacam scil. passionem, syncopen, & mortem ipsam, licet febris omni periculo vacet, nulla siquidem pars nostri corporis exquisito adeo sensu pollet, nec in consensum trahit utrumque principium, Cor nimirum & Cerebrum, ac ventriculi os, idque propter nervorum à cerebro manantium magnitudinem & copiam, unde merito dicebat Gal. quod os ventriculi in consensum sui animam ducit. Quinimo observavit Trall. quod si humores valdè erodentes & ventriculi exquisitus sensus simul concurrant, ægri citò oriuntur.

Nostræ igitur partes eruat, evacuantibus, præparantibus, alterantibus feberi prospicere, prout extra Cardialgiæ accessionem præsertationi, in accessione vero curationi incumbere. Prævertunt autem Evacuantiâ, Revelleantiâ, interceptantiâ, & ventriculum corroborantiâ, ad quæ diebus intermissionis animus convertendus, quare hodie, secunda scilicet die, de medicamento minorativo exhibendo cogitatum fuit, quod tamen distulimus in sequentem diem, quinque horis ante accessionem præbendum, ut materiæ biliosæ à jecore ad os ventriculi regurgitanti occurramus, sicq; fiat ejusdem cum evacuatione diversio. Interim tamen duos clysteres infundi suademus, manè alterum alterum vespere. Medicamentum vero erit cassia, cum pulpa Tamarind. addito Tart. ri crem.

Sanguinis missio hic locum non habet, cum bilis peccet, eaque satis sincera per alvum ac vomitum excernatur, tribus namque solis casibus Cardialgia admittitur. Primò præsentē jecoris intemperie calida, servidissimum sanguinem producente, ex quo neque carnosa neque adiposa substantia progigni possit. Sic apud Hippoc. vir in Oeniade vehementissimis ventriculi doloribus correptus, secta vena in utraque manu, & sanguine copioso educto, liberatus fuit. 2. quando ichor sanguineus à jecore, vel à toto in ventriculum irruit, ex suppressa aliqua consueta hæmorrhoidali evacuatione. Tertiò quando Cardialgia provenit à suppressis mensuris. Ab hoc quoque fonte clysteres etiam purgantes hora ante accessionem injecti, revulsionis causa desumendū more Petri Salii. Frictiones quinetiam, ligaturæ, cucurbitula sicca, quinimò & Vesicantiâ, urgente necessitate non omittenda.

Bilis verò contemperanda vel Decoct. cicchor. Endiv. Acetos. Portul. Viol. addito Julap. Viol. Rosac. Syrup. de Papav. vel sero. distillat & chalybeato ad ℥j, β. vel aquis distillat. Acetos. Endiv. cucurbit. cum syrup. rosac. Violac. de ribes, de Berber. Quæ si crassior evaserit, præberi poterit aqua hordeacea, vel serum depuratum cum Julap. acet. aut syrup. de acido Cit. & Lim. Perdurante verò Cardialgia, & valde minorata materiâ, ad interceptantiâ humores ad ventriculum decurrentes tuto deveniri poterit, duabus horis ante accessionem præbenda. Sint autem adstringentiâ & incrassantiâ, ut.

℥℥. Pulv. Margar. præpar. ʒj. Terra sigill. aeræ ʒβ. Aquæ scorzon ʒiij. Vini Granat. ʒij. Tinctur. Corall. gutt. v. m. & ad cochlearia sæpius assumantur ante accessionem.



Vel ℞. syr. de papav. ʒj. & in Cardialgia pravæ conditionis.

℞. Ther. rec. ʒß. Margar. præpar. ʒj. m. f. b. & sur.

Dum hæc sunt extra accessionem, semper aliquid os ipsum ventriculi corroborans adnuitur, internum & externum. Gal. enim dum quatit, num evacuationi materia magis, an oris ventriculi roborationi sit incumbendum, sic quæsto respondet, multos se vidisse defunctos, alios ad extremum periculum perductos, cum Medicos magis curare, quam corroborare tentarent. Intrinsecus itaque præbeatur conserva rosar. vel bolus ex Margaritis & corallius, vel ossa panis in vino Granatorum, de quo Hipp. *Mulier Cardialgia torquebatur; nec malum sedatum est prius quam potentiam succo mali punice adpersam comedisset.*

Extrinsecus apponi poterit regioni ventriculi ossa panis, vino autero imbuta, & pulvere rosarum, sumach, & Malliches aspersa, vel emplastrum de crusta panis Montagnæ, cum succo agrestis, aceti loco paratum. Aëtius commendat spongiam infusione rosarum, cum aceto madefactam. Et hæc ad præservationem.

Pars autem curativa perhibetur Anodynus primo 2. causam respicientibus. Anodyna autem sunt vera velipuria, omnia tamen doloribus conferunt, à quacunque causa exortis, solutionem enim continuè spectant & sensum partis, sine quibus color non fit. Anodyna vero sunt interna & externa. Interna jus Althææ, Malv. intestinorum Caltrati cum butyro recenti: emulsio amygdal dulcium. ol. amygdal. externa ol. amygdal. chamæmel. adeps vituli, catrati, omenta vitulina, vervecin, iuilla, ol. amygdal. & rosac. imbuta, placenta ex ovis, etiam dictis oleis parata. Anodyna spuria, narcotica quoque dicta, interna esse possunt emulsio sem. Papav. alb. extracta cum Aqua lactucæ, syrup. de Papav. ad ʒj. Theriaca recens, philonium romanum recens, Nepenth. Querc. ad gr. j. vel. ij. externa erunt lomenta ita parata.

℞. Cap. Papav. alb. num. vj. sem. hyoscyami ʒiij. tol. viol. nymphetæ an. m. j. Aq. con. lbxj. m. bull. ad consumpt. tertix; pro lomento, quo amoto, huiusmodi inunctio adhibeatur.

℞. Ung. Popul. Malv. an. ʒj. ol. nenuph. ʒß. m. f. ut linim.

Verum legitima & propria curatio est causarum ablatio, hoc ordine peragenda. ingruente accessione, vomitus statim provocandus Galen. exemplo, qui vel oleo simpl. vel aquæ misto vomitum ciebat, Aëtius aqua tepida, nos vero iure carniuum, ad ʒvj. cum ol. amygdalar. & julap. acet. an. ʒiij. concitato vomitu, perdurans accessio signum exhibet bilis crassioris ventriculo adherentis, ideo exhibendum julap. ad ʒiv. vel v. & hora ab hoc anumpto, nisi sponte vomitus iterum procedat, exhibeatur oleum amygdalarum recens, ad ʒv. ita enim materia incisa, & deterfa à julapio, & attenuata per vomitum aut per alvum facilius educetur. nec ullum metum iniiciat julapium acetosum, bilem siquidem id in pituitam, & pituitam in bilem vertit, ut docet Avicenn. statim vero à vomitu, morsu sedato, aliquid adstringens & roborans extrinsecus Galen. consilio apponendum.

Ita verò procedendum præservativis auxiliis, materiam iterum imminuendo, bilis fervorem & febrilem calorem contemperando, eandemque à ventriculo revellendo, atque in progressu intercipiendo, osque ventriculi roborando, curativis vero, modo dolorem anodynus, vel etiam narcoticis demulcendo, modo laxantibus, vomitumque cientibus materiam biliosam educendo, usquedum Cardialgia, & febris imminuantur, atque omnino auferantur.

Addita congrua victus ratione, circa quam notat. Trall. quod tarde cibum capere valde noceat. Ideo Celsus ante ipsum parum & sæpè cibum exhibuit, cui subscripsit quoque Aëtius. Cibi autem sint refrigerantes, & potius ventriculum confirmantes. Sic mala punica, pyra conveniunt, vini tamen usus non est accelerandus, quod exigente necessitate, sit austerrum & gelidum, ex Cello, sub. stringens, ex Aëtio; etenim præterquam quod os ventriculi roborat, celeriter etiam nutrit, quicquid dicat Mercurialis, hoc enim confirmatur expressis verbis ipsius Galen. Hæc pro præsentium febris tum Cardialgiæ accessione sufficiunt, prout plura superessent pro præservatione ab aliis imminutibus, ad quam suis loco, & tenore, tum sanguinis missione, tum electivè bilem purgantibus & jecoris fervorem contemperantibus opus fuerit, viris Excellent. quam notissimis. *Joan. Raym. Fortis Consult. & respons. Medic. T. i. cent. 2.*

#### Cardialgia spuria.

Ventriculi dolor corrosivus, toto elapso anno, per intervalla ordinata primo, & tandem inordinata juvenem Illustrissimam afflixit & adhuc num rarius invadit. Cardialgicus si lubet, quanquam non adeo legitimus appellari poterit, non modo quia laeditur ventriculus, verum multo magis, quia & prima vice & alias sæpius cum febre apprehendit, quem à bile quidem, copiosæ tamen pituitæ immista, incepisse & perdurasse certo existimari potest, ob ejusdem diuturnitatem, qua pituita à ventriculo ad mesenterium detrusa, omnino renittebatur, nulla licet secuta ejusdem extra corpus excretionem. Huiusmodi autem excrementa, tum ab inbecillitate ventriculi, tum jecoris fervore, originem duxerunt, à quorum intemperie iis jugiter productis, invicem mistis, & in mesenterio putrefactis, febrem quoque sæpius toto hoc tempore repullulasse credendum, prout ab iisdem non putrefactis dolores quandoque sine febre fuisse excitatos. Nec mirum videri debet, si primò hebdomadariam periodum servaverint, intemperata siquidem earum partium diathesi, tanto temporis intervallo ea excrementorum copia producebatur, quæ accumulata dolores illos renovare poterat, quæ tamen temporis propotio obliterata est, magna secuta mutatione ab edito partu. Sic nec novum accidit, quod fere ad syncopen perducta fuerit Illustriss. Patiens, siquidem *Nulla pars nostri corporis adeo exquisitum sensum habet, nec ita in consensum trahit utrumque principium, ac ventriculus ipse.* Ideoque iure dicebat Gal. quod os ventriculi in consensum sui animam ducit. Quoniam verò inultas viscere-



ribus intemperies non curavit Excell. defunctus: ideo ab excrementorum colluvie postmodum febres inaequales, cum inaequali rigore fuerunt observatae, excrementis iisdem per partes sentientes una cum basitibus elevatis circa viscera naturalia, & quidem inordinate decurrentibus; cuius etiam humorum redundantiæ indicia præbent sudores, circa tebrum initia manantes, prout caloris ad viscera refluxum significavit genarum rubedo, paucis horis ab assumpto cibo eas perludens. Et quoniam vix credi potest, hoc temporis spatio illustris Patient. ab obstructionibus immunem se præstare potuisse, ideo easdem delitescere pro certo habeo, & quidem ab his terreis atque melancholicis redditis exhalationes elevari, quæ lumbos, femora, & brachia, propriis acrimonia & aciditate percellentes, vagos & errantes dolores excitarunt, nunc vero coctionibus ventriculi saltem, si non appetentiæ, ob aciditatem nonnihil officere persilunt. Hæc autem ita se habere adeo verum puto, ut ab hypochondriaca jam dictorum humorum, tum crudorum tum asilatorum minora materia stultenta atque fuliginosa elevata, in penitioribus mesenterii & viscerum partibus conclusa, dolores & cruciatus lancinantes producere majori ex parte nunc existimem, supposita tamen necessario humorum minora jam dicta cujus portio recentior ac crudior a calore liquata solutis doloribus per urinas copiosas & aquosas excernitur. Quoniam vero affectus huiusmodi rari quodammodo sunt, eorumque causa a Medicis ipsis, vel maxime exercitatis, nedum a Patientibus, non adeo facile investigari potest, quid mirum si ad veneficia, & fascinationes confugiant cum tamen ut plurimum pertinax & inextabilis lateat melancholica qualitas.

Et licet affectus huiusmodi contumaces esse soleant, & ægre medicamentis cedant, cum præter numeram, & viscidiora a frigiditate & crassorum humorum a cōsoliditate, intemperiem, inaequalem quoque causam habent, attamen quia Patient. juvenis, & medicis præceptis obtemperans est, nec manifesta tactu percipiuntur obstructiones continuæ, ideo salutem, licet non adeo brevi tempore, & facile, polliceri possumus, accommodata curatione, quæ tuto procedet, si humores jam geniti & corpore educantur, intemperies remittantur, & partes roborentur. Quibus intentionibus, aliqua parte, opportunissime consistendum fuit, ideo reliqua agenda ordine executivo proponam.

Primo itaque leniens ex syr. & mel. ros. sol. vel ex lenit. & tart. præmittatur, mox unico interposito die, aqua testuciana ad lb. iv. exhibeatur cum vehiculo mel. ros. sol. secundo die iteranda ad lb. v. quæ nisi secunda vice, clara, & sine excrementis excernatur, repetatur quoque tertia, sic enim tum ventriculi, tum primarum viarum deterfusio atque ablutio, necnon exsiccatio obtineri poterit. Inde ratione hypochondriorum ad succos depuratos malv. & borrag. erit deveniendum ad 3. iv. in iure cichoraceis alterato, 12. aut 15. dies, mox ad usum feri capr. aut asin. depur. per quinque dies, alternatim, ad lb. iv. & v. præmissis vehiculo deject. aut syr. ros. sol. aut pot. clarif. à quibus tandem magna fiducia utor.

diutius lacte alinino de more, exhibendo ad 3. v. cum semicochleari sacch. m. progressu lacte ad 3. x. cum pleno sacch. cochleari, mane quatuor horis ante prandium. Verum eodem tempore 15. dies summo mane ventriculo stillicidium erit adhibendum, ita paratum.

24. Ol. amygd. lb. iv. mastic. lb. ij. vini albi generosi lb. j. sol. rec. absint. pont. menta virid. an. m. j. nucum myrist. contus. num. ij. cort. cit. rec. 3. j. cinam. integ. 3. ij. m. bull. ad consumpt. vini & lactis torti express. colat. servetur pro stillicidio, calide administrando, mane ante lactis usum.

Interim si recrudescant dolores, tutissimum erit auxilium clyster. ex lacte vaccino, in quo dissolutum sit pilul. rec. rom. ad 3. ij. stilico, namque eosdem sedabit, & somnum conciliabit, duabus tamen aut tribus post horis movenda alvus, ut excernatur clyster. ne nimium soporem inducat.

Quibus omnibus consueta victus ratio, quam laudo servanda. Caveat autem ab intaratu ciborum, his enim casibus nihil peius, ex Avic. quam comestio supra comestionem, atque prima mensa de more jus putæ aut vituli malva aut borrag. alter. sorbeat. Vina generosa vitet, & reliqua medicis intensionibus correspondant.

Quæ jam dicta, quoniam ab Excellentiss. Viro prudentissimo administranda erant, profutura spero, ita meritis Illustriss. juvenis D. O. M. annuente Joan. Raym. Foris Consult. & Respons. Medic. Cent. 2.

Puella viginti annorum jam à multis annis de rosione, & compressione circa ventriculi regionem coqueritur, ructus continuos, ædidos, in hypochondriis murmura & rugitus audiuntur: torminibus ventris frequentibus & dolore capitis infestatur. Colore est pallido & cachectico, mensæque non decenter munt.

Afficitur in hac ægra ventriculus: ut patet ex rosione & compressione circa eius regionem, quæ est circa mucronatam cartil. ginem, percepta, & ructibus acidis emissis. Afficiuntur item viscera, hepar scilicet & lien in hypochondriis sita, nec non pancreas, & caput, quod probant murmura in hypochondriis audita, & tormina ventris, ac dolor caput mentans. Deinde totum corporis habitum & uterum affici, testatur pallidus & cachecticus color, & mensæ non decenter, sive parcius, & inordinate fluentes.

Morbus præcipuus, qui ægram nostram affligit, est intemperies ventriculi & vicinorum viscerum frigida & acida, imò etiam & acerbata, quæ rosionem & compressionem ventriculi, & ructus acidos: item murmura hypochondriorum & rugitus ac ventris tormina præiens, cardialgia, sive cordis dolor vulgo appellari solet: sed ventriculi dolor merito appellandus, cum hic non cor, sed ventriculus præcipue afficiatur.

Hæc intemperies ventriculi & vicinorum viscerum frigida, acida & acerbata est manifesta ex acidis ructibus & rosionibus atque compressionibus circa ventriculi regionem perceptis; illa enim producit acidum, acerbum & crudum chylum, qui ventriculum pungit & constringit, & quia ex eo oriuntur obstructiones in



in partibus variis crassique succi & vapores, hinc nascuntur omnia illa symptomata, quæ in casu proposito narrantur.

Nam chylus ille crudus, acrimoniâ & acerbitate sua pungens ventriculum, facit in eo dolores rotivos & constrictorios, in vapores crassos mutatus, qui ob crassitiam suam commode per poros ventriculi & intestinorum distribui nequeunt, facit ructuum acidorum per os excretionem, & per vicina viscera discurrendo, & partes eas cum sonitu agitando, & doloris ventrem vel tunicas intestinorum lancinando, facit in hypochondriis rugitus & in ventre tormina. Ad cor vero per venas mesaraicas & lacteas, & inde in caput delatus, & ibidem cerebrum & membranas vellicans, efficit capitis dolorem. Ad habitum verò corporis cum sanguine crudo delatus, colorem pallidum & cachecticum. Ad uterum denique delatus, ibique poros ejus obstruendo, languinemque ad commotam excretionem ineptum faciendo, facit mensium parcam & inordinatam excretionem.

Morbus hic propter magna symptomata, quæ inducit, periculum hypothyriæ, hydropis, aliorumque gravium affectuum, minuitur. Atque ideo diligenti, & citâ curatione erit impugnandus.

Quæ in intensiori & symptomatum per contraria impugnatione consistit.

Primo itaque utatur talibus pilulis usualibus, quæ leviter purgant, ventriculumque roborabunt.

℞. Pil. de hiera simpl. ʒi ʒ. alephanginar. assaiereth, agavei trochisc. an. ʒi ʒ. rh. barb. elect. ʒʒ. cinnamomi ʒj. cum syr. ros. sol. q. s. fiat pilularum massa, de qua capiat singulis septimanis ʒʒ. cum pomo cocto, mane jejunò ventriculo, & deinde porro utatur hoc electuario.

℞. Conserv. rosar. antiq. flor. cichorii ana ʒj. conserv. scolopendr. cort. citri condit. an. ʒʒ. spec. aromat. ros. ʒiv. spec. de gemmis ʒj. spec. diatriasantal. cum duplicato rhabarb. ʒj. cineris intestinorum & pelliculæ ventriculi gallinæ ʒi ʒ. h. aturæ chilibis præparat. cum aceto ʒʒ. trochiscor. de rhabarb. ʒiv. de cupatorio ʒi ʒ. cum syr. de mentha q. s. f. electuarium, de quo capiat quantitatem castaneæ majoris, mane duabus horis ante prandium, superbibendo haustum vini generosi, aqua absinthii diluti.

Post singulos pastus utatur de hoc medicamento.

℞. Carnium cydon. saccharo condit. ʒij. conserv. rosar. antiquæ ʒi ʒ. cortic. citri condit. ʒʒ. coralli rubri ulii & loti, rasuræ eboris, cornu cervi an. ʒj. spec. diacydon. ʒj. cinnamomi ʒʒ. sacchari ad pondus omnium, f. Mixtura de qua capiat cochleare unum post singulos pastus.

Ventriculi regioni scutum hoc stomachale admoveat.

℞. Emplastri de mastiche, pro stomacho an. ʒj. pulver. rad. galengæ ʒij. cariophyllor. ʒʒ. ladanii ʒj. coralli rubri ʒʒ. cum ol. de absinth. f. emplastrum extensum in corio ad formam luti. Hepatis regionem semper mane inungat hoc linimento.

℞. Ol. de absinthio, nardini an. ʒij. ol. cydon. ʒj. spic. utriusque ʒj. rad. cyperi, asari, santali rubr. & albi an. ʒij. ceræ q. s. f. linimentum.

In dieta, aer sit temperatus. Cibus offeratur succocitacilis, corruptioni minus obnoxius, ex aviculis, capis, perdicibus, pullis gallinaceis, jussulis carnum, conditus succo arantiorum. Potus sit vinum tenue, cerevisia mediocris.

Motus sit corporis moderatus, ut & Somnus. Alvus in dies natura vel arte respondeat. Marmor vitetur præcipue, ut & alii vehementiores affectus. *Henric. Regim. apud Theodor. Craanen Medication. lib. 3.*

### Observationes.

*Pro cardialgia cum impedimento veluti bolo in faucibus.*

Cuidam femine de dolore stomachi, cum nausea & difficultate aliqua deglutendi, ac si buccella in faucibus hæreret, jam longo tempore conquerenti, cum sæpe varia ac inter reliqua etiam vomitoria exhibita, nihil effecissent, illaque uix vomere cuperet, & adhuc robusta esset, dedi aquam destillatam ex nucibus viridibus, cum raphanis prius in aceto maceratis, qua alias vomitum movere solitus eram, sed in illa nihil fecerat, itaque addidi vini albi, in cuius ʒij. stibii vitreati pulv. gr. iij. macerata per noctem fuerant ʒʒ. ut biberet, quo facto copiosissimam materiam quinquies evomuit, & postea ab ejusmodi cardialgia & impedimento in faucibus, penitus liberata est. *Felix Platerus Observ. lib. 2. pag. 438.*

Matrona quædam honesta ac pia, cum ultra annos duos de dolore ventriculi conquesta fuisset, nec ullis remediis ventriculum roborantibus, aut per inferiora purgantibus sanari potuisset; tandemque ex consilio Medici cujusdam celeberrimi, vomitivum accepisset, tristum cori luridi fumo exsiccati, quod ante duos annos inopinanter cum difficultate tamen deglutierat, maxima cum admiratione adstantium evomuit, & brevi plenissime convalevit, utinam semper causæ morborum tam facile debellari possent. *Guil. Fabricius Hildan. Observ. 33. cent. 4.*

Filiolus meus Cardialgia, seu passione cardiaca, infantibus familiari malo affligebatur, illi secretum experimentum nostrum magno cum fructu applicatum est. Mucago sem. cydonior. misceatur cum pingued. gallinæ, atque hoc linimento ter in die ungatur orificium stomachi, deorsum versus costas spurias. In plerisque sequitur hanc unctionem dejectio excrementorum virescentium & fetidorum, qua cardialgia cessat. *Hieron. Kennerum Observ. 71.*

Quidam cardialgia laborans, insumpto sequenti haustulo, statim sanus factus est, nam multos acres, mordaces, & virulentos humores, qui juxta os ventriculi obhærebant, vomitu propiciebat.

℞. Aq. benedict. nostr. ʒi ʒ. vini absinth. ʒi ʒ. m. f. haustulus, quo solo sanitatem recuperavit. *Martinus Rulandus curat. 30. cent. 5.*



*De cardialgia miris stipata symptomatibus tandem lethalis.*

Vir Senatorii quondam apud nos ordinis, temperamento sanguineus, corpore prædatus obeliiori, doloribus quidem obnoxius Nephriticis, cæterum sanus & bene valens. Anno ætatis suæ 54. ex mœnore animi ob calamitosissima hæc tempora sensim, sine febris tamen manifesta, contabescere cœpit, de nullâ re conquiescit aliâ, quàm de præcordiorum compressione & Anorexia; credidit tamen hæc omnia à calculo quodam oriri & à neglecto usu thermarum singulis annis aliàs consueto. Sed circa festa Natalitia rem serio agi, & dolores quasi morsus ex sinistro latere versus cor ascendentes sensit, qui etiam de die in diem exacerbati singulis tamen trinis diebus tantum vehementius infestantur.

Horum prodromus semper erat nasi extremitatis refrigeratio sentibilis. Tandem singulis diebus circa vesperam recruduit hic morbus, vere *indefessus*, ita enorvis, ut clamare vehementissime coactus fuerit, interea manus, & pes dextri lateris continuo tremebat, sinistrum vero latus, ubi tamen dolores erant, quievit. Sic quandoque per totam noctem misere divexatus circa auroram, recedentibus cruciatibus sensit levamen. Alvum perpetuo adstrictum, clysteria aut propinata laxativa solvebant quidem, sed statim commovebant etiam dolores. Excrementa sive per purgationes sive naturaliter reddita, quod sub finem morbi (cum ex metu cruciatuum nec clysterem, nec laxativum sumere vellet) sed non nisi, de tertio in tertium diem factum, semper erant solida & bene concocta, ac si optime sani essent hominis. Pulsus nunquam mutatus, nisi sensim debilior factus. Deglutitio insuper mirum in modum erat læsa; nam solida deglutiebant facillimè, liquida verò neutiquam, ita ut sitim intensam, absque tamen calore febrili, nunquam potuerit potu restinguere, sed aquam cochleatum tantum, ut & alia medicamenta liquida sorbere debuerit, statim superveniente enormi quâdam salivatione quæ descensum liquidorum impedivit, quamvis & fluxus hujus pituitæ lentæ, ac viscidæ semper, & per totum morbum usque ad finem vitæ duraverit, ut quandoque singulis diebus aliquot vascula hæc materia impleverit. Tandem ex vehementia morbi ita contabescens, ut cutis ossibus hæreret, circa initium Maii hujus anni placide exspiravit. Dolor adeo pertinax nullis cedebat remediis, nisi exhibitis granis duobus laudani nostri, de tribus dicti, cum Magisterio perlarum vel oculorum canceri in aqua flor. arant. Tum enim ad miraculum usque quasi in momento omnis evanuit cruciatus & noctem insequentem cum somno placidissimo transiegit patiens: Cætera omnia quæcumque adhibita nihil profuere, vel dolores exacerbant. Caroli Raygeri.

*Cardialgia cum molesto ventriculi sensu, & dysphæa.*

Anno 1671. 10. Februarii vocatus sum ad C.

S. gravi cardialgia pressum cum insigni respirationis difficultate ac permolesto ventriculi sensu, addidit videri sibi mobile quid in ventriculo oberrare varia circumvolutione ultra medium œsophagum crebro ascendens, quod respirationem janijam intercepturum videbatur. Motum naturæ examinans vomitorium statim exhibui ex oxymelle simplici ac squillitico, unde per repetitos vomitus magnam quantitatem mire gravis pituitæ rejiciens æger, statim liberius respirare occipit, & à tristi illo ventriculi sensu liberari, sponte per triduum succedente copiosissimo ptyalismo, ac si mercurialibus usus, postea ventriculo iterum corroborato satis rectè valuit. *Henrici à Moimchen.*

CARDIOGNVS.

Vid.

CARDIALGIA.

CARIES.

Caries dicitur *ῥυτίς* & est morbus solutæ unitatis in partibus duris, ossibus videlicet cum deperditione substantiæ a materia acris & corrosiva proveniens, & respondet ulcera quod est solutio itidem unitatis sed in partibus mollibus, carne scilicet &c. De hac vide tum ulcera cum carie in genere, tum in specie caput de Spina ventosa. Cariem pudendorum quod spectat idem significat quod Caroli.

*Curationes & Observationes.*

*De carie ossium ubi de euphorbii usu.*

In ulcerum curatione nihil fermè occurrit, quod Chirurgo majorem pariat molestiam atque plus negotii faciescat, quàm si ulcus cariem in osse sibi adjunctum habeat, præcipue si profunda fuerit, propter humorem osi imbutum, ad hujus autem humoris exsiccationem, & ossis deciditiam tum ab antiquis tum neotericis Medicis ac Chirurgis præstantius cauterio actuali nihil excogitatum est, quo & ego non raro maximo cum fructu, usus sum. Post cauterium actuale, euphorbium hoc in casu secundum nostrum locum vindicare facile concedo, quandoquidem non solum quia acre est & calidum in quarto gradu, humores osi imbutos exsiccet, sed videtur occultâ quâdam facultate hic convenire, non immerito itaque a Dioscoride, Avic. & recentioribus Medicis in cariosis ossibus præ aliis medicamentis celebratur. Ego etsi hæcenus in cariosis ossibus euphorbio maximo cum fructu usus fui: una tamen mihi occurrit difficultas, nimirum an verum euphorbium, cujus Dioscor. mentionem facit, hodie ad nos advehatur? scribunt enim Dioscor. & Avic. beneficio euphorbii cariem uno die abscedere, id quod nostrum vix spatio 40. dierum præstat; neque proximam carnem adurit, quemadmodum Dioscor. & Avic. de suo euphorbio scribunt. Hinc verisimile est, aut textum Dioscor. adulteratum esse, aut euphorbium antiquorum apud nos non extare. Cæterum Dioscor. &

Avic.



Avic. monent, ut si quando quis Euphorbio uti voluerit, propter ejus summam acredinem atque Caliditatem, osium circumjacentem carnem linimentis aut ceratis diligenter ac probe communiat, ne contactu carnis inflammationem excitet.

Vetalius in sua chirurgia & Fallop. in tractatu de ulceribus non minus hac de re solliciti sunt. Hinc factum ut a multis annis Euphorbio uti non ausus fuerim propter metum inflamationis aut doloris; deinde non exigua erat molestia, circumjacentem carnem, quotiescunque ulcus curare necesse fuit, ita diligenter curare. Paulatim tamen experientia contrarium me docuit, nimium Euphorbium nostrum et si linguam & nares vehementer vellicet, in ulceribus tamen etiam si copiose eis inspergatur, nullam inflammationem aut dolorem excitare; foelici itaque cum successu in omni cariosa carne denudata, et in maturitis ulcerum labris, quotidie aut alternis diebus eo insperso utor. Ante aliquot annos cum hæc coram Dom. Abele Roscio Medico doctissimo narra-rem, miratus fuit. Qua propter petii, ut ille ipsemet Euphorbium optimum ex officina pharmaceutica sibi eligeret, & in pulverem redigi curaret, quo facto puerum 14. annorum natum, & ulcere in anteriore parte cruris (in quo anterior pars ossis tibiae longitudine spithamæ denudata erat) laborantem accessimus, tum temporis ulcus in plevi pulvere Euphorbii, deinde filamentis siccis, & emplastro di-palmatis super impositis, in alterum usque diem reliqui, quo denuo Medicum ad ægrum duxi, qui cum nullam neque pulsus neque urinae mutationem perciperet, multo minus dolorem, aut inflammationem aliquam adesse videret, rei novitate obstupuit, quod oculari demonstratione viderit, Euphorbii sævitiā atque acrimoniam in ulceribus tantam non esse, sicuti à doctissimis Medicis divulgatum atque proclamatum. *Guil. Fabric. Hildanus Observ. 92. Cent. 2.*

*Pro carie ossium ulcere.*

Puer 15. annorum ulcus habebat vetustum in meta pedio, quod à perito chirurgo per annum integrum curari non potuit, alter Chirurgus junior, cui postmodum æger commissus fuit, dilatato ulcere cariem percipit, pulverem cartagmaticum imponit ad tollendam cariem, sed frustra. Postea oleum sulphuris ad-movet, & frustra, postea me consultit, jubeo imponi prima applicatione pulverem Euphorbii cum plumaceolo ex lenteo detricto facto, multæ exiguæ educuntur ossium squillæ. Secundo die Plumaceolum nudum ad-movet, tertio die eundem pulverem denuo applicat, & plures iterum squillæ egressæ sunt, ut deinde os mundum & à carie repurgatum apparuerit, atque ulcus postmodum intra breve tempus curatum fuerit. *Lazarus Riverius Observ. 76. cent. 2.*

Ossibus cariis mandibularum, ut ignis & ferrum, item oleum vitrioli, & aqua fortis adhibeantur, non suadeo, idque propter gravissimas causas, sed inspergantur pulveres rad. Aristoloch. rot. irid. flor. angelic. thuris, corticum pini & similia, quæ separationem.

osium cariosorum accelerant, aut misceantur cum succis prædictis & melle Rosæ. ad sonam linimenti, quod si mandibula aliquo in loco extra os denudata fuerit, applicarem pulverem Euphorbii quod mirandas habet proprietates in hoc casu. Ulceribus tamen in ipso ore existentibus, quia inde ad linguam & fauces facile pervenire potest, ut inspergatur non suadeo. *Guil. Fabric. Hildanus Observ. 31. Cent. 4.*

Commendatur in hoc affectu *Benedictio Bolognino* unguentum ex agarico in hunc modum.

℞. Sais, agaric. tartar. an pt. 2q. f. pulvis & cum n.elle unguentum. Si ita non possit os desquamari, cariesque tolli, ferrum candens (quod quamvis ipsa bile amarius videtur medicamentum, ipso tamen sanguine dulcius commodum quod inssequitur exitus) sine cunctatione adhibendum. Extremis namque morbis extrema secundum *Hipp.* appropriata conveniunt remedia. *Matthias Glandorp. cap. 25. lib. de Paronychia.*

*Pro carie gallica in pudendo*

AQ. Plantag. ℥iij. pulv. squammæris, adustæ & lotæ ℥j. M. i. injectiones in virgam per syringam tepide. Hoc medicamentum facultatem habet exsiccandi sine morbo, eo minus habere cepit, & cum minore dolore & ardore mingebat, quia tamen perseverabat sanies & ardoris sensus, recurrimus ad præcipitatum quod omnium medicamentorum optimum pro san. ad. carie gallica jure merito ceteri debet, & ut moderatius fieret medicamentum, cum butyro recentissimo cumus in hunc formam.

℞. Præcipitati correcti & præpar. ℥j. butyr. rec. ℥j. M. quo intingebat linteolum angulum & stylo obvolutum intra virgam mittebat, & ad partem atrectam applicabat, extrahendo styli & relinquendo linteolum, ita tamen ut pars linteoli foris penderet, ut extraheretur. *Rodericus à Fonseca Tomo 5. Consult. 35.*

Fernelius describit aquam mirabilem, ad cariem malignam, quam vocat divinam; fit ita ℞. Sublimati opt. gr. xij. aqu. plantag. ℥vj. recoque supra cineres calidos in phiala vitrea ad dimidias. Hoc liquore styli acumen illinatur, ut postmodum attingantur ulcera bis vel ter indies supra posito unguento de tutia. *Rodericus à Fonseca Tom. 2. Consult. 39.*

Vidi quendam patientem Carolos (cariem) in virga, accepi lac mulieris tepidum & ablui membrum & sanatus est, aliquando etiam curavi ulcera virgæ cum succo millefolii, & aliquando cum succo summitatum Sanibuci, pulvis cariei ligni multum etiam prodest, maxime vero salicis. Ego *Marcellus* curavi multos patientes Carolos & ulcera virgæ cum tumefactione præputii, & dolore vehementissimo primo facta purgatione & dieta, & defensivo supraposito, & cum oleo rosato unguendo. Cum syringa injicio intra præputium lac vaccæ, capræ, vel si habeam, mulieris ab uberibus mulctum, tepidum. *Marcellus Cumanus Obs. 20. & 21.*



## CARO SUPERFLUA

Prò Carne superflua.

**E**go uti soleo linamentis excerptis ita par-  
tis.

℞. Aq. plantag. ros. solan. an. ℥iij. opii. ℥j. medullæ panis, ℥i. mercurii sublimat. ℥iij. sublimatum supra porphyritem teratur: deinde M. & bulliant ad medietatis consumptionem, colentur per pannum crassiusculum. Fila excerpta bulliant aliquandiu in hoc liquore, postea eximantur, exprimantur, siccantur, ac servantur ad usum. Sepiasarii nostri in officinis ad manus habent alumen ustum, quod optimum est, Squammam aris, æruginem aris, pulverem hermodostylorum, pulverem asphodelorum, præcipitatum omnium optimum, quia agit sine dolore; ex compositis unguentum Aegyptiacum, apostolorum, & isidis, quæ omnia carnes superfluas exedere solent. *Gabriel Fallopius cap. 18. Tract. de ulceribus.*

## CARO ABLATA

quomodo restituenda: ubi de chirurgia  
Cætorum.

De nasi amputati ex carne Brachii restitutione.

**Q**ueritur an talis restauratio sit possibilis, & videtur quod non. Primum autoritate Jo. Andrea Crucii maximi chirurgi qui lib. 2. c. 3. sua chirurgia dicit non audiendos eos, qui amputatos nasos restituere pollicentur: nam, natura, inquit, tantum artificii nemini concessit. Videtur id etiam ratione confirmari. primo quia caro brachii est musculosa, nasi non; & caro brachii est alterius temperamenti, quam nasi: itaque non videtur, quod illæ carnes possint uniri. Secundo quia in illa operatione videntur tam multæ difficultates debere intervenire: hæmorrhagiæ, convulsionis, gangrænæ, dolorum inflammationis, œdematis, pustularum, februm, ut omnino impossibilis videatur. verum in contrarium sunt autoritas variorum, qui dicunt hanc artem & operationem possibilem esse, imprimis *Calentinus in Epist. ad Orpianum* scribit, sic nasum abscisum ex brachii carne, vel ex carne servi restaurari posse. Et *Seaph. Gourmelennus lib. 1. chirurgia* testatur, sic nasum reparari posse, & scribit, quod quidem *Branca Siculus* ita nares solebat restituere. Quod idem *Gourmelennus* scribit se vidisse. Et *Guilberus Cognatus Nosterennus lib. 2. narrat*. scribit quod ille *Branca Siculus Catanus* insignis chirurgus aures, nasos, & labia sic solet restitueret. *Alexand. Bened lib. 5. c. 19. Avicenna* scribit sua ætate sæpe visum esse, quod nasus restitueretur caruncula e brachio concisa. Idem tradit *Vesalius lib. 3. c. 19. & Paræus l. 22. c. 2. sua chirurgia* scribit hoc fieri posse, & superioribus, inquit, annis extitisse chirurgo in Italia, qui id faceret. Idem etiam scribit *Fallopius lib. de*

*decorations c. 2. & Hieron. Mercur. lib. de eadem materia* Ego etiam testari possum, *Cass. Taliacotium* Professore chirurgiæ in acad. Bononiensi plurimos hac arte nasos restituisse, quorum ego aliquos restauratos in aliquibus vidi, alios actu fabricari: itaque certum est hanc restorationem esse possibilem & tapissine factam, & ideo autoritas *Joan. Andrea Crucii* non est attendenda, ut pote qui illam nesciebat, sed quia mirabilem, ideo putat esse impossibilem. Ad secundum argumentum respondeo, non esse tantam diversitatem, quæ unionem impediat, & etsi incommoda, & difficultates satis multæ circa illam operationem occurrant, non sunt tamen tanta, ut operationem faciant impossibilem.

Queritur secundo, an ex carne Brachii alterius hominis possit hæc restauratio fieri. Dico autem breviter, quod sic; quod probatur auctoritate *Calentini* supra citati ad *Horpianum* item *Gourmelenni* in chirurgia, *Tallacotti* in suo libello chirurg. qui omnes scribunt, n. sum ex carne Brachii alterius hominis separabilem esse, & probatur ratione: quia constat ex historiis lætus geminos aliquando in lucem venisse modo tronribus tantum, modo dorsi, modo ventris parte aliqua connatos. si ibi diversos non inesse connasci non fuerit impossibile utique neque impossibile erit, post partum diversos homines artificio conjungi, & uniri posse. Secundo constat sæpe in corpore nostro partes aliquas connasci quæ & substantia & temperamento magis sunt diversæ, quàm cutis aut caro musculosa diversorum hominum. Secundo quia legimus in historiis aliquando monstra genita fuisse, quæ parte trahebant corpus unius animalis, altera alterius, si ibi diversa specie animalia in unum corpus unumque animal connasci potuere, quanto magis duo corpora ejusdem speciei connasci, & arte conjungi potuerunt.

Queritur tertio, an hæc operatio sit periculosa? Et videtur, quod sic, quia videtur in ea esse periculum lethalis hæmorrhagiæ, cum tam magna carnis pars e brachio deumitur. sunt enim in brachio magnæ venæ, & arteriæ. Secundo videtur esse periculum convulsionis, cum musculi illi brachii scinduntur & nervi forte dividuntur, aut punguntur. tertio videtur periculum syncopes a magnis doloribus inflammationis, februm, pervigilii, gangrænæ. quæ omnia cum obvenirent, possent mortem asserere. sed respondeo operationem hanc non asserere periculum mortis, sed tantum habere multas molestias, & difficultates conjunctas: nulla enim ibi potest vel hæmorrhagiæ, vel convulsio, vel gangræna talis oriri, quæ non possit mox compesci a Medico, modo operationi velit vacare. Ergo non est periculum mortis. Secundo quia non fit scissio in musculis Brachii, sed tantum cure, & eligitur locus, in quo venæ & arteriæ magnæ non decurrunt.

Hæc tamen operatio infinitas difficultates, & inconvenientias habet. Prima est quod æger sæpe, & maximos debeat pati dolores. Hos patitur duplici ratione; Primo propter sectiones, quia debet antiqua nacli cicatrix circumcidi, brachium bis terere, diverso tempore secari, acus plurimæ per nasum & brachii carnem transfigi. Secundo propter brachii ad caput allig-



alligationem, quæ bene quatuordecim diebus debet permanere, unde in cubito & omoplati, æger ut tolerabilem fere patitur dolorem, saltem primis quatuor aut quinque diebus, donec brachium situi illi assueverit. Altera difficultas est, quod æger ægrè se non capere possit, propter dolorem ex brachii alligatione. Terti, æger magnam patitur sitim, interim dum trachium capiti est annexum, eo quod propter nares extrinsecus obstructas, cogitur per os respirare, aeris enim per os attractio, maximam gutturis, & linguae semper siccitatem inducit, unde sitis. Quarta difficultas est quod hæc cura, quatuor mensibus dureret, & postquam jam nasus factus est, adhuc bene uno anno, aut altero necessarium est, modo æger velit nasum optinè formatum habere, rectorium ad usum gestare. Saltem de nocte, cum jam factus, hæc inconvenientia sequuntur. Primo quod, quando in locum conjunctionis remaneat magna aut turpis cicatrix. Secundo quod pars appositæ non sit omnino ejusdem coloris, cuius est nasus, sed est albicanrior naso, & tempore hyemis cum illa pars frigeat propter defectum naturalis caloris, sit tota livida, saltem primis annis, cum pars recenter applicata, adhuc non est temperamento nam bene conformata, nec adhuc bene assuevit naso calorem & alimentum recipere, aut ab eo perfectè nutiri; quod facilius res sunt aliis molliores, quia cutis brachii est laxior cute nasi, ideo pars appositæ magis quassata est, & pennula, quam verus nasus, qui stat rectus & unus. 4. quia in facitio naso aliquando pilii nascuntur, ideo quod caro opposita cum esset in brachio habuerit naturam pilos producendi; & sic eam adhuc servat, cum naso est applicata. 5. foramina facitii nasi sunt longè minora foraminibus nasi naturalis; nam etiam si in principio illa foramina conformantur satis magna, cum tempore tamen fiunt minora, & aliquando ita minorantur, ut æger fere per ea spiritum ducere non possint. 6. non habent facitii nares tam exactum sensum quam naturales, eo quod extrema nervorum corporis non ingrediuntur illam facitiam carnem, cum sint partes spermaticæ, nec possunt regitari, unde influxus facultatis sensitivæ & spiritus animæ in ea est debilior. 7. ille nasus vel debet in principio major fieri, quam deceat, vel in lineam, si erat nimis parvus; caro enim illa novella quæ in principio est spongiosa, tempore decursum consolidatur & constringitur, hinc immittitur; unde ut nasus sit postea bene proportionatus, debet in principio fieri major quam deceat. Sive ergo in principio fiat major, sive post evadat minor, utrumque disformitatem habet. Et si vero hæc omnia incommoda possint ex hac operatione contingere, tamen neque semper contingunt, & plurima possunt vitari, & plurima temporis decursu, & cum ætate nasi minuuntur.

Ad hanc operationem quævis corpora non sunt idonea. In cacochymia, in morbo gallico affectis, in intemperatis operatio est vitanda: in pituitosis & frigidis non succedit propter defectum caloris nativi quia in his facultas nutritrix non est vegeta: hinc tradux marcescit,

non bene nutritur, mortificatur, non facile agglutinatur, allabuntur ad partem pituitosi humores, qui nutritionem impediunt, & traducem faciunt laxum, spongiosum, cedematofum, unde totum turpiter albescit, & livescit, propter caloris defectum.

Si biliosa sint corpora, facile etiam marcescit, & liceatur tradux, & inflammatione, erysipelate, herpetibus, impeditur: si melancholica etiam facile tradux exarescit, nasus fit lividus, pilosus &c. conveniunt optime sani, sanguinei, carnosii, solida roseaque carne præditi, in his enim vegeta est nutritio, & calor nativus fortis, ideo tradux optime crescit, & educatur, & fit solidus, & facile agglutinatur, unde nasus solidus & boni coloris, & brevi tempore conformatus. Senes non conveniunt huic operationi, nec pueri, hi quia nequeunt manere quieti, nec dolores tolerare, illi quia frigidi sunt & pituitosi, calor nativus, & virtus nutritiva in his fere emortua sunt: hinc tradux non adolescit, sed contabescit, & nequit congruiri.

Tempus omne etiam huic operationi accommodum non est. Vestigia hiems, & tempus omne frigidum, quia ab externo frigore tradux alioqui per se debilis, ut pote a matre sua semi-divulsus, debilitatur, & frigeratur, & perdit suum calorem nativum. Aestate biliosi humores facile in cutem effluuntur, herpes inflammationes, febres oriuntur. Optimum est ver, quia temperatur, verum etiam autumnus, quia interfrigus, & calorem medius est.

Artificium hujus operationis in his præcipuè consistit. Primo ut tradux ita nutriatur, foveturque, ut non conglobetur, marcescat, exsiccetur, & emoriatur, aut ædematosus fiat, aut apostematibus, aut gangraena, aut humoris fluxionibus afficiatur, sed necructur, fiat crassus, & solidus, & bene sanus. Secundo, ut æqualiter naso accommodetur, proportionetur, non sit nimis tenuis, nec nimis crassus, & conjungatur cum parva & æquali, pulchraque cicatrice. Tercio, ut nasi foramina artificiose excaveantur, & tradux parte interna ac interna sui quum ad labia pervenit, non sinatur agglutinari, quodque foramina nasi bene sint concinnata. Quarto, ut cum tradux undique est agglutinator, pulchrè conformetur, & concidatur, & in rectorio ita bene concludatur, ut pulchram acquirat figuram.

Verum ut hæc omnia bene observentur, necessarium est operandi modum subjungere. De Modo variè scripsere, imprimis Fallop. l. de Decorat. c. 2. Alexand. Bened. l. 6. c. 19. Vesal. l. 3. Chirurgia c. 9. Paræus lib. 2. Chirurg. c. 2. Marian. Santus in consiliis. Taliacotus in sua Chirurgia. Sed non omnes æque bene cum sunt assecuti. Verus & absolutissimus operationis modus est talis. Primo deliberandum ex quo brachio tradux sit eximendus. Capiendum autem est brachium potius illius lateris, cui æger dormiendo non solet incumbere, vel id cuius alligationem facilius feret. Instat ordinariè capere sinistrum. Primo, quia plerique homines in dextro latere melius dormiunt. Secundo, quia tunc poterit æger tempore operationis adhuc uti brachio dextero, quod magnum solatium adfert



adfert. Tertiò, quia, cum fieri possit, ut brachium ab illa exsectione traducis debilitetur, vel aliquod inconueniens acquirat, præstiterit sinistram capere eo quòd illo minus egeamus, euique noxam minus curemus. Insuper notandum, quod non oportet secare musculos brachii sicuti malè *Vesalius* & *Paræus* docent, sed tantum cutem carnosam ejus, nam musculos secare periculum convulsionis adfert, & musciosa caro non est carni nasi homogenea aut proportionata. Eo cognito brachium denudetur, & medio inter cubitum & humerum loco parte brachii interioris cutis duabus manibus secundum brachii longitudinem attollatur: sic elevata apprehendatur tenacula quatuor digitis lata, quæ habeat foramen tenue instar lineæ tam longum, ac debet esse tradux amputanda. Illa tenacula fortiter comprimatur & claudatur, quo sensus carnis illa compressione minuat, & sic dolor non sentiat.

Per illam lineam tenaculæ adigatur scalpellum, seu lancetta, quæ transigat carnem ad longitudinem lineæ, seu foraminis illius linearis tenaculæ. Tum enim tradux à brachio erit divisus tantum sursùm & deorsum suis extremis adhuc adherens. Tum antequàm tenacula laxetur, per illud idem foramen lineare tenaculæ transmittatur oblonga pars lintei, seu fascia tam lata, quàm est linea sectionis; & sit illa, primum albumine ovi, & oleo rosato imbuta. Tunc tenacula laxetur, & tradux explanetur. Porro imponitur linteum inter traducem, & carnem, ut non iterùm accrescat, imbuatur albumine, & oleo rosato, ut sanguinem sistat, & sedet inflammationem: desuper ponantur cataplasmata anodyna, repellentia, & sanguinis fluxum sedantia: ab immodico tamen eorum usui est cavendum, nè frigiditate suâ faciant traducem emori. Secundo die, ablato metu accidentium, illa fascia quæ inter brachium & traducem transit, inungatur terebinthina, & oleo olivæ ad suppurandum, sed nunquam fascia eximatur, quia non posset nisi magno dolore reponi. Cum alia imponi debet, ea prior affui debet, & sic pertrahi. His digestivis tam diu utendum, donec plaga sit benè suppurata, & purgata. Ager primis quatuor diebus in lecto quiescat, brachium medio situi continet, non exerceat, utatur tenui & refrigerante victu, si nulla occurrunt prava symptomata, potest tum æger liberaliore victu uti, & brachio ad collum appenso etiam exire, & ambulare. Quatuordecim diebus debet sic tradux educari, nutrir, & foveri antequàm ab una parte abscindatur, ut interim incarnetur, densetur, & robustus fiat: nam si statim primis diebus abscinderetur, conglobaretur, marcesceret, & inutilis fieret. Post diem circiter decimum quartum tradux in uno extremo est abscindendus. Debet autem abscindi parte superiore, quæ humerum spectat, manens inferiora parte sui adhuc brachio affixus. Ideò autem debet abscindi parte superiore, ut cum affigitur naso; habeat cutem suam extrorsum: si inferius abscinderetur, cum applicaretur naso, deberet inverti, & sic cutis naturalis ejus veniret extrorsum, quòd naso pareret deformitatem. Faciæ abscissione iterùm stiptica, & repellentia sunt adhibenda, & postmodum iterùm

digestiva, sicut suprâ; ea autem sunt continuanda, novem aut decem diebus circiter. His elapsis, non est amplius suppurationi studendum, sed siccantia adhibenda ut tradux callescat, & consolidetur. Eo facto, de traduce naso agglutinando est cogitandum. Usque ad tempus agglutinationis æger nullas molestias habet, potest incedere, exire, & munia sua obire. Sed cum agglutinatio instituitur, tum dolores præ foribus sunt. Imprimis tum universa barba est abradenda, nè ea impedimentum adferat, tum nasi antiqua cicatrix æqualiter est præscindenda, & simul quoque cicatrix illius traducis extremitatis, quæ naso debet agglutinari: illæ enim cicatrices impedirent unionem, & agglutinationem. Nasus debet oblique deorsum præscindi, ut vulnus habeat trianguli figuram. Illi figuræ debet charta accommodari ejusdem figuræ. Illa charta tum debet traduci adhiberi, ut tradux ad figuram illius chartæ conformetur, & quicquid traducis extat debet abscindi, ut sic figura traducis figuræ nasi sit conformata. Cum tradux sic est figuratus, debet tum naso conjungi, & tum utrumque simul junctum consui, sed debet brachium manere in suo loco, seu ad pectus, & ibi debet acus cum filis primò per traducem transmissa sursùm ad nasum duci, & ibidem per nasum ab infra, sursùm foraminibus oppositis, transmitti; & ideò debent acus habere fila oblonga, ut brachio supra pectus pendente usque ad nasum pervenire possit, quando utrobique acus cum filis sic transmissæ sunt, tum primum debet brachium elevari, & tradux naso applicari, & cum applicatus est, tum debent fila utrinque pertrahi & contrahi, ut arcuè naso tradux alligetur, debent acus sic per brachium, & nasum, à se distantia transmitti; quia si primò tradux naso admooveretur, cum una acus, cum primo puncto transmissa esset, non possent reliquæ acus commodè per utramque partem, jam conjunctam, transmitti pro reliquis punctis. Acus illæ debent ducere filum duplicatum, ex lino, ignem non experto, futura fieri debent non una acu, nec uno filo, sed pluribus, nempe tot, quot erant futura, sicut una quæque futura sit cum diversa acu, & filo. Suturae debent esse quinque vel septem, una in medio, & duæ, vel tres à singulis lateribus; quæ in medio est, prius facienda est; postea autem à lateribus, hic enim fiet æqualiter applicatio.

His factis, brachium ita est fortiter capiti alligandum, ut nulla ratione, nullove modo possit, ab eo, vel minimum separari aut divelli, nisi si vel minimum divelli posset, agglutinatio quæ sit labiorum vulnere conjunctione, impediretur. Brachii alligati situs sic esse debet, ut corpus supremum frontis tangat, vola capitis vertici superponatur, & medius digitus ad angulum futurae lamedœidis deveniat. Ut illa alligatio benè fiat, debet pariter unus thorax cum cuculla ex linteo grono, & forti, quòd extendi & laxari non potest, & eo debet æger indui, ut fasciæ ei hinc inde optime annecti possint. Fascia, quæ brachium annectitur, est in mediolata, & cava, ut brachii cubitus in illa cavitate recipiatur, & quiescat: debetque esse sic confuta, & ex tali linteo facta, ut non possit extendi. Illa fascia habet diversas fascias seu extre-



extrema in oppositas partes tendentia, tanquam ramos, aut propagines, quæ ad caput, collum, & alias diversas partes adduci, alligari, & annexi possint, ut brachium quàm exactissime tirmetur. Cum jam per futuram applicatus est tradux, debent ei medicamenta repellentia, & sanguinem silentia apponi pro primo: postea vero, super lineam conjunctionis, debent semper siccantia, glutinantia, & cicatrifiantia supponi, donec sit agglutinatio facta. Alii balsamis utuntur, alii emplastris siccantibus, ut emplastro barbaro diaconphoricis &c.

Parte interna debent suppurantia adhiberi. Quarto plerumque die signa agglutinationis factæ apparent. Cum illa apparent, futuras laxare oportet: præstat autem aliquas tantum laxare non omnes simul, ad videndum atque experiendum, an tradux adhæreat. Si bene adhæreat, oportet alias futuras etiam statim laxari, si enim futuræ diu manerent, fierent in foraminibus suturarum ulcera & remanerent postea turpes cicatrices. Prima itaque agglutinatio, nempe externæ partis nasi, quæ futuræ sunt factæ, septimâ die perfectè facta est: verum agglutinatio partis internæ nec dum adhuc tunc est facta; sed diu postea fit. Impediendum autem nè interna parte ita tradux statim agglutinetur, quia quoque foramina nasi tum amplius excavari non possent. Itaque non prius sinenda est illa pars agglutinari, quàm quando foramina illa bene sint perfecta. Post septimum ergo diem, cum jam futuræ sunt laxatæ, debent adhuc epulorica loco suturarum adhiberi, usque ad alios septem dies, priusquam tradux amputetur, ut interim fiat firmissima agglutinatio & dura mater, & tradux naso assuescat, & ab eo jam didicerit bene nutriri. Decimo quarto itaque die à primâ futurâ debet tradux extremo illo, quod huic brachio adhærebat, abscindi: non debet autem totum simul abscindi, sed tantum pro media parte ad experiendum, an si totus abscinderetur, fortè non emoreretur, & an à naso jam sufficienter nutriretur.

Si enim pro medio abscissus non mutet colorem suum, nec fiat lividus aut pallidus, indicium est, quod à naso jam perfectè nutriatur. Tum in totum est abscindendus. Quando tradux est abscissus, magna ejus habenda cura est, nè frigescat aut emoriatur, quia à naso adhuc debilitè nutritur, & ab eo exiguum spiritum, & calorem adhuc recipit. Tum videndum, quantum de mole traducis jam agglutinati, ad nasi restorationem opus sit: quod ejus supervacaneum esset debet postmodum amputari, & in rotundum ad formam nasi, cum cultro conformari: Potest autem hoc sine dolore fieri, quia tradux tum exiguum sensum habet: tum super traducis parte recentè amputatâ, septem iterum diebus suppurantibus, & siccantibus utendum ab infra: & parte interna traducis dux turundæ medicamento idoneo imbutæ infigendæ sunt, nè tradux subtus naso accrescens foramina obstruat. Illis turundis foramina confortabuntur. Interim quia ea parte, ubi tradux rescissus est, sæpe nova caro ultra proportionem accrescit, ea sæpe rescindi debet, nè forma nasi vitietur. Quando foramina confor-

mata sunt, pro ultimo internæ, ac internæ partis traducis agglutinatio procuranda est.

Omnibus his factis tubuli duo plumbei, pro turundis, sunt imponendi, & instrumento cavo, seu tectorio ad similitudinem. Nasi facti tradux, seu novellus nasus est includendus, ut in eo & similitudinem & figuram suam exactius acquirat. Tubuli singulis ferè diebus sunt removendi, & pro plumbeis postea argentei sunt imponendi. Tectorium primò ex plumbo, deinde ex argento fieri debet. Plumbum enim magis callum inducit; argentum verò dat soliditatem & applanationem. Illud tectorium hieme tenui panno lineo vel bissono est investendum, nè frigus metalli calorem recentis nasi adhuc debilem extinguat, æstate verò ni nil debet interius poni, melius enim applanatur, & solidatur à tectorio nasus, si nihil intermedium sit, & nudum metallum nasum tangat quàm aliter.

Nasus debet quàm diutissime tectorio inclusus gestari: quo enim diutius ei includitur, formam suam servat magis permanentem, & induratur: aded ut ad duos annos sic in tectorio gestari malum non sit. Naso sic efficto in loco cicatricis aliquando talia medicamenta adhibenda, quæ cicatrices dolent, ut minus nasus habeat deformitatis. *Thom. Fienus de præcip. artu Chirurgic. controvers. tract. 12.*

#### *De carne lateris ablata & restituta.*

Ab itinere Brasiliensi ad nox redux Chirurgus haud vulgaris experientia, & jussu regio à nobis examinatus, sancta fide asseveravit, ictu tormenti ablatam esse nauciero in navi quæ vehebatur, magnam carnis portionem in sinistro hypochondrio, ut hiatu manifesto viscera interiora illæsa apparerent, se verò carne vervecinâ, quæ fortè ad manus erat; læsum locum replevisse, & hæc Chirurgiæ artorum hominem restituisse. *Thomas Bartholinus hist. 39. cent. 6.*

#### C A R O L I.

Sunt pustulæ venereæ in membro virili excitæ de quibus capite de Lue Venerea.

#### C A R U N C U L A.

##### *In Meatu urinario.*

**H**ic de Carunculis illis præternaturalibus Hagimus quæ à succo ex ulcere, vel colli vesicæ, vel meatu ipsius urinario, subinde succrescunt, urinæque evacuationi non parum incommodant. Ulcera autem illa unde enascuntur ejusmodi carunculae, sunt ut plurimum venereæ, à Gonorrhæa scilicet orta. Ex eo dignoscitur hoc malum quòd urina non ut in sanis pleno, ut aiunt, alveo prorumpat, sed minutius & ad instar fili in duas partes divisi, exeat; præterea dolor in mictionis fine crudeliùs, quàm dum urina profluit, discruciat. Explorari etiam potest Cathetere immisso.

*Pro*



*Pro Carunculis in collo vesicae.*

℥. Viridis aris, auripigmenti, vitrioli, alumin. roch. an. ʒ ij. omnia hac aceto acerrimo pertusa inter duos porphyrites lapides, quàm accuratissime ducantur, in levoremque tenuissimum reddantur, & soli altivali exponantur. Hac rursus sic exsiccata aceto affuso ducenda sunt, & leviganda, solique exponenda, quousque pulvis subtilissimus evadat, ut ab iis omnis prorsus acrimonia extincta sit, quod opus 8. dierum spatio conficies, hoc parato pulvere.

℥. Ol. rosac. ʒ iv. litharg. ʒ ij. ad ignem f. coctura quousque emplastri acquirat consistentiam, tunc ab igne deposito, adde prædicti pulveris ʒ ij. & spatula M. & ad ignem omnia tractato, quousque medicamentum duriusculum evadat, ita ut si candela cereæ, vel plumbeæ virgula hæreat, non diffuat etiam si digitis tractetur. Hoc enim emplastrum hujus Lernæi & Herculei morbi clava exitit, quod hymnis multis, & laudibus variis decantari meretur. Nec solum huic morbo prodest, sed varios alios arceat, & explodit, nam polipos unice curat, & extuberantes carnes in aurium meatibus & aliis locis repertas unice extirpat, & refecat.

Præter hoc emplastrum cereæ candelæ numero xx. in promptu erant, quæ ex alba cera paucula resina terebinthina adjecta parabantur longitudinis 12. digitorum transversorum, crassitudinis vero prout nobis meatus urinaris ferre videbatur. Nec minus ex plumbo 3. vel 4. plumbeas virgulas paratas habuimus, quibus quando caruncula refractaria & difficiles sunt, candelarum vice utimur: iis sic in ordinem dispositis candelam ceream unam vel alteram per circuitum excavatam eo modo quo fusi in cuspide, ne fila decident, excavari solent, ex prædicto emplastro humectam per urinarium meatum ægrotante optime sedente immittimus, ac per 6. vel 8. dies singulis diebus unam, vel alteram, ut decet innovatam candelam æger continuo in urinario meatu insertam habet, neque absque eâ, nisi meiendi tempore, agat, necesse est; septimo die in ægroto nostro carunculas defecisse manifestissime deprehendimus ex his signis, primo quod candela jam facile penetrabat, secundo ex multitudine caruncularum putridarum extra emissarum, & humoris purulenti effluentis.

Tertio ex urina expedita ejaculatione, extirpatis igitur ac ex toto eradicatis carunculis per 8. sequentes dies nihil per siphonem injecimus, sola candela crassiuscula sicca absque alicujus rei inunctione immissa contenti. Nam, etsi caruncula extirpata sint, non tamen ex toto portiuncula, quæ emplastrum subterfugit, brevi illo tempore deponi potuerunt, sed ut magis exacte excernantur longiori indigent tempore, quas ad fundum vesicæ non sine ulcerum vellicatione & ægrotantis detrimento, si per Siphonem quid injecerimus, retrocedere faciemus, reliquis igitur 7. diebus urinarium meatum per candelam ceream crassiusculam patefactum servavimus, per quem urina abstergendi exsiccandique vim habens liberè

& expeditè exeat secum caruncularum reliquias nonnullas excernens. Quod unum hac in curatione tanquam præcipuum adnotandum decrevi, elapso igitur hoc tempore quo & caruncularum & crassioris puris effluxus cessavit, ad nonnullorum liquidorum abstergendi vires habentium injectionem per Siphonem devenimus in hunc modum.

℥. Hordei integr. pii, rad. aristol. ʒiij. fol. plantag. p. ij. f. e. a. decoctio in aq. ʒiij. ad medias. Colaturæ adde mell. rosac. colati ʒiij. m. & cum syphone per fistulam urinariam injice bis vel ter in die, & virgulam plumbeam, aut candelam ceream remittat. Hoc decoctio absterfitorio nos utimur continuo & in nostro hoc ægrotante intra 6. dies opus peregit, quod si fortiori opus fuerit, ad aquam cantranci viridem pro ulceribus exacte abstergendis pervenimus, quæ ita habet.

℥. Alumin. roch. virid. aris an. ʒ β. auripigmenti ʒ j. f. decoctio in aq. fontis vel plantag. ʒiij. quousque ʒiij. absumat; per faccum laneum coletur. Hanc aquam camphorâ alteratam per Siphonem in meatum injicimus, deinde post plures elapsos dies hoc cicatrizans medicamentum injicimus.

℥. Ceruss. ʒ j. alum. roch. lithargyr. an. ʒiij. f. decoctio in aq. caudæ equinæ ʒiij. ad medias, colatura per manicam laneam trajecta injiciatur. Iis medicamentis hic vir intra mensem ex toto sanus evasit. Si ut aliquando dolor superveniat, urinaris meatus colluatur lacte aut aqua rosacea camphorâ admixta, aut decocto sem. lini & fenugraci, quod si acerrimus dolor sit, ut eum æger pati nequeat, ad opii unum aut alterum granum deuenimus dissolutum in aqua ros. *Amatus Lusitanus cent. 4. curat. 19.*

*Pro carunculis in meatu urinario.*

Post celebratas universales evacuationes, partes urinae famulantes tomento, balneis, ac unguentis relaxantibus foras sunt deinde ad opus Chirurgicum accessimus, hoc modo. Candelas cereas albas, quibus parum terebinthinæ immixtum erat, paratas habebat Chirurgus longitudinis 12. digitorum transversorum, crassitudinis vero prout meatus urinaris ferre posse videbatur, eas Chirurgus sequenti unguento oblinebat & bis in die impositum, unguentum illud erat ex lib. i. pag. 20. *De secretis Alexii Pedemontani* ad ulcus sanandum carnosum etiam si fuerit inveteratum, cujus hæc erat descriptio.

℥. Fæces ex melle destillato, vel his deficientibus sumito mellis ad justam crassitudinem cocti. Deinde ponito in ollam ad cremandum vel in figuli vel in vitream fornace, donec auri colorem assumat, hæc materia valet ad omnes plagas, nam carnem putridam atque mortuam consumit, postea mundificat, & absque ullo dolore persanat.

℥. Hujus pulveris ʒ j. stercoris canin. ʒ ij. tartar. alb. ʒ β. sacch. albi. aluminis usti, ruthe an. ʒ j. terantur omnia atque cribrentur. Deinde.

℥. Fol. olivæ rec. contund. in mortario lapideo optime, adjiciendo parum vini albi postea



postea benè expresso succo addatur tantundem succi plantag. ponanturque ad ignem iussu-  
dendo paulatim prædictos pulveres & conti-  
nuo miscendo, postremò parum ceræ viridis  
adjungatur & parum mellis rosac. s. unguen-  
tum moile atque in usum servetur. Est autem  
valde pretiosum ad carnem consumendam con-  
sistentem præsertim in locis valde sensibilibus,  
quæ fortia medicamenta respuunt propter do-  
lorem. Modus verò utendi est huiusmodi; sy-  
ringa parva vino albo impleatur, in quorolæ  
sicca & fol. plantag. cocta, deinde parum la-  
ctis muliebris vel caprini adjectum fuerit, po-  
natur in virgam, quæ vino optimè lavetur,  
deinde candelam parvam ceream sumito, &  
in ejus mucrone prædicti unguenti parum affi-  
gito, atque sic in virgam immittito quousque  
ulcus pertingat, & unguentum ibi relinquat  
hoc bis in die faciendum manè scilicet & ves-  
peri, & sic admirabilem effectum videre lice-  
bit: nam paucis absque ullo periculo æger sa-  
nabitur. Hoc tamen non juvante usi sumus ex-  
perimento *Amari Lusitani* descripto cent. 4.  
curat. 19. quo feliciter curatus fuit æger nolter.  
*Petrus Forestus* Observ. 10. lib. 25. *De Vesica mor-  
bis.*

*Pro Carunculis urinam suppressantibus.*

Caruncula, quia pepasmi experta est, si im-  
pedimentum fecerit, consumi debet, abstergi  
ulcus & claudi, ne moriatur æger, (inquit *Hol-  
lerius*) cogimur carunculam illam absumere, &  
rumpere; remedio carunculis est oleum cucu-  
meris alium remixtum cum unguento rosato,  
cui pauca grana sublimati, vel præcipitati ad-  
duuntur; candela cerea immittetur doctæ ma-  
nu, vel hæc adduuntur unguento de Tutia: qui-  
dam 30. ferè annis ita laboraverat, urinâ sem-  
per tenui filo fluente, his recreatus fuit *Joan.  
Heurnius* ad aphor. *Hippoc.* 81. sect. 4.

Pro caruncula in meatu urinario inter alia  
unum familiare habeo secretum, arsenicum  
nimirum, quo utor hoc modo. Emollio opti-  
me ipsum super lapide pictorio cum succo limo-  
num, postea soli, donec siccatur, expono;  
deinde ipsum diluo aceto stillatitio, & iterum  
sub sole sicco, & hoc quater facio. Ultima  
vice abluo aq. rosac. deinde cum aliquo cera-  
to misceo, ut cum diapalma vel diachylone,  
vel cum ol. ros. & cera, & facio emplastrum  
pro ratione duritiei carunculæ, & minimam  
portiunculam hujus medicamenti pono in ex-  
tremitate candelæ & quotidie semel aut bis in  
meatum urinarium felicissimè intromitto. *Ga-  
briel Fallopius* lib. de Tumoribus cap. 38.

Carunculam meatus urinarii certissimo expe-  
rimento in pluribus sustulit *Antonius Fuchsius*  
*Medicus Noribergensis*, scil. oleum succini cum vi-  
tello ovi mixtum applicabat candelâ cereâ, &  
meatui immittebat securum sanè remedium, &  
reliquis omnibus præferendum, si respondeat  
eventus. *Hieronymus Reusnerus.* Obs. 91.

**C A R C I N S**

Vid.

**C A N C E R**

**C A R U S.**

Item

*Coma Somnolentum & Vigil, Somnolentia  
perpetua ac Lethargus.*

**S**omnus naturalis qui pars est humanæ me-  
lior vitæ, laborumque portus meritò cen-  
setur, si in morbosum quid abeat pro graduum  
varietate variis insignitur nominibus, exinde  
enim & *Carus*, & *Coma Somnolentum* ac *Vigil*, &  
*Somnolentia perpetua* & etiam *Lethargus* oriun-  
tur. Unam enim prope ac eandem causam a-  
gnoscent morbi variis hæc nominibus distin-  
cti & gradu tantum distant, propterea uno eo-  
demque capite a nobis describentur.

Est autem *Carus* somnus sine febre & maxi-  
mè profundus, in quo æger etiam durius com-  
punctus aliqu. utillum revera membrum sæpe  
contrahit, at interim neque clamoribus, ne-  
que pilorum vellicationibus, aliisque mediis  
excitari potest. *Coma Somnolentum* seu *Cataphora*  
est somnus profundus quidem, sed à quo æger  
excitatur & respondet, verum mox in somnum  
relabitur, idque sine febre. *Coma Vigil* est gra-  
vis ad somnum propensio cum impotentia ta-  
men ad eundem, in quo scilicet ut eleganter  
*Tertullianus* quam sitit æger quietem desperat  
ebibere. *Somnolentia perpetua* est continua ad  
somnum propensio etiam inter colloquia ac  
convensationes. *Lethargus* tandem est affectus  
in quo æger somno quidem quasi sepelitur, sed  
ad interrogata respondet cum delirio, & fe-  
brem habet adjuvancam.

*Parti affecta* in hisce omnibus affectibus est  
cerebrum, quod scilicet humoribus pituito-  
sis, vel etiam particulis narcoticis variè obses-  
sum, varios somnolentorum morborum gradus  
profert. Cerebrum autem hic in genere tan-  
quam spirituum animalium genuinum fontem  
pro parte affecta producimus, nec ad corpora  
striata, medullam oblongatam, aliasque in spe-  
cie hujusce visceris partes nos restringimus, quia  
quicquid demum super hac materia tradant  
*Willisius* & alii, de earundem tamen functio-  
nibus particularibus & læsionibus adhuc dum  
non satis constat. Focus autem morbi sæpius  
non est in cerebro, sed ut plurimum in imo  
ventre scilicet humoribus corruptis variis  
ipsius visceribus innidulantibus sanguinem-  
que, aut succum nerveum eo contagio infi-  
cientibus quod ad cerebrum delatum morbos  
descriptos pariat.

Quomodo *Somnolentia perpetua* ab aliis omni-  
bus Affectibus soporosis differat satis clarum  
est: In eo autem *Lethargus* ab iis distinguitur,  
quod febrem habeat comitem quæ nec in Ca-  
ro, nec in Comate somnolento aut Vigili nec  
in *Somnolentia perpetua* si simplex fuerit affe-  
ctus, affigit. In specie vero à Caro diversus  
est, quod quamvis in illo magna adsit ad som-  
num propensio, æger tamen clamoribus exci-  
tari potest, & ad interrogata cum delirio res-  
pondere, cum in Caro somnus sit tam profun-  
dus ut nulla vi æger excitari queat. *Coma Vigil*

Nn



differt à Caro ut & à Comate Somnolento & Lethargo, quod eo tacti quamvis per propriam morbi propensionem somno capescendo quam maxime parati videantur, inquieti tamen continuo vigilant. *Carus* tandem & *Coma Somnolentum* inter se tantum secundum magis & minus discriminantur; Quidam etiam qui *Comatis* nomine omnem morbosum somnum designant, illud in profundum seu grave per quod ægrotans in nigras Lethargi mergitur undas & propriè *Carus* est; in insomne de quo supra; in somnificum quod in utriusque prædictorum confusio positum est; & denique morbum quem hic *Comatis* nomine in specie insignimus, dispartunt.

*Causa* horumce omnium affectuum est, vel humor pituitosus spirituum animalium motus quales pro vigiliæ requiruntur, præpediens, vel particula venenosa ac narcotica quæ etiam secundum Sylvium de le Boë in bile ad opii naturam & genium per peculiarem quandam fermentationem ac corruptionem exaltata reperiri possunt & nunc parcius, nunc abundantius, nunc magis, nunc minus sese explicant & diffundunt, sicque spirituum actioni magis aut minus officientes, varios morborum sopororum gradus constituunt. Humoribus autem, aut particulis prædictis, adjungi possunt alie acriores, aut cerebri membranarum peculiaris dispositio, quibus arceatur somnus per irrititos ex parte spiritus aliis necessario inducendus; sic videmus quotidie temperamenta quædam cerebrique specificas constitutiones quæ opii omnem vim elidunt, scilicet respectu somni, & ab eo epoto vel aliis deglutito potius cum inquietudine vigilant quam dormiunt, dum interim eorum caput vaporibus, ut loquuntur, repletum non parum gravatur. Febrem Lethargi comitem quod attinet, ejus causam minimè necesse est huc adducamus, cum eadem sit quæ aliis plures febres facit, scilicet fermentatio inter varios humores seu potius inter varios sales humoribus & succis corporis nostri degeneribus supra modum exaltatos, invidulantes, orta, de qua suo loco, nempe tractatu de Febribus.

*Diagnosis* ex descriptione & differentiis horumce affectuum mox allatis, satis patet.

*Prognosis* vero varia est pro varietate affectuum, ac primò *Carus* prognosis omnino est ominosa, præcipuè si febrem malignam, aliquamque non judicatam adjunctam habeat, aut si puerperium consequatur, ut & si morbis aliis cephalicis, aut capitis vulneribus succedat. Non raro etiam in Apoplexiam eamque citò lethalem abit, & etiam si cerebrum aliquando videatur ex parte excussile materiam morbificam, unde loquela restituitur, non sic tamen minus timendum, ne spasmi superveniant, aliaque quæ ægrum subito tollant. *Coma Somnolentum* dubii omnino est eventus & medicum prudentem inter spem ac metum continet. *Coma Vigil* melancholicis proprium irritationemque magnam in cerebro aut ejus membranis denotans, in Maniam sæpe abit, nec periculo vacat. *Somnolentia perpetua* ad affectus alios omnes somnolentos, ipsamque etiam Apoplexiam viam sternit. *Lethargus* tandem per febrem ut plurimum malignam sibi adjunctam potius quam per se

periculosus est, & præterea propter metum inflammationis in cerebri meningibus, à particulis salino acrioribus ipsis quasi in pacis, & à febris foco continuo ascendentibus, unde phrenitis excitari potest. In senibus tamen usque quorum vires prorsus collapsæ sunt periculolior est, ut & cum à veneno, vel intus assumpto, vel extus per ictum à venenato animali inflictum serpente diutiusque retento, procreatur. ex Hippocr. autem sect. 7. Aph. 21. tremior Lethargo superveniens malum, ut & ex ejusdem Sect. 2. Aph. 1. somnus laborem multum faciens malum. Si affectus hic ex crapula, ictu, plaga, aut narcoticis assumptis, usque non admodum infestis oriatur, spes omnis non excluditur; ut & humanis fortis atq; medicamentorum ope statim aliquid causæ morbificæ dimoveri videatur.

*Indicationes* hic eadem prope sunt quas in Apoplexia & Paralyti adduximus, observata tantum graduum varietate. *Lethargium* quoque spectat, quandoquidem ut plurimum alterius morbi soboles est, vel à causa aliqua evidenti enascitur, indicationes ab iisdem petantur, nam longum foret ac minus necessarium eas hic omnes pro varietate causarum enumerare. In *Comate* præ retinendū venit acrimonia illa vitriolica cerebro ac præcipuè ejusdem membranis imposita, unde & spiritus efferrari & in motus maniacos deduci possunt: hæc autem ad classem morborum melancholicorum referenda veniunt.

De *Curatione* nihil hic addimus nisi quæ tamen in aliis afferuntur capitibus, sed præcipuè de Apoplexia, ut & etiam quæ mox à variis Autoribus adducenda veniunt.

### *Curationes, Consultationes, Observationes & Anatomica Inspektiones ex variis.*

#### *Curationes.*

In sopore, caro, voterno, comate, vigiliis, cataphora, siphila stricta, id est noctambulomb. in incubo, in tremore, stupore, cæterisque vitis cerebri, præter illa, quæ hactenus enumerata sunt, potissimum prodest, liquoris, supra in delipientia descriptus, cujus excellentiam ejusmodi casibus commendari nequit.

NB. Sternutatoria, in ejusmodi casibus esse necessaria, itaque in curationibus istorum morborum sternutationes sicut sæpius provocandæ.

Prodest hucus ex oleo castorei cum succo rutæ, scæniculit. ℞. Succus apii, acet. fortis q. s. & cum pulvere castorei f. emplastrum, & capiti abrafo superpone *Joan. Harin. in praxi chin. air.*

*De Comate vigili.*

Licet coma vigiliæ seu vigil ad soporosos affectus referri soleat quia tamen longè diversam à cæteris conditionem obtinet, ideo seorsim in hoc capite explicandum est.

Est autem coma vigil affectus, in quo ægri clausis oculis decubunt, ut dormire videantur, cum tamen vigilent, & delirant, ac si eos tetigeris, statim oculos aperiant & torve aspiciunt, & iterum delabuntur in somnum, qui variis imaginibus, & deliramentis impeditur, ita ut vigilare cogantur. Hunc affectum Gal. medium constituit inter phrenitidem & lethargum & typhomaniam appellat.

*Causa*



Causa hujus affectus vulgarissima est bilis cum pituita permixta, a quibus humoribus cerebrum tantum irrigatur, vel tumorem atque inflammationem coepit, unde erysipelas oedematofum, vel oedema erysipelatosum exoritur. Cum autem haec humorum miscella variis modis & proportionibus neri valeat, sic varii in diversis aegrotantibus isti affectus apparent. Si enim bilis in mixtione praevaleat, delirium majus est, & aegri licet clausos habeant oculos, minus dormiunt, si vero pituita praevaleret, aegri magis dormiunt, minus delirant, & expergefacti minus vociferantur, ac desipiunt.

Hic enim coma vigil per lymphathiam à vaporibus biliolis, pituitosis simul mixtis in cerebrum translatis: quod non raro solet contingere in febribus ex humorum miscella oriundis, praecipue hemitritae ex tertiana, & quotidiana compositis. Non est tamen inconueniens adterere, vapores simpliciter calidos & humidos in febribus satis intensis hunc affectum producere, quia ab humiditate fit somnus, à calore autem vigilia.

Diagnosin hujus affectus ex iis quae antea dicta sunt satis elucescit in eo enim laborantes clausis oculis permanent, & somnum capere videntur; attamen dormire nec queunt, & se variis modis excitant, sese subito erigunt, è lecto surgere nituntur, & iterum in somnum relabuntur. Causarum varietas ex praedictis etiam facile dignoscitur.

Periculosus affectus maxime censendus est. Sive enim tumore, & inflammatione cerebrum afficitur, grave malum esse consuevit, seu alio quouis modo à praedictis humoribus obsideatur, sive à vaporibus ex febrium malignarum materia oriundis afficiatur.

Deliria vehementia in comate vigili convolutionem efficiunt: sunt enim ab humore, vel vapore acerrimo, qui partes nervosas feriendo convolutionem facile concitare potest.

Curatio comatis vigiliis idiopathici iisdem instrumentis percutitur, quibus phrenitis & lethargus curari consuevit: quod si magis ad parentidem delectat, illius remedia magis adhibentur; si vero magis ad lethargum inclinet, ejusdem remedia magis usurpantur. Sympathici vero comatis curatio à febris malignae curatione dependet, à qua sumit originem. Peculiariter tamen remedia vapores illos à cerebro revehentia, & repelentia usurpanda sunt in principio, ut phlebotomia ex brachio & malleolo, & Oxyrrhodina fronti & syncipiti admota, quibus accedent clysteres frequenter injecti, cucurbitulae tum liccae, tum humidae scapulis, cubito, natibus, & cruribus affixae; vesicatoria brachiis, & femoribus admota & si quid in cerebro intus videatur, derivatio per sectionem venae frontis, aut hirudines pone, & temporibus affixas, molienda erit, si non e resolutio procuranda animalibus tenentibus capiti admotis. *Lazarus Rivierus, de medic. lib. 1.*

In comate &c. nimium Phlegma cerebrum inundans, est evacuandum nunc per aluum aut per sudorem, nunc per sternutatoria. Hic si opus torpidi primò acidis excitandi, & si opus libus spirituosus denuo restaurandi. Interdum acris, aut sensuum organa vel-

licantibus nimius somnus impediendus

Inter evacuentia primum obtinet vomitus, qui si commode potest institui, admodum est prolicuus: haec inter uti novum est, eminent emetica antimonialia vini emetica. Item tinctura Nicotianae cum spiritu vini extracta ad ʒij. propinata. Purgatio institui debet cito, neglecta temporum electione, neque enim timidus aut cunctabundus in purgandis Lethargicis debet esse medicus, & quidem forti medicamento fiat; alias enim frustra laboratur. Inter purgantia imprimis est purgans ex scammonio cum castoreo, id quod jam à Tralliano atate fuit celebratum. v. g.

ʒi. Castorei ʒj. scammonii preparati ʒj. M. Divid. in 2. partes aequales. Datur in vehiculo oxymelitis scillitici, jam hoc ipsum à Tralliano atate, ut dixi, est celebratum, & curavit eadem virum 55. annorum Borellus uti videre est in cent. 2. obs. 52. Alias extractum phlegmagogum Quercetani a ʒj. ad ʒss. propinatur. Item extractum Trochiscorum alhandal a gr. 6. ad xij. usurpatur. Item extractum Esula aliis loco stimuli additum laudatur. Ex officinalibus sunt Pilulae cochiae ad ʒj. propinatae, quae ceu expertus in Lethargo commendat Forestus lib. 10. obs. 33. si cum Castoreo Misceantur v. g.

ʒi. Extracti phlegmagogi Quercetani, castorei ana. ʒss. Extracti Trochiscor. alhandal. gr. ij. Resina Jalapae gr. v. c. s. q. ess. Castorei F. v. Pilulae purg. credo quod pilulis additus mercur. dulcis non futurus sit frustraneus, cum hic in similibus affectibus alias sit egregius.

Loco purgantium per os assumendorum si non possint convenienter adhiberi; conveniunt clysteres acres & fortiter stimulant, quibus imprimis addenda salia volat. V. gr. sunt tales clysteres ex cent. minor. Majoran. Salvia, origano, absinthio, serpillio, ruta, pyrethro, felle tauri inspissato. Pulpae colocynthidos in petia ligata cum electuario de Hiera picra cum agarico, cum electuario Indo & similibus v. g.

ʒi. Herbae absinthii, cent. minor. folior. rutae ana. mj. radices pyreth. ʒiij. pulpae colocynth. in petia ligat. ʒiij. (alias enim exulcerat intestina) coquantur in f. q. aqu. communis. Colaturae.

ʒi. ʒix. cui adde Electuarii cum agarico ʒj. felle tauri inspissati ʒj. sal. vol. succum ʒss. vitell. ovor. Num. 1. M. pro clymate, quod est satis acre.

Item subinde applicantur suppositoria, eaque etiam acutiora: Nunc scilicet suppositoria acuta usitata illita cum felle tauri, aut illita cum ol. colocynth. Quercetani: vel preparantur de novo, ex melle inspissato cum sal. gemm. aut ex felle tauri inspissato cum speciebus Hierae picrae & similibus, quae cum melle conjunguntur, in formam suppositoriorum applicanda.

Praemissis hisce dantur appropriata, quibus tamen etiam intermiscuntur sternutatoria. Haec sternutatoria sunt fortiora ex rad. Helleb. albi, rad. liliorum coavall. cum granis aliquot Euphorbiae. Item ex pulvere Nicotianae cum Euphorbio & aliquot granis sal. volat. urinae spirit. vin. vol. Nam haec salia vol. optimè permiscuntur cum talibus sternutatoriis acrioribus cum fortiter penetrent, dum interea alia acris sternutatoria vellicant. Vitriolum ad albedi-



nem calcinatum ad 3j. solutum aq. Majoranz 3j. qui liquor naribus attrahendus subinde pro sternutatorio satis eleganti. Juxta hujusmodi evacuantia & subinde ven. sect. vel saltem pro scopo averforio aut derivatorio locum habet, in casu nempe quo à colluvie recrementorum mediante sanguine & sero cerebrum inundante malum ortum fuerit. Tali in casu venarum jugularium apertionem suadet Willis loc. cit. Quibus non sufficientibus, altero die cucurbitula scarificata inter scapulas aut hirudines prope aures applicari possunt. Quod si nec sic resuscitari videatur æger, præmissis talibus ad vesicatoria item ad sternutatoria, accedendum venit: ad ista quidem pro scopo averforio, ad hæc pro scopo excitatorio ac simul evacuatorio, sed non nisi istis præmissis v. g.

℞. Pulv. cantharidum ʒj. euphorbii gr. xij. castor. gr. xv. fermenti acerrim. 3℔. M. pro vesicatorio. Nam acria ac dolentia in talibus ægris omnino requiruntur. Applicari nunc possunt vertici, nunc syncipiti, pro scopo derivatorio, nunc cruribus pro scopo revulsorio. Sternutatoria per pennam insuffianda sunt naribus.

℞. Pulv. Nicotian. lil. convall. an. 3j. rad. hellebor. albi ʒj. ol. destillat. majoran. gr. iv. castor. gr. xij. ad xv. M. vel sternutatorium Timæi in affectibus soporosis expertum, quod habet in casibus p. 20.

℞. Ellebor. albi, castor. piperis alb. an. ʒj. ol. destillat. rutæ, majoran. salviæ, an. gr. ij. M.

Hæc etiam salia vol. v. g. sal. vol. salis ammoniac. aut sp. salis ammoniaci cum calc. viv. paratus commodè permiscetur, cum fortiter penetrent cæteris addita vellicando; sternutatorium ex turbit. cum pulvere glyzyrrh. vid. in Barbett. praxi cum comment. Deckers p. 76.

Post hæc sunt appropriata quæ aut spiritus excitant, aut eos restitunt.

Hæc inter primatum obtinet Castoreum quod est omnium optimum sive ipsum Castoreum sive Ess. sive extractum quocumque modo usurpatur: Post castoreum est imprimis Ruta, Serpillum, pulegium, & origanum. In specie tamen acida omnia externe & interne ad excitandos & curandos lethargicos mire conveniunt. Hæc inter, præter acetum & Oxymel scilliticum est imprimis spirit. vitriol. vol. cujus legitimum signum est quod non guttatim, sed stertatim in alembico appareat, paratus ex vitriolo artificiose calcinato, ita ut Phlegma saltem evaporet, remanente spir. vol. qui postmodum per rectificationem à spiritu fixiore separandus; sic enim fit spir. vitriol. vol. excellens in cura lethargi. Loco hujus spir. vitriol. seu acetum istud singul. re vol. potest commodè usurpari ad guttas aliquot in aqu. appropriata rutæ, liliorum convall. Majoran. &c. aqua quadam apoplectica & simili; spir. vitrioli regeneratus s. ex capite mort. aeri exposito denuo destillatus, (qui non tam est vitriolaceus quam potius nitrosus) & ipse commendatur ad curam lethargi, vel adhibetur spir. vitrioli cephalicus factus ex eodem capite mortuo ab aere imprægnato, quod irroratur largiter speciebus cephalicis vegetabilibus, Cerasorum Nigrorum, flor. tiliz, lil. convall. majoranz, salviæ. Hoc destillatum more solito, & post rectificationem dat spir. Cephalicum admodum penetrantem & volati-

lem, qui in cura lethargi in aquis appropriatis propinatus, in aqua rutæ in aqua rosæmarini & similibus admodum convenit, & egregie restituit ægros. Pertinet huc etiam acetum Hystericum Mynsichti, præ cæteris verò acetum vitriolatum benedictum, remedium quoddam singulare in affectibus catarrhosis, & etiam in affectibus soporosis. Modus præparandi est hic, vitriolum in crucibulo leniter calcinatur ad absumptionem phlegmatis: exhausto omni phlegmate crucibulum contegitur operculo, & hoc contegitur carbonibus vivis, ita ut per quadrante horæ calcinatum exactè rubescat: h. m. calcinatum pulverisatum per setaceum subtile trajiciatur. Postmodum.

℞. Carbonum saginorum durorum benè pulverisatorum ac per setaceum trajectorum, & vitrioli istius præparati an. 3℔. benè mixta indantur vasi plumbo, & satis patulo terreo, quodque igni tamen resistere valeat, imponatur carbonibus in turno venti, benè calcementur, continuo agitando cum rutabulo ferreo tandiu donec nulla amplius scintilla in mixtura appareat. Hinc.

℞. h. m. vitriolum præparatum; affunde acer. destillat. acerrim. exponantur radiis solaribus per 14. dies, hinc hletretur acetum per chartam, eritque sic paratum vitriolatum benedictum. Dosis à gutt. x. ad xij. in aqua appropriata assumendum. In omnibus catarrhis frigidis, ut vocant, item in affectibus soporosis admodum commendatum, & ab accurato, & celebri medico in secretis habitum remedium. Hæc & similia acida vitriolica vol. exsuscitant, & sedant lethargum. His subjungenda etiam, quæ spiritus torpidos volatilisare & agiles reddere valent, qualia sunt Ess. & spiritus vegetabiles Ess. lil. convall. Ess. rutæ, croci, spir. & Elixir. Citri, Ess. ambre, cum spir. rosarum vel spir. lil. convall. Item semen sinapi & semen Naturtii, quæ ipsa insigniter laudantur ad curandum lethargum, quin & sal. vol. in lethargo apoplexia & Caro singulariter laudantur. Item herba Thee modernis usitata, in tali casu admodum convenit. Est Plantula Sinenfis, & Japonensis foliis myrtinis; hæc collecta coquantur in aqua istiusque decocti, quod soporem acquirit aromaticum, haustus interius assumptus, mirum est quam arceat omnem somnum, ita ut quis etiam per triduum sine somno continuo perflite, re possit. Hinc etiam acuit admodum ingenium. Præparandi modum & descriptionem vid. in Borello cent. 3. obs. 39. item in Wormii musæo, uti etiam in Iulpio lib. 4. obs. cap. ult. Item Deodati valetudinario p. 169. Denique est radix indica quæ vocatur radix Cusæ, quam mirifice externo usu esse ad curandum lethargum refert Kircherus in regno naturæ magnetico p. 45. &c. dico externo usu. Nam præter interna etiam externa in lethargo conveniunt. quæ inter sunt i. spir. salis ammoniaci vol. naribus subinde admotus, qui potens est ad lethargum & apoplexiam inò etiam hystericas mulieres excitandas, alias acetum castoreo imprægnatum cum linteis vel spongia naribus admotum est egregium; experimentum Hartmanni est spongia cum succo apii & aceto rutaceo imprægnata venit ad arcendum somnum & adducendas vigilas. Item succus sonculi aut etiam



etiam succus rutæ mistus cum aceto naribus applicatus aut cum linteis temporibus & fronti alligatus admodum laudatur. Semen sinapi aceto tubactu n. si eodem fricentur plantæ pedum, commendatur ad excitandos lethargicos. Comata febrilia quæcumque optime curat acetum naribus applicatum, quo validius, eo est melius; unde spir. vitriol. omnibus præfertur. Carus ex opiatorum & narcoticorum externo abusu aut vaporibus venenatis mercurialibus aut sub nuce juglande contractus, aut ex ebrietate aut ex inspiratione halituum ex liquoribus fermentantibus ortus curatur quando vomitus mature instituitur. Hinc acetum naribus est applicandum, & postmodum spirituosus internus spiritus animales denuo volatilisandi. Ex opio s. croco si sit carus acetum est optimum. Hos etiam figit opium & opii sal. vol. oleosum omnino destruit; unde etiam acetum assumitur a quibusdam in præparationem Laudan. opiati. Ex Ebrietate si oriatur carus præmissio vomitorio acetum capiti applicandum, & epithema ex succo semper vivi majoris Acet. & nitr. testibus applicandum & subinde renovandum potenter enim ebrietatem discutit. Imprimis spiritus salis ammoniaci vol. non erit inconveniens, propterea quoniam hic spiritum vini rectificatum (unde ebrietas) prompte coagulat in ossam crassam, ratione cujus coagulationis est præservativum ebrietatis, licet etiam curat ebrietatem coagulando spiritum vini, cumque aut per sudorem aut per urinam expellendo. *Michæl Eibmüller. Collegii practici part. 2. cap. 7.*

*In caro & comate.*

Methodus Therapeutica easdem medendi intentiones suggerit, ac eadem prorsus remedia indicat, quæ in lethargo, & apoplexia adhiberi solent. Quare non opus erit, indicationum claros hic subpicere aut ingentem medicamentorum sylvam congerere *Tom. Willis de Morbis cerebri.*

Coma vigil raro morbus solitarius, sed plerumque symptoma est, aliisque affectibus, uti febris, phrenitidi, lethargo, & similibus superviens, quapropter methodum therapeuticam peculiarem non postulat, at vero tantum opus esse videtur, ut remediis primario iudicatis adjungantur alia cephalica, quæ nempe hæc cerebri meteora quasi nubes & fulgur dispellant, vel si utraque simul exterminari nequeant, ipsum medicamentum unius affectus partis foveat, quo iste superior factus, mox alterum vincat: adeo in somnolentia, vigilia aut, perfectum somnum aut perfectam vigiliam accersere conveniat. enim verò in hoc casu narcotica sæpe bono cum successu exhibui. *Thom. Willis de pervigilio.*

Circa lethargi therapeiam cum nullas faciat inducias, haud diu deliberandum est post Enema acrius injectum, protenus vena seceatur; nam vasa sanguine depleta serum, aut alios humores in cerebro depositos aptius resorbent. Porro in hoc casu venam jugularem præ brachiali pertundendam consulo. Quoniam hoc morbo sanguis intra capitis sinus plurimum coacervatus, & forsitan stagnans in circulationem æquabilem facilius reducetur.

Phlebotome peracta, alia cujusque generis

remedia mox in usum adhibenda sunt. Vesicatoria larga cervici, & cruribus applicentur; tempora & facies oleo succini, aut balsamis cephalicis illinenda, cataplasmata ex Ruta, Piperitide aut ranunculo, cum sapone nigro & sale marino in pulvem contulis totis pedibus imponantur frictiones asperiores membris adhibeantur, sal urinæ aut spiritus salis ammoniaci crebro naribus admoveatur. Interim remedia cephalica subinde propinentur.

℞. Aq. Florum Pæoniz, ceraforum nigrorum, Rutæ, juglandium simplicis an. ʒij. C. storii nodulo inclusi, & in vitro suspensi ʒij. acchari ʒij. misce f. julapium, dentur Cochlearia iij. vel v. tertia, vel quarta quaque hora, porro singulis hujus dosibus adde sp. C. C. succini, vel salis ammoniaci gut. 12. ad 15. vel chartam pulveris sequentis.

℞. Pul. Rad. Pæoniz Maris, Cranii Humani, rad. serpentariæ virginariæ contrayervæ an. ʒj. Bezoar. Margarit. an. ʒʒ. Corallii præpar. ʒj. f. pulvis divide in 12 partes.

Porro hic considerandum est, annon Catharsis per vomitum aut secessum mox ab initio celebrari debeat. Scio hoc inter authores varie controversum, etiam vario cum successu in praxi adhibitum novi: quibus perpenis, & inter se collatis, quid nostra fert sententia, breviter proponam.

Si lethargus à crapula aut ebrietate recenti vel si ab incongruis, & narcoticis assumptis, exorsus fuerit, statim vomitio excitatur; quare sal vitrioli cum vino & oxymelite scillitico, vel in robustis, infusio croci metall. aut Mercurii vitæ cum aq. cerafor. nigror. exhibeatur, & postea, ni sponte operetur, penna gutturi intrusa vomitus irritetur.

Si morbi insultus, febris aut affectibus aliis cephalicis supervenerit, vel si ipse primario aut perse, ob procatarxin in sanguine & cerebro prius latum, exicetur, vomitoria & cathartica statim ab initio, dum materia in fluxu est, exhibita, sæpius plus officere quam prodesse solent, quatenus nempe humores dum in motu, magis exagitant, cumque adhuc subigi & educi nequeant, eos in partem affectam adigunt.

Die secundo si torpor nondum remittatur, phlebotomia, si pulsus indicabit, repetatur, vel loco ejus sanguis per cucurbitulas post scarificationem in scapulis eximatur, dein paulò postea Pharmacum emeticum (si nihil prohibeat) vel catharticum exhibeatur.

℞. Sulphuris antimonii gr. v. scammonii sulphurati gr. viij. cremoris tartari gr. vj. misce f. pul. detur in cochleari julapii præscripti.

Vel ℞. Scammonii sulphur. gr. xij. crem. Tartari gr. xv. Castorei gr. iij. f. pulvis; detur eodem modo: Remedia interim alterantia aut derivantia usque eadem aut similia continuentur.

Die tertio & deinceps, quæ morbo incunte ob metum novæ fluxionis vetantur, scilicet errhina, sternutatoria, apophlegmatismi adhiberi debent. Porro tunc interdum expediet, animalis recens mactati viscera calida sincipiti post capillitium rasum vel detonsum applicari, & subinde mutari, quandoque etiam loca isthæc decocto cephalico, & discutiente foveri; præ cæteris verò topicis maximum juvamen à



## CARO SUPERFLUA

*Prò Carne superflua.*

**E**go uti soleo linamentis excerptis ita par-  
tis.

℞. Aq. plantag. ros. solan. an. ℥iij. opii. ℥j. medullæ panis, ℥i. mercurii sublimat. ℥iij. sublimatum supra porphyritem teratur: deinde M. & bulliant ad medietatis consumptionem, colentur per pannum crassiusculum. Fila excerpta bulliant aliquandiu in hoc liquore, postea eximantur, exprimantur, siccentur, ac servantur ad usum. Sepiasarii nostri in officinis ad manus habent alumen ustum, quod optimum est, Squammam aris, æruginem aris, pulverem hermodactylorum, pulverem asphodelorum, præcipitatum omnium optimum, quia agit sine dolore; ex compositis unguentum Aegyptiacum, apostolorum, & isidis, quæ omnia carnes superfluas exedere solent. *Gabriel Fallopius cap. 18. Tract. de ulceribus.*

## CARO ABLATA

*quomodo restituenda: ubi de chirurgia  
Curiarum.*

*De nasi amputati ex carne Brachii restitutione.*

**Q**uæritur an talis restitutio sit possibilis, & videtur quod non. Primum autoritate Jo. Andreae Crucii maximi chirurgi qui lib. 2. c. 3. *sua chirurgia* dicit non audiendos eos, qui amputatos nasos restituere pollicentur: nam, natura, inquit, tantum artificio nemini concessit. Videtur id etiam ratione confirmari. primo quia caro brachii est musculosa, nasi non; & caro brachii est alterius temperamenti, quam nasi: itaque non videtur, quod illæ carnes possint uniri. Secundo quia in illa operatione videntur tam multæ difficultates debere intervenire: hæmorrhagiæ, convulsionis, gangrænæ, dolorum inflammationis, œdematis, pustularum, februm, ut omnino impossibilis videatur. verum in contrarium sunt autoritas variorum, qui dicunt hanc artem & operationem possibilem esse, imprimis *Calentium in Syph. ad Orpianum* scribit, sic nasum abscisum ex brachii carne, vel ex carne servi restaurari posse. Et *Steph. Gourmelennus lib. 1. chirurgia* testatur, sic nasum reparari posse, & scribit, quod quidem *Branca Siculus* ita nares solebat restituere. Quod idem *Gourmelennus* scribit se vidisse. Et *Guilbertus Cognatus Nofavennus lib. 2. narrat.* scribit quod ille *Branca Siculus Catanensis* insignis chirurgus aures, nasos, & labia sic solet restitueret. *Alexand. Bened. lib. 5. c. 19. Anat.* scribit sua ætate sæpe visum esse, quod nasus restitueretur caruncula e brachio concisa. Idem tradit *Vesalius lib. 3. c. 19. & Paræus l. 12. c. 2. sua chirurgia* scribit hoc fieri posse, & superioribus, inquit, annis extitisse chirurgos in Italia, qui id facerent. Idem etiam scribit *Fallopius lib. de*

*decoratione c. 2. & Hieron. Mercur. lib. de eadem materia* Ego etiam testari possum, *Cass. Taliacotium* Professorem chirurgiæ in acad. Bononiensi plurimos hac arte nasos restituisse, quorum ego aliquos restauratos in aliquibus vidi, alios actu fabricari: itaque certum est hanc restitutionem esse possibilem & tepissime factam, & ideo autoritas *Joan. Andreae Crucii* non est attendenda, ut pote qui illam nesciebat, sed quia mirabilem, ideo putat esse impossibilem. Ad secundum argumentum respondeo, non esse tantam diversitatem, quæ unionem impediat, & etsi incommoda, & difficultates satis multæ circa illam operationem occurrant, non sunt tamen tanta, ut operationem faciant impossibilem.

Quæritur Secundo, an ex carne Brachii alterius hominis possit hæc restitutio fieri. Dico autem breviter, quod sic; quod probō autoritate *Calentii* supra citati ad *Horpianum* item *Gourmelenni* in chirurgia, *Tallacotti* in suo libello chirurg. qui omnes scribunt, n. sum ex carne Brachii alterius hominis separabilem esse, & probatur ratione: quia constat ex historiis lætus geminos aliquando in lucem venisse modo tronibus tantum, modo dorsi, modo ventris parte aliqua connatos. si ibi diversos non inies connasci non fuerit impossibile utique neque impossibile erit, post partum diversos homines artificio conjungi, & uniri posse. Secundo constat sæpe in corpore nostro partes aliquas connasci quæ & substantia & temperamento magis sunt diversæ, quàm cutis aut caro musculosa diversorum hominum. Secundo quia legimus in historiis aliquando monstra genita fuisse, quæ parte trahebant corpus unius animalis, altera alterius, si ibi diversa specie animalia in unum corpus unumque animal connasci potuere, quanto magis duo corpora ejusdem speciei connasci, & arte conjungi potuerunt.

Quæritur Tercio, an hæc operatio sit periculosa? Et videtur, quod sic, quia videtur in ea esse periculum lethalis hæmorrhagiæ, cum tam magna carnis pars e brachio delinuitur. sunt enim in brachio magnæ venæ, & arteriæ. Secundo videtur esse periculum convulsionis, cum musculi illi brachii scinduntur & nervi forte dividuntur, aut punguntur. Tercio videtur periculum syncope a magnis doloribus inflammationis, februm, pervigilii, gangrænæ, quæ omnia cum obvenirent, possent mortem asferre. sed respondeo operationem hanc non asferre periculum mortis, sed tantum habere multas molestias, & difficultates conjunctas: nullæ enim ibi potest vel hæmorrhagia, vel convulsio, vel gangræna talis oriri, quæ non possit mox compesci a Medico, modo operationi velit vacare. Ergo non est periculum mortis. Secundo quia non fit scissio in musculis Brachii, sed tantum cure, & eligitur locus, in quo venæ & arteriæ magnæ non decurrunt.

Hæc tamen operatio infinitas difficultates, & inconvenientias habet. Prima est quod æger sæpe, & maximos debeat pati dolores. Hos patitur duplicatione; Primo propter sectiones, quia debet antiqua naci cicatrix circumcidi, brachium bis terve, diverso tempore secari, acus plurimæ per nasum & brachii carnem transfigi. Secundo propter brachii ad caput alliga-



alligationem, quæ bene quatuordecim diebus debet permanere, unde in cubito & omoplati æger ut olerabilem sere patitur dolorem, saltem prius quatuor aut quinque diebus, donec brachium sicut illi allueverit. Altera difficultas est, quod æger ægre solum capere possit, propter dolorem ex brachii alligatione. Terti, æger magnam patitur sitim, interim dum trachium capiti est annexum, eo quod propter nares ex traduce obstructas, cogatur per os respirare, aeris enim per os attractio, maximam gutturis, & linguæ semper siccitatem inducit, unde sitis. Quarta difficultas est quod hæc cura, quatuor mensibus dureret, & postquam jam nasus factus est, adhuc bene uno anno, aut altero necessum est, (modo æger velit nasum optime formatum habere) rectorium ad id sum gestare. Item de nocte, cum jam factus, hæc inconvenientia sequuntur. Primo quod aliquando in locum conjunctionis remaneat magna aut turpis cicatrix. Secundo quod pars apposita non sit omnino ejusdem coloris, cuius est nasus, sed est albicanior naso, & tempore hyemis cum illa pars frigeret propter defectum tunc caloris, ne tota livida, saltem prius nasus, cum pars reciperet agglutinationem, adhuc non est temperamento nam bene conformata, nec adhuc bene alluevit a naso calorem & alimentum recipere, aut ab eo perfecte nutrirî; quod facit res sunt alii molliores, quia cutis brachii est laxior cute nasi, ideo pars apposita magis quassata est, & pennula, quam verus nasus, qui stat recit & unus. 4. quia in factio naso aliquando pilii nascuntur, ideo quod caro opposita cum esset in brachio habuerit naturam pilos producendi; & sic eam adhuc servat, cum naso est applicata. 5. foramina facit nasi sunt longe minora foraminibus nati naturalis; nam etiam in principio illa foramina conformantur sitis magna, cum tempore tamen sunt minora, & aliquando ita minorantur, ut ægi sere per ea spiritum ducere non possint. 6. non habent facit nates tam exactum tenorem quam naturalis, eo quod extrema nervorum corporis non ingrediatur illam facit carnem, cum sint partes spermaticæ, nec possunt regerari, unde influxus facultatis sensitivæ & spiritus animæ in ea est debilior. 7. ille nasus vel debet in principio major fieri, quam deceat, vel in fine, si erat nimis parvus; caro enim illa novella quæ in principio est spongiosa, tempore decursum consolidatur ac constringitur, hinc immittitur; unde ut nasus sit postea bene proportionatus, debet in principio fieri major quam deceat. Sive ergo in principio fiat major, sive post evadat minor, utrumque disformitatem habet. Et si vero hæc omnia in eodem modo possint ex hac operatione contingere, tamen neque semper contingunt, & plurima possunt vitari, & plurima temporis decursu, & cum ætate non minuuntur.

Ad hanc operationem quævis corpora non sunt idonea. In cacochymia, in morbo gallico affectis, in intemperatis operatio est vitanda: in pituitosis & frigidis non succedit propter defectum caloris nativi quia in his facultas nutritrix non est vegeta: hinc tradux marcescit,

non bene nutritur, mortificatur, non facile agglutinatur, allabuntur ad partem pituitosis humores, qui nutritionem impediunt, & traducem faciunt laxum, spongiosum, edematofum, unde totum turpiter albescit, & livescit, propter caloris defectum.

Si biliosa sunt corpora, facile etiam marcescit, & siccatur tradux, & inflammatione, erysipelate, herpetibus, impeditur: si melancholica etiam facile tradux exarescit, nasus fit lividus, pilosus &c. conveniunt optime sani, sanguinei, carnosii, solida roseaque carne præditi, in his enim vegeta est nutritio, & calor nativus fortis, ideo tradux optime crescit, & educatur, & fit solidus, & facile agglutinatur, unde nasus solidus & boni coloris, & brevi tempore conformatus. Senes non conveniunt huic operationi, nec pueri, hi quia nequeunt manere quieti nec dolores tolerare, illi quia frigidi sunt & pituitosi, calor nativus, & virtus nutritiva in his sere emortui sunt: hinc tradux non adolescit, sed contabescit, & nequit conglutinari.

Tenpus omne etiam huic operationi accommodum non est. Pessima hiems, & tempus omne frigidum, quia ab externo frigore tradux, loqui per se debilis, ut pote a matre sua semivivus, debilitatur, & frigeratur, & perdit suum calorem nativum. Aestate biliosi humores facile in cutem effluentur, herpes inflammationes, febres oriuntur. Optimum est ver, quia temperatur, verum etiam autumnus, quia inter frigus, & calorem medius est.

Artificium hujus operationis in his præcipue consistit. Primo ut tradux ita nutriatur, foveturque, ut non conglobetur, marcescat, exsicceatur, & emoriatur, aut edematofus fiat, aut apostematibus, aut gangrena, aut humoris fluxionibus afficiatur, sed ut crescat, fiat crassius, & solidus, & bene sanus. Secundo, ut æqualiter naso accommodetur, proportionetur, non sit nimis tenuis, nec nimis crassus, & conjungatur cum parva & æquali, pulchraque cicatrice. Tercio, ut nasi foramina artificiose excaventur, & tradux parte interna ac interna sui quum ad labia pervenit, non sinatur agglutinari, quodque foramina nasi bene sint concinnata. Quarto, ut cum tradux undique est agglutinatus, pulchre conformetur, & concidatur, & in rectorio ita bene concludatur, ut pulchram acquirat figuram.

Verum ut hæc omnia bene observentur, necessum est operandi modum subungere. De Modo varii scripsere, imprimis Fallop. 1. de Decorat. c. 2. Alexand. Bened. 1. 6. c. 19. Vesal. 1. 3. Chirurgia c. 9. Paræus lib. 2. Chirurg. c. 2. Marian. Santus 17 consilii. Taliacotum in sua Chirurgia. Sed non omnes æque bene eum sunt assecuti. Verus & absolutissimus operationis modus est talis. Primo deliberandum ex quo brachio tradux sit eximendus. Cipiendum autem est brachium potius illius lateris, cui æger dormiendo non solet incumbere, vel id cuius alligationem facilius teret. Instat ordinariè capere sistulum. Primo, quia plerique homines in dextro latere melius dormiunt. Secundo, quia tunc poterit æger tempore operationis adhuc uti brachio dextero, quod magnum solatium adfert



adfert. Tertio, quia, cum fieri possit, ut brachium ab illa exsectione traducis debilitetur, vel aliquod inconueniens acquirat, præstiterit sinistram capere eo quod illo minus egeamus, ejusque noxam minus curemus. Insuper notandum, quod non oportet secare musculos brachii sicut male *Vesalium & Paracelsum* docent, sed tantum cutem carnolam ejus, nam musculos secare periculum convulsione adfert, & musciosa caro non est carni nasi homogenea aut proportionata. Eo cognito brachium denudetur, & medio inter cubitum & humerum loco parte brachii interioris cutis duabus manibus secundum brachii longitudinem attollatur: sic elevata apprehendatur tenacula quatuor digitis lata, quæ habeat foramen tenue instar lineæ tam longum, ac debet esse tradux amputanda. Illa tenacula fortiter comprimatur & claudatur, quo sensus carnis illa compressione minuat, & sic dolor non sentiatur.

Per illam lineam tenaculæ adigatur scalpellum, seu lancetta, quæ tranfigat carnem ad longitudinem lineæ, seu foraminis illius linearis tenaculæ. Tum enim tradux à brachio erit divisus tantum sursum & deorsum suis extremis adhuc adhærens. Tum antequam tenacula laxetur, per illud idem foramen lineare tenaculæ transmittatur oblonga pars lintei, seu fasciæ tam lata, quam est linea sectionis; & sit illa, primum albumine ovi, & oleo rosato imbuta. Tunc tenacula laxetur, & tradux explanetur. Porro imponitur linteam inter traducem, & carnem, ut non iterum accrescat, imbuitur albumine, & oleo rosato, ut sanguinem sistat, & sedet inflammationem: desuper ponantur cataplasmata anodyna, repellentia, & sanguinis fluxum sedantia: ab immodico tamen eorum usui est cavendum, ne frigiditate suâ faciant traducem emori. Secundo die, ablato metu accidentium, illa fasciæ quæ inter Brachium & traducem transit, inungatur terebinthina, & oleo olivæ ad suppurandum, sed nunquam fasciæ eximatur, quia non posset nisi magno dolore reponi. Cum alia imponi debet, ea priori assui debet, & sic pertrahi. His digestivis tam diu utendum, donec plaga sit bene suppurrata, & purgata. Ager primus quatuor diebus in lecto quiescat, brachium medio situi continet, non exerceat, utatur tenui & refrigerante victu, si nulla occurrunt prava symptomata, potest tum æger liberaliore victu uti, & brachio ad collum appenso etiam exire, & ambulare. Quatuordecim diebus debet sic tradux educari, nutrir, & foveri antequam ab una parte abscindatur, ut interim incarnetur, densetur, & robustus fiat: nam si statim primis diebus abscinderetur, conglobaretur, marcesceret, & inutilis fieret. Post diem circiter decimum quartum tradux in uno extremo est abscindendus. Debet autem abscindi parte superiore, quæ humerum spectat, manens inferiora parte sui adhuc brachio affixus. Idem autem debet abscindi parte superiore, ut cum affigitur naso; habeat cutem suam extrorsum: si inferius abscinderetur, cum applicaretur naso, deberet inverti, & sic cutis naturalis ejus veniret extrorsum, quod naso pareret deformitatem. Factâ abscissione iterum stiptica, & repellentia sunt adhibenda, & postmodum iterum

digestiva, sicut supra; ea autem sunt continuanda, novem aut decem diebus circiter. His elapsis, non est amplius suppurationi studendum, sed siccantia adhibenda ut tradux callescat, & consolidetur. Eo facto, de traduce naso agglutinando est cogitandum. Usque ad tempus agglutinationis æger nullas molestias habet, potest incedere, exire, & munia sua obire. Sed cum agglutinatio instituitur, tum dolores præ foribus sunt. Impræmissis tum universa barba est abradenda, ne ea impedimentum adferat, tum nasi antiqua cicatrix æqualiter est præsciudenda, & simul quoque cicatrix illius traducis extremitatis, quæ naso debet agglutinari: illæ enim cicatrices impedirent unionem, & agglutinationem. Nasus debet oblique deorsum præscindi, ut vulnus habeat trianguli figuram. Illi figuræ debet charta accommodari ejusdem figuræ. Illa charta tum debet traduci adhiberi, ut tradux ad figuram illius chartæ conformetur, & quicquid traducis extat debet abscindi, ut sic figura traducis figuræ nasi sit conformata. Cum tradux sic est figuratus, debet tum naso conjungi, & tum utrumque simul junctim consui, sed debet brachium manere in suo loco, seu ad pectus, & ibi debet acus cum filis primò per traducem transmissa sursum ad nasum duci, & ibidem per nasum ab infra, sursum foraminibus oppositis, transmitti: & idem debent acus habere fila oblonga, ut brachio supra pectus pendente usque ad nasum pervenire possit, quando utrobique acus cum filis sic transmissæ sunt, tum primum debet brachium elevari, & tradux naso applicari, & cum applicatus est, tum debent fila utrinque pertrahi & constringi, ut arcu naso tradux alligetur, debent acus sic per brachium, & nasum, à se distantia transmitti; quia si primò tradux naso admoveretur, cum una acus, cum primo puncto transmissa esset, non possent reliquæ acus commodè per utramque partem, jam conjunctam, transmitti pro reliquis punctis. Acus illæ debent ducere filum duplicatum, ex lino, ignem non experto, suturæ fieri debent non una acu, nec uno filo, sed pluribus, nempe tot, quot erant suturæ, sicut una quæque sutura sit cum diversâ acu, & filo. Suture debent esse quinque vel septem, una in medio, & duæ, vel tres à singulis lateribus; quæ in medio est, prius faciendâ est; postea autem à lateribus, hic enim fiet æqualiter applicatio.

His factis, brachium ita est fortiter capiti alligandum, ut nulla ratione, nullove modo possit ab eo, vel minimum separari aut divelli, nisi si vel minimum divelli posset, agglutinatio quæ sit labiorum vulnere conjunctione, impediretur. Brachii alligati situs sic esse debet, ut corpus supremum frontis tangat, vola capitis vertici superponatur, & medius digitus ad angulum suturæ lamdoeidis deveniat. Ut illa alligatio bene fiat, debet pariri unus thorax cum cuculla ex linteo grosso, & forti, quod extendi & laxari non potest, & eo debet æger indui, ut fasciæ ei hinc inde optime annecti possint. Fasciæ, quæ brachium annectitur, est in mediolata, & cava, ut brachii cubitus in illa cavitate recipiatur, & quiescat: debetque esse sic confuta, & ex tali linteo facta, ut non possit extendi. Illa fasciæ habet diversas fascias seu

extre-



extrema in oppositas partes tendentia, tanquam ramos, aut propagines, quæ ad caput, collum, & alias diversas partes adduci, alligari, & annecti possint, ut brachium quàm exactissime firmetur. Cum jam per futuram applicatus est tradux, debent ei medicamenta repellentia, & sanguinem silentia apponi primo: postea vero, super lineam conjunctionis, debent semper siccantia, glutinantia, & cicatrifiantia supponi, donec sit agglutinatio facta. Alii balsamis utuntur, alii emplastris siccantibus, ut emplastro barbaro diaconphoticis &c.

Parte interna debent suppurantia adhiberi. Quarto plerumque die signa agglutinationis factæ apparent. Cum illa apparent, futuras laxare oportet: præstat autem aliquas tantum laxare non omnes simul, ad videndum atque experiendum, an tradux adhæreat. Si bene adhæreat, oportet alias futuras etiam statim laxari, si enim futuræ diu manerent, fierent in foraminibus futurarum ulcera & remanerent postea turpes cicatrices. Prima itaque agglutinatio, nempe externæ partis nasi, quæ futura sunt factæ, septimâ die perfectè facta est: verum agglutinationis partis internæ nec dum adhuc tunc est facta; sed diu postea fit. Impediendum autem nè interna parte ita tradux statim agglutinetur, quia illoqui foramina nasi tum amplius excavari non possent. Itaque non prius sinenda est illa pars agglutinari, quàm quando foramina illa bene sint perfecta. Post septimum ergo diem, cum jam futuræ sunt laxatæ, debent adhuc epulonica loco futurarum adhiberi, usque ad alios septem dies, priusquam tradux amputetur, ut interim fiat firmissima agglutinatio & dura mater, & tradux naso assuescat, & ab eo jam didicerit bene nutrirî. Decimo quarto itaque die à primâ futurâ debet tradux extremo illo, quod huic brachio adhærebat, abscindi: non debet autem totum simul abscindi, sed tantum pro media parte ad experiendum, an si totus abscinderetur, fortè non emoreretur, & an à naso jam sufficienter nutrire-  
tur.

Si enim pro medio abscissus non mutet colorem suum, nec fiat lividus aut pallidus, indicium est, quod à naso jam perfectè nutriatur. Tum in totum est abscindendus. Quando tradux est abscissus, magna ejus habenda cura est, nè frigescat aut emoriatur, quia à naso adhuc debiliter nutritur, & ab eo exiguum spiritum, & calorem adhuc recipit. Tum videndum, quantum de mole traducis jam agglutinati, ad nasi restorationem opus sit: quod ejus supervacaneum esset debet postmodum amputari, & in rotundum ad formam nasi, cum cultro conformari: Potest autem hoc sine dolore fieri, quia tradux tum exiguum sensum habet: tum super traducis parte recenter amputatâ, septem iterum diebus suppurantibus, & siccantibus utendum ab infra: & parte interna traducis duæ turundæ medicamento idoneo imbutæ infigendæ sunt, nè tradux subtus naso accrescens foramina obstruat. Illis turundis foramina confortabuntur. Interim quia ea parte, ubi tradux rescissus est, sæpe nova caro ultra proportionem accrescit, ea sæpe rescindi debet, nè forma nasi vitietur. Quando foramina confor-

mata sunt, pro ultimo internæ, ac internæ partis traducis agglutinatio procuranda est.

Omnibus us factis tubuli duo plumbei, pro turundis, sunt imponendi, & instrumento cavo, seu tectorio ad similitudinem. Nasi facti tradux, seu novellus nasus est includendus, ut in eo & similitudinem & figuram suam exactius acquirat. Tubuli singulis ferè diebus sunt removendi, & pro plumbeis postea argentei sunt imponendi. Tectorium primò ex pumbo, deinde ex argento fieri debet. Plumbum enim magis callum inducit; argentum verò dat soliditatem & appanationem. Illud tectorium hieme tenui panno lineo vel bissino est investendum, nè frigus metalli calorem recentis nasi adhuc debilem extinguat, ætate verò ni nil debet interius poni, melius enim appanatur, & solidatur à tectorio nasus, si nihil intermedium sit, & nudum metallum nasum tangat quàm aliter.

Nasus debet quàm diutissime tectorio inclusus gestari: quo enim diutius ei includitur, formam suam servat magis permanentem, & induratur: adeò ut ad duos annos sic in tectorio gestari malum non sit. Naso sic effuso in loco cicatricis aliquando talia medicamenta adhibenda, quæ cicatrices dolent, ut minus nasus habeat deformitatis. *Thom. Fienus de præcip. artis Chirurgic. controvers. tract. 12.*

#### *De carne lateris ablata & restituta.*

Ab itinere Brasiliensi ad nox redux Chirurgus haud vulgaris experientia, & jussu regio à nobis examinatus, sancta fide asseveravit, ictu tormenti ablatam esse nauciero in navi qua vehebatur, magnam carnis portionem in sinistro hypochondrio, ut hiatu manifesto viscera interiora illæsa apparerent, se verò carne vervecinâ, quæ fortè ad manus erat; laesum locum replevisse, & hæc Chirurgia curtorum hominem restituisse. *Thomas Bartholinus inst. 39. cens. 6.*

#### C A R O L I.

Sunt pustulæ venereæ in membro virili excitæ de quibus capite de Luc Venerea.

### C A R U N C U L A.

#### *In Meatu urinario.*

**H**ic de Carunculis illis præternaturalibus Hagimus quæ à succo ex ulcere, vel colli vesicæ, vel meatus ipsius urinarii, subinde succrescunt, urinæque evacuationi non parum incommodant. Ulcera autem illa unde enascuntur ejusmodi carunculæ, sunt ut plurimum venereæ, à Gonorrhæa scilicet orta. Ex eo dignoscitur hoc malum quòd urina non ut in sanis pleno, ut aiunt, alveo prorumpat, sed minutius & ad instar fili in duas partes divisi, exeat; præterea dolor in mictionis sine crudeliùs, quàm dum urina profluit, discruciat. Explorari etiam potest Cathetere immisso.

*Pro*



*Pro Carunculis in collo vesicae.*

℞. Viridis aris, auripigmenti, vitrioli, alumin. roch. an. ʒ ij. Omnia hac aceto acerrimo pertusa inter duos porphyrites lapides, quam accuratissime ducantur, in lavoremque tenuissimum reddantur, & soli altivali exponantur. Hac rursus sic exsiccata aceto affuso ducenda sunt, & laviganda, solique exponenda, quousque pulvis subtilissimus evadat, ut ab iis omnis prorsus acrimonia extincta sit, quod opus 8. dierum spatio conficies, hoc parato pulverere.

℞. Ol. rosac. ʒ iv. litharg. ʒ ij. ad ignem f. coctura quousque emplastri acquirat consistentiam, tunc ab igne deposito, adde prædicti pulveris ʒ ij. & spatula M. & ad ignem omni tractato, quousque medicamentum duriusculum evadat, ita ut si candelæ cereæ, vel plumbeæ virgulæ hæreat, non diffuat etiam si digitis tractetur. Hoc enim emplastrum hujus Lernæi & Herculei morbi clava exitit, quod hymnis multis, & laudibus variis decantari meretur. Nec solum huic morbo prodest, sed varios alios arcet, & explodit, nam polipos unice curat, & extuberantes carnes in aurium meatibus & aliis locis repertas unice extirpat, & refecat.

Præter hoc emplastrum cereæ candelæ numero xx. in promptu erant, quæ ex alba cera paucula resina terebinthina adjecta parabantur longitudinis 12. digitorum transversorum, crassitudinis vero prout nobis meatus urinaris ferre videbatur. Nec minus ex plumbo 3. vel 4. plumbeas virgulas paratas habuimus, quibus quando caruncula refractaria & difficiles sunt, candelarum vice utimur: iis sic in ordinem dispositis candelam ceream unam vel alteram per circuitum excavatam eo modo quo fusi in cuspide, ne fila decendant, excavari solent, ex prædicto emplastro humectam per urinarium meatum ægrotante optime sedente immittimus, ac per 6. vel 8. dies singulis diebus unam, vel alteram, ut decet innovatam candelam æger continuo in urinario meatu insertam habet, neque absque eâ, nisi meiendi tempore, agat, necesse est; septimo die in ægrotto nostro carunculas defecisse manifestissime deprehendimus ex his signis, primo quod candela jam facile penetrabat, secundo ex multitudine caruncularum putridarum extra emissarum, & humoris purulenti effluentis.

Tertio ex urinx expeditâ ejaculatione, extirpatis igitur ac ex toto eradicatis carunculis per 8. sequentes dies nihil per siphonem injecimus, sola candela crassiuscula sicca absque alicujus rei inunctione immisâ contenti. Nam etsi caruncula extirpata sint, non tamen ex toto portuuncula, quæ emplastrum subterfugit, brevi illo tempore deponi potuerunt, sed ut magis exacte excernantur longiori indigent tempore, quas ad fundum vesicæ non sine ulcerum vellicatione & ægrotantis detrimento, si per Siphonem quid injecerimus, retrocedere faciemus, reliquis igitur 7. diebus urinarium meatum per candelam ceream crassiusculam patefactum servavimus, per quem urina abstergendi exsiccandique vim habens libere

& expeditè exeat secum caruncularum reliquias nonnullas excernens. Quod unum hæc in curatione tanquam præcipuum adnotandum decrevi, elapso igitur hoc tempore quo & caruncularum & crassioris puris effluxus cessavit, ad nonnullorum liquidorum abstergendi vires habentium injectionem per siphonem devenimus in hunc modum.

℞. Hordei integr. pii, rad. aristol. rot. ʒiij. fol. plantag. p. ij. f. e. a. decoctio in aq. ʒiij. ad medias. Colaturæ adde mell. rosac. colati ʒ ij. m. & cum siphone per fistulam urinariam injice bis vel ter in die, & virgulam plumbeam, aut candelam ceream remittat. Hoc decocto absterfitorio nos utimur continuo & in nostro hoc ægrotante intra 6. dies opus peregit, quod si fortiori opus fuerit, ad aquam mantracæ viridem pro ulceribus exacte abstergendis pervenimus, quæ ita habet.

℞. Alumin. roch. virid. aris an. ʒ β. auripigmenti ʒ j. f. decoctio in aq. fontis vel plantag. ʒiij. quousque ʒ β. absumatur; per sacculum linteum colatur. Hanc aquam camphorâ alteratam per siphonem in meatum injicimus, deinde post plures elapso dies hoc cicatrizans medicamentum injicimus.

℞. Ceruss. ʒ j. alum. roch. lithargyr. an. ʒij. f. decoctio in aq. caudæ equinæ ʒiij. ad medias, colatura per manicam linteam tractata injiciatur. Iis medicamentis hic vir intra mensem ex toto sanus evasit. Si ut aliquando dolor superveniat, urinaris meatus colluatur lacte aut aqua rosacea camphorâ admixta, aut decocto sem. lini & scenugræci, quod si acerrimus dolor sit, ut eum æger pati nequeat, ad opii unum aut alterum granum devenimus dissolutum in aqua ros. *Amatus Lusitanus cent. 4. curat. 19.*

*Pro carunculis in meatu urinario.*

Post celebratas universales evacuationes, partes urinæ famulantes fomento, balneis, ac unguentis relaxantibus fortis sunt deinde ad opus Chirurgicum accessimus, hoc modo. Candelas cereas albas, quibus parum terebinthinæ immixtum erat, paratas habebat Chirurgus longitudinis 12. digitorum transversorum, crassitudinis vero prout meatus urinaris ferre posset videbatur, eas Chirurgus sequenti unguento oblinebat & bis in die impositum, unguentum illud erat ex lib. i. pag. 20. *De secretis Alexii Pedemontani* ad ulcus sanandum carnosum etiam si fuerit inveteratum, cujus hæc erat descriptio.

℞. Fæces ex melle destillato, vel his deficientibus summo mellis ad justam crassitudinem cocti. Deinde ponito in ollâ ad cremandum vel in figuli vel in vitram fornace, donec auri colorem assumat, hæc materia valet ad omnes plagas, nam carnem putridam atque mortuam consumit, postea mundificat, & absque ullo dolore per sanat.

℞. Hujus pulveris ʒ j. stercoris canin. ʒ ij. tartar. alb. ʒ β. sacch. albi. aluminis usti, tuthiæ an. ʒ j. terantur omnia atque cribrentur. Deinde.

℞. Fol. olivæ rec. contund. in mortario lapideo optime, adjiciendo parum vini albi postea



postea benè expresso succo addatur tantundem succi plantag. ponanturque ad ignem infundendo paulatim prædictos pulveres & continuo miscendo, postremò parum ceræ viridis adjungatur & parùm mellis rosac. s. unguentum molle atque in usum servetur. Est autem valde pretiosum ad carnem consumendam consistentem præsertim in locis valde sensibilibus, quæ fortia medicamenta respuunt propter dolorem. Modus vero utendi est hujusmodi; syringa parva vino albo impleatur, in quorolæ sicca & fol. plantag. cocta, deinde parùm lactis muliebris vel caprini adjectum fuerit, ponatur in virgam, quæ vino optimè lavetur, deinde candelam parvam ceream sumito, & in ejus mucrone prædicti unguenti parùm affigito, atque sic in virgam immittito quousque ulcus pertingat, & unguentum ibi relinquat hoc bis in die faciendum manè scilicet & vespere, & sic admirabilem effectum videre licebit: nam paucis absque ullo periculo æger sanabitur. Hoc tamen non juvante usi sumus experimento *Amati Lusitani* descripto cent. 4. curat. 19. quo feliciter curatus fuit æger nolter. *Petrus Forestius* Observ. 10. lib. 25. *De Vesica morbis.*

*Pro Carunculis urinam supprimentibus.*

Caruncula, quia pepasmi experta est, si impedimentum fecerit, consumi debet, abstergi ulcus & claudiri, ne moriatur æger, (inquit *Hallerius*) cogimur carunculis illam absorbere, & rumpere; remedio carunculis est oleum cucumeris alium remixtum cum unguento rosato, cui pauca grana sublimati, vel præcipitati adduntur; candela cerea immittetur doctæ manui, vel hæc adduntur unguento de Tutia: quidam 30. ferè annis ita laboraverat, urinâ semper tenui filo fluente, his recreatus fuit *Joan. Henricus* ad aphor. *Hippoc.* 82. sect. 4.

Pro caruncula in meatu urinario inter alia unum familiare habeo secretum, arsenicum nigrum, quo utor hoc modo. Emollio optime ipsum super lapide pictorio cum succo limonium, postea soli, donec siccatur, expono; deinde ipsum diluo aceto stillatitio, & iterum sub sole sicco, & hoc quater facio. Ultima vice abluo aq. rosac. deinde cum aliquo cerato misceo, ut cum diapalma vel diachylone, vel cum ol. ros. & cera, & facio emplastrum pro ratione duritiei carunculae, & minimam portiunculam hujus medicamenti pono in extrenitate candelæ & quotidie semel aut bis in meatum urinarium felicissimè intromitto. *Gabriel Fallopius* lib. de Tumoribus cap. 38.

Carunculam meatus urinarii certissimo experimento in pluribus sustulit *Antonius Fuchsius* Medicus *Noribergensis*, scil. oleum succini cum vitello ovi mixtum applicabat candelâ cereâ, & meatui immittebat securum sanè remedium, & reliquis omnibus præferendum, si respondeat eventus. *Hieronymus Reusnerus*. Obs. 91.

**C A R C I N F S**

Vid.

**C A N C E R.**

**C A R U S.**

Item

*Coma Somnolentum & Vigil, Somnolentia perpetua ac Lethargus.*

**S**omnus naturalis qui pars est humanæ melior vitæ, laborumque portus meritò censetur, in morbosum quid abeat pro graduum varietate variis insignitur nominibus, exiunde enim & *Carus*, & *Coma Somnolentum* ac *Vigil*, & *Somnolentia perpetua* & etiam *Lethargus* oriuntur. Unam enim propè ac eandem causam agnoscunt morbi variis hæc nominibus distincti & gradu tantum distant, propterea uno eodemque capite a nobis describentur.

Est autem *Carus* somnus sine febre & maxime profundus, in quo æger etiam durius compunctus aliqu ntilum revera membrum sape contrahit, at interim neque clamoribus, neque pilorum. vellicationibus, aliisque mediis excitari potest. *Coma Somnolentum* seu *Cataphora* est somnus profundus quidem, sed a quo æger excitatur & respondet, verum mox in somnum relabitur, idque sine febre. *Coma Vigil* est gravis ad somnum propeasio cum impotentia tamen ad eundem, in quo scilicet ut eleganter *Tertullianus* quam sitit æger quietem desperat ebibere. *Somnolentia perpetua* est continua ad somnum propensio etiam inter colloquia ac conversationes. *Lethargus* tandem est affectus in quo æger somno quidem quasi sepelitur, sed ad interrogata respondet cum delirio, & febrem habet adjunctam.

*Pars affecta* in hisce omnibus affectibus est cerebrum, quod scilicet humoribus pituitosis, vel etiam particulis narcoticis varie obfessum, varios somnolentorum morborum gradus profert. Cerebrum autem hic in genere tanquam spirituum animalium genuinum fontem pro parte affecta producimus, nec ad corpora striata, medullam oblongatam, aliasque in specie hujusce visceris partes nos restringimus, quia quicquid demum super hac materia tradant *Willilius* & alii, de earundem tamen functionibus particularibus & læsionibus adhuc dum non satis constat. Focus autem morbi sæpius non est in cerebro, sed ut plurimum in imo ventre scilicet humoribus corruptis variis ipsius visceribus innidulantibus sanguinemque, aut succum nerveum eo contagio insipientibus quod ad cerebrum delatum morbos descriptos pariat.

Quomodo *Somnolentia perpetua* ab aliis omnibus Affectibus Soporosis differat satis clarum est: In eo autem *Lethargus* ab iis distinguitur, quod febrem habeat comitem quæ nec in *Caro*, nec in *Comate Somnolento* aut *Vigili* nec in *Somnolentia perpetua* si simplex fuerit affectus, affligit. In specie vero à *Caro* diversus est, quod quamvis in illo magna adsit ad somnum propensio, æger tamen clamoribus excitari potest, & ad interrogata cum delirio respondere, cum in *Caro* somnus sit tam profundus ut nulla vi æger excitari queat. *Coma Vigil*

Na



differt à Caro ut & à Comate Somnolento & Lethargo, quod eo tacti quamvis per propriam morbi propensionem somno capescendo quam maxime parati videantur, inquieti tamen continuo vigilant. *Carus* tandem & *Coma Somnolentum* inter se tantum secundum magis & minus discriminantur; Quidam etiam qui *Comatis* nomine omnem morbosum somnum designant, illud in profundum seu grave per quod ægrotans in nigras Lethargi mergitur undas & propriè *Carus* est; in insomne de quo supra; in somnificum quod in utriusque prædictorum confinio positum est; & denique morbum quem hic *Comatis* nonnunc in specie insignimus, disperiunt.

*Causa* horumce omnium affectuum est, vel humor pituitosus spirituum animalium motus quales pro vigilia requiruntur, præpediens, vel particula venenosa ac narcotica quæ etiam secundum Sylvium de le Boë in bile ad opii naturam & genium per peculiarem quandam fermentationem ac corruptionem exaltata reperiri possunt & nunc parcius, nunc abundantius, nunc magis, nunc minus sese explicant & diffundunt, sicque spirituum actioni magis aut minus officientes, varios morborum sopororum gradus constituunt. Humoribus autem, aut particulis prædictis, adungi possunt aliz actiores, aut cerebri membranarum peculiaris dispositio, quibus arceatur somnus per irretitos ex parte spiritus aliàs necessario inducendus; sic videmus quotidie temperamenta quædam cerebrique specificas constitutiones quæ opii omnem vim eludunt, scilicet respectu somni, & ab eo epoto vel aliàs deglutito potius cum inquietudine vigilant quam dormiunt, dum interim eorum caput vaporibus, ut loquuntur, repletum non parum gravatur. Febrim Lethargi comitem quod attinet, ejus causam minime necesse est huc adducamus, cum eadem sit quæ aliàs plures febres facit, scilicet fermentatio inter varios humores seu potius inter varios sales humoribus & succis corporis nostri degeneribus supra modum exaltatos, innidulantes, orta, de qua suo loco, nempe tractatu de Febris.

*Diagnos* ex descriptione & differentiis horumce affectuum mox allatis, satis patet.

*Prognosis* vero varia est pro varietate affectuum, ac primò *Carus* prognosis omnino est ominousæ, præcipuè si febrim malignam, aliamque non judicatam adjunctam habeat, aut si puerperium consequatur, ut & si morbis aliis cephalicis, aut capitis vulneribus succedat. Non raro etiam in Apoplexiam eamque citò lethalem abit, & etiam si cerebrum aliquando videatur ex parte excussisse materiam morbificam, unde loquela restituitur, non sic tamen minus timendum, ne spasmi superveniant, aliaque quæ ægrum subito tollant. *Coma Somnolentum* dubium omnino est eventus & medicum prudentem inter spem ac metum continet. *Coma Vigil* melancholicis proprium irritationemque magnam in cerebro aut ejus membranis denotans, in Maniam sæpe abit, nec periculo vacat. *Somnolentia perpetua* ad affectus alios omnes somnolentos, ipsamque etiam Apoplexiam viam sternit. *Lethargus* tandem per febrim ut plurimum malignam sibi adjunctam potius quam per se

periculosus est, & præterea propter metum inflammationis in cerebri meningibus, à particulis salino acrioribus ipsis quasi in pacis, & à febris foco continuo ascendentibus, unde Phrenitis excitari potest. In senibus tamen iisque quorum vires profus collapsæ sunt, periculosior est, ut & cum à veneno, vel intus assumpto, vel extus per ictum à venenato animali inditum serpente diutiusque retento, procreatur. ex Hippocr. autem sect. 7. Aph. 21. tremor Lethargo superveniens malum, ut & ex ejusdem sect. 2. Aph. 1. somnus laborem multum faciens malum. Si affectus hic ex crapula, ictu, plaga, aut narcoticis assumptis, iisque non admodum indolis oriatur, spes omnis non excluditur; ut & si minus fortis atq; medicamentorum ope statim aliquid causæ morbificæ dimoveri videatur.

*Indicationes* hic eadem prope sunt quas in Apoplexia & Paralyfi adduximus, observata tantum graduum varietate. *Lethargum* quod spectat, quandoquidem ut plurimum alterius morbi soboles est, vel à causa aliqua evidenti evadit, indicationes ab iisdem petantur, nam longum foret ac minus necessarium eas hic omnes pro varietate causarum enumerare. In *Comate* quoque retundendi venit acrimonia illa vitriolica cerebro ac præcipuè ejusdem membranis imposita, unde & spiritus efferrari & in motus maniacos deduci possunt: hæc autem ad classem morborum melancholicorum referenda videntur.

De *Curatione* nihil hic addimus nisi quæ tum in aliis afferuntur capitibus, sed præcipuè de Apoplexia, ut & etiam quæ mox à variis Autoribus adducenda veniunt.

#### *Curationes, Consultationes, Observationes & Anatomicae Inspectiones ex variis.*

##### *Curationes.*

In sopore, caro, veterino, comate, vigiliis, cataphora, siphila stricta, id est noctambulone, incubo, in tremore, stupore, ceterisque vitis cerebri, præter illa, quæ hactenus enumerata sunt, potissimum prodest, liquor luna, supra in desipientia descriptus, cujus excellentiam in ejusmodi casibus commendari nequit.

NB. Sternutatoria, in ejusmodi casibus esse necessaria, itaque in curationibus istorum morborum sternutationes sunt sæpius provocandæ.

Prodest hinc ex oleo castorei cum sicco ruta, fomiculizit. ℞. Succu apii, acet. fortis q. s. & cum pulvere castorei s. emplastrum, & capiti abrafo superpone *Joan. Mart. in praxi chin. art.*

*De Comate vigili.*

Licet coma *apoplectica* seu vigil ad soporosos affectus refecti soleat quia tamen longe diversam à ceteris conditionem obtinet, ideo seorsum in hoc capite explicandum est.

Est autem coma vigil stertilis, in quo ægri clausis oculis decumbunt, ut dormire videantur, cum tamen vigilant, & delirant, ac si eos retigeris, statim oculos aperiunt & torve alpicunt, & iterum delabuntur in somnum, qui variis imaginibus, & deliramentis impeditur, ita ut vigilare cogantur. Hunc affectum Gal. medium constituit inter phrenitidem & lethargum & typhomaniam appellat.

*Causa*



Causa hujus affectus vulgatissima est bilis cum pituita permixta, a quibus humoribus cerebrum tantum irrigatur, vel tumorem atque inflammationem cocipit, unde erysipelas oedematofum, vel oedema erysipelatosum exoritur. Cum autem ea humorum miscella variis modis & proportionibus veri valeat, sic variis in diversis ægrotantibus isti affectus apparent. Si enim bilis in mixtione pravealeat, delirium majus est, & ægri licet clausos habeant oculos, minus dormiunt; si vero pituita predominetur, ægri magis dormiunt, minus delirant, & expergefati minus vociferantur, ac desipiunt.

Hic enim coma vigil per sympathiam à vaporibus biliosis, pituitosis simul mixtis in cerebrum translatis: quod non raro solet contingere in febribus ex humorum miscella oriundis, præcipue hemicriticis ex tertiana, & quotidiana compositis. Non est tamen inconveniens asserere, vapores simpliciter calidos & humidos in febribus satis intensis hunc affectum producere, quia ab humiditate hic somnus, a calore autem vigilia.

Diagnosin hujus affectus ex iis quæ antea dicta sunt satis elucescit in eo enim laborantes clausis oculis permanent, & somnum capere videntur; attamen dormire nec queunt, & se variis modis excitant, sese subito erigunt, e lecto surgere nituntur, & iterum in somnum relabuntur. Causarum varietas ex prædictis etiam facile dignoscitur.

Periculosus affectus maxime censendus est. Sive enim tumore, & inflammatione cerebrum afficiatur, grave malum esse consuevit, seu alio quovis modo a prædictis humoribus obsideatur, sive a vaporibus ex febrium malignarum materia oriundis afficiatur.

Deliria vehementiora in comate vigili convolutionem efficiunt: hunc enim ab humore, vel vapore acerrimo, qui partes nervosas feriendo convolutionem facile concitare potest.

Curatio comitis vigiliis idiopathici iisdem instrumentis percutitur, quibus phrenitis & lethargus curari consuevit: quod si magis ad phrenitidem delectat, illius remedia magis adhibentur; si vero magis ad lethargum inclinet, ejusdem remedia magis usurpantur. Symphtici vero comitis curatio a febris malignæ curatione dependet, à qua sumit originem. Peculiariter tamen remedia vapores illos à cerebro revellentia, & repellentia usurpanda sunt in principio, ut phlebotomia ex brachio & malleolo, & Oxyrrhina fronti & syncipiti admota, quibus accedent clysteres frequenter injecti, cucubitalæ tum siccæ, tum humidæ scapulis, cubito, natibus, & cruribus affixæ; vesicatoria in brachiis, & femoribus admota & si in cerebro intus videatur, derivatio per sectionem venæ frontis, aut hirudines pone antea, & temporibus affixas, molienda erit, si resolutio procuranda animalibus tenentibus capiti admotis. *Lazarus Rivierus medic. lib. 1.*

In Comate &c. nimium Phlegma cerebrum inundans, est evacuandum nunc per alium nunc per sudorem, nunc per sternutatoria. Si id est torpidi primò acidis excitandi, & si spiritibus spirituosissimis denuo restaurandi. Litteras acris, aut sensuum organa vel-

licantibus nimius somnus impediendus

Inter evacuentia prunatum obtinet vomitus, qui si commode potest institui, admodum est proficiuus: hæc inter uti novum est, eminent emetica antimonialia vini emetica. Item tinctura Nicotianæ cum spiritu vini extracta ad ʒij. propinata. Purgatip institui debet cito, neglecta temporum electione, neque enim timidus aut cunctabundus in purgandis Lethargicis debet esse medicus, & quidem forti medicamento fiat; alias enim frustra laboratur. Inter purgantia imprimis est purgans ex scammonio cum castoreo, id quod jam à Tralliani ætate fuit celebratum. v. g.

ʒi. Castorei ʒj. scammonii præparati ʒj. M. Divid. in 2. partes æquales. Datur in vehiculo oxymelitis scillitici, jam hoc ipsum à Tralliani ætate, ut dixi, est celebratum, & curavit eadem virum 53. annorum Borellus uti videre est in cent. 2. obs. 52. Alias extractum phlegmagogum Quercetani a ʒj ad ʒss. propinatur. Item extractum Trochiscorum alhandal a gr. 6. ad xij. usurpatur. Item extractum Esulæ aliis loco stimuli additum laudatur. Ex officinalibus sunt Pilulæ cochis ad ʒj. propinata, quæ ceu expertus in Lethargo commendat Borellus lib. 10. obs. 33. si cum Castoreo Misceantur v. g.

ʒi. Extracti phlegmagogi Quercetani, castorei ana. ʒss. Extracti Trochiscor. alhandal. gr. ij. Resinæ Jalapæ gr. v. c. s. q. eff. Castorei F. v. Pilulæ purg. credo quod pilulis additus mercur. dulcis non futurus sit frustraneus, cum hic in similibus affectibus alias sit egregius.

Loco purgantium per os assumendorum si non possint convenienter adhiberi; conveniunt clysteres acres & fortiter stimulant, quibus imprimis addenda salia volat. V. gr. sunt tales clysteres ex cent. minor. Majoran. Salvia, origano, absinthio, serpillio, ruta, pyrethro, felle tauri inspissato. Pulpæ colocynthidos in petia ligata cum electuario de Hiera picra cum agarico, cum electuario Indo & similibus v. g.

ʒi. Herbarum absinthii, cent. minor. folior. rutæ ana. mj. radicis pyreth. ʒiij. pulpæ colocynth. in petia ligat. ʒiij. (alias enim exulcerat intestina) coquantur in f. q. aqu. communis. Colaturæ.

ʒi. ʒix. cui adde Electuarii cum agarico ʒj. fell. tauri inspissati ʒj. sal. vol. succini ʒss. vitell. ovor. Num. i. M. pro clymate, quod est satis acre.

Item subinde applicantur suppositoria, eaque etiam acutiora: Nunc scilicet suppositoria acuta usitata illita cum felle tauri, aut illita cum ol. colocynth. Quercetani: vel præparantur de novo, ex melle inspissato cum sal. gemm. aut ex felle tauri inspissato cum speciebus Hieræ picr. & similibus, quæ cum melle conjunguntur, in formam suppositoriorum applicanda.

Præmissis hisce dantur appropriati, quibus tamen etiam intersciantur sternutatoria. Hæc sternutatoria sunt fortiora ex rad. Helleb. albi, rad. liliorum convall. cum granis aliquot Euphorbii. Item ex pulvere Nicotianæ cum Euphorbio & aliquot granis sal. volat. urinæ spirit. vin. vol. Nam hæc salia vol. optimè permiscuntur cum talibus sternutoriis acrioribus cum fortiter penetrent, dum interea alia acris sternutatoria vellicant. Vitriolum ad albedi-



etiam succus rutæ mistus cum aceto naribus applicatus aut cum linteis temporibus & fronti alligatus admodum laudatur. Semen sinapi aceto iunctum, si eodem fricentur plantæ pedum, commendatur ad excitandos lethargicos. Comata febrilia quæcumque optimè curat acetum naribus applicatum, quo validius, eo est melius; unde spir. vitriol. omnibus præfertur. Carus ex opiatorum & narcoticorum externo abusu aut vaporibus venenatis mercurialibus aut sub nuce juglande contractus, aut ex ebrietate aut ex inspiratione halituum ex liquoribus fermentantibus ortus curatur quando vomitus mature instituitur. Hinc acetum naribus est applicandum, & postmodum spirituosus internus spiritus animales denuo volatilifandi. Ex opio s. croco si sit carus acetum est optimum. Hos etiam figit opium & opii sal. vol. oleosum omnino destruit; unde etiam acetum assumitur a quibusdam in præparationem Laudani opiati. Ex Ebrietate si oriatur carus præmissio vomitorio acetum capiti applicandum, & epithema ex succo semper vivi majoris Acet. & nitr. testibus applicandum & subinde renovandum potenter enim ebrietatem discutit. Imprimis spiritus salis armoniaci vol. non erit inconveniens, propterea quoniam hic spiritum vini rectificatum (unde ebrietas) prompte coagulat in olfam crassam, ratione cuius coagulationis est præservativum ebrietatis, sicut etiam curat ebrietatem coagulando spiritum vini, eumque aut per sudorem aut per urinam expellendo. *Micheæl Eschmüller. Collegii præfici part. 2. cap. 7.*

*In caro & comate.*

Methodus Therapeutica easdem medendi intentiones suggerit, ac eadem prorsus remedia indicat, quæ in lethargo & apoplexia adhiberi solent. Quare non opus erit, indicationum classes hic subicere aut ingentem medicamentorum sylvam congerere *Tom. Willis de Morbis cerebri.*

Coma vigil rarò morbus solitarius, sed plerumque symptomata est, aliisque affectibus, uti febris, phrenitidi, lethargo, & similibus superviens, quapropter methodum therapeuticam peculiarem non postulat, at vero tantum opus esse videtur, ut remediis primario indicatis adjungantur alia cephalica, quæ nempe hæc cerebri meteo quasi nubes & fulgur dissipant, vel si utraque simul exterminari nequeant, ipsum medicamentum unius affectus partis foveat, quo iste superior factus, mox alterum vincat: adeo in somnolentia, vigilia aut, perfectum somnum aut perfectam vigiliam accersere conveniat. enim verò in hoc casu narcotica sæpè bono cum successu exhibui. *Thom. Willis de pervigilio.*

Circa lethargi therapejam cum nullas faciat inducias, haud diu deliberandum est post Enema acrius injectum, protenus vena secetur; nam vasa sanguine depleta serum, aut alios humores in cerebro depositos aptius resorbent. Porro in hoc casu venam jugularem præ brachiali pertundendam consulo. Quoniam hoc morbo sanguis intra capitis sinus plurimum coactervatus, & forsitan stagnans in circulationem æquabilem facilius reducetur.

Phlebotome peracta, alia cujusque generis

remedia mox in usum adhibenda sunt. Vesicatoria larga cervici, & cruribus applicentur, tempora & facies oleo succini, aut balsamis cephalicis illinenda, cataplasmata ex Ruta, Piperitide aut ranunculo, cum sapone nigro & sale marino in pulvem contulis totis pedibus imponantur frictiones alperiores membris adhibeantur, sal urinæ aut spiritus salis armoniaci crebro naribus admoveatur. Interim remedia cephalica subinde propinentur.

℞. Aq. Florum Proniæ, ceraforum nigrorum, Rutæ, juglandium simplicis an. ʒij. Castorii nodulo inclusi, & in vitro suspensi ʒij. acchari ʒij. misce f. julapium, dentur Cochlearia iij. vel v. tertia, vel quarta quaque hora, porro singulis hujus dosibus adde sp. C. C. succini, vel salis armoniaci gut. 12. ad 15. vel chartam pulveris sequentis.

℞. Pul. Rad. Proniæ Maris, Cranii Humani, rad. serpentariæ virginariæ contrayervæ an. ʒj. Bezoar. Margarit. an. ʒʒ. Coralli præpar. ʒj. f. pulvis divide in 12 partes.

Porro hic considerandum est, annon Catharsis per vomitum aut secessum mox ab initio celebrari debeat. Scio hoc inter authores varie controverti, etiam vario cum successu in praxi adhibitum novi: quibus perpenlis, & inter se collatis, quid nostra fert sententia, breviter proponam.

Si lethargus à crapula aut ebrietate recenti vel si ab incongruis, & narcoticis assumptis, exorsus fuerit, statim vomitio excitatur; quare sal vitrioli cum vino & oxymelite scillitico, vel in robustis, infusio croci metalli aut Mercurii vitæ cum aq. cerafor. nigror. exhibeatur, & postea, ni sponte operetur, penna gutturi intrusa vomitus irriteretur.

Si morbi insultus, febris aut affectibus aliis cephalicis supervenerit, vel si ipse primario aut perse, ob procataxin in sanguine & cerebro prius lactum, exicetur, vomitoria & cathartica statim ab initio, dum materia in fluxu est, exhibita, sæpius plus officere quam prodesse solent, quatenus nempe humores dum in motu, magis exagitant, eumque adhuc subigi & educinequeant, eos in partem affectam adigunt.

Die secundo si torpor nondum remittatur, phlebotomia, si pulsus indicabit, repetatur, vel loco ejus sanguis per cucurbitulas post scarificationem in scapulis eximatur, dein paulò postea Pharmacum emeticum (si nihil prohibeat) vel catharticum exhibeatur.

℞. Sulphuris antimonii gr. v. scammonii sulphurati gr. viij. cremoris tartari gr. vj. misce f. pul. detur in cochleari julapii præscripti.

Vel ℞. Scammonii sulphur. gr. xij. crem. Tartari gr. xv. Castorei gr. iij. f. pulvis; detur eodem modo: Remedia interim alterantia aut derivantia usque eadem aut similia continuantur.

Die tertio & deinceps, quæ morbo vicunte ob metum novæ fluxionis vetantur, scilicet erchina, sternutatoria, apophlegmatismi adhiberi debent. Porro tunc interdum expediet, animalis recens mactati viscera calida sincipiti post capillitium rasum vel detonsum applicari, & subinde mutari, quandoque etiam loca isthæc decocto cephalico, & discutiente foveri; præ cæteris verò topicis maximum juvamen à



velicatorio amplo, ulcuscula plurimum manantia in toto ambitu capitis excitante, collatum novi. Duos ego lethargicos, post morbum diu protractum & non solum memoriam, sed & notitiam ferè omnem deperditam, ab hoc potissimum remedio sanatos vidi: quippe in utrisque loca excoiata, cum iis cicatrix haud facile obduceretur, ichoris tenuis copiam ingentem, nempe quotidie circiter libræ semis profuderunt. *Idem ibidem.*

In affectibus loporosis, somnolentiâ perpetuâ, comate & caro.

℞. Pilul. aloephang. ʒss. Res. Jalapp. agarici an. gr. iij. mag. succin. gr. iij. sal. Succini gr. iij. ol. menthæ gr. ij. misc. f. pilul. n. vij. assumantur vesperi.

℞. spir. sal. ammon. succinati, fuliginis succinati an. ʒss. Tinct. castorei ʒj. sal. succini ʒij. aq. majoran. menth. an. ʒijss. misc.

Per diem interdum assumatur.

℞. Spir. Cran. humani, fulig. succinati an. ʒss. aq. lavendul. Rorismarin. Primul. veris an. ʒijss. syr. corallor. ʒss. misc.

Dosis cochlear unum bis indie. In India.

℞. Spir. corn. Alcis, Lign. Ebeni an. gr. xxij. Essent. ambr. griseæ gr. xij. aq. Ocymi ʒij. syr. perlarum, corallorum an. ʒss. misc.

Dosis cochleari. bis indie. seu.

℞. Sp. C.C. fuliginis, cinnamom. an. ʒss. syr. fol. cinamom. ʒss. aq. flor. cardamom. sylv. ʒij. misc. & cochleatim exhibe. Pro ordinario potu usurpari potest, decoct. ligui sancti, sassafras, cum foliis salviæ, rorismarini, betonica, aliisque herbis cephalicis. Naribus quoque tale attrahi potest.

℞. Aceti succini, Rutacei an. ʒss. spir. armoniac. aromatic. ʒj. misc. quando clysteribus opus est, utatur medicus illis, qui in capite de apoplexia præscripti sunt. *Herm. Nicol. Grimm. in compend. medic. chymic.*

In lethargo ℞. sp. vini camphorati. sal. ammon. aromatici an. ʒj. aceti succini, rutacei an. ʒss. misc. mistum attrahatur naribus vel interne.

℞. Sp. c. cervi ʒj. Tinct. Castor. Succin. an. ʒss. aq. Lavendul. ʒijss. misc. pro una dosi. Aliud.

℞. Sp. sal. ammon. succinati, aromatici an. ʒss. corn. alcis ʒj. Tinct. Castor. succin. an. ʒss. aq. melissæ, Lavendul. an. ʒij. syr. cinnamom. ʒss. misc. Dosis cochleatim usurpanda. seu in India.

℞. Spir. corn. Rinocerot ʒj. Epileptic. ex ungu. alcis ʒss. aq. calaminth ʒijss. syr. cinnamomi ʒss. misc. pro 1. dosibus.

Humores vitiosi evacuentur per talia.

℞. Panaceæ antim. gr. vij. cremor. tartari ʒss. Pulv. castor. ʒss. syr. de Betonic. ʒij. misc.

Vel ℞. Panaceæ antim. gr. vj. extr. castorei gr. iij. magisterii succini gr. iij. conserv. rorismarin. ʒij. ol. itul. rutæ gr. iij. misc. f. bolus.

Aliud. ℞. Resin. scammon. gr. xij. Panaceæ antimonii gr. v. Tinct. castor. succini an. gr. viij. conserv. anthos ʒij. misc. f. bolus.

Aliud. ℞. Resin. Turbith. gr. x. sal. cinnamom. gr. vj. asæ foetid. ʒss. misc. fiant pilul. n. vij. vesperi assumendæ. Notandum hic, ut post purgationem clysteres præservantes non omitantur.

Aliud. ℞. Conserv. primul. veris, lilior. Con-

vall. an. ʒj. salviæ, anthos, an. ʒss. Extr. castorei gr. v. Magisterii succini gr. iij. sal. c. cervi ʒj. misc. pro duabus aut 3. dosibus, quæ adveniente nocte usurpari possunt. *Hermann. Nicol. Grimm. In compend. medic. chymic.*

Pro curatione Galenici plura adhibent. Primum balans, & clysteris alvum pluries exonerare conantur, mox in lethargo venam secant ob adjunctam febrem: frictiones & cucurbitulas, etiam cum cutis incisione, cruribus & scapulis applicant: protinus quoque catharticum propinant, præsertim ex pilulis aliisque liquore fontis: vellicantia admovent: Catellos, gallos, aut pipiones per dorsum dissectos, atque adhuc calentes tuturæ coronali imponunt, & fronti oxyrodina, naribusque acerrima inducunt, & cum hac non satis esse viderint, capillos ægotantium cremant, & verticem capitis candenti ferro inurunt ut illos alto sopore detentos, excitent, & in vitam, ut credunt, reducant.

Verum curandi Methodus rationabilis à causis petenda. Cum tumoris aut abscessus in meningibus suspicio est, ea probantur, quæ ejusdem resolutionem aut diruptionem, atque per suam emunctoria repurgationem promovere possunt, ut sunt omnia diaphoretica superius memorata; quanvis nec his pierumque morbus cedat, nec aliis violentioribus, præsertim cum nequeant medicamenta cerebrum perungere, & apostema ibidem genitum dissolvere.

Cum superabundantis feri, aut lymphæ, seu mavis dicere pituitosi humoris indicia adliant, purgantia locum habebunt, & quidem validiora, tum quia ob sopitos sensus nec ventriculus, nec reliqua viscera tum facile ad exoneranda corporis recrementa concitantur, tum etiam quia adhuc à remotioribus ductus humores subducere expediet, ut qui in cerebro restigant, commodius inde deponi possint, & alios divertere. Quamobrem licebit uti medicamentis ex colocynthide, scammonio, agarico, Jalapa, gummi guttæ, carthamo, & fenna compositis. Salutaris præ cæteris elutus extracti catholici, & pilularum ex tribus Galenici, cochlearum, aggregatarum dilutarum in aliquo convenienti liquore, ut facilius à sopore deglutiantur, quibus addi potest castoreum verum, & sal. volatile succini. Conferent præterea quæ salivam, & sputum movent, quibus Hippocrates *cir. lib. 3. de morbis* universam curationem concedidit. Ad hæc sudorifica præsertim sal volatile cornu cervi, & viperinum bezoarticum, Jovis,

Vel minerale antim. Diaphoreticum, simul cum roborantibus cephalicis diambra diamoscho, diaplire, confectione aichermes vel tincturis eorundem, optima erunt.

Castoreum etiam, ejusque Magisterium, vel essentia maxime commendatur, sicut pariter spiritus cupri ad aliquot guttas exhibitus in convenienti liquore. Externe vero proderit balsamum rutæ, oleum nicotianæ destillatum, essentia lavendulæ & rorismarini, spiritus salis ammoniaci.

Cum à crapula, & ebrietate sopor orrus est, vel provocetur vomitus, & quidem quam citissime, vel pannis contextus æger, ut remulentiam somno deponat, consueque dimittatur.

Proderit.



proderit etiam vomitus, cum ex ventriculo pravis humoribus repleto caput gravatur, & in soporem delabitur. Concitetur autem ille emeticis ex vitriolo, antimonio, aut mercurio.

Vel oymel scilliticum, aut oxyfaccharum Angeli salz torbendum detur.

Postea vero cum stomachus, tum caput roboretur, & peculiaribus, propriisque remediis foveatur.

Parimodò procedendum in sopore à Narcoticis inducto, promotò animi, si commode fieri possit; protinus vomitu ac præterea specialibus antidotis vim veneni retundentibus congruenter administratis. Cumque ut plurimum ab opiatīs immodicè, vel intempestivè sumptis cerebrum sopiri possit, proinde quam cito ad sua antidota confugiendum. Galenus 8. de Compos. med. s. Castoreum scribit opio obsistere, illudque vocat Avicenna huius theriacam, & Guainer. de venenis; bezoar dicitur aliis, antidotum opii, vinum Creticum, ut testatur Gaspar Hoffmann. animadvers. in Mont. ex Galeno lib. 3. de simpl. med. facul. cap. 19. qui vinum calidum, vetus, generosum, polyphorum, præstantissimum opio in apto remedium esse docet, confirmantque Rondeletius, Grevinus, aliique. Dioscorides lib. 5. c. p. de sale. Contra hautum opium, & fungos, Galienus cum oxymelite bibi, ait; idemque repetit lib. 6. cap. de Meconio & opio, ubi plura alia ad assumptum opium commemorat, præ cæteris autem merum cum absynthio, aut cinnamomo, origanum cum lixivio, piper cum castoreo; & aceto mulso, æcetum ipsum calidum, decoctum saturæ, & origani cum vino. His addi possunt acida, quæ sulphur narcoticorum obtundunt, præcipitant, aut invertunt. Bacc. lib. 7. de therm. cap. 23. commendat balneum aquæ tepidæ, præsertim cum soporati ingenti pruritu cruciantur ab assumpto opio. At verò stupidi ex pravis halitibus in liberiorē aërem ducantur, nares aceto sæpius abluantur, vel spongia aqua gelida & odora imbuta facies madent. Cordi verò apponatur mica panis calida vino generosiori irrorata, vel ejus loco theriaca vino diluta.

Cum sopor febrī adnectitur, quæ proculdubio maligna erit, vel pestilens, oppugandum iis, quæ ejusmodi febribus occurrere præstò sunt, aut vitium in sanguine, succove nervorum inductum auferre possunt, & utriusque naturalem habitudinem restaurare. De quare alibi. In hanc rem tamen valde proderit sal volatile succini, & cornu cervi, elixir magnanimitatis, spiritus cochlearia, spiritus sanguinis, & salis ammoniaci dilutus, elixir proprietatis ex descriptione Helmontii, oleum cinnamomi, sal essentielle tartari, & id genus alia. Quòd si sanguis, & liquor nervorum vitium contraxerint à Pancreatē, mesenterio, liene, aliisque visceribus in ventris, ut in scorbuto, & hypochondriaco affectu; tunc antiscorbutica, & antihypochondriaca præcipue acidum infringentia locum habebunt.

A sanguine extra proprios ductus stagnante vel à pure effuso per meninges, & cerebri corticem, illatus sopor curabitur (præter ea, quæ Chirurgi periti operam exposcunt) grunios

sanguinis dissolventibus, & quoad fieri poterit, simul cum pure evacuantibus. Quare non levem opem alteret in principio pulvis contracasum Mesues, sanguis hircinus in decocto rubiz tinctorum, sperma ceti cum extracto hyperici, aut balsamo ligniguae: Itemque portiones vulnerariæ dictæ, cum balsamo sulphuris ex oleo anisi, vel juniperi; oleum succini destillatum, cerusa antim. tinctura ejusdem; præter foras externos suture coronali, & sagittali, temporibus, auribus, naribus, & palato adhibendos ex aqua ardente, & oleis stillatitiis cærez, castorei, lavendulæ, rorismarini.

Postremò qui à mala capitis constitutione ad soporem, & lethargum proclives observantur, præcautionibus potius quàm curantibus muniri poterunt, tum evitando alias causas, tum etiam artificiosa industria caput in meliorem statum reducendo; tum denique cerebrum roborando, ut obsistere valeat causis internis & externis, nè in soporem altum gravemque delabens, vita tandem defungatur.

Quæ specialiter postremò lethargicis, ac soporatis auxiliantur, proindeque antilethargica appellata, referuntur, externe quidem oleum nicotianæ, succini, & balsamum rutæ naribus admotum, & syncipiti, ac temporibus illitum, spiritus salis ammoniaci, si ex phiala oblongo collo olfactandus detur, mirifice excitat, & cerebri recrementa per nares allicit. Hermannus commendat licum ex oleo castorei cum succo rutæ & fœniculi, itemque emplastrum ex succo apii, aceto acerrimo, & pulvere castorei abraso capiti superponendum. Proponit Paracelsus in sopore, qui febribus malignis & pestilentibus supervenit, solum quendam, quem mirabilem prædicat, estque ut sequitur. 2. fol. beton. amarac. & salviæ, fl. sambuci & ros. sylvestr. singulorum m. j. bull. in suff. quant. acet. ros. & vini albi: tum prædictæ herbæ exprimuntur; & calentes capiti circumponuntur, & cum refriguerint, denuò calefiunt in prædicto decocto, & iterum admoventur, aliquoties repetendo, nam subinde sopor ille lethalis expugnatur.

Alium describit Riverius efficacissimum qui habet angel. zedoar. & imperat. singul. ʒj. fol. beton. salv. roris. singul. m. j. saturæ, rutæ, amar. & ilor. lavendulæ singul. m. ʒ. bacc. lauri, & juniperi singul. ʒi ʒss. coq. in suff. quant. acet. & cum spongiis capiti abraso s. foras.

Sternutamentum moventia, etiam optima sunt ex pluribus autem summè contulisse refert Fridericus Deckers in notis & observ. ad proximo. Barbet. de Lethargo, hunc pulverem naribus inditum, qui continet: turbitib. natural. ʒss. glycyrrh. pulv. ʒ ʒss.

Utilis quoque est pulvis compositus ex beton. rorem. puleg. castor. & cyclam. naribus exceptus.

Internè verò præstantissimum est castoreum, ejusque extractum, magisterium vel essentia. Borellus cent. 1. obs. 52. ductus autoritate Tralliani, Ruffi Ephesii, & Oribasii, narrat se curasse lethargum uti castorei cum subdupla portione scammonii addito oxymelle, myrrham etiam, & thus deglutitum somnum discutere nonnulli testantur. Cardilucius in officin. sanit. cap. de aff. sopor. saluta. usus esse scribit spiri-



tum sulphuris acidum, vel vitrioli in dosi 3 j. & ultra in aceto vini mistillatum, addit insuper in defectu horum spirituum, exhiberi posse decoctum chelidonii majoris in lb j. aceti ad dosim iij. vel iv. unciarum per vices patientis ori infundendum. Dominicus Leonus relatus à Sennerio quendam empiricum memorat retulisse, succum consolidæ minoris ad 3ij. haustum, lethargo & caro laborantes excitare. Ipse vero Sennerius sulphur lunc cum extracto castorei aliis præfert. Apud Joan. Bapt. Du-Hamel mentio fit quarundam pilularum lunarium valde efficacium in omnibus affectibus cerebri soporiferis, earumque compositionem deberi Roberto Boyle. D. Michael magni facit spiritum ven. & Hofmannus junior spiritum volatilem vitrioli verum, & philosophicum, vel simplicem vel cum spiritu salis, & aquis cephalicis committum. Inter hæc suum habet locum camphora tum interius, tum exterius adhibita. Georgius Wolfgangus in sua opiolgia laudat essentiam castorei, elixir cephalicum cum spiritu salis ammoniaci, spiritum formicarum volatilem tum externe, tum interne. Ab Helmontio, sopores tam morboſi, quam artificiales, sive opiatorum efficaciter debellantur per lixiviam quæ multo antea commendata fuisse à Dioscorid. lib. 6. cap. 17. de Meconio, ubi origanum cum lixiviam aut passo, inter plura alia opii antidota commemorat, idemque Helmontius radicem carliæ, ejusque succum, & extractum, somnum arcere scribit, multoque magis sopores modum non servantes. *Lucas Tozzi Medic. practica part. 1.*

### Consultationes.

#### De carotica affectione. Pro adm. R. Patiente Anconitano.

Quemadmodum ex animalibus actionibus læsis constat cerebrum esse partem affectam, præsentem alium non esse quam qui à græcis caros dicitur, à latinis vero sopor, & altus somnus. Refert enim Patiens adm. R. se in accessione quolibet sensu cum interno, tum externo privatum esse & animali motu, solâ exceptâ respiratione, quæ illa permanset, per quam præiens affectus distinguitur ab apoplexia teste Gal. 4. de L. aff. 1. absque ullo motu convulsivo partis alicujus determinatæ, quoniam licet in epilepsia nonsemper adsit evidens corporis convulsio, semper tamen adeſt motus aliquis vel oculorum, vel buccarum, & labiorum. In carotica autem passione jacent patientes prorsus immobiles, non tamen rigidi, & inflexibiles, ut in catalepsi. Propterea Gal. de hoc affectu locutus §. Apl. §. dixit, proprie earum nominari *repentinam totius corporis sensus, motusque privationem*; ac propterea in lib. de symptomatum differentiis §. statuit earum esse veluti paralyſin imaginationis, seu resolutionem ipsius. Læditur autem cerebrum in hoc affectu, non secundum corpus, sive secundum temperamentum, ut pars similis, sed secundum ventres, sive cavitates, ut pars organica, & præsertim superiores, anteriores dictos, & medium, ex ejusdem Galeni testimonio. Un-

de Patiens adm. R. refert, quod ubi primum evadit ab occasione, gravitatem percipit in fronte, & temporibus, sine ulla in occipite molestia. Negandum tamen non est, aliquando sensus internos non esse prorsus deperditos, sed imperfectos manere: ut contigit illi, cujus historiam descripsit Fernelius §. Pathologia 1. qui in accessione erat ita sopitus, ut nec pilorum evulsionem, nec punctiorem sentiret, & nihilominus excitatus illa omnia cum turore retulit, quibus graviter excruciatuſ fuerat in sopore.

Utrum autem cerebrum sit essentialiter affectum, vel per consensum, dubitare non immerito quis potest; Hinc enim apparet elevari ab internis partibus vaporem quendam iursum repentem, sibilumque in auribus excitantem, antequam superveniat affectus: nec raro tator in ore sentitur: ex quibus conjectare quis potest adeſse consensum a ventriculo & hypochondriis. Hinc habemus affectus præsentis durationem, quæ medicis præſidiis non cessaret: unde colligere licet affectum hunc esse essentialem. Crediderim tamen ego mixtum esse ex essentiali & per consensum. Adeſse enim cenſeo essentialem cerebri humiditatem excedentem, necnon & ipsius imbecillitatem aliquam, contractam ex præterita violentâ capitis contusione in puerilitate; unde facili negotio in ipso congeruntur excrementa, cum per modum generationis, tum per modum receptionis. Negari tamen non potest vaporum ascensus pituitosorum à ventriculo, & melancholicorum à liene, statutiſ quibusdam temporibus genitorum ab inæquali naturalium viscerum intemperie, caput petentium, ac humores in ipso congeſſos agitantium; atque ideo aurium tintum, præcedere catoniam passionem, factâ scilicet obſtuctione ventriculorum cerebri à prædictis vaporibus & flatibus, quibus deinde discutiſ, tollitur affectus, patiensque adm. R. ita liberatur, ut proprias actiones libere obire valeat, persistente tamen aliqua totius corporis imbecillitate.

Dubitare tamen non immerito quis poterit, qui fiat, quod in accessione servetur libera respiratio, cæteris omnibus sensitivis & motivis actionibus deperditis, imo & aliquando principibus; cum j. m. statutum sit, esse ventu paralyſin imaginationis. Quod etenim respiratio sit actio animalis non aſſiciliter probari potest, cum ex eo quod ipsam ad libitum ita cohibere possumus, ut aliqui sibi ipsis, voluntario mortem intulerint respiratione cohibita Gal. cell. 1. de motu musculorum: tum & magis, quoniam respirationis instrumenta sunt musculi intercostales, & septum transversum. Musculi autem sunt instrumenta motus animalis. Ergo & respiratio erit motus animalis: atque ideo cessantibus omnibus motivis actionibus, deberet cessare & respiratio. Ex alia tamen parte non desunt rationes, quæ probent respirationem esse operationem naturalem, non animaleſ, ideoque servari posse, & debere, cessantibus aliis animalibus operationibus, & vigentibus naturalibus: duæque inter cæteras sunt præcipuæ, quarum prima est hæc. Actiones animales ex continuo motu defatigantur, per virtutis animalis, quam cerebrum continuo trans-



transmittit, absumptionem, sic asserente Galeno primo de causis sympt. 8. Ergo si respiratio esset motus animalis, cum sit continua, cum vigilantibus nobis, tum dormientibus, defatigaretur & ipsa, quod tamen non evenit: ergo non est motus animalis. Secunda ut se habet pulvis, ita & respiratio: Utriusque enim idem est finis, caloris scilicet cordis ventilatio, & fuliginum expulsio. Sed pulvis est motus naturalis, ex communi omnium consensu, ergo & respiratio. Quare statuendum censeo, respirationem esse motum mixtum ex naturali & animali. Eadem enim est ratio respirationis, quae & foecum, & urinae excretionis, ex Gal. 2. de motu muscul. 6. sed excretio foecum, & urinae, non est omnino voluntaria, & ex electione, teste eodem Gal. 3. de l. aff. 4. ergo neque respiratio; ratione enim necessitatis est naturalis, quoniam vita sine respiratione subsistere non potest. Ratione autem instrumentorum est partim naturalis propter pulmones motu naturali attolentes se & subsidentes: ratione autem musculorum intercostalium est animalis. Ideoque ratione necessitatis & finis conservari debet, etiam in carotica passione & somno, non secus ac motus constrictorius musculi sphincteris intestinorum, & vesicae tempore somni. Ita tamen conservatur, ut non sit prorsus naturalis, ut asserunt Galen. 3. de l. aff. 1. dicens, quod in levi apoplexia, caro, catalepsi, & lethargo respiratio lesionem aliquam suscipit, ut ut videtur iborax veluti cingula ligatum, & haec de essentia & causis.

Affectus praesens est magni momenti. Scribit enim Hipp. 2. aphor. 3. quod somnus & vigilia modum excedens malum; ac propterea scriptum reliquit in coacis praenotionibus, quod si vehementer caput dolere caros supervenerit, convulsionem significat. Nec tam facile superari poterit, cum sit antiquus, neque hactenus cesserit variis medicis praesidiis antehac in usum revocatis.

Pro ipsius curatione alia sunt praestanda in accessione, alia vero extra accessionem. In accessione tria sunt agenda; primo spiritus animales revocandi suffitu naribus factio ex asa foetida, castoreo & galbano, vel suffitu bituminis, vel barbae hircinae combustae: Excitetur sternutatio, tiantque asperae frictiones. Secundo avertend. est fluxio suppositoris, vel clysteribus acerbis. Tertio discutendi sunt vapores calorigenis, & exsiccantibus; puta suffitu facto cum castoreo, calamentho, ruta & aceto: & si pertinacior fuerit, ad unctiones etiam in occipite deveniendum erit.

Extra accessionem, humores peccantes praeparandi sunt, & purgandi, caputque roborandum. Praemissa itaque alui lenitione, praeparantur humores oxymel. simplici, syr. de betonica, de succo borraginis, & de hyssopo, cum decoct. proportionata: ac interim modica sanguinis copia educatur ex venis sedalibus per hirudines admotas. Pro purgatione laudatur diagrydium cum castoreo, sumendo gr. j. huius cum granis v. diagrydii formata in pilulas cum oxymel. scill. & drach. sem. extracti hellebori nigri: vel exhibeantur pil. de nitro Alexandri cum pil. de hiera cum agarico. Pulvis etiam hermodactylatus dictus, cum portiuncula foliorum

sennae pulverisatæ summo opere proficiet. Erituina quinetiam, & apophlegmatismi non genere rose caput purgantia praescribentur a Viris excellent. qui curae praerunt. Mox erit roborandum caput interius & externis; inter quae laudatur theriaca antiqua cum castoreo aut mithridatica confectio cum eodem. Odoramenta capiti maxime ex usu erunt, utpote moschus, ambra, benjuin & similia. Quae tamen non conveniunt in accessione, ne trahantur humores in caput, sed post accessionem & capitis expurgationem. In accessione namque foetida sunt utiliora. Si esset Patavi, non improbarem stillicidium ex aquis thermalibus sulphureis, futuræ coronali, & ventriculo administretum. Conferet quoque conserva parata ex flor. rosarum, salvia ad 3 ij. coriandrorum praeparatorum pulverizatorum drach. ij. cinnamomi drach. j. moschi gr. v. lixivium quoque exsiccans, & calefaciens capiti fieri poterit ex vino albo generoso. Quod si praedictus non cesserit affectus, perseverabitque evaporatio in caput, inuretur fonticulus sinistro interno femori pro continua revulsionem.

Victus sit tenuis, attenuans, aromatibus conditus, paretur panis cum aniso, & sine lolio, abstineat a piscibus, leguminibus, lacticiis, felino, hipposelino, aliisque in caput exhalantibus. Vinum sit oligophorum, & subast. ingens. Vigilet, corpus exerceat, non tamen satiat a cibo; aerque sit lucidus, calidus, & siccus & alvus continuo lubrica servetur. Benedict. Sylvatic. Consil. & respons. Medicina. cent. 1.

#### Carm.

Vir quinquagenarius, temperamenti totius calidi & humidi, capitis humidi & excrementitii, per nares materiam mucilaginosam frigidam expurgare assuetus, habitus potius ad obelitam quam ad piethoram vergentis, copiosis meripotibus indulgens, postremis huiusce annis, ob extinctam familiam, uxorem juvenulam duxit, eamque fecundam, quae pro sapiam ab interitu revocavit.

Hic autem multis abhinc mensibus, de capitis gravitate conqueri cepit, & consueta nucoiz materiz per nares expurgatione immixta. Somniculosus quoque praeter consuetudinem factus est, & decubitus valde amans. Accessit insuper quaedam ignavia ad propria negotia obeunda & merces expediendas, unde exercitio intermisso domi semper manet, ventri tamen, nec veneri parcens. Quare tandem hesternae die, capite gravatus statim a prandio decubuit & somno se tradidit & adeo quidem profundo, ut usque in hanc horam matutinam nunquam sit expergefactus. Et quoniam neque expergefactus potest, ideo ejus uxor & cognati nos accersiverunt, qui Pat. invenimus profundissimo somno sepultum, neque clamoribus, neque vociferationibus respondentem, quinimò nec punctum moveri, aut sentire, sed oculis clausis dormire, sine stertore, & spirandi difficultate, sine febre, motibus convulsivis, & sine corporis rigiditate, cum pulsu magno & valido, atque florido faciei colore, pro quo ita consultum fuit.

Profundissimus somnus, quo prehenus jacet egre-



gerregius iste mercator, ille est, quem Caium Græcisoporem sive Vetrinum latini, Marcorem Cælius, Gal. caroticum appellat; de quo Aëtius dicebat, quod in caro homino profundissimo detinentur, ita ut si pungantur, nec loquantur, nec oculos aperiant, quod desumpsit à Gal. dicente. *In caro licet stimules, serias & inclamantes, nihil respondent, nec expergefiunt.* Caroticos autem muros nominare consuevit Hipp. Quare actiones omnes principes una cum sensu & motu abolitas esse omnino asserendum. Et quoniam noster Patiens observatur sine spirandi difficultate & stertore, sine febre, motibus convulsivis & sine corporis rigiditate, cum pulsū magno & valido atque florido faciei colore, ideo ab omnibus consimilibus affectibus facile distingui potest; & primo quidem ab apoplexia, in qua lædatur respiratio, & cui paralytis succedere solet; à lethargo, in quo semper febris præsens, à comate lethargico, in quo non abolentur actiones principes, nec sensus, & motus, & quo interrogati lat. respondent, à catalepsi, in qua rigent ægri, oculolque tenent apertos, ab epilepsia per motus convulsivos: à syncope tandem per asphyxiam & totius floridum colorem.

In hoc affectū cum principes omnes actiones, una cum sensibus tum internis tum externis, non solum lædantur, sed prorsus aboleantur, cerebrum ideo necessario affectum esse censendum, & quidem magis secundum anteriorem quam posteriorem ejusdem partem, ita Gal. scribit quod si *tota anterior cerebri pars patitur, supremum ipsius ventrem ei consentire necesse est, atque mentis quoque actiones vitari, hæcque passio Carus vocatur*, afficitur autem cerebrum immediate ab insigni angustia ventriculorum anteriorum & medii quorum ratione omnium primo tollitur imaginatio. Unde Gal. carum appellabat paralyin imaginationis; dum autem aufertur imaginatio, & ratiocinationem quoque & memoriam tolli necesse est, nam nisi offerantur phantasmata, nec ratiocinari certe, nec memoriæ quidquam mandare quis potest; unde ablatis sensibus externis, necessario aufertur imaginatio, quæ ablata tollitur & ratio & memoria. Ideo Gal. dicebat quod in caro non solum corrumpitur sensus & motus voluntarius, sed etiam ratiocinatio & memoria, unde concludit Carum esse ablationem imaginationis & discursus, dum subdit, *supremum ventrem consentire.* Nec obstat historia à Fernel. adducta de carotico illo qui post accessionem puncturæ recordatus fuit, fuit enim ille carus imperfectus, non autem exquisitus. Angustia igitur insignis potissimum in anteriori & medio cerebri ventriculis est immediati cari causa, quæ quidem à plurimis mediatis pendere potest. Et primo quidem à densitate ex frigidity inducta. Secundo à compressione ex mala terebratione aut ictu. Tertio à subsidenti ex spirituum resolutione, vel retractione, in mortis proximis aut doloribus vehementissimis. Quarto ab obstructione, ut in casti nostro, quæ licet aliquando à sanguine provenire possit, ut Paulus, Aëtius & Avic. ab Hippocr. desumpserunt, in præsentī tamen facta est obstructio ab excrementis pituitosis, ac glutinosis tum à cerebro natura perquam hu-

mido genitis, tum in toto venoso genere quodammodo obfesso, & cruditis scatente acervatis atque ab orio, cibo multo, & coitu non parum adauctis; nec non à meri potibus facile ad caput elatis, neque ut antea expurgatis, unde Galen. dicebat, *quod eadem est materia causans Carum, & causans lethargum, at differi solum quod in lethargo putrescit, in Caro non.* Suā siquidem mole onerabat solum, & humectabat præteritis mensibus cerebrum. Unde Pat. consuetudo somniculosior factus est, sed tandem adaucta, & in ventriculis cerebri firmata, obstructionem, & inde insignem angustiam induxit, unde Carus; à qua tamen angustia licet insigni, non tollitur respiratio, prout in apoplexia, quoniam ut considerabat Doctissimus Valesius, in apoplexiā non solum cerebri ventriculi obstruuntur, sed obstruitur quoque ipsa ejusdem substantia, quæ cum sit nervorum radix, & principium processus corporalem, & influxus spirituum, mirum non est si lædatur respiratio, quam opinionem deduxit ex Galen. dicente. *Verum in Sopore & morbo comitiali ventres magis cerebri, corpus minus, in apoplexia vero corpus magis pati solet.* Et hæc est vera ratio quicquid dicat Aver. de articularum obstructione, sive Mercurialis cum Peripateticis, de cordis à cerebro perfrigeratione.

*Si somnus atque vigilia utraque modum excesserit, malum est.* Carus pessimus erit, cum multum naturæ modum excedat, est enim lethargo profundior, imò profundissimus sopor, qui gravior redditus in apoplexiā sere temper degenerare solet, ac magis, magisque respiratione læsa in interitum, si vero levior fiat, in affectum comatosum declinat.

De apoplexia autem, & interitū dubitandum in Patientē nostro, altas quippe & naturales habet affectus iste radices cum crudo & pituitoso, tum in capite, tum in toto venoso genere, apparatū, & nativi caloris imbecillitate. Omnia tamen agenda, nam si fortasse accederet quoque febris, ad pituitosi humoris attenuationem, atque resolutionem non parum conferre posset.

Medela autem dupl. esse debet, curativæ, modò in accessione, & præservativa extra accessionem.

Pro curatione, primò facultas est excitanda; secundo humorum influxus à capite divertendus, tertio jam fluxi, attenuandi, discutiendi & quoquo pacto è capite educendi.

Pro præservatione verò calefaciendum, attenuandum, evacuandum, frigida & humida capitis intemperies, corrigenda, & tandem roborandum. Sed de hac alias.

Curatio itaque tentanda, primò facultatem sopitam excitando stimulatoriis, pulverem per nares insufflato, ex nigella, majorana, iride & nicotiana parato. Suffumigium ex barba hircinā naribus admoveatur, nares pariter illinantur oleo de castoreo, cum succo rutæ, siant frictiones asperæ, ligaturæ artæ, facies aspergatur aceto ros. cujus guttula angelis oculorum instilletur, sed & ferro ignito occiput tangendum.

Secun-



Secundò, humorum influxus à capite diver- tendus, cucurbitulis siccis eturibus applicitis, phanigmis coxis, brachiisque appositis, acribus repetitis suppositorius.

Tertio, attenuatio, atque discussio procu- randa. Sic nares illinantur theriaca, cum ca- lloreo, & aceto squillit. capiti derafo ap- ponendum Oxyrrhodinum, ex ol. cha- nam. & aceto squillit. vel empl. ex succo apii cum aceto torti, addito Calloreo, ac tandem sinapismus coronali apponendus, præmissis ta- men fomentis, spongia magna decoct. im- buta & expressa, ex satureia, thymo, calament. origano, pulegio in vino malvatico. Nec quic- quam de sanguinis missione cogitandum in hoc affectu curando nisi ab interceptione venarum procedat, tum enim per selectam venam sanguis educitur, ut monet Hipp.

Hæcque sufficiant, cum plurium remediorum patiens capax non sit. Interim aer cubiculi ad calidum & siccum vergat, calidis sustinuis al- teretur sitque lucibus. Cibus sit pulli instau- rans, aromatilis conditum. Ovorum recen- tum lutea, aceto dissoluta. Vinum non oste- ratur, nisi in declinatione, quia n. reoticum. Alius soneitetur suppositorius & clysteribus acribus, si injici possint. Quibus nos numeri nostro satisfecisse abundè putamus. *Joann. Kaymühl. Fortis consultat. & respons. Medicin. T. 1. cent. 1.*

*Caroticus, & Vermiginosus affectus.*

Reverendiss. Vestalem fervidum semper ha- buisse jecur, ac proinde calidum sanguinem, atque tandem consistentiæ exultum, celta- tur abunde tumor, qui a 45. ætatis anno in dextera mamma succrevit, carcinomatosa naturam redolens, & ideo a refrigerantibus medicamentis inhibitus. Verum quoniam je- coris calida intemperies in hac reverendissima Pat. naturæ ab animi quoque curis non pa- rum aducta non adeo facile remitti potuit, hinc accidi, ut demceps ex fluxionibus e. li- dis quolibet anno humores in gula subori tue- rint, suffocationem minantes, unde jure merito cogitatum fuit de validis medicamentis refrige- rantibus exhibendis, prout est aqua virginis. Sed quia in expurgatione, quæ necessario præ- cedere debet, non exigua sequuta fuit humo- rum calidorum agitatio, hinc elevati ad caput copiosi & crassi vapores, cerebri ventriculos anteriores præsertim obstruentes, & spiriti- bus animalibus effluxum intercipientes, affe- ctum caroticum, potius quam apoplecticum, nimis Epilepticum excitarunt, ad id totum utero quoque conspirante, cujus ratione oc- ciput quoque gravatur, cui per spinalem me- dullam ille consentit; cum materia oppletus quodammodo coarctatur; Sanguinis vero ca- lidioris in toto præsentiam testantur acres illæ puncturae, totam membranam carnosam capi- tis percurrentes, & vermiculorum adinstar mordicantes, ac nonnunquam usque ad peri- cranium pervadentes, quas non solum ab eva- porationibus, verum & serositatibus timaci- dis & melancholicis, tum biliosis acribus, ad caput elatis, procul dubio provenire creden- dum, quibus quandoque per madorem pro- deuntibus, caput quoque melius habere vider- tur. Tandem quoniam caput quotidie semper

maorem imbecillitatem, & jecur ac sanguis majorem effervescentiam acquisiverunt, ob va- lidum nimis chinæ decoctum, à quo ventriculi quoque labes potius privativa sequuta est, ideo capitis mala invaluerunt adeo, ut in præsens, non modo insigni imbecillitate, verum & sco- tomatico affectu continue afficiatur, ita ut ca- put à pulviniari elevari nequeat, minusque Pa- tiens stare possit, spiritibus agitatis & inordi- nate commotis. Hinc jure suspicari possumus, caput modo non solum sympathice à toto & ab utero, verum & idiopathice affectum esse, cum ipsius mala continuo Nob. Pat. excrucient.

Cui ut succurratur, Medici intentiones esse debent, totum evacuare. Secundò à capite revel- lere. Tertio jecur & venosum genus contem- perare. Quarto materiam in capite hærentem sensibilibiter, & insensibilibiter resolvere & tan- dem caput idem roborare.

Quibus omnibus omnino satisfacere perar- dum fuerit cum hæc mala altas imo & natu- rales radices habeant, nihilominus de corun- dem diminutione desperandum non est. Auxiliorum propterea materia, a fonte Chirurgico, Pharmaceutico, & Dietetico desumenda.

Et primo quidem sanguinis missio omnino convenit, eaque repetita ex pede pro revulsio- ne & ex brachio, tum pro derivatione, tum pro jecoris, & totius venosi generis refrigeratione; in progressu vero hæmorrhoidalis quoque sanguis educus non parum prodesse poterit. Caustica, quæ gestat aperta servantur. Et to- to atque capite expurgatis capiti derafo rubifi- cantia sive napilini apponuntur, ut ad sum- mam cutem proficiantur humores, qui postea sensibilibiter & insensibilibiter evacuari ac digeri possint, & ideo sub tunc unctiones convenient, ex lixivio dulci malv. Betonica & majorana al- terato. Occipiti tandem venæ canis applicetur, quod derivandi quidem non vero a toto veno- lo genere humores attrahendi vim habeat, cu- jus metu letacuna suspexitur habet us.

Apharmacia reliqua sunt desumenda me- dicamenta. Et quoniam ex relatis totum cor- pus ab Excellentissimo Viro electivè purgatum est ideo caput quoque non semel erit expur- gandum, in quem finem tertio aut quarto quoque die, tribus vicibus, erunt præbendæ pilulae aureæ, & Cochiz, à quibus transactis duabus, vel tribus horis superbibat Reveren- diss. Pat. ser. capr. aut asin. depur. ad lib. i. ß. vel ij. & duabus horis ab assumpto iero, pran- deat, diebus verò intermediis bibat seri capr. destill. libram, cum conserva de acido citri, at- que capitis expurgatio etiam per nares procu- retur, errhino ex pulvere majoranæ, ireos, & nigellæ.

Toto & capite expurgatis, materia serosa in capite redundans omni arte educenda & statu- lenta resolvenda, quod vix alio modo obtri- neri poterit, quam sudore in hypocausto pro- lecto, licet enim acris & acida sit, attamen evacuanda est, neque hypocausti calor, jeco- ri, aut capiti officere poterit, quia decoctum eâ arte erit concinnatum, ut humores quidem liquare, & sudorem provocare, nullo vero modo calorem augere possit. Sic itaque hujusmodi.

℞. Salis parillæ elect. unc. ß. chinæ opt rad. rosar. an. unc. ß. aquæ cich. destill. lib. iij. aq. beton



beton. lib. j. m. f. inf. per hor. 24. deinde bull. ad consumpt. dimidii, & colat. fervetur pro vicibus tribus, matutino tempore exhibenda.

Deinde ℥. Residuum dempta & abjecta radice rosar. aquæ fontis lib. x. m. bull. ad consumptionem tertiz, in fine ebullitionis, adde cinnam. integr. drach. ij. bull. par. & colat. adhuc ferventi addantur Sacchari lini unc. ij. pro potu quotidiano. Hora una ab assumpto decocto ingrediatur hypocautum, & ibi maneat, primis diebus ad sudoris provocationem tantum, mox sudet in lecto, in progressu vero, nunquam excedat horæ dimidium. Nec victus ratio debet esse valde tenuis, sed quotidie vel caro alia, vel ova recentia, vel præsana hordeacea concedatur. Perseveret autem supra viginti & usque ad triginta dies, sed decimo quoque die potio man. clarif. prrpinetur pro evacuatione.

Quibus peractis, jecoris, hypochondriorum & viscerum fervor erit contemperandus, quod succis dep. præstari poterit, ut,

℥. Succ. dep. end. unc. ij. borrag. unc. j. decoct. cich. borrag. end. acet. unc. v. n. pro syrup. quotidiano, matutino tempore sumendo. Quod si respuat succos. Serum capr. depur. exhiberi poterit, vel aq. de succo cich. & end. ad lib. j. cum syr. de acido citri, vel lim. conserva quoque rosar. convenientissima erit sicut & e floribus betonicæ, sem. prœniz immista.

Nequæ Spemenda à proprietate juvantia, inter quæ sal cranii humani optimus est, in aliqua ex dictis conservis, prout præstantissimum oninium stercus pavonis pulv. sine ulla præparatione, quod pariter incia Pat. conservis vel e floribus Prœniz vel beton. misceri poterit.

Et quoniam de ventriculi imbecillitate, sine concoctionis tarditate, conqueritur Pat. licet ventriculus per consensum a iecore, & hypochondriis potius quàm essentialiter sit affectus; nihilominus aliqua ejusdem corroboratio erit procuranda, quæ tamen jecori officere non possit, idè a praudio, & canâ deglutiat gr. ij. aut iij. mastich. integra aut pil. ex serup. i. succi abanthii condens. paratam. Quæ omnia licet inopportuno tempore, autumali scilicet administrata, optatum tamen finem consecutura spero, potissimum, quod a summa prudentia viri Excell. ac peritissimi & dirig. & moderari possint. Ita Deus vota nostra secundet. Joann. Reynard. Foris consil. & respons. Medicin. T. I. cent. 1.

### *Coma somnolentum.*

Nobilis adolescens 25. annu ægis temperamentum torius, jecoris, calidi & humidum, humidioris capitis, & imbecillis ventriculi, sanguine in toto abundans, sed ad obelitatem potius vergens & ante hac pituitosis vomitibus frequenter obnoxius hoc anno ex toto suppressis, post errores in meri potibus, & edulis ex lacte paratis, captus est febre magno calore, æstuque comitata, capitis dolore, rubore faciei, & in somnum diuturniori, atque intensiori delatione, perseveravit enim usque ad hanc quartam diem, prout adhuc num perseverat, & au-

getur, adeo ut continuò dormire cupiat, imò & dormiat, qui tamen si expergeat, responder somniculosus, & statim lucius in somnum delabitur. Febris parum, imò nihil remitti videtur, pulsus magnus, frequens, mollis, urina ad ruborem vergentes, potius tamen tenues.

Medicus familiaris accersitus ienicus præscripsit, & brachii venam aperiri iussit. Velicantia duo coxis apponi curavit: præparantibus & alterantibus usus est. Modò nos de ægenuis Domeltici consulunt.

Febrem hanc Nob. adolescentem quatuor ab hinc diebus continuò & æqualiter divexantem continentem esse, synochum, scil. illamque homotonam, non est quòd dubitemus; hanc enim ostendit accessionis modus & continuatur vita ante acta, habitus sanguine abundans, ætas juvenilis, temperamentum calidum & humidum, & præterea rubor faciei, pulsus magnus, frequens, mollis, urinaque subrubra. At quoniam habitus ejus quodammodo ad obesitatem vergit, licet plurimo sanguine abundet, sanguinem tamen quodammodo pituitosum esse, non sine ratione censemus, idque non solum ob assumptorum conditionem, sed multò magis ob capitis naturalem humidam intemperiem, & ventriculi imbecillitatem, dum enim catarrhalis humiditas in ventriculum descendit imbecillum coctiones turbat, indeque jugis cruditatum proventus, quarum portio a jecoris calore tracta, & a meri potibus in venas perducta, sanguis quidem producit, sed pituitosior, quibus addita consueti pituitosi vomitus suppressione, & ejusdem excrementi ad hepar transmissione, obstructiones subortæ sunt, sicque impedita transpiratione, calor putris redditus in sanguine ipso corruptelam accendit, & febrem, synochum quidem continentem, sed tamen spuriam excitavit, sicut enim spuria sic synochus ex abundantia bilis in sanguine, quæ synochus quodammodo biliosa a Gal. nominatur, ita in casu nostro, ex pituitosi excrementi in sanguine præsentia, synochus spuria quodammodo pituitosa dici potest.

Habet autem symptoma sonnolentum sibi annexum, quod potius concomitans, quam subveniens centeri, & appellari potest; cum febris statim ab initio cum capitis dolore & ad somnum delatione invaserit, quæ modo ad somnum quoque pervenit, invalescente quotidie magis, non solum ad somnum delatione, verum & ipso somno, quasi Comatis conditionem excedat, cum ex Gal. comatis nomen idem importet ac delatio in omnium Verum quoniam Gal. idem attulerit quod Hipp. coma appellare solebat cataphoram sive somnolentam, live non sonnolentam (coma enim & cataphora a symptomate ita dicta synonyma sunt) ideo & nos hunc affectum, Coma sonnolentum appellare possumus; hoc autem lethargicum esse credendum, quia cum febre, uno non solum legitimum, quia nunquam in ullo statu febris remittit, verum & exacte legitimum esse censemus, adeo ut non putata in cerebro putrescente, sed ab inflammatione ædematosa ac pituitosa in anteriori cerebri parte existente, proveniat, unde anceps quodammodo sit febris origo, licet eandem



nos putridam & essentialem existimemus, ita ut affectus ille coma somnolentum lethargicum sit appellandus, prout, si febris symptomatice esset, coincideret cum ipso lethargo. Non est tamen negandum, quinimo alterendum, ad febrem essentiali symptomatice etiam accedere. Atque adeo licet huius affectus comatosi causa immediata est semper angustia aliqua in cerebro, ob quam sit, ut spiritus animales effundi ac permeare non possint, unde ut imminutus sensus & motus, ita huiusce angustiae causa in nostro casu non est subsidencia, quia non processerunt causae spiritus animales, & calicum immixtum solventes, neque comiventia ob solam humiditatem nervos laxantem, febris enim non adesset, sed est obstructio gravans, ut pote proveniens à copia pituitosi sanguinis, ab imbecillitate ventriculi, & praegressa vicia ratione, niarum lacris ulu, & suppreffo ejusdem pituitosi extremi vomitu conlueto. In caput vero praevidendum facile quoque elterri potuit, praesertim a meri potibus consuetis. Sicque primo cerebrum molle reddendo, gravando, meatus semiostruendo, dolorem gravantem, & in somnum propensionem inexit, cui tandem ex nimia immixtione ab eo excitata somnus quoque comatosus jam descriptus successit.

Horum affectuum complicatio periculum evidens huic Nob. juveni immatur, febres enim cum Comate acutae atque malignae esse semper consueverunt. Coma verò cum exacte exquisitum sit, & ab incepta inflammatione proveniens, lethale facile evadet, nisi surditas accedat, indeque Parotides erumpant, vel quod melius retrocedant humores, & cerebri inflammatio resolvatur.

Pro horum affectuum curatione, modice refrigerandum, humores revellendi, repellendi, praeparandi, evacuandi, discutiendi, & tandem cum put roborandus, & praeter omnibus continuo facultas excitanda.

Et in chirurgico fonte, si consideretur sanguinis missio, ex altero brachio repetendam esse cuncto, juvenis enim est, viresque validae, & febris continens, cum affectu inflammatorio in parte principe, additque annos ætatis, qui narrat, quendam ex hoc morbo subito solo & copioso sanguinis profluvio à naribus liberatum fuisse. In progressu verò ita exigente morbo, & perimittentibus viribus, venae quoque sedales aperiri poterunt. Cucurbitulas scarificatas dorso, scapulis, & occipiti, non parum prodesse asserit ipse Gal. Cataphoricos eam excitant. Et progrediente inflammatione duo alii phanigmi brachii applicandi. Jam abrasum est caput, cui medicamenta praeter repellentia, ordine infra dicendo, erunt admoveenda.

Et primò omni arte revellendi vapores, & humores a capite, in quem finem clysteres potius acres conveniunt, tum ut major sequatur a capite revulsio, tum ut excitetur sopita facultas.

℞. Decoct. malv. betæ, mercurial. chamæmel. lib. i. mel. ros. olei chamæmel. an. ℥iij. elect. diaphan. ℥ss. salis parum vitel. ovi m. pro clyst. interdum suppositorium ita paratur.

℞. Troch. alhand. ℥ss. salis gem. ℥j. hieræ

magnæ ℥. j. mel. q. s. m. f. suppos. n. ij. cum nlo.

Ante septimam & antequam gravior sopor obrepit, rursus pituitosae materiae antecedentis evacuatio erit procuranda potione utpote familiari ex melle ros. & manna clarif. cum tartaro, cui nulla superepota idonea foret. Praeparantia erunt quotidie exhibenda, & in his dilutum Oxymel. Neque alterantia omitenda, jura scilicet cichor. borrag. beton. salv. alterata, commodius vero erit alterans ex aqua stillat. cichor. & borrag. beton. paratum ex cordialibus, Aqua Excel. Saxoniae cum Elixir. vitæ bis in die exhibenda.

Ut autem excitetur Pater, hora saltem quacumque, aut medicamenta sunt praebenda, amoveantur phanigmi, pedum plantae perfricentur, & sternutamentum excitetur, pulvere infusato intra nares, ex majorana iride & nigella.

Dum jam dicta sunt, materia in capite attenuanda, insensibiliter resolvenda, naribus apponendo spongiolam aceto imbutam, alterato majorana, salvia & satureia. Oxymelino chamæmelinum addendum, in quo folia serpilli macerentur. Clysteres acriores, vel suppositoria repetendo.

Quibus non obstantibus, si somnus perseveret profundior, tria agenda concurrunt.

Primo purgans medicamentum exhibendum, ex pulv. ut pote facilius parandum.

℞. Troch. alhand. diagrydii an. gr. viij. Castor. gr. v. m. Secundo cucurbitula magna & sicca occipiti applicetur, pluriesque repetatur. Tertio sinapismus capiti apponatur, praemisso lotio, spongia magna tepida, imbuta & expressa decoct. majoran. serpilli, satureia, betonice, in vino albo, quibus omnibus squilla tandem addi potest. Aliqui Euphorbium quoque addunt & Castoreum: Verum: inflammationis, & maxime, ratio habenda, ut nos monet ipse Gal.

Et nisi jam dictis omnibus cedat affectus, desperata res est, tuncque parum & saepe aeger nutriendus pullo instaurante, vino albo dulci immixto, ut ad cibum capiendum proleceatur.

Victus ratio ad tenuitatem inclinet, & quodammodo sit attenuans, acetum ideo & prisanæ, & vitellis ovorum in jure dissolutis, semper addendum. Vinumque in declinatione, ac meliori rerum statu, concedendum foret. Deus verò O. M. omnibus praestet & salutaria reddat Joann. Raymund. Fortis consult. & respons. Medicin. T. i. Cent. i.

#### Coma vigil.

Vir Nobiliss. 35. annum agens, temperamenti totius, jecoris & capitis calidi & humidi, meri potibus assuetus, capitisque doloribus obnoxius, post validum exercitium, Veris tempore, sub radiis solaribus febre correptus fuit, cum horroribus inaequalibus, quos æstus insignis fuit subsequutus, cum difficili tolerantia, molesta siti, capitis dolore, totiusque lassitudine, potius ulcerosa, quæ omnia inde parum remissa, tertia die simul cum febre exacerbata suere. Quare Pat. magis repleto capite, atque ideo facie rubore perfusa, pa-



rumper deliravit cum quadam in somnum delatione, quibus adiacentis somnolentus factus, oculis conniventibus somnum quidem captare videtur, attamen dormire nequit, mox interrogatus iterum excitatur & respondet, inepta loquitur, & agit, nam corpore in composito dimovetur, e lecto surgit, moxque iterum decumbit, & clausis oculis somnum quaerit. Pulsus quoad dimensionem mediocriter se habent, quoad motum vero inaequales & frequentes cum aliqua celeritate; quoad instrumentum, tactu duriores percipiuntur; quae tamen durities, dum ad somnum inclinatur, quietusque manet, laxari videtur. Urinae ab initio rubrae, mox flavescerent, in praesens vero non valde coloratae, & potius tenues apparent. Medicus domesticus statim accitus imposito clystere sanguinem ex brachii vena detrahi iussit deinde minorativum praebebat medicamentum, indeque rursus ex altero brachio sanguinis missionem repetiit, phanigmos duos coxis apponi voluit, alterantia & praeparantia opportuna praescripsit, nihilominus propè septimam nullum levamen, imò febris atque symptomatum augmentum potius observatur. Quare nos de agendis acturi accersimur.

Febris quae premitur Nobiliss. hic Patiens de synochorum genere censenda est, si primò res praeter naturam consideremus, nimirum æstus insignem, & ex eo jactationes, molestam sitim, capitis dolorem, faciei ruborem. Secundo res non naturales, nempe meri potum consuetum & validum, exercitium sub radiis solaribus peractum. Tertio & res naturales hanc eandem attestari possunt, juvenilis scilicet ætas, & jecoris totiusque temperamentum calidum & humidum. Verum quoniam febris tertia die exasperari visa est, cum lassitudine potius ulcerosa quam phlegmonosa, pulsus aliquam celeritatem atque duritiem praeseferunt, urinae ab initio quidem rubrae, sed paulò post flavescerent redditae sunt, ideo synochum hanc non legitimam, sed spuriam esse censuimus, propter bilem exuperantem, ex illis videlicet synochis, quas quodammodo biliosas appellabat Gal. quae inter synochos & ardentes mediū locum tenere solent, ut pote ortae ex bilioso sanguine in venis, cum corde & faucibus magnū consensum habentibus.

Capitis autem affectus qui post continuū dolorem febris tertia die supervenit, delatio scilicet in somnum, cum vigiliis atque delirio, comatosus dicendus est. Comatis enim nomen idem significat ac delatio in somnum, quod clarius expressit Gal. Idem dicens, *Coma idem sopor, est affectus ille, in quo indicatur propositio ac delatio in somnum, cum vigilare acri nequeant, non apertos habentes oculos, sed conniventes vel alios somnis, vel tenuibus, vel vigiliis decueantur.* Ideo & Hipp. & idem Gal. Cataphoram somnolentiam, & non somnolentiam, Coma appellare consuevit. Hoc autem Coma vigil est, & non pigrum, dum vocatur patiens, aperit oculos, sese cum impetu atque violentia movet atque delirat; in Pigro vero Comate Vigili patientes acri respondent, & statim rursus oculos claudunt delirantes.

Causa hujus affectus potest quidem esse materia vaporosa, inaequaliter in cerebro conten-

ta, sed in nostro humorosa est, quae continuus non autem modò accedens, modò recedens est affectus. Inaequalitas autem haec in cerebro saepe provenit a missione pituitae cum bile. Unde tertius emergit affectus, ex phrenitide & lethargo compositus à Gal. ex acie descriptus quem Antiquiores Typhomaniam appellabant. Attamen in hoc casu inaequalitas ut à missione sanguinis, cum enim totum venosum genus sanguine abundet, ab eodem excalefacto, & putrefacto, & vapores prius elevabatur ad caput à radiis solaribus, qui quantitate & qualitate continuum solventes dolorem excitabant, sed perseverantes ebullitione, atque putredine à bile sursum elati, sua copia aggravant, comprimunt, angustiam inducunt, & in somnum delationem; ratione vero bilis, vigiliis & delirium excitant; omnia in anteriori potius quam in posteriori parte cerebri fieri docuit Gal. dicens, *Saporis sui sunt cum lamellata parte, quae sensuum fons est.* Et ita Coma vigil erit affectus Typhomaniae, ex phrenitide & lethargo compositae non absimilis.

Febris haec, utpote tertia die ingravescent, ceteris continuus periculosior habenda, imò maligna propter superveniens symptomata, unde Hipp. *febres cum Comate, labore, lucis turbulencia, vigiliis, sudoribus, malignae.* Coma namque vigil facile in phrenitidem ex usu calefactientium, vel in lethargo ex usu refrigerantium degenerat. Sic nullus Phreniticorum vehementer sanavit, sed alia quadam veterosa in somnum delatione, capite gravati peribant.

Pro curatione itaque hujusce febris, cum Comate vigili, medicae intentiones erunt, refrigerare & humectare, praeparare & evacuare, repellere, repellere, resolvere, & roborare.

Et in fonte chirurgico in his aptissime detrahetur tunc sanguis ex brachiis, modo transacta septima, tertia vice educatur ex venis scapularibus, & tandem pro derivatione, cogitantur non erit de mudinibus retro aures applicandis, ante quarum usum duo alia veniculae baculis sunt proponenda. Cucurbitula quoque scarificatae prius dorso, modo scapularibus eadem occipiti locum habebunt.

Pharmaceutica remedia talia esse poterunt, Primo clysteres ita parentur.

℞. Decoct. malv. mercurial. chamæm. lib. i. syr. ros. sol. ol. chamæm. an. ℥ij. elect. de succo ros. ℥ij. vitel. ovi, salis parum, m. pro clyster. Oxyrrhodinum sit huiusmodi.

℞. Ol. ros. ℥ij. acet. ros. ℥. m. Diligenter autem observanda ad somnum progreſſio vel ad vigiliis, & Oxyrrhodinum in progressu oportune mutandum, ita ut in febribus accessione sit magis repellens, in declinatione magis resolvens, & ita saepe mutanda oxyrrhodina, pro affectus mutatione, adeo utambo inaequalibus serventur, quousque simul remittantur.

Lenientia interim repetenda ex syr. ros. & manna clarif. vel ex flor. can. cum tart. quibus superbibat aquam Nocerianam, aut hordeaceam, quae primum quoque alterantis loco esse poterit, addito syr. vel conserva de acido citri, sicut secundum alterans erit decoct. cicior. borrag. acet. beton. vel aqua stillat. borrag. & beton. addito syr. acetoso.



Cordialia quoque semper toto mali progressu sunt exhibenda & in statu, magisque in declinatione, reiventia capiti apponenda, infundendo serpyllum in oxycrithino, applicata quoque spongia madefacta, mox expressa, in decoct. beton., chamæm. puleg. serpill. saturæ, spongiola quoque naribus admoveatur, aceto madefacta, in quo serpillum fuerit infusum, non cedente vero malo, purgans exhibere solet, extremis enim morbis extrema remedia adhibenda. Sic tendente ad phrenitidem affectu, exhibeatur diagrydium cum castoreo, prout si ad lethargum, addantur dictis trochisc. alhand.

Victus sit ad tenuem inclinans: prisanam & apomel præbet Aëtius. Nos addimus ex pullo instaurans, aut ovi vitellum. Vinum in declinatione tantum convenit ad humorum concoctionem ac expulsionem, nec non materię in capite resolutionem. Quæ satis pro præsentis affectu. *Joan. Raymund. Fort. Consuli. & respons. Medic. Cent. 1. tom. 1.*

### *Comatosus affectus.*

Nob. Vir annum agens quinquagesimum secundum, largiori victu & potu præsertim vino meraciori utens, temperamenti sanguinei, pituitosi, corporis obeso, capitis humidioris, tribus abhinc annis somno tam mane quam vespere plus julto vexatur, ita ut in mensa, iussu, scribendo, loquendo & aliis actionibus obdormiat, non tamen profunde, cum facile vel per se, vel ab adstantibus excitetur: sed iterum in actionibus obeundis pergit, ut antea. Vir est satis perspicacis ingenii, industrius, & ad motum, licet obesus, valde agilis, nec vitam agit sedentariam, motibus præsertim itineris assuetus.

Somnus à natura fuit institutus, ne perenni calor & spirituum dissipatione sensus clanguant, & tandem pereant. Unde Themistius dicebat quod somni finis est salus & conservatio animalium; moderatus tamen esse debet & ætati atque temperamento proportionatus: tunc enim est suavior quædam sensuum detentio, calorisque ad interna revocatio, à qua cessat interioris animæ ab exercitatione membrorum in sensu, & motu operatio, eo quod melius & suavius judicetur cessare, quam sic operari: Non autem suavis & naturæ amica est cessatio ab operationibus adeo frequens & importuna quæ observatur in Nob. Patiente propolito: namque omnino p. n. est talis somnus qui in genere sopor dici potest; in specie tamen neque lethargicus est, quia sine febre, neque Caroticus, quia non profundus, nimis apoplecticus, quia nulla spirandi difficultas, neque principum functionum læsio, præterquam quod diuturnus est, sed comatosus vere dicendus, à comazando ita dicitur, cujus essentia in delatione in somnum consistit, unde definitur quod sit *in somnum delatio nequeuntibus & Egri vigilantium munera obire*. Coma verò huiusmodi non quidem Vigil sed somnolentum est, dormit enim. Nob. Pat. non tamen lethargicum, ut dictum fuit, tum quia facile expergefeit, tum quia nullam habet febrem sibi conjunctam.

Fit autem huiusmodi coma affecto cerebro ab aliqua angustia, per quam fit quod spiritus animales moveri, nec transire liberè possint, ex quo sequitur imminutus sensus & motus. Huiusmodi autem angustia fit humectata parte quæ sensuum lons est, anteriori scilicet potius quam posteriori: Premitur autem & gravatur cerebrum in Patientem nostrum, non à frigidityte, tunc enim profundus fieret somnus, sed ob alicujus succi redundantiam, qui humidus esse debet, adeo ut cerebrum molle reddat, gravet, meatus obstruat, & laxando corpus stupidum faciat, quæ humiditas in casu nostro, tum humoris, tum vaporis specie se prodit: humoris quidem nempe pituitosi sanguinis, à toto venoso genere per carotidas ad caput delati, & nutriendo capiti inepti, quod facile colligitur ex continuis erroribus in cibo & potu, nec non ex ejusdem temperamento atque obeso corporis habitu; quare per consensum a toto & a ventriculo potius, quam per essentiam caput lædi credendum: licet enim caput quoque præhumidum habeat, est tamen vir industrii, & perspicacis ingenii: quæ conditiones redundantem humiditatem essentialem in capite non adesse demonstrant. Præterea vini generosioris usum, narcoticos vapores cerebro communicare, & spiritibus animalibus torporem inducere, quotidiana in temulentis docet experientia, quod licet calidum, frigida mala parere dicebat Galen. unde quærenti Hippocrati, *an sopor sit ubique malus*? Respondebat Galenus, *non esse malum in Ebriis*, quatenus per ipsum consumuntur copiosi, crassi, & narcotici vapores, à vino & crapula necessariò in caput elevati: hæc igitur causa, si non principalis hujus soporis, saltem valde fovens censenda est.

Est iste affectus magnificiendus. *Somnus enim atque vigilia utraque si modum exceßerint, malum*: caput enim gravat, mentis hebetudinem inducit, memoriæ jacturam, caput copioso, & pravo humorum affluxu ad sævissimos præparat morbos, ad verum scilicet lethargum, ad Apoplexiam, dum sanguis ob sui copiam, & pravam, frigidam, & humidam qualitatem, non solum tardè movetur, ut nunc in somno, sed crassior adhuc redditur, stagnat in cerebro, propriumque circularem motum prorsus amittit. Sic fortem somnum corpus dissolvere, capiti gravitatem inducere, dicebat Galenus. Sicut Plato, quod somnus multus nec animis, nec corporibus, neque rebus gerendis conducit.

Ideo omnia agenda, & quam primum ut à præsentis Comatoso affectu liberetur, & ab imminetibus præservetur vir nob. quod sperari potest, tum quia nondum majora & propria adhibita fuere remedia, tum quia errata hoc malum patientia omissa non sunt.

Primo igitur viæ primæ sunt diligenter expiandæ. Secundo Venosum genus à cruditatibus depurandum. Tertio Vapores revellendi. Quarto caput ipsum sensibilibus, & insensibilibus evacuandum. Quinto roborandum, & dum hæc omnia fiunt, facultas sollicitè excitanda.

Quibus intensiõibus ut satisfaciamus, à fonte Chirurgico non unica est depromenda sanguinis missio, sed ex brachio prima, ex Saphena secunda: habemus enim historiam ab Aëtio tra-



ditam de illo qui copioso sanguinis profluvio è naribus superveniente hoc affectu liberatus fuit. Infernis partibus quoque conveniunt Sinapifm, qui possunt diuturno tempore administrari, non ita Phœugmi. Frequentes esse debent Clysteres aciores, cum pulpa Colocynth. utpote mirabilis efficaciar.

Prunæ viæ mundandæ mellis Ros. & syr. ros. solut. addito polline crem. tarrari. Primum Preparans sex diebus sit sine diluto, ex oxymel. & melle ros. ad ʒiij. quæ exigua aqua florum citri dilui possunt, mox idem leniens erit repetendum, & ad ulteriora Preparantia deveniendum, & esse poterunt oxymel simplex, & syr. de beton. ad ʒij. in decoct. cich. borag. melissæ, beton. calend. agrim. in quorum ulu insillat septem diebus. Mox exhibeatur Purgans, ex elect. lenit. & diaphæn & granis Magist. Jalappæ; cui post horam superbib. mul. dilut. libram. Inde ad efficaciora progrediendum: Oxymel enim, saltem compos. si non squilliticum, necessarium erit, cum syr. de beton. compos. in decoct. cich. melissæ, beton. stachad. majoranæ, serpilli, per alios septem dies: & interim clysteres aciores injiciendi; tribus diebus transactis, pilulæ capitales erunt præbendæ, ut cochix præparatæ, aggregat. & aureæ an. ʒß. Castorei gr. vj. m. cum aceto squillit. reform. & aur. quibus post horam superbib. mul. dilut. salutat. ʒb iß. & tribus horis ab assumpta mulsa prandeat. Et quoniam corpus obesum est, caputque repletum, ideo in purgantium medicamentorum ulu insillere necessum est; quare pilulæ jam dictæ aliis duabus vicibus quarto aut quinto quoque die repeti poterunt, diebus intermediis syrosos jam dictos offerendo, caput Errhinis & masticatoriis expurgando.

Si jam proposita satis profuerint, ut sperari potest, sat erit præscribere jus galli junioris, & visco querc. lentisco, ligno toris marini; & tantillo sassafras alteratum: cui præmittatur pulvis viperinus, in cuius ulu pelillat per integrum mensem. Sin minus Decoctum sudorificum erit parandum, ex iisdem ingredientibus, in aqua cich. salvix atq. beton. hora una ante sudorem, in hypocausto propinandum: quod tamen facile omitti poterit, cum caput essentialiter affectum non sit. Interim diximus à somno Patientem frequenter esse excitandum, in quem finem Gal. sapius sternutatoriis uti solet, pulvis enim cannula per nares insufflatur. Suffumigium pulveris quoque Castorei, & asa foetidæ & lapidis gagates carbonibus injecti naribus admodum efficax est, spongiola naribus apposita, aceto imbuta, in quo ebullierint serpillum, majorana, & pulegium. Excitat quoque, tum materiam ipsam, tum vapores attenuando & dissolvendo, spongia magna vino imbuta & expressa, in quo saturata cum floribus ebullierit, syncipiti calens admota; sicut inter interna à Trall. & prius à Gal. extollitur Castorei usus.

Quibus omnibus aptior addatur vivendi ratio, & primo cubiculum lucidum inhabitet, parcus comedat, & parcissime vinum oligophorum & album bibat. Condiantur cibi aceto, menthastro, salvia, majorana, cinnamomo. Exerceat corpus, & frequenter moveatur, Pi-

lulas mastic. toto anno in usum ducat, & consociates frequentes habeat, omnia autem contra hujus affectus contumaciam proposita lueret. Faxit Deus, ut paucioribus cedat; frustra enim per plura fieret, quod per pauciora obtineri potuerit. *Joann. Raymund. & oris consultat. & respons. Medicin. T. 2. sem. 1.*

### Lethargus.

Vir dives annum agens 55. temperamenti totius ad calidum & maxime humidum vergentis, capitis humidioris, obeli habitus, delicate vivens, ventri, gulæ, otio, & somno plurimum indulgens, antehac capitis destillationibus obnoxius, tempore præsertim autumnali, quandoque etiam podagræ cubiti, atque manus, post copiosorum æstate nuper elapsæ fructuum nive refrigeratorum, & lactariorum frequentem usum, tandem autumnio præfenti, nulla secuta destillatione, nulloque dolore podagrico, de dolore capitis gravativo cum delatione in somnum, inappetentia, totiusque corporis lassitudine conqueri cepit, mox per quindecim præteritos dies, dolor capitis gravans magis, magisque semper adeo invaluit, ut modo tandem Pat. prorsus somnolentus lassus sit, cum levi febricula, & quandoque etiam delirans, & obliviosus. Cum autem Medicus assilens, & horativum medicamentum ei exhiberi jussisset, & ab eo sanguinem quarto die ex brachio detrahi, hic pituita redundans observata fuit, cujus ratione oxymel cum alterantibus præscripsit, atque tandem duo vena cœcis apponenda. Quibus tamen non obstantibus, somnus adeo excrevit, ut vix respondeat interrogatus, oculosque statim iterum claudat, oclat insuper, hiat & os apertum detinet, matulæ præ manibus obliviscitur, alienaque loquitur, delirium tamen non furiosum, sed satis remillum est, & hodie, x. scilicet, febris cum reliquis symptomatibus adaucta videtur. Quare nos de agendis consulit.

Pituitosi sanguinis & catarrhalis excrementi necessarium proventum in hoc egregio Viro sat nobis præmonstrare possunt agens inclinans, temperamentum totius humidum, humidum item caput, vita antea, otio, & somno indulgens, usus lactis, & fructuum nive refrigeratorum, podagrici insultus periodici, prout & nunc illius sunt indicia, dolor capitis gravans, inappetentia, & quedam etiam veluti spontaneæ lassitudines. Cum enim præteritis annis pituitoso humore copioso in hoc patiente producto, in id conspirantibus rebus naturalibus & non naturalibus, corruptus ab eodem sanguis ad articulos à natura deponeretur, & partim insensibiliter resolveretur, partim ab evacuantibus medicamentis, tunc temporis à medico præscriptis, insensibiliter evacueretur, nec non ex inedia quoque coctione absumeretur, modo natura jam forte defessa, & humori copiosiori ac tenaciori reddito tortasse jam impar, ab ejusdem depositione cessavit, unde ille in venis hærens, & magna sui parte ad caput elevatus, vasa distendens, & continuum solvens, dolorem gravantem excitavit & in præfens excitat, cum delatione in somnum, & quia ob  
crudi



crudi sanguinis præsentia totius exinanitio prohibetur, nec non iuctio, & ab ea sensus suctionis, sine quibus fames dari non potest, ideo inappetentia prægressa quæ solet alioquin ægitudines prædicere non secus ac spontaneæ lassitudines.

Verum quoniam excrementi pituitosi apparatus jam in capite succrevit, ob humidam ejusdem intemperiem, & assumpta antehac vaporosa humida alimenta, unde dolor gravans prægenus, hic propterea in cerebro putredinem concipiens, somnum profundiorē induxit, dum a calore putri liquidus magis, magisque in cerebri substantiam sese insinuavit. Sic Gal. dicebat quod *Alii sopores sine febre sunt Apoplexia, Caros & Catochus, ac si humor putrescat, additur febris, & fit Lethargus.* Quod repetit præterea dicens, *cum pituita humectaverit digne, itaque cerebrum fit Lethargus.* Hinc lethargicæ febres sunt ex humore pituitoso in cerebro acervato. Obliviosus autem & amens factus est, ut de quibusdam dicebat Gal. *Non est mirum in cerebro crudis collectis humoribus, comatosos illos, simulque demones evasisse, comatosos quidem simul ex multitudine & frigore succorum crudorum; demones vero quia putrescentes acridinem pariebant & calorem.* Sic & ipse Hipp. scripsit, *Lethargicus nugæ gerit, & nobis nugari deservit, dormit.*

At quoniam modo in xi. Febris & reliqua symptomata, nimirum somni profunditas, atque delirium cum oblivione, adaucta videntur, & urinæ, quæ ab initio crassæ ac perturbatæ, crudorum humorum in venis agitationem prædebant in præsens tenues factæ sunt, verendum ne a calore putri in capite attractio, & a toto venoso genere transmissio pituitosi sanguinis facta fuerit, qui etiam inflammationis in cerebro ipso ansam dederit, unde lethargus exquisitus quidem antea, exactè jam exquisitus evaserit, somnus enim morbosus in nobis fieri incipit, cum pituita copiosa cerebrum irrigat ac humectat, quæ proinde quò copiosior fuerit, eo profundior erit somnus, quod si eadem putredinem suscipiat sit somnus lethargicus, cujus putredini accedente quoque cerebri inflammatione ex sanguine pituitoso, per venas a toto transmissio, vel in cerebro genita, fit lethargus, non modò exquisitus, sed & exacte exquisitus; quæ tamen inflammatio raro in principio, & insiente, sed in facto tantum & consummato lethargo accedere solet: ad lethargum enim constituendum, sufficit sola pituitosa materia in capite putrescens.

Hinc sibi non contradixit Gal. dum in eodem genere phrenitidem & lethargum reposuit, atque phrenitidem in lethargum degenerare probat, dumque illam a benigna potius, hunc vero a cerebri inflammatione fieri scripsit. Nec male Hipp. & Celsus cum eo, asseruerunt Lethargum nonnunquam ad suppurationem verti, prout optime quoque Avic. Lethargum apostema frigidum, & alias tumorem pituitosum appellavit. Et propterea non audiendus Avic. qui essentiam lethargi in inflammatione constituit, quem sequuti fuerunt Hollerius, Heurnius, Capivac. Ugo, & plures alii de consummato lethargo loquuti. Idèò quamvis perpetua lethargi comes sit ipsa febris; attamen quoniam adaucta est, novam causam, inflammationem scilicet accessisse jure merito suspicandum; adeò

ut dux in unum conspirent, febris nimirum lethargica simpliciter, & lethargica inflammatoria; quæ cum non in membranis, sed in cerebro hæreat, pulsus idèò lethargicorum proprius percipitur, mollis scilicet undosus, magnus, licet vacuus, & intermittens potius quam interceptus, refrigeratæ facultatis indicio,

Status itaque hujus Patientis est periculi plenus; cum modò in xi. nullum appareat coctionis signum, & copiosus sit in capite, & venis crudorum humorum apparatus, lethargus insuper sit morbus acutus. *Et morbum acutum acuto morbo supervenire lethale fit.* Idèò inter periculosos a Gal. collocatur; quinimo periculosior censetur peripneumonia, phrenitide lethalior, Phrenitis enim lethargum sanat, non autem vice versa: cum utem terminus solutionis soleat esse septima dies, quæ imminet, cum urinarum tenuitate, & crudis atque foetidis dejectionibus, exigua spes superest quod per resolutionem terminari possit, aliqua per abscessum post aures, nulla vero per suppurationem; cum enim in puppi potius quàm in proa cerebri natus iste affectus, agere potius per nares, per os, aut per aures expurgari poterit.

Curatio utem dirigenda adiectus lethargum. Primo revellentibus, & repellentibus. Secundo præparantibus, incidentibus, attenuantibus, & detergentibus, moderate calidis, habita febris ratione. Tertiò evacuantibus insensibiliter, & insensibiliter. Quarto facultatem sopitam excitantibus. Quintò a proprietate juvantibus. Sexto symptomatibus occurrentibus.

Pro quibus explendis intentionibus, initio ab Excell. assilente sanguis ex brachio prudenter educi, ratione imminentis inflammationis; ob quam repetita quietiam concurret sanguinis missio, non obstante quod lethargus & peripneumonia sanguinis fluxum non ament, locutus enim fuit Gal. de crisi per hæmorrhagiam difficili. Nec quicquam facit quod Mesue eandem omiserit in lethargo phrenitidi succedente. Minimè verò quod Gal. prohibeat sanguinem crudis abundantibus succis, in febre syncopali: verum tamen quoniam vires non satis constant, omisâ venæ-sectione, sedales aperiri poterunt, utpote quæ a capite revellere & a toto evacuare possunt; Saphenam enim & Avic. referari jubebat. Cucurbitulæ quoque siccæ; cum multa flamma, primùm cruribus, coxis, & natibus; tandem & scapulis applicanda; quinimo in casu nostro cucurbitula magna inter primam & secundam vertebra scarificari poterit, Aetii exemplo; cum adsit & inflammatio. Cætera omnia genera revulsionum, ac tandem derivationum in usum ducenda, & idèò pedum plantæ scilla sunt perfricandæ, more Tral. Duo alia veticantia brachiis apponenda, idèò & scapulis, & occipiti, namque & ipsi capiti, derafis capillis, rubificans, sinapisimum scilicet, admovebat Aetius ipse.

Revellentia jam ab Excellentissimo Adstante administrata fuere, nec non repellentia, quæ cumque enim humor sit, semper repellendus, capite derafo, ut monet Celsus. Acres clysteres commendat Aret. non solum ad evacuationem



ed & ad revulsionem ab ipso capite, ideo in clyst. injiciebat saleni, nitrum, castoreum. Nos autem hujusmodi paremus.

℞. Utriusque centaur. chamameli, fennæ an. m. f. pulv. coloc. in peria lig. Div. aq. com. fß j. f. m. bñ. ad consumpt. tertiæ colat. vero add e mel. ros. sol. ol. chamamel. an. ʒ ij. hieræ pro clyst. ʒ ij. salis gemmæ ʒ j. m pro clyst. Quos si non admittat, suppositoria acria substituantur hac forma.

℞. Troch. alhand. diagrydii, an. gr. x. sal. gemmæ ʒ j. mellis q. s. ni. t. supposit. num. ij. parva cum filo.

Optimum erit leniens, si repeti possit, ex melle ros. sol. cum manna. Sicut & preparantia ex decoct. cich. beton. major. salviæ & hyssopi, addito saltem oxymel. compos. Purgans quoque exhibeatur, si possibile fuerit, ut pul. de nitro Alex. cum troch. alhand. vel quod facilius.

℞. Troch. alhand. diagr. an. gr. viij. castorei gr. v. m. exhibeantur ex cochleari vini albi. Neque admittenda compositio Tral. imo & Avic. & Mel. ex cast. ʒ ij. & diagr. ʒ j. utpotè validissima, nec proportionata pituitoso humori, castoreum enim etiam in soporosis affectibus caute exhibendum, nec nisi exigua existente febre.

Insensibiliter quoque materia discutienda ac resolvenda, in augmento decocto in oleo ros. thymo, origano, pulegio, calamento. In statu addito castoreo, vel euphorbio. In declinatione, fricando caput jam derafum ol. chamamel. cum nitro & sinapi. Sinapismos enim apponebat Æt. & Gal. ante ipsum. Interim insufflatur per nares pulv. nigellæ, major. & ireos.

Quarta intentio est, facultatem sopitam excitare, in tota curatione necessaria iterutatoria proponit Gal. Conveniunt & suffumigia ex castoreo, asa foetida, gagate. Valent acclamationes, capillorum evulsiones, Plinius & Aretæus proponunt crurum verberationes cum urticâ. Gordonius ferrarum & limarum fragores. Gentilis proponit porcellos arête ligatos in cubiculo detinendos. Aurelianus monet proprio nomine frequenter vocandos esse patientes.

Quinta intentio est, cerebrum roborare; quod prestare poterunt conservæ beton. anthos, salviæ, lavendulæ, majoranæ, & magnæ antidoti. Ex chymicis, ol. majoranæ, serpilli, quinta essentia rorismarini, extractum castoreæ ad grana dilutum in aq. lilior. convul. & omnium maxime extollunt sulphur lunæ.

Tandem a propteritate juvantia non despicienda & inter interna, castoreum præcellit, quo solo vidit Tral. multis lethargo victis in potu exhibito, mortem evasisse, de quo Archigenes integrum librum scripsit, ut refert Gal. à quo etiam probatur. Extrinsecus Sisymbrium cum aceto capiti affusum. Sed nos experientia compertum, non semel vidimus, satireiam cum floribus, vino incoctam & calentem capiti admotam Lethargicos pertinaces excitasse. Cor & oculi Philomelæ alligati carnem attingentes somnum arcant, ut refert Nicolus, prout gemina Hamarites ex Alberto.

Tandem symptomatibus supervenientibus occurrendum fuerit, quæ solent esse, tacultas sopita, oblivio, urinx & fecum retentio, dentium contrictio, & extremorum refrigeratio.

Facultatem excitant, præter adducta, sterutamenta excitata. Pro oblivione sunt provocandi ad respondendum. Urina sollicitetur paleæ trititulo litula urinaria irritata, fecum exercetio acri supposito. Saliva linteolo lineo ex ore uetergenda. Cochleari sape dentes diducendi, & os apertum servandum, ac tandem extrema calefacienda, ut docet Hippocrat.

Victus rationem quod attinet. Aer cubiculi sit moderate calidus, odoribus alteratus, splendidus, non tenebrosus. Victus medius cum Aretæo, tenuis & attenuans cum alijs. Condiuntur cibi aceto, & cinnam. cavendo ab emuls. amygd. dulc. à Tral. proposita. Vinum in declinatione concedendum. Sic Tral. ubi morbus concoqui cæperit, ita Cellus, & Æt. Sic Hipp. ait, *vinum album vinosum postea bibendum dare*. Aquolum caput replet, nec resolvit, vinosum vero adjuvat coctionem & materię resolutionem. Interim potus sit mulsa, ex aqua hord. parata, & cinn. m. condita. Tandem ad iram frequenter provocetur Ager. Paxit Deus, ut jam dicta abundè sint à nobis proposita, atque paucioribus Vir Generosus pristinae sanitati restituatur. *Joan. Raymund. Fortis Consult. & respons. in din. Cent. 1. tom. 1.*

#### De Caro.

Juvenis Robustus cum è loco editiore in caput decidisset, mox alto sopore oppressus est. Ab amicis presentibus, qui illum ebrium esse putabant, in lecto depositus, toto biduo in illo statu remansit, cumque illo temporis spatio sponte non evigilaret, tandem Medici consilium imploratum est. In capite nulum vulnus animadvertitur, propterea quod pileus durior caput à vulnere defenderat. In vertice tamen aliqua non magna contusio observatur. Pulsus bene sese habet, neque cordis male affecti signa exhibet. Respiratio facilis est. Si pungatur ager, con punctum membrum aliquantillum contrahit. Interim nullis clamoribus, pilorum vellicationibus, aliisque medijs è somno excitari potest.

1. Quantopere in hoc ægro caput afficiatur, gravissimus ille sopor latis ostendit.

2. Sopor hic Carus appellatur, *estque somnus maxime profundus cum actionum animalium lesione*.

3. Apoplexiam non esse liquet, quod respiratio libera sit, & æger compuncta membra aliquantillum contrahat. Neque lethargum, quia febris abest, & æger excitari nequit, quo signo etiam à Comate distinguitur, utpotè in quo ægri subinde excitantur, & membra loco dimovent.

4. Mali hujus causa depressio superioris crani, sive ossium Bregmatis, lapsu illo tacta, quæ etiam depressum cerebrum in suo motu impeditur, ita ut se dilatare commodè non possit: hunc propter impeditam illius actionem, omnes quoque animales actiones laeduntur. Ad-



de quod propter compressum, & hinc magnâ ex parte obstructum plexum choroidem spiritus vitales pauciores ad cerebrum penetrent, hincque pauciores etiam generentur animales spiritus, quorum influxus ad sensuum organa, aliaque partes ab eadem compressione non parum impeditur: atque sic propter spirituum animalium tum non satis liberum influxum, deliciunt partium actiones, & ita quies, altusque sopor.

5. Sopor hic grave periculum minatur, & nisi quamprimum commoda remedia adhibeantur, metuenda est mali hujus infortem apoplexiam mutatio.

6. Indicationes curativæ sunt primo, ut cranium depressum elevetur. Secundo, ut cerebrum à depressione illâ debilitatum corroboretur. Tertio ut totius corporis ratio habeatur & ne humores multi ad caput affluant, vel alius in corpore morbus generetur, præca-veatur.

7. Præmissis igitur clystere, sanguinis  $\bar{z}$  viij. vel ix, e brachio extrahantur. Quo facto ad generosum maximeque necessarium remedium deveniendum est, scilicet cranii denudationem, & si necesse sit, perforationem.

8. Eadem die (nam periculum est in mora) quâ clyster injicitur, & sanguis detrahitur, etiam circa vespertinam cranium, eo loco ubi extrinsecus in vertice contusio apparet, cruciali incisione, in partibus carnis facta, satis lato vulnere denudetur. Postridie matutino tempore annitendum, ut commodis instrumentis depressum os elevari possit. Sed quia non sine ratione metus est, a violentâ illâ depressione aliquas in dura meninge venulas disruptas esse, ex hisque nonnihil sanguinis inter illam meningem & cranium effluxisse, qui postea ibidem putrescens mortem inferre posset, tutissimum foret, si cranium trepano perforaretur in parte limba depressæ parti proxima, ut sic extravasatus ille sanguis effluere, & cranium, immixtis per illud foramen instrumentis, commodius elevari possit.

9. Elevato crano, & vulnere s. art. petii obstruato, toti capiti hoc fomentum tepidè circumponatur, & cum refrigerari incipit, mox renovetur.

25. Herb. betonicæ m. iv. majoranæ, rosmarini, verbenæ, feniculi, fol. lauri, melissæ, thymi, rutæ, flor. stochados, chamomillæ, meliloti, an. m. j. aquæ commun. q. s. coquantur s. art. adjiciendo sub finem, vini albi lb j. fiat fomentum ad lb iij.

10. Temporibus illinatur hoc linimentum.

26. Olei succini, rosmarini, majoranæ distill. ana scrup. j. castorei pulverisati gr. ix. unguenti martiati drach. ij. misceantur.

11. Aegro e somno jam excitato (quod paulo post cranii elevationem plerumque fieri solet) hic haustus purgans exhibeatur.

27. Fol. senæ mund. drach. iij. rhabarbari opt. drach. j. s. agarici albi. drach. j. sem. anisi drach. j. decocti hordei q. s. fiat infusio s. art. adde colaturæ elect. diaprui solutivi drac. iij. misce, fiat haustus.

12. Corpore purgato, bibat bis tervè de die haustum hujus apozematis.

28. Radic. cichorii  $\bar{z}$  j. s. feniculi, acori,

ana  $\bar{z}$  ss. herb. betonicæ, taraxaci, borraginis, melissæ, rutæ, ana m. j. rosmarini, majoranæ, florum stochados, ana m. ss. corticum citri, aurantium, ana  $\bar{z}$  ss. passularum corinth.  $\bar{z}$  ij. aquæ q. s. coquantur s. art. & fiat apozema ad lb j. ss.

13. loco apozematis subindè etiam dari potest particula talis conditi.

29. Specier. diambæ drach. j. rad. acori cond. corticum aurantium cond. conservæ anthos, rosarum pallid. ana  $\bar{z}$  ss. syrupi de stœchade q. s. fiat conditum.

14. Si interea alvus non respondeat, clysteribus subindè proutetur: vel suspendatur hæc puppa in cerevisiæ tenuis lb j. ss. de qua subindè matutinis temporibus haustus detur.

30. Foliorum senæ mund.  $\bar{z}$  j. s. rhabarbari drach. ij. rad. jalappæ drach. j. sem. anisi drach. ij. fol. majoranæ, cardui benedicti, ana m. s. fiat puppa.

15. In dieta, sit aer temperatus & clarus. Cibi offerantur euclymi & supti, primis diebus pauciores. Potus sit cerevisiæ tenuis & vinum tenue. Somnus primis diebus brevior sit, postea moderatus. exercitia sint mediocria. Excretiones naturales vel spontè, vel arte debito modo procedant. Animi pathemata fugiantur. *Librand. de Diemerbroeck de morbis capitis medicat. 8.*

#### De Comate Somnolento & Flegli.

Vir quadragenarius, mediocriter fortis, temperamento aliquantum pituitosus, bis terve in anno catarrhis ad dentes vel pulmones delabentibus, per aliquot dies affici consuevit erat, qui interdum nullo, interdum levi aliquo capitis dolore præcedente, invadebant. Tandem autumni tempore in postica capitis parte dolorem tensivum ac gravativum rursus lenit, qualis catarrhum præcedere solebat, nullo tamen catarrho subsequente. Dolori huic in dies adaugeto, cum vertigo adjungeretur, Medici consilio corpus purgatum, vena secta, aliaque convenientia remedia adhibita sunt, quibus dolor adeo mitis evasit, ut æger rursus toras prodiret. Verùm cum se intempestivè nimis æri frigido exponeret, incrementum subito dolore, unâ cum vertigine, cubitum discedere coactus fuit, ac subindè aliquantum delirare compertus est. Dolor hoc magis, magisque incrementum, secundo die ante lectum casu pedibus insistens, concidit, nec se erigere rursus potuit, sed ab adstantibus lecto impositus est, in quo paulo post tanto somno obrutus fuit, ut nonnisi magnis corporis concussionibus ac vellicationibus excitari potuerit; excitatus oculos tantum aliquantulum elevaret, nihil autem loqueretur, sed mox in somnum relaberetur. Tertio die excitari amplius non potuit. Cum altus ille sopor circiter per quatrimum durasset, postea subindè paulisper evigilare cœpit, tuncque plerumque nihil, interdum pauca cum delirio loquebatur. Tali modo soporosus vixit per octiduum. Postea continuam quidem habebat inclinationem ad somnum, cum oculis convulventibus, sed dormire tamen non poterat, plurimaque deliramenta secum loquebatur; interdum quiescens, cum dormire putare



tur, repente è lecto exsiliire (quod tamen ob debilitatem non poterat) & hoc illudve peragere volebat: in istâ inclinatione ad somnum cum continuo delirio, per octo decemve dies remansit. Istea omnino dormire non potuit, neque ullâ inclinatione ad somnum per duas septimanas tenebatur: interea tamen delirium in dies magis immutatum est, ita ut eo spatio mentis plane compos evaserit, viribusque paulatim recuperatis, tandem summi Dei & medicorum ope pristinae sanitati restitueretur. Toto morbi decursu non febricitavit. Appetitus constitit usque ad profundum soporem, & postea evigilans nihil quidem petiit, sed oblata assumpsit, & bene digessit, ex delirio responsis, prater imaginationem ac ratiocinationem, etiam valde labefactam fuisse memoriam, compertum est. Quæritur quo morbo hic æger laboraverit, & quibus remediis curari debuerit?

1. Cerebrum in hoc ægro omnium maxime laborasse, hincque sensus principes & externos valde afflictos fuisse, clarissime patet ex historia.

2. Gravis ille sopor, quo in principio detinebatur æger, fuit *Cataphora seu coma somnolentum*, quod est sopor gravis ob sensum communem torpescentem exoritur. Quæ verò postea, cessante sopore, accessit gravis ad somnum inclinatio cum impotentia tamen dormiendi, fuit *coma vigil*, quod est gravis ad somnum propensio, & ad eundem impotentia, à vasorum in ventriculis cerebri compressione vel obstructione, & spirituum inordinato motu mentem turbante, producta.

3. Causa antecedens hujus mali fuit pituita in partibus inferioribus paulò copiosior generatio, quæ ad cerebrum delata, in ejusque ventriculis copiosior collecta, causam continenter constituit, cum enim hæc pituita, more solito, non deflueret ad partes inferiores, sed ibi detineretur, paulatim ventriculos sua copia distendit, unde primo dolor capitis tensivus ac gravativus exortus est. Deinde verò, illa pituita magis adaucta, plexum choroidem una cum reti mirabili, aliquo modo compressit, & magnâ parte obstruxit: hinc cum spiritus vitales, in animales mutandi, non sufficienti copia transirent, spiritus animales tam pauci generati sunt, qui ad sensuum principum & externorum officia non sufficerent, unde æger, motu immutato, primo concidit, neque se erigere rursus potuit: & deinde sensibus externis quiescentibus altus ille sopor obortus est. Tandem verò natura & medicamentorum beneficio, illa plexus choroidis obstructione aliquantum immutata cum spiritus vitales jam paulo copiosiores transirent, atque hinc plures generarentur spiritus animales, nondum tamen satis copiosi, itaque per impeditas vias inordinate moverentur, inde factum ut mens admodum turbata sit, & spiritus quidem plures ad sensuum externorum organa effluerent, sed non satis copiosi ad eorum munia bene peragenda, quæ causa fuit magnæ inclinationis ad somnum, qui tamen à continua mentis turbatione impediatur, ita ut æger dormituriens dormire non potuerit, sed cum continuis deliriis dormituriendo viglaverit. Ultimo, cum soluta

penitus obstructione, spiritus jam satis libere quidem transirent, sed ob magnam corporis inanitionem paucissimi ad cerebrum accederent vapores, qui illos debito tempore aliquantum in cerebro litterent. Hinc continua secuta sunt vigilæ, quæ postea pluribus vaporibus à copiosiore alimentorum usu ad cerebrum elatis, paulatim rursus immutatae sunt. Febris non adiit, quia nulla humorum putredo cor infestavit.

4. Coma somnolentum, ut & vigil, periculosissimum malum est, quo plurimi intereunt, imprimis si ultra quartum diem sopor profundus extendatur: propterea quod nobilissimum viscus, cerebrum, in eo graviter afficiatur. Ex obstructione enim & compressione illa plexus choroidis duplici de causa periculum imminet: vel quod à spirituum animalium defectu, in apoplexiam mutetur, ægrumque ito extinguere possit. Vel quod à spiritibus vitalibus calidis solitas vias transire nequeantibus, facile inflammatio in cerebri membranis fieri, hincque malum in Phrenitidem mutetur possit.

5. Indicationes curativæ primariæ sunt, ut materia continentis in ipso principio instituat revulsio & evacuatio, itaque solvatur obstructio. Deinde ut causa antecedens tollatur, cerebrum corroboretur, & impediatur, ne in eo nova pituita collectio fiat.

6. Quia æger profundo sopore oppressus, nihil per os assumere potest, clysteres, ad minimum semel de die, sunt injiciendi. Asperæ frictiones & ligaturæ dolorificæ in externis partibus faciendæ. Sanguis e brachio detrahendus, cucurbitulæ cum & sine scarificatione scapulis, dorso & collo imponendæ. Corporis concussionibus & vellicationibus dolorificis æger, si fieri possit, sapiens & somno excitandus est. Utque materia continens excutiat & evacuetur, hic pulvis sternutatorius subinde cum penna in nares suffundendus est.

℞. Rad. hellebori albi scrup. j. pyrethri scrup. ij. fol. majoranæ scrup. j. piperis callosi, ana gr. v. fiat pulvis.

7. Sopore aliquantum immutato, exhibeantur hæc pilulæ.

℞. Massæ pil. cochiarum scrup. j. extracti catholici scrup. β. fiant pilulæ v. vel si illas deglutire nequeat, detur drach. j. pulveris diaturbith, aut diacarchami, cum paucillo cerevisiæ tenuis: vel haustus purgans ex foliis senæ, agarico, radice jalappa, aliisque similibus paratus.

8. Corpore satis purgato, præscribendum tale apozema.

℞. Rad. aconiti drach. vj. heleni, sceniculi, ana ℥ β. galangæ drach. ij. herb. majoranæ, betonicæ, rosmarini, melissæ, calamitæ, ana m. j. salviæ, florum stœchas ana m. β. bacc. juniperi drach. vj. Lauri drach. ij. passularum mundat. ℥ ij. aquæ q. s. coquantur s. art. & fiat apozema ad ℥ β. j. β. Qui admisceri possunt syrupi de stœchade, ℥ ij. vel iij. Hujus decocti ter quaterve de die haustus exhibeatur. Interea tamen continuandum est in usu sternutatorii.

9. Si



I X. Si Apozemate continuè uti nequeat, detur subinde particula hujus conditi.

℞. Specier. diambra, drach. j. β. conserv. melissæ, flor. salviæ, betonica, anthos, ana. ʒ. β. Syrupi de Stachade q. s. misce, fiat conditum.

X. Conficiatur quoque sequens cucupha, vel potius capitium capiti imponendum.

℞. Fol. majorana, rosmarini, flor. lavendula, meliloti, ana scrup. iij. benzoini, nucis moscata, gariophyllorum, ana. scrup. ij. fiat pulvis grossus pro cucupha. Tempora & vertex capitis illinantur hoc linimento.

℞. Oleosmarini, majorana, nucis moscata, ana. scrup. j. ung. martiati drach. ij. misceantur pro linimento. illud autem capitium medicatum æger morbo jam cessante diu adhuc gestet.

XI. In Diæta, aër sit purus, mediocriter lucidus, ad calidum vergens. Cibi dentur pauciores, euchymi, & eupepti, cum rosinarino, majorana, aliisque cephalicis conditi. Potus sit pituitosa, cerevina tenuis bene defacata, vel julepus aliquis cephalicus. A continuo somno æger arcendus est: postea tamen ubi ad continuas vigilias deventum erit, convenient amygdalata, aliaque quæ corpori bonum nutrimentum exhibere, & capiti blandum soporem conciliare possunt. Evacuationes naturales sponte vel arte procedant. Æger autem bene servandus est, ne in delirio se à lecto devolvat, aliove modo lædat. *Librand. de Diemerbroeck. de morbis capitis medicat. 6.*

#### De Lethargo.

Vir sexagenarius, temperamento pituitosus, pro ætate mediocriter fortis, cum toto autumni tempore nullam diætæ rationem habuisset, sed fructus horarios; lactucas, cucumeres, melones, aliaque similia copiosius ingestisset, per aliquot dies totius corporis lassitudinem, cum magna ad somnum proclivitate persensit. Deinde nuti, sed continua febricula corripitur, sub noctem quo idie aliquantum recrudescente, & quotidianæ normam gerente. Hanc statim maxima somnolentia comitari cœpit, tanta fuit ut a somno detineretur æger; qui somnans adeo profundus est, ut nec ad aditanti multos clamores, nec ullum in cubiculo excitatum strepitum æger audiat, à somno non sine molestia & valida corporis agitatione excitatus, adstantes paulisper aspicit, atque ad interrogata paucis verbis, & sæpè non satis ad rem respondet, se dormivisse nesciens: matula si detur, mingere obliviscitur sicque oculis & ore clausis in somnum mox relabitur.

Pulsus est mediocriter magnus, tardus & rarus, cui subinde, imprimis circa noctem, inæqualitas quædam & paulò major celeritas adest. Urina turbida est, quæ refrigerata sedimentum pituitosum copiosum deponit. Queritur Medici consilium.

I. In hoc ægro caput & totum corpus afficitur; illud liquet ex gravi sopore; hoc ex febris continua, & totius corporis lassitudine.

II. Gravis ille sopor, quo æger noster laborat, *Lethargus* appellatur, qui est *inexplebilis in*

*somnum propensio, cum febre lenta, & principum facultatum lesio.*

III. Causa Remota hujus mali imprimis fuit vitæ pravus & refrigerans, quo in corpore pituitoso multi crudi ac pituitosi humores generati causam antecedentem præbuerunt.

IV. Hi pituitosi humores partim ad cerebrum copiosiores delati, idque frigida intemperie afficientes, partim in vasis majoribus putrescentes, in corde accensi indeque per totum corpus, & simul etiam per arterias carotides ad caput impulsi continentem soporis & febris causam constituerunt.

V. Cum enim per arterias carotides crudiores illi humores, jam in corde accensi, ad plexum choroidem perveniunt (cujus minime arteriolæ ob frigidam cerebri intemperiem solito angustiores sunt) & partim propter arteriarum istarum angustiam, partim ob propriam crassitiam, plexum illum lentius transeunt. in eodem a frigida cerebri constitutione magis incrassantur, sicque adhuc tardior he eorum transitus. Quæ causa est, quod spiritus animales solito pauciores & tardius conficiantur propter spiritus vitales, e quibus confici debent, paucius & tardius per plexum choroidem transeunt. Qui pauciores spiritus cum ob paucitatem non sufficiant ad continua munia sensuum exteriorum, hinc fiet quies, in sensuum illorum organis; per quorum quietem cum nulla objecta ad sensus principes deferantur, etiam illi quiescunt, sicque altus fit sopor. A quo cum æger excitatur, etiam sensus principes læsi comperiuntur, ob eandem spirituum paucitatem, eorumque inordinatum per impeditas vias motum.

VI. Periculolus est hic affectus 1. quia nobile viscus cerebrum hic graviter afficitur. 2. quia febris adest, unde cor, totumque corpus patitur. 3. quia æger senex est, ob caloris nativi debilitatem, tam grave malum vix evincere poterit: adde quod in illa vires facile collabantur, & difficulter restarentur. Spem tamen sanationis exhibent vires mediocriter fortes, ac proinde curatio quamprimum instituenda est, antequam illæ collabantur.

VII. In curatione materia pituitosa, in toto corpore redundans, evacuanda, à capite revellenda, & ad partes inferiores derivanda est: præterea cerebri frigida intemperies tollenda, caput corroborandum, atque in eo contenta materia educenda ac resolvenda.

VIII. Injecto clystere instituuntur ligaturæ dolorificæ, & asperæ fricciones in cruribus, quæ sæpius repetantur. Venæ sectio in hoc senili corpore minus conveniens videtur, sed ejus loco cucurbitulæ, partim cum, partim sine scarificatione, admoveri possunt scapulis, dorso, humeris & cervici. Ab oxyrrhodino, aliisque similibus repellentibus frigidis hic abstinendum judicamus.

IX. Deinde excitato ægro hic haustus purgans exhibeatur. Rec.

Agarici albiss. drach. j. fol. senz mundat. unc. s. sem. anisi drach. j. zingiberis scrup. j. decocti hordei, q. s. fiat infusio s. art. add. colaturæ elect. diaphænici drach. iij. misc. fiat haustus.



Postea si alvus quotidie non satis respondeat, clysteribus proritetur.

X. Corpore expurgato, subinde detur xgro haultus hujus apozematis. Rec. Rad. calami aromat. helenii, fœniculi, petroselini, ana unc. f. herb. betonica, capilli veneris, cardui ben. centaurei minoris, taraxaci ana m. j. rosmarini, majoranz, hyssopi, florum stachados, chamomilla, ana m. f. baccarum juniperi drach. vj. sem. anisi scrup. j. β. corticum citri, aurantiorum ana unc. f. aqua q. f. coquantur f. art. & fiat apozema ad lib. j. β. cui admisceantur syrupi de stachade unc. ij. vel iij.

XI. Post usum hujus apozematis corpus iterum expurgetur haultu purgante ante dicto: cujus loco si xger pilulas malit, dentur scrup. ij. vel scrup. iij. pilularum cochiarum: vel si pulverem melius assumere possit, detur drach. j. pulveris diacarthami aut diaturbith, cum decocto hordei dissoluta.

XII. Secunda hac purgatione peracta, ad prædictum apozema redeundum, cui tunc plura diuretica (ut radices ononidis, asparagi, cryngii, herb. petroselinum, fragaria, aliaque similia) commodè adjiçientur. Et quia callorem in hoc morbo admodum laudatur, non male interdum cum haultu istius apozematis, aut cum oxymeli scyllitico, castorei pulverisati grana quinque aut sex exhibebuntur.

XIII. Interea dum hæc fiunt, studendum etiam, ut materia e capite speciatim evacuetur, ipsum caput topicis roboretur, in coque contenta residua materia discutiat. Prius impetabimus si succum radicum betæ & soliorum majoranz æqualibus portionibus pro errhino in nares inmittamus; vel si hunc pulverem sternutatorium in nares sufflemus.

℞. Rad. hellebori albi scrup. j. rad. pyrethri, fol. majoranz, ana. scrup. f. piperis nigri gr. v. Castorei, benzoini, ana gr. iij. fiat pulvis.

Posteriori consequemur, si verticem & tempora sæpe illinamus hoc linimento & sequentem cucupham imponamus.

℞. Olei succini, rosmarini, majoranz ana scrup. j. unguenti martiati drach. ij. Castorei pulverisati scrup. f. misceantur pro linimento.

℞. Ol. majoranz m. β. rosmarini, salvia, florum meliloti, ana. p. j. gariophyllorum, nucis moscata, ana. scrup. j. fiat pulvis grossus pro cucupha.

XIV. Porro diætã convenientem instituerè necesse est. Aer sit purus, lucidus, moderate calidus & alteratus odoribus ex castoreo, pullegio, rosmarino, salvia, thymo, majorana, melissa &c. cibi dentur pauci, & facili digestio, conditi rosmarino, majorana, betonica, hyssopo, aliisque quæ humorem pituitosum attenuandi & coquendi caputq; corroborandi vim habent, non enim hic ratione febris victus mere refrigerans est instituendus, sed potius ratione humoris peccantis, aliquo modo calefaciens: nam hoc modo sublata humoris pituitosi generatione, ejusque coctione peracta, febris facile evanescet) abstineat xger à lacte, leguminibus, fructibus horariis, aliisque frigidis alimentis, ut & ab iis quæ subtili calore attenuatos humores copiose & subito ad caput de-

ducunt, qualia sunt cæpe, allium, syn. pi, raphanus &c. Potus sit aqua hordei, cum hyssopo, majorana, rosmarino, & similibus decocta, melle vel hydromelite dulcorata, & cum pauxillo cinnamomi aromatizata. A continuo somno xger omnibus modis arceatur, & quàm sapissime excitetur. Evacuationes naturales, si sponte non succedant, arte proritentur: cumque lethargici mictionis, & egestionis alvi oblivisci soleant, sæpe admonendus est xger ad urinæ, & alvi excretionem. *Isbrand. de Diemerbroek de morbis capitis medical. 7.*

#### *Medicatio adolescentis Comate vigili laborantis*

Adolescens quindecim annorum, febris continuâ, eaque satis fervida laborans, sæpe ex lecto prostratus mutus ac oculis clausis, dormienti similis, quamvis perfecte non dormiat; tumque caput, reliquumque corpus in parietes illidit, tanquam exitum querens. In lectum relatus, corpus varie jactat, oculosque clausos vel connivescentes habet; Siquis ipsum alloquatur, vel attingat, nihil articulate respondet, sed inconditum sonum, instar mugitus, edit.

Afficitur in hoc xgro præter cor, cujus affectio ex febre est manifesta, etiam cerebrum; quod ex mentis stupore, oculis instar dormientium clausis vel conniventibus, & corporis illo inconcinno, & inconveniente motu & jactatione, patet.

Morbus qui ipsum cum febre continuâ affligit, est intemperies pituitosa cerebri cum magno spirituum animalium, in cerebro & ejus ventriculis existentium, fervore conjuncta, quæ somnolentiam, vereque dormiendi impotentiam, simul inducens, *coma vigil appellari solet.*

Causa antecedens hujus morbi est congeries pituitosorum, biliosorum, ac putridorum humorum, in toto corpore existens. Pars verò ejus pituitosa in cerebrum copiosius delata, illudque gravans, & biliosa in spiritus feruidos convertita, & ventriculos cerebri distendens, inordinateque movens, continens hujus morbi symptomatumque in historia commemoratorum est causa.

Morbus hic propter cerebrum & coram graviter affectum, maximum vitæ periculum, & præterea phrenitidis vel lethargi metum inducit.

Curatio itaque diligentissima adhibeatur. Eaque in causæ antecedentis, continentis & intemperiei, per contraria ablatione, consistet.

Mox itaque vena secetur, sanguisque pro ratione virium, ad revulsionem & evacuationem educatur. Taliq; clyster injiciatur.

℞. Decocti emollientis lib. i. in qua dissolve el. diaphanici, diapruri an. ʒvj. ol. violacei, camomill. an. ʒj. salis ʒj. Misce f. clyster, aliquoties iterandus. Vel subinde purgari etiam poterit tali haultu, si cum admittit.

℞. Diaphanici, diapruri an. ʒss. Aq. decocti hordei q. f. misce f. haultus.

Oxyrhodium etiam capiti ex aceto acerrimo, ol. rosar. & camomillino, tepide per triduum adhibeatur.

Postea pro cerebri corroboracione & mat-



rix discussione, fiat oxyrhodinum vel capitis iunctio. ol. camomillino, collino, irino, cum aceto, in quo pulegium est incoctum vel maceratum.

Corpore evacuato, cucurbitula cum scarificatione collo & dorso etiam sunt adhibenda. Ad sitim & ardorem detur tale iulapium.

℞. Aq. decoct. hordei lib. f. syr. violacei, de succo limonum an. ʒj. Rob. de ribes ʒss. Misce. vel.

℞. Rob. de ribes ʒj. syr. violacei, de limon. an. ʒss. F. Mixtura, de qua subiade aliquid detur ex coenclari.

Versetur in aere temperato. Nutriatur iuiculis vervecinis & gallinaceis, alteratis endivi, acetosa, lactuca, item l. cie amigdalato cum decocto hordei facto. Potus sit cerevisia tenuis. Teneatur quietus, a turba remotus. *Henricus Regius apud Theodor. Craanen medication. lib. 1.*

Vir Quadraginta annorum, pituitosus, crassus, pinguis, deies, ebrietati & ingluvie deditus, postquam per aliquot dies de capitis gravitate esset conquies, in tam inextinguibilem dormiendi incidit propensionem, ut quicquid ageret dormire cuperet & in somnum assidue liberetur. Malum jam ita crevit, ut magna difficultate per clamores & vellicationes excitatus, oculos vix attollerat, aliena incondito murmure loquatur, & mox in somnum relabatur. Quandoque exasperatus matulam mingendi causa postulat. Verum mox ejus oblitus urinam in lectum inferius effundit. Totum corpus tactu iusto calidius sentitur. Calorque sub vesper. in quotidie est intensior. Pulsus mollis est, celer, inaequalis, & debilis. Respiratio lenta, urina sunt crassa & turbida.

Afficitur in hoc agro totum corpus, quod docet ingluvies & ebrietas, atque urina crassa & turbida, sed præcipue cerebrum, quod probat magna illa somnolentia, & præterea cor, ut constat ex febris.

Morbus, qui eum tenet, est *Veternus*, sive intemperies totius corporis, & præcipue capitis, pituitosa, & nimis gravis, quæ putrescens febrem, & cerebri substantiam suo pondere gravans, somnolentiam talem, qualis in historia hic describitur, inducit, quæ græcè *Leptogio* dicitur.

Causa hujus morbi *procatartica*, est ingluvies & ebrietas, cui nuper æger indulgens, magnam pituitosorum humorum copiam in toto corpore collegit, quæ pro antecedente ejus causa est habenda. Eaque in corpore putredinem concipiens, ac in corde vehementius incallescens, & deinde per totum corpus, ac præcipue in cerebrum delata, illudque suo pondere premeis & gravans, continens hujus morbi, & symptomatum omnium, est causa.

Nam sanguis pituitosus in venis putrescens, & in quales partes habens, cum cordis repetito novam incensam causam suppedit, illudque in totum corpus per arterias se diffundit, hinc oritur *febris continua*; quæ calore iusto majore, pulsu celeri & inaequali, sese prodit. Magna vero illius pituitosi sanguinis portio, in cerebri substantiam & meningum poros delata induxit, primum *Capitis gravitatem*, eaque ibi acuta, cerebri molem ita oneravit, ut spiritus animales, qui in ventriculis

exidunt illud satis attollere, ventriculosque & nervos subjectos sufficienter distendere nequientes, *somnolentiam magnam*, & postea etiam *soporem tantum pepererunt*, ex quo vix ullis clamoribus & corporis vellicationibus, spiritus in cerebro dilatantibus, excitari æger possit & si aliquantum exasperatus, recte nomen audire, oculos satis aperire, & opportuna loqui nequeat, ac proinde inconditum & inconveniens murmur edat, matulæque exhibitæ obliviscatur, mox in somnum, ob cerebri gravitatem relabatur, & inter dormiendam urinam ob nervum qui vesicam per influentes spiritus claudit, affectum, inferius in lectum effundat.

Sub vesperam ingreſcit quotidie febris; quia materia morbilica, in cerebro existens, quotidie sub id tempus, propter peculiare suum temperamentum, tam matura evadit, ut in venas sese per rarefactionem effundens, ad cor deferatur; ibique calorem cordis, & deinde totius corporis, præter naturam augeat.

Nec est quod miremur, pituitum putrescentem posse febrem, & hic delirium aliquod, hic excitari: nam etiam lactuca & granen, aliæque similia frigida per putredinem sæpè incallescunt, cum se. per eam insensibilium particularium pori ita disponuntur, ut æther, in his copiosior existens, & sese vehementius movens calorem sive varium & vehementem insensibilium partium motum, in illis producat.

Hic affectus celeriter, nisi celerrime ei occurratur, occidere solet; ideoque ocissime illi *medela* adhibenda.

Eaque consistat in causæ antecedentis & continens ablatione, & intemperii cerebri per contraria correctione.

Primo itaque educatur sanguis per phlebotomiam e brachio ad uncias octo.

Et Deinde mox injiciatur hic clyster.

℞. Rad. altheæ unc. ij. Herb. malvæ, bismalvæ, parietariæ, betæ, mercurialis an. m. j. flor. camomill. meliloti ana m. f. fursuris macris p. ij. Decoq. in aq. comm. ad lib. i. in qua dissolve elect. Diaphanici, diacatholici ana dragm. vj. mellis rosat. unc. f. olei camomill. unc. j. f. salis dragm. j. misce. F. clyster, mox injiciendus.

Postea hoc utatur oxyrhodino leviter repellente.

℞. Aq. rosar. camomillor. ana unc. ij. f. ol. ros. cei unc. j. f. camomill. unc. f. acet. optimi dragm. vj. M. F. Oxyrhodinum, tepidè cum panis capiti adhibendum.

Deinceps ad ea remedia deveniendum quæ ægrum excitare possunt: qualia sunt frictiones alperæ dorsi & artuum, vinculaque iis injecta, ac frequentius soluta, tractio pitiorum.

Præterea hoc usurpetur apozema.

℞. Rad. cichorii, polypod. q. ana unc. j. fennicui, petroselin. asp. ragi ana ʒvj. Herb. betonice, melissæ, hyssopi. capilli veneris ana m. j. Fior. anthos, strachados, camomill. ana. p. j. Sem. anis, fenniculi ana ʒv. Decoq. in aq. comm. ad lib. j. ʒ. addendo sub finem decoct. fol. senæ unc. ij. Jalappæ unc. f. colaturæ adde syr. de hyssopo unc. ij. aq. cinnamomi unc. j. f. apozema; de quo sumat quotidie uncias quatuor, semel, vel indies; pro ratione operationis.

Et adhibeatur tale vesicatorium, post cucurbitas humeris, dorso, & naribus adhibitas

℞. Pulv. cantharid. ʒj. euphorbii ʒss. piperis



peris gr. vj. fermenti acid. unc. ʒ. aceti q. s. F. Vesicatorium, collo circa nucham adhibendum.

Circa tertium diem praescribatur hoc linimentum.

℞. Unguenti alabastrini unc. s. Olei liliorum dragm. iij. de castoreo dragm. ij. M. F. Linimentum; quo caput cum panis adhibitis illinatur.

Sumatque hunc bolum; ℞. Theriacæ Androm. ʒiv. Castorei in oxymelite sol. gr. v. M. F. Bolus, lex horis ante partum exhibendus.

Tandem, ubi vis morbi & febris jam plusculum erit superata, cerebrum t. li medicamento erit corroborandum.

℞. Consev. n. lavendulae, salviae, anthos, betonica ana. ʒʒ. Calami aromatici condit. Nucis moschatae condit. ana. ʒij. Spec. aromatici rosati, diambrae ana. ʒij. Theriacæ ʒj. cum syr. de itachade q. s. F. Electuarium de quo summat castaneæ quantitatem, bis in die.

In viciis ratione aer sit moderate calidus, & castoreo, pulegio, hyssopo, Origano, & aliis similibus alteratus; Cibus, ubi malum nonnihil remiserit, sit paucus, calidus, ad concoquendum & ad distribuendum facilis; uti sunt pulli gallinacei, capri, gallinae. Alimenta quoque poterunt condiri salvia, thymo, roremarino, majorana. Potus sit aqua mulsæ, à vino abstineat usque ad declinationem morbi. Exercitii loco sint frictiones validæ, unctiones curriculo factæ. A nimio somno arceatur æger, & tantum dormiat, quantum saltem viribus conservandis sufficiat. Et qui præ oblivione aut stupidi- tate excrementa alvi & vesicæ deponere negligit, idcirco de excretionibus est admonendus; curandumque ut vel sponte, vel arte alvum quotidie deponat. *Henric. Regius apud Theodor. Craanen medication. lib. i.*

### Observationes.

#### Pro comate seu subeth puerorum.

Puer quidam 5. annos natus, crassius & obesus, subito incidit in comatosum affectum, cui convulsionibus interdum superveniebant. Vocatus statim præscribo clysterem ex hiera diaphenicone & aqua benedicta; quo multum purgatus est. Rejecto clystere, exhibeo salis vitrioli ʒʒ. & provocato cum penna vomitu, multam pituitam excrevit, paucis post horis liberatus est. *Lazarus Riverius Observ. 28. cent. 4.*

Puella quædam 8. annorum comate detinebatur cum convulsionibus frequentibus, cui medici multa remedia adhibuerunt, clysteres, frictiones, cucurbitulas, vesicatoria, sternutatoria, & similia, ego vitrioli albi ʒj. cum jusculo exhibui, & vomitu excitato ilico liberata est.

Filius cujusdam hortulani 5. vel 6. annos natus, eodem affectu cum convulsionibus detinebatur, cui exhibui aq. bened. Rutandi ʒʒ. unde supra & infra purgatus est, & ab affectu liberatus. *Samuel Formannus Observ. 11.*

Sacerdotem juvenem robustum comate vivi correptum a recidiva febris, clystere, cæterisque cum colocynthidis ʒij. melle ros. ʒij. & lacte melle efficaci mendo, prævotus 7. venerantia impetavit, quibus parum proacientibus, à occipitis inunctionem ventum; à qua melius habuit. *Joan. Rhodius Oiserv. 36. cent. 1.*

Commune est omni us Cathaphoris remedium aceti acetrini pertusio super laminam ferream ignitam, qui multos lunos acres excitat, qui naribus attracti cerebrum excecant, somnumque expellunt, efficacius erit, si addatur semen nigella, vel ruta, aut castoreum. *Gust. Rondeletius Præst. lib. 1. cap. 9.*

Qui in somnum profundissimum cadebat, pro apoplectico false habebatur; hunc autem difficulter ligaturis fortibus ac vinculis injectis, ac demum lotus, cum frictionibus excitare potuimus. Sed injecto aceti clistere cum multis molestiis & vellitationibus excitatus est, frigidum & humidum habebat cerebrum pituita repletum. Post exhibitum Oxymel scyllinum & syrupum de itachade, has pilulas commode devoravit.

℞. Pil. Coch. ʒij. cum syr. de itachade F. pilulæ v. quibus alvus egregie turbata est, deum adhibita theriacha ad ʒj. vigil factus est & à somno excitatus ad mentem rediit. *Petrus Forestus Observat. 33. libro decimo de cerebri morbis.*

#### De Comate somnolento ex vini nimio usu.

Sacerdos quidam si apud convivas paulo largius vinum hausisset, comate soporifero detinebatur, adeo ut neque tympanis valde sonantibus, nec quovis horribili strepitu aut sonitu, vel exclamationibus à somno expergisceretur: mo in mensâ sedens, somnuculosus, stupidus, & immotus manebat: & si annuli a digitis detraherentur, & modo in hanc, modo in anampartem propulsus, & si in domum ab aliis tenebatur, nullo modo excitabatur. Hunc viro ego apoplexiam, aut aliud gravius malum ob hoc accedens præcavi: nec me fecellit prognosticum, postea enim ab apoplexia extinctus est. Alios etiam novi, qui ubi largiter potassent, ilico coma soporiferum incurrebant. *Petrus Forestus schol. Oiserv. 34. lib. 10.*

#### Dormitio puella quasi Lucumorianæ.

Lucumoria gentis hyematio, inter mucum & ni. es a 27. Novembr. ad usque 24. Aprilis extensa, jam tum vero in ipso Illustr. Baronis Flexhersteno (relata saltem referente) p. 90. expresse pro fabula habita, nec aliter ante quadriennium à magni Moschoviae Imperatoris ad Serenissimum nostrum leg. to altissima, planius autem nuper quoque ab Excellentiss. Dom. D. Pech. in cap. 6. de aeris & alimenti defectu deducta; nihilominus in memoriam nobis revocavit consoleretere, quoniam brevioris periodi exemplum; superioribus annis in quodam territorio huius pago notatum, relatu forsitan laud indigam



gnum. Puella præter propter octennis (cui pro more domi durus pater, qui iniusta noverca) pugnis prius probe dedolata mittebatur ad merendam patri bibulco deferendam; esuriens parem adoritur, pauloque post semesum videns, verbera denuo verita, proximum nenuculum ingreditur, & prona concidens inter lacrymas atque suspiria, facie musco undique merita obdormifert. Desiderata, qualita tandem properdita habita est usque ad diem septimum, quo quidam ejusdem pagi pueri eo venire, pediculis aviculis autumnali tum tempore paratari. Vident ex arbusculo quodam dependens subrepentis puella peplum, noscuntque: paulo ulterius progressi ipsam inveniunt pronam cum panis ad latus frusto, mortuamque rati parentibus nunciant: accurrunt isti, & in pagi proximam domum, ubi cum affini forte fortuna aderamus, deportant. Artus omnes adhuc molles, flexilesque, respiratio vero ad sensum nulla, facies glutinosa pituita, musco deciduisque solis inter, extra totaliter obducta, os, naresque undique musco crassissimo oppleta. Corpus nihilominus frictionibus & fornacis ope post humo caleneri, vel tamen illud mucosissimum calida removeri, & viscidum in ore, naribusque coagulum eximi curavimus; hinc spiritus vini cochlear, quia aliud ad manum non erat, infudimus, qui descendere videbatur; repetitionem ejus suspirium sequebatur post tertium cochlear aperiebat oculos, per horas tamen aliquot adhuc intar attonitæ jacebat, donec relictis paulo magis viribus, supra memorata, & quod lacrymis superindormierit, referret, amplius non orat. Hanc ita pridem adhuc vixit, sed in actionibus animabus obrutior, seu hinc, seu parentum intar, aut per utrumque.

Addimus autem huic consimilem observationem ex alio tamen capite. Puer septem vel octo annorum variolis hic grauantibus aliquando corripiebatur, cumque eruptio jam instaret, impotentissimo cochlearia duo vel plene tria haud mediocriter, de *sympo papav.* (fort. nex in maturissimis parato) vicinæ suavis deicit mater. Indormivit brevi post ille, ore plerumque hante, calore tolerabili satis pulsusque pro morbiratione sat constanter. Potum interea & iurulentum tandem etiam medicamenta liquida (cum per rentes continuatione somnolentia perterriti me vocassent) lente deglutiebat; cetera inclamantes, palpebrasve diducientes hanc advertens, nec manu voce signum perceptionis reddens. Jacuit ita fere per quintiduum, ubi suppuratarum forsani variolarum ardore superatus sensum ad se, & actionum animalium munia redire cepit, brevi post integræ valetudini restitutus, citra residua cuiusdam stupiditatis notam. De cetero, si cum iudicio, debita proportionem & Bezoarticorum consociatione sit, equidem non est de nihilo, sed presentanei plane subsidii opiatorum sub tempore eruptionis (ab inquietudine Patientis, inter nimiam confusamque sanguinis effervescentiam impedita) accessus; admodum tamen accessus, ad decimam, octavam, sextam, quartamve dosis Tincturæ vel Pulveris anodynæ (pro ætatis ratione,) partem semper si pote, alexipharmacis temperatam: cucurbitæ parili ratione sub ipsa talium aliarum-

que malignarum (cum vomitu profluviisque) invasionem plus proficitur una vice, quam sistendum, roborantiumque (in se fermentante acrimonia magis irritantium) mixturarum, juleporum &c. congiis. Nostro vero huic dormitatori, circa tertium vocati, bis tantum *Tind. Bezoartica ammoniacalem*, guttis aliquot *Ess. caloris* sociatam, & in potu *spir. salis* & muria spontaneè inspissata subtiliorem dedimus, sicque successivè se recollegit.

Dubitamus autem num referre huc liceat, cum incideret, ridiculam variolarum aliquando in Nigritis, nec diligentissimo in his *I. Bonnis*, nec aliis, [quod recordemur] itinerariis, diariisque notatam; quam vir probe hic notus, bonæ fidei & à nugis perquam alienus, presente non uno Serenissimi Regiminis Consiliario, magna contestatione, causamque simul rogans, inter alia Orientalia recensuit. *In Java Nova Bantavia*, ubi tum mancipiis quoque plurimis dives vixerat, variolæ ab Europæorum, in fallimur, novellis quibusdam etiam ad Æthiopes ibi pervenerunt, perireque ipsi quoque hujusmodi fervorem haud pauci. Conterranei eorum accurrentes quærivere, cur morbo haud tanti momenti obierint? ille, sibi hoc longè esse perniciosius; de cætero nil fecisse reliqui; medicamentorum satis oblaturum. Petierunt hi, ut si denuo e sociis quispian corripere, notum faceret. Invasit affectus postero die duos; quos in ipso febrili fervore sublatis in proximum Civitatem profluentem mersere. Secundo lacticiunium oxygalæ nostrati conforme. Tertio acetarium & cucumeribus, quasi nostro more paratum, utrumque liberalius assumere adegerunt. Quarto imminuentis eruptionis die denuo in profluente merfos stragulis suis, uti semper, reposuerunt faciem morbi decursu passos, brevique cum subsequiis omnibus ea methodo, (quam cuius quoque ac puerperæ in Africa ac Asia ex parte sequuntur.) restitutos: saltem quod ob persistentia subalidaque variolarum vestigia reliquis immunibus (æquè ac ejusdem Æthiopissa, per totum corporis latus fervida perflua, post sanationem quasi dividua) aliquamdiu fuerint deridiculo. Interea rebus sic stantibus, causam rogati, putavimus forsani nimis diaphoreticis ad nostrorum tractuum normam, sub eo climate, eoque Nigritarum temperamento, hac conditione adhibitis, sanguinis, inconditum fervorem (quem misera mancipia moderata ibi attemperatione intus ac extus, ad faciliorem secretionem vel nostratum fermentantium liquorum semi exemplo sic interea disposuerunt) fuisse eò magis exaltatum, ut mors anticipando quasi facile supervenire potuerit: æquè ac complures fortasse pulsiones terræ cedunt nimia illa cubiculorum exastuatione, potus denegatione vel calefactione, expulsivorum anticipatione, multitudine, inordinatione refectionum, juleporum, aquarum perlatarum, &c. ingurgitatione &c. qui ceteris paribus, vel rusticorum exemplo, dulciori, consideratiorique medicatione forsani servari potuissent, ante eruptionem sc. nil aut parum saltem per absorbentia bezoartica fixiora, (in malignitas, vomitus, diarrhææ subtilius cum anodynæ tantillo exegerint) mo-



vendo; expulsionem postmodum volatilibus (solitariis, aut dicto modo exaltatis) semel aut bis, hinc fixioribus denuò adjuvando, circa nonum vel undecimum novas interdum exacerbationes accisa *tinct. bezoartica*, mixtura simpl. dosi, moderatioribusve infringendo, vel quum per vulgarissima præcipitantia (mixto interea potui spiritu salis subtiliori, clisso &c. transigendo, non neglecto post recollectionem laxativo. *Daniel. Ludovici.*

*Comatis curatio.*

Illustriss. Domin. Coniecpolsky ob crebram capitis lotionem in soporem incidit, memoria fere omni abolita, ad interrogata apertis oculis respondebat: ita, ita Domine. sed ad rem nihil, cibo porrecto, quærebat quid esset, quid faciendum: inditum ori deglutiebat, moxque rursus dormiebat, febre carebat, qua ante aliquot septimanas laboraverat. Duraverat hoc symptoma 2. tantum dies; clystere enim injecto ex emollientibus, tandem purgante ex infus. sol. Senæ, & Agar. cum manna exhibitio, disparuit. Non multo post lequuntur sunt destillationes gravissimæ, primò ad fauces, deinde ad aures, tandem ad oculos, ut lumen aspicere non posset.

*Coma somnolentum variis stipatum symptomatis.*

Honoratus Civis, *Joachimus Currius* annorum circiter quadraginta cacochymicus, scorbuticus, & sedentariæ vitæ assuetus jam ante triennium in somnos cœpit esse propensior, adeò ut sæpe inter prandendum, cœnandumque sæpe inter colloquia obdormisceret, non sedens tantum, sed & cum stans in fulcrum se aliquod inclinaret, cœtera sanus & polyphagus, & a febre immunis. Duravit illa narcosis, quanvis antiscorbuticis oppugnata, ægro diætæ leges minus sollicitè custodiente, donec ante hos sex menses pertinacior comitem sibi adjungeret hydroperem. Venter enim adinstat ligni induruit, intumuitque scrotum aquis & flatu distentum, urina parca, crura rigida, anipla, hinc inde livida, & à digiti pressu fortiori in vallecule constantes subsidentia. Evocatus in auxilium chirurgus catharticis, emplastris, & nescio quibus aliis hydropicum tumorem aggrediens eo tandem neglecto comate, rem deduxit, ut detumesceret scrotum [quod in primis tristitia minabatur] atque æger in spem sanitatis erigeretur, abdomine licet adhuc tenso & pedibus tumidis. Verum non diu tenuit illa lætitia. Quò enim plus induciarum spondebat mitigatus hydrops, hoc sæpius paulatim coma incubuit, & ægrum; præcipuè verò uxorem ejus ad desperationem sanitatis conclamata plenissimè addegit. Tandem accersitus ego hominem video statum Mercuriali similem, qui vix. clamore subinde expectatus statim oculos iterum clausit, non modo obdormiscens, sed & stertore & rhonchis spiritum meantem inquietans. Aderat & is in vultu, & præsertim in labris livor, ut nullius suspensi facies aut labella saturatori cæruleo colorentur. Instigatus agitatione, clamore, apoplecticis liquoribus verba subinde aliquot pronunciavit, sed illa tertiatæ & male

coherentia, mox iterum in rhonchos & interceptam quandoque respirationem declinans brachius, & si sæpe attolleret, statim collabescens. Suasilem mox (præter analeptica) emeticum, sed metu calumniarum, ne secundum illud Celli, quem non hoc modo servasilem, occidisse videret, abstinui, & prognostico præmissis, recentissimum sal. armon. urinam redolentis spiritum naribus ægri sæpe admovi, quo ille expectectior momento iterum cum Didone fluca.

*Quasivis oculis lucem, ingemisque reperta.*

Nihilominus crebro spiritus ejus admotu id effectum, ut ad pharnax os ubinde aperiret; quo vilo ingeri, jussu vinum liliorum convallium sale volatili succini, & spiritu salis armoniacæ aromatico prægnans, non quidem nullo successu, sed initio perexiguo, quod conclamata viderentur omnia, pulsu vix dum observabili, id quod & missionem Linguinis aliquot profuturam retardavit. Ventum ergo & ad spiritus Cephalicos, salvia, lavendula, rosmarini, cerasorum nigrorum, salem volatilem unguis alciis, & quæ alia usus in hoc affectu solet commendare, cumque his præmissis, sequentibus diebus paulo excitatior æger paulatim clysteres admitteret, & cathartica, plurimum quidem sæcum exclusum est, sed caput adhuc oblitipum & germano Endymioni conveniens perduravit. Observatum mihi interea, quoties æger incumberet lecto supinus (quæ sola illi dormiendi consuetudo) anhelum fuisse paulo libertiorem, & labra minus livida, quin & rhonchos placidiore, quoties autem sedili insidens à famulis contineretur metu lapsus omnia symptomata visa graviora, unde conjiciens obliteri cerebrum circa sagittalem futuram aqua quadam narcotica, quæ sedentem erectiori capite magis aggravaret, jacente autem, pondus ex declivi litu immineeret, in occipite mox cauterio viam noxio humori exitum aperiri jussi, & crasso ad sagittalem capillitio cucurbitas ex vitro amplas sine scarificatione caluz sæpius affigi. Propinata interim frequenter tinctura soliorum tabaci cum volatili urinx & fuliginis sale, suppositisque linguæ rotulis ex oleis rosmarinari, salvia, succini, extracto castorei & aliis, cò præter expectationem post dies viginti rem vidi redactam, ut æger postea mane ad negotia sua confurgeret, domo egrederetur, cum amicis luderet frivolis, & libro rationum suarum vigil quotidie assideret, nec quicquam omitteret eorum quæ negotiationes domesticæ requirunt. Neque tamen ea felicitas diu duravit, cum plus cibariorum, plus potionum quotidie efflagitaret, quam stomachus, & vita sedentaria paterentur. Accessit anplitudo illa & durities abdominis, accessit crurum tumor hydropicus, quæ mala, cum diætæ custodiam non adhiberet exquisitiorem, satum accelerarunt. *Olaus Borrichius.*

*Lethargus ab erisypelate.*

Honestissima Matrona Deruda Finckia, Vidua



dua beati Dn. Joan. Brochmanni, Matertera nostra, annos nata 67. erysipelate pedis per hyemem totam vexata, vere primo 1671. disparente illo tumore convaluisset existimabatur. Sed uè falsus esset Hippocrates sect. 6. aphor. 25. peiora mala in procinctu erant. Supervenit enim lethargus, obmutuitque optima Matrona, benigne omnes affari solita, compos tamen mentis evigilans subinde, signa pietatis dedit. Omnia cum D. Jano Loffio tentavimus nihil profecimus. Septimo enim die expiravit placidissime, trille suis amicis deliderium retelinquens. Semper tamen pulsus validus permansit, & celer, secus quam in *Casca* 138. Com prodidit, quia in nostra beata sanguis humoresque calidi vigeant in arteriis, & translati fuerant ad cerebri vasa. Unde tentata venesectione etiam in extremis. Caterum sanguinem laudabilem promptè fluentem dedit vena, non vitam. *Thome Bariboli.*

#### *Veternus ex Laudano opiato.*

Medicus quidam peregrè veniens Ratisbonam, duobus hic ægrotantibus, quorum alter plebeius doloribus arthriticis magnis infestabatur, alter Nobilis Ungarus juvenis febre ardente & vigiliis nimis afflictus, opium vel laudanum opiatum in inusitata dosi porrexerat, inaeambo veterino obruti, & simul lethi poculo obierunt *Helvigius.*

Quam salutare pharmacum est Opium cum prudentia usurpatum: tam noxium & instar gladii in manu turibundi periculosum evadit, ab imperito propinatum, tragicis hoc exemplis plurimis attestantibus; quæ inter orthopneam lethalem ab exhibitio opio in quartana a circumforaneo, nullâ præviâ evacuatione, describit *Frider. Loffius* lib. 2. *Observ.* 12. Quæ occasione in Pseudo medicos, oppidatim & per pagos oberrantes, unam omnium morborum medelam, veluti Panaceam venundantes, ac vulgo credito obrudentes unâ invehitur. Rationalis sane medicus abunde habet, quod prospiciat, si salutarem opii effectum obtinere velit: quam periculosa itaque evadet ipsius exhibitio, empirici (si epitheto hoc ad nostri ævi medicos, omni *curia* destitutos, abuti liceat, cum ab antiquis illis, multis parafangis scientiâ & dignitate differant; de quo præ aliis, videndus *Joan. Freitagius* Noct. medic. cap. 4.) in manus si incidat, qui neque morborum naturam causasque ritè dignoscere, multo minus ex fundamento curare didicit. Talem Panaceam, solaris epitheto superbientem, ab aliis etiam jam memoratam, pilularum sub schemate vidit non ita dudum urbs nostra, quæ muliebri dispensatæ manû, quid commodi, damne ubique attulerint, equidem me latet; hoc tamen compertum habeo, puellæ in pleuritidis initio, liberali satis manu, necessariis aliis neglectis, exhibitas, mortem accelerasse. Non quidem is sum, qui cuncta empiricorum remedia velim rejicere, cum sæpius olitor quoque fuerit opportune locutus, nec à Plebeis, si quid ad curandi opportunitatem conferre videatur, sciscitari, ex Hippocratis præcepto lib. de Præcept. quenquam pigere debeat. Ast Panaceas illas proclamare velle,

alia vero necessaria negligere, aut etiam Medicis magnam propterea in cæteris etiam quibuscumque partibus, ad medicinam quæ pertinent, & nescio quam insulam scientiam tribuere, eosdemque genuinis Medicis præferre, nemo prudens facile præsumat. Omnes equidem Medendi artem quæ profitentur, nomen ipsum facit medicos, ast illi demum veri dicendi sunt, qui Physica, Anatomica, & cætera artis fundamenta edocti, (non incertis ac cæcis quibusdam experimentis aut merâ temeritate ducti) cum ratione medentur; quo intuitu, ut in lege Hippocrates loquitur, *Medici nomine quidem multi, reipsa pauci.* Sed hæc jam transeant. Quod verò Laudanum duos Observationis hujus ægrotantes lethali veterino obruerit, in dosin inusitatam, Auctori nostro libuit causam referre nec immerito. Opium enim validum est medicamentum, parvâ in mole magnas exserens vires, adeoque debito ejus si excedatur in prævio, periculi plenum. Somnum alias provocando, spirituum orgasmum demulcendo, ichorum acrimoniam temperando, eorumque effervescentiam coercendo, Nectar est & Ambrosia, sicque ipsis in febribus ardentibus, doloribusque arthriticis auxiliares præstare valet manus, nimium tamen si ingeratur, æternum somnum atque inevitabilem *anæsthesiam* accelerat. Sed plura de hoc proferre supersedeo, cum quidquid adduci in medium queat; omne à Collega & amico meo honoratissimo D. D. Georg. Wolsf. Wedelio in elegantissima sua opiologia curiose propositum ac sufficienter enucleatum fuerit.

#### *Coma Vigil.*

Mercator quidam Misnicus cum convivore suo rusibat, ut Julos sambuci verno tempore pro medicina colligeret: ambo domum reversi Julos illos sambuci crudos non coctos cum aceto & oleo sanitatis ergo comedebant, alter innoxie deliciis citis fruebatur; alter vero de quo sermo nobis est, vel quadragies alvum inde dejecerat: sequenti tamen die nihil mali amplius sensit, nisi quod debilis admodum esset, postera vero luce, utpote ipsâ die dominica, cum templum, ut lacris interesset, adire vellet, in via comatosus concidit, in diversorium ergo cum deportatus esset, ego vocor, inveni ipsum in lecto jacentem, & clausis oculis somnum quidem referentem, vigilans tamen, loquebatur enim sed delira: præscripsi quæ ex methodi lege necessaria, & salutaria videbantur. Deoque benedicente, sanitati restitutus fuit. Hoc saltem eruditus judicandum hic relinquo, an coma hoc ex crebris illis alui dejectionibus, an ex sambuci Julis crudis non coctis obortum fuerit, siquidem teneri isti Sambuci furculi vi narcotica non destituuntur, crudi scilicet, non cocti, coctione enim illa vis narcotica perit. *Caspari Kolichen Physici Hafn.*

Vir egregius 40. circiter annos natus, & propter intemperantiam perditâ valetudine, cum medicamentis, nescio quibus, ab empirico præscriptis uti cœpisset, in *carum* incidit; fortè quia materies morbifica à *Pharmaco* com-



mota & agitata, in *cerebrum* irruerat. Hunc die secundum insens, sopore profundo sepultum, ac tere insensibilem reperi, nam licet à punctione, aut vellicatione acriori oculos aperiret, & membra moveret, mox tamen iterum dormitans, eorum quæ agebat, aut patiebatur, nihil prorsus percepit. In hoc casu trille licet prognosticon denunciâns, operam utcumque medicam navare non desistebam; à Phlebotomia propter vires attritas & sanguinem depauperatum, abstinens, Vescicatorium amplum cervici mox applicandum, & enema acrius ex decocto radicum bryoniz, cum floribus & seminibus carminativis, additis insuper specierum hiez § ij. quamprimum injiciendum curavi: tempora & nares balsamis illinebantur. Cataplasmata ex ruta, rad. bryoniz totis pedibus admovebantur. Insuper horis alternis aut tertiis, dosim sp. C. C. cum julpio cephalico propinabam; quin & plures aliz administrationes, in hoc casu usitatæ, sedulo adhibebantur. Quibus tamen cum morbus non omnino cederet, die sequenti catharticum ex scammonio preparato, in cochleari jusculi sumendum præscripsi; à quo, cum sæpe & copiose dejectum, oculos aperire, loqui, & astantes cognoscere cœpit, & paulo postea ad se rediens plenè evigilabat. Hic morbus ideo (ut opinor) facilius & præter spem cito curabatur, quoniam nubes ista forsitan à Pharmaco in cerebrum immissa illinc alterius pharmaci ope melius deduci potuit.

Vir illustis quinquagenarius, corporis obesi, & olim vertigini atque affectibus althynaticis obnoxius, per duos annos Pharmacia vernâ, & autumnali usus, & juxta Homoplatam utranque, fontanellâ amplâ instructus, sanus admodum vixerat, incunte ætate, cum ruri degeret, & fontanellis per plures hebdomadas neglectis recrementa evacuati solita longe minus fluebant, usque tamen bene valuit, donec circa solstitium, cum quodam mane in porticu sederet, & cum amicis alacriter colloqueretur, derepente surgens se male habere querellus est, ædes ingressus, cathedrâ insidens, plurimum evomuit, dein mox reclinatus, in soporem profundum incidit, eoque ita obrutus jacuit, ut totâ illâ die excitari vix posset. Vespero adveniens Phlebotomiam, clysterem, vescicatoria, & multa alia remedia in tali casu appropriata, sedulo administranda curabam. Poltridie cerebrum paulo inclarescere cœpit, ita ut circum spiceret, & pauca verba eloqueretur: amicos cognoscere visus; nullus nomen efferre potuit. Attamen ob materiam hanc altius in cerebro subsidentem totius lateris dextri paralysis exorta est. Porro adhuc cum *Somnolentia* ingens persisteret isto die sanguis ex altero brachio mittebatur; remediis etiam aliis, ut prius, continuatis, die tertio, minus torpidus plurimos cognoscere, quorundam nomina proferre, agritudinem suam percipere, & de remediis sollicitus esse cœpit. At vero dum cerebrum melius haberet, labes cerebello, & nervoso generi inflicta, se prodebat; nam die quarto respiratio inæqualis, & magis laboriosa, pulsus debilior evasit; porro totius corporis rigore, & concussione convulsivâ spasmî, & convulsiones atrociores factæ crebrius infestabant,

dein pulsû sensim diminuto, die sexto torpore licet magis immunis, interibat. In hoc casu, aliisque similibus probabile est, materiam morbinicam una cerebrum ac cerebellum invadere: verum hujus (contra quàm, in cerebro accidit) dum in cortice hæret, noxam haud valde sensibilem inferre, quondam hic quæ læduntur, nec somni, nec memoriæ sedes sunt: sed postea, die forsitan quarto, aut quinto, materia deinceps ad cerebelli medullulas subsidente, dum quoad alia ægrotans melius se haberet, functio vitalis, ob spiritus et destitutos, in ipso fonte oppressos, latiscere incipit, & mox subito declinans, salutis spem, antea affulgere visam, inopinatò omnem intercipit. *Thom. Willis, de morbis cerebri.*

Generosus quidam, temperamentis sanguinei, & dum juvenis esset, ingenii acris, & callidi, postea ætate in senium vergente, otio & ebrietati deditus, hebes, & torpidus; ac insuper cum magno aqualiculo, cumque femorum & crurum intumescens, hydropicus evasit: Verum ab his morbis (in quos frequenter incidit) si quando ad tempus aliquod à potulis abstineret, & pharmacia iuumberet; & cito, & sæpe convalebat. Tandem vero hydropice licet immunis, *Somnolentia* ita gravi, & sere perpetua oppressus est, ut quocumque in loco, & inter quodvis ægendum dormitaret, deinde à servis aut amicis expectatus, satis animo constare, & per horæ minuta quædam, de rebus propositis satis recte discurrere solebat, mox denuo in torporem prolapsus. Huic post varia medicamenta, sere in casum, tentata, præscripsi denum ut omni mane & vesperi sumeret pulveris folior. betonicæ solæ ællivo siccat. & in vitro asservat. cochl. in haustulo aq. stillatitiz & floribus lavendulæ. Quo remedio intra paucos dies levamen recipiens, mensis spatio perfectè curatus est, per quatuor deinceps annos integrâ valetudine fruens. Postea cum ob malam victus rationem eadem mala redirent, remedium idem etiam non tanto cum successu repetebat; quin præterea cum medicamentis aliis etiam opus iuvenit, interdum spir. C. C. aut fuliginis cum julpio appropriato; quandoque electuariis ex conservis, & pulveribus cephalicis; addito nonnunquam chalybe sumebat. Quoties solito bibendi genio indulgere veller, loco vini aut cervisiz, liquorem Cossæ potabat; cæterum pro potu ordinario, modo Allam cum foliis cochleariz, salviz, & aromatis infusus, modo decoctum ex lignis, aromatis, & herbis cephalicis medicum habuit: per plures deinceps annos sere semper intemperatus & cachecticus lethargo tamen immunis vixit, tandem cachexiâ pectus inundante, à tussi cum althynate sentim labetactatus interiit. *Thom. Willis de morbis cerebri.*

Colonus annuæ ætatis agens circiter trigessimum, temperamenti pituitosi ad sanguineum vergentis, crebris cephalalgis diu obnoxius, sub initium hyemis *Somnolentus* admodum, & torpidus evasit; dein quodam die, dum agros aratro subigeret, humi distumbens, in somnum profundum incidit, cumque à servo aliisque accessit excitari non poterat, domum perlatus lecto committitur, amicis interim expe-



expectantibus, ut somno tandem finito sponte expergiscatur: Post elapsam nycthemori spatium cum vellicando, pungendo, obstrependo, aliisque modis eum excitare nequirent, me accerunt, adveniens vesicatorium amplum, mox toti cervici posteriori applicabam, dein sanguine ad § xvi. detracto enema acre injiciendum curavi, tempora, & faciem oleo succini illini, frictiones, & ligaturas dolorificas cruribus adhiberi: insuper spiritus fuliginis, cum julapio cephalico. sæpius in die propinandum præscripsi; nihilominus toto isto die sine omni sensu stupidus jacuit; si à vellicatione acriori irritatus se paulum erigeret, & oculos aperiret, mox reclinans, colque claudens, veterno iterum indulgebat. Circa vesperum cucurbitulas cum multa flamma scapulis applicandas curavi, quo facto nonnihil expergeneri cœpit; cumque circa illud tempus alvus copiose dejecerit, & plurimum feri emplastris ademptis e veliculis efflueret, exinde salutis magna spes affulsit. Itaque remediis crebra vice post illam noctem adhibitis, mane sequenti vigilans an icos dignoscebat, & interrogatis apte respondebat nondum vero nubes tota evanescerebat, quippe somnolentus & obliviosus per plures dies perstitit, donec bis purgatus tandem perfectè convaluit.

Calus hic lethargi ita propriè dicti typum exacte refert, ubi pro morbi causa conjuncta adsunt feri copiosi circa cerebri ambitum aggestio, ac deinde in gyros ejus irruptio: cumque à tempestivo remedium usui materiz novæ affluxus impediretur, quæque parti infederat, partim in sanguinem retorberetur, partimque in effluvia & vapores refracta discuteretur morbi curatio cita & integrè successit.

Hortulanus Oxoniensis, febre putridâ laborans, & circa n. orbi <sup>oculo</sup> loco criseos, in veterum incidens per tres aut quatuor exinde dies sopore obrutus, nullius remedii usui ita ex somno excitari poterat, ut perfectè evigilaret, tandem verò cum eraso capite per totum tere ipsius ambitum vesicatoria applicata ulcuscula plurima & copiose in nantia excitassent, expectatus aliqualem sensus usuram recuperavit; attamen memoria fere in totum abolita, adeo stupidus evasit, ut nullius nomen, aut verba recordatus, vix supra brutum saperet. Cum ad hunc modum per duos pene menses ingenii vacuus, & somni plenus mansisset, nubes paulatim dispelli cœpit; atque is demùm ad solitos labores rediens, mediocriter convaluit, eundem vero animi vigorem, & pristinam solertiam quâ ante morbum pollebat, nunquam iterum recepit. In hoc casu proponitur exemplum Lethargi febre male judicatz supervenientis, in quo materia morbifica, subita & copiosa metallasi in cerebrum exterius facta, non tantum poros, & meatus omnes paulisper impleverat, verùm & eorundem conformationem ita læserat, ut spiritus aliquandiu exclusi, & demùm immunes facti, nonnisi multo post tempore, orbitas, & tractus suos priores, & solitos recuperarent.

Lethargi autem ex opiatarum usu orti, Typum satis exactum meminui me olim ruri in pago observasse, in quo pernoctari coactus sum,

itinere ob cœli inclementiam interrupto: enimvero cubitum mox iturum rogat me hospes, ut in vicinia pauperis duos invisam mirandum, miserandumque in modum affectos; Quod quidem officium ut præstarem non tantum charitate, sed & curiositate inductus, ad casulam perexiguam & humilem lubens perducor, ubi patrem senem, & filiam inveni, in duobus intra eandem cellam, hic illic, lectulis, profundissimo sopore obrutos, qui pridie eos oppresserat, postquam radices hortulo tunc recens effosso erutas comedisent, pro pastinaca habitas, cum forte hyoscyami essent.

His utrisque, post vomitionem oleo & oxymelite gulæ infusis, pennâque gutturi intrusâ copiose proritatam. Tincturam castorei, ex cochleari aq. theriacalis. (quæ remedia fortè tunc penes me habui) crebra vice per totam noctem exhibendam præscripsi, insuper ut eadem tinctura tempora & nares illinantur, & si fieri posset, enema acius injiciatur; die sequenti primo senex, & postea filia evigilantes ad se redierunt, torpore penitus excusso. In hisce affectis post narcotici reliquias, nè ampliùs nocerent, per vomitum rejectas, tantum opus erat, ut per idonea medicamenta (in quo cœni castoreum contra opiatarum venena merito habetur) spiritus exsuscitati à narcosi inlicita liberarentur. *Thom. Willis. de morbis cerebri.*

#### Anatomica Inspektiones.

Hydrocephalus familiaris pueris affectus, qui non solum, ut Celsus ait, cutem inflat, id est, extra calvariam gignitur, sed etiam inter membranas cerebrum obvolventes, & sub ipsis sit, & etiam in adultis, ac quandoque in senibus, de quo author introductionis; Quod tandem, inquit, intra meningem cerebrumque incidit, insanabile est. Hoc morbi genere laboravit, cum obiit, admirabilis Princeps Clem. VIII. Pontifex Max. cujus cerebrum repertum est in aqua natans: Erat autem illius aquæ quantitas circiter libram & amplius: Hinc somnus tere inexpugnabilis. *Hieronymus Rubius ad cap. 2. lib. 4. Medic. Celsi.*

Puer 14. annorum duobus mensibus ante obitum caput casu ex alto allisit, & dolio à literarum commilitonibus rotatus fuit, postea in febrem incidit, & primum empiricorum opera usus, hunc ego vocatus fui: inveni puerum leviter febricitantem, stupidum, instar ebrii incedentem, non listentem, conquerentem de dolore capitis, absque rubore aut inflammatione postea oculis clausis obmutescerebat, dentibus stridebat, frustraneis clysteribus, cucurbitulis, aliisque remediis, & licet loquutus sit mox tamen obmutescerebat; paulo post moritur.

Aperto cadavere, inveni pulmonem dextrum, & hepar accrevisse, & ventriculum dextrum cerebri aquæ libram continuisse. Cui lethargus imprimis adscribi debere videtur. *Cristianus Observ. singular. 2. p. 9.*

*Sopor profundus à sero ad caput amandato ob vitium renum perforatorum.*

Comitissa quædam sterilis in reditû ex Ther-



mis Helveticis ; in profundum incidit soporem, adeo ut nocte tota, matutinoque tempore ad vesperam u.que somno obruta, non nisi admodum impulsu ab eo excitari potuerit, à cibo potuque abstinens ; & ubi parum excitata vigilasset, iterum obdormiscere solita : insuper & aliis accidentibus inter quæ & pedum tumor, atque inflammatio erant, oppressa tandem expiravit.

Corpore aperto abdomen pinguedine supra modum, transversæ manus spissitudine obiectum, intrinsecusque omentum, mesenterium eadem admodum referta deprehensa, uti & hepatis lienque vitiosa. Renes insuper perforati erant sicut in hydrope alcite, qui ab epate fuso & reibus oritur. Præterea in vesica felleis, quæ tota ampla, sed nigra erat, loco bilis qua destituebatur. Calculi innumeri inclusi erant, coloris cinerei & subviridis, e quibus sex magnitudinem nucis moschatae æquabant, rotundi, sed angulosi ac leves, minores vero circiter trecenti, alii pili, alii sem. coriandri, alii sem. raparum magnitudine. *Fel. Plateri Observat. lib. 3. pag. 804.*

Joh. Anton. Maginus Mathematicus celeberrimus, à morte lectus, lat magnum in vesica calculum ostendit, qui uncias xv. pependit, tot scilicet malorum causam, quæ ille in vita perpessus erat : Nam integro octennio continuo urinæ stillicidio & acrimoniâ graviter divexatus cum semper de calculo dubitaret, & omnia in destillationem humoris salii referret, doloribus tandem succubuit, superveniente febre continuâ cum Comate, quæ causa extitit, ut eum plerique apoplexia mortuum crediderint.

Ejusmodi soporem profundum doloribus à calculo ingentibus supervenientem in V. C. Joh. Jacobo a Brunn. Medico Basileensi observatum memoravit Gr. Segerus oratione de vita ejus & obitu. Multos præterea ex Iscuria 5. 6. 7. dierum comate extinctos vidit Joh. Beverovicus lib. de calculo c. 9. Velschius Epilog. observ. lxiv.

Scribit G. Clemenius Jurisconsultus de Joh. Hebenstreit Medico præclaro 1593. cum causarium diuque afflictum Calculo vesicæ obisse, cui ovi magnitudine, sectione à morte reperto, per triduum sideratio accesserit, ætatis anno 64.

Comæ ex iscuria à calculo curatum commemorat J. Beverovicus Epistola ad Gvid. Pativum scripta appendice de Calculo. *Velschii Epilogate Observ. 64.*

Marcus Prené, ex pago Ondrevillers, ultrinae ferrariæ in Audincourt Operarius, vir robustus, ann. 30. sub vesperam diei xii. Maii anni 1670. cum alio quodam ultrinae operatio litem habens, impacto in sinistra temporale gravius ictus concidit. Surgit paulo post, & prolatis aliquot verbis, Casam patris forte 4. millie distantem petit, postquam bombardam in vindictam explosurus : Uxor maritum, quominus clavis pendente arripere, colapho excipitur. Illico post super arca recumbit Marcus, & sopore profundo correptus, proxima nocte mortuus est.

Vespere diei xiii. seq. visitato cadavere, nullus tumor, nulla lividitas externe apparuit, fanies e naribus putidissima & cadaverosa efflue-

bat, & eadem lecti linthea è sinistra auris effluvio mædebant. Jubeo Chirurgum raso in circulum capillitio circumscissa communi cerebri involucri calanticæ intar semovere : hoc tacto, similiter musculus temporalis ruber, lividus & confusus apparuit, nulla ruptura vel contra fissura, serrato & remoto cranio, sanguinis circiter zñj. coagulati & nigri inventus, qui lateralem ossis iphenoidis sinistri cavitatem ita adimplebat, ut ab ejus copia incuneata, compressa meningēs & cerebrum, adempta spirituum animalium commectus libertate, ortis unica causa judicata sit, quum nullibi in tota cerebri substantia & ventriculis quicquam inventum sit ; quod contra naturam esset. *J. Nic. Hemmingeri Cent. v. Observ. xxvii.*

Quidam grandævus gravedine capitis afficiebatur, tandem subito in cataphoram incidebat, & quidem lethiteram ; ea nec levare poterat nec liberari. Latelacto capite defuncti, reperiebatur os frontis carie contextum, & quidem aliqua tantum ex parte cerebro salvo ac ejus integumentis integris. *C. Vissler Schneideri L. de aff. cap. soporosi pag. 241.*

Sonolentia & Torpor insignis scorbuticis frequenter accidunt in quantum scilicet spiritus animales particulis vel aquosis aut narcoticis onusti ac plurimum aggravati ultra cerebrum, etiam valde obstruunt, motus pernices & expeditos non facile ineunt, neque functionum suarum actus, & exercitia diu continuant, quin succumbere, ac otio & quieti indulgere amant : Porro hujusmodi affectus quandoque à spirituum animalium defectu & penuria excitatur : etenim à sanguine plurimum vitato & quasi effuso, liquor non nisi tenuis & vigoris omnis fere expers cerebro & nervoso generi suppeditatur : à tali *obser.* in mori bundis lethargum excitatum novi, quo scilicet affecti, licet somno continuo indulgere videantur, interpellati tamen illico adstantes noscere, & entis quibusdam respondere solebant. Spirituum vero animalium copiâ fatiscere, nec diu vigilare, nec ad colloquia longiora attendere valebant. Tales demum cum somno perpetuo obrutos apertum, cerebrum satis exsiccum, ac hydrope aut colluvie serosa, quibus lethargici plerumque afficiuntur, prorsus immune deprehendi. *Thomas Willis. Tract. de Scorbuto cap. 4.*

Sodæ subethica hic jam multos interficiunt pueros, quorum e numero ante sex dies D. N. nlium, cum cum xij. die sopor citra febre rapuisset, dissecto corpulculo omnia salva repertis, tantummodo in media parte cerebri sinistri supra oculum sinistram, prope nervos opticos, sinum apoplematicis, caltanæ magnitudinis vacuum deprehendimus ( jam enim in ipsa sectione calvaria pus per vias exierat mortuo ) quem cum amplius videndum palparem, & sinisterris cerebrum eximere, erupit clara mucilaginis subtilis intar aqu. ad dimidiam usque libram quæ sub cerebro supra nervos opticos & rete mirabile delituerat. *Epilog. de G. Gasteri ad G. suum & l. 1. Rati cum Observ. 75.*

In Nosocomio Pativino 1641 caput apertum viri in osse temporum vulnerati, qui sine delirio, paralyti & pulu febrili x. die soporosis decesserat, vulnus ad cerebrum penetraverat, ubi apostema excitatum pure copio-



so abundans, vicinis partibus ad nigrorem vergentibus. *Thomas Bartholinus cent. 2. hystor. 34.*

Mulier quaedam honello loco nata, cum aliquot diebus capitis gravitate laborasset, adeo fuit somnolenta ac in somnum propensa, ut quæcumque agens dormire semper cuperet, ac assidue in somnum dilaberetur, a quo nutu excitari potuit, tandem vero accedente febre non potuit: remedia multa huic tarde adhibita, sed tandem mors supervenit.

Capitis hujus crani osse sublato, abscessus in anteriori cerebri parte repertus, & pus interiori osis cranii parti adhaerens, quod & e naribus paulo ante mortem irritatis profluxerat. *Dodonæi Observat. Medic. cap. 7.*

Luer XI. annorum Julio mense 1545. cum prius lethargo laboraret ante paucos dies, vel nupore quodam non admodum gravi; a quo cum finis factus videretur, demum in lethargum gravissimum incidit, & statim cerebri sphacellum. Videbatur autem dum profundissimo somno detineretur hemiplegia laborare, nam tota pars dextra paralyti reloluta, neque movebatur, neque sentiebat, nihil loquebatur, quamvis subinde garrere videretur mulitando, quæ nemo intelligebat, neque ullo modo caudicis instar jecens, a somno excitari poterat. Tertius dies erat ita jecens absque loquela in castello patris: Adhuc evocatus, tinnium (cum nihil aliud esset ad manus) contritum cum aceto, glandis instar cum aceto nari dextra impositus ad excitationem a somno, ut & materia crassa viscida dissolvi posset, & ad vias derivari: atque hoc adhibito remedio nonnulli reviviscere videbatur, ut oculos aperiret, & verba quædam indistincta proferret, & enare materia quædam crassa valde corrupta, sanguinolenta, viscosa instar putridæ saniei prociaret. Hæc cum viderem, puerum abscessum una cum sphacelo in parte dextra cerebri habere pronunciaui; & cerebrum corruptum esse, unde nec puerum diem supervivere posse prædixi ob materiam corruptam non solum ventriculos cerebri obstruentem, sed & totam ejus substantiam corrumpentem &c. eo quarto die ut prædixeram, defuncto, rogatus fui ut cadaver aperitem.

Crani osse sublato, cerebrum & cerebellum in parte dextra vergens ad posteriorem partem omnino laniosum, putridum, corruptum, sanguinolentum inventum est, apoplemate ex lethargo in abscessum & sphacellum permutato: sinistra verò pars cerebri album, sanum & incorruptum habebat. *Forestus libro decimo cap. 11.*

Non semper lethargus ex capitis apostemate provenit, neque omne capitis apostema lethargum inducit. Observavi enim quendam ex diuturno dolore capitis, longisq; vigiliis afflictum tandem levi delirio & convulsionibus correptum periisse: & perito crani inventum fuit abscessus, cum pure admodum sentente & corrupto. Quare dici debet non semper lethargum ab apostemate induci, sed tunc præcipue cum non circumscripta margine, sed in omni cerebri substantia humor diffusus putrescit: vel cum apostema circumscriptum mediam & præcipuam cerebri regionem, in qua arteriosi plexus continentur occupat; ita ut spiritus omnino opprimantur

vel corrumpantur: cum verò apostema locum certum circumscriptum in cerebro habet, & reliquæ ipsius partes remanent libere, nec spiritus opprimuntur in illis, & possunt ex illis ad organa sensuum diffundi, tunc non sequitur, neque lethargus, neque comatorius sopor licet apostema fiat ut in exemplo allato. *Sebastianus & ejus Meth. Med. Part. 2. p. 243.*

Kulicus consistentis ætatis *palangie* in palpebram superiorem oculi sinistra vulneratus parum sollicitus de vulnere non admodum conspicuo, Chirurgum accedit ob imminuentem capitis dolorem, qui ea quæ oculorum & palpebrarum vulneribus conveniunt imponit, a quibus solutio continui penitus curata videtur. At vero cum circa septimum Coma quasi vigilans, & sensuum torpor sese offerret, accitus quoque sui vires agro adhuc ita constabant, ut ex superiori contignatione in inferiorem ad nos descendere. Consideratis circumstantiis, augum in herba latitare dixi, tam ob subitam consolidationem externam lisionis, quam ob lationem sentium interiorum: At sequentibus diebus magis magisque inclinatio ad somnum augetur, donec die obierit nono.

Post mortem cranium apertum fuit, ubi interius orbita oculi in superiore parte punctum ita læsa conspicietur, ut una etiam osiculum in duram meningem dilaceratam imprimeretur, separata vero dura matre, tenuis meninx etiam in eodem loco foramen instar fonticuli saniem expellentis exhibebat, sub quo tantus abscessus putulentusque latitabat, superior cerebri substantia omnino in pus conversa videretur, quo undique cerebri ventriculi superius & inferius replebantur. *Gr. Horstius Tomo secundo lib. 2. Observ. 4.*

Luella XI. annorum Lethargus quadraginta horarum spatio funellus fuit: aperto crani cerebri sanum citra inflammationem, & ventriculi mundi reperti: in intestino vero tenui vermes duodecim oblongi conglobati, & intestinum cum insigni rubore inflammatum fuit, frustra injectis clysteribus cauterio suturæ coronali applicito, & cucurbitulis affixis. *Chiffleinius singularium Observ. 10. pag. 8.*

Juvenem Comate Vigili interemptum secui ad investigandum quanam hujus morbi sedes affecta esset, Referat capite, in primis ventriculis, ubi sunt plexus illi choroeidei in dextera & sinistra parte duæ parvæ quædam pilæ compactæ ita erant, ut non sine magna laceratione separari possent: Pilæ vero unaquæque magnitudine Ciceris, sed aliquantulum majoris, tunicam interne flavam habebat; substantia verò erat alba, sed aliquomodo dura, externe verò tunica rubra erat: Hoc ut vidi; collegi unde nam proveniret quod huic morbo invalida essent medicamenta omnia, quandoquidem nec medicamento nec ferro, nec igne superari potest. *Domin. Panatolus Penit. 3. Observ. 9.*

Parvulus paulo supra tres annos natus, cerebri humidus, prout ex ophthalmis gravioribus, & faciei exanthematis aquosis (quibus interdum fuit obnoxius) constat, in eunte autumno malè habens cum febre lenta, & appetitu dejecto torpidus admodum & somnolentus evasit, ut dies & noctes serè continuè dormiret;



Experrectus verò adstantes novit, & interrogatus apte respondit. Huic idonea remedia scilicet enemata, vesicatoria, cathartica, item Julapia, spiritus C.C. pulveres, cum multis aliis in hoc casu utilitatis, statim & sedulo adhibita in tantum perfecerunt, ut intra 6. & 7. dies agrotans febre immunis, satis evigilans, & alimenta poscens, convalescere, & cura medica vix amplius opus habere videatur. Brevi tamen postea (incertum ob quam occasionem) recidivam passus, & de novo soporosis, torpore statim graviore afficiebatur, adeo ut ægre expergefcibilis vix quidquam noverit, aut scienter fecerit; postmodum plane stupidus, etiam si acris vellicatus oculos aperiret, eosque huc & illuc obvolveret, nihil videbat atque intra diem unam, vel, alteram totius dextri lateris paralysis insequuta est. Huic remedia priora repetita, insuper iterutatoria, apophlegmatismi, sanguinis detractio, cataplasmata pedibus, & epispastica toti capiti raso applicanda, cum aliis medicamentis, & administrationum modis ordine præscripta, nihil profuerunt, quin agrotans postquam ita per 4. & 5. dies insensibilis jacuisset, respiratione & pulsû tandem fufcenscentibus interibat.

Cadavere aperto, in imo, & medio ventre fere omnia satis sana reperiuntur, nisi quod in dextro rene humor ichorosis albicans, quasi sanies tenuis congeri ceperat, qui ex renis disseci & compressi partibus quibusdam copiose effluabat; hoc abscessus futuri initium, sive rudimentum quoddam fuisse videbatur, & forsitan ob serum haud satis ubertim, hic secretum, copia ejus major ad cerebrum affuxerat.

Nam Calvaria ulla exempta, anterior *Triginta* regio fere usque ad sinus quarti insertionem, aqua limpida per membranas transfluente oblecta intumescebat, quæ meningibus dissectis statim distinebat; porro illic loci, cerebri assulatum abscessi portiones minus madida, & fere sine punctis rubentibus, sive sanguineis apparebant, in posteriori autem Cerebri limbo vasa cruore rubescebant, & substantia corticalis sine tumore aut aquæ diluvio, depressior, & minor apparebat: ex his (prout supra statuiimus) lethargi causam a cerebri exterioris diluvio aquosa, & velut anasarca pendere manifestò liquebat.

Cerebro assulatum abscessu, & foramine in cavitatem anteriorem a lymphâ distinctam factu, aqua limpida, quasi prius intra spatium angustius coarctata, exiit; cujus ingens copia ventriculos omnes ad summum impleverat (ac uti videtur) Thalamos opticos comprimendo (prout in altero casu superius descripto) cecitatem, atque corpus unum striatum, aut porose ejus subeundo, aut comprimendo paralysis intulerat.

Flexus choroëides tanquam semicoctus, subalbicans, & fere exanguis apparebat; probabile est ex his vasis lympham qua ventriculi cerebri inundabantur, omnem aut quoad maximam ejus partem, exudasse; quanquam in hoc si (prout nonnulli existunt aut) latex aquosus è cerebri cortice inferius subsidens, demum cerebro penitus trajecto, in hos sinus depluere poterit, non incommode inde ratio petatur, quare lethargus primò sanari visus, mox immu-

nior, cum cecitate & paralyti adscitis reciderit, nimirum quatenus primò materiam soporiferæ penus, a cerebri cortice in cavitatem ejus prolapsus est, functio animalis paululum inclauit, postea vero cum nova materies in cerebri cortice pullularet; & hæc in sinus prolapsa, ad plenitudinem aggereretur, ideo morbi prioris recidiva cum ius cecitatis & paralyticæ auctariis contigit.

Quanquam autem cerebri interioris hydropis, seu ventriculorum ejus inundatio, aut corpora lstrata, vel Thalamos opticos comprimendo, Paralytim, vel cecitatem, aut nervorum origines vellicando affectiones spasmodicas cieat; attamen lethargum non a tali causa, sed tantum a cerebro exteriori inundato, aut compresso exoriri, observatione nupera anatomica evidentissime constabat. *Thom. Willis. de anim. brutor. part. 1. cap. 9.*

Quinquagenaria per semiannum fennè in m. in cephalalgia sub sutura sagittali continuo fere torquebatur: ea denique in lethargum cum partiali membrorum resolutione incit: à curatione tamen per convenientia adhibita, multò peius quàm prius cephalalgia atroci experrecta est; post tres fere hebdomadas apoplectica obiit.

Calvaria dissecta è latere sinus tertii, tumor scyrrhusus tres digitos latus membr. nis accreverat, cujus interventu & crassa meningis aliquanto spatio tenui accreverat, & rafa sanguifera, quæ illic in sinum dehiscere debuerant, constipabantur. Cerebrum tam extus quàm intus lymphâ madidum.

#### Morbi ætiologia.

Ex præcedenti inflammatione dolor primò, & deinceps scyrrhus factus, qui compressione suâ sinum tertium adeo angustum reddidit, ut sanguis ex cerebro in illum transire non potuerit, hinc cerebri paralytis, quæ apoplexia dicitur. *Stephan. Blancard. in Anatom. public.*

Fuer 14. circiter annorum, habitu corporis macilento, staturæ satis parvæ toto quantum coultat viæ tractu, male habitus, & vitio linguæ, ob quod ne verbum quidem integrum efferre poterat à prima nativitate laborans, cum mens. septembri 1680. Orphanotrophii ægros inviseremus, malè se habere tremulis verbis significavit.

*Ægrotam volvens faciem maculisque trementes  
Peiresque genus. Virg. Æneidos 4.*

Nec tamen doloris locum dicere poterat, nunc parum circumcurritabat, nunc caput contingendo, doloris indicia exhibebat; verbera quibus a magistro quandoque præter rationem exceptus fuit, ad iram misellum concitasse videbantur, vana hæc, sit sine viribus licet; prægressa quoque mala victus ratio, de corpore vitiosis humoribus repleto, quæcunque prodidit vestigia: hinc lenè intus ex sol. sen. &c. suavisimus, quod autem assumere renuit, aliquot diebus post in deterius labens, viridia & flava copiose evomit, succedente somno profundo, a quo difficulter expergefciebat, & expergefactus, præter morem neminem fere ex adstantibus cognoscebat, imò vix dum oculis fixis ipsos tantisper intuitus, in somnum lethargum



lethum rursus protuebat, neque excernenda amplius retinuit, urina, & fecibus involuntarie profluentibus, quamobrem misturam antepilepticam per cochlearia lapideis exhibendam ex aq. fl. lil. conv. pœon. m. antepil. Lang. Spir. C. C. tinct. caltor. & syr. de pœon. præscripsimus, vesicatorium nuchæ applicari curavimus, aliaque pro lociratione, ex artis præscripto imperavimus; sed vix convulsionibus, quas imminere prævidimus, obviam itum fuit, quin miserum confectum invaderent, & per dies aliquot graviter vexarent, usquedum animula, ad creatorem anxie tendens, corpusculum viribus suis profus defraudatum dereliquerit, in suo loculo blande tantisper requieturum, dum suo tempore latius eidem conjungatur. Nos qui anxie respiranti & stertenti ino agonizanti manè adstiteramus, sub vesperam, ulteriora fragilitatis nostræ hausturi tecmeria, juxta quoque mortis causam demonstraturi, sectionem institimus, spectatoribus Vir. Excellentiss. Clariss. D. D. Theodoro Zvingero, jam Eloq. Profess. & Colleg. Leopoldin. Aristotele digniss. D. D. Rolluvagio Heilbronnens. D. D. Hochrütinero Sangall. D. Urcele Ritzio Pharnacopolâ, & D. Phil. Speckero Bas. Med. Licent. Remotis musculis abdominis, epiploon putridum & corruptum totum oculis se hinc cum intestinis flatibus distentis, ventriculo contra parvulo & inani: in illorum interioribus intra viginti plexus glandulosos protuberantes ostendimus, qui omnes tribus tantum exceptis gangrenosis cum aliqua duritie contraxerant, de quibus videatur Clariss. D. D. Peieri exercitat. 2. de gland. Intest. Valvulæ conniventes Kerkringii in iisdem admodum erant conspicuæ: Hepar pro ætate & staturâ nucelli maximum, subnigrum: vasa cystica vesiculam suam eleganter perreptabant, pancreas subtus ventriculo protentum albicabat: Lien non nigrum lividus & superneie superiore admodum corruptus. Vena cava turgidissima, ut & vasa emulgentia & adiposa: Testiculi parvuli nucis avellanæ magnitudinem vix æquantes, ex innumeris vasorum filamentis compacti: renes cum ureteribus satis ampli: venter supremus cranio ablato, cerebri molem exhibuit, itidem iusto majorem: vasa per hujus corticem distributa, admodum erant tumida & inflata: sanguine livicante: glandulæ in ejusdem superneie, præprimis corpus falcatum versus, vasis appendicæ videbantur: sinus tubulo inflati, maxime ipsam autem falx a vasis reticulariter dispersis varie perreptabatur: cortice abscisso ventriculi cerebri anteriores, velicæ instar aqua distenti protuberabant, e quibus incisione facta, ichor copiosissime profluxit, qui in tertia & quarta cavitate non minore quantitate stagnavit. Plexus choroideus totus palluit, vasa quæ ex hinc corpus falcatum versus expanduntur, glandulis subduris, gelatina infarctis, stipata erant: cerebellum flavidum, a quo antepinalis medullæ progressum plures nervos oriri inferius vidimus. Glandula pituitaria erat subfusca.

Joan. Jacob. Harderm Apianii Observ. 35.

## CASUS AB ALTO.

*Curationes, Observationes & Anatomice Inspektiones.*

### *Curationes.*

**I**N casu ab alto si febres accesserint signum est sanguinem extra vasa in corpore putrescere.

In quo casu nihil melius aqua benedicta in vehiculo aquæ chærefolii propinata, febrem nimirum & inflammationes subito tollit, (vena quoque secari potest) ac totum corpus ab impuritatibus liberat. Potest eadem exhiberi, etsi nulla adhuc tum adsit febris & quidem statim ab initio, facit nimirum ne febris facile succedat. Interim cætera fiant, quæ sanguinē coagulatum dissolvunt, qualia sunt essentia sanguinis hirci; It. Sanguis lupi, mumia, in primis vero Magisterium oculorum cancerorum. It. carbonēs tiliz (3j. in aqua chærefolii, vel aceto) chærefolium detur in cibis, pulvis in hoc casu multum prodest.

℞. Carbones tiliz, oculorum cancerorum, herbæ chærefolii ana f. s. a. pulvis, dosi 3j. in acet.

Sic Diaphoreticum in peracutis vel mixtura simplex, (vel aqua alia theriacalis) singularis est in hoc casu, si intro sumpta sudores provocentur, qui admodum necessarii sunt & interdum ab externis promovendi.

Sic Iodices in vino rubro stiptico (diaphoreticis parum proficientibus) immergæ, & polica expressæ, ac universum corpus amicientes, sudores in hoc casu mirifice promovent in lecto, præsertim ubi conquassationes interiorum viscerum metuuntur. Felix Wurzius in sua Chirurgia laudat mercur. sublim. quem vide: sunt alii descripti pulveres ad casum utiles, de quibus vide praticos.

Sanguinem coagulatum in venis & extra venas, resolvunt omnia illa, de quibus jam diximus, interdum etiam vena hic secari potest, in primis verò sudores prolekti post sumpta resolventia citò id expediunt.

Extractum vel arcanum seu essentia bellidis minoris sumpta, innata quadam proprietate omnem sanguinem coagulatum solvunt, & per insensibilem quandam transpirationem educunt, sic aqua theriacalis & spiritus tartari idem præstant. *Joannes Hartmannus in Praxi chymiatr.*

Pueri & homines, cursu incessuque temerario & ascensu præcipiti sapissime corruunt. Casus, autem differentiz sunt multiplices, tum ex loco ex quo & in quem fit: ut humili, sublimi, duro, molli, medio: tum ex offensæ partis substantia, vel molli, ut ventris, vel dura ut capitis, crurum, brachiorum, thoracis, spinæ: tum denique ex sequentibus affectibus & symptomatis, ut fractura, luxatione, paralyfi, contusione, obmutescencia, deliratione, hæmorrhagia, interna externaque. Ab iis omnibus casus differentius, indicationes curativæ variantur.

Qui



atque roborantibus qui vel inspergentur & capiti raso tonsive per plures dies, vel cucuplia diutius circumterenda ex cotone & serico rubro excipientur, non neglectis etiam lotionibus similibus sub ætatem. Si forte ex casu graviore fractura ossis alicujus inciderit; tunc præter revulsionum prædictas species præmittendas, junctæ prorinus ossis fracti oræ, emplastro oxycroceo muniantur vel cataplasmate ex farina fabarum cum oxymelite coctis & probè subactis.

Luxationis quoque propria curatio est per repositionem subitam ante revulsionem ipsas.

Denique distentionis articulorum per quam ligamenta sine ossium fractura aut luxatione in pedibus, genibus manibusque tantum elongantur, curatio est per blandam repositionem partis, dolorisque & caloris sedationem repentini ex linteis in frigidam immerso, vel ex cataplasma adstringente ex boli arm. sang. drac. gallar. myrtillor. pulvere, ex albuminibus ovorum ij. vel ii. excepto. cum oleo rosato & aceto rosato. Post principium autem id est post quartum vel quintum diem, novum cataplasma priori omnino adstringens leniensque & digerens articulo læso inducendum est, quale est hoc.

℞. Fol. absynt. verben. caps. barbat. plantag. an. m. j. Rosar. rubr. flor. cham. aneth. centaur. minor. an. p. ij. alumin. & balast. an. quart. ss. coquantur in aqua simplici, addendo post finitam coctionem vini rubri autlerique partem tertiam. Hoc decocto foveatur pars dolens bis in die, tepide cum spongis novis & per horam singulis vicibus.

℞. Residentiam contusam & cribratam eique adde farin. fabar. & hord. an. ℥ij. radic. iros flor. ℥j. olei myrtin. & rosat. an. q. s. fiat cataplasma admovendum tepidè parti affectæ post sortum. Simile est emplastrum oxycroceum & contra contusiones descriptum in nostra chirurgia magna Gallica de vulneribus, capite de vulnere contuso. *Joannes Vigierius Chirurgia lib. 1.*

In casu & contusione commune remedium est, si ovi vitellum crudum cum aceto concussum ebibendum actus: prohibet enim concretionem sanguinis.

Rustici buphtalmi herbarum cum floribus luteis in aqua calenda in cerevisia incoquant, & tepidum haustum ejus decocti exhibent, qui omnes obstructions & sanguinis concretiones ex lapsu dissolvit, vasorumque ruptiones perfanat. Idem præstat Pilosella herba cum rad. in cerevisia cocta & bibita. Nautæ in præcipiti casu remedio utuntur ℥j. olei salis marini & calida cerevisia cocta & bibita, quomodo autem hoc oleum ex sale conficiatur, nondum explorare potui. Milites in castris ad violentas plagas, casusve præcipites exhibent ℥j. aut ℥ss. pulveris nitrati bombardici cum haustulo vini, aceti, aut cerevisiæ; qui tum ratione nitri; tum carbonis salicis, discutit omnem concretum cruorem & colluviem. Nam & Carbo Tiliz in pulverem redactus, & per se exhibitus in casu præcipiti mirum in modum confert: usitatum etiam remedium est quod sequitur.

℞. Unguenti Rubei porabilis ℥j. aut ℥ss.

aceto calido dissolvatur, & ebibendum propinetur. *Franciscus Joël Præfatus libro decimo sect. 5.*

Quod sæpius usu venire videmus, ut, dum in plantarum nomenclaturas curiosè nimis inquirimus, plantam lere ipsam cum ejusdem virtutibus tantopere dilaudatis, aut amittamus, aut seplatiarius & scriptis quandoque aniculis excutiendas propinemus, id quod præstantissima huic & plantæ *Arnica* præter meritum quoque accidisse passim constat, quam enim ut proprio nomine ignotamita & usu rarissimam putabat *Dodonæus* & ex illo *Job. Bauh. Hist. Plant. univers.* eam jam vulgo, præsertim nautico quoque notiore esse & frequentiori usu commendatam, quam quibuldam Medicis & Botanicis, in conspectu est, ac dolendum, magnos interdum sumptus heri, & plurimum temporis laborumque tribui utinam pervestigando, nec sine vitæ periculo ex intus terræ visceribus eruto alicui medicamento rite preparando, & per ignis violentiam à quicquid depurando simplici, aut granulatum & scrupulatum ad ostentationem tantum confuto & confarcinato informi eund. in composito, domesticis interim & passim obvisis neglectis: Præstaret igitur ad imitationem primorum medicinarum inventorum & modernorum in *China* & *Japonia* aliisque *Indiarum* provinciis feliciter medicantium, aut nostræ etiam plebis, quam penes optima quandoque & specifica reperiuntur medicamenta, uno eoque certo & experto simplici remedio uni obviam ire morbo, quam receptis triumularum longitudinem exsuperantibus. Quod & quanta *Vulnere* perfavit solo suo *Chironio* *Chiron* Medicus ille *venet. armig. 2mo*. Quot ulcera *Telephus* *Mysia* Rex suo *telephio*? Quos uteri dolores & hystericas passionem *Artemisia* *Carix* Regina sola suâ *artemisia* mitigavit, sopivit, radicitus sustulit? Celebratum illud apud *Sinenses* & *Japonenses* procuranda *arthritide* remedium mox dictum ex simplici quadam herba exsiccata paratur, lanugine obvoluitur & in forma cylindri vel pyramidis *Europæ* jam passim divenditur ac pluribus experimentis nobilitatur, quod magnificus *Domnus* *Assessor* *Spirensis* *Mauritius*, Vir in *chynia* quoque versatissimus nuper confirmavit in Epistola ad *Nobil. D.D. Sebast. Schefferum*. *Phys. Francofurtensem* die 14. *Julii* Anno 1677. exarata: Dominus *Mareschallus* de *Stubenvolt*, inquit, *podagricus* luc (*Spiræ*) decumbebat, ita ut ob intentissimum dolorem ne pedem quidem loco movere posset, moxam petit & facile à me impetrat, pollicique pedis affecti ter imponit levis brevisque ab imposito cauterio dolor, exsudante quoque paucio ichore, sed *podagricus* dolor statim remissior, nox quieta, alteroque die tanta pedum alacritas, ut iisdem terram fortiter pullaret & pleraque *Dominorum* *Assessorum* palatia frequentaret. Similem quoque curam cum prædicta moxa felicissime peractam esse in quodam *Aromatario* *Francofurtensi* diebus hæc sancte mihi affirmavit Vir quidam *Æthiops*. Sed mox religiose regitur ab *Indis*, regerunt nonnulli, ergo nec optima illa in vulgus statim sunt propalanda remedia, ne Medicorum vilescat auctoritas, & pessimis, quandoque nebulonibus ad experimenta per mortes agenda amplissima aperia.



aperiatur janua, aut insano gladius porrigatur ad nocendum. Verum, o bone, plurima tuta times; præterquam cui n quod illa medicamentorum occultatio avaritiam sapiat, aut invidiam ambitionisque & inanis gloriolæ captationem, diversissimè contradicit religione Christiana haut imbutus *Scribonius Largus præfatione ad Callistam*.

Qui experti sunt remediorum utilitatem, denegant autem usum, valde culpandi sunt, utpote qui crimine invidentiæ flagrant, quod malum cum animantibus invisum esse debet, tum præcipuè medicis, in quibus nili plenus misericordiæ & humanitatis animus sit secundum ipsius professionis voluntatem, omnibus diis & hominibus invisum esse debent. Et *Sennerius* in suis Exotericis: vix homini, qui talentum sibi à Deo conceditum sub terra defossum abscondit, Hominum quidem consilia sunt occultanda, Dei autem O. M. beneficia universo Orbirevelanda ad maiorem ejusdem gloriæ proximique utilitatem, quod prima & primaria fuit naturæ curiosorum semper cura & cynosura. Non ignorant Medici *Ætius* Medicamenta esse *Ætius*, sed legitimè administrata & methodicè usurpata, quod nonnisi longo usu addiscimus in schola Hermetico Dogmatica probe instructi, & edocti à puero, quibus omnibus destituti adminiculis empirici insaniam non raro perniciem ruunt & summam ignominiam, tranquillitatis animi & lætitiæ omnino expertes, ut *Cassius* noster loquitur, & fultus hoc argumentum ac gravissimè persequitur *Langius* in suis *Epistolis* pluresque alii, sed ad rhombum.

Vox *Arnica* ex plantica mihi corrupta esse videtur ab imperito quodam rhizotomo, quod insignis ipsi iulit vis sterminatoria, hinc *Plantica* *mutata* nomen invenit apud *Lagdamenses*: *Gesneria*, & ex eo *Tabernaemontana* *Caliba* & *Calendula alpina*, *Aster lucidus* & *Chrysanthemum latifolium* alius, ob eorum quandam similitudinem dicitur. *Marthiola* & quibusdam aliis & *Damascenum* *Dioscor.* inscribitur, quibus quidem repugnare videtur *Renaldus* in *plantarum specimen* *Parisii* Anno redeuntio hujus seculi in 4. edito quod *Ætius* *adversus* *Ætius*. *Hoers* albos & subpallidos suo tribuat *Damascenio* *Dioscorides*, sed nostrum turcis passim superbiat, quod deinde non in aquis, ut vult *Dioscor.* sed montosis locis plerumque nascatur, sed, quod pace tanti viri dictum esto, & floribus albis à *Matthiolo*, & ex pallido - albicantibus à *Call.* *Durante*, *Leontideis* à *Bauhino* reperit & hæc nostra *arnica*, & locis plerumque humectis, tum montium jugis, pratibus riguis, sylvis caduis ac uliginosis frequentior. *Nardus* quoque *celtica* nonnullis vocatur ob saporem aromaticum, & *Doronicum Germanicum*: Rectissime autem ab absolutissimo *Classe* ad *Doronica* refertur, & à *Casp. Bauhino* differentia ergo *Doronicum* *V. plantaginifolia* alterum cognominatur, *Doronicum* puta salutiferum & non venenatum quam insaniæ notam ab eo gravissimis rationibus abstergit. *Nobiliss. noster Nestor*. Diss. 2. de *Ægagrop.*

Profert autem folia plantagini villosa & emula, leniter hirsuta & molliora, summa potissimum telluri incumbentia, quaterna ut plu-

rimum, rariora intereti & lanuginoso caule, semper tamen bina ex adverio, e quorum summa plerumque unius, interdum terni eximigant fureuli, suis mense Junio singuli nobis in fastigio conspicui aureo fulgore. *Doronicum* *Emulantibus*, eodemque modo cum semine suo tenui, oblongo & nigro in pappum ponea fatiscens; Radix subest oblonga tumida telluri pluribus fibris annexa cum lous & floribus aromatica tota.

Nobis rara est & uno saltem loco, quod sciam, coque sylvestri, nascitur, in pratibus alibi & locis humidioribus frequentissima; in hortos translata culturam non admittit, quod & *Camerarius* notavit in suo horto.

Vires ejus ex acrimonia & virtute aromatica æstimanda veniunt, in caliditate & siccitate excedentes cum magna partium subtilitate minimis etiam venarum fibras intimius permeat, easque ab obstructione liberat, in asthma, in catharro utilis, sternutamenta ciet, menses & urinas potenter movet, quod & mihi compertum (inquit *Renaldus*, unde & plantæ huic *Diuretica* nomen tribuit, & a doctissimo quoque *Penna* annotatum) colicos & hylericos dolores mitigat. Vasa rupta per sanat, in exturbandis arenulis & calculo præstans, sudorem facile ciet & nonnunquam vomitum, ideoque in morbis chronicis & in febribus diuturnis pronua, sed in contusionibus & casu ab alto pro dissolvendo sanguine grumoso etiam diutissime in corpore delitescens, & motum ac respirationem impediens, tanta virtutis & efficacis vix ullum ipsi facile par reperitur, simplex ex triplici omnipotentis Naturæ regno. *Lapforum* igitur quædam quasi Panacea jure meritoque deprecanda: statim enim atque assumpta est, tanto impetu ad locum fertur affectum, sanguinisque grumosi pertransit latebras, ut magnos ibidem cruciatus, & summam quandoque respirandi difficultatem suscitasse observatum sit, præsertim à nimia ejusdem dosi, & ubi malum hoc inveteratum ac contumax; quæ tamen omnia brevi vel spontaneo vomitu, vel lectione ventris &c. iterum sopiuntur, cum exoptata corporis incolumitas & virium restitutione in integrum: ubi autem nulla multitudo lesio, ibi quoque nullus ab hac assumpta planta dolor, ubi nulla gloria aut victoria, quod ipsi cum bezoardicis proprie dictis famulare.

Uti est in radice, foliis & floribus, quorum dosis a pug. j. ad ij. in robustis, in decocto ex cerevisia calide propinato quod vulgariissimum in infusione ex Aqua major. Vino quoque infundi potest medicato cum cæteris ad plures affectus in abdomine, in utero, hene & vesica: pulvis quoque planticus ex foliis & radice paratur præstantissimus. Ejus autem potissima vis, ut jam dictum, in dissolvendo sanguine consistit, quod ex sequentibus aliquot historiis evidenter elucescit.

Vetula quædam Pharmacopoli nostri Senatorii famula, de dolore lateris cum dyspnæa à nimio conatu abortu, diu multumque conqueritur, frustra quoque tentatis aliis pluribus medicamentis à solo *Arnica* ex cerevisia decocto calide assumpto integre convaleuit, provocata plurima per urinam & sudorem serositate An-



no 58. Secretarius quidam, robustus ceteroquin, & consistentis ætatis vir, ob cerevisiam frigidissimam in æstu copiose haultam in cervicis statim, spinæ dorsi & lateris dolores delabitur, aliquot dies noctesque lecto quasi affixus, ut aiebat, & immobilis decubuit, cum tussi pertinaci, raucedine & spirandi difficultate: usurpata alterantia, expectorantia variâ, ab assumpto Arnica decocto ex cerevisia dolor quidem & angustia circa pectus intendit; sed obrepente suavi per bignium somno omnia mox symptomata evanescere visa, profusa insigni urina copia. Ann. 60.

Albertus Stumpf. Villicus sexagenario major, catharro crasso cum tussi diu afflictus eodem modo curatus est; idque remedii genus sæpius repetit cum successu, quod cum malo hoc quotannis præsertim vere vel autumno conuictaretur.

Annorum 16. Juvenis I. D. S. ex equo præcipitatus, de continuis totius corporis doloribus conqueritur, idque menstruo tere spatio, qui tandem Arnica nostræ decocto proficito largo sudore iterum evanuerit. Ann. 67.

Plebeja quædam, à consternatis equis cum temone ad murum violenter detrusa, & gravissime in pectore ac dorso læsa, aliis huic malo destinatis, pulvere sc. contra casum, unguento rubro potabili, spermate ceti &c. frustra administratis, decocto hoc feliciter restituta est. Ann. 63.

Nicolaus Ori Agricola dormituriens curru excidit, a rota medium thoracem transcurrente in respirandi difficultatem cum abdominis intumescencia incidit, pluribusque medicamentis tam internis quam externis nihil levatus, tandem Arnica decocto convalescit. Anno 70.

Capit. Kempf. Carbonarius ab arboris succis subito lapsum imprudentia in dorso & femore ita læsus, ut diu tanquam claudus tutor domi sederet, nec se loco movere posset, licet pluribus unctionibus continue uteretur, eodem tamen modo sanitatem priusnam recuperavit, una cum ejusdem uxore quæ diro coxendicium dolore à nimio conatu exorto diu laboraverat. Ann. 70.

Carpentarius quidam A. R. fracto alliere uno inter duos allieres in profundam cellam pender medius litera longa sursumque summa vi vix tandem enititur, sed lateris inde dolor, qui ab impositione emplastri de ulmaria à dolore facta exasperatur, tertio à casu die inter conuictos labores concidit miser quasi attonitus nec à terra se exigere nec movere potest de summo lateris dorsi que dolore conquerens. Alvo l. a. aperta & vena secta pulvi, contra casum in decocto Arnica exhibitus, & Arnica cerevisiæ pro potu ordinario immerfa convaleuit, iuncto quoque latere dolente cum unguento rubro potabili. Eodem.

Peter Schirmer Oberndorffensis ab equo calcitrante ad pectus percussus, ex sanguine hirci nequaquam, ex Arnica autem decocto itidem restitutus est. Petulus quidam puer ex casu caput fortiter lapidi allidit, unde tumor & vomitus in tertio die febricula cum nonnullo delirio, impositum capiti emplastrum de beson. decoctum Arnica bis terque exhibitum, sub-

sequente diarrhæa spontanea & urina quasi sanguinea evasit. Ann. 61.

Iracundus noster molitor H. L. Uxorem propriam, sultibus præter modum excipit, unde respiratio difficilis, sputum cruentum, capitis tumor, Arnica decocto exhibitum, urina sanguinea prodit cum præsentaneo levamine. Anno 61.

Obstetrix nostra de scalis lapsa sumpto hoc decocto probe sudavit, & convaleuit, nullo subsequente symptomate. Ann. 73.

Leonhard gravissimis oneribus ferendis & attollendis alluetus, ex nimio tandem conatu, deficientibus sensim ex ætate viribus, dorsum & lumbos ad perinæum usque vehementer dolet à nimia Arnica dosi dolor ubique major cum metu suffocationis, sed sumpto jusculo ex croco & maci liberius statim respirat, dolor remittit & secta in brachio vena evanescit omnis. Ann. 75.

Andreas Venn. tutor Cachecticus, cui & caput & pedes reciproce dolebant ac intumescabant, cum nullo modo ad sudandum disponi posset, decocto Arnica ex cerevisia sumpto, egregie sudavit 13. Oct. Ann. 60.

Matronæ cuiusdam primariæ hac hieme asperiori in glacie lubrica lapsa, & spatium sat longum lumbos dolenti, idem decoctum cum successu exhibui. Item.

Quidam Juvenem diu febricitanti cum inflatione lienis, & ex errore diætæ sæpius recidivanti, qui re.ecta ex ejusdem usu per vomitum & scellum pravorum humorum saburra convaleuit ex voto; alique intumescere, quos studio prætereo, cum ex præmissis nobilissimæ nostræ Arnica virtus luculenter enitescat. Et nullus omnino dubito, quin in aliis quoque morbis, præsertim pectoris & abdominis, ubi magna in vasis corrupti seri restagnat copia, ut in hydrope, dysuria, præmissis tamen præmittendis, cum successu illa in usum vocari possit. Joh. Michael. Febrii.

### Observationes.

#### Pro casu ad puerum quendam

℞. Vini rubri ℥ss. cui superadde ros. rubr. sicc. rosinar. summittat. Myrti. an. m. ij. in cacabo ad ignem sit. decoctio: in hoc vinum stipiticum syndon immergatur, & parum manibus exprimatur, & eo calido optime xger involvatur, & in lecto optime cooperiatur: quo facto remedio copiosissime sudavit, & sanus factus fuit: Est autem hujus generis remedium apud Hispanos in omni lapsu admodum frequens & usitatum, à scribentibus de casu & offensione prætermisum, quum tamen potissimum sit. Amatus Lusitanus cent. 3. curat. 9.

Juvenis quidam 20. annorum cum per vimineum septum instar cancellorum tortum saltaret, cecidit supra palum circa dorsum, sine cutis tamen læsione; unde sequutus est dolor ingens circa renes & spinam inferiorem, ut incedere non posset. Ideo locum dolentem inunxit oleo rosat. insperso pulvere myrtillorum, & sanguinem ex Basilica, quia Juvenis erat, ne febris aut inflammatio supervenirent, detrahère mandavimus. Deinde statim



mummiz, spermatis ceti an. 3ß. cum cerevisia butyrata calida propinavimus; mox ut sequentem potionem sumeret iussimus.

℞. Ronic. cum toto, scabios. rubiz tinct. caulium rubr. pariet. malv. cum rad. charesol. sanicul. valerian. agrimon. bugul. & borrag. an. m. j. sem. nigell. (unicè confert ad casum ut experti sumus.) semin. anis. an. 3j. concisa & conquassata coque in cerevisia communi pro lb. ij. colatura saccharo dulcoretur in qua puppa sequens pendeat.

℞. Mummiz, spermatis ceti, an. 3j. nuc. mosch. troch. alkekeng. sine opio an. 3ß. f. puppa exprimenda dum portio sumitur; decoctum aromatizetur, cum 3iij. cin. moni. bibat de eo bis in die hora sexta matutina, & hora quarta à meridie, quarto die ita eundem purgavimus.

℞. Fol. sen. 3iij. infund. in decoct. pectoral. 3 v. adde elect. è succo rosarum, post fortem expressionem, 3jß. oxymel. 3 v. numm. nuc. mosch. an. f. portio. Deinde ad maiorem resolutionem inunximus hoc unguento.

℞. Unguenti de althæa 3ß. ol. chamæm. aneth. an. 3ij. m. quibus dolor sedatus est, & perfecte curatus fuit. *Petrus Forestus Observ. 29. lib. 6. Observ. Chirurg.*

#### Pro casu ab alto in quodam.

Hæc quæ sequuntur ex præscriptione Forentiolæ egregie contulerunt.

℞. Rhab. 3ij. rub. tinct. gr. xv. cum vino stiptico, f. pilulæ, quibus utebatur in principio; postea in processu exhibeatur illi medicamentum sequens.

℞. Cassia rec. extract. 3vj. mummiz 3j. rub. tinct. 3iß. rhab. el. 3j. pulverisanda pulveriscentur & dissolvantur cum cassia in decocto cicero rub. & fiat potus. Hic pulvis contra casum in usu est apud Colonenses cuius author fuit Zittardus, Medicus insignis.

℞. Mummiz, scabios. pilosell. hyperic. an. 3ß. costi dulcis & amari. nuc. mosch. an. 3iß. terræ sigillat. bol. arm. an. 3iv. rub. tinct. rhapont. semin. nigell. an. 3vj. sperm. ceti, rhab. an. 3ij. agar. troch. cumini præpar. an. 3j. m. f. pulvis dosis est 3j.

*Elidam præceptor meus pro sanguine coagulato è corpore hominis expellendo, tum à percussione, & concussione; sequent. remedio utebatur.*

℞. Mummiz, rhab. el. an. 3j. rubiz tinct. 3ij. m. cum decocti pulli nigri 3iij. vel capiat cum aliqua aqua convenienti; at pulla nigra coqui debet cum penis & visceribus, eadem prius strangulata, nec aliter occidi debet: nam ita decoctia plurimum præstat in hoc affectu proprietate quadam occulta. *Petrus Forestus Observ. 31. & schol. lib. 6. Observ. Chirurg.*

#### Pro casu ex fenestra ad somnambulonem quendam.

Præmissa venæ-sectione & injecto clystere, ad sanguinem collectum dissolvendum & expectorandum, exterius adhibui decoctum lactis cum meliloto, fl. chamæm. an. m. iij. mar. rhub. anthos an. m. ij. quod comprehensum

aliquot vesiculis bubulis, per vices calidum epithematis loco partib. dolentibus applicare iussi. Interius diebus aliquot matutino tempore piaguedinem humanam (quam tunc temporis à recenti corporis humani sectione copiosam in promptu habui) in iusculo cerevisiæ ad 3ß. exhibendam dedi quo remedio dolores & punctiones internæ leniebantur & sanguis concretus; ad exitum præparabatur, ita ut consequenter per tussim & sreatum concreti sanguinis frusta copiosè satis, & cum facilitate rejicerentur. Post octiduum cum suspicio aderat de sanguine concreto, aliquoties pulverem ex iis quæ sanguinis grumos dissolvunt, ut sunt oculi cancri præp. rad. rub. tinct. sperma ceti & similia, exhibui, & sudorem provocavi, & sic præter spem multorum intra 14. dies juvenis hic perfectè convaluit.

In hoc juvene observatione dignum, quod licet ex contiguatione domus tertiæ ad altitudinem 14. ulnarum deciderit, inventus tamen fuerit, quod ad membra externa omni ex parte illæsus, capite excepto, cui vulnus illitum erat ad os ulque bregmatis sine ossis & pericranii læsione. *Guil. Fabricius Hildanus, obs. 84. cent. 2. ex Epistola. Gregor. Horstii ad Hildanum.*

Mulier quædam ex altiori delapsa loco diu jacuit semimortua, tandem cum ad se rediisset, exhibui ante omnia contra sanguinem coagulatum hunc potum.

℞. Succ. cancri vivi contusi 3ß. vini albi 3iv. m. hæc portio expulit sanguinem coagulatum. Postero die ab assumpto potu, me jubente venam medianam secuit. Quarto à venæ-sectione die balneo aquæ dulcis chalibeate usa fuit, atque his paucis mox valere rectè cepit. *Martinus Rulandus cent. 5. curat. 12.*

Mulier quædam quinquagenaria ab equo sternace sub bigas lapsa rotis caput, pectus, totumque corpus miserè contudentibus deplorata videbatur. Ego advocatus, devote Deum implorans, talem medendi curam instituo.

Primo posthabitis omnibus saphænam secandam suam mane deum sudorem hoc modo provocandum curavi.

℞. Vini rubri stiptici lb. 10. ros. rubr. sic. rosmar. summitat. myrti, an. m. ij. f. decoctio in cacabo ad ignem. In hanc postea sindonem vel linteolum immergebam; coque extremitate digitorum leviter expressio, ægram undique & calide, & optime involvebam; atque sic in lecto arctè contexta, diu multumque sudavit, in prandio & cena potus erat decoctum cærefolli cum saccharo. *Martinus Rulandus curat. 74. cent. 6.*

#### Gravi casu capitis absque ulla trepanatione.

Uxor L.O. infortunio quodam in sulcrum incidit focarium, quod 25. libras pendebatur, quo ita læsit caput ut omnia deprehenderentur accidentia in tracturis crani observari soita. quare judicarunt medici, chirurgique cerebrandum esse cranium, licet vulnus tantum cum contusione absque fractura, fissura aut depressione ossis animadvertenter, ideo statuerunt, requi-



requiri loci perforationem. Eam autem xgra admittere neutiquam volebat. At ecce! quarto decimo post lationem die, caput ejus, faciesque admodum temere, plurimisque hæc, ut & trons notari cepit hinc inde vesiculis. Atque ita dicta mulier absque trepano, sed nos absque auxilio divino, modo certe insolito, paulo post omnino fuit pristina restituta valetudini.

Vero simile est dictam materiam infernè sub cranio prodixisse. Quoniam enim nulla manifeste deprehendebatur fractura fissurave, necesse est, tenuis ille & serosus humor, per futuras aut sudationem, vel denique per occultam rimam extra cranium pervenerit.

Id ipsum autem per transudationem fieri posse multi testantur scriptores: ut *Thom. Bartholinus, Observ. cent. 2. hist. 41. pag. 214. Marcellus Donatus Med. historiar. Mirab. lib. 3. cap. 4. pag. 200. Wepferus pag. 38. lib. 1. Tulpus Obs. c. p. 3. pag. 4.* qui etiam profert exemplum in quo immixtus sanguinis gutta per calvariam, (quæ tamen integra erat quamvis aliquantum mutata colore, adeoque naturali soliditate parum debilitata,) erumpebant, imitatur roris universam calvariam conperientes. Quibus spongia aliquoties detenta, repullulavit continuo & alia: monstraturæ veluti nihil naturæ esse injum; sed omnia pervia, neque ossa ullibi tam solida, quin per ea libere permeet, cum sanguis tum pus. *Galenus in librum 7. Hippoc. Aphor. 54.* hæc confirmat dicens arbitrari Hippocratem, naturam semper, si robusta sit, materia viam mori & invenire, etiam si quam maxime crassa sit, & per exiles transitura meatus: quando per ossa etiam abscessu fieri dicat.

sicut autem ab intra foras pus per calvariam, ita etiam contra facilius foris resudat in interiora. Hæc de re etiam videatur *Avicenna sen. 14. lib. 3. tractus. 4. cap. 5. ac Jacobus de Carpo de signis comitatu cerebri, e quo Marcellus Donatus Med. hist. mirab. lib. 5. pag. 200.* testatur contingere aliquando in capitis vulneribus non dari liberum saniei transitum per ipsum vulnus eamque eo casu per porositates ossis resudare ad intra cranium, cujus rei testis est Hippocrates in lib. de vuln. cap. dum scribit vulnera in posteriore cranii parte reperta nimis esse letalia, quoniam os propter crassitatem diuturniori tempore pus contrahit & ad cerebrum interius transudat.

Petrus Marchettus celeberrimus Chirurgus polleaque Chirurgie Professor Paduæ obser. 12. pag. 24. ait se vidisse duo exempla vulnertum capitis, ac contusionum absque fissura in quibus sine terebratione evittebatur pus, quoniam id per cranii poros, haud aliter, quam per cutem sudor, exibat: quavis uterque hic æget, diutius dilata perforatione, postea decesserit.

Quare ille artem profitentes monet, si vulneratis medeantur, quorum symptomata arguunt, internas partes etiam læsas. ut in tempore trepano utantur, dictante etiam Hippocrate si quid movendum videtur principio move. Unde sequitur, si terebrandum, initio terebra. Joan. Baptista de Lamszverde, Append. obser. pag. mihi 238. obs. 41. duo similia vidit exempla, in quibus sanies pars qua-

dam per cranii poros transudare conspiciebatur, huic autem evacuationi dum quidam nimium fiderent, sero trepani opera accessit: subjecta enim sanies aliquando nimis copiosa, tardiorque est exoneratio unde tandem interna corrumpuntur partes. Et licet frequenter trepanum fracto fusoque cranio utile sit, idem tamen quandoque, salvo etiam, atque integro cranio, adhibetur præsertim cum tumor est, ne intus vasa quædam rupta sint. Trepani enim ope non tantum sanguini effuso datur exitus verum ita etiam inflammationi, putredationi, delirio, febribus, aliisque letiferis accidentibus iter obviam, quamquam hoc agentis modo artis Magistri sperata non semper assequantur, optime id ipsum ostendente Tulpio obs. lib. 1. pag. mihi 3. & cap. 1. &c. fieri non potest, ut materia quæ extra vasa sua fluxit, alio, quam quem ictus, casuve læsit, contineatur loco. Exempli gratia; si finitimum alijus os parietale lædatur; sanguis in adversam partem repulso quodam potest effundi: licet falce a se invicem separentur binæ hæc ossa; item: si ictus lapsusve frontem tangat, posteriore capitis parte potest manifestari sanguis quod sequenti probatum unus observatione

Continetur etiam quandoque humor qui effluxit, inter binas membranas, vel etiam sub pia matre; uti is ipse inter cerebri fissuram supra corpus callosum in ventriculis aliquoties apparuit locatus, cujus posterius narrationem instituiam.

Al quando etiam incerta sunt signa, quibus dignoscatur, ubi lateat quæ effluxit, nec loco suo contenta materia, quamvis ea plerumque si fractura, fissurave adsit sub eadem reperitur, nonnunquam alibi simul; notante Tulpio obs. lib. 1. cap. 1. pag. mihi 4. Contingit enim sæpius (ac non semper) ut vi illa quæ sit loco plagæ vel ictus (quamvis nulla fissura fissurave adsit) sanguis extravasatus ibidem reperitur, qui exitum non inveniens, ac proinde ibidem tractu temporis putrescens, pravorum sæpe symptomatum, nec non mortis interdum causa fuit.

Verum quidem est fieri aliquando, cum nec manifesta apertura cranii reperitur, virium robore subjectam exonerari materiam, sive id eo fiat modo de quo superiori observatione dictum, sive per nares, auresque, uti Wepferus pag. mihi 123. ac Bartholinus cent. 2. hist. 4. pag. mihi 215. pluresque testantur, vel, quia aliquando per collum ad pectus, ventremque deferretur, atque illis abscessus causa est, quod P. Marchettus obs. Med. Chirurg. 15. fol. mihi 35. sæpius se expertum ait, ac Jobus Mekernus obs. cap. 1. pag. mihi 18. Paræus lib. 10. cap. 8. Marcellus, Donatus lib. 5. cap. 4. pag. mihi 201. nec non Roehusius part. 1. lib. 1. obs. 3. p. 190. indicant. Qui vero viribus ægri cum internæ læsionis deprehendantur signa, solummodo fidere statuit, deceptum se sæpius sed serò dolebit. *Cornel. Sielpari. observat. rarior. centur. 1. obs. 7.*



*Historia Casus ab alto Augustissimi Regis Daniae  
Divi Christiani IV.*

Rex Daniae Christianus IV. 20. Julii ann. 1625. hora decima vespertina, ubi dispositas vigilias exploraret, in foveam secundum perpendicularum effossam 22. pedes profundam cum equo lapsus, & in dextrum latus prostratus diu jacuit inanitus sine loquela, sine sensu & ratione, & sanguis multus ex naribus & utraque aure fluxit. Medicus in loco venam aperuit. Ego vocatus 23. Jul. inveni valde debilem, qui neque loqui ipse posset, neque colloquia aliorum ferre, vix nosseine potuit, adspiciens tamen manum languide porrexit nihil locutus. Nullum tempus commodum a medicinis vacuum esse volui, & cum serius aliquanto accessissem, nihil potui nisi clysterem, eo ipso die adhibere; ex eo cum bis excrevisset, visus fuit aliquo modo melius habere, loquela tamen ignava & vix intellecta. Eodem die Balsamus inunctus est naribus, & auribus parum illitus, item spiritus cephalici inuncti vertici capitis, ubi futurae coeunt. Pulverem sternutatorium nolui admittere.

D. 24. Julii pulverem pro casu ad dissolvendum sanguinem dare volui cum aceto bezoartico, quem cum assumere recusaret, neque tamen quicquam temporis frustra praeterire sinerem, dedi ipsi pilulas 9. valde lenes, quae tamen ter alvum moverunt, & cum de pulvere ad casum, ut volebam, pomeridianis horis iterum quicquam sumere recusaret, propter periculum, quod erat in mora, iterum clysterem eodem die applicui, quem statim reddidit non sine fructu, adpersio capitis cum spiritibus cephalicis, & inunctio narium eo die non fuit neglecta, aqua etiam pro collutione oris utilis est.

D. 25. Julii summo mane sub diluculum iter Verdam ingressi sumus; & tum Rex in monasterio Mollebeck pransus est, & eo prandio sua manu bis mihi cibum porrexit. Inde perreximus & pervenimus in pagum Reemer, hic sumpsit cochlear aquae bezoarticae, & caput inunxit, inde Peteterfugium.

D. 26. Julii & 27. tria cochlearia aquae bezoarticae sumpsit; & capitis verticem spiritibus cephalicis inunxit, & os colluit cum aqua destinata, quod ut vesperi, cum Hoiam appulissimus, faceret, impetrare non potui, quemadmodum neque matutinis horis diei sequentis, cum inde Verdam proficisceremur. Eo cum pervenissemus, statim appositus est clyster, quem adlita hiera fortiores reddidi, ex eo clystere magnam excrementorum copiam exclusit, & comode habuit, ita ut me post rejectum clysterem ad se vocaret, & per horam diutius tam bene, tam articulate & tam prudenter, ut post hunc lapsum unquam mecum de multis rebus consuleret. Vesperi sub decubitu facta est inunctio ex unguento Hamelae praescripto, & adpersio verticis cum spiritibus.

Subsequenti die 29 sumpsit potionem ex rhabbaro, ex qua parum deiecit, quocirca sub vesperam iterum clyster injectus est qui cum favore, quod relictum erat, exclusit, unde Rex

iterum bene habuit. Usus est etiam eo die pulvere sternutatorio, ex quo capitis levamentum sensit, ita ut postero cupiverint adstantes iterum adhiberi, quod factum est, cum prius pulverem A.C. cum Aqua Bezoartica sumisset, & caput lavisset cum lixivio medicato & sapone odorato. Inde ex pulvere cum irolestiam nonnullam Rex teste percipiente austriore vultu indicasset, adstantes prope me & medicamenta, quorum tamen utilitatem ante perpexerant torvo vultu miculare videbantur. Verum Rex sub prandium hilaris fuit & multa locutus est modo de his, modo de illis, cumque pridie & postridie calidorem potum bibisset, circa vesperam praecedentibus duobus diebus capitis gravamentum sensit, & noctem inquietiorem habuit, absque ullo tamen calore praeternaturali. Alioquin tum propter curam procrastinationem, tum propter calidorem potum, & iterum irolestias vix fieri potuit, quin in tanto casu corpus a malo, & cerebrum ab inflammatione defenderetur. Sub ingressum lecti fomento pro oculo & linimento est usus.

D. 31. Julii sumpsit 5v. gelatin. ribium, hora tertia pomeridiana de Electuario confortante sumpsit, hora quarta ablutio facta est capitis, & adpersio spirituum cephalicorum, caput detersum est lintheis calidis & pulvere praescripto infumatis. Hoc die mentis aliquis fuit error & hallucinatio, namquam urbs in qua erat, interrogavit inter cernendum, tamen satis rationaliter locutus fuit. Circa tempus decubitus & dorsum inunctum est, & ea nocte bene dormivit.

D. 1. August. Rex ipse medicamenta flagitavit, dedi ipsi pulverem ad casum quantum ter cuspe cultelli capere potuit, & statim bibere iussi aquae bezoarticae 5ij. caput spiritibus cephalicis irroratum, & dorsum inunctum. Hoc die cum multa adversa nunciarentur, aliquanto perturbatori animo visus fuit, inter prandium hallucinari visus est, hora octava pomeridiana injectus est clyster, quem brevissimo tempore retinuit, post multa excrevit. itaque de electuario cephalico dedi, nasalium admittere noluit, dorsum tamen inungi passus est, dormivit nocte, neque quicquam absurdum locutus est.

D. 2. Aug. assumpsit 3vj. gelatinae ribium, aqua praescripta os colluit, pulvis capiti inspersus est, nasalium admittere noluit. Post meridiem dedi de electuario, caput lotum, spiritibus adpersum, iterum tentata nasalium & leniter. Vesperi hora octava dorsum inunctum, & caput spiritibus irroratum est, post decubuit. Hodie cum mentis hallucinatio & capitis aggravatio pertinacius hareat, necum cancellario ostendi. Hae nocte bene dormivit, sed somnia habuit turbata; unde caput adhuc praegravatum potuit conjici.

D. 3. Aug. propinavi pulverem A.C. cum aqua bezoartica, pulverem capiti inspersi, in prandio satis prudenter locutus est, vesperi hora tertia caput lotum est, spiritibus cephalicis irroratum & pulvere adpersum.

D. 4. Aug. potionem ex Rhabarb. sumpsit, & tertia pomeridiana electuarium, caput lotum est, & irroratum, noctu dorsum inunctum.

D. 5. Aug.



D. 5. Aug. pulverem ad casum cum aqua bezoartica sumsit, adpersus est pulvere; hora octava caput lotum, spiritibus inunctum, & nuchæ, scapulisque quatuor cucurbitulæ scarificatæ appositæ & dorsum oleis præscriptis primum inunctum, & unguentum prius abdicatum.

D. 6. Aug. Gelatina ribium sumta, à meridie electuarium confortans.

D. 7. Aug. sumpsit pulverem A. C. cum aqua bezoartica, caput lotum, spiritibus irritatum, dorsum inunctum oleis, cucurbitulæ siccæ adhibita, & pulvis sternutatorius in nares insufflatus. Pomeridiana tertia sumit electuarium, circa sonnum dorsum inunctum est.

D. 8. Aug. Mane Vestimenta induit, pulverem A. C. sumit cum aqua bezoartica, deinde exercitum visitavit.

D. 9. Aug. iunxit potionem ex rhabarb.

D. 10. Aug. pulverem A. C. cum aqua bezoartica, caput lotum spiritibus inunctum.

D. 11. Aug. clyster. consuetus appositus est, cucurbitulæ siccæ dorso fuerunt appositæ, & sic perreximus in alterno usu clysterum, purgationum, pulveris A. C. cum aqua bezoartica, inunctionum, cucurbitularum & reliquorum, quorum antea lacta est mentio, usque ad 18. diem Augusti, morbi autem diem 31. ubi bene valere visus, & *Amisus* advenit, neque quicquam incommodi sensit.

#### Medicamenta Regi Præscripta.

℞. Aloes insuccat. 3vj. Pilul. de Rhab. 3ss. extr. hellebori nigri panchymag. Croll. cor. an. 3j. Mumix 3j. Castor. 3ij. Diagrid. 3j. ol. carv. cinam. an. gutt. vj. cum aq. cinam. f. Pilula ex 3xxv.

℞. Gelatin. rib. l. xat. lbij.

℞. Aq. apoplect. L. ang. 3vj. Spir. Sulph. ur. 3j. Syrup. de chichor. 3j.

℞. Ol. rut. dest. carv. an. 3j. Caryophyl. 3j. 6. lavend. 3j. nuc. mosch. expr. q. i. f. Balsamus

℞. Acet. Bezoart. lbij. Aq. Theriacal. 3ij. Spir. Sassafr. 3ss. Syrup. de cinamom. de acetosic. Limon. de eupator an. 3ss. Spir. sulphur. acid. 3ij.

℞. Ungu. potabil. 3vj.

℞. Ocul. caner. præp. 3j. succin. alb. præp. 3ij. rad. tormentill. vincetox. rub. an. 3j. Lap. bezoar. 3ss. cinamom. 3j. terr. sigill. v. bol. armen. an. 3j. sacch. ex julep. rosar. candifat. 3j. f. pulvis A. C.

℞. Rad. Irid. flor. calam. arom. pyreth. angelic. meu an. 3j. fol. ror. marin. salv. an. 3ss. flor. lavend. p. ij. pzon. primul. ver. an. p. j. sem. rut. bacc. laur. exs. an. 3ss. aq. destill. sal. 1lbss. rut. lavendul. an. 3ij. Acet. vin. acerrin. 3ij. stent in infus. per horas 2. postea balneo fervescunt & colentur, colaturæ add. mell. anthoslat. 3j. oxymel. scillit. 3ss. spirit. vitriol. 3j. M.

℞. Rad. althææ, gentian. helleb. nigr. præp. an. 3j. Herb. hyssop. beton. majoran. mell. an. m. 3ss. flor. chamomill. Rom. p. ij. bacc. laur. 3j. Coq. in aq. font. & in fin. add. vini tertiam partem, colaturæ.

℞. 3x. add. confect. Hamech. Diaturbith.

c. rhab. an. 3iiijss. mell. anthos. 3j. f. clyster.

℞. Elect. diaturb. c. rhab. diaprun. hamech. mell. mercurial. anthos. an. 3ss. rosar. 3ij. M.

℞. Conserv. rad. cichor. Scorzon. an. 3j. majoran. 3ss. Veron. marrub. an. 3ij. rut. 3j. flor. ror. marin. lavend. an. 3j. nuc. indic. 3vj. myrobal. emblic. 3ss. conserv. flor. rosar. rubr. 3ij. conf. Alkerm. 3ij. spirit. Vitriol. 3ss. Syrup. d. cinam. f. m. f. Electuarium.

℞. Rhabarb. 3ij. fol. sen. 3j. Turpeth. 3j. passul. Corinth. 3j. spic. 3ss. sem. scenic. 3j. aq. endiv. fragar. an. 3ss. Acet. flor. salv. 3ss. intund. & col. colaturæ adde Syrup. diafer. 3vj.

℞. Rad. aristol. ror. v. gentian. an. 3ss. costi 3ij. Herb. majoran. rut. salv. an. m. j. flor. chamomill. itachad. an. mss. scob. Lign. sassafr. 3ss. bacc. laur. exs. 3vj. agaric. crud. 3vj. fol. laur. 3ss. nuc. moschat. 3j. incisa D.

℞. Sapon. vener. 3ij. agaric. crud. 3j. cinam. caryophyl. an. 3ss. rad. irid. flor. 3ij. camph. 3ss. mosch. ambr. an. 3ss. cum aq. majoran. & lavend. formentur globuli pondere 3ij. S. sapo odoratus.

℞. Tartar. vin. 3ss. litharg. 3ss. alum. 3ij. sal. comm. 3ss. aq. fontan. pur. 1lbss. folan. plantag. an. 1lbj. acet. vin. acerr. 1lbss. m. & coq. in vase clauso, neque aperiatur vas, antequam refrigeretur, tum transcoletur.

℞. Gum. elem. anim. an. 3ij. Mastich. thur. an. 3ss. caran. stitac. an. 3vj. fol. ror. marin. salv. majoran. an. 3j. m. f. pulv. pro fumo.

℞. Rad. Irid. flor. 3ij. lign. Rhod. aloes an. 3ss. sassafr. 3ss. fol. ror. mar. majoran. an. 3j. flor. lavend. p. ij. gum. anim. tacamah. an. 3ij. Ityrac. calam. oliban. an. 3j. f. pulvis deinde.

℞. Mosch. Zibeth. ambr. an. 3j. m. & diluantur accurate in aq. cinam. & lavendul. an. 3ss. postea misc. cum pulv. iterumque exticcetur.

℞. Cort. limon. exticc. 3j. rad. irid. flor. 3ij. calam. arom. pimpinel. enul. an. 3j. turpeth. el. 3j. fol. ror. marin. salv. an. 3j. scob. lign. sassafr. 3ij. santal. rubr. agalloch. an. 3j. sem. carv. 3ij. fl. caryoph. hortens. rotar. rubr. an. p. i. passul. corinth. 3ss. vin. rhenan. 1lbss. spir. vitriol. 3j. intund. & add. zingib. 3ss. cardamon. 3vj. caryophyll. cinam. an. 3ss. sacchari 1lbss. f. decoctum.

℞. Spir. salv. chamomill. R. calam. arom. hyss. an. 3j. aq. carbuncul. 3vj. m.

℞. Ol. arthrit. 3ss. terebinth. 3ss. chamomil. dest. 3j. majoran. salv. rut. an. 3ss. M.

℞. Spirit. rut. majoran. lil. convall. an. 3ss. cinam. 3ss. M. S. spiritus cephalic.

℞. Radic. hellebori albi, pyreth. an. 3ij. h. majoran. tabaci an. 3ij. semin. rutæ itaphisagr. an. 3j. euphorb. 3ss. m. f. pulvis. *Thomas Bartholini.*

#### Varia cadentium fortuna.

Tralatitium est & vulgo etiam compertum homines nonnunquam cadentes ex edito loco non lædi, sive si id angelorum custodiz (quod malim credere) adscribas, sive corporis positioni inter cadendum fortunatiori. Talis mihi cognitus, qui puer ex alta turri in saxum stratum præcipitatus, postquam se ca-



dens pedibus exceperet, nullum damnum sensit, nisi calopodiorum ligneorum, quibus pedes munierat, fracturam. Libuit tum experiri, ut sociis ejus verumne esset, quod vulgò jactari solet alurum, quomodo cumque cadat, semper ita se in medio periculo gubernare, ut terram attingens insiliat pedibus. Projectus ergo è fastigio turtis in ipso lapsu varie gyrabatur, nonnumquam pronus, aliquando supinus, sed ubi ad pavimentum allisit, in pedes erectus subito cursu profugere nitebatur, & currebat strenue ad teli jactum, mox in ipso cursu mortuus dirigit, cerebro, opinor, ex illo lapsu nimium concusso. Altioris est indaginis, quod Sevenhulæ in Hollandia quotannis accidit, & mihi bis spectatum est. Nemo ibi surgit modicum, sed in quo plurimæ arbores volucrum nidis occupantur, succedentibus sibi in iisdem cubilibus, vari generis alitibus; de quo plura *Heginitius* in Itinerario Hollandiæ. Concesseramus istuc aliquot annis eo tempore, quo corvi aquatici in nidis imperium exercent, non plane impluēs, sed nondum volucres. Igitur præmonstrator noster ut artificium capturæ ostenderet, contum altero extremo recurvum arborum unius sic satis proceræ, sed trunci tenuioris impingit, & varie agitando, succutiendoque duos corvos plumatos quidem, sed alis suis nondum fidentes nido excutit. Illi qui aquarum naturam experti nunquam fuerant, in medio lapsu dum superficiem aquæ (suberat enim rivus, in quem decidebant) attingunt, tanta sagacitate immergunt se undis, ut cum tres famuli altarent, omnes itidem sudibus longis armati, ut decedentes interinerent, ictus eorum diu eluserint, alio scilicet margine rivi emergentes, quam quo in eadem parati excubabant; Dixiles volucres has, & vix bimestres, in illo foro evadendi pericula, pluribus annis dexterrime spectatas fuisse, ita nulla esse potuit matrum solertia prudentior. Id quod mea quidem sententia, satis evidenter docuerit notiones quasdam fortibus animalium ingenerari, sine prævio genitorum magisterio; neque enim hi, ut ita dicam, corvuli, imperiti rerum & experientis imbuti nullis, nec a nido in terram prospectare docti (tantum abest ut assueti lymphis fuerint) hos omnes cursus, recursusque, has è periculis intentatis exeunditechnas scivissent, nisi ab innato emanassent principio. Quin & anatum ova gallinis incubantibus supposita attestantur idem exclusi enim hi autumni pulli & gallinaceis permixti, ubi ad fluvium veniunt, statim, nullo nisi intellectu doctore, aquas ingrediuntur, natant, lumenta quarunt, stupente veluti gallina, pullorum quos suos æstimat, degenerem indolem. At hi pulli matrem videntur nunquam. Hæc eo tendunt, ut si notiones suas clares, distinctasque ab ovo secum ferant volucres, majorem utique prærogativam largiamur animæ humanæ (ut cumque suas alioquin tenebras agnoscat) nec eam vel exilium tabulam rasam esse, generalem vel regulam; nihil esse in intellectu, quod non ante fuerit in sensibus. Sed ad cadentes iterum: Alius è scopulo Stephanite ad trecentos pedes in præceps per infortunium actus, piscatorem in subiectis undis cymbulæ suæ inhaerentem subito lapsu exauimavit, ipse salvus. Sacerdos quidam

Hafnienſis fallente veſtigio è ſcalis ſuis proſuens in filiam advolantem caput inſepgit eliſurus haud dubie calvariam, niſi ex improviſo adſtitiffet virguncula. Verum ſuperat hæc omnia fatum dyecanz ſexminæ, quæ menſe Auguſto hujus anni, ex incenſa à noſtris ad Calmarniam bellica hoſtium nave (cui à clave nomen) in ſublime ultra centum pedes cum infante, quem ulnis retinebat r. pta, deſlagrante ſimul omni tormentorum pulvere, in mare inter medios ignes ſalva prociſit, puerulo ſuo comitata, & à noſtris excepta. Olandiæ ſuz reddita eſt, ut facti ſui luſum, & noſtrorum miſericordiam evulgaret. *Olaus Borrichii.*

#### De lapſu ex alto indemni.

Fieri miracula in Medicina, non *Avicenna* ſolum, ſep ipſa experientia docuit. Occurrunt exempla *ἰατρικὰ καὶ ἀγὰ διόρτα, καὶ πνευματικὰ καὶ ἰατρὰ*, quibus ſapenumero r. pta ſubefſe, nemo niſi atheus negaverit.

*L. F. Evvaldi*, Civis & Panniſcis h. l. filiolus trium annorum 1669. d. 25. Jul. in avi ſui domus ſecunda contignatione, circa fenetram inſu occupatus, & e ſcamno pronus in plateam lapidibus ubique ſtratam deſpiciens, pondere ſuperioris corporis extra librato & declinante, præcipiti in caput lapſu decidebat, 17. pedum altitudine. Vocati cum binis chirurgis in conſilium invenimus infantem præter ſolum ploratum, alias optime habentem, nulla cutis læſio, nullus tumor, nulla cruentatio apparebat. Quare interne Pulverem Cephalicum bis terve propinavimus, externe verò ſaculo ex plantis cephalicis interpaſſato, & vino incocto caput fovimus, hinc en plaſtro de Heronica impoſito intra triduum omne negotium abſolvimus, ipſo interim puello aſſiduo bene habente, qui & hunc uſque in diem quàm optime valet.

Verum quidem eſt rotundam figuram eſſe omnium perfectiſſimam, quæ ubique ſe ſuſtinet, & contra externarum injuriarum impetum particulis & nexibus quaſi concatenatis armat, nullibi facile admittens aditum, & hunc capitis ſphæra non aque fracturæ, aliſq; injuriis ſubjacet, quod ob hanc ipſam cauſam natura (quæ *Galeno* teſte, nullam partem reliquit *ἀφ' ἧς οὐκ ἐννοῦται, contra i-jurias non bene muniam*) tali donavit figura, ut durum oporteat eſſe ictum, qui reſpectu aliarum partium, Oſſem hunc formicem perſumpere valeat. Nimilominus pium & chr. humani eſt, divinam hic agnoſcere manum, quæ teneros poſſiſimum & molles infantes protegit, & Angelis angelaribus ubique ſepit, ut ex ætris laus deduci poſſet, niſi talem in alieni inſellum inmittere dubitarem. *Georg. Wolff. Weacii.*

#### Ex lapſu alius.

Civis quidam noſter (cujus nomini parco, quod inter nos hodieque ſanus, & bene habitus vivat) itinere Heſſingoræ inſtituto, per ſuriga incuriam everſo curru in ſaxum inſpingit, inter cœtera, quàm vehementiſſime ſiniſtrum teſticulum jam ante per ſedecim annos ſcirrho, & timore præter naturam obſeſſum. Delatus



tus mox in hanc urbem, præter dolorem par-  
tis contusæ febris corripitur & quidem conti-  
nua. Cui ut malo obviam mature iretur, roga-  
tus cataplasmatibus partem affectam foveri ju-  
beo, & febris pharmacorum oppono solemnia.  
Duravit morbi & medicaminum confectus  
mensis propemodum integrum, donec natura  
victrix & scirrhum sustulit, & contusione im-  
mani præmollium, & natam ex dolore febrim  
extinxit. *Olai Borrachii.*

*Ex casu contusio maxilla, vomitus, febris cum  
delirio & sopore, sinistri lateris motus  
convulsivi. &c.*

Puerulus 4. circiter annorum. Vegetus ac  
vivax, cum aliquando currum imprudens con-  
scenderet, cum traterculo, de eodem in terram  
præceps con. idit, ita quidem ut maxilla dex-  
tra inde præcipue contusa fuerit, capite aliis-  
que partibus immixtis: nihil quoque sangui-  
nolenti vel per os expuit, ut per nares excre-  
vit: Parentes mali subitescens infans, externe  
remediis domesticis contusioni obviamiverunt,  
aliquot autem diebus post, ægrotulo cibum  
tenente, imò, si quid iniecerat, mox evo-  
mente, graviora subveriti convenerunt nos die  
14. Maii 1683. conquelli de imbecillitate ven-  
triculi, qua filiolus laboret, cui Diaph. mart.  
C. C. philos. ppt. ungu. alc. aliisque his similibus  
prospectum ivimus: triduo post ingruentibus,  
nausea, vomitu, siti intensa & inquietudine  
apud misellum ut accederemus ipsi petierunt,  
simulque quid mali nuper acciderit retulerunt;  
pulsus celer erat & frequens, urina saturata: in-  
terne pro resolvendo & discutiendo sanguine  
grumescence, usi fuimus cinnab. antim. rectif. ant.  
diaphor. cum spir. urin. addit. aq. destill. exter-  
ne vero Balsam. de Peru cum ol. destill. menth.  
ventriculum inunxit: sub vesper. sympto-  
matibus persistentibus, mixtur. ex autepil.  
diaphoret. per cochlearia sæpius propinendam  
suasimus, cui d. seq. febris augmentum sumen-  
te miscuimus spir. C. C. addito Epithemate cum  
spirituosis penetrantibus, quo caput subinde  
foveatur: postero die pulsus celer erat & inæ-  
qualis, intermittens: Ugebat sopor profun-  
dus cum delirio: Expergetus statim obdor-  
miit, sinistro latere immobili, adiutus tunc  
existente: de abscessu subitescente Parentibus  
suspicionem nostram aperuimus: vesicatoria  
inde applicari iussimus, ad quæ ipsi prorsus  
obmutuerunt, abradis capillis, sacculos ex  
herbis aromaticis cephalicis, hinc & columbam  
vivam per medium lectam imponi curavimus,  
pergendo juxta in internis: vesperi reduces in  
copioso sudore ægrum offendimus, sed citra  
pulsus matutino similis: delirabat &  
vigilans tortis oculis adstantes salutabat:  
Clyster injectus à quo materiam satis graveo-  
lentem sed parce deiecit: nox subsequens in-  
quieta fuit ægerque dentibus stridere capir:  
Vesicatoria demceps imperata, præscripta  
vero Emulsio in 2. Dos. ex semun. card. bene-  
dict. aquileg. cucurb. cum aq. scabios. beton.  
add. C. C. Philos. ppt. qua rursus idoneum  
sudorem excitavimus, sed citra ulterius emolu-  
mentum: Mane quippe postero motus convulsi-  
vi invaserunt, qui paulatim increbuerunt &

misellum die sequente morti tradiderunt: in-  
casum adhibitis ante-pilept. internis & exter-  
nis.

Sectione, quâ hand dubiè prædictiones no-  
stræ obfirmatæ fuissent, ob alterius parentis  
rusticitatem prohibiti fuimus. *Joh. Jacob. Har-  
derus Apiarii Observ. 31.*

### *Anatomica inspectio.*

*Ex casu, capitis contusio, apoplexia &c.*

Anno 1674. mense Janu. r. Molitor quidam  
transihenanus, ubi prius haccho aliquantum in-  
dulserat de scalis ex alto de. idit, domumque ve-  
cius mox instar statui: ne sensu & motu jacuit,  
vomuit cuoniter & sanguinis per aures erup-  
tionem passus est, vulnere in cranio nullo appa-  
rente; que postero hinc engravit. Cr. nio ex  
artis præscripto remoto, sanguis inter ipsum  
& duram matrem copiose in occipite extravasa-  
tus deprehendebatur & tota sui mole cerebel-  
lum versus & spinalem medullam procumbere.  
*Joh. Jac. Harderus Apiarii Observ. 31.*

Vir quadragenario maior in viciniâ, die 24.  
Januarii anni 1692 è sublimiori loco præcidebat,  
& caput in saxa quibus strata erat in quam de-  
cidebat platea, tam vehementer aludebat, ut  
inde non parvum vulnus effectum sit. Chirurghi  
adstantes cum viderent magnam contusionem,  
incisionem per illius longitudinis majorem par-  
tem ex arte deducunt, venæ sectione etiam  
prius celebrata, sed nihil amplius in diem us-  
que 27. prædicti mensis tentare ausi sunt, quo  
tempore cum Chirurgo dexterrimo J. J. Cou-  
dougant advocatus, febris satis intensa &  
phrenetica quasi anectione vulneratum labo-  
rare vidimus, tum explorato vulnere, cum de  
extracto cranio nobis constitisset, dilatata  
quantum necessarium fuit incisione, trepanum  
sequenti die applicandum decrevimus, quod  
etiam tactum cum tanta sanguinis per forā-  
men a trepano confectum evacuatione, ut ad  
libras ad minimum duas assurgeret, metum-  
que nobis incuteret subita mortis tam largæ  
hamorrhagia, res tamen in melius abire vix  
sunt potius, ita ut æger nollet & cum ratione  
loqui, & alimenta assumere, imò febris remit-  
tere jam non parum inciperet, cum nescio quo  
fato omnia in pejus ruere subito ceperunt  
die prima februarii, eaque ipsa die Caroticus  
obiit. Cranio elevato, vidimus fracturam non  
tantum per totam longitudinem ossis bregmaticis  
dexteri, sed etiam ultra suturam lambdoideam  
ad ipsum os occipitale extendi; duram præ-  
terea & pia men. ingem in toto illò cerebri hæ-  
misphærio quasi putridam, imò cerebrum ip-  
sum intra usque ventriculos sphacelo prope af-  
fectum & prorsus diffuens reperimus. Unde  
mirari subit quomodo vulneratus hic in tan-  
ta cerebri, & commotione & contusione, quam  
corruptio prædicta subsequuta est, etiam si tre-  
pano exitum sanguini effuso pro viribus pa-  
rassemus, nec paralyticum, nec convulsivum  
quid passus fuerit, imò à trepano applicito ad  
interrogata sine delirio responderit, donec pa-  
rum ante fatalem horam Caro lethali affectus  
fuerit.



## CATAGMA

Vid.

## FRACTURA.

## CATALEPSIS.

**C**atalepsi, aliis Carosbe, Prehensio, & Congelatio est affectus in quo ægri rigidi, & quasi congelati corporis situm servant in quo erant cum ipso corripentur: innotis autem & apertis plerumque sunt oculis, motu & sensu destituti. Affectus hic ita rarus est ut unicam ejus historiam proponat Galenus, duas verò Fernelius, alii sc. Skenkius, Forestus, Tulpius alias iridem habent. Nos aliquoties hunc affectum vidimus, sed non legitimum, & subito prehendentem, qualis fuit ille quo corripiebatur Galeni condiscipulus dum studiis attentius incumberet; sed febris vel continuæ vel intermittentis peioris notæ semper fuit factus & proles. Illius à mensibus retentis orti hanc habet descriptionem Clar. Diemerbroekius. Domicella 20. annorum ob menses parcius fluentes uterinis suffocationibus subinde obnoxia, his diebus subito prehensa omnis sensus experta transiit, & in illo, quo prehensa fuit, corporis situ, obrigit, oculos apertos ac fixos detinens, nihil tamen videns. Si adstantes brachium illius sursum, deorsum, vel ad latus deflecterent, illud in tali situ remanebat. Si ægram in pedes deponerent, stabat; si corpus impellerent, pedem promovebat. Respiratio autem libera persiliebat. Cum hic paroxysmus per horam durasset, tandem ad se rediit ægra immemor omnium quæ ipsi contigerant. Post biduum simili paroxysmo de novo detenta fuit, qui etiam sponte cessavit. Sic unus ex illis quem vidit Fernelius è lectulo sublatum cum spiratione facili, solus consistebat, quicquid in os inferebatur prompte vorabat, impulsus incedebat, & quocunque vel manus, vel brachium, vel crus inflecteretur, illic quasi fixum & stabile permanebat. Expressam quandam, addit, dixisses larvam, aut arte progredientem statum.

Partem affectam in hocce affectu cerebrum esse, aut potius spiritus animales, nemo iniicias iverit, atque eò potissimum quod Galenus eum viderit à nimia attentione, spirituumque defatigatione in libris pervolvendis & perlegendis in suo condiscipulo natum. Fortitan aliquando, ut in casu è Diemerbroekio allato, ut & in aliis à nobis ipsis observatis, somes morbi alibi nidulans in cerebrum emittit materiam quæ spiritus torpore corripantur & quasi congelentur; sed non minus propterea cerebrum aut spiritus ejusdem incolas affici dicās, aut minus exigere remedia quibus excitentur, & excutiantur copula illa heterogenea motibus per eosdem peragendis adeò insensa, & ipsi cerebro & nervis, ut quibusdam placet, quasi impacta.

E supra dictis satis explicatur morbi istius diagnosi ut & ejusdem ab aliis capitis affectibus differentia; unde non opus est illis enarrandis ulterius immoremur.

Causam quod spectat, eam exquirendam

cum Galeno non credimus in frigida cerebri intemperie, nervos consupante & congelante, talem enim intemperiem in subjecto vivente non optinamur possibilem. Denuerit spiritus congelans verbatantum & voces nihil amplius continet, quamvis exemplo fulminis aut ignis ab eodem profecti, atque homines aliquando congelatis, illum illustrare conetur. Symplicius coagulatio, analoga illi quæ e spiritu vini & urinæ invicem mixtis oritur, pluribus nominibus non arridet, primo quod tales humores in cerebro vix, imò nunquam reperiuntur, qui tamen pro morbo isto faciendo per totum hoc viscus & in omnes nervorum origines subito effundi deberent. Secundo quia etiam daretur, similes humores in cerebro nasci, vel in illud aliunde elevari, non sic omnis spirituum animalium vis hebetaretur, nam e nucleis spiritus vini & urinæ quod præcipitatur penetratissimum est & ad minimum calorem prævolatilitate sublimatur, quod verò liquidum perit, quamvis corpus multum, non est minus mobile, aut viis sibi per nervorum canaliculos referendis aptum. Superest igitur, ut missis aliis aliorum sententiis de Cataleptico causa, ad eam quam legitimam credimus continuo veniamus. Morbus autem hic cum melancholicis & iis qui assiduo disciplinarum studio se fatigant potius quam aliis sit familiaris, non incongrue pronuntiabimus illum de genere exstaticorum affectuum esse. Sic ipsi ideam imitabatur Socrates, qui referente Gellio se se exercens in vestigiis patientiæ perdis, atque pernox, ab altero solis ortu ad alterum orientem cogitabundus, & immobilis perstabat. Si itaque dispositio melancholica in qua spiritus pauci dantur, itque ad voluntatem minus mobiles, concomitetur attentionem & contemplationem illam fixam à studiis, vel aliunde ortam, in ea attentione procul dubio parcius spirituum copia in cerebro ad motus voluntarios peragendos degens tota impendetur; sicque revera animalium spirituum pars peragitur in tota nervorum longitudine, ut & fibris muscularibus exiens motibus naturalibus ad tempus continuandis par erit, ut & ipsi motibus etiam voluntariis ad externam impulsione peragendis; sed si diuturnior foret affectus, atque anima unionis cum corpore quasi oblita spiritus in cerebro longius detineret, tandem membra omnia ac viscera auxilio tam benecæ defraudata, conderent, sanguinis circuitus & immineretur, & periret, unde mors prompta expectanda foret. Quod autem objicietur ex Diemerbroekio, sc. quod anima in hocce affectu omnium oblita, contemplationis cuaspium in qua attentionem tam fixam adhibuerit omnino sit immemora, à nostra nobis sententia minime dimoveret, nam præterquam quod illud ex unica tantum historia ab Autore prænominato allata colligi potest, scilicet eveniet ut spiritus post longioris defatigationem, indeque factam assumptionem rationi permaneant, nec tunc in cerebro ad tempus non aperiant per quos memoriam præteritorum resercent, aut præsentis meditationis ideam imprimant.

Prognosis non æque periculosa ac in Apoplexia, in quam, tamen hic affectus si longius pro-



protrahatur facillimè degenerat. Si malum non sit idiopathicum, si ejus causa in cerebro non nascatur, sed eo aliunde feratur, si sponte & per spirituum vitium subito non adveniat, si invasiones sunt breviores, aut earum recurſus non sit nimium frequens, facilius dispellitur: Sin minus periculo coque etiam gravissimo non vacat.

Indicationes sunt cerebri corroboratio, spirituum excitatio, attentionisque & contemplationis nimium defatigantis, & longius protractæ, abſtinentia. Dubas prioribus potissimum providetur volatilibus aliisque in capitis morbis, remediis recensendis, tertiz, cique sane præcipuz, potissimum medetur ratio, quæ hocce in negotio Medicinæ utrique, sc. Galenicæ & Chymicæ, prævalet.

### Curationes, Consultationes, Observationes & Anatomica inspectiones ex variis.

#### Curationes.

Curatio Catalepsidis duplex instituenda est: una in Paroxismo, altera extra proximum, in Paroxismo ad ægrum excitandum conveniunt ea remedia quæ in soporosis affectibus descripta sunt. Extra Paroxysmum curatio melancholicæ hic omnino conveniet, si catochus ab humore aut vapore melancholico generetur quæ quidem causa frequentissima est. Si autem frigida intemperies sola, à causa externa, vel interna producta huic malo originem dederit: quæ illam emendant remedia e capite primo hujus libri erunt depromenda, ac denique si copia sanguinis hunc affectum generet, vel foveat, illius immunutio per venæ sectionem erit consentanea.

Victus ratio calefaciens & humectans præscribenda erit, sicut in affectibus ab humore melancholico oriundis. *Lazar. Rivierii Præcept. Med. lib. I. cap. 4.*

Quoniam catalepsidis morbus rarissimus esse solet, alto silentio scriptores curationem præterire contenti solummodo generaliora præscribere, communia his, quæ ad Epilepsiam referuntur. Sed & Sylvius conferentia solum autumat sile volatili acriori prædita. Quendam mihi aliquando contigit observare qui levamen maximum persensit, (cum nihil per os assumere posset) à balneis ex chamærelo, fœnugræco, anetho, malva, althea, meliloto, seminibus lini, additis salvia, betonica, nicotiana itemque linimentis ex Galbano Paracelsi, essentiali lavendulæ, Oleo nucis myristicæ, & ceræ. Capucinus catalepticus relat. ab Henrico Heers his remediis curatus fertur. Primum, glande acri alvus soluta est, unde membra movit, surrexit & ambulavit; omnium præteritorum tamen immemor. Tum fricatis natis ex ptarmico potentissimo sæpe sternuit mucumque excrevit simile glaciæ, deinde ingressus laconicum status discutiencia assumpsit. Postmodum ab usu clysteris validissimi, & cathartici purgatus est; atque insuper decocto herbarum capitalium, cerebelli regio, & universa spina tota est ac convenientibus oleis inuncta: Pro potu hydromel dilutissimum, in quo sassafras, tœniculum, & anisum ebullierat, ebibit, ad-

misto vino fulvo: Ac tandem in dies exhibitum fuit conditum ex electuariis, acori, stachados nucis myristicæ, zingiberis cum Theriaca & confectioe pliris arconticon; sequæ in posterum, cum malum persentiret, oleo calido toti spinæ affricto à congelatione præcavit. Alium narrat Forestus, qui non dissimiliter à clystere & balneo acris, inunctionibus, decocto cathartico & roborantibus cephalicis convaluit. *Lucas Tozzi Medicin. practic. lib. I.*

#### Consultationes.

Perillustis patiens, annum agens 23. perpicacis ingenii, in infantia habuit caput tadis crustis infectum, per abscessum retro aurem sinistram disruptum lanatus, mox & totum corpus squamosis crustis fuit fœdaturum, sola blanda purgatione, feri lactis usu & halituoso sudore dehiscentibus: ita tamen ut ex levi qualibet ambientis frigiditate tussicula quædam necesse foret, nisi sutulis vellibus indueretur. Adultior factus, frigidis humidisque alimentis familiariter usus, longo scribendi & legendi labore delinatus, post graves animi passionem, dum casu cubitum ad parietem allicit cum dolore maximo, in scalam antrosum prolapsus est derepente querulusque mansit, absque loquela & sensu jacuit, post aliquot vero menses, à cena & usu variorum fructuum, horariorum, potu vini frigidi, & aquæ gelidissimæ, mane dolore ventriculi acuto suborto, brevi temporis spatio perlitit immobilis, insensibilis, rigidus, cum oculis apertis inmobiles, facieque pallida, & veluti cadaverosa reddita. Quibus affectibus ante biennium semel atque iterum correptus fuit, post laboriosum motum accedente quinetia longa, eaque spuria catarrhali gonorrhæa, variis prædictis perfectissime sanata: propterea quaerit, quænam sint horum affectuum natura, causæ, qui futuri eventus, & curatio.

Quibus paucis satisfactori, non on istis rationem utilioribus, statuimus, affectum præcipuum Nob. hujus Patientis, alium non esse, quam, qui à Græcis Catochos, vel catalepsis, à Latinis congelatio dicitur: non tamen accepto catochi nomine, ea significatione, qua usus est Hippocrates in coacis Prænotionibus, ubi legitur, Cephalalgias, Catochos; latine vertitur à Dureto dolor capitis firmiter fixus. Sic enim quilibet affectus firmus, & stabilis, seu in habitu, catochos vocatur: minus, sumpta voce. catochi, pro affectu mixto ex lethargo, & phrenitide à Græcis Typhomania dictio, quo sensu usurpatur ab Aetio, vel pro comate vigili sicut à Paulo Aegineta: Sed pro affectu specifico à prædictis distincto, à Gal. descripto 1. in Irimum Prothetorum text. comm. 56. in condiscipulo suo sic scribente: *quidam etiam ex nostris condiscipulis, cum assiduo disciplinarum studio satigantur, malo hoc correptus est. Jacebat enim veluti lignum prorsus inflexum, rigidum atque extensum, & videbatur oculis apertis nos ita intueri, ut ne commiveres quidem, nihil tamen loquebatur.* Et in eadem significatione sumitur ab eodem Gal. 2. de causis symptom. 7. 4. de Loc. aff. 2. 1. Aphor. 3. Libro de Sympt. Differ. 3. & alibi; quo sensu aliquando est tantum in principio: quo tempore est vitium solius motus



triciis facultatis, non autem sensitivæ & principis, qualis fuit condiscipuli Gal. qui videbat audiebatque ea quæ dicebantur, dictorumque factorumque post accessionem recordabatur, ut tulit ipsemet Gal. Aliquando vero est affectus confirmatus, quem propterea Gal. lib. de sympt. diff. cap. 3. agens de rectricis facultatis vitis asseruit esse veluti paralyticum, & resolutionem imaginationis, qualis est affectus Nob. nostri patientis, in quo propterea non erat corporis rigiditas, sed & insensibilitas, & abolitio functionum principum. At vero cum oculorum inconvientia, corporisque rigiditas observata non fuerit in prima accessione, credendum est, illam fuisse potius levem Epilepsiam, cum quæritus fuerit & genuerit, ut fieri solet in accessione Epileptica. Ideoque in utroque hoc affectu cerebrum est pars affecta, magis tamen secundum ventres, quam secundum corpus, sicuti in melancholia affectus secundum corpus magis quam secundum ventrem, & præsertim secundum ventriculum posteriorem, ubi est internum principium medullaris substantiæ, a qua emanant omnia septem nervorum paria, cum ad anteriores tum ad posteriores partes, quæ per irradiationem facultatem diffundit, cum sentitivam tum motivam, sensus, & motus instrumentis.

Ac Proinde causa immediata non est intemperies frigida & sicca, ab aliis authoribus proposita. Hæc enim neq; cito accedit & recedit: quod non fit in hoc affectu. Negari quidem non debet aliqua imbecillitas caloris nativi cerebri siccitati iuncta, cujus ratione in juvenili ætate prædictus est morbus, & prudentia senili; potestque facile affici à causis moribificis, & coacervare excrementa, ut propterea cessante accessione remaneat gravitas capitis. Verum symptomatis causa est incrassatio spirituum animalium & induratio nervosæ substantiæ. Hinc enim fit insensibilitas, immobilitas & corporis rigiditas accedens & recedens. Crassitiei autem spirituum, & duritiæ nervosæ substantiæ causam in statu præfenti aliam statuendam non censeo, quam statum copiam cum pituitosorum in ventriculo genitorum ex erroribus in victu præteritis, tum & magis melancholicorum, partim in cerebro genitorum, ex vigiliis animique perturbationibus, assidua lectione & scribendi munere, partim à venoso, & arterioso genere elevatorum, ob immodicum exercitium replentium quartum ventriculum, & principium spinalis medullæ, atque ita membranas extendentium, spiritusque incrassantium, unde rigiditas, & inflexibilitas, illi similis quæ a statibus irrumpentibus in nervos hilulolos penis, una cum spiritibus inducitur: cui ut plurimum jungitur oculorum inconvientia, quoniam musculi palpebras attollentes sunt ita breves ut facillime sese contrahere valeant ad quamlibet contractionem nervosæ substantiæ, ideoque aperiuntur oculi antequam fiat perfecta totius corporis congelatio, quam primum autem replentur porositates nervosæ substantiæ, cum incrassatione spirituum, tunc totum corpus rigidum manet, in illa figura in qua erat quando corripit affectus; Ut propterea dicendum non sit, motum hunc esse tetanicam convulsionem: quoniam in illa omnia membra recta sunt: multo minus, fieri

hunc affectum à sola obstructione ventriculi posterioris cerebri, ut existimant alii: tunc enim aboleri quidem possent actiones ex impedita irradiatione spirituum, non tamen fieret rigiditas. Si enim in apoplexia in qua fit obstructio omnium ventriculorum cerebri, nulla sit corporis rigiditas, imo potius universalis flexibilitas, quomodo quæso solus ventriculi obstructio rigiditatem inducere poterit? Neque dicat quisquam quod ad lationem ventriculi posterioris cerebri lædi debeat motus, & non sensus, supponendo verum esse id, quod ab omnibus fere admittitur, nervos scilicet motui inferentes esse in postica parte capitis, sensui vero dicatos in anteriori. Comperitissimum etenim est nervos oculorum motui inferentes esse in anteriori: qui vero ori ventriculi & partibus thoracis facultatem irradiatione spiritus diffundunt pro sensatione, esse in postica parte cerebri. Omnes tamen originem habent à principio spinalis medullæ quæ continua est cavitati ventriculi posterioris cerebri, & cerebelli: unde facile fieri potest læsio, non magis in organis sensitivis, quam in motivis, quotiescunque pars illa graviter afficitur ut in casu præfenti: in quo cerebrum modo afficitur essentialiter, quando scilicet ex vigiliis, studiis, animique pathematibus recurrit affectus, modo per consensum à ventriculo ex erroribus in victu; vel à venoso & arterioso genere, in motibus violentis, nec non & aliquando per consensum à corde, unde lipothimia, facili pallor, & fortassis pulsum imbecillitas observatur. Et hæc de essentiæ, parte affecta & causis sufficiant.

Ex quibus colligendum est periculosum esse præfentem affectum: cui propterea nisi brevi prospiciamus, periculum imminet, ne patientes moriantur lapidi, & apoplectici, ut inquit Gordonius, verum idem esse habet Epileptici, cui potissimum obnoxi sunt acris ingenii, qualis est noher N. p. riens.

Quare congruis remediis prædictæ affectioni occurrendum est. Alique sunt agenda in accessione, & alia extra accessionem. In accessione, elyther catinativus illico præscribendus est cum decoctione thimi, epithymi, fumariæ, notæ, chamæ, utriusque centaurei, addito electuario de benedicta laxativa, speciebus hieræ picæ Glen. mell. ros. sol. & oleo rutæ. Elicandi sunt artus manibus inunctis oleo litorum alborum & modico castorio: oblinentur nares, tempora & occiput Oleo sambucino, cum modico Euphorbio. Vinum Creticum sub naribus detinendum, & si fieri potest, canis ængis os aperitur ac instilletur vinum Creticum, aut Hispanicum in os, vel spiritus vini cum cannamomo, vel elixir vitæ, aliudve simile spiritus attenuans & recreans. Extra accessionem, corpus est diligenter purgandum, nec non & caput, illis medicamentis, quæ humorem melancholicum & pituitosum expurgare valeant, præmissa eorundem humorum præparatione cum syr. appropriatis: ut potest syr. de pomis, de suc. borraginis, acetofo simpl. & de corticibus citri cum decoct. betonicæ, melissæ, borraginis, itchedis, menthæ: factaque purgatione cum syr. de polyp. composito, ros. solut. cum infusione sennæ & agæci, in decoct. cordiali, vel exhibitis pilulis, aggregatis



gativis, hiera cum ag. cum castoreo. Quo tempore non erit abs re sanguinem mittere ex cephalica dextri brachii, mox & ex venis sedalibus; in pauca tamen copia sanguinis vicibus, reperita venarum sedalium refectione Vere & autumno. Inurantur quin etiam duo fonticuli, alter sinistro brachio, alter dextro interno femori ad revulsionem, & derivationem. Præter quæ remedia, duo præcipua ex ulu futura censeo, internum unum, aliud externum; internum erit decoctum ex radice chinæ, ligno buxi, lentis, & ligni visci quercini cum modico medullæ ligni indicis, addita betonica, lilio convallium, ruta caprarum, melissa, borragine & mentha, præmisso bolo confecto ex castoreo & mitridatica confectione, vel confectione de Hi. citho, & Alchemes. Extremum erit balneum aquæ dulcis æstivo hoc tempore, summopere ex usu, cum universale tum particulare capitis cum aqua tepida, lotio quin etiam fieri poterit cum lixivio dulci in quo decocta sint malva, tilia, strachis, & fl. chamæmeli. Ventriculo conferret stillicidium, vel ex oleis mastichino, de mentha, amygd. amararum, de absinthio communi, cum spica schænantho, & zingibere, facti ipsorum infusione & ebullitione in duplici vase cum vino Cretico, ad penetrationem, vel ex aquis thermalibus non impense calidis, quales esse possent in ægro nostro Patavino aquæ Læstrenses super posita summitate purpuræ, imbuta prædictis oleis, vel oleo de nucæ moschata & caryophyllorum. Aquas Thermæles aliasque minerales intus exhibitæ non laudo, siue sint frigida ratione jecoris, siue calida, ratione ventriculi, quoniam omnes tanquam exsiccentes in affectu præsentis, proveniente potius à causis exsiccantibus, intus sumptæ sunt aliquatenus suspectæ. Propterea si jecoris caliditas ad se curationem traxerit utatur succo cichorii depurato cum succo absinthii per aliquot dies, & à cibo semperumat aliquid subastriugens: puta diacydonium vel saccharum rosatum tabellatum.

Victus ratio primas partes habeat in omnibus sex rebus non naturalibus: ac proinde fructus horarii, lacticia, aquæ potus, vinum nive refrigeratum, computationes, comestiones sunt interdiciendæ, cum cibis crassi succi, difficilis coctionis, & succum melancholicum generantibus: cænaque sit parciore præcæna. A somno pomeridiano absteat: vigiliæ diuturnæ, animi pathemata, assidue meditationes, longaque lectio, & scriptio quàm maxime efficiunt. Exercitia non sint violenta. Aer valde tenuis qualis est Genuensis, nimis calidus, nimis frigidus, venti Boreales, æquilonaresque constitutiones sunt fugienda: neque iter suscipiendum per loca nivosa & valde frigida, aut æstuosa. Nimia venus, aliaque hujus ordinis, vel caput replentia, vel i. pensæ refrigerantia, & exsiccantia sunt semper noxia. Alvus continuò lubrica servanda, exlique mutatio in temperatius, quale est nostrum Patavinum, vel aliud simile maxime erit juvamento. Et hæc pro salute perillustri patientis proponenda duxi, quàm ipsi à præpotente Deo enixe precor. *Benedictus. Silvanius, consil. & respons. medic. cent. 1.*

Reverendiss. Abbas annorum 50. temperamenti calidi & sicci, habitus tamen mediocris, & hirsutus, rebus æconomicis sui cæsus magnopere addictus, & ideo vigiliis, curis atque cogitationibus nimium intentus, in febrem quartanum incidit à qua spatium mensium liberatus fuit. Spontanea superveniente venarum sedalium copiosa & repetita evacuatione. Hic tamen paulo post febre acuta correptus curatus fuit a Medico domestico remediis congruis; sanguinis scil. ex brachio missione, & quoniam dolor capitis cum vigiliis undecima transacta die, remissa quodammodo febre, non modo perseverabat, verum etiam auctus est, ideo summa cum ratione venas sedales aperiri iussit, postquam tamen sanguinis eductionem, sponte non advertente ægro, copiosius effluxit, Patienti Reverendiss. vires eripuit, exigua tamen febre relicta. Decima vero quarta febris die dum sedens in lecto cibum capturus esset, ex tempore totus rigidus factus est, sine ullo motu ulloque sensu, apertis palpebris, immotis manentibus oculis, & ore subidente. Pulsus erant paulo duriores, illæsa respiratio, & tota illa die excrementa retenta fuere. Post aliquam vero administrata remedia oculos movere iterum cepit mox & reliqua membra, tandem ad se reversus asseruit se nusquam præteritorum reminisci, nec ullum in accessione cognovisse, videri, aut audivisse, sicque duos sequentes transiegit dies, cum exigua febre, at non levi manuum & capitis imbecillitate; Die verò decima septima febris, & quarta ab accessione redit idem insuleus, ipso decumbente, cum iidem symptomatibus, quorum causa rursus accersiti, de agendis huic in modum sumus effati.

Affectus iste, in quo fit subita prehensio & occupatio tum mentis tum sensuum internorum & externorum, motusque voluntarii quæ Reverendiss. Pat. rigidus manet in eo statu quo prehensus fuit, apertis & immotis oculis statum alicujus instar, & nec sentit, nec videt, nec audit, sola respiratione & pullu illæsis manentibus, Catalepsis, siue Catochus proprius & exquisitus erit appellandus; dico proprius & exquisitus, nam catochum improprium & non exquisitum coma vigil nuncupavit Amatus Lusitanus, cum Hipp. nec non Doctissimus Laugius & Fernel. ipse cum Ætio, & Paulo, in quo rigiditas & insensibilitas nunquam observatur; exquisito catocho necessaria, cum ipsius essentia in tribus consistat, rigiditate corporis, pristinam figuram servantis, oculis semper apertis manentibus, & sensuum privatione. Ita rigidus, calamus adhuc manu tenens, mansit studiosus ille de quo Ferri. sicuti & Gal. condiscipulus. Oculis insuper apertis manent. Catocho detenti, utentis atque ideo comate vigili detentus fuit ille a Paulo descriptus, qui oculis clausis degebat, non autem catocho, sicut comatosus fuit ille quem refert Ætius, quia punctus membra retraxit; in quo præterea perfecta sensus privatio non adfuit, ut in catocho exquisito seu catalepsi.

Hujus affectus causa immediata spirituum immobilitas, rigiditati totius corporis juncta ob quam differt Catalepsis ab Ecstasi, in qua spirituum quidem immobilitas cum sensuum

caren-



mummiz, spermatis ceti an. 3ß. cum cerevisia butyrata calida propinavimus; mox ut sequentem potionem sumeret iussimus.

℞. Fenic. cum toto, scabios. rubiz tinct. caulium rubr. pariet. malv. cum rad. chærefol. fanicul. valerian. agrimon. bugul. & borrag. an. m. j. sem. nigell. (unicè confert ad casum ut experti sumus.) semin. anis. an. 3j. concisa & conquassata coque in cerevisia communi pro 1b. ij. colatura saccharo dulcoretur in qua puppa sequens pendeat.

℞. Mummiz, spermatis ceti, an. 3j. nuc. mosch. troch. alkekeng. sine opio an. 3ß. f. puppa exprimenda dum portio sumitur; decoctum aromatizetur, cum 3ij. cin. mom. bibat de eo bis in die hora sexta matutina, & hora quarta à meridie, quarto die ita eundem purgavimus.

℞. Fol. sen. 3ij. infund. in decoct. pectoral. 3v. adde elect. è succo rosarum, post sortem expressionem, 3jß. oxymel. 3v. mumm. nuc. mosch. an. f. portio. Deinde ad maiorem resolutionem inunximus hoc unguento.

℞. Unguenti de althæa 3ß. ol. chamæm. aneth. an. 3ij. m. quibus dolor sedatus est, & perfecte curatus fuit. *Petrus Forestus Observ. 29. lib. 6. Observ. Chirurg.*

#### Pro casu ab alto in quodam.

Hæc quæ sequuntur ex præscriptione Forencioz egregie contulerunt.

℞. Rhab. 3ij. rub. tinctor. gr. xv. cum vino stiptico, f. pilulæ, quibus utebatur in principio; postea in processu exhibeatur illi medicamentum sequens.

℞. Cassia rec. extract. 3vj. mummiz 3j. rub. tinctor. 3iß. rhab. el. 3j. pulverisanda pulveriscentur & dissolvantur cum cassia in decocto cicero rub. & fiat potus. Hic pulvis contra casum in usu est apud Colonenses cujus author fuit Zittardus, Medicus insignis.

℞. Mummiz, scabios. pilosell. hyperic. an. 3ß. costi dulcis & amari. nuc. mosch. an. 3iß. terra sigillat. bol. arm. an. 3iv. rub. tinct. rhapont. femin. nigell. an. 3vj. spermat. ceti, rhab. an. 3ij. agar. troch. cumini præpar. an. 3j. m. f. pulvis dosis est 3j.

*Elidam præceptor meus pro sanguine coagulato è corpore hominis expellendo, tum à percussione, & concussione; sequent. remedio utebatur.*

℞. Mummiz, rhab. el. an. 3j. rubiz tinct. 3ij. m. cum decocti pulli nigri 3ij. vel capiat cum aliqua aqua convenienti; at pulla nigra coqui debet cum penis & visceribus, eadem prius strangulata, nec aliter occidi debet: nam ita decoctia plurimum præstat in hoc affectu proprietate quadam occulta. *Petrus Forestus Observ. 31. & schol. lib. 6. Observ. Chirurg.*

#### Pro casu ex fenestra ad somnambulonem quendam.

Præmissa ventz-sectione & injecto clystere, ad sanguinem collectum dissolvendum & expellendum, exterius adhibui decoctum lactis cum meliloto, fl. chamæm. an. m. ij. mar. rhub. anthos an. m. ij. quod comprehensum

aliquot vesiculis bubulis, per vices calidum epithermatis loco partib. dolentibus applicare iussi. Interius diebus aliquot matutino tempore pianguedinem humanam (quam cum temporis à recenti corporis humani sectione copiosam in promptu habui) in iusculo cerevisiæ ad 3ß. exhibendam dedi quo remedio dolores & punctiones internæ leniebantur & sanguis concretus; ad exitum præparabatur, ita ut consequenter per tussim & scretum concreti sanguinis trulla copiosè latis, & cum facilitate rejicerentur. Post octiduum cum suspicio aderat de sanguine concreto, aliquoties pulverem ex iis quæ sanguinis grumos dissolvunt, ut sunt oculi cancri præp. rad. rub. tinct. spermat. ceti & similia, exhibui, & sudorem provocavi, & sic præter spem multorum intra 14. dies juvenis hic perfecte convalevit.

In hoc juvene observatione dignum, quod licet ex contiguatione domus tertia ad altitudinem 14. ulnarum deciderit, inventus tamen fuerit, quod ad membra externa omni ex parte illæsus, capite excepto, cui vulnus inflictum erat ad os usque bregmatis siue ossis & periotitii læsione. *Guil. Fabricius Hildanus, obs. 34. cent. 2. ex Epistola. Gregor. Harslii ad Hildanum.*

Mulier quædam ex altiori delapsa loco diu jacuit semimortua, tandem cum ad se rediisset, exhibui ante omnia contra sanguinem coagulatam hunc potum.

℞. Succ. cancri vivi contusi 3ß. vini albi 3iv. m. hæc potio expulit sanguinem coagulatam. Postero die ab assumpto potu, me jubente venam medianam secuit. Quarto à ventz-sectione die balneo aquæ dulcis chalibeatz usafuit, atque his paucis mox valere rectè cepit. *Martinus Rulandus cent. 5. curat. 12.*

Mulier quædam quinquagenaria ab equo sternace sub bigas lapsa rotis caput, pectus, totumque corpus miserè contudentibus deplorata videbatur. Ego advocatus, devote Deum implorans, talem medendi curam instituo.

Primo posthabitis omnibus saphænam secandam suavi mane dein sudorem hoc modo provocandum curavi.

℞. Vini mbræ stiptici 1b. 10. ros. rubr. succ. rosar. summitat. myrti, an. m. ij. f. decoctio in cacabo ad ignem. In hanc postea sindonem vel lintecolum immergebam; coque extremitate digitorum leviter expresso, ægram undique & calide, & optime involvebam; atque sic in lecto arctè contexta, diu multumque sudavit, in prandio & cena potus erat decoctum cærefolii cum saccharo. *Martinus Rulandus curat. 74. cent. 6.*

#### Gravi casus capitis absque ullo trepano sanatus.

Uxor L.O. Infortunio quodam in fulcrum incidit focarium, quod 25. libras pendebatur, quo ita læsit caput ut omnia deprehenderentur accidentia in tracturis crani observari solita: quare judicavit medici, chirurgique cerebrandum esse cranium, licet vulnus tantum cum contusione absque fractura, fissura aut depreffione ossis animadvertent, ideo statuerunt, requi-



requiri loci perforationem. Eam autem zgra admittere nequitiam volebat. At ecce! quarto decimo post lationem die, caput ejus, faciesque admodum timere, plurimisque hæc, ut & frons notari cepit hinc inde vesiculis. Atque ita dicta mulier absque trepano, sed nos absque auxilio divino, modo certe insolito, paulo post omnino fuit pristina restituta valetudini.

Vero simile est dictam materiam infernè sub cranio prodixisse. Quoniam enim nulla manifeste deprehendebatur fractura fissurave, necesse est, tenuis ille & serosus humor, per suturas aut sudationem, vel denique per occultam rimam extra cranium pervenerit.

Id ipsum autem per transudationem fieri posse multi testantur scriptores: ut *Thom. Bartholinus, Obser. cent. 2. hist. 41. pag. 214.* *Marcellus Donatus Med. historiar. Mirab. lib. 1. cap. 4. pag. 200.* *Wepferus pag. 38. lib. 1. Tulpium Obs. cap. 1. pag. 4.* qui etiam profert exemplum in quo innumera sanguinis guttae per calvariam, (quæ tamen integra erat quamvis aliquantum mutata colore, adeoque naturali soliditate parum debilitata,) erumpebant, instat roris universam calvariam cooperientes. Quibus spongia aliquoties deteris, repulularunt continuo & alia: monstraturæ velut nihil naturæ esse inivum; sed omnia pervia, neque ossa ulibi tam solida, quin per ea libere permeet, cum sanguis tum pus. *Galenus in librum 7. Hippoc. Aphor. 54.* hæc confirmat dicens arbitrari *Hippocratem, naturam semper, si robusta sit, materiam viam moliri & invenire, etiam si quam maxime crassa sit, & per exiles transitura inveni: quando per ossa etiam abscessu fieri dicat.*

sicut autem ab intra foras pus per calvariam, ita etiam contra facilius foris refudat in interiora. Hæc de re etiam videatur *Avicenna sen. 14. lib. 3. tractat. 4. cap. 5. ac Jacobus de Campo de signis commoti cerebri, & quo Marcellus Donatus Med. hist. mirab. lib. 5. pag. 200.* testatur contingere aliquando in capitis vulneribus non darilibetum saniei transitum per ipsum, & nusquam eo casu per porositates ossis refudare ad intra cranium, cujus rei testis est *Hippocrates lib. de vi n. cap. dum scribit vulnera in posteriore cranii parte reperta minus esse letalia, quoniam os propter crassitiem diuturniori tempore pus contrahit & ad cerebrum inferius et nudat.*

Petrus Marchettus celeberrimus Chirurgus polleaque Chirurgiæ Professor P. duæ obser. 12. pag. 24. ait se vidisse duo exempla vulnere capitis, ac contusionum absque fissura in quibus sine terebratione exibat pus, quoniam id per cranii poros, haud aliter, quam per cutem sudor, exibat: quamvis uterque hic æger, diutius dilata perforatione, postea decesserit.

Quare ille artem profluentes monet, si vulneratis medeantur, quorum symptomata arguunt, internas partes etiam læsas. ut in tempore trepano utantur. dictante etiam Hippocrate si quid movendum videtur principio move. Unde sequitur, si terebrandum, initio terebra. *Joan. Baptista de Lamzverde, Append. obser. pag. mihi 238. obs. 41.* duo similia vidit exempla, in quibus sanies pars quæ-

dam per cranii poros transudare conspiciebatur, hinc autem evacuationi dum quidam minimum fiderent, serò trepani opera accessit: subjecta enim sanies aliquando nimis copiosa, tardiorque est exoneratio unde tandem internæ corrumpuntur partes. Et licet frequenter trepanum fracto fissoque cranio utile sit, idem tamen quandoque, salvo etiam, atque integro cranio, adhibetur præsertim cum tumor est, ne intus vasa quædam rupta sint. Trepani enim ope non tantum sanguini effuso datur exitus verum ita etiam inflammationi, putrefactioni, delirio, febribus, aliisque letiferis accidentibus iter obviatur, quamquam hoc agendi modo artis Magistri sperata non semper assequantur, optime id ipsum ostendente *Tulpio obs. lib. 1. pag. mihi 3. & cap. 1. & c.* fieri non potest, ut materia quæ extra vasa sua fluxit, alio, quam quem ictus, casusve læsit, contineatur loco. Exempli gratia: si sinistram alicujus os parietale lædatur; sanguis in adversam partem repulso quodam potest effundi; licet falce à se invicem separentur bina hæc ossa; item: si ictus lapsusve frontem tangat, posteriore capitis parte potest manifestari sanguis quod sequenti probatum imus observatione

Continetur etiam quandoque humor qui effluxit, inter binas membranas, vel etiam sub pia matre; uti is ipse inter cerebri fissuram supra corpus callorum in ventriculis aliquoties apparuit locatus, cujus posterioris narrationem instituiam.

Aliquando etiam incerta sunt signa, quibus dignoscatur, ubi lateat quæ effluxit, nec loco suo contenta materia, quamvis ea plerumque si fractura, fissurave adsit sub eadem reperiatur, nonnunquam alibi simul; notante *Tulpio obs. lib. 1. cap. 1. pag. mihi 4.* Contingit enim sæpius (ac non semper) ut vi illa quæ sit loco plaga vel ictus (quamvis nulla fissura facturave adsit) sanguis extravasatus ibidem reperiatur, qui exitum non inveniens, ac proinde ibidem tractu temporis putrescens, pravorum sæpe symptomatum, nec non mortis interdum causa fuit.

Verum quidem est fieri aliquando, cum nec manifesta apertura cranii reperitur, virium robore subjectam exonerari materiam, sive id eo fiat modo de quo superiori observatione dictum, sive per nates, auresque, uti *Wepferus pag. mihi 22. ac Bartholinus cent. 2. hist. 4. pag. mihi 215.* pluresque testantur, vel, quia aliquando per collum ad pectus, ventremque defertur, atque illis abscessus causa est, quod *P. Marchettus obs. Med. Chirurg. 15. fol. mihi 35.* sæpius se expertum ait, ac *Jobus Mekerus obs. cap. 1. pag. mihi 28.* *Paræus lib. 10. cap. 8.* *Marcellus, Donatus lib. 5. cap. 4. pag. mihi 201.* nec non *Roonhufius part. 2. lib. 1. obs. 3. p. 190.* indicant. Qui vero viribus ægri cum internæ læsionis deprehendentur signa, solummodo fidere statuit, deceptum se sæpius sed serò dolebit. *Cornel. Sialpart. observat. varior. centur. 1. obs. 7.*



*Historia Casus ab alto Augustissimi Regis Daniae  
D. Christiani IV.*

Rex Daniae Christianus IV. 20. Julii ann. 1625. hora decima vespertina, ubi dispositas vigilias exploraret, in foveam secundum perpendicularum effossum 22. pedes profundam cum equo lapsus, & in dextrum latus prostratus diu jacuit inanimis sine loquela, sine sensu & ratione, & sanguis multus ex naribus & utraque aure fluxit. Medicus in loco venam aperuit. Ego vocatus 23. Jul. inveni valde debilem, qui neque loqui ipse posset, neque colloquia aliorum ferre, vix nosse me potuit, adspiciens tamen manum languide porrexit nihil locutus. Nullum tempus commodum à medicinis vacuum esse volui, & cum serius aliquanto accessissem, nihil potui nisi clysterem, eo ipso die adhibere; ex eo cum bis excrevisset, visus fuit aliquo modo melius habere, loquela tamen ignava & vix intellecta. Eodem die Balsamus inunctus est naribus, & auribus parum illitus, item spiritus cephalici inuncti vertici capitis, ubi futurae coeunt. Pulverem sternutatorium noluit admittere.

D. 24. Julii pulverem pro casu ad dissolvendum sanguinem dare volui cum aceto bezoartico, quem cum assumere recusaret, neque tamen quicquam temporis frustra praeterire sinerem, dedi ipsi pilulas 9. valde lenes, quae tamen ter alvum moverunt, & cum de pulvere ad casum, ut volebam, pomeridianis horis iterum quicquam sumere recusaret, propter periculum, quod erat in mora, iterum clysterem eodem die applicui, quem statim reddidit non sine fructu, adpersio capitis cum spiritibus cephalicis, & inunctio narium eo die non fuit neglecta, aqua etiam pro collutione oris unius est.

D. 25. Julii summo mane sub diluculum iter Verdam ingressi sumus; & tum Rex in monasterio Mollebeck pransus est, & eo prandio sua manu bis mihi cibum porrexit. Inde perreximus & pervenimus in pagum Reemer, hic sumpsit cochlear aquae bezoarticae, & caput inunxit, inde Pereterfagium.

D. 26. Julii & 27. tria cochlearia aquae bezoarticae sumpsit; & capitis verticem spiritibus cephalicis inunxit, & os colluit cum aqua destinata, quod ut vesperi, cum Hoiam appulissemus, faceret, impetrare non potui, quemadmodum neque matutinis horis diei sequentis, cum inde Verdam proficisceremur. Eo cum pervenissemus, statim appositus est clyster, quem addita hiera fortiores reddidi, ex eo clystere magnam excrementorum copiam exclusit, & commode habuit, ita ut me post rejectum clysterem ad se vocaret, & per horam dimidiam tam bene, tam articulate & tam prudenter, ut post hunc lapsum unquam mecum de multis rebus consuleret. Vesperi sub decubitum facta est inunctio ex unguento Hamelae praescripto, & adpersio verticis cum spiritibus.

Subsequenti die 29 sumpsit potionem ex rhabbaro, ex qua parum deiecit, quocirca sub vesperam iterum clyster injectus est qui cum fratre, quod reliquum erat, exclusit, unde Rex

iterum bene habuit. Usus est etiam eo die pulvere sternutatorio, ex quo capitis levamentum sensit, ita ut postero cupiverint adstantes iterum adhiberi, quod factum est, cum prius pulverem A.C. cum Aqua Bezoartica sumisset, & caput lavisset cum lixivio n. edicato & sapone odorato. Inde ex pulvere cum irrosciam nonnullam Rex sese percepisse austriore vultu indicasset, adstantes prope me & medicamenta, quorum tamen utilitatem ante peripexerant torvo vultu miculare videbantur. Verum Rex sub prandium hilaris fuit & multa locutus est modo de his, modo de illis, cumque pridie & postridie calidiores potum bibisset, circa vesperam praecedentibus duobus diebus capitis gravamentum sensit, & noctem inquietiorem habuit, absque ullo tamen calore praeternaturali. Alioquin tum propter curam procrastinationem, tum propter calidiores potum, alium & iterum irroscias vix fieri potuit, quin in tanto casu corpus à malo, & cerebrum ab inflammatione defenderetur. Sub ingressum lecti fomento pro oculo & linimento est usus.

D. 31. Julii sumpsit 3v. gelatin. ribium, hora tertia pomeridiana de Electuario confortante sumpsit, hora quarta ablutio facta est capitis, & adpersio spirituum cephalicorum, caput detersum est linteis calidis & pulvere praescripto infumatis. Hoc die mentis aliqualis fuit error & hallucinatio; nam quoniam urbs in qua erat, interrogavit inter cernendum, tamen satis rationaliter locutus fuit. Circa tempus decubitus & dorsum inunctum est, & ea nocte bene dormivit.

D. 1. August. Rex ipse medicamenta flagitavit, dedi ipsi pulverem ad casum quantum ter cuspide cultelli capere potuit, & statim bibere jussi aquae bezoarticae 3iij. caput spiritibus cephalicis irroratum, & dorsum inunctum. Hoc die cum multa adversa nunciarentur, aliquanto perturbatiori animo visus fuit, inter prandium hallucinari visus est, hora octava pomeridiana injectus est consuetus clyster, quem brevissimo tempore retinuit, post multa excrevit. itaque de electuario cephalico dedi, nasalium admittere noluit, dorsum tamen inungi passus est, dormivit nocte, neque quicquam absurdi locutus est.

D. 2. Aug. assumpsit 3v. gelatin. ribium, aqua praescripta os colluit, pulvis capiti inspersus est, nasalium autem admittere noluit. Post meridiem dedi de electuario, caput lotum, spiritibus adpersum, iterum tentata nasalium & leniter. Vesperi hora octava dorsum inunctum, & caput spiritibus irroratum est, post decubuit. Hodie cum mentis hallucinatio & capitis aggravatio pertinacius haereat, necum cancellario ostendi. Hac nocte bene dormivit, sed somnia habuit turbata; unde caput adhuc praegravatum potuit conjici.

D. 3. Aug. propinavi pulverem A.C. cum aqua bezoartica, pulverem capiti inspersi, in prandio satis prudenter locutus est, vesperi hora tertia caput lotum est, spiritibus cephalicis irroratum & pulvere adpersum.

D. 4. Aug. potionem ex Rhabarb. sumpsit, & tertia pomeridiana electuarium, caput lotum est, & irroratum, noctu dorsum inunctum.

D. 5. Aug.



D. 5. Aug. pulverem ad casum cum aqua bezoartica sumit, adpersus est pulvere; hora octava caput lotum, spiritibus inunctum, & nuchæ, scapulisque quatuor cucurbitulæ scarificatæ appositæ & dorsum oleis præscriptis primum inunctum, & unguentum prius abdicatum.

D. 6. Aug. Gelatina ribium sumta, à meridie electuarius confortans.

D. 7. Aug. sumpsit pulverem A. C. cum aqua bezoartica, caput lotum, spiritibus irritatum, dorsum inunctum oleis, cucurbitulæ siccæ adhibitz, & pulvis sternutatorius in nares insufflatus. Pomeridiana tertia sumit electuarius, circa somnum dorsum inunctum est.

D. 8. Aug. Mane Vestimenta induit, pulverem A. C. sumit cum aqua bezoartica, deinde exercitum visitavit.

D. 9. Aug. iunxit potionem ex rhabarb.

D. 10. Aug. pulverem A. C. cum aqua bezoartica, caput lotum spiritibus inunctum.

D. 11. Aug. clyster. conuetus appositus est, cucurbitulæ siccæ dorso fuerunt appositæ, & sic perreximus in alterno usu clysterum, purgationum, pulveris A. C. cum aqua bezoartica, inunctionum, cucurbitularum & reliquorum, quorum antea facta est mentio, usque ad 18. diem Augusti, morbi autem diem 35. ubi bene valere visus, & Arnisem advenit, neque quicquam incommodi sensit.

#### Medicamenta Regi Præscripta.

℞. Aloes insuccat. ʒvj. Pilul. de Rhab. ʒss. extr. hellebori nigri panchymag. Croll. cor. an. ʒj. Mumiz ʒj. Castor. ʒij. Diagrid. ʒj. ol. carv. cinam. an. gutt. vj. cum aq. cinam. f. Pilula ex ʒxv.

℞. Gelatin. rib. l. xat. lbij.

℞. Aq. apoplect. L. aug. ʒvj. Spir. sulph. ur. ʒj. Syrup. de chichor. ʒj.

℞. Ol. rut. dest. carv. an. ʒj. caryophyl. ʒj. ʒ. lavend. ʒss. nuc. mosch. expr. q. l. f. Balsamus

℞. Acet. Bezoart. lbij. Aq. Theriacal. ʒij. spir. cassia. ʒss. Syrup. de cinamom. de acetosil. Limon. de eupator an. ʒss. spir. sulphur. acid. ʒij.

℞. Ungu. potabil. ʒvj.

℞. Ocul. cancr. præp. ʒj. succin. alb. præp. ʒij. rad. tormentill. vincetox. rub. an. ʒj. Lap. bezoar. ʒss. cinamom. ʒj. terr. sigill. v. bol. Armen. an. ʒj. sacch. ex julep. rosar. caudisat. ʒj. f. pulvis A. C.

℞. Rad. Irid. flor. calam. arom. pyreth. angelic. men. an. ʒj. fol. ros. marin. salv. an. ʒss. flor. lavend. p. ij. pæon. primul. ver. an. p. j. sem. rut. bacc. laur. exs. an. ʒss. aq. destill. salv. ʒss. rut. lavendul. an. ʒij. Acet. vin. acerrim. ʒij. stent in infus. per horas 2. postea balneo fervescunt & colentur, colaturæ add. mell. anthosil. ʒj. oxymel. scillit. ʒss. spirit. vitriol. ʒj. M.

℞. Rad. althææ, gentian. helleb. nigr. præp. an. ʒj. Herb. hyssop. beton. majoran. mell. an. m. ʒss. flor. chamomill. Rom. p. ij. bacc. laur. ʒss. Coq. in aq. font. & in fin. add. vini tertiam partem, colaturæ.

℞. ʒx. add. confect. Hamech. Diaturbith-

c. rhab. an. ʒij. mell. anthosil. ʒj. f. clyster.

℞. Elect. diaturb. c. rhab. diaprun. hamech. mell. mercurial. anthosil. an. ʒss. rosar. ʒij. M.

℞. Conserv. rad. cichor. scorzon. an. ʒj. majoran. ʒss. Veron. marrub. an. ʒij. rut. ʒj. flor. ros. marin. lavend. an. ʒj. nuc. iudic. ʒvj. myrobal. emblic. ʒss. conserv. flor. rosar. rubr. ʒij. conf. Alkerm. ʒij. spirit. Vitriol. ʒss. Syrup. d. cinam. f. m. f. Electuarius.

℞. Rhabarb. ʒij. fol. sen. ʒj. Turpeth. ʒj. passul. Corinth. ʒj. spic. ʒss. sem. fenic. ʒj. aq. endiv. fragar. an. ʒss. Acet. flor. salv. ʒss. infund. & col. colaturæ adde Syrup. diafer. ʒvj.

℞. Rad. aristol. ros. v. gentian. an. ʒss. costi ʒij. Herb. majoran. rut. salv. an. m. j. flor. chamomil. strachad. an. m. ʒss. scob. Ligu. cassia. ʒss. bacc. laur. exs. ʒvj. agaric. crud. ʒvj. fol. laur. ʒss. nuc. moschat. ʒij. incisa D.

℞. Sapon. venet. ʒij. agaric. crud. ʒij. cinam. caryophyl. an. ʒss. rad. irid. flor. ʒij. camph. ʒss. mosch. anibr. an. ʒss. cum aq. majoran. & lavend. formentur globuli pondere ʒij. s. sapo odoratus.

℞. Tartar. vin. ʒss. litharg. ʒss. alum. ʒij. sal. commun. ʒss. aqu. lontan. pur. lbij. solan. plantag. an. lbj. acet. vin. acerr. lbj. m. & coq. in vase clauso, neque aperiatur vas, antequam refrigeretur, tum transeoletur.

℞. Gum. elem. anim. an. ʒij. Mastich. thur. an. ʒss. caran. litrac. an. ʒvj. fol. ros. marin. salv. majoran. an. ʒj. m. f. pulv. pro fumo.

℞. Rad. Irid. flor. ʒij. lign. Rhod. aloes an. ʒss. cassia. ʒss. fol. ros. mar. majoran. an. ʒj. flor. lavend. p. ij. gum. anim. tacamah. an. ʒij. Syrac. calam. oliban. an. ʒj. f. pulvis deinde.

℞. Mosch. Zibeth. ambr. an. ʒj. m. & diluantur accurate in aq. cinam. & lavendul. an. ʒss. postea misc. cum pulv. iterumque exticcetur.

℞. Cort. limon. exticc. ʒj. rad. irid. nor. ʒij. calam. arom. pimpinel. enul. an. ʒj. turpeth. el. ʒj. fol. ros. marin. salv. an. ʒj. scob. lign. cassia. ʒij. santal. rubr. agalloch. an. ʒj. sem. carv. ʒij. fl. caryoph. hortens. rosar. rubr. an. p. i. passul. corinth. ʒss. vin. rhenan. lbij. spir. vitriol. ʒj. infund. & add. zingib. ʒss. cardamon. ʒvj. caryophyll. cinam. an. ʒss. sacchari lbij. f. decoctum.

℞. Spir. salv. chamomill. R. calam. arom. hyss. an. ʒj. aq. carbuncul. ʒvj. m.

℞. Ol. arthrit. ʒss. terebinth. ʒss. chamomil. dest. ʒj. majoran. salv. rut. an. ʒss. M.

℞. Spirit. rut. majoran. lil. convall. an. ʒss. cinam. ʒss. M. s. spiritus cephalic.

℞. Radic. hellebori albi, pyreth. an. ʒij. h. majoran. tabaci an. ʒij. semin. rutæ Itaphisage. an. ʒj. euphorb. ʒss. m. f. pulvis. *Thomas Bartholini.*

#### Varia cadentium fortuna.

Tralatitium est & vulgo etiam compertum homines nonnunquam cadentes ex edito loco non lædi, sive si id angelorum custodia (quod malim credere) adscribas, sive corporis positioni inter cadendum fortunatiori. Talis mihi cognitus, qui puer ex alta turri in faxeum stratum præcipitatus, postquam se ca-



dens pedibus excepisset, nullum damnum sensit, nisi calopodiorum ligneorum, quibus pedes munierat, fracturam. Libuit tum experiri, si oculis ejus verumne esset, quod vulgò jactari solet ælurum, quomodocumque cadat, semper ita se in medio periculo gubernare, ut terram attingens insiliat pedibus. Projectus ergo è fastigio turris in ipso lapsu varie gyrabatur, nonnunquam pronus, aliquando supinus, sed ubi ad pavementum allieit, in pedes erectus subito cursu profugere nitebatur, & currebat strenue ad teli jactum, mox in ipso cursu mortuus dirigit, cerebro, opinor, ex illo lapsu nimium concusso. Altioris est indaginis, quod Sevenhulz in Hollandia quorannis accidit, & mihi bis spectatum est. Nemus ibi surgit modicum, sed in quo plurimæ arbores volucrum nidis occupantur, succedentibus sibi in iisdem cubilibus, varii generis alitibus; de quo plura *Heginitius* in Itinerario Hollandiæ. Conceileranius istuc aliquot anuci eo tempore, quo corvi aquatici in nidis imperium exercent, non plane implumes, sed nondum volucres. Igitur præmonstrator noster ut artificium capturæ ostenderet, contum altero extremo recurvum arborum unius sic satis proceræ, sed trunci tenuioris impingit, & varie agitando, succutiendoque duos corvos plumatos quidem, sed alis suis nondum tidentes nido excutit. Illi qui aquarum naturam experti nunquam fuerant, in medio lapsu dum superficiem aquæ (suberat enim rivus, in quem decidebant) attingunt, tanta sagacitate immergunt se undis, ut cum tres famuli altarent, omnes itidem sudibus longis armati, ut decedentes interimerent, ictus eorum diu eluserint, alio scilicet margine rivi emergentes, quam quo in eadem parati excubabant. Dixiles volucres has, & vix bimestres, in illo foro evadendi pericula, pluribus annis dexterrime spectatas fuisse, ita nulla esse potuit matrum solertia prudentior. Id quod mea quidem sententia, satis evidenter docuerit notiones quasdam fortibus animalium ingenerari, sine prævio genitorum magisterio; neque enim hi, ut ita dicam, corvuli, imperiti rerum & experimentis imbuti nullis, nec a nido in terram prospectare docti (tantum abest ut assueti lymphis fuerint) hos omnes cursus, recursusque, has è periculis intentatis exeundi technas scivissent, nisi ab innato emanassent principio. Quæ & anatum ova gallinis incubantibus supposita attestantur idem: exclusi enim hi anatum pulli & gallinaceis permixti, ubi ad fluvium veniunt, statim, nullo nisi utetino doctore, aquas ingrediuntur, natant, lumenta quarunt, stupente veluti gallina, pullorum quos suos æstimat, degenerem indoleant. At hi pulli matrem viderunt nunquam. Hæc eo tendunt, ut si notiones suas claras, distinctasque ab ovo secunferant volucres, majorem utique prærogativam largiamur animæ humanæ (ut cunque suas alioquin tenebras agnoscat) nec enim vel existimemus tabulam rasam esse, generalem vel regulam; nihil esse in intellectu, quod non antefuerit in sensibus. Sed ad cadentes iterum: Alius è scopulo Stephanite ad trecentos pedes in præceps per infortunium actus, piscatorem in subjectis undis cymbulæ suæ iuharefcentem subito lapsu exaudivit, ipse salvus. Sacerdos quidam

Hafniensis fallente vestigio è scalis suis proruens in filiam advolantem caput impegit elisurus haud dubie calvariam, nisi ex improviso adlitisset virguncula. Verum superat hæc omnia fatum dvecanzæ foeminae, quæ mense Augusto hujus anni, ex incensa a nostris ad Calmarniam bellica hostium nave (cui a clave nomen) in sublime ultra centum pedes cum infante, quem ulnis retinebat rapta, delatigante simul omni tormentorum pulvere, in mare inter medios ignes salva procidit, puerulo suo comitata, & a nostris excepta. Olandiæ suæ reddita est, ut facti sui lusum, & nostrorum misericordiam evulgaret. *Olai Borrichii.*

#### De lapsu ex alto indemni.

Fieri miracula in Medicina, non *Avicenna* solum, sed ipsa experientia dicat. Occurrunt exempla *ἰασηται ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ, καὶ μὴ θνήσκουσιν*, quibus sapienter numero *ἰσχυρὸν* subesse, nemo nisi atheus negaverit.

I. F. Evvaldi, Civis & Pannificis h. l. filiolus trium annorum 1669. d. 25. Jul. in avi sui domus secunda contignatione, circa fenestram insu occupatus, & e scamno pronus in plateam lapidibus ubique stratam despiciens, pondere superioris corporis extra librato & declinante, præcipiti in caput lapsu decidebat, 17. pedum altitudine. Vocati cum binis chirurgis in consilium invenimus infantem præter solum ploratum, alias optime habentem, nulla cutis læsio, nullus tumor, nulla cruentatio apparebat. Quare uternè Pulverem Cephalicum bis terve propinavimus, externe verò sacculo ex plantis cephalicis interpassato, & vino incocto caput fovimus, hunc en plastro de Betonica imposito intra triduum omne negotium absolvimus, ipso interim puello assiduò bene habente, qui & hunc usque in diem quam optime valet.

Verum quidem est rotundam figuram esse omnium perfectissimam, quæ ubique se sustinet, & contra externarum injuriarum impetum particulis & nexibus quasi concatenatis armat, nullibi facile admittens aditum, & hinc capitis sphaera non aque fracturæ, aliisq; injuriis subiacet, quod ob hanc ipsam causam natura (quæ *Galeno* teste, nullam partem reliquit *ἀσπέρων* in *ἰσχυρὴν*, contra injurias non bene munitam) tali donavit figura, ut durum oporteat esse ictum, qui respectu harum partium, Oseum hunc fortuitem pertransire valeat. Nihilominus pium & christianum est, divinum hic agnoscere munus, quæ teneros potissimum & molles infantes protegit, & Angelis tutelariis ubique sepit, ut ex dæris latius deduci posset, nisi talem in alieni mellei immittere dubitarem. *Georg. Wolff. Wetzli.*

#### Ex lapsu alius.

Civis quidam noster (cujus nomini parco, quod inter nos hodieque sanus, & bene habitus vivat) itinere Helsingoræ instituto, per aurigæ incuriam, everso curru in saxum impingit, inter cætera, quam vehementissimè sinistrum testiculum jam ante per sedecim annos scirrhus, & timore præter naturam obsessum. Delatus



tus mox in hanc urbem, præter dolorem partium contusæ febris corripitur & quidem continuâ. Cui ut malo obviam maturè iretur, rogatus cataplasmatibus partem affectam foveri iubeo, & febris pharmacorum oppono solemniter. Duravit morbi & medicaminum conflictus mensem propemodum integrum, donec natura victrix & scirrhum sustulit, & contusione immani præmollium, & natam ex dolore febrem extinxit. *Olai Borrachii.*

*Ex casu contusio maxilla, vomitus, febris cum delirio & sopore, sinistri lateris motus convulsivi. &c.*

Puerulus 4. circiter annorum. Vegetus ac vivax, cum aliquando curram imprudens conscenderet, cum fraterculo, de eodem in terram præceps con. idit, ita quidem ut maxilla dextra inde præcipue contusa fuerit, capite aliisque partibus immixtis: nihil quoque sanguinolenti vel per os expuit, ut per nates excrevit: Parentes mali subitescens infans, externè remediis domesticis contusioni obviamiverunt, aliquot autem diebus post, ægrotulo cibum renuente, imo, si quid iniecerat, mox evomente, graviora subveriti conveniunt nos die 14. Maii 1683. conquesti de imbecillitate ventriculi, qua filiolus laboret, cui Diaph. marr. C.C. philos. ppt. ungu. alc. aliisque his similibus prospectum ivimus: Iriduo post ingruentibus, nausea, vomitu, siti intensa & inquietudine apud misellum ut accederemus ipsi petierunt, simulque quid mali nuper acciderit retulerunt; pulsus celer erat & frequens, urina saturata: interne pro resolvendo & discutiendo sanguine grumescente, usi fuimus cinnab. antim. recit. ant. diaphor. cum spir. urin. addit. aq. destill. externe vero Balsam. de Peru cum ol. destill. menth. ventriculum inunximus: sub vesper. symptomatibus persistentibus, mixtur. ex autepil. diaphoret. per cochlearia sapius propinandum suavisimus, cui d. seq. febris augmentum fumentem misceimus spir. C.C. addito Epithemate cum spirituosius penetrantibus, quo caput subinde foveatur: postero die pulsus celer erat & inæqualis, intermittens; Urgebat sopor profundus cum delirio: exasperatus statim obdormiit, sinistro latere immobili, adinstar trunci existente: de abscessu subitescente Parentibus suspicionem nostram aperuimus: vesicatoria inde applicari iussimus, ad quæ ipsi prorsus obmutuerunt, abrais capillis, sacculos ex herbis aromaticis cephalicis, hinc & columbam vivam per medium lectam imponi curavimus, pergendo juxta in internis: vesperi reduces in copioso sudore ægrum offendimus, sed citra æquum pulsus natutino similis: delirabat & vigilans tortis oculis adstantes salutabat: Clyster injectus à quo materiam satis graveolentem sed parce deiecit: nox subsequens inquieta fuit ægerque dentibus stridere capit: Vesicatoria demceps imperata, præscripta vero Emulsio in 2. Dos. ex denun. card. benedict. aquileg. cucurb. cum aq. scabios. beton. add. C. C. Philos. ppt. qua rursus idoneum sudorem excitavimus, sed citra ulterius emolumentum: Mane quippe postero motus convulsivi invaserunt, qui paulatim increbuerunt &

misellum die sequente morti tradiderunt: incasum adhibitis ante-pilept. internis & externis.

Sectione, quæ haud dubiè prædictiones nostræ obfirmatæ fuissent, ob alterius parentis rusticitatem prohibiti fuimus. *Joh. Jacob. Harderus Aptarii Observ. 31.*

### *Anatomica inspectiones.*

*Ex casu, capitis contusio, apoplexia &c.*

Anno 1674. mense Janu. r. Molitor quidam transhenanus, ubi prius haccho aliquantum induserat de scalis ex alto de. idit, domumque vectus mox instar statui sine sensu & motu jacuit, vomuit enormiter & sanguinis per aures eruptionem passus est, vulnere in cranio nullo apparente; die postero hinc emigravit. Cranio ex artis præscripto remoto, sanguis inter ipsum & duram matrem copiose in occipite extravasatus deprehendebatur & tota sui mole cerebellum versus & spinalem medullam procumbere. *Joh. Jac. Harderus Aptarii Observ. 31.*

Vir quadragenario major in vicinia, die 24. Janu. rii anni 1692 e sublimiori loco procedebat, & c. put in saxa quibus strata erat in quam decidebat platea, tam vehementer alidebat, ut inde non parvum vulnus effectum sit. Chirurgi adstantes cum viderent magnam contusionem, incisionem per illius longitudinis majorem partem ex arte deducunt, venæ sectione etiam prius celebrata, sed nihil amplius in diem usque 27. prædicti mensis tentare ausi sunt; quo tempore cum Chirurgo dexterrimo J. J. Coudougnant advocatus, febris satis intensa & phrenetica quasi atrectione vulneratum laborare vidimus, tum explorato vulnere, cum de extracto cranio nobis constitisset, dilatata quantum necessarium fuit incisione, trepanum sequenti die applicandum decrevimus, quod etiam tactum cum tanta sanguinis per foramen a trepano confectum evacuatione, ut ad libras ad minimum duas assurgeret, metumque nobis incuteret subita mortis tam larga hemorrhagia, res tamen in melius abire vix sunt postea, ita ut æger noster & cum ratione loqui, & alimenta assumere, imò febris remittere jam non parum inciperet, cum nescio quo fato omnia in pejus ruere subito ceperunt die prima februarii, eaque ipsa die Caroticus obiit. Cranio elevato, vidimus fracturam non tantum per totam longitudinem ossis bregmaticæ dextræ, sed etiam ultra suturam lambdoideam ad ipsum os occipitale extendi; duram præterea & piam meningem in toto illo cerebri hemisphere quasi putridam, imò cerebrum ipsum intra usque ventriculos sphacelo prope affectum & prorsus diffuens reperimus. Unde mirari subit quomodo vulneratus hic in tanta cerebri, & commotione & contusione, quam corruptio prædicta subsequuta est, etiam si trepano exitum sanguini effuso pro viribus parassemus, nec paralyticum, nec convulsivum quid passus fuerit, imò a trepano applicito ad interrogata sine delirio responderit, donec parum ante fatalem horam Caro lethali affectus fuerit.



## CATAGMA

Vid.

## FRACTURA.

## CATALEPSIS.

**C**atalepsis, aliis *Catoche*, *Prehensio*, & *Con-*  
*gelatio* est affectus in quo acri rigidi, &  
 quasi congelati corporis situm servant in quo  
 erant cum ipso corripenterent: immotis autem  
 & apertis plerumque sunt oculis, motu &  
 sensu destituti. Affectus hic ita rarus est ut  
 unicam ejus historiam proponat Galenus, duas  
 verò Iernelius, alii sc. Skenkius, Forestus,  
 Tulpus alias itidem habent. Nos aliquoties  
 hunc affectum vidimus, sed non legitimum, &  
 subitoprehendentem, qualis fuit ille quo corri-  
 piebatur Galeni condiscipulus dum studiis at-  
 tentius incumbere; sed febris vel continua vel  
 intermittens peioris notæ semper fuit factus  
 & proles. Illius à mensibus retentis orti hanc  
 habet descriptionem Clar. Diemerbroekius.  
 Domicella 10. annorum ob menses parcius  
 fluentes uterinis suffocationibus subinde obno-  
 xia, his diebus subito prehensa omnis sensus  
 expers remansit, & in illo, quo prehensa fuit,  
 corporis situ, obriguit, oculos apertos ac  
 fixos detinens, nihil tamen videns. Si aditan-  
 tes brachium illius sursum, deorsum, vel ad  
 latus deflecterent, illud in tali situ remanebat.  
 Si agram in pedes deponerent, stabat; si cor-  
 pus impellerent, pedem movebat. Respi-  
 ratio autem libera persilabat. Cum hic paro-  
 xysmus per horam durasset, tandem ad se re-  
 duit agra immemor omnium quæ ipsi contige-  
 rant. Post bidduum simili paroxysmo de no-  
 vo detenta fuit, qui etiam sponte cessavit. Sic  
 unus ex illis quem vidit Iernelius è lectulo su-  
 blatus cum inspiratione facili, solus consi-  
 stebat, quicquid in os inferebatur promptè  
 vorabat, impulsus incedebat, & quocunque vel  
 manus, vel brachium, vel crus indexteretur,  
 illic quasi fixum & stabile permanebat. Expres-  
 sam quandam, addit, dixisses larvam, aut arte  
 progredientem statum.

Partem affectam in hocce affectu cerebrum  
 esse, aut potius spiritus animales, nemo mu-  
 ctias iverit, atque eo potissimum quod Galenus  
 eum viderit à nimia attentione, spirituumque de-  
 fatigatione in libris pervolvendis & perlegendis  
 in suo condiscipulo natum. Forlitim aliquando,  
 ut in casu è Diemerbroekio allato, ut & in aliis à  
 nobis ipsis observatis, somes morbi alibi nidu-  
 lans in cerebrum emittit materiam qua spiritus  
 torpore corripantur & quasi congelentur; sed  
 non minus propterea cerebrum aut spiritus  
 ejusdem incolas affici dicis, aut minus exige-  
 re remedia quibus excitentur, & excutiantur  
 copula illa heterogenea moribus per eosdem  
 peragendis adeò infensa, & ipsi cerebro &  
 nervis, ut quibusdam placet, quasi impacta.

E supra dictis satis explicatur morbi istius  
 diagnosi ut & ejusdem ab aliis capitis affe-  
 ctibus differentia; unde non opus est illis enar-  
 randis ulterius immoremur.

Causam quod spectat, eam exquirendam

cum Galeno non credimus in frigida cerebri  
 intemperie, nervos constipante & congelante,  
 talem enim intemperiem in subiecto vivente non  
 opinamur possibilem. Sennerti spiritus conge-  
 lans verbatantum & voces nihil amplius con-  
 tinet, quamvis exemplo fulminis aut ignitus  
 ab eodem profecti, atque homines aliquando  
 congelantis, illum illustrare conetur. Symp-  
 tomata, analogia illi quæ e spiritu vini &  
 urinae invicem minus oritur, pluribus nomi-  
 bus non arridet, primo quod tales humores in  
 cerebro vix, imò nunquam reperiuntur, qui  
 tamen pro morbo isto faciundo per totum hoc  
 viscus & in omnes nervorum origines subito  
 effundi deberent. Secundo quia etiam date-  
 tur, similes humores in cerebro nati, velum  
 illud aliunde elevati, non sic omnis spirituum  
 animalium vis hebetaretur, nam e mulcella spi-  
 ritus vini & urinae quod precipitatur penetran-  
 tissimum est & ad minimum calorem prævolati-  
 litate sublimatur, quod verò liquidum perlat,  
 quamvis corpus multum, non est minus mobi-  
 le, aut viis sibi per nervorum canaliculos re-  
 ferendis aptum. Superest igitur, ut multis aliis  
 aliorum sententiis de Catalepticos causa, ad  
 eam quam legitimam credimus continuo ve-  
 niamus. Morbus autem hic cum melancholicis  
 & iis qui assiduo disciplinarum studio se fa-  
 tigant potius quam aliis sit familiaris, non in-  
 congrue pronuntiabimus illum de genere ex-  
 staticorum affectuum esse. Sic ipsius ideam  
 imitabatur Socrates, qui referente Cello se se  
 exercens in vestigiis patientiæ perarans atque  
 pernox, ab altero solis ortu ad alterum orien-  
 tem cogitabundus, & immobilis perstabat. Si  
 itaque dispositio melancholica in qua spiritus  
 pauci dantur, iique ad voluntatem minus mo-  
 biles, concomitetur attentionem & contem-  
 plationem illam fixam à studiis, vel aliunde  
 ortam, in ea attentione procul dubio parcius  
 spirituum copia in cerebro ad motus voluntari-  
 os peragendos degens tota impendetur; sic-  
 que revera animalium spirituum pars perexi-  
 gua in tota nervorum longitudine, ut & fibris  
 muscularibus existens moribus naturalibus ad  
 tempus continuandis par erit, ut & ipsis moti-  
 bus etiam voluntariis ad externam impulsio-  
 nem peragendis; sed si diuturnior foret affe-  
 ctus, atque anima unionis cum corpore quasi  
 oblita spiritus in cerebro longius detineret,  
 tandem membra omnia ac viscera auxilio  
 tam benecæ defraudata, conciderent, san-  
 guinis circuitus & immineretur, & periret,  
 unde mors prompta expectanda foret. Quod  
 autem obijciatur ex Diemerbroekio, sc. quod  
 anima in hocce affectu omnium oblita, con-  
 templationis conspiciam in qua attentionem  
 tam fixam adhibuerit omnino sit immemor, à  
 nostra nobis sententia minime dimoveri, nam  
 præterquam quod illud ex unica tantum aucto-  
 ritate ab Autore prænominato allata colligi po-  
 test, scilicet eveniet ut spiritus post longio-  
 rem defatigationem, indeque factam absorp-  
 tionem attoniti permaneant, nec tunc in ce-  
 rebro ad tempus non aperiant per quos me-  
 moriam præteritorum resuscitent, aut præsentis  
 meditationis, ideam imprimant.

Prognosis non æque periculosa ac in Apo-  
 plexia, in quam, tamen hic affectus si longius  
 pro-



protrahatur facillimè degenerat. Si malum non sit idiopathicum, si ejus causa in cerebro non nascatur, sed eo aliunde feratur, si sponte & per spirituum vitium subito non adveniat, si invasiones sunt breviores, aut earum recursus non sit nimium frequens, facilius dispellitur: Sin minus periculo eoque etiam gravissimo non vacat.

Indicationes sunt cerebri corroboratio, spirituum excitatio, attentionisque & contemplationis nimium defatigantis, & longius protractæ, abstinencia. Duxbas prioribus potissimum providetur volatilibus aliisque in capitis morbis, remediis recensendis, tertiæ, eique sane præcipuæ, potissimum medetur ratio, quæ hocce in negotio Medicinæ utrique, sc. Galenicæ & Chymicæ, prævalet.

### Curationes, Consultationes, Observationes & Anatomica inspectiones ex variis.

#### Curationes.

Curatio Catalepsis duplex instituenda est: una in Paroxismo, altera extra proximum, in Paroxismo ad ægrum excitandum conveniunt ea remedia quæ in soporosis affectibus descripta sunt. Extra Paroxysmum curatio melancholicæ hic omnino conveniet, si catochus ab humore aut vapore melancholico generetur quæ quidem causa frequentissima est. Si autem frigida intemperies sola, à causa externa, vel interna producta huic malo originem dederit: quæ illam emendant remedia e capite primo hujus libri erunt depromenda, ac denique si copia sanguinis hunc affectum generet, vel foveat, illius immunatio per venæ sectionem erit consentanea.

Victus ratio calefaciens & humectans præscribenda erit, sicut in affectibus ab humore melancholico oriundis. *Lucar. Riverius Praxios, Med. lib. 1. cap. 4.*

Quoniam catalepsis n. orbus rarissimus esse solet, alto silentio scriptores curationem præterire contenti solummodo generaliora præscribere, communia his, quæ ad Epilepsiam referuntur. Sed & Sylvius conferentia solum autumant sale volatili actiori prædita. Quendam mihi aliquando contigit observare qui levamen maximum persensit, (cum nihil per os assumere posset) à balneis ex chanaræ oleo, somnigræco, anetho, malva; althea, meliloto, seminibus lini, additis salvia, betonica, nicotiana itemque linimentis ex Galbano Paracelsi, essentia lavendulæ, Oleo nucis myristicæ, & ceræ. Capucinus catalepticus relat. ab Henrico Heers his remediis curatus fertur. Primum, glande acri alius soluta est, unde membra movit, surrexit & ambulavit; omnium præteritorum tamen immemor. Tum fricatis naribus ex ptarmico potentissimo sæpe sternuit mucumque excrevit simile glaciæ, deinde ingressus laconicum flatus discutientia assumpsit. Postmodum ab usu clysteris validissimi, & cathartici purgatus est; atque insuper decocto herbarum capitalium, cerebelli regio, & universa spina tota est ac convenientibus oleis inuncta: Pro potu hydromel dilutissimum, in quo sassafras, toniculum, & anisum ebullierat, ebibit, ad-

misto vino fulvo: Ac tandem in dies exhibitum fuit conditum ex electuariis, acori, strachados nucis myristicæ, zingiberis cum Theriaca & confectioe pliris arconticon; seque in posterrum, cum malum persentiret, oleo calido toti spinæ affricto à congelatione præcavit. Alium narrat Forestus, qui non dissimuliter à clystere & balneo acris, inunctionibus, decocto cathartico & roborantibus cephalicis convaluit. *Lucar. Torzi Medicin. practic. lib. 1.*

#### Consultationes.

Perillultris patiens, annum agens 25. peripicacis ingenii, in infantia habuit caput tadis crustis infectum, per abscessum retro aurem sinistram disruptum lanatus, mox & totum corpus squamosis crustis fuit scedatum, sola blanda purgatione, seri lacus ulu & halituoso sudore deinceps: ita tamen ut ex levi qualibet ambientis frigiditate tussicula quædam neca suboriretur, nisi sultis vellibus indueretur. Adultior factus, frigidis humidisque alimentis familiariter usus, longo scribendi & legendi labore defunctus, post graves animi passionem, dum casu cubitum ad parietem allisit cum dolore maximo, in scalam antrosum prolapsus est derepente querulusque mansit, ubique loquela & sensu jacuit; post aliquot vero menses, à cæna & ulu variorum fructuum, horariorum, potu vini frigidi, & aquæ gelidissimæ, mane dolore ventriculi acuto luborto, brevi temporis spatio perlitit immobilis, insensibilis, rigidus, cum oculis apertis inmobilitibus, facieque pallida, & veluti cadaverosa reddita. Quibus affectibus ante biennium semel atque iterum correptus fuit, post laboriosum motum accedente quineta. in longa, eaque spuria catarrhali gonorrhæa, variis prædiis perfectissime sanata; propterea quarit, quantum sint horum affectuum natura, causæ, qui futuri eventus, & curatio.

Quibus paucis satisfactori, non on issis tamen utilioribus, statuimus, affectum præcipuum Nob. hujus Patientis, alium non esse, quam, qui à Græcis Catochos, vel catalepsis, à Latinis congelatio dicitur: non tamen accepto cathochi nomine, ea significatione, qua usus est Hippocrates in coacis Prænotionibus, ubi legitur, Cephalalgias, Catochos; latine vertitur à Dureto dolor capitis firmiter fixus. Sic enim quilibet affectus firmus, & stabilis, seu in habitu, catochos vocatur: minus, sumpta voce. catochi, pro affectu mixto ex lethargo, & phrenitide; à græcis Typhomania dicto, quo sensu usurpatur ab Ætio, vel pro comate vigili sicut à Paulo Ægineta: Sed pro affectu specifico à prædictis distincto, à Gal. descripto 1. in Irimum Prothetorum text. comm. 56. in condiscipulo suo sic scribente: *quidam etiam ex nostris condiscipulis, cum assiduo disciplinarum studio satigaretur, malo hoc correptus est. Jacbat enim velut lignum prorsus inflexum, rigidum atque extensum, & videbatur oculis apertis nos ita innervi, ut ne conviveret quidem, nihil tamen loquebatur.* Et in eadem significatione sumitur ab eodem Gal. 1. de causis symptom. 7. 4. de Loc. aff. 1. 1. Aphor. 3. Libro de Sympt. Different. 3. & alibi; quo sensu aliquando est tantum in principio: quo tempore est vitium solius motricis



gativis, hiera cum 2g. cum castoreo. Quo tempore non erit abs resanguinem mittere ex cephalica dextri brachii, mox & ex venis sedalibus; in pauca tamen copia sanguinis vicibus, repetita venarum sedalium reseratione Vere & autumno. Inurantur quin etiam duo fonticuli, alter sinistro brachio, alter dextro interno femori ad revulsionem, & derivationem. Præter quæ remedia, duo præcipua ex usu futura censeo, internum unum, aliud externum; internum erit decoctum ex radice chinæ, ligno buxi, lentis, & ligni visci quercini cum modico medullæ ligni indicis, addita betonica, lilio convallium, ruta caprarum, melissa, borragine & mentha, præmisso bolo confectio ex castoreo & mitridatica confectio, vel confectio de Hi. citho, & Alchernes. Extremum erit balneum aquæ dulcis æstivo hoc tempore, summo tempore ex usu, cum universale tum particulare capitis cum aqua tepida, lotio quin etiam fieri poterit cum lixivio dulci in quo decocta sint malva, tilia, stachas, & fl. chamæmeli. Ventriculo conferret stillicidium, vel ex oleis mastichino, de mentha, amygd. amararum, de absinthio communi, cum spica schænantho, & zingibere, facti ipsorum infusione & ebullitione in duplici vase cum vino Cretico, ad penetrationem, vel ex aquis thermalibus non impense calidis, quædes esse possent in ægro nostro Patavino aquæ Læstrenses super posita summitate purpureæ, imbuta prædictis oleis, vel oleo de nucæ molchata & caryophyllorum. Aquas Thermales aliasque minerales intus exhibitæ non laudo, siue sint frigida ratione jecoris, siue calida, ratione ventriculi, quoniam omnes tanquam exsiccantes in affectu præfenti, proveniente potius à causis exsiccantibus, intus sumptæ sunt aliquatenus suspectæ. Propterea si jecoris caliditas ad se curationem traxerit utatur succo cichorii depurato cum succo ablinthii per aliquot dies, & à cibo semper sumat aliquid substri-gens: puta diacydonium vel saccharum rosatum tabellatum.

Victus ratio primas partes habeat in omnibus sex rebus non naturalibus; ac proinde fructus horarii, lactinia, aquæ potus, vinum nive refrigeratum, computationes, comestiones sunt interdiciendæ, cum cibis crassi succi, difficilis cocutionis, & succum melancholicum generantibus: cænaque sit parvior prædiano. A somno pomeridiano abstineat: vigilæ diurnæ, animi pathemata, assidua meditationes, longaque lectio, & scriptio quàm maxime officiant. Exercitia non sint violenta. Aer valde tenuis qualis est Genuensis, nimis calidus, nimis frigidus, venti Boreales, æquilonaresque constitutiones sunt fugiendæ: neque iter suscipiendum per loca nivosa & valde frigida, aut æstuosa. Nimia venus, aliaque hujus ordinis, vel caput replentia, vel in pensè refrigerantia, & exsiccantia sunt semper noxia. Alvus continuò lubrica servanda, cælique mutatio in temperatius, quale est nostrum Patavinum, vel aliud simile maxime erit juvamento. Et hæc pro salute perillustri patientis proponenda duxi, quam ipsi à præpotente Deo enixe precor. *Benedictus. Silvaticus, causæ. & respons. medic. cent. 1.*

Reverendiss. Abbas annorum 50. temperamenti calidi & sicci, habitus tamen mediocris, & hirsutus, rebus æconomicis sui cætus magnopere addictus, & ideo vigiliis, curis atque cogitationibus nimium intentus, in febrem quartanam incidit à qua spatio mensium liberatus fuit. Spontanea superveniente venarum sedalium copiosa & repetita evacuatione. Hic tamen paulo post febre acuta correptus curatus fuit à Medico domestico remediis congruis; sanguinis scilicet ex brachio missione, & quoniam dolor capitis cum vigiliis undecima transacta die, remissa quodammodo febre, non modo perseverabat, verum etiam auctus est, ideo summa cum ratione venas sedales aperiri iussit, postquam tamen sanguinis educationem, sponte non advertente ægro, copiosius effluxit, Patienti Reverendiss. vires eripuit, exigua tamen febre relicta. Decima vero quarta febris die dum sedens in lecto cibum capturus esset, ex tempore totus rigidus factus est, sine ullo moru ulloque sensu, apertis palpebris, immotis manentibus oculis, & ore subridente. Pulsus erant paulo duriores, illæsa respiratio, & tota illa die excrementa retenta fuere. Post aliqua vero administrata remedia oculos movere iterum cepit mox & reliqua membra, tandem ad se reversus asseruit se nusquam prætorum reminisci, nec ullum in accessione cognovisse, vidisse, aut audivisse, sicque duos sequentes transegit dies, cum exigua febre, at non levi manuum & capitis imbecillitate; Die verò decima septima febris, & quarta ab accessione redit idem insultus, ipso decumbente, cum iidem symptomatibus, quorum causa rursus accersiti, de agendis hunc in modum sumus effati.

Affectus ille, in quo sit subita prehensio & occupatio tum mentis tum sensuum interiorum & exteriorum, motusque voluntarii quæ Reverendiss. Pat. rigidus manet in eo statu quo prehensus fuit, apertis & immotis oculis statuz alicujus instar, & nec sentit, nec videt, nec audit, sola respiratione & pullu illæsis manentibus, Catalepsis, siue Catochus proprius & exquisitus erit appellandus; dico proprius & exquisitus, nam catochum improprium & non exquisitum coma vigil nuncupavit Amatus Lusitanus, cum Hipp. nec non Doctissimus Langius & Fernel. ipse cum Ætio, & Paulo, in quo rigiditas & insensibilitas nunquam observatur; exquisito catocho necessaria, cum ipsius essentia in tribus consistat, rigiditate corporis, pristinam figuram servantis, oculis semper apertis manentibus, & sensuum privatione. Ita rigidus, calamum adhuc manu tenens, mansit studiosus ille de quo Feru. sicuti & Gal. condiscipulus. Oculis insuper apertis manent. Catocho detenti, utentis atque ideo comate vigili detentus fuit ille à Paulo descriptus, qui oculis clausis degebat, non autem catocho, sicut comatosus fuit ille quem refert Ætius, quia punctus membra retraxit; in quo præterea perfecta sensus privatio non adsuit, ut in catocho exquisito seu catalepsi.

Hujus affectus causa immediata spirituum immobilitas, rigiditati totius corporis juncta ob quam differt Catalepsis ab Ecstasi, in qua spirituum quidem immobilitas cum sensuum

caren-



cauentia, non vero cum rigiditate reperitur. Hæc vero causa immediata à variis mediatis procedere potest, siue à sola frigiditate, externa tamen, ex ipso Gal. ut etiam observavit Forensus in militibus illis per loca nivosa iter facientibus congelatis; siue à frigiditate & siccitate, siue à frigida & sicca materia, ut Paulus; siue à sanguinea, ut Aetius; siue à forti imaginatione, ut Rondeletius; siue à materia melancholica; ut Altimarus, Rudius, Mastaria, Capivaccius; siue tandem à sanguine multo & crasso replente ac distendente venas & arterias in postica parte cerebri, ut Holerius Nicolus, Mercatus; In casu vero nostro causa immediata est intemperies frigida & sicca cerebri cum materia halitiosa & serosa melancholica in quam proclivis fuit Pater Reverendus. accedentibus etiam causis procatactis, utentis nimirum applicationibus, curis, sollicitudinibus, vigiliis, prægressis febribus, ac tandem copiosa sanguinis hæmorrhoidalis evacuatione. Ita Gal. scripsit quod *causa immediata catalepsis est immobilitas spirituum animalium, cum duritie nervosa substantia, proveniens ab intemperie frigida & sicca, falsa vigiliis, curis, studiis, exercitationibus & huiusmodi aliis.* Unde narrat historiam condiscipuli sui qui ex assiduo disciplinarum studio catalepsi fuit captus, spuria tamen, quia præteritorum recordabatur.

A jam dictis igitur procatactis, in hoc patiente disposito, & antehac quartana correpto, facile fuit introducta in cerebro siccitas, cum frigiditate, simulque melancholicus ichor, qui in eodem, & præsertim ejusdem postica parte contentus, replendo, cogendo & exsiccando spiritus immobiles reddit, atque ita sensum ac motum universi corporis intercept, non irradiata per eosdem motiva, ac sensitiva facultate, prout accidit patientibus Ecstasim, ut proinde ad catalepsim necessaria sit quoque rigiditas, atque durities, quam non à causa congelante, sed partim exsiccante, partim replente in casu nostro fieri credendum, cum causæ nervosam substantiam exsiccentes præcesserint, non sine exhalationibus à serofitibus melancholicis (unde & affectio quarta die recurrit) quæ partes nervosas non secundum solam medullarem partem, (ita enim fieret Paralysis) nec secundum solas membranas (fieret quippe convulsio) sed secundum totam substantiam, tum exsiccando, tum replendo rigiditatem catalepticam inducunt, à quibus omnibus excrementorum retentionem securam esse, quid mirum jam sopita facultate?

Affectus catalepticus est semper gravis & sui natura periculosissimus, cum nonnumquam eadem die, imo & paucis horis jugulet, & licet à Cælio Aureliano inter morbos chronicos reponatur, id solum admittatur ratione dispositionis, acutus puipe est ratione affectionis. Periculosior autem præfens est, post tot causas exsiccentes viresque prosterneutes, & quia morbo acuto supervenit, unde dicebat Hipp. *quæ cum exultatione sunt, & catocha & aphonia perniciosæ sunt, non sic, quæ repente sanis adveniunt.*

Attamen quia facultas vitalis valida conservatur, & accessio prima, horarum spatio paucis remediis evanuit, non admodum rebellis

causæ indicio, idem de præfenti sperare potest, atque etiam integralis remedium medicorum ope.

Et primo præfens accessio removenda, deinde futura præcavenda. In accessione vapores & humores spiritus cogentes & immobiles reddentes, à capite retrahendi, qui sunt in capite discutendi totum & caput modeste caeteraciendum, & humectandum.

Aque adeo statim clyster acris, omni industria, sicut aias, est impiciendus ex decoct. Thimi, epith. fum. r. mercurial. pariet. chamæmel; additis mel. ros. sol. ol. lil. alb. ovi vitello, & modico sale. Nec omittantur reliqua revulsionum genera, frisiones coxis, natis, cruribus, manibus inunctis ol. lil. alb. auig. utur cucurbitula sicca, ac cum multa lanina; sternutamentum excitetur, corpora cortice exura naribus subdita, vel insufflato pulvere majorana, iros & nigellæ.

Interim illinatur tota spina, in o & totum corpus & caput ol. lil. alb. & sesamin. capiti fomentum paratur ex vino albo in quo ebullierit beton. itechas, salvia, rosmar. aithra, mellis: his enim a præterita accessione evadit. & non præcedente affectu in balneum aquæ calidæ toret mittendus: deinde ol. lil. alb. cum aromat. totum & caput iungendum.

Circa victus rationem pauca proponenda supersunt, cum in accessione cibis alterri non posset; quæ tamen si diutius perduret odore calidi panis vino aspersi & carnis assæ præcalidæ nutriendus fuerit. Præterea clysteres nutrites ex vino quoque parati forent injiciendi.

Extra accessionem humores sunt præparandi & evacuandi, vapores à capite revellendi & intemperies corrigendæ, habita semper febris, licet exigua ratione. At quoniam in hoc casu quarto die imminet accessio, ideo statim melancholici humoris minorationem moliri optimū censemus, cassiam præbendo cum extracti lenæ ʒj. cui superbibat feri caprini lib. ij. Die vero sequenti pro humorum præparatione, ac totius corporis & capitis humectatione, idem serum erit repetendum ad lib. ij. addito julap. viol. ʒij. & interim aliquod terculum ex lacte, ovis & saccharo paratum exhibendum. Die vero accessionis primis horis nativus, unapism. duo cruribus apponendi, cibis vero sint ova recentia, & lac caprinum cum panis buccella, omisso vino. Quod si recurret accessio, omnia supradicta repetenda, mox sicut de purato præparandi humores & clysteribus educendi.

Sed tandem lac & balneum erunt huiusce affectus propria & adæquata remedia, non obstante febre, quæ nulla aut valde exigua erit. Lac autem copiosum afferendum nimirum ad libram cum saccharo, cum caput petat & humectet. Balneum autem sit aquæ dulcis, sed sol. malvæ, viol. salic. & pariet. alterata, quæ caput quinetiam irigetur, & perseverante affectu lacte ipso lavetur. Interim medicamentum minorativum repetendum, inio si recesserit febris, cassia, pil. cochiar. & aurear. scrupulis addi poterit, præbendo tamen ab his serum copiosum, aut etiam more Hippocratico, plurimum lac asininum; atque ita humores præparandi & evacuandi, nec non cerebrum



a nervosam substantiam humectandi indicationibus satisfactum fuerit.

Circa victus rationem obervo Galenum cataplexicis, extra accessiorem concedere vinum malvaricum, cuius exemplo Amatus Cret. cum permittit, atque plerique aquam insensissimam putant quia à frigiditate licet rem superari supponunt. Verum quoniam in casu nostro contra se res habet Vinum, quidem concedatur, tamen tamen nostro patienti Reverendiss. ob siccitatem, sitque album, tenue, aquosum, & potius S. lvia vel Rosemar. medicatum. Quæ pro Reverendiss. Patris salute satis. *Joh. Raymard. Foris consulti. & Respons. Medic. Tom. j. Cent. j.*

Domicella ob menses parcius fluentes uterinis suffocationibus, subinde obnoxia, his diebus subito prehensa sensus experta remanet, & in illo quo prehensa fuit corporis utu obruit, oculos apertos ac fixos detinens, nihil tamen videns. Si adstantes brachium illi sursum, deorsum vel ad latus inflecterent illam in statu illo remanebat. Si ægram in pedes depouere stabat, si corpus impellerent, pedem promovebat: si caput ad latus detorquerent in illo situ remanebat. Respiratio tamen libera persistebat. Cum hic paroxysmus per horam durasset tandem ad se rediit ægra immemor omnium quæ ipsi contigerant. Post biduum similibus paroxysmo de novo detenta fuit qui etiam sponte cessavit.

In capite mali hujus sedem esse, actionum animalium gravis lætio satis ostendit sicut uteri affectionem indicant hysterice suffocationes.

Affectio hæc est *cataplexis* quæ et in catoche & prehensio appellatur, *estque actionum animalium excepta respiratione subita & maximalis, cum totius corporis rigiditate, quæ ægri illius corporis situm servant in quo erant cum illi afflicti corriperebantur.*

Afficitur in hac ægra cerebrum, non quidem totum sed secundum illam partem, in qua sit sensus communis. Afficitur autem hæc pars à vicioso humore, aut vapore ex utero eo translato.

Causa antecedens est vicius & viscidus humor, aut vapor crassus in utero genitus vel collectus, indeque per cæcos ductus ad caput translatus (quod ex præcedentibus uteri suffocationibus liquet) qui sensorio communi partibusque ei vicinis adherens, easque subito involuens spirituum a sensorio communi determinationem impedit, sicque hujus cataplexeos causam continentem constituit.

Quia autem hic totum cerebrum non afficitur & spiritus satis copiosi in eo generantur quorum etiam influxus in nervos, nulla principii nervorum compressione, vel obstructione impeditur, hinc fit quod spiritus illi in determinatas partes influentes cum jam sensorium commune à prædicto vicioso humore crasso vapore subito occupatur, involuitur & detinetur, non determinantur ad alias partes sed continue copiosi influunt ad illas partes, ad quas determinati erant, mox ante illam prehensionem, seu detentionem: Atque hæc causa est quod singulæ partes in illo situ detineantur in quo erant mox ante prehensionem, & oculi, brachia, crura &c. quasi fixa remaneant.

Quod autem ægra in pedes deposita stet, & membra ab adstantibus aliorum reflexa in novo rursus statu contineat, hoc fit, quod mutato musculorum situ, mutatur etiam influxus spirituum; & pori qui antea clausi fuerant, aperiantur ac spirituum influxum recipiunt; ita ut qui spiritus copiosi infuebant in hos musculos, statim mutato pororum situ copiosiores influant in illos; in quos etiam continue influere partemque in tali statu continere non desinunt usque dum ille situs rursus mutetur.

Respiratio eodem modo percipitur ut in dormientibus, & illæsa manet, partim propter insignem magnitudinem & latitudinem pororum, maxime necessarium usum nervorum respiratorio, um; partim consuetam, & continuam determinationem ad musculos; respiratorios.

Cessat paroxysmus & ad se redit ægra vapore illo vel humore, qui sensorium commune occupat, discussio & dissipato. Redit paroxysmus cum ab utero similis humor vel crassus vapor ad sensorium commune de novo pervenit idque subito occupat & involuit.

Periculosum est hoc malum propterea quod pars nobilis hic afficiatur, & tenaces viscidique humores sensorio communi adherentes non facile dispellantur. Magnam tamen sanationis in nostra ægra spem facit, quod malum non sit isopathicum ejusque causa in ipso cerebro non generetur, sed aliunde eo feratur: præterea quod invasiones sint breviores, unde judicamus sensorium commune non tam detineri ab humore tenaci & viscido, quam potius à crasso quodam vapore, qui facilius attenuatur & dispellitur. Hic tamen crassus vapor, quia in tenacem humorem ibi aliquando concrefcere, sicque gravissimam cataplexim, cum summo vitæ periculo inducere posset, curatio quamprimum erit instituenda antequam res eo deveniat.

Indicationes curativæ sunt 1. Ut in accessione crassus ille vapor vel humor sensorium commune occupans, discutatur. 2. Ut uterus expurgetur; ejus obstructions tollantur novæque hujus pravi humoris generatio in eo præveniat. 3. Ut pravi illius humoris vel vaporis translatio ad caput impediatur. 4. ut caput ita corroboretur, ut hujusmodi crassos ac pravi vapores, vel amplius non admittat, vel admissos protinus dissipet ac dispellat.

In paroxysmo hic pulvis sternutatorius in nares suffletur, ut irritata (si fieri possit) facultate expultrice, vapor ille vel humor, sensorium commune occupans, valide excutiat.

℞. Rad. hellebori albi scrup. j. β. pyrethri, fol. majoranz, flor. lilior. convallium, ana scrup. β. piperis nigri. gr. num. vij. castorei gr. iij. nat pulvis.

Postea hoc linimentum naribus ac vertici illinatur, ejusque nonnihil cum gossypio auribus immittatur. Rec. olei thymi, rosmarini, salvia, carui, castorei, succini, ana scrup. β. ung. martiati drach. j. misce pro linimento.

Hic quoque nodulus de collo suspendatur Rec. castorei, assæ fetidæ, camphoræ, ana scrup. j. β. fiat nodulus in tenui serico. Interea etiam clyster injiciatur acrior.

Si his peractis, paroxysmus adhuc perduret cucurbitæ sine & cum scarificatione imponan-

Rr



obstat quod animi in Catalepticis nonnunquam quorundam maiore rigidiore appareat de amur. Nam rigiditas illa profectitur a spiritibus, non congelatis sed in mteculos intrusis, & perpetuo influentibus ibique ob nullam novam eorundem insectam determinationem, retentis, atque ita partes distendentibus. Talis quodammodo rigiditas passim in nobis observatur, dum stantes & ad rem non attendentes, corpus nostrum erectum tenemus.

Alii vero qui observant catalepticos quosdam, ab aliis motos artus suos neciere, & erectos stare, imo propitios ad passus aliquot progredi, existimant spiritum imaginationis inservientes in cereb. ob hoc figi, dum reliqui manent integri. Sed hæc opinio non est admittenda cum spiritum animalium in cerebro nullum sit discrimen; sed iidem sensationi, imaginationi, motui, aliisque animalibus operatibul us inserviant. Ut ex Phisicis nostris constat.

Nec mirum a Catalepticis, nihil cogitative, ob sensorium commune affectum, sentientibus, tales manus peragi, & alimenta; ori i-ferta, nonnunquam deglutiri; cum hi, ob spiritus cerebri animales & sensori. singulari a. h. u. d. graviter hic affecta, tales motus ab objectis possunt recipere, quibus spiritus in cerebro ita determinentur, ut certos quosdam nervorum meatus per vias aperiant & el. udant atque in his vel illas partes fluant, easque vicissim, inscio cataleptico, moveant; Eo fere modo ut in automatis pneumaticis, & hidranlicis, aliisque contingit.

Periculisissimus hic est morbus: quia humores melancholici sensorio communi firmiter infixi dum difficillimè possunt tolli, ægrum necessario alimento sumendo privant; & ipsam corporis motum impediunt cacochymiam valde augent; atque adeo procul dubio vitam, nisi tempestive, & cito excutiantur, brevi ipsi per lipothymiam, vel apoplexiam, vel etiam, adiment. Matur. n. d. itaque curatio: quæ pertheietur per causæ antecedentis & continentis ablationem; & deinde per intemperiei cerebri & reliqui corporis per calefactionem, humectantia, ac incidentia, emendationem.

Primo itaque talis injiciatur clyster:

℞. Mercurialis, betæ, salvia, ruta, pulegii, cent. aur. min. an. m. j. Flor. meliloti, camomill. Stachados, an. p. j. Rad. polipod. querc. fol. semæ, sem. carthami an. unc. β. rad. althææ ʒj. Rad. Ellebori nigri ʒij. colocynth. ʒss. decoquantur in aqua com. ad lib. j. colaturæ adde confect. n. mech. ʒss. Hieræ Logadii ʒvj. trochisc. alhandal. ʒj. ol. rutæ, anethi, n. ʒss. sal. commun. ʒj. f. f. clyster.

Si clyster injectus ob umiam intestinorum irritationem, vel aliam causam non retineatur, mox sequens suppositorium ano inseratur:

℞. Pulv. hieræ logadii, ʒij. trochisc. alhandal. ʒj. Diagridiigra. iij. sal. com. Gemmæ an. ʒss. n. ellis cocci & indurati, qu. f. fiat suppositorium.

Ab anni educatione, mox hoc sequens medicamentum, si tum deglutire æger aliquid possit, ingeratur:

℞. Theriacæ And. ʒj. mithrid. ʒj. aq. cin. n. n. ʒss. aqua beton. ʒij. misce fiat sudoriferum.

Tum adhibeantur artuum & posterioris partibus colli ac spinæ dorsæ, cum paucus asperis calidis, frictiones; & inungatur caput hoc linimento calido.

℞. Ol. anethini, camomill. lilior. an. ʒj. His in vase dup. incoquantur herbe, hisopi, thimi, scerpilli. an. p. j. Expressioni forti adde castorei ʒss. cera parum fiat linimentum.

Naribus etiam infletur sternutatorium, ex helleboro albo, pyrethro, euphorbio, Tabaco coniectum.

Ubi ad se plussculum redierit, præscribatur hoc decoctum.

℞. Rad. bugloss. borag. an. ʒj. β. ellebori nigri ʒij. Herb. card. bened. stachad. epithymi, calamint. sumariæ, anethi an. M. j. Flor. borag. meliæ an. p. ij. coq. ex hydromellite ad lib. j. addendo sub finem decoctionis fol. sennæ ʒj. β. rhabarb. agarici an. ʒij. cinamom. nucis moschatæ an. ʒss. in colatura dissolve syr. de stachad. ʒij. fiat Apozema.

De quo sumat ʒij. semel vel bis in die, pro operationis magnitudine. Ad intemperiem capitis & totius corporis corrigendam, sumat de h. c. miltura mane & vespere, ad quantitatem castaneæ in jorj.

℞. Conserv. llor. borag. buglossi, anthos, an. ʒvj. sp. diamosci dulcis, lactificantis Galeu an. ʒij. Theriacæ veteris ʒj. cum syr. de buglossi q. f. misceantur ad consist. Electuarii.

In diuturnæ sit calidus & humidus, cibus sit panis ex bono frumento, bene fermentatus, & recte cocinus: sumat & ova recentia, carnes juniores vervecinas & gallinaceas. Convenit ptilfanna hordeacea: ex oleribus conveniunt malva, lactuca, buglossum, hōrrago. Ex fructibus mala dulcia, uvæ passæ. Legumina, porrum, oapæ, canes vitet. Cibi quantitas sit moderata, vinum bibat tenue & mediocrem cerevisiam bene defecatam, exercitium ad excrementa excutienda sufficiat. Quærit latitæ occasionem tristitiæ fugiat, somnus sit longior, a vigiliis diuturnis abluat. Henr. Regim apud Theod. Craanem Medication. lib. j.

### Observationes.

Vir annorum 50. asperrima hieme cum diu in parte capitis posteriore dolorem persensisset, neque medicum tamen consilium adhibuisset sedens in cella in eodem statu permanens subito correptus est, & mente detentus, & veluti lixos oculos in adstantes ac palpebras veluti immobiles penitus habebat voce insuper ac sensu privatus nihil audiebat, neque respondebat. Mandavi illico ut Clyster actum heret.

℞. Fol. mercurial. betæ, salvia, ruta, puleg. an. m. j. ll. stach. d. ch. mem. melilot. an. p. j. polipod. fol. sen. an. ʒss. cent. min. m. β. rad. alth. ʒj. sem. cartham (aliqui addunt colocynthid. vel hellebor. nigr. ʒj) F. decoctio in aqua (ali decoquant cum gallo veteri.) colaturæ adde confect. hamec. ʒj. hier. logad. ʒvj. troch. alhand. ʒj. mellis anthos ʒj. ol. rutæ. camm. aneth. an. ʒj. sal. communis ʒss. M. F. clyster. mox suppositorium præscripsimus quod filo alligato immittetur, si clyster non retineat, aut præter expectationem in corpore ol. hæreret.

℞. Pulv. hier. logad. ʒij. trochisc. alhand. ʒj.



Diagtid. gr. iij. Salis communis & Gemmae an. ʒi melius q. l. f. suppositorium.

Statim ab alvi educatione exhibui ʒi theriacae praestantissimae, & ʒi mithridae. cum aq. card. benedic. & beton. an. ʒi ʒ. ultio in os ingerendo strictionibus etiam utebar ut & ligaturis fortibus brachiorum, pedum & crurum. Partem quoque capitis posteriorem mungi mandabam unguento infra scripto.

ʒ. Ol. aneth. camem. lihor. an. ʒi ʒ. adice hyssopi, thymi & serpilli parum & coquantur in duplici vase deinde fortiter colentur. Colaturae adde castorei ʒi ʒ. ceræ modicum. fiat unguentum molle. Nonnulli totum corpus anethino oleo mungunt maxime in hyeme & Castor. ʒi. cum aqua multa ori infundunt: Cum hisce non nihil ad se rediisset, & melius quid sumere posset, ne iterum rediret malum, & ut ex toto convalesceret, praescripti decoctum praeparans apii, fenicul. cal menth. aneth. fumar. buglos. borrag. meliss. syrappis de Epithymo, & Itacade & de succo fumariz adjectis: Postea huic decocto adicientes dennam. Epithimum, polipodium, ut similiter purgaret: & ad roborationem capitis consului ut acciperet Diambram, pliris Archonticum, Conservam rosmarini, & similia quibus tandem bene habuit. *Petr. Forestus obs. 47. lib. 10.*

Ad fratrem Caputium Catalepticum fictum vocatus inuenio illum aphonon, uno genu terae innitebatur, alterum cum flexurus curabat: brachiorum sinistrium pendebat ad genu, dextrum in aerem elevatum diductis digitis, viam praetereuntibus, (ut olim *Mercurii* statua,) ostentare videbatur: utrumque omni gelato marmore frigidius: patebant oculi sed irretorti, & quicquid sudario illos perstringerem inconnivi. Os habebat cum respiratione satis libera, pulsus in utroque brachio sat magni. Cum ad satietatem aspectualem, dixi accederent alios Medicos, meque cum statuam exiisset aeger, cum illis revocarent, in casu enim ad hunc mihi diem in viso nihil tentatum nisi consultis senioribus. Volebam tamen injici validissimum Clysterem, sed Apothecarius negabat se ulli ratione obstrictas nimium nates injicere posse, glandem ergo praescripti ex speciebus hieræ, colocynth. sale gemmato, & muscerda: Jusque excipifelle, loco mellis, ut melius pingeret: agre immisit sed cum bonis aegri rebus, valide enim solutalvo, multisque bombis emissis, degelatus membra movit, surrexit, ambulavit, omnium praetitorum ignarissimus, tum fricatis naribus [praevenit enim potentissimum sufflaveram ante horas aliquot, sed sine effectui] iisque motu calefactis, saepe sternuit multumque pituita vitrea, aut glaciæ, ut verius loquar, excussit. Cum sub viciesimam horam ad se rediisset, laconicum seu stupham *germanicam* paucis horis struenda non procuravi: credebam enim algidissimum hoc corpus non nisi in ære perpetuo aequaliter calido servari & curari posse. Cum illud ingressus esset, statibus in cerebrum delatis discutendis incumbendum duxi. unaque novorum generationem impediendam statui. Injecto ergo sub vespere validissimo clystere, qui praeter calida quaeque recipiebat etiam Elleborum, turbit, tro-

chisc. alhand. omnibus in jure veteris galli decoctis, colaturae remiscebam hieram, colocynth. coact. hamech. elect. de baccis lauri, Theriacam; & aquam vitae rectificatissimam, postridie ecoprotico commode purgato cerebelli regionem radi jussi, totamque cum tota spina decocto lavendul. lauri, acori, Itachad. ex malvatico incocturum, inungebam primo castoreo, aurea alexandrina, melle anachardino, Theriaca, oleo petroleo, & succini solutus. Hunc unguis superponbam emplastrum Taraceii iidem oleis recens subactum, dabam cibos convenientes, bibebat hydromel dilutissimum, cui sataphras, feniculum, & anisum incoxerat, miscebatque vinum fulvum. In dies sumebat conditum ex conserv. acori. Itachad. nuc. mosch. zinzib. chinensis, theriaca cum conserv. pleres arch. sicque cum Deo toto biennio libertissimus a congelatione fuit, saepe tamen postea hic iterum catochomenos factus est, sed tandem ita convaleuit, ut duodecim annis mali nihil sentiret, quoties enim rigente parum collo, (malum secutum praestigium,) statim oleo calido nucham totamque spinam mungi curat, & ita malum avertit. Miror itaque *Dodonaeum* & ex illo *Henricum* scripsisse neminem, secundo sine perniciæ certa hoc morbo corripì posse. *Henricus ab Heers observ. 3.*

Juvenis Brit. natus impensius [ut solet illa ætas] amori indulgens, percussus fuit adeo vehementer ex inopinata matrimonii repulsâ: ut obtriguerit instar stipitis, sedens in sedili suo *stipiti*, sive detentus, sive congelatus, per integrum diem, retinensque continenter eundem ritum, & oculos non minus apertos, atque olim si nullum affectum delineavit Galenus, comm. 11. in Proch. cap. 55.

A qua figura ne latum quidem cum recederet unguem: jurasses certo te statuam potius quam hominem videre. Adeo quippe fuere omnia non modo rigida, sed plane immobilia. Verum ubi exclamaretur, alta voce, rem ipsius meliori esse loco, & cupitanti habiturum amicum: modo ad se reverteretur, protulit confestim ex sedili, & quasi excitatus ex profundiore somno, *cessit* curatum ad se, disruptis protinus *illis* vinculis, quibus illum arce iligaverat tenacissima hæcatocoe. *Nicolaus Tulpinus observ. medicarum lib. 1. obs. 22.*

Rustica quidam puella annorum circiter 15 jam a quinquennio Catalepsi laborat [hæcat ita loqui] Itataria, eaque brevi ac sapius die inter eundem in media via, nullo praecedente frigoris sensu, subito instar Mercurialis statuz consistit, omnibusque sensibus tam internis quam externis quasi consopitis, oculis apertis non videt, non audit inelamata, nec se loco movet, nec progreditur, nec unquam cadit etiam graviter onerata, nec opus deponit aut projicit, quin & in templo ad Sacram Canam accellura saepius ita consistit, & Pastorem in altari moratur, sed mox, quasi è profundo somno excitata ad pristinum vigoris statum redit; praetitorum omnium ignara, ceteroquin & extra paroxysmum omnium animæ corporisque functionum sic satis capax. Unica convalescentiæ spes in felici menstruo-



num eruptione; quæ nondum apparere. Ab ejusmodi diuturni aultrina tempestate correpta Cataleptica quinquennis puella admodum somnolentæ & Morosæ, mentio quoque facta est in *Hiera mea pica*, seu. *Tractatu de Absinthio* pag. 59. quæ in prandio ob pinguioris boli præsumptionem à sorore offensa subito obriquit, cum manu & Cochleari ad patinam extenta, irretorto oculo quasi indigna bunda sororem adspiciens, fortiter inclamata & increpata neque audit, neque os aut labia movet, manu ducta & coacta incedit, brachia ejusdem sursum aut deorsum, vel etiam transversim tracta in eodem situ perstant. Ceream hominis statuem dixisses: Ante Paroxysmum marmoris instar frigidissimi rigebat; post horam ferè unam cum pandiculatione, ventris murmuribus, ac profundis suspiriis sensim iterum incalescebat, largiorique sudore profuso restituebatur in integrum, antepilepticis tum curata, & helminthagogis. Vorax enim erat; sed anno insequenti variolis publice grassantibus graviter afflicta obiit, Catalepsi non amplius tentata. Sic Prætor quidam in vicinia a quodam maleferiato subdito, aculeatis cavillis præter modum petitus tantopere excaudescit ut subito ac in ipso adhuc tribunali sedens obrigesceret quasi minitabundus ac superveniente Apoplexia forti statim expiraret quasi fulmine percussus. Quò fato etiam arrepti sunt octo Meliores in Insula Lemno sub quercu cœnante, & subito exanimati, qui sub ea specie qua discubuerant, rigidi permanserunt, ita ut unus comedere, alter ori poculum manu admoveere, alius bibere videretur: cumque omnes nigri essent, imaginem totidem statuarum repræsentarent, P. Zacchias *Question. Med. Legal.* pag. 395. Unde non inficere Catalepsis morbus attonitus a quibusdam nuncupatur, & Catochus seu subita quædam quasi congelatio totius corporis viventis. Geminum quid patitur obsestrix nostra, Epilepticis alias convulsionibus ex aura maligna à summo pedis digito sursum exhalante obnoxia. Quoties enim ad maxillas usque ascendit aura ista frigida, ibique penitus se insinuat, caput obrigescit, nec os claudere vec verbulum eloqui potest, donec succedente stertore Paroxysmus finiatur: Vesicatorium pedi impositum, & aqua Ciconiar. exhibita cum successu. Cor quoque ciconiar. hic quidam maximopere probant. *Johann. Michaël. Febr.*

### Anatomica Inspektiones.

In anatomia eorum qui catoche periissent, majores venas, quæ recta decurrunt a posteriore capite ad synciput plenas concolto crassoque sanguine vidimus, & posterius cerebrum serosa materia occupatum; Atque revera in hoc malo posteriora magis affici veteres Medici putaverunt: Galenus meminit cujusdam condiscipuli in *Prorrhet.* qui ex hoc sed levi malo, ut scripsit evasit: nam in omni genere morbi,

hic gravior ille levior est. *Iacotius comm. ad aphor. 7. lib. 1. Concreta.*

Secretarius vasco in febris declinatione, & alvi profluvio, urinis bene coctis certam valetudinis spem præbentibus, Catalepsi præhensus uno die obiit.

Aperto cadavere pulmones & hepar corrupta sunt inventa, serum quasi rufum cerebro posteriore contentum. Et sanguis concretus in majori vena quæ medium caput proreptat *Scholiographus ad caput. 9. lib. 1. Hollerii de morbis int.*

Civis Leodiensis mercator, à rivali suo in carcerem conjicitur, è quo valde liber domum reversus, totum Melancholiz se immergit; paucos post dies acute febricit sine delirio tamen: à febre liber, in amentiam primum, dein furorem versus, vinculis coacti debuit: numellæ manus stringentes tanto interdum squatiebat strepitu, ut fracturus crederetur: Melanagogis per Epicrasin diu sumptis, conciliato etiam multis noctibus somno ad mentem rediisse visus, ut omnino restitutus sibi videretur, xx. a Captivitate mense sanissimus factus & repuerascens sub ætatis annum xl. primum sinistræ manus digitos tres ultimos ita lunavit ut nulla arte extendi possent: Purgato capite; applicitis medullæ spinali oleis calefacientibus & humectantibus, digitorum usum recuperavit; sed paulo post omnes digiti ejusdem manus incurvati riguerunt, & ut in catochico, nullo ingenio dimoveri potuerunt; paulo post & dextro captus brachio, & utroque crurum, aphonus factus, immobilis jacuit, multis litibus & fomentis & gargarismis linguæ usum recepit: sed toto biennio ad mortem usque vocem articulatam formare non potuit, instar infantis semelstris lallabat, alienaque manu cibum capiens sustentabatur: alvus interm utcumque respondebat, respiratio semper liberrima, & pulsus optimi, tandem sub anni quarti finem fatis concessit.

Ad anatomen vocatus, volui primum cerebrum inspicere quod ablato cranio siccissimū, durum adeoque in summa parte digitis meis friabile, flavedine citri æmula undiquaque ad altitudinem digiti tinctum, observatum circa ventriculos & basin mollius & humidius, colore tamen aliquantum vitiatum; rete admirabile depressum: nervorum origines sicæ solitoque graciliores: Thorax Imusque venter nihil observabile exhibebant. *Henric. ab Heers Observ. Medic. 3.*

Argentum vivum si largius sumatur congelare sanguinem testatur Conciliator exemplo cujusdam seplasiarii, qui febre ardenti laborans, cum ad sitim sedandam imprudens aquæ vice, vasculum argento vivo plenum invenisset illiusque magnam copiam ebibisset, congelatus interiit.

Aperto cadavere sanguinem circa cor concretum Medici invenerunt *Primisus de Vulgi erroribus l. 4. cap. 29.*



## CATAPHORA

Vid.

COMA

Capite de Caro.

## CATARACTA.

*Curationes, Consultationes, & Observationes ex variis.**Curationes.*

**C**ataracta est membrana seu tenuis pellicula genita in oculo ex pituitosa aliqua materia vel crasso vapore ad oculum & albugineum humorem delato, & ibi calore capitis paulatim in pelliculam condensato; quæ pellicula sua opposicione impedit receptionem specierum visibilium in humorem crystallinum, seu transitum earum per pupillam, ex quo contingit cæcitas. Illa pellicula est opaca, alioqui non impediret visionem; Et occludit seu obstruit pupillam; si enim alio loco esset quam ante pupillam non sic impediret; suspenditur ergo tanquam velum quoddam vel ante vel retro pupillam. Dico retro vel ante; quia locus ejus communiter est ante vel intra pupillam, id est profundius quam pupilla & post eam & sic intra tunicam uveam; interdum verò est extra pupillam, seu ante eam & extra tunicam uveam id est inter uveam & corneam, seu in spatio illo quod ab iride oculi comprehenditur, & constituitur, à tunica uvea compressa, & ipsa cornea. Itaque cataracta est in humore albugineo. Talis cataracta, cum est adhuc in fieri, priusquam in pelliculam est condensata, & in forma humoris est adhuc fluctuans, est curabilis per medicamenta discutientia & nulla ratione curabilis acu seu Chirurgia. Sed quando jam est in formam pelliculæ continuata, & condensata, tunc non est amplius curabilis per pharmaciam; sed tantum per Chyrgiam. Medicamenta omni, quæ id possunt præstare, sunt discutientia: illa autem non possunt pelliculam jam condensatam & siccatam dissolvere, quinimò cum calida sunt magis, effictando indurant.

Hæc Cataracta cognoscitur seu signis à ratione desumptis, tum ipso sensu. Est enim facile visibilis, & ubi est, ibi pupilla non apparet integra, sed alba præcipue cum cataracta est valde externa, sed si profundius lateat, tum quidem adhuc pupilla quod immo integræ apparet, sed tum in profundo in ea, quasi album velum ei obtensum videtur. Signis à ratione desumptis cognoscitur, quia æger cæcus est & cæcitas illa paulatim exorta est, & paulatim majus majusq; coepit incrementum. Primo enim mulier, cimices & nubeculæ ante oculos volare visa fuerunt, postea visus minui & res fenestrate ac in iis, integræ maculæ apparere inceperunt, tandem verò cæcitas magis magisque oboriri.

Varia sunt differentia cataractarum, alia sumitur à situ, quia alia est extra uveam & pupil-

lam, alia intra, uti supra dictum. Quæ quia diverso modo debent curari distinguendum est quo loco contineantur. Quæ intra uveam est discernitur profunditatesque extra exterioritate, vilius enim facile judicat, unam esse anteriorem, alteram posteriorem. Denique cognoscitur ex eo, quod quando est intra uveam, tunc videtur rotunditas pupillæ, quando verò est extra, tunc tota pupilla est obducta, nec illius ulla vestigia apparent. A quantitate etiam sumitur differentia, nam aliqua cataracta tegit totam pupillam, aliquam partem tantum aliqua. Cum tota pupilla est tecta, tum adest absoluta cæcitas, cum pars aliqua tantum, tunc res apparent, vel quadrangulata, vel triangulata, vel media, vel fenestrata, prout est figura ipsius cataractæ &c. A substantia, quia alia est subtilis, alia crassa. Cum subtilis; tum res videntur obumbrate, ac si pannus quidam lineus subtilis esset ante oculum, cum crassa est omnimodo cæcitas. A qualitate; Nam alia est mobilis, fixa alia, alia est cinericea, caelestina, alba, citrina, nigra, margaritalis, gypsea, viridis, subrubra, argentea, vitrealis, plumbea, turchini coloris, similis ferri nitentis seu aquæ marinæ.

Priusquam Chyrurgus sese operi accingat, ut laudem referat ex sua operatione, debet considerare, an cataracta talis sit, quæ sit bene deponibilis necne, non enim omnes prædictæ differentia, æque bene sunt deponibiles. Si enim non sit deponibilis, non debet operationem incipere, ne cogatur postea cum infamia deserere. Si est facile deponibilis, animose opus aggredi debet. Si dubie aggrediatur, tum prædictione id faciat, in primis recens & non confirmata cataracta non est deponibilis: talis enim adhuc est pultacea, & necdum satis in pelliculam condensata, ideoque quando acutangeretur, linderetur, & acus eam pervaderet, & sic non posset eam deprimere: Debet ergo esse confirmata, signa confirmata sunt perfecta cæcitas, sicut æger distinguere non possit colores, secundo quod cum oculis fricatur manu, cataracta non divellitur, nec discontinuetur, aut dissolvatur, nec humores oculorum conturbentur, sed maneat unita. Cum enim adhuc confirmata non est contraria eveniunt. Ut cataracta sit solida & confirmata debet habere aliquam ætatem. Itaque ante medium ævum non est confirmata, nec debet deponi, sed illa tantum, quæ est unius anni aut plurium. Nimis tamen inveterata cataracta etiam difficulter deponibilis est: talis enim valde dura & solida est, & tunica uvea adheret, per fibras valde fortes quæ non possunt ab acu deprimente sutis facile frangi.

Uti ergo nec unius tenera debet esse cataracta, ita quoque nec unius antiqua, cataracta quæ omnimodam adfert cæcitatem, ita ut æger per eam non videat lumen, non debet deponi, quia periculum de ea est, quod etiam deponatur adhuc tamen æger visum non recuperabit. Ut ergo sciatur an subtilis facultas visiva adhuc integra sit, debet æger lumen opponi, & ejus oculus fricari & rogari, an lumen cæli videat, subinde ponendo manum inter lumen vel tenebras, quando lumen non distinguit, vel indicium est facultatem esse inæstimatoriam



tuam. vel saltem Cataractam esse valde duram. In illo casu frustranea esset depositio: in hoc propter soliditatem irrita aut valde difficilis. Si oculus sanus claudatur, & æger manu Chirurghi fricetur, & parum comprimatur, & tunc statim aperitur & videatur cataracta in partes dividi seu reparari, non est deponibilis. Talis enim est nimis subtilis, & recens & cederet acui, cum deprimeretur. A colore etiam sumitur indicatio. Nam si cataracta est margaritalis, aerea, columbina, cineritia, aut Turcino lapidi similis, aut plumbei coloris, aut ferri nitentis est, deponibilis est; alii colores sunt deceptivi & rarissime bonum dant successum. A motu quoque nam si cataracta est fixa & immobilis, non debet tentari ejus depositio, si mobilis contra. Ideo debet Chyrurgus oculum ægi altero oculo clauso fricare vola manus, & statim oculum inspicere, si videat cataractam dilatari & contrahi, aut sistolen quendam & distolen pati, indicium est quod sit deponibilis, contra vero non. Spiritus etenim visivi frictione illa cataractam vellicant & moveri faciunt ex quo colligitur visivos spiritus adhuc ad oculum venire & sic interius in nervis opticis, aut in alia parte oculi non esse obstructionem & proinde si cataracta deponatur nullum aliud subitutum oculi vitium, & consequenter ægrius visum recuperaturum. Verum etiam cataracta quoad ipsam talem sit, & tam bona signa habeat, & videatur facile esse deponibilis, tamen adhuc alia ex parte corporis sunt considerata. Si enim illa cataracta fuerit in homine habente oculos nialos & laborante dentitionibus, aut lippitudine, aut continuo lapidis dolore, vel etiam tinnitu, reuma, aut continuum tremulationem, vel vomitum, vel aliquam molestanti iunmitatem habente, non est subeunda cura, quia vel inflammatio, vel mala accidentia ex illa punctura sequerentur; unde febris, phrenitis, mors &c. vel eadem cataracta motu illo iterum assurgeret ante pupillam: unde labor omnis esset inanis. His prognosticis habitis potest Medicus audacter operationem aggredi, propterea quod etiam si operatio non succedat, tamen per hoc æger nihil perdet: quoniam si non deponatur in nullo peccat, nisi quod eadem tantum cæcitas & eadem cataracta maneat.

Pericula quæ circa operationem occurrunt, & vitari debent sunt ista; Primo ut a punctura tunice conjunctivæ & dolore ex eo allato & oculi diuturna acus agitatione fatigato inflammatio & inde febris, pervigilium, phrenitis, mors, vel omnimoda cæcitas sequeretur. Secundo ne per foramen quod in conjunctiva & uvea tunice a transpuncta acu fit, effluat humor albugineus, quo effluxo visus vitaretur & cæcitas fieret, tunice corrumpere & crystallino collapso vel insitu mutato. Tercio ne ab acu profundius adacta crystallinus pungatur & vulneretur, qui est proprium visus instrumentum. Quarto ne profundius acus immisione & versatione humores oculorum commisceantur. Quinto ne cuspide acus uvea tunica multum tangatur, & ejus nigro colore per attactum recedente albugineus humor inficiatur aut obscuretur. Sexto ne cuspide acus pupilla multum divellatur, & hac ratione corrugetur,

concidat, vel comminuetur, adeoque rotundam suam figuram perdat, quod irreparabilem adferret lationem. Septimo: ne si cataracta sit durior & difficulter cedat, dum sic nimis fortiter deprimitur, eadem etiam ratione uvea, cui ipsa adhæret divellatur & figuram ac magnitudinem perdat.

Ut hæc omnia pericula evitentur, hæc considerata sunt, imprimis, ut tempus operationis sit congruum scilicet ver & autumnus. Ætas est inconveniens, propterea quod in magno ætate nimium sit periculum inflammationis vel febris oborituræ. In hyeme membranae oculi perforatae læderentur. Hora sit matutina, corpore jejuno, ut impediatur vaporum adscensus. Dies sit clarus, ut omnia perfecte in oculo videantur, an scilicet Cataracta sit, an retrocedat & retroacta adhuc hæreat, an vero ceciderit. Dies sit minime ventosus, ne aeris & vento in cubiculo motu depressa semel, cataracta iterum elevetur, sed quiescat. Luna sit decrescens, tum enim humores in corpore minus multiplicantur & agitantur. Acus debet esse longitudinis quinque digitorum, scilicet manubrium trium, cuspidis vero duorum; sit mediocriter subtilis ne faciat nimis magnum dolorem, & nimis magnum in oculo foramen, per quod possit humor albugineus exire, non sit nimis acuta, sed ita medio riter ut facili negotio ingrediatur, si enim nimis acuta esset, mterius nimis facile uveam aut corneam, aut crystallinum læderet & exasperaret. Debet etiam esse rotunda, & valde lubrica: rotunda, quia debet valde leviter in orbem voluendo imponi ut sic quam minime oculum inquietet. Ideoque antea planæ non valent. Sunt nonnulli, ut Albucasis, qui ut subtiliores viderentur, excogitaverunt acum perforatam, per cuius foramen postquam jam ingreßa esset, suæ cataracta extraheretur, sed ridiculum est inventum: nam sic humor albugineus extraheretur, potiusquam membrana ipsa. Adde quod vix imponi posset talis canaliculus, aut si imponeretur, maximum in oculo faceret foramen, magnumque causaret dolorem. Alii voluerunt quidem talem canaliculum imponi, sed non suctu cataractam extrahi, sed per foramen citharæ chordam immitti uncatu cuspidem, quæ cum usque ad cataractam permota esset, illam apprehenderet, & foras educeret, sed & illa operatio nugatoria est, & talis quæ magis animo excogitari, quam manu practici poterit. Acus debet esse ex argento, ferro, aut auro; præstat autem ex argento esse, propterea quod illa propter albedinem melius in pupilla reluceat, postquam jam est imposita.

Antequam operationem aggrediamur, corpus primo præparandum est: aliqui dicunt, primo esse purgandum, ut cacochymia ablata, minus humores ulli ad oculum ferantur, aut febres oboriantur. Alii dicunt e contra, purgationem noxiam esse, eo quod propter illam humores in corpore & capite agrentur, & agitati aptiores sint ad fluendum versus caput & febrem faciendam. Sed distinguo, nam si purgatio immediate operationem præcedat, nocet agitando humores, si diu ante non no-



cet, sed prodest cacochymiam tollendo. Sanius doctrina practicanum docet i. clystrem esse injiciendum, inde venam è directo latere secandam & ulterius nil agendum, sed tamen æger debet triduo ante tenui victu ali, à vino & calidis omnibus abstinere, & solum aqua potari, ut minus ad febrem incurrendum dispositus sit. Verum priusquam operatio incatur, debet æger aliquam confortans lumere, & ovum forbile cum manu Christi perlata, vel panis frustum in succo granatorum maceratum, vel simile quippiam, quo vires acquirat, ne jejunos exiliens in syncopem incidat, quod scribunt nonnulli practici sibi aliquando obtigisse; ex qua & operatio irrita heret, & periculum aliquando, ne acu in oculo existente tunice ejus dilacerentur. Quæcumque post factam operationem necessaria sunt futura, ea primum parata, & in promptu esse debent. Adfuit, coto mundus, splenia, petia, fasciæ, & medicamenta necessaria. Adhuc acetum, & aqua rosata si forte contingeret ægrum in animi deliquium incidere.

Omniibus paratis ponatur æger in sede humili, lumini & fenestrix oppositus, sic tamen ut radii solis cum non illucent, neve in oculum ferantur, manus sub genibus aptentur; ne earum motio impediatur operationem. Oculus sanus claudatur, & petia & fasciæ suppositis obligetur: sic enim firmatur, & eo firmato etiam firmatur æger, qui alioqui motu sani moveretur. A tergo ministro caput ægri teneat. Medicus seu chirurgus sedeat ex opposito patientis, dorso lumini obverso sede parum altiori quam ipse æger. Inter utrumque sit sedes cum pulvinari, quo cubitus medici innitatur, & quiescat, ut sit firmior manu. Tunc medicus fœniculum ore masticeat & palpebris ægri tum à medico tum à ministro bene apertis, medicus vaporem fœniculi ter quaterve in oculum insufflet ut cataracta motum cum calore recipiat. Tunc ægro jubendum, ut oculum introrsus versus nasum moveat & quietum servet. Si cataracta est in oculo dextro medicus debet operari in. n. sinistra; si in sinistro, dextera. Acus primum per pileum bistervæ adigenda ut asperitatem omnem deponat, tunc ore madefacienda est, inde indigenda est in album oculi externum, medio loco inter iridem oculi & angulum externum, sic tamen ut venulæ vitentur. Tunc acus leniter in orbem volui & revolui, cum quadam moderata trusione debet, donec in vacuum oculi, id est, in humorem albugineum intra cristallinum & uveam deventum sit. Tum verti debet acus paulisper antorsus versus corneam, & tam profunde infigi, ut ejus cuspis usque ad medium cataractæ perveniat, acus enim mox intra oculum retro cataractam apparebit ac relucebit, tunc ab altiore cataractæ parte incipiendo ipsa cum acu deprimi debet, & curari ut fibræ, quibus superius uveæ adheret distumpantur, & cataracta cadat. Cum ceciderit deorsum sub pupilla diligenter sæpiusque trudi debet; & ibi usque ad unum miserere, cum acu detineri; si resurgat, iterum eam acu deprimi debet toties donec deorsum maneat, at si voluerit descendere, & ad aliam partem declinet versus illam depelli debet cavendo semper, ne

pupillam dilaret aut laceret, aut cristallinum tangat. Si obstinate redeat, in plures partes dissipanda est.

Facto opere acus paulatim extrahatur, ut sic paulatim foramen conjunctivæ minuat, ne aliquid albuginei humoris per id effluat: Inde omnis quies corporis oculique imperanda est, statim coto albus intinctus in albumine ovi tenuiter qualitato in quo aliquid croci in dissolutum, & aliquid cunini impositum, super oculo jam clauo ponatur, & de super petia lacte & aqua rosata imbuta, & tum uterque oculus obueletur, & claudatur, ne viuis motu etiam alter moveatur. Fronti apponatur cataplasma repellens ex albumine ovi, oleo rosato, aceto, bolo & similibus. Et statim æger pedetentim ad propinquum lectum auceatur, in quo lubrevato capite supinus quiescat. Non loquatur autem nisi submissa voce, trahatur primodie sine cibo, sequenti detur adhuc tenuis & liquidus, qui non habeat opus masticatione ne motu masticationis aliquis, etiam in partibus oculi morus fiat, & sic detur occasio auctentius cataractæ masticat oculus sic clausus quatuor diebus, nec coto superpositus renouetur, nisi maximus dolor & inflammatio aliud jubeant, sed quotidie semel petia, aqua rosarum & lacte imbuta removenda. Postquam tum diem potest oculus aliis locis liberari, sed æger adhuc tamen in lecto remanere debet, & cubiculum adhuc esse tenebrosu lumen enim dissipando & visio spiritus movendo cataractam agitent: & hoc usque ad septem dies secundum Avicennam, secundum practicautes autem usque ad nonum. Si alvus ægranti non respondeat, clystere blande movenda est, sic tamen ut æger maneat in lecto, ne loco moveatur. Si interim iterum cataracta resurgat, & nulla oculus inflammatione aut dolore tentetur, iterum deponatur acus in idem foramen imposita.

At si inflammatio & dolor adsit expectandum quousque ea sunt sedata; sedantur in hebotonia, cucurbitulis, hirudinibus &c. aliquando in deponendis cataractis fit dachynosis in oculo, seu quod humores in eo contenti appareant rubri, hoc fit à sanguine qui propter aliquam parvam venam tactam exiens, albugineo humori miscetur, ex quo qui id nunquam vidisset, posset arbitrari oculum fractum, sed id nihil est, neque magnopere metuendum; post aliquot enim dies ille sanguis resolveretur, & discutietur. *Thom. Fienus. de Principiis Artis Chirurg. consversis Tract. ij.*

Incipiens cataracta incremento & concrecione prohibetur, diata convenienter & artificiose præscripta, vini præsertim potentioris & caput implentis abstinentia, vitato usu ciborum, quibus succus inest pituitosus & vaporosus, ut pisorum, fabarum, n. porum, castanearum, omnium denique rerum quibus vis inest humores in corpore ciendi, & ad fluxum proritandi: cujusmodi sunt lassa omnia, & piperata sive acris, ut allia, cepæ, sinapi, præ ceteris verò immoderatio coitus nocet, quia totum corpus vehementius exagitat, cerebrum, caputque debilitat & crudos parit succos. Panis imperetur fœniculi semine conditus, huic enim vis inesse creditur visionis juvanda & oculi illustrandi, vapores nebulosos



ante in ventriculo dissipando quam confluere ad cerebrum possint. Quae re eadem ratione, cydoniati, conservae rosarum, euphrasie, aut cuiusvis ex aliis rebus status discutientibus, ut ventriculum constringentibus composita, utilis est usus. Phlebotomia & purgatio, si res possit, oportune praescribentur, frictiones divertentes imperabuntur, cucurbitulae scapulis & cervici affiguntur: maturino tempore multicatoris pituita per palatum derivabitur, sicut etiam velicatoria, phlegmici & cauteria potentia occipitio vel brachio applicabuntur. Verum quia ut dicebat Plato in Charmide, neque oculos confirmare, neque desiccare licet nisi prius caput purgetur, neque hoc nisi universum corpus ante emundetur, idcirco ante omni corporis totius purgationi incumbendum est. Sed calens anhelitus ejus qui famelicus, anisum, coriandrum, nucem moschatani, cinnamomum, caryophyllos & similia ore versat & dentibus mandit, oculis digito rite leviter attritis continuo & frequenter exceptus magnum ad humorem concretioni proximum calefaciendum, attenuandum, resolvendum, digerendum, ac diffundendum momentum habet. Quin etiam illustrandorum oculorum, visionis roborandae, & prohibendarum suffusionum, discutierendaeque si quando concreverint & cogi incipiant. Vis maxima inesse creditur huic Joh. Vigonis collyrio.

℞. hepat. hircin. sani & recent. ℥ ij. calam. aromatic. & mell. an. ℥ ss. succi rutae ℥ iij. aquar. chelidon. foenicul. verben. & euphras. an. ℥ iij. piperis longi, nucis mosch. caryophyll. an. ℥ ij. croci ℥ j. flor. rosin. ar. aliquantulum contrit. m. β. sarcocolla, aloes hepat. an. ℥ iij. sellis raje, leporis & perdicis an. ℥ j. terantur omnia, tritilque adde sacch. alb. ℥ ij. mell. rosae. ℥ vj. conficiantur in alembicum vitreum & destillentur in B. M. Stillatitius liquor frequenter oculo ostendatur. Hujusce aquae usu post universalia remedia absque alterius cuiusvis remedii externi ope, plures curavi nulla lucis usura fruenter. Aquae e corniculis quae in fraxinis nascuntur confusis destillata ad visum clarificandum est excellentissima.

Quod si his & tot remediis nihil profectum fuerit congestusque nebulosus humor in dies augeatur & inspissetur, abstinendum a remedio est, expectandumque donec jam non congeri sed cogi, imò durities quadam concrevisse videatur. Sic enim demum acu decuti poterit: alias si nondum matura, ac iusto tenerior sit, illa velut pellicula, cum ventum ad opus erit, acu transadigetur, non decutietur. Si contra durior sit, illa resistet acui, nec decuti se facile patietur.

Itaque quae ejus sit quasi tempestivitas Chirurgus cognoscendum est; diligenterque tenenda signa quibus maturam suffusionem & immaturam, & sanabilem ab insanabili discernere possit. Nam sola quae matura & sanabilis est manu & acu curanda, quae immatura, id est quae tenerior, & quasi cruda adhuc, quaeque durior & densior est, quae denique insanabilis, ne tentanda quidem.

*Quibus signis cataracta matura & curabiles ab immaturis & incurabilibus dignoscantur*

Oculo sano clauso, si suffusi. postquam pol-

lice attritus fuerit, pupilla statim dilatatur & diffundatur, eademque celeritate in suum locum, figuram, colorem & statum redeat, opinioem fore nonnullis creditur matura & confirmata cataracta, immatura vero & nondum attingenda, si diu pupilla dilatata & diffusa maneat. At matura, itemque densioris, adeoque insanabilis, commune signum est nihil eorum quae spectabilia sunt, praeter lucem, & lumen cernere, distinguere vero aliquid aliorum rerum aspectabili. Nondum matura est argumentum: Ideo vero clauso compressoque oculo sano, alterius pollice attriti pupilla dilatatur, quae amplificatur, intumescit, diffunditurque amplius compressione illa, quasi compulsa a sano in aegrum oculum visibilibus spiritibus. Ceterum quae sequuntur cataractae insanabiles censentur, illae scilicet quae magna sunt, quae affecta; attritave palpebra nihil dilatantur aut diffunduntur: quarum pupilla: nihilo pariter illo attritu atque hinc enim intelligere est obstruendum, si esse in nervo optico, adeo ut decuti quantumvis feliciter ea rursus luteoscat, ut mansura: nihilo plus proficias inde utenda ea cataracta, cujus oculus multum tumescit & patenti laborat. Insanabilis etiam est illa quae ex gravissimo morbo, acerbissimo nempe & duris c. pituitis doloribus, vel icu vehementissimo orta est. Quae gyptiae sunt coloris, virides, nigrae, lividae, citrinae, & coloris argenti vivi simulae, fere sunt insanabiles: contra quae colore corticem castaneae emulantur, quae caeli, seu quae marinae colorem habent cum quadam libeane, haec sanabiles sunt & feliciter succedere solent.

De cataractae curatione chirurgica, postquam sanabilem esse cataractam commemoratis signis cognoveris, restat ut manu ejus curationem adornaris, ita tamen si nihil sit quod impediat. Nam si capitis dolor, si tussis, si nausea, vomitusve aegrum infleat, frustra operam impenderis. Expectandum itaque donec talia symptomata evanuerint. Tempus eligendum ad eam rem opportunum, scilicet sitiente luna, a fulgore & tonitru silenti caelo, & sub alio quam Arietis, quod capiti donantur, signo. Nam secundum Proclum lunam signum illud cuius est membrum ferendum, tenente, terro non attingendum. Tum Medicum consulat Chirurgus, si purgatio, & sanguinis missio aegro necessaria sit, vel phlebotomicis symptomatibus occurratur, relapsui alioqui materiam suppeditaturis. Biavo post eligendus est locus mediocri lumine persutus, jejunusque aeger in angustio sedili collocandus est, sic ut non ad verum, sed a latere lumen habeat. Oculus qui curabitur mobilior efficiendus est super alterum lana imposita & deligata; mox chirurgus aegro se adversum statuat in scamno paulo altiori, iussuque eo manus ad zonam demittere, genibus suis ejus crura comprehendere & concludere. A tergo autem adstabit ministrum, quae ejusdem caput contineat & immobile praestet: nam levi momento crui acies in perpetuum potest. Acus inde praeparanda est, & in densum aliquem pannum pluries intrudenda, ut illo velut motu levigetur, & ad jamjam futurum opus minori dolore perficiendum tanquam incalascit. Ferrea sit oportet, aut



aut chalybea, non aurca, argenteave, sed aliquantulum lata, acuto mucrone, quo in oculum penetrat, comprehensamque cataractam decutiat penitus, ac ne in manu chirurgi labatur, minusq; stabili sit, manubriolo inseretur.

Hac tanquam preparatione rebus omnibus adhibita, imperandum ægro ut oculorum aciem nates versus contorqueat. Iunq; acus intrepidè (inani, enim & spiritibus tantum pleno loco excipitur) recta per annat. in tunicam medio inter minorem cantum & corneam loco, è regione medix cataractæ, sic, ut ne qua adnatæ vena lædatur, intrudenda est, varieque tum quali versanda, donec ad mediam pupillam suffusioneque pervenerit. Ubi eo ventum est, superne deorsum inclinanda acus est ad ipsam tutionem, leniterque ibi versanda, donec paulatim eam, quantum fieri potest integram infra pupillæ regionem deduxerit deprelse: instandum acu nihilominus vehementiusque ad breve aliquod temporis momentum ea comprimenda, ut inferiori parti in qua decussa est infideat, & ægrum monebit chirurgus ne oculum commoveat. Nam si sic constans hæret neque redit, Completa est curatio. Tum acus paulatim sursum referenda est, neque tamen ita tim eximenda, ut si revehatur ac reurgat sit usio, iterum & toties dum adhuc opus calet, & res in procinctu est decutiat versus minorem angulum, donec plane & fideliter condita fuerit. Tum igitur molliter & pari qua intromissa fuerat inclinatione revocanda acus est; ne si moderationem non adhibeas, una cataractam eo unde decusseras referas, ut ad chrysalinum humorem primum videndi instrumentum, pupillamve cum ejus dilatandæ periculo, graviter offendas. Quidam opere ita tim peractio aspectabile aliquid ægro videndum exhibent: Sed non probat Paulus, timet enim ne intuenti ille coatuatus suffusionem sursum revehat. Itaque & sanius & certius statim ab educta acu ovi albumen in aqua rosacea cum alumine agitarum, molli linteo excipere, & adstrictionis arcendæque inflammationis gratia oculo ac vicinis partibus imponere, tumque una etiam sanum deligare, ne si ad intuentum moveatur una etiam per sympathiam & quæ ipsis per nervos intercedit connexionem ægrum quasi rapiat, & ad noscendum incitet.

Post hæc lecto molli æger trahendus est, atque ita collocandus, capite ut sit altiori: procul sit ab omni strepitu, ne loquatur, nec quid mandat durius, ne maxilla laborent: liquidum ergo nutriatur, ut panatella, hordeato, colatibus aut expressis carniū euchymatum succis, gelatina, ovis sorbilibus, & aliis hujus generis. Octavo denum die resolvenda quæ oculos obvallat fascia, ipsi aqua rosacea proluendi sunt, oppositi que specillis, aut serico panno, sensim lumini ac diei æger est assuesciendus ne repente lucis occurso offendatur. Quod si pancis post diebus sursum referatur surfusio, decutienda iterum illa est, sed altero foramine, priori enim dolet oculus.

Contingit aliquando ut acus occurso non decutiat integra suffusio, sed concidatur & in plures partes dissipetur. Tum igitur seorsim singula persequendæ & decutiendæ: si quæ minima portio subsit, quæ acus velut ansam effu-

giat, relinquenda illa est, virtute caloris nativi non est duotandum quin tempore resolvatur.

Nonnullæ etiam occurrunt cataractæ, quæ ad primum acus contactum in lacream quandam; aut aquæ turbidæ per similem substantiam distendantur & abeunt; quod nondum plena concrezione maturaverint, hæc tamen vel eo nomine sperabilem sanitatem pollicentur, quod nunquam postea in unum ut ante corpus coire possunt. Quare tandem etiam robore innati caloris discurrunt, tunique pristinus splendor oculo restituitur. Si quæ alia de insperato superveniant symptomata, novis illa consiliis & suis quæque remediis profligabuntur. *Joh. Vigierius Chirurg. magna lib. 1.*

Suffusio est cataracta incepta. Cataracta suffusio perfectæ, vel confirmata. Diferunt enim non specie, sed tantum gradu.

In hoc affectu primo levis quædam visus obtenebratio contingit, quæ sensum augetur, dum materia visum in pediens, in pelliculam concreseat, visionemque demum profus aufert.

Incipienti morbo diligentissime occurrendum & nam consummati curationis spes nulla, nisi ex operatione chirurgica, acus ope.

Cum medicamenti locus est, totum corpus, & præcipue cerebrum exacte evacuandum est, deum humor visum obtenebrans ducitendus.

Quæ indicationes cum eadem ferre sint quæ ad guttæ serenæ curationem fuerint propostæ, remedia evacuantia, revellentia, discutientia & roborantia ibi laudata, hic etiam aptari possunt, ut non opus sit hic eadem frustra repetere. Ab erhinis autem, blutendium, illa enim omnia nocent.

℞. Aloes hepat. diligenter lotæ in aqua fœnicul. ʒss. caryophyll. nucis mosch. macis an. ʒss. fol. euphras. & rut. siccor. an. ʒj. sem. fœnic. ʒss. cum syr. ex succo euphras. & fœnic. hat massa quæ formetur in pilulas. Dosis ʒss. in lecti introitu.

℞. Flor. viol. sic. ʒss. flor. euphras. ʒss. flor. betou. vel eorum defectu folior. ʒij. sacch. ad pondus omnium f. pulvis, cujus portio infpergatur butyro recenti in pane extenso, sumend. initio prandii. Capiti prodest & alium humectat.

℞. Sem. coriandr. in succ. cydon. pp. ʒiss. conserv. flor. euphras. solid. recent. paratæ ʒij. flor. fœnicul. in umbra siccat. ʒiiij. fol. euphras. ʒij. macis ʒj. sacch. cum aq. fœniculi in rosatum cocti ad pondus omnium, f. pulvis quo utatur e cochleari hora dimidia post singulos p. sus.

Quoad topica nihil plane immittatur oculis quod dolorem faciat.

Proderunt inspirationes pucci vel puellæ post mansum semen anisi vel fœniculi.

Bis terve in septimana mane post evacuatum ab excrementis corpus applicentur oculis exta columbarum, vel pullorum, aut aliorum animalium juniorum, adhuc palpitantia, his viventibus per medium sectis extracta, atque super oculis detineantur, donec penè refrixerint, mox abluantur partes, clausis & conniventibus palpebris. aqua mox describenda, quæ quotidiè mane, etiam sine visceribus utiliter usurpabitur.

℞. Succ. fœnic. scarleæ, rut. chelid. maj. verben.



verben. trifol. macul. euphras. an. lbj. succ. napi, vini lupan. an. lbj. mell. albiss. lbj. urinae pueri impuber. lbj. f. in balneo M distillatione ut artis est, servetur aqua usui quæ validior reddetur, si huius liquoris sumatur lbj. aloës succotr. 3j. Ireos florent. torref. 3ij. vitriol alb. depur. 3lbj. sacc. cand. 3j. Agitentur diu simul, & hat per chartam emporeticam colatura. Temperetur liquore stillatio simplici, si dolorem excitet.

Dominus *Packer* passus est in oculo sinistro cataractam confirmatissimam per annos ad minus 25. quam albissimam, satis compactam & maturam acu deturbandam sapinus scissi una nocte, sine ulla causa externa, evanuit suffusio, & licet confusæ, mane exiit & lucem aspiciere, & colores agnoscere. Veni ad me & oculum ostendit purum nigrum, sine ulla humorum perturbatione, obscuritate aut confusione. Pupilla minor tantum fuit, quæ tamen clauso altero oculo dilatabatur. Non credo fuisse dissipatum istud coagulum, sed pondere forsitan ab uvea divinum tundum petiisse aquei humoris eo loci ubi ab acu separata cataracta deprimitur & subsidit. Forsitan ascendet denuò, ut sæpe contingit in cataractis malè depressis & locatis ab operatore, nisi forsitan substantia crassior & gravis elevationem impedit.

Elapsis diebus 12. ad me rediit, ostendit oculum clariorem, & facile de omnibus objectis visibilibus potuit pronuntiare. Dixit tamen uxorem aliquoties vidisse partem cataractæ denuò ascendentem ad pupillam quæ valida urina emunctione illico ima iterum petiit. Proculdubio recurret, neque enim absumi potest.

Mulier Angli oculista, vidente *Mylord Rich*, filio Comitiss *Warwick* acu aperit corneam supra pupillam, & humorem aqueum exhaust, sive effluere sivit, qui turbidus & obscurior factus, visionem imminuerat, ita ut æger quasi per velum se omnia confuse cernere crederet. Post humoris effluxum oculus concidit. Applicata medi. imperata quies in tenebris: sic prospectum inflammationi. Aliquot post diebus post humorem crescente humore aqueo, qui est excrementitius, non pars corporis, & qui reparari potest: intumuit, sive repletus oculi globus: punctura ejus oclusa & consolidata, nulla remanente cicatrice. Restituta visionis acies, & perfecte curatus fuit æger.

Non corneam non sentire. *Theod. de Mayerne* *Tract. medic. lib. 1.*

### Consultationes.

Innumera visio, quam novem ab hinc annis patitur reverendissima matrona in utroque oculo, eo progressa est in oculo sinistro ut nunc ferè nihil ipso videat, etiamsi perspicillis utatur. Ad nonnullam ob causam, quam ob manifestissimam suffusionem ejusdem oculi pupillam ferè totam obvelantem, qualis dextri quin etiam oculi pupillam invadere incipit. De quo sine affectu sicuti nullam video hesitationem inter viros peracerrimos, quanquam volitantia corpora incipiente suffusione ut plurimum apparentia non præcellerunt: ita neque ego ambigendum censeo, cum nullus peculiaris præcellerit oculorum affectus, nulla inæqualitas appareat in cornea neque lumen sit omnino ob-

tenebratum, quæ tunicæ corneæ, araneæ, aut nervi optici affectum proprium indicare valeant: cunque causæ externæ adeo validæ fuerint, ut celerem humorum confluxum ad oculos excitare potuerint, qui illico crassitatem aliquam adepti non difficili negotio liberam cum spirituum expansionem, tum specierum receptionem impedire apti fuerunt.

Humores autem qui ad oculos confluerent, me quoque juhet, sunt pituitosi. cum a capite calido & humido, tum a toto corpore ad partem affectam transmissi per venas potius circa oculorum tunicas diffusas, quam per nervos opticos, à quibus si pituita vitrea fuerit suscepta, fieri vix posset, quam in istam impacta amaurosim vel saltem amblyopiam excitaret, nec tam facile ab ipsis per tunicam araneam ad humorem albugineum, & tunicam uveam conflueret. Causæ externæ ut & ego censeo, præcipue fuerint, stuturnæ lacrymæ, continualectio, & scribendi labor diurnus, & nocturnus, struendum horariorum immodicus usus & variæ animi perturbationes, accedente mutata oculorum inbecillitate, forsitan hæreditaria, cum & fratres serenisissimi similes oculorum affectum passi fuerint. Accedit naturalis oculorum humiditas exuberans, ob quam longe facilius in hunc affectum incidere potuit. Hanc enim sol in ob causam soles capitis inter bruta suffusionem pati prædidit Hippocrates, quoniam caput & oculi illi sunt humidissimi. Uterum in hoc affectu vix ullum locum habere mihi persuadeo, quamquam enim nunquam conceperit spatio sexdecim annorum conjugii, semper tamen habuit menses ordinatos, nec unquam de ullâ re in mensium fluxu conquesta est. Licet enim immixti corperint 45. et 46. annis, & subinde intermiserint 47. ætas tamen hæc ut plurimum naturalem mentium suppressionem pati solet.

Utramque affectus propositi tam curati quam cogniti faciles essent, suffusionem enim in oculo sinistro jam factam, ferè totam pupillam obducenstem, albam, ac ita immobilem, ut neque vel confractione oculi dilateretur, neque ad alterius oculi compressionem, pupillæ dilatationem admittat, prorsus incurabilem esse censeo. Quippe quæ neque localibus insensibiliter digerî, neque manus operatione deponi unquam poterit, si Græcis & Arabibus scriptoribus fides adhibenda: nisi forsitan emollientium beneficio mobilitatem aliquam adipisceretur, quod Viri præclarissimi experiri poterunt. Insistentium itaque magis præservationi oculi dextera majori labe, cum & ipsius jam antiqui affectus sanatio difficillima ne dicam impossibilis sit futura.

Ut itaque voti compotes fieri possimus, quantum per artem licet, necessarium erit intulere diversioni materiæ fluentis ad oculos per revellentia & derivantia; exsiccationi capitis & digestionem, vel manu factæ depositioni materiæ quæ jam fluxit, atque in membranam conversæ.

Quæ præstabitur quidem primò per repetitam purgationem totius, cum aliqua sanguinis educatione ex saphena pedis dextri. Nec displiceret inustio alterius fonticuli in dextro interno femore pro majori revulsione, prout summo opere laudatur setaceum in occipite, à



viris præclarissimis alias propositum, vel saltem ulcuscula excitata retro aures in utraque parte aperta servantur. Aliam sanguinis educationem ex venis capitis non propono, cum de nullo inflammationis principio suspicionem subesse videam.

Peculiaris capitis expiatio debet esse accuratissima, primo quidem per masticatoria, ex *saniculo* in primis aliquandiu administrata ac deinde per *errhina* blanda; tandemque & validiora pro derivatione materię quæ ad oculos confluit. Quibus peractis, blandum aliquod decoctum triginta dies circiter præscribi poterit, exsiccandi quidem, non tamen calefaciendi vi pollens. Quod propterea confici poterit ex *radice china*, *visco quercino* & *santalio*, cum temperatis ocularibus.

Hoc enim spero fore, ut serenissima matrona sine jecoris incommodo uti possit, præmisso quinetiam bolo ex *trochiscis viperinis* cum *succo eichorii concreto*.

Nec displiceret, ut eodem tempore comederet carnes viperarum coctas, amputatis capite & cauda. Exsiccarent enim quam maxime & visionem conservarent. A quibus si abhorruerit, licet non sint ingrati gustui, habeat saltem in familiari usu *pulverem seu saltem viperinum*, cibis inspergendum, non omitto potum jam præscripto ex *china* & *visco quercino* in aqua coctis, cum modico euphrasie statuitque temporibus repetita corporis purgatione per pilulas *lucis* & *aggregativas*, vel alias similes.

His internis addenda erunt externa, cum cephalica, tum ocularia. Quare pro capitis exsiccatione, pulvis confici poterit ex *agario*, *cornu cervi*, *corticibus ostrearum ussæ*, *ossibus sepium*, & *resis exsiccatis*, capillis inspergendus, nisi prohibeatur ab ipsorum longitudine; vel saltem spongiis liccis caput frequenter exsicceatur, abstinendo ab illis, quæ caput, vel actu vel potentia calefacere valeant. Quod oculum postea sinistram spectat, jam incurabilem redditum, non erit abs re uti emollientibus aliquot dies; ut puta succo malvæ, & altheæ destillato oculo adhibito cum vitrea illa cucurbita perforata, quo diutius hæreat, & emolliat magis; appposito quinetiam eniplastro prædicto oculo; parato ex pulpa pomæ coctæ, cum butyro sæpius loto aqua malvæ, additis mucilagimbus semin. malvæ & radicum altheæ. Quod si forte mollietiem aliquam suscepserit, tunc tentandi erit ipsius depositio verno hoc tempore, die sereno, luna decrecente. Magis tamen insistendum erit alterius oculi præservationi, per digerentia medicamenta, primò leviora parti affectæ applicita; in quem usum fuerit radix chelidoniz diligenter lota aqua vitæ, contusa, & per colum transtrinisa, instillando guttatim liquamen illud in oculum. Proderit quoque tartarum ex vino generoso, intenuissimum pollinem redactum, oculo insufflatum. Aquæ saniculi, sænigræci & cymini cum aqua vitæ oculo adhibita, cum instrumento vitreo, vel aqua parata ex pane furfuraceo, cum saniculo, cynano & sænigræco pulverizato, in furno cocto, ac deinde sic calente intra duas patinas in cella vitriaria, vel in alio loco frigido reposito quo vapor ille densatus in aquam vertatur; cui

addantur deinde sella animalium, primo non rapacium, deinde & rapacium. Hæc quædæ similia ad digerendum humorem illum possunt esse accommodata, quæ licet viris præclarissimis perquam notissima esse censeam, proponere tamen debui, ut oratoris illustrissimi mandatis obtemperarem. Paxit Deus O. M. ut cedant in iuvamentum Seneris & Augustis imperatrici. Horum tamen remediorum usu non juvante facta sunt perfecta suffusio, ob quam visione prius deperdita administrata sunt suffusionis depositio a perito Lithotomo feliciter adeo, ut visum recuperaverit Augusta. *Benedict. Sylvatic. consil. & respons. Medic. Cent. 2.*

#### *Suffusio incipiens*

Illustrissimus Vir, post ictum vehementem capiti prope oculum militum, & hinc enatum tumorem, brevi tamen sanatum, rus adhuc convalescens, se contulit, ubi præter aerem humidiores, & impuriorem illius loci, sæpius etiam nocturno sese exposuit, sicque naturalem humidam capitis & oculorum intemperiem non parum adauxit. Quamobrem præteritis diebus ex improvise sensit humorem quemdam in dextrum oculum delabi, qui obsectorum distinctionem non solum eripuit, sed visionem ipsam obscuravit, valdeque confusam & nebulosam reddidit, ideoque medicum auxilium exposcit.

Momentanea ferè visionis depravatio ex sensibili destillatione, & condensatione materię inter tunicam uveam, & corneam, non alio quam suffusionis nomine cum Celso & Galeno nuncupanda est, quæ tamen in fieri in hoc casu est; Etenim si absoluta foret, aut velum seu tela, aut macula, aut guttula quædam ante oculum appareret, ut vel nulla omnino esset visio: prout quando est in fieri, sumus solum vel vapor, vel nebula tantummodo cernitur.

Hæc autem fit ab humore pituitoso inter uveam & corneam condensato ex Celso; seu inter corneam, & cristallinum ex Galeno. Humor verò iste abunde generatus ab humido capitis temperamento, naturali quidem, sed ab erroribus etiam in rebus non naturalibus adaucto, non potuit in oculum natura imbecilem, postea à vehementi ictu debiliorem factum, nec in curatione, ut par erat, corroboratum, partim non delabi, qui tamen humor neque hoc suffusionis principium induxisset nisi condensationem à frigiditate oculi adeptus esset.

Ut malo huic consulamus, satisfaciendum intentionibus à Gal. propositis, dicente, quod *Oculum curare ante caput non licet, neque caput ante totum corpus*. Quare totum prius expurgandum, inde caput, tertio materia in oculo attenuanda & resolvenda, antequam suffusio ulterius progrediatur. Hypochyma enim in principio digeri potest, ubi verò diu constituerit, amplius digeri non potest. Et quamvis habeat Gal. quod promissiones medicamentorum in suffusis magnæ sunt, effectus vero aut nullus, aut valde exiguus, nihilominus hoc locum habere supponimus in suffusione tantum perfecta & absoluta, quæ, ut inquit Paulus, immoderate coahuit; quod dignoscitur, quia tunc exdigit



ex digiti impressione nulla fusio oboritur. Sperandum itaque, & licet non sine dubio, agendum tamen, ut saltem sanus oculus præservetur, qui facili ob mutuum nervorum oculorum consensum, & ipse quoque affici posset.

In chirurgico itaque fonte, facta primarum viarum expiatione sanguis ad 3. vi. ex cephalica dextra educendus ad evacuationem & derivationem. Et quoniam caput copiosis humiditatibus abundat, ideo cauterium utriusque brachio inurendum pro curatione læsi oculi, & pro sani prælervatione. Et si morbus interim potius augetur, setaceum in occipite per aliquot menses conveniet. Frictiones quoque in dorso & cucurbitula sicca valde conserent.

Ex Pharmacia, exhibitio medicamento ex lenit. & speciebus hieræ, delinenda præparantia ex syr. de chich. de beton. & oxynel. simplici, in decoct. cich. borag. beton. fœniculi, euphrag. & Itachados, a qua præparatione purgentur humores elect. lenit. & diacatholicon. Inde efficaciora præparantia usurpanda, syr. scilicet comp. in eadem decoctione; Quibus succedat purgatio pilulis de trib. cum rhabarb. sine quibus, nallie. aur. & iucis.

Toto expurgato, c. piti quoque incumbendum masticatorius ex mastiche, rad. Acori, pyrethro, Zinzib. & cera paratis, gargarismi quoque convenient ex decocto origani, pulegii, calamenthi, hyssopi, beton. addito ox. mel. simplici; interim alius lubrica servanda pilulis lucis, masticis & de hiera cum agar. ad 3j.

Tandem ut corroboretur caput, parandum erit Electuarium ex conservis appropriatis, nempe rotarum, e noribus beton. e nor. roris marum, nisi potius Theriaca quandoque utatur, quæ magis fortasse proderit.

Si vero huic remediis mortuus non cedat, necessario deveniendum erit ad decoctum guajaci, salis, visci querc. salisfras & Sant. lorum, cum herbis appropriatis, perviginti. ut triginta dies sudorem in lecto procurando: cui tamen præmitti poterit huius ex ineco cich. pulv. euphrag. fœniculi, fileris mont. & chelidon. paratus.

Potest Decoctum verò uti poterit Confectione aliqua, ex pulv. fœniculi, chelidoniz, fileris mont. chamædryos, salisfras, & sacch. q. s. Extrinsecus idoneum erit leve laxivum ex herbis exiccantibus, paratum, quo abluitur caput & inde pulveribus exiccantibus aspergatur, additis n. aci, caryophyll. ladano & similibus & a stillicidio abstinere, ne fusi humores ad affectam partem copiosius irruerent.

Purgato & corroborato capite læsi oculi ratio habenda: & quidem inter plurima collyria engerem decoctionem Anagallidis, Euphrag. fœniculi, chelidoniz, in aqua fœniculi & euphragiz, in qua dissolvatur fel perdicis aut luci, a proprietate oculis valde amicum.

Si his adhibitis remediis perseveraret adhuc morbus, chirurgus relinquendus erit, dummodo tamen humor talis sit, ut possit tuto deponi, h. ut enim operatio non immerito subtilissima vocatur a Celso.

His addatur conveniens vivendi modus, adeo ut vitet æterem humidum & impurum. Alimenta sint potius assa, quam elixa, & fœni-

culo ac petroselino condita. In fine mensæ aliquod adstringens semper assumat, somnus sit mediocris, & nocturnus tantum. Exercitium moderatum & ante cibum. Alius lubrica servetur pilulis lucis & masticis. Et alacriter vivat. *Job. Raymond. Fortis consult. & Respons. Medic. T. 1. Cent. 1.*

### *Suffusio incipiens.*

Excellentissimus Comes, quinquagesimum quintum annum ægens, temperamenti totius calidi & humidi, hepatis calidioris, & humidioris cerebri, alearum iudo noctu & aquarum potibus maxime delectatus; præterito autumno catarrhalibus fluxionibus quibus semper obnoxius fuit, in xime divexatus est. Quare Medicinæ opem tentare coactus, præter alia extractum chinæ, additis tamen salis, lentisco & sanctis per paucos dies assumpsit, cujus ope bene habere vius fuit, usque ad Quadragesimæ initium, quo tempore visus dexteri oculi obtenebratus est, & valde impeditus in apprehendendis clare & distincte objectis visibilibus; quinimo veluti nubecula quædam ante oculos apparet quæ non solum peractæ expurgationi non cessat, sed potius aucta est. Quare continuatum en x e flagitat.

Visus immunitio circa objecta, Myopia dici posset, si sine ullo intercedente impedimento, & non adeo illico facta fuisset. At quoniam ex tempore incepit & quotidie magis increvit cum quadam apparente tumore, quæ specierum sensibilibus distantium impedit ingressum, sicut impeditur quoque obviantium spirituum ad debita loca transiit, ideo Hypochymate seu suffusione oculum dextrum excellentissimi Comitis affectum esse pro certo habendum; cujus quoniam tres dantur gradus, & primus est dum nulla in pupilla, medico inveniunt, mutatio, & a Patientis solus sumus observatur, ideo in primo gradu constitui potest. Cum vero conditio huius affectus sit, quod spatio mensium augeatur & increseat, ideo si ad secundum gradum accedat, non nisi per telam raram, seu cribrum objecta patienti videre concessum est, sicut tandem ubi tertium gradum attigerit, prius aufertur visio, & amblyopia exadit.

Fusus autem iste apparens vere vaporosa materia non est, sed aquosa, a valis oculi humoribus, & potissimum aqueo alimentum deferentibus, in interapedinem inter corneam & crystallinum existentem extrusa, quæ tractu temporis a frigiditate, tum potissimum ipsius oculi, tum ambientis, & propria paulatim crassescit, sicque visionem minuit, quæ tamen tanto tempore immixta conservatur, quanto conservatur perspicuitas: tunc diaphaneitas in ipsa materia etiam citra ulum alium alterius materiam accessum, unde iure merito Paulus & Oribasius suffusionem appellabat, humoris præterfusionem, inter corneam & crystallinum, & Actius humorum præterfusorum congelationem, quare decipi solent qui suffusiones a continuato materia influxu augeri credunt: ita enim exiguo tempore utumesceret, & extuberaret oculus, aliique affectus a suffusione diversi exorirentur.



Nec defuit serosa materia antecedentis copia in Excellentissimo viro, cum hujus excellentiæ alia manifesta signa non desint, tum caput ejus essentialiter calida, & valde humida intumescere jamdiu laborat, tum quia in aqua potui semper deliquit & tandem quoniam à jecoris caliditate colliquante atque fundente, serositates in eodem multiplicari alias consideravimus, quas per venosum genus ad cor, deinde per arteriolum ad caput delatas, & ab oculis, tum alcarum ludu accensis candelis circumstantibus, tum etiam facile in legendo, aut scribendo sese exercentibus nimirum attractas, & nutritioni ineptas, vasa ipsa in jam dictum spatium evomerunt, & suffusionem constituerunt, quæ quando ab extrinseco influente discernitur, tunc non amplius incipientem, sed progressam esse censendum.

Summa vero prudentia statim ab Excellentissimo Adstanti fuit tentata curatio, quæ intervenire quoque potuit illi oculi præsertim, cum facilis nimis unius cum altero sit communicatio, & rara unius, & non alternus læsis. Nec deferenda suscepta provincia, cum Excellentissimi Comitatus corpus totum & caput humiditatibus scateat, quas educere, corpusque totum, & præsertim caput exiccare nostra semper intentio fuit. Et quamvis promissiones medicamentorum in lusu plures sint, effectus vero ut plurimum aut nullus, aut valde exiguus; attamen Hypochyma incipiens digeri posse promisit Gal. idem. Non est igitur cunctandum, sed in curatione progrediendum tum ut attenuato humore ulterius non procedat affectus, imo diminuatur, tum ut oculus sanus, aliaque corporis partes ab imminentibus malis præservetur.

Et ideo medicis intentionibus jam ab eruditissimis viis suppositis satisfaciendum; primo materiam fluentem evacuando, revellendo, ejusque generationem prohibendo, fluxum vero resolvendo, & oculos moderate calefaciendo.

Pro quibus assequendis sanguinis missio locum habere non videtur, & ideo & à Gal & ab Avic. ommissa fuit, sicut & Rhasis quancunque sanguinis missionem prohibet, quam & nos in hoc viro Excellentissimo omittendam censuimus, sicut nullo modo omittendum cauterium in laevo brachio inurendum: nec frictiones à nucha incipientes usque ad infernas partes, neque pedum lotiones. Interim totum corpus, quoad fieri potest, ab humiditatibus vindicandum. Inde caput quoque & piliis Elleboratis, & erthinis expurgandum: oculum enim ante caput curare non licet, neque caput ante totum, ut dicebat quoque Plato in Carmide. Quod tamen solis purgantibus medicamentis nos assequi posse nimis speramus, sed Diaphoreticis & sudorem provocantibus intus, & extra opus esse pro certo habemus, alioquin & oculos & alias facile partes à redundantibus humiditatibus lædi dubio procul videbimus, ut superius innuimus. Idcirco præmissa jam dicta totius & capitis expurgatione, Decoctum sudorificum erit instituendum, nec de liquatione, & fluxione ad oculos quicquam timendum, dum liquatae humiditates ad extremas corporis

& capitis partes alliciuntur, & per sudorem expelluntur, sicque ab oculis divertuntur, & interim materia jam fluxa attenuatur, & resolvitur aut ad resolutionem paratur. Sicuti valde inspectus apud nos semper fuit Decocti liquantis usus citra sudorem fusi namque humores dum per sudorem non expelluntur, ad debiliores corporis partes irruunt, sicque præsentis effectus adaugent, novosque producant: credibile namque non est Decoctum ipsum tantum absorbere posse, quantum liquat. Paretur itaque Decoctum, sed sudoricum, adeo ut totum corpus, & caput potissimum in hypocausto exudare possit, nempe ex visco querc. ligno roris mar. exigua pulpa guajaci, nec non lentisæ portione, in aqua stillat. cich. atque beton. euphrag. aut chelidoniz, cui si placeat præmitte bolum ex extracto præscripto clunæ, aut pulverem viperinum, Peritissimi Adstantis arbitrio remittimus, de cujus recto usu plura adducere non licet.

Interim autem Ophthalmica topica externa in usum ducenda, inter quæ quoniam crocus metallorum in aqua chelidoniz dissolutus à Quercetano extollitur, ideo nos tincturam ejusdem croci parari jussimus, ipso croco multo præstantiorem: cum enim crocus metallorum ex antimonio, & nitro semel calcinatis conficiatur, citra metallorum missionem non adeo operosum evadit tincturas extrahere. Verum ut facilius corneam permeare valeat ipsa tinctura, præmitti poterit suffumigium ex vino malvatico, in quo crocus & feniculum ebullierint, reposito vino calente in vase, aut phiala vitrea oculo adaptata, ita ut fumus ab oculo eodem recipiatur: rarefaciendo enim tincturæ penetrationem non parum juvabit.

Ante sudorem & post, vinum pro mensa, ligno roris. r. & euphragia paretur medic. tum. Et in reliquis congruam victus rationem a Viro Excellentissimo Adstanti præscribendam relinquimus. sicut cetera in præteritis nostris consultationibus descripta optime dirigi pro salute Illustrissimi atque Excellentissimi Comitatus & optamus, & exoramus. Joh. Raymundi Far-  
tur Consuli. & respons. Medic. T. 2. Cent.

#### *Suffusio incipiens.*

Nob. iste Adolescens temperamenti secundum totum ad calidum & siccum vergentis, calidioris jecoris, capitis humidioris, glaucos oculos à natura sortitus, libere præterea vivens; annus jam agitur cum dimidio, ex quo corpuscula quadam, seu atomos pupillæ observantes, sursum & deorsum moveri observavit, quæ modo majores quàm antea eidem apparent; nec semper ejusdem magnitudinis, sed quandoque majores, quandoque minores, sine tamen visus imminutione, sed potius ejusdem confusione: objectorum namque visibilibus visio non impeditur, nisi quantum loci occupant corpuscula ipsa, nunquam stabilis, sed ut superius diximus, in continuo motu posita. Pupilla observatur nitida, & licet non nigra, suo tamen naturali colore prædita, humiditas autem quandoque, licet raro sponte ab oculis decidit. Pejora verò timens Nob.



Nob. Juvenis de agendis consulit.

Corpuscula illa in oculis volitantia, ascendunt, & descendunt, imagines dici possent cum Gal. si perpetua non essent, sed modo adsint, modo abessent: sicuti quoniam perpetuo adsunt, idola potius cum eodem sunt appellanda. Differunt autem inter se idola & imagines ratione causarum; imagines enim à materia vaporosa ab infernis partibus ad oculos elevata proveniunt, quæ vaporosa materia, quoniam modo elevatur, modo non elevatur, ideo nec illa continuo apparent. Idola vero sunt à materia humorosa in oculo existente, quæ in aqueum humorem exprimitur in intercapedine inter corneam, & crystallinum, quæ postea in atomos divisa & à spiritibus se per commota & agitata, sursum & deorsum movetur, & modo majores, & modo minores apparent particule illæ humorosæ, prout quandoque elevatur quoque materia vaporosa, quæ implentur, & majores apparent, sicuti à calore, vaporibus resolutis, minores sunt, & ad primum statum redeunt. Oculo autem glauco exillenti & naturalem imbecillitatem habenti, ab humidiori capite justo major impertitur humiditas, sicuti à jecore & hypochondriis, feridioribus exillentibus, vaporosa quandoque communetur materia, unde hæc mala, eoque facilius, addita promiscua libertate vivendi.

Quod quidem symptoma nuncius suffusionis esse solet: jam enim præterfusio humoris secuta est cum Paulo, & Oribasio, underit quod uniantur corpuscula illa incassentur, & ut Actii verbis utamur, congelentur; tunc enim ad instar telæ ante pupillam velamen apparet, quod specierum visibilibus ingressum impedit, & suffusio, seu Cataracta tunc absoluta evadit.

Jure merito igitur Nob. Adolescens affectum præsentem non parvi facit, cum majora mala minetur: ideo cum hypochyma incipiens digeri posse promittat Gal. non sine spe præsentis incunda curatio & à progressu præservatio. Et proximo verno tempore agendum, antequam corpuscula illa simul coeant: tunc enim spatium meum visio semper tenebrosior redditur.

Et quoniam oculum curare ante caput, neque caput ante totum corpus non licet, ideo prima vix sunt expianda. secundo totum expurgandum. tertio caput. Quarto illud idem exiccandum, & roborandum, ut tandem materia pituitosa tenuis in oculo exillens insensibiliter digeratur, habita semper caloris jecoris, & hypochondriorum ratione.

Quibus intentionibus satisfaciendum remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis, & Dieteticis.

Et à Chirurgico desumi poterit sanguinis missio semel tantum administranda, eaque ex pede dextero, tum pro revulsione vaporum ascendentium, tum ut minus caput & oculi refrigerentur. Cauterium quoque pro nunc in laevo brachio inurendum. Frequentes sunt matutino tempore, antequam à lecto egrediatur, frictiones dorsi: vespertino vero ante cœnam pedum lotiones.

Reliqua remedia ex Pharmaceutico deprecanda; sic potio ex manna clarif. vel syrupus

rosi solut. cum manna poterit ventriculum exonerare, sicut cremor tart. ad sennunc. in jure cortic. citri alterato dissolutus, per quinque dies erit primum præparans, cui succedat eodem medicamento supra proposita evacuatio. Inde ad ulteriora præparantia erit deveniendum, & esse poterunt julapium quidem simplex acer. ad 3j. in decoct. cichorac. addita betonica, salvia, & majorana; in horum usum insillendum ad dies xii. in quorum intermedio sumat vel insulum agar. thab. & sennunc., addito syrupo ros. solutivo, vel electarium lenit. cum diaphen. cui superbibat aquam hordeaceam ad lbj. vel, 3j. quod idem medicamentum repetatur duodecim jam dictis terminatis diebus. Post hæc caput quoque erit respiciendum, tum præparantibus, tum expurgantibus; præparantia sunt oxyn el simpl. ad 3ij. cui superbibat succi beton. & euphrag. an. 3j. in decoct. cich. endiv. melissæ, calend. beton. salviæ, euphrag. chelidoniz; & quinque transactis diebus assumat pilulæ rum aggregat. coch. & aurearum an. 36. quibus, transactâ horâ, superbibat aquam hordeac. ad lbj. & quatuor horis ab assumpta aqua prandeat & repetat deinde tribus sequentibus diebus eadem præparantia, & inde pilulas aggregat. cochias, & lucis eadem dosi; ita & tertia vice interpositis, ut supra, præparantibus. Quibus præpar. ntium diebus onibus, masticatoria ex uiv matutino tempore erunt, ex mastiche, pulvere staphisag. pyrethri, fœniculi, & cera paratâ. Errhina namque si ve nifaria non vident ab Hyppoc. probantur.

Furgatum caput esset quoquo pacto exiccandum: Verum pro hac vice faciliora proponemus: quibus tamen non sufficientibus, mox ad generosiora, & magis operosa alio tempore esset deveniendum. Hant ergo quotidianæ aspersiones & manè, & vespere, pulveribus capitibus exiccantibus, paratis ex carie lignorum, cornu cervi ulio, radice iridis florent. ultis orizis rous rub. major. & caryophyll. in aqua rosac. prius maceratis, deinde exiccatis & in pulverem redactis. Post perimationem perficitur caput spongia vino albo imbuta mox expressâ & exiccâtâ, in quo insula fuerint, & efferbuerint lignum salutaris, rosismarini, radix rhodia, radix fœnicul. majoran. salvia. Sub ingressum lecti summo digito medio quinta essentia rosismarini intimato illuminatur futura coronalis, & sumat conservam, modò è floribus rosismarini, modò beton. modo euphragiz.

Tandem ophthalmica quoque externa sunt adhibenda, & esse poterit aqua B. M. destillata ex succis euphrag. chelidon. fœniculi, prassii, vino malvat. & mell. additis bovis, & lucii felibus, cum volatiliis hoc tempore haberi non possint; quæ aqua tepida jejuno ventriculo pluries sunt oculi abluendi; & ut facilius corneam penetrare valeat, præmitti poterit suffumigium ex vino malvatico, in quo ebullierit globulus croci & fœniculi pusillus, per phialam oculis adaptatam recipiendum. Ophthalmico jam dicto feliciori cum successu ego sum usus, quam cerebri illo Quercetani ex croco metallorum & aqua chelidoniz parato.

Jam dictis omnibus cautior erit addenda victus ratio, adeo ut caveat Nob. Juvenis, ab æris inclementius, ab edulibus vaporosis, tum



frigidis, tum nimis calidis; & præsertim ab usu lactis, lactuæ, apii, leguminum; a crassis & viscidis; à vinis generosioribus. Fugiat somnum diurnum, pariter exercitium à cibo; veneris immoderatum usum; & alacriter vivat, sed citra comestiones, & conpotationes. Quæ à Deo Nob. Adolescenti salutaria precamur. *Joan. Raymund. Fortis Consult. & Respons. Medic. tom. 2. Cent. 1.*

Vir triginta quinque annorum, chymicis operationibus apud fornaces ardentes incumbere solitus, post visus defectum in sinistro oculo, cum nubeculis ante illum volare visis, & majore obscuritate postea infecura, passum & seronem cervici frustra adhibitum; aliaque remedia, quæ humorum ad oculos deluxum inhibent, incassum usurpata; tandem, incrassata in oculo pellicula, & albida in pupilla apparente, in cæcitatem istius oculi incidit. Dum verò etiam in dextro oculo similem visus defectum, cum nubeculis, & filamentis ante illum volantibus, observat. Dextro oculo connivente, dilatatur pupilla oculi sinistri qui ex cæcatus est.

*Afferuntur in hoc ægro, oculus sinister secundum pupillam, ut ad oculum patet, & dexter oculus secundum humorem aqueum: ut constat ex nubeculis, ante oculum dextrum per visus fallaciam volare apparentibus.*

*Morbis quo sinister oculus laborat est obstructio pupillæ, à pellicula albicante in ejus cavitate nata, quæ radios rerum visibilium à sinistri oculi retina excludens, cæcitatemque coinducens, Cataracta confirmata dicitur. Morbus verò qui dextrum oculum afficit, est intemperies humoris aquei crassa, quæ particulas quasdam opacas in eo dispergens, & volare faciens, nubecularumque volitantium imagines in retina, & deinde in cerebro excitans. Cataracta incipiens, sive suffusio appellatur.*

*Causa procatartica horum morborum est diutina apud fornaces ardentes mora, qua pori vasorum & membranarum nimis aperti fuerunt, & humores in capite, & præsertim oculis, incrassati; iique in vasis eorum existentes, antecesserunt his morbis præbuerunt causam; illi verò in aqueum utriusque oculi humorem ex iis affusi, & primum in parvas quasdam obscuras & opacas nubeculas coagulati, & deinde in sinistri oculi pupilla in membranam coacti, continentes hujus morbi & symptomatum constituunt causam.*

A nubeculis enim in aqueo humore natantibus, & ex motu oculi in eo dispersis & volitantibus, excluduntur à retina multi rerum visibilium radii, atque ita integram inducit istius oculi cæcitatem.

*Periculum hic est, ne in sinistro oculo non tantum panniculus sive pellicula in pupilla sit nata, sed etiam ne humor crystallinus, vel vitreus opacitatem contraxerit, atque ita nulla chirurgia per membranae ablationem hic morbus curari possit. Verum dilatio pupillæ oculi cæci spem sanationis præbet. Et deinde metus est, ne etiam in dextro oculo humores oculares tandem opaci evadant, vel pellicula opaca in pupilla tandem nascatur atque ita cæcitatem etiam dextri oculi inducat.*

*Curatio tamen tentanda, quæ consistet in*

pelliculæ ablatione, nubecularum discussione; humorum ocularium attenuatione, & intemperiei oculi correctione.

Primo itaque acui à perito chirurgus, in oculum sinistrum prope extremitatem tunice adnatæ, adacta, pellicula à pupilla separatur, & deprimitur, ac vulnusculum cum maxima corporis, & oculi quiete, consolidatur.

Lo consolidato curatio incipientis suffusionis dextri oculi est inchoanda. Ac primo tales pilulæ erunt præscribendæ.

℞. Fol. feniculi ʒss. sem. feniculi ʒij. aq. chelidoniz, euphrasiz, verbenæ, an. q. s. Post levem ebullitionem infundantur per noctem; postea colaturæ eousque decoquatur, donec in spissam extracti formam fuerit redacta: atque adde aloës rosatæ ʒij. rabarbari opt. ʒij. turbith. ʒj. sem. rutæ, feniculi an. ʒss. cubebæ. macis an. ʒj. maltiches ʒij. scammonii ʒss. f. massa pilularum; de qua capiat bis tertie in septimanâ ʒ. dimidiam, vel duos scrupulos, mane jejunos.

Perterea corpore aliquoties purgato, utatur hac aqua stillantia, cerebrum, nervos, & oculos corroborante, humoresque oculares attenuante, mane cochlear unum quotidie bibendo.

℞. Herbarum feniculi, rutæ, euphrasiz, verbenæ, chelidoniz an. m. j. summit. consimilini, salvia, flor. rosar. an. p. j. baccar. juniperi ʒvj. lauri ʒss. piperis, garyophyllor. an. ʒj. cinnamomi ʒij. s. ligai aloës ʒss. sem. feniculi ʒij. fileris montani ʒj. rutæ ʒss. infundantur in vino generoso, & distillantur. Adhuc utatur hoc humento.

℞. Mellis carptionum, mellis, succi chelidoniz an. ʒss. coquantur parim, donec inspissentur, iisque adde tuthiz dragm. j. camphoræ ʒss. axungie thymali piscis ʒss. f. humentum pro palpebris extrinsecus sub lecti ingressum utgendis.

*Versetur in aere calido. Cibus sit ex carnibus gallinarum, vervecum, & aviculis montanis. Caveat nimis namectanti. Condiatur cibus serpilio, feniculo, beconica, salvia, majorana, pulegio, cinnamomo; Potus sit cerevisia, & vinum mediocrius virum. Exercitium sit moderatum, somnus brevior. Alvus respondeat quotidie arte vel natura. Mœstitiâ fugiat. *Hernicus Regim apud Theodor. Craanen. Medicinor. lib. 1.**

### Observationes.

Retulit mihi Medicus quidam ingeniosus, se in *Hollandia* vidisse mulierem quandam, vera suffusione laborantem, ex consilio cujusdam empirici succo millepedum brevi sanatam; incipiendo scilicet a tribus pro vice, augendo in dies usque ad ix. tum iterum gradatim numerum diminuendo atque ad 3. & rursus augendo ut ante, & sic vicissim.

Alia item mulier ab imminente, & minitante suffusione ejusdem medicamenti ope proflus liberata est. Contundebat quidem illa primum 5. millepedes, postea 10. tum 15. dem 20. (quotidie augendo numerum per quinque, donec ventum fuerat ad 50) in vino albo vel tenui cerevisia, forteinque expressionem jejuno ventriculo



culo bibebat. Honoratissimus D. Robertus Boyle  
In nunquam satis laudato libro de utilitate natu-  
ralis philosophiæ cap. 5. sect. 5. part. 1.

*Cataracta metus.*

Ante 10. Menses fere oculis meis simula-  
chra telarum aranearum instar observata, visus  
verò Dei gratiâ adhuc, licet nullus dies sine  
querela transigatur, dum hæc scribo, tam acut-  
us est, ut nec atomus fugiat eum, & splendi-  
dissimam lucem citra omnem ferunt laborem  
oculi, universum corpus sæpius evacuavi ut &  
caput pilulis cephalicis mundavi, interdum  
quoque ad sudorem eliciendum me composui,  
fonticulum in sinistro brachio & jam per ix.  
menses habui, vesicatoria quoque, errorem in  
dextra angue & cane peius vitavi, nihilominus  
adhuc dum hæc spectra ante oculos illuitare, &  
varias juxta oculorum nutum inducere formas,  
perseverant. Periculosam prognosin mecum  
intituo, & nē tandem aliquando, quod tamen  
coelestis avertat archiater, suffusio succedat,  
paveo hercle: licet clariss. Plempio a pueritia,  
Platero & ipsi ægro apud Carolum Pissum talia  
citra notabilem noxam oculis fuerint observa-  
ta, & ipse in hac praxi meâ vidi virum, cui  
quasi rete ante oculos expansum per quod ob-  
jecta videret, verum jam citra ullam querelam  
acute cernit, nihilominus tamen ego mihi ve-  
reor, quare à te imploro auxilium. Joann. Ludo-  
vic. Hannemannii.

*Tb. Bartholini ad D. Hannemannum Res-  
ponsio.*

Dolendi causam subministras, sed telis ara-  
nearum, ut spero, fragiliorem. Times scilicet a  
suffusione, quod simulachra quædam instar te-  
larum aranearum ante oculos observentur. Sed  
noli metuere. Securus te a suffusione esse ju-  
beo vel meo exemplo. Triginta & amplius an-  
ni effluxerunt, cum primò Patavii hæc spe-  
ctra metum quoque mihi injicerent, ut consi-  
lii gratia ad senem Medicum Joann. Dom. Sa-  
lam, in praxi meum ibidem ducem, accedens  
pro remediis solatium reportarem, plus hæc  
terrere quam nocere: ego certe ex illo tempo-  
re sprevi ista simulachra, quæ pro aëris humidi  
vel calidi conditione, vel augentur, vel minu-  
untur, nullo visus impedimento, quem tibi  
quoque integrum & acutum superesse lætor.  
Cæterum sedulo ex illo tempore cavi a lucu-  
brationibus, à quibus mihi tempero, ut post  
cœnam ad lucernam nunquam vel legam, vel  
scribam. Præterea pulveri tabaci magnam par-  
tem clarioris visus refero acceptam, derivantur  
per nares oculorum humiditates offuscantes  
visum: quo remedii genere plures sublevavi.  
Vel sola tabaci folia in pulvisculum comminuo,  
vel addo majoranam, euphrasiam, agaricum  
trōchiscatum & sem. fœniculi. Alia medica-  
menta ad suffusionem præcavendam tibi com-  
mendare nolo, ne noctuas Athenas. Ipse quæ es  
experientia, plura & scis, & rectè singulis uti  
novisti. Axungiam viperinam, l. udatam vidi-  
mus in Miscellaneis curiosis Germanorum,  
quam etiam amicus quidam meus expertus nu-  
per est, quæ idem metus tecum terret. Simplex

aqua ophthalmica ex vino albo rhenano, in  
quo intusa fuere fœniculum, bethonica, ruta, eu-  
phrasia, chelidonium majus, sarsaparilla, triticum,  
laudabatur mihi Patavii ex Bellocati traditione.  
Non dubito, quin corpore quotannis rite ex-  
purgato, servataque decenti victus ratione, & à  
lucubrationibus abstinentia, posthac simula-  
chra ista necum discas spernere, quod ex ani-  
mo precor, ut diutissime salvis oculis his per-  
fruaris.

*Cataracta depositio.*

Idem Lithotomus & ocularius Laurentius Ni-  
colai non semel magna dexteritate Cataractas  
labente anno deposuit. Unius depositioni in-  
terfuit, ne in prædio absente filius, Casparus  
Bartolinus, cujus in hanc rem literas ad me  
scriptas non pigebit hic subnectere, modo non  
pigeat lectorem legisse.

Pater charissime.

Adiit die 19. Januarii cum Dn. D. Simone  
Pauli, D. Henrico a Moench & D. Casparo Ko-  
tichen. Viro cuidam natione Gallo, annorum  
vix quadraginta, cui reliqua membra de me-  
liore luto iuxerat Titan, cæterum in sinistro  
oculo suffusionem patiebatur quam summa cum  
dexteritate deponi vidimus à Laurentio Nicolai  
Cimbri, artis quæ præterit haud infelici  
magistro. Oculo sinistro opposuerat se hæc suf-  
fusio, ex pituitosi, ut videbatur, humoris in spa-  
tium quod est inter corneam tunicam, & cry-  
stallinum, affusione, quamquam Galenus lib. 1.  
de sympt. caus. cap. 1. ab ipsius humoris aquei  
condensatione fieri interdum suffusionem do-  
ceat. Veram & legitimam suffusionem hanc  
atque à spuria distinctam esse nemo dubitabat,  
quippe quæ omnes veræ suffusionis habuit no-  
tas. 1. Alterum tantum oculum occupabat,  
quod veræ suffusioni proprium aiunt, unum  
tantum oculum aggredienti, aut si utrumque,  
non tamen simul aut similiter, sicut in spuria  
accidit. 2. In legitima suffusione tenebrosam  
quiddam in pupilla apparet, quod in spuria  
non contingit. Unde Vegetius lib. 11. Artis ve-  
terinariæ cap. 16. cum accedit suffusio oculi vide-  
tur i. calidus nullis lacrymis, nullo sanguine, nulla  
indignatione prodit in partem, sed uno tantum decla-  
rantur iudicio, quod cum pupilla ipsius imaginem  
inam tamquam in speculo videre non potest. 3. In vera  
suffusione symptomata sunt continua, nec ulla  
sunt intervalla, in spuria vero per vices augen-  
tur, & remittunt, prout vapores ad cerebrum  
efferuntur. Quas notæ nostram, de qua scri-  
bo, suffusionem habuisse vidimus. Quamquam  
autem Plinius lib. 18. Hist. Natural. cap. 1. Mi-  
letum scripsisse ait, oculorum suffusiones selle hominis  
sanari, huic tamen ultatum atque præsens no-  
stris temporibus remedium adhibitum fuit, so-  
la depositione per acis seu styli immisionem.  
Hic sine iurejurando sed efficacius oculos teri-  
git alienos ocularius, sedens quam veteres, qui  
oculos juraturi olim tangebant, teste Petronio  
Ovidium lib. 11. Amor. El. 16.

*At mihi te comitem jurabis usque futuram*

*Per me, perque oculos, sidera nostra, tuos*

*Sic & Tibullus lib. 3. El. 6.*

*Es si perque suos fallax juravit ocellos*

*Cur id factum, ex parente discere vellem,*



quem scio in Anatome Paganâ olim rem hanc pertractasse accuratius. Sed Vulcani invidiâ tantus labor periit. Si balbutientem me audire velis, Minervam hoc more coluisse, & ad testimonium vocasse veteres suspicor. Oculos quidem Cupidini Veneris filio, in quibus excubet ceuspecula quadam, tribuit *Philolaus*: rectius tamen minervæ eos sacrosuisse Paganis tradit *Fulgentius*. Unde Minervam cæcis oculis, ut pulcherrimis, tinxerunt poëtæ *Hesiodo* in operibus vocatur *Θη γλαυκῶπις Ἀθήνη*: Dea cæcia Minerva & alibi de Deorum generatione, idem *Asclepius*.

*Ἰὺς δὲ τῶν κεφαλῶν γλαυκῶπις Τριτογενής.*  
ipse verò (Jupiter) ex capite (peperit) cæcis oculis *Triogeneriam*.

Neque id injuria Minervæ enim oculi debebantur, quibus nihil pretiosius aut utilius est. Hinc oculis digni habiti non sunt venenci, & malefici. Exurebantur enim istis *Plaut.* *Menech.* A. 5. sect. 2. Ecce Apollo mihi ex oraculo imperat ut ego illi oculos exuram lampadibus ardentibus. Imò malignis eruti, apud eundem *Plautum* in captiv. A. 1. sect. 4. Nam hercle ego huic diei si liceat oculos effodiam libens, ita malignitate oneravit omnes mortales mihi. Deus tibi, parens indulgentissime, tuos diutissime conservet. Vale. *Hæmæ filium obsequenti.* *Cass. Barinolinus.*

*Suffusionis initium Fonticulo in brachio excitato evanescens: & oculi vigore eodem in nucha facto, restituitur.*

Chirurgo cuidam hujus urbis ante oculos muscæ & culices observari videbantur, hicque fontanellam facit in sinistro brachio; hujus beneficio visus naturali claritati restitutus, muscæque obvolantes evanuerunt.

Alius quidam puer rustici filius in Hollandia ex pago Bargenhufen, omnimodo oculorum imbecillitate laborans, ita ut lucem ægè ferret; hic primo in nucha habuit fonticulum sine successu, tandem consolidata rursum fontanella in nucha, unum in brachio, alterum in pede ipsi fecerunt fonticulum, hinc optime jam habet, acute cernit, splendidissimam lucem oculi admittunt. *Joan. Ludovicum Hannemannum.*

## CATARRHUS.

**C**atarrhus vox est vastissimæ significationis, quâ scilicet designari potest omnis affluxus materiae, è quacumque denuum parte procedat, & cuicumque illabatur, quo sensu plerique morbi catarrhorum decurrit adscribendi sunt. Inflammationes nempe & dolores intensiores, omnes linitates, ophthalmiæ, exetates, anginae, pleuritides, erysipelata, herpes, arthritis, tussis, imò lassitudo spontanea, scorbutus &c. Verùm non hic in sususima illa acceptione, quæ omnem humorum incurSIONem, ut nec contra etiam stricissimâ illâ, quæ destillationem tantum in os vel pulmones denotat: At media significatione, pro destillatione scilicet quæ à capite aut à glandulis ipsi proxime

accumbentibus, in quamlibet partem subjectam ruit, sumitur. estque ut vulgò desinitum præternaturalis humoris supervacanti & capite in partes infernas prolapsi.

In consideratione *Partis affecta* videndum quam sit *pars mittens*, quænam *pars recipiens*, seu terminus à quo, & terminus ad quem catarrhi; terminus à quo & pars mandans, est cerebrum pituitosi excrementi præcipua officina, seu potius glandulæ omnes in capite, ac etiam infra caput sitæ, parotides nimirum, maxillares, salivares variz, tracheales, aliæque per fauces œsophagum, ventriculum &c. sparsæ, quantum cum munus sit succum in parca quantitate pro variis usibus, aut pro sanguinis purificationes secernere, quandoque propter affluxum majorem, quàm ejus cursum & impetum moderari queant, ut propter fermentum in iisdem vitiatum sanguinemque appellentem totum quasi in serum tundens, per filtra hæc non tantum transudat quod transudare non debebat, sed etiam varie infectum, saliumque spiculis varie exaltatis ac suis humor extillans imbutus in partes vicinas ac subjectas excurret, plurimum malorum causa futurus. Terminus ad quem, seu pars recipiens, sunt partes illæ omnes in quibus destillatio illa decumbit, quæ si fuerint nares internæ Coryza, si gurgulio Staphyle, si tonilla Antias, si partes tonsillis proximæ Parithuria, si fauces Branchus, &c. dicitur.

*Causa materialis* est lymphæ, nunc insipida, nunc acida, salsa, ac acris, aliquando etiam corrupta & tota obstantia peccans, ut in catarrho contagioso ac maligno. Abundantius separatur hæc lymphæ, in quæ varios acrimoniæ gradus elevatur, tum quia jam sanguis ea quasi invidatus fuit, unde quæ data porta ruit, ac præcipue per glandulas cerebrumque glandularum omnium nobilissimam, tanquam per propria sua secermiculæ viam sibi in partes vicinas ac subjectas facit. Jam autem cum cerebrum illam separavit, non quidem per glandulam pituitariam aliasque vias à veteribus effictas intramandatur, sed tum per ossis cribriformis foramina tenuibilia; tum per jugulares venas quæ ipsam à vasis lymphaticis in cerebri sinus sese exonerantibus, excipiunt, aliundeque etiam exugunt, à cor, sanguinis quasi primam scaturiginem & fontem deducendam, atque per ejusdem circuitus, varias in partes deportandam ac deponendam; tum etiam per nervorum tubulos succo nervo admista undequaque defertur, licque non parum & vires, & membrorum morus, & viscerum functiones, interturbat; inio siquidem quæ per has vias exodat lymphæ, penetrantissima est censenda, (quo scilicet tam minutos subire possit poros) sale ad illorum magis evecto proculdubio imprægnatam esse credendum, unâ etiam atrociorum dolorum ac cruciatuum erit autor. Quæ verò in aliis omnibus memoratis glandulis cumulatæ lymphæ, tum per eandem membranas transudat, quod rarum est, tum præcipue per varios canaliculos excretorios ab hisque inde assurgentes, effluit. Copiosa etiam quandoque separatur lymphæ in glandulis, propter fermentum aliquod peregrinum in ipsis exiens, cujus maligna vis sanguis non tantum in serum funditur, sed etiam eidem sero tanta acrimonia imprimatur, quæ variis



variis torturis ansam præbeat. Sed præterea illa acrimonia vel ab aere, vel a cibis, vel à calore sanguinem non tantum fundente, at etiam saliva in ipso invidiantia exaltante, generabitur, imò etiam in sanguinem induci poterit analogum quid mercurio, quod ierilibus etiam mitionibus adjectum in corrosivum quid exaltetur, affluxumque ad caput faciat non abnilem illi unde salivatio in lue venerea anectis ex uncto mercurio oritur. Tandem ab ictu in partes glandulosas capitis, frigore quem extus admittit, tum etiam intus ex longiore in loco algido mora, suscepto, dum hincurgent glandularum fibræ, hic vero contriunguntur, pori earum, seu potius tubulanti: vasculosa, non parum aërantur, unde sanguis per alteras appellenti cum liber non concedatur comestus, illius tenuior pars, serum scilicet per arteriolarum ultimos ramusculos percolatur in ea spatia in qua nec vena nec vasa lymphatica hiant, sicque et circulationis viis excedens partes vicinas inundatione molesta affliget. Catarrhis autem cur quidam homines sint magis quam alii obnoxii, quoniam nec in nata nec in omnibus rebus non naturalibus ullatenus preceat; vel à debiliore sanguine seroque multo facile coagulabili, unde glandula ita obstruuntur ut succi postea advenientes ac viam satis patulam non reperientes, exundare cogantur. Vel etiam à laxiori glandularum compage quæ pius excipi et feri, quam per valde se assurgentia transmittere possit. Vel ab hæreditario aliquo malo fermento easdè glandulas inquinante & inciente. Adde hisce omnibus calvariam densiorem & inconsutam, pravam capitis conformationem ac illaudabilem magnitudinem aut parvitatem, antice seu postice ipsius projecturæ defectum, pinetam ac turbinatam ejusdem figuram, unde cerebrum ut plurimum aliquid patitur &c.

Differunt inter se catarrhi non tantum secundum varias quas affligunt partes unde scilicet coryza, Bronchus, Catarrhus suffocativus, Catarrhus stomachi &c. sed etiam in eo quod alius sit, in consistens, alius in gustu, quod alius sit frigidus, alius calidus, alius subdulcis, alius salus, imò etiam amarus, alius suffocativus qui tanta vi in pulmones irrupit ut subito suffocationis incertum merito incutiat, alius denique contagiosus.

*Signa Diagnostica per se satis patent. Prognostica* verò ex ubertate ac natura materiae decidunt, partiumque in quas irrupit præstantia petenda veniunt. Nam ut recte Celsus, *humorem in mures stillare leve est, in fauces posse, in pulmonem pessimum*; in genere tamen multo potius est humorem pituitosum in cerebro aggelum extra equitem conceptacula amandari quam in ipsis concitari, tunc enim vel Apoplexiæ vel Assectu Soporiformi materiam præberet. Ueri catarrhis quidem sunt obnoxii sed facile sanantur, dentes autem non modo ipsi opportuni vivunt, sed etiam ab hisce vix liberantur. Catarrhus cephaligæ junctus ægre sanescit; qui vero a præcordiorum altu elevatur, non prius curatur quam hæc refrigerint. Catarrho cujus causa in cerebro proprie sedet febris superveniens, eaque in dubio, & morbo analago gradu medetur, fluxionis enim materiam digerit; unde

Hippocrates, *Minus his qui ex capite gravedine laborant, si febre corripiantur, recidiva sunt.* De Catarrho eorum qui in agonem à variis morbis deducti sunt, quique mortis indefinenter adventuræ signum certissimum est, hic nihil addimus, quia ejus funestissima prognosis etiam mulierculis est nota.

*Catarrhi Curationem ac indicationes curativas* quod attinet, vide si placet de iis fusissime differentem Conradum Victorem (Schneiderum libro suo de Catarrhis quinto: ubi sectione prima, de Catarrhorum Digna septem capitibus; sectione verò secunda de speciali cura Catarrhorum, quatuor capitibus, totidem catarrhorum speciebus, ex ipsius distinctione, Coriza scilicet Catarrho membranae pituitariae posterioris. Brancho seu Catarrho gutturis, ac Catarrho suffocativo respondentibus accuratissime agit. Huc verò jam *Curationes, Consultationes, Observationes ac Anatomias iniectiones ex aliis variis* adducemus.

### Curationes

In omnibus catarrhis & defluxionibus tum prohibendis, tum etiam caput ab iisdem prætervandis prodest aqua serpilli cum vino destillata, ejusque particula quotidie sumpta dos. cochl. j. ij. pro ratione ægri, illa sic fit.

℞. Serpillum cum flore natutino tempore ante exortum solis decrecente luna collectum, inde in particulas minimas superiuso vino generoso libo in sole aliquandiu, postea per alembicum destilla in B.

Prodest vinum medicatum sequens.

℞. Rad. caryophyll. ʒvj. r. d. acori ʒiij. pulv. sanibuc. mss. fol. majoran. m. j. vini lbxvj. exhibeantur pro potu communi.

Catarrhum quemvis sistit saccus ex succino & sp. vini paratus de quo supra in apoplexiâ. Hujus itaque usus est magni momenti in catarrho suffocativo. It. ex chamæpithy pulverisato ol. succini asperso.

Catarrhos tenues delabentes ad partes interiores, præsertim pectus, feliciter sistit laudanum opiatum, sub ingremum lecti exhibitum.

Præcelsissimum in catarrho remedium extat in amuleto radice verbasce virginis, hoc est, quod per eam astatem non floruit, quando colligendum est. Colligitur autem in die veneris (ex his in ultima veneris die optime luna decrecente) ante exortum solis a 15. august. usque ad 8. sept. luna decrecente: postea radix purificata exsiccat in loco umbroso. Ejus particula in auro ligata, & collo postea appensa mirifice contra omnes catarrhos qualescunque corporis præservat. Læminis non prodest, conceptum impedit, quando gestatur, qui ea remota restituitur. Vide Dodonæum, Radix quod rectior, eo melior in parvâ quantitate.

### Catarrhus suffocativus.

Inter fluxiones, quæ à capite ad partes subjectas sunt, nulla periculior illa quæ ad pectus & cor sit, adeo interdum vehemens, ut hominem subito e medio tollat. Unde huic statim occurrendum absque omni mora. Hinc medicus vocatus, statim præsentem magnam sangui-



his abundantia, præmisso clystere forti, coque reddito venam secet, fumum in cubiculo exeret e mastiche, thure, succino per vices, & acet. rosaceum super lapidem ignitum effundat.

Capiti rasis capillis applicet emplastrum sequens.

℞ Emplastri contra rupturam ℥i℥. gummi ammoniaci ℥℥. masticis, succini ana. ℥j. myrrillorum ℥℥. m. simul & F. Emplastrum rotundum, suturæ coronali applicandum.

Nares inungat Balsamo succini, & ut æger sedeat in lecto, imperet. Exhibeat deinde syrupum ex aqua benedicta, & paulo post acet. theriacale vel scilliticum destillatum cum radice iudis Florentinæ. Accipitur sc. ℥j. acet. scillitici pulveris rad. ireos Florentinæ ℥ij. simul per alembicum ad siccitatem destillando, imposito rostro alembici nodulo ex radice dictamini. Accipiat item Boli atmeni loti in aqua rosarum ℥ij. cum syrupo de rosis siccis & pulvere diatragacanthi frig. ad ℥℥. sequens item garg. risina mulum vocetur.

℞ Syrup. papaveris, diamor. an. ℥ij. vini granatorum ℥℥. aq. plant. ginis, scabiosæ an. ℥j. M.

Hinc ad materiam concoquentia apozemata, syrupos, magisteria & electuaria confugiendum.

Materia costa repurganda tum iis, quæ sentinam in toto corpore respiciunt, tum iis quæ caput ab humore liberant, qualia erthma, sternutatoria, apophlegmatismi, garg. risini. Palmarum inter hæc obtinet nigella Romana, si subtilissimè pulverisata cum aq. majoranæ è vola manus in n. res attrahitur: imo hæc sæpius odorata proprietate occulta confert in quavis destillatione capitis.

Quæ caput confortant, sunt vel electuaria, vel conservæ storum anthos, stoechados, rosarum vel cum pulvere diamoschi dulcis, oxymelle scillitico, & oleo nucis molchata mixta, aut rotul. cum speciebus dictis, & cum ol. succini & saccharo in aq. fl. sambuc. soluto, quibus addi potest flor. sulphur. ℥j. vel altera. Possunt quoque ad præcavendum fluxum humorum subitaneum in ore noctu præsertim inter dormiendum tempore illi. tionis detineri orbiculi sequentes.

℞ Spicæ nardi ℥j. mastic. ℥ij. sacch. ℥ij℥. cum syrup. de ros. siccis f. orbiculi similes lupinis.

Exterius admoveantur sacculi vel pileoli capiti, qui recipiunt ea, quæ caput roborant, & materiam exsiccant.

℞ Flor. melissæ, majoranæ, betonicæ, summit. origani an. m. ss. nuc. molchata, caryophyll. Benzoin. ana ℥ij. croci, macis an. ℥ij℥. thur. mastic. an. ℥ij. rosar. rubr. p. ij. in pulverem grossum redacta serico rubro includantur ac insuantur. f. pileolus.

Aut si æger hoc medicamentum recuset, pulvis syncipiti inspergatur e mastiche, thure, succino, gallia molchata. Excipiat linteum, quo caput tegatur; linteum sæpius perfumeatur, & capiti applicetur.

Vel ℞ Masticis olibani an. ℥ij. rhymi, benzoin an. ℥j. suc. ini ℥℥. Tacamahacæ q. s. ad incorporandum. f. Trochisci profumo.

Profunt & hic poma odorifera ac balsamus

apoplecticus naribus illitus.

Quod si medicamentis dictis non cedat catarrhus, parti capitis anteriori tonsæ vesicæ totum admoveatur, vesica rumpatur, & per diebus unum & alterum aperta servetur, tandem consolidetur; non neglectis interim, quæ ad catarrhum exterminandum faciunt medicamentis. Alii candens ferrum, vel cauterium potentiale applicant, ubi digitorum in ximus desinit, capitis partii anteriori passim ubi ejus radice seu pollice extrema nasi radici adnoto Job. Harthm. in Praxi chymia.

Hujus affectus curatio duplex instituenda est, una quæ frigidum catarrhum, alia quæ calidum respiciat.

Tota catarrhi frigidi curatio in eo consistit, ut materia peccans præparetur & evacuetur, & si ad pectus, aliamve partem influat, revelatur, illiusque motus inhibeatur, tandemque intemperies cerebri corrigatur.

Primo itaque si materia copiosa sit, aut nimio impetu ruat, & metus sit ne a reliquo etiam corpore affluat, præsertim si hepar sit calidum, (contingit enim non raro, ut catarrhis obnoxii habeant cerebrum frigidum, & hepar calidum) sanguis mittendus est, sed parciori manu. Si vero materia sit pauca, & lente moveatur; ætas vero senilis, aut temperamentum hepatis minime calidum, unde nulla sit suspicio humorum aliunde cerebro supeditari, venæ sectio omittenda est.

Materia vero peccans primum imminuenda est, portione aut pilulis, vel alio quovis medicamento purgante, & his quæ in frigida cerebri intemperie fuerunt proposita.

Mox reliquæ humoris præparandæ apozemate dicto loco descripto; aut si nimia humoris exagitatio non metuetur apozema purgans poterit institui.

Ac tandem pilulis fortioribus; aut alio cathartico integra purgatio erit absolvenda.

Si catarrhus admodum contumax fuerit, ad vomitoria confugiendum est quæ illius materiam potenter eradicant.

Colocynthis ad cerebrum potenter expurgandum efficacissima est, sed summo amarore intentata est, vehemensque est illius operatio. Corrigitur utrunque infusione in urina, sic enim amaritudinem deponit & ferè insipidum remedium evadit, tum vehementia illius infringitur, ut ad ℥j. tuto exhiberi valeat, itque excellens ad morbos à causa frigida oriundos remedium.

Interdum verò contingit, ut humores excrementitii à partibus interioribus ad cerebrum sublati, catarrhum efficiant. Motum autem illum præternaturalem nanciscuntur obstructis meatibus ordinariis, per quos humores illi expurgari solebant. Ex tunc temporis opportunissime curatur catarrhus apertione viarum, tum etiam blandâ, mistâ, & continuâ purgatione, quia humores sic ad partes inferiores deturbantur, usque motus contrarius sensim conciliatur.

Hujusmodi autem purgationes blanda fieri possunt per decocta, vel juscula ad multos dies usurpata. Interim tamen roborantia medicamenta non erunt omittenda.

Ad revulsionem vero admovebuntur cucurbitulæ



bitulæ & vesicatorum scapulis & cervici; tum etiam cauteria occipiti vel brachio. Zacutus Lusitanus lib. 2. Praxis ad miranda Observat. 160. Cauterium retro aures, tanquam præstantissimum, ad omnes destillationes à capite manantes, remedium plurimum commendat. Et nos in fluxionibus, oculorum præsertim, laudabiles effectus vidimus. Erhina, sternutatoria, apophlegmatismi & masticatoria erunt usurpanda; ea tamen adhibita cautione, ut quando catarrhus in fauces, pulmones aut ventriculum decumbit, erhina, & sternutatoria tantum usurpentur; quando vero in oculos & nares induit, masticatoria & apophlegmatismi.

Horum omnium formulæ capite prædicto fuerunt propontæ. In his tamen advertendum, quando materia tenuitatis cuiusdam particeps est, ne fortius resolutiva usurpentur: his enim humoris impetus ad pectus, & pulmonem aliasque partes adaugeri potest, sed nonnulla incrementa, ut humoris impetum continentia erunt admiscenda, ut rosæ rubræ, mastiche, coriandrum, nux molenata, aliæque in catarrho calido tutius proponenda. In hunc sensum erhinum in sequentem modum componi poterit.

℞. Aquæ majoranæ ℥i℥. succi betonice ℥j. sem. nigellæ pulverat. ℥i℥. nuc. moschat. ℥j. nat. erhinum. Pro ditioribus addi poterunt moschi, & ambre griseæ, an. gr. ij.

Vel ℞. Ligni guaj. ci linuati ℥j. aquæ puræ ℥b. infundantur per noctem supra cineres calidos, deinde coquantur ad medietatis partis consumpt. addendo sub hunc majoran. & rosarum rubr. an. p. ij.

Sic etiam masticatorium, subtenui existente materia, vel fiet ex mastiche sola, vel in hunc modum.

℞. Nucis mosch. ℥j. mastiche, gummi arabici, an. ℥i℥. redigantur in pulverem & cum aqua rosar. hant trochisci masticatorii.

Præstans sternutatorium componitur ex hellebori nigri, & sacchari partibus æqualibus, quod cerebrum potenter expurgat.

Extractum nicotianæ cum aqua vitæ paratum linguae impositum, ad pili magnitudinem magnam pituitæ copiam instat apoplegmati nuper os educit. Verum si nimis copia usurpetur aut si in ventriculum effluere sinatur, vomitum excitat etiam vehementer.

Supra dictum est cauteria brachiis, occipiti, & pone aures inusta plurimum conferre, quod etiam efficaciter præstant posteriori parti cervicis, & inter scapulas adnota quæ hodie in maximo usu sunt, & à Practicis nostris passim usurpantur. Novus etiam locus a quibusdam inventus est nempe in cervice prope venas jugulares, in musculorum interstitio, & hujus cauterii beneficio catarrhus inveteratus raucedinem efficiens in duobus curatus est.

Tandem post convenientes evacuationes, cerebrum roborantia & exsiccantia tum interna quam externa, erunt utilissima, ut opiata, pulveres, cucuræ, suffitus, prout in curatione frigida intemperiei cerebri descripta fuerunt.

Notandum autem est opiata prædictæ, aut aliis similibus, in catarrhi curatione conservam rosarum, nucem moschatam & tins album uti-

liter admisceri.

Decoctum ligni lentiscini in modum decocti sudorinci usurpatum, cerebrum exsiccet, & fluxionem cohibet.

Præterea sequentes morsuli ad hunc usum sunt utilissimi.

℞. Sem. coriandri præparati ℥i℥. nucis mosch. thuris an. ℥. iij. glycyrrhizæ, mastiche, an. ℥. ij. cubebæ. ℥. j. conserv. rosar. rub. ℥. j. sacchari albi in aqua rosar. dissoluti ℥x. Fiat confectio in rotulis pond. ℥. iij. capiat unam mane & vespere.

Trochisci sequentes valde commendantur à Solenandro Conf. 10. sect. 4. quos ab Antiquis tum Græcis, tum Arabibus mutuatur.

℞. Thuris masculi, succi hquiritiæ an. ℥. j. opii, croci, myrrhæ an. ℥. j. cum syrupo pappi. forma trochiscos, vel pilulas urgente catarrho exhibendas per intervalla, dosis erit ℥ij. vel, ℥i℥.

Tabellæ sequentes etiamnum usui esse poterunt.

℞. Pulver. electuar. diamb. & diamoschi dulcis an. ℥. j. succini albi ℥. j. ol. anisi gutt. iij. sacchari in aqua lavendulæ dissoluti ℥. iv. Fiant tabellæ pond. ℥. j. capiat unam mane & sero.

Interna media interna, capite de intemperie frigida cerebri descripta, summa est efficaciz ad catarrhi inveterati curationem, balsamum cephalicum ibidem post opiatam descriptum, quod vitus alium poterit, & in narium cavitates immitti.

Lac sulphuris, & flores ejusdem ad catarrhum exsiccandum maxime laudantur à Chymicis, tum etiam Galenici in tubellis flores sarpissimæ usupant.

In recenti Catarrho aqua nucum cum hydro-melite exhibita hora somni per triduum, cum valde inununt.

Ad cohibendum catarrhum utiliter admoveatur incipiti raso cataplasma ex fermenti ℥. ij. & carabes ℥. ij. compositum. Si vero æger caput radere noluerit supra ipsum capillitium aliqua ex parte detonsum, sacculus ex chamæpit. & carabe conflatus apponi poterit.

Præter suffitus prædictos, qui ex gummi Tanahaca sit, summa est efficaciz, catarrhum enim exsiccet ejusque motum cohibet; neque vehemens est illius odor, ita ut conclave agrotantis eo sine molestia perfundi valeat.

Commodissimum est etiam caput exsiccare sacculis ex suffure, nilio, sale, foliis salviz, betonice, floccados, sem. feniculi, anisi & similibus.

Denique si affectus sit contumax, omnia convenient remedia quæ pro frigida cerebri intemperiei curatione fuerunt proposita.

Calidus catarrhus curatur remediis materiam peccantem evacuantibus, incrassantibus, & revellentibus, tum etiam partium mandantium & recipientium intemperiem corrigentibus.

In hunc finem primo phlebotomia instituenda est, si cætera consentiant, quæ humor fluens revellitur, ejusque armonia temperatur.

Deinde humoris ejusdem portio educenda est, blando cathartico, quod humores nullo modo commoveat in hunc aut similem modum.

℞. Rha-



℞. Rabarb. electi ℥ iv. myrobalan. citrinor. ol. amygdal. dulc. 3℔. fantali citrini 3℔. Infundantur in aqua lactuca & portulacæ. in expressione dissolve manna granat. & syrup. rosar. solut. an. 3. j. Fiat potio.

Vel loco aquarum predictarum potest fieri decoctio ex herbis refrigerantibus, & tamarindis, cui purgantia prædicta permisceantur.

Deinde humor alterandus & incrassandus est julepis convenientibus.

℞. Ol. lactuc. portul. c. & plantag. an. m. j. sem. quatuor frigid. mai. & papav. albi an. 3. ij. flor. violar. nymphaeæ & papaveris rhæados, an. p. j. coquantur ad f. b. j. in colat. dissolve syrupi violac. & rosac. siccat. ana. 3. j. ℔. Fiat julep. pro tribus dosibus bis in die nunciis.

Vel loco decocti, aquæ stillatitæ prædictarum herbarum, vel emulsionis quatuor sem. frigidorum mai. substitui poterunt.

Deinde purgatio paulo fortior usurpanda; addendo purgantibus prædictis semani, catholicum, diaprunum & similia.

Leve ac blandum remedium incrassans, humorisque acrimoniam demulcens, desumitur ex vitellis ovorum recentium, quorum duo in uncis quinque vel sex aquæ fontis dissolvantur, binario numero, addendo sacchari albi 3. j. coquantur parum sine ebullitione, semper novendo, & capiat calide quantum ferre poterit, mane & sero per triduum.

Actandem majori humorum incrassationi, & fluxus cohibitioni incumbendum est quod fiet syrupo sequenti.

℞. Syrupi violac. & de ros. siccis ana. 3. j. syrupi de papavere 3℔ detur ex cochleari 3. j. hora somni.

In eundem finem usurpari poterit opiata sequens.

℞. Conservæ rosar. antiquæ 3. vi. pulveris electuar. diatræg. frig. 3. ij. Ol. armeni loti in aqua rosar. 3. ij. cum syrupo rosar. siccatum, fiat opiata; capiat ad magnitudinem avellanae hora somni.

Hordeatum sequens utilissimum etiam est.

℞. Hord. mundat. q. s. maceretur per horas vi. postea coquatur perfecte, & trahatur. Deinde accipe amygd. dulc. excort. 3. ij. sem. cucurbitæ mundat. 3. j. ℔. sem. melon. 3. j. papav. albi lactuc. an. 3℔. contulis omnibus cum aqua hord. eliciatur lac. quod cum f. b. ij. pulpæ hord. permixtum coquatur parum, addendo sacchari portionem. Bibat 3. x. aliquot martiniis super dormiendo, & nonnunquam in introitu lecti. Tum etiam trochisci sequentes in ore frequenter erunt detinendi.

℞. Gummi tragacanthi & Arabici, an. 3. ij. boli armeni. terra sigillat. lotor. in aqua rosac. an. 3. j. sem. papav. albi, succi liquiritiæ, an. 3℔. sacchari penidiat 3. j. cum mucilag. sem. cydon. extract. cum aqua rosar. nant orbiculi parvi, quos diu noctuque in ore detineat.

Spiritus sulphuris, & vitrioli ad gutt. ij. vel iv. exhibitus mane, & sero cum liquore idoneo, contra omnes fluxiones magnas vires habet; præsertim vero eas quæ a calida viscerum intemperie ducunt originem. Potest etiam in minori dosi potui permisceri, quia cum eo venas omnes pervadit, & motum humorum cohibet.

Crystallum etiam minerale ad eundem usum julepis, aliisque remediis admisceri potest. His nihil pronientibus necessitas cogit, uti narcoticis, inter quæ principatum obtinet Laudanum opiatum ad gr. iv. vel v. hora somni exhibendum. Vel syrupi de papav. 3℔. vel 3. j. exhiberi poterit. Hæc ab initio morbi usurpata miranda præstant. Eandem habet vim theriacalæ recens ad 3. j. vel 3℔. noctu exhibita.

Benedictus Faventinus sequentibus pilulis usus est in catarrho falso, felicissimo cum successu.

℞. Succu glycyrrhizæ 3. ij. aloës lotæ 3. j. pilul. de cynoglossa 3℔. cu syrupo violac. fiat massa pilularum de qua capiat 3. j. hora somni: trochisci dolentissimi supra descripti erunt etiam utilissimi.

Huic usui etiam maximè conferre possit diacodium. album, in curatione phlegmæ descriptum.

Interim revellenda est materia fluxus per clysteres cucurbit. frictions & ligaturas extremorum, omniumque potentissime per venæ-toria, posteriori cervicis parti adnota ac denique cauterium occipitio, vel brachio, si cathartus sit diuturnus.

Ad caput etiam roborandum, fluxionem retinendam, ejusque reliquias ablumendas convenient pulveres, cucurbitæ, & eniphaltra.

℞. Succu albi, sandarac. gummi. Arab. mastiches, benionii, nucis moschatæ, an. 3. j. thuris gran. kermes, & rosar. rubrar. an. 3℔. fantalor. omnium myrtill. & balaut. an. 3. ij. fiat pulvis, qui inspergatur capiti hora somni, mane pecunie decutiendus.

℞. Gummi juniperi 3. ij. rosar. rubrar. p. ij. myrtill. 3. j. macis, nucis moschatæ, an. 3. j. thuris, sem. proniæ, cortic. papav. an. 3. ij. nuc. cupreæ. 3. ℔. pulveriscentur, & cum stocci panni coccinei, ac sindone rubra fiat cucurbita inter puncta perpetuo gestanda.

℞. Mastiches, cortic. rhinis, an. 3℔. sandaracæ, coralli rubri, rosar. rubrar. myrtill. balaut. cortic. granat. an. 3. j. laudani 3. ij. ceræ, & olei rosar. an. q. s. nate. plastrum, applicatur coronari.

Quia vero hujusmodi catarrhus a calida ple-rumque hepatis intemperie ducit originem, ideo remedia quæ huius intemperiem emendant, erunt etiam usurpanda.

Denique hoc imprimis notatū dignissimum est, quod etiam nunc supra in catharris frigidi curatione propositum est; quod nimirum non raro minores excrementitii, à partibus inferioribus ad cerebrum sublata, cathartos efficiunt, & motum acquirant præter naturalem, obstru-ctis meatibus ordinatis, per quos expurgari solebant. Et tunc temporis opportune curatur catharrus apertione viarum; si autemque blanda & continua purgatione per pulegiæ aut talis decocta, ad multos dies instituta. *Le-zavi Riverius Prax. Medic. lib. j. cap. ij.*

In ipsa catharris curâ observandum, ut lymphæ aut nimis copiosæ evacuetur, ut eadem vitiosa corrigatur: serum salsum & acidum per contraria temperando (id quod vulgo vocant catharrum seræ esse incrassandum) eandem vero lympham crassam vel nutrimento partibus in mucilaginem degenerato imprægnatam tandem



tandem attenuando, incidendo & resolvendo (ubi tamen observetur, modo pars affecta sit reilituta) sponte hæc rejicitur.

Porro si quis subest partis & glandularum, aut obstructarum, aut alio modo læsarum, vitium, istud corrigatur, & quidem imprimis, si sit à læsione externa, per convenientia externa istud corrigatur, & restituatur; si autem sit à causa interna stomachi nempe vitio, & huic sequente totius massæ sanguineæ corruptela, in specie ab acrimonia falsa, hæc ipsa emendetur. Nimirum uti rectè monet Schneiderus materix, causæ, & loci ratio sedulo in cura catarrhorum habenda.

Remedia ea quæ hic conveniant, videntur.

1. Esse evacuantia: verum evacuantia quæ per alvum evacuant, minus commoda sunt, quando potius feliciori & promptiori succellu lymphæ augmentum per urinam, & etiam nunc per sudorem evertitur. Talis ergo ex salibus volatilibus v. gr. succini, C. C. item ex lignis sudoriferis; in specie ex ligno sassafras eruat optima. Interim tamen, ubi catarrhus fuerit contumacior, aut idem ex stomachi vitio dependeat, vel etiam corpus impurum ostendat, subinde necesse est ad purgantia progredi, imò ubi contumacior fuerit catarrhus, etiam ad vomitoria properandum suadet Riverius in sua praxi, id quod confirmat per experientiam in cent. 2. observ. 90. ibi enim refert catarrhum in pulmones cum aspera tussi defluentem, cum insequentem gravi dolore capitis, qui tandem curatus fuit per vomitum, per mallicationem solorum tabaci procuratum.

2. In catarrhis sæpius recurrentibus v. gr. in senibus aut senilibus sæper ante novilunium, aut evacuantia appropriata, aut a catarrhis alias præservantia, usurpanda, quæ inter eminent succinata & post hæc myrrha & sperma ceti, de quo postmodum.

3. Si quæ alia in catarrhis à lymphæ nimia acrimonia conveniunt, sane opiata erunt optima. Unde a veteribus in tali casu, nempe uti vocant, in catarrho tenui pilulæ de cynoglossa ex narcoticis dispositæ, fuerunt in usu.

Hæc ipsæ tamen pilulæ, quia ex crudis nimis, nimisque præparatis narcoticis sunt compositæ, v. gr. ex opio, Hyoscyamo crudo, & similibus, ob id in desuetudinem ferè abierunt, utut in Belgio adhuc usurpentur.

His opiatis optime catarrhus nocturnus evertitur & præcavetur. Sed tamen sola vix usurpanda; verum uti jam alias monui, appropriatis sæper mixta. v. gr. succinatis, cephalicis, & similibus, quæ lympham corrigere, & blanda diaphoresi & diuresi ejus augmentum avertere possunt.

Decantat admodum horum opiatorum usum Helmont. in catarrhis & similibus affectibus in tr. Jus duumviratus, §. 62. 64. & 65. & inter alia felicem prædicat ægrum, cujus auxiliator Medicus sciat lethalia à papavere separare, retento auxilio excitatore potestatis in duumviratu. Salutarem præterea opiatorum usum confirmat quotidiana experientia. Imprimis ex modernorum consuetudine frequenter iis fuit usus Riverius qui cent. 3. observ. 5. observat catarrhum contumacem cum raucedine cu-

ratum per iij. grana laudani opiatum assumptum; item in eadem cent. 3. observ. 69. refert, catarrhum diurnum cum tussi per duplicem usum granorum trium laudani opiatum curatum. Et eadem cent. observat. 74. Catarrhum serinum cum variis febrium complicationibus, præsertim per laudanum opiatum curatum observat. Allumuntur talia opiata imprimis tempore vespertino sub introitum lecti, uti alias est consuetum.

4. *Chirurgia* in catarrhorum cura flet, nisi in iis corporibus ubi catarrhi fere sunt incorrigibiles, uti sunt admodum contumaces, aut sæpius recidivantes, aut ubi sunt similes affectus vitio lymphæ exorti admodum contumaces: tunc enim deceptivum & palliativum fonticulorum remedium interdum est adhibendum. Hæc enim voluntaria ulcera palliative tantum his affectibus medentur, productum nempe morbosum aliquantisper eliminant, causas vero ipsas relinquunt. & cum vitioso latice utilem alimentitium succum in pus corruptum simul emungunt: ubi tamen à priori catarrhorum contumacia sæper occurrere nequit Medicus, per fonticulum, à posteriori ejus ferociam nonnihil mitigare intendat, subtrahendo scilicet laticem & cruorem in parva quidem sed continua quantitate, & ita imminuendo naturam catarrhalem, horum insultus mitiores reddit: per se enim totum cauterium, & facti inde fonticuli excitatio tantummodo in cruoris & laticis minutâ quidem sed continuâ exhaustionem consistit, adeoque palliative tantum proprie convenit; per accidens vero & à posteriori æ palliative, etiam iis confert affectibus quia sordibus quibuscumque vitio primæ digestionis aut vitio lætæ in sanguine fermentationis, aut vitio corrupti feri in massa sanguinea, enascuntur, ita ut labe illa à priori propter subiecti ineptitudinem, v. gr. vel ob senium, aut in mulieribus propter menses deficientes, aut propter characterem hereditarium sunt incorrigibiles.

In talibus ergo casibus una cum sanguine laudabili evacuatur simul id quod est nocivum, & etiam, quia excrementitium omne per se naturæ hostile ab æconomia vitali est præscriptum, propterea istud facile, imò facilius quam utiles succi separatur, & ita per fonticulos excernitur: sicut fit interdum ab ipsa natura, cum eadem hinc inde spontanea excitat ulcera, quæ sanata per artem corpori non leve inferunt incommodum, sin vero denuo aperiantur, corporis æconomia denuo fit quieta. Egregium hujus rei exemplum habet *Scultetus in observationibus Chirurgicis observat. 55. & 57.* & sane id quod Scultetus hic observavit in ulceribus spontaneis, interdum etiam in fonticulis intempestive oclusis observatum fuit.

5. Quoad venæ-sectionem negotium hoc per se locum non invenit. Sin verò subjectam sit plethoricâ & consueta sanguinis evacuatio suppressa &c. quibus & aliis similibus occasionibus intenduntur symptomata catarrhum vel constituentia, vel consequentia, consulta est ven. sect. observando revulsionum & aversionum regulas. Quin etiam cum confestim nimis fit decubitus catarrhalis in quadam parte, ad impetum istum refræmandum, ven. sect. in loco opposito secun-



dum revulsionem & aversionem instituta, subinde solet in praxi admodum esse proficua.

Post opiata, remedia vel sudorifica, quae partes eluunt, earundem sordes mediante sero commodo abstergunt, ac serum ipsum simul minuunt: vel aromatica, vel balsamica quae tam ipsum corrigunt & emendant, quam partes solidas roborant, sunt utilissima in paroxysmis catarrhalibus. Haec ipsa enim indicationibus supra factis maximam partem satisfaciunt.

Quod ergo attinet remedia in affectibus catarrhalibus usitata, iisque appropriata ea sunt primario serpillum quod est singulare catarrhale, quodque ut dicit Lindanus, simul corrigit stomachum, & ita antecedentes causas removet. Satureia, thymus, majorana, mentha, hyssopus; Item flor. betonicae, flor. salviae, flor. anthos, lavendulae, liliorum convallium, radices caryophyllatae, aristolochiae rotundae, helenii, lignum sassafras, lignum lentiscinum, lignum juniperinum, lignum guajacicum & similia ligna, quae communia decocta sudorifera ingreduntur. Quin & baccae juniperi, macis, acorus verus & adulterinus, zedoaria, cinnamomum & similia usitatissime usurpantur.

Haec inter primatum obtinet lignum sassafras nobilissimum, praeter omnibus ad catarrhos remedium, adeo ut etiam a Brunero in suis consiliis proprium catarrhorum vocetur alexipharmacum: odorem & saporem habet aromaticum adeoque vim monstrat corrigendi, & alterandi acrimoniam lymphae, tam acidam quam salsam, praetereaque eandem nimis copiosam viam per urinam, aut per sudores evacuandi. Unde decoctum ligni sassafras egregium est remedium ad sistendos & curandos catarrhos, vel etiam exinde fit ess. vel tinct. sassafras Mynsichti quam habet in armamentario ad omnes affectus catarrhales convenientissima.

Pertinet huc etiam ess. ligni sassafras D. Michael. quam alias etiam vocavit ess. catarrhalem, quae extrahitur cum spiritu serpilli. Nam serpillum & ipsum est commendatissima planta ad catarrhos, & ab omnibus laudatur. Modus praeparandi spiritum serpilli pro extrahenda ess. ligni sassafras est hic. Nempe recipiuntur summitates serpilli camp. stiris recentes, exque collectae ante solis ortum, ita ut rore nocturno adhuc madeant, his affunditur vinum malvaticum q. s. ut 3. praeter propter digitos emineat: digeruntur in arena per 14. dies & noctes, hinc destillantur per balneum: liquor destillatus affunditur recentibus serpilli summitatibus eodem modo collectis, deindeque ut antea digeruntur, & destillantur, idque quod fit saepius, eo aqua fit efficacior, & magis spirituosior evadit. tandem haec aqua spirituosior seu spiritus serpilli affunditur rasura ligni sassafras: digeruntur in loco calido, donec menstruum ligno sassafras impraegnatum egregie rubescat: Hinc decantatur & ad usum reservatur: dosis prout vel magis, vel minus spirituosior fiet aqua serpilli, ad gutt. 30. vel 60. aut si debilius fuerit menstruum cochlear 1. potest propinari, idque mane, in meridie, & vespere, vel etiam urgente necessitate quocumque tempore. Valet admodum in omni catarrho, praeservat ab apo-

plexia, & insigniter conducit affectibus similibus. In catarrho scorbutico miscetur haec tinct. sive essent. ligni sassafras cum essent. pini balsamica, & sic fit egregium remedium contra catarrhum scorbuticum, imprimis si simul maneat paralyticus scorbuticus.

Loco decocti ligni sassafras subinde etiam aliorum lignorum decocta fructuose usurpantur, sicuti videre est in observationibus Lotichii, admodum fructuosus decoctorum lignorum usus in affectibus catarrhalibus. Item Gabelchoo in obs. singulis catarrhosis decoctum chinæ summo cum fructu praescribit.

Alii non sine ratione commendant decoctum ligni lentiscini, ex quo destillat mastiche. Cum ergo mastiche sit singulare anti-catarrhale, non dubium est lignum lentiscinum, & ipsum aquae esse appropriatum, atque lignum sassafras ad curandos catarrhos. Pertinet huc decoctum catarrhale Mynsichti, quod ex similibus paratur. Item vinum medicatum ex infusione aut decoctione istorum simplicium vegetabilium, quae inter primarium est vinum Paracelsi, quod pro basi agnoscit radicem caryophyllatae & acori aquatici: cuius descriptionem habet Hartmannus in praxi chymiatrica cap. 21. §. 2. Nam Paracelsus radicem acori aquatici, & caryophyllatae singulariter commendat ad roborandum caput, & ad praeservandum a quibuscumque defluxionibus catarrhalibus. Lindanus insigniter commendat hoc vinum catarrhale, quod ipsum etiam non est inelegans.

℞. Ligni sassafras rasi ʒij. radic. caryophyllatae ʒj. herb. rorismarini recentis ʒss. intunduntur, in mensuras ij. vini, coquantur vase clauso in balneo maris horis 8. deinde removeantur ab igne, ut refrigerent, & vinum hoc coiatum bibendum. Dicit Lindanus, ubi experimentum esse hoc vinum, & magnarum virtutum in curandis catarrhis, cum & venterculo succurrat, sanguinem emendet, & in specie lymphae vitia egregie corrigit. Alias non minus quam lignum sassafras, Cortex tamarisci ad curandis catarrhosis laudari solet: si scilicet huius ʒvj. coquantur in aquae simplicis mensuras vi. ad absorptionem dimidiae partis, hoc enim decoctum potum admodum laudatur ad quancumque lymphae abundantiam, indeque ortos affectus catarrhales quoscunque; unde tere posset vinum medicatum ex formula Lindani praescribi hoc modo.

℞. Ligni guajaci, corticis tamarisci ana ʒij. ligni rhodii, sassafras gummosi ana ʒij. herb. absinth. vulgaris m j. scolopend. eupator. n enthae, hyssopi ana m ss. radicis helenii, centaurei majoris, zedoariae, cinnamomi ana ʒj. affundantur mentura 4. vini, stent in infusione, & de infuso sumatur semper haustus per 10. diem 1. vel 2. ante prandium. Huiusmodi vinum medicatum usurpantur imprimis in catarrhis ex vitio interno enatis, imprimis stomachi & mase sanguineae; qui sunt a causis externis, facilius ab externis curantur. Facit huc etiam vinum Adriam Papae ad catarrhos alias commendatissimum.

℞. Myrobalanorum omnium siccatorum an. ʒij ss. cinnamomi ʒj. caryophyllorum, galanga, cubebae, cardamomi granorum paradisi, nucis molchatae an. ʒss. rosarum rubrarum sicca-



siccatarum 3 i 6. flor. anthos. contusa misceantur ad aliquot mensuras vini & infusum exinde bibatur.

Præter dicta vegetabilia & hætenus recensita etiam alias sunt egregia ess. lignorum compositæ, item tinct. corall. lassifrata, sive cum spiritu ligni lassifras parata, item ess. florum anthos, ess. salvia, ess. serpilli, præ cæteris ess. succini, de qua postmodum. Species serpilli, liliorum convallium, ceraforum nigrorum & similia.

De succino modo dixi: si quid aliud certè succinum est appropriatissimum pro catarrhis remedium, sive præparatū solito modo usurpetur, sive cum aqua spirituosā serpilli præparetur. Sic enim fit succinum catarrhale. Imprimis sal vol. ejus est expertissimum catarrhale, quò vix reperitur melius, & omnia ex succino parata.

Quo facit liquor cornu cervi succinatus factus verbi gratia ex lb. spirit. C. C. bene rectificati, & proprio sale volat. imprægnati, cui adduntur sal. volat. succini probe ab oleo proprio liberati ʒiij. Hæc mista per reiterata cohobia ununtur in liquorem, quò vocatur liquor C. C. succinatus, qui est egregium catarrhale, cujus gutt. 20. vel 30. assumi possunt: alias egregium est antepilepticum, imprimis infantibus exhibitus.

Quia uno ess. succini parata cum spiritu vini rectificatissimo (nisi enim fuerit probe rectificatus, extrahit nihil ex succino) est appropriatum remedium ad quæcumque vitia lymphæ ad gutt. 20. vel 25. plus minus prout magis vel minus est spirituosā, propinata.

Post succinum est myrrha, & parata ex myrrha ess. salutis. Myrrha ad aliquot grana data interne conducit ad catarrhos sive ess. cum spiritu vini tartarificato parata, miro usu est proficua. Loco succini sunt, qui & mastichen, olibanum, & thus usurpant interne & externe felici cum successu: quin & olea destillata vel cum saccharo, in Elæo-sacchara reducta, v. g. ol. majoranæ, ol. succini, ol. rosmarini, quin & balsamus sulphuris amictus: ad aliquot gr. si fuerit Elæo saccharum: vel guttas aliquot, si adhuc olea usurpata interne admodum conducunt in catarrhis. Post hæc est sperma ceri, & ipsum singularissimum remedium contra catarrhos, modo habeatur recens & non rancidum. Hoc namque & corrigit acrimoniam lymphæ catarrhalis, & simul lympham crassam & viscidam incidit, resolvit, & ad expectorationem disponit: & sic utrique scopo mire convenit. Formulas dedi ubi de tussi, ex olibano, thure, succino, laud. opiato. &c. nam his sulphureis subjectis optimè permiscetur laudanum opiatum.

Faciunt huc pilulæ Montagnanæ ad catarrhos curandos & sistendos egregiæ, compositio hæc est.

℞. Myrrhæ, storacis calamitæ, croci ana ʒj. opii gr. xiv.

Cum syrupo rosarum. Fiant pilulæ majores, de quibus 3. aut 5. accipiantur duabus horis post assumptam causam. Quia & ipsum sulphur ex eoque præparati flores non sunt ultimi in curandis catarrhis: si vel soli flores usurpentur ad ʒj. vel cum aliis misceantur, imprimis cum succino: aut si ex his cum extracto enulæ cam-

panæ fiant pilulæ catarrhales, quas insigniter commendat Rhumelius in jatro-chymia, benzoe etiam convenit: ratione opii sæpius decantati interdum asuntur theriaca recens: recens dico, in qua vis opii fermentando non est nimis infracta: assuntur vel sola, vel additur ipsi aliquid de bolo armena.

Dixi superius, interdum opus esse pergere ad purgantia: quæ semper admiscenda appropriatis catarrhalibus. Unde mass. pilul. de succino Cratonis fere primatum obtinet, sunt blandæ aromaticæ, & lenibus possunt præscribi commode. Modus præscribendi est hic.

℞. Mass. pilul. de succino Cratonis ʒj. extract. absynthii ʒss. scammonii sulphurati gr. j. resina jalapæ gr. iv. vel v. (in catarrho à lymphæ acri, & tenui) si sit crassius, potius derur, extracti trochisc. alhand. gr. 2. cum s. q. ol. succini f. pilulæ catarrhales pro s. dos.

In affectibus senum etiam valent imminuta dosi stimuli. Alias etiam jalapa ordinario usui præscribitur ad ʒj. Hac utitur Riverius mista cum mercurio dulci, ita ut ad purgandos catarrhales recipiat mercurii dulcis gr. xx. radicis jalap. gr. 8. vel 10. uti videre potestis cent. j. observ. 28. 41. 46. ubi utitur hoc pulvere pro purgante catarrhali, idque imprimis, uti dixi, in catarrho tenui: in catarrho vero spisso seu ubi adest mucilago crassa colocynthis convenit, sive extractum ex trochiscis sive correctis. Correctio optima sit, quod obiter moneo, per terram soliatam tartari, vel sal. tartari.

Porrò mistum gummi de Peru sive resina gummi guttæ ad gr. vii. ad x. specificum dicitur purgans catarrhosorum.

Poterius in suis curationibus in usū haberi propinare decoctum Melanagogum cum ligno lassifrato. Confirmate hoc videtur Penotus de medicamentis, qui dicit, quod perfecta cura catarrhorum consistat in helleboro nigro mens. Octobri collecto. Et credo quòd helleborina multum valeant, modò virulentia laxativa corrigatur.

Pilulæ aloë phanginæ & alias notæ sunt in his casibus.

Hæc de internis.

Quod attinet medicamenta externa applicanda locis & glandulis catarrhos fundentibus vicinis: hæ ipsæ glandulæ, quoniam nempe in capite aut circa caput partesque ipsi vicinas sunt consistunt aut locata: Hinc fit, ut remedia contra catarrhos capiti aut vicinis locis applicentur, nunc naribus, nunc vertici, nunc temporibus &c. nunc ut melius penetrent, sub formâ suffitus, imprimis ubi aspera arteria & fauces nimis laborant. Hæc inter externa primatum obtinet oleum succini, si aliquot ejus guttæ vertici illinantur mirum est quantum faciat ad præservandum & curandum catarrhum, imprimis si adsit simul gravitas capitis aut lethargus, aut torpor sensuum. Juxta oleum succini oleum mastichis, item oleum majoranæ usurpantur. Oleum destillatum C. C. est potentissimum vertici & temporibus illitum, modo ejusdem fætor non sit adeo gravis: alias cum hoc ol. sit turgidum sal. vol. esset summum remedium.

Uterius applicatur emplastrum de betonica, emplastrum pro bregmate usitatum, item



emplastrum de tacamachaca, quæ omnia malaxantur commodè cum oleo succini destillato verbi gratia.

℞. Emplast. de betonica usitati, gummi tacamachacæ an. q. s. malaxentur C. S. Q. olei destillati succini inducatur super alutam, & obducatur syndone rubra in forma orbis medii. F. emplastr. capit. applicand.

Pertinet ad externa etiam fumus tabaci sive nicotianæ haustus, qui sane est egregium experimentum contra catarrhos, quod omnibus huic in finem debet esse commendatum omnibus scopis satisfacit fumus tabaci haustus. Nam sal ejus vol. admodum acre corrigit aciditatem lymphæ catarrhalis: eodem sale vol. lympham crassam & viscidam incidit & fluxilem facit, quin & lésiones partium à causa externa vitio aeris vitiosa facta lymphæ corrigit & imprimis ratione sui ol. narcotici, quo opiatorum vires æmulatur, insigniter conducit ad motus catarrhales feroces sistendos, prætereaque salivam copiosam eliciendo augmentum lymphæ nimium corrigit. Si huic nicotianæ usitatæ alias admisceatur semen anisi in catarrho ad bronchia & pulmones defluo vel addantur pulveres succini aut pulvis cardamomi, fit remedium eo magis appropriatum. Certi sitis quod in affectibus catarrhalibus vix habeatur par remedium fumo Tabaci, omnibus enim satisfacit scopis. Nec metus est, quod denigret cerebrum; hoc enim vana est persuasio. Utut hoc verum sit, quod ejus nimius usus vitiat pulmones, eos aridos, squalidos & flaccidos reddat, simulque variis maculis tingat. Vid. experimentum hujus rei in *Observationibus Thoraci*.

#### *Hæc de Catarrhis verò.*

Monenda adhuc sunt, quæ habet Lindanus de catarrhis quasi nothis, dum dicit; Notiu sæpe evenit (sunt verba Lindani,) ut surgentes mane homines sentiant dolores, præsertim in scapulis, in lumbis, aliisve locis. Statim inquit, hoc refertur ad catarrhos, ubi tamen duo sunt consideranda. Primum non esse semper in catarrho vitium, sed sæpissime à statu (de hoc tamen dubito) præsertim iis in locis, ubi muscoli se invicem contingunt. Nam nocturnum corpus nostrum valde perspirabile fit sub lecto, adeo ut natura tunc soleat liberè per habitum corporis se evacuare. Jam si manus, vel alia pars extra lectum jaceat denudata, concluditur iste insensilis expiratus, qui exiturus erat, & sic dolorem ibidem facit. Interdum etiam fit, ut solummodo sub forma flatulentia ibidem hæreat. Uterque dolor satis molestus est, is qui à statu est vagus, qui agitari ac subinde recrudescere videtur. Si ibi hæreat liquor, fixus est dolor & continuus interdum per aliquot dies.

In his catarrhis quasi nothis quoad curam cavendum est ab omnibus oleosis.

Hæc enim inuncta crustam quasi inducunt cuti, poros que adstringunt sive implent. Emplastrà itidem hic nocent. In tali causa nihil potestis habere melius quàm gummi tacamachacæ mar. baln. solutum in vino, atque extensum super elutam & applicatum parsi dolenti:

si non benè hæreat, addi debet tantillum rebinthinæ, hæc enim conciliat firmam adhesionem.

Hoc emplastrum applicatum egregie resolvit istas humiditates, id quod patet ex eo, ut quod plurimum membra sub emplastro sudant, cum hoc gummi tacamach. interdum conjungere licet gummi Carannæ, hujus recipiendo partem unam ad alias partes, ij. dum duo ista gummata imposita optimè resolvunt status etiam crassos, aut etiam materiam tenuem. Quod si eveniat, ut applicatis hisce cutis tollatur in pustulas, exque factæ ejusmodi applicatione gummarum; (hoc enim interdum quibusdam contingit) tunc potius præstanda est cura per tincturas sive essentias spiritu vini extractas, & ita inunctas: insudimus scilicet ea, quæ habent potentem facultatem incidendi, attenuandi, calefaciendi, & coquendi, ita ut in eam rem sumantur, v. gr. semina calida minora, item semen crucæ, allii, sinapi albi, piper longum, & similia quæ spiritui vini, infusa externe iricando illita calide super impositis linteis calidis. Sed rarum est, quod cutis non ferat, gummatum impositionem, quæ omnium sunt optima.

Superius, ubi de catarrhis in genere, injecta fuit mentio febris catarrhalis, sicuti etiam in doctrina febrium febres catarrhales ex lymphæ deduximus: adhuc quædam dicenda de cura, quæ in multis cum cura catarrhorum vulgariū convenit. In specie omnis cura eò dirigenda est, ut lymphæ vitium corrigatur, & ipsa per blanda sudorifera, & diaphoretica immutetur, idque eo magis, quoniam tales febres catarrhales epidemicæ non carent malignitate, id quod ex debilitate virium, ex facili contagio, ex vigiliis, interdum levibus deliriis supervenientibus apparet. Medicamenta hic imprunis sint sudorifera volatilia, quæ inter eminent etiam succinata, item conveniunt hic antimonialia fixa subinde volatilibus mista.

Rem exemplo declarabo; superiori anno grassabatur hic catarrhus epidemicus. tempore vernali circa festum Pentecostes, isque malignus & insigniter contagiosus, vix erat domus in qua non aliquis ægrotaret, utut non omnes in lectis decumberent. Symptomata erant tussis admodum gravis cum copioso sputo, coryza contumacissima, cephalalgia, dolores dorsi & artuum, mox ingens virium prostratio citra manifestam causam, quibusdam superveniebat hæmorrhagia narium, quibusdam superveniebat diarrhœa serosa, curatio, quæ tunc temporis instituebatur, optime fiebat per sudorifera. Vocatus enim mox in principio præcripsi.

℞. Aqu. sambuci, cardui benedicti an. ʒi. species C. C. essentificati (vel sal. vol. proprio acuat) ʒß. sal. vol. succini gr. iv. syrupi papaveris rhæados ʒß. m. pro potione sudorifera. Quam capiebat æger, & expectabat sudorem, isque semper cum levamine profluebat. Repecebatur hic potus pro varietate circumstantiarum.

Interdum præscribebam hunc pulverem sudoriferum.

℞. Succini præparati gr. xv. specifici cephalici ʒß. bezoardici jovialis gr. iv. m. pro dosi



dosi. Pro compescenda tussi & jucunda excretionē præscribere istam formulam, quam habebitis in cap. de Tussi (prima forsan est) cum spiritu salis dulcis pro incisione materiæ crassæ, ejus expectoratione, simulque lymphæ correctione. Pro coryza & capitis affectibus optime conveniebat inunctio verticis cum oleo succini, aut applicabatur emplastrum cephalicum ex emplastro de betonica, & emplastro de bregmate ana malaxatis cum oleo succini. Pro reliquiis morbi expellendis, pro artuum debilitate, & eorundem dolore. Conveniebat hæc mixtura, quæ ut plurimum morbum curabat, præmissis modo dictis. Mixtura erat hæc.

℞. Aqu. cordis cervi, menthæ, antiscorbuticæ Domcreu. an. ℥ij. ℥ss. ligni sativæ. sri. & lumbricorum terretrium (propter dolores vagos) ana ℥ij. cerasorum nigrorum, aqu. anihmaticæ Rudolphi (est spirit. compositus an. ℥j.) sal. vol. succini ℥j. specinæ cephalicæ ℥ss. syrupi flor. tunicæ ℥i β. m. pro aliquot dolibus, de qua sumuntur quater in die 3. vel 4. cochlearia. *Michael Eschmüller Colleg. practic. part. 2.*

In curatione Catarrhi tria sibi Medici agenda proponunt. Fluentem humorem evacuare: partem quam mandantem nuncupant, corrigere & roborare, ne novum humorem progignat: ac postremo partem recipientem ab irruente humore defendere, illumque alio divertere ac derivare. Hinc in catarrho, ut ipsi putant, à pectoris calore, sanguinem mittunt, purgantia exhibent, frictions, cucurbitulas, aliaque revellentia adhibent, caput pariter exonerare tentant per ea, quæ e naribus, palato, faucibus, humores eliciunt: mox vero electuariis, tabellis, syrupis, pilulis ex moscho, ambra, roremarino, betonica, stœchade, rosis puniceis, myrobalanis, atque extrinsecus pulverum supra verticem insersionibus, unctionibus, suffimentis ex rebus cephalicis, roborare, atque interea illuxuros humores avertere conantur per emplastra caustica. potissimum ex thaplia & fimo columbino, aliove simili suturæ coronali applicita, quibus etiam serofas sanguinis partes cumulas, vel fortasse in cerebro genitas educere simul, & illabentes inhibere credunt.

At his catarrhi plerumque non curantur, sed ingravescent, vel in alios morbos commutati tandem in lethum desinunt, ut pluries experientia docuit. Tot namque evacuationum generibus vires maximè deperciuntur, affectæ partes magis elanguent, & præsertim cerebrum suâ natura debile, humoresque redditi tenuiores plus iusto fluitant, & destillatio urgentius promovetur, ut tandem extenuato corpore, sæpius viderem nuferos ægrotantes in phthisi delapsos irreparabiliter occidere, nisi prius ex superveniente sopore lethargici perissent.

Satis esse existimant alii convenienti institutione dixit sensim abundantem lympham absumere, & vel per vias urinx, vel per sudores, extrudere: quo pacto consuevit sæpissime natura in his præsertim affectibus seipsam vindicare. Aërem proinde calidum præparant, ægri quoque jubent pannis commode contegendum. Cibum & potum frugalem, attenuan-

temque præscribunt, vitando omnia dulcia, pingui-, acida & nimis humentia. Consuetas egestionēs, alternis saltem diebus, sollicitant, & quæcunque ad sudorem blandum disponere possunt, absque ulla naturæ perturbatione, suadent. solum in abundantiori lymphæ, & ubi periculum summationis instat ab ejusdem affluxu, hydroticum aliquod medicamentum exhibent, ad depiendam ejusmodi quantitatem. De reliquo cerebrum, spinam. & nervos roborantia seculosa putant, non tamen posthæbitis, quæ guttur, fauces, & pulmonem, illasque partes, in quas humor catarrhum excitans irruere solet, lenire, detergere, aut confirmare valent.

Cum ergo in fauces & guttur decumbit humor, gurgulio laxatur, tumetque tonsillæ, præter gargarismos ex diamoro cum aqua hordei & sale prunellæ, vel ex rhodomelle cum decocto liquiritiæ, betonicæ, aut nicotianæ, vel melius cum aqua ardente: profunt suffitus ex succino, maniche, & gummi animæ: atque pro linctu utatur æger syrupo papaveris rubri, aut de Erylimo Lobelia.

Si delabatur in pectus, & pulmonem, conferent syr. ex pralio, hyalopo, tuissilagine, hederæ terrestri, nicotianæ, oxymel, & iooch scilicetum, tœcula Ari, extractum, & pulvis radicis iridis Florent. & illyr. flores sulphuris, butyrum, & rubinus ejusdem, oleum sacchari cum aqua ardente perlatum, julap. vitale, & efficacius elixir proprietatis descriptione Helmontii. Quod si humor destuens falsedinem aut acritudinem sapiat, timeaturque de pulmonis læsione, ad corrigendam alius acritatem, falsulaginemve summe confert iteratus usus pilularum de cynoglossæ, vel tyrace. Eiusdem est efficacitæ pulvis anodynus D. Michaelis, theriaca recens, & laudanum opiatum: ad diminuendam vero peccantis lymphæ copiam, exhiberi poterit extractum agarici, & resina jalappæ cum modico gummi tragacanthæ: & quidem salutaris observata sunt pilulæ compositæ ex ℞j. resinæ jalappæ, & gr. vii. tragacanthicum modico cinnamomi acuti ad tempus repetitæ.

Ad sedandum deinceps catarrhum consule Crato hoc electarium sumendum ad castaneæ quantitatem, quod habet: thur. masc. ℞ij. nuc. cond. tost. ℞j. spec. aromat. ros. ℞ss. hæc autem excipiuntur rosarum punicarum conditura.

Eiusdem Auctoris pilulæ ex succino efficacissimæ referuntur: sicut etiam quæ constant: Thur. mascul. & succ. glycyrrhiæ singul. ℥j. opii, croci, & myrrhæ, singul. ℞j. cum syr. papav. alb. confect. mass. dos. gr. vii. vel x.

Thus ipsum hora somni deglutitum optimum est cum balsamo Peruviano: & Lotichius admiscet ol. anis. gutt. iij. opii præpar. gr. j. cum syr. de papaver. Alias ex B. Faventino pilulas describit Riverius ex succo glycyrrhiæ, aloë lota, & pilul. de cynoglossæ cum syr. viol.

Ossa bubula, vel efficacius Donzellino, humana, præsertim cranium, ad albedinem combusta, & in pulverem redacta, cum portione cinnamomi, & sacchari efficacissima experti sunt.

Hartmanno probatur aqua serpilli, cum vino



albo generoso destillata, quotidie sumpta ad unum vel alterum cochleare. Vult tamen F. Hofmannus in ea infundendum esse lignum sassafras. Aliam serpilli aquam benedictam nuncupatam conficit Adrianus Myusiet ad catarrhum præstantissimam.

Idem Hartmannus futura coronali admovet sacculum succino repletum, & spiritu vini madefactum: & Rulandus vertici derafo cataplasma, quod componitur ex sennenti acrioris ʒij. & pulv. carabes ʒij.

A Schrodero proponitur emplastrum cephalicum, quod catarrhum in fauces sistit & epilepticos motus, atque vertiginem arcet. Efficax quoque est gummi Tacamahaca cum oleo mastiches dissolutum & malaxatum.

B. Montagnana extolit & hoc aliud quod habet. Aloes, puleg. calament. mont. cort. citr. singul. partes æquales, F. pulv. & commisc. cum ladano & modico acacie in formam cerati.

Pro amuleto verò commendat Hartmannus radicem verbasci virginis, quæ scilicet per eam ætatem non floruit.

Refertur in Ephemeridibus germanicis anno 1670. fuisse quendam, qui usu cuiusdam pulveris, catarrhorum materiam e naribus eliceret. Expertus sum ego idem tuto, & salubriter præstari pulvere ex cyclamino in clybano arefacto cui si lubet, addi potest tantundem betonicæ, rosarum punicearum & sampluchi. Ex helleboro nigro & saccharo conficit Helmontius pulverem, qui efficaciter lternutamentum concitet, & coryzæ medeatur. A spiritu vini puro, & a tinctura succini plurimum sane juvatur cerebrum in catarrhis, saltem sinuibus excipiantur & temporibus, ac cervici sæpius adhibeatur. Sed & spiritus ac sal volatilis ammoniaci olfactus mire admodum plerisque confert. Cæteros affectus Catarrhum consequentes, aut comitantes, suis locis memorabimus. *Lucas Tozzi Medic. practic. parte prima.*

*Emplastrum* seq. valide omnes fluxiones sistit, & dissipat. Applicetur capiti raso post itrenue per plures dies expurgatum cerebrum.

℞. sicum pingue. fermenti acris an. ℥ss. sem. viticis & nasturt. contusor. an. ʒj. sem. sinap. coptul. ʒij. empl. de mucilag. ʒiv. malaxentur & incorporentur addendo olei laurini quod satis fuerit. Formetur emplastrum extend. super alutam, quod toti capiti imponatur, & quotidie manurenovetur. Hoc omnem capitis humorem sensim eliciet, quod neque cancharides occipitio admotæ, neque ulcus sincipiti & commissuræ cauterio inductum, neque scæra in fronte vena effecerit.

Quidam juvenis gravissimo catarrho in dentes decumbente conflictari solitus, mihi retulisse Cantabrigiæ D. Butlerum adiisse, qui dixit se malo nodo malum velle applicare cuncum, & extremum malum extremo malo præstigare. Assuetus erat æger fumo *Tabaci*, Jussit medicus ut sine intermissione hauriret fumum, donec absumpsisset integram pulveris unciam. Ita ille uno tractu successive hausit 25. fistulas. Primo gravissime ægrotavit, antequam motus sit catarrhus: eo fluere incipiente, paulatim imminuta omnia symptomata, & affluxit blennæ quantitas ingens, ultra duas quar-

tas. Illico cessavit catarrhus, qui non recurrit postea per annos 17. sed ab eo plane immunis vixit donec a liberiore dieta, & assiduo vini clareti potu in conuetum affectum sit relapsus.

*Pistachiar.* exterior cortex ex viridi rubescens, siccatus, & accensus in fistula mitat Tabaci. fumum dat aromaticum, qui usu continuato catarrhum sistit & siccatur. Potentius operatur si ei admisceatur sexta vel octava pars Tabaci. Caput non turbatur, & bonum spirat odorem. Hoc viso pulvis talis a me præscriptus ad deficiendum catarrhum a cerebro in pectus labentem.

℞. Cortic. pistach. optimè siccatur. citra ulsionem ʒiss. partis lignos. nuc. pineæ ʒss. ramentor. lign. cedr. fragrantiss. sassafr. rhod. an. ʒij. nuc. moschat. cinam. an. ʒj. tabaci indicis opt. ʒj. m. f. pulvis servand. loco sicco.

Vel ℞. cort. pistach. sicciss. ʒiss. part. lignos. nuc. pineæ, cort. guajaci, lign. juniper. vel cedr. lign. Aloes vel sassafr. ligni rhodii, cortic. Winteran. nuc. moscha. an. ʒiss. tabaci (a ʒiij. ad ʒ. 6. 7.) ʒj. m.

N. B. Quæcunque remedia in hujus libri capite primo pro frigida cerebri intemperie curanda laudantur, hic etiam locum habent. consulat ergo lector caput dictum, & hujus brevitati ignoscat.

Vide ntur item capita sequentia quæ fluxionum in partes particulares v. g. oculos, dentes &c. curam docent: nam termini ad quem sit catarrhus, æque ac termini a quo, ratio habenda est. *Theod. De Mayerne in Praxi Medice.*

### Consultationes.

*De Gravedine, alijsque affectionibus ex catarrho pro illustriss. Domino Gregorio Malvezzi.*

Ex utero materno hæreditarium catarrhum contraxit Illustrissimus Dominus, annos natus 64. gracilis, temperamenti calidi, & sicci, cordis, jecoris, & totius, cum excedente caliditate, & humiditate cerebri. Qui quidem catarrhus indies magis ac magis aductus est ob insolutus, vigilias, venationes, venerem, inordinatamque victus rationem: unde effectum est, ut quemadmodum antehac destluens ad mæculos intercostales circa mamillam sinistram, inibi dolorem; ad os ventriculi, & intestina, inappetentiam, ac diarrhæam; ad renes urinx difficultatem, calculorumque generationem, induxit; ita tribus ab hinc annis in autumno & hieme ruens ad fauces, & pectus, raucedinem, tussim, & spirandi difficultatem pepererit, quod omnium maxime contigit in hunc ætatis proximè præteritæ, propter varia animi pathemata, febres, aliaque suborta symptomata. Unde non tussim duntaxat nunc, & spirandi difficultatem patitur Vir Illustrissimus, prout annis superioribus, verum etiam ex prædicti catarrhi salsedine, putredineque, levis aliqua facta est pulmonum erosio: quam ob causam & adfuerunt sputa cruenta, & nunc non raro conspiciuntur filamenta quædam



quædam sanguinis; excitaturque nonnunquam febricula quædam putrida & ea quidem horrida; cui jungitur quinetiam nunc fixa, & habitualis cum insigni totius corporis macie.

Ut propterea omnimoda & perfecta præsentis affectus sanatio non sit expectanda, speramus tamen remedium proponendorum beneficio remissionem tuis, renutritionem aliquam & virium restitutionem.

Quod ut fiat, catarrhus est evacuandus, divertendus à partibus spiritalibus, detergenda, exsiccanda & consolidanda pulmonum labe, exsiccandum & caput, totumque corpus refrigerandum, humectandum, renutriendum. Quibus intentionibus satisfiet per remedia Pharmaceutica & rectam victus rationem.

Chirurgica namque tunc tantum locum habebunt, quando vel sanguis in majori copia fluxerit, in quo casu parum sanguinis ex saltella dextræ manus detrahi poterit: (Venarum enim letalium apertio suspecta esse potest, propter fistulam inibi forsitan latitantem) vel si majori cum impetu fluxerit catarrhus ad partes spirituales, tunc enim cogitandum erit de fonticulo, vel in futura coronali, vel occipitio. Quibus non supervenientibus chirurgica remedia locum non habebunt, præter blandas aliquas frictiones ipsorum artuum; cum ad diversionem & resolutionem catarrhi; tum ad attractionem sanguinis pro perfectiore totius corporis nutritione.

Remedia autem pharmaceutica erunt universalis, & particularia. Quare primò lenietur alius flore cassiæ noviter extractæ, & electuario lenitivo cum modica pulpa tamarindorum in bolo; vel syrupo ros. solut. & manna. cum decoctione pulpæ tamarindi. Levia tamen sunt medicamenta; quoniam facile ex quolibet etiam levi medicamento succedet purgatio, imo facta fuit etiam superpurgatio. Preparabuntur humores primo levioribus, ut pote syrupo acetoso simplici, de pomis, de betonica cum decoctione borraginis, betonica, farsaræ, liquiritiæ, hordei, capill. ven. cichorii, aut sonchi. Deinde generosioribus deveniendo ad syrupum de hyssopo, de prasio, ad oxymel compositum, cum decoctione botrydis, pulmonariæ, radicum urticæ, hyssopi, betonica, liquiritiæ, interposita blanda purgatione modo cum clysteribus, modo cum melle & syr. ros. solutivo, addita manna & infusione rhabbarbari; agaricum, namque alias magno cum nocumeto sumpsit, propterea ab ipsius usu abstinendum erit. Purgato toto corpore, purgandum erit caput blandis errhinis, ut succo malvæ, manna dissoluta in aqua malvæ, radice cyclaminis & aliis levioribus: generosa namque caput ipsum calefacere poterunt. Quam ob causam suspectus est usus tabaci quem aliquin ad purgandum caput, & siccandos pulmones valde opportunum judicarem. Purgari quinetiam debet thorax eclegmatibus, & portionibus illis vulnerariis, quæ sunt valde diuretici, & calorigici. Quare conficiantur eclegmata ex syrupo de hyssopo, oxymelite composito, syrupo capill. veneris, looch de pino, de pulmone vulpis, & de caulibus. Interim ad demulcendam tussim, detinebit in ore succum liquiritiæ concretum vel rotulas ex quacodio. His peractis, ad topica cum interna,

tum externa deveniendum. Inter interna tria sunt, quæ summopere arbitror potestura: primum erit jus Galli junioris cum radice chinæ, visco quercino, santalis, & medulla ligni sancti derasi, additis nucleis pineis, & seminibus melonum contusis, capillo veneris, pulmonaria, consolida, agrimonia, veronica, & plantagine: quod sumetur in aurora sine sudore, & cum victu mediocri, sed exsiccante. Secundum erit terebinthina cypria cum minima quantitate florum sulphuris & boli armenæ; qua pariter uti poterit vel tempore decocti suprascripti, vel post ipsius usum. Tertium erit saccharum rosatum antiquum cum terra sigillata hora decubitus. Lactis usum pro renutritione, deterfione, & agglutinatione summopere commendatum non proponimus, quoniam læticio repugnat natura Illustrissimi patientis. Ideoque ipsius loco parari poterunt morselli ex pulpa caponis cum fisticis, nucleis pineis, nuce indica, & saccharo cum aqua farsaræ. Inter externa præscribi poterunt pulveres capitales exsiccantes confecti ex ossibus sepiarum, cornu cervi ustis, agarico, rosis, & corticibus ostreorum ustis. Stillicidium namque ex aquis thermalibus non erit tutum: quoniam caput Illustrissimi Domini facile accenditur.

Victus sit refrigerans, humectans, & nutrimentum glutinosum suggerens. Propterea carnes decoqui poterunt cum limacibus, carne testudinum, caudis cancrorum, & ranis; fieri poterunt jura ex carne porcelli junioris. Habebit familiare ferculum ex hordeo cum saccharo & china, cocto in ollula, ut præscribitur à Saxonia in Praxi, capite de Pthiysi. Potus sit vinum subdulce tenuis substantiæ, quod medicatum fieri poterit cum ligno indico deraso visco, quercino & farsara pulverizatis, & in dolium coniectis, & hæc nunc duxi proponenda, mittens usum balnei, ob inclementiam aeris, cujus loco sat erit aliquando corpus inungere oleo amygdalarum dulcium sine igne extracto. *Remed. Silvæ. Consil. Medic. Cent. 1.*

*De catarrho, tussi & difficili respiratione pro Illustrissimo, & excellentissimo D. Georgio Osclinschi, Oratore extraordinario Serenissimi Polonia Regis, & Succia, ad summum Pontificem.*

Conqueritur Orator Illustrissimus, & Excellentissimus de perenni quadam destillatione à capite ad thoracem, propter quam ante biennium tussi continua annum integrum correptus fuit, & in præsentia angustiam patitur in respiratione, horis præsertim matutinis, propter quam & extulire, & quasi vomitu quodam materiam pituitosam & aquosam expectorare cogitur: imò & nocturnis horis involuntarie similis materia extullat ab ore. Nec minus conqueritur de compressione quadam circa regionem cordis, duobus ab hinc annis, continuo molesta, ob quam cum gravitate aliqua acclivem locum conscendere solet, & difficulter super latus sinistrum decumbit.

Prioris affectionis causa alia non est, quam copia catarrhi in capite calido & humido coacturata, cum per generationem, tum per attractionem à subjectis partibus, cum præ-



sertim ob gravia negocia caput ipsum faciliè repleri possit, ideoque & per nares, & per os plura expurgantur excrementa. Posterior affectio, si externam occasionem præbuit insignis maior præteritus ob mortem primogenita, quam fovit, fovetque etiamnum collectio aliqua humoris melancholici, in regione torte lienis hærentis, cujus uberem proventum gignere facile potest illustrissimus & Excellentiss. Dominus ob naturalem jecoris fervorem utinac præteriti n. ætate consultant: ut propterea natura aliquando tentaverit levem aliquem effluxum sanguinis ex venis sedalibus, a quibus sanguis melancholicus expurgari consuevit.

Ab his igitur affectibus, ut liberetur Orator Excellentissimus opus esse censeo levioribus quidem remediis hoc tempore, ac deinde generosioribus Vere recurrente; tunc enim convertenda erit fluxio prædicta, materiaque illuxa expectorandi, caput exsiccaudum, corque roborandum, non neglecto etiam liene, si ad tactum se prodatur hypochondrii tensio, quod conjectare non potui, præmissa totius corporis evacuatione.

Neque difficile futurum spero Virum Illustriss. & Excellentiss. perfectæ sanitati restituere, cum alioquin sit optima habitus, vividique coloris.

Hoc itaque anni tempore nonnulla profutura mihi persuadeo, primum erit sanularis usus pilularum matichinarum ad drach. i. hora ante cenam semel in hebdomada; alterum erit usus conservæ alicujus cum cordiatis, tum capitalis ex floribus rosularum & borraginis cum confectione Alchermes & de hyacintho, cujus dosis erit unc. i. singulis matutinis horis 20. & plures dies, duabus horis aut tribus ante prandium. Valebit quinetiam Juleb illud gemmatum magni Ducis Florentiæ ad guttas vi. cum aqua ex floribus citri. Præter quæ, sæpius matutino tempore dentibus conterere poterit fructulum citri cum toto cortice, expuendo quidquid ad os confluerit, proderit etiam ad expurgandum caput, & corroborandum cor. Cui quinetiam reget nocturnis horis cucupha ex pulveribus exsiccantibus hunc in modum parata.

℞. Flor. rosularum, litch. di., an. pug. i. ossum sepiarum, agarici an. drachm. ss. cornu cervi usti, spongiæ uitz an. drachm. ss. in pulvis: & includatur cucuphæ ex rara sindone.

Quibus omnibus accedat congrua vivendi ratio, abstinendo à vinis generosis, aromatibus copiosis, & diuturna mora in hypocaustis, singulisque matutinis horis cap. ut erit exsiccaudum spongiis madefactis lixivio parato ex cineribus ficus, & capitalibus deinde exsiccatis.

Verno autem tempore, præmissi diligenti purgatione totius, ut quæ auceant humorem pituitosum, & melancholicum, ipsosque præparent, & expurgent, cum à capite, tum a liene, quem suspicor non vacare noxa aliqua, cum educatione sanguinis ex jecoriorum dextri brachii, nec non ex venis sedalibus, quarum referentio quam maximè conducit, ratione melancholicæ cordis & lienis affectionis.

Purgandum erit peculiariter caput per os & nares errhinis, & apophlegmatismis accommodatis, in quibus opportuna erit matichæ

cum Zingibere. Quod si in thorace hæreat materia, lambitivis erit expectoranda. Hæque peractis potus aquarum sulphurearum erit quam maxime utilis, ad exsiccaudum catarrhum, & roborandos pulmones. Quod si aquis careat, sint ei familiares flores sulphuris & disulphur una cum terebinthina laticina plures dies assumpta, superbibito decocto ex radice cinna, & ligno indico deorsum cum cineraceis, cordiatis, cephalicis & peccorantibus. Verum si accit tumor, aut obstructio in sinistro hypochondrio, præscribi poterit jus galli junonis, cum prædicta china & ligno, præmixto ch. lybe vel pot. bili, vel electuario de chalybe saxoniæ no aut vino chalybeato, instillando semper decocto tres aut quatuor guttulas juleb gemmatæ; vel detur Scrupulus mithridaticæ confectionis cum dragm. sem. confectionis alchermes. Extrinsecus erunt ex u. u. lotiones ita capitis, quæ Illustriss. & Excellentiss. matrona tuæ præscriptæ, si oculique supra cordis regionem continuo gestatus, hunc in modum paratus.

℞. Ocyni caryophyll. cl. cinnamomi, macis, zingiberis, croci, n. olchi, ambra an. gr. decem. no. citri, aurantiorum, rosarum borraginis an. drach. i. sem. M. Exsiccentur in lectulo sericeo purpureo, qui detineatur supra regionem cordis. *Benedict. Salvatic. consuit. & respons. Medic. cent. i.*

#### *De catarrho falso, & melancholica affectione pro nobili muliere Rhodigina.*

Si unquam experientia comprobatum fuit verissimum Divini Hipp. oraculum, in nobilissima patiente luculentissime conspicitur; quod scilicet *in senibus deficientibus morbi ex æro fiat.* Nobilissima etenim Domina cum alias, libenter degeret, usque ad 20. ætatis annos quibus al. hinc nimis immaturas, inordinatas, & albicantes habuerit menstruas purgationes, conqueri cepit de affectu melancholico. Mox ita si quidem est, cum frequentibus lacrymis. Conqueri quinetiam cepit de Iussi, & debilitatione catarrhi falsi ad pulmones, hæreditaria quadam imbecillitate laborantes.

Qui sane affectus originem, & incrementum habent a sanguine menstruo non expurgato, jugiter in caput evaporante, & cerebrum calcificante, a quo propterea catarrhus falsus gignitur mediis tibus ictericis biliosis a jecore transmissis, atque spiritus animales crassiores reddit obnubilantur, & affectus melancholicus, producitur; retenta autem est menstrua purgatio propter obstructions uterum uter: ut optime statutum est a viro Excellentissimo ab humoribus crassis, cum pituitosis a ventriculo, tum melancholicis a jecore per venas ad uterum condutis: quos redundare comprobatur qualitas sanguinis per uterum erumpentis, albicantis & pituitosi.

Affectus sane difficillimæ curationis, cum ob hereditariam maternam dispositionem, tum ob maximum recessum a statu naturali in hac ætate juvenili, eoque magis quod cum juncta sit viro nobilissimo & congressu tamen juvenitum illud suscipere non potest, quod alias luculentum



lentum esset. Propterea non immerito de agendis consultit.

Quare insistendo indicationibus à Viro Excellentiss. propositis ego quoque laudo, quoad chirurgica, sanguinis missionem; semper tamen in partibus infernis, saphena scilicet utriusque pedis; sed parca manu, hinc enim nec major revulsio à capite. Quod si in conspectum veniret vena poplitea, hinc major heret evacuatio ab ipsomet utero, cum sit vicinior, amplior, & maiorem consensum habeat cum utero. Semper tamen ante sanguinis eductionem fiant frictiones ad inferiora, & soveatur uterus vino albo, in quo ebullierint fl. chamamelis, fenugrecum, malva, artemisia, & matricaria, quo sanguis fluxibilior fiat. Fonticulos quinetiam propositos laudo, ita tamen ut primo inuratur coxa dextra; ac deinde aurumino brachio: quo fiat primo revulsio, & observari possit, numquid fassedo illa, & continua fluxio catarrhi originem habeat ab evaporatione uterina: si enim hinc proveniret, remittere quinetiam posset absque fonticulo brachii, non adeo tuto in hac continua exhalatione. Pellicaria quoque hinc in vaginam immittenda, ex mercuriali & sabina, quae maxime confert ad evacuandos mentes, cum lotionibus & frictionibus frequentibus infernarum partium.

*Pharmacentica* huc ea quae fuere prosita hac observatione, ut primo praeparentur humores in ventriculo latentibus cum syr. sine diluto, & aperientibus & menies provocantibus, factaque ventriculi & primarum viarum deterfione, & evacuatione etiam cum aqua Teturtiana dejectoria reddita: praescribitur postea syrupi magis attenuantes & aperientes, puta syr. bizantinus cum aceto, oxymel. comp. syr. capill. veneris, & de quinque radicibus cum decoctione lupulor. capill. ven. agrimoniae, cicchorii, & borraginis. Progrediendo postea ad magis aperientes, trochisc. scilicet de myrrha, de rhabarbato cum syr. de pomis compos. & de cicchorio cum rhabarb. addita decoctione proportionata: ac tandem praescripto purgante accommodato: medio tamen tempore aluum lubricum servando, vel pil. ex aloe lotae, vel infusione seminis in syr. vel decoctione epithymi Mes. loco decoctionis consuetae. Hisque peractis, duo genera remedium peropportuna censeo, ius scilicet galli saliti, cum herbis, & radicibus aperientibus, cum chalybe potabili, vel electuario de chalybe, praescripto exercitio in curru. Aliud quod hoc anni tempore mihi videtur apprime profuturum usus aquarum Thermalium Apenensium cum intus sumptarum, tum extra adhibitarum stillicidii forma supra ventriculum, & infestatione uteri cum cannula pertusa undique intra vaginam detenta.

Hae potiora sunt, quae juncta cum congrua vidu ratione motu praesertim & calis mutatione miti; videntur profutura. Faxit D. O. Omnipotens, ut votis cedant. *Bened. Silvatic. Cons. & resp. Med. 1. ent. 1.*

Nobilissimus Dominus Bernardus Schulden ex finibus regni Turcici per Podaliam & Poloniam tempore hyberno ni Pomeraniam iter faciens; gravitatem quandam & tensionem capitis sentiebat cum delusione ad fauces,

tussi & rejectione materiae viscidæ & pituitosae, nares erant obstructae, facies subturnida, somnus profundus, urina albicantes & turbidae aliis suppressa.

Catarrhum à causa frigida excitatum iudico, quatenus reclusis à frigore externo poris, per quos alias vapores exhalare solent, materia catharri cumulata, vel alius de causis in capite congesta, ut ambientis & ad ipsum cerebrum per vias patentis penetrantis frigoris, commota & expressa ad facies deluit.

*Capitis gravitas & tensio* à pituita cerebrum occupante, membranasque distendente excitatur.

*Tussis* humor à capite ad fauces & asperam arteriam lentini denuens excitat.

*Nares Obstruuntur* ab humore crasso ossaethmoidea obsidente & expirationem impediente.

*Facies tumet diffusis* in musculorum externorum spacia humoribus.

*Somnus profundus* à cerebro refrigerato, & humectato dependet.

*Urina albicans, & turbida sunt* à crudorum & pituitosorum humorum in venis & meatibus contentorum copia.

*Alvus suppressa est* ex repletione intestinorum à pituita ob quam stimulus ita facile percipere non possunt.

Ante omnia itaque lenienti Pharmaco aluum laxandum censui exhibito decocto meo solutivo: hinc ad preparationem materiae frigidae viscidæ, & crassae mixturam ex calefacientibus, incidentibus, & attenuantibus praescripsi.

℞. Aq. salv. beton. fenicul. an. ℥ij. Hyliop. ℥ij. syr. de betonic. Hyliop. an. ℥iij. Oxymel. simpl. ℥j. essent. rorism. ℥ij. m. pro 4. dosibus.

Pro universali corporis purgatione dedi pilulas.

℞. Extract. pil. de hier. c. agaric. phlegmag. an. ℥j. ol. stillat. salviae gr. iij. m. c. syr. de nyliopo 1. pilulae no. 19. deaurandae.

Ad particularem capitis evacuationem errhinon praescripsi.

℞. Aq. major. ℥j. pulv. sem. nigell. ℥j. sol. betonic. ℥ss. ambr. gr. iij. m. attrahatur naris per vices & jejuno ventriculo.

Cum paulo remissius ageret, addidi tantillum flor. lil. convall. & tabaci, simulque nares obstructas inunxi tali balsamo.

℞. Linguet. anserin. c. aq. majoran. ter lotz ℥ss. ol. stillat. majoran. gr. v. salv. beton. an. gr. iij. m. F. balsamus.

Repurgato convenienter corpore & capite, ad reliquam catarrhi materiam assiccandam, caputque corroborandum singulis matutinis coctilearia tria aquae cephalicae exhibui.

℞. Aq. lign. salatr. ℥iij. aq. lil. convall. c. vin. dellill. ℥ij. cubebar. ℥j. meliss. ℥ij. essent. rorismar. ℥ij. rosl. man. christ. perlat. ℥ij. m. vespere sub horam decubitus electuario us est, quo simul & vaporum ascensus inhibetur.

℞. Electuar. nostr. cephalic. ℥iij. conserv. rosar. rubr. ℥j. nuc. indic. condit. ℥vi. medull. nuc. indic. cond. ℥ij. cubeb. ℥iij. coriand. prap. ℥iij. thur. oliban. ℥ij. essent. salv. ℥ij. m. c. syrupo de rosis q. s. f. electuarium.

Capiti pilaeolum sive cucupham ex speciebus siccantibus, & roborantibus destinavi.



℞. Fol. meliss. salv. majoran. origan. an. p. β. stor. rosar. rubr. ℥ij. lavendul. stach. Arab. torismarini pronic, tunic. ana. ℥j. thur. nuc. moschat. cuminum. caryophyll. gran. kern. an. ℥β. gummi elemi, benzoës an. ℥j. storac. calani. ℥ij. grosso modo trita sydon. rubr. includantur, frequentique filo interpassata in formam cucuphæ redigantur.

Pro pedum lotione sequentia præscripsi.

℞. Herb. salv. Hyslop. origan. thym. beton. majoran. an. mj. stor. chamam. mis. stach. mj. summitat. aneth. mj. bacc. juniper ℥ij. salis ℥ij. incid. grosso modo pro pediluvio. A lotionē & absterione plantæ pedum medulla cervinā quantum ferre potuit calidissime munctæ sunt, sicque à defluxionibus molestissimis, Dei gratia, plene liberatus est vir integerrimus, meique amicissimus. *Baldassar. Timau lib. 1. casuum & observ. practicarum.*

Senectissimi Electoris Brandenburgici consiliarius intimus, capitaneus, & æconomus in Pomerania Orientali director, Nobilissimus Dominus Jacobus Heidebreck hæreditarius in Parnav. Byzitker & Cragzig &c. post vehementem corporis & animi commotionem defluxione cum impetu ad fauces & pectus ruente teturabatur, respirabat difficillime cum summo stertore & pectoris elevatione, adeo ut à suffocationis periculo parum abesset.

Pectus & pulmones à catarrhi depluvio impetuose infestantur, quatenus per venientem corporis & animi commotionem, materia in capite agitata, & à calore fusa ac liquata in partes subjectas *Begius ubi dicitur* irruit.

Respiratio difficilis est propter asperæ arteriæ & pulmonum ab humore viscido à capite irruente obstruccionem.

Cum stertore ob viarum per quas spiritus ducitur, angustiam, & elevatione propter motum thoracis præter naturam auctum.

Suffocationem defluxio repente, subito, & confestim in fauces & pectus irruens minatur.

Et si verò in præsentī vitæ periculo versari videtur æger; spem tamen aliquam faciebat constans virium robur, unde in præcipiti malo haud cunctandum esse duxi, sed omni potius conatu allaborandum, ut materia ad fauces & pectus defluens, revellendo, derivando, & quibuscunque modis in plures partes distraheretur, defluxionumque impetus cohiberetur. Quo fine alius suppositorio acri, mox & clystere provocata, hinc frictions extremorum pannis calentibus & asperis institutæ, cruribus & brachiis cucurbitulæ applicatæ, futuræ coronali capitis quod caluum erat ceratum Galeni ex stercore columbarum & thapsia impositum, nucha oleo succini inuncta, nihilque eorum quæ suffocationem impedire poterant, neglectum.

Remittente quodammodo fluxionum impetum materiam à capite & pulmonibus ad ventriculum & intestina trahere, indeque per alium evacuare visum est, exhibitis decocti nostri laxativi ℥ij. agarici trochiscar. ℥j. galapp. gr. vij. excrevit septem dejectionibus ingentem humoris pituitosi copiam, liberiusque respirare cœpit; ne tamen aliquid materiæ in insidiis remaneret, ad expectorationes promovendas præscripsi emulsionem, cujus usum etiam in ipso

Paroxysmo valde salutarem expertus est, sumendo per vices cochlearia quatuor, vel quinque.

℞. Condit. rad. euul. ℥ij. cortic. aurant. cort. citri ana ℥β. incis. contund. in mortar. postea affund. Aq. hyslop. ℥vj. fenic. ℥ij. exprimi. tortul. & colent. add. Aq. althm. Rudolph. Imperat. ℥j. cinam. ℥ij. Looch. san. & expert. ℥β. M. Sic Dei gratia, præter omnium expectationem & spem ex Acherusia quasi palude liberatus est æger; ne vero deinceps in hanc Scyllam defluxionibus admodum obnoxius, incideret, quasi observata singali dicta, sæpius pilulis de succino Cratonis & vino Adriani Papæ contra catarrhos uteretur, quo factō in hunc usque diem ab omni morborum insultu præter mirabilem illum palpebrarum affectum cujus in Epistolis meis medicinalibus fit mentio, immunis vivit. *Baldassar. Timau casuum & observation. practicarum lib. 1.*

Nobil. Adolescens 24. annum agens, temperamenti secundum totum & potissimum secundum caput, calidi, humidi, calidioris hepatis, mediocris habitus & coloris subpallidi, liberius in aère subtilissimo degens, tribus ab hinc annis copiosam pati cœpit à capite destillationem in subjectas partes, tum naturales, tum spirituales, tussinamque continuā molestat, cum excretionē catarrhalis materiæ crassæ, & viscidæ, modo flavi, modo viridis coloris, quæ tamen nec falsa, nec fetens est, neque per nares satis expurgatur, cum earum necatus à materiæ crassitie fere obstruantur. Præterea rugitus atque tensionem in sinistro hypochondrio frequentissime percipit. Parentes ac consanguineos copiosis atque molestis destillationibus ad pectus obnoxios habuit, non tamen phthisi peremptos aut podagrâ afflictos. Modo de agendis consulit, ut destillatio, si non omnino debelleretur, saltem imminuatur.

Copiosam, Viscidam atque crassam materiæ catarrhalis à capite destillationem & per tussim excretionem, qua præsertim tribus ab hinc annis divexatur Nob. hic Adolesc. ab ætate valde alienam, altas, tum naturales, tum acquisite habere radices certo credendum, adeo ut non modo caput ipsius impense humidum, verum & totum venosum genus ad productionem adeo copiosæ materiæ concurrere, sit necessario statuendum. Caput enim intemperie calida & humida à natura primordiis affectum, non confecto proprio alimento ob concoctricis facultatis unbecillitatem, crudam & excrementitiam humiditatem quotidie gignit, quam debilitata retentrix in subjectas partes dimittit, unde coctiones in ventriculo turbantur, cruditates generantur, massam sanguineam insipientes. Has autem à jecore præcalido una cum sanguine exallatas, partim ad Lienem, natura transmittit, quibus repletus & tumens, halitus ab iisdem expirat, unde rugitus, & tandem affectio hypochondriaca, citra tamen melancholiam producit, partim vero per venosum genus ad caput elevat, ubi crudos humores congerens destillationem perpetuo fovet atque auget quæ à calore quidem ætatis crassa & colorata effici potest, prout falsa quoque & corrupta fieret, si caliditate æque ac humiditate excelleret intemperies ipsa,

Quibus



Quibus ita se habentibus summa prudentia medicam opem implorat Nob. Pat. cum catarrhus omnium maiorum fons & origo esse possit, cuius vi totum corpus languere dicebat Gal. desumptum forsitan ab Hipp. asserente. Destillationes magno tædio atque molestia naturam frangere, quæ ideo in casu nostro coctibnes labefactant, sanguinem impurum reddunt, viciant nutritionem, & universo corpori pro roseo pallidum colorem inducunt, non sine lassitudinis metu, temporis spatio temperamenti totius calore adacto, quam facilis sequitur vasorum in pulmonibus diæresis, unde hæmoptysis & phthisis, vel ex perenni humiditate in usdem staciditas ac tandem fraciditas & phthisis ipsa secunda, aut ex eadem in bronchiis hærente, asthma & orthopnea, atque ad articulos decumbente podagrici dolores, ut propterea cum Gal. concludendum sit, ut diximus, catarrhum omnium morborum originem esse posse.

Ut igitur à præsentī molestia luculenter levetur Pap. & ab imminentibus præservetur, curatio eradicans instituenda, quæ perficietur, primas vias mundando. Secundo viscerum, & lienis potissimum obstructions, aperiendo. Tertio venosum genus purificando, & à cruditatibus vindicando. Quarto caput & pectus expurgando. Quinto ejusdem intemperiem humidam corrigendo. Sexto jecoris calorem contemperando, & tandem caput & viscera roborando.

Et à fonte Chirurgico omnium primo desumenda repetita sanguinis missio, ex interna utriusque brachii. Cauteria omittimus, utpote ætate florentibus odiosa, & quoniam non diversionem, sed catarrhi extirpationem moliri intendimus.

A Pharmaceutico fonte primo desumenda primas vias emundantia, quæ esse poterunt potio ex m. nua clarif. deinde m. ros. simplex cum jul. p. acet. ad ʒij. per quinque dies, mox repetita eadem potione, & addito melle ros. solut. Secundo aperiendæ obstructions succis depur. hac ratione.

ʒi. Succī depur. cich. agrim. fumar. an. ʒj. decoct. cich. borrag. beton. melilla, scolopend. tamarisci ʒv. m. pro syrup. & sic pro aliis septem. Inde purgentur humores præparati infus. agari-ci, rhab. & semmæ, additis syr. & melle ros. solut.

Pro tertia & quartâ implendâ intentione, pilulæ hujusmodi conveniēte poterunt.

ʒi. Pilul. aggreg. cochiar. an. ʒß. de agar. Mef. aurear. an. ʒj. m. ref. pil. & aur. pro una vice, quæ ter repetendâ, quarto quoque die, diebus autem intermediis, sumantur succi depur. cich. beton. & fumar. ad ʒij. cum jam præscriptâ decoctione. Interim errhinis caput quoque erit purgandum ex pulv. major. ireos, & nigellæ paratis, sed mane tantum, jejuno ventriculo. Ita pariter expectoranda materia oxymel. ireato.

Atque ita toto cum capite expurgatis, capitis ejusdem intemperies humida erit auferenda, in quem finem necessarius omnino nobis videtur sudor in hypocaufto, præmisso decocto hoc modo parato.

ʒi. Visci quercini veri, guajac. pinguis, & reco. salz electæ, lentisci & chio, ligni tamarisci an. ʒj. aq. stillat. cich. beton. an. lb ij. m. fiat

infus. per horas 24. deinde bull. ad consumptionem dimidii, & colat. servetur pro tribus diebus, matutino tempore, horâ una ante ingressum hypocaufti assumenda, quod si sudor non adeo facili & promptè erumpat, præscribatur bol. ex ʒj. extr. salz, & ʒß. pulv. viper. Pro potu vero consueto, paretur ita aqua secunda.

ʒi. Residuum, aq. com. lb xii. m. bull. ad consumpt. tertia, sub finem ebull. additis cinnam. integri ʒij. bul. par. & in colat. adhuc ferventi dissolvantur sacchari fini ʒiv. Procuratur autem sudor 40. diebus, & decimo quoque die præbeatur potio ex m. nua clarif. & victus ratio sit attenuans, non tamen adeo tenuis, sed quæ semper dimidiâ parte a consueto declinet.

Jam dictis transactis diebus, & peracto sudore, jecori & sanguini aliqua refrigeratio erit concilianda aq. destill. de succo cich. ad cyathum quolibet mane cum conserva de acido citri. vel syr. de succo limon. præmissa rosar. conservâ, idque quindecim aut viginti diebus, quatuor saltem horis ante cibum. Et interim patetur vinum medicatum ad mensam ligno torismarini, lentisco, & santalo rubro ad ʒij. pro qualibet situlâ, quo toto hyemali tempore utatur. Et pro capitis roboratione in usum ducatur, sub ingressum lecti, bol. c. conserva modo torismarini, modo c. floribus, beton. quarum consuetus sit usus.

Et jam dictis congrua addatur victus ratio, & præter cætera, caveat ab aere nocturno, & quam maxime à crepusculis, abstineat omnino a lactariis omnibus, lactucâ, apio, feniculo, condimento allii, & cæparum, & à leguminibus, ac raro utatur cibariis ex pasta paratis, rarissime vero piscibus squamis carentibus, ut anguilla, tinea & hujusmodi aliis. Vitet vina generosiora, & comotationes, potissimum inter prandium & cœnam, necnon comestiones, ne cruditates congerantur. Somnus sit nocturnus, & si diurnus, capite elevato. Exercitia conveniunt jejuno ventriculo. Parca sit Venus, & alvus lubrica servetur, alacriter vivat. Quibus caute administratis, Nobil. Adolescenti levamen insigne ominamur. *Jam. Raymond. Fortis Consuli. & Respons. Medic. Cent. 1.*

Nobilis Juvenis Vestalis 20. annorum temperamenti secundum totum ad frigidum & humidum, secundum vero caput ad calidum, & humidum vergentis, ventriculi frigidioris & humidioris, sex abhinc mensibus affligi cœpit, destillatione catarrhalis materię crudæ & insipidæ, atque in præsens salz, ad fauces, thoracem, aliasque corporis partes, cum tussi molestâ, siti, inappetentiâ, febricula inconstanti, inordinatâ & nocturnis vigiliis, somnis inquietis, denum auditu gravi. Quæ tamen mensuris purgationibus consuetis rectè procedentibus patitur.

Nemo in arte vel mediocriter versatus non videt, quod Sacra hæc virgo Nobilissima falsa destillatione laborans, caput habeat essentialiter affectum, à quo omnia mala eandem affligentia deriventur, tum quia ejus temperamentum calidum & humidum, ideoque destillationibus obnoxium, tum quia sensorium læsum habet, surdastra enim utraque aure facta



est, capiti tamen materiam quoque per totum venosum genus subministrari credendum, ob temperamentum totius frigidum & humidum, quod proinde duplici nomine erit laesum, essentialiter scilicet & per consensum, unde non mirum, si copiosa inde suboritur in varias corporis partes destillatio, quae omnium morborum fons & origo esse potest, ut dicebat Gal. & magno tadio atque molestia naturam, humanam frangit, quanquam admiratione non careat, quae ratione hoc temperamento totius frigido & humido, capite item calido & humido, ventriculo frigido & humido, falsa destillatio, sitis immoderata, vigiliae, & somni inquieti adesse possint. Ut propterea nobis conicere liceat, jecoris caliditatem in Nob. Virgine vigere, quae & ventriculo siccitatem aliquam alcitiam inducere possit, & biliosos ichores producere, ex quorum cum pituita permissione salsedo fiat, cum de corruptis & coloratis sputis nulla fuerit facta mentio simulque ab eodem viscere, & forsan ab hypochondriis quoque, calidas evaporationes caput petentes, vigilias & somnos inquietos Patienti eidem invehere. Copiosa autem catarrhalis materia, non tota à capite in subjectas partes decubuit, sed ejus portio in eodem harena, & ad meatum auditorium transmissa aut obstructione, aut nimia madefactione sordiditatem induxit, cujus maxima portio ad partes tum naturales, tum spiritales precipitata, in naturalibus putrescens, febrem putridam quidem, non tamen humoralem, sed catarrhalem produxit, eamque intermittentem & inordinatam utpote quam nonnulli sufficiens, à capite catarrhalis materiae destillatio exciter, quae dissoluta ac consumpta febris cessat, interim tamen ventriculum permeare necesse est, unde nausea, minor autem ejusdem materiae pars irruens in asperam arteriam atque pulmones, tussim molestantem necessario concitat.

Status hujus patientis est periculi plenus, cum destillationes in pulmones vitae adversarissimae, à Gal. malignae, à Celfo pestiferæ dictæ fuerint: phthisin enim inducere solent, & potissimum in hac nostra Nob. Virgine periculum imminet, cum consanguineos phthisi preceptos habuerit, difficilior quinetiam redditur sanatio capite duplici nomine, tum essentialiter, tum per consensum affecto. Surditas quoque non levem difficultatem ex se habet, magnum enim à statu naturali recessum significat, prout sanationem difficiliorem reddit anni tempus, ætati proximum, quo accommodata prohibentur administranda remedia. Nihilominus salus desperanda non est, cum juvenis sit, & menstruis consuetis purgationibus gaudeat, sed curatio tentanda, suo postea loco, & tempore pericienda.

Primo itaque ventriculi & primarum viarum expiatio est procuranda. Secundo venosum genus expurgandum. Tertio ipsum caput. Quarto destillatio à pulmonibus divertenda. Quinto capitis intemperies humida corrigenda. Et tandem pulmones exsiccandi, & materia in auribus pro virili resolvenda. Quibus intentionibus satisfaciendum remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis, & Dieteticis.

Et ex Chirurgico fonte primo depromenda

parca sanguinis missio ex jecoraria dextra: secundo cauterium in sinistro brachio nullo modo omittendum. Tertio frictiones quotidianæ à nucha per dorsum usque ad crura & pedes non negligendæ, matutinis horis, sicuti vespertinis ante carnem lotiones pedum aqua calente.

Ex Pharmaceutico vero desumenda lenientia, præparantia, totum purgantia, evacuantia caput, intemperiem ejusdem corrigentia, & tandem expectorantia & aures exsiccantia.

Leniens esse poterit potio ex manna clarif. vel cassia cum lenit. & tart. primum præparans suavius hoc erit.

℞. Julap. acet. ℥ iij. Tenuiss. crem. tart. ℥ iij. aquæ cinnam. ℥ ss. m. pro syr. & sic pro quatuor aliis. Inde sequatur humorum evacuationio præscripto medicamento, & ulterior succedat præparatio, præbendo oxymel. simpl. ℥ ij. cui superbibat hujusmodi potionem.

℞. Succ. depur. borrag. beton. pomor. dulcium an. ℥ j. decoct. cichor. borrag. endiv. melissæ, beton. flor. citri ℥ v. m. pro syr. & sic pro aliis septem. Inde præparati humores expurgentur infusione agarici, rhab. & sennæ, adluto syr. & melle ros. sol. vel potione ex manna clarif. addēdo agaric. & rhab. infus. consuetæ, vel electuar. lenit. cum diaphan. à quibus bibat patiens mulsam dilutam ex aqua malvarum paratam, vel aquam hordeaceam ad ℥ ij.

Purgato toto & caput erit expurgandum his pilulis.

℞. Pilul. cochiar. aurear. aggreg. an. ℥ ss. m. ref. pilulæ, & aur. & hora post bibat aquam hordeaceam, vel Nocerianam ad ℥ j. ss. quatuor vero horis ab assumpta aqua, prandeat. Eadem vero pilulæ, quarto quoque die ter repeti debent, & diebus intermediis præbendi succi jam dicti in decoctione præscriptæ; interim inane erithinis modo, modo masticatoris capitis expurgatio adjuvanda. Erithinum vero paratur ex pulv. majoranæ, ireos & nigellæ, licet masticatoria auribus magis conferre possint ex mastiche, gingibere, pyrethro, & feniculo cum cera parata.

Hoc tempore caput exsiccandum quidem foret decocto aliquo cum sudore; verum quia æstatis calor vetare id poterit, ideo confugiendum erit ad aliquod aliud in jure paratum, quod exsiccandi quidem, sed parum calefaciendi facultate polleat, quale hoc esse poterit.

℞. Ligni lentisci è chio, ligni rosismar. an. ℥ j. ligni buxi, santal. albor. radic. rosar. damascen. an. ℥ ss. aquæ destillatæ cichor. ℥ ij. violar. betou. an. ℥ j. m. f. inf. per horas 24. deinde illi adde quartam partem pulli junioris, & bulliant ad consumpt. dimidui, factæque colatura servetur pro tribus diebus matutinis horis assumenda, cui præmittatur pulvis viperinus ad gr. x. aut xx. quotidie, valde enim exsiccat, citra insignem caliditatem, præter ejusdem vii quandam balsamicam ventriculo accommodatam, in cujus usu persistat ad 30. dies vel 40. Quo tempore, mane potissimum, ante decocti usum, materia catarrhalis expectoranda, vel julap. acet. cum syr. de ibisco, nisi adeo crassa fuerit, quo casu oxymel. simpl. cum aqua facsaræ ex usu erit, sub noctem vero inter



intercipientia convenient, quæ salsedinem quoque contemperare possint, quale est diapenidium, diatragacanthum frigidum cum bolo, ore in somno detinenda. Pariter auribus medicamenta erunt infundenda; & quidem selectiora, ut

℞. Corpam integram, excavetur, deinde oleo amygdal. amar. & pulvere cymini impleatur, ad ignem mox decoquatur, & fiat fortis omnium expressio, tum gossypium in turundæ formam, eadem madefactum in aures instituitur.

Vel ℞. Pomum colocynthidis evacuatum, quod impleatur succo raphani, & felle capræ, mox ad ignem cinerum decoquatur, & pariter fortiter exprimat, & in usum, ut supra, ducatur. His peractis, conservæ caput roborantes erunt usurpandæ, nimirum e floribus betonicæ, floribus rorismar. rosar. sub ingressum lecti sumendæ. Ventriculus quoque roborandus, atque e prandio statim duo, aut tria integra grana mastiches quotidie devoranda, vel pilula ex ʒj. succi absinthii cond. deglutienda.

Quibus omnibus congrua victus ratio erit addenda, vitando lactaria omnia, lactucam, legumina, condimenta coarparum, allii, apium, fœniculum, vina generosa. Vinum verò pareatur medicatum lentisco, santalo rubro, & ligno rorismar. an. ʒj. pro qualibet situla. Somnus sollicitetur sola quiete, non autem medicamentis aut vaporosis alimentis. Corpus moveat, & jejuno ventriculo exerceat, atque bis aut ter per mensem utatur semper pilulis mastichinis ad ʒj. a cibo abstineat a lectionibus & meditationibus, & alacri animo vivat. Quæ omnia D.O.M. salutaria reddat. *Johan. Raymund. Fortis consult. & respons. medic. tom. 1. cent. 1.*

Sereniss. Matrona 30. annorum circiter, proceræ ut cumque staturæ, eximie pulchritudinis, habitus corporis inter gracilem & carnosum medii, complexionis biliosæ, sub dominio sanguineæ pituitosæ, agilis ad motum, sensus acutissimi, ingenii excitatissimi, prudentissimi & ad omnes heroicæ actiones obeundas, expeditissimi, quatuor filiorum, duorum scilicet marium, totidemq; sceminarum augusta mater, passa est ob infortunia inopinata tres abortus duobus elapsis mensibus a conceptionis initio, quos profluvium sanguinis copiosum semper subsequutum est, non sine vitæ periculo, potissimum hoc postremo proxime præteriti Decembris, à quo accommodatis remediis, supremi Numinis ope convaluit, mensibus aliquin ordinatè semper fluentibus. Conqueritur igitur Sereniss. Domina de variis fluxionibus, tum ad dentes & oculos, tum ad fauces & pectus, unde frequentibus & atrocibus dentium doloribus quandoque, atque etiam rursi fere perpetua ab anno jam cum dimidio divexatur, cum expectoratione pituitæ aliquando viscidæ, alias serosæ & tenuis, ut plurimum tamen nullius aut paucae salsedinis participis, cuius ob percunem fluxionem, dentes aliquam cariem contraxere, quorum tres ob hanc causam, cogente atrocissimo dolore, fuerunt revulsi.

Corripitur insuper levi de causa dolore capitis, modo gravante & sæpius pungente,

cranium quippe ipsius rara textura, & subtiliori compage constans conjicere licet pluribus argumentis; ab injuriis siquidem externis facile offenditur, & post ultimum abortum acuto capitis usque adeo dolore divexata est, ut phrenitidis periculum subjerit, nisi missione sanguinis ex taphena, aliisque idoneis remediis illi prospectum. Naribus frequenter emungit mucum viridem, flavum & glutinosum, atque in capite ejusdem diutius effluerunt furfures squamosi, nec non ulcuscula cum crustis cineritiis, e quibus Ichores lenti & crassi, ad instar mellis manabant, quæ tamen omnia jamdiu evanuerunt ab usu thermarum, sæcunditatis comparandæ causâ, spatio mensis, & ultra adhibitarum. Cauterium vero in brachio ut præsidium utile, emissarii loco, sæpius propositum, ob varias causas renuit.

Quibus sic stantibus, cum in prædicta Sereniss. continuus Rheumatismus observetur, ob habitalem capitis intemperiem humidam, & calidam, nec non ob quandam imbecillitatem contractâ quaeritur à Doctull. ac peritiss. Viris, num Patavini agri aliquæ thermæ, præmissis præmittendis, & pro usu præparato corpore, possint stillicidii forma, potissimum in bregma robur cerebro conciliare, humiditates superfluas exsiccare, loco habitualis intemperiei, contumacium, & rebellium affectionum causæ, temperiem aliquam mediocrem inducere, ut enarrata incommoda expurgari possint, atque eadem operâ graviora præverti, non parum adjuvante benigno hoc cælo, ac saluberrimo, huic regioni Numinis indulgentia præ cæteris concessio. Quæ raptim, & currenti calamo, variis aulicis occupationibus dillicius exarabat. N. N.

Serenissima Matrona à naturæ primordiis, jecoris justo calidioris & præhumidi ac calidi capitis, pravas quoque soboles earundem intemperiem prodidit, etenim primo antehac, in capite squamulæ quædam observatæ fuere, à quibus ulcuscula cum crustis, quæ lento & crasso humore, mellis adinstar, manabant. Favi ideo appellata, quæ exsiccatis thermis, non tamen adeo utiliter, licet casu cesserunt. Præterea idem caput primario & essentialiter effectum materiam continuo producens sæpe patitur telis vulnera facta suis, dolores scilicet nonnunquam gravantes, ab eadem extendente, nec non pungentes quandoque tum à propria caliditate, tum à calida, & acri subministrata serositate biliosa ab hepate, à cujus cum catarrho missione, salsedinem factam censemus. Et quoniam enim ob doloris acutiem & sævitiam, in delirium fere incurrisse relatum est, ideo partium intra cranium continuum solvisse existimandum. Sed quia Catarrhus, sors & soboles omnium morborum habetur, cuius vi totum corpus languere dicebat Gal. ab Hipp. mutatus asserente, *Fluxiones à capite magno radio, & molestia naturam frangere*, hinc accidit, ut in capite exuberans, & ad varias infernas corporis partes delabens, varios quoque præter naturam induxerit affectus, nimirum dentium corruptionem præcedentibus eorum gravissimis cruciatibus, qui sæd emulsionem eorundem admittendam & tolerandam Patientem Sereniss. coegerunt. Præterea adenas sive gulæ glandulas inflavit, & quod gravius in pulmones decum-



decumbens & expultricem facultatem irritans ad noxii excretionem, violentum & concitatum pulmonis atque thoracis motum excitavit cum strepitu, tussim videlicet, quæ decem & octo ab hinc mensibus perpetuo Sereniss. molestat, quæ materia quidem catarrhalis excernitur, tenuis ut plurimum, nonnunquam & crassior, frequentissime salsa, non tamen flava, seu subviridis, prout naribus aliquando emungitur, pro majori vel minori portione serositatis biliosæ à jecore, & venis ad caput transmissa, atqui diuturniori ejusdem, vel breviori in calido capite mora. Quibus omnibus accedit regionis ambientis nimirum conditio, est enim quid divinum, quod nobis inest, aer ipse à cuius mutatione effectus divinos, nostrum scilicet caput superantes produci videmus, & potissimum in calidis & humidis temperaturis, & mollis, & raræ texturæ, quæ ut notabat Gal. facilius à causis externis, prout frigida ab internis laeduntur.

Diximus autem calidam & humidam intemperiem capiti innatam fuisse, nihilominus augmentum quoque suscepisse asserimus, non quidem ab utero, ob sequutos abortus, ac proinde lochiorum, & sanguinis immoderata profluvia. Etenim *Si menstrua plura fiant, accidunt morbi, & si non fiant ex utero morbi contingunt.* Verum potius à ventriculo ob sanguinis effluxum, animi inarores præteritos, & mentis applicationes quodammodo inbecilliori reddito, nec non à jecore calidiori, cujus fervor hac ætate potissimum vigere solet, & præsertim in hac serenissima, cujus cordis quoque temperies, sicut firmissima ita calidior quoque censenda, ut ex influentis caloris robore, ad omnes actiones promptissime & perfectissime obeundas, facile colligere possumus, unde mirum non fuerit, si sanguis in hepate calidiori genitus, & in calidiori corde elaboratus, ex immodicâ caliditate venarum expultricem irritante, postremis abortibus, non sine aliquâ vasorum uteri laxitate, profluvium immodicum, & ideo præter naturam excitaverit.

Status præsens Sereniss. Matronæ opem medicam exposcit, ut in meliorem mutetur vel saltem, ne in deteriore labatur. Tenuis enim destillationes *Malignas* appellabat Hippoc. *pulmonibus adversarissimas.* Gal. *Pysiferas* Celsus ob rationes Excellentissimo Viro notissimas, & potissimum quod salsa in casu nostro percipitur. Ac propterea summa cum prudentia calum mutandum esse, & propria medica auxilia inquirenda consultum fuit, agitur enim imposterum de summa rerum.

Quare caput erit exsicccandum, & nullo modo calefaciendum, sed refrigerandum, jecoris & venarum calida intemperies pariter corrigenda, & contemperanda, destillatio aliò derivanda, ac intercipienda, & pulmones roborandi, congruâ universali totius corporis & capitis expurgatione præmissa, quod præstari poterit sanguinis ex brachii venis, medio inter utrumque tempore menstruæ purgationis, educatione. De cauterio autem nihil in præsens, dum desente destillationis exhauriendo cogitamus, ideoque Sereniss. D. Genio indulgeamus.

Reliqua purgatio erit perficienda lenienti-

bus, præparantibus, ex herbarum succis & decoctionibus potius quàm saccharatis aut mellitis parandis, & purgantibus, tum a toto venoso genere, tum à capite electivè educantibus, quibus semper succedant potiones copiosæ refrigerantes; Interim erithimum suavissimum, caput recreans & reficiens, more tabaci in usum ducendum, ex pulvere majorane, & iridis Florent. paratum, ut ab infundibulo & gutture materia catarrhalis divertatur, non omisso nocturno tempore, confectionibus sublingualibus, ex Diacodio cum bolo, vel ex diatragacantho frigido, pariter cum bolo.

Hoc loco intemperies corrigendæ veniunt, proprio ordine, & prius capitis humiditati mox caliditati ejusdem, & jecoris, incumbendum. In quem finem sacre thermæ, ab effectibus ita dictæ, à Viro Excellentiss. proponuntur usurpandæ, quæ saluberrimæ in agro nostro Patavino scaturiunt, pro capitali stillicidio, vocantur Laitrenses, exsiccant enim citra in lignem caliditatem, cum multi aluminis, exigua calcis, sive gipsi, paucique sulphuris mineram contineant. Etsi capitis calor non oblitterit, præsto sunt Aponenses, magis exsiccentes, sulphure, cinere, alumine, & gypso constantes. Aliæ vero ejusdem agri sunt ore sumendæ, quæ B. V. dicuntur, refrigerantes, parum salis & sulphuris, nec non alumen & juxta aliquos ferrum quoque continentes, quæ tamen prout reliquæ minerales, sulphuris participes capiti nocent, quare ab Andrea Bacio, celeberrimo viro, prohibentur, utpote effumantes, & caput plurimum replentes, locum tamen habere poterunt capite prius internis & externis exsicccato.

Præcedat itaque (quod omnino necessarium etiam præter usum harum aquarum) jus pulle junioris, china, santalo albo, & radice rosar. damascenar. alteratum aqua beton. & farsar. paratum, quod exsicccandi quidem citra calorem, refrigerandi facultate pollebit, per mensem exhibendum, quo tempore stillicidium quoque aqua Laitrensi administrabitur. A quibus ad aquas jam dictas Beatæ V. deveniri poterit, primis diebus dejectorias, sequentibus vero diureticas, quarum usus si aliqua difficultate urgeri videatur, Aquæ Nocerianæ huc advectæ ex agro Romano iisdem à nobis substitui solent, frigida namque scaturiunt, nec exportata spiritus diffiant, cum non minerales sint, terram enim Samiam potissimam habent, quæ jecur egregie refrigerant sine ulla capitis offensâ. Quæ jam dicta, & alia Sereniss. Matronæ Salutaria evadent sub prudentissima viri Excellent. directione, ita D. O. M. vota nostra secundet.

*Pro eadem.*

Utinam sic firmum, ac Sereniss. Matronæ saluti proficiens, quæ sitis iam propositis admitteret responsum mutilata historia, quæ modo pervenit ad manus nostras, prout fidelissimum & more nostro integerrimum reddetur.

Quatuor igitur in Scheda proponuntur solvenda quæ sita, circa Sereniss. D. statum quibus nos addimus abortus causam expendendam quæ licet externa esse potuerit ob præteritos dolores, vigiliæ, corporis & animi motus,



utin secutis antehac abortibus nihilominus imbecillitatem quoque in utero contractam fuisse supponimus.

Primum autem quaesitum fuit, an integra secundina hucusque extracta fuerit, an vero pars ejusdem non exigua adhuc num in utero hæreat. Secundum, utrum lochiorum expurgationem in puerperio necessariam possit supplere, alia alba materiae profluvium adhuc durans.

Tertium, an alicujus levis ulceris in utero suspicio esse possit.

Postremum num in dictis afflictionibus, Balnea, sive aquae nostrae Patavinae prodelle possint, & si non convenient, num hyberno tempore facultates suas adeo conservent, ut Sereniss. huic se conferre, earum causa expediat. Balnea quippe hic habemus utero firmando, ac roborando quam maxime opportuna, quaecunque demum intemperies imbecillitatis causa fuerit.

Quaerita igitur quod attinet, statim ab abortu hæsisse secundinam autopsia liquido patet, non enim excreta apparuit, sed praeterea id mox apparentia confirmant immanes scilicet dolores, sicut ejusdem suppressae & putrescentis indicia sunt nausea & animi deliquia, licet mirum acciderit, quod neque rigores, neque febres excitatae fuerint. Num vero integra secundina excreta fuerit, prorsus ignoramus, siquidem putrefacta sexta aut septima die delabitur, quam si praeterierit nunquam ad 60. protrahitur ejusdem excretio. Nos autem latet tempus ab abortu & praeterea, num fragmenta plurima & manifesta, vel crassa materiae fatens profluxerit, quanquam dolorum & deliquiorum moderatio, si non totam, magnam tamen ejusdem partem fuisse excretam certum non is præbeat indicium, siquidem gravioribus accidentibus alioquin premeretur sereniss. D. D. nostra.

Secundum quod spectat, consuetas expurgationes esse materiae albae continuo per uterum excretae, minime dubitamus adscribere serositatibus & cruditatibus ex liquato catarrho, in venoso genere Sereniss. scatente.

Ad tertium de ulcere dicimus, quod hoc plurimum praecedere solet inflammatio, quae non datur sine febre acutissima, doloribus atrocissimis, & saevioribus aliis symptomatibus, de quibus nulla mentio, quod licet quandoque etiam fiat ex abortu difficili, aut violenta secundinae extractione, has tamen causas non praecessisse supponimus. Neque ab acri humorum fluxione ulcus excitatum existimamus, quoniam dolores & pungentes, & corrodescentes antehac passus fuisset. Quare ulcus in utero non adesse censemus, absentibus potissimis praesentis ulceris signis ab Hipp. recensitis, quae sunt, continuus dolor acutus, qui ad tactum exasperatur, protensus ad pudenda, pubem, imum ventrem, ilia, & lumbos non sine febre, cum puris, & serosae saniei effluxu, quibus a casu nostro prorsus alienis, nec ulcus in utero adesse suspicandum. Et licet quandoque recrudescant dolores, horum tamen causa, vel in partem aliquam secundinae hærentis, vel in materiae per uterum effluentis suppressionem referenda est, continui namque forent, si ab ulcere, ut pote a causa continua procederent.

Quibus ita statutis, ut quarto quaesito satisficiamus, num scil. Thermae nostrae dictis affectionibus conferre possint, considerandum easdem tres esse secundinam scil. retentam, album ex utero profluvium, & ulcus si advenit.

Et primo si de suppressa secundina loquamur laxantibus, putrefaciendis, & detergentibus per uterum injectis, & impellentibus per os assumptis indiget.

Si secundo de albo profluvio si sermo, hoc cum Puerpera expurgationis vicem suppleat, non est supprimendum, sed permittendum. Quod si quadragesimo transacto die persisteret & morbum muliebrem profluvium evaderet, tunc totum venosum genus serositatibus & cruditatibus purificandum foret. mox intemperies calidajecoris, humida capitis corrigenda, in quem finem aquas nostras B. V. per os commendare utiles censerem, sicut & Laticrenses quoque pro stillicidio ad capitis humidam intemperiem contemperendam. Verum ut diximus, profluvium hoc observandum an orbofolum redditum fuerit. Interim animadvertimus, aquarum B. V. vires caniculari tempore vigere quo assumi solent, quia facilius permeant, & per urinam excernuntur, quae aliis temporibus non sunt ex usu utpote quarum vires pereant. Primo quia calidioribus temporibus ab ambientis aëlu retinentur quodammodo, earumque vires & facultas a minera sursum attolluntur, & per ipsarum substantiam diffunduntur, prout contrarium accidit frigidiori tempore. Secundo quia ab aquarum pluvialium missione vitantur, & tandem quia anni tempore minus calido non permeant, sed cum agrorum detrimento in corpore hærent. Unde ingruentibus pluvii diebus quinetiam canicularibus, Patientes ab earum usu abstinere per plures dies; quae eadem ratio est Laticrenium pro stillicidio, & sere Aponensium, pro infusu.

Si tertio de ulcere verba faciamus, quoniam non adesse speramus, & credimus, ex relatis in Scheda, ideo de remedio ulceri curando, a nostris aquis depromendo, non est quod cogitemus, quod tamen si a Sereniss. istis Archiatris in progressu forteprehenderetur in utero superstes, hoc tantum casu, in gratiam harum aquarum, adventum Patavinum Sereniss. D. D. proxima hyeme, & quam primum necessarium omnino existimamus, ubi balneum extat montis agrorum appellatum, cujus minera continet Gypsum, Calcem, & Alumen, ulceribus exsiccandis mirabilis facultatis, quae non adeo facile refringitur, ut ceterorum Balneorum, & potulentarum aquarum.

Hæcque abunde, ut quaeritis pro virili ingenue satisficiamus, atque omnia in superiori consultatione proposita pro salute Sereniss. D. D. confirmemus, addentes interim, quod in hoc adversae valetudinis Sereniss. statu, aeris & regionis mutatio, ut pristinum & meliorem facilius adipiscatur, praesentissimum, & pene unicum futurum sit remedium, quod candidè & ex corde pronuntiamus, prout summam felicitatem Sereniss. universae familiae a D. O. Menixe precamur. *Joan. Raymond. Fortis consuli. & R. spons. Medic. Cent. 1. T. 1.*

Illustrissimus Vir in Hispania natus vel con-



tinuis Jurisprudentiali studiis vel gravi negotiorum mole (ratione ministerii) fatigatus, a fluxionibus quas ad dentes aliasque corporis partes passus est aliquando; inulto cauterio in brachio sinistro, deinde salsa parilla & guajaci propinato sudorifico decocto, anno ætatis trigesimo nono convaluit, ita ut per tres sequentes annos stomachi robore abuti non formidaverit: proinde enim natura (quæ solet esse morborum medicatrix) singulo mense humoris atrabilaris copiam sponte excernebat. Uxorem interim duxit, & meliori victus ratione instituta (excepto quadragesimo quinto ætatis anno; quo iluxu sanguinis per aluum, & febre correptus est) usque ad quinquagesimum vitam duxit saluberrimam, post quem usque ad quinquagesimum sextum quem hodie numerat, non sine labore pituitam quotidie multam, & bile commistam, prius paucam deinde & inspidam per os summo mane excreare consuevit. Quinque ab hinc annis incunte ætate tempore oedematosi tumores cum aliquo rubore pedes & crura occupantes, depositam à natura, adhuc forti, pituitam cum aliqua portione bilis, ad minus nobiles partes ostenderunt. Verum anno ætatis quinquagesimo tertio, post multa in sex rebus non naturalibus errata, vehementissimis colicis doloribus correptus, postquam opportunis adhibitis remediis convaluit, per anni spatium bene & sine crurum tumore se habuit, sed tumefactis denudò partibus ipsis, licet absque dolore laborem in motu quem passus non erat antea, persensit, & duobus abhinc mensibus, evanescente denudò partium inferiorum tumore in novum importunum que morbum incidit. Nam ab assumpto cibo inter tertiam, quartamve horam ab hypochondriis, & a dextero præcipue removeri quidpiam agnoscit quod statim usque ad sterni medietatem ascendens, ita violento dolore pectus opprimit, ut subsistendum illi sit, sudor circa frontem erumpat, brachia & gingivæ, leniusculo tamen dolore, & in dextera magis corporis parte coarctantur. Citò invadit dolor, & citò etiam evanescit; Modico enim aquæ saccharata haustu, duo vel tres ructus erumpunt, post quos aliqua solet pituitæ viscidæ quantitas excerni, & si aqua desit, qualibet re actu frigida, exterius admota, sublevatur: Condensantur enim vapores illi ascendentes & minus spatium occupantes, minorem etiam faciunt continui solutionem. Statim à metu se recolligens Illustriss. Pat. ita se habet, ut transactæ pressuræ nullum remaneat vestigium, & nihil labefactata naturali facultate circa vitales actiones omnes melius se habere fateatur, quam antea, dum crura & pedes intumescabant. Modò tuum, Vir Sapientissime, anxie consilium efflagitat.

Licet unius rei unica tantum assignari possit causa, ab una tamen eademque causa plures procedere effectus sæpè videmus, ut in casu Viri hujusce Illustriss. cujus temperamentum totius & spatium, atque corporis habitus, quamvis in historia desiderentur, ex aliis tamen relatis, totius & jecoris, iustoque humidius tum cerebri tum ventriculi conjicimus; ut propterea olim fluxionibus ad varias partes Pat. obnoxius fuerit: sicut ob jecoris fervo-

rem sanguinis fluxibus, & atrabilariis vomitibus. Naturales autem jam dictas intemperies omnes non parum foverunt & auxerunt intensa studia & vehementes in arduis animi applicationes, quæ caput replere, defatigare & imbecille reddere solent, sicut ventriculi robur dissolvere. Undè jure merito dicebat Aretæus, *Studiis ventriculum necessariò debilitari: amor enim disciplinarum à quo non avocatur? à Patria, à parentibus, à semetipso usque ad mortem.* Et sicut decoctum sudorificum Catarrhales fluxiones jam imminuere, & ventriculo non nihil prodesse potuit, ita jecitori colorem addidit, unde paulo post atrabilaris humoris proventus. Interim & in capite & in ventriculo tum Catarrhalis, tum crudæ & pituitosæ materiæ urgente reproductione, ejusdem copiosa, plures annos summo mane quotidie per os excretio visa fuit, non sine exigua bilis permissione. Verum quoniam à capite continuo, & noctu potissimum in ventriculum delabens, & ab eodem quotidie ex assumptis genita, adeo copiosa fuit, ut illa per os evacuatio sufficere non potuerit ad venas conversâ, inde per arterias ad pedes à natura deposita fuit, talique metastasi tumores oedematosi in pedibus utiliter suborti. Verum ab erroribus in victus ratione commissis, cruditatum adauctâ mole, naturæ vires obruente, cessarunt abscessus, evanuerunt tumores, & in abdomine stagnans colicos excitavit dolores, à quibus congruis remediis liberatus, sat bene habuit Illustrissimus vir, per annum scilicet, nimirum usque ad novam crudæ materiæ accumulationem, quam rursus sinceriores, quam antea natura ipsa ad pedes deposuit, sine bile, & ideo sine dolore, cum habeamus à Gal. quod *humidum & viscidum sine violentia corpus attingunt*: humiditas enim opponitur solutioni continui, nec illam nisi copia replendo inducere valet, ideo ex illa aut nullus, aut valde exiguus dolor, licet mole sua spatia dearticulationum implendo, motum difficilem reddiderit. Sed tandem rursus materia eadem naturæ repugnans, aut ob sui copiam, aut facilius ob sui viscidam, quinimò & crassam qualitatem à calore jecoris inditam, sicque admotum inepta reddita, resistit in via, & in venis tum mesenterii, tum hepatis, nec non lacteis hærens vapores emittit, dum a calore ejusdem resolutio tentatur, qui præsertim elevari solent tribus vel quatuor horis ab assumpto cibo, dum Chylus ad venas jam dictas perveniens movet cruditates viam eidem intercipientes, quâ occasione sumosi halitus multiplicantur, & ab hypochondriis, à dextero potissimum elevari percipiuntur, quorum pars sursum elata exitum quarens, nec inveniens, septum fortiter comprimens, pectus opprimit, & sterno dolorem inducit: portio alia à venis lacteis per ductum thoracicum perreptans facile ad jugulum, indeque ad brachia pervenit, & per carotidas ad caput & ad gingivas ipsas, quæ tandem in sudores solvitur.

At si simplices halitus, cur non facile dissolvuntur, cur dolores adeo immanes ac violentos excitant? an quia vaporosa & halitosa materia non est, sed fuliginosa, crassa, acris, aut acida, & mordax, à minera ejusdem conditionis elevata; humor namque olim tantum pitui-



pituitosus & crudus, qui statim genitus per os excernebatur, in intestinis collectus, colicos pariebat dolores, ad extremos artus decumbens tumores excitabat, tandem ad hypochondria insinuatus, & in isdem permanens, non solum calorem concipiens, sed nigro, & melancholico humori associatus, qualitatem aerem, acidam, & mordacem comparavit, cujus halitus fuliginosi, exhalationum potius quam vaporum naturam servant, & ideo utpote crassi & acidi difficilem habent resolutionem, & interim varias jam dictas partes petentes continuum solvunt & dolores jam dictos pariunt, sicque ab una eademque materia cruda & pituitosa, & fluxiones, & quotidianæ per os excretiones, & pedum crurumque tumores, & colici dolores ortum duxerunt, & ab eadem, sed causa alterata, & humori exulto, ac melancholico immista, tandem postremi suborti fuere dolores: quam veritatem confirmant frigida assumpta & admota, cum morbum & causam morbi ostendat sanatio.

Affectum hunc non adeo facile solubilem fore minatur causæ pertinacia, atque diuturnitas altas radices agnoscens, & difficultatem augeret modò tum locus causam continens, tum melancholici humoris societas. Nihilominus omnino congrua supposita vivendi ratione, appropriatis tandem remediis cessurum speramus.

Si primis viis, ab excrementis expeditis, Aperiens, humectantibus, humorum peccantium præparatio procuretur, per Epicrasim benignioribus expurgentur, qualitas acris & acida eorumdem demulceatur, & status acti dolores excitantes discutiantur, atque tandem tum ventriculi, tum jecoris intemperies corrigantur.

Pro quibus explendis, sanguinis missio per venam sectam in brachio nullo modo omittenda, sicut à venis sedalibus hirudinibus est repetenda. In hoc fonte locum habet balneum aquæ dulcis tepidæ, folius malvarum, violarum, salicis, sonchi & lactucæ alteratæ, & inunctiones à Balneo copioso oleo amygdalino.

Pharmaceutica remedia quod attinet, pro prima intentione explenda erunt, Syrupus rosolot. cum melle rosato; vel Cassia cum lenitivo. Et primum Præparans: Julapium acet. cort. citri aromatiz. additis tribus aut quatuor drachmis pollinis crem. tart. aut mellis ros. simplicis portione. Quibus per quinque dies exhibitis succedat evacuatio consimili medicamento supra proposito, cui superbibere poterit jus pullæ hordeo alteratum. Et hoc tempore tum ad absolvendam primarum viarum deterisionem atque ablutionem, tum ad ventriculum quoquo pacto exsiccandum, aquæ Tettucianæ tribus saltem vicibus, cum vehiculo dejectorio adhibita, convenientissimæ erunt. Inde ad ulteriorem humorum præparationem erit deveniendum, quæ obtineri poterit succis depur. cich. borag. maluz ad ʒ ij. in jure pullæ, cichorio alterato, in quorum usu viginti diebus perseverandum, sed quinto quoque die præbenda erit Cassia cum pil. de tribus cum Rhabarb. cui superbibat serum alumin. depur. ad lib. ij. & primis decem transactis diebus, succis jam dictis tartarus vitriolatus erit addendus, vel sal tart. vitriolati.

Transactis jam dictis viginti diebus, Rhabarbarum erit in usum ducendum, & potius infusum, ut facilius venas meseraicas pervadere & ad hepar pervenire possit. Infundatur autem in aqua stillat. de succo cichorii, ut uno eodemque tempore viæ aperiantur, humores expurgentur, & jecoris, atque hypochondriorum calor non augeatur, & in hujus administratione quindecim dies perseveret, cui si opus videbitur, addi quoque poterunt decem aut duodecim guttulæ spirit. tart. rectificati.

His absolutis, usus Thermalium acidularum locum habebit, primis quatuor diebus cum vehiculo dejectorio, reliquis verò duodecim aut quindecim cum vehiculo diuretico, quæ le esse poterit idem spiritus Tartari rectif. sicut spiritus salis, addito syrupo de succo limonum.

Dum jam dicta omnia sunt, accedentibus doloribus, statuum discussio procuranda jam expertis. Namque si aqua frigida semper profuit, ab hac non erit recedendum, quæ si è toto citro, vel ex ejusdem floribus fuerit destillata, & frigida exhibita, efficacior forsitan erit, sicut & exterius admota. Jam proposita à nobis opportunum exposculant tempus. Verum quoniam dolores urgent, nec inducias ferunt, ideo si non omnia, plurima tamen hyemali quoque tempore usurpari poterunt, cum peccantes humores per centrum, non per corporis peripheriam expurgari possulent. Addenda interim congrua victus ratio, in activis temperata, in passivis qualitatibus ad humidum vergens: sicca namque paulatim evadit affectio; præterquam quod & ipsa pituita incidi quidem & attenuari, non autem exsiccare debet, ut s. simpl. monebat Gal. undè & Trall. pituitam ipsam à calore crassèfactam humectantibus præparabat, & ideo anhelosis potum copiosorem exhibendum præcipiebat, ad faciliorem pituitæ catarrhalis, jam à calore crassèfactæ, excretionem. Neque patientem Illustrissimum decipiant flatibus, qui cum non vaporosam simpliciter, sed fuliginosam naturam præ se ferant, ideo à calidis magis, magisque densantur, sicut potius humidis & modicè calorificis dissolvuntur. Quæ in universali dicta sufficiant, ut adstanti excellentissimo Medico, quem hujusmodi difficultatis affectus idea, nec vera causa latere potuerunt, particularia alimenta, & seligenda, & reprobanda relinquuntur. *Johan. Raymunda. Fortis Consult. & Respons. Med. Cent. I. Tom. II.*

Vir quadragenarius, temperamenti frigidioris, cum victu refrigerante & humectante diutius usus fuisset, incidit primo in gravarium capitis dolorem, modò majorem, modò minorem cum proclivitate ad somnum. Hinc modò valida tussis, modò gravi auditu, tinnitù aurium, dentium, cervicis, humeri, aliarumve partium gravibus doloribus infestatur, quibus subindè graviter per aliquot dies excrucietur: Interdum validissima tussis corripitur, cum impedimento respirationis, non sine suffocationis periculo: sæpè nauseabundus est, & ventriculi molestis fustibus, ac dolore torquetur: sub maxilla inferiore oedematosi tumores oboriuntur, qui postea dissipati rursus evanescent. Nares ipsi præter consuetudinem siccæ sunt, & per os pauca ejicit. Conqueritur



se in vertice capitis continuam quandam frigiditatem sentire, & capillos non esse adeò humidos, ut solent.

*Ager hic Catarrhus infestatur, qui sunt humorum excrementiorum defluxiones præter naturam à capite ad partes inferiores.*

Vitus refrigerans crudius ac pituitosum nutrimentum corpore exhibens remota mali causa fuit, hinc enim refrigerata & debilitata sunt viscera coctionibus inservientia, multaque in corpore generata est pituita excrementitia, antecedentem huius mali causam præbens: quæ in cerebro maiore copia collecta, illud nimis frigida & humida intemperie affecit, atque inde quæ data portâ defluens ad alias inferiores partes, causam continentem constituit.

Pituita autem illa collecta fuit in cerebro partim quia cerebrum intemperie frigida affectum, exiguo suo calore tam frigidum, crassumque humorem coquere & dissipare non potuit: partim quia obstructi fuerunt meatus per quos falsa excrementa naturaliter evacuari solent, & debent, scilicet viæ quæ ducunt ad nares & palatum, nec non pori in vertice Capitis.

Contingit autem hæc obstructio partim in interioribus, partim in exterioribus capitis partibus: In interioribus ob crassitiem & viscositatem istorum humorum angustos meatus, excretionis talium excrementorum dicatos, infarcientium. Unde cum per debitas vias, evacuari nequeant defluunt modò ad aurium interiora, ubi tinnitum, dolorem, gravem auditum: modò ad laryngem & pulmones, ubi validam tussim & suffocationis periculum: modò ad ventriculum aliasve interiores partes, in quibus gravia mala excitant. In exterioribus, ob pororum in vertice capitis ab eisdem humoribus repletionem, eorundemque a frigore externo constrictionem: à quo frigore externæ capitis partes adeò refrigeratæ sunt, ut æger frigus illud continuum in vertice perferat. Quod frigus præterquam quod poros constringat, in causa est, ut quicumque vapores à cerebro per suturas & cranii poros transeunt, illi extra cranium sub cute vel pericrauiò condensentur in humorem serosum ac pituitosum, qui ob pravam coctionem sæpè salsus & acris existit. Hic cum ob suam crassitiem & pororum constrictionem dissipari nequeat, secundum externas capitis partes defluens ad maxillas, dentes, cervicem, scapulas, aliasve quascunque partes, ut dolores, alia etiam mala inducit.

Vias ordinarias, excrementorum istorum evacuationi dicatas, esse obstructas, ex eo liquet, quod nares ægro præter consuetudinem siccatæ & capilli quoque sicciore sint, quodque pauca sputa ejiciat: nam per palatum, nares, & verticis poros, maxima horum excrementorum pars naturaliter evacuari solet, & debet, quod hic non fieri manifestum est.

Affectio hæc, præterquam quod symptomatum multitudine ac gravitate molestissima est, etiam periculo non vacat: nam humoribus his copiosis & acris subito ad fauces & pulmones defluentibus, repentina suffocatio, vel pulmonis erosio & exulceratio, hincque tabes metuenda est: ad alias verò partes interiores ruentibus, Apostemata occulta & periculosa induci facile possunt.

In curatione (quæ sine periculo differri non potest) primò corpus bis terve expurgandum est pilulis coctis, pulvere diaturbith, vel diacarthami, aut tali haustu: Rec. Folior. Senæ mund. Drachm. iij. agarici albi drachm. j. β. Sem. anisi drachm. j. cinnamomi electi, Zingiberis albi ana scrup. j. β. decocti hordei q. s. fiat infusio s. art. adde colaturæ elect. hieræ picæ drachm. j. diaphœnici drachm. ij. misce. fiat haustus.

Deindè sequenti apozemate corpus & cerebrum corroborandum & siccandum. Rec. Rad. acori, fœmculi, ana drach. vj. galangæ drach. iij. herb. majoranæ, betonicæ, thymi, rosmarini, melissæ, calamenthæ, ana. m. j. fol. Lauri, flor. stachados, ana m. β. sem. anisi, fenic. ana drach. ij. baccarum lauri drachm. j. β. Aquæ & vini ana part. xq. coquantur s. art. & fiat apozema ad lib. j. β. de quo sumantur tres, quatuorve haustus de die.

Meridie, & vesperi utatur post primum particulâ huius conditi. Rec. specierum dianthræ, diamoschi, diagalangæ, ana drach. β. conservæ anthos, rosarum rubr. ana. drachm. vj. rad. acori condit. drach. ij. Syrupi de stachade q. s. misce, fiat conditum.

Magnam hic etiam locum habebunt decocta guaiaci, salsæ parillæ & salsæfras; imprimis si cum cephalicis calefacientibus & siccantibus præparentur, iisque sudor semel de die provocetur.

Interea dum hæc fiunt, etiam masticatoria, & errhina sunt adhibenda, ut dictorum meatuum obstructions tolli, & excrementa per debitas ac convenientes vias deduci seu evacuari queant. Tabaci usus eundem in finem etiam multum proderit.

Capiti imponatur huiusmodi cucupha, vel capitium: Rec. fol. rosmarini, majoranæ, thymi, flor. lavendulæ, ana p. ij. masticis, thuris, ana drach. j. gariophyllorum, nucis moscatæ, ana scrup. j. fiat pulvis pro cucupha. Tempora & vertex illinantur quotidie hoc linimento. Rec. olei rosmarini, succini, majoranæ, ana. scrup. i. olei nucis moscatæ expressi semip. ij. unguenti martiati drach. ij. misceantur pro linimento.

Si malum his adhibitis diutius perseveret, ut Catarrhus à principalioribus partibus diverti possit, conveniet fonticulus in altero brachio, aut cervice excitatus.

In dieta sit aer modicè calidus. Cibi sint eucymi & eupepti, assii potius quam elixi, conditi cum aromatibus & cephalicis calefacientibus, attenuantibus, & siccantibus, fugienda autem raphanus, allium, synapi, cepe, aliaque quæ copiosos vapores excitant, & sic caput replent. Potus sit paucus, & generosus, somnus moderatus, potius brevior quam longus. Corpus mediocriter exerceatur, & animus quietus sit.

*Librand de Diemerbroeck de morbis capitis medicat. 16.*

Juvenis 18. annorum, eulærcus, plethoricus, & vino largiore sæpiusculè sese oblectans, postquam diu æthi solis sub diu incaluisse, incidit in magnam capitis incalesceniam, & gravitatem eamjam comitatur copiosus, acris, tenuisque & salii humoris, per nares & in os defluentis, descensus, ejusque copiosa & frequens



quens cum sreatu per os rejectio. Adest faciei rubedo, atque etiam tussicula, vesperi sub lecti ingressum ingravescent: & noctu sæpe omnem somnum ipsi adimens. Pulsus adest celer, creber, magnus. Plus julto sitit, urina est rubicundior.

Pars in hoc ægro præcipue affecta est caput; ut patet ex nimia ejus incallescencia & gravitate: Item pulmo & aspera arteria, ut docet tussicula. Item cerebrum nares, os & fauces, ut indicat copiosa & frequens humoris tenuis & falsi cum sreatu per os rejectio. Atque etiam cor, ut constat ex pulsui celeri, crebro & magno cum siti; & totum vasorum genus, ut probat urina rubra.

Morbus præcipuus, qui cum affligit, est intemperies calida & serosa, & nimis laxa cerebri & glandularum, vasorumque circa nares, fauces, & palatum existentium; quæ copiosos humores acres, tenues & falsos, in nares, palatum, fauces, & pulmones demittens, sreatumque & tussiculam sæpe excitans. Catarrhus calidus aeris & falsus à Medicis synecdochicè duncupatur.

Causa procatactica hujus morbi est vinum largius ab hoc juvene ingestum, unde multi humores calidi & serosi geniti, & per totum corpus diffusi, causam antecedentem huic morbo præbuerunt: lique in caput reliquasque partes jam enarratas delati, & serolis suis partibus, à reliquo sanguine, vi æstus solis humores attenuantis, porosque cerebri, faucium, glandularumque narium, & vasorum nimium aperiens, leparati atque per nares & foramina palati in os, fauces, & pulmones delabentes, & in capite putrescentes, continentem ejus & symptomatum omnium causam constituunt.

Materia enim serosa, in caput cum reliquo sanguine copiosius delata, ibique a sole incallescens, produxit capitis nimium calorem & gravitatem, & faciei ruborem eaq. ibi putrescens & majorem calorem concipiens, ac deinde ex parte in cordis ventriculos, cum reliquo sanguine ad cor redeunte, reversa producit cordis & arteriarum pulsus crebrum, celerem & magnum, urinam rubram, & sitim febriculæ symptomaticæ indices. Dum verò serosus ille sanguis ab æstu solis nimio attenuatus, & ex parte in vapores est dissolutus, porique vasorum & cerebri nimium sunt aperti, magna copia istorum humorum & vaporum a reliquo sanguine sese separans, & in liquorem concretescens in substantiam & ventriculos cerebri, reliquasque partes affectas, sese effudit, & etiamnum effundit. Quæ ibi, propter angustiam loci, & minorem ejus calorem, in serum acre & falsum coagulata, & densata, ac ad cerebri basin in glandulam pituitariam, glandulasque & ductus aquosos narium & alias vicinas spongiosas & porosas partes descendens, perpetuam humoris tenuis, acris, & falsi in nares, palatum ac fauces delabentis, parit defluxum, ejusque frequentem excreationem. Pars autem hujus seri ex palato & faucibus per com. ventis epiglottidis runum, in arteriam & bronchia pulmonum descendit, & partes illas ita veincat, ut fibrillæ nervorum asperæ arteriæ & pulmonum, in ventriculos cerebri, extremitatibus suis, desinentes, poros ejus copiosius & fortius inbindè ape-

riant, spiritusque animales copiosos, modò in mûculos thoracis & faucium inspiratorios, modò in expiratorios vehementius & inordinatius transmittant; atque ita thoracem inordinatè & vehementer dilatando & contrahendo, ærenique contentum per vices vehementius & inordinatius cum strépitu expellendo, *insufficientem illam molestem* producant.

Ingravescit autem hæc ægri *tussicula vesperi sub ingressum ejus in lectum frigidum*, quia vapores & humores cerebri & pulmonum, aliarumque partium affectarum, à lecti & advenientis noctis frigore copiosius coagulati & densati, & a cerebro, aliisque paribus affectis, sese ob frigus superveniens magis constringentibus, in pulmones copiosius tum deturbati, augent tantopere defluxum humorum, & hinc orientem tussiculam, ut illa propter humorum ad pulmones copiosius defluentium, illudque attollentium & pandentium copiam, sæpe ipsi *omnem somnum adimant*.

Morbus hic est valde periculosus, quia est humoris acris, & falsi ac copiosi, non tantum in nares, & palatum, sed etiam in fauces, & pulmones deluentis destillatio: unde exulceratio pulmonum, ac inde tabes imminet. Bene tamen sperandum, quia æger est validus, & malum non est inveteratum.

Curatio igitur laud perfunctorie est aggredienda: quæ consistet in causæ procatacticæ, antecedentis, & continentis, ac intemperici cerebri, aliarumque partium affectarum, per contraria ablatione.

Primò itaque purgetur æger hoc medicamento:

℞. Fol. Sennæ ʒ iij. Rabarb. Electi ʒ j. Sem. anisi, foenic. an. ʒij. Infundantur in decocto hordei q. s. in colatura dissolve crem. or. tartari ʒss. Scammonii gr. iv. M. F. Haustus manè exhibendus & pro re nata postea reiterandus.

Sub vesperam sumatur de hoc lacte amygdalato, ad somnum conciliandum, & humores acres, & falsos temperandum; eorumque fluxum sistendum.

℞. Amygd. dulc. excortic. ʒ ij. sem. quat. frig. major. ana ʒ j. Papav. alb. ʒiij. Aq. hord. lbj. F. Emulsio amygdalata.

Velumat subinde vesperi pilulam gr. iv. laudani opiatam vel pil. de cynoglossa, gr. xvi. quæ in pilulas duas formentur: vel syrupi de papav. unc. ʒ. vel ʒvi.

Magni etiam usus ad catarrhi defluxum sistendum, & acrimoniam ejus temperandam, est cochleare sequentis syrupi, postquam corpus bene est purgatum vesperi sub ingressum lecti sumtum.

℞. Syr. de papav. albo, de hyssopo, Oxy-mell. simpl. an ʒj. Misce.

Postridie aperiatur vena, & educatur sanguis satis largiter, cum æger noster sit plethoricus.

Deinde si malum perseveret, humor est alterandus, & incrassandus tali decocto.

℞. Fol. lactuc. portul. plantag. an. m. j. Sem. quat. frig. maj. papav. alb. ana ʒ ij. flor. viol. nymph. pap. rhæad. an. p. j. coquantur ex aq. com. ad lib. j. in colatura dissolve Syr. violacei, rosar. siccat. an. ʒj. Misce. F. Apozema pro tribus dosibus, bis in die sumendis.

Ad materiam defluentem ulterius incrassandam



dam, & fluxum inhibendum atque acrimoniam ejus temperandam, hunc sequentem liquorem in ore teneat.

℞. Flor. ros. rubr. p. j. cortic. cap. papav. num. j. vel ij. jujub. recent. p. j. decoquantur in aqua communi pro lb j. colaturæ adde syr. papav. ℥ ij. diamori ℥ ss. boli arm. veri ℥ j. milce.

Tum etiam trochisci sequentes in ore frequenter erunt detinendi.

℞. Gum. tragacanthi & arab. an. ℥ ij. boli armen. terræ sigill. lotorum in aqua rosacea an. ℥ j. sem. papav. alb. succi liquiritiæ an. ℥ ss. sacch. penid. ℥ j. cum mucilag. sem. cidon. extracti cum aq. ros. q. s. f. troch.

Interdum etiam ad catarrhum sistendum, & materiam tenuem incrassandam, & acrimoniam ejus temperandam, commodè utetur hoc linctui.

℞. Loch. de papav. ℥ j. syr. papav. ℥ j. & ss. de jujub. ℥ ss. spec. diatragac. ℥ ij. m. & lambatur cum bacillo liquiritiæ.

Ad materiam aliò revellendam, adhibeantur lotiones brachiorum & crurum in aq. decoct. flor. nymph. fol. salicis, cap. papav. alb. & flor. chamom. Frontem & tempora inungat ad somnum conciliandum oleo nymph. papav. & ung. popul.

Ad caput roborandum, fluxionem sistendam, ejusque reliquias absuendas convenit hæc cucupha.

℞. Gum. junip. ℥ j. ros. rub. p. ij. myrtil. ℥ j. macis, nucis mosch. thuris, sem. pæon. cort. cap. pap. an. ℥ ij. nucis cupressi ℥ ss. pulveriscentur & cum illoccis panni coccinei, ac syndone rubra, f. cucupha interpuncta, perpetuo in capite gestanda.

Si his malum non cedat, fonticulus aperiendus in brachio, vel etiam circa nucham, ubi etiam vesicatoria poterunt adhiberi.

In diæta aer sit temperatus, aquilonaris, austrius, ventosus, & pluviosus vitetur. Cibus sit concoctus facilis, ex piscibus saxatilibus, lactuca, ovisforbilibus, pullis gallinaceis, hordeatis. Cibi quantitas sit moderata, cœnaprædico parcior, sub finem refectiois sumatur portio carnis cydoniorum: sumantur etiam uvæ passæ, & amygdalæ dulces. Potus sit cerevisia tenuis. parce, quantum potest, sumpta; lectum vesperti ingrediatur moderate prius calefactum. Somnus sit moderatus & nocturnus. Tegatur caput mediocri tegmine, excrementa alvi quotidie vel arte, vel natura respondeant. Motus immodicus & animi perturbationes vitentur. *Henricus Regius apud Theodor. Craanen Medicationum lib. 1.*

Juvenis 26. annorum cum excalefactus ad ignem, & postea foras in aerem frigidum & humidum subito esset egressus, coepit in parte nasi, quæ os frontis attingit sentire gravitatem, & respirationis per nares faciendæ difficultatem. Malum hoc postea auctum jam per biduum durat, humorque acris ex naribus exstillans, easque exasperans, magnam molestiam ipsi parit.

Pars quæ in hoc juvene præcipue afficitur est nasi radix & os ethmoides, idque ex gravitate circa radicem narium percepta, & ex respirandi per nares difficultate patet.

Morbus qui ipsum affligit, est intemperies narium & ossis ethmoides, ac vicini cerebri frigida, humida & acris, cum obstructione eorum conjuncta; quæ gravitatis sensum in iis, respirandi per ea difficultatem pariens, latine gravedo & græcè coryza dicitur.

Causa hujus morbi est corporis & præsertim capitis calefacti, in aerem frigidum & humidum subita delatio. Inde enim partes jam commemoratæ fuerunt refrigeratæ, porique circa nares & anteriorem cerebri partem ab igne ante aperti, per frigus superveniens externi aeris, profundius in cerebrum ingredientis, subito clausi, impediverunt, quominus vapores copiosi, in cerebro calido existentes, satis abunde ex eo, & naribus exhalare possent. Illi autem ibi retenti & vehementius agitati, apertuerunt in anteriore cerebro, & naribus ita poros, ut copiosum serum & pituita salsa, à reliquo sanguine eorum ope separaretur, ac ad nares deflueret. Cumque illi pori cerebri etiamnum ita dispositi mancant, hinc fit, ut humores, etiamnum eo defluentes, obstructionem narium, gravedinem, & asperitatem ac resolutionem in iis pariant.

Hoc malum plerumque si diæta rectè instituat, sponte cessare solet. Verum quia hoc nostro juveni magnam molestiam parit: & non sine periculo est ne catarrhus hic auctus etiam ad pectus aliasque partes defluat, idcirco curatio mox est adhibenda.

Eaque in humorum superfluatorum, ex toto corpore, & partibus affectis, evacuatione, pororum clausorum apertione, & intemperiei per contraria correctione consistet maneat itaque purgetur talibus pilulis.

℞. Aloës rosatæ, scammonii optimi an. gr. xiii. olei cariophyllor. gut. j. cum syr. ros. fol. q. s. f. pilulæ num. iv.

Interdum huic nodulum sæpe naribus adnotum olfaciat.

℞. Sem. nigellæ, cymini, thuris, cariophyllor. an. ℥ ss. contusa includantur linteo & t. nodulus.

Purgato jam corpore, vesperti, & mane caput mantili injecto & undique dependente tegat, excipiatque pronis naribus, fumum à cariophyllis indicis sex vel septem, in ignem patella exceptum, & naribus suppositum, aliis post alios conjectis, exhalantem. Nares interius ad asperitatem tollendam & exulcerationem præcavendam oblinat unguento rosato vel pomato.

Vapor etiam à majoranæ, chamomeli, meliloti, & sisymbrii decocto, vel ab acero rosaceo, in laminam ferream ignitam injecto exhalans, & naribus exceptus, multum hic conducit.

Versetur domi in aere moderate calido, & caput tegat integumento quod ad frigoris sensum tollendum sufficit. Vesperti cubitum iturusumat cochleare spiritus vini cum saccharo albo. *Henricus Regius apud Theodor. Craanen Medicationum lib. 1.*

*De Catarrho pro viro Ampl. D. D. M.*

Affectus Illustrissimo Domino præcipue molesti & opem medicam postulantes, sunt catarrhi



rhii; corysa scilicet bronchusque, nunc cum febre juncti, nunc citra illam affligentes: nam nunquam emungere cogitur, quandoque ita induratur, ut nares tenaciter obstruat, ægreque eliciatur, frequenter autem sputum, vel sreatu, vel tussi, nunc fortiore, dum materia adhuc cruda est & aquea minusque aeris impulsui cedit; nunc faciliore negotio etiam ex intimis pulmonum recessibus inspissatum, & crassefactum, excernit.

Horum catarrhorum indaganda materia ex qua tam frequentes & diuturni producuntur; locus ex quo in nares, fauces & in pulmonum bronchia stillat, forte etiam in ventriculum; causa materiam ad tam largam & crebram stillationem impellens; atque hæc scire ad faciliorem curationem plurimum interest, & in medendo magnum momentum adferret.

Materiam quod attinet, non videtur lymphæ in specie sic hodie nuncupata, cum illius motus sit ab externis ad interna, scilicet aut ad receptaculum chyli, aut ad ramos venarum majorum non uno in loco: sed serum, quod cum sanguine per arterias ad partes deferretur, per quas alias tum superfluum, tum usui alicui inservitutum excernitur. Seræ natales, & omnia quæ de eo dici possunt, huic responso inferre intemptivum foret, & prope in volumen excreveret: pauca delibabo atque ea solummodo quæ ad explicationem Illustrissimi Domini affectuum pertinebunt, primum non negabitur serum perpetuum & individuum sanguinis comitem esse, eique commisceri cum vitæ primordiis, autimque dicere illud jam sanguini junctum in vesicula saliente, antequam ullum viscerum consociatum esset; nisi scilicet ab illo disterneretur sanguis, nec fluidus esset, nec per minutissima capillamenta exportaretur; ut taceam illum ipsum sanguinem nihil nisi limpidissimam aquam prius fuisse, quam Excellent. Harveius appellat colliquamentum.

Deinde certum est serum massæ sanguineæ quotidie in sanis reparari non solummodo ex potulentis, sed etiam exulentis, nam & hydropotorum sanguis, qui parcissime bibunt, & non raro demum tertio vel quarto die; item avium quarundam quæ nunquam potulenta ingluunt, sero diluuntur. Aquilæ duæ, hic ubi hæc scribo, jam à 26. annis nutriuntur, rarissimeq; animalibus seu vivis, seu mortuis sanguine irriguis, sed plerumque carnibus exsuccis & exanguibus scilicet. intestinis & extremis animalium potiuntur, ac ne guttula potus apponitur, nihilominus more aliarum avium mingunt. Paradoxon pridem, at nunc physicis curiosioribus non ignotum, & ipsemet in omnibus avibus renes & ureteres urina candida turgidos, & non ita pridem in aquila ejusmodi; & dum hæc scribo in cloaca aquam lymphatissimam cum sedimento cretaceo in falcone reperi: instauratur autem serum hæc ratione, absumpta liquida non diu in ventriculo manent, nec in intestinis moras longas nequeunt, sed inde celeriter per vasa lactea ad receptaculum chyli & cor amandantur, ac partim per vias à natura ad id destinatas, à sanguine separantur, & nonnunquam brevi post eliminantur. Tertio

serum non solum plurimos usus corpori humano præstat, verum etiam ipsum morbosum; plurimorum symptomatum morborumque causa sit; si vel copia, vel qualitate, vel motu, vel loco peccat. Apud Illustrissimum Dominum peccat copia, qualitate falsuginosa; loco frequentioris excretionis, ac receptionis incongruo, atque etiam propterea graviora minari videtur. Sero abundare macilentos, fuscòs, venis amplis & capillis nigris præditos, passim Car. Piso de colluv. serosa & alii tradunt, Illustrissimum Dominum verè hujus plurimum cumulare, non solum & frequentia & pertinaci duratione catarrhorum, sed etiam sentiri ipso constat, dum in sanguine venæ sectione emissio, multoties feri proportio debitam excedens inuenta fuit; hoc in massa sanguinea Illustrissimum Dominum non credo coacervasse ob nimiam potentiorum ingurgitationem; cum semper temperanter vixerit, superfluum potius in massa sanguinea colligi videtur, quia in illa portio molestiam paritura permanet, nec per vias & ductus à natura destinatos sufficienter excernitur, videlicet, aut vitio renum quos forte hæreditario imbecilliores natus est; fratrum unius ex ulcere renum obiit, alter ischuria, atque ipsemet Illustrissimus Dominus ab anno 1653. ad annum 1673. dum merum bibit ac victu calefaciente & siccante fruebatur, urinas colore, consistentia, sedimentis, varias excrevit: quandoque obscuras cum sedimento copioso, crasso, etiam mucoso, non sine suspitione renum agrorum; aut glandularum subcutanearum, ob habitum corporis macilentum sicciorum minusque perviarum, nec ad sudorem, aut insensibilem transpirationem satis bene dispositarum, eoque minus quia serum ad faciliorem exitum non ritè præparabatur, nam Illustrissimus Dominus ob negotiorum multitudinem & gravitatem legendo & scribendo maximam vitæ partem sedentarius traduxit, & nimis calorem egregie superfluum aquam absumentem excitavit; aut denique glandularum intestinalium, per quas massa sanguinea vere & autumnio diarrhoeis salubriter depletur, atque à superfluis humiditatibus vindicatur & levatur, neminem plerumque alvi siccioris fuit. Serum falsuginosius esse apud Illustrissimum Dominum sapor sputi manifestum facit; insuper patet ex sabulo seu subtilissimis arenulis rubris & flavis, ut & ex operimento urinae telæ aranearum simili, quæ nihil nisi salinae concretionis sunt; sive matula fundo aut lateribus adhæreant, sive sedimentò permisceantur, nam demum post aliquam moram apparent similes prorsus crystallis nitræ aut tartari, quæ in liquore aliquo soluta post quietem mediis in undis coagulantur, atque operimentum urinae, pinguedine hætenus credita, monitore Excellentiss. D. Willis de urinis, sal esse conperitur, si exstillatum cultri apici imponitur, & candela ardens subjicitur; nam nec diffunditur, nec flammam concipit, sed instar salis culinaris crepitat. Unde falsuginem excedentem obtineat serum apud Illustrissimum Dominum, prolixè res explicanda foret, si cum contentiosis agendum mihi esset; rem paucis absolvam, primo serum omnium animalium sanguineorum in sicco viventium falsum & nitrosum esse existimo; quamvis quædam ne guttam quidem salis culinaris, aut



alterius seorsim existentis degustent, nam urina omnium quotquot novi acrimonia salina nares ferit, & deglutata proculdubio salinam sobolem prodiret: pullus asinivus nullo alio cibo nutritus quàm lacte materno, aliàs ad sanguinem edulcorandum tantopere commendato, urinam salinam emittit, cuniculi solo sincho levi & lactuca cibati acerrimam urinam emittunt, equos gramimbus pastos, vena secta copiosissimum falsissimumque serum acquirere veterinarii fidem faciunt & sudor illorum testatur; deinde arbitror saluginem feri quotidie reparari, & quandoque augeri, nam quamvis à primordiis vitæ aliquid salis ipsi immittum fuisset, vel milles evanuisset, cum naturæ volatilis sit, ut ex feri & urinx destillatione notissimum est. Tertio concedetur mihi cibos & potus plerosque cen corpora perfectè mixta aliquid salini & pinguis continere, nisque his prædita essent ad nutrimentum inepta forent, quod utrumque rationibus & inductione alimenter. probarem, nisi brevitati studerem, denique non negabitur alimenta in chylum lacti simillimum converti, adeo ut lac etiamnisi plures nihil nisi chylum esse tantum non apodicticè demonstrent, chylus igitur cum lac sit, vel lacti similis, utique quoque cremorem seu portionem pinguem habebit, calidi nativi pabulum, quod aliorum pinguiorum in morem à flammula vitali incenditur, deslagrat, ac fuligines post se relinquit, & quamvis harum portio per expirationem & insensilem transpirationem avolet, pars tamen magna sanguini permixta manebit, quæ in liquorem soluta illum salinum efficiet, non secus ac à cineribus lixivium enascitur: cum itaque omne serum falsum sit, illud quotidie reparetur ex cibo & potu, dum non solum alimenta solvantur, sed etiam portiones pinguioribus comburantur quasi & deslagrant, facile constabit, quò temperamentum totius calidius, eò serum sanguinis magis salinum evasurum. Quoniam igitur Illustrissimus Dominus quoque tale temperamentum nactus est, ut ex plurimis indicis constat, quia insuper massa sanguinea ipsius à frequentibus febribus continuis & intermittentibus toties tantum non combusta fuit, mirum non est, pinguibus consumptis maximam partem, salina magis in propatulum venisse, & tandem prope principatum obtinuisse, serumque falsissimum evasisse.

Mucum qui emungitur ex Glandulis narium; sputum quod simplici screatu prolicitur ex Glandulis supra pharyngem in faucibus sitis, item extremæ Tunicæ palati juxta uvulam, insculptis, & consillis prodire existimo, cum in ovibus & hominibus his in locis phlegma seu mucum facili non semel expresserim; neutiquam vero ex intimis cranio indutis partibus & à cerebro huc descendere solidis argumentis Excell. D. Schucideri de Catarrhis fretus, credo, an mucus in Broncho è faucibus per laryngem in asperam arteriam delabatur? ambigo, cum tantillum liquoris rimæ isti illabens tantum non suffocationem intenteret; novi exceptionem quam regerunt; nimirum Catarrhosam illuviem sensum & ad latera descendentem tale periculum non asferre, verum cum in Broncho sputum copiosum per plures septimanas ejiciatur, vix turbas istas Illustrissimus Dominus

evitare posset. Ut taceam me non raro Bronchos observasse, in quibus fauces prorsus ab illuvie mundæ; imò quandoque prorsus aridæ erant; quod nunc quoque his in oris multi febri maligna decubuis accidit, multum sine pleuritide, aut peripneumonia tussientibus, succedente in quibusdam sputo, absque difficultate, simillimo catarrho sine febris contingenti. Existimo potius sputum hoc extillare ex Glandulis Bronchialibus, & extremis capillamentis arteriarum pulmonicarum; nam sero Bronchia perpetuò irrorari constat inde, quia semper tum aspera arteria, tum rami etiam extremi, liquore intus imbuti reperiuntur; Inflatibus pulmonibus etiam multorum animalium spuma ab exagitato liquore copiosa resultat, fluctuante nihilominus liquore in ramulis: denique non semel observavi Aspera arteria secundum longitudinem divisa, digitoque attensa & fortiter pressa protinus liquoris plures guttulas exsudasse intus, nec absurdum est serum in massa sanguinea secretum & despumatum tumultuans uno eodemque tempore diversis in locis exitum querere; non enim semel observatam fuisse Broncho & Corysa affectos, simul largiter salvasse, copiosius solito minxisse, insuper sudasse, imò quosdam quoque dolores arthriticos expertos; in aliis quandoque simul larga diarrhæa alvum solutam fuisse: Exorbitans enim in tumultu hoc qua data porta ruit ac effluit. Glandulæ istæ serum ab arteriis accipiunt, quibus ubique pulcherrimè exornantur & ditantur.

Serum commovetur & à massa sanguinea separatur aliquando sua sponte & citra causam aliquam praviam, quæ alicujus momenti esset prægressam; quando nimirum copia aut acrimonia peccat. Apud Illustrissimum Dominum fiebat pridem à quavis tempestate frigida, unde diu Illustrissimæ matris more, frigoris impatiens fuit. Ultima vice evenit, æstivante corpore, à perfrigeratione in umbra frigidæ, illique per ~~antipræparat~~ quandam feri, per habitum Corporis exitum querente in vasa sanguifera repulso alibique exitum impetuosius inveniende. An illius commotio & segregatio aliquando fiat præcipitatione quadam ceu fieri solet acido lacti instillato, non certo statuerim, quamvis nec impossibilis sit, nec desinit qui hoc etiam rationibus probent. Serum commotum per oscula glandularum narium, faucium & bronchiorum exitum sibi parat, quia naturaliter alias per illas evacuat; propter crebros verò catarrhos, illorum oscula vasorum deferentium magis patula, cavernulæ ampliores & ostia in cavitates prædictarum partium magis hiantia existunt, ut inde sine impedimento largè emanare possit: largius & diutius continuato effluvio elabatur, quia serum acrisua salugine osculorum labia prorsus nervea & exquisito sensu prædita continuo lacessit, atque ad ulteriorem effluxum sollicitat; qui eò usque perdurat, donec sem magna pars depleta, illudque tandem in illarum Cavernulis inspissari & incrassari, coeperit: unde etiam sero à lactis asinini potu mitiore reddito, Illustrissimus Dominus minus tussit, & mutato victu calido & sicco in humidum & frigidum ab his molestiis vixit immunis.

Febres continuæ tum solæ tum cum Catarrhis  
exo-



exorientes adscribenda sunt accensioni sanguinis alias fervidioris, ulteriori, potissimum à causis externis, nam temperamentum totius calidum & siccum scribitur esse, quod solummodo à tali constitutione dependet, atque alias sæpe ex levi occasione & commotione, etiam à dolore exardescit, intermittentes præterea fomitem aliquem postulant; qui bilis esse videtur, nam Illustrissimus Dominus toto durationis tempore carnes fastidivit ac plerumq; mitigata aut subducta bile curabatur.

Sententia hæc nimium propriæ credulitati litantis est, quâ asseritur neminem inficias iturum; Catarrhos ita frequenter recurrentes ab intemperie viscerum naturalium calidiore & sicciora multa humorum excrementorum colluvie stipata, primario scaturire: ejusdem fortis est quæ paulo post subijcitur, vel, certe illam illustrat scilicet colluviei humorum excrementitiorum partem crassiorem & terrestriorem in viscerum naturalium venulis omnibus indefinenter stabulantem, instar fermenti ex intervallis incallescere, atque fermentari, inde massam sanguineam ebullire, atque hoc modo recursus hujus catarrhi frequentes fieri. Certè qui sanguinis motum circularem agnoscunt, hoc effectum ridebunt: nolo judicium Italorum adjungere de illis qui superstitiose, hunc motum in tanta rerum anatomicarum luce spernunt. Cum plurimis Viris Doctissimis per maximam Europæ partem sentio sanguinem venosum ubique sibi similem esse, nec diversum in pollice pedis dextri existere, ab illo qui in auricula cordis dextra detinetur, excepto illo momento quo chylus recenter per ductum Thoracicum affertur, brevi tamen pollicis sanguini similis futurus existimo, quam colluviei crassam & terrestrem cum sanguine in venulis omnibus viscerum naturalium stabulantem, alios potius morbos, non multum recidivantes quàm Catarrhos parituram: à stagnatione non oriuntur inflammationes, canceri, scirrhui, scrophulæ, tumores cum folliculo, aliave mala, prætenditur quidem antiquitas, quæ tamen vix Pernelianam ætatem supergrediatur. Novi Excell. Riolanum huic sententiæ favisse, ac propterea circulationem sanguinis peculiarem excogitasse: attamen quoque egregie ab Excell. D. Slegelio Hamburg. de motu chyli & sanguinis aliisque vapulavit. Phthisi Illustrissimum Dominum à pulmonum ulcere orunda non egrotare, libera Respiratio, sputum etiam ex imis bronchiis productum puris expertus, & febris lentæ absentia demonstrant; num illa quæ à Marcove & pulmonum ariditate originem ducit, vel adsit, vel metuenda foret? summopere dubito, cum Illustrissimi Domini pulmones aliàs ob crebros Bronchos nimium irrigentur, an omnino talis visafuerit non ausim negare; quamvis illam nunquam observavi in praxi mea trigessimum primum annum excedente, nec viderim, quamvis non paucos phthisi emortuorum cadavera secuerim. Waldzuthi ad Renum in vicino monte specus est in quo lapides molares effodiuntur & dedolantur, in illo aer semper etiam gelidissimæ brumæ, calet, pulvisque volitat subtilissimus loculos coriaceos penetrans arctissime clausos & nummos conspargans: quotquot lapidicidarum ultra annum in illa morantur, quod non

pauci faciunt, diviti lucro inhiantes, omnes phthisici fiunt, quidam etiam anno nondum elapso. Paucissimi & non nisi maturè opem polcentes evadunt: forte his pulmones exarescunt; certo id affirmare nequeo, quia hactenus nullo cadavere potiri potui, quamvis id prece ac pretio attentarim, ab hac phthisi Illustrissimus Dominus ut sibi metuat nullam rationem habebit, licet macilentus sit, nec à liberaliore victu habitus augeatur: maciei enim cauz plures aliæ, præter febres lentas, esse possunt; plurimorum habitus non augetur licet nullus morbus adsit, vel propter unicum succum nutritium, ob salsuginem quoque minus ad instauracionem aptum; quia vero Illustrissimus Dominus parens & fratrum unus phthisi obierunt, oportebit saltem medentes cautiore esse atque etiam tuta timere: plerique falsos catarrhos phthisim mutari tradunt, quibus tamen Exc. Platerus in praxi adversatur, plures quoque novi frequenter illis obnoxios ad seram senectam pervenisse, & quotidie videmus serum falsum sine damno pulmones permeare, fortè Illustrissimus Dominus jam aliquid arthritici experitur, dum in his paroxysmis catarrhosis brachius sinistèr, ubi fonticulum gestat, aliquoties doluit, nisi symptoma hoc adscribendum fonticulo devio & nimium versus tendinem deltoidis vergenti, vel affluxui alicui seri salsuginosi, ad partem à fonticulo aliquantulum debilitatam & ad affluxum dispositam.

His ita præsuppositis, indicationes erunt, serum in massa sanguinea redundans imminuendum, salsus & fluxibilis edulcorandum, & densius reddendum; sanguinis inflammabilitatem emendandam & pro virili incendium declinandum; denique oscula glandularum nimis parula coarctanda esse: quibus his auxiliis satisfaciendum est.

Venæ sectionibus semper aliquid seri subtrahitur, simulque sanguinis imperus coercetur, nimia ebullitio & effervescencia obtunditur, at illas neque usque adeo crebras snaserim, cum in qualibet V.S. non exigua spirituum portio profundatur, unde ob hanc spirituum depradationem sanguis serosior redditur, qui cachexia & secundum Avicenn. Apoplexiæ paratior tandem evadit; à scarificationibus utilius quippiam non sperare quam venæ sectionis succedaneo expectari potest: idem de hæmorrhoidum apertione sentio, quia non alius sanguis ab hyrudinibus elicitur, quàm si aliæ venæ affligerentur; fonticuli cum semper aliquid seri de massa sanguinea subtrahant & illud quotidie fiat; non sine Illustrissimi Domini comodo contingeret, si in dextro quoque brachio alter quoque excitaretur: in pedibus raro illos paro; cum sæpe erysipelata superveniant, ulcerum difficiliorum curatu auctores; quod Illustrissimo Domino eveniret ob massam totam debito fervidiorem;

Vesicatoria in habitu macilento atque ad febres proclivi, renibus aliàs debilibus, unprimis si è cantharidibus pararentur facile turbas excitarent: tutius propterea omittentur; purgantia ex cassia, senna (addo Rhabarbarum, Tamarindos, syr. ros. sol. syr. flor. pers. & similia) non improbanda, attamen in his modum servandum existimo, cum à frequentibus purgantibus



sibus ventriculus & intestina mire enerventur: fortiora verò hydragoga ex jalappa, Gummi Gotta, & similibus in habitu macilento, & ad febres admodum proclivi detestor;

Sudorifera & diaphoretica non penitus damnanda arbitror, cum serum æque ac purgantia evacuent, nec metuendum illud acrius inde evasurum, non enim mera aqua his viis excernitur aut tam graves ab illis quàm à purgantibus turbæ excitantur. Purgatio enim sive irritando oscula glandularum intestinalium, sive sanguinem fermentando, sive utraque ratione fieri putetur, id nunquam sine sanguinis commotione peragitur. Certè in principio quoque phthisis vix quicquam purgantibus nocentius exhiberi poterit: nullum novi qui horum usu convalescit, tenue principium ab illorum abusu invaluit, & semper mortem ipsis acceleravit: Unde non immeritò Hippocr. diarrhæam phthisicis etiam citra purgantia supervenientem lethalem pronunciat, l. 5. aph. 14. & alibi; non tamen suaderem sudorifera aut diaphoretica valde calida: quamvis sint qui etiam tabidis decocta ex guajaco & similibus paratz suadeant, & se cum fructu adhibuisse publicis scriptis bona fide attestentur, ut Jos. Freitag. in consilio contra phthisin, ac etiam Exc. Riverius in suis observationibus, & alii in sudore vel leviculo madore ciendo, curationem ineant; nec ab illius eruptione tantoperè terrerent; nimirum si mane circa horam quartam aut quintam sudor emergeret, neutiquam statim illum reprimerem, sed ad bonam tolerantiam manare sinerem; nec moderata exercitia ad sudoris emerfuri metum, mane celo sereno & benigno, aut in conclavi temperato, vel vespere tantopere prohiberem, quia calore nativo aliquantulum excitato, & vegetiore reddito, multum feri, catarrhorum materia futuri, si non per sudorem, saltem per insensilem transpirationem subtrahitur, citra ullum incendi periculum: præterea absque ullo scrupulo Illustrissimo Domino sape dæcem, maxime mensibus autumnalibus, hibernis & vernis diaphoretica absorbentia, simulque sanguinem edulcorantia, juxta potum lactis asinini, aut Juscul. Carn. vitul. aut similia, idque summo mane hora scil. quarta vel quinta: Cujusmodi sunt pulv. antihect. Pot. C. C. philosophicè præparati, Ebor. philosoph. præpar. unicornu fossil. Terr. sigill. Turc. Bol. arm. & similia, tantum abest ut hæc nocitura sint, ut ausim dicere, me aliquos phthisicos qui adhuc superstites sunt; benedicente Deo, integre valetudini restituisse; nec possum perspicere, qui tutius catarrhorum fons perpetuus sine his exauriri possit. Doleo Thomam Willisium, virum optime de re medica meritum hoc nomine suggillari, ac neminem ipsius methodo à phthisi vindicatum fuisse, licentiosius pronuntiare: nolo nunc illius causam agere, illud solum addo, rectius neminem ex pulmonum ulcere phthisicum, se curatum posse fateri, æterno illo circulo clysterum, venesectionum, purgationum & pisanarum, utpote si res penitus exentiatur, methodo veræ rationi & experientie refragante, & umbram non corpus, symptoma non ulcus aggrediente. Prædicta hac ratione exhibem.

24. Pulv. Antihect. pot. 3 ij. C. C. philosoph.

præpar. corall. præpar. Terr. sig. ana 3j. unicornu fossil. præpar. Matr. perl. præpar. ana 3j. Tab. man. Christ. perl. 3 vi. M. l. P. cujus dosi sit 3ß. cum aqua scabios. vel veronic. vel lussilag. pauxill. hora supra memoratæ. aut omisiss Tabell. Man. Chr. perl. reliquum pulverem miscerem cons. ros. rubr. 3 ij. cons. fl. bellid. min. succo numular. aut simili inspissato, paro sc. ex 3 j. pilulas numero XL. dosi sunt pil. X. cum paux. syr. viol. fl. bellid. min. hæc raro sudorem movent, aut si sudor emerget, nemini vel minimum nocuisse testari possum: nollem tamen illum culcitris aliterve violentius cieri.

Ead. diureticor. ratio est quæ non prorsus exhibenda videntur, nec illi ipsi qui verbis illa detestantur, improbant, dum lac Asininum, Juscul. vitul. Cassian. suadent, quæ ipsamet diuretica: fateor tamen mitiora seligenda, calida fugienda esse, lac Asininum mane hora 6. vel 7. & vespere hora 5. ad lb j. tepide Illustrissimus D. bibere posset, admisceo semper Jussul. ros. aut viol. 3 j. vel 3 iß. ut ventriculo gratius sic minusque acefcat, continuare illius potum poterit non per unum alterumve mensem, sed etiam pluribus mensibus, quandiu nimirum illius potum ventriculus toleraverit, (nam non raro lac fastidit & summopere averfatur) nec symptoma prohibens supervenerit, ad podagram expugnandum jam pluribus proficue suavis illius insultus hac ratione Illustr. Dom. evitaret, quos dolor humeri sinistri, & Illustrissimæ Domine matris valetudo, quæ demum sexagenaria, podagrica facta fuit, minari videntur.

Si lac Asininum non amplius biber, Juscul. vitul. substitui poterit, ac non nudum, sed alteratum scorzonera, endivia, aliisve cichoraceis recentibus addito pauxillo hordei mundati, hac enim ratione major feri portio simul recederet, ac sanguinis effervescencia compesceretur; Ciocholatem, omisso pipere indico aliisque aromatibus non omnino improbarem, cum nucleum Cacao hecicis imprimis conducere legerim aliquando in Hermandi Thesaurorum medicarum Hispaniæ novæ. Commendant quidam contra catarrhos potum cavæ sive caffè & decoct. herb. theæ, ambo tamen Illustrissimo Domino minus convenientia opinor, ob calorem quo prædita sunt, licet nunc apud plures in usa sint, & sua quoque beneficia præstent: hæc potationes antiquor. potui calido respondere videntur, quas Europæi nunc ab Orientalibus mutuuntur. Semicupia sen infusus in conclavi temperato parata ex humectantibus sc. malv. flor. Nymph. viol. hord. fursur. macris in aqua fontana decoct. extra paroxysmos catarrhorum non rejicio, cum quoque hac ratione salugo emendetur, pori referentur, habitus ad incrementum disponatur: verum illis utatur mane tepide, post infusum lectum petat & toto die corpus contra frigus muniat, ne catarrhis ansa præbeatur. Dixta accuratissima ineunda est: aer frigidus, nebulosus, ventosus semper nocebunt, ut etiam præservidus; cibis vescatur boni succi, facili digestionis; cum lactis potu, carniū teneriorum esum nunquam prohibeo: cibi aromatibus, sale nimirum, item succis acidis cydoniorum, aurant. aceto aut saccharo nimio conditi; item fructus horei crudi



crudi p̄nitius fugiendi, pisces, pasta farinaceæ succum n̄itilis glutinosum præbentes, cum Glandulas globosas inviscunt, omnem butyri usum non p̄nitius rejicere possum, cum etiam flammulæ seu pabulum debeatur, & particulæ quædam pinguiculam resocillationem exigunt, ab-usum vero ejusmet ut & ipsius olei etiam optimi, aliorumve alimentorum præpinguium damno: cum effervescentiæ sanguinis ansam præbeant, vinum dum lac bibitur in cibo & potu exulet, præ aqua fontana laudarem obfrequentes catarrhos decoctum aliquod E. g. in aquæ fortanz lb̄ iij. coque ligni visc. quern. aut lentisc. aut santal. citr. aut rad. chin. ℥ iij. quibus commode passul. maj. exac. ℥ j. vel ℥ iij. dederentur; Cæna longè parcior prandio: Exercitia moderata nihil prorsus nocebunt; somnum pomeridianum & lucubrationes summiopere dissuadeo, non tamen statim à cæna se ad somnum componat, sed demum post aliquam ambulationem. Si alvus sponte aperiatur clysteres superflui videntur, imo rectum & colon temere enervant flatibusque implent, &c. *Ex Consil. Manuscripto Clar. D. Wepseri, die 12. Octobr. 1678.*

Ad Glandulas faucium roborandis conducet gargarismus leviculè adstringens, ex fl. ros. rub. flor. malv. arbor. & hord. parat. pulmonibus prodesse rotul. pector. ex spec. diatrag. frig. & bolo armen. parat. maxime dum catarrhus adhuc tenuis & aqueus est; item Diacod. Montagn. cum aq. lactuc. ad cochli. ij. vel iij. ante somnum sumptum.

*Pro eodem ex aliis præcitati Excell. Wepseri literis.*

Hactenus alteras accepi literas quibus traditur successus potus lactis asinini, & consilium Excell. D. F. B. Lac Asininum non contemnenda beneficia præstare, & ulteriora polliceri facile perspicio: illius usum diu continuandum arbitror; quando scil. illud ventriculus tolerabit, nec symptomata prohibentia supervenient, aliàs soleo ejus potum mane hora 6. & vesp̄i circa 5. sc. duab. horis ante cænam suadere; verum quia Illustr. Dom. parce cænat & hora quinta vesp̄tina hordeatum bibit; potus nocturnus non multum nocebit, licet admictionem stimulet, atque somnum aliquo modo interrumpat; quia statim rursus indormiscit. Excell. Dom. B. Consilium quod attinet, video in præcipuis, maxime in illis quæ imprimis in curatione attenduntur, nos consentire, primum enim mecum statuit catarrhorum, sc. Corysæ & Bronchi materiam serum esse cum tenue & mobile sit, addo semper præsens, adeo ut ad quamvis causam externam catarrhos etiam subitaneos parere possit, non verò phlegma quod tardioris motus sit, nec obster catarrhorum visciditas & crassities, quæ tum imprimis conspicitur, quando vulgò coqui dicuntur, cum nunc notissimum sit serum sanguinis facile à calore spissari & gelatinæ simile reddi; serum quoque falsius faretur testibus gustu & totius pruritu. Copiosius generari putat ob intemperiem totius calidiorem & sicciorem, modum non explicat, fortè sanguinem nimiam ab illa derivat, ac cumulari propter insensibilem transpirationem inhibitam, imprimis ob ventos Neocomenses vesp̄i frigidos quosque sentit, accedente abusu fructuum horzorum & ole-

rum. Loco moveri serum & exitum affectare ex vasis sanguiferis, allerit, retentrice ob copiam labefactata, ac propter acrimoniam salinam & nitrosam expultrice sollicitata; Item ob perfrigerationem post æstum, imprimis denu-dato collo vasis sanguiferis maximis instructo; ob radios solares intensius caput ferentes. De loco ubi serum percolatur, & ex vasis elabatur, in hac corysæ & broncho remotiore, scil. extremis apicibus arteriarum capillarum, nulla quoque dissentio inter Excell. D. B. & me erit, cum materiam catarrhorum serum existimet illudque non nisi per illas ad partes affluat; aliquis intercedet de propiore loco mandantes; quamvis si recta ratione rem reputemus inter locum remotiorem & propiorem non longior distantia sit, quàm vel dorsum est tenuioris cutelli. Ex omnibus perspicio Excell. D. B. credere adhuc catarrhorum fontem esse cerebrum, unde fingit cerebrum Illustrissimo Domino humidius esse; ac ob ejus coctionem debiliorem serosi plus in illo produci, & cumulari à vaporibus ex partibus sub diaphragmate locatis ascendentibus; augeri, à meditationibus post paltum, allici & attrahi quasi, à radiis solaribus, exprimi inde per quandam antiperistatim. Verum primò dubito cerebrum Illustr. Domino admodum humidum esse. Utcumque profundè dormiat, nam non dicitur propterea somnolentus admodum. Imò scribitur in omnibus actionibus procul dubio etiam in animalibus alacrem & promptissimum esse; deinde vaporum ex abdomine ascensum ad caput simile quo illud quo caput testis fumosa domui imposito aut alembico, comparatur, post circulationem sanguinis in lucem proditam, plures pridem exploserunt, ac publicis scriptis impossibilitatem rationibus & experimentis demonstrarunt, nihilque ex abdomine & pectore ad cerebrum pervenire, nisi per arterias Carotides internas & vertebrales; vaporum obicem in imo ventre esse diaphragma, in pectore pleuram, in basi cranii duram meningem, ibi densissimam & prope quadruplo crassiorem, nec cranium in vivo, aut demortuo animali, nondum omnibus membranis spoliato simile credendum illi, quod in osuariis reperitur; iund oscula illa quæ in basi conspiciuntur, omnia ita obturari, ut humori vel etiam flatui ne minimus vel ingressus vel exitus pateat, ut facile experiri licet; unde etiam merito affirmant, serum intra calvariam extravasatum, alios potius affectus quàm catarrhos facturum, scilicet affectus soporosos, apoplexiam, in tenella ætate hydrocephalos, &c. Nisi intra venas resorbeatur, aut alibi quàm per nares & fauces exitum inveniat; & si ostia hæc tam patula sunt, cur post tam graves contusiones capitis, ad Trepanum properandum est? Addidi prius alia quæ hic reperere nolo, moneo solum pulmonum debilitatem non consistere in illorum sacciditate, cum hæc ipsis naturalis sit: componuntur enim ex teneris vesiculis, vasis sanguiferis, & lymphaticis, & bronchiis quæ omnia cavernola & exceptis bronchiis mollissima ac ad distensionem & receptionem promptissima esse debent; verum in osculorum nimia apertione, per quæ naturaliter fuligines ac portio seri ad Vesiculas & Bronchia humectandas exsillat, ob nimiam



miam dilatationem plus feri elabitur imprimis si aliqua despinatio in massa sanguinea fiat, neque illi propter pororum cutis subitam constrictionem transpiratio concedatur. Denique mihi suspecta est & multis contradictionibus obnoxia sententia de obstructione glandularum globosarum, ob quam lymphæ detenta corrumpatur, acrior fiat, ansam det febribus, fermentationi & segregationi feri, &c. cum quotidie plurimis scrophulis circa collum, sub axillis & in inguinibus refertissimi, horum nihil vel rarius patiantur, qui omnes tamen quoque his glandulis auctis in abdomine scatent, ut asserunt Cl. Riolanus & alii ac ipsemet quoque anatomicè comperi. Adjungit his ventriculū humidiorē debito, quamvis huic effato adversetur appetitus integer, & pridem proclivitas nimia ad alui constipationem: si enim humidior esset obtunderetur sensus ac pylorus laxaretur, ut cibo nondum penitus subactō exitus pateret ante tempus, unde fluxus cæliacus, lienteria, aut certe alvus magis lubrica hætenus contigisset, & quid opus est ventriculū humidiorē causare, cum ob alias causas serum cumuletur. Verū videtur frustra merito in scaturiginem horum catarrhorum prolixè inquisivisse cū Domini Parisienses & D.B. præterita antipraxi decantata viscerum, omiſsa recensione aperitivorum, stomachicorum, cephalicorum, pneumonicorum ( quibus aliàs scatent consilia, omnium nationum extantia de affluxu hypoch. & catarrhis ) rectā pergant in medendo ad emendationem sanguinis & subtractionem feri, ac si ipsimet agnoscerent omnem labem in sanguine delitescere, illaque sublata Illustrissimum Dominum ad unguem curatum iri, quæ in re ipsis non invitæ assurgit, credoque tum in hoc morbo, tum in plurimis aliis sanguinem morbi sedem, utcunque Miscellus ex partium numero expungitur, plurimorum morborum & symptomatum causam, fontem, & terminum, a quo, & nescio quæ non alia existere.

Materiam igitur auxiliorum quod attinet, D. B. V. S. illam non magni facere videtur; nec ego nuper frequentiorē & largiorē laudavi; at penitus illam proſcribere in temperamento calido & sicco non ausim neque etiam febri catarrhali, quæ non semper putredinis expers, ex calore mordaci, urina crassiore, rinctiore & turbata comperietur, hæmorrhoidum apertionem non majoris facio, quam aliam venæ sectionem ubivis factam: & si omnino credantur hyrudines idiosyncrasia quadam sanguinem adustum & falsum allicere, ut Nicol. Fontanus opinatur, sine verecundia jactura alibi quàm turpiter venis sedalibus apponentur. Certe hæmorrhoidum apertio utcunque ab Italis summè extollatur, in praxi non illam opem fert, quam præstare multi pollicentur, quin sæpe alibi vena scēta laudabilior successus consequatur, fonticulos in interscapulo excitatos nunquam vidi; at sæpe in collo loco setacei. Excel. Dom. Willis commendat phthiricis & empyficis, fonticulos in spatiis intercostalibus paratos; cum locus interscapulii commendetur ab Illustrissimo Domino de Mayerne non negligendus erit: ad quem eligendum exemplum Dom. De Seguier permovebit. A purgantibus massa sanguinea sero abundans sæ-

pè ægre depletur, at illorum abusus improbiocum Dom. B. imprimis si ventriculo bene sit, Illustriss. D. appetat: alius quotidie exoneretur, nimium frequentes purgationes ventriculū & intestina nare enervant, vitæque decurtant: quæ in sena & cassia capiuntur, eadem in mannam a scrupuloso animadvertentur; dissuadet cholerice; adulteratur Esula & scammonio aliisque: novi illam hypercatharses eticillæ & tormina plerumque infantibus funesta, Symplicius aureus tutior est. Succolatam cum Excell. D. Parisiensibus merito damnat, at solummodo paratam cum pipere indico: non aromatibus omiſsis factam, cum etiam Hecticis concedatur, & memini magno Hæturæ Ducemortuo, vel propter solos catarrhos & ad habitum augendum in frequenti usu fuisse ann. 1646. Sulphurata & decocta magna non respuit D. B.; attamen nec illorum necessitatem imperare videtur præfens Illustriss. D. Valerianus status, nec alias facile suaserim illa antequam mihi penitus ejus constitutio innovasset. Decocta santalor. rad. chinæ præmisso bolo ex conserv. rosar. rubr. flor. bellid. min. & pulv. Antihect. Poter. suo tempore commendarem. Interea Illustriss. D. his præteritis pergat in lactis Asinini potu, cum inde tussis imminuat, rauceſco serè evanuerit, ac habitus incrementa sumperit: nam quia urina copia potulenta quantitate, superat diureticum est, quia tussis imminuit feri sanguinem corrigit, quia denique habitus inde augetur, alimentum ultimum ab illo emendabitur: adeo ut vix laudabilius medicamentum & quidem alimentosum, idest tutissimum excogitari posset, Eidem succenturiare videtur jusculum vitulinum hordeatum, si pauxillum Endiv. recent. adjiceretur, magis caverentur febriles insultus, minusque afficeretur ventriculus, quem humidum existimat D. B. nec tam facile inde putresceret sanguis; si omnino talia a jusculis mane potis metuenda sint: secus ac nunc, seu novo modo, seu antiquato in usum revocato creditur, non, ubique locorum mane bibuntur vel succolata, vel decoct. Theæ. vel Caffè seu cave. Vinum dum Illustriss. D. lac bibit plane dissuadeo, cum sæpe gravissima damna attulisse sciam illis qui Podagra causa lactis cura fruebantur. Baro quidam Eques Melitensis illa felici cum successu diu utebatur, & podagram tantum non expugnaverat, in principio harum tumbarum bellicarum, ex his oris in Cliviam patriam suam profectus, ab Equestribus ad computationes sollicitatus, post paucos errores, ut mihi à Medico scribebatur, primum in febri anomalam incidit, quam excepit hydrops, Juveni adhuc paulo post funestus. Exitimo à vino non solum in ventriculo lac, sed etiam in massa sanguinea quorsum ejus portiones integre abripiuntur, ( teste sero lactis sanguine statim post potum V. S. emisso ) coagulari periculosarum obstructionum authorem. Perplacet Illustriss. D. in prandio pleniorē victum in hac cura concedi, quod etiam facere apud podagricos consuevi, pauci enim victum illum tenuem sufferunt quem Itali & Galli in cura lactis imperant. Tinnitum aurium nuper præterii, factum fortasse à portione feri tenuioris in labyrintho & cochlea aurium devia; quia evanuit



nuit de illo non multa verba facienda sunt, nec inquisitionem ulteriorem meretur, num quod ab hypochondriorum æstuario provenit necne? &c. *Scaphusii die 30. Octobr. 1678.*

*Ad eundem ex eodem Clar. D. Wepfero.*

Curam lacteam opem insignem attulisse, multa sunt quæ confirmant, nam hæcenus nihil molestiarum Illustriss. Dominus quæ antehac expertus est, amplius patitur: facies est vividior, minus irascitur, non læditur à sole, ventis, pluvio & frigore, toto die extra lectum moratur, obambulat sine lassitudine. Pluribus ante aliquot annos Illustribus viris, ac quoque Religiosis suavi hæc curam, qui adhuc feliciter in illa pergit. Cum itaque hæcenus non pauca beneficia Illustriss. Domino lac præstiterit, nec ullum indicium appareat quod illius usum ulteriorem prohibeat, audacter illud continuandum arbitror; sanguinem debilitari, seu aquosiores minusque fibrosus inde fieri non tam facile credo, cum lac nihil prope aliud sit quam chylus atque ex illo eque bonus chylus produci possit ac ex aliis alimentis sive carnes sive pisces, sive olera & fructus sunt; imò præstantior, quod ex tam lu. ulenta sanguinis correctione manifestè patet. In hac cura alios cibos nunquam denego, si modo tales eligantur, à quibus chylus non corrumpitur, nec vel accescit, vel bilefcit: concedo carnes vitulinas, hædinas, pullor. gallinac. perdicum, avicularum montanarum, sive elixas, sive assas, etiam fructus dulces coctos, item olera cum butyro recenti cocta. Nocent verò valde salita, aromatizata, frixa, acida, nimis dulcia & saccharata. Cibis boni succi & facili digestionis in prandio potissimum frui posset, nec ut lac illo mane intermitteret necesse est. Vinum penitus improbo, quod non solum in ventriculo & intestinis chylum corrumpit, sed etiam jam cum sanguine permixtum, unde sequuntur periculosa vasorum capillarium obstructions, gravium morborum Authores. Canam semper in hac parciorum suadeo, in primis in senibus nunquam tamen penitus omittatur.

Nescio quam ob causam Illustriss. Dom. crebrius & fortius purgandus esset quam hæcenus fiebat: nam nihil de ventriculo afflicto queritur, & massam sanguineam plurimum emendatam superius recensita beneficia testantur: Merum commentum est lac tot & tantas sordes legitime possum in ventriculo linquere, citra illius vel aliquales læsiones. Novi plures hac cura fruente, vix semel in anno lenitivum assumere, idque sine ulla sensatis noxa: sufficit igitur Illustriss. Dom. sola rhabbarbari infusio. Nodum quoque in scirpo querere videntur illi qui pulverem antihæcticum Poterii rariorem improbant: posito illum fermentum stomachi, quod plures opinantur acidum esse, edulcorare, ac hac ratione tutior lactis potus redditur: illum verò fermentum effatum prorsus reddere nemo me facile persuadebit: Certè si æquo animo reputare velint aduersantes, facile animadvertere possent uno atque altero mane sumto hoc pulvere, eodem & sequentibus diebus ægros tam bene appetere & alimenta assumpta coquere ac antea hebat, imò plerumque & me-

lius cibus sapit, & laudabiliter dissolvuntur alimenta, quam diebus prægressis, modo nitrum probe ab illo eluendo sublatum fuerit. Hydropis quidem prænuncii sunt pedum œdema, & respiratio difficilior; verum quoniam toto die sine lassitudine obambulare valet, vix credo œdema quod alicuius momenti sit, adesse, eoque minus quoniam pedes quæ udoque sudant. Si solummodo respiratio difficilior observetur in ascensu ad arcem, non tanta erit ut Illustrissimum Dominum tertere debeat; hoc enim senectutis culpa, non ab aliquo vitio intra cavum pectoris abscondito, aut graviora minante hæc: certe si domesticas scalas, citra interpositam quietem ascendere valet, si que in lecto non altum decubitus eligere cogatur, quod vix credo, quia sex horis continue noctu dormit, nec hanc dyspnoeam timendam arbitror. Memoriam apud senes minui in vulgus notum est, ac & hoc plerumque non fit ob aquam intra cranium stagnantem, sed quia & objecta negliger, seu prædem nota, non attendunt, aut quia propter multivaria negotia, quæ recentior obveniunt a succedentibus obliterantur; hanc ob causam non forem Author Illustriss. Dom. ut pro memoria roboranda uteretur confectio. anacard. pulvere marmetico Trithemii, aut similibus exsiccantibus, quibus mar. sinum senilem accerseret: præcipuum remedium erunt induciæ a copia negotiorum, imprimis tadioforum, & animi quadam tranquillitas. Concludo ulteriorem lactis potum Illustriss. Dom. proficuum fore; frequentes purgationes nocituras, pulverem antihæcticum præservationis causa, semel in septimana, proutumum, aut urgente affectu, etiam crebrius sumtum levamen allaturum, & lacti citra ullam noxam plenius vicium adjungi posse.

D. T. O. M. Illustrissimum Dominum porro conservet, curæ benedicat, ipsique ad Nestoris annos servet.

Soloduri 1. Februarii, ann. 1687.

### Observationes.

Continua coryza affligit nares Integr. Dom. Pauli Morbi Archiatri regii, ætatis ingravescens, ut per nares impedita via difficilis sit illi & somnus & spiratio: obstructionis narum peculiaris causa & ratio est: Quotiescunque molestior est affectus per narum cavitatem prolabitur vesicula oblonga, rotunda, candida, sero plena, quod exsudat: hæc verò vesica membranosa sæpe in medio narum sublit, sæpe extra nares propendit, levi digitorum impulsu sursum ad caput retruditur, naresque deserit, sed circa os ethmoides & olfactum & spirationem impedit: Evacuatur subinde exstillante sero, & liberior redditur olfactus. Ex pulvere sternutatorio sæpe amicorum hortatu hujus coryzæ quæsit levamen, sed quia majores in naribus obstructions in ipsa tractione catarrhi oriuntur, ab illo defuit unumque dormienti remedium est, in opposito latere obstructæ naris decubitus. Facillimum foret vesicam pendulam fornice amputare, si de membranulæ natura & origine constaret.

Ad varias conjecturas mentem torfi: an processus mammillares? Per Epilepsiam ad nares



protrufos author est *Erasmus*; & recipiendis excrementis cerebri destinantur à *Warthom* in Adenogr. Sed quomodo ossis ethmoidei foramina permeabunt, nisi p. n. cribrum hoc dilatetur amplius? At quid de olfactu dicendum? ut in quavis coryza, ita & hic propendentibus vesiculis cessat odoratus, qui illis evacuatis redit: Taceo processus facile rumpi posse nimis fero distentos? Polypi principium quominus credamus, facit substantiæ diversitas & mobilitas. An duræ matris productio vel laxatio? Id sine insigni doloris sensu haud fieret, quo tamen caret vir optimus. An vasorum lymphaticorum progenies? Nec color ablu dit, nec contentus liquor, nisi alia subsit causa: forsan idem cum Polypo generationis modus, observante enim *Riolano* 4. Anthropogr. cap. 6. In cellulis osseis spongiosis caruncula exites continentur, quas vidit prolongatas, & ad imas nares prolapsas, sponte vero adstringentibus medicamentis superne revelli: Vesículas membranofas siue dubio, loco caruncularum in hoc corpore natura efformavit, quæ serò ex catarrhoso cerebro defluente intumescant. *Th. Bartholinus hist. 37. Cent. 6.*

Quemadmodum aliis nares sanguine stillant, ita semel vidi illas pituitâ tenui cuidam stillare integrum triduum, per intervalla tamen: vacuato autem cerebro cessavit. *Quâ de causâ hyeme nares stillent*, notum est, per compressionem fess. cerebri quâ causa itidem per arietem scil. per fusionem humorum: hoc loco autem quomodo separatio illa humoris pituitosi à reliquâ massa sanguinea contigerit, merito dubitatur, in cerebro enim tanta copia latere non potest absque gravitate.

Id plane sibi evenisse assererat conjux. N. quod nempe cum virgo adhuc, integrum triduum absque illo prorsus somno choreis consumpsisset, per quatrimum integrum dormierit, evigilanti verò experint nares pituitâ sincera per dies aliquot stillare cessavit autem iste fluxus usu pilularum cephalicarum. *Salmich. Observat. 37. Cent. 1.*

#### *Catarrhus frequens in insulis Ferroensibus Dania Regi subiectis.*

In Insulis Ferroensibus propter aëris frigidam constitutionem, incolæ pene omnes vere & autumno Catarrho affliguntur, (quem vocant *Krüm*) longè vehementiori quàm alibi terrarum. Ad nares defluit & pectus, cum tussi molestissima, & expectoratione, dolore capitis, & membrorum debilitate, ut vel lecto diu detineantur, vel moriantur. Salutaris tamen, censeatur, & criticus, expurgans corpus ab humoribus humidis morbos graviores minuantibus. Deinde eadem frigida humiditas sæpe excitat morbum acutum (*Landsfevret* dictum, eo quod regionem pervagetur) non absimilem morbo Castrensi militum ex mora in cubilibus humidis, frigidisque, febris ardens est; cum dolore capitis ingenti & delirio, in nonnullis cum diarrhæa nec antè solvitur quàm medulla ossium consumpta corpus tabescat; plerique tamen evadunt. *Thoma Bartholini in altis Hassn.*

#### *Malignitas occulta Catarrhum in pectore mentita.*

Morbi qui ab initio blandiuntur, plerumque mutato schemate sub finem sæviunt, & dum aperte jocantur, occulte jugulant. Quod si de ullo, certè de maligna febre dici potest, quam merito P. *Newcranz de purp. cap. 12.* Mortuum fallacissimum *Amoen. Meniot.* vaserrimum atque versipellem, & *Hæschl.* quovis vertumno mutabiliorum, varias induentem larvas, modò hanc, modò illam faciem formantive mentientem. *Dec. 1. observ. 6.* appellant, quæ ita quandoque & ingenium, & mores suos occultare novit, ut nec lyncæ possit observari oculis, semperque quo segniores ciet turbas, eo res agrotantis deteriori loco sitæ, quoniam furtiva mansionem magis radicatur, firmioresque nanciscitur, malignitatis nervos, ut inquit præfatus *Meniot. in febr. malign. hist. & cur. p. m. 49.* Vera hæc esse sequens probat historia. Circa finem mensis Aprilis anni 1674. huc venit Hungarus quidam robustæ alias naturæ, nomine *Michael Todt*, habebat ille nescio quos dolores in pede, unde tamen rectè curatus, remanente aliquâ eorum imbecillitate, quam ex prioribus doloribus provenientem credidit, & neglexit: Non multò post languore corripitur universali totius corporis cum tussi valde, urgente, & ut apparebat, cum gravi catarrho in pectore. Deambulavit hinc inde quanquam languidus, prostrata omnis appetentia, calor nullus, nulla sitis, dedi, cum Dietam non semper observavit bonam, aquam laxativam & post *Eliz. propr. Parac.* Undè rediit appetitus, sed tussis exasperata; sumpsit decoct. pector. *℞ij. mann. cl. ℞ij.* quo quinquies purgatus. Sumpta cæna decubuit, mediâ nocte expergefactus de calore extraordinario, & siti vehementissima conquestus. Mane ipsum accedens corpus quidem observo plus iusto calidum, in pulsû nil nisi aliquam debilitatem circa vespèram vehementissime delirare cepit, præposere ad omnia respondens, corpus summe talebat exterius, lingua arida, vultus torvus, nihil tamen mutato pulsû. Apertâ venâ brachii, exhibita sudorifera, alexiteria, sed ille tertio die postquàm delirare cepit obiit. Latuit sub specie Catarrhi malum, diu cum natura aliàs robusta conflictatum, donec prostratis viribus uno imperdâ mentem & vitam ademit. Sanguis qui V.S. mittebatur, floridus erat, nullum vitium notabile habens quod sæpius in malignitate observavi, & notavit hoc etiam *Meniot. l. c. p. 2.* Quod mireremur, ait, sanguis iste profugus (c. naribus scil.) ac plerumque illè ipse etiam, qui secunda venâ educitur, rutilus, optimusque apparet, quod venenosa qualitas sensum lateat, solisque patefcat facinoribus, vel quod venetæ putredinis focus altior, strictique hincibus circumscriptus *D. Caroli Raygeri*

#### *Singularis Catarrhorum extractio ope pulveris cujusdam.*

Transiit anno 1661. mense Januario Suisfurtum quidam veteranus Bombamachides, qui pulvere quodam farinæ purissimæ simili, impido



pido ferè, nisi quòd paulum acrimoniz lingue aut faucibus affricaret, insignem pituita lentissimæ copiam e naribus catarrhorum, quibus pulveris illius quidpiam indiderat, absque permutatione aut molestia, cum stupore elicit; asseruitque esse pulverem cuiusdam radicis ex Arabia delatæ, summique artificium multorum Medicorum in Imperio admodum celeberrimum testimoniis corroboravit, ego suspicor esse corticem Rheumaticum, quem *Carolus Clusius à Nicolao Monarde in simpl. Medic. ex novo orbe delatum* 3. p. 10. ita describit. Ex Peru mihi nullus est crassius quidam cortex, quem ex vasta arbore ulmo simili, tum amplitudine, tum forma, detractum serunt: Nascitur ad ripas fluminis cuiusdam 25. leucis à Lima distantis, nec alibi in India facile reperitur: Indi in capitis defluxionibus, rheumatismis, aut aliquo corporis gravedine laborantes, huius arboris corticem in tenuissimum pulverem comminunt, & naribus imponunt, humores insigniter educit, qua ratione liberantur quod verum essent ipsi experti sumus; secundum caloris gradum excedere videtur.

*Hastennus Clusius.* Si Colonienfis ille Pygopolinices alio quoque concesserit optandum esset, ut certo inquiri posset in genuinam huius pulveris naturam à Medicis propter insignem utrum, quem præbere posset in curatione catarrhorum, si fieret familiarior. *D. Joh. Mich. Febr.*

Forte est idem Colonienfis quem describit *P. Scottom in lib. 11. Phys. curios. p. 1289. novæ edit. de anno 1667.* Fuit præteritâ hyeme (inquit) hic Herbioli, Colonienfis, qui aliquandiu in Creta apud Venetos contra Turcam militaverat, ac deinde militis pertæsus in Palæstinam trajecerat, & annis aliquot propè Hierosolimam in ipsa valle Josaphat, ut dicebat, habitaverat inter Turcas quidem, sed tamen non sine Christianorum, etiam religiosorum consortio. Habebat is pulverem, cujus exigua portiuncula, quantum apice cultri sustentatur, naribus imposita, & sine attractione retenta, projiciebat e naribus ac faucibus catarrhos ac fatidos humores tanta copia, sine ulla tamen violentia, ut qui curam patiebatur, sentiret notabiliter dictos humores e capite extrahi, atque ad nares & fauces confluere. Multis curam adhibuit, semper cum emolumento. Aiebat pulverem conchi ex radice aliqua Arabiæ, nulla tamen aperire volebat vel nomen radicis. Sat magno pretio vendebat hunc pulverem. Forte & iste pulvis & radix in nostris pharmacopoliis reperitur, cum incredibile nuncium hominem tantam eius copiam è Palæstina attulisse, ut sufficeret in aliquos annos, & pro multis Germaniz urbibus. *Hæc Scottom l. 1. a.* Et talis Bombardarius Vratislaviæ quoque venit nundinarum tempore anno 1664. & aliquot experimenta fecit, à Medicis tamen, quod dolendum, non prius observatus, nisi cum dudum abierat. Insigne tamen exemplum adducam, quod mihi sequenti anno 1665. oculatus retulit testis aliquoties, cum me suæ valetudini præficeret Generosissimus Comes *Caspar S. R. I. Comes Colonna L. B. de Fels;* is cum ex constitutione nativa partim etiam morbofa difficulter spiritum traheret, & nares haberet maximè obstructas,

audito nuncio de hoc homuncione, illum accertiri jubet. Comparet is vocatus, & cum *Gen. Comes* jam major septuagenario in se ipso primum experimentum vix tentare auderet, secretario suo persuasit, qui difficulter pariter auehlabat naribus obturatis, ut in se permitteret fieri tentamen. Annuit ille, & in præsentia *Comitis prædicti & Rev. Patris Theodori Moreti* è Soc. Jesu Mathematici insignis pulverem tenuissimum, ab isto homine in aqua oblatum, naribus attrahit, quo facto tam insignis copia humoris tenuissimi per palatum absque ulla molestia educta fuit, ut aliquot minores pelues argenteas impleret, & post optime respiraret. Ipse Comes quidem hæc vice ab ipsa cura, quam false vocabat *die Flüße abzupffen*, abstinuit, sapientius tamen postea indoluit, & conquestus est, cum aliis nundinis amplius ille circumforaneus non rediret, quod tamen speraverat. Vidit *D. Joachimi Georg. Elserius collega noster Jenæ*, dum studiorum gratia ibi moraretur, Rusticum quendam in Thuringia Catarrhos tentasse educere maxima cum audacia adhibito pulv. Euphorb. & ut os tenerent eo facilius apertum, instrumentum adhibuit singulare pro apertura (*einen Buebel*) & ita copiosissime humores e capite vidit in subjectam pelvim fluentes cum molestia tamen; pariter hunc modum vocabat *Flüß abzupffen* & pro singulis libris educti phlegmatis, Imperialem solvere ægri cogebantur. *Joh. Michael Febr.*

## Appendix ad caput præcedens.

### De singulari Catarrhorum extractione.

Mentio facta fuit *Artificis* cuiusdam Catarrhos singulari artificio extrahentis: quid hac de re ulterius innotuerit, placet verba *Excell. D. D. Salomonis Reifeli* Archiatri Hæmovenfis. meritissimi, amici sincerissimi, adducere ex *Litter. 24. Januar* hoc ipso 1671. anno è Hanovia ad me datis: in vena *Observat. 34. inquit*, facta fuit mentio de singulari *Catarrhorum extractione* cuiusdam Bombardarii qui pulvere rheumatico ad nares attracto insignem copiam humoris tenacissimi eduxerit: antè paucos dies, *inquit*, Hanoviam transit circumforaneus quidam nomine *Joh. Georgius Clar. Singardianus* Herniarius, Lithotomus, qui præter suffusiones detractas ejusmodi pulverem vendidit rheumaticum quem ineptè quidem in schedula sua ab Arabibus *Panchimachobi* dictum ad multos usus & destillationes, pisorum duorum magnitudine attractum laudavit publice: is ea de re interrogatus apud me privatim, & bona fide sua fide *Halustissus* (forte adhuc ineptius quàm antè) dici affirmavit, & esse corticem ex Arabia allatum radice betæ rubræ, unde color rubeolus, permittum & auctum. Retulit porro quod Stutgardie stipendio Serenissimi Ducis vivat, ibique eo pulvere utatur, quod eo usus sit *Vratislavia* circa annum 1664. comitatus servo, qui ad plebem colligendam ignem evomuerit. Fides sit penes ipsum. Pulvis ipse est incarnatus nullius ferè saporis, sed si naribus attractus sit, multa acredinis, unde distentis præsertim ligno faucibus, plurimum feri per nares, oculos, &



palatum educit ejus rei ut experimentum facias, indeque facilius subodorari possis, quæ desideras, mitto aliquot doses. Incidit hujus occasione in memoriam alterius cujusdam radicis, quæ masticata, compresso paulum stomacho, appositione manuum inclinato capite, aperto ore & efflato spiritu tenacissimam & copiosam pituitam in quodam, magno cum levamine ventriculi, si is gravatus fuerit, eduxisse aliquoties vidi, quod in aliis licebit imitari. Id ipsum nè longius animum sciendi cupidum avarus teneam, gratis accipe, *est cortex aut canda acrioris raphani. Hac D. Reisel. ad D. Sachsum.*

### Appendix altera.

#### *De Dicto Pulvere Rheumatico.*

Anno Christiani nati 1658. vir quidam militaris nomine Jacobus Weidenfeld patria Colonien- sis, Ratisbonam venerat, & medicinam vendens quandam ad purgandum Caput ab omni humore excrementitio sub forma pulveris grisei cum albido mixti pretio satis ingenti, considerato sexu & ætate, in varia dosi. Imponetur autem pulvis hic parum madefactus extremis oris utriusque narium, ea tamen cum cautela, ut ne cerebri meninges convellerentur, ore patulo patiens semper & capite inclinato sederet, aut staret, quousque humores profluebant, compressis interim per vices paululum, & leniter, aut non emunctis nari- bus, tunc è momento incepterunt mucores, humores excrementitii, non sine risu & mira- tione adstantium, continuato fluxu, & con- nexu ad quadrantem horæ per nares ac pala- tum posluere imò etiam ex oculis destillare, & cum humoris crassi & viscosi defluxiones spon- te defiliebant, signum fuit evacuationis com- pletæ ac deinceps patiens corpus & caput re- flectens erigere se, & circa tempora, incipit & verticem, expansis manibus retrorsum tri- cari jubebatur. Vix dictu credibile, quam hilares & leves in capite se senserunt patientes post hujus pulveris usum. Si major copia humo- rum in incipite, major fluxus per nares; si major in occipite, per palatum major fluor fiebat; tardior vel lentior operatio, naca penis tosti ad nares calide admodum stimulabatur. Agebat medicaster, se biennio, vel triennio ab hoc tempore è Terra Sancta in Germaniam redire, medicinam hanc per medicum Ara- bicum in secreto obtinuisse, ac de trunco, seu stipite certæ cujusdam arboris esse in Arabia crescentis; defectum sive penuriam sibi suppleri cura & familiaritate Patriarchæ Damasceni. Arborem hanc præterea referebat, esse crassitie & proceritate malo nostrati non dissimilem, pa- tulis, sed paucis ramis, corticem habere non valde rugosum coloris spadicei, medullam li- gneam, coloris subalbidi, duriorē quam in ar- bore malo, frondescere cum foliis salicis, ger- minare cum flore magno, rotundo, patulo, in diametro prope pedali, qui intus colore varius, viridi, caruleo, rubro, nigro, artificiose in- terexto, exterius, vel in extremitate ac laciniis flavo; floribus succedere fructus, bac- cas scilicet vel pomula parva, rotunda, subni-

gra, sed nullius usus, quæ & sponte decidunt. Arborem hanc in lingua Arabica, (Etiopata) vocari. Truncum, qui odore & sapore aroma- tico insigniter acris, solus hactenus ab octode- cim annis apud Arabes in usum medicinalem venerat, in particulas parvas & minutim disse- ctum, atque subtilissime pulverisatum calcinari in vase æneo super carbone ignito, atque dum fumus acris sub cœruleus de pulvere devolve- rit; cui ob acrimoniam inter calcinandum prope aditare nemo audeat. Experimentum hujus pulveris cum effectu bono in personis il- lustribus, mediocris ac inferioris ordinis, tam religiosis, quam secularibus utriusque sexus, & diversæ ætatis in urbe Ratisbona factum fuit ex observ. propr.

#### *Scholion Helvigiianum.*

De hoc pulvere rheumatico legatur in To- mo seu anno 1. Ephemeridum medico-physi- car. Academiæ Naturæ curiosorum in Germa- nia, Observatio 34. ubi ex epistola Nob. D. Johan. Michaelis Lehr. Physici Suinfurtensis, perhibetur, eundem medicastum anno 1661. Suinfurti fuisse, ac eundem pulverem cum ma- gno applausu vendidisse, & ex radice rheu- matica Calori Clusii præparatum esse. Meminit etiam P. Schottus S. L. lib. 12. Physicæ curios. hujus pulveris; nec non & D. Philipp. Jacob Sachs, Physicus Uratislaviensis, in scholio ad observ. prædictam refert, quod idem vel talis homo cum pulvere suo Uratislaviæ anno 1664. in nudinis fuerit, & applausum magnum ha- buerit; vid. etiam annus 11. dd. Ephem. ap- pend. Placet his adjungere litteras, quæ Ro- ma Ratisbonam, & vicissim Ratisbona Ro- mam de hac materia missæ fuerunt, ex quibus Reverendi & excelsi nominis P. Athanasii Kir- cheri S. J. sententiam, sensumque n cum quis percipere potest.

Seballi no Denichio, Præsuli Almirensi, Sus- fraganeo Ratisbonensi. Reverendissime, & Il- lustriissime Præsul. Mirabitur forsitan me. m in respondendo tarditatem, sed causas ejus pau- cis expono. Jam a mense ingenti auriculari ca- tarrho ita divexatus fui, ut me fere ad omnia inhabilem reddiderit, absurdum videbar om- nibus nec quicquam medico proficiente suis passim dari solitis alexiteriis, Dei gratia tan- dem convalui a surditate, remedio mihi à Deo inspirato, & fuit sulphuris accensi vapor intra aures immissus. Atque hic fuit rerum mearum hucusque status. Litteras interim Illustr. D. V. penitus excuriens, circa mirum illud nescio à quo empirico propositum medicamentum hic statim in eo inposituræ vestigia subolfeci. Præ- teritum fuit, quod pulveris nomen Arabicis lite- ris exhibere voluerit, quæ literæ non arabicæ fuerunt, sed cabalisticæ, & amuletariæ, ex pla- netarum, signorumque characteribus confectæ, ut quis facile advertere poterit. Secun- dum fuit vox (Etiopata) quæ vox Arabica non est, sed per anagrammatismum id signifi- cat, quod est opiata. Est autem opiata con- sectio ex opio, helleboro, similibusque mirifice caput expurgantibus medicamentis confecta, mahumetanis valde usurpata, utpote quæ mi- rificam vim ad capitis humores trahendos ob- tineat, spiritus corporis ad insaniam usque



excitet, opportunum proinde remedium quo ad hostes furiose invadendos utuntur. Tercium est quod Archiepiscopus, seu Patriarcha Damascenus illud dispensare soleat. Ego sane alium Patriarcham Damascenum nescio quam Patriarcham Maronitarum, qui habitat in monte Libano in monasterio Genubin, mihi literis notissimum sed neque a Maronitis hic Romae meis amicis, neque ab ipso patriarcha, de hoc mirifico pulvere quicquam innotuit, utique hic, sicuti multa alia peregrina à Maronitis mihi communicantur, ita & hoc tanti momenti non pratermississent. Addo quartum, nullum hic mercatorum Arabum de huiusmodi Arabiae felicitis arbore, ejusque virtute quid nolle, inde concludo nullam simili medicamento fidem adhiberi posse & debere, cum & periculosissimum sit, & à superstitiosis lucris profectum, quibus in more positum, sine magico amuleto nullum ferè simile medicamentum exhibere, ut in magia, & cabala saracenica sine ostenditom. 2. Oedipi part. 1. syntagm. 4. & de virtute quidem istiusmodi pulveris non dubito, cum innumera in Oeconomia botanica repertantur, quae similes effectus praestent, ut sunt Helleborus, solanum, peplum opium omne certa arte preparatum; & similia repertiuntur in Prosp. Alpino de plantis Aegypti. de virtute itaque talis, ut dixi, pulveris non dubito, sed ut tales statim, assumptum effectus praestet, quos Ill. D. V. descripsit, illud dico esse suspectum; & ponamus non esse suspectum, dico tamen nulla ratione adhibendum esse, ob summam quam naturae infert violentiam, & damna vitalis aeternae irremediabilia atque hoc est meum de pulvere illo iudicium, salva doctorum medicorum opinione nil igitur restat, nisi ut me gratia tua commendationi habeat. Vale, decus Praesulum, meque ut soles, ama. Romae 20. Julii 1658. Athanasius Kircherus.

Reverendo admodum Patri Dom, Athanasio Kircheri S. I. feliciter agere! Reverende admodum Domine pater.

Quantum contristatus fueram de percepta agitudine tua, tantum iterum sum letatus, cum literas manu tua ad Rev. Dom. praesulem Almirensensem videbam exaratas. Et quid nisi dignus etenim omni benevolentiae & amoris affectu, quem omni honore dignum censet, & cui sceptrum submittit literarius orbis. Averruncet, precor, altissimus, ne prius caelum laboris premium capias, antequam nobis mundum subterraneum sagaci opera tua recluseris & publicaris, quem omnes anhelantes expectamus. Sententiam tuam, vir reverende de pulvere, seu medicamine empirico, in praememoratis literis tuis ex benevola Reverendissimi praesulis communicatione, jucundam sane perlegi, sagaciter omnia & erudite literarum ipse enim, quarum figuras ego in ullo orientalium scriptore unquam invenire, aut pro Arabicis agnoscere non potueram scrupulum mihi imposturae moverunt. Nec displicet anagrammatismi enodatio, si latiori sumitur significatione opiata vocabulum. Sub hoc siquidem veteres illa magna medicamenta, quae opium admixtum vel stuporem inducunt, intellexerunt, moderni vero etiam multas confectiones cardiacas, alte-

rant, purgantes, vocabulo hoc designant. (ut Renodius lib. 3. Inhibetur. p. 111. macem. tempestive amotavit) credo ob subitas earum operationes. Linquamus interim Empirico secretum suum, quo hactenus multorum oculos enavit, & est inuentum illud non ita modernum, octavo etenim ab hinc anno, & quod ultra, eodem cum medicamine idem homo Bavariam peragraverat, ut incolae quidam mihi narraverunt qui, eo non absque caeculano, uto tempore quoque usi sunt. Imo ante sexdecim annos in Helvetia Lucerna, & Tiguri quendam doctorem medicum pro usu communi aegrotorum suorum, ejusmodi pulverem in eadem substantia, colore, odore, sapore, inque eundem finem, in publico preparari pharmacopolio curasse, sive dignus noster Pharmacopoeus, qui societatis Collegio hac in urbe pro tempore intererat, retulit. Placuit quoque discursus R. T. de consiciendo ejusmodi pulvere valde elegans; sed secreti huius pulveris preparationem legitimam ex agyria illo audire, posito quocumque pretio, hactenus non licuit; licuit vero ex operosa investigatione, & variarum compositionum experimento demum subsistere pulverem hunc certe ex nihilo alio, quam ex euphorbio fore compositum. Observavit hic quidem aliqui, sub huius manibus saepius tractari radices pyrethri & morsus diaboli, inde in experimentum coniciebant ex dictis radicibus tritis & cum paucis Zingibere ac cornu cervi preparato mistis pulverem tere ejusdem coloris cum priore, sed saporis acutioris, dum ille sit acris & aromaticus, phlegma etiam ac humores serosos e naribus atque palato trahebat, alii non tam cito & potenter veluti dicitur. Quocirca sagaciori processu alii procedentes preparaverunt ex euphorbio & calce trita, qui quidem potentius humores, ac majore cum impetu trahebat; interim vero ob vim suam causticam, insignem & acerrimum capitis dolorem aut molestiam caustavit. Usque dum ad formam & processum illius supra memorati medici Helvetii, preparari mihi portionem curaveram, quem pulverem ex una parte euphorbii & dimidia parte amyli confectum, comperi unum & eundem esse in substantia, colore, odore, sapore, & effectum cum empirico illo. Euphorbium autem basin genuinam esse huius medicaminis, acrimonia sub lingua & odor accensi super carbone aromaticus ostendunt, atque causticam ejus vim infringi amylo, usus docebat. Et cum Euphorbio rite preparato & correcto, cujus preparationis quinque diversi habentur modi in catapotis, & aliis utimur, etiam si à quibusdam pro veneno habetur, non dubito cum fructu & citra periculum quodque sub forma praedicti pulveris, sternutatorii vel erthini instar illud usurpari posse, si modo inconsulto medico id non fiat; quod sane in utroque tum empirico isto tum illo cura mea preparato pulvere expertus sum, quibus igitur laudem omnem derogare non potero. Et dum Dioscorides ceterique veteres & moderni Botanici frigide factis Euphorbii historiam dederunt, imo nunc ex arbore, vel frutice concisis succus manet, discrepant, descriptionem magis genuinam ejus aveo, praesertim arboris, vel fruticis ipsiusmet, atque magna mihi & bono publico



gratia fiat si hujusmodi historia à modernis Arabibus, aut iis qui in Lybia oris negotiantur, peteretur: in quo te V.R. multum posse non dubito, modo te exorare liceat. Hæcque sunt, quæ tibi tum ex jussu & voluntate reverendissimi præsulis, tum proprio motu ac confidentia veteri in itinere quodam nostro contracta, notificare debui, simulque ulteriori tuo favori, cujus non parvam favillam è literis tuis ante biennium ad me per quam humanissime datis ceperam, me meaque simul commendare volui. Vale, & factum tuum, Mundum subterraneum, demum feliciter enitere. Ratisbonæ d. 5. Id. Septembr. A. C. 1678.

*Johannes Heßvigiur.*

Pulverem rheumativum, quem Dom. Joach. Georg. Elsnerus Jenæ apud circulatorum quendam agrestem observaverat, sicut D. Sachsus enarrat in Schol. supra cit. nec ego dubito, aliud quid, præter pulverem istum medicatri Colonienfis ex euphorbio fuisse, assidua ejus abundantia quoque & experientia ipsa persuadent. Alioquin posterioribus annis celeberrimus D. Guernerus Rolincius in tract. suo de purgantibus vegetal. sect. 4. art. 3. euphorbii historiam accuratissime conscriptam, & præparationem pulveris hujus rheumatici genuinam tradidit.

#### SCHOLIUM SCHRÖCKII.

Alias etiam Errhinorum ex Euphorbio formulas, idem Vir Excellentiss. in ord. & meth. medic. spec. comment. lib. 6. sect. 4. cap. 1. consignavit. Sed uti cautum semper in quovis adhibendo errhino Medicum esse decet, ita in primis in illis, quæ ciendo sternutationem, levius cujusdam epilepsie ideam referentem, vehementioris operationis exsunt. Quale utique Euphorbium esse, si sibi relinquatur, nec additis idoneis aliis, acrimonia ejus infringatur, nemo non novit, cujus nempe acre & adurens quasi sal volatile variorum incommodorum causa esse valet. Quod sanè Regius in Dania Capitaneus pessimo eventû expertus fuerat, inflammationem capitis funestam sibi causatus, cui testantur magna regni illius sidera medica, Simon Pauli Class. 3. Quadripart. botan. cap. de tithymal. nec non præfat. tract. de Dosibus vomitorior. ac purg. & Thom. Bartholinus Volum. 2. Act. Medic. Hafniens. observ. 102. Item Dissertat. G. de Medic. Danor. domest. Quamvis si debite contemperatum, & à prudentis Medici provida manu porrectum fuerit, innoxium evadere, optimosque præstare posse effectus, experientia sua confirmat Nobiliss. D. D. Franc. Ignat. Thiermairius Consilior. Med. lib. 1. cap. 2. ubi etiam pulveris hujus rheumatici, cujus historia in præsentis observatione traditur, præparationem edocuit, quem utique ob disgregatas & obtusas à Coralliis, & amylo potentioris succi istius Lybici particulas, blandiorem agendi vim fortiri credibile est. Alias quoque oleosis distemperatum mirescere, ex Mesue constat, quem Augustani nostri in Dispensatorio sui Classe 20. sequuti fuerunt à me pag. 431. Pharmac. August. restit. defensi, videlicet ab

olei hamositatis salis volatilis spicula (quæ etiam acidus citriorum pomorum succus tranfgit, atque obtundit,) illaqueari, Celeb. Joh. Nicol. Pechlinus exercit. de purg. Medic. facult. cap. 21. ostendit. Quâ ratione non ineptè Agyrta ille pulverem catarrhalem, quem Matri Excell. D. D. Joh. Ludov. Hannemannii dederat, oleo olivarum infusum, naribus attrahi jusserrat, quem utpote ejusdem cum Euphorbio farinæ fuisse Illustr. Bartholinus l. c. Act. Medic. Hafn. non abs re suspicatur quamvis idem potentissime quidem tenacissimi humoris pluviam ex oculis, naribus, & palato concitaverit absque tamen sperato levamine, non tam pulveris ipsius culpa, quam ut ipse D. Hannemannus judicat, quod corpus non antea debite præparatum vel evacuatum fuerit. Quos verò Euphorbii vehementia nimium terret, alia tutiora, quæ substituant, habent, nec tamen minoris virtutis Errhina; quæ inter in primis Aqua major. n. laudem meretur, magnopere à D. Simone Pauli Class. 3. quadripart. botan. tit. majoran. commendata; nec non Vitriolum album à Nobilissimo nostro Wedelio in Ephemerid. Curios. Ann. iij. Observ. 14. debito cum encomio communicatum. Ceterum quæ circa actionem, usum, & virtutem Errhinorum notanda, optime expressit idem Wedelius lib. 2. de medicament. facult. sect. 2. cap. 2. Vias etiam, per quas serositates arte ista evacuantur, eleganter monstravit. Magnif. Guern. Rolincius lib. de purg. vegetal. sect. 4. art. 3. cap. 10. & Cl. Nicol. Steno observat. anat. de glandulis oris 5. 23. ac observat. de vasis narium.

Ante annos sex Agyrta quidam Matrem meam de imbecillitate capitis, & Vertigine conquerentem accessit, pulverem qui evacuat Catarrhos, ipsi dedit, cum in oleo olivarum infusum naribus attraheret hinc acutum ex oculis, naribus, palato, tenacissimus pluebat humor, usque ad guttam sanguinis, quod pro bono successu interpretatus, cum ex ipso quæterem quoddam genus medicamenti esset? gummi exoticum ex India allatum dixit, cumque mihi ostenderet aliquot frusta, aliqua gummi species mihi visa fuit, hanc catarrhi pluviam nominabat *Flusæ abzeff. n.*; nil verò levaminis inde sensit mater mea, quare? ratio in promptu, quoniam corpus non ante præparatum vel evacuatum, ut oportuit, scis enim quam præpostera & sinistra utantur medendi methodo, quæ homines magis belle necant, quam tuto curant. De Catarrhorum extractione similem observationem Ephemeridum Curiosorum anni primi Observat. 34. p. 110. 111. 112. legi, cui hanc historiam meam socio, eamque dudum ad aliquod Academix membrum transcripsi, quæ dubio procul hujus anni Mellis inferetur J. Ludovic. Hannemannii.

Empirici Errhinum, quod ad pluviam Catarrhi adhibuit Matri tuæ, ejusdem forsitan farinæ fuit. Vidi vel mensuram portæ nostræ liquore ex naribus stillante velut ex fonte perenni impletam à quodam Empirico. Secretam autem hanc artem servant Agyrtæ, nec satis illi fident, cum euphorbio vix sit melior. Rectè ille

----- Ignotum nolis proponere notis

Cognita Judicio constant, incognita casu.

Optima quippè remedia, Hollerii Judicio, quæ



quæ plurimis cognita, pluribus probata sunt. His ergo utamur, præeunte *Vindiciano* ad *Valentinianum* Imperatorem, quibus sumus benè experti, & quorum beneficio consequuti sumus operabilem sanitatem. Non dubito ad eliciendam per nares aquam, quin *Agaricus*, *Gummi gotta* quocumque modo præparata plurimum valeant. *Th. Bartholin* ad *D. H. H. Mannemannum*. Responsio.

*Vitriolum album Errhinum tenuissimum.*

Legi in *Observ. 34. Ann. 1. Misc. Medico Phys.* p. 3. de pulvere ad Catarrhos extrahendos è naribus & faucibus, quod olim jam apud citatum *Schottum* legi. Non possum non mentem meam, quam circa illud Medicamentum hætenus fixi, exponere. Putavi enim aut illud fuisse radicem *Euphorbii*, ita cum aliis temperatam, ut minori energia, exuta agendi tyrannide, ageret, quale *Excell. 1.* ipsa quoque suggestit, vel quod probabile visum est (uti de non viro Medicamento conjectari licet) *Vitriolum album*, subtiliter pulverisatum vel solitarium, vel mistum, idque 1. quia *Schottus* ipse putavit, illud in nostris etiam *Pharmacopoliis* reperiri, inductus tantâ copia Medicamenti, quâ artifex intrusus erat. 2. addit. Idem sine attractione in naribus retineri debuisse, dubio pro ulne sternutationem ciceret, vel saltem minorem. Si additum fuisset, an in aqua, quacum administratum est, Medicamentum illud solutum fuerit necne, esset id longe probabilius & certius assertu. Quicquid vero horum sit, *Vitriolum album* expertus sum in aqua s. vel cephalicâ solutum, pennaque naribus modeste applicatum, liquare in debita quantitate ex voto Catarrhos, & extravocare, ita ut infantibus etiam recens natis, præ spiramentorum nasi obstructionibus, uti sæpius fit, vix lactate valentibus & suffocandis, feliciter aliquoties id adhibuerim. Quo casu neque ol. *Amygd. d.* naribus instillatum, & radices earundem illicum, neque aqua *Majoranz* indita, semper votis responderunt. Hoc Medicamentum omne tulit punctum. Novumque non est circumforaneos talibus sæpè ludere vulgus, ut peregrina illa jactent, quæ pro foribus sæpè reperiuntur. *Georg. W. J. G. Wedelii.*

*Ex succo betæ noxa.*

Non infrequens apud nos est in coryza difficilius visus succi radices betæ, quem permittunt aquæ majoranz addito mellis *Anthotati* tantillo naribus excipiunt agri, & ita paulatim lentæ pituitæ copiam inde proleptam, sed non esse æque omnibus salutarem sæpè deprehendimus; imo noxiu visus quibus glutinosa illa pituita non hæret in ipsis naribus, aut supra palatum, sed stagnat adhuc in vasis capitis sanguineis exitum moliens, quibus convenientius est solum foliorum betæ in aqua majoranz infusum, ut quod minus narium interiora radit, minusque offendit. Spretæ hujus admonitionis poenas luit non ita pridem virgo nubilis, quæ in matri familias coryza laboranti, & exhausto radices betæ cum aqua majoranz succo nares cum dolore contrahenti ludibunda gratificaretur, excepit & illa naribus satis liberalem ejus mixturæ por-

tionem, sed paulo post inter cruciatus intensissimos caput ejus totum ita intumuit, ut duplo majus naturali appareret, & vestigia prioris formæ obliterarentur omnia. Post triduum ab infelici *Errhino* meæ curæ permixta ostendebat faciem tumidissimam, duram, sublividam, præsertim sub oculis, conquesta de vertigine, inquietudine, & doloribusque gravissimis. Inter hæc mala nihil ipsi tristius, quàm speculum inspicere, & in vultu suo vultum frustra querere, ita ille

Hæc mihi, qualis is erat, quantum mutatus?

Ego præmissis universalibus contrario *Errhino*, ex solo lacte recenti, eoque tepido, curam hanc, Deo benè fortunante, prospere absolvi. Prælagiens enim lætas primum ab acri betæ succo narium membranulas malum ad Meninges cerebri, & alia vasa propagasse, credidi fore, ut infuso per eandem viam blandiori lactis succo obliterentur iterum offensæ partes, & acrimonia betarum obtusa paulatim ad officium redirent. Quod ita successit ut hodie in conjugio vivat, telix nuper mater & priorum oblita laborum, *D. Olai Borrichii.*

*Caloris & frigoris in eodem corpore mirificus lapsus à Catarrho.*

Vir validus ex dolore ossifrago nocturno non sine suspitione luis venereæ, & metu tabis dorsalis sæpius laborabat, semel, iterumque à me curatus post vehementissimos animi irati motus, ad quos incredibile quantum esset proclivis, in eundem recidit affectum, sed propter auri, temporumque inclementiam, multo savio-rem, erat perpetua seri fluidioris & falsuginosi a capite destillatio, modò in os, unde tum sale lixivo exuri palatum querebatur, modò in nares, quæ & ipsæ erodebantur, nunc etiam ad postica; ibique cum immensi frigoris sensu. Pulsus intempestus, & de die pro vario Catarrhorum fluxu ipse quoque varius; calor incertus, & frigore alternatus, nunc *Antipyreticus*, & ad interiora vehementi æstu recedens deserta superficie. Sonni summa inopia & rheumatismum de nocte inquietantium nulla remissio. Cum totum hoc negotium à copiosiore seri stillantis impetu proficisci conjicerem, pilulis de *Cynoglossis*, quarum usus nunquam me fefellit, occurrendum esse rebar; nec mora, quin à tribus, quatuorque pilulis immodicam illam falsuginem, suorumque descensum coerceri ipse æger notaret, subrepente etiam molli somno. Sed cum postridie ad novi impetum paroxysmi recrudescerent rheumata, alvo lenta & contumaci, copiam seri evocandam esse duxi præsertim cum illud remedii genus olim commodo suo absumpisset. Exhibeo ergo resinæ *gialappæ* gr. vi. (mobilitas enim seri augere dolui verbar.) cum vitello ovi, aquis rosarum, cinamomi & syrupo de acetositate citri, nequid ad gratiam deesset, permixta. Inde alvus quaterdecies soluta, & morbus multis partibus jam levior, spem faciebant sanationis, imò intra tres dies de lecto surgere, obambulare zdes inceperat sui securus, pulsus etiam nihil monstri alente. Verum post aliquot dies malo domestico concitatus, in tantam incidit iram, ut redditam sibi valetudinem momento dilueret.



baret, jamque superveniente tremula palpitatione membrorum, non febrem tantum, sed fluores quoque istos in perniciem suam revocaret. Id unum autem circa frigoris, calorisque vices à me singulare deprehensum, quod utraque qualitas corpori quidem simul gravis esset, sed diverso, quam hætenus observatum est, modo: quippe dimidium corporis à capite ad calcem, vel ut perpendiculari sectione, calido & frigido sensu distinguebatur, neque illo levi, nam unam partem glacie, alteram igne infestari serio querebatur, admodum manū differentiam quidem, sed non adeo magnam notante. Hoc peregrino & prodigiali symptomate exterritus nihil boni ominari cœpit, sed quod eventus monstravit, fatum prædixit. *Jean. Nic. Pechlin.*

### Anatomica Inspektiones.

Eminentiss. Cardinalis Camillus Melius non simplices catarrhi quamvis levioris, molestias aliquoties perpeffus, aliquam capitis debilitatem advertit, quibus febris sociam se superaddens, 14. ab invasione die septuagenarius moritur.

Cranio ejus aperto plusquam libra feri tenuioris inter duram & tenuem meninges diffusa videbatur, quo turgida pia mater solitam crassitiem quater superabat: eodem sero, sed rubicundiore, ventriculi cerebri erant repleti. *Henr. à Moirichen in Epist. Th. Bartholini Ep. 97. sent. 2.*

*Catarrhus suffocativus in muliere, cujus cerebrum illa sum fuit, soli Pulmones vitati.*

Mulier dies 40. foetum gerens, dum forte sororem est nacta, eamque complectitur, paulo post tenebrosus quid ob oculos observatur, nec amplius potest consistere; hinc aphonos jacet, ac primum steris ac si suffocante catarrho premeretur, convellitur, nullâ ratione restitui potuit, omnia tentata sunt, convulsionem perseverant, sex horis post moritur; aperto cadavere, pulmones inveniuntur corrupti, ac sanie foetenti & olidâ repleti, sed hoc non fuit causa tanti morbi, quanquam juvare potuit. In cerebro nihil fere alienum compertum est: in ventriculis aliqua erant corpuscula, sed adeo tenuia & exilia ut parvi essent momenti. Accipimus etiam huic morbo alias obnoxiam fuisse: erant hæc epileptica, & non interiiisset nisi convulsionem assidue fuissent, nihil enim est quod tam vires frangat: vitium illud pulmonum ad subitam istam moriendi occasionem aliquid forte attulit. *G. Ballonius epid. & ephem. lib. 2. p. 69.*

D. Kirstenius plures observavit cordis polypos, in quibus catarrhos suffocativos ideo oriri imprimis credidit, quia omnes illi in quibus polypos hos observavit, catarrho hocce extincti sint. Credidit scilicet hujusmodi excrescentias inhibere aut plane sistere fluxum purpure alimentarius. *G. Segerus ad Th. Bartholinum Epist. 85. cent. 2.*

Quotquot Apoplexia aut Catarrho suffocativo mortuos aperui, in omnibus corpora illa callosa,

viscida, ac glutinosa, aut in corde, aut in cerebro, aut in ambobus aliquando reperi, de quibus scribit Excell. Wepterus Exercit. de Apoplexia. *Ex Jean-Georgii Greifselii observat.*

### CATOCHE.

Vid.

### COMA seu CARVS.

### CAVSVS

Vid.

### FEBBIS ARDENS.

### CEPHALEA

Vid.

### DOLOR CAPITIS.

### CEPHALALGIA

Vid.

### DOLOR CAPITIS.

### CEREBRI CONCVSSIO, COMMOTIO &c.

Vid.

### CONCVSSIO & COMMOTIO CEREBRI.

### CHIRAGRA

Vid.

### ARTHRITIS.

## CHLOROSIS.

Chlorosis quæ Virgineus morbus, febris alba, amatoria febris, & ictericia alba nuncupatur, est affectus Virginum nubilum, aut Viduarum juniorum per quem totum corpus languet, facies pallet, ac etiam livescit, Chlorosis autem dicitur a voce *χλωρις* quæ ambigua est significationis, modo namque ex virore pallescentem, interdum pallidum, luteum, aut sub pallidum denotat colorem; Virgineus præterea morbus quia Virginibus frequentior; Febris alba, non quod ea afflicta semper febri-citent, sed quia specimen febrientium præ se ferunt, nimirum debilitatem, pulsus celeritatem & frequentiam, & insuper pallore albes-cunt; Febris amatoria, non quod eâ laborantium color amantibus sit aptus, (quia scilicet pallet omnis amans) sed potius quia amantibus, aut amabilibus virginibus, ac pulchrioribus sæpe accidit; Alba tandem vocatur ictericia quia ut ictericia flava per admixtam sanguini bilem totum corporis habitum flavo colore, depositis scilicet undequaque illius particulis, inficit, sic in hoc morbo sanguis sero putrido prægnans, illud per circuitus repetitos in varia membra partesque musculosas & nerveas, ac ipsam faciei cutem insinuando, præter lassitudines aliasque symptomata, plura, in colore alterationem parit, quæ præcipue in facie, tanquam maxime expositâ parte, visitur, dum aut albes-cit, aut ex albido virefcit, aut ad flavum, immo tus-cum vergit.

Pars præcipue affecta, de sententia omnium prope Medicorum, sunt organa seminalia, unde



de toti sanguini & per eum etiam succo nervo, imprimatur labes symptomatum mox enarranturorum causa.

Dilert hic Affectus à *Cachexia*, quæ est morbus utriusque sexui communis, interque feminas non minus, vetulis, atque maritatis, quam virginibus ac junioribus viduis, familiaris. *Chlorosis* enim aggreditur tantum virgines, viduas, aut similes extra viri consortium viventes. Præter ea *Cachexia* in mulieribus ut plurimum mensium suppressionem habet comitem, cum in *Chlorosi* sæpissime fluere persistant, nec aliter ut plurimum subsistant, quam post longum morbi decursum. De differentiis *Chlorosis* respectu colorum ab ea inductorum, ut & respectu varietatis symptomatum eam consequentium, nihil hic addimus.

*Causa* est, in liquore seminali alterato ac nonnihil corrupto, propter sui retentionem, succorumque illi efformando idoneorum appulsus contrarius. Propterea hic morbus formosæ virgines ac viduas, easque etiam vegetiores ac temperamenti laudabilioris, quæ viro nuptæ, aut illum jam expertæ, amplexibus tamen virilibus aut nondum fruuntur, aut frui cessant, aggreditur, quia in illis materia seminalis est uberior. Qui generationem humanam ex ovo fieri, non secus ac illam avium, piscium, animaliumque forsitan omnium ac plantarum, statuunt, volunt quod de materia seminali jam diximus, proprie penes ova, in ovaris, seu testiculis mulierum retenta, esse, super quo adfertur historia a Domino Denis Medico Parisiensi Regio, de Virgine octodecim annos nata, quæ variis *Chlorosis* symptomatibus diu & frequenter vexata, ac tandem oppressa, obiit, in cujus scilicet cadavere aperto nihil morbidum, præter testiculi sinistri, tumefactionem, quæ partem naturaliter minoris sitæ magnitudinem habentem, in ovi auserini molem elevabat, quo præter vesiculas piliformes, seu ova naturaliter constituta, concludebatur ovum grandius, scilicet olivarii & figura & magnitudine quam maxime referens. Nobis perinde est sive materiam seminalis, sive ovi nomine indigetur materia illa, cujus retentionem diximus esse in causa affectus quem explicamus. At dicent aliqui vix ac ne vix quidem tantas turbas, tamque gravia symptomata totum corpus afficientia, & tam levi particula concitari posse. Verum respondemus miasmata venenosa per animalium morsus aut puncturas inducta, inio à variis venenis è regno, tum vegetabili, tum minerali petita, minoris esse molis, imo quædam inter ea prorsus insensibilia, non minus tamen totum corpus eorum vi ita concuti, ut brevi mortem per truculentissima symptomata adferant, ut maturè ipsis occurratur. Addimus præterea quo nobilior & spirituosior est succus quispiam, eo funestiores esse ipsius corruptiones, facile enim fermenti naturam acquirit quod promptè in massam sanguineam aliosque succos se infundit. Sic ab ovaris mulierum affectis, quasi Pandoræ pyxide, oriri videmus furores uterinos, suffocationes, aliaque innumera de quibus suo loco. Illud autem etiam minus mirum videbitur si attendatur ad varios plexus nervos innumerasque nervorum per partes semi-

nales distributiones, quibus, dum afficiuntur, facile totum corpus in affectionis suæ consensum trahunt; quomodo videmus liquorem illum seminalem naturaliter constitutum sub pubertatis annis, alacritatem, robur, venustatem & similia cum menstrua fermentatione & mammarum sororiatione, conciliare.

*Signa diagnostica sunt*, quod *Chlorosi* affectus faciei, genarum & labiorum color palleat, plumbeus, vel subalbidus efficiatur, qui antea roseus, rubeusque sæpe fuerat, quod prædictæ partes & oculorum palpebræ quadantenus tument, sicuti crura juxta malleolos; quod pulsent temporum ac dorsum arteriæ, sæpe cum capitis gravitate, & dolore tum occipitis, tum lyncipitis; quod cor contremisceat, maxime dum nimium moventur, saltant, aut acclivem locum ascendunt, tumque etiam difficilis accidat respiratio, itaut contractæ, anhelosæ atque impotentes se projiciant, mæstæ, dejectæ ac pigre fiant, cibos fastidiant, præsertim carnes, lassitudine premuntur & corporis gravitate; quod appetant nonnunquam extraneas, sed præcipue quod aliàs curis & vacuæ & bene constitutæ visæ sint, nec in diæta peccaverint, aut morbus per mensium suppressionem inchoaverit.

Quoad *Prognosim*, facillimum est concludere quod quo diutius durat hic morbus, eo deteriora inequantur symptomata: Virgines autem satis promptè liberantur si viro cohabitent. Quibus vero morbus associatur æagnis lienis obstructionibus, ille facile in melancholicum habitum, icterum nigrum, delirium &c. degenerat.

*Indicationes Curativas & Curationem* quod attinet de his vide in sequentibus, ubi scilicet *Curationes, Consultationes & Observationes* adducimus ex variis.

### Curationes.

Curatio hujus affectus perficitur obstructionum apertione, viciolorum humorum ex toto corpore vacatione, & intemperiei viscerum correctione, eorumque roboratione.

Obstructiones auferantur iisdem remediis quæ in obstructionum hepatis, & lienis curationibus fuere proposita, additis nonnullis quæ utrum respiciunt, & ad venarum ejus obstructiones referendas magis appropriata sunt.

Primo igitur medicamentum purgans exhibendum est, laborantis naturæ & temperamento congruum, ex benignioribus compositum, ut primam tantum regionem evacuet, idque præmisso clystere, si alvus non sit libera.

Postea vero Venæsectio erit celebranda, si affectus non fuerit inveteratus admodum, & puella valde exanguis vel ad cachexiam inclinans. Vena autem brachii ab initio erit aperienda, quamvis menstrua suppressa fuerint. Si enim ex pede sanguis tunc temporis detrahetur, majores fient venarum uteri obstructiones, aucta earum plenitudine. Ex brachio denique sinistro sanguis detrahetur, si lien magis obstructus sit: è dextro vero, si hepar obstructiones magis invaserint.

Educta ea sanguinis quantitate quæ necessa-



ria fuerit, solennis purgatio instituenda est apozemate aperiente & purgante, quale in obstructionis hepatis curatione fuit propositum. Cui addentur herbarum utero peculiares: ut artemisia, matricaria, pulegium, & si lien obstructus fuerit, addi etiam poterunt, quae illi peculiariter respiciunt, ut cortex capparis, ceterach, scolopendrium. Si vero biliosum fuerit temperamentum, & calidioris, & siccioris hepatis indicia apparuerint, calidiora omnia simplicia ex apozemate erunt detrahenda, & aperientia frigida eorum loco substituenda.

In puellis delicatioribus loco apozematis, juscula in dicta curatione obstructionis hepatis descripta usurpari poterunt, ejusdemque simplicia immutari, ut de apozemate dictum est.

Interim totus & linimentum dicto loco descripta admoventi debent, non solum Regioni hepatis, sed etiam lienis & uteri.

Peracta solenni purgatione, paretur sequens Balneum, ad vasa aperienda & relaxanda, & materiae obstructionum fundendam atque digerendam. Cujus tanta est efficacia, ut aliquando viderimus quibusdam aegrotantibus menstruas purgationes in tertio aut quarto balneo producere incepisse, quae per longum tempus antea delituerant.

℞. Rad. althaeae, liliorum alb. enulae campanae, bryoniae, cucumeris agrestis, ana ℥ ij. foliorum malvae, violariae, mercurialis, pulegii, matricariae, melissae, ana m. iv. seminis lini, & fenugr. leviter contusi, an. ʒ ij. coquantur in aqua fontis pro balneo, quod ingrediatur tepide, bis in die sine sudore, longè a pallio, per biduum singulis diebus decocto renovato.

Postmodum ultimi balnei, si mensium suppressio adfuerit, aperiuntur venae inferiores, & emittitur sanguis ad ʒ iij. idque bis aut ter repeti poterit eo tempore, quo menses fluere solebant. Aut si nunquam adhuc apparuerint, quo tempore agra magis affici, & gravius laborare solita est.

Absolutis hisce remediis, ad viscera roboranda, & obstructionum reliquias conterendas conveniet opiata aperiens & roborans, dicto loco descripta, cui utiliter foecula bryoniae & sal artemisiae ad drach. ij. utrinque addi poterit.

Quia vero non raro adeo contumaces sunt obstructiones, ut primis remediis non cedant; hoc casu syrupus magistralis parari poterit ex materia apozematis praescripti, aucta purgantium dosi, quo iterum agra bis aut ter in mense.

Pilulae etiam usuales erunt efficacissimae, quales in dicta obstructionis hepatis curatione fuerunt propositae, quibus utiliter addentur remedia ex tartaro, vitriolo, & chalybe composita, ibidem descripta.

Zacutus Lusitanus *Observ. 99. lib. 2.* proponit historiam cujusdam mulieris, quae chlorosim per decennium cum mensium suppressione passa erat, & variis purgantibus & aperientibus remediis, quibus chalybs etiam accesserat, curari non potuerat; hanc ipse curavit conservâ artemisiae, triginta dierum spatio exhibita, superbibendo aquam stillaticiam sabinae, in qua per noctem rhabbarum maduerat.

Idem Zacutus *Observ. 117. lib. 3.* aliam proponit historiam cujusdam virginis, quae multo sa-

le sese ingurgitans, ex diuturno atque assiduo illius usu incidit in diarrhoeam biliosam cum tunc implicitam. Quam ipse curavit, post totius providentiam, lacte caprino chalybeato, & frigidis hepatis applicitis.

In contumacissimis & diuturnis obstructionibus, cautum tibi dextra vel sinistra (prout hepar aut lien afficitur) inultum, plurimum conterre poterit.

Referatis magnâ ex parte obstructionibus humores pituitosi ac serosi, tum in vasis residui, tum praecipue in habitu corporis stagnantes, per sudores resolvendi sunt cui usui conveniet decoctum guajaci, in naturis frigidioribus, vel radices chinae ac sallaparillae, in calidioribus, per ij. aut 20. dies exhibitum. Hac cautione adhibita ut quarto aut quinto quoque die, intermisso sudore, catharticum detur, quod humorem circum viscera collectum praeparatum, ac concoctum, (ad sudores tamen ineptum) per alvum detrahat. Alioqui intus si restiterit ibi obdurefcens & putrescens febris & aliorum morborum occasio erit. In eundem finem thermæ sulphureae usurpari poterunt, quales sunt nostrae Balerucanae, tam potu quam balneo. Potu enim istarum aquarum, expeditis prius & liberatis viis, remediis antea propositis, detergitur, excluditurque humor, in primâ & secunda corporis regione contentus, per alvum & urinam profluvium; tertia vero regio excitata a balneo sudoribus ab humorum sarcina liberatur.

Ac denique congressus, si legitime fieri possit, post deobstruentium remedium usum, erit utilissimus; illo enim calor naturalis in partibus naturalibus multum excitatur, quo uteri vasa impensè dilatantur. Et docet experientia, interdum primâ conjugii nocte pallidis illis mensium fluxum, excitari: alius vero, quae optimâ fruuntur valetudine, tempus confluxum anticipari. *Lazar. River. Prax. Medice. lib. 15.*

In morbo hoc curando imprimis corpus cachecticum bene purgari debet, antequam ad deobstruentia (sic dicta) perveniat v. g.

℞. Rad. petroselin. foenic. glycyrrhiz. an. ʒij. sem. anis. & coriand. praep. ana ʒ j. crem. tartar. ʒ iv. sol. sen. mund. ʒ ʒ. pulp. tamarind. ʒ iij. s. decoct. & colat. addatur infusio ʒ iv. rhabbari seorsim fact. in aq. fumar. cum ʒ ʒ. santal. citrin. reducantur omnia ad dosin: in qua dissolv. man. calabr. syr. ros. pallid. comp. cum agar. ana ʒ j. m. f. potio danda in auror. ʒ hor. ante jusc. cum custodia.

Post diem unum aut alterum iteretur purgatio, a qua si non videatur satis vacuatus stomachus, sed supersit cruditas cum plenitudine, utile fuerit vomitum provocare vel data ʒ j. vitrioli alb. depurat. vel ʒ ij. vini emet. cum debita custodia, ita tamen, ut post purgationem, ante vomitorii exhibitionem, per biduum incidatur tenax humor exhibitio oxymel. syr. viol. cum spir. vitrioli bis terve in die & cochleari longè a partibus. Si vero sufficiens fuerit purgatio, a vomitorio abstinendum.

Purgatione generali praemissa ad deobstruentia deveniendum, quae vel cum purgantibus mixta, vel sola exhiberi possunt. Deobstruentium omnium basis est chalybs, in cujus



parationibus omne fert punctum anima hepatis  
toties laudata.

℞. Aloës opt. ʒij. specier. hier. rhubarb:  
agari. ana ʒss. Croci Martis ʒij. spec. diarrhod:  
Abbat. ʒj. croci ʒj. Aqu. Meliss. q. s. f. massa  
pil. Dosis ʒj. vel ʒss. per plures dies continuos:

Vel ℞. Rad. eucum. & aristol. rot. ana  
ʒijss. Rad. chelidon. maj. enul. ar. præp. valer.  
sylv. calam. aromar. croci Angl. ana ʒj. flaved.  
aurant. & citri sicc. cort. saff. tr. ana ʒiv. sem.  
trifol. odor. Sem. Myrrhid. ocul. cancr. & chel.  
cancr. marin. maj. constellat. C. C. vitriolati  
ana ʒv. flor. matricar. agerati ana ʒij. Trita  
omnia seorsim in alkool. ponderata & mista ex-  
cipiantur, f. q. Mellaginis liquida, bacc. junip.  
& f. *Electuarium*.

℞. Hujus Elect. ʒiss. Croci Mart. Tartarel  
ʒss. resin. Gambodiz gr. vi. viii. vel x. pro una  
dosi: capiat doses xx. xxx. xl. superhausta ala  
inaciata calente, & superambulet.

Vel omnia resina Gambodiz, loco mellagi-  
nis bacc. junip. excipe species syr. vel succo  
inspillato bacc. spinæ cerv.

Vel si purgantia omittere velis, ad formam  
seq. formentur *Tabella*.

℞. Croci Martis aperient. ʒijss. conf. Al-  
kermes ʒis. magist. perl. & corall. ocul. cancr.  
præp. ana ʒij. cort. citri & aurant. sicc. condit.  
ana ʒiss. rasur. C. C. primar. rec. ʒvi. ossis e cord.  
ejusdem, cinam. ana ʒiij. sacch. ʒij. f. omnium  
pulvis ut alkool, excipiend. mucilag. sem. mal-  
væ extract. in aq. cinam. f. pasta ex qua formentur  
*Tabella* æqualis ponderis num. 10. pro toti-  
dem diebus. Cap. mane hor. 4. vel 5. ante pran-  
dium superambulando per horas duas; super-  
hauriat aliquid vini absinthit.

*Tabella Diarriari*. ℞. Crem. tartari albiss. ʒss.  
Ocul. cancr. cum succ. limon. præp. gr. ix. fla-  
ved. extinz citri sicc. cinam. inter. ana gr. i. r.  
curcunt. sal. absinth. cochmell. anim. hepat. ana  
gr. iij. Omnia subtiliss. pulv. excipiantur muca-  
gue admodum liquida rad. alth. aut sem. ejus-  
dem vel malvæ, & f. *Tabellæ* pro una dosi, quæ  
ulius tempore reducat in bolum cum syr. flor.  
veton. rubr. vel dissolvatur in jusculo vel posse-  
to. Sumatur hor. 4. ante prandium per plures  
dies; inter præparandum teratur massa optime  
in mortario a mureo & exacte subigatur.

Alterius autem diebus capiat. pil. stomach.  
cum gum. ʒij. horæ quadrante ante levem cæ-  
natn. vel vesperti ling. diebus pilul. tales.

℞. Gum. Animon. in vino generos. vel ace-  
to scillit. dissolut. ʒi. Aloës ʒj. myrrhæ ʒij.  
croci ʒi. sal. absinth. & artemis. ana ʒj. sal.  
corall. ʒiv. M. & cum syr. de artemis. vel oxy-  
mel. scillit. f. pil. Dos. ʒj.

Si chalybeata minus arriserint, sequentia ut  
plurimum sunt utilia.

℞. Rad. Petrosel. fœnicul. gram. asparag. ana  
ʒss. raf. C. C. ebor. dent. equi marin. ana ʒij.  
livar. Corinthiac. c. ppar. a sale mundat. ana  
cochlear. j. sem. alkekeng. & nulli solis ana ʒijss.  
Includ. omnia ventre galli gallinacei, qui con-  
suetus elixetur cum fructo carnis vitulin. addend.  
sub finem coctionis fol. borag. bugl. caryophyll.  
adianth. polytrich. ceterach. ling. cervin. salu.  
vit. hepatic. ana p. jss. flor. calend. vetonic.  
rubr. primul. ver. violar. ana p. ij. cort. pomor.  
redolent. m. j. Reduc. ad ʒxxiv. pro 3. dosibus

matutinis, in quarum singulis dissolv. crem. tart.  
vulg. ʒij. magistralis ʒj. m. exhib. 4. hor.  
ante prandium cum exercitio. Repetatur ad  
placitum.

℞. Rad. oxylap. chelid. maj. ana ʒij. Rad.  
filic. fœm. cichor. taraxac. gram. asparag. fœni-  
cul. rusc. ana ʒj. fol. agrimon. chamædr. cha-  
mæpit. hyperic. capillar. omnium ana m. j. fl.  
calendul. genist. rubr. ana p. 2. sem. anis. fœnicul.  
dule. coriand. ana ʒij. pom. redolent. num. 3. f.  
omnium decoctio & colatura, quæ levi coctio-  
ne reducat ad ʒss. In qua dissolv. syr. de  
cichor. simpl. & de 5. Rad. ana ʒij. M. f.  
*Apozema* clausat. aromatiz. cochi uno aqu.  
cinam. pro 4. dosibus in die sumend. longè à  
pallibus, continuand. per plures dies.

℞. Rad. sicc. chelidon maj ʒvi. Rad. cich.  
taraxac. petrosel. rub. tinct. ana ʒss. verm. ter-  
restr. præp. ʒj. flaved. aurant. condit. sicc. ʒiij.  
Sem. Alkekeng. milu solis, myrrhid. bardanz  
ana ʒij. spodi ex ebore, C. C. calcu. reduct. in  
magister. cum ol. vitrioli, ocul. cancr. corall.  
rubr. cum succ. limon. cephlegmat. apert. ana  
ʒijss. crem. tartari utriusque ana ʒv. spec. tr on-  
dant. j. host. ʒiss. sal. artenai. & absinth. bis  
ust. ana ʒiv. Terantur terenda ut alkool, om-  
niaque mixta excipi. ntur syr. de cich. simpl. &  
de quinque rad. & nat *Electuarium*. Dosis ʒij.  
vel ʒiij. super hausta cerevis. absinthite vel poti  
sequent.

℞. Sarsaparil. ʒviij. rad. filic. fœm. oxylap.  
ana ʒxij. rusc. asparag. ana ʒiv. lign. saff. tr.  
cum cort. ʒiij. fol. agrimon. melil. capillar.  
omnium ana m. ij. fl. genist. sambuc. & garyo-  
phyl. ana p. 3. nuc. moschat. ʒj. Includantur  
omnia sacculo e telatara, quæ pendeat in gal-  
lon. vi. cerevis. non lupulat. recent. utatur pro  
potu ordinat. dum sumet electuarium præ-  
scriptum.

N. B. Satius est uti iis quæ remonent impe-  
dimenta quàm naturam impensius irritantibus.  
*Theodor. de Mayerne Prax. Medic. lib. 3.*

*Curatio Chlorosis* absolvitur primo V. S. præ-  
cipue in talo, si malum recens est, nec sanguis  
in alium humorem degeneravit, imprimis si à  
sanguinis evacuatione suppressa oriatur.

1. *Purgatione*, præmissis præparantibus.

3. *Deobstructione*, in qua omnium viscerum  
habenda est ratio. Mensum imprimis suppressio  
maxime attendenda venit.

In Dieta acetum fugiendum. vid. *Franciscu  
Ranchini Prof. Mompellensis de Morbis virginum*  
qui instar omnium esse potest: Exstat item *Di-  
sputatio inter Basilienses de hoc affectu* lectu digna.

Purgantibus semper digestiva & aperientia  
præmitti debent. Digestiva & aperientia simul  
sequentia sunt.

℞. Croci Martis aperit. ʒss. Sal. cichor.  
fraxini ana ʒj. fœcul. Bryoniz ʒij. M. F. Digestiv.  
Datur a ʒj. ad ʒss.

℞. Croc. Martis aperitivi ʒss. fœcul.  
Bryoniz ʒj. Sal. aperitiv. ʒij. M. F. Digestiv.  
Pulvis.

℞. Tartar. vitriolat. ʒj. Sal. cichor. fraxini,  
uterini ana ʒj. M. D. in 6. p. æqu. S. Digestiv.  
Pulvis.

℞. Essent. chalyb. liquid. aperit. splenet.  
bovis ( si lien simul laborat ) ana ʒij. S. Dige-  
stiv. Essent. Dos. gutt. ʒo. vel 60.

Vel



Vel ℥. Essent. aperitiv. chalyb. liquid. ana ʒiſs. M. S. ut supra.

℥. Aqu. Aperit. compos. ʒiv. Syr. aperit. Minder. ʒij. Essent. aperit. chalyb. liquid. ana ʒiij. M. Dos. cochl. j. vel ij.

℥. Elix. propriet. aperit. ad menses ana ʒij. M. purgantia (vomitoria etiam si vites ferant) adhiberi debent, & possunt.

℥. Pulv. Diapalap. Mynſ. ʒj. Agar. trochisc. croci Martis Sacch. ana gr. viij.

℥. Pulv. rad. Jalappæ ʒj. Croci Martis Saccharini, ſcſcul. Bryon. ana gr. vj. Scam. sulph. gr. ij. M. D. & S. ut ante.

℥. Pulv. phlegmagog. ʒj. Scammon. sulph. resin. Jalapp. ana gr. v. Vitriol. croc. Martis Antimon. gr. ij. (ht ex regulo croco Martis & Antimonio.) M.

℥. Agar. trochisc. ʒʒ. Pulv. rad. Jalap. ʒʒ. Scammon. sulphur. gr. iv. Tartar. vitriol. ʒʒ. conserv. & syr. ros. q. ſ. pro efformando bolo.

℥. M. P. de ammon. Quercet. Tartar. Ejusdem ana ʒʒ. Scammon. sulph. gr. xij. Extract. troch. alhand. gr. v. F. l. a. Pilulæ num. xxiv.

℥. M. P. de Sagapeno ʒj. resin. Jalapp. gr. vi. Extr. troch. alhand. gr. ij. c. ſ. q. Essent. ch. lyb. liquid. F. l. a. Pilulæ.

℥. Extract. diacartham. ʒj. troch. alhand. gr. ij. Croci Martis aperit. gr. vi. F. l. a. Pilulæ num. xxi.

℥. Extr. diacartham. ʒj. Scammon. sulphur. gr. vi. Extract. troch. alhand. gr. ij. F. l. a. Pilulæ.

℥. Extr. chalyb. resin. Jalappæ, Scammon. ros. Tart. rati ana gr. vij. F. l. a. Pilulæ Adſperg. ſcſcula Bryoniz.

℥. Extract. diacartham. ʒʒ. dissolve in ſ. q. Aqu. aperitivæ, adde Scammon. rosati gr. v. Essent. croc. Mart. liquid. aperit. ana ʒj. Syrup. aperit. Mindereri q. ſ. F. potiuncula.

℥. Essent. croc. Mart. liquid. aperitivæ ana ʒj. Extract. diacartham ʒj. Syr. de pom. laxat. q. ſ. F. l. a. Potiuncula.

℥. Pulv. cathol. purg. ʒj. Essent. aperit. croc. Mart. liquid. ana ʒj. Syr. de pomis laxat. F. l. a. hautilulus.

℥. Herb. agrimon. cusc. Marrub. ana Mj. Florum Borræg. lugloſi, Cichor. genift. Epat. Nob. ana pug. i. Rhabarb. Monach. ʒiſs. Rad. Helleb. nigri, filicis ana ʒj. v. aperient. ana ʒij. Sem. Carthami ʒvi. Agar. albiſſ. ʒiij. Cinamo. m. elect. Caſſiæ lignæ veræ ana ʒij. Caryophill. ʒiſs. ſpic. ʒj. Sal. Tartar. albiſſ. ʒiſs. F. l. a. Nodulus.

℥. Agarici albiſſimi ʒij. Rad. Jalapp. ʒiv. Adſperg. Tartar. tinſur. a. infunde per noctem in ſ. q. Aquæ aperitivæ compos.

Adde syr. de pom. laxat. ʒʒ. Essent. croc. Mart. liquid. ʒj.

Hiſce præmiſſis ſequuntur *Conſtantia.*

℥. Pulv. cachect. Q ʒij. ebor. ſine igne ſpec. diarrhod. abbat. ana ʒj. cum ſ. q. Sacch. Aq. Scorzonæ. diſſol. F. l. a. Rotulæ.

℥. Fboris ſine igne calcin. ſcſcul. Bryoniz ana ʒj. Pulv. cachect. Q ʒiij. ſpec. diarrhod. Abbat. ʒiv. Joh. Michæ' in praxi. clinie. gener.

Curam quod attinet, quid melius quam jucundo amplexu tam moleſta exterminare mala? Quod ſi hoc ipſum non liceat ad remedia alia accedendum. Verum pauca admodum, ut

horum affectuum, ita & remediorum ap. prædicos eſt mentio: Eo tamen imprimis quoad indicationes eſt collimandum, ut liquoris genitalis ſ. ſeminalis vitium corrigatur, & maſſ. ſanguineæ hinc derivata vitia & craſis emendetur ac denique variis inde ortis ſymptomatis remediis appropriatis obviam eatur. Ut à poſteriori incipiam: ſymptomata horumq; truculentiam optime remonent opiatæ ſpecificis miſta. Sed hæc ipſa opiatæ non curant morbum radicatus, ſed ſaltem ferocitatem ejus palliando occultant.

Quæ ergo ſeminalis liquoris corruptelam corrigere valent, erunt imprimis *camphora* & *camphorata* quæ non tam abſumunt quantitatem, quam corrigunt virulentiam hujus ipſius liquoris, hinc & maſſ. ſanguineæ & ſpirituum animalium vitia mire emendant: Nam ſingulare aliquid in hiſ affectibus latet in *camphora*: Unde & peſtifera miſmata tum potenter corrigit, eorumque violentiſſimam ferocitatem mitigat & obtundit. Hiſ adjuncta *ſuccinata* erunt proſicua: Nam præter vim corrigendi malignitatem ſeminalem, ſal. ejus vol. oleoſum ad hyſtericas aliasque convulſivas paſſiones mirum eſt auxilium. *Myrrham* etiam non contemnendi uſus putarim non minus quam *Caſſoreum*. Denique ex ſaturno parata remedia tam ejus ſal. ſ. Saccharum quam c. ſpiritu nitr. aut ſolo, aut c. aceto diſtillato acuto, tam ex minio, quam ex minerâ ſaturni parati cryſtalli: Hi enim & vitioſos ſapores ſuccorum corporis corrigere & præternaturales ſanguinis efferveſcentias potenter compeſcere valent. Moderata acida ex citro imprimis petita, item ex *granatis*, aut *cydoniis* erunt proſicua. Hiſ intermiſcenda ſemen extinguentia dicta ut ex vitice, ſalice, cannabi, ac ſimilibus elicta medicamina, forſan & *Balſamica Terebinthina* viſ genitalibus locis imprimis dicata erit non inutilis.

*Vene ſectio* denique ubi opus fuerit interdum cum prudentia inſtituenda: imò habitâ circumſtantiarum ratione repetenda erit. Verum cum raro occurrant tales affectus, eorum medelam vel primariam inmiſſe ſufficiat. *Mich. Kohnmuller. de morbis mulierum cap. 3.*

### Conſultationes.

Illuſtris, & admodum reverenda virgo quoniam habitu decore, & formoſo donata eſt a natura, ea propter non miretur aliquis (quod tumor, & mæſtitia demonſtrant) ſi in affectionem melancholicam inciderit, ſolent enim quæcumque ex ſeminis pulchriores hoc genis mali, atque quodlibet aliud ſimile ex pravis ſuccis uſarum incurtere, cujus nulla alia (ut obiter hoc ſit dictum) cenſetur ratio, niſi quod ſeminæ quo formoſiores, & colore vividiores, eo etiam temperatiores, & quo corpus earum eſt temperatius, eò etiam plures illius partes purius, atque temperatius alimentum exoptant, ſi alimentum, & alitum ſimilia ſunt, quare alimentum quod remanet in corpore ſit deterius, & intemperatius oportet, quod per univerſum corpus propagatum, ac diſtributum affectus præter naturam prætaſtos producit.

Atqui melancholiam, de qua agitur eſſe, quam ſtatualem, & hypochondriacam dicunt,



hæc attestantur, ventriculi languor, inappetentia, dolores, ac flatu per unum ventrem discurrentes, urina copiosa, cruda & turbida, ac tandem alvus stiptica, verum hanc eandem affectionem esse conuulsam durities in medio ventre cum magno pulsu, cordis palpitatio cum tussicula, & pectoris dolore, totiusque macies, ac lassitudo demonstrat, nec capitis dolor, vigilia, auriumque tinnitus affectionem a capite, & non ab hypochondriis oriri suadent, quando hæc cum symptomatibus ad hypochondria attinentibus iuncta melancholia ab hypochondriis, & non a capite (materia vaporosa in caput idem effumante) sint argumenta.

Quod verò postremo sit melancholia hypochondriaca ob uterum male affectum indicio sunt menses imminuti, valde decolorati, ac sine ordine prodeuntes, potissimum vero morbus virginis; febris alba a quibusdam vocatus, qui quidem virginis morbus, sicuti foemina obrationem a principio adductam contingere quoque solet ita & pro sui characteris, ex Hippocrate in lib. de Morb. Virg. habet ventrum præcordiorum obstructionem cum sanguinis crassi affluxu & permanente, qui cum transmissus ab hepate ad uterum non potuerit vel ob sui crassitudinem, vel quia incidit in venarum oscula propria sorte angusta, expurgari, necessarii ad hepar, & præcordiorum venas recurrit, & regurgitat, obstructionemque parit, a quo varia incommoda, in nobili autem vultu quæ proposita sunt suboriri necesse est, & quoniam præter timorem, anxietatem, corporis segnitiam, & quamplura alia mala pulsus celer, ac frequens plus iusto, deficiente debita ventilatione sub morbo virgineo evadit hinc hic ipse a quibusdam febris nominatur, cum tamen sui natura sit frigida, quoniam per ipsum calor ingenuus ex magnis obstructionibus strangulatur, & veluti suffocatur, proutque corpus universum ad intemperamentum frigidum perducitur, quia humores recrudescunt, refrigerantur, crassescunt, & impactiores fiunt, quod in aliis obstructionibus nuncius usu venit, quia humores sub his ex prohibito transpiratu potius incalescunt, febris vero eadem quæ infirmissimas virgines apprehendit, albo faciei, labiorumque colore alba dicitur, sub qua palpebræ ac crura prope malleolos sæpe etiam intumescunt, ut affectus virginis icterus quidam albus existeret videatur, nam quemadmodum ex bilis effusione in cutem icterus flavus, ex effusione melancholicæ, icterus niger producit, ita etiam & ex pituitæ effusione icterum album oriri nemo erit qui neget.

Sed jam ad melancholiam nostram hypochondriacam redeuntes, generationem, & modum generationis illius adducamus, quocirca si ad Galenum 3. loc. aff. 7. respiciamus, proculdubio affirmandum, in venis hypochondriorum ex obstructionibus ibidem factis phlogosim quandam generari, merito cujus exhalatione atra, & terrea in cor effumante cor anxius reddi & spiritus animales obscurari, hincque timorem, & anxietatem derivari oportet, nec obstat quod Galenus eo loci ventriculum, & lienem, non autem uterum proponat, ut propterea sententia illius non videatur accom-

modari melancholiam nostram quæ ex utero pendet, quoniam responderi potest quod Galenus, meminit earum partium tantum exemplificans, non autem ex proposito loquens, proinde Avicennas non tantum uterum, sed etiam mesenterium ac jecur ex proposito loquens proponit: quod si ad morbum virginum animum convertamus, qui est affectus frigidus, jam non a phlogosi, & hypochondriorum altu, sed eorum frigiditate hanc melancholiam oriri contra Galenum est statuendum.

Quare ut hæc lis dirimatur, dicendum, generationem, & modum generationis melancholice hujusce nostræ sic perquiri posse, quod nimirum illius principia generationis in agentis efficaciam, & passi habilitatem referantur, Agens efficax est exhalatio atra, & terra cordi, & cerebro communicata, elevata a minera simili non legitima sed spuria, cujus mineræ causa generans tum effectrix est frigiditas, seu intemperamentum frigidum non modo uteri, sed etiam præcordiorum.

Verum cum ad præcordia ventriculus, mesenterium, jecur, atque lien referatur, merito dubitari potest an omnia hæc viscera, an vero aliqua male habeant; De ventriculo igitur (ut res hæc deceatur) nulla est difficultas, quando inappetentia & languor illius aperte demonstrant ipsum male affici, sed & durities in medio ventre mesenterium ipsum laborare ostendit, solum igitur de liene, ac jecore est difficultas, quoniam tametsi sub morbo virgineo femina colore albo sint referta nihilominus jecore affecto cum colore illo flavities aliqua, sicuti liene laborante sub nigredo conjungitur, quorum in literis missis nulla penitus sit mentio, ut propterea aut jecur, & lienem omnino intacta esse, aut saltem a statu naturæ vix recedere sit constituendum; Utrumque autem sit, intemperamentum frigidum jam propositum ab caloris ingenui ob magnas obstructiones in visceribus illis extinctione ortum ducit, ad hæc enim obstructiones semper affectum frigidum sequi scribitur ab Hippocrate & Gal. 4. act.

Quod vero minera melancholica spuria ex frigiditate, sicuti legitima ex calore nascatur Aetius & Avicenna, primum tamen Galenus 3. de Sympt. cau. 2. scribit, sanguis enim dicit Galenus, nigrescit, & ob id melancholicus ex frigiditate evadit, nam ab hac, partibus sanguinis Diaphanis & limiosis expressis sanguis idem nigrescit. Et si quis objiceret quod Galenus 3. loc. aff. cit. de generatione melancholice hypochondriacæ loquens phlogosim, & non frigiditatem proponat, hic ipse sciat, Galenum id quod ut plurimum accidit respexisse.

Causa vero materialis ejusdem mineræ melancholicæ spurie est sanguis menstruus copiosus, ac crassus in vasis viscerum prædictorum præter naturam retentus, non ob angustiam vasorum naturalem, quoniam molestiæ quas nunc patitur ante biennium inciperunt, quocirca menstruum retentum fuisse ob sanguinis crassitudinem ac visciditatem vasa obstruentem a pravo victu, & aliis similibus occasionibus externis acquisitam putamus. Nec obstat quod menses aquosi prodeant, quia tenuior pars percolatur, & crassa retinetur, quæ in vasis conclusa frigiditate viscerum nigrescit & a calore ali-



quod præter naturam in vas prædictis concitato in cor ac cerebrum effumat nec enim inconvenit in corpore quantumcunque etiam refrigerato calorem aliquem extraneum & ultra leges naturæ excitari qui & putredinem efficere, ac tum os elevare possit, exemplo sunt corpora hydropticorum alioquin refrigerata, in quibus & putredines fieri, halitusque elevari quotidie videmus; & hæc de agentis efficacia.

Subsequitur modoabilitas passi perpendenda, ad quæ duo Hippocrates in libro de morbis virginum totam earum melancholicæ constitutionem reduxit, retulit vero habilitatem corporis mulieris ad pusillanimitatem, & timiditatem, cum etenim semina frigidiores sint, propterea ex Aristotele, Avicenna, & aliis pigra, ac segnes sunt proindeque quavis causa, levi concitante, animo deiciuntur, animositas enim, ut in ore onium positum est, à calore proficiscitur, quapropter si halitus ater spiritibus animalibus permisceatur, virgines, imò vero & omnes alie feminae obinnatam timiditatem affectui melancholico obnoxie fiunt, quod illustri & nobili vestali accidisse liquet.

Verum tamen quoniam affectus melancholicus ob caloris ingenti omnium operum vitæ opificis jacturam, quam illi infert, omnium malorum veluti seminarium existit, minimè alicui mirum videri debet, si tot incommoda nobilis hæc virgo sustineat, hæc enim veluti germina ac partus affectus jam propositi existunt, quandoquidem calore nativo depauperato, ac lacescito, succi crudi, & ex succis crudis, ac alimentis status quam plurimi gignuntur, qui ad diversas partes distributi, ac relegati eas male efficiunt, & incommodant, cunctaque mala, quæ in historiis describuntur gignunt.

Quibus ut Medicus præsto sit, in id incumbere debet, ut caloris nativi jacturam submoveat, atque hunc ipsum tum toti, tum singulis ejus partibus præcipuis reparet, ea tamen ratione ut prius totum à colluvie excrementorum vituitorum, & melancholicorum expietur, deinde obstructions ac sanguinis menstrui vitia propriis præsidiiis attenuantibus, detergentibus, ac impetum illi ad uterum perhibentibus emendet; tamen si prouincia Medico curanti valde ardua, ac difficilis offeratur, ut vix metam attingere posse putandum sit, affectus enim est vehemens, & vires totius corporis rectrices ferè superat, quod ex his facile est intelligere, primum enim affectus de quo agitur secundum propriam essentiam est cum ingeni lapsu à naturæ statu; Symptomata plura, & hæc ipsa magna adjunguntur, causæ vehementer agunt, ut atrophiam ipsam iminentur. Secundò viscera omnia naturalia, vitalia, ac animalia, imò vero, & totum ipsum corpus, ut de se liquet, labem ex inrigiditate aliquam contraxerunt, postremò adeo difficulter, (uti pulsus languor, totius marcor & lassitudo ostendunt) vitium hoc à facultate regitiva tolleratur, ut hæc ipsa quasi succumbere videatur, nihilominus Deo, Optimo Max. auxiliante spero ob patientis obsequentiam, prudentiam, ac florentem ætatem futurum, uti si affectus propositus, ejusque Symptomata non penitus cedant, saltem imminuantur, quod per materias medicas proponendas obtineri posse existimo.

Et quantum ad chirurgicas spectat, hoc tempore cauteria femoribus secundum partem domesticam infixa laudamus, mox obstructionibus aliquo modo referatis, ac sanguine per calescentia, & concoquentia ad meliorem frugem deducto, scarificationes malleolorum, vel potius cucurbitulas scarificatas suris tibiæ hinc inde applicitas non improbanus, sicuti nec frictiones humidas nunc toti corpori præhabita totius providentia, posthac partibus infernis ex aqua ardenti, vel elixire vitæ adhibitæ vituperamus, imò verò & cucurbitulæ siccæ femoribus secundum partem domesticam citra scarificationem applicitæ, ubi usus postulabit, videntur opportuna.

Pharmaca administranda evacuantia, & alterantia erunt, in serie priorum non tantum ea quæ sensibiliter, sed etiam insensibiliter agunt arident, quæ sensibiliter evacuant sunt lenientia purgantia & menses evocantia, lenientia quæ hic opportuna videntur, sunt vel syrupus de polypodio magistralis cum mel. rosol. vel hiera cum Diacatholice, purgantia verò, quæ placidiora selgantur, & per intervalla, ac vices usurpentur, nam corpora magnis obstructionibus referta medicamentis vehementibus non sunt irritanda, & humores crassi, ac viscidissimi vice non possunt concoqui, & evacuari, sed sensim concoquendi, sensimque evacuandi sunt, pilulæ igitur de tribus cum Rhabbaro, de hiera cum agarico Mes. de Sageno Mes. probantur, quibus portio aliqua vel epithimi, vel ellebori nigri præparati est addenda, huc quoque referendum infusum agarici troiscati & ellebori nigri præparati cum syrupo de polypodio magistrali, item & cydoniatum ex carne cydoniorum in vino decoctionis polypodii, & epithimi cum saccharo coctæ & pulvere radice mechiocani factum, postremo & vinum ex sena, & carthamo cum radicibus buglosi paratum, item & triphera de epithimo, nec non Diachartamum ex descriptione Nic. Florentini addito pulvere senæ præparatæ compositum.

Menses evocantia hæc placent, primum ex aqua pimpinellæ, & croco paratur, alterum est pulvis radice gentianæ ad drag. j. ex jure cicerum rubeorum quotidie datus. Tertium est sal Sabinæ chemicum ad scrup. i. ex decocto pulegi exhibitum. Quarto Cattoreum devoratum ad idem conducit, sicuti & medicamentum quod fit ex æquis portionibus boracis mineralis, & cassiæ lignæ in formam potus cum aqua adianti exceptis. Quinto antidotus hæmagoga. Sexto oleum vitrioli Romani ad scrup. f. in vino decoctionis betonicæ & matricariæ exhibitum. Postremo est vinum chalybeatum quod componitur sic.

℞. Vini albi generosi lib. 12.

Aqua stillatitia maritima lib. 3.

Foliorum Diptami Cretics

Pulegii

Colaminte

Origani Orientalis

Sabina

} an. pug. 1.

Radicis cistoidis

ciperi

} an. unc. 1.

Cinnæ



Cinnamomi  
Macis } an. dragm. ij.  
Sem. dauci }

*M. & bulliant in duplici vase ad consumptionem quintæ partis, deinde addatur lib. j. limatura chalybis prepar. & omnia reponantur in vase vitreo bene obturato, vasque in suffia furnaria per decem dies continuos detineatur. & quotidie vas agitur. Dosis est ab unc. iij. ab lib. i.*

Chalybs quoque fusus Magni Ducis Hetruriz ad drag. ij. in decocto ueritæ ad plures dies bibitus huc est referendus.

Pharmaca insensibiliter evacuantiâ, quæ post totius prospectum ad pituitæ dissipationem conveniunt, tamen plura sint, duo potissimum possunt illustri, & Reuerendæ Veltali usui esse, Primum est antidotus magna medicæ ætatis intervallis quibusdam devorata; alterum est jus columbi torriti, vel (quod magis probatur) galli antiqui, in quorum ventre lignum Indicum, sassafra, radix cinæ, lignum visci quercini, betonica, melissa, capillus ven. Ceteræ, cuscuta, artemisia, menta, passulæ, & tartar. vini albi sint incocta; exterius quoque abdomini spongiz madefactæ in decocto eorundem simplicium facto in aqua, & vino odorato, adhiberi poterunt.

Occurrunt tandem medicamenta alterantiâ, quæ vel ad materiam crudam, vel ad obstructions, vel ad viscerum intemperamenta diriguntur, si ad cruditatem materiæ primum syrupi de betonica, acetosus de radicibus, & de artemisia diluti cum jure columbino decoctionis betonice, palegi, boraginis, melissæ & artemisiz, deinde syrupus de calamento, vel oxymel scyllinum cum decocto matricariæ, vel Diacalamentum, vel Diatrium pipereum probantur.

Si ad obstructions præter alia jus columbi, & galli superius propositum, adjectis ladidibus aperientibus maxime laudatur, quod magis proderit, si ante syrupum matutinum bolus ex gummi ammoniaco, & sale absinthii dletur, quo pertinet infusum radices scorchiõneræ in vino odorato, adjecto pulvere lapidis Bezoar, & vini n quod ex infusione chalybis supra propositum.

Potterio si alterantiâ ad intemperamenta viscerum pertineant, pro ventriculo præter nucem mulcatam concheam, ac radicem gingiberis, & pulverem Angelicæ odoratæ, maxime extollitur, stillicidium radmotum ex oleo amygdalarum dulcium, & vino Cretico cum polio montano, absinthio; menta, nuce myrrhica, cinnamomo, ligno sassafra, myrrha, Benzoino, & mastiche in duplici vase ebullitis factum, à quo ceratum ex mastiche pulvere Angelicæ aromatizatum appositum juvabit, sicuti & lana illota, insectorio coctio infecta jugiter gestata. Pro mesenterio in medio abdominis indurato stillicidium pariter ex oleis amygdalarum dulcium, & semine lini, in quibus in progressu radix peucedani & cucumeris agreitis sit incocta maxime juvabit, à quo pariter superdandum ceratum ex oleo seminum lini ad spissitudinem cocto pariter in progressu addita portione cerati. Ex quibus apparet, nec lac nec balneum aquæ dol-

cis hoc tempore ob caloris nativi indigentiam, ac labem ex frigore contractam convenire.

De victus ratione statuendum moderate attenuantem convenire, quem nobis Galenus in proprio tractatu reliquit, solum igitur notamus primum pulverem coctilem ex pane biscocto, agalloco, cariophyllis, croco, & coriandris cum saccharo cibarum esse inspergendum; præterea, vinum fulvum auratum, vel calybeatum in coena, & prandio continuo potandum esse, immo vero vinum in quo chalybs præparatus cum pulvere coriandrorum per sacculum maceratus continuo detineatur maxime probatur, sicuti & quod tempore hoc vinde-  
mianum instante cum roremarino, radice buglossi, china, & ligno sassafra pro tota hyeme conchitur; Postremo pro alio irritanda præter clysteres emollientes, laudantur hæc: primum sal tartari albi, vel Mercurialis chymicum ex ovo forbili assumptum. Secundo caricæ pingues in quarum medio granum salis positum sit in prima mensa commanæ. Tertio pruna dulcia primum in manna dissoluta, ex infuso senz infusa, deinde manna simplici antequam ex toto liceantur oblecta; Postremo aloes succotrina in succo babinæ nutrita. Atque ut hæc in salutem hujus dignissimæ Virginis cedant D.O.M. precamur. *Jus. Cesar Claudin. Consultationum Medicinal. libro.*

Barbara Margareta filia viri Nobilissimi Domini C. A. K. p. m. ab anno decimo quarto ætatis usque ad decimum septimum menstruatim & ordinate per uterum purgabatur: Hinc fructibus horariis & lacte, piscibus item, aliisque cibis crassis & viscidis copiosius, frequenterque ingeltis, menses subititære; faciesque & labia ex colore roseo in subalbidum & virecentem mutari, totumque corpus, maxime crura, & pedes intumescere coeperant. Accessit, & capitis dolor, ciborumque fastidium & murmura, rugitusque ventris cum hypochondriorum tensione, interdum & cordis palitationes moleste erant, spirandique difficultas, maxime à concitatore corporis motu.

Ex trava victus ratione humores crudos, & viscidos in corpore collectos, sanguinique pernixtos mensium retentionem induxisse statuo, quatenus obstructis uteri venis sanguini menstruo denegatur effluvium.

Ex hoc fonte reliqua seaturiunt symptomata: *Facies & labia pallent* ab humore pituitoso, & seroso ad ambitum corporis & cutem delato.

*Totum corpus, maxime crura, & pedes intumescunt* ob eorundem vitiosorum humorum abundantiam, quorum potissima pars ad pedes decumbit.

*Capitis dolor* à vaporum adscensu, quatenus membranz cerebri ab iisdem distendantur, dependet.

*Ciborum fastidium* impedita chyli distributio; crudique humoris copia excitat.

*Murmura rugitusque ventris* à conclusis & hinc inde divagantibus flatibus moventur.

*Hypochondriorum tensio* à sanguinis ad majora vasa refluxu, dimanat.

*Cordis palpitatio spirandique* maxime post motum concitatiorem, difficultas, suboritur à vaporibus, qui è sanguine crasso & impuro per motum incalescente elevati, respirationis orga-



na comprimunt, cordique molesti sunt.

Humores itaque vitiosi evacuandi, obstructions viscerum referendæ, intemperies corrigenda, mentes provocandi, & victus ratio memorandæ.

Evacuationi præmittenda est viarum communium relaxatio & humorum præparatio. Illud prunis nostris laxativis, hoc emulio supra descripto obtinimus.

Purgationem ipsam pulvere nostro panchymagogo instituiamus. Ad viscerum autem obstructions expediendas, intemperiemque corrigendam, vinum medicatum præscripsimus, quod simul & menses movet.

℞. Iol. meliss. Chamadryos, Arthemis. Agrimon. ana m. ss. Sabinz. Rad. Enulz, ieds, rubiz tinct. ana ʒ ss. Sars. parill. ʒvi. Flor. cheiri, rorismar. apic. Rav. lil. albor. ana p. i. Sem. claucci, anis. fœnicul. ana ʒ ij. Croci integri ʒ i ss. Incisis & conquassatis affunde vin. Rhenani albi q. s. bibat manè & vesperti cyathum unum uncias circiter quinque continentem.

Verum cum pertinacia mali hæc omnia eluderet. duro nodo durum ratus quærendum esse cuneum, corpus denuò evacuavi, exhibito pulvisculo exiguz quantitatis, sed magnæ efficaciz.

℞. fœcul. Bryon. ʒj. Magister. gummi de Goa gr. x. ol. thiliat. niacer. gr. j. M. F. pulvis ex aqua cinamomi sumendus in aurora, cum jejuniis & custodiâ.

Hinc Electuarium meum chalybeatum per dies 14. singulis matutinis cum vino melissato hauriendum præscripsi.

Postmodum denuò pulvisculum ex Magisterio gummi de Goa exhibui, cujus iterato, & efficaci usu humor serosus in tantum absuitus est, ut pedes manifeste detumescerent, & vena tali, quod antea propter œdema non erat integrum, aperiri posset, quo factò menses erupere, perfectaque quâ in hunc usque diem gaudet, subsequuta est sanitas.

Interea toto curationis tempore victum commendavimus ex cibis boni succi, & facili coctionis, interdicto frigidorum, humidorumque ut & flatulentorum usu, leguminibus scilicet & oleribus, piscibus, carne suillâ, anserinâ, anatina, jurulentis, lacte, & lacticiiniis, fructibus horariis, & imprimis aceto, quod calorem viscerum debilitat.

Pro Potu ordinario obtulimus cerevisiam melioris grani & vinum Rhenanum, quandoque & sextarium, sed parcius.

Cætera vigilias & somnum, animi pathemata, motum & quietem &c. omnia moderata esse iussimus; excretionem autem nisi quotidianæ per naturam essent, art. promovimus. *Badass. Timæu casum Medicæ. lib. 4.*

Honestæ virgo, 25. annum agens, à nativitate totius temperamentum calidum & humidum sortita, pravis eduliis semper de more enutrita, pallida facie, satis tamen formosa, cui parca menstrua, nec ante 18. annum apparuere, continuo circa viscera naturalia aliquod incommodum passa fuit, sed postquam duobus ab hinc annis ei menstrua omnino defecerunt, mæsta & timida evadere capit, cum sensibili cordis oppressione atque palpitatione, & difficili quadam respiratione strangulationem æmulante; nec non hypochondriorum tensione, &

coxarum atque tibiarum torpore. Tandem febri cum horroribus correpta est, quæ itatus periodicationes minime servat, sæpe cum mentis alienatione, clamoribus ac vociferationibus, adeo ut à Dæmone ipsam possideri Religiosi aliqui afficerent, vulgares suspicentur, dum vero ad mentem redit, mortem ut jucundissimam, vitæque multo meliorem, desiderat. Præterea pedes tandem semper, palpebræ vero & facies tota quandoque œdemate tumescunt. Religiosi vocati pro signaculis. Malentæ mulieres, ad maleficia solvenda. Divis vota facta. Cum vero horum nihil profuerit, tandem ad nos Medicos confugiunt, ut de agendis pro Virginis salute consulamus.

Cum Medicinæ Scriptores dubitaverint affectû hunc forsitan nullo nomine nuncupandum, paucibus ab iis sollicitè tuit insignitus. Ab aliis cum Virgineus morbus fuit dictus, quia Virginitatis familiaris esse solet. Ab aliis lebris amatorum, pulchiores enim potius quam deformes hoc affectu corripiuntur, ratio est quoniam partes in his bene temperatæ, bonum sanguinem ad se trahunt, malum rejiciunt, qui corpus inquinat. Quibusdam febris alba seu alba ictericæ, quia hoc affectu correptæ corpus album, cachecticum, ac veluti œdematosum præ se ferant. Et tandem ab Hippocr. Erroneæ febris, quia nullum typum nullumve ordinem servet.

Est autem affectus iste morbus in via, nimirum obstructio vasorum, circa uterum primo, deinde circa mesenterium & jecur, dum enim sanguis statim temporibus uteri venas pervadere non potest, refluat, & præ multitudinem reilit in cor & septum transversum, unde timores, pavores, demoniacæ imaginationes, difficiles respirationes & veluti strangulatus, cordis oppressiones; qui sanguis depressus ex coxis ac femoribus, in tibias & pedes, torporem inducit, donec ad superiora revertatur, quod facile fit propter venarum rectitudinem. At ex corde & sepro non adeo facile refluat, venæ enim obliquæ sunt, & locus est ad inaniam & delirium satis aptus, quo repleto, & horror cum febre ingruit, quas erroneas febres appellant. Verum quia ex pravo sanguine detento, frigida in visceribus & toto corpore succrebit intemperies, ideo frigidorum atque crassorum humorum copia congeritur, quæ nativum calorem cordis, jecoris & totius suffocando modò pedes & faciem paulatim, brevi vero & totum corpus, veluti œdematosum, ac verbo, cachecticum reddet.

Affectus, qui neglectus, sæpe in schirrhos viscerum naturalium, hydropem, insaniam & mortem terminatur. Curatu quidem difficilis in hac Virgine, sed difficilior multò evadit si maritalis sterilitas contingat, nam Virgines si viro utantur, aut menses suboriantur, aut conceperint, promptius liberantur.

Pro curando hoc affectu duplex est medica intentio. Altera totum. Altera partes, tum obstructions tum intemperatas respiciens. Totum itaq; 1. per partem post partem evadendum. Secundò, mesenterii, jecoris & uteri venæ deobstruendæ. Tertiò, ventriculi, jecoris & uteri frigida intemperies corrigenda & auferenda. Et quartò partes affectæ roborandæ. Cujus quidem affectus



Quis curatio, curæ Leucophlegmatiz non admodum dissimilis est.

Et si de remediis à fonte Chirurgico desumendis loquamur, hujus affectus curatio est sanguinis detractio, & quidem in hoc casu venæ superiores prius aperiendæ, ut auferatur & dematur sanguis collectus, qui per venas inferiores nullo modo evacuari posset, imò sectis primo venis inferioribus, uteri obstructions adangerentur. Secundo verò loco, ex venis interioribus, circa tempus consuetum menstruum purgationis. Parce tamen erit sanguis educendus, cum jam in Cœtochymiam migraverit, at potius electivè purgantibus pravi humores erunt educendi. Cauterium in coxa dextera locum habebit; Pariter frequentes pedum lotiones; aqua salsa & nitrosa, aut lixivio fortis, addito sale.

In totius expurgatione; ventriculus est primò mundandus, melle rosat. cum manna, vel elect. lenit. tart. Prima præparatio procurabitur ita.

℞. Mell. ros. col. oxym. simpl. an. ʒiʒ. aq. cinnam. ʒj. M. pro syr. & sic pro aliis quinque. A quibus expurgatio succedat syr. rosat. & mell. ros. sol. cum elect. diacarth. vel elect. lenitivo, diachar. cum granis extracti mechoacan. Hac sequuta primarium viarum expiatione, secunda ineunda erit præparatio tali syr.

℞. Oxym. comp. syr. byzant. cum aceto an. ʒj. syr. de cichor. cum rhab. ʒʒ. decoct. cich. borrag. melliss. beton. agrim. cuscut. rad. gram. ʒvj. M. pro syr. & sic pro aliis septem. Deinde præparati humores erunt ita expurgandi.

℞. Agar. trochisc. ʒij. rhab. opt. ʒj. fol. senn. epith. an. ʒiʒ. cinnam. integri ʒj. aq. melliss. q. s. M. f. inf. per hor. 12. deinde fiat fortis expressio, & colat. adde syr. ros. sol. ʒiiij. elect. diaphanic. ʒij. M. f. potio.

Vel ℞. Electuar. lenit. diaphanic. diachar. an. ʒiiij. pilul. de hiera cum agar. ʒj. M. f. bol. 4. horis ante cibum assumendi.

His peractis, nemo in arte versatus facile crediderit omnes obstructions circa viscera naturalia omnino expeditas, minus verò totum venosum genus à pravis humoribus defæcatum. Quare reliquæ obstructions sunt removendæ, ac totum, quantum fieri potest, expurgandum, in quem finem nil syr. Iernel. præstantius excogitari potest, eidem addendo rhab. ab eodem omisum. Præbeatur autem quotidie ad ʒij. in semicyathis vini albi maturi, non valde generosi, matutino tempore, 4. horis ante prandium per 15. dies. Post ejus usum, cum viscera naturalia deobstructa satis fore conjectari possit, totumque, si non omnino, sat tamen bene expurgatum, ideo tempestivum fuerit quam proximè ad obstructions uteri demolendas, mox ad menstrua provocanda devenire.

Pro contumacibus obstructionibus auferendis, principem locum obtinere chalybem tota Medicorum schola profitetur, qui tamen, nec nimis tritatus sit, nec nimis ignitus: tritatus enim in argentum vivum degenerat, tuncque vomitum provocat, & alvum turbat: nimis autem ignitus privatur suo sulphure & mercurio: qua ratione evadit crocus martis, potius adstringendi quam aperiendi vim obtinens.

Quare in hoc casu convenientissimus erit crocus martis aperiens, cum acido sulphuris paratus, ita exhibitus.

℞. Croci mart. aperit. gr. iij. trochisc. de eupat. ʒj. de myrrha ʒʒ. M. & cum aq. capill. ven. q. s. ref. bol. j. & aur. à quo bibat Patiens talem potionem.

℞. Salsa elect. rad. fenic. petros. gram. lign. sassafr. incis. an. ʒʒ. aq. agrim. lib. iij. M. f. inf. per hor. 24. deinde bull. ad. consumt. dimid. addita quarta parte pulli junioris, & colat. servetur pro duabus vicibus, matutino tempore assumenda, quæ efficacior reddetur, additis gut. iij. vel iij. spir. sal. vel. ʒj. spir. tart. ter rectific.

In hujus medicamenti usu per xxx. aut xl. dies erit persistendum. Sed interim externa quoque deobstructione amittenda, quæ humectent & aperiunt, non exsiccant, cujusmodi erit fomentum paratum ex decocto malv. melil. orig. puleg. calam. leucos. rad. alth. & lil. alb. quod mane & vesp. per horam administratur, inunctis mox pudendis oleo lil. alb. & keirino mistis.

His peractis, si menstrua adhuc, prout opus est, non eruperint, eadem provocantia continuo erunt adhibenda. Quare institutum jus familiare alteratum fol. capill. ven. arthem. orig. puleg. calam. mont. exhibendum singulo mane ad ʒvij. additis, vel aq. ex allio destill. ad ʒj. vel oleo sabina ad ʒʒ. adhibitis interim infusibus usque ad umbilicum, in aqua Apocynitana sulphurea.

Toti exsiccando, & partibus corroborandis, usus theriac antiquæ præstantissimus fuerit.

Quibus victus ratio congrua erit calefaciens, parum exsiccans atque attenuans, & nisi medicamentis, aut Dianæ votis malum cedat, viro jungatur, & sana evadet *Joan. Raym. Foris lib. de Morb. Mulier. Tom. 1. Consil. inferib.*

Virgo Nobilis ætate jam nubili submelancholica censenda ex totius colore fusco, hepatisque intemperie justo calidiori, sedentariæ vitæ sexui propriæ addictæ, proximè præteritis annis succos crassos in venis congeffit, qui ad uterum expurgationis causâ quolibet mense transiissi, tandem ob eorundem crassitiem & visciditatem in ejusdem venis declusi & fixi obstructions & infarctus induxerunt, unde consuetæ menstrua purgatio suppressa fuit. Quoniam verò si menstrua non fiant, ex utero morbi contingunt. Ideo duobus mensibus ab eadem suppressione, succi in venoso genere hærentes, prædominio biliosi, & subdominio melancholici atque pituitosi, putredine concepta, febrem duplicem tertianam continuum excitarunt, cui mirum non est, capitis dolores, & ventriculi angores accessisse, tum ob exhalationes ad caput & os ventriculi à putridâ materia elevatas, tum propter uteri consensum cum omnibus corporis partibus.

Congruis autem medicis auxiliis sanata febris, judicataque Pat. fuit. Verum quoniam causa antecedens eodem tempore auferri non potuit, menstruum nempe suppressio, & præterea quia obstructions licet nondum putrescentes, circa viscera adhuc superstitæ, supponimus, ex aliquo potu copiosiori in febre præ-



gressa æstiva contractas, ideo paucis post diebus novis coacervatis cruditatibus ab imbecilliori convalescenti ventriculo relapsa est Nob. Pat. in febrem non quidem ut antea acutam, sed febriculam potius, ut potè a cruditatibus partes non adeò Nobiles obsidentibus productam.

Hæc vero neglecta, una cum accommodata victus ratione, cruditates, & excrementa varia, indeque obstructions, non leve incrementum susceperunt unde hepar, & lienem obdurusse tunc primum, atque mesenterium, & universam abdominis regionem intumuisse credendum, tuncque nutritionem, labefactari paulatim coepisse, accedentibus maxore, cibi fastidio, capitis, lumborumque dolore, cordis angustia atque tremore, difficili respiratione, totius lassitudine, ac tandem faciei & labiorum pallido colore, cum febricula erronea, nullo ordine invadente, & pulsu parvo, ac frequenti, quæ omnia symptomata virginæ morbi, sive febris alba, superiorum viscerum naturalium obstructions utero perpetuo fovente. Cum enim scilicet exitus mensuus purgationibus non fuerit apertum & sanguis continuo influxerit, tunc sanguis non habens effluxum, præ multitudine resistit in cor & ad septum, quæ partes repleta in frigidantur, & ideo sanitatem & torporem sequi scripsit Hipp. Ad hæc horror cum febre ingruit, erronea dista, formidant Patientes, usque gladiatur respiratio, timent, marant, & tandem in viâ desperationem incurrunt. A quo statim ab Hipp, descripto, parum aut nihil abesse Nobil. hanc Virginem utique censuimus.

Quo ideo liberari difficillimum putamus, est enim ex illis morbis quorum curationem a Diis auspiciandam esse dixit Hipp. ejusdem difficultatem his verbis significans, quæ & augetur a prægressa plurimum mensium menstruorum suppressione. Nihilominus quoniam tumores nondum in visceribus genitos supponimus, & anni tempus purgationibus idoneum accedit, supposita Pat. obtemperantia, & in medicamentorum usu perseverantia, hucusque minime servata (unde non mirum si leve, aut nullum ab arte medica juvamentum sit secutum) curatione à nobis proponenda, ab imminente cachexia, & hydropse Nob. Virg. præservandam, & ad multò meliorem statum redigendam speramus,

In quam rem recto ordine primæ viæ erunt excrementis emundandæ, inde paulatim per partem post partem mesenterii, hepatis & lienis obstructions aperiendæ, mox totum venosum genus a cacoehymia vindicandum, & tandem ad uteri venas referandas erit deveniendum, corroboratis denique visceribus.

Quibus intentionibus ut satisfaciamus, à fonte Chirurgico repetita sanguinis missio est depromenda ex brachio, post primarum viarum expiationem, verum eâ cautione ut Medico præsentē, si tenuis, & valde serofus effluerit, supprimatur. Secundo ex saphena, sed parcè, ratione tantum motus, & solum sub finem post adhibita hysterica aperiencia. Cauterium omnino conveniet coxæ inustum, sicuti pedum lotiones in fine tantum curationis, & quotidianæ inunctiones uteri regionis, oleo simpl. lil. alborum.

A fonte Pharmaceutico præcipua desumen-

da remedia, quoniam jam sanguis suppressus in cacoehymia descendit. Sic primò conveniet potio ex manna clarif. cum infus. sen. & tart. Primum præparans erit Julap. acet. ad ʒij. vel iij. totidem additis drachmis crem. tart. & ʒss. Aq. cinnam. Quinque vero post diebus repetatur eadem potio, ut supra instituta mox novâ præparatione. Et quoniam in uterinis affectionibus, & hypochondriacis affectibus, non multum conferunt Sacch. aut mellita, ideo succi potius herbarum depur. decoct. erunt mluendi, ut

ʒl. Succ. depur. borrag. agrim. an ʒj. tart. vitr. gr.x. decoct. cichor. borrag. buglos. bet. meliss. petrosel. ʒiv. m. pro syr. & sic pro aliis. Septem vero exactis diebus, præbeatur infusum ex agar. rhab. & senna additis syr. ros. sol. & de polyp. a quo jus hordeac. ebibatur.

Inde ad efficaciora deobstruentia erit progrediendum, in quem finem efficacissimus erit Syr. Fernel. quem cachecticum appellant addito Rhabarbaro, cujus mittimus descriptionem nobis familiarem. Præbeatur autem alternis diebus ad ʒij. in jure cich. vel end. alterato, & absente febre, etiam in semicyatho vini albi tenuis, non dulcis, more Ferneliano, diebus autem intermediis exhibeatur Bol. ex ʒj. Extract. rhab. & ʒss. tart. vitriol. paratus, a quo bibat decoct. cich. end. agrim. niellissæ petrosel. & fonic. ʒv. vel cyathum aq. lil. agrim. sicque pergat per mensem, etenim nec levibus remediis, nec brevi tempore affectum hunc expurgari posse pro certo habendum.

Tunc temporis vero de Chalybeatis medicamentis cogitandum fuerit ut duriores & contumaciores obstructions attenuari & atteri possint. Chalybs autem ita præbeatur, ut peractâ operatione extra corpus educatur simul cum excrementitiis humoribus obstructions inducentibus, cujus causâ medicamento aliquo purgante, vehiculi loco illi immixto opus fuerit. Præ omnibus autem Chalybis præparationibus à me expertis, præstantiorem observavi, quam crocum Martis aperitivum appellant, cum acido sulphuris paratum, cujus grana duo aut ad summum tria mirabiles certe effectus semper præstare consueverunt. Quare præberi poterit bolus ita paratus.

ʒl. Pil. detribus cum Rhab. ʒss. croci Mart. aperit. gr.ij. in f. Bol. quem sequatur potus decocti salis, & tamarisc. idque pluribus diebus, prout Excell. Viro adstanti opportunum ac necessarium visum fuerit.

Tandem ad uteri venas aperiendas erit perveniendum, in quam rem xv. aut xx. diebus præbeatur aqua destill. ex capill. Ven. & artemisia, addito vel cochleari Aq. Sabinæ still. vel gutt. Ol. Sabinæ, vel gr.x. sal. arthemisiæ, præmisso quæntiam bol. ex troch. de myrrha, cum Tereb. reformato, quo tempore, præstò sint sili cannabina in lixivio cocta, & imò ventri, matricis nimirum regioni calida admota, efficacissimum enim hoc ad mensura provocanda remedium, quo ablato, munctio ex ol. lil. alb. cum aromatibus usurpanda.

Interim ventriculo ac jecori roborationem conciliabit sal absinthii ad ʒss. hora ante prandium & canam exhibitus.

His omnibus tandem congrua & accurata vivendi



vivendi ratio addatur. Vinum ad mensam sal-  
sa, tamarisco, & panxillo satiasfras medicatum  
paretur, & familiare medicamentum purgans  
prescribatur, magist. scilicet mechoac. ad gr. xii.  
vel xv. cum ꝑss. pil. aggreg. vel ꝑss. elect. leuit.  
iterum aut tertio quolibet mente assumendum.  
Quæ omnia a Prudentiss. atque Excell. Viro  
Aditanti administrata; ope divina, profutura  
speramus; ut tandem Hipp. consilio, viro iungi  
possit Nobiliss. Virgo. *Joh. Raymund. Fortis con-  
sult. & respons. medic. Tom. 1. Cent. 1.*

Vita vexationibus plena, quam à naturæ pri-  
mordiis traxit Illustrissima patiens, quæ cum  
visceribus potissimum naturalibus detrimentum  
asserere potuerit, unicuique in arte perito mani-  
festum est cum exstimaverit Plato, omnia no-  
stra mala ab animo pendere. Eorundem præ-  
terea viscerum nativus calor non parvam con-  
traxit labem ex venenata assumptione: Uteri  
pariter intempestivam infertilitatem læsio-  
nem insidem attulisse credendum. Damnum ta-  
men non sese manifeste prodidit; dum viguit  
ætas & calor nativus, sed eo paulatim debili-  
tato, imperfectiores quotidie semper magis  
coctiones; nutritionesque depravate sunt red-  
ditæ ab excrementorum & crassorum & viscid-  
orum proventu, unde totius jam color sem-  
per tere vitæ, tuis, excoctus tamen observari non  
fuit, donec menstrua purgatio singulo mense  
onus deposuit. At quia tandem tum ex immi-  
nuto calore nativo, tum ex ætatis conditione;  
succi & crudiores & melancholici copioso-  
res geniti sunt, si sibi ipsis viam ad uterum in-  
tercluserunt, unde menses diminuti; nec per  
idem tempus semper venientes, imo tandem  
præpropere ex toto fere suppressi; qui præter-  
quam quod massam sanguineam impuriorem  
significabant detenti & ad superiora conversi,  
obstructiones jam sub pyloro; nunc magis in  
ramis inferioribus, in liene manifestas, in he-  
pate & utero non adeo manifestas produxe-  
runt, cum caloris nativi harum omnium par-  
tium imbecillitate, qui ut parvus ignis à copia  
lignorum viridium suffocatus est. Quare mirum  
esse non debet si ex utero morbi contigerint;  
menses enim recurrentes per venas in septum  
difficultates anhelitus & suffocationis sensum  
pariunt; in caput destillationes; in ventricu-  
lum inappetentiam & nauseam, in jecur san-  
guificationem vitiant, unde vitiatius totius co-  
lor, tumores pedum oedematosi, in cor tre-  
mores, palpitationes; pavores, melancholias  
(imo & in senioribus cor fatuum sit ex Hipp.  
indeque torpedit, & delirium) & tandem co-  
rundem excrementorum portio circa viscera  
naturalia putrescens, vel agitata incallescens  
nonnunquam jam febres quartanas & erraticas;  
nec non in præsentia fere continuò erroneas &  
albas producit.

Affectus quidem difficiles; recursus enim  
mentium ad inferiora ob ætatem progressam  
obteneri non poterit. Quare hoc insigni naturæ  
beneficio destituti; omni arte tuenda erit Illu-  
strissima mulier à melancholia, cachexia, &  
Hydrope: quod præstabitur; diligenter de-  
faciendo massam sanguineam, aperiendo ob-  
structiones, auferendo intemperies, & semper  
fovendo calorem nativum, cum totius habitus  
jam ad frigidum vergere inceperit. A sanguinis

missione inchoat Curationem Hipp. si nihil  
prohibeat. In casu nostro sola quantitas pro-  
hibetur, quare vena superior aperienda erit  
ad sanguinem prævum in toto collectum ecu-  
cendum; & si se obtulerit occasio; caute tangi  
poterit, & sapharia ad motum. Duo cauteria  
affigenda, & si forsitan affixa sint, custodienda:

Evacuatio medicamenta erunt lenit. cum  
tart. vel potio magistralis; elect. diaphan. ma-  
gist. Jalappæ, flos antimonii, præparatus se-  
cundum Fonsecam. Specificum autem est in  
hoc casu medicamentum extractum Veratri  
cum Cassia: Præparantia erunt Oxyssel cum  
aqua cinnam. sine diluto; oxyssel cum syr. Bi-  
sant. & de cich. cum rhab. cum decoct. Lorag.  
malv. melissæ, artemisiæ, scolop. eupath. abstinth.  
& quatuor radicum aperientium. Alternis au-  
tem diebus syrupus Fernel. ex vino albo. tunc  
temporis forsitan ex usu esse poterunt aquæ ter-  
tutianæ, de quibus consilium in arena. Mox  
decoctio Epithymi Mes. aut extractum ejusdem  
per tres aut quatuor vices alternis diebus cum  
lero, si opus fuerit. Diebus autem inter mediis  
succus cich. & fumariz depur. ut jure aperien-  
te. Ultimo loco ad usum chalybis tanquam ad  
alexipharmacum deveniendum; qui chalybs  
nec nimis tritatus sit nec ponderosus sit; ar-  
gentum vivum evadat ventriculumque turbet:  
nec sit nimis calcinatus, ne partes sulphureas  
amittat, & astringens, ut crocus martis eva-  
dat: namque sæpe frustratur expectationem no-  
stram; quia perperam præparatur. Asumatur  
verò cum pilulis de tribus cum Rhab. aut de  
hiera cum agarico. Huic associabitur jus co-  
lumbi alteratum china; nomento satiasfras, ta-  
marisco; dictamno, artemisia, & quatuor radi-  
cibus aperientibus. Declinante verò ætate  
magis antidotus ex usu erunt. Nec displice-  
rent uteri infusiones in Balneis Aponenibus.

Congrua his omnibus addenda erit victus  
ratio, ut felicem eventum à nobis tantopere  
exoptatum assequamur; qui ut facilius obti-  
neatur, prædicta omnia ab exordio, & pruden-  
tissimo judicio ducti Viri Illustrissima Patienti  
corrigenda fuerint. *Joh. Raymund. Fortis Consult.  
& respons. Medic. Tom. 1. Cent. 2.*

N. V. De Aristotele ingenti illo naturæ lumi-  
ne; Platonis discipulo; refert *Aelianus* cum  
adversâ valetudine premeretur, & Medicus  
vocatus non prævio de morbi genere discursu  
ipsum curare tentaret; ita fuerit affatus. Ne  
me velut bubulcum suscipias curandum, quin  
prius de causa morbi edisseras; tum me ma-  
gis morigerum & præceptis tuis audientem ha-  
bebis. Hoc ipsum ne mihi eveniat; priusquam  
in curanda filia tua dulcissima medendi metho-  
dum proponam, paucis te de morbi, quo la-  
borat; indole & ingenio erudiam. Affectus  
cujus illa; meliori fortuna digna, succumbit  
tyrannidi ab Hippocrate artis Medicæ veneran-  
do conditore *χρόνιος*; à recentioribus sit pecu-  
liaris. Idem à Brabantiorum matronis febris  
alba, ob faciei pallorem & amatoria appella-  
tur, cum palleat omnis amans, & color hic  
sit aptus amanti; quanvis febris raro coinci-  
dat in hoc affectu, quæ antehac Roseo ge-  
n. rum; labiorumque rubore florebat, nunc  
velut exanguia eadem triste pallefcunt, cor ad



quemvis vehementiorem motum contremiscit, & temporum arteriæ sensibilibiter pulsant, in scellarum ascensu dispnoea molestat, ventriculus cibum & imprimis carnem fastidit, crura tandem, præcipue juxta talos, oedemate intumescunt, aliaque complura symptomata infestant. Pendet autem affectus hic immediate ab intimi ventris obstructionibus, unde fit vitiosa in visceribus concoctio, & hinc crudi humores in toto corpore cumulantur, qui ad habitum ejusdem delicti cachexiam excitant, in reliquis vero partibus varia symptomata produciunt quorum singula jam particulatim allegare non vacat. Causa saltem obstructionum, quæ in venis viscerum contingunt sunt humores crassi, viscosi & crudi, ex prava victus ratione geniti; ut *Diogenianum* ex iis non ægrotare, ex quibus vivimus, verissime pronunciarit. His calor partium nativus, omnis humorum coctionis in corpore opifex, obrutus, magnum generat ciudorum humorum proventum. Malum hoc ut plurimum periculo vacat, & ad longum sæpe tempus perdurat. Si tamen negligatur, ut altas radices agat, ita ut magnæ nutritionis depravatio contingat, graves partium naturalium affectus subsequuntur interitum producentes. Idcirco Curationis in eo consistit, ut obstructiones referantur, humores in toto luxuriantes, evacuentur, & viscerum intemperies corrigatur, & tonus eorum restituatur. Hæc non sunt hujus tempestatis, quia sirius intenso flagrat æstu. Sub cane & ante canem difficiles sunt purgationes, inquit summus in Medina dictator *Hippocrates*. Ne tamen malum emendo crescat, & morâ diuturna augeatur, velim hujus curam auspicari emetico ad everrendam ventriculi saburram. Id commodè faciet vino siquillitico adjecta uncia hujus cum dimidia oxymelitis semuncia. Hoc ventriculi everriculum excipiat lenis primæ corporis regionis evacuatio hoc vel simili modo; Rec. rad. Polypodii fol. senæ ana ʒiʒ. Agaric. Rhabarbar. ana. ʒʒ. cinamom. ʒj. Macis gr. vii. Infundantur per noctem in f. q. aq. Betonicæ; in colatura dissolve mannæ Elect. syrupi rosar. sol. ana ʒj. misce fiat potio, sequenti die aperiatur Saphena sinistri pedis. Postea verò utatur decoctio obstructiones aperiens. Rec. Radic. apii, fœniculi, Petroselinii, ana ʒʒ. Helenii ʒij. Herb. capillor. veneris, artemisiæ, pulegii, ana M. j. hyslop. sicci, florum Betonicæ, & anthos an. p. ij. calami aromat ʒij. cicerum rubr. ʒj. granorum alkekeng. ʒij. semin. meli solis, fœnic. dulc. ana ʒj. bulliant in vini alb. lbij. in vase lapideo probe clauso in M. B. per horas 6. ubi refrigerint colentur. De colatura bibat omni mane ʒiij. cum syr. de artemisia ʒʒ. absoluto hoc decocto purgetur. agaric. ʒʒ. ʒj. pil. de Hier. & fortid. an. ʒj. syr. de artemis. q. s. misce fiant pil. no. v. purgato corpore ad chalybeata progrediendum, quæ inter omnia remedia ad hunc morbum profligandum sunt efficacissima, corpus ab obstructionibus liberant, humoresque vitiosos in visceribus collectos evacuant, sed nolim ut chalybem in substantia assumat, vellem potius meum propinare syrupum simplicem, vel jusculo alterato herbis convenientibus permiscendum sine violento exercitio, à quo incallescit corpus, & caput, de cujus dolore con-

queritur, oppletur. Quod si syrupus non attulerit sale martis conserva permulto uti poterit. Sed inhaerendum diu præstantissimo. His recte administratis, spes est fore, ut sauto & annuente *Apolline* hujus tua meliorem corporis statum attingat. Interim observanda proba victus ratio, qua sola hujusmodi affectus sæpe evictos fuisse constat. Paxit Deus optimus maximus ut omnia cedant in hujus tuæ salutem omninodam. Vale. *Frideric. Lossii consil. Medic. libro.*

Virgo ætat. xxij. annor. habitu corporis gracili, & longiori paululum staturâ, pallidoque faciei colore prædita, postquam varios aliquandiu in Dixta commisisset errores, cibis potissimum acidis, & crassi succi delectata, & aliquoties choreis mox à pastu institutis, multamque in noctem productis una interfuisset, mane vero electo surgens potu frigido jejunum obruere ventriculum consueveret, paulo post finito sonno quandam in facie & palpebris intumescantiam observare cepit, accessit ciborum, præsertim euchymorum fastidium, quod mensum suppressio, hæcenus continuans, cum dolore capitis diuturno & gravante excepit, conqueritur nunc insuper, quod etiam ad leviolem corporis motum palpitacione cordis satis molesta corripiatur, pulsationes in temporibus sentiat, neque absque insigni respirandi difficultate, & lassitudine scalas ascendere valeat. Pulsus plerumque celer ac frequens est debilisque apparet, & aliqualis in pedibus tumor conspicitur, graviora metuens Medici opem expetit.

Affectus cum quo ægra nostra conflictatur est *χλωρσις* *ἀνὴρ* & *χλωρσις*, quo color ex vitio pallescent, innuitur nomen habens malum virginibus familiare; unde latinis febris virginea vel alba, morbum item virgineum dici suevit. Plura ad *Etymologiam* pertinentia apud *Sennert. Kest.* & alios videantur. Rem ipsam ut definiamus, est chlorosis (ad mentem *Sennerti* & aliorum) coloris nativi & floridi in toto corpore, præcipue autem in facie, in pallidum, lividum, ac virescentem mutatio; cum virium languore, difficili respiratio, & aliisque gravibus symptomatibus conjuncta, ab imminuta & depravata nutritione, vasorumque circa uterum imprimis obstructione, originem trahens. Ex quibus patet affectum non esse simplicem, sed compositum, in quo magna symptomatum caterva concurrit, unde à variis varie describi solet prout vel morbi vel symptomatum rationem magis respiciunt. Nobis interim iis subscribere lubet, qui formalem istius rationem in coloris nativi in p. u. & pallidum &c. mutatione ponunt culpamque in vitiatam nutritionem vasorumque quam diximus obstructionem transferunt.

Adesse verò hunc affectum, neque alio nostram virginem laborare patet primo ex essentialiter inhaerentibus, in ipsâ mali descriptione occurrentibus, colore sc. nativo in virescentem mutato, cum langore totius, difficili respiracione &c. secundo ex essentialiter consequentibus, quorum plura in historia recensentur v. g. in actionibus naturalibus occurrit appetitus prostratus; qui ad cibos præcipue *ἰσχυρὰ* nauseat; in vitalibus palpitacio cordis, temporum pulsatio &c. in animalibus ad leviolem corporis motum oborta lassitudo; In Qualitatibus pedum intumescencia &c. patet id tertio quoque ex causis variis



varius prægressis, ita sane comparatis, ut non potuerint, non producere tandem hoc mali genus, cujus rationem in subsequ. fusius examinabimus.

*Subiectum seu pars affecta* quænam sit? Rogantibus, cum distinctione inter *subiectum morbi & causam* respondemus. *Vtrum*, sane cum suis *vasis* fo. item subministrare non est, ut quis dubitet, cum juxta Hipp. lib. de loco in hom. Uteri muliebrium morborum omnium sint causæ: hinc eodem teste. Menstruis abundantibus morbi ex utero scilicet. 5. aph. 57. Cujus quidem de *partis naturalis* æque ac p. n. constitutione ut prolixè jam agamus, nostri non est instituti; poterit, qui talia desiderat, anatomicos præsertim Riolan. Incheurid. lib. 2. cap. 36. Rolinc O. & M. generat. dicat. part. c. 13. aliosque consulere; scopo nostro sufficere, pluribus hanc generationi sacram partem esse dotatam *vasis sanguinis*; quæ quoties in distribuendo suo penso vel solvendo debito lunari officii rationem negligunt, id genus turbat. de quibus historia loquitur, moveri experientia docet. Morbi 7. *subiectum* quod attinet, *utrum* id esse corpus, tot mutatur in eodem *qualitates* externa de quibus supra mentionem fecimus testantur.

Causa immediata & Proxima dum in descriptione nostra ad *obstructionem vasorum uteri* refertur, petenda simul est juxta quosdam à pororum circa uterum p. n. dispositione; tumque imprimis à *naturalis turgescencia, & fermentationis sanguinis defectu*, in quem ceu, supra innuimus, viscera primæ & secundæ coctioni dicata, officio suo minus rectè fungentia conspiciant. Quod dum sit neque uterus, quæ debet, expurgat d. M. magis depravatur, ad superiora regurgitat, & ut habitum corporis effunditur, ubi non solum partes nutriendas genio suo defraudat, sed etiam livido & virescente colore cutim, seu potius, cuticulam, defædat.

Pater hinc causam mediatam Proximiorem in massa sanguinea latitare: quæ sicuti tali in casu particulis viscidis, crassis, & chylosis imperfectioribus scatet, ita humorum pituitosorum nomine ut plurimum exprimi solet. Et sane si ægræ nostræ constitutionem aliaque quæ in historia commemorantur, consideramus, non exiguum ejusmodi saburræ apparatus adesse, deprehendemus. Præterquam enim quod ipse corporis & faciei præsertim pallidus color tantum particularum prædominium confirmet, docent id insuper.

Causæ mediatae remotiores. Nam temperamento præditam esse hanc virginem frigido, ex actionibus languidioribus, textura corporis tenera, aliisque supra enarratis facile liquet: imo etiam si natura tale non fuisset initio, errores in victu commissi inducere id quam maxime potuissent: quantum noxæ adferant utero acida non est ignotum; sic nec cibi crassi succi, melius nutrimentum partibus subministrari possunt; præsertim cum intempestivo frigida potui ventriculi calor obrutus & choreis istis mox à pastu institutis, & in multam noctem continuatis chylus crudior & indigestus ad receptaculum per vasa lactea concitatus, tota corporis æconomia maxime turbata fuerit.

Quibus causis tum præsentibus, tum, ut fieri

solet, in totius detrimentum potius, quam emolumentum concurrentibus, mirum non est, tanta virginem nostram Symptomatum syndrome quæ obrutam, modo de his, modo de illis, modo de singulis, quibus misera affligitur, molestiis conqueri: quarum omnium rationem breviter jam examinabimus.

Adest itaque 1. Pallidus faciei color, qui sui causam agnoscit nutritionem depravatam, cum enim hoc in affectu crudi, viscidii, serosi, ac lentè abundant humores, subtilior horum portio effervesceat, & ab expultrice ad corporis superficiem protrusa, cutim livido, pallidoque pingit colore 2. Intumescencia faciem & palpebras post longiorem præcipue somnum occupat, eo quod magna serosi l. lympha in tenuioribus huiusce partibus rest. quantis copia à calore per noctem conclusa agitur, majorque hinc vaporum elevatio, quam dissipatio oboritur. 3. Ciborum secuta insuper est præsertim eucharystiarum inappetentia, quæ a pravis certoque modo corruptis humoribus provenit, qui in ventriculo ob latam illius coctionem, colliguntur, vel ab aliis partibus eo transietuntur. 4. Dolor capitis diuturnus ac gravans anigit ob consensum tum uteri, tum ventriculi, cum vapores illi serosi ac crassi ex his visceribus elevati, cerebrum petunt, in poris & cavitatibus, seu ventriculis ejus stagnant, ibidemque membranas replendo & distendendo continuum solvunt, & sensationem ejusmodi molestant inducunt. 5. Palpitatio cordis temporumque pulsatio ad leviores quoque corporis motum excitatur, propterea quod sanguis crudior, & ex suppressione stagnans retrogrediatur, viscera, & imprimis cor gravet, tumque in arteriis temporum, indigestis suis particulis, turbas moveat: præsertim ubi accedente corporis motu saburra illa agitur, cui debiliior flammula vitalis dum non sufficit, reiterato quasi motu se cor exonerare & colligere vires laborat. 6. Hinc pulsus celer ac frequens, febricitanti haud dissimilis, ob debilitatem facultatis vitalis sequitur. 7. Mensium suppressio accessit, ob nutritionem depravatam qua laudabilis sanguinis portio heterogeneis particulis subruitur, hinc viscosi lenticque humores in vasis uteri coæservati, certo tempore quidem moventur, sed non promovenentur. 8. Intumescencia crurum ac pedum tum pituitosi ac crudioris humoris abundantia, tum ejus ponderi, quo partes decliviores petit, debetur. 9. Totius tandem corporis segnitie ac gravitas à devolutis ad musculosum corporis habitum serosis humoribus oboritur, id quod eo facilius fieri potest, quod flamma vitalis ex parte quasi suffocata actionibus sibi convenientibus sufficienter præesse nequeat.

Ut verò nostram nunc de hoc affectu, ratione Prognoseos, sententiam dicamus, non absque omni periculo esse arbitramur. Cum enim pertinaciores; quæ hic occurrunt, viscerum obstructions insignem præ se ferant cacoehymiam, non minus, quodque malum ab iisdem foveri atque longius protrahi solet. Hinc Agneta Chlorosin viam ad Hydropem valde tritam dicit, quæ non raro in Leucophlegmatiam, à qua non nisi gradu differt, degenerat. Interea tamen cum ægra adhuc in ætatis flore sit,



fit, malumque non tam hæreditaria ab imbecillitate ortum duxerit quam varios per errores in diætâ commissos incrementum caperit, spes est fore, ut licet non sine aliquali mora, & difficultate id obtineri posse videatur, sensim tamen ægra, sublata causa, & collectis viribus, pristinæ sanitati restituatur.

Quod ut fiat, sine ulla sane dilatione, danda est sedulo operâ, ut 1. coacervati in corpore humores tenaces atque viscosi, debito incidentium & aperientium vulgo dictorum usui præparentur. 2. per purgantia postmodum evacuentur. 3. Menfes convenienti tempore promoveantur & 4. viscera coctioni primæ & secundæ dicata: propriis aromatis roborentur.

Quoad primum scopum obtinendum, proficuum Ægræ iudico, si utatur per octiduum quotidie horis maturinis iusculo carnis, in quo rad. fœnicul. petroselin. asparag. cum flor. helenii, borrag. anthos &c. fuerint decoct. cum quo veluti vehiculo una sumi poterit seq. tinctur.

℥. Tinct. croci martis cum succ. pomor. præpar. 3 i β essent. cent. min. 3 j. spir. meliss. anth. ana 3 β. m. f. tinctur. sumat vero ægra, pro qualibet dosi gutt. xxv.

A meridie proderit pulv. qui.

℥. Pulv. cachect. Q. 3 j. tæcul. aron. 3 i β. bryon. 3 β. gr. v. crem. tartar. stomach. birckm. 3 i. m. f. pulvis. Sumatur 3 j. v. 3 β. cum vino, in quo rad. caryophyllat. pimpinell. herb. meliss. ceterach. flor. borrag. anth. cortic. aurant. &c. infundantur.

Secundæ indicationi ut satisfiat, non tam semel & simul, quam potius per *intermittentia* humores crassos & viscidos educendos arbitror. Num elective purgantia dentur? jam non est ut prolixè exanimemus, confer. hæc de quæstion. *Excell. Dn. D. Wedel. de Med. Facult. lib. 2. sect. 2. c. 3.* virginis nostræ suadeo usum vini medicati, cuius manè & à meridie haustum mediocre bibat; e. g.

℥. Rad. polypod. q. 3 β. pimpinell. 3 ij. herb. meliss. chamædr. ana m. β. flor. cheyr. rorism. ana p. j. passul. min. 3 i β. fol. seu. opt. mundat. 3 β. 3 ij. rhabar. el. ver. 3 i β. agaric. in pet. lig. 3 ij β. tartar. crud. 3 ij. spec. aq. vit. mul. 3 j. misc. incif. d. ad chart.

Usu huius vini purgantis finitò proculdubio de V. S. quæstio movebitur, nisi enim hæc purgationem excipiat, plebecula medicum à scopo aberrasse, saltem generosum remedium neglexisse, censet; verum cum vera methodus indicationibus nitatur, nostræque virgo non tam plethorica quam cachectica sit, affectusque ipse jam aliquandiu duraverit. V. S. differri in commodus tempus, quod consuetus alias naturæ motus innuet, posse; & tum demum in pede parce instituendū esse, arbitror.

Interea aliquot ante novilunium diebus, ad implendam indicationem tertiam commode Ægræ nostræ propinabuntur *χλωροδόν* sive menses moventia e. g.

℥. Elix. uterin. Horst. 3 j. tinct. calendul. 3 ij. spirit. puleg. 3 j. M. S. elixir.

Sumatur huius manè cum aq. aperitiv. Schroder. vel cum iusculo carnis cum rad. petroselin. &c. gutt. xxv. & repetatur usus à meridie cum

vino cui cortic. aurant. infundi poterunt. Hinc scopo pariter inservient pedihiv. ex herb. rheum. meliss. puleg. flor. chamomill. sum. mir. aneth. &c. sub somni tempus usurpanda. Quibus nisi eventus respondeat optatus, parca V. S. in pede, cui dixi, administranda, ad sollicitandum naturæ motum, non intempestive in subsidium vocabitur.

Quartæ indicationi, quæ viscerum roborationem urget, præter laudabilem diætâ. Itionachica, tum externa, tum interna non infelicitè succurrent, in tanto horum apparatu, commendando ægræ nostræ seq.

℥. Elixir proprietat. Paracels. 3 j. ess. cardiac. 3 ij. spirit. menth. meliss. ana 3 j. m. f. elixir.

Sumat singulis diebus mane cum iusculo carnis gutt. xx. à meridie autem pulverem sequ. sumendo pro dosi 3 β. usurpet cum vino melissato.

℥. Spec. diarrhod. abb. 3 β. ebor. f. igne præpar. 3 ij. ocul. can. præpar. 3 j. pulv. stomach. Birck. 3 β. c. panc. sacch. nusc. stomachi insuper regio seq. balsam. sæpius inungatur.

℥. Ol. nucist. 3 i β. bals. peruv. 3 j. still. mac. menth. ana gutt. v. caryophyllor. gutt. ij.

Quod si mali pertinacia (uti non raro his in morbis evenit) horum *divina* eluderet, validiora auxilia in utrum vocanda iudico: hinc tum præparantia, tum purgantia iteranda, & quoad illa quidem chalybeata (de quibus *Celeberr. G. Horst. lib. 5. Obs. 1. 2. & 5.* consulatur) quoad hæc vero serum educentia e. g. magist. gualap. gumm. gutt. &c. dextre usurpanda commendarem, non neglectis quoque sudoriferis serum in habitu corporis pariter, ac valis redundans, discutientibus, & repetitis post modum subinde roborantibus qualia apud laudat. Horst. Timæum & alios parva occurrunt.

Quibus omnibus legitima victus ratio coramdem imponat. Aer itaque ambiens calidus & siccus eligatur; quoad alimenta vero vacentur imprimis frigida & humida, cibique omnes *divina* hinc à fructibus, lacticius, piscibus fere plerique, omnibusque crudis, & crassioris succi carnibus abstineat; iis contra potius utatur cibus, qui calefaciendi facultate pollet, uti sunt iuscula vini cum aromatibus & saccharo præparata, brodia carniū cum sem. fœniculi, anisi, carui, vel etiam cum mace & croco & quas supra commendavi, radicibus petroselin. aliisque aperientibus. Carnes e. g. gallin. vitulin. juvencor. &c. assatæ potius sint, quam elixæ, & frequenter cum mace, cinnamom. salv. thym. major. n. rorismarin &c. condiantur. Panis non nimis recens, & bene fermentatus, cui aliquid sem. carui, sem. fœniculi admittum sit, elig. tur. Potus sit vinum tenue, in quo rad. helen. & cort. aurant. cum meliss. ceu supra innui, infundantur. Quod si vero vino vel non sit assuetus, vel non lubenter utatur. Decoct. ex sem. coriandr. rad. galang. pauco cinamom. & lign. sassafr. par. tum substitui poterit: ubique vero tam circa potulenta quam esculenta, mediocritatem observet. Cumque ad levem corporis motum palpitatio cordis imminet, moderato admodum exercitio utatur. Neque nimis diu dormiat, sic enim incrementa



menta in corpore iusto diutius detineatur. Quorum evacuationes omni potius studio promoveri debent; præsertim mentibus instantibus eo erit laborandum, ut ea quæ illorum fluxum adjuvare possunt; minime negligantur. Proinde præter jam commendata, haustus vini aromatizati cum croco, galatigâ & saccharo &c. huic quoque scopo multum inserviet; si præcedentibus diebus bis calide sumatur. Animi *mutata*, cum facile sanguinem & spiritus turbent, data diligenter opera moderentur; tristitiaque imprimis & mœrore, quantum fieri potest, abesse iussis, quorum locum potius moderatum gaudium; spiritus restaurans; & alacriores reddens, occupet. *Joan. Michael. Prax. Cithynic. Special. cas. 21.*

Puella anno vitæ decimo octavo frumentum crudum, cretam, & arenam subinde edere solita incidit in mensium obstructionem, per tres menses durantem; accessit faciei & labiorum pallor, totius corporis lassitudo, ac hypochondriorum nonnunquam inflatio & intumescencia; palpitatio cordis & respirandi difficultate sæpe etiam afficitur, præsertim ubi scalæ sunt ascendendæ: Ac præterea etiam capite, & ventriculo frequenter dolet.

Afficitur in hac ægra *Vierus*, quod ex mensibus obstructis; *facies & labia* quod ex pallore; *totum corpus*, quod ex lassitudine; viscera in hypochondriis existentia, *lien scilicet & hepar*, quod ex hypochondriorum tumore; *cor & pulmo ac diaphragma*, quod ex respirandi difficultate; ac denique *caput & ventriculus*, quod ex eorum dolore patet.

*Morbis*, quos hæc ægra laborat, est pituitosa & serosa viscerum, sanguificationi, & chymosi ac chylosi inservientium, intemperies, cum obstructionibus conjuncta; quæ pallorem faciei, & labiorum, item respirationis difficultatem, ac cordis palpitacionem; necnon hypochondriorum inflationem, & totius corporis lassitudinem in hac virgine inducens, *morbis virginis & Chlorosis* vulgo appellari solet.

*Causa præcaritica* huius morbi est consuetudo illa, quæ hæc puella frumentum crudum, cretam & arenam subinde comedere solebat. Inde enim crassi & sæculenti in corpore ejus geniti sunt humores, qui ad uterum delati, porosque ejus obstruentes, sanguinemque ad mensuram evacuationem ineptum facientes, mensium induxerunt suffaminationem; jam per trimestre spatium durantem. Travi deinde humores, per menstruum obstructionem in corpore retenti, atque ad viscera chylosi & chymosi atque hæmatosi inservientia delati, debilitarunt istarum partium calorem nativum, unde serosior & pituitosior in ejus corpore productus est sanguis, qui antecedentem huic morbo præbuit causam. Pars vero ejus ad varias partes delata, variaque symptomata inducens, *continens* huius morbi & symptomatum est causa.

Nam serosi isti & pituitosi humores ad viscera, quæ jam commemoravimus delati, *in intemperiem jam diutam conciliaverunt*. In faciem vero & labia per circulationem sanguinis pervenientes, pallidum illis colorem suo pallore

excitant. In habitu corporis autem existentes, suoque pondere n. usculos gravantes, & crassitie suæ in cerebro iustam spirituum animalium generationem impediētes, inducunt *totum corpus lassitudinem*, in hypochondriis vero nonnunquam rarefacti, & in crassos vapores qui satis commodè ob cruditatem & crassitiam suam, dissipari non possunt, dissoluti; excitant ibidem *inflationem & distensionem hypochondriorum*.

Dum verò subinde acriores quidam humores ad cor feruntur, qui cor vehementius & inordinatius vellicant; hinc oritur ex illa vellicatione per nervum sextæ conjugationis ad cerebrum delata; & poros ejus copiosius & inordinatius aperiente, inordinatus & vehemens spirituum ex cerebro in cor influxus, *palpitationem* live inordinatam & vehementem cordis motum subinde efficiens. Effusi vero copiosius in pulmonum substantiam; bronchiaque ibidem arctantes præsertim ubi illi ex scalarum ascensu vehementius in pectore, & visceribus vicinis agitantur, & dilatantur, inducunt *respirandi difficultatem per scalarum ascensum ingrarescentem*.

Denique quia sæpe contingit, ut acres illi humores ad caput & ventriculum copiosius ferantur, aliasque partes, tum quantitate distendant, tum qualitate acri rodant, hinc conqueritur nostræ ægræ etiam de *capitis & ventriculi dolore*; ipsam sæpe molestante.

*Morbis* hic periculosus est, cum totam corporis æconomiam pervertat, & hydropem; aliæque gravissima mala, sæpe inducat.

Diligente itaque curatione erit impugnandus: quæ in causarum jam enarratarum & intemperiei & obstructionum ablatione, consistet.

Primo itaque purgetur tali haustu.

℞. Elect. diaphœnici, diapruni ana ʒss. aq. hord. q. s. misce f. Haustus. Postridie leccetur vena, & sanguis e brachio educatur, pro ratione virium.

Postea utatur hoc apozemate, sumendo haustum trium vel quatuor unciarum quotidie.

℞. Rad. aperient. rubiz tinctor. eryngii, ireos, enulæ, falsaparillæ, capparum, cort. cæticor. an. ʒss. herb. nepitæ, chamædryos, artemisæ, melissæ, pulegii, matricariæ, valerianæ, an. m. j. summit. absinth. rōm. fœniculi, sabinz, an. p. j. sem. carthami ex cort. ʒj. apii ʒij. flor. stœchad. anthos, sanibuci, genistæ an. p. j. Cicer. rub. p. j. fol. fennæ ʒij. decoq. in hydromelitis q. s. ad ʒb i ʒ. & colentur pro apozemate aliquoties reiterando.

Convenientissimus etiam erit usus harum pilularum:

℞. Pil. de hiera ʒvj. agarici trochisc. ʒij. gummi ammoniaci aceto dissol. ʒss. salis gemmæ, mastich, spicæ nardi an. ʒj. croci g. v. cum syr. de absinthio f. pilulæ iustæ magnitudinis, scrup. j. sumatur ante cœnam.

Corpore aliquoties expurgato, utatur quotidie de his rotulis mane jejuno ventriculo superbibendo haustum vini albi.

℞. Chalib. præp. ʒj. cinnamomi, sem. anisi an. ʒij. spec. diamoschi ʒj. sacchari in aq. artemis. dissoluti q. s. f. rotulæ de quibus capiat ʒj. vel



vel ij. pro dosi, corpus deinde motu mediocri exercendo.

Non negligantur deinde corroborantia, quale est hoc conditum.

℞. Spec. aromat. ros. diagalangæ, ana ʒj. diacumini; diacinnamomi an. ʒss. conserv. ros. ʒj. conserv. melissæ, rosinarini, absinthii an. ʒss. confect. alchemines ʒij. cum syr. de menta q. s. m. f. conditum, de quo sumatur castaneæ magnitudo ante singulos passus.

Contra ventriculi & hypochondriorum inflationem ac dolorem, & cordis palpitationem utatur his rotulis ad dragm. duarum quantitatem.

℞. Rad. angelicæ, obstrutii, rhabarb. cinnamomi, nucis moscat. macis, zedoar, calam. aromat. an. ʒj. ireos, flor. zinzib. an. ʒss. nucis vomicæ, dictamni albi, pimpinellæ, cubebæ, pipetis long. lapid. bezoar. margarit. præp. cornu cervi ulti & præp. coralli rubr. præp. an. ʒss. croci gran. xx. pulveriscentur omnia separatim, & misceantur cum sacchari albi in aq. ros. soluti ʒvj. f. confectio in rotulis.

In victus ratione aer ad calidum vergat, cibi sint sicci, & facili coctionis, conditi hyssopo, salvia, roremarino, cumamomo. Panis sit bene fermentatus, semine fœniculi & carui perfusus. Rotus sit vinum & cerevisia mediocri virum. Motus sit moderatus. Venus legitima maxime hic conducit. Somnus etiam sit moderatus. *Henric. Regim. apud Theod. Craanen Medication. lib. 4.*

Mulier Itala 31. annorum, foris & alias integræ, constitutionis sanæ, succi plena, postquam per duodecim annos marito sano ac robusto nupta feliciter cum eodem vixisset, & aliquot liberorum mater facta fuisset, illo post mortem sibi erepto incidit paulo post in vomitus enormes, periodice singulis diebus, apparente aurora invadentes, perque duas horas durantes, tanto siquidem cum impetu, ut hæc cessante cervicis tendines adeo tenderentur, ut quasi tetano correpta, per aliquot horas non sine multo dolore illius partis, & totius capitis torqueatur; Ipsa antea floridæ faciei evadit nonnihil pallida, ipsi labiis nativum colorem perdentibus. Mala hæc per integrum annum jam eam mirum in modum excruciarunt, mensibus semper ordinatim, licet nonnihil parcius fluentibus. In abdomine ac circa hypochondria recte se habet. Plures medicos consulit frustra, flagitat nihilominus pro suo malo curam.

*Affectus noster est Chlorosis incipiens. Pars primario affecta sunt genitalia, ubi & focus morbi: est enim ægra vidua Itala &c. Symptomatum vero sedes est stomachus & primæ viæ.*

*Causa proxima est corruptio genituræ muliebri, hinc aura virulenta expirans. Notum quod aura ejusmodi orgasmum, brutis certò tempore concitet.*

Hirci nisi crebrius ad venerem admittantur, odorem virosi spirant, ex inchoatâ seminis putredine, ex odore tali cætes se invicem cognoscunt, odores penetrantissimi habent se instar fermentorum, quorum naturam per odores *Helmont.* explicat, quæ tenuis summe sunt activa, & volatilia, fermentum stoma-

chi, renum, se habet instar odoris. Odor acetilac coagulat, odor ex chirothecis scabiosis expirans, uanus, ex genitalibus infectis, partes sanas in lue venerea corrumpit, odor sulphuris vina à corruptione præservat, odor camphoræ peltem curat.

*Causæ remotæ* exercitium veneris deficiens, & trilitia.

*Vomitum* sit partim mensium vitio, partim vitio fermenti, ab aura virulenta ex genitalibus, mediante circulatione advecta, corrupti.

*Maintino tempore vomit*, quatenus cruditates nitrosæ ex ingelitis non rite digestis noctu coactæ, stomachum gravant, & ad expulsiōnem irritant.

Tetanus oritur ex spasmo musculorum per consensum cum nervis stomachicis.

*Pregnosus* malum anceps est, & metus epilepsie imminuentis, itaque ocyus curandum.

*Cura* (1) ut vitium genituræ corrigatur. (2) Massa sanguinea, & lymphæ vitiatæ purgantibus, & diaphoreticis blandis purgetur (3) stomacho mature prospiciatur.

*Quoad primum* excellit camphoræ quæ in specie odores morbosos ex putredine ortos emendat, non tam extinguit, quam refrænat impetus venereos, figit quadantenus spiritus animales, hinc in deliriis prodest, & somnum inebriando quasi excitat. Egregie confert in potu ordinario crebrius extincta, quali potu turorem uterinum curavit *Bartholinus.* In forma sicca cum nitro & saccharo saturni.

℞. Nitri antimoniat. l. arcan. duplic. myn. ʒij. sacch. saturni s. potius crystall. miner. saturni cum spir. nitri parat. ʒj. camphor. ʒss. m. pro 6. l. 8. dosib. capiat mane & sub introitum lecti cum potu camphorato, cum his in principio largæ venæ-sectione instituat, eaque repetatur. Videt *Hildan.* ac *Forest.* in observ. Vomitus gravidarum optime venæ-sectione curantur secundo vel tertio mense: nec inconsumtum fonticulos coxis supra genua inurere, in specie, si non amplius nubere velit, in principio, cui corpus purgandum ex hellebor. nig. & mercurio dulci.

℞. Extr. helleb. nigr. gr. xv. ad ʒj. mercur. dulc. gr. vii. ad ʒss. scam. sulphurat. gr. ij. c. s. q. ol. camphor. f. pilul.

Remediis ex camphora & nitro addendus est liquor salicis ex his incisus verno tempore collectus, impetus venereos in mulieribus singulariter refræmans, mane & vesperi pro subitâ propinatus.

Myrrhata ad putredinem, succinata ad spasmos adjunctæ.

Externæ mensibus remorantibus & seminis vitii succurrendum per pessos artificiales quales delineat *Rhumelius.* Instrumento Glauveri, commodius videtur sequens, phialæ longioris colli immittatur spiritus salis armoniaci, collum linteis involutum muliebris applicetur; phialæ carbonēs candentes providè admoveantur, sic spiritus magis penetrabit. *Michael Eshmaeller. Colleg. Consultator. casu II.*

*Observationes.*



## Observationes.

Aurifabri filia annos 2. deviginti nata sexennio fere foedos colores patiebatur, nil artis remediis contra contumax malum proficitur. Dum peregre profectura curru succussorio devehitur, nauseabunda tandem vomuit incredibilem humorum variegatorum copiam, animam agere videtur, intra 4. vel 6. dies deperditus faciei color; recuperatus nullâ opè medica, sed solo vomitû spontaneo revocatus, ut mirum non sit si tantopere in omni repletionis specie vomitiones Hippocrates commendaverit. Inque credibile est à variis humoribus isdem corruptis malum hoc ali ac foveri *Guil. Ballonius lib. De virginum & Mulierum morbis.*

Inter cetera in antiquis obstructionsibus in usum vocetur radix Enul camp. in taleolas secta & in vinò albo macerata, miraculo enim creditur foedos virginum colores tollere, *idem ibidem.*

Vocatus ad virginem nobilem i&ericam, cachecticam, verminosam, catameniis olim fluere solitis delitutam, præmissis purgationibus; decocto quoque tartari, rubiz tinct, mercurial. &c. Saphiranam apertui, tandem exhibito *Montspeliensium* ad pallidos colores pulvere, quem schyronii vocant, menses copiose provocavi, quibus fluentibus, icterus & cachexia brevi cessere. Formula pulveris quem sæpe fidum expertus sum est hæc.

℞. Rubiz ʒiʒ. fabinz, muscerdæ an ʒj. croci ʒʒ. lumbricor vino lotor. & uslor. ʒj. (ego vermicibus illis quos suspectos jam tum habebam boracem substitui) macis. fol. lauri an. ʒʒ. spec. aromat. rosat. ʒj. limaturæ chalybis ʒiij. rad. Enul. ʒj. sacchar. duplum omnium dotis ʒj. cum vino albo dulci *Henric. ab Heers. Observat. 6.*

Fratris mei ancilla ætatis 13. febre alba à primis juventutis annis, ut ex colore faciei pallido ad leucophlegmacionem futuram tendente apparebat, laborans sæpe ventriculi Anorexia, vomitu, lassitudine totius, per convenientia remedia adhibita, aliquatenus sibi restituta visa, semel tantum sua sponte; auno præfato, mensium patitur fluxum, quibus debito tempore non recurrentibus; perpetuis totâ die vomitibus divexatur; cum uteri ac lumborum doloribus. Huic præscripsi multa convenientia, universalia nihil proficere; omnibus iterum per vomitum rejectis. Tandem 14. diebus ante obitum, in credibilem copiam viscerum, lentique parum albescentis phlegmatis (quasi cum Tragacantha flava, farinam volatilem vel amyllum miscuisset quispiam) odore planè excrementa alvina referentis; ut adstantes ferre vix potuerint, continuo usque ad finem vitæ evomit, alvo perpetuo obstructâ parum saltem vel clysteriis vel balanis sollicitata, excrementorum reddente. Dolores uterini erant continui, cum difficultate respirandi, anorexia, siti, frigida, quæ tamen nocivæ valde, appetitui, faciei modò pallore, modò rubore conjunctis. Otiduo ante obitum post levem præbitam purgationem, eamque quod mirabar, retentam, in animi deliquia ex uterinis evaporationibus, earum commotione orta indefu-

ter incidit, vomitû perseverante, & alvo stannente contipata, quæ tamen altero die sua sponte soluta, cum ingenti levamine, idque per totum otiduum. Appetitus iterum rediit, dolores uterini cessarunt, ante fluxum alvi perpetui. Cum verò hic supervacaneus videretur in corpore atrophia correpto, præbitum tunc diebus iusculum abstergens ex sol. Mercur. cum Macere conditum & sæcula Ari ʒʒ. pro j. vice. Ecce denuò recidivantes hysterici dolores, vomitus, fluxus fatidissimus colliquativus. Anorexia extremorum refrigeratio, internus vero gulæ ac præcordiorum ardor, & siccitas (quæ etiam pridie ante obitum deglutionem læserat) virium omnium prostratio tandem insecuta, placidissima mors finem fecit malorum. Laboravit autem ab aliquot annis lica, confessaque se herbas pro acetariis allatas planè crudas cum voluptate devorasse. Colocolum etiam cum lacte coagulato, ceterosque cibos planè crudos; pessimaque coctionis appetisse, multum etiam recens mirum in modum bibisse, præter ea quæ reticere placuit, ut erat argilla hgulina, hordeum crudum &c. Omni quæcunque vel uterinis symptomatibus (præterquam semel inditum granum Zibethi ad genitalia) vel alvi fluxum adhibita frustranea, & sine fructu fuere. Puto latens aliquod apostema crudum in mesenterio ejusque glandulis extitisse. Phlegmatis autem istius fortidissimi tam per alvum quam per vomitum evacuavit prope mediam urnam, quod summopere mirandum. *Paul. Spindlerus apud Carol. Raygerum observat. Medicin. centur.*

## CHOLERA.

*De ea sic scribit Clar. Joh. Nicolaus Pechlinus Observationum Medico Physicarum lib. 1.*

**I**N Cholera sanè apparet plus esse humorum in corpore humano quam vulgò nostri credunt; ut enim aliquando fluxus ille sit symptomatikus & ab errore ægri aut medentis natus, plerunque tamen criticus est, subitoque & vehementer, quæ est Crisis natura, ægrum absolvit, ne quis tantum viribus cum illa excretorum mole decessisse credat. Ego verò nec hoc observare potui, bilis aut biliosum esse semper hunc fluxum, quando & alterius male corrupti humoris ingens copia maximam excretionis partem faciat. Est quidem, non diffiteor, humor si quis alius, bilis potissimum ad hepatis pronam & volubili impetu; attamen, copiam & celeritatem excretionis in Cholera considero, non video quomodo ab una vesica fellea & hepate quantumvis mole magno repeti illa possit. Et verò sciendum est hepar solidum esse glandulosum multisque, usque non exilibus, venis perfusum viscus, cujus quod minimum est, ad bilem pertineat; deinde bilis secretionem naturâ lentam, aliquando celeriore, nunquam tam præcipitem & copiosam esse, ut tam numerosis excretionibus respondeat. Itaque credamus oportet, vel non omne quod dejicitur, biliosum esse, aut non solam bilem ab hepate defluere. Quid quod sollicita ægotantium inspectione deprehenderim, etiam cholericis;



lericis, quibus fluida & meraca bilis initio secesserat, postea serum ut est ejus in corpore pars maxima, fuisse subductum, idque longe copiosissimum. Et quamvis quotidianum non sit Cholera esse *αχολα*, omnique bilis experem, novitamen, quibus serum solum, idque limpidum, dulce & ad frigus congelabile *αχολα* prodierit incontinata bile, certe non animadversa. Cholericus, erat, qui cum jam inde ab aliquot septimanis lente grassantem per viscera *φύσιν* & borborygmōs notasset, tandem occasione acerarii pinguis miscellaneique, nam & amara & salsa & acida & dulcia & pingua in unum coiverant, in dejectiones vomitusque incidit tam copiosos, ut post octo & viginti sellas sedecimque vomitus mirifice fatigatum vires jam iam deferere viderentur, & musculi gastrocnemii tibiaeque, quod in Cholera est famulare, adseri detracti inopiam valide contraherentur. Ego, quod pulsus ad se redire intelligerem & excretionem fieri minorem, agrum periculi immunem judicavi, & plane ita accidit. Hic cum de qualitate humoris aeger rogaretur, & praeter meam opinionem non bilem, sed serum quoddam, aut si mavis, lympham dulcem limpidam & post moram viscosam oculis ostenderet, qualem ab initio omnem fuisse sine ulla bilis nota tantum adjurabat, coepit mecum ipse decernere, posse etiam fluxum esse quasi cholicum, qui maximam partem sit sero lymphaticus; id quod deinde etiam uno alteroque experimento probatum vidi. Neque hic de viis post tam manifestas & multiplices observationes ullus relictus est scrupulus, cum ventriculus totus quantus, cum intestina, quae patent, tubulis hydragogis velut siphunculis pertusa in illo serosi humoris orgasmo suppeditare possint, quod tot alvi dejectionibus, vomitibusque sufficiat. Equidem, si copiam & naturam lymphae nostrae attendis, una est in ceteris humoribus & copiosissima & fluidissima, & nili fallor, maxime volatilis, imprimis in hisce regionibus, ubi praeterea salino quodam fermento acuitur atque depravatur. *Atque haec de Cholera humida, jam de Cholera sicca adjungit.*

Hippocrates Cholera sicca ideam nobis traditurus ventrem quidem inflari tumidumque esse, jam & laterum lumborumque, dolores graves incumbere *αλγος* & *αδιν* *αδιν*, *αδιν* *αδιν* *αδιν*. disertis verbis scripsit; adeo censoris ejus interpretes hoc uno Cholera unam ab alia humidam a sicca, distinxere, quod in ea alvus copiosa fluere, in hoc nihil plane sive flatum seu humorem deiceret, causam vero ubique esse eandem, persuasi simili nomenclaturae exemplo tum Hydropem siccam qui sanè illorum arbitrio Tympanites non est, tum Tussim siccam, in qua & ipsa nihil excernitur, ut praesens sit materia, ab Hippocrate appellata esse. Vidi ego, quibus Hypochondriorum tensio, borborygmi, lumborum laterumque dolores divexante molesta essent, quam in os & alvum materia desumaret, & vero haec Cholera erat sicca, quae tamen ipsa ubi excretionem solveretur, in humidam transibat: quae de causa etiam Cholerae definitionem mutare fas erat, ut quarum una ad excretionem referri non posset, & si placet, excretio esset non ex-

cretio. Quamvis autem hunc in modum, emendatis definitionis genericæ terminis, in tres admodum species distinguere Cholera licet, humidam, siccam, & flatuosam; graves tamen Practici & Epitheti ingenio, & experimentorum usu adducti siccam etiam volvere esse illam flatuum *αχολα* excretionem, non infelici augurio; quando tanta saepe sit flatuum copia, ut postquam discursibus hinc & inde ventrem fatigarunt, importuno turbine sursum deorsumque quanta maxima vi effundantur. Vidi aliquot horarum momentis flatus natos alios ex aliis alvum gulamque tam continuato impetu infestasse, ut veluti ex polytili missi toti in ventum abiisse humores viderentur. Notus mihi est, qui quoties cum tristiore animi aegritudine mista iracundia colluctatur, toties ventosa hujus excretionis incommoda perferens. Jam vero etiam alii, quibus morbus hic familiaris est, antequam in alvum & gulam erumpat ille impetus, dura experiuntur & decretoria symptomata, tensiones hypochondriorum, borborygmōs, cardialgias, lumborum dolores, & si tandem etiam in sanguinem erepat illa flatuum materia, cordis anxietates, cephalalgias, sudores frigidos, pulsuum momenta citissima, quibus ipsis non ante imponitur finis, quam dato comineatu sursum deorsumque ex ordine proruperint flatus, nimiamque & tumidam circa Pylori confinia effervescentiam novum remedium aut temporis beneficium sedaverit. *Haec enim ille*, unde non necessum est pluribus de morbi aut definitione aut differentiis agamus. Super illius autem causis cum videri possint quae de irritatione fibrarum ventriculi ac intestinorum humorumque motibus contra naturam, abunde affert sua de primis viis Dissertatione Clariss. Thom. Willis; jam adducemus tantum Cholerae descriptionem per sua signa paulo accuratiorem qualis à Clar. Sydenham traditur.

Cholera morbus eam anni partem quae Aestatem fugientem, atque Autumnum imminentem complectitur, unice ac eadem prorsus fide, quae veris primordia Hirundines, aut insequentis tempestatis fervorem Cuculus amare consuevit: Qui ab ingluvie ac crapula nullo temporis discrimine passim excitatur affectus, ratione symptomatum non absimilis, nec eandem curationis methodum respiciens, tamen alterius est subsellii. Malum ipsum facile cognoscitur; adfuit enim vomitus enormes, ac pravorum humorum cum maxima difficultate & angustia per alvum dejectio, Ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio & distensio; Cardialgia, sitis, pulsus celer ac frequens cum aestu & anxietate, non raro etiam parvus & inaequalis; insuper & nausea molestissima, sudor interdum diaphoreticus, crurum & brachiorum contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas, cum aliis consimilibus notis symptomatis, quae adstantes magnopere perterrefaciant, atque etiam angusto viginti quatuor horarum spatio agrum interimant. Est etiam & Cholera sicca a spiritu flatuoso supra & infra erumpente, idque sine vomitu vel secessu; cuius unicum duntaxat exemplum me vidisse meminisse inveniunt hujus anni Autumno, quo tempore prior illa species mihi creberrimè, & factio quasi agmine sese obrulit. *Sedula*



Sedulâ mentis applicatione, & multiplici etiam experientiâ edoctus, quod si hinc istos acres humores, fontem morbi, Catharticis expellere conarer, idem agerem atque is qui ignem oleo extinguere satagit, cum Cathartici vel lenissimi operatio omnia magis perturbaret, & novos insuper excitaret tumultus: & si ex adverso Medicamentis Narcoticis, aliisque atringentibus in ipso statim lumine primum humores impetum compescerem, dum naturali evacuationi obstitere, & invitum humorem detinerem, æger, inimico visceribus incluso, bello intestino indubie conficeretur. Has, inquam, ob causas mediâ mihi viâ insitendum esse duxi, ut partim scilicet humorem evacuarem, partim etiam diluerem: morbum itaque hac arte, mihi a multis retro annis comperta ac comprobata, toties quoties in ordinem coëgi.

Pullus tenerior in tribus circiter aquâ fontana conglis elixatur, adeo ut carnis saporem vix perceptibilem liquor referat; hujus decocti (vel defectu ejus liquoris polletici) capaciores aliquot cyathos æger tepide exhaustire jubetur, eodemque tempore, bona ejusdem quantitas pluribus *Enemata* successivè injiciendis inservit, donec qua per superiora, qua per inferiora, tandem omne jusculum absumptum, ac denuo rejectum fuerit. Huic hauribus, pariter ac clysteribus, Syruporum *Lactuca*, *Violarum*, *Portulacæ*, *Nymphæ*, corumve alicujus, uncia subinde admisceri poterit, quanquam & citra ejusmodi additamenta, jusculum ipsum per se rem satis commodè exequatur. Ita ventriculo insigni liquoris quantitate sæpius onerato, atque ut sic dicam, subverso, ac reiterata *Enematum* injectione, humores acres vel foras eliminantur, vel retusa acrimonia, ad temperiem debitam revocantur. Exantlato hoc eluvionis penso, quod tres vel quatuor horas sibi vendicat, medicamentum aliquod *Paregoricum* curationi coronidem imponit: Mihi hoc crebro in usum est.

℞. Aq. Paralyf. ℥j. Mirab. ℥ij. Laudani liquidi gutt. xvi. ejus loco Narcoticum quodvis officinale succedenturari poterit. Atque hæc quam proposui diluendi humores via multò tutius ac expeditius quam quæ vel per evacuationem, vel per atringentia vulgò instituitur, periculosissimo affectui occurrit, quippè cum ab illis tumultus concitator, & ferocior evadat, ac omnia susque deque vertantur, hæc è contra hostem in mediis visceribus detineant, ac ex advena reddunt plane inquilinum; ut taceam, protracto in longitudinem morbo præter periculum ex ejusmodi mora, quâ in massam sanguinis tandem humores vitiosi irrepunt, atque mali moris febrim facile accendunt, etiam ægris gravissimi mali tardium procreari.

At verò diligenter est animadvertendum, quod si non accesserit Medicus, nisi postquam æger vomitum ac dejectionibus ad horas aliquam multas continuatis, puta 10. vel 12. fuerit exhaustus, & jam frigescant extrema membrorum, hoc, inquam, casu, omissis aliis quibuscunque auxiliis recto cursu ad sacram hujus morbi ancharam, *Laudanum* intelligo, confugiendum est, quod non tantum exhibendum est urgentibus symptomatis, sed etiam cessantibus vo-

mitu, ac Diarrhæâ mane & sero quotidie repetendum, donec pristinas vires æger, ac sanitatem tandem receperit.

Hic morbus, quantumlibet Epidemicus, rarissime tamen (quod supra dictum est) *Angusti*, quo primum capit mense, terminos excessit, ex quo mihi subest contemplari elegantissimum illud, subtilissimumque artificium, quo utitur natura in epidemicorum natalibus atque ortu: licet enim eadem prorsus maneant causæ, unde plures sub finem *Septembris* æque ac mense præcedente, hoc morbo possunt corripi, nimia sc. fructuum horariorum ingeltio, eundem tamen non sequi videmus effectum. Quisquis autem *Cholera morbi legitimi*, quocum solo nobis impræsentiarum res est, phænomena studiosè collegerit, fatebitur morbum istum, qui quovis alio anni tempore invadit, quamvis ex eadem occasione prognatum, atque eorundem symptomatum nonnullis stipatum, ab hoc nostro toto cælo distare; haud aliter ac si in aëre peculiaris mentis hujus lateat reconditum ac peculiare quiddam, quod specificam hujusmodi alterationem soli huic morbo adaptatam, vel cruori vel ventriculi fermento valeat imprimere. Hæc *Thom. Sydenham* libro de *Morb. Acutis jam sequuntur Curationes, Consultationes, Observationes & Anatomica inspektiones ab aliis variæ.*

#### Curationes.

In Cholera valent eadem quæ in vomitu, in primis aqu. menthæ, semen rosarum, magister. perlarum, corallorum, tinctur. corall. & essentia Smaragdi. Et, his nihil proficientibus, laudanum opiatum, cujus dos. gr. j. spong. salicibus adnasci solita ad gr. iv. in aqua styptica vel vino rubello. *Joh. Harshmann. in Prax. Chymiatr.*

*Conveniunt hic clysteres adstringentes, cum Alexipharmacis.*

In hoc affectu semper admiscenda sunt *Alexipharmaca*.

Decoctum caryophyllorum, Succus menthæ, & alia ex menthâ peculiari proprietate hic profunt. Aqua Multichina Myns.

Syrupus ejusdem, Laudan. opiatum debet misceri cum theriaca Smaragdina Dom. Petr. à Castro.

*Externè balsamus & emplastrum stypticum Myns. convenit.*

Crystallus est proprium bilis æruginosæ medicamentum, etiam in dysenteria Syrup. cryst. *Vid. Horstius Tom. 2. p. 116.* Sed melius exhibetur Crystallus in substantia propria.

Porro hæc pertinent Medicamenta ex menthâ, Mastiche, Theriaca Smaragdina, præsertim si veniat à veneno, ut & Tinct. Smaragdi, crocus Martis, spongia salicis, Acetum rosaceum, Faber valde commendat in febris malignis, Ebur philosophicè præparatum, terr. sigillat. liquor. styptic. bol. armen. Aqu. Solari. Syrup. coralliorum.

Si adsunt convulsiones medicamenta ex Smaragdo specificè profunt. Decoct. carminat. cum Elect. de baccis lauri, decoct. bacc. lauri cum vino malvatico, ess. carminativa, spiritus carminativus, aqua Zedoariæ cum spiritu & syr. aurantiorum, spiritus nitri.

Si à veneno profunt clysteres ex lacte, & quæ corrosivitati resistere valent.



℞. Herbe mercurialis, malvæ, parietariæ, scordii ana in j. flor. Malvæ p. iij. Rad. alth. ʒj. Coq. in f. q. aquæ com. Col. ℞. ʒ vi. in quibus dissolve Tryphera Persicæ ʒj. M. F. l. a. Clyfma.

℞. Flor. chamom. verbasci malvæ ana mß. Coq. in f. q. Lactis. Colat. ℞. ʒ viii.

Si dolor sit acutissimus in intestinis, laudari opiati gr. iij. vel iij. addi possunt.

℞. Eboris sine igne, crytall. præp. magist. corall. c. succo citri ana ʒj. smaragd. præp. ʒj.

℞. Mag. corall. c. succo citri, Eboris sine igne ana ʒj. Smaragd. præp. croci Martis adstring. ana ʒß. divid. in 2. part. æq.

℞. Spiritus Mastich. ʒij. Lq. stipt. ʒj. M. Doi. ʒo. gutt. in jusclo.

℞. Spiritus Mastich. vitriol. mart. ana ʒiß. M. Doi. 10. vel 25. gutt.

℞. Essent. menth. ʒi ß. Spirit. Mastich. ʒj. Vitriol. mart. ʒj.

℞. Aquæ menth. cinamom. cydoniat. ana ʒij. Ebor. sine igne, mag. corall. c. citro ana ʒij. Smaragd. præp. ʒj. Syrup. corall. ʒj.

℞. Aqu. cinamomi cydon. ʒij. Laud. opiat. gr. ij. vel iij. Myr. cydon. ʒj. M. detur præmissis universalibus.

℞. Pulv. menth. ʒj. ros. rubr. ʒß. Rad. torment. bistort. ana ʒvi. Mastich. ʒij. Nuc. mosch. ʒij. fermenti acerrimi ʒij. Aceti Rosacei q. s. pro consistentia cataplasmatris, vel species possunt pulverisari & insperge pani tolto in vino madefacto.

℞. Empl. de crusta panis q. s. malax. Oleo Mastich. & Balsamo Peruviano, induc super alutam, & obduc syndone rubro in forma empl. stomachalis.

℞. Olei Mastich. menth. cydon. ana ʒj. Bals. Perny. ʒj. Ole. still. menthæ g. vi.

In CHOLERA SICCA. ℞. Decoct. carmin. usitat. ʒi ß. in quibus dissolve ole. de baccis lauri ʒj. stillat. lauri gr. iij. M F. Clyfter.

℞. Aqu. carmin. Dornr. ʒij. Menthæ ʒiß. Essent. Menth. ʒij. Spir. nitr. ʒiß. Externe prodest ole. chamom. menthæ ol. stillat. cinanomj. *Henricus* habet observationem, quod à lacte fuerit orta cholera.

Ole. amygdal. dulc. sed recens demulcet acrimoniam ortam a veneno, ubi etiam lac prodest. *Joh. Michael, in praxi clinica generali.*

Cum in Cholera morbo cunctatio periculosa sit, quam citissime succurrendum, scilicet causæ remotione, correctioneque, mox vero vomitus & dejectionis temperatione, ac virium restauratione. Lucebit autem aliquando, blandioribus tamen medicamentis, vomitum, aut ventris subductionem promovere, cum natura videbitur cunctabunda & æger gravamen in ventriculo persentiet. At in reliquis satius erit abstinere & solis corrigentibus uti, quibus retundatur vis, & molestia irritantis humoris; idque potissimum observandum, si vires ferendo non sint, nam inurbationibus alvi, & vomitibus ultionis, si talia purgentur, qualia oportet, confert, & leviter ferunt. Opiata communi voto commendantur, theriaca recens, diascordium, philonium, ut in curatione vomitus dictum est.

Sedato vomitu, virium refectioni deinceps incumbendum, nec tamen subito & immoderate, sed paulatim, ne gravamen inde sequatur, æqui interea tum extrinsecus tum intrinsecus

fovendus venter erit. Vinum Celso commendatur, sed tenue & odoratum cum aqua frigida mistum: refert præterea Erasistratum qui primo tribus vini guttis aut quinque aspergendam potionem esse dixit, deinde paulatim merum adiciendum. scribitque *Crallianus* multos solo vino præter spem evasisse, & quidem si calidum illud exhibeatur, præsentaneum remedium est, cum & calidas potiones unice produci se, si reliqua omnia æger evomat, advertat *Aræteus*.

*Petrus Joh. Faber* aceto rosaceo ex aqua fontis compescendum vomitum esse consulit, ter aut quater iterato. Deinde suadet tincturam violarum cum syrupo violaceo. *Riverius* etiam oxycrati exhibitione, Vomitum, & alvi profluvium in scemina quædam statim cohibuit. Et *Langius*, cui quoque assentitur *Sennertus*, præsentissimum & probatissimum in cholera humida remedium testatur esse Crytallum ad semidrachmam exhibitum, præsertim in succo citri & berberum, ut vult *Henricus* ab *Heers*; & *Pannarolus* vomitum, & dejectionem sanguineam ad virium jacturam usque cum sudore frigido compefcuit lapide hæmatites in succo puniceorum. Reliqui demum omnes refrigerantibus, & acidis universaliter insistant. Verum hæc opportuna erunt ad humorum acritudinem temperandam, atque in sedanda cholera in picrocholis.

Si maligna febris affectum hunc comiteretur, Bezoardica proderunt, & antimonium diaphoreticum, magisterium corallorum, C. C. ultum, bolus armenia, terra sigillata, ebur, crocus Martis, tormentilla, bistorta, & alia hujus generis.

Cæterum quæcumque stomachum roborant non levem opem in hac affectione præstabunt, præsertim vero quæ ex mentha conficiuntur, ex absinthio & Mastiche.

Ad siccam verò quam appellant choleram, itemque ad ructus, rugitus & tormina ventris, quæ communem videntur habere conditionem, & causam eandem, conterunt status ancuentia, diacinnamomum, dianisum, diacuminum, diatriopipereon, diambra, philonium utrumque, theriaca, nithridatium. Commendatur à *Sylvio* spiritus nitri in aqua feniculi, & syrupo menthæ, itemque spiritus carminativus ab eodem descriptus. Aliis ambra efficacissima dicitur cum quadruplo sacchari. Aliis vinum malvaticum & Cretense in quo feniculi & petroselinæ semina, aut frondes incocta sint. Præcellit vero oleum cinnamomi, & essentia caryophyllorum, ac rosmarini. Rusticis familiare est allium coctum cum ruta, quæ nisi profuerint etiam enemata ex iisdem parata sunt in usu. *Hippocrates 4. de rat. vill. in acut.* Cholera sicca medelam describit per usum el. iterum, vini meracionis, olei, & lactis Asinæ, præter somnum, quem illi conferentem esse dicit. *Lucius Tossæ Medic. Præf. parte secunda.*

### Consultationes.

Juvenis quidam temperamento biliosus, dulcibus & pinguibus vesci solitus, cum in eadem mensa æstivo tempore coepisset, pepomibus, raphanis, aromatibus, & vino generoso largius



largius usus fuisset, cepit à cana, cum se ad sonnum composuisset, nauseam cum dolore pungente & anxietate, circa ventriculum & reliquum abdomen sentire. Paulo post subsequutus est vehemens vomitus, & alui per inferiora evacuatio, quibus tanta copia humorum corruptorum & biliosorum cum flatibus, torminibus, & magna angustia per vices fuit ejecta, ut jam æger valde sitiat, animique deliquis, exudationibus, & magna virium imbecillitate affligatur.

*Afficitur in hoc ægro ventriculus cum intestinis* ut ex nausea, vomitu, aluique copioso secessu est manifestum; afficitur etiam cor & habitus corporis, ut ex animi deliquis, & sudoribus, ac virium illa imbecillitate pater.

*Morbus*, qui cum affligit, est intemperies ventriculi & intestinorum biliosa, & nidorulenta ac corrupta, quæ nauseam, vomitum aluique secessum copiosum ac animi deliquia inducens. Cholera vulgo appellari solet.

*Causa procacissima* hujus morbi est usus alimentorum pinguium & dulcium, antehac ab ægro nostro frequenter usurpatus, item larga illa copiarum, peporum, raphanorum, aromaticum, & vini generosi in eadem mensa assumptio. Hinc enim magna biliosorum & acrimie humorum copia, in corpore ejus genita antecedentem huic morbo præbuit causam. Eaque corrupta, & vehementius circa ventriculum & intestina, item in eorum & reliqui corporis vasis, ebulliens & effervescentes. Continens hujus morbi & symptomatum est causa.

Nam hinc ventriculus irritatus primum *Nauseam*, & ad vomendum proclivitatem magnamque anxietatem, per inordinatum spirituum in ventriculum, intestina, & cor ex cerebro defluentium influxum induxit. Aucto verò hinc illo spirituum, in illarum partium fibras, tum oblique ascendentes, tum descendentes repentim, inordinato influxu, mox etiam per fibrarum illarum contractionem, subsequutus est *vehemens vomitus*, & alui per inferiora evacuatio, quibus humores acres, corrupti & effervescentes, tum à corde ex arteriis coeliacis & mesaraicis in ventriculum & intestina propulsi, tum in iis antea collecti, tanto impetu, tamque copia per vices cum multis flatibus & torminibus, à magna illa humorum effervescencia ortis fuerunt evacuati, ut dissipatis & expulsi per magnam evacuationis istius vim spiritibus & humoribus utilibus. *Æger jam animi deliquis, exudationibus & sui magnopere torquetur.*

*Morbus hic est valde acutus*, ac proinde periculosissimus; metus enim est ne ex humorum perturbatione, & spirituum, humorumque evacuatione magna, æger subito per lipothymiam vel convulsionem extinguatur.

*Curatio* itaque mox sedulo instituenda, eaque in humorum detersione, alteratione, & evacuatione, ac symptomatum mitigatione consistit.

Primo itaque cum etiamnum adsit nausea, humores ita detergantur, & blande educantur.

℞. Hordei tosti m. j. f. Decoque in aqua Chalybeata ad tertie partis consumptionem pro lib. i. Colaturæ adde Syr. cydonior. acetositar. citri an. ℥i. Syr. de mentha ℥ss. misce F. Julapium, de quo frequenter aliquid exhibeatur.

Interea temporis frictions, & ligaturæ sunt brachiorum & crurum subinde solvendæ ut iis fluxus humorum advenientium nonnihil succedat.

Post absterfionem leniter factam, & ubi materia corrupta sic satis evacuat fuerit, exhibeatur hoc electuarium corroborans.

℞. Conservæ rosar. antiq. R. dic. cichor. an. ℥j. f. Rob de Ribes, carnis cydonior. an. ℥ss. sem. acetosæ, citri, pulv. an. ℥ss. cornu cervi vili præp. ℥j. f. cum Syr. de acetositate citri q. s. f. Electuarium, de quo sumat frequenter quantitatem castaneæ majoris.

Ubi per diem unum & alterum symptomata vehementiora quieverint blando cathartico reliquæ materiæ peccantis si quæ supersint, educi poterunt.

*In vitæ ratione*, Aer ad frigidum paululum declinet. *Cibus* sit ex ovis sorbilis, carnis gallinarum, veruecum, Parum autem alimentum admittat, donec vehementiora symptomata mitigata fuerint. *Potus* sit cerevisia tenuis. *Quies* corporis imperetur. *Somnus* omni ratione conciliandus. *Viteatur* ira, mæstitia, & sollicitudo. *Henric. regium apud Theodor. Cr. in medication. lib. 3.*

Ancilla ab heræ ad pharmacopolium, cornu cervi, ad vermes intestinorum necandos, enendi causa missa, attulit (sua, incertum, an aliena culpa) arsenicum; illudque cum rob de ribes mixtum, a matre, rei hujus inscia duobus liberis, post cenam cubitum iturus fuit exhibitum. Paulò post uterque puer incidit in magnam sitim, stomachi ardorem, ventriculi & intestinorum roiones, acutissimum dolorem inferentes, quem jam secutus est vomitus magnus, aluique copiosus secessus.

*Afficitur in his ventriculus & præterea intestina*, quod sitis, ventriculi ardor, intestinorum roiones, vomitus & alui copiosus secessus satis evidenter docent.

*Causa* hujus morbi remota fuit ancilla, quæ arsenicum, loco pulveris cornu cervi, attulit. *proxima* vero fuit mater, quæ culpæ commissa inscia; arsenicum illud pro pulvere vermium necandis apto, liberis suis exhibuit. Idque innotuit ex diligenti inquisitione, quæ occasione vehementissimorum symptomatum, in historia superius commemoratorum, & post hujus pulveris summionem subito apparentium, in pharmacopolio postea fuit facta.

*Morbus*, qui eos affligit, est intemperies calida, acris, & corrosiva ventriculi & intestinorum; quæ ab arsenico assumpto orta, materiæque acris copiosum vomitum; & excretionem multam per inferiora efficiens, aliisque commemorata gravia symptomata producens, Cholera arsenicalis est dicenda.

Intemperies hæc vulgo deleteræ & occultæ qualitatibus vitium esse dicitur. Verum cum ea manifestissimo particularum arsenici acumine; quo illa instar pulveris vitri scindunt, & præterea in vehementissima incalescendi vi, qua illa in modum calcis vivæ urunt, & partes contactas incendunt, revera consistat, atque hinc suam magnam, stomachi ardorem, ventriculi & intestinorum acutissimas roiones, præterea excretionem rerum acrim per vomitum & alui secessum, dum manifeste producat, & nisi remedia tem-



pestivè adhibeantur *singultum, spasnum & ipsum mortem*, hac manifestâ sua acrimonia & caliditate, sit productura, nullam causam video, cur non hic in manifesta hujus morbi intemperie subsistamus *Morbui* hic cum à causâ vehementissime agente, gravissimaque symptomata inducente, & ni ei mox obviam eatur, graviora etiamnum inductura, originem ducat, in *maximo vite periculo* versantur hi pueri.

Celerissima itaque *curatione* suppetias ipsis veniendum: *qua* in arsenici evatuatione & in ejus reliquiarum acrimoniæ & caloris attemperatione, & in corrosionis ablatione consistet.

Singulis itaque eorum mox exhibeatur tale vomitorium, quod simul acrimoniam veneni retundet, & leniet atque evacuabit.

℞. Conservæ asari ʒv. Contundatur in mortario marmoreo, addendo Aq. decoct. hord. ʒij. & exprimatur per linteum succus, cui adde olei amygdalar. dulc. recentis ʒj. Misc. f. vomitorium.

interea temporis, dum hoc medicamentum præparatur, ut etiam postea quovis tempore, utique liberaliter subinde bibat cerevisiam in quâ copiosum butyrum est liquatum; ea enim ratione, & evomitio arsenici procurabitur, & acrium & scindentium, ac corrodentium ejus particularum acies, per ramosas & plicabiles butyri & olei partes, implicabitur, & obvolvuetur: ejusque rosio & scissio, calefactioque impedietur præsertim cum ista pinguedine etiam ventriculus, & intestina, aliæque partes sint obducendæ, eaque adversus corrosionem, tum factam, tum faciendam muniendæ.

Ubi per vomitum purgati fuerint, exhibeatur singulis hoc medicamentum, ad eundem scopum.

℞. Olei amygdalarum dulcium ʒiij. Theriacæ Andr. ʒij. misc. Ad sitim leniendam hæc utantur ptisana.

℞. Hord. mund. m. j. liquir. ras. passular. an. ʒss. malvæ m. j. sem. malvæ ʒij. coq. in aq. comm. ad lib. i. f. postea colentur pro Ptisana.

Subinde etiam sumant de hoc syrupo.

℞. Syr. acetositatis citri ʒiij. violacei ʒj. Misc. Ad veneni hujus partes implicandas & frangendas magnopere etiam conducunt sequentes tabellæ:

℞. Crystalli veri, Margaritarum an. ʒj. contundantur, & postea terantur super marmore in alcohol, sive pulverem omni asperitate orbatur; deinde cum sacchari albi ʒiij. in f. q. aq. melissæ solutis. f. tabellæ. Itaque de his dragmæ quantitas per vices subinde ipsis exhibeatur.

Item magnopere hic conducit crystalli alcohol, ad ʒj. quantitatem cum oleo amygdal. dulc. recenti exhibitum.

Lixivium sarmentorum per os assumptum etiam summopere hic prodest; cum salinæ ejus particulæ, cum arsenici particulis acutis, instar pectinum sibi mutuo, implicatorum ita inter se contendantur, ut mutuas acies abscondant, atque ita vehementiores punctiones impediant.

Postridiæ ad excretionem reliquiarum veneni, si tormina adhuc adsint, singuli puerorum sumant ʒv. cassiæ recentè extractæ, in formâ boli. Tumque in reliquis remediis etiam perseverandum.

Inter *alimenta* exiheantur lac, Oryza, jus-

cula pinguis, butyrum, malua, portulaca, videntur omnia alimenta acra. *Henric. Regius apud Theodor. Craanch. medication. lib. 3.*

Vir triginta annorum, crassus & ingluviei deditus, incidit in enormem evacuationem spontaneam, qua multa corrupta per superiora & inferiora magno impetu rejecit. Hanc subsequuta est syncope, a qua vix liberatus, mox prolapsus est in magnam musculorum manuum, pedum, crurum, colli, gutturis, Pectoris, dorsi, & ventris inferioris, contractionem, quæ tantis doloribus, & animi deliquiis est comitata, ut adstantes ipsum jamiam moriturum metuant.

Partes quæ in hoc agro afficiuntur, sunt *ventriculus, & intestina*, ut ex vomitu, & alui secessu; *et* ut ex syncope: item *musculi totius corporis*, nec non *cerebrum*, ut ex ingenti illa partium contractione est manifestum.

*Morbui* quo hic æger laborat, est intemperies ventriculi, & intestinorum varia, acris, & nidorentia, ac corrupta, quæ vomitum aluique secessum copiosum, animique deliquia, & musculorum totius corporis contractiones vehementes inducens; *cholera convulsiva* comitata appellari potest.

*Causa præcæritica* hujus morbi est ingluvie nostræ ægri, quâ multi varique humores acres, in corpore ejus geniti *anteceðentem* huic morbo præbuerunt causam. Pars verò eorum circa ventriculum & intestina, & in eorum, reliquique corporis vasis ebulliens & effervescentes continens hujus morbi & symptomatum est causa.

Hinc enim ventriculus & intestina irritata motum vehementiorem, inordinatumque impresserunt nervis sibi implantatis: quo per illorum fibrillas ad cerebrum, cerebrique spiritus delato, pori cerebri ita fuerunt aperti, spiritusque cerebri ita determinati, ut illi in fibras ventriculi, & intestinorum, oblique ascendentes, & descendentes, magno impetu confluerint, easque secundum latitudinem dilatando, & longitudinem abbreviando, contraxerint. His contractis ventriculus, & intestina ita fuerunt mota, ut copiosi humores acres, corrupti & effervescentes, tum à corde ex arteriis celiacis & mesaraicis in ventriculum & intestina propulsi, tum in iis antea collecti, *magna impetu*, tum per os, tum per anum fuerint rejecli.

Dispatis autem & expulsis, per magnam istius evacuationis violentiam, spiritibus, & humoribus utilibus, sanguis ad cor perueniens ineptus fuit ad justam dilatationem in corde suscipiendam, quo *spiritus vitales deficientes syncope induxerunt*. Expulso verò deinde ex corde pravo illo sanguine, & meliore ad illud redeunte, spiritibusque vitalibus satis copiose recens ex eo genitis, *æger nosse syncope fuit liberatus*.

Quia verò reliqui pravi humores, in corpore postea effervescentes, jam vehementius suo impetu membranosas vellicant partes, motumque illum vehementem & inconvenientem per nervos ad cerebri ventriculos, spiritusque ibi contentos deserunt; hinc fit, ut illi tam pravam motus determinationem accipiant, porique cerebri ita aperiantur, ut spiritus, inordinates in partes fluentes, valvulas nervorum, musculis totius corporis insertorum, quæ iis contrahendis



hendis inserviunt, citra aut contra voluntatem nostri ægri jam aperiant, tantaque vi, tum ex cerebro, tum ex oppositis musculorum poris & cavitatibus, in mûculos gutturis, dorli, pectoris, inferioris ventris, item brachiorum & crurum, fluant, eosque cum magno dolore, novam lipothymiam per constrictionem cordis subiinde inducente, vehementer secundum latitudinem, & profunditatem distendant, secundum longitudinem verò contrahant: atque ita totius corporis vehementissimam convulsionem nunc excitent.

*Morbis* hic periculosissimus est. Metus enim est, ne æger ex violentiâ doloris & perturbationis, subito extinguatur.

*Curatio* itaque diligens quam primum est adhibenda. Mox igitur sumat hoc medicamentum, ut ventriculus ab humore acri abluatur, humoresque acres temperentur, & excernantur.

℞. Decocti hordei communis, non excocti ℥ij. Syr. ex infusione rosarum ℥j. Misce.

Pro lipothymia aqua digitis in faciem ægri inspergatur, & vinum generosum cum linteis; naribus admoveatur.

Postea ad impetum cholerae inhibendum; vomitum, & alvi secessum reprimendum, ut etiam ad lipothymiam tollendam, de sequenti mixtura quotidie aliquid sumat.

℞. Rob. de Ribes ℥ij. Cerasorum ℥j. Syr. cydoniorum ℥i. Manus Christi cum perlis 3 vi. Misce.

Ad contractiones membrorum, partes omnes convulsionem patientes inuaguntur indefinenter cum frictione forti, hoc sequente linimento.

℞. Olei irini, vermiuni terrestrium an. ℥ij. Calorei pulverisati ʒiv. Misce.

Ubi malum inclinaverit, nutriatur lacte amigdalato, cui modicum sacchari sit additum, & reiciatur cibis euchymis, ut ovis forbilibus, & pullis gallinaceis, ac similibus. Exhibeatur etiam diacydonium post singulos passus.

Ubi per diem unum, atque alterum symptomata vehementiora quieverint, blando cathartico reliquæ materiæ peccantis, si quæ supersint, educi poterunt.

*Ad præcautionem* novi paroxysmi utatur parciore cibi & potus quantitate, corpusque subiinde blande expurgetur. *Hent. Regius apud Theodor. Craanen. Medication. lib. 3.*

### Observationes.

Juvenis quidam bilioso temperamento præditus, incidit ætate media in febrem tertianam, quæ duabus primis accessionibus satis mitis apparuit, sed in tertia accessione, tanta fuit humoris biliosi malignitas, & ferocia, ut concitato vomitu, atque alvi fluxu frequenti, cum maxima virium jactura, summum agro periculum impenderet, vocatus ad eum præscribo clysterem ex jussulo cum conf. alchem. ʒij. Theriac. rec. ʒj. quo statim vomitus & alvi fluxus sedatus est, quia verò in hujusmodi febribus malignis seiva illa symptomata in singulis paroxysmis redire solent, & ægrum secunda, vel tertia invasione de medio tollere, ad præcautionem præscripi victum incalescentem, & laudani gr. i. duabus horis ante paroxysmum su-

menda, sicque symptomata prædicta non redire, levis accessio fuit, & Julepis refrigerantibus, incalescentibus, atque alexipharmacis curatio absoluta est. *Laz. River. Cent. 3. Observ. 78.*

Mulier quædam correpta est Cholera morbo 23. die Julii circa meridiem & ad vespertinam usque vigesies alvum deposuit, cum gravissimis doloribus, non solum intestinalibus, sed etiam ventriculi intestinalibus, ita ut sequenti die, etiam vomitu premeretur, multosque humores acres & biliosos excerneret. Maritus a me consilium petiit, dum alia remedia pararentur, conuio ut ægra oxycrati cyathum assumeret, cujus adeo efficax fuit operatio, ut vomitus & alvi fluxus statim cohibiti fuerint, & alia remedia omissa, discedente ægra, se à morbo liberatam, & pristinae valetudini restitutam. *Lazarus Riverius, Cent. 4. Observ. 8.*

Mercator quidam *Montepeliensis* septuagenarius, gravi Cholera morbo correptus 4. præcipue remediis intra 7. dies liberatus est. Clystere ex lacte confect. de hyacintho conserv. ros. & vitell. ovor. sotu ventriculi adstringente & roborante, cum sacculis in vino rubro maceratis, Julepo ex decocto plantag. & portulac. cum Syr. cydonior. & confect. de hyacintho mane & sero exhibito, & Laudano cujus gr. j. singulis noctibus in Julepo dissolvebatur. Pro miraculo habita est hæc curatio in tam proveceta ætate. *Lazarus Riverius, Cent. 4. Observ. 33.*

Laterarius quidam mediâ dum ætate uxorem suam formosam noviter nuptam, in mio libidinis ardore accensus aliquando cognosceret, valde periclitatus est, nam copiosissime per vomitum & secessum sanguis excernebatur, cum calor & motus ora venarum peruisissent, istum morbum sanguineam choleram appellavi. Sanguine ad 12. circiter libras ejecto maxima aderant symptomata, nempe pulsus deperditio cum defectione virium, facies *Hippocratica*, sudor frigidus, & jam desperatus erat, tamen propinatus cum vino granator. Lapid. Hæmatitis ʒiv. statim sanatus est, magnâ omnium admiratione. *Dominicus Panarolus Obs. 11. Pentecoste 1.*

Dominum quendam latè imperantem, subita aggrediebatur cholera, cujus vomitum sequens sedabat medicamentum.

℞. Latidan. aromatic. gr. ij. Syr. Corall. ʒij. Aqu. cinnamom. ʒj. Misce. alvi autem fluxus adhuc tantus erat; ut cum magno ventris, ex flatibus dolore per biduum centies excrementa ejiceret. Quiescebat tandem effervescentiâ, auxilio supra scripti medicamenti, quod decoctum hoc sequens, pro potu ordinario adhibitum, maxime adjuvit.

℞. Conserv. Rosarum ʒij. Ligni sassafras ʒj. Rad. Tormentillæ ʒss. Hordei mundat. ʒj. Coquantur in aqua communi colaturæ ʒij. adde Syr. Coralliorum ʒij. Misce. f. potio.

In Urbe Batavia quædam femina Illustris in vehementem vomitum, fluxumque alvi frequentem, quos ventris dolores status concomitabantur, misere incidebat. Per sequentem mixturam graviora symptomata quieverunt, & durantem adhuc alvi fluxum infra scripta emulsio sedavit.

℞. Laudan. aromatic. gr. v. Syr. cinnamom. Corallior. an. ʒij. Aq. menth. ʒi ss. Misce. pro 3. aut 4. vicibus.



Emulsio. ℞. Conserv. Rosarum ʒij. Rasur. C. C. ʒij. Lign. Sassafras ʒj. Coquantur in aqua simplici q. s. ex colatur. ℥ij. & Amygdal. dulc. ʒj. Fiat emulsio, huic adde Corn. cerv. ust. ʒij. Philosoph. præp. ʒi ʒ. Syr. corallior. Perlarum ana ʒj. Muc. Hermann. Nicol. Grimm. Compend. Medico chymici lib. 3.

Puer quatuordecim quasi annos natus, hero suo qui est a pedibus, & manu, feriâ tertiâ Pentecostes hujus anni, finitâ concione vespertina, invisit domum alicujus patris familias hujus urbis; qui merendæ loco oxygala ipsi apponit. Idem domum reversus cum forte in culina heri sui reperit solito in loco, ab ancilla sepositum lac ovillum, ejus magnam partem in se ingurgitat, non avariter. Pauculis autem horis intermissis, & die se in crepusculum præcipitante, ecce puer hic usque adeo horrendis symptomatis corripitur, ceu toxicum hausisset. Accersor, compareo, jubeo actutum ut pareatur Clyster domesticus ex lacte, ac ei dextre applicetur. Verum licet is alvum semel atque iterum ab illius usu deiceret, attamen gliscabant symptomata cholerae propria, usque adeo ut præ doloribus intolerabilibus, ita sive exclamaret, sive vociferaretur, ceu in quætionem esset datus. Jubeo adstantes pararent, ex terna infusione vini, florum camomillæ campeltris, potionem pro aliquot sive doibus, sive vicibus, eum in modum, quem pridem in historia camomillæ Quadripartiti mei, Argentorati a filio meo Charissimo Simone editi, publici juris feci, quem proin non opus est huc arcescere, ne actum agere ac medicinz candidatis, aut novellis practicis, veluti cramben bis coctam obtrudere velle videar, quorum ingratiam & commodum, (non moror, non sum invidus) hic loci noto, quod ab usu dicti infusi florum chamomillæ, horrenda illa symptomata mitescere quidem ceperunt, attamen cum continuacius esset malum (lac quippe coagulatum in vivo corpore comparatur ad venena) ac labascentes vires pueri præsentissimum Alexipharmacum poscere viderentur, hoc ipsum, Collega, & consultore Viro celeberrimo Dom. Olao Borrichio præscripsi quod

℞. Aqua Zedoar. cum vin. ʒiv. Cardui Bened. Veronic. an. ʒvi. Theriac. Andromach. recent. Dioscord. Fraçastor. an. ʒij. Radic. Zedoar. galang. an. ʒj. Syrup. nienth. crisp. q. s. ad edulcandum. Muc.

Cujus mixturæ, cum unum itemque alterum cochlear absorbuisset, dictum, factum, divinâ interveniente benedictione, dolor & cætera symptomata evanuerunt penitus. Interim Medicinæ candidatis (insuper lubens illorum causa, vel paradoxologus nominabor ab illorum hominum, genere, qui nihil rectum putant scioli, nisi quod ipsi faciunt) revelabo hic arcanum practicum: Jam Dei gratiâ, ab hinc quadraginta & amplius annos, praxin medicam exercens, nempe ex simplicium aut vegetabilium numero, contra inflationes hypochondriorum ac ventris tormina in utroque sexu, haud reperiunt in Zedoariæ radice generosius medicamen; imò insuper puerperis lochiis cessantibus, radice Zedoariæ nihil est conducibilius. Si illius pulveratæ draghma dimidiata, duabus tribusve guttulis roris marini olei irrorata, aut con-

sperfa in vini haustulo calido propinetur. Simonis Pauli.

### Anatomica inspectiones.

Puella 20. annorum cholera obiit cadaver ab Adr. Falkeburgio sectum vasa mammaria diligentius inquirenti nusquam apparuere, in abdomine multa immutata; Ventriculi fundus transversum palmum infra costas spurias demersus, nullo omenti fotu gaudebat, undè ventriculus imbecillis tanta vehementiâ viventem puellam ad vomitum concitavit, ut revocato omni ad caput sanguine, post mortem rubeus faciei color persisteret: quâ etiam vehementiâ ruptis viscerum vinculis, ventriculus cum intestinis fuit depressus: Omentum infra ventriculum ad os lichi protendebatur, intestinum colon profundius, multis alias gyris & circumvolutionibus distinctum, hic levi inflexione serræ dentes amulabatur: In intestinis vero vermiculus rubicundus latitans, corpus vero caecochymicum notabat. Lien dupla magnitudine, tumidus, à solitâ figurâ in globum oblongum mutatus videbatur. Meatus cholidochus in plurimos ramulos divisus multum bilis ob angustiam regurgitare fecerat, undè molestus ille & lethalis biliosarum humiditatum vomitus concitatus. Th. Bartholinus Cent. 2. Histor. 81.

Secundo Comitem Aufumondianum, offendimus porum cholidochum, alias in ecphyfin se exonerantem, proximè pylorum egressum habuisse, ita ut non minus ventriculo quam intestinis bilem transmitteret; hinc causâ, cur sæpius nausearet vomeretque & alvo esset duriori; Natura enim nativo suo clysmate orba, cum nihil expultricem irritaret, desidebat, undè subito cholera diem finit. Barthol. Cabrollius Observat. Anat. 6.

### CHOREA SANCTI VITI.

Tarantulatis affine est malum quod Choreæ, & saltus S. Viti appellatur. Hoc enim delirio & insaniz genere qui laborant, dies, noctesque saltare gestiunt. Nonnulli equidem choream S. Viti ad *chorea* veterum referendum censent. Neque negandum est, quandoque etiam quiddam divini subesse, & malum hoc pœnæ loco interdum divinitus immitti, sicut sedecim viris & tribus fœminis in cæmeterio choreas ducentibus ex imprecatione sacerdotis anno Domini 1012. id accidisse refertur ex Vincent. Belvacensi lib. 26. cap. 10. Verum sæpius hoc malum à causis naturalibus & humore maligno provenit; cum *chorea* Græcorum sine dubio à Dæmone immisus fuerit, & præcipue in sacrificiis, quibus cessantibus etiam *chorea* cessavit. Qui verò hoc modo laborant, continuo, diesque noctesque saltant. Ita refert Felix Platerus lib. 1. Observat. ut & in Practic. se vidisse fœminam Basileæ, cui Magistratus viros aliquot robustos constituerat, qui alternatim uno fesso, altero succedente cum ea dies noctesque tripudiarent. Quod ferè mensis spatio spectantibus multis duravit, sine ferè intermissione, & si solearum pedum ejus cutis attrita esset. Et licet aliquando ut cibum caperet, & somno



sonno correpta, sedere cogeretur, tamen gestu, motuque corporis inquieto interim nihilominus corpus veluti saltans agitabat. Ortum autem habet proculdubio hoc malum ab humore maligno Tarantulæ veneno simili. Sicut enim hydrophobia quidem a rabidorum animalium veneno extra communicato plerumque oritur: interdum tamen, ut supra dictum, etiam in ipso corpore tale venenum generatur, a quo hydrophobia excitatur: ita etiam non impossibile est humorem malignum Tarantulæ veneno cognatum in ipso corpore generari. *Daniel Sennert. Pract. lib. 1. part. 2. cap. 17. oper. T. 2.*

Quod Vitilla cura à nobis describitur, & proponitur, res multis temeraria, & plane impossibilis esse videtur, his rationibus persuasus, quod nempe Vitilla à S. Vito nomen traxerit, qui plagæ & pœnæ loco hunc hominibus morbum immittat: aut quod Viti vice ipse Deus propter hominum peccata malum hoc iungat. Quod quidem vero esse simile quandantenus nos minime inficiamur: non tamen arbitramur interim, pœnam tam talent esse, quam vel Deus ipse, vel Divus nobis infligat aliter, quam permittendo, ut per choream Viti imprecationem, imaginatio ejusmodi in animis hominum generetur, per quam iste morbus deinceps introducatur, & emergat quem vulgus postea pro pœna divini æstimet, cum tamen ægritudo ea sit mere æstimativa seu imaginativa, sicut in capitulo de origine ejus tradimus. Contra ejusmodi Vitillam æstimativam vel imaginativam, curam talem proponimus, eamque peculiarem. Præterea si originem traxerit ex levitate animi, consentiente voluntate, quæ æstimo, chorea lasciva, vel levitas animi vocatur: Contra hanc ipsam quoque aliam, eandemque singularem curam docemus. Tertiò contra choream coactam cuius origo naturalis est, naturalem quoque Medicinam apponimus. His tribus distinctis speciebus tres distinctas curas apponimus, quarum quilibet suo morbo seorsim applicanda est, nec una pro altera unquantacit.

Dum ergò primam de Cura choreæ æstimativæ, vel imaginativæ ex imprecationibus discerimus, notandum vobis erit, discrimen aliquod intercedere inter æstimativam, & imaginativam, quia nimirum altera ex ira, altera ex lascivia oritur. Primam ergo nos *Vitillam*, alteram *Lascivam* vocamus, quarum cura quoque diversa est, velut ortus. Et Vitilla extra nata cura ejusmodi est. Ex cera vel resina patiens imaginem sibi similem finget & obstinate, firmiterque sibi persuadebit aut cogitabit, universas adjurationes seu imprecationes, quas unquam fecerit, pro sua voluntate in hac imagine perfectum & impletum iri, hac ratione: nempe intra sese ita cogitabit, quod imagini omnia ea mala imprecetur, omnesque suas cogitationes, ac animum penitissimum citra recordationem omnem aliorum hominum in solam eam imaginem intendet & defiget, ac cum intentione eam animi obstinatissimè tandem imaginem in ignem projiciet, exuretque ut nec cinis nec suligo ulla ex materia imaginis corporaliter superstes relinquatur. Dum ista prædicto modo fiunt, ex imprecante cogitationes usque adeò efficaces & validæ in imaginem procedunt, & effundun-

tur, ut nihil ob stare aut adversari queat. Imprecationes enim periciuntur in iis, qui eas faciunt, non in iis, contra aut in quos fiunt aut jactantur, idque ob hanc causam, quia aliorum lenitas per suorum hostium iram lædi non potest: Sicut de imaginibus traditur. Itaque ejusmodi reluctatio nulla etiam in imagine existit, sed hæc corporaliter comburitur, ita ut imprecanti cogitationes hæc omnes adimantur. Hæc autem qui ex ipso fundamento intelligi debeant, plenius de *Imaginationibus & incantationibus, de impressionibus* traditur. Et fieri hoc etiam potest, ut si vel tantillum cineris corporaliter de ista imagine relinquatur, ægro curæ satis prælitum minime sit, sed de morbo aliquid adhuc superstes maneat. Quæ causa sola cera & resina huc conducunt, seu de imaginibus & impressionibus dilucidius docetur. Sed hæc hæctenus de curâ Vitillæ ex irâ dictâ sufficiant. Deinceps etiam de Choreâ lascivâ & impudicâ differemus tali ratione:

Per usum ac rerum Magistratam experientiam constat, quod contrarium unum per alterum naturali modo pellatur. Hoc vero cum modis variis, diversisque fiat, vos hoc loco nostram quoque experientiam proponemus, qui lascivæ & immoderata chorea expellatur, & expugnetur, & sit hoc modo. Si choreilla, vir, vel femina ex uberiore lascivia choream hanc ordiatur, & saltare incipiat (quod feminis, quam viris frequentius accidit, ut quæ plures æstimationes, & cogitationes habent, & profundius, efficaciusque imaginantur, & facilius à naturæ suæ fortitudine seipsas vincunt & expellunt) nihil magis prodest ac conducit, quam quod cogitationibus & operibus eorum adversum est. Ipsarum enim cogitationes liberæ & lascivæ sunt, levitatis plenæ, omnis pudoris, timoris ac verecundiæ vacuæ, quas ita expelles. Abstrude eas in locum caliginosum & obscurum, cibentur aliquandiu solo pane, & aqua, nullo misericordiæ affectu in eo loco sordido serventur. Hoc modo fiet, ut per esuriam, & penuriam, aliam naturam ac cogitationes concipiant, ita ut lascivia per eam abstinentiam expugnetur in ipsis, & opera luxuriosa sopiantur, sanguis ferocior residat, spirituique vitæ leniatur & remittat, corque ex lætitiâ in mœrorem à captivitate, & loci sorditæ conjiciatur, adeoque vetus morbus vaneat, & tristitia recens, nullâ lætitiâ, nullo risu, saltu ac clamore comitante, animum occupet ac gubernet. Quibus omnibus prælitis, ex loco obscuro captivæ emittuntur, sensimque ac de die in diem prior dicta laxetur, & cibus paulatim melior præbeatur, carcerque subindè lenior & tolerabilior reddatur; donec ipsa quoque Melancholiâ consumptâ, ratio vera postliminio redeat. Et hujusmodi regimen tam cogitationes, quam gestus & opera horum amentium tollit. Mera verò insania est, quod quidam putant hujusmodi choreas expugnari, si saltantibus immittantur & jungantur alii, qui eodem modo tripudiant, & ad ægrorum exemplum similiter se gerant, contentque & subsiliant. Istâ enim æmulatione ægri plus incitantur, quam ut reprimantur: licet diversum statuunt alii, persuasumque habeant, ægros saltatim exanimatim iri tandem, nisi tali diludio cohibeantur. Id quod morum



merum somnium est. Quinimo hoc multò conducibilis est, ut fustibus probe pulsantur, & comminuantur, & a saltu per vim in carcerem abripiantur, & abstrudantur. Ubi tamen hoc quoque simul notandum est quod vapulantes si quandoque intra se iram graviores concipiant, ejus vi prosterni & interitui possint. Et hac cautela observata omnino opus est. Rarius autem non proncit, si in aquam frigidam insperato conjiciantur.

Reliquum est ut tertiam quoque curam choreæ naturalis scilicet ex ipsius naturæ principio ortæ, subjungamus, prout in capite de chorea definivimus, quod malum hoc ex venis ritis oriatur, quarum vi & incitatione ægri ad salendum compellantur. Hæc autem cura per remedium genera duo perficitur, nimirum per externa & interna. In externa cura notanda sunt loca exteriora, in quibus morbus sese prodit, & exerit. Interiora vero remedia ex essentia quinta sunt hujusmodi. Aurum potabile, oleum Margaritarum, materia gemmarum, aqua margaritarum, anodynum summum, Quinta essentia Opii, quinta essentia mandragoræ, quinta essentia papaveris, Quinta essentia lolii, aqua vitæ, cancerorum &c. ex his sunt nonnulla, quæ non intus saltem, sed etiam foris adhiberi possunt, ut summum anodynum, essentia mandragoræ, essentia opii, essentia papaveris, Ess. loliatorum.

Hæc loca & regiones inungi debent. Formula tamen hæc composita nobis usitata sæpius commoditates ingentes præstitit.

℞. Essentia quintæ opii ʒj. essent. quintæ mandragoræ gr. vii. essent. quintæ lolii ʒj. essentia quintæ papaveris ʒij. essent. quintæ jusquiame ʒiij. auri potabilis ʒiij. aquæ cordis ʒvi. misceantur omnia. Mixturæ hujus, mane, vespere, & circa diem median, guttas 4. in vino bono aut aqua pura propina, ad finem usque sanationis. Externa vero membra inunge his rebus.

℞. Summi anodynii ʒß. ol. nucis muscatæ ʒj. ol. musci ʒj. misceantur in formam unguenti quo membra titillationis primaria, velut alas, collum, inunges.

Prodest hoc etiam in casu prædicta carcerandi norma ac ratio, severitate tamen lascivis debita aliquatenus remissa. Nam & hic tristitia inducenda, & alteratio corporis per abtinentiam facienda est. Sed hæc de chorearum curâ hæcenus sufficiant. *Theophrast. Paracelsus de morbis Ament. tract. 2.*

Puella est Pia ac proba, bene morata & educata: salubriter antehac vixit, nihilque deprehensum, quod corporis offensam argueret: temperaturæ, ut videbatur, calidæ & siccæ, adeoque cholericæ, quæ ad iracundiam levissimè incitatur, fratrem habet epilepticum, & certè ejus ipsa natura, sicut & sororis in idem malum propendere videtur. Ea 7. Julii anni præteriti 1622. cum pridie leves capitis dolores sensisset, mane circa septimam, cum ad templum se præpararet, subito quasi consternata, concidit, & scamno immixa adhæsit; loquelâ impeditâ incedere, manus pedesque movere ac attollere nequivit. In lectum translata, quadam quasi anhelitus difficultate, itaut ægre spiritum duceret, & pectus, scapulasque inter res-

pirandum insigniter attollere cogeretur, premi cepit, & interdum clamorosa suspiria duxit; rediit autem subinde quasi per paroxysmos hæc difficultas, atque pressura, in qua nil quicquam loqui potuit, reliqui autem sensus, vius & auditus integri manserunt. Paulo post caput hinc inde conjectare cepit, mox tamen rigidam & immobilem cervicem habere visa est, & quod postea in erectione capitis à me animadvertum, cum quid sorbitionis vel medicamenti ingerere vellet, capite retrorsum magnâ vi retracto, manumque attollentis deprimente, opisthorono prehensam judicavi: perterritus autem ægritudinis infrequentia & insueto morbi, qualis nunquam occurrit, insultu, cum diu suspensus hærerem, ea fere adhibui medicamenta, quæ in Epilepticis invasionibus utilia existimaui. Sed durabat affectio, & post leves intermissiones subinde recurrebat, ad horam usque duodecimam, quando omnia invalescere incipiebant. Tum majoribus suspiriis anhelans, & ejulans spiritum traxit, atque cervicis nervorum rigore continuo detenta, pejus habuit adusque tertiam. Hinc mitigato malo loqui cepit, delirare, cibum poscere, vociferari, indignari ad usque vespere, ubi tum ab inquietudine hæc languescens extremâ debilitate laboravit, ita ut sensu motûe privata, animam exhalatura videretur: duravit autem languor hic per 2. ferme horas, quibus exactis sensim se recollegit, & ad sese rediit, cibisque refecta per totam noctem placide dormivit. Altero die mediocriter habuit, & medicinam purgantem sumxit. Duodecima autem horâ malum reversum est & prioris diei fere formamque modumque servavit, nempe per intervalla tetano correpta, cervicis rigorem, spiritusque difficultatem atque pressuram passa est: inter paroxysmos de tanto capitis dolore conquesta, ut ad clariorem etiam vocem & loquelam quiritaret, alias loqui, imò linguam movere non potuit, nili forsan ubi mitior invasio, ubi tum lingua titubavit & inexpedite loquuta est. Tercio die sat bene habuit. Quarto post levio-rem paroxysmum in tantam pedum convulsionem & contractionem incidit, ita ut pedes retracti quasi funibus corpori alligati viderentur, absque tamen omni dolore, tendines autem sub genibus lapideæ ad tactum duritiæ, & rigiditate continuâ afficerentur. Et quamvis post convenientes inunctiones melius habere videretur, attamen ad quartum usque diem spasmodica hæc & violenta contractio, continuò perseveravit, interim corpore reliquo bene valuit, à prioribus paroxysmis plane immunis: quarto autem die circa vespere subito distensio hæc remisit, ipsaq. ex improviso è lecto prosiliens in pedes se coniecit, & parentibus accurrens latabunda liberationem annuntiavit: post hæc bene se habuit, sensumq. validior facta est, ita ut penitus restituta crederetur.

At post mensem nempe 6. Aug. cum pridie magnos capitis, frontis maxime, temporumque dolores passa esset in idem ferme malum, alio tamen invasionis modo, incidit, nam manè sumto jentaculo, cum corporis titubatione, & vertigine vexari videretur, in lectum redire jussâ, profundo quasi somno abrepta est:



in quo tanquam somnians vana loquebatur: subito autem exterrita, quasi cum magna & precipiti corporis concussione, evigilavit, mox rursus somno se dedit, denique terrore concitata exasperata est, & id per integram horam, vel diutius paulo duravit idemque post prandium & cenam, & posthac sæpius quam primum aliquid cibi ingessit, evenit, itaut mox super dormire cogeretur, & resitico tali somno corripere, nocte alias placido ac naturali somno semper ferè dormivit, excepta tertia ab accidenti hoc nocte, quam fere totam deliravit, ita ut omni intellectui orbata videretur: memoria ita defecit etiam ut orationem dominicam amplius orare nequiverit: per intervalla tamen mens & memoria reveria, post leve autè momentum iterum extincta. Circa vespeream convulsio invasit nunc hoc, nunc alterum brachium, itaut extendere ac movere non potuerit, mox pedes quoque eadem contractio corripuit, ita ut tum brachia & pedes convulsi sisterentur, sed paulo post brachia reliquit, hinc etiam pedes, itaut tam brachia quam pedes movere potuerit. Postremo die maxima omnium membrorum inquietudine correpta primum tandem in pedes se conicere, & in hypocaulito discurrere ac saltare cepit: miserabili sane & stupenda infantiæ specie tentata ac turbata, varios ac turbulentos mores exhibuit. Nam nulla neque vineque increpatione contineri potuit, quominus hinc inde cursitaret, nulloque modo subsisteret, sed indefinenter inquietudine hac detenta, in lecto etiam si forsan cohiberetur ex uno loco in alium sese coniecit: imò parietes etiam transcendere, & circa fornacis extremitates discurrere quasi-vit: extra lectum dissiliens, scopas vel aliud quid simile apprehendens, pavimentum a sordibus divertere, omnemque inmunditiem conclavis, omnes angulos evoluendo, exquirere, & expurgare nunquam cessavit. Interdum subitaneâ pedum contractione inter discurrendum correptâ, subsistere coacta fuit, mox tamen soluto iterum spasmo, denuo saltare perrexit; imò defatigata, vel alioquin lassâ si pigriorem interdum cursum iniret vel subsisteret, pedum affectio spasmodica mox irruerat; solvebatur autem si cursum repeteret, & impetuosius se agigaret. Quin etiam paroxysmo hoc turbulento, interdum repente soluto, sublecebat, suisque quod stare posset, exclamavit, lectum etiam ingressa, quievit; mox autem iterum prosiliens denuo saltare compulsâ fuit, subinde namque per intervalla longiora jamjam breviora inquietudo hæc ipsam, maxime autem à cibo sumpto invasit, non raro tamen inter prandendum aut cenandum subito de mensa surgens, in pedes se coniecit, nec cohiberi potuit, vi autem cohibita, pedibus tripudiando, quasi humum indefinenter pulsavit. Quod si ne in pedes se coniceret, prohiberetur interdum, (quod non raro parentes tentarunt) insigniter affligebatur circa præcordia, maxime juxta orificium stomachi, ubi de validissima compressione querebatur, quæ nitescebat si sese saltando jactaret, protinus autem quando subsistebat, denuo iterum dicto loco gravissimas passiones sustinebat, itaut ab iisdem impelleretur indefinenter discurrendo se exercere, languebat

etiam plurimum, ac debilitabatur, & distentionibus membrorum tentabatur, quando nondum finito paroxysmo sese gitare cessabat, aut prohibebatur. Si mitiores fuere invasiones, in lecto, locoque suo manere potuit, nec evagari coacta fuit, attamen tum inquietudo nunc hoc, nunc aliud membrum invasit, ita ut incessanter quatere nempe, brachium hinc inde movere, vel pedem sursum, deorsumque trahere, serie continuata, cogeretur. Sæpe caput solum ut hoc hinc inde indefinenter jactaret malum occupavit, sæpe saltem ejus partem, nempe linguam, unde titubatio, maxillam, unde dentium collisio atque stridor, aures, natum, buccam, labia, collum, unde earum partium tremor, atque concussio, totam denique faciem, unde ejus fæda distortio sequuta: inferiores etiam non raro partes vexavit, pectus nempe, ventrem, exteriores musculos, unde palpitantes & distensiones exorta, imò mirabili varietate nunc hoc, nunc aliud membrum, nunc unam saltem, sæpe plures partes simul invasit, atque affixit. Semper autem & in omnibus paroxysmis, linguam simul affectam vidimus, ita ut tremere, vellicare, balbutire, & impedite loqueretur, leviter etiam deliraret, ratione aliquantum destituta, licet alio tempore plus, alio minus, quæ caris, sermonisque imperfectio & titubatio, mane præsertim cum è lecto surrexisset, animadverti, futuram invasionem semper indicabat, quamvis alias in ipsa accessione, dum saltaret atque discurreret, vel membra jactaret, sensus exteriores illati ac integri permanerint, quod facile judicare fuit ex eo quod quodvis audire, & ne sese offenderet, sedulo cavere potuit. Interdum loqui omnino non potuit, & ad interrogata nequicquam respondere; sæpe autem quando affectio linguam inquietavit, incessanter garrire, imò canere etiam coacta fuit, & tunc, quò plus loquebatur, vel canebat, eo minus se circa præcordia affici, & immunita molesta cordis compressione fieri dicebat: quam primum autem inquietudo linguam deseruit, ipsaque deblaterare & canere cessavit, membri alterius, aut pedis aut brachii quatitio, & agitatio secuta est. Interdum ratione omnino priuata, interdum mente satis valere visa. Cibum in paroxysmo maxime vehementiori, assidue flagitavit. Crassum imprimis nempe panem secundarium cum butyro coctum, quem avidissime semper devoravit, quod si denegabatur, urgentissime poscere non desistit, sæpe cum precibus, lacrimis, & indignatione, si alius quandoque & diversus ab eo, quem petierat, forsan exuberetur, pro eo tamen, quem postulaverat, cupidè comedit; imò interdum, si non confestim adesset, exacerbata, obvia quævis, ligna, stipulas, linteos, pannos, vel quidvis aliud ori ingessit, dentibusque maxime si malum maxillas prehenderat, laceravit. Et si brachia inquietudo occupavit, illud quo uteretur inter edendum, ad eo hinc inde jactavit, ut difficulter cibum ori admoveere potuerit, adeo ut sæpe ingerendo opem ferre necessum fuerit. In omni invasione frontis, temporumque venæ turgescens & livescens apparebant: frontis autem dolor, cordis tremor, orificii stomachi compressio, delirii sermones etiam; linguæ item

tremor



tremor, ac vocis titubatio futuram invasionem prænuñciabant.

*Dysuria* etiam accessit non raro, ita ut sæpe per integrum diem nihil excreverit, quamdiu nempe paroxysmus duravit, eo autem soluto, urinam emisit. Per totam noctem fere semper dormivit, placideque quievit, quantumvis totum diem inquiete peregerit. In somniis tamen aliquoties turbata est, sicuti & prius, cum sana adhuc viveret.

Prodigiosum hoc malum per 14. continuos fere dies duravit, ita ut in dies vel membrorum motus concussivi, vel inquietudines jam enumeratæ exorta sint: postea vero remittere cepit, & non nisi certis dierum intervallis recurrere, eandem autem feruè idem servavit semper, ita ut vel discurrere, vel membra quasiare cogere, ejus invasionis principium delirationes, linguæque titubationes tanquam prænuñtium indicabant.

Varias adhibui Medicinas, purgantes, roborantes, bezoarticas, internas & externas, fonticulum etiam nuchæ impressi: nihil autem, vel parum profeci, tandem autem mense Decembri, cum illa medicamenta, quibus olim Hassiaci Medici in morbo quodam publice grassante, huic pene simili, usi sunt, quorum descriptionem ab Excellentia tua accepi, exhibuissem, sensim immui affectio cepit, ita ut primum paroxysmi mitiores facti fuerint, post ipsæ saltationes remiserint, causam etiam membrorum concussiones mitigatæ. Nec tamen ne nunc malum extirpatum nam quotiescunque ad iracundiam commoveretur, uti facile fit in re familiaris, in quâ valde se indolentiam exhibet, vel quando terretur, uti maxime accidit viso fulgure, & audito tonitru, aut impetuosiore, aut repentino sonitu, denuò ejus rudimenta subito eam apprehendunt, ita ut loqui nesciat, aut balbutire incipiat, sæpe etiam hinc unum, aut alterum membrum, agitare compellatur, nec tamen diutius hæc durant, sed per mediam saltatem, sæpe tamen etiam per unam aut duas horas, postea ad se reversa, rectè iterum se habet, optimeque valet, adeo ut nihil adversi in ipsa animadvertere liceat. Plerumque etiam recrudescit affectio, quando Luna superiora signa, nempe arietem atque Taurum, occupat, tum à sumpto cibo mane præsertim, quam primum aliquid degustat, tale quippiam quandoque patitur, ita ut delirare, linguaque tremere atque titubare, sæpe etiam hinc inde membrum quoddam agitare incipiat. Quando vero pulveris illius & electuarii bezoartici usum non negligit, sed continuâ adhibitione subsidium sibi subinde comparat, fere à mali invasione servatur. Et hæc fere est mirabilis illa, & prodigiosa affectio, quæ stuporem omnibus astantibus & videntibus peperit. *Gregor. Horstius Observat. & Epistolæ Medicinæ lib. 2.*

Memini me præcedenti verno tempore cum mulieribus quibusdam loquutum quæ quotannis *Sacellum S. Viri* quod est in finibus ulmensium, non procul à Geislingem propè ditionem Rechbergensem, visitant, ibidemque saltu cum perturbatione mentis eoque sese nocte, dieque exercent, donec Ecstasticorum instar corruant, quâ ratione sibi restitutz videntur, ut parum vel nihil sentiant, per an-

num integrum, usque ad Maii tempus subsequens, ubi membrorum inquietudine eoque sese torqueri referunt, ut vicissim circa festum *S. Viri* ad prædictum locum saltationis gratia sese conferre cogantur, quemadmodum una ex ejusmodi mulieribus per viginti & plures, alter per 31. annos ibidem quotannis saltavisse dicebatur. Absque superstitione hoc quicquid est, non est, utpote cum verisimile videatur exacerbari verno tempore causas convulsivorum motuum in membris naturaliter, quas postea cum singulari vehementiâ animi, spe restitutionis per *sacellum S. Viri* oblatum, suscepta saltatio fortassis ita dissipat, ut recollectis viribus aliquandiu tales ægrotantes ab invasione liberæ permaneant.

Novi puellam Honestam, Mercatoris filiam in hac Republica, quæ jam per annos aliquot verno tempore, cum aliqua, sed levi, mentis perturbatione, similem affectum ferè patitur, ut inquieta jam hoc, jam illud membrum movere cogatur, sæpius & lingua, sermonisque operatione intercepta, de loco ad locum hinc inde commovetur, quod per septimanas aliquot singulis annis, nocte dieque continuat. Valdè vereor, ne tandem gravius aliquid hic etiam expectandum sit. Quamquam verò non ignorem, ex authoribus, quosdam in *Salm S. Viri* nihil quicquam convulsivi concedere velle, contra alios ex Arabibus, quatenus mens istdem alienata tantum videtur, cujus ratione perverfus saltandi conatus & appetitus oriatur; nihilominus si fides adhibenda mulieribus illis cum quibus hac de re præcedenti verno tempore sum loquutus, omnino statuo convulsivos hic motus concurrere, præsertim cum adfirmant, quod pluribus septimanis, antequam *Sacellum Salmi Viri* accedant, sensivos omnium artuum dolores, una cum lassitudine spontanea, capitisque gravitate paterentur, in quo statim permanent, eoque donec accedentes ad consuetum saltationis locum, organum mulicium, quod in eorum gratiam pullatur, audiant, ubi mente magis, magisque perturbata (fortassis concurrente simul imaginationis firmioris, spe saltationis, impressione) saltare cogantur, ut accidat ipsis fere, quod iis, quos à Tarentulæ morsu læsos dicit *Matthiolus*. *Gregor. Horstius Observat. & Epistolæ Medicinæ lib. 2.*

Tarentulæ morbi affinis est malum, quod *Chorea S. Viri* appellatur, de quo refert Gregorius Horstius, secum mulieribus quibusdam locutum, quæ quotannis *Sacellum S. Viri* quod est in finibus Ulmensium, visitantes, ibidemque saltu cum perturbatione mentis, eoque sese nocte, dieque exercent, donec ecstasticorum instar corruant quâ ratione sibi restitutz videntur, ut parum vel nihil sentiant, per annum integrum, usque ad Maii tempus subsequens, ubi membrorum inquietudine eoque sese torqueri referunt, ut vicissim circa festum *S. Viri* ad prædictum locum, saltationis gratia, sese conferre cogantur. *Horst. Epist. Med. sect. 7. de admirandis convulsionibus.*

Profecto usitatum est (prout sæpius observavi) tum viros, tum feminas, interdum ea membrorum inquietudine, & velut cætro quodam urgeri, ut necesse habuerint, usque ad lassitu-



lassitudinem ambulare, quin etiam saltare; huc illuc discurrere, ut hac ratione graviores molestias, & lipothymias alioquin inuasuras evitare possint. Quorum ratio videtur esse, quod spiritus animales, quatenus in toto nervoso genere a copulâ heterogenea incitati, efferi prorsus ac citrares evadunt: quos quidem ita exerceri, atterique opus est tum ut ipsi perdomentur, tum ut copula explosiva excutiantur. *Thom. Willis de morb. convuls. cap. 7. operum part. 2.*

Tarentula ictus, ut inquietudinem; & canis rabidi venenum, aqua metum, sic inducit; vel perpetuas Choreas, vel indefatigabilem curium, illa infama species quam Felix Platerus Vici saltum nuncupat; ejus miserrimi morbi speciem hinc nobis aliquando videre prope Contracum, modicum Flandriæ oppidulum, in homine vere misero.

Qui dies ac noctes cursitabat, subsultu tam pernici, & agitatione tam percini, ut præ defatigatione deflueret undiquaque sudoribus, neque tamen propterea, vel tantulum quiesceret, homo volaticus, & irrequietæ huic revolutioni, tam stricte addictus, ut non-quam se dederit ulli quieti, nisi quam invito extorqueret, inevitabilis dormiendi necessitas. *Nicol. Tulp. Observ. lib. 1.*

## CILIORUM AFFECTVS.

Vid.

## PALPEBRARUM AFFECTVS.

## CIRSOGELE.

Vid.

## HERNIA.

## CLAVVS OCULI.

Vid.

## OCULI VITIA.

## CLAVVS PEDIS.

Vid.

## PEDIS CLAVVS.

## CÆLIACA PASSIO.

Vid.

## LIENTERIA.

## COLICA PASSIO.

Hic morbus tam accurate à Clar. Villisio describitur ut aliunde nobis non necessarium videatur quod de eo dicendum habemus; mutuari. Sic itaque ille.

Quo jure hunc morbum inter Affectus cerebri, & nervosi generis referimus, in superiori capite innuitur, nempe tum respectu symptomatum præcipue urgentium, quæ sunt dolor, & motus convulsivi; tum ratione causæ à Carolo Pissone in *Trisulpho* (& quidem non improbabili-ter) collocatæ.

De Colica vocabulo, ab intestino Colo (quod in hoc morbo potissimum affici, perperam licet, vulgò supponitur) non litigabimus. Affectus del-

cribi potest quod sit, partium quarundam Abdominis insignis vellicatio, unde dolor valde acutus, cui plerumque vomitio, nec non spasmi, & contractiones viscerum fere omnium totius ventris adjuagi solent. Quippe umbilicus; ejusque vicinia modò velut cum perforatione quadam intus retrahuntur; modò cum inflatione, & velut exultatione magnâ extumescunt; intestina, fibrarum motu inverso, sæpe sursum convelluntur: Quapropter alvus summè stricta; parum aut nihil reddit, immo, licet ab enematis crebro sollicitetur, contenta sua haud facillè deponit: *Ventriculum* cum *duodeno*, & *vesica fellea* pariter convelli, ex vomitu, & copiosâ bilis; ita aut viridis rejectione, liquidò constat. Quandoque etiam *ureteres* & *vesica urinaria* ita contrahuntur, ut toto paroxysmo urina aut supprimatur, aut parcius excernatur: Præterea in capite *vertiginosi affectus* frequenter hujus morbi insultus præcedunt, aut sequuntur: Quinimo *Colica* ingravescent, & inveterata non raro dolores in membris exterioribus accersit, ac demum in *Paralyssi* terminatur: Cum itaque partes ab ea plures laborare solent, inquirendum erit quæ sit primario affecta, & cujus ratione reliquæ patiuntur, dein quæ sit morbi causa confusæ, in quo loco subsistat, ac unde originem ducat?

Quoad partem primario affectam licet morbo urgente tota ventris regio perturbari solet, attamen ejus sedes primaria collocari debet, ubi dolor potissimum infestat; & pertinacius hæret: Hoc autem, ex Medicorum plurimorum consensu, alicubi in *Colo intestino* esse perhibetur. Quare *Celsus* dicit *Colicam intestini majoris Affectam*; quod etiam ratio nonnihil suadere videtur; nam sive materies morbifica in cavitatibus intestinorum congeri, sive in membranis illorum penitus defigi supponitur; certè in *Coli plicis*, pro receptaculis ejus profundiores extant cellulæ, & quæ intestini hujus tonicæ crassiores existunt, in quibus humor peccans altius impingi queat. Verum enim vero hæc opinio (cui non facile assentimur) uti & Affectus denominatio, ex eo tantum Medicorum Scholis increbuisse videtur, quia passim observamus *Intestina* à flatibus, à pharmaco, bile, alilique forsân humoribus intra cavitates eorum contentis irritata, dolores ac tormina inire; hinc ut obvium sit inferre dolores colicos tantummodo ab intestinorum, ac imprimis *coli* contentis acrioribus, & irritativis exoriri: Quod tamen ita si haberet; procul dubio quæ ventrem solvunt, atque flatum, & sæces copiose educunt, certissimum leyamen adferrent; cujus contrarium sæpenumero evenit, nempe à cathartici crebriori, aut violenta, morbum istum intendi.

Quamobrem ut morbi hujus sedes, & natura rite innoscat, hic imprimis distinguere oportet, de ventris torminibus, sive doloribus pro colicis vulgo habitis: Isti nimirum aut mere occasionales a causâ evidenti solitaria oriuntur, & sine præviâ diathesi hominibus quibusvis, iisque imprimis, qui teneræ constitutionis fibras valde sensibiles; spiritusque citò dissipabiles habent, passim contingunt; ad hunc modum incongrui, vel inassueta epota, vel comesta, item pharmaca, frigoris contractio, pluresque aliz



circa sex non naturalia alterationes, in visceribus in ventris perturbationes insignes, cum doloribus non raro excitant: Cujusmodi tamen affectio non morbus, sed tantum symptoma, à causa manifestà excitatum, censeri debet.

Attamen præterea, Colica ita propriè dicta, non tantum à causa accidentali producta quibuscumque contingit, sed homines nonnullos peculiari ritu prædispositos incessens, omnino à causa præternaturali sensim maturatà dependet. Morbi insulsi graviores plerumque periodos suas habent, atque Aeris, & Anni alterationes observant; porro excitati, remediis non facile cedunt, neque citò pertranseunt; verum non obitante epithematum usu, aut ventre per enemata aut cathartica copiosè licet subducto, sæpe per plures dies, ac interdum hebdomadas, cum magnà ferocià persistunt. Dolores in quolibet paroxysmo, eandem usque partem repetunt, & aliorum symptomatum pari ut plurimum syndrome stipantur: Cæterum dolores colici, licet non eandem in omnibus sedem habeant, sed modò sub v. n. n. modò circa umbilicum, aut hypochondria, quandoque in hypogastrio, aut versus lumbos maxime delavant; attamen, quoties in eodem ægrotante repetunt, eundem sapissime locum observant.

Pro explicanda hujus morbi *Ætiologia*, non satis erit statuere, intestina vel ab acrioribus suis contentis vellicari, vel à sanguine, aliisque humoribus iisdem suffosis, ac continuitatem solventibus, irritari. Nam quoad prius summè improbable est, bilem, vel pituitam, vel succum pancreaticum, aliumve quicumque humorem aut simplicem, aut cum aliis effervescentem, dolores adeo atroces, fixos, & diu perseverantes excitare posse: Præterquam enim quòd intestina propria mucagine oblita à contentis, licet acrioribus, non facile pungi, aut exasperari solent, in tantum ut sedes aciores, quæ anum sæpe excoriant, intestinorum ductus parum aut minime divexent, insuper hæc gravis irritata, quicquid molesti in ipsorum cavitate continetur, facile excutiant, atque sursum vel deorsum propellendo, citò eliminant; prout in Cholera morbo, aliisque Affectibus dysentericis planè cernitur; neque ulla fere est saburra horum membranas stimulant, inque dolores ciens, quæ una aut altera purgatione foras exterminari non potest. Dein 2. quod spectat ad sanguinis, aut feri intra intestinorum tunicas suffusiones, à quibus phlogosis aut tumores dolorifici excitantur, revera ita neri interdum concedimus, immò *ætiologia* novimus: exinde verò passionem, non Colicam, sed Iliacam excitatam fuisse observavimus. Quippe cum plures ab illo defunctos aperuerim, intestini cujusdam inflammationem, aut phacelum sæpe in omnibus & morbi, & mortis causam fuisse deprehendi: neque mirum hoc, quoniam in membrana tenera, & maxime sensibili magna solutio continui, spasmos, & corrugationes dolorificas ita continuas, & atroces ciebat, propterea ut intestini affecti motus peristalticus, quo faeces alvi versus anum provehuntur, inhibeatur ac prorsus invertatur.

Cum itaque morbi Colici, alijsmodi tum materies sive minera, tum sedes & affluxionis via perquirendæ sint; jure merito liquor nervæus, ejusque recrementa in suspicionem veniunt; eò ma-

gis, quod passio istæ cum alijs Cerebri, & nervosi generis affectibus, intimum adeo consensum habet, prout supra innuimus. Carolus Piso cum plerisque totius corporis affectus, tum insuper dolores Colicos à colluvie serosa in capite aggesta excitari statuit, morbi hujus sedem, nec in tunicis, nec cavitatibus intestinorum, sed in Peritoneo esse, atque causam omnino in cerebro juxta nervorum origines hærere, contendit. Nimirum supponit ille (quod ex observatione Anatomica compertum ait) serositates in postica cerebri regione depositas, nervorum paris vagi capsula obfideri, proindeque ipsorum ramos, & propagines quasdam ultimas peritoneo inferas, in spasmos agere, atque ab hujus contractione dolores tum in ipso, tum in visceribus subjacentibus atrocissimos, ac velut peritæbrantes excitari. In probationem hujus sententiæ exemplum subdit, cujusdam à paroxysmo Colico graviore defuncti, & dissecti, in quo postica capitis regio juxta cerebellum, & nervosus paris vagi origines aqua limpida in tantum perlundebatur, ut substantia medullosa instar papyri madidi plurimum humectata appareret. Sect. 4. c. 2.

Verum enimvero, ut colicam ex humoris cerebri, & partes nervosas irrigantis vitio orti concedatur; attamen haud isto modo, quem hic Author designavit, pathemata istæ dolorifica excitari putamus. Quippe nec in peritoneo morbi sedem, nec intra v. n. n. causam ejus primariam sublitere putamus. Nam quoad hunc, etsi materies morbifica, in capite juxta nervorum origines aggesta, quandoque in partibus longe distitis motus convulsivos, spasmos, & stupores, (uti pluribus instantiis, una cum affectuum rationibus alibi ostendimus) producat; attamen in dolore (qualis solet esse colicum) valde atroci multo secus habet. Quippe ad hunc, qui semper à solutione continui procedit, excitandum requiritur, ut causa dolorifica sive objectum improporcionatum ipsi membro affecto, aut saltem ejus parti, aut portioni cuidam innigatur: Nec enim sufficit dicere convulsionem à causa remota, ac inde dolorem à convulsione procedere: Quippe licet dolor sæpe motus convulsivos, attamen hic motus per se, saltem magnus & diu perseverantem, minime producant. Quia propter in dolore colico, materies fibras sensiles diutius hærens, & ab invicem divellens, proindeque in corrugationes dolorificas irritans, haud usque in cerebro commorari, verum exinde, per ductus nervos versus intestina descendens, alicubi in eorum vicinia juxta partes dolentes congeri, & subinde vel ob plenitudinem sponte turgescens, vel cum alio humore effervescentem morbi istius paroxysmos inferre videtur.

Mineram verò colicam à peritoneo rejicimus; quia membrana hæc cum admodum tenuis, ac valis paucioribus & tantum exilibus donata sit, nec magnæ humorum affluxionis capax, neque ipsa, ut convellatur, viscera substrata comprimendo, aut contrahendo in dolores urgere posse videtur. Materies autem morbifica à capite per nervos in ventrem lapsa, nidos maxime idoneos in mesenterio reperiet; in quo scilicet nervi plurimi, & magni, eorumque plerumque distributiones valde insignes habentur: Quare, cum pars hæc valde sensibilis, & humorum nervosi generis affluxionibus plurimum obnoxia fuerit, morbi colici sedes merito statuatur.



*Motuum* quorundam in Abdomine *convulsivorum*, qui vulgò *Hysterici* dicuntur, causas læpenumero in *plexibus mesentericis* latere olim ostendimus, porro in iisdem locis dolores *colicos* interdum nidos suos habere tunc asseruimus, & ex *observatione Anatomica* satis ratum fecimus. Attamen non eadem, sed nonnihil *diversa materies* est, quæ utrosque ita dispartes affectus, sub eodem lære excitare solet. In *passionibus* dictis *hystericis* spiritus animales copulæ *elasticæ* onuitos, ab invicem elidi, seu velut explodi, proindeque corpora continentia, in motus irregulares, seu præternaturales invitè rapere, in *priori tractatu* satis fusè declaravimus: In *doloribus* autem *colicis* iidem spiritus propter materiem iis infestam, & improporcionatam irritati, proindeque ab invicem divulsi, & distracti fibras sensiles in *corrugationes* valde molestas agunt: Quo ritu in *doloribus colicis* hoc fiat, item quæ morbi istius *causæ conjunctæ*, *procatarraxis*, & *symptomatum rationes* fuerint, jam paulo explicatius dicemus.

Itaque pro *Affectu colici* seminio sive minera, humoris nervi recrementa quædam a cerebro per nervos decidua, inque *mesenterium* aliofque *Abdominis* *plexus* delapsa, ibidem congeri supponimus, quæ si crassiora, & magis viscosa fuerint, quam ut per lymphæ ductus excipi, & amandari, aut per vasorum propagines exiles, in cavitates intestinorum exiungere possint, in partibus illis stagnantia & sensim coacervata, tandem in plenitudinem irritativam assurgunt; dein materies ista stagnatione plus degeneret, & magis infesta evadens, occasionaliter, aut sponte turgescens, vel forsitan cum *humore salino fixo* è sanguine illuc suffuso effervescent, nervorum propagines, fibrasque nerveas, quibus innumeris *Mesenterium* scatet, corrugationibus valde molestis, & dolorificis torquebit; cujusmodi illorum affectio, haud planè cessat, donec materies effervescent aut discussa, aut in cavitates intestinorum expressa, aut demum subacta fuerit.

Porro in quantum è *mesenterio* ejusque *plexibus* propagines fibræque nerveæ in *ventriculi* fundum, *vesicam felleam*, *ductum choledochos*, *intestina* omnia, & quæquaversus in cuncta ferè totius abdominis viscera densissimè protenduntur, idcirco, dum *materies colica* in mineris suis effervescent, tormina, & cruciatus sæpe acerrimos ibidem ciet, una in partibus plerisque aliis membranosis *spasmi*, & *contractiones convulsivæ* aut *dolorificæ* ubique excitantur. Hinc ob *mesenterium* primario affectum sub umbilico dolor acerbus, quasi pali affixi, aut terebræ perforantis speciem præ se ferens; dein circumcirca in toto ferè Abdomine, propter *intestina* simul in diversis locis variè diducta, aut retracta, dolores vagi huc illuc excurrunt, atque ob fibrarum motus, tum in his, tum in vasibus urinariis perturbatos, aut inversos, alvus ferè semper adstricta est, & urinæ interdum suppressio, aut paucitas succedit: Quin etiam *Duodeno*, *vesica fellea* cum ductibus, atque *ventriculi* fundo *spasmo* affectis, eorumque fibris sursum tractis, vomitio crebra, cum *bilis flava* aut *præstina* rejectione copiosa, durante paroxysmo subindè infestat.

Quod autem nonnulli, ejusmodi *bilem* (quæ

nonnumquam instar *viridellæ* intensè *præstinæ* rejicitur) morbi *causam materiale* esse contendunt; ejusque copiam, & in viscera exudationem dolores *colicos* in *intestinis* excitare: Dico humorem istum circa paroxysmi initia, in *cysti felleæ* sine offensâ quavis contineri, postea tamen propter viscerum *spasmos* indè expressum & quasi emulctum, in *ventriculi* vomitu affectum exantlari; ibidem verò humori alteri forsitan acido, occurrens, *colorem viridem*, immo quandoque *atrum* (prout olim observatione Anatomica compertum habui) acquirit. Atque hoc quidem ex eo patet, quod qui temperamenti frigidioris *bilem* minus progignunt dum *colica* laborant, *flavi* aut *viridis* parùm, aut nihil vomitu rejiciunt; attamen doloribus haud minis acerbis divexari solent.

In *paroxysmo colico*, doloribus *ventris* *lumbares* atrocissimi, in imo dorso sævientes sæpenumero adiunguntur: qui certe a nullius *intestini* irritatione oriri possunt. Attamen facile erit concipere, eos à causa morbinica in *mesenterio* constituta excitari: in quantum scilicet nervi quidam insignes *lumbares* *mesenterii* *plexum* nervorum maximum ingrediuntur; hinc ut non tantum *spasmi* *dolorifici* per consensum ab una parte, in alteram tradantur; sed probabile insuper sit, etiam *dorsi* & *lumborum* recrementa quædam hoc transitu in *mesenterium* derivari; atque aliquatenus ob hanc rationem, *Scorbuteos* *ventris* torminibus, & fluori ita plurimum obnoxios fieri.

Hæc de morbi *Colici* natura, & sede, nec non de *causâ conjunctâ*, & *symptomatis* ab eadem in ætate existente oriundis: Quod ad *procatarrxin* spectat in his duobus ea potissimum consistit, scilicet *primò* quatenus in liquore nervæo recrementa plura congeruntur; & 2. quod ea potissimum à nervis, ad viscera uni ventris destinatis excepta, & ad *mesenterium* delata, mineras ibi morbidas constituunt. *Primò* prius horum plerumque *cerebri* culpa, ac vitio contingit: nempe quatenus hoc una cum *liquore nervæo* particulas heterogeneas, & regimini animali infestas intra fines suos admittit; præterea item quod hæc, aliaque recrementa ordinaria per idoneas cloacas haud statim amandat: Quapropter materies incongrua, cum aliàs à cerebro ablegari nequit, in nervos *pari vagi* maximè patentes facillimè irrumpit. Atque ob hanc rationem est, quod *formina* à quavis *cerebri* inordinatione *diathesis Hysterica* dictam frequenter contrahunt; nempe quatenus recrementa liquoris nervæi, sive *exspasmodica* & *elastica*, sive *dolorifica*, & *irritativa* tantum fuerint, in *par vagum* deponi aptiora, symptomata *convulsiva* & quæ ac *colica* ita passim excitant. *Secundò*. Quod materies hæc nervorum *par vagum* incurrens, in *mesenterio*, aut aliis intra Abdomen *plexibus* deponitur, ratio est, quod in hos *plexus* nervæos conjugationis istius nervi plures & majores, ferè ultimò terminantur: Quamobrem si humoris nervæi recrementa hic quasi in inum subsidentia, nec per vasa quæpiam regeri, nec in cavitates intestinorum transire possunt, necesse erit eadem focos morbidos in hac parte struere.

*Causæ* evidentes duplicis sunt generis, scilicet *primò* quæ cerebro & generi nervoso injuriæ, *materiæ morbilicæ* proventum majorem fa-



ciunt; vel secundò quæ sanguinem, & humores agitando, mineras aggestas, & prius quiescentes exuscitant; inque effervescentias dolorificas cient. Tadiò hic esset multiplices, ac diversimodas ~~exuscitant~~, a quibus *dolores colici* in prædispositis accientur, examinare; hos enim & inordinaciones magnæ in sex non naturalibus, & aeris & Anni mutationes, ac insuper ipsa a ( quibus juvamen expectatur ) *pharmaca* intempestive exhibita, crebrò accerunt.

Ex prædictis morbi hujus *differentia* facilè innotescunt. Nam *primò* ratione *causarum* ostendimus, *Colicam* aut *accidentalem*, quæ propter intestina à contentis acrioribus irritata inferitur; aut *habitualement*, qualis modò describitur, secundò, ratione *loci affecti* *Colicam* modò *superior*, modò *inferior*, modò *lateralis* est, prout materies morbosica aut in mesenterii parte modò hac, modò illà, vel in aliis Abdominis plexibus defigitur. Tertiò, ratione *Aegrotantis temperamenti*, & *valetudinarij status*, dicitur *colica biliosa*, *pituitosa* aut *atrabilaria*; item vel *simplex*, vel *scorbatica*; non quòd humores isti imaginarij *colicam* per se excitant, sed juxta corporis affecti dispositiones, symptomata variari faciunt.

Quoad *prognosin* satis vulgò innotescit: *Colicam accidentalem*, scilicet à causa evidente solitaria excitatam sæpiissime tutam esse, & facili negotio curari; *habitualement* vero & quoad diarrhetin difficulter admodum eradicari, ita ut paroxysmi non amplius redeant; & ipsos quandoque paroxysmos, non obstantibus remediis pertinaces esse, atque per plures dies, immo hebdomadas ac menses interdum persistere.

2. *Dispositio Colica* febribus intermittentibus diuturnis, & continuis male judicatis frequenter succedit, in quantum scil. liquor nervens insigniter vitiatus recrementa plura congerit, quæ in Abdominis plexus, quasi receptacula magis patentia altius deponuntur. Porro ob hanc rationem febris epidemica quibusdam Annis increbuit, cui *Colica* velut symptoma pathognomicum adjugebatur: Hinc pariter *Scorbutus* diuturnus ac ingravescens, quatenus liquorem nervum pervertit, etiam *Colicam* accerlit.

3. Postquam *dolores Colici* aliquandiu in ventre defævierunt, sæpenuero *lumbos*, & dein morbo ingravescente, membra, & musculos ferè omnes in toto corpore incessunt, tandemque non raro in *paralyssi* terminantur; quod certè indicio manifesto est, materiem morbosicam non per *arterias*, sed *nervos* deferri, ejusque subjectum siue sedem, non intestinorum cavitates, aut tunicas, sed mesenterij plexus nerveos esse; nam quòd *dolores lumbares* ventris torminibus superveniunt, præterquam quòd nervi utriusque loci communicant, tandem insuper in *causa* est, quòd materies morbosica in capite multum aucta, non tantum in *p. vagum*, sed etiam in spinalem *medullam* illabitur; quam subiens, ac in inum ejus subsidens, primò in *lumbis*, ac postea nervis plerisque alijs, qui à spinâ procedunt, affectis, in membris, & musculis alius *dolores* exoriri facit; denique nervorum ductibus, à materia morbosica in ipsis ad plenitudinem aggesta, infectis, *paralyssi* inferitur.

4. *Colica atrocior*, & plurimum immanis, cuius causa intestini cujusdam *inflammatio*, aut *abscessus* est, *passionem Iliacam* plerumque lethalem inducit.

*Methodus Therapeutica*, in *Colica*, ut in plerisque morbis intermittentibus, *res primarias Indicationes* suggerit: Quarum *prima curatoria*, in paroxysmo adhibenda, dolores sedandos, atque morbi accessionem citius, ac facilius tollendam respicit. *Secunda Præservatoria*, quid extra paroxysmum ad morbi causam tollendam, ne paroxysmi sæpius repetant aut gravius infestent, agendum sit, edocet. *Tertia Vitalis*, remedia ad vires inter tormina & diros cruciatus conservandas, & spiritus refocillandos suppeditat. Super his singulis paulò explicatiùs ordine dicemus.

1. *Indicationem curatoriam* in *Colica accidentali* ferè solam respicimus; etenim causa evidente, quæ intestinorum à contentis acrioribus irritatio est, remota, dolores ut plurimum sponte cessant, nec recidiva absque simili occasione timentur. Quare ad hunc morbum citò curandum, praxis apud vulgus, imò quosvis e plebe homines satis idonea innotescit, scil. protenus *Emmata emollientia*, *Topica anodyna*, & *narcotica* exhibere; quibus si febris adlit vel metuatur, *phlebotomia* sæpe cum fructu adjungitur. Horum *formulas*, & utendi ordinem in *Therapiciâ colicæ habitualis* modò subdemus.

Itaque pro Affectus hujus *paroxysmo* sanando, *duæ* sunt præcipuæ intentiones; nempe, & *solutio continui* dolorifica tolli; & *fibrarum* siue *spirituum* in iis excalescencia compesci debet. Ratione *prioris* enitendum erit, tum ut mateties minere uni aut pluribus impacta, & effervescent, aut discutiantur, aut subigantur: tum interea ut novæ materiz affluxus inhibeatur. 1. *Intentio* cui primò, & continuè insistere oportet, per *Anodyna* potissimum & *narcotica* perficitur: Quo ritu, & quibus remediis quæque hæc methodicè peragenda sunt, trademus.

*Dolores Colici* curatio sæpiissime, & satis rectè à clystere incipitur. Hic primò sit tantum leniens, & emolliens, à quo, velut à *fonti interno*, fibrarum corrugationes compesci, & spiritus excalescentes demulceri poterunt. In hunc finem *lactepidum*, cum *saccharo*, vel *molesto*, aut *syrupo violaceo*; item *decocta emollientia* ex *Malvâ*, *Albâ*, *Mercuriali*, *floribus Meliloti*, *Sambuci*, cum oleo *Amigdalinarum*, vel *olivarum*; item *decoctum* ex *capite vervecino*, aut *pedibus vitulinis* conveniunt: Interdum *enema* ex *mero oleo Olivæ*, aut *Lini* præ quibuscumque alijs juvare solet.

Quod si *enemata interiora* non faciliè redduntur, aut ventrem non laxant; quæ magis irritant, atque humores ab Arteriolarum osculis exprimunt, & quasi emungunt, adhibeantur: In quem finem parentur *decocta carminativa*, aut *amara*; in quibus dissolvantur *electuarium Diacatholicon*, vel è *baccis Lænci*, aut *species Hiera*. Item liquoribus istis usitatum est addere *infus. croci metallorum* ʒ iij. vel iv. vel *decocti emollientis* lb j. adde *Terebinthinæ Ven. solut. cum vitello ovi* ʒ j. aut ʒ iß.

Vel ʒ. *Urina sana* lb j. *Tereb. Ven. sol.* ʒ iß. *molesto* ʒ j. *misc.*, f. *Enema*. Hoc magnum juvamen sæpius contulisse novij; cujus ratio videtur, quòd *Terebinthina* particula balsamica intestina confortant; ac insuper a sanguine venoso accepta, & cum eo per totum corpus circulatæ, urinas movent, ita ut lotium à tali clystere sæpe copiosius succedat, & semper odorem violaceum reddat. Forsan etiam particula *Terebinthina* ubique diffusæ



diffusa; materiam morbosam aut ilaguantem movent, aut acetosam, aut aliâs degenerem ad crasim meliorem inclinant.

Dum intestina clysteribus colluuntur ita, ac intus quasi foveantur, Epithemata exteriora etiam Abdomini applicentur.

℞. Folior. Malva utriusque, Mercurialis, Parietaria, an. m. iv. floribus sambuci, chamomeli, meliloti, an. m. j. capui vervecinum discissum. Coquantur in s. q. aquæ font. colatura usurpetur pro potu, cum stuphis laucis calidissime intinctis, & expressis, atq; vicissim applicatis: repetendo quoties dolores intensius urgebunt: Circa fotus intervalla cataplasma, aut linimentum adhibeatur.

Mugmati herbarum confuso adde farina Avenacea q. s. Cataplasma, quod interpassatim insuatur duobus sacculis figure quadrata pro abdomine obtegendo. Horum unus pro vice effervescent in patina supraputnas ardentes cum oleo lumbricorum, aut Ranarum; imponatur calide, mutando quamprimum frigescente incipit.

Vel ℞. Olei Lumbricorum, aut Ranarum q. s. illinatur pars dolens post fotum: & charta emporetica tenuis eo imbuta applicetur, & gesseitur.

Omentum Aquinum aut Pulmones, aliave Brutorum viscera calentia Abdomini imposita, & subinde mutata, dolores interdum mire sedant.

Observavi in quibusdam constitutionibus, & temperamentis Epithemata ex calidioribus aut calidiùs applicata dolores exacerbasse potius, quam lenivisse: Quare in his casibus ex re fore videtur, fotus ex solutionibus niri, vel salis Armoniaci, aut aliis liquoribus chymicis, prout in doloribus Arthriticis, quandoque (uti Sepialius refert) ex aqua purâ pura frigida instituire.

Quod si ventris tormina horum usu non remittunt, hypnoticus utendum erit: quæ scilicet iustâ dosi exhibita, inducias sæpe magnas præbent: interim ut vires ac spiritus fatiscientes refici, & contra morbum apparatus adhuc major institui possint.

℞. Landani liquidi Tartarificati gr. 16. ad 20. dentur hora somni, in coch. aq. florum chamomeli superbibendo ejusdem coch. 6. Repetatur, noctibus alternis, vel tertius; si dolores graviter urgebunt.

In constitutione calidiori. ℞. Aq. flor. chamomeli 3 ij. Syrupi de meconio 3 ss. aq. mirabilis 3 ij. f. haustus sumendus hora somni.

Interea dum hæc aguntur, pro doloribus sedandis, atque materiâ focus morbidis impactâ aut discutienda, aut saltem laxanda, remedia evacuantia vices suas habeant nempe tum ut minera colica penitus extirpetur; tum ut supplementa si ve fomes ejus (ne magis accrescat) præsciudicetur. In hos fines vomitio (ubi convenit) atque lenis purgatio; insuper in temperamento calido, ubi febris urget, aut timetur, phlebotomia celebrari debent.

℞. Sulphuris Antimonii gr. 5. ad 7. vel 8. conserva Boraginis 3 j. deur mane cum regimine. In hoc casu juxta Medici præsentis judicium, aut infusio eruci metallor. vel Mercurii vitæ. Tartarus emeticus & Myrsicini, expressio foliorum Asari, ac in constitutionibus tenerioribus, sal vitrioli & vinum oxymel scilicet exhiberi possunt.

Purgantia, ne stomacho laboranti nauseam moveant, in dosi tantum perexiguâ & formâ eleganti exhibeantur.

℞. Resina Jalapii, scammonii an. gr. 5. cremoris

Tartari 3 j. Cinnamomi pul. gr. 4. f. pulvis, aut redigatur in pilulas vel in bolum. cum conserva florum Borag. aut Rosar. damascenar.

℞. Scammonii sulphurati 3 ss. crem. Tart. g. 15. Anim. Diaphoret. 3 j. f. pul. deur eodem modo.

Si febris non urgeat, exhibeatur dosis pilularum stomach. cum Gummi. aut de Succino vel per se, vel cum resina Jalap.

℞. Pilular. Rudii gr. 25. vel 3 ss. Landani gr. 1. f. pil. 4. sumantur hora somni. Ha primò somnum accersunt, & mane purgant.

Vel ℞. Calomelanos 3 j. resin. Jalap. gr. 6. scammon. gr. 4. Annon. q. s. f. pil. 4. sumantur hora somni. In Colica diuturna, cum remedia quævis alia parum vel nihil juvant, sæpius novi medicamentum hoc semel aut bis exhibitum, cum maximo agrotantis levamine salutationem movisse. Etenim si quando materies morbifica, in plexibus nervis, aliisq; circa Abdomen locis uberius aggesta; & penitus impacta, per alia medicamenta dimoveri nequit; particula Mercuriales sese quaquaversus explicantes, eam faciliè dissolvunt, in minutias dividunt, easque huc illuc variè dispellunt, & tandem prorsus dissipant: Quamobrem in Colica diuturna ac pertinaci, salivationis mitioris ergo, nonnunquam feliciter exhiberi possunt.

Balnea & sudorifica in doloribus colicis passim præscribi solent; attamen, quantum nostræ observationi constitit, rariùs cum fausto successu. Quippe hæc sanguinem & humorem nervinum exagitando, eos plus adhuc materiæ in mineram colicam deponere, quin & materiam ibi depositam magis effervescente, & ferocire faciunt; eamque petraro integre discutunt.

Diuretica multo commodius exhiberi solent; à quibus cum sanguis funditur, ejusque serositates copiosè præcipitantur, inde morbi fomes præsciinditur, atque massa sanguinea inanita partem materiæ morbificæ excipit, propterea ut reliquæ ejus faciliùs discutiantur. In hunc finem.

℞. Sp. Tartari optime rectificati 3 ss. deur 3 ss. bis vel ter in die in cochlear. j. vel ij. Julapii seq. superbibendo ejusdem coch. 5.

℞. Aq. folior. Bardana, aut Ari, aut Persicaria 3 j. aq. flor. Sambuci, Chamomeli an. 3 iv. aq. Gentiana compos. Raphani compos. 3 ij. sacchari 3 iv. misce.

Eodem modo ac spir. Tart. in iusta dosi exhibeantur, modò Tinct. sal. Tart. modo Mixtura simplex, aut sp. salis Armoniaci succinati.

℞. Millepedum præpar. 3 ij. flor. sal. Armon. tartarificat. 3 j. olii nucis moschat. 3 ss. Terebinth. q. s. f. massa, formetur in pilul. sumantur 3. vel 4. semel aut bis in die superbibendo dosim Julapii, vel aq. destill. sequentis coch. v. vel vj.

℞. Millepedum recentium mundatar. 3 b i ss. flaved. 6. Anan. & 4. Limonior. nuces moschat. nura. 6. minimis confisis adde mica panis albi veteris 3 b j. omnibus simul confisis, & probè missis asfunde lactis recentis 3 b iv. vini Hispani 3 b ij. destillantur si art. liquor totus misceatur, & edulcoretur cum saccharo, aut syrupo violaceo, ad placitum.

In Colica diuturna ac pertinaci, cui adsunt temperamentum, ac viscera fervidiora, Acidula purgantes, vel serum lactis cum syrupo violaceo sæpe cum magno juvamine propinari solet: utrique enim liquores, ubi congruunt, copiosius epoti, stomachum, ac intestina æstuantia refrigerant eaque à spasmis, & corrugationibus dolorificis



contracta, aut flutibus convulsivè extensa statim solvunt, & laxant; insuper, unde potissimum (ut opinor) juvant, *particulas salinas*, alterius indolis, mineræ morbificæ insinuantur alias hujus meolas salinas & irritativas edomant, & subigunt, easque per cathartim excitatam sæpe toras educunt.

In hoc morbo siquidem *omnia omnibus* non conveniunt, imo nec *eadem* semper aut aliquamdiu *eidem* personæ, Medici prudentis observatione sedula, & quotidiano consilio opus est, ut per *coindicaciones à juvenibus*, & *adentibus* deumptas medendi methodus recte institui, & subindè variari possit.

II. *Indicatio vitalis*, Curatoria adjungi, & subindè intercalari debet. Quippe cum Agrotantes tortura, vigiliis, vomitu, & abstinentia ferè continuis affecti, in languores sæpe incidunt, ac de vita interdum periclitantur, *remedia* quæ vires sustentent, spiritus reficiant, & contra morbi terociam induciis quasdam procurent; nempe *Cardiaca* ac *Hypnotica* vices suas habeant.

℞. *Aq. flor. Chamom. Samb. an. ℥iv. Cinnam. hordeata, citri totum an. ℥ij. Margar. pul. ʒj. sacchari ʒiij. f. Julapium, capias subindè coch. ʒ. vel 6.*

℞. *Pul. Margarit. oculor. Cancr. an. ʒj. dividatur in 4. partes; pars una detur bis, vel ter in die cum Julapio, vel cum Decocto rad. Contrajerva.*

℞. *Conserva Caryophyll. ʒj. Confect. de Hyacin. Alcher. an. ʒij. Margar. pul. ʒiij. Syrup. c. succo citri q. s. f. confect. detur q. nuch Mosch. ter vel quater in die cum Julapio.*

In constitutionibus minis calidis *sp. C.C. Fuliginis, sis. Armon. succin. item Tintl. Anim.* aut *Coralli* non raro egregie profunt.

*Opiata* in morbo Colico necessarij sunt usus, sine quibus nec agrotis vivere, nec Medicis ac ministris quiescere aut otio quovis frui licebit.

℞. *Aq. flor. Paralyseos ʒiij. syr. de Meconio ʒβ. Aq. Mirabilis ʒij. mis. f. haust. hora somni sumendus.*

Si dolores magis intenti, tali remedio non cedent, *Opii preparata, & compositiones* exhibere oportet. *Laudanum Paracelsi aut Londinense, pilula de Syrace, aut Cynoglossa conventura; Opi solutio tartarif. ad gr. 16. vel 20. mihi præcipuo in usu esse solet.* Quod sanè pharmacum, quibusdam ab hoc morbo diu ac miserè divexatis, interdum longo tempore, noctibus modo singulis, modo alternis cum bono successu exhibui.

3. *Indicatio preservatoria*, in paroxysmorum intervallis tantummodo locum habens, morbi *procatarxin*, proinde ut dolorum insultus, raro aut nunquam postea redeant, præsentem tollendam, ac futuram inhibendam molitur: Quorum gratiâ *sanguis & liquor nervus*, ne materiam morbificam gignant, depurari ac in crassi debita conservari; atque *cerebrum & Abdominis plexus nervei*, ne illum promptè nimis suscipiant, corroborari debent. Propter hos fines victus ratione instituta, *Vere & Autumno* solennes Medicinæ cursus, cujusmodi *pro Arthritidis prophylaxi* præscripsimus incantur.

*Vomitio*, si congruat, in hoc casu nunquam ommittatur; quæ nempe *viscerum emulsioria* inanita sanguinis, & liquoris nervei recrementa, secus materiam morbificam auctura, uberius excipiant; insuper, & *plexus nervei*, partesque omnes excutiantur adeo, ut nihil in mineram morbi celsurum ibidem stagnare, aut aggeri sinatur.

*Purgatio* per tres, aut quatuor vices, cum debitis intervallis, item in constitutione calidiori *phlebotomia* celebrentur; insuper *remedia alterantia*, ac imprimis *chalybeata*, quando a catharsi vacat, horis medicis quotidie sumantur.

Præ cæteris autem quibuscunque remediis *Acidula minerales ferratæ* æstivo tempore per mensem epotæ, juvamen maximum conferre solent: verum cum istæ propinantur, sedulo cavendum est, ut bene, & celeriter per urinam aut sedes reddantur, ne fortè, si in corpore duntius morantur, in *caput* aut *pedes* incurrendo (uti crebro aisolet) *veriginem* aut *Podagram* inducant.

℞. *Tinct. noſt. Chalybis ʒj. sumantur gr. 15. ad 20. bis in die in Julapii sequentis coch. 7.*

℞. *Aq. solior. Ari. hardan. an. lb β. Lumbr. magist. Gentiana compos. Pæonia compos. an. ʒij. sacch. ʒβ. misce.*

Eodem modo *Tinctura Antimonii, & succini*, quin & *remedia alterantia* ad affectus Cephalicos multa alia superius præscripta, etiam in *preservatione à Colica*, cujus nempe *procatarxis* a cerebro procedit, hic meritò locum habet,

Quod autem spectat ad *Caroli Pifonis* observationem, quæ probare nititur, *Colici doloris* causam omnino in cerebro hæere, eo quod serosa colluvies in capite cujusdam ab eo morbo defuncti reperta fuerit: Dico serum istud in *cranium* aggestum, illius morbi *causam remissam & antecedentem*, ac minimè *conjunctam* fuisse. Enimvero probabile est, ab istâ primâ scaturigine seri superflui, & acris, portionem quandam ductu nervoso in *Abdominis plexu nerveo* descendisse, ibidemque *affectionis Colicæ* mizeras constituisse. Porro, licet materies morbifica illic prolapsa præ tenuitate partium, & exiguitate nidorum raro oculis conspiciatur, attamen talem hujus morbi inveterati, & atrocioris facti mineram. non ita pridem *semine illustris*, cujus alibi facta est cadaver aperiens, in *mesenterio* planè vidi, & palpavi.

*Hæc Thomas Villius de morb. ad anim. corpor. pertinentibus tractat. Iam adducimus Curationes, Consultationes, Observationes & Anatomicas inspectiones ex alijs varijs.*

#### Curationes

A dolore sumitur indicatio, cum adeo vehemens est, ut tantisper neglectâ causâ, curationem ad se pertrahat. Propriè enim symptomata curationem non requirunt, nisi rationem causæ majoris mali habeant. Quare si dolor auctus tantus fuerit, ut secum maximi periculi metum apportet, posthabita curandi lege, protinus telandus est & mitigandus.

Triplex autem dolor aufertur. Primò iis, quæ causam doloris tollunt, eiq; contraria sunt. Sic dolor a frigore tollitur, calidis, & contra: Secundo anodynis, quæ pægorica dicta, propriè doloris causam demulcent. Hæc enim gradui nostri caloris similia causam mitigant, concoquunt, & æquabilem reddunt, leviterque rarefaciunt. Tertiò narcoticis dolor aufertur, hæc enim quia sensum partis solent, dolorem non percipi efficiunt, cum pars sensu privata non doleat. Verum propriè causam doloris non tollunt, nisi fortè per somnum quem inducunt, ea miti-



mitigetur & concoquatur. Si dolor itaque vehementissime urget, Narcoticum, si non adeo vehementer, anodynum saltem indicat, sive per os, sive per clysterem, & suppositorium sumendum.

In usu verò horum observandum est. Primò ne usum horum differamus, donec vires labefcentes prorsus deficiant. Secundò quod commodius & tutius usurpentur in doloribus à causa calida, quam frigida, Tertiò, quòd tutior sit usus compolitorum, quam simplicium.

Ad morbum ipsum sive doloris causam quod attinet, si sit nuda intemperies, quod tamen in hoc casu raro vel nunquam usu venit, vel si accidat, non diu tamen sola immaterialis subsistit, per contraria est alteranda: si cum materia, quæ quantitate peccet, evacuetur, ut si sint flatus, discutiantur, si bilis, pituita, vel alius p. n. humor evacuetur.

Hic autem considerandum, an causa doloris essentialiter in colo generationem habeat, an vero aliunde communicetur, & somentum suum accipiat; sive illud sit intrinsecus, sive extrinsecus, à causis externis ortum, cui prius propiciendum est.

Et si igitur dolor hic, pro varietate causæ variæ & diversæ, imò quandoque contraria exposcat præidia, tamen in genere notandum est, quod semper in hoc casu plurimum conducat, ut alvus sit aperta: deinde, ut medicamenta potius per clysterem injiciantur, quam per os exhibeantur: tertio ut nulla medicamentum per os dentur aut extrinsecus adhibeantur ante alui apertionem.

Quando itaque à pituita crassa & viscida ortum ducit, tum prima indicatio est diminuerè illum humorem ex parte affectâ leniter purgantibus, idque per locum, quo natura sua maxime vergit humor, per alvum videlicet, quod Hiera simplici vel sola, vel cum Terebinthina commixta, additis paregoricis dictis perficitur vel per vomitum, quod decocto alterato cum anetho, aniso, addito oxymelle vel simplici vel iussu potest præstari poterit.

Quotactò, secunda indicatio docet pituitam crassam ac viscidam fundere, eliquare, & hac ratione ad expurgationem præparare, ad flatum denique crassos simul respicere, cavendo, illa, quæ nimium calefaciunt.

Postea ad validiora purgantia progrediendum, ita tamen, ne vehementium purgantium attractione ad locum affectum, materia morbifica augeatur, præsertim in principio. Quapropter tutius est, ut vicibus mediocriter purgantia propineantur, quam unâ vice vehementia, cavendo tamen Rhabarbarum & Myrobalanos ob astringentem, quam possident, facultatem. Senam & Cassiam, ob flatulentiam quam gignere solent.

Sunt autem mediocriter purgantia, infusum seu decoctum Agarici, Mechoacanna, Elect. Diaphanicum, Diacarthami, vel Elefchoph dissolvenda in decocto accommodato, & additis oleis infundenda, vel sine his per os assumenda, uti & jus galli antiqui cum agarico, sem. Carthami, & seminibus carminativis præparatum.

Expurgatâ materiâ etiam calefacientibus,

& attenuantibus, & discentientibus uti possumus, quibus admisceri possunt Chymica, ut spiritus salis natri spagyricè præparatus, qui omnibus scopis dictis satisfacit, spiritus terebinthinæ extracta quoque & olea, ut vis medicamentorum magis ad intimiores intestini partes penetret, in quem finem etiam propinantur theriaca, Mithridatium, aquæ theriacales, alique aquæ compositæ, quibus sudor una etiam elicitur, quem haud inutidem tunc judicamus.

Extrínsecus prorsus sicut calidi & sicci ex fursure & milio, sacculi, inunctiones ex oleo smegmatis ol. anethino, chamomel. quibus penetrationis causa guttula aliquot aliorum destillatorum oleorum admisceri possunt. Solemus etiam lapides interdum quosdam calefactos, & linteo involutos admoveere loco affecto: Balneum etiam & infusum ex simplicibus accommodatis tunc temporis utiliter usurpari possunt.

Si ex flatu affectus suboriatur, discutienda imprimis indicantur, tam intus assumenda, quam exterius applicanda. Inter assumenda sunt rotula variæ, ut Diacyninum, Diacalamment. Aromaticum rosat. Rotula facta cum oleo succini anisi, & feniculi, Zedoaria aq. stillatitia ex cinamomo, vinum hippocraticum dictum: præterea magnæ astidoti, ut theriaca, mithridatium. Extrínsecus paranda sunt somenta, sacculi &c. ex milio, fide tosto, floribus chamom. seminibus fœnugræci, fol. lauri, rutæ &c. additis gutt. aliquot oleorum stillatitiorum penetrationis causâ.

Valeat quoque in hoc casu remedium à Galeno celebratum lib. 12. meth. med. c. ult. materiâ flatuum prius subtractâ, cucurbitula scilicet magna umbilico imposita, nec spernendum est consilium ejusdem Galeni, ut scilicet in doloribus præsentibus cingulo constringantur partes abdominis.

At si dolor proficiatur ex biliosis & acris humoribus, tunc humores illi statim detergendi & expurgandi sunt iis, quæ bilem respiciunt; ut vomitorius ex aqua hordei cum oleo: dejectorius per os adhibitis ex Rhabarb. syr. infusion. rotar. aut violar. elect. diapruti. sicut. pil. ex aloë, &c. per clysterem; ex decoct. malvæ, violariæ, parietariæ, sem. lini. cum elect. hieræ simpl. elect. diaprun. & diasebellen sine diagridio præparatis. Extrínsecus vero usurpetur oleum rosatum cum mucilagine sem. lini Balneum aquæ dulcis.

Si vero dolor ex phlegmone seu inflammatione fiat, tum, si inflammatio sit supra umbilicum, secunda est vena in cubito: si intra umbilicum, ut urina intercipiatur, ex Paulo secetur vena malleoli. Clysteres, & refrigerantes & laxantes quales commodiss. sunt ex decocto hordei, lacte, sero cum saccharo rubro & ol. violaceo &c. maxime hic conveniunt. Pariter quæ per os assumuntur sint refrigerantia. Exterius verò in initio locus affectus inungatur oleo rosato completo cum vitello ovi, postea ol. amygdal. dulc. & chamomel. astrictorius in hoc casu Gal. l. n. meth. med. c. 16. dicit opus non esse, nisi forte affectus cum fluxione sit.

Denique si dolor Colicus à duris & diu recentis excrementis suboriatur, primum hæc



emollire oportet, & clysteribus injectis ex oleo, & assumpto mulso, oleo, balneo, item aquæ dulcis cum simplicibus humectantibus eorumque oleis præparato. Postea vero propinandum medicamentum validum quod emollitas jam fœces possit deturbare. Possunt etiam addi, quæ vermes necant, medicamenta, si videlicet illos adesse suspitio sit.

Quod si hæc valida non proficiant, confugiendum est ad illud auxilium propositum ab Hippocr. lib. 4. de morb. & acceptum ab Amato Lusitano cent. 4. curat. 89. ut folle fabrili inflentur intestina patientis, ut ex hac inflatione separentur fœces ab intestinis: quo facto statim injiciendus est clyster fortis, cui admiscendum salis gemmæ aliquid, quod ut testatur Forellus, peculiari vi dura stercora dissolvit, ægerque in balneum prædictum lotandus.

Interim quoque non negligenda sunt medicamenta ea, quæ peculiari proprietate juvare creduntur, qualia sunt intestina lupi præparata, & in vino ad 3j. epota. Item stercus ejusdem, quod Gilbertus sæpissime cum successu se probasse testatur, eruribus tantum aut pectini alligatum, avis galerita quæ (teste Galen. lib. 2. de simpl. med. fac. cap. proprio, & Aetiol. 9. cap. 31.) pulverisata idem præstat. Cornu cervi præparatum, umbilicus infantis nuper nati, exsiccati & pulverisati, stercus bubulum exsiccatum aut succus illius, aut aqua ejus per alembicum destillata. Verum his & similibus experimentis ita fidendum esse putamus; ut semper auxiliis illis potius utamur, quibus præter experientiam ratio quoque manifestior suffragatur, quale est vinum malvaticum cum aliquot gutt. vel spir. Terebinth. exhibitum ol. micis moschatæ expressum, amygdalar. dulcium &c.

Quod restat, omnibus his compar victus ratio instituenda est, siquidem hanc negligere, vel perspectam non habere calamitatis plenares est secundum Hippocr. 6. epidem. sect. 8. part. 48.

Tota itaque ad calidum magis & siccum vergat, quam ad frigidum & humidum, æris itaque humiditas & frigiditas vitetur.

Cibi sint optimi succi & paucorum superfluitatum. Laudantur itaque volucres omnis generis, præcipue sylvestres, & galeritæ, gallinæ, capones &c. à carnibus bubulis, suillis, asininis, anatum & omnium palustrium, piscium item summe est cavendum ab omni olerum genere abstinendum, præterquam à fœniculo, melissa, mentha, salvia petroselinò, majorana, quibuscum cibi condiri possunt.

Pro potu, si causæ calidæ (quod etiam in aliis præsupponimus, quia omissis reliquis causis raris, potissimum dixerat, proponimus, quæ in colicâ à pituitâ & flatibus oborta tanquam frequentissima, servanda est) absint, vinum convenit generosum album, absynthite, & Hippocraticum dictum: cerevisia, absynthite, cum calamo aromatico, & Baccis Lauri præparata.

Exercitium corporis valdè ante cibum sumptum prodest, contra vero à cibo vocet.

Animi perturbationes, cujusmodi sint arceat, excretiones alvi quotidie ut respondeant, laborandum esse, ante jam dixi, & qui concitantur sint monstravi; Quare finem hæc facio, me-

liora monstrantibus cedere paratissimus. *Joan. Harthm. disput. chymic. Medic. 15. in 4. parte suorum operum.*

Curatio hujus affectus pro varietate causarum varia instituenda est.

Ac primum flatulentia & pituitosa eadem curatio adhibenda est, quæ incipit a clystere emolliente, cui postmodum succedat carminans & discutiens (qualis in dolore ventriculi à simili causâ descriptus est) qui reiterandus est eadem die bis, ter, quater, donec dolor dispareat: Si tamen uno aut altero clystere alvus non deponat, ut interdum contingit, acri suppositorio sollicitanda est. In uno autem prædictorum, clysterum utiliter admiscetur, aquæ benedictæ 3iv.

Vel colocynthidis 3ij. vel iij. in clystere emolliente & carminante decoquantur. Si clysteres dolorem non solvant, in iis pertinaciter insistendum non est, sed satius est levi aliquo medicamento uti. Observatum est, cum æger quidam triginta clysteres sine fructu accepisset, alium medicum mannæ 3i β. cum ol. amygd. dulc. 3ij. in jusculo gallinæ pingui exhibuisse, & ægrum à dolore liberalisse. In dolore tamen qui sit à pituita crassa, fortiora medicamenta exhibenda.

Postea verò fomenta, inunctiones, balnea, emplastra, aliaque remedia, convenient, quæ in dicta doloris ventriculi curatione supra proposita sunt. Quibus addenda sunt specifica nonnulla, huic affectui maximè proficua.

Intestina lupi vino albo abluantur, postea in furno exsiccentur, in vase terreo; donec in pulverem reduci queant. Hujus pulveris capiat æger drac. i. cum vino albo: subito dolorem sedat.

Aqua simplex bulliat, eique ferventi adde ol. commun. quartam partem & grana aliquot piperis crassiuscule nitri; capiat æger cochl. iij. vel iv. calidè quantum fere poterit, sedatur dolor ferè in momento.

℞. Aloës opt. drach. j. laudani opiat gr. iv. diagrydii gr. vj. Misce formentur pilulæ vj. deaurata, capiat æger horâ commodâ, dolorem post horam sedant, & postea humores noxios evacuant. His etiam pilulis substitui potest medicamentum ex diaphanico & philonio Romano, in dolore ventriculi descriptum. Hipp. lib. 6. de internis affectibus proponit purgationem ex peplo, & meconio. Olei amygdal. dulci. aut amarat. recentis 3vj. exhibitæ dolorem demulcent & materiam intestinis adhærentem per inferiora deturbant. Cum sequentibus etiam mixtum utilissimum est.

℞. Ol. amygdal. dulc. vel alterius pro pauperibus, 3iv. vini generosi 3j. sem. syrapi de papav. 3j. misce fiat potio.

Cum manna etiam exhibitum oleum amygd. dulcium in jusculo pingui, ut supra dictum est, dolorem lenit, & materiæ in peccantem evacuat.

Semen ameos pulverat. cum vino exhibit. ad 3j. urgente dolore cum subito sistit, & secundâ exhibitione morbum plerumque auferit admovendo simul cataplasma ex terebinth. 3viij. stuppis exceptum, sinapismatum piperis, & sang. draco. subtiliss. pulverat. an. 3j.

Galbanetum Paracelsi humori discutiendo idoneum est, si totus venter eo illinatur, illius descriptio à Cratone talis proponitur.

℞. Gummi Elemi, hederæ, galbani, ol. laurini, ana partes æquales. Distillantur in arcua per



per retortam servantur seorsim, primum aqua: deinde ol. clarum, tertio ol. crassum instar mellis, quo inprimis utendum est.

℞. Calami Aromat. ʒj. galangæ ʒij. flavedinis exterioris corticis arantior. ʒiv. cinam. electi, sem. anisi & fœniculi, ana drach. iij. cumini drach. vii. baccar. juniperi recent. ʒi. baccar. lauri drach. iij. pulverentur subtilissime, & infundantur in vini malvat. opt. lb iij. stent in infusione in loco calido per vi. dies. Postea distillantur in balneo mariz. Dosis ʒj. præmissis evacuationibus.

Ventri admoveatur utiliter gummi caragna, & tacamahaca, & prius cucurbitula magna umbilico affigatur.

Etiamsi empiastra prædicta ventri non admoveantur, omittenda tamen non est cucurbitula umbilico admoda, quæ ipso Galeno teste dolorem à flatibus excitatum discutit instar incantamenti.

Si affectus sit diuturnior, decocto guajaci per multos dies continuato faciliter curari poterit, purgando per intervalla, & clysteres frequenter injiciendo. At si cholicus dolor fiat à pituita vitrea, decoquatur guajacum cum vino, quemadmodum usurpavit Amat. Lusit. cum scœlici successu *Curat. 32. Cent. 1.*

Sedato dolore apozema pituitam evacuant præscribendum est, quo reliquæ omnes educantur; vel ejus loco decoctum galli veteris cum incidentibus, attenuantibus, & catharticiis compositum. Vel julepus efficacissimus in colica ventri-uli descriptus.

Colica biliosa curatur clysteribus emollientibus, & acrimoniam humorum temperantibus.

Foveatur venter decocto emolliente & anodyno, aut quod melius erit, paretur semicupium ex eodem decocto.

Conveniet etiam cataplasma infimo ventri ex farina hordei, & sem. lini coctis in ol. chamæmel.

Tum etiam epithema refrigerans hepatis regioni admotum, in hunc modum compositum.

℞. Succu endiviz, & cichorii ana lb ss. succu lactucz, & aceti rosac. ana ʒij. misce fiat Epithema.

Julepi exhibeantur ex aquis papav. rhœad. lactucz, endiviz, acetosa, cum syrup. violac. de pomis & de limonibus.

Si doloris atrocitas urgeat, ad narcotica confugiendum erit.

Mitigato aliquantulum dolore; expressio Rhei in aquâ cichorii, cum syrupo rosaceo exhibenda erit, & frequenter repetenda, donec tota humorum saburra evacuata fuerit.

Si purgatio ista benignior morbo eradicatione non sufficiat, confugiendum est ad mercurium dulcem, qui aliquoties exhibitus cum purgantibus diagrydiatis curationem absolvit. Quibus suspectum est diagrydium, solus exhibeatur mercurius dulcis, in pilulam efformatus, cum conferua rosarum, superhausta infusione senaz, & rhab. addita manna, & syrupo rosaceo.

Postea utiliter usurpantur aquæ acidulæ, & vitriolatæ.

Saviente dolore ad balneum, & laudanum

confugiendum est, cui aliquando purgantia misceri poterunt, sed majori dosi, quæ eorum vis retunditur à laudano: Galbanetum Paracelli, quamvis calidum ad humorem discutendum idoneum est, si totus venter eo illinatur, illius descriptio supra proposita est.

Phlebotomia in hac colicæ specie aliquando convenit, cum metus est, ne caloris vehementia sanguis incalcescat, febrisque generetur. Si vero febris adfuerit, statim celebranda est.

Urgente admodum siti, aqua frigida exhibenda est, docente Galen. lib. 12. meth. cap. 7. ejusque usu testatur Amat. Lusit. se talem dolorem subito, incantamenti instar, sultulisse; eadem se usum feliciter tum sumpta tum admoda, testatur Septalius duabus historiis lib. 7. anuadversionum practicarum descriptis.

Ad colici doloris, qui in paralyfin degenerat, curationem, alvo variis clysteribus soluta, priusque viis cathartico apertis, demittatur æger in balneum tepidum, ex decocto emollientium paratum, bis, ter, quater, quinque in die, ut acrimonia humoris temperetur, ac pori membranarum aperiuntur. Postero die cathartico accommodato humor ille purgetur. Deinde repetatur balneum. Idque iterum diebus faciendum, si vires ægri ferre queant, donec ex purgatis humoribus, & sedato dolore, æger in tuto sit.

Interim clysteres continuentur; præsertim qui ex lacte parantur, ad dolorem demulcendum utilissimi sunt, quibus cassia ol. violaceum, & liliorum admisceri poterunt.

Venter ol. chamæmel. anethino, amygdal. dulc. lilior. cum butyro frequenter inungatur.

His feri lactis, & acidularum usus tandem subjiciatur.

Ac denique affectû in longitudinem abeunte, ea quæ in melancholiz hypochondriacæ curatione relata sunt, hic aptari poterunt.

Neque omittenda est ab ipso morbi initio, phlebotomia, eaque purgationi præmittenda, ac sæpe iteranda, si sanguis præva qualitate infectus appareat, aut si dolor rheumatismi particeps esse videatur.

Denique omnia remedia, quæ in colica biliosa proposita sunt, hic etiam aptari poterunt. Quibus non conferentibus, nonnulli Medici confugiunt ad potionem sequentem quam licet sordidam & delicatorum hominum ore indignam exhibent, & dolorem statim mitigare affirmant.

℞. Stercoris Equini ʒj. minutim dividatur, & infundatur in lbj. aquæ papav. rhœad. in qua spiritus vini guttæ vii. vel x. dissolutæ fuerint colentur cum expressione levi, & dividantur in tres doses satis amplas, sumendas horis exacerbationis doloris.

Si vero affectus in paralyfin degeneret, lenienda est spina dorso, & partes paralytica balsamo resolvente, & nervos roborante, modo febris abfuerit. Si enim adhuc, lana succida oleo, aut unguento digerente imbuta, partibus paralyticis alligatur, cavendo diligenter frigus, quo humor partibus impingitur, illiusque distillatio impeditur.

Galbanetum Paracelsi hic præcipuè confert, si partibus prædictis, tum etiam umbilico admoveatur. *Lazar. Reverim Prax. Med. lib. 10.*

Cum



Cum singula hujus affectus Phænomena cum ab acri aliquo huc humore sive habitu è massa sanguinea in intestina excusso, nasci aptè doceant, indicatio curativa primaria mihi hæc est, ut scilicet evacuetur dictus humor, tam antecedens in venis, quam continens in visceribus conclusus; altera verò ab hac, ut Anodynorum usu & compescatur humorum eo tendentium impetus, & mitigetur immittissimus dolor.

Sanguinem itaque à brachii venis paulo liberalius educi (si nempe id fuerit hactenus intentatum) & post horas 3. vel 4. Anodynum exhiberi curo. Postero die catharticum aliquod lenitivum præscribo, interposito die uno repetendum, ad tertiam etiam nonnunquam vicem, prout humoris reliquæ plures mihi videntur, aut pauciores. Observandum est autem, quod si malum hoc, sive fructibus horariis nimis avidè ingestis, sive alii cibo cuicunque *Demum* originem suam debeat, unde scilicet succi pravi corruptique primum in sanguinem transmittentur, atque ex eodem postliminio in viscera, rebus inquam sic stantibus, ventriculus ante omnia eluendus est lacte cerevisiato affatim hausto, & per vomitum rejecto, quo exantlato Anodynum propinandum est, sequenti autem die primum venæsecanda, & in cæteris eo quem jam docuimus ordine, procedendum.

At vero cum & doloris vehementia, & vomituritio, ob quam intestina ad inversionem quasi feruntur, catharticonum operationi obstitent, intendendæ sunt eorundem vires, neque leo subere excipiendus. Frustra enim mitius catharticum exhibueris, nisi fortè zger alvo sit facile solubili, quod diligenter inquirendum est: Cum enim hujusmodi medicamentum viam sibi facere per intestinorum canales non valeat, zger ab eo læditur magis, dum scilicet ab ejusdem inefficaci agitatione & vomitus & dolor augentur. Potio cathartica lenitiva ex infusione Tamarind. fol. senn. & Rhei in qua dissolvi possunt Manna & syr. Rosaceus, cathartice aliis anteferenda, cum humores minus exagitet, & commoveat: cum tamen sive ob ægri aversionem medicamenti formæ liquidioris, sive vomituritionum in ventriculo retineri vix queat, Pilulæ necessario in subsidium vocandæ, inter quas Cochiaz mihi præ cæteris semper placuere, utpotè certissimo pede quam cæperunt viam insistentes, tum in hoc casu, tum aliis plerisque. Ubi vero tanta est sive ventriculi debilitas, sive etiam vomituritio, ut nec pilulæ possint detineri, ibi remedium primo Anodynum impero, & paucis horis elapsis Catharticum eo temporis spatio interjecto, ut Catharticum à Narcotico tanto distet intervallo, ut ab eo non vincatur, & pereat, eas autem in ventriculo moras trahat, quæ ad virtutem purgativam eidem communicandam sufficiant, ut suam demum exerat operationem, cessante altero. Licet Catharticum, modò id possit fieri, diu post Anodynum rectissime propinatur, cum etiam ad horas duodecim ab hoc assumpto, alvus isti ægrius respondeat, atque non nisi operosius solvatur.

Cum autem hic, uti in aliis plerisque mor-

bis in quibus indicantur Narcotica, Catharticum semper dolorem intendat (saltem nuda jam operatione, qua quidem urgente mitius nonnunquam cum ægro agitur) idcirco solenne mihi est Anodynum ingerere, ubi primum expiravit Cathartici *visus*. Quale quidem manè etiam & serò quotidie hauriendum impero, spatio scilicet omni inter purgationes medio, quo certius dolorem conopiam donec Catharsis debite fuerit celebrata.

Peracta Catharsis humorum *visus* compescere (quod jam solum restat agendum) Anodyno manè & vespere jugiter exhibitio, contendendo: quod etiam sæpius aliquando est repetendum: nec unquam mihi contigit, dolores vehementiores sedare posse nisi dosi largiori & reiterata; quæ enim alteri malo debellando par esset, ab hoc vincitur, violentia doloris remedii vires frangente. Tutissime autem repetuntur Narcotica urgente hujusmodi dolore, non item ubi ille desierit. Quamobrem doloris indicium secutus Narcoticum repeto, donec vel cessaverit ille vel admodum fuerit mitigatus; eo nihilominus interjecto temporis spatio, ita compertum mihi sit, quid à dosi precedente sperari debeat antequam alteram superaddam. Plerumque verò, nisi ubi summè viget dolor, Paregoricum manè & serò exhibitum sufficit. Anodynum mihi familiare Laudanum illud liquidum est supra descriptum, cujus guttæ xvi. in aqua Cardiaca stillatitia solvuntur, vel augetur dosi pro doloris magnitudine.

Simplicissima hæc methodus, qua primum humor peccans venæsectione, & purgatione evacuatur, deinde Narcoticorum ope conciliatur quies, semper mihi felicissime cessit præ aliis quæ mihi hactenus innotuere omnibus. Cum enemata carminantia, eo sine injecta ut humores acres extenuent, crabrones irritum diuturniorem reddant morbum. Hic autem imprimis animadverti volo, quod licet tam Phlebotomiam quam catharsin huic sedandi methodo necessario esse præmittendam affirmavero, nonnunquam tamen, re ita postulante, ea utraq; omisâ à Paregoricis ordiendæ tela est. Exempli gratia, ubi ob prægressam ægritudinem aliquam evacuationes copiosiores non ita diu ante colicæ adventum institutz fuerint, (non raro enim ob viscerum debilitatem, maxime si accedat major caloris gradus à vino, vel spirituosio liquore alio immodice hausto, qui nuper ab alio convalescere morbo in hunc præcipitantur) hoc inquam in casu non modò non necessarium, sed & noxium esse censeo, alia insuper adjiciendo Cathartica novos excitare tumultus atque omnia denuo perturbare; illud jam taceo, quod in hoc affectu zger ut plurimum prius quam consulatur Medicus, repetito enematum usû intestina satis proluit, ita ut partim hæc de causâ, partim ob diuturniorem morbi moram Narcotica fere sola in usum videantur revocanda.

Mense Augusto 1671. Nobilissimus Dominus Baro Annesly colicâ biliosa laborans cum cruciatu intolerabili, & frequenti vomituritione jam ab aliquot diebus, ad castellum de



de Belvoir accersiri me iussit, nullum non enematum genus, atque alia insuper remedia a Medicis Doctissimis, experientissimisque eo locorum degentibus praescripta iam tentaverat. Ego nullis ulus anabagibus, repetitum narcoticorum ulum ad normam iam traditam suasi, quorum ope prope diem convaleuit, & mecum ad urbem sanus rediit.

Quandoquidem autem dolor hic praeter ceteris quibusque ex sua natura recidivus sit, omnis rei revertendi ansa Anodyno bis quotidie ad aliquot dies exhibito praescindenda est. Quod si, quoties intermittitur Narcoticum, dolor subinde recrudescat (ut nonnunquam fit) nihil a me hactenus excogitari potuit quod ad persanandum egrum ita certo faceret atque equitatio vel in curru vectio, quilo longiora itinera confici debueret; Anodyno interim mane & sero indefinenter propinato; huiusmodi enim exercitiis materia morbum committens in corporis habitum deducitur, & sanguis perpetua agitatione commutatus de novo quasi depuratur, ipsaque demum intestina caloris nativi excitatione haud parum corroborantur ac resocillantur. Nec pudet fateri, me dicto exercitio in partes adscito morbum hunc, cui alio quovis modo devincendo par non fui, plus semel penitus expulisse. Neque vero illud tentandum est, nisi post evacuationes debitas sufficienter celebratas, neque ab eo nisi post dies aliquamultos desistendum. Pauper quidam mihi vicinus, qui & adhuc est superstes, colica biliosa vehementissima per hos annos liberavit, quam cathartici, clysteribus, globulisque plumbeis devotatis expugnare diu sed frustra erat conatus. Hic ego ad frequentem Narcoticorum usum confugi, neque poenitenda opera, quamdiu enim ista repeterentur, satis recte habuit, sed cum his palli retur tantum malum, non extirparetur, (revertetur enim ut primum erat exhausta Narcoticorum vis) ego hominis miseratus & gravi morbo, & re angusta afflictissimum, equum ex meis cominodavi, quo iter dicto jam modo peragendum aggrediretur, eoque ad dies pauculos continuo, viscera eas vires recipere, ut morbi reliquis exequendis paria iam essent, & sine Anodynorum praesidio omnino convalesceret.

Et ut quod res est loquar, non in hoc tantum casu, sed in morbis aliis chronicis quam pluribus, hoc exercitii genus nunquam non cum uberrimo fructu usurpatum memini, modò quis in illo improbius perseveraret. Si enim nobiscum reputemus ventrem inferiorem, in quo disponuntur organa secretoria, hoc maxime exercitio vibrari, eaque succussionibus aliquot mille uno in die exagitari solere, facile credemus, eadem succuni quemlibet recrementitium ibi impactum ope dicti exercitii posse excutere, & (quod maioris adhuc est momenti) validiori ista caloris nativi excitatione ita corroborari, ut munere quod iis mandavit natura in sanguine depurando recte deserviantur.

Dietam si junior fuerit aeger, & calidioris temperamentis, refrigerantem atque incrassantem impero, puta hordei cremorem, Panatellam &c. & tertio quoque die si latret adhuc

Stomachus, pullum teneriorem, miculamve pilcem coctum; Potum non alium concedo quam cerevisiam tenuem, mitemque, vel lac cum aqua coctum: neque ulterius quicquam indulgeo, nisi equitatio ad reintegrandam sanitatem necessaria, pleniorum victum & generosiorem postulet liquorem, quibus rependantur spirituum exercitio exhaustiendorum d. mna.

Quinimò observatione constat, quod ubi hic morbus nimis perite tractatus diutissime fatigaverit, ita ut viscera elanguescerent, atque aeger extremam iam macie atque debilitate tantum non esset confectus, in hoc inquam casu, liberalior sive aqua epidemica, sive narabilis, sive alius demum cuiuscunque quae sanus maxime delectabatur, ulus, hoc tempore eundem ultra spem omnem juverit, huius enim ope paucissima ista caloris nativi spirituumque reliquia excitabantur, & fermentum praeternaturale visceribus adherens, & novis paroxysmis fontem subinde ministrans, à liquoribus magis spirituosus exstinguebatur.

Porro ut in morbi curatione, ita etiam & eodem iam depulso, diæta illa tenuis, de qua diximus, adhuc aliquamdiu est observanda, cum enim morbus hic recidivum praeter aliis omnibus affectet, atque insuper sedem sibi delegerit praecipua coctionis instrumenta (viscera intelligo, iam ab eodem infirmata) vel levissimus huius generis error matum haud leve contellum apportabit. Quocirca tam in hoc quam in ceteris omnibus viscerum affectibus cibi *diæta* canescens & angue sunt vitandi, & qui conceduntur *temperata*, ea tantum quantitate sumendi, quae ad vitam sustinendam possit sufficere.

Feminarum nonnullas vexat affectus hysterici speciei quaedam, colicam biliosam ita ad unguem referens, tam doloris acerbitate, quam litu, tum etiam humoribus coloris flavi, viridisque vomitu rejectis, ut mihi obiter tractanda veniat, ne à quopiam pro iam dicto morbo hæc habeatur.

Quæ habitum corporis laxo, crudoque sunt mulieres cum hoc malo praeter ceteris coniectantur, quæque alio aliquo affectu hysterico jam pridem laboraverunt; aut (quod saepenumero fieri solet) quæ à partu difficili ac laborioso ob natum infantem grandiusculum, qui vires & naturam matronas nimis exhaustis, vix evasere. Regionem ventriculi; nonnunquam & paulò inferiorem, dolor haud mitior quam in passione colica, iliacaque primam obsidet, quem vomitiones sequuntur enormes, nunc viridis materiae, nunc vero flavae.

His accedit, (quod saepe observavi) maior animi dejectio, desperatioque quam in morbo alio quocumque. Post diem unum alterumve cessat dolor, qui post paucas septimanas revertitur, nihilo lenius saviens quam antequam solveretur paroxysmus.

*Menstruum* quandoque satis spectabilem, comitem sibi adsciscit, intra dies pauculos sponte evanescentem. Cessantibus jam symptomatibus omnibus, ubi agra sibi satis valere videatur, levissima animi commotio, sive ab ira sive à dolore ea fuerit excitata (quibus hoc in casu promptissime afficiuntur feminae) dolorem ferè revocat, quod etiam & de ambulatione, & de alio exercitio quolibet praeturae nimis suscepto dicem.



circa sex non naturalia alterationes, in visceribus in ventris perturbationes insignes, cum doloribus non raro excitant: Cujusmodi tamen affectio non morbus, sed tantum symptoma, à causa manifestà excitatum, censeri debet.

Attamen præterea, Colica ita propriè dicta, non tantum à causa accidentali producta quibuscumque contingit, sed homines nonnullos peculiari ritu prædispositos incessans, omnino à causa præcæteristica sensim maturatà dependet. Morbi insidius graviorès plerumque periodos suas habent, atque Aeris, & Anni alterationes observant; porro excitati, remediis non facile cedunt, neque citò pertranscunt; verum non obitante epithematum usu, aut ventre per enemata aut cathartica copiosè licet subducto, sæpe per plures dies, ac interdum hebdomadas, cum magnà ferocià persistunt. Dolores in quolibet paroxysmo, eandem usque partem repetunt, & aliorum symptomatum pari ut plurimum syndrome stipantur: Cæterum dolores colici, licet non eandem in omnibus sedem habeant, sed modò sub v. nriculo, modò circa umbilicem, aut hypochondria, quandoque in hypogastrio, aut versus lumbos maxime delatant; attamen, quoties in eodem Egrotante repetunt, eundem sapissime focum observant.

Pro explicanda hujus morbi *Ætiologia*, non satis erit statuere, intestina vel ab acrioribus suis contentis vellicari, vel à sanguine, aliisve humoribus iisdem suffusis, ac continuitatem solventibus, irritari. Nam quoad prius summè improbable est, bilem, vel pituitam, vel succum pancreaticum, aliisve quemcumque humorem aut simplicem, aut cum aliis effervescentem, dolores adeo atroces, fixos, & diu perseverantes excitare posse: Præterquam enim quòd intestina propria mucagine obnata à contentis, licet acrioribus, non facile pungi, aut exasperari solent, in tantum ut sedes aciores, quæ anum sæpe excoriant, intestinorum ductus parum aut minimè divexent, insuper hæc gravior irritata, quicquid molesti in ipsorum cavitate continetur, facile excutiant, atque sursum vel deorsum propellendo, citò eliminant; prout in Cholera morbo, aliisque Affectibus dysentericis planè cernitur; neque ulla fere est saburra horum membranis stimulant, inque dolores ciens, quæ una aut altera purgatione foras exterminari non potest. Deinde quod spectat ad sanguinem, aut feri intra intestinorum tunicas suffusiones, à quibus phlogosis aut tumores dolorifici excitantur, revera ita fieri interdum concedimus, immò ætèrni novimus; exinde verò passionem, non Colicam, sed Iliacam excitatam fuisse observavimus. Quippe cum plures ab Ileo defunctos aperuerim, intestini cujusdam inflammationem, aut phacelum fere in omnibus & morbi, & mortis causam fuisse deprehendi: neque mirum hoc, quoniam in membrana tenera, & maxime sensibili magna solutio continui, spasmos, & corrugationes dolorificas ita continuas, & atroces ciebat, propterea ut intestini affecti motus persistat, quo faeces alvi versus anum provehantur, inhibeatur ac prorsus invertatur.

Cum itaque morbi Colici, aliismodi cum materiis sive mineris, tum sedes & affluxionis viæ perquirenda sunt; jure merito liquor nervorum, ejusque recrementa in suspicionem veniunt; eò ma-

gis, quod passio istæ cum aliis Cerebri, & nervosi generis affectibus, intimum adeò consensum habet, prout supra innuimus. Carolus Piso cum plerisque totius corporis affectus, tum insuper dolores Colicos à colluvie serosa in capite aggesta excitari statuit, morbi hujus sedem, nec in tunica, nec cavitatibus intestinorum, sed in Peritonæo esse, atque causam omnino in cerebro juxta nervorum origines hærere, contendit. Nimirum supponit ille (quod ex observatione Anatomica compertum ait) serositates in postica cerebri regione depositas, nervorum parvi vagi caputella obfideri, proindeque ipsorum ramos, & propagines quasdam ultimas peritonæo insertas, in ipsos agere, atque ab hujus contractione dolores tum in ipso, tum in visceribus subitè acutissimos, ac velut percrebrantes excitari. In probationem hujus sententiæ exemplum subdit, cujusdam à paroxysmo Colico graviore defuncti, & dissecti, in quo postica capitis regio juxta cerebellum, & nervos parvi vagi origines aqua limpida in tantum perfundeatur, ut substantia medullosa instar papyri madidi plurimum humectata appareret. Sect. 4. c. 2.

Verum enimvero, ut colicam ex humoris cerebri, & partes nervosas irrigantis vitio oriri concedatur; attamen haud isto modo, quem hic Author designavit, pathemata istæ dolorifica excitari putamus. Quippe nec in peritonæo morbi sedem, nec intra v. nriculo, causam ejus primariam subscire putamus. Nam quoad hunc, etsi materies morbifica, in capite juxta nervorum origines aggesta, quandoque in partibus longè distitis motus convulsivos, spasmos, & stupores, (ut pluribus instantiis, una cum affectuum rationibus alibi ostendimus) producat; attamen in dolore (qualis solet esse colicus) valde atroci multo secus habet. Quippe ad hunc, qui semper à solutione continui procedit, excitandum requiritur, ut causa dolorifica live objectum improporcionatum ipsi membro affecto, aut saltem ejus parti, aut portioni cuidam intigatur: Nec enim sufficit dicere convulsionem à causa remota, ac inde dolorem à convulsione procedere: Quippe licet dolor sæpe motus convulsivos, attamen hic ipsum per se, saltem magnum & diu perseverantem, minime producant. Quapropter in dolore colico, materies fibras sensiles diutius hærens, & ab invicem divellens, proindeque in corrugationes dolorificas irritans, haud usque in cerebro commorari, verum exinde, per ductum nervos versus intestina descendens, alicubi in eorum vicinia juxta partes dolentes congeri, & subinde vel ob plenitudinem sponte turgescens, vel cum alio humore effervescens morbi istius paroxysmos inferre videtur.

Mineram verò colicam à peritonæo rejicimus; quia membrana hæc cum admodum tenuis, ac vasis paucioribus & tantum exilibus donata sit, nec magnæ humorum affluxionis capax, neque ipsa, ut convellatur, viscera subscata comprimendo, aut contrahendo in dolores urgere posse videtur. Materies autem morbifica à capite per nervos in ventrem lapsa, nidos maxime idoneos in mesenterio reperiet; in quo scilicet nervi plurimi, & magni, ebrunneque plexu & distributiones valde insignes habentur: Quare, cum pars hæc valde sensilis, & humorum nervosi generis affluxionibus plurimum obnoxia fuerit, morbi colici sedes merito statuatur.



Motuum quorundam in Abdomine convulsivorum, qui vulgò *Hysterici* dicuntur, causas sæpenumero in plexibus mesentericis latere olim ostendimus, porro in iisdem locis dolores colicos interdum viros suos habere tunc asserimus, & ex observatione Anatomica satis ratum fecimus. Attamen non eadem, sed nonnihil diversa materies est, quæ utrosque ita dispares affectus, sub eodem lare excitare solet. In passionibus dictis hysterici spiritus animales copula elastica onuitos, ab invicem elidi, seu velut explodi, proindeque corpora continentia, in motus irregulares, seu præternaturales invicem rapere, in priori tractatu satis fuse declaravimus: In doloribus autem colicis iidem spiritus propter materiem iis infestam, & improporcionatam irritati, proindeque ab invicem divulsi, & distracti fibras sentiles in corrugationes valde molestas agunt: Quo ritu in doloribus colicis hoc fiat, item quæ morbi istius causa conjuncta, præcatæxus, & symptomatum rationes fuerint, jam paulo explicatius dicemus.

Itaque pro Affectus colici seminio sive minera, humoris nervi recrementa quædam à cerebro per nervos decidua, inque mesenterium alioque Abdominis plexum delapsa, ibidem congeri supponimus; quæ si crassiora, & magis viscosa fuerint, quàm ut per lymphæ ductus excipi, & amandari, aut per vasorum propagines exiles, in cavitates intestinorum exiungere possint, in partibus illis stagnantia & sensum coacervata, tandem in plenitudinem irritativam assurgunt; dein materies ista stagnatione plus degener, & magis infesta evadens, occasionaliter, aut sponte turgescens, vel forsitan cum humore salino fixo & sanguine illuc suffuso effervescens, nervorum propagines, fibrasque nerveas, quibus innumeris Mesenterium scatet, corrugationibus valde molestis, & dolorificis torquetur; cujusmodi illorum affectio, haud planè cessat, donec materies effervescens aut discussa, aut in cavitates intestinorum expressa, aut demum subacta fuerit.

Porro in quantum è mesenterio ejusque plexibus propagines fibræque nerveæ in ventriculi fundum, vesicam felleam, ductum choledochum, intestina omnia, & quaquaversus in cuncta ferè totius abdominis viscera densissimè protenduntur, idcirco, dum materies colica in mineris suis effervescens, tormina, & cruciatus sæpe acerrimos ibidem ciet, una in partibus plerisque aliis membranis spasmi, & contractiones convulsivæ aut dolorificæ ubique excitantur. Hinc ob mesenterium primario affectum sub umbilico dolor acerbis, quali pali affixi, aut terebræ perforantis speciem præ se ferens; dein circumcirca in toto ferè Abdomine, propter intestina simul in diversis locis varie diducta, aut retracta, dolores vagi huc illuc excurrunt, atque ob fibrarum motus, tum in his, tum in vasibus urinaris perturbatos, aut inversos, alvus ferè semper adstricta est, & urinæ interdum suppressio, aut paucitas succedit: Quin etiam Duodenum, vesica fellea cum ductibus, atque ventriculi fundo spasmò affectis, eorumque libris sursum tractis, vomitio crebra, cum bilis flavæ aut prasinæ rejectione copiosa, durante paroxysmo subinde infestat.

Quod autem nonnulli, ejusmodi bilem (quæ

nonnumquam instar viridellæ intensè prasinæ rejicitur) morbi causam materiale esse contendunt; ejusque copiam, & in viscera exudationem dolores colicos in intestinis excitare: Dico humorem istum circa paroxysmi initia, in cysti fellea sine offensâ quavis contineri, postea tamen propter viscerum spasmos inde expressum & quasi emulsum, in ventriculum vomitu affectum exantlari; ibidem vero humori alteri forsitan acido, occurrens, colorem viridem, immo quandoque atrum (prout olim observatione Anatomica compertum habui) acquirere. Atque hoc quidem ex eo patet, quod qui temperamenti frigidioris bilem minus progignunt dum colica laborant, flavæ aut viridis parum, aut nihil vomitu rejiciunt; attamen doloribus haud minus acerbis divexari solent.

In paroxysmo colico, doloribus ventris lumbares atrocissimi; in imo dorso sævientes sæpenumero adjunguntur: qui certe à nullius intestini irritatione oriri possunt. Attamen facile erit concipere, eos à causa morbinica in mesenterio constituta excitari: in quantum scilicet nervi quidam insignes lumbares mesenterii plexum nerveum maximum ingrediuntur; hinc ut non tantum spasmi dolorifici per consensum ab una parte, in alteram tradantur; sed probabile insuper sit, etiam dorsi & lumborum recrementa quædam hoc transitu in mesenterium derivari; atque aliquatenus ob hanc rationem, Scorbuticos ventris torminibus, & fluori ita plurimum obnoxios fieri.

Hæc de morbi Colici natura, & sede, nec non de causa conjuncta, & symptomatis ab eadem in actu existente oriundis: Quod ad præcatæxin spectat in his duobus ea potissimum consistit, scilicet primò quatenus in liquore nerveo recrementa plura congeruntur; & 2. quòd ea potissimum à nervis, ad viscera imi ventris destinatis excepta, & ad mesenterium delata, mineras ibi morbidas constituunt. Primò prius horum plerumque cerebri culpa, ac vitio contingit: nempe quatenus hoc una cum liquore nerveo particulas heterogeneas, & regimini animali infestas intra fines suos admittit; præterea item quòd hæc, aliaque recrementa ordinaria per idoneas cloacas haud statim amandat: Quapropter materies incongrua, cum aliàs à cerebro ablegari nequit, in nervos parvi vagi maximè patientes facillimè irruit. Atque ob hanc rationem est, quòd famina à quavis cerebri inordinatione diutius Hystericiam dictam frequenter contrahunt; nempe quatenus recrementa liquoris nervei, sive ex spasmodica & elastica, sive dolorifica, & irritativa tantum fuerint, in par vagum deponi aptiora, symptomata convulsiva & quæ ac colica ita passim excitant. Secundò. Quòd materies hæc nervorum par vagum incurrens, in mesenterio, aut aliis intra Abdomen plexibus deponitur, ratio est, quòd in hos plexus nerveos conjugationis istius nervi plures & majores, ferè ultimo terminantur: Quamobrem si humoris nervi recrementa hic quali in inum subsidencia, nec per vasa quæpiam regeri, nec in cavitates intestinorum transire possunt, necesse erit eadem focos morbidos in hac parte struere.

Causæ evidentes duplicis sunt generis, scilicet primò quæ cerebro & generi nervoso injuriæ, materię morbinicæ proventum majorem fa-



ciunt; vel secundò quæ sanguinem, & humores agitando, mineras aggestas, & prius quiescentes exuscitant; inque effervescentias dolorificas cient. Tædio hic esset multiplices, ac diversimodas causas, à quibus *dolores colici* in prædispositis acciuntur, examinare; hos enim & mordinationes magnæ in sex non naturalibus, & aeris & Anni mutationes, ac insuper ipsa a ( quibus juvamen expectatur) *pharmaca* intempestivè exhibita, crebrò accerunt.

Ex prædictis morbi hujus *differentia* facile innotescent. Nam primò ratione *causarum* ostendimus, *Colicam* aut *accidentalem*, quæ propter intestina à contentis acrioribus irritata infertur; aut *habitualement*, qualis modo describitur, secundo, ratione *loci affecti Colicæ* modò *superior*, modò *inferior*, modò *lateralis* est, prout materies morbifica aut in mesenterii parte modo hac, modo illà, vel in aliis Abdominis plexibus desigitur. Tertiò, ratione *Ægrotantis temperamenti*, & *valetudinarii status*, dicitur *colica biliosa*, *pituitosa* aut *atrabilaria*; item vel *simplex*, vel *scorbatica*; non quòd humores isti imaginarii *colicam* per se excitant, sed juxta corporis affecti dispositiones, symptomata variari faciunt.

Quoad *prognosis* satis vulgò innotescent: *Colicam accidentalem*, scilicet à causà evidente solitaria excitatam sæpissime tutam esse, & facili negotio curari; *habitualement* verò & quoad diathesin difficulter admodum eradicari, ita ut paroxysmi non amplius redeant; & ipsos quandoque paroxysmos, non obstantibus remediis pertinaces esse, atque per plures dies, immo hebdomadas ac menses interdum persistere.

2. *Dispositio Colicæ* febribus intermittentibus diuturnis, & continuis malè judicatis frequenter succedit, in quantum scil. liquor nerveus insigniter vitiatus recrementa plura congerit, quæ in Abdominis plexus, quali receptacula magis patentia altius deponuntur. Porro ob hanc rationem febris epidemica quibusdam Annis increbuit, cui *Colica* velut symptoma pathognomonicum adjuugebatur: Hinc pariter *Scorbutus* diuturnus ac ingravescent, quatenus liquorem nerveum pervertit, etiam *Colicam* accerit.

3. Postquam *dolores Colici* aliquandiu in ventre desævierunt, sæpenumero *lumbos*, & dein morbo ingravescente, membra, & musculos ferè omnes in toto corpore incesunt, tandemque non raro in *paralysin* terminantur; quod certè indicio manifesto est, materiem morbificam non per *arterias*, sed *nervos* deferri, ejusque subjectum si ve sedem, non intestinorum cavitates, aut tunicas, sed mesenterii plexus nerveos esse; nam quod *dolores lumbares* ventris terminibus superveniunt, præterquam quod nervi utriusque loci communicant, tandem insuper in *causa* est, quòd materies morbifica in capite multum aucta, non tantum in *par vagum*, sed etiam in spinalem *medullam* illabitur; quam subiens, ac in inum ejus subsidens, primò in *lumbis*, ac postea nervis plerisque aliis, qui à spinà procedunt, affectis, in membris, & musculis aliis *dolores* exoriri facit; denique nervorum ductibus, à materia morbifica in ipsis ad plenitudinem aggesta, infarctis, *paralysin* infertur.

4. *Colica atrocior*, & plurimum immanis, cuius causa intestini cujusdam *inflammatio*, aut *abscessus* est, *passionem Iliacam* plerumque lethalem inducit.

*Methodus Therapeutica*, in *Colica*, ut in plerisque morbis intermittentibus, tres *primarias Indicationes* suggerit: Quarum *prima curatoria*, in paroxysmo adhibenda, dolores sedandos, atque morbi accessionem citius, ac facilius tollendam respicit. *Secunda Præservatoria*, quid extra paroxysmum ad morbi causam tollendam, ne paroxysmi sæpius repetant aut gravius infescent, agendum sit, edocet. *Tertia Vitalis*, remedia ad vires inter tormina & diros cruciatus conservandas, & spiritus refocillandos suppeditat. Super his singulis paulò explicatius ordine dicemus.

1. *Indicationem curatoriam* in *Colicâ accidentali* ferè solam respicimus; etenim causa evidente, quæ intestinorum à contentis acrioribus irritatio est, remota, dolores ut plurimum sponte cessant, nec recidiva absque simili occasione timeatur. Quare ad hunc morbum cito curandum, praxis apud vulgus, imò quosvis e plebe homines satis idonea innotescent, scil. protenus *Enemata emollientia*, *Topica anodyna*, & *narcotica* exhibere; quibus si febris adsit vel metuatur, *phlebotomia* sæpe cum fructu adiungitur. Horum *formulas*, & utendi ordinem in *Therapiciâ colicæ habitualis* modò subdenuis.

Itaque pro Affectibus hujus *paroxysmo* sanando, *duæ* sunt præcipuæ intentiones; nempe, & *solutio continui* dolorum tolli, & *fibrarum* si ve *spirituum* in iis excaulescentia compesci debet. Ratione *prioris* enitendum erit, tum ut materies minere uni aut pluribus impacta, & effervescens, aut discutiat, aut subigatur: tum interea ut novæ materis affluxus inhibeatur. 2. *Intentio* cui primò, & continuè insistere oportet, per *Anodyna* potissimum & *narcotica* perficitur: Quo ritu, & quibus remediis quæque hæc methodicè peragenda sunt, trademus.

*Doloris Colici* curatio sæpissime, & satis rectè à clystere incipitur. Hic primò sit tantum leniens, & emolliens, a quo, velut à *fonti interno*, fibrarum corrugationes compesci, & spiritus excaulescentes demulceri poterunt. In hunc finem *lactepidum*, cum *saccharo*, vel *molossis*, aut *syrupo violaceo*; item *decocta emollientia* ex *Maltâ*, *Alibâ*, *Mercuriali*, floribus *Meliloti*, *Sambuci*, cum oleo *Amygdalearum*, vel *olivæ*; item *decoctum* ex capite *vervecino*, aut *pedibus vitulinis* conveniunt: Interdum *enema* ex mero oleo *Olivæ*, aut *Lini* præ quibuscumque aliis juvare solet.

Quod si *enemata mitiora* non facile redduntur, aut ventrem non laxant; quæ magis irritant, atque humores ab *Arteriolarum* osculis exprimunt, & quasi emungunt, adhibeantur: In quem finem parentur *decocta carminativa*, aut *amara*; in quibus dissolvantur *elestinaria* *Diacatholica*, vel è *baccis Lauri*, aut *speciebus Hieræ*. Item liquoribus istis insitatum est addere *infus. croci metallorum* ʒ iij. vel iv. vel *decocti emollientis* lbj. adde *Terebinthinæ Ven. solut. cum vitello ovi* ʒ j. aut ʒ iij.

Vel ʒ. *Urina sana* lbj. *Tereb. Ven. sol.* ʒ iij. *molossi* ʒ j. *misc.*, s. *Enema*. Hoc magnum juvamen sæpius contulisse novi; cuius ratio videtur, quòd *Terebinthina* particula balsamica intestina confortant; ac insuper a sanguine venoso accepta, & cum eo per totum corpus circulata, urinas movent, ita ut lotium à tali clystere sæpe copiosius succedat, & semper odorem violaceum reddat. Foran etiam particula *Terebinthina* ubique dissulz



diffusa; materiam morbificam aut stagnantem movent, aut acetosam, aut aliâs degenerem ad crassiorem meliorem inclinant.

Dum intestina clysteribus colluuntur ita, ac intus quasi foveantur, Epithemata exteriora etiam Abdomini applicentur.

℞. Folior. Malva utriusque, Mercurialis, Parietariae, an. m. 14. floribus sambuci, chamomeli, meliloti, an. m. j. caput vervecinum discissum. Coquantur in s. q. aquae font. colatura usurpetur pro potu, cum luphis lanceis calidissime intinctis, & expressis, atq; vicissim applicatis: repetendo quoties dolores intensius urgebunt: Circa foris intervalla cataplasma, aut linimentum adhibeatur.

Magma herbærum confuso adde farina Avenacea q. s. f. Cataplasma, quod interpassarim insuatur duobus sacculis figure quadrata pro abdomine obtegendo. Horum unus pro vice effervescat in patina supraprurinae ardentes cum oleo lumbricorum, aut Ranarum; imponatur calidè, mutando quamprimum frigescente incipit.

Vel ℞. Olei Lumbricorum, aut Ranarum q. s. illinatur pars dolens post somnum: & charta emporetica tenuis coimbuata applicetur, & gestetur.

Omentum Agninum aut Pulmones, aliave Brutorum viscera calefacta Abdomini imposita, & subinde mutata, dolores interdum mirè sedant.

Observavi in quibusdam constitutionibus, & temperamentis Epithemata ex calidioribus aut calidiùs applicata dolores exacerbasse potius, quam lenivisse: Quare in his casibus ex re fore videtur, totus ex solutionibus niri, vel salis Armoniaci, aut aliis liquoribus chymicis, prout in doloribus Arthriticis, quandoque (uti Septalino refert) ex aqua pura pura frigida instituire.

Quod si ventris tormina horum usu non remittunt, hypnoticis utendum erit; quæ scilicet iuxta dosi exhibitæ, inducias sæpe magnas præbent: interim ut vires ac spiritus satiscientes relinqui, & contra morbum apparatus adhuc major institui possint.

℞. Laudani liquidi Tartarificati gr. 16. ad 20. detur hora somni, in coch. aq. florum chamomeli superbibendo ejusdem coch. 6. Repetatur noctibus alternis; vel tertiis; si dolores graviter urgebunt.

In constitutione calidiori. ℞. Aq. flor. chamomeli ʒij. Sympi de meconio ʒß. Aq. mirabilis ʒij. f. haustus suavendus hora somni.

Interea dum hæc aguntur, pro doloribus sedandis, atque materiâ focus morbidis impactâ aut discutienda, aut saltem laxanda, remedia evacuantia vices suas habeant nempe tum ut minera colica penitus extirpetur, tum ut supplementa siue fomes ejus (ne magis accrescat) præsciudantur. In hos fines vomitio (ubi convenit) atque lenis purgatio; insuper in temperamento calido, ubi febris urget, aut timetur, phlebotomia celebrari debent.

℞. Sulphuris Antimonii gr. 5. ad 7. vel 8. conservæ Boraginis ʒj. detur mane cum regimine. In hoc casu juxta Medici præsentis judicium, aut infusio cruci metallor. vel Mercurii vitæ. Tartarus emeticus & Myrsinæ expressio foliorum Asari, ac in constitutionibus tenerioribus, sal vitrioli & vinum oxymel scilliticum exhiberi possunt.

Purgantia, ne stomacho laboranti nauseam moveant, in dosi tantum perexiguâ & formâ eleganti exhibeantur.

℞. Resina Jalapii, scammonian. gr. 5. cremoris

Tartari ʒj. Cinnamomi pul. gr. 4. f. pilulæ, aut redigatur in pilulas vel in bolum. cum conserva florum Borag. aut Rosar. damascenar.

℞. Scammonii sulphurati ʒß crem. Tart. g. 15. Anim. Diaphoret. ʒj. f. pul. detur eodem modo.

Si febris non urgeat, exhibeatur dosi pilular: Stomach. cum Gummi, aut de Succino vel per se, vel cum resina Jalap.

℞. Pilular. Radii gr. 25. vel 36. Laudani gr. 1. f. pil. 4. sumantur hora somni. Ha primo somnum accersunt, & mane purgant.

Vel ℞. Calomelanos ʒj. res. Jalap. gr. 6. scammon. gr. 4. Ammon. q. s. f. pil. 4. sumantur hora somni. In Colica diuturna, cum remedia quævis alia parum vel nihil juvarunt, sæpius nova medicamentum hoc semel aut bis exhibitum, cum maximo agrotantis levamine salutationem movisse. Etenim si quando materies morbifica, in plexibus nervis, aliisq; circa Abdomen locis uberius aggesta, & penitus impacta, per alia medicamenta dimoveri nequit; particula Mercuriales sese quaquaversus explicantes, eam facile dissolvunt, in minutias dividunt, easque huc illuc variè dispellunt, & tandem prorsus dissipant: Quamobrem in Colica diuturna ac pertinaci, salutationis mitioris ergo, nonnunquam feliciter exhiberi possunt.

Balnea & sudorifica in doloribus colicis passim præscribi solent; attamen, quantum nostræ observationi constitit, rarius cum fausto successu: Quippe hæc sanguinem & humorem nervinum exagitando, eos plus adhuc materiæ in mineram colicam deponere, quin & materiam ibi depositam magis efferverecere, & ferocire faciunt; eamque perraro integre discutiant.

Diuretica multo commodius exhiberi solent, à quibus cum sanguis funditur, ejusque serositates copiosè præcipitantur, inde morbi fomes præsciinditur, atque massa sanguinea inanita partem materiæ morbificæ excipit, propterea ut reliquæ ejus facilius discutiantur. In hunc finem.

℞. Sp. Tartari optimè rectificati ʒß. detur 3 B. bis vel tertio die in cochlear. j. vel ij. Julapii seq. superbibendo ejusdem coch. 5.

℞. Aq. folior. Bardanae, aut Ari. aut Persicariae lb j. aq. flor. Sambuci, Chamomeli an. ʒiv. aq. Gentiana compos. Raphani compos. ʒij. sacchari ʒiv misce.

Eodem modo ac sp. Tart. in iusta dosi exhibeantur, modò Tinct. sal. Tart. modo Mixtura simplex, aut sp. salis Armoniaci succinati.

℞. Millepedum præpar. ʒij flor. sal. Armon. tart. iurisat. ʒj. olei nucis moschat. ʒß. Terebinth. q. s. f. massa, formetur in pilul. sumantur 3. vel 4. semel aut bis in die superbibendo dosim Julapii, vel aq. destill. sequentis coch. v. vel vj.

℞. Millepedum recentium mundatar. lb i ʒ. flaved. 6. Aurant. & 4. Limonior. nucs moschat. unum. 6. minutim confisis adde mica panis albi veteris lb j. omnibus simul confusis, & probè missis asfunde lactis recentis lb iv. vini Hispani lb ij. destillantur f. art. liquor totus misceatur, & edulcoretur cum saccharo, aut syrupo violaceo, ad placitum.

In Colica diuturna ac pertinaci, cui adsunt temperamentum, ac viscera fervidiora, Acidula purgantes, vel serum lactis cum syrupo violaceo sæpe cum magno juvamine propinari solet: utrique enim liquores, ubi congruunt, copiosius epoti, stomachum, ac intestina æstuantia refrigerant eaque à spasmus, & corrugationibus dolorificis



contracta, aut flutibus convulsivè extensa statim solvunt, & laxant; insuper, unde potissimum (ut opinor) juvant, *particulas salinas*, alterius indolis, mineræ morbificæ insinuantes alias hujus incolæ salinas & irritativas edomant, & subigunt, easque per catharim excitatam sæpe foras educunt.

In hoc morbo siquidem *omnia omnibus* non conveniunt, imo nec *eadem* semper aut aliquamdiu *eidem* personæ, Medici prudentis observatione sedula, & quotidiano consilio opus est, ut per *coindicaciones à juvenibus*, & *ludentibus* de sumptis medendi methodus recte institui, & subindè variari possit.

11. *Indicatio vitalis*, Curatoria adjungi, & subindè intercalari debet. Quippe cum *Ægrotantes* tortura, vigiliis, vomitu, & abstinentiâ ferè continuis affecti, in languores sæpe incidunt, ac de vita interdum periclitantur, *remedia* quæ vires sustentent, spiritus reficiant, & contra morbi terociam induci is quædam procurent; nempe *Cardiaca* ac *Hypnotica* vices suas habeant.

℞. *Aq. flor. Chamom. Samb. an. ℥iv. Cinnam. boracæ, citri totius an. ℥ij. Margar. pul. ʒj. sacchari ʒij. f. Julapium, capias subindè coch. ʒ. vel 6.*

℞. *Pul. Margarit. oculor. Cancr. an. ʒj. dividatur in 4. partes; pars una detur bis, vel ter in die cum Julapio, vel cum Decocto rad. Contrajerva.*

℞. *Conserve Caryophylli ʒj. Confect. de Hyacin. Alcher. an. ʒij. Margar. pul. ʒij. Syrup. e succo citri q. s. f. confect. detur q. n. uel Mosch. ter vel quater in die cum Julapio.*

In constitutionibus minis calidis sp. C.C. *Fulguris, sa. Armon. succin. item Tinct. Anim. aut Corallii* non raro egregie prosunt.

*Opiata* in morbo Colico necessarij sunt usus, sine quibus nec *ægrotis* vivere, nec *Medicis* ac ministris quiescere aut otio quovis frui licebit.

℞. *Aq. flor. Paralyseos ʒij. Syr. de Meconio ʒss. Aq. Mirabilis ʒij. mis. f. haust. hora somni sumendus.*

Si dolores magis intenti, tali remedio non cedent, *Opii preparata*, & *composiciones* exhibere oportet. *Laudanum Paracelsi* aut *Londonense*, *pitula de Syrace*, aut *Cynoglossa conventus*; *Opi solutio tartaris. ad gr. 16. vel 20.* mihi præcipuo in usu esse solet. Quod sanè pharmacum, quibusdam ab hoc morbo diu ac misère divexatis, interdum longo tempore, noctibus modo singulis, modo alternis cum bono successu exhibui.

3. *Indicatio præservatoria*, in paroxysmorum intervallis tantummodo locum habens, morbi *procatarxin*, proinde ut dolorum insultus, raro aut nunquam postea redeant, præsentem tollendam, ac futuram inhibendam molitur: Quorum gratiâ *sanguis & liquor nervus*, ne materiam morbificam gignant, depurari ac in crassi debita conservari; atque *cerebrum & Abdominis plexus nervei*, ne illum promptè nimis suscipiant, corroborari debent. Propter hos fines victus ratione instituta, *Vere & Autumno* solennes Medicinæ cursus, cujusmodi *pro Arthritidis prophylaxi* præscripsimus incantur.

*Vomitio*, si congruat, in hoc casu nunquam omitteratur; quæ nempe *viscerum emundatoria* inanita sanguinis, & liquoris nervei recrementa, secus materiam morbificam auctura, uberius excipiant; insuper, & *plexus nervei*, partesque omnes excuriantur ad eò, ut nihil in mineram morbi cessurum ibidem stagnare, aut aggeri sinatur,

*Purgatio* per tres, aut quatuor vices, cum debitis intervallis, item in constitutione calidiori *phlebotomia* celebrentur; insuper *remedia alterantia*, ac imprimis *chalybeata*, quando à catharsi vacat, horis medicis quotidie sumantur.

Itæ cæteris autem quibuscunque remediis *Acidula minerales ferratæ* æstivo tempore per mensem epotæ, juvamen maximum conferre solent: verum cum istæ propinantur, sedulo cavendum est, ut bene, & celeriter per urinam aut sedes reddantur, ne fortè, si in corpore diutius morantur, in *caput* aut *pedes* incurrendo (uti crebro aisolet) *vertiginem* aut *Podagram* inducant.

℞. *Tinct. nost. Chalybis ʒj. sumantur gr. 15. ad 20. bis in die in Julapii sequentis coch. 7.*

℞. *Aq. solior. Ari. Kardan. an. lb ʒ. Lumbr. magist. Gentiana compos. Patonia compos. an. ʒij. sacch. ʒss. misce.*

Eodem modo *Tinctura Antimonii*, & *succini*, quin & *remedia alterantia* ad affectus Cephalicos multa alia superius præscripta, etiam in *præservazione à Colica*, cujus nempe *procatarxis* à cerebro procedit, hic meritò locum habet,

Quod autem spectat ad *Caroli Pisonis* observationem, qua probare nititur, *Colici doloris* causam omnino in *cerebro* hætere, eo quòd serosa colluvies in capite cujusdam ab eo morbo defuncti reperta fuerit: Dico serum illud in *cranium* aggregatum, illius morbi *causam remissam & antecedentem*, ac minimè *consequentem* fuisse. Enimvero probabile est, ab istâ primâ scaturigine seri superflui, & acris, portionem quandam ductu nervoso in *Abdominis plexus nerveos* descendisse, ibidemque *affectionis Colicæ* mineras constituisse. Porro, licet materies morbifica illic prolapsa præ tenuitate partium, & exiguitate nidorum raro oculis conspiciatur, attamen talem hujus morbi inveterati, & atrocioris facti mineram, non ita pridem *famina illustris*, cujus alibi facta est cadaver aperiens, in *mesenterio* planè vidi, & palpavi.

*Hæc Thomas V Villis de morb. ad anim. corpor. pertinentibus tractat. Iam adducimus Curationes, Consultationes, Observationes & Anatomicas inspectiones ex aliis variis.*

#### Curationes

A dolore sumitur indicatio, cum adeo vehemens est, ut tantisper neglecta causâ, curationem ad se pertrahat. Propriè enim symptomata curationem non requirunt, nisi rationem causæ majoris mali habeant. Quare si dolor auctus tantus fuerit, ut secum maximi periculi metum apportet, posthabita curandi lege, protinus tendendus est & mitigandus.

Tripliciter autem dolor aufertur. Primò iis, quæ causam doloris tollunt, eiq; contraria sunt. Sic dolor à frigore tollitur, calidis, & contra: Secundo anodynis, quæ paregorica dicta, propriè doloris causam demulcent. Hæc enim gradui nostri caloris similia causam mitigant, conquiunt, & æquabilem reddunt, leviterque rarefaciunt. Tertio narcoticis dolor aufertur, hæc enim quia sensum partis solent, dolorem non percipi efficiunt, cum pars sensu privata non doleat. Verum propriè causam doloris non tollunt, nisi fortè per somnum quem inducunt, ea miti-



mitigetur & concoquatur. Si dolor itaque vehementissime urget, Narcoticum, si non adeo vehementer, anodynum saltem indicat, sive per os, sive per clysterem, & suppositorium lumendum.

In usu verò horum observandum est. Primò ne usum horum differamus, donec vires labefcentes prorsus deficiant. Secundo quod commodius & tutius usurpentur in doloribus à causa calida, quàm frigida, Tertio, quòd tutior sit usus compositorum, quàm simplicium.

Ad morbum ipsum sive doloris causam quod attinet, si sit nuda intemperies, quod tamen in hoc casu raro vel nunquam usu venit, vel si accidat, non diutamen sola immaterialis subsistit, per contraria est alteranda: si cum materia, quæ quantitate peccet, evacuetur, ut si sint flatus, discutiantur, si bilis, pituita, vel alius p. n. humor evacuetur.

Hic autem considerandum, an causa doloris essentialiter in colo generationem habeat, an vero aliunde communicetur, & somentum suum accipiat; sive illud sit intrinsecus, sive extrinsecus, à causis externis ortum, cui prius propiciendum est.

Et si igitur dolor hic, pro varietate causæ variæ & diversæ, imò quandoque contrariæ exposcat præsidia, tamen in genere notandum est, quod semper in hoc casu plurimum conducat, ut alvus sit aperta: deinde, ut medicamenta potius per clysterem injiciantur, quàm per os exhibeantur: tertio ut nulla medicamentum per os dentur aut extrinsecus adhibeantur ante alui apertionem.

Quando itaque à pituita crassa & viscida ortum ducit, tum prima indicatio est diminuire illum humorem ex parte affectâ leniter purgantibus, idque per locum, quo natura sua maxime vergit humor, per alvum videlicet, quod Hiera simplici vel sola, vel cum Terebinthina commixta, additis paregoricis dictis perficitur vel per vomitum, quod decocto alterato cum anetho, aniso, addito oxymelle vel simplici vel squillitico præstari poterit.

Quo tacto, secunda indicatio docet pituitam crassam ac viscidam fundere, eliquare, & hac ratione ad expurgationem præparare, ad flatum denique crassos simul respicere, cavendo, illa, quæ nimium calefaciunt.

Postea ad validiora purgantia progrediendum, ita tamen, ne vehementium purgantium attractione ad locum affectum, materia morbifica augeatur, præsertim in principio: Quapropter tutius est, ut vicibus mediocriter purgantia propinentur, quàm una vice vehementia, cavendo tamen Rhabarbarum & Myrobalanos ob astringentem, quam possident, facultatem. Senam & Cassiam, ob flatulentiam quam gignere solent.

Sunt autem mediocriter purgantia, infusum seu decoctum Agarici, Mechoacanna, Electæ. Diaphanicum, Diacarthami, vel Elefchoph dissolvenda in decocto accommodato, & additis oleis infundenda, vel sine his per os assumenda, uti & jus galli antiqui cum agarico, sem. Carthami, & seminibus carminativis præparatum.

Expurgatâ materiâ etiam calefacientibus,

& attenuantibus, & discutientibus uti possumus, quibus admisceri possunt Chynica, ut spiritus salis nitri spagyricè præparatus, qui omnibus scopis dictis satisfacit, spiritus terebinthinæ extracta quoque & olea, ut vis medicamentorum magis ad intimiores intestini partes penetret, in quem finem etiam propinantur theriaca, Mithridatium, aquæ theriacales, aliæque aquæ compositæ, quibus sudor una etiam elicitur, quem haud inutilem tunc judicamus.

Extrinsecus præfunt fotus calidi & sicci ex fursure & milio, sacculi, inunctiones ex oleo smegmatis ol. anethino, chamomel. quibus penetrationis causâ guttulæ aliquot aliorum destillatorum oleorum admisceri possunt. Solemus etiam lapides interdum quosdam calefactos, & linteo involutos admoveere loco affecto: Balneum etiam & insessus ex simplicibus accommodatis tunc temporis utiliter usurpantur.

Si ex flatu affectus suboriatur, discutienda imprimis indicantur, tam intus assumenda, quam exterius applicanda. Inter assumenda sunt rotulæ variæ, ut Diacyninum, Diacalamment. Aromaticum rosar. Rotulæ factæ cum oleo succini anisi, & fœniculi, Zedoariæ aq. stillatitia ex cinamomo, vinum hippocraticum dictum: præterea magnæ asfridoti, ut theriaca, mithridatium. Extrinsecus præparanda sunt somenta, sacculi &c. ex milio, sale tosto, floribus chamom. seminibus fœnugræci, fol. lauri, rutæ &c. additis gutt. aliquot oleorum stillatitiorum penetrationis causâ.

Valeat quoque in hoc casu remedium à Galeno celebratum lib. 12. meth. med. c. ult. materiâ flatuum prius subtractâ, cucurbitula scilicet magna umbilico imposita, nec spernendum est consilium ejusdem Galeni, ut scilicet in doloribus præsentibus cingulo constringantur partes abdominis.

At si dolor proficiscatur ex biliosis & acerbis humoribus, tunc humores illi statim detergendi & expurgandi sunt iis, quæ bilem respiciunt; ut vomitoriis ex aqua hordei cum oleo: dejectoriis per os adhibitis ex Rhabarb. syr. infusion. rosar. aut violar. elect. diapruss. sicut. pil. ex aloë, &c. per clysterem; ex decoct. malvæ, violariæ, parietariæ, sem. lini, cum elect. hieræ simpl. elect. diapruss. & diasebetiem sine diagridio præparatis. Extrinsecus vero usurpetur oleum rosatum cum mucilagine sem. lini Balneum aquæ dulcis.

Si vero dolor ex phlegmone seu inflammatione fiat, tum, si inflammatio sit supra umbilicum, secunda est vena in cubito: si infra umbilicum, ut urina intercipiatur, ex Paulo secetur vena malleoli. Clysteres, & refrigerantes & laxantes quales commodiss. sunt ex decocto hordei, lacte, sero cum saccharo rubro & ol. violaceo &c. maxime hic conveniunt. Pariter quæ per os assumuntur sint refrigerantia. Exterius verò in initio locus affectus inungatur oleo rosato completo cum vitello ovi, postea ol. amygdal. dulc. & chamomel. asfrictoris in hoc casu Gal. l. n. meth. med. c. 16. dicit opus non esse, nisi forte affectus cum fluxione sit.

Denique si dolor Colicus à duris & diu recentis excrementis suboriatur, primum hæc



emollire oportet, & clysteribus injectis ex oleo, & assumpto mulso, oleo, balneo, item aquæ dulcis cum simplicibus humectantibus eorumque oleis præparato. Postea vero propinandum medicamentum validum quod emollitas jam fœces possit deturbare. Possunt etiam addi, quæ vermes necant, medicamenta, si videlicet illos adesse suspitio sit.

Quod si hæc valida non proficiant, confugiendum est ad illud auxilium propositum ab Hippocr. lib. 4. de morb. & acceptum ab Amato Lusitano cent. 4. curat. 89. ut folle fabrili inflentur intestina patientis, ut ex hac inflatione separentur fœces ab intestinis: quo facto statim injiciendus est clyster fortis, cui admiscendum salis gemmæ aliquid, quod ut testatur Forestus, peculiari vi dura stercora dissolvit, ægerque in balneum prædictum lotandus.

Interim quoque non negligenda sunt medicamenta ea, quæ peculiari proprietate juvare creduntur, qualia sunt intestina lupi præparata, & in vino ad 3j. epota. Item stercus ejusdem, quod Gilbertus sæpissime cum successu se probasse testatur, cruribus tantum aut pectini alligatum, avis galerita quæ (teste Galen. lib. 2. de simpl. med. fac. cap. proprio, & Aetiol. 9. cap. 31.) pulverisata idem præstat. Cornu cervi præparatum, umbilicus infantis nuper nati, exsiccati & pulverisati, stercus bubulum exsiccatum aut succus illius, aut aqua ejus per alembicum destillata. Verum his & similibus experimentis ita fidendum esse putamus; ut semper auxiliis illis potius utamur, quibus præter experientiam ratio quoque manifestior suffragatur, quale est vinum malvaticum cum aliquot gutt. vel spir. Terebinth. exhibitum ol. nucis moschatæ expressum; amygdalar. dulcium &c.

Quod restat, omnibus his compar victus ratio instituenda est, siquidem hanc negligere, vel perspectam non habere calamitatis plena res est secundum Hippocr. 6. epidem. sect. 8. part. 48.

Tota itaque ad calidum magis & siccum vergat, quam ad frigidum & humidum, aeris itaque humiditas & frigiditas vitetur.

Cibi sint optimi succi & paucorum superfluitatum. Laudantur itaque volucres omnis generis, præcipue sylvestres, & galeritæ, gallinæ, capones &c. à carnibus bubulis, suillis, asineriis, anatum & omnium palustrium, piscium item summe est cavendum ab omni olerum genere abstinendum, præterquam à fœniculo, melissa, mentha, salvia petroselinio, majorana, quibuscum cibi condiri possunt.

Pro potu, si causæ calidæ (quod etiam in aliis præsupponimus, quia omnis reliquis causis raris, potissimum dixerat, proponimus, quæ in colicâ à pituitâ & flatibus oborta tanquam frequentissima, servanda est) absint, vinum convenit generosum album, absynthite, & Hippocraticum dictum: cerevisia, absynthite, cum calamo aromatico, & Baccis Lauri præparata.

Exercitium corporis valde ante cibum sumptum prodest, contra vero à cibo nocet.

Animi perturbationes, cujusmodi sint arceat, excrepiones alvi quotidie ut respondeant, laborandum esse, ante jam dixi, & qui concitantur sint monstravi; Quare finem hæc facio, me-

liora monstrantibus cedere paratissimus. *Joan. Harthm. disput. chymic. Medic. 13. in 4. parte suorum operum.*

Curatio hujus affectus pro varietate causarum varia instituenda est.

Ac primum flatulentia & pituitosa eadem curatio adhibenda est, quæ incipit à clystere emolliente, cui postmodum succedat carminans & discutiens (qualis in dolore ventriculi à simili causâ descriptus est) qui reiterandus est eadem die bis, ter, quater, donec dolor dispareat: Si tamen uno aut altero clystere alvus non deponat, ut interdum contingit, acri suppositorio sollicitanda est. In uno autem prædictorum, clysterum utiliter admiscuntur, aquæ benedictæ 3iv

Vel colocynthidis 3ij. vel iij. in clystere emolliente & carminante decoquantur. Si clysteres dolorem non solvant, in iis pertinaciter insistendum non est, sed satius est levi aliquo medicamento uti. Observatum est, cum æger quidam triginta clysteres sine fructu accepisset, alium medicum mannæ 3i β. cum ol. amygd. dulc. 3ij. in jusculo gallinæ pingui exhibuisse, & ægrum à dolore liberasse. In dolore tamen qui fit à pituita crassa, fortiora medicamenta exhibenda.

Postea verò fomenta, inunctiones, balnea, emplastra, aliaque remedia, convenient, quæ in dicta doloris ventriculi curatione supra proposita sunt. Quibus addenda sunt specifica nonnulla, huic affectui maximè proficua.

Intestina lupi vino albo abluantur, postea in furno exsiccentur, in vase terreo; donec in pulverem reduci queant. Hujus pulveris capiat æger drac. i. cum vino albo: subito dolorem sedat.

Aqua simplex bulliat, eique ferventi adde ol. commun. quartam partem & grana aliquot piperis crassiuscule nitri; capiat æger cochl. iij. vel iv. calidè quantum fere poterit, sedatur dolor ferè in momento.

℞. Aloës opt. drach. j. laudani opiat gr. iv. diagrydii gr. vj. Misce formentur pilulæ vj. deaurata, capiat æger horâ commodâ, dolorem post horam sedant, & postea humores noxios evacuant. His etiam pilulis substitui potest medicamentum ex diaphanico & philonio Romano, in dolore ventriculi descriptum. Hipp. lib. 6. de internis affectibus proponit purgationem ex peplo, & meconio. Olei amygdal. dulci. aut amarar. recentis 3vj. exhibita dolorem demulcent & materiam intestinis adhærentem per inferiora deturbant. Cum sequentibus etiam mixtum utilissimum est.

℞. Ol. amygdal. dulc. vel alterius pro pauperibus, 3iv. vini generosi 3j. sem. syrapi de papav. 3j. misce fiat potio.

Cum manna etiam exhibitum oleum amygd. dulcium in jusculo pingui, ut supra dictum est, dolorem lenit, & materiæ in peccantem evacuat.

Semen ameos pulverat. cum vino exhibit. ad 3j. urgente dolore cum subito silit, & secundâ exhibitione morbum plerumque aufert admovento simul cataplasma ex terebinth. 3iij. stuppis exceptum, sinapisatum piperis, & sang. draco. subtiliss. pulverat. an. 3j.

Galbanetum Paracelsi humori discutiendo idoneum est, si totus venter eo illinatur, illius descriptio à Cratone talis proponitur.

℞. Gummi Elemi, hederæ, galbani, ol. laurini, ana partes æquales. Distillantur in arena per



per retortam; ferventur seorsim, primum aqua: deinde ol. clarum, tertio ol. crassum instar mellis, quo imprimis utendum est.

℞. Calami Aromat. ʒj. galangæ ʒij. flavedinis exterioris corticis arantior. ʒiv. cinam. electi, sem. anisi & fœniculi, ana drach. iij. cumini drach. vii. baccar. juniperi recent. ʒvi. baccar. lauri drach. iij. pulverentur subtilissime, & infundantur in vini malvat. opt. lb iij. stent in infusione in loco calido per vi. dies. Postea distillantur in balneo mariz. Dosis ʒj. præmissis evacuationibus.

Ventri admoveatur utiliter gummi caragna, & racamahaca, & prius cucurbitula magna umbilico affigatur.

Etiam si emplastra prædicta ventri non admoveantur, omittenda tamen non est cucurbitula umbilico admotæ, quæ ipso Galeno teste dolorem a flatibus excitatum discutit instar incantamenti.

Si affectus sit diuturnior, decocto guajaci per multos dies continuato faciliter curari poterit, purgando per intervalla, & clysteres frequenter injiciendo. At si cholicus dolor fiat a pituita vitrea, decoquatur guajacum cum vino, quemadmodum usurpavit Amat. Lusit. cum fœlici successu curat. 32. Cent. 1.

Sedato dolore apozema pituitam evacuans præscribendum est, quo reliquæ omnes educantur; vel ejus loco decoctum galli veteris cum incidentibus, attenuantibus, & cathartice compositum. Vel Julepus efficacissimus in colica ventri-uli descriptus.

Colica biliosa curatur clysteribus emollientibus, & acrimoniam humorum temperantibus.

Foveatur venter decocto emolliente & anodyno, aut quod melius erit, paretur semicupium ex eodem decocto.

Conveniet etiam cataplasma infimo ventri ex farina hordei, & sem. lini coctis in ol. chamamel.

Tum etiam epithema refrigerans hepatis regioni admotum, in hunc modum compositum.

℞. Succus endiviæ, & cichorii ana lb β. succi lactucæ, & acetæ rosac. ana ʒij. misce fiat Epithema.

Julepi exhibeantur ex aquis papav. rhæad. lactucæ, endiviæ, acetosæ, cum syrup. violac. de pomis & de limonibus.

Si doloris atrocitas urgeat, ad narcotica confugiendum erit.

Mitigato aliquantulum dolore; expressio Rhei in aquâ cichorii, cum syrupo rosaceo exhibenda erit, & frequenter repetenda, donec tota humorum saburra evacuata fuerit.

Si purgatio ista benignior morbo eradicationem non sufficiat, confugiendum est ad mercurium dulcem, qui aliquoties exhibitus cum purgantibus diagrydiatis curationem absolvit. Quibus suspectum est diagrydium, solus exhibeat mercurius dulcis, in pilulam efformatus, cum conserva rosarum, superhausta infusione scilicet, & rhab. additâ manû, & syrupo rosaceo.

Postea utiliter usurpantur aquæ acidulæ, & vitriolatæ.

Serviente dolore ad balneum, & laudanum

confugiendum est, cui aliquando purgantia misceri poterunt, sed majori dosi, quæ eorum vis retunditur a laudano: Galbanetum Paracelsi, quamvis calidum ad humorem discutendum idoneum est, si totus venter eo illinatur, illius descriptio supra proposita est.

Phlebotomia in hac colicæ specie aliquando convenit, cum metus est, ne caloris vehementia sanguis incalcescat, febrisque generetur. Si vero febris adfuerit, statim celebranda est.

Urgente admodum siti, aqua frigida exhibenda est, docente Galen. lib. 12. meth. cap. 7. ejusque usu testatur Amat. Lusit. se talem dolorem subito, incantamenti instar, sulsulisse, eadem se usum feliciter tum sumpta tum admotâ, testatur Septalius duabus historiis lib. 7. anmadversionum prædicarum descriptis.

Ad colici doloris, qui in paralyfin degenerat, curationem, alvo variis clysteribus solutâ, priusque viis cathartico apertis, demittatur æger in balneum tepidum, ex decocto emollientium paratum, bis, ter, quater, quinquies in die, ut acrimonia humoris temperetur, ac pori membranarum aperiuntur. Postero die cathartico accommodato humor ille purgetur. Deinde repetatur balneum. Idque alternis diebus faciendum, si vires ægri ferre queant, donec ex purgatis humoribus, & sedato dolore, æger in tuto sit.

Interim clysteres continuentur; præsertim qui ex lacte parantur, ad dolorem demulcendum utilissimi sunt, quibus cassia ol. violaceum, & liliorum admisceri poterunt.

Venter ol. chamamel. anethino, amygdal. dulc. lilior. cum butyro frequenter inungatur.

His feri lactis, & acidularum usus tandem subjiciatur.

Ac denique affectû in longitudinem abeunte, ea quæ in melancholicæ hypochondriacæ curatione relata sunt, hic aptari poterunt.

Neque omittenda est ab ipso morbi initio, phlebotomia, eaque purgationi præmittenda, ac sæpe iteranda, si sanguis prævâ qualitate infectus appareat, aut si dolor rheumatici particeps esse videatur.

Denique omnia remedia, quæ in colica biliosa proposita sunt, hic etiam aptari poterunt. Quibus non conferentibus, nonnulli Medici confugiunt ad potionem sequentem quam licet sordidam & delicatorum hominum ore indignam exhibent, & dolorem statim mitigare affirmant.

℞. Stercoris Equini ʒj. minutim dividatur, & infundatur in lbj. aquæ papav. rhæad. in qua spiritus vini guttæ viii. vel x. dissolutæ fuerint colentur cum expressione levi, & dividantur in tres doses satis amplas, sumendas horis exacerbationis doloris.

Si vero affectus in paralyfin degeneret, lenienda est spina dorsi, & partes paralytica balsamo resolvente, & nervos roborante, modo febris abfuerit. Si enim adsit, lana succida oleo, aut unguento digerente imbuta, partibus paralyticis alligatur, cavendo diligenter frigus, quo humor partibus impingitur, illiusque diffusio impeditur.

Galbanetum Paracelsi hic præcipue confert, si partibus prædictis, tum etiam umbilico admoveatur. *Lazar. Riverrum Prax. Med. lib. 10.*

Cum



de Belvoir accersiri me iussit, nullum non enematum genus, atque alia insuper remedia a Medicis Doctissimis, experientissimisque eo locorum degentibus praescripta iam tentaverat. Ego nullis usus ambagibus, repetitum narcoticorum usum ad normam jam traditam suasi, quorum ope prope diem convaleuit, & mecum ad urbem sanus rediit.

Quandoquidem autem dolor hic praeter ceteris quibusque ex sua natura recidivus sit, omnis rei revertendi ansa Anodyno bis quotidie ad aliquot dies exhibito praescindenda est. Quod si, quoties intermittitur Narcoticum, dolor subinde recrudescat (ut nonnunquam fit) nihil a me hactenus excogitari potuit quod ad persanandum aegrum ita certo faceret atque equitatio vel in curru vectio, quo longiora itinera confici debuere; Anodyno interim mane & sero indefinenter propinato; huiusmodi enim exercitiis materia morbum committens in corporis habitum deducitur, & sanguis perpetui agitatione comminutus de novo quasi depuratur, ipsaque denum intestina caloris nativi excitatione haud parum corroborantur ac resocillantur. Nec pudet fateri, me dicto exercitio in partes adiecto morbum hunc, cui alio quovis modo devincendo par non fui, plus semel penitus expulisse. Neque vero illud tentandum est, nisi post evacuationes debitas sufficienter celebratas, neque ab eo nisi post dies aliquamultos desistendum. Iamper quidam mihi vicinus, qui & adhuc est superstes, colica biliosa vehementissima per hos annos liberavit, quam cathartici, clysteribus; globulisque plumbeis devotatis expugnare diu sed frustra erat conatus. Hic ego ad frequentem Narcoticorum usum confugi, neque poenitenda opera, quamdiu enim ista repeterentur, satis recte habuit, sed cum his palli retur tantum malum, non extirparetur, (revertebatur enim ut primum erat exhausta Narcoticorum vis) ego hominis miseratus & gravi morbo, & re angusta afflictissimi, equum ex meis commodata, quo iter dicto jam modo peragendum aggrediretur, eoque ad dies pauculos continuo, viscera eas vires recipere, ut morbi reliquis excutiendis paria iam essent, & sine Anodynorum praesidio omnino convalesceret.

Et ut quod res est loquar, non in hoc tantum casu, sed in morbis aliis chronicis quam pluribus, hoc exercitii genus nunquam non cum uberrimo fructu usurpatum memini, modo quis in illo improbius perseveraret. Si enim nobiscum reputemus ventrem inferiorem, in quo disponuntur organa secretiora, hoc maxime exercitio vibrari, eaque succussionibus aliquot mille uno in die exagitari solere, facile credemus, eadem succum quemlibet recrementitium ibi impactum ope dicti exercitii posse excutere, & (quod majoris adhuc est momenti) validiori ista caloris nativi excitatione ita corroborari, ut munere quod iis mandavit natura in sanguine depurando recte desungantur.

Dieta si junior fuerit aeger, & calidioris temperamenti, refrigerantem atque incrassantem impero, puta hordei cremorem, Panatellam &c. & tertio quoque die si latret adhuc

stomachus, pullum teneriorem; merulamve pilcem coctum; Potum non alium concedo quam cerevisiam tenuem, mitemque, vel lac cum aqua coctum: neque ulterius quicquam indulgeo, nisi equitatio ad reintegrandam sanitatem necessaria, pleniorum victum & generosiorem postulet liquorem, quibus rependantur spirituum exercitio exhaustiendorum dimina.

Quinimo observatione constat, quod ubi hic morbus minus perite tractatus diutissime fatigaverit, ita ut viscera elanguescerent, atque aeger extrema jam macie atque debilitate tantum non esset confectus, in hoc inquam casu, liberalior sive aqua epidemica; sive narabilis, sive alius denum cujuscunque qua sanus maxime delectabatur, usus, hoc tempore eundem ultra spem omnem juverit, huius enim ope paucissima ista caloris nativi spirituumque reliquiae excitantur, & fermentum praeternaturale visceribus adhaerens, & novis paroxysmis fontem subinde ministrans, a liquoribus magis spirituosus extinguebatur.

Porro ut in morbi curatione, ita etiam & eodem jam depulso, diæta illa tenuis, de qua diximus, adhuc aliquamdiu est observanda; cum enim morbus hic recidivam praeter aliis omnibus affectet, atque insuper sedem sibi delegerit praecipua coctionis instrumenta (viscera intelligo, jam ab eodem infirmata) vel levissimum huius generis error malum haud leve contulit apportabit. Quocirca tam in hoc quam in ceteris omnibus viscerum affectibus cibi duriusculi, canes peius & angues vitandi, & qui conceduntur, ea tantum quantitate sumendi, quae ad vitam sustinendam possit sufficere.

Feminarum nonnullas vexat affectus hysterici species quaedam, colicam biliosam ita ad unguem referens, tam doloris acerbitate, quam litu, tum etiam humoribus coloris flavi, viridisque vomitu rejectis, ut mihi obiter tractanda veniat, ne a quopiam pro jam dicto morbo haec habeatur.

Quae habitu corporis laxo, crudoque sunt mulieres cum hoc malo praeter ceteris constrictantur, quaeque alio aliquo affectu hysterico jam pridem laboravere; aut (quod saepenumero heri solet) quae a partu difficili ac laborioso ob natum infantem grandiusculum, qui vires & naturam matronas nimis exhaustis, vix evasere. Regionem ventriculi; nonnunquam & partem inferiorem, dolor haud minor quam in passione colica, illacave primam obsidet, quem vomitiones sequuntur enormes, nunc viridis materiz, nunc vero flavae.

His accedit, (quod saepe observavi) major animi dejectio, desperatioque quam in morbo alio quocumque. Post diem unum alterumve facessit dolor, qui post paucas septimanas revertitur, nihilo lenius saviens quam antequam solveretur paroxysmus.

Iterum quandoque satis spectabilem, comitem sibi adsciscit, intra dies pauculos sponte evanescentem. Cessantibus jam symptomatibus omnibus, ubi aegra sibi satis valere videatur, levissima animi commotio, sive ab ira sive a dolore ea fuerit excitata (quibus hoc in casu promptissime afficiuntur foeminae) dolorem ferè revocat, quod etiam & de ambulatione, & de alio exercitio quolibet praeturae nimis susceptio dicitur.



dicendum est: cum ab huiusmodi causis eleventur vapores in habitu corporis laxo, atque imbecilliori. Vapores cum vulgo dico, cum live istiusmodi fiat, live convulsiones particularum partium, utrovis pariter modo solvantur. Hi vapores live convulsiones hæ, ubi hanc, illamve corporis regionem invaserint, pariunt symptomata, et quam invasere parti accommoda; ac proinde licet unum atque eundem ubique morbum faciant, plerumque tamen quibus miseri cruciantur atque simulant quod vel ex hoc liquet affectu, qui cum partes *Colo* adjacentes invaderit, *Colicam biliosam* ad amissim imitatur. Neque minus id patet in multis aliis corporis partibus eodem modo tactis; e. g. nonnunquam *Renum* alterum vehementissimo dolore afficit, unde vomitus immanis; atque etiam per ureteris ductum persapè delatus, calculum simulat, & cum ab enematis aliisque medicamentis Lithontripicis & calculo exturbando dicatis exasperatur, uno eodemque tenore diutissime affligit, subinde etiam (præter morem suum, cum per se omni vacet periculo) ægrum ad plures deducit. Visa insuper & symptomata ab eodem prognata quæ velicæ calculum omnino retenebant. Non ita diu est, à quo noctu excitabar, ut Comitibus mihi vicinis, dolore in velicæ regione admodum violento, & urinx suppressione iterè repente correptæ, consulerem: cum ego illam affectibus hystericiis variis obnoxiam certò scirem, atque ex eo augurarer non isto eum quem putabat, laborare morbo, enemata, quæ parabat ancilla, injici non poterat, ne ab eis cresceret morbus, at horum loco, atque embolientium verbi gratia Syr. de althæa &c. quæ adferebat Pharmacopola, Narcoticum exhibui, quod symptoma illud subito compescebat. Neque sane vel una aliqua pars corporis ab huiusmodi insultibus penitus eximitur, live interna ea fuerit, live externa, ut sunt fances, coxæ, crura, in quibus omnibus dolorem excitat intolerabilem, atque ubi discesserit, teneritudinem quandam quæ tangi recuset, relinquit, perinde ac si carnes multo verberæ fuerint emolite.

Quemadmodum autem quædam ad colicæ hysterice historiam pertinentia obiter tradidi, ne scilicet illa pro biliosa falso haberetur, ita & quædam etiam alia, quæ ad illam attinunt, ad symptomatis doloris, qui eam corrumpitur, curationem facientia: Curatio enim radicalis, quæ morbum subitæ causa tollit, alterius omnino est, & speculationis, & loci.

Ventæ sectio, & repetitæ purgationes, quæ in colica biliosa incipiente apertissime indicantur, hic locum non habent, nisi in casu infra dicendo. Docet enim experientia & exasperari dolorem, & invalescere symptomata alia omnia, à tumultu, quem illa cient, adjecta, atque adeo plus semel animadverti, enematum, vel lenissimorum repetitionem, continuam symptomatum seriem invexisse. Experientia etiam assipulabitur, quæ morbum hunc à spirituum potius atque inordinato motu, quam humorum vitio aliquo produci dicat, si expendamus nempe circumstantias illas, quibus ut plurimum originem suam debet. Huiusmodi sunt magnæ atque indebitæ sanguinis profusiones, motus animi uti etiam & cor-

poris violentiores, & alia id genus. Quæ omnia, remedia illa suadent proscribenda, à quibus major spirituum perturbatio possit excitari, atque eorum loco anodyna esse usurpanda, licet viridis ac pravus materiz vomitus rejectæ color contrarium indicare videatur: subtilior enim est atque minutior colorum speculatio, quam ut evacuationibus, quas ipso facto nocentes deprehendimus, auctoritatem conciliare valeat. Nullusque dubito, morbum hunc (qui licet acerbissimum dolorem, nullum tamen vitæ discrimen apportat) ob errores hoc nomine contrarios lethalem expeunero evadere. Adde, quod si quis emeticum vel fortissimum hodie propinaverit, ut scilicet eam, quam putat, morbi mineram exhauriat, ægra postero die materiam æque viridem aut pravi alterius coloris, atque erat prior illa, evomet.

Observandum est tamen, eam quandoque sanguinis atque humorum copiam reperiri, quæ narcotici operationi eo utque obstat, ut quamlibet sæpius repetatur, orgasmum tamen cohibere nequeat, nisi secta prius ægra venæ, aut alvo subducta; quod in feminis temperamenti magis sanguinei atque viraginibus mihi subit notare. Si ita res se habeat, vel Phlebotomia, vel catharsis, fortè etiam utraque Anodyno via aperienda est. Celebrata enim harum utraque, narcoticum, quod prius summa licet dosi exhibitum, nihil quicquam profecit, jam etiam in mediocri dosi, effectum obtinebit, cui destinabatur. Raro autem hoc contingit, neque tum reiteranda sunt hæc remedia. Quibus præmissis, ubi opus his fuerit, in anodynis ea methodo, quam in colica biliosa proposuimus, exhibendis progrediendum est, quæ crebrius, parciusve sunt ingerenda pro doloris recedentis ratione. Quæ quidem methodus præsens atque mutans venementissimi doloris symptoma tantum respicit, cum non hic loci illam, quæ morbi causa occurritur, tractandum in me receperim.

Cum vero hic morbus tam in hypochondriacis, quam hystericiis (nam utrobique ut alio loco dicitur, par est ratio) sæpius in ictero delinere soleat, atque isdem passibus, qui us hic ingreditur, ille se propriat, observandum occurrit, quod in hac icteri specie curanda cathartica omnia, vel omnino omittenda, vel si adhibenda fuerint, rhubarbò solum, vel leni quovis medicamento utendum. Etenim metuedum, ne a catharsi novi tumultus creantur, ac proinde symptomata omnia postlimino recurrant. In hoc itaque casu nihil omnino agendum, cum icterus hinc occasione originem debens, sensim sponte sua faceat, ac tandem brevi temporis spatio penitus evanescat: sin autem icterus longas moras necet, atque non mihi ægre discedere videatur, ad remedia contugendum. Hoc uti soleo.

℞. Rad. rub. tinctor. & curcumæ an. ʒi. chelidon. major. cum toto & summat. centaur. min. an. M. ʒ. coq. in æqualibus partibus vini Rhen. ni & equæ font. ad ℥ij. colatura dissolve syrup. de quinque radicibus ʒij. m. f. apozema, & fiat ℥ij. calide mane & sero usque dum convalescit. At ubi icterus per se invadit, colicæ neutrquam prægressa, omnino oportet



oportet, ut præter alterantia jam dicta, etiam cholagoga, 1. e. quæ per alvum bilem subducunt, ægro exhibeantur, nempe semel vel bis antequam aggrediatur usum præscripti Apoze-matis, & postea semel singulis septimanis du-rante ejusdem usu; ut

℞. Electuar. e succo rolar. ʒij. Rhabarb. subtiliss. pulv. ʒss. Cremor. tartari ʒj. cum s. q. Syr. cichor. cum Rheo. f. Bolus. sumat summo mane superbibendo vini Rhenani haustulum. At si vel his diu continuatis morbus adhuc ob-stiterit, ad aquas ferreas, quales sunt istæ Tun-brigenses abeundum, quæ ex ipso fonte bibendæ sunt singulis matutinis dum convalescit. *Thom. Sydenham de morbis acutis scilicet. 4.*

In omni colica quacunque sit servetur alvus aperta semper, quantum fieri potest & hinc Anodynus sedetur dolor.

Observeetur 1. si est à materia in intestinis contenta, tunc imprimis est acidum tempe-randum, viscidum incidendum, & evacuan-dum, & flatulentum dissipandum.

Observeetur 3. si vero est colica convulsiva propinanda appropriata nervina imprimis salia volatilia opiatia mista, & hinc primarius mor-bus curandus.

His scopis ut satisfaciamus, dum 1. debet servari alvus aperta.

Observeetur quod in principio Colicæ pur-gantia non conveniant, quatenus talia, si verò debent usurpari, sint lenia & opiatia mista.

Cum enim in colica sæpius periculosus adsit vomitus, metus est ne ita purgantibus irrites crabrones & ex colica contumacem ileum pro-ducas.

In progressu verò morbi attenuata viscida materia & temperata ejusdem acrimonia blan-de subducentia conveniunt.

Deinde si ex inflammatione est colica, Me-dicus caveat, ne ullo quatuorvis leni medi-camento subducente utatur, ex irritatione enim intestinorum, inflammationem auget, & hinc volvuli seu ilei metum infert.

Observeetur 2. Opiata in principio appropria-tis mista sunt optima; frequentius tamen in usum duci possunt, ubi materia morbifica sit acrior, minus verò ubi eadem sit viscidior.

Nam opiatia acrimoniam temperant, viscidæ verò materiæ motum ulterius impediunt, qua-tenus motum intestinorum inhibent.

Denique si quando opiatia utendum, non sunt differenda eo usque, donec vires vitales jam collabascunt, ægerque non longè sit ab in-teritu: tali enim in casu non raro solet vita dor-miendo finire.

Observeetur 3. Clysteres in omni dolore co-lico conveniunt, magis tamen quando malum hæret in intestinis crassis, minus quando in te-nuibus.

Deinde ubi non sumus certi materiam pec-cantem hære in crassis intestinis, minus con-veniunt purgantia clysteribus admista, propter metum volvuli. Ubi verò sumus certi, quem-admodum in dolore Hypochondriaco commu-niter hærent in colo, tunc fortioribus purgan-tibus seu stimulantibus per clysmata eadem evacuare convenit.

Quod si videmus clysteribus malum non mi-gigari, iis ulterius insistendum non est, sed præ-

sumendum vitium hære in intestinis superio-ribus.

Hoc ergo in casu quando adest morbi sedes in intestinis superioribus conveniunt potius blandissima per os laxantia & abstergentia: quod confirmat experientia D. MOEBII in in-fante colicâ laborante, cui Medicus quidam aliquot clysteres applicandos curavit, sed sine fructu: tandem Moëbius advocatus laxantia blandissima per os adhibuit, quod ex voto ces-sit & infans brevi convaleuit. *Vide Colleg. Moëbii in synopsis. cap. de colica.*

Ea quæ propinquantur in Colica internæ, & qui-dem ubi materia est in intestinis sunt aromati-ca. Hæc enim sola satisfaciunt scopo, ratione salis volatilis, temperant acidum, incidunt vis-cosum, & discutunt flatulentum.

In colica vero convulsiva conveniunt ea quæ mulieribus in passionibus hysteriis propinan-tur imprimis volatilia salina, item ex Calloreo cum opiatia mista.

Videamus hæc ordine 1. Clysmata in colica stercoraria aut à pituita viscidiora nunquam obliviscatur Medicus salis gemmæ. Nam hoc est expertissimum ad resolvenda stercora & mu-cilagines crassas. Elegans est de hoc observatio FOREST. lib. 11. observ. 5.

Dabo exemplum Clysmatis injiciendi in tali casu, ubi materia hæret in crassis intestinis.

℞. Herb. malv. m. ij. Radic. lilior. alb. ʒss. Flor. sambuc. Verbasc. ana mß. (sunt anodynæ) coqu. in Aqu. simplic. s. q. colat. ʒ viii. add. Electuar. Hieræ picr. ʒss. ad ʒvi. (stimulat. & est aloëticum) salis gemm. ʒ ij. ad ʒj. Vitell. ov. n. ij. Misc. Ubi adsunt flatu loca sal. gem. potius ol. destill. addenda, quæ potenter pene-trant, & flatu discutiant. h. m.

℞. Rad. Angel. l. levissic. ʒvi. flor. chamom. roman mß. (aut commun sunt basis.) folior. laur. p. ij. sem. quat. calid. minor. ana ʒij. coq. in aq. comm. s. q. colat. ʒx. add. Elect. de bacc. laur. ʒvi. ol. destilli. Angelic. cumm. carui. Lauri. ana gt. iij. l. iv. Symp. papav. ʒss. vel The-riac. ʒj. ad ʒij. Vitell. ovor. n. j. Misc. pro Clysmate

Pro duabus dosibus injiciendo propter fla-tus, qui impediunt quominus totus possit injici.

RULANDUS seu expertum clysmata laudat in dolore colico. & iliaco sequens.

℞. Decoct. Thapsi barbat. flor. chamom. ana ʒvii. ol. chamom. ʒv. Vitell. ov. n. j. salis ʒj. sacchar. rubr. ʒss. benedict. laxativ. ʒj. Dia-gryd. gr. vii. Misc. pro Clysmate. (incondita est compositio.)

Commendat usum hujus Clysteris tanquam sibi sæpius expertum.

Quod si certum sit hære in intestinis infe-rioribus malum quod tamen nulli vult cedere remedio; tunc ad infusionem antem Clysteri-bus admiscendam felici cum successu accedunt practici. Videatis hæc in parte River qui sæpius usurpat Aqu. benedictam, aqu. infusionis croci metallorum in alemb. vitr. paratam & ad ʒij. vel iv. miscet has cum clysteribus, nunc cum emollientibus in cent. 1. observat. 58. & 67. videbitis exempl. 1c. (cent. 2. observ. 12. & cent. 3. observ. 12.)

Imitatur hæc in parte RULANDUM, qui ipsi hic est antecessor, qui & ipse solet in Enemate dissolvere aq. benedict. hac forma.



2. Juris Pisorum § viii. (egregiè abstergit) sacch. §ß. Aq. benedict. 3iß. ol. commun. 3iv. Misc. Injiciatur calidè quavis hora doloris rebrudecentis: insigniter commendat hunc clysterem & quidem in contumacissima alvi obstructione, in dolore iliaco & colico. Simile exemplum habet idem in contumacissima alia obstructione in puerperâ quæ per 20. dies nihil excreverat, etiam stercorea per os exibant, curata hoc clysmate in quo loco aq. benedict. addidit extractum esulæ.

2. Jur. pisor. 1b j. ol. sem. lini 3iv. Extract. esulæ 3j. Misc. quo injecto alvique excrementis copiosis rejectis curata fuit ista puerpera.

Superius in dysenteria dedi exempla clysmatum therebinthinæstorum, quæ similiter conveniunt in colicis, præprimis ubi adest suspicio affectuum uterinorum vel etiam renalium, aut in alio casu clysteres therebinthinatos admodum laudat DEODARUS in valetud. p. 247. qui etiam in colica flatulenta hoc clysmâ præscribit.

2. Fol. Mercurial. chamom. Bet. ana m.ß. Absinth. Rut. Laur. ana m. f. sem. cummin. Baccar. Laur. ana 3ij. Hæc decoctio in aqua com. & vini malv. t. ana 1bß. (ingredientia sunt nimis copiosa pro 1bß. potest faciliè emendari) ol. nucis expressi 3iv. castorei 3ß. Therebinth. 3ß. Misc. pro clysmâ in affectibus renalibus & uterinis, aliàs etiam clysteres ex lacte tanquam insigniter emollientes injiciuntur. Sunt qui ceu singulare clysmâ laudantes commendant decoctum veronicæ cum vino & myrrha quibus B.D. LAVGUS addit sal. tart. 3ß. ad 3j. aut tinct. Tartar. 3ij.

Clysteres ex fumo Tabaci sunt præstantissimi, id videre potestis in BARTHOL. cent. 6. Epist. pag. 53. instrumentum verò quo commodè potest sibi applicare unusquisque tale clysmâ habet Cent. ultima historiæ anatomicæ.

Uterius ubi sunt nimii status in intestinis, ibi præ cæteris conveniunt clysmata ex urina pueri, quæ mira faciunt in affectibus flatulentis. Si scilicet recipiatur urina pueri inpuberi & ipsi addatur peritum fermenti, ipsique postmodum incoquantur semina anisi, fœniculi, anethi & colatur. § viii. vel ix. additis mellis de spumat. 3j. sicque injiciuntur, insigniter confert in affectibus flatulentis.

Quæ alia sunt usitata clysmata carminantia & emollientia, studio prætereo.

Quod attinet interna ea sunt varia, & subinde varianda, usitata tantum proponam.

Herba veronicæ ceu singulare specificum laudatur, cui tamen non cedit chamomilla in specie Romana. Nam chamom. sive aqu. sive decoctum specificè commendatur à Gabelhover cent. 1. cur. 10. imprimis ol. saphyrium quod est præsentissimum carminativum, & anodynum. Veronica multum probatur cum vino & myrrha decocta & ejus decoctum assumptum. Porro species est Hormini quam vocant Delaream, quæ solent adulterare vinum nostrates, ut fiat moscatellium & odoris penetrantis & tetri, si quid tamen aliud vegetabile, est miraculosum quod facit, in colica virorum & suffocatione mulierum uterina; sive decoctum usurpetur, sive exinde parata essentia aut succus in conveniente vehiculo adhibeatur, mira præstat imprimis in suffocatione uterina mulierum in arcanis habenda.

Radix allii jam a GALENO temporibus laudatur. Notum enim est exemplum de rustico esu allii se curante, quod ex GALENO habet SCHENCK. & ZAC. Lusit. de Medic. princip. hist. lib. 2. hist. 93. Ad hujus imitationem commendatur jusculum ex allio & ol. olivarum (nec sine ratione) hoc ol. enim laxat intestina, (alium humorum acrimoniam temperat) quæ calide hauriantur cum parte dimidia vini, & hanc misuram ceu sæpius expertam commendat BURELLUS Cent. 4. Observ. 92.

In corticibus aurantium non est vis vulgaris anticolica, & certe essentia cortic. aurantium legitime parata, aut saltem ejus pulv. usurpatus, aut Eleosacharam ex ol. corticum aurantium sunt egregia remedia in affectibus colicis. Mirum est quam potenter acida quæcumque temperentur a corticibus aurantium. ob id etiam quod obiter moneo in stranguria ab acido conveniunt.

Helenium ejusque radix, absinthium, & similia alia nota.

Helenium cum vino ceu singulare experimentum laudatur. Et postmodum absinthium convenit iis imprimis, qui peregrinationibus dediti, colicis doloribus vexantur, sive decoquantur, sive minutim dissectum cum saccharo misceatur & capiatur. Ob id MINDERERUS in Medic. milit. commendat vinum decoctionis absinthii vel radices Helenii cum corticibus aurantium. calidissimè potum addito pauculo Theriacæ vel mithridati.

Semina quatuor calida minora in vino ebullita & ita hausta rectè dicuntur ab HELMONTIO solamen pauperum, virtus consistit in eo, quod nempe corruptionem & aciditatem inhibendo faciunt egregium solamen intestinis §. 75. in tr. de flatibus.

Semina hæc decocta in vino & hausta à STOKERO commendantur.

Usitata etiam est aq. flor. chamom. veronicæ, cin mom. menth. aqu. spirituos. compolitæ aq. carminativ. DORNCRELL. N.B. Aq. theriacalis camphorata, it. syrupus corticum aurantium, de papavere, ubi dolor adest. Syrupus de Althæa Ferneli, ubi emolliendum, & acrimoniam temperanda.

Restant quædam de Materia medica in cura colicæ necessaria, & quidem.

Castoreum est similiter medicamentum admodum egregium in colica, non tantum in ea ubi adsunt status, quos potenter discutit, aut ubi adest pituita viscida, acida quam temperat, sed etiam in colica convulsiva, ubi notum est quod sit egregium. In suffocatione uterina quæ revera est colica convulsiva: it. in doloribus scorbuticis convulsivis egregium quoque est Castoreum, sive per se, sive mistum cum aliis in colica convulsiva permisceatur cum salibus volat. in spec. cum sal. volat. succini cui addatur unum l. alterum gr. opii sit egregium medicamentum.

Dabo exemplum in colica convulsiva seu suffocatione uterina.

2. Castorei 3j. sal. vol. succin. titè præp. gr. v. (nam in succino multa latent arcana contra convulsiones & epilepsiam) Laudan. opiat. gr. 15. ad 1. Misc. f. pulvis.

Unde Castoreum ad 3ij. propinat JOEL in sua præxi, si colica sit orta, uti dicit à causa frigidi in



in aliis tamen etiam convenit. Et *Solenand.* commendat *Castoreum* clysteribus additum; sc. aliquot gr. ejusdem in vino dissoluta infunduntur loco clysteris in colica. vid. *ejus* sect. 3. consil. 28.

Item *Essent. Castorei* hic convenit: quo facit *essent. anonyma* b. D. *Langii*. facta ex castoreo, & Asa foetida, cum spir. vini tartarizato, quæ essent. anonym. & in colica & in passionibus histericis, id est, colicis convulsivis, & in stranguuriis, & in præcavendis variolis & morbillis est egregia.

*Extractum Castorei* commiscetur commode cum extract. theriac. quod habet vim opiatam; & sic cum ol. succini hanc pilulæ anticolicæ.

Porro sulphur ejusque flores valde commendantur in colica si scil. a ʒʒ. ad ʒj. propinentur, & sanè expertissimum sunt remedium flores sulphuris: Vidi Romæ effectum egregium in comite, colicâ pertinaci laborante, qui aliis irritis per ʒʒ. flor. sulphur. fuit curatus. Propinantur commode in vino calido.

Termscentur sulphur & ejus flores convenienter cum *Eleosacharis carminativis* factis ex ol. destill. corticum aurantior, anisi, Zedoariæ & sinakibus quibus imprægnatur saccharum v. gr.

ʒʒ. Flor. sulphur. ʒj. ad ʒʒ. Eleosach. anisi Zedoar. ana gr. viii. Laudan. opiat. gr. j. Muc. F. pulv. Dolor sedans flores sulphuris sunt egregii, vobis ergo sint recommendati.

De aromaticis res est nota, quod eorum sal volatile oleosum insigniter conveniat in colicis torminosis: præ cæteris eminet inter Aromata *Galanga* abas egregium uterinum, Zedoaria, cinnamomum, nux moschat. & caryophilli, & hinc ex his paratæ species sic dictæ in dispensatorius: nempe species diacumini, diacalamintar, diammi, diagalangæ, diatrion pipereon, & tandem species diasulphuris *Mysichii*. Item pulvis factus ex Tenellis cornibus cervi, cum myrrha & pipere, commendatur a *Sennerto* cap. de colica.

Ut & pulvis ex mandibulis Lucii piscis, oculis 69. & similibus acidum absorbentibus similiter laudatur. Pertinet huc pulvis *Schalleri* ad colicam, compositio hæc est.

ʒʒ. Cortic. aurant. pulver. ʒʒ. dent. inferior. auratæ, oculor. cancr. Dent. Lucii pisc. Succin. præp. Talor. lepor. Zedoar. ana ʒij. Misc. F. pulvis: M. dos. a ʒʒ. ad ʒij. Meliorari possit hic pulvis additione flor. sulphur. & irrotatione cum ol. carminantibus.

Porro essentia s. extracta, itidem sunt egregia. Nempe essent. s. tinct. Zedoar. Essent. s. tinctur. Corticem aurant. facta imprimis cum spirit. chamomill. Romanæ. Extract. calami aromatici, cortic. aurant. & denique extract. specificum colicum *Mysichii*. Est elegans compositio (utur quædam adsint ingredientia non multi pretii.)

De Theriaca, Mitridatio res est nota, quod ad ʒj. in vino propinata, ubi aperta prius fuerit alvus, sint egregia remedia, idque ratione Laudani opiat: nam laudanum opiatum est generale, & universale remedium & anodynum.

Cæterum notum est varias esse opii præparationes, e quibus omnibus duas vobis commendo (in praxi enim sæpissime adhibenduntur venit opium) quæ semel pro semper notentur.

Est secundum modum *Helmontii*, fermentando

cum succo cydoniorum, idque tribus vicibus, postmodum cum spiritu vini, aut in forma liquida, essentia, aut sicca, extractum: potest adhiberi, uti didici ab amico, qui hunc modum ab *Helmontio* juniore habuit communicatum. Videri etiam potest hic modus in *Barthol.* cui a *Langelot.* fuit communicatum in *Epist. cent. 3. Epist. 45. p. 188.* Præparatio est sequens in *Bartholino*.

Vidi id sane non sine inigni voluptate cum una cum appropriato succo corrigente succo cydoniorum levi calore ad fermentandum exposuissim. Exspirabat primo volatile illud sulphur fatidum, cerebro, cordique adeo infestum; si quis eo propior factus id copiosius cum aere hauserit: Ego tunc cum meo ipsum damno expertus sum, cum prima vice pararem. Cautior deinde factus elegi locum aëri maxime pervium. Colligitur dein sensim, sensimque reliquum quod ment impurius substantia: atque ea quæ levis spumolique est superiorem, ea vero quæ crassa & terrestris est, imum occupat locum, utraque in magna quantitate ea tamen imprimis quæ inferiora petit; Mirum quam puri parum adit. Eri liquor perlucidus, rubrum intar rutilans medio contentus loco, qui a doctis accurate separatus, balneoque vaporis. d. ipsius extracti consistentiam, redactus, circulator tandem per unum aut alterum mensem cum alcoole vini, ut quod crudi reliquum est, excoquatur, adque debitam maturitatem deducatur, &c.

Usus ejus est amplissimus, atque extendit se ad omne ferme morborum genus. Exceptis soporosis, vel naturam motu inordinato peccantem sedando, viribus defectam reficiendo, doloribus & vigiliis consumptam placidissimâ quiete resocillando, vel humores nimium effervescentes compefcendo, vel spiritus paulo concitiores ad temperiem reducendo.

Adjungo ut plurimum appropriata cuque membro remedia, inque magnis ardoribus flores nitri, nitrum perlatum, sal. Ducis Holfatiæ: sequenti tamen compositione familiarissime utor.

ʒʒ. Pulv. diacherm. Aug. Sala ʒij. sal. Ducis Holfat. cum aur. par. flor. nitri. ana ʒʒ. Essent. opii nostræ gr. ʒ4. Misc. optime. dos. est gr. xv. xvii. xx. pro adulto, quam dimidium tantum granum essentia opii ingreditur, et ro enim ad gr. j. aut ʒʒ. ascendo, & nisi in magnis doloribus & vigiliis, &c.

Hæc sunt verba *D. J. Langelot.* & desumpta ex *Bartholin. Epist. cit. loc.*

*Angli* in frequenti usu habent illud laudanum opiatum *Helmontianum*. Nec potuerunt mihi satis decantare singularissimas ejus virtutes. Vide *Bartholin. cit. loc.*

Vix inferior priori est correctio opii beneficio salis tartari: Nam sal tartari ut obiter moueam corrigat & omnia purgantia & præ primis etiam corrigat opium: siue addatur insimul vinum; siue quod melius est addatur spirit. therebint. & est laudanum multarum virium a quibusdam in secretis habitum. Hæc sunt duæ singularissimæ opii præparationes quas semel prosemper ne prolixus videar, commendo.

Multa sane prostant in Medicina cum opio, adeo ut *Sylvius* dicat, se malle non esse medicum, quam carere Laudano opiato.



Porro Spir. anticolicus est summum *Hartm.* Arcanum & ultimum refugium, quem ipse describit in praxi chymiatrica. Fit ex parte 1. spir. nitr. & part. 3. spirit. vini, omnibus benere-tificatis: & sane hic spiritus est egregius in quocunque flatulento casu adeo ut etiam in Tympanitide suum faciat egregie officium.

Modus præparandi est, si spiritus dicti in quantitate notata misceantur, mitti in Balneo digerantur, digesti duabus vel tribus vicibus, cohobentur, donec perfectissime uniantur, & sic fit Spir. anticolicus à 3ß. ad 3j. in appro-priato vehiculo propinandus.

Vehiculum appropriatum est imprimis deco-ctum radicis Helenii, vel decoctum priapi tauri.

Loco spiritus vini vulgaris melius sumitur spir. appropriatus v.g. sp. chamom. per fermenta-tionem paratus, aut idem spir. infusus specie-bus carminantibus digestus, & tandem in bal-neo aliquoties cohobatus, sic enim rapit secum particulas carminantium aromaticas per alem-bicum, idest salinas volat. oleosas & ita cum spirit. nitr. junctus fit efficacior & melior.

De spiritu carminativo ex nitr. tart. & spir. vini superius locutus sum ubi de cardialgia.

Spiritus Itidem Therebinthinæ commenda-tur ab *Hartmanno* qui abstergit egregie intesti-na, ut nihil remaneat.

Unde quidam commendant hoc remedium ad colicam.

℞. Spirit. therebinth. juniper au. infundantur cum Floribus Hyperic. digere per diem & no-ctem, exprime & ita cum floribus novis per-ge, quod erit liquor rubicundus cujus dos. 3j. in brodio sumptus in colica est expertissimus.

(Unum adhuc observa de perforata, idest, Hyperico, si sc. digeratur in spir. vini per mens. supernabit ejus ol. in usu chirurgico externo & Medico interno pretiosissimum. Sapiienti sat.)

Denique olea destillata carminantia similiter egregie commendantur: qualia sunt Carui, cumini, anisi, fœniculi, caryophyll. lauri, cortic. aurant. angelic. succini, macis, Zedoariæ, men-thar, quod insigniter commendat *Thomnerus*; cum his oleis possunt fieri Eleosacchara, uti antea monui.

Hinc *Panarolius pentec. 2. observ. 8.* ceu sæpius expertum remedium ad dolorem ex causa frigi-da in colica commendat ol. baccar. lauri aut ol. ex corticibus aurant. per expressionem para-tum cum vino (potius est succus expressus) quo bibito ægri per breve tempus sedato do-lore somnum capientes convaluerunt.

Porro sordes aurium humanarum pro præ-santissimo auxilio in colica similiter commen-dantur.

Pulvis testiculorum Equi ad 3j. cum pulv. sem. anisi experimentum est *Fonsec.* anticoli-cum in lib. 1. consil. 57. (fuit archiater Papæ) Qui pulvis testiculorum equinorum in aqu. lilior. convallium cum croco exhibitus; & fuit re-medium Polychreston Anticolicum *Zwelferl.*

Pudendum s. Priapus tauri experimento egre-gio comprobatum est à *Zac. Lusitan.* lib. 2. prax. admirand. *Observ. 24.* in colica quam cu-rat & præservat. dos. ad 3j. in vino malvatico.

Similiter commendat Pudendum cervi *Bar-tholin.* cent. 6. hist. 50.

Fuligo pulverisata cum acet. destill. mista & bibita calide, statim dolorem pellere dicitur, similiter etiam spir. fuliginis aliquando felici cum successu fuit propinatus.

Sacharum saturn. in colica à nimio acido remedium est singulare si ad gr. iij. vel iv. cum aliis propinetur.

In saccharo saturn. magna vis medica later.

Denique stercorea animalium sunt remedia aliis omnibus si non anteferenda saltem, tamen æquiparanda.

Præ cæteris stercus equinum recens: hujus succus cum liquore appropriato expressus tan-tum non præsentaneum est remedium colicæ: habita tamen si fieri potest ratione sexus, ita ut succus ex equo propinetur masculo, ex equa vero femina.

Loco hujus stercus Carti exsiccatum in aëre in vino resolutum & edulcoratum, hinc perco-latum aliquando magnatam aulicum restituit.

De stercore lupi res est apud omnes decan-tata: præ cæteris totus est in commendando, *Panaroll.* pentec. 3. obser. 36. Item *Forest.* lib. 21. observ. 13. Item in *observ. River.* & tantum non apud omnes autores in magnis laudibus versantur stercus & intestina lupi. Hinc etiam aq. destill. ex stercore, Bovis junioris ad 3j. propinata laudatur.

In colica ubi metus est Paresis, in tali casu salia volatilia propinata expectato sudore ju-vant, certo præ cæteris convenit sal. volat. uri-næ quod & præservat, & curat Paresin expe-ctato sudore.

Spir. tart. volat. legitime paratus (quo volatilior eo melior, variz sunt ejus præparaciones fe-lix est qui optimam habet) est excellens reme-dium pro curanda Paresi per sudorem. Obi-ter moneo. Ex facibus vini fit volatilior spir. quam ex ipso tartaro modo recte destilletur; & super caput mortuum rectificetur.

Deinde necesse est ut alvus clausa etiam per inferiora aperiatur in quo casu raro fortiora Purgantia, quin tantum Lenia aut emollientia, aut abstergentia conveniunt. Sin verò necessum sit propinentur Purgantia paulò fortiora, iis commode permiscetur Laudanum opiatum.

Veteribus nonnullis in specie Helidæo Pa-duano hoc fuit usitatum, qui Helidæus propi-navit in colicis doloribus Electuar. diaphæni-con. à 3v. ad 3vi. *Philon. Romani.* 3j. quod la-xat, doloremque sedat.

Cæterum nostra delicatula rostra non perfe-runt hos bolos s. Electuaria: propterea conve-niunt potius Pilulæ ad imitationem *Riverii* præ-scribendæ: qui cent. 2. observat. 1. & cent. 1. Obs. 63. has imprimis commendat pilulas.

℞. Aloës optim 3j. Diagryd. gr. viij. Lau-dan. opiat. gr. iij. f. v. vel sex pilul. misc. f. l. a. (satis forte non ita præscriberem.)

Similes pilulas cum laudano permistas vide-bitis apud *Porterum* cent. 3. cap. 27.

Pertinent huc pilulæ *Stockeri*, quibus ut ipse scribit cum summo suo honore ducem Tar-tariæ curavit in colica.

℞. Aloës succotrinæ. Pilular. Aloë. phangi-nar. 3j. opii, croci an. gr. ij. (pro croco po-test sumi castoreum) misc. F. pilul.

Exhibeantur stomacho jejuno: dolorem enim post horam sedant & postmodum solvunt,



ac faciunt uti dicit operationem. Si velis ut potentius operentur gr. ij. l. ij. scan mon. essent addenda.

Verum perfecta purgantia non semper in colica conveniunt, quin lenissima plura præstant quam fortissima. Hinc noto usitatam esse Mannam ab ʒj. ad ʒij. cum ʒij. ol. amygdal. dulcium propinari cum jusculo gallinæ pingui, commendat hanc misturam River. prax. l. 10. c. 8.

Singulare experimentum Cratonis ad solvendam alvum & sedandos dolores colicos est ol. amygd. dulc. cum vino malvatico & ʒʒ. spermatis ceti.

Plateri potio ad dolorem colicum in principio propinanda ex simili leniente & emolliente procedit; hæc est præscriptio.

℞. Ol. amygdal. dulc. ʒi ʒ. Vini malvatic. ʒʒ. Sirupi de papav. ʒʒ. Misc. f. potio. Vide *Observationes Plateri*: Nam & ol. amygdal. dulcium in jusculo calido propinatum subito sedat tormina intantum.

In declinatione morbi ubi adhuc hæret pituita viscidæ ac nitreæ commode usurpatur mercur. dulc. qui hanc ipsam potenter abstergit.

Imitandus hæc in parte Deodatus qui has præscribere solet pilulas:

℞. Mist. pilul. Cochlear. minor. ʒj. Aquil. albæ dulcis f. Mercur. dulc. gr. xvi. ad xx. ol. anisi gut. ij. Misc. f. pilul. mane deglutientur (inepta est compositio possunt & alia.) Mercur. dulcis est egregium medicamentum, & videbitis in *obs.* River. sæpius fieri mentionem Chalometani Turquenti qui nil aliud est quam merc. subl. dulc. additis tantum aliquot gr. nis scammonii in hac proportione v. gr.

℞. Mercur. sublim. dulcis gr. 25. Scammon. gr. x. fiant cum Mucilage Tragacanthi. l. 2. Pilulæ. Sed hæc obiter. Denique subsequuntur externa, quæ abdomini applicantur ad compescendos dolores colicos iliacos: quæ inter sunt notissima ol. externe inungenda: Ol. aneth. chamomill. rutæ, amygdal. dulcium. Item ol. destill. quæ intus sumuntur, possunt etiam externe applicari.

Oleum laurinum ad ʒʒ. cum ʒj. Castorei permixtum; non est inconveniens umbilico inunctum.

Sacculi & fomenta carminantia sunt nota.

*Galbanum* præ primis convenit tam in omni colica, quam imprimis colica convulsiva: nade etiam est egregium Hystericum.

In omni colica in specie convulsiva, in affectibus hystericis applicatur umbilico.

Huc pertinet *Galbanetum* Paracelsi de quo vid. Schrod. quod est elegans & expertissimum in colicâ quacunque.

Verum loco hujus etiam ol. Succini umbilico illitum est egregium. Vel *Galbanum* dissolvitur in spirit. vini non adeo dephlegmato, & additur *Castoreum* & ita fit unguentum tenue.

Emplastrum ex gummi Tacamahaca & Caranna est egregium.

Alias usitatum etiam est Emplastrum ex bacis lauri Item Emplastrum

De Meliloto cum ol. chamomill. malaxatum; & ita *Stercus suillum* tanquam Emplastrum calide applicatum laudatur à Rulando.

*Cataplasma* verò ex stercore equino cum ol. rutaceo experimentum est Joelis & Amati Lusit.

Paracelsi remedium externum est ol. nuc. moch. & macis cum Zibetho junctum & umbilico inunctum.

Hæc sufficiant de colica, & passionibus colicis. *Michael Eismüller. colleg. practici part. 1.*

Si excrementa indurata, vel humores crassi, acres, biliosi, fermentantes, agglutinati & pituitosi in causa sunt, per iteratam enematum applicationem, rite detrahantur.

Ut ℞. Herb. calamenth. rutæ an. m. j. fol. althææ, flor. chamomillæ, summitat. anethi an. M. ʒ. Bacc. lauri sem. cumini, carui an. ʒʒ. lini, fenugreci an. ʒij. coquantur in aqua simplici & colaturæ ʒ xii. adde confect. hamech. ʒʒ. o. anethi, rutæ an. ʒʒ. sal. gemmæ ʒj. misc. f. enema. in India.

℞. Herb. calaminth. fol. cinnamom. marubii, ocymi, rutæ, malv. arboresc. an. M. ʒ. baccar. cinnamom. sem. anisi Chinesis an. ʒj. coq. in aqua fol. cinnamom. & colatur. ʒ xiv. adde pulp. cassiæ, sacchar. rubr. an. ʒʒ. sal. commun. nitri an. ʒj. ol. coct. fol. cinnamom. rutæ ana ʒʒ. Misc. f. enema.

Urgentia debent esse hujusmodi.

℞. Pulp. prunor. ʒʒ. resin. jalapp. gr. xii. crem. tartari gr. v. tinct. succin. ʒj. ol. aurant. gut. iij. misc. f. bolus.

Vel ℞. Resin. scammon. jalapp. an. gr. vj. mag. succini ʒj. tartari vitriolati gr. iv. ol. st. myrrhæ gut. iij. Misc. f. pilul. nu. v. vesperi deglutientur. Ad dolores simul leniendos.

℞. Resin. jalapp. gr. xii. Mag. succini gr. v. laudan. aromatic. gr. ij. extr. carminativi ʒij. Misc. f. bolus.

Vel ℞. Resin. Mechoacami. gr. viii. Extr. agarici ʒj. carminativ. ʒij. Tinctur. succin. ʒj. Misc. f. bolus.

Inflammatione causam reddente.

℞. Elect. de succo Rosar. ʒj. Pulp. Tamarind. ʒʒ. Tartari vitriolati nostr. ʒʒ. salis essent. tartari gr. x. misc. f. conditum.

In India. ℞. Pulp. Tamarindor. Cassiæ Prunor. an. ʒʒ. Res. Turbith. gr. xii. salis cinnamom. ʒʒ. ol. st. fol. cinnamom. gut. iij. Misc. f. bolus.

Vel ℞. Pulp. Cassiæ ʒʒ. Extr. sennæ ʒj. Resin. Turbith. gr. viii. sal. Cinnamom. ʒʒ. ol. cinnamom. gut. ij. Misc. f. Bolus.

Carminativa anodyna & effervescentiam corrigentia medicamenta sunt talia.

℞. Extr. Carminativi ʒij. Tinct. succin. ʒj. Aq. carminativæ ʒij. Misc.

Vel ℞. Aq. Carminativæ ʒij. extr. laudani aromat. gr. ʒ. Tinct. Tartari, succini an. gut. xv. Misc.

℞. Extr. Carminativi ʒij. Tinct. Tartari, succini an. ʒj. spir. tartari ʒʒ. Aq. carminativæ ʒij. Misc.

Vel ℞. Spir. Carminativ. ʒii. Nitri, tartari an. ʒʒ. Tinctur. succini, Cinnamom. Castorei an. ʒj. Aqu. aurant. ʒij. Misc. detur cochleatim.

In India ℞. Pulv. Carminativ. ex fol. cinnam. ʒj. Aq. fol. cinnamom. ʒij. Misc. pro una dosi.

Vel ℞. Pulv. Carminativ. ex fol. cinnam. ʒi ʒ. Extr. opii tartarificati gr. v. Aq. Carminativæ ʒij. Misc. detur cochleatim.

Sudorifera, quæ discutiant status, & acres

Bbb 3 hu



humores expurgant ac rarefaciunt, ut per sudorem ac urinam eo facilius egrediantur, sunt lequentia.

℞. Rob. sambuci juniperi an. ʒj. Antim. diaphoretic. ʒj. Spir. tart. satiasati gut. xx. Carminativi ʒʒ. Aq. menth. fœniculi an. ʒj. Misc. f. potio.

Vel ℞. Rob. sambuci ʒij. Spir. tartari, Tinct. Sulph. Antim. an. ʒj. Antim. Diaphoretic. gr. xv. ocul. Cancr. ʒj. Aq. carminativ. ʒij. Muc. f. potio.

Seu ℞. Spir. sal. Ammon. Theriacal. succinat. an. gut. xii. tartari gut. x. Antim. diaphoretic. gr. xv. salis ocul. cancr. ʒʒ. Rob. juniperi ʒij. Aq. fœnicul. aurantior. an. ʒj. Misc. f. sudoriferum.

In India. ℞. Spir. sal. ammon. aromatic. lign. Ebeni an. ʒj. Essent. lign. colubriu. ʒʒ. salis volat. oleos. Rad. Cinnam. sylv. gr. v. Aq. Carminativ. ʒij. Misc. f. sudoriferum.

Vel ℞. Extr. Alexipharmac. ʒij. Spir. lign. Ebeni ʒj. Aq. rad. Cinnamom. sylv. ʒij. Misc. f. sudoriferum.

Scorbuto una affligente, specifica antiscorbutica admisceantur.

Colicam, quæ adjuncto spasmo, Indiæ incolæ torquet, & curata paralyfin relinquit, primo libro explicui. Quasdam igitur observationes tantum hoc loco enarrabo.

De gangrana vero & contractione intestinorum, alii authores videri possunt. *Herm. Nic. Grium. Compend. Medic. lib. 3.*

### Consultationes.

#### Pro Reverenda Vestali Doloze Colico detenta.

Tametsi dolores, qui fiunt in abdomine varii sint, nihilo minus præcipui, ac frequentes sunt stomaticus, intestinalis, nephriticus, & uterinus in mulieribus, quorum aliqui usque adeo difficulter distinguuntur, ut gravissimi viri immo ipsemet Galenus decepti fuerint, nihilo minus ego diligenter advertens quæ de dolore Reverendæ vestalis scribuntur coactus sum affirmare, ipsum ad intestina tantum, & inter ipsa solum id colum attinere, & hoc mihi ipsi ex doloris positu suadeo, nam præcipue regionem intestini hujus occupat, quia cum intestinum colum a dextris ad fundum ventriculi ascendat & à fundo ventriculi per sinistram abdominis partem usque ad inguën descendat, dolorque præcipue hanc partem affligat, procul dubio intestini coli est dolor, accedit & in hujus confirmationem alui adstrictio. Verum dolorem non esse totius intestini, sed partis superioris ventriculo-hærentis, necnon proximæ infra costas nothas & circa lumbos satis per se constat; quod vero ventriculus non doleat absentia nausæ, ac vomitus, & utilitas quam ex clysteriorum usu percipit suadent, quod pariter urinæ instrumenta non doleant absentia symptomatum in exitu urinæ, & urinæ ostensio a quocumque præter naturam contento immunes demonstrant; tandem uterum intactum esse illud sufficit argumentum, quod dolor ne minimam quidem particulam regionis illius attingat; dolor autem hic secundum speciem est gravativus cum ten-

sione perenni saltem secundum fundum ventriculi aliquando remissus, & mitis, aliquando intensus, & acerbus, semper locum determinatum occupans, & velut nexus, tametsi etiam vagus fiat quæ per varias loci illius partes discurret, ut modo unam magis, modo alteram affligat.

Cujus doloris generatio est ex objecto improporcionado organo tactus, quod illius symmetriam corrumpens sensum præter naturam, atque dolorem infert, & hoc objectum est tum commune, tum proprium, commune est solutio unitatis facta à materia pituitosa, quia dolor est gravans, excreta per alvum sunt succo hoc referta, urinæ crasse excernuntur, dolor præcipue ab usu alimentorum pituitosorum intenditur, à calidis juvatur, ac cerebrum, & ventriculus, quæ sunt pituitæ officinæ frigidiora existunt, verum unitatis solutio non ut ab hac materia immediate, sed ubi in halitus fuerit resoluta tunc enim partium fit distensio, & aucto halitu, illa quoque augetur, hinc dolor aliquando mitis, aliquando acerbus, imò vero & discurrens per locum laborantem affligit, ut non sit mirum etiam, si dolor sit tensivus, ac à flatuum excretionem usu carminantium & calorificorum imminuatur. Caterum cum materia hæc modo in cavitate intestini, modo impacta, modo inter tunicam, & tunicam sit; contumacia doloris, & ejusque perseverantia, (nam à tribus annis vexat Reverendam hanc virginem) materiam morificam esse & impactam, & forsitan etiam inter tunicam, ac tunicam, docet; Hujus autem materię principia generantia sunt intemperies cerebri, & ventriculi frigida, ac alimenta pituitosa, ut ex dictis liquet, ab illius vero visceribus materia pituitosa genita protruditur ad intestina sua natura excrementa quæcunque recipientia, præcipue vero ad colum, uti magis capax, ibique à calore aliqui imbecillo in statum resolvitur, & merito hujus facta veluti suspensione fœcum, merito vero pituitæ quædam in inviscatione inducta, ac acrimonia bilis expulsionis inservientis remissa alvus adstringitur, & hæc de objecto improporcionado communi, est & proprium, nempe intemperies frigida intestini coli cum præsentia materię pituitosæ, tum aliunde transmissæ, tum ibidem ob errorem facultatis alteratri, is collectæ, merito cujus intemperiei facultate expultrice labefactata facile etiam alvus supprimi potest.

Ut autem dolor, ac cætera mala tollantur, Medicus in id incumbat oportet, ut halitus dissipet, quicquid impactum discutiat, quod fuit retrahat, quod fluxurum inhibeat per calorificam generationem pituitæ submoveantia, tandemque intestini calorem vivificet, roboretque, ac intemperiem eisdem calorificis deleat, prius tamen toti consulat, ut autem dolor quando induit rationem causæ ac urgentis demulciatur, mitigeturque Medicus totum animum anodynis, imò & amuletis adicere debet.

Verum tamen ubique difficultatem inveniet, quoniam ei agendum contra morbum in habitu, & causas valde reluctantes, & rebelles, & materia pituitosa extra locum affectum per alvum esset educenda, cum tamen locus affectus purgationem prohibeat, accedit quod causa præ-



dictæ habent localem generationem in visceribus præcipuis, jecore uiquam, ac ventriculo, larduntque partes, quæ viscera illa per modum circuli afficiunt, nam intestina ventriculo facile suas affectiones communicant, ut sæpè non difficultas, sed periculum etiam laboriatur, & mala tolerantia accedat.

Quæ ne eveniant Medicis curans cito præsto esse debet materiis Medicis, inter chirurgicas ergo quæ sanguinis evacuationi destinata est, non videtur ex usu, nisi in maxima doloris sævitie; nam quia tunc imminet sanguinis attractus, ideo ad hoc periculum avertendum sectio venæ, vel saltem ejus vicinæ cucurbitulæ scarificatæ conveniunt, sectio quidem venæ tali sinistri, & cucurbitulæ partibus infernis adhibita, pro statuum discussione magna cucurbitula cum multa namma applicata loco dolenti est opportuna, sicuti & cauterium in utroque femore, præcipue verò sinistro; secundum partem domesticam, imò in abdominis n. o. litudine supra partem dolentem inultum, maxime est contentaneum, nec avertunt qui in parte dolenti non cauterium tantum simplex, sed duplicatum, setaceum dictum excitant.

Medicamentum ad materiam, ad dolorem, & ad viscera refero, quæ ad materiam, duplicem habent coordinationem nam vel illatus, vel immeram respiciunt, si illatus; per os præter aquam stillatitiam cinamomi, ac Angelicæ odoratæ, præter oleum distillatum ex seminibus odoratis, atque aromatibus, & electuarium Ratis ex baccis lauri, laudo jus galli antiqui, vel columbi sylvestris cum illatus discutientibus paratum; per injecta in anum ultra clysteres carminantes utitatos, probò qui cum oleo de cherna tantopere a Melue commendato, & succo, vel decocto rutæ ab Avicenna celebrato; conficiuntur, qui magis proderunt si electuarium vel de baccis lauri, vel Jutinum immisceatur. Tandem per ea quæ exterius, inter quæ assiduam loci dolentis irrigationem cum aqua ardenti & succo rutæ, vel elixire vitæ, & totum per vesicam bubulam oleo de cherna, vel rutaceo completo referam, vel cum patera cineribus calidis repleta, prius injectis senibus odoratis, deinde vino Cretico superasperfo, ac tandem panno lineo superdato, & illutionem cum oleis ex seminibus odoratis, & rutæ ebullito, vel ex quinque partibus olei anethini, una castorei, omnibus præfero.

Quod si medicamenta immeram respiciant, sunt concoquentia, & evacuantia, in genere concoquentium jus columbi medicatum cum origano orientali, betonica, capillo veneris, cicorio; boragine & melissa, adjecto oxymellite composito, imò vero & hyera simplex cum minori dosi aloës, & diacalaminata unire conveniunt. Evacuancia si sensibilibiter agant, & sine lenientia non recedendum ab usu hyeræ cum majori dosi aloës, & aquæ tectucianæ cum melle rosato solutivo datæ, ac intervallis quibusdam repetitæ; si vero purgantia sint, abstinendum ab iis quæ vomitum cient, nam vomitus in colica cum alui suppressione non est tutus, quia aliquando ad fecum vomitum perducit, præterea si cacochimia in toto subsistat, ab omnibus purgantibus abstinendum, priusquam materia concoquatur: quocirca ubi

purgantia erunt usurpanda, mihi probantur quæ valenter purgant, & bilem ad intestina perducunt, ut magis expultrix excitetur, ac tandem, ut materia non ascendat sed descendat referta sint adstringentibus, ideo præter diaturbæ Montagnanæ, diacarthamum Nic. Florentini, diacydonium factum ex dimidia libra conservæ cydoniorum drag. ij. turbit. electi, & drag. s. diagridii ab unc. i. ad drag. vi. vel unc. j. datum mihi arridet, nec contra utrum horum purgantium illud obstat, nempe non trahendos esse humores ad locum affectum, nam licet hoc facere ad evitandum majus malum; cum igitur in nostro casu impendat fecum vomitus, ideo licet uti medicamentis ad intestina attrahentibus, in quem usum præter jam dicta clysteres acres sapius injecti plurimum prodesse solent.

Medicamenta insensibilibiter evacuantia maxime hic conveniunt, quoddam materia est impacta, ideo decoctum columbiturrialis, vel galli antiqui cum guajaco, vel sassafras, china, tartaro albo, cartamo, & similibus paratum, extracta guajacæ, & sassafras, trociscos viperinos, utranque antidotum magi. in antiquam nullo modo damno, sed præter hæc habeo ego & alia: primum est acetum scyllinum infusionis cardui benedicti distillatum, & cum syrupo de corticibus citri simpliciter datum, alterum est Galeni quod sit ex drag. j. cornu cervi ulti, gran. ij. piperis albi, & totidem myrrhæ cum vino exhibitis, vel cum oxymell. simpl. in bolum redactis, tertium est sal aliquod chymicum, inter alia autem salis genera laudo quod ex hisce plantis, nempe parietaria, absinthio, verbasco, pimpinella, levistio, & camomilla conficitur, & eo magis si ex aqua arantiorum detur, quartum est oleum calcanti cum vino. Verum & per ea quæ alio subducuntur licet materiam discutere, ideo clysteres ex decocto futorum aliorum, & brassicæ in vino odorato vel aqua salita naturali, vel artificiali coctorum, & oleo irino aut laurino cum nitro, vel ex urina humana, sapa, oleo rutaceo, & fermento æri in lixivio dissoluto in hunc usum parari poterunt. Tandem & per topica idem peragere licet, quapropter oleum ex croco, & de piperibus Mel. Rastannum Tralliani, ceratum diachilon magnum cum gummis & portione sacri, vel diapyrtes, micelus ex aqua naturali sulphurea salia, & nitrosa cocta cum emollientibus ac resolventibus; embroca ex eadem aqua vel oleo communi cum vino Cretico, & baccis juniperi, ac lauri ebullito in duplici vase, cataplasma ex foliis tabaci in oleo amygdalarum amararum coctis, & cum melle exceptis, tandemque synapismis huc referenda sunt.

A quorum omnium usu habenda est consideratio medicamentorum quæ viscera attemperant, pro ventriculo igitur, ac intestinis thermæ porrectanæ novæ bibita, & per modum embrocæ (quo nomine & Tectucianæ optimæ censentur) adhibita, ea tamen ratione ut ab embroca ceratum masticum cum extracto nucis muscatæ, vel balsamo naturali alteratum apponatur, sunt præstantissima, tamen si plura ex dictis sint, quæ ad hoc opus conducunt. Pro cerebro assumat hora somni conservas cephalicas cum Mithridatio, curetque sibi caput



ablui lixivio decoctionis plantarum cephalicarum adhibito agarico loco saponis.

Tandem ad dolorem ubi insaverit, convertenda est curatio per materias remedii anodynici, quo circa intus oleum amygdalarum dulcium, & amararum, vel nucleorum persicorum adjecto pulvere mechiocani, vel melle rosato solutivo non sentel, sed pluries datum omnibus, excepta theriaca est præferendum, nam & theriacam, non tamen antiquam summopere probō, extra verò in seculis ex oleo cominum, sacculus ex avena torrefacta, item & venter anatis vivæ ventri adhibitus plurimum valet, sicuti & pedum in aqua ferventissima longa detentio, ac stillicidia ex oleis anodynis. Et ut de Amuletis etiam aliquid dicam, corrigia ex dorso lupi cineta, talus leporis ventri alligatus, & coagulum catuli ex vino sumptum conferre solent.

Victus calefaciens, siccans, & attenuans moderate convenit, ideo carnes facili coctionis & nullius fere excrementi concedantur conditæ aromatibus, rore marino, salvia, petroselinum, imò allium à Gale. duodecimo Meth. ultimo laudatur, sicuti & Trallianus porra laudat, amygdalatum quoque, & ptyfana cum melle, ac pipere minime inopportuna sunt, nec intinctus, qui cum synapi, nec aliquo sale condita, uti cappares, olivæ, aleces, & aliqui alii pisces minime duri, & crassæ substantiæ sunt interdenda; hinc pisces aliqui friabiliore tamen ex mare capti non sunt denegandi, dummodo potius assi, quam elixi offerantur. Vinum potius generosum ex Galenō, & Tralliano concedatur quod si anrosatum vel emulatum, vel guaiacum eligatur, magis placebit; pro alvo irritanda sæpe utatur alde succotrina ad scrup. j. & in principio mensæ comedat panem ex tota farina cum sale, anisi, & passulis paratum, aliquatidoque bibat vinum fena medicatum; reliqua ad victus rationem attinentia ad proportionem respondeant. Interim autem Deum Optimum maximum præcor, ut hæc omnia in salutem Reverendæ Virginis cedant. *Jul. Caf. Claudii. Consultat. libro.*

Vir quadragenarius, gracilis, venosus, cui antehac statutis temporibus hæmorrhoides fluebant, antè annum conqueri cœpit de dolore in medio ventre inferiore, ad dextram partem vergente, cum vomitu, alvique suppressione: cuipeinde successit febris cum urinis coloratis, quæ antea erant aquosæ, & excretionem materiæ purulentæ per alvum, & quandoque per urinam.

Dolorem itaque illum, qui horam circiter à cibo patientem nostrum exercebat, colicum esse ex situ facile colligi potest, & aliis annexis symptomatibus. Refert enim se dolore torqueri in medio ventre inferiori, parum supra umbilicum, ad dextram usque latus propè lumbos, cum vomitu succedere, alvum suppressi, & clysterum beneficio excerni compatis feces bubularum instar: quæ nonnisi colicæ passionis indicia esse possunt, in qua vomitus excitatur propter consensum cum ventriculo, per tunicam quam habent communem à peritonæo: suppressitur verò alvus, propter immodicam intestini coli extensionem

cujus ratione prohibetur constrictio fibrarum ipsius transversarum.

Nec est difficile conjectare à qua materia colicus dolor exciteretur. Nam qualitas doloris, & tempus durationis palam faciunt ipsum fieri à flatibus, cum sit extensivus, & horam tantum, vel duas duret; status autem hi elevantur a materia pituitosa crassa, viscida, & copiosa in eodem intestino colo sensim & sensim collecta; quæ de causa continue pondus in illa parte & frigiditas molesta sunt. Coærceretur vero eadem non magis per generationem, quam per receptionem a ventriculo imperfecte cibos concoquente, propter intemperiem frigidam, & humidam ipsius, cupis indicium est oblectatio illa ex frigidorum & humidorum usu tempore sanitatis, sputum ferè continuum, & languidus cibi & potus appetitus. Hinc fit, quod urgente dolore evomit non solum cibum assumptum, sed etiam multam pituitam crassam & viscidam, urinasque albas, ctudas & tenues excernit, crudæ indiciæ, non tantum in primis viis, sed etiam in venoso genere. Neque mirum quod dolor exacerbetur magis à cibo, tunc enim & cibi calor, & naturalis ad interna recurrens, agensque in materiam pituitosam, multam inde flatuum copiam suscitatur, qui postea insigniter extendentes intestinum, dolorem excitant; Passioni autem frigida calida & inflammatoria successit. Verum in qua parte, & quomodo per alvum, & urinam se prodatur, acriori eget investigatione. Hic enim est affectus princeps de quo conqueritur & qui ad se potissimum curationem trahit. Nam quod inflammatio præcesserit, inde colligitur, quod 20. diebus à doloris paroxysmo, urinx coloratiores reddite sunt, & feces duriores, quod successerit sitis, febris continua cum obscuris exacerbationibus, ac tandem apparuerit excretio puris, quod nunquam fit, nisi ab ulcere, vel abscessu. Ulceris verò nulla suspicio, quia nulla præcessit excretio cruenta ulceris incipientis indicium: Abscessus autem supponit inflammationem, de qua dubium in qua parte sedem habuerit, ut ex illo subortum sit ulcus. Dicit enim Hippocrat. 4. Aphor. 71. quod si quis sanguinem aut puri meatum, renem aut vesicæ exulcerationem significat. Verum nullum est ulcus in renibus, quia nullus ibi dolor: ubi autem dolor, ibi morbus. Neque in vesica, quia vesicæ inflammationem subsecuta esset urinx suppressio, dolor acutissimus, & excretio puris per urinam, non per alvum; fuerit ergo in aliqua parte ventris inferioris, circa umbilicem scilicet: ibi enim dolor, & gravitas, quæ invalescunt, dum validius comprimitur pars affecta. Hæc autem alia esse non potest, quam pancreas, vel mesenterium, quod cum sit receptaculum sanguinis crassioris, & melancholici, illius potissimum qui per internas hæmorrhoides solet expurgari, non difficili negotio in patiente nostro potuit inflammari ex continua calidiorum applicatione: suppressis præsertim hæmorrhoidibus per quas expurgabatur hic sanguis statutis temporibus, qui multâ copia generatur ob temperamentum jecoris, & totius validum, & siccum. Est enim gracilis & venosus, atque



atque ætate consistente 40. annorum : quem postea per abscessum disruptum expurgari posse per alvum planum est, cum venæ plurimæ per mesenterium sparsæ, meseraicæ dictæ interantur in intestina, in quæ hanc materiam evomere possunt. Quod contigisse memini puero illi nobili, qui lex ab hinc mensibus patitur abscessum, & excernit per alvum purulentam materiam modò sinceram, modò fecibus permixtam, majori aliquando vel minori copia. Cujus excretionis meminit Fernellius 6. Pathol. 7. Benivenius de abditis morborum causis cap. 33. Dodoneus, & Petrus Forestus lib. 21. Observat. primâ. Neque est difficile determinare cur per urinas excreta sit materia purulenta. Ab eodem enim trunco arteriarum magnæ descendentes emanant propagines ad mesenterium, omentum, & intestina, à quo oriuntur rami ad renes diffusi, arteriæ scilicet emulgentes. Quâ ratione empyema thoracis per arteriam venosam, cor, & arterias emulgentes expurgatur per urinam, teste Galen. licet rarissime contingat, quia brevior per alvum via est. Verum cum adest multa materiæ copia, utique non repugnat, ut in casu præsentis : Ideò nunc excernitur materia hæc per alvum, & urinam : quanquam per urinam etiam excerni possit à ramis venæ portæ ad jecur transmissa, & ab ipso ad venas emulgentes : quod tamen rarissime fit, cum plurimum hæc materia per alvum expurgari soleat. Et hæc de essentia & causis horum affectuum.

Qui sanè sunt gravissimi, & difficillimæ curationis ob durationem ipsorum, & indicationes contrarias. Habitus enim corporis refrigerantia exigit, dolor verò colicus calefacientia.

Pro horum autem curatione quatuor sunt agenda ; detergenda est sanies in mesenterio, & intestinis conclusa ; discutiendi status, consolidandum ulcus, & contemperanda intemperies frigida ventriculi, & intestinorum per calefacientia, præmissa primarum viarum expiatione. Quæ præstabuntur remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis, & Diæreticis.

Inter chirurgica præmittenda est venæ sectio ratione totius, aperiendæ venæ hæmorrhoidales ratione evacuationis suppressæ ; inurendus fonticulus dextro interno femori ratione diversionis ; & applicanda magna cucurbitula cum multa flamma, quæ instar incantamenti est in discutiendis flatibus ex Galeno.

In Pharmaceuticis præmittenda sunt universalia præparantia, & purgantia, Viro Doctiss. experientiâ probata ; atque in iis primas sibi vindicat. Hiera picra Gal. & Rhab. cum in substantia, cum passulis, tum in infusione cum mell. ros. sol. mox exhibenda aqua Tettutiana quatridentum ad lib. 4. quâlibet vice, cum cremore tartari, vel melle ros. sol. pro deterfione ventriculi, intestinorum, & ulceris : in quem usum ex usu erit *mulsæ, cum lupinis & siliquis fabarum*, addita *emuls. sem. citri* ratione flatuum, à quibus deveniendum est ad potiones vulnerarias à Paræzo descriptas in magna Chirurgia, non omisâ decoctione *sem. feniculi, cymini, anisi* ad discutiendos status. In quam rem præsentis remediorum *aqua Thymaleis Aponitana* : ex quibus fieri etiam poterit stillicidium ventriculo, & toti ventri inferiori, munitis dictis partibus *lana*

*succida imbuta oleo rutaceo & laurino* ex quibus oleis frequentes parabuntur clysteres ; atque inopia *aqua Aponitana*, stillicidium ex illis fiet.

Addita congrua victus ratione in rebus omnibus non naturalibus viro doctissimo apprimè notis. *Benedict. Sylvan. Consil. & respons. Medic. Cent. 3.*

Sævissimi dolores per vices excruciantes Illustr. Comitum in ventre inferiori, cum tensione ventriculi, & hypochondrii dextri, siti, & oris amaritudine, a vomitu frequenter cessantes, & aliquando suborta ictericitia remittentes, ut & erumpentibus superius & inferius flatibus, ut habetur ex historia, excitari quidem possunt in ventriculo, prout à Viro Excell. statutum video, tanquam parte exquisiti sensus ; & intemperie admodum frigida donata, cujus ratione neri potest corruptio ad acidum, non raro in ructibus observata. Non abs re tamen dolorem hunc colicum pronuntiaverim, non eo solum nomine, quòd dolor præsens sit in parte dextra, quæ sola est doloris colici sedes, ex Ludovico Mercato : sed potissimum, quoniam hic insignis extensio dextri hypochondrii, quæ utique se proderet magis in hypochondrio sinistro, si ventriculus esset pars affecta, ratione fundi ipsius ad sinistra vergentis. Accedit, quod non raro suboritur ictericitia, succeditque flatuum eruptio superius & inferius, atque vomitus superveniens constat materia pituitosa & biliosa, quæ & per alvum deijcitur. Quæ sanè licet doloris ventriculi indicia esse possint, facilius tamen consequuntur dolorem intestini colli, in illa parte affecti, ubi desinunt intestina tenuia, & incipiunt crassa, colon in primis, cujus ortus est in hypogastrio dextro, unde subfundum ventriculi ad sinistram partem diffunditur.

**AFFECTIONIS** verò ejus causa est, cum pituita à ventriculo, tum bilis copia à jecore transmissa, non sine aliqua portione atræ bilis acris valde, & mordacis, quandoquidem observamus jecur in Illustr. patiente præcalidum. Quod me quoque iudice, primas partes obtinet ad producendum affectum præsentem. Quare statuendum est, dolorem hunc provenire ab heterogenea materia, ex qua dum elevarunt status, distenditur non solum intestinum Colon, sed etiam duodenum, ex cujus extensione occluditur orificium porî fellei, hincque bilis regurgitatio in jecur, & effusio in totum corpus, tunc potissimum evanescens, quando Pharmacorum ope evacuetur materia in intestinis contenta ; quod sæpius in doloribus colicis accidisse observavi. Neque obijciat quis Aphoristicam Hip. Sententiam 5. Aph. 71. *Auriginosi sunt ictერი non admodum ventosi.* Gal. item in com. qui addit, status ex pituitosa materia generari ; cum præsertim flatulenti à pituitoso & frigido humore, auriginosi sint contrarii, ut pote biliosis. Auriginosi enim sunt vel ex copia bilis in jecore genitæ, ab ipsius fervore, vel ex angustia porî fellei ipsam transmittentis ad intestina. Si sunt auriginosi ex bilis copia, non possunt esse ventosi ex pituitæ copia in status faciente : verum si ictericitia fiat ex sola meatûs fellei angustia, quæ potissimum consequitur extensionem intestini duodeni, ut in casu nostro, auriginosi fuerint etiam ventosi : Consue-



rum tamen dolorem hunc potissimum fieri à materia acri, & ea quidem cum biliosa, tum attrahibili in jecore fervido genita, non secus ac dolor colicus in eodem agro causam habuit immodicum *Scammonii* usum, quo notho quidem cum aliquot dies laboraverit, periodicus tactus est: quod alteri quadragenaria contingit ex acri materia intestinis intareta, sitque astate potissimum ob ambientis caliditatem, ex Gal. 12. Methodi medendi. Quinimò aliquando colicam Epidemicam hinc ortum habuisse refert Paulus Aegineta Lib. 3. de Re Med. Cap. 43. cum dixit hanc colicam a temerario quodam Italo refrigerantibus medicamentis sanata fuisse. Quibus suppositis tanquam verissimis, mirum non est, quod dolores hi sint acutissimi, quibus nonnunquam accedant animi deliquium, dejectiones item biliosæ, & quod ab immodicè caleracientibus noxam capiit, juvamentum e contrario Comes Illustriss. ab epicerasticis ipsi à Viro præclarissimo præscriptis, *Oleo* scil. *Amygd. dulcium*. Et hac de essentia & causis hujus affectus.

Qui quidem est gravissimus, & quem aliquando in paralyfin cessare asseruerunt Græci, Paulus in primis, nosque non semel experientia comperimus. Quinimò in arthritidem aliquando desinit ex Hipp. 4. in 6. Epid. 3. his prope verbis, *cui intestinum in dextra parte, arthriticum factum est & quietior fuit: post curationem dolore magis fatigatus est*. Hoc autem duplicem ob causam provenire posse addit Gal. in Com. aut quia dolor major minorem obscurat: vel quia fiat metastasis, & transmissio materię de loco ad locum, ab intestino scil. ad articulos, & ab his ad colon.

Utcunque tamen, insistendum est Medicis præsidii humorem in intestino hærentem evacuantibus, quæ copia peccat, quæ verò qualitate, contemperantibus, & epicerasticis, prohibenda est fluxio divertentibus humorem fluentem, & subastringentibus vias, per quas fluit: ac tertio prohibenda est prædicti humoris generatio jecoris fervorem contemperantibus, præmissâ primarum viarum expiatione. Idque remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis, & Dieteticis.

Chirurgica quod spectat, sedato dolore epicerasticis, sanguis est educendus ex jecoraria dextri brachii, & per vices educendus ad libram circiter. Fonticuli quin etiam utrique interno femori, pro majori revulsione sunt inurendi.

Pharmaceutica universalia lenientia sunt fl. cassiæ recens extractæ cum el. lenit. & pulpa tamar. vel syr. ros. cum decoct. pulpæ tamar. vel elect. de sebesten sine scammonio. Præparentur aquis cichorii borrag. hepaticæ, & plantaginis; omissis mellitis, & saccharatis, ne bilefiant. Purgentur rhab. & agar. incisis, addito syr. ros. sol. Interim clysteres carminativi præscribentur ad discutiendos flatus, & epicerastica medicamenta, ad demulcendum dolorem, atque in primis oleum amygd. dul. extractum sine igne. Peractâ hæc evacuatione, & mitigatò dolore, duo genera remediorum erunt peropportuna: Primo serum lactis caprini, modò dejectorium cum cremore tartari, modò diureticum, cum syrup. capill. ven. Secundo aquæ Thermales frigida, quales erunt B.V. in agro

nostro; vel *Villenses* in agro Lucensi, vel etiam *Ficoncellæ* in agro Senensi. Calderianæ namque agri Veronensis impensius refrigerant quam par sit, ratione ventriculi. Pro cuius corroboratione, & subadstrictione emplastrum de crassa panis præfens erit remedium, atque fomentum cum spongia insuccata vino rubro aultero, cui incocia fuerint, mentha, absinthium, rosmarinus, rosæ, & balauistia. Tandemque fluxione non cessante, nec dolore remittente, ad opiata deveniendum erit, *Theriacam* nempe recentem & pil. de cynoglossa.

Victu pariter refrigerante, & subastringente præscripto, familiari usui diacydonii sine aromatis. *Benedicti Sylvar. consil. & respons. Medic. Cent. 3.*

Ex illis quæ diligentissime & distinctissime enarrata sunt a Viro per Illustri & Excellentissimo, compertissimum redditur, generosum patientem quinquagenarium dolore colico detineri cum febre, & vigiliis fere continuis; atque dolorem hunc dependere cum à flatibus crassis ex materia pituitosa elevatis, copia genita propter errores in victu, & aliquam imbecillitatem ventriculi catarrhique à capite descendentis, cujus magnam copiam excret. m. vidit vir præclarissimus; tum, & forte magis ab humore bilioso in jecore fervido genito. Dolor enim acutus per vices molestus, febris assidua, vigilie, sitis id manifestissime confirmant. Quam ob causam refractarius, & valde molestus est affectus. Humor enim calidus agens in materiam crassam, & viscidam, ab ipsa jugiter flatus & vapores elevat, qui distendentes hypochondrium, dolorem pertinaciorum reddunt: ut propterea statuere possimus dolorem hunc colicum esse ex illis, qui ab Alexandro Tralliano propositi fuerunt, dependentes à materia biliosa, quos proposuit & Galenus. Febris pariter, me quoque iudice, ab huiusmodi materia in venis meseraicis conclusa, & putrescente, dependet. Quare non sine ratione de agendis consultitur, cum huiusmodi dolores non raro in paralyfin degenerare soleant, prout a Paulo Aegineta proditum. Quos & ego sæpius observavi.

Agendum igitur & insistendum quidem est attenuantibus, & detergentibus, ratione humoris pituitosi, magis tamen refrigerantibus, & humectantibus, cum habeamus ex eodem Aegineta, illos tantum evasisse, qui a temerario quodam Italo refrigerantibus & humectantibus fuerunt curati.

Quare repetitis lenientibus ex flore cassiæ, cum speciebus hieræ picæ; vel syr. ros. cum tamarindis superbibito sero caprino, evacuantis sunt humores, prius tamen præparati syr. acetos. simplici, & de acetositate citri, cum pisculo alterato cichoraceis, & seminibus citri. Purgentur modica infusione rhabarbari; administratis interim clysteribus, modo deterforiis ex melle ros. sol. cum decoctione mercurialis, betæ, fursurum, & florum chamæmeli, modo & frequentius epicerasticis, puta paratis ex lacte, & saccharo rubro, vel aliquando ex cremore hordei, lacte, & oleo chamæmelino, supersedendo à quibuscunq. adstringentibus, in augmento febris serum caprinum cum emulsione seminum melonum, præquisâ maceratione comæ absinthii exhibebitur ad unc. viij. circiter. omen-



omentum castrati imbutum oleo violato, & chamamelino erit ex usu. Magna item cucurbita cum hamini apponitur, ut ait incantamenti, ex Gal. peneverante febre, sanguinis educio ex venis sedalibus nihil probatur. Superfledendum vero vesicantibus, propter vigilias quarum causa laudanum tuto exhiberi poterit, conteret enim ratione doloris, prout etiam Theriaca recens. Quibus respondeat congrua victus ratio. *Benedict. Sylvan. Consil. 9 resp. ns. Medic. Cent. 3.*

Dolor ille perforans veluti, quo referunt frequenter torqueri admodum reverendam Vellestem in dextra parte abdominis, intra colitis mendoas, quanquam censeri possit, non nimis concus, quam nephriticus, cum in eadem regione contingere possit renibus male affectis; ut propterea Galenus ipse crediderit se nephritide laborare, dolore perforante excruciatum, cum tamen divexaretur colica, ut refert secundo de locis Affect. 1. Viro tamen clarissimo, & de re medica bene merito accesserim lubens, dolorem nobis Veltalis colicum esse scribentis, cum praesertim in historia referatur, dolorem percipi non in regione, sed supra regionem dexteri renis, in qua parte adnectitur intestinum colon ipsius lumbis. Neque urinarum color albus, & splendor negotium taceant: quia tales etiam compieuntur in colica passione. Quod si dolor occupet ampliorem locum, si juvatur a clysterum usu, leces supprimuntur, succedit vomitus, neque deinit & alia colica indicia, quae praeternuntur, nos tamen de parte affecta certiores reddunt, pronuntiabimus affectum propositum esse colicum.

Qui quidem licet plures agnoscat causas, plurimum tamen provenit a materia frigida, & humida, vel vaporosa, vel ab utraque in praesenti casu liquidum exillim. In his principem causam huius doloris esse pituita vitream; nuncus principem esse flatum, vel vapores crassos, quia a vaporibus & flatibus nascuntur extrenvi dolores, a pituita vero vitrea perforantes, quales sunt religionissimae Virgatus laetae. quibus & Galenus ipse committatus est, atque liberatus per excretionem humoris vitrei, ex eodem loco citato. Erit igitur affectus huius patientis trillis sensus intestini coli, dependens a copia pituita vitrea, non sine aliqua flatuum copia. Neque est difficile reddere rationem, cur natus ibi colligantur copiosi. Elevantur enim ab humore crudo, & pituitoso in intestinis diutius coacervato, cum genito ex vitata coctione, ob labelactatam ipsorum intemperiem a praesentia humoris frigidi, qui eo confluerit, tum ab aliis partibus transmissis; frigida & humida intemperie affectis, qua totum corpus laborat a natura primordiis, cerebro, & ventriculo non exceptis, ad aucta quinetiam ab imminuto calore aetatis decursu, ut ex signis in historia propositis colligere est. Quod si jecoris vasa sunt obstrueta, refert Vir clarissimus observari duritiem aliquam in dextro hypochondrio, patebit magis causa copiosa collectionis humorum crudorum in intestinis. Cum enim a jecore per porum felleum transmittatur bilis ad intestina, ad sollicitandam ipsam expultricem, contigit, ut propter obstructions ipsa non transmittatur, quae etiam paucis copia gignitur, ob jecoris intem-

periem frigidam, ut hoc nomine torpeat veluti intestinorum expultrix; cuius ratione sensum & sensum multa pituita vitrea, & alterius generis copia colligitur in ipsis, quae postea dolores infert frequentissimos. Bilis liquidum non impedit sanguinis distributionem per universum corpus, quia haec ut a facultate naturali expultrice venarum, & subtilitatis jecoris, concurrente etiam attractrice aliarum partium alimento carentium, atque serosa humiditate attenuante sanguinem jam genitu, quo facilius subiens tenuia vasa, possit pervadere omnes corporis partes; sed solum expultrix intestinorum muneri officit: qua ratione, qui obstruatum habent porum felleum, doloribus colicis sunt maxime opportuni.

Quibus ne constitutis de essentia & causis horum affectuum non est difficile colligere curationis huius difficultatem, cum quia intemperies naturales jam confirmatae ad 43. usque annuntiant fere insuperabiles, frigida praesertim ventriculi partis scilicet exatiguis, & membranosa, semper frigida, quae propterea difficillime incaluit, tum etiam quia aetas declivis corpus reddit frigidius. Sicut enim in juventute conservatur calor, etiam si humiditatis aliquid pereat, quae praetertis aetatibus erat supernua, ita & aetate ad senium vergente, qualis est patientis Adm. Rev. calor languescit, ut propterea augeat curationis difficultatem. Attamen si praesidiis usi fuerit generosis a viro clarissimo praescriptis, & a nobis proponendis rectamque instituerit victus rationem, spero fore, ut a praescripto affectu releveretur.

Quo autem voti compotes habemus; ventriculus primò, & intestina sunt ab excrementis pituitosis; expurganda: quod ut facilius fiat, sunt incidenda & attenuanda: obstructions deinde jecoris ab humoribus iridem crassis, viscidis; & lentis sunt referenda usu attenuantium, incidentium, & abstergentium; atque ita totum corpus est expurgandum universalibus purgantibus, ratione capitis, erethismi scilicet & irritatoris. Tandem inter peties ventriculi, cerebri, jecoris, & totius, quantum fieri potest, contemperanda calorificis, & exsiccantibus. Quod si id consequi in totum non possumus, ut mihi persuadeo, avertenda saltem erit materia jugiter genita ab intestinis ad alias partes: non tamen haec sunt corroboranda, cum sint convenientia totius corporis, & emunctoria omnium partium. Praesidia vero expromemus ex fonte Chirurgico, Pharmaceutico; & Dietetico.

Chirurgiam quod attinet; si agatur de sanguinis missione, nullus sane illi est locus, ratione affectus principis propositi: Quia tamen menses sunt immuniti, ut referunt, non abhorrerem a levi aliqua ejus educatione; tunc sibus imminetibus, cum hi supressi obviando calidum innatum, possint augere frigiditatem partis intemperiem, & praesertim jecoris. Mirretur itaque ex partibus infernis per cucurbitulas alte scarificatas, ad uncias quinque, cum sit valde pinguis, exilesque venae habeat. Funiculos quod spectat, praeter illum, quem gestat in coxa, alium curarem inurendum brachio sinistro, quod diveratur materia a capite & ventriculo fluens ad intestina. Quando



enim copiosius coarctatur excrementia materia, & in multis partibus, paranda etiam sunt entisaria jugiter eandem expurgantia. Neque metus est à majori refrigeratione. Nunquam enim observatum, refrigerari corpus ex evacuatione materiae superfluae, quin potius ex accidenti calefit, dum evacuata materia frigida, partes solidae sunt ab illa immunes, quarum alias augebat intemperiem. Quinimo si hi non sufficerent, & tertium pararem in sinistra coxa, quo copiosius manaret inde materia, quae in hoc corpore valde exuberat. Quod tamen iudicio Viri Excellentissimi committo praefecti curae nobilis hujus Veltalis. Atque hæc ex Chirurgicis satis.

In Pharmaceuticis alvus cieatur hiera boli formâ, melle rosato solut. superbibito, dissoluto in decoctione seminum citri. Praeparantur humores oxymelite, primò simplici, syrupo de mentha, & de corticibus citri Ad unciam semis in singulos. Purgantia blanda erunt. Ventriculus enim frigidus validiora non patitur, præter quam quod agitando violenter materiam in intestinis hærentem auferent dolores. Ideò placeret repetita hiera simplex cum electuario diacatholico, vel portiuncula etiam diaphanici: atque die postero ab hoc purgante, clystere pararem ex decoctione carminativa, cum portiuncula utriusque centaurei, addito melle rosato simplici, electuario de benedicta, cum oleo rutaceo, & chamamelino. Iplius enim beneficio facilius educetur materia colo intestino impacta, quam assumptis per os. Quo uteretur etiam in accessione ipsa, urgentibus doloribus, tum & clystere ex solo oleo rutaceo, & chamamelino ad uncias xiv. mox vero, quò magis emundentur ventriculus, & intestina ab hujusmodi materia, propinanda est aqua Tettiana quatuor dies ad libras quatuor cum uncias duabus mel. ros. sol. quin & aquæ salitæ quandoque portiunculam salis addendam censerem, quo magis detergat. Hæc enim quâ detergendo, quâ statim digerendo, & calefaciendo summo perit proderit. A quibus jecoris obstructions occurrendum est internis, & externis. Et quoad interna syrupus exhibeatur paratus ex uncia semis oxymelitis compositi, syrupo de cichorio cum rhabarbaro, & de betonica composito, additis uncias tribus decoctionis ex mentha, betonica, agrimonia, & radice fœniculi. Quinimò devenire ad trochiscos de rhabarbaro, & de eupatorio, Pilularum formâ exhibendos singulis diebus statim ante hunc syrupum. Purgandum postea erit corpus infusione rhabarbari, & agarici in decoctione anisi, schœnanthi, dauci & spicæ, addito melle rosato solutivo, & manna. Extrinsecus inungendum hepar oleo amygdalarum amararum, & de absinthio cum pulvere agrimonie, vino albo, portiuncula aceti, & cera; Super addito cerato ex ammoniaco, dissoluto in aceto; misso æsypo, & aliis plus satis laxantibus. Quod si his non cedat obstructio, posset etiam aliquot dies exhiberi portiuncula chalybis potabilis cum vino parati, alterato absinthio, mentha, schœnantho, agrimonia, radice filicis & asparagi. Atque dum hæc sunt, exhiberi possunt pilulæ ex Aloë non lota ad scrup. i. alternis diebus, non longe ante cenam. A quorum usu

contemperanda erit intemperies omnium viscerum caloricis, & exsiccantibus; & quidem intrinsecus conveniet, vel jus galli antiqui, ex praescripto Viri praestantissimi, vel simplex decoctum ex ligno sassafras & china; ita ut quilibet syrupus admittat drach. i. radice china, unc. i. ligni guaiaci & scrup. i. sassafras, facta infusione conlietâ, atque additis aperientibus & caloricis, ut mentha, absinthio, betonica, & schœnantho, quem tempore frigidior assumer bis in die, sudorem etiam tunc saltem semel in die excitando, cum victu tenui & attenuanti. Sic enim intemperies corrigetur, & superflua humiditas totius & partium absumetur. Quo tempore poterit etiam radice cyclaminis in naribus detenta turundæ formâ caput expurgare, nec non & massiche cum staphilagrâ, cera & saccharo, confectis globulis, in ore volvendis, & continuo dentibus atterendis. Atque tunc etiam utetur pilulis de hiera cum agarico, & massichinis octavo quolibet die 30. dies circiter; non omissa conserva ex absinthio Pontico, & roremarino, cujus assumer unciam quolibet mane ab usu decocti propositi. Horum enim ope affectus praesentes removebuntur, & contemperatis intemperiebus, ab imminenti bus praeservabitur patiens religiosissima: si tamen rectam victus rationem à Viro Clarissimo propositam religiosè observaverit. Atque hæc est mea sententia in casu praesenti. Faxit Deus, ut ad vota succedant. *Bened. Silvati. Consil. & Respons. Medic. cent. 3.*

Quemadmodum ex situ partis dolentis compertissimum sit dolorem, de quo conqueritur patiens Illustriss. esse colicum, prout statutum est à Viro præclariss. ita ex ætate juvenili, temperamento calido & sicco, efflorescentiis pruriginosis præteritis, nunc evanescentibus, variisque ac arduis negotiis, quibus dedit operam, existimandum est dolorem præsentem provenire à bile prædominante, in jecore fervido genita, transmissa cum ad ventriculum, tum & magis per porum selleum ad intestina, in quibus pituitosa materia crassa, & viscida in ventriculo impensè frigido genita, quod ex intenso appetitu, & tarda concoctione facile innotescit. Quam ob causam dum invadit affectus, ipsi accedit anxietas ventriculi, ad cardialgiâ vergens, hypochondriorum item tensio, dependens à statum copia cum pituitosorum, tum melancholicorum ex prædictis humoribus elevatorum ab excedente calore bilis, ratione qualitatis prædominantis. Accedit & alvi adstrictio, & ad vomitum propensio.

Atque ideò præsens affectus summo studio curandus est. Periculum enim imminet, ne in cardiacam passionem facessat, si os ventriculi petat materia morbifica, vel in iliacam passionem & volvulum, si vomitus convalescat, in paralysem quinetiam, prout non raro contingit, dum a bile prædominante attenuata pituita, facta metallasi, transmittitur ab intestinis ad spinalem medullam, critico quodam ritu, cujus Trallianus & Paulus Aegineta lib. i. cap. 16. meminere: neque negavit Galen. dolorem colicum a biliosa materia quandoque fieri, ut patet ex 12. Methodi medendi cap. 7.

Quare pro ipsius curatione evacuanda est materia peccans, attenuata prius, & incisa; con-



contemperandus est fervor jecoris, astringentibus intercipienda est fluxio, alvusque lubrica servanda.

Aque ideo ex Gal. & Pauli Aeginetæ consilio tria picra. Gal. est exhibenda, ad drach. ij. cum v. uncia semis floris cass. recens extractæ. Solo n. amque hieræ usu liber evasit ille, de quo Gal. 12. illo methodi verba fecit. Præparandi sunt huiusmodi aqua cichorii, borraginis, betonica, seminibus citri, cum syr. de acetositate citri. Urgentur rhab. infuso in aqua cichorii, cum sp. icæ, & syr. ros. sol. Mox pro majori primarum viarum expiatione, in ultimum veniat Aqua Tetterii, cum syr. ros. sol. quæ ex literis Viri clarissimi ad me datis, triduo jam epota feliciter permeavit, & primâ die pellucida fuit excreta, secundâ die utcumque turbata, etiam fecibus permixta, ac tertia vice magnæ bilis, & atræ bilis copiæ; cuius ratione biduo ea adhuc usus fuit, cum non dissimili excretionem: quod magis confirmavit bilis prædominium. Exhibita deinde fuit aqua B. Virginis, cum emuls. seminum melonum & syr. capillorum ven. quod facilius per urinae vias permearet, diverteret humores, & jecoris fervorem compesceret, prout successit. Facto autem fomento & inunctione ventriculi, ita corroboratus fuit, ut aliquot annos, immunis vixerit ab affectu, quo antea frequente infestabatur. Caterum posthabita victus ratione, publicis que negotiis magni dies addictus, de novo invasit, a quo tamen non difficili negotio liberatus est, evacuata bile iterum congesta; ut proinde sperandum si Excellentiss. Virum convalesciturum omnino; sit in sex rebus non naturalibus moderate se gesserit & præsertim in publicis negotiis curandis. *Benedict. Silvatic. consil. & respons. Medic. Cent. 3.*

Egregius mercator sexagenarius, temperamenti secundum totum & jecur calidi & humidus habitus, obeli sedentariam vitam domi ducens mercium venditione gratia (cum illi unicus sit filius, & quidem extra urbem mercaturam faciens) crassis & trigidis cibis semper usus, necnon fructibus, & vinis crassæ substantiæ ac recentibus delectatus, tribus abhinc annis vomitibus pituitosis obnoxius fuit, quibus sex abhinc mensibus omnino suppressis, hoc in eunte hyemali tempore ventris doloribus corripitur, a dextero Rene in sinistram diffusis, adeo ut 2 onâ quâdam præcingi sibi videretur, atrocioribus equidem modo cum quodam sensu gravitatis, modo cum distensione & inflatione, ventrisque rugitibus, nausea, vomitu, & alui stypticitate, qui nec remediis plures dies administratis cesserunt, quinimò inhumani nonnunquam cruciatu invadebant, ut pars veluti terebra perforari videretur. Tandem tamen cessarunt, copiosis erumpentibus flatibus, & primò evacuationes fecum alui inquantum, bubularum consistentia, inde excretionem copiosæ pituitæ, crassæ, viscidæ, & glutinis, imò & vitri speciem præ se ferentis. Verum mense elapso rursus dolores iidem recruduerunt, copiosis prægressis eructationibus, ventris murmure pituitæ expuitione & ciborum fastidio, a quibus pariter flatuum & pituitæ ejusdem speciei evacuatione, Clysteribus carminativis, & ex calidis Oleis paratis sollicita liberatus fuit.

At quoniam vires valde labefactæ sunt, & de eorundem recursu gravis metus impendebat, ideo Pat. egregius a nobis præservacionem, & si dolores recurrerent, curationem exposcit.

Ventris dolores quibus per intervalla divexatus fuit vir ille, proprie colici a parte affecta nuncupandi sunt licet Ilei nomine eosdem plerique complexi sint & præsertim Diocles Carilius apud Celsum, Colon enim ut plurimum est pars affecta, unde a Celso *Morbui intestini plenior* fuit nuncupatus. Et quamvis Gal. Medicos reprehendat, ut populares, qui vehementissimos quosque dolores in qualibet parte abdominis. Colo adscribunt, nobis tamen sum. moperè placet loquendi formula. Avic. dicentis. *Et in Colo quidem intestino accidit colica, secundum phlogismum.* Mox subdit *Et colica quidem secundum veritatem habet suam causam in intestinis grossis.*

Quare ut colicus dolor dici mereatur, facit, in crassis intestinis excitari, prout iliacus in tenuioribus, licet nostro casu proprie & exacte colicus appellandus sit, cum in intestino Colo fuerit. Sy. ptoma equidem in actione Animalis Tactrice depravate læsa in quo, quoniam ob dolores intestina in sese contrahuntur, aliud in excretis præter naturam immo, dicitur retentis sequitur. Et quidem colicum nobis manifeste demonstrant qualitas doloris terebrantis, & palo infixo similis, nec non sedes ejusdem, Colon scilicet intestinum, a dextra parte in sinistram exportecium, ac protensum. Et licet adeo Nephritico humilis sit ut Gal. in semet ipso fuerit deceptus, lapidem in vetre sibi concludi existimans, cum tamen clystere ex oleo rutaceo injecto vitream Praxagoræ pituitam excreverit, & liberatus fuerit, attamen colicus dolor multò atrocior est nephritico, prout & illius symptomata, nausea scilicet vomitus, & alui stypticitas, sæviora quam Nephritici. Sequentia quoque colicum dolorem testantur, cum flatibus erumpentibus & vitrea pituita evacuata cessaverit, prout in nephritico, arenosa in urinis subsidentia, quæ ex eodem Gal. omnem quæstionem dirimit.

De causa non est quod dubitemus, morbum enim ostendit sanatio. Fuit igitur pituita vitrea copiosis flatibus immixta, quorum causa tactus, pruritus, pituitæ vomitus, nausea & dolores præcesserunt. Hanc autem semper produxit & fovit vicus ratio, pituitæ generandæ opportuna, crassiorum nempe ciborum usus, vini crassæ substantiæ potus, vita sedentaria ætas quoque, temperamentum, corporis habitus, & tandem anni tempus, quæ omnia pituitosi etiam humoris præsentiam confirmant. Hinc dolor plurimum gravans, licet ob flatuum cum pituita multationem, quandoque etiam distendens, & vehementius divellens, cum in inflatione, & rugitibus evaderet, prægresso fructuum fugacium usu, & copioso multo potu. Neque de flatibus dubitandum, cum excrementorum flatulentorum inquantum, & copiosæ eorundem evacuationis per alvum certissima habeamus indicia quos tamen flatus, non inter intestinorum tunicas, sed in eorum cavitate concludi credendum lethalibus fere alioquin torminibus & cruciatibus futuris. Neque cū aliquibus mirari subit, tantâ dari in viventi corpore frigiditatem, ut inde vitrea pituita acti & potentia



frigida procreari queat. Etenim cum humor sit maximè crudus, destituitur à natura, atque à proximo resolvente calore, magisque in dies crassescit, donec crassissimus, adeoque caloris non capax, frigidus evadat. Verùm non possibile solum, sed & necessarium omnino, frigidam pituitam colicos dolores excitare, hancque vel ut humidam, vel ut frigidam: non ut humidam, ex ipso Gal. ergo ut frigidam: vehementissimi namque dolores ab activis qualitatibus pendent. Neque quis credat, huiusmodi dolores, fieri posse à frigida intestinorum intemperie: non enim tam citò sedarentur: neque pituita per alvum excreta cessaret.

Hinc autem affectus magnus est ratione essentia, unde quidam coli dolore vexati, animi deliquio extincti sunt, aut se ipsos interfecerunt, ut narrat. Gal. cui quandoque etiam Iliaca passio supervenire solet; quinimò & Hydrops sicca, & nonnunquam etiam in Paralylin & Arthritidem, si humores tenues fuerint, desinit. Neque in nostro Sene periculo vacat, cum vires magnopere prosterant, unde facilis sit in Lipothymiam lapsus. Quare ut hanc prævertat, auxilium implorat.

Pro præservatione itaque præmissa, accommodata primarum viarum expiatione, totoque venoso genere cruditatibus expedito, frigida & humida ventriculi atque intestinorum intemperies corrigenda eademque partes roboranda.

In quem finem efficax fuerit Aqua Tettuciana, quinque vicibus exhibenda. Inde paratur decoctum in iure Galli antiquioris, Medulla Guaj. Ligno lentisc. & Sassafr. alteratum, cui præmittatur bolus ex Mithrid. confect. & Sale Menthae, quibus 30. diebus assumptis, ad Thermas Apononienses Pat. deducendus, ut sulphureas eas Aqu. 12. aut 15. diebus hauriat, dejectiones potissimum, quæ tamen postremis diebus etiam diureticae prodesse. Tandem magna Antidota in usum revocet iterum aut tertio, qualibet hebdomada, obesum enim totum corpus calida & sicca medicamenta facile tolerat.

At si fortasse, his non sufficientibus, recrudesceret affectio, curatio duplex esse poterit. Coacta scilicet & regularis. Coacta locum habet atrocissimis urgentibus doloribus, Anodynis, imò & Narcoticis perficienda, unde Gal. ait, *licet ego omnium maxime ab usu graviter sopientium abhorream, ea tamen in colico vehementissimo exhibeo.* Quod repetit his verbis cogente dolore stupefacientibus necessario utor. Ad quæ tamen deveniendum non est, nisi post alia medicamenta incassum adhibita: *Dolores enim sedant, sed dispositiones non sanant.* Hinc Aëtius considerat stupefacientia calidis humoribus magis conferre, frigidis vero nocere, quia illos cogunt, atque incrassant, & valdè refrigerant. Ita Trall. & Paul. scripserunt, quod à stupefacientibus humor frigidus crassior & ad motum ineptior evadit, intestinorum tunicæ densiores redduntur, & tandem aucta dispositione prorogant morbum. Quare nobis Anodynis utendum, missis quoad fieri poterit Narcoticis. Anodyna autem sunt interna & externa. Inter interna jus pingue cum gutt. olei Chamæ. habetur pro secreto. Oleum item Amygd.

amar. oleum de Lino. Clysteres ex decoct. chamæ. Anethi, Meli. Pariet. addito oleo chamæ. & Vitellis ovorum. Inter externa oleum Amygd. chamæ. Lil. alb. pinguedines, o. nenta suilla, Vitulina, jam dictis oleis imbuta, & ex Trallian. fomenta magna spongia valde laxantia.

His non sufficientibus, mitiora quoque Narcotica usurpanda, intrinsecus & extrinsecus. Intrinsecus Ther. rec. Nepenth. Querc. & Phil. Rom. insignis in hoc affectu prærogativa. Per sedem quoque injici poterit ol. Amygd. in quo Phil. Rom. rec. ad 3ij. fuerit dissolutum. Post horum autem usum, jubet Gal. ut noxa calidis emendetur. Quare infundatur clyster vel ex oleo Rutaceo, vel ex vino Cretico aut Hispanico. Extrinsecus Viri celebres secreti loco habent gelidam aquam affatam ventri affusam, quod tamen Hippocrati debent, nam frigida largè affusa corpori inducta dolorem solvit.

Legitima vero atque regularis curatio causæ ablationem spectat. Quare omnium primò occlusio auferenda, alvum molliendo, & fæces laxando. Secundò pituita educenda. Tertiò status discutiendi. Quartò intestina calefacienda, & roboranda.

A clysteribus autem medela exordienda, ita paratis.

℞. Decoct. malv. mercurial. flor. Chamæ. Pariet. Betar. ℞ j. mell. ros. ol. Chamæ. an. 3 iij. Vitell. ov. nu. ij. sine sale m. pro clyst. cui si non succedat evacuatio, repetatur alius ex solis oleis, aut Amygd. aut Chamæ. addito butyro rec. quem detineat Pat. tota nocte, aut die, appositis interim extrinsecus aliis emollientibus. Quod si nulla facum evacuatio sequatur, leniens aliquod præbendum; quoniam vero plura lenientia sæpe frustra exhibita fuisse vidimus; Ideo tutissimum medicamentum, pluries a nobis expertum, Mannam pinguem proponimus, ad 3v. in iure cinnam. alterato dissolutam, suam namque pinguedine, humectatione & partium subtilitate, laxat, penetrat, & fæces emolliendo expellit, cui si fortè alvus non cedat, exhibeatur oleum Amygdal. ab 3viij. usque ad integram libram.

Expedito intestino facibus, pituita tenax est præparanda mell. ros. sol. simp. & oxym. addita aqua Vitæ, Anis. aut Juniper. vel etiam Aqua cinnam. Præparata vero evacuetur hiera picra Gal. ad 3ij. cum Elect. lenit. rec. Quod si interim alvus rursus suppressa fuerit, tale præbeatur medicamentum.

℞. Elect. Diaphan. 3ß. Spec. hieræ simpl. 3 ij. Philon. Rom. 3ß. M. F. b. sedato namque dolore, melius & facilius laxantur intestina, & excrementa ejiciuntur. Quod si persistat affectio, repetenda erit præparatio, hoc modo.

℞. Decoct. Veronicæ a Cratone commendatæ, menthae virid. ab Aëtio, Rad. Imper. t. 3v. Olei Zedoar. gutt. v. m. pro syrup. Zedoaria, namque adversus vitream pituitam potentissima est. Inde validioribus repetatur purgatio, quicquid dicant magni viri, his enim uti licet sedato aliquantisper dolore, minorata materia, eademque satis præparata. Quare præbeatur essentia Troch. Alhand. vel spir. Vitæ aureus Rulandi, quæ si præsto non fuerint.

℞. Elect. Diaphan. 3ij. pilul. Aleph. 3j.



Trochisc. Alhandal. Castor. an. gr. iij. M. F. b.

Tertia intentio erat statuum discussio. Sic cucurbitula apud Gal. cum multa flamma umbilico admodum, veluti incantamentum status discutiens, dolores momento temporis sedavit, quæ tamen efficacius operatur, si antequam applicetur, in vinum malvaticum calidum immittatur, vel succo allii crudi intrinsecus illinatur. Per os cuminum commendat Aëtius à 5j. ad ij. in Vino Cretico, oleum cumini, oleum Croci. Ole. e floribus Chamæm. per destill. è baccis item Junip. aut lauri ad aliquot guttulas in jure. Potentissima est tinctura cort. Aurant. spiritu vini extracta. Allium quoque ab aliquibus commendatur exemplo illius Rustici, qui solius Allii esu, & mero meraciori à colica frigida seipsum liberavit, quod propterea à Cælio Rhodigino Theriaca Rusticorum fuit appellatum, ejusdem efficaciz in illis, ac in nobis Theriaca.

Tandem ventriculo & intestinis aliquod robur conciliandum usu vini absinth. vel Aq. vitæ Juniper. Valet præterea Zinziber conditum, Amygd. amaræ, totulæ ex oleo de citro, Anisor. Caryophyl. Extrinsecus, umbilicus inungatur Zibetto cum oleo nucis Mirist. vel Balsamo Galbani Terebinthinato, nec non oleo de Baccis Juniper. A proprietate juventia non sunt spernenda, præsertim a Viris fide dignis experta. Sic à Gal. commendantur Cicadæ tres cum pipere ana, cui subscripsit quoque Aët. Mirabilis habetur lapis Hystricis, Aqu. chamæm. dissolutus, sed omnibus præcellit stercus lupinum de quo mirabilia refert Gal. hoc enim narrat se vidisse non solum sanatos, sed colicæ quoque obnoxios præservatos, datur autem potu, in vino albo, & potissimum in colica frigida, quod extollitur quoque ab Aët. Orbi. atque Trall.

Circa victus rationem Trall. laudat panem cum pipere aut cumino, Paulus allium crudum, & porrum pro agrestibus. Zinziber conditum plurimum pollet, jejuno ventriculo commansum; quandoque buccella panis Aqua vitæ cum cinam. madefacta. Vinum alb. meracius probat Trall. cui Salsafraz infundere utilissimum fuerit. Abstineat à fructibus, mittat usum ciborum frigidorum, & crassi succi, & corpus in posterum exerceat. Quæ pro salute, & præservatione egregii viri satis. *Job. Raym. Ferris (Consul. & respons. Medicin. Tom. 1. cern. 2.)*

Nob. Juvenis 31. annorum agens, temperamenti totius & Jecoris calidi & sicci, gracilis habitus, longis itineribus assuetus, & venationibus quàm maximè delectatus, quorum causâ comestationibus & compotationibus vini etiam meracioris magnoperè indulgit, cibosque salitos, atque aromatibus conditos in usum habuit, quinque abhinc annis Diarrhæis biliosis æstivo tempore obnoxius fuit, quæ tamen æstate proximè præterita suppressæ (vix enim incipientes statim substituerunt) dolores in imo ventre excitarunt, quibus ingens sitis adjuncta fuit. Quare Pat. ruri degens, absque Medici consilio, cum vini potus sitim & dolorem potius augetet aquam è puteo haultam largius potavit, cujus ope per alvum admodum biliosa copiose dejectans, omni molestia vacavit. Hoc nihilominus ineunte Autumno, iis-

dem doloribus correptus nec cum Medico domestico, eadem die ad consilium accivit, quæ illum inveni de vehementissimis doloribus conquerentem, iisque vesicantibus & lancinantibus cum sit molesta, imo lingua arida, prægressis vigiliis, alvi stypticitate, ac vomitu materiæ crudæ primum, mox amaræ & biliosæ. Obsident autem hi dolores abdomen, transverlim sub jecoris regione usque ad lienem protensi, quorum causa habita hujusmodi fuit consultatio.

Non raro dolores hypochondriaci, præsertim in temperamentis calidis, & siccis, & habitû graciliori, à nobis observantur, colicos æmulantes, quorum Fernellius se primum auctorem prodidit, colicos illegitimos appellans, in Peritonæo, seu membranis sedem habentes, quod tamen cum aliis pluribus callidis deprompsit ab Hipp. qui in Coacis hæc habet. *Quibus dolores hypochondriorum, Hepatis, & partium circumstantium, hæc, si sanguis excernatur, sanantur, sicut, moriuntur, quia melius est inflammationis.* Nostro tamen casu hujus conditionis non sunt dolores Nob. hunc Juvenem affligentes, insistant enim Coli intestini regionem, suntque terebrantes, & p. lo infixo similes, vomitibus & alvi stypticitate stipati, qui propterea dubio procul colici statuendi. Neque Nephritici ullo modo censerî possunt, cum is vehementiores sint, neque ad inguina unquam oblique protendantur, ut Nephritici, neque ulla alteratio, aut læsio in mictione observetur, quæ Nephritici laborant, ad eam frequentius sollicitati, & quidem parciore urinz, ejusque ab initio valde tenuis, & ferè aquosæ, in progressu verò crassæ & turbidæ. Multo minus de Iliacis dubitari potest, quos comitari solet vomitus assiduus & vehemens, potus incontinentia, & tormina in superiori parte, atque Ilei regione.

De causa autem apud vulgares Medicos dubitari posset, falso credentes, colicos dolores ab humore frigido ferè semper pendere, cum tamen a calido frequentissime hiant, ut contra illos Trall. exclamat. Quod observavit quoque Gal. in illo quadragenario, cui prius, tum intrinsecus, tum extrinsecus adhibita fuerant calida remedia, fomenta nimirum, Cataplasmata, clysteres cum oleo Rutaceo, Castoreum, & mel coctum cum pipere, ex quibus cum deterior semper habuisset Pat. cognovit biliosos & acres humores esse expurgandos, ut sanitati restitueretur, quod spatium dierum succedit. Verum, quoniam Ars conjecturalis est, experimenti causa, alimentum prius ægre concoctionis, & corruptionis exhibuit, quia forsitan & ipse Collegas Medicos metuebat, cum alias solus ab insitio accersitus, illicò tutam & certam conjecturam fecerit de morbi causa calida, & acri, quam etiam Hiera exhibita statim superavit.

Calida itaque causa certò statuenda, primò enim hanc attestantur calidum & siccum Jecoris temperamentum, & habitus gracilis, secundo vita prægressa exercitiis immodicis dedita, comestationibus, compotationibus, vini meracioris, cibis calidis atque aromatibus assueta, tertio Diarrhææ biliosæ, tot abhinc annis consuetæ, & hoc anno tandem suppressæ, quibus hujusmodi dolores successerunt, denique pute-



lis aqua inconsulto epota, quâ illi omnino sedati sunt. Quibus accedunt quoque vomitus, biliosus, oris amaritudo, sitis cum linguae ariditate, atque prægressæ vigiliæ, hoc idem certo indicio confirmantes.

Quare certi ideæ morbi, atque causarum, certa quoque erit salutis spes, statim a Medicis auxiliis petenda, cum urgeat affectus, neque ferre possit inducias, dolor enim acutissimus est, atque immanis, qui Pat. aliquando præ animi deliquio intererit, aliquando vero ad mortem sibi inferendam compulit. Præterea nostro casu inflammatio, & Iliaca passio peritescenda non sine metu pariter abscessus, in quem colicam migrasse vidit Gulielmus Fabricius.

Statim itaque cura regularis aggredienda, nisi obster doloris vehementia, tunc enim *noxa aliqua potius ex Narcoticis medicamentis, quam mors eligenda, crudelis enim hominis officium facit Medicus ille, qui una cum morbo vitam quoque homini auferit.*

Ideo si dolor aut vires valde prosterant, aut subeat naturam causæ morbum augentis, aut novi imminantis suspicionem præbeat, Anodynis propriis primò, deinde etiam impropriis Narcoticis scil. utendum. Anodyna propria intrinsecus erunt, Jus Althææ, Malvæ, & Flor. Chamæ. Oleum Amygd. sine igne extractum. Clysteres ex decoct. Malvæ, Melil. Chamæ. cum vitellis ovorum, ex oleis quoque Amygd. & Chamæ. Extrinsecus vero omenta suilla, vitulina jam dictis oleis imbuta, fomenta cum Trall. ex fol. Malv. Chamæ. Anethi, Melil. Rad. Alth. Lil. alb. sem. lini, Farnugr. in aqua communi.

Quibus non sufficientibus, ad Narcotica, audacius in causa calida, quam in frigida, ex Aëtio progredi possumus, interius & exterius. Interna erunt emulsio sem. papav. albi, Syr. de papav. Nepenth. Querc. & Philon. recens, Clyster quoque injici poterit ex decoct. hyoscyami, & papav. addito oleo Nenuph.

Quamprimum autem ad curam regularem properandum, refrigerando, & biliosos succos evacuando, unde Paulus narrat Medicum quendam Siculum omnes dolores colicos refrigerantibus curasse, fereque omnes sanasse.

Quod si in fonte Chirurgico, de sanguinis missione verba faciamus, quatuor potissimum casibus convenire videtur. Primò quidem in affectu inflammatorio. Secundò præsentē febre. Tertiò si colicæ ictericia superveniat. Quartò si in contumaci & diuturno dolore copiosum calidorum humorum affluxum metuamus, quæ conditiones cum absint à nostro Pat. omittenda ideo quælibet sanguinis detractio.

Ex Pharmaceutico fonte depromenda remedia per os assumenda, per sedem injicienda, & extrinsecus applicanda. In hac verò colica calida Aëtius vomitum provocat copiosâ Aqua tepida, nos autem jure Pulla copioso tepido. Medicamentum deinde per os exhibendum, quod humorum acrimoniam demulcere, & ventrem laxare possit, quod egregie præstare potest cassia ad ʒx. vel xii. cui superbiat serum cap. aut Asin. ad lb. ij. Et licet Gal. Colicam à mordacibus succis statim lue-

ra picra sanaverit, ego tamen hiera uti nunquam ausus fui antè humorum contemperacionem. Quare hodie Cassia erit exhibenda, & nocte sequenti clyster injiciendus, ex Lactè, & Flor. Cass. ad humores contemperandos. In quem finem quoque Gal. quendam colicam patientem, ætatis tempore, sicciosum, solo aquæ frigida potu sanavit, cui subscripsit quoque Aëtius, quorum exemplo ego quoque Veneris medicinam faciens, sæpius in colicis passionibus felicissimo successu gelidani propinavi. Attemperati humores expurgari poterunt eadem hiera picra, hoc pacto.

ʒ. Flor. Cass. rec. ʒj. Hieræ picræ ʒj. M. F. b. à quibus horâ exactâ hauriantur Seri Asin. depur. lb. ij. aut iij. quod Serum sequentibus quoque diebus, matutinis horis erit exhibendum & Clyst. ex Lactè, Butyro, vel ung. Malv. parati injiciendi.

A doloribus autem Pat. liberato, quod paucis diebus futurum spero, diathesis illa, & prava intestini dispositio erit auferenda, jecorisque calida intemperies corrigenda. Quare statim Aquas acidulas Villenses pluribus diebus, cum vehiculo dejectorio syr. ros. sol. præberem, clysteribus interim ex Flore Cassiæ eadem Aqua Villensi dissoluto injectis.

Extrinsecus quoque refrigerantia, sed laxantia conveniunt, intestinis enim laborantibus, ab adstringentibus abstinendum. Quare illuminatur venter Oleo Viol. Nenuph. Amygd. Ung. Malv. & in fine quoque Rosaceo. Nonnulli magni Viri linteum commendant frigida aqua madefactum, & ventri appositum, quod tamen soluta alvo, & sæcibus laxatis, atque evacuatis tutius fieri poterit.

His omnibus aliqua à proprietate juvantia non inutiliter addi possunt. Sic Galerita rosta & comesta dolores sedat, sed & elixa repetita, quam approbat quoque Aëtius, & cuius cinerem ad cochlearia duo exhibet Trall. Lupi quoque intestinum optimum, cum Cornu Cerv. ex Avic. & Rhafi. Ego verò quandoque exhibui cinerem Gammarorum, Astacorum, ad cochlear. & quidem cum juvamento. Extrinsecus extollit Gal. sterus lupinum inguinibus appensum, vinculo facto ex pelle Cervina. Neque hæc, ait ipse Gal. sunt barbara præstigia, sed sunt substantiæ, quas alias operari sum expertus, quod & à Sexto Empirico confirmatur Avic. verò laudat intestinum Lupi eodem modo alligatum.

Circa victus rationem, primo vino omnino omisso, Aqua putealis bibenda. Cibus sit Præfana sine Sale, Lactuca quoque decocta, poma pariter cocta. Ab aceto cum Avic. prorsus abstinendum, intestinis infesto. Neque media Pat. præscribenda, sed parum, & sæpe potius cibus exhibendus, causa namque biliosa est, temperamentum calidum siccum, habitus gracilis, & pluries quotidie cibus assumendis est assuetus. Quæ pro curatione hujus affectus in confirmationem eorum, quæ à Sapientiss. Viris adducta fuere dicta satis, hoc solum addito, quod ut prævertatur Diarrhæa biliosa, ad usum sit revocanda semel singulo mense Pilula ex Aloë ad ʒj. sub cibi tempore assumpta. *Johann. Raym. Fortis Consulti. & respons. Medicin. Tom. 1. Cent. 2.*



Serenissima Matrona annum agens trigessimum secundum, temperamentum totius calidi & siccī, teruidioris jecoris, habitus gracilis, ad operationes promptissima, arthriticis & podagricis doloribus obnoxia, cruditatibus temper scitens; post intermissum ludendi exercitium, necnon viperini juris usum, incidit jam bis in colicos gravissimos dolores, a quibus ratio, qua præservari possit à te, Vir præstantissime, queritur.

Si arthriticos seu podagricos dolores Dysenteria superveniens solvit, ut in Prothet. testatus est Hipp. qui asseruit & in Epidem. idem contingere à doloribus colicis supervenientibus, pro certo quoque habendum, non à solo capite, ut credidit Iernelius, sed à venoso genere etiam Podagram originem ducere, eamque non tantum à bile & pituita commotis, verum & à sanguine, à bile, & pituita corrupto, ut distinguebat Hippoc. libro de affectionibus. Et licet effectus hujusmodi per mercurialem fieri ab omnibus Medicis scriptoribus ac Professoribus creditum fuerit, hoc tamen non nisi improprie asseri potest: per deductionem enim live diversionem proprius ille fieri dicendum existimo; siquidem materia in venoso genere collecta, quæ ad articulos ruere jam inceperat, dum ad intestina motum & impetum sumit, ab articulis ipsis divertitur, jam ad eosdem transmissa resolvitur, sicque dolores podagrici cedunt; non autem cedunt, mercuriali facta ejusdem humoris in articulis actu dolores excitantis, quod facile quoque confirmare potest quandoque humoris paucitas in articulo exilis, copiosa vero ejusdem sarcina per Dysenteriam ipsam excreta, necnon in colicis, medicamentis & clysteribus ab intestinis educita, quod idem contingit in Sereniss. Duce, dum cruditates in ventriculo genitæ, bili à fervido jecore productæ, associatæ, & in venis collectæ, non amplius ad articulos transmissæ, sed ad centrum & intestina conversæ, & in istis detentæ, crassæfactæ, ac magnæ ex parte in halitus conversæ, intestina ipsa, & Colon præsertim distendentes, continui solutionem, & per consequens colicos dolores quandoque excitant.

Ventriculus autem in casu nostro potissimum est accendendus, qui non adeo validus naturaliter existens, imbecillior redditur, & ad perfectam Chylisum magis ignavus, dum à perpetuis applicationibus, & gravioribus curis in bene regendo calor ejusdem ad caput divertitur, unde cruditates: sicut ab animi motibus jecur, natura calidius, magis magisque fervet, unde bilioli humoris proventus; qui humores antehac ad manus advocabantur, mediante illarum frequenti motu, quo intermisso, ad intestina tanquam ad locum ignobiliorem, magisque confertentem transmissi, neque excreti, colicos dolores, modo jam dicto, & forsitan acutiores ob bilis missionem, nonnumquam produxerunt.

Quibus ita se habentibus, in promptum est præservationis ratio: curandum enim ne hujusmodi excrementa regenerentur. Secundo, ut genita cito & frequenter per alvum ejiciantur, quæ præstanda erunt, Ventriculū roborando; Jecoris fervorem quodammodo con-

temperando; Juges cruditates frequenter evacuando; & venosum genus, si opus fuerit, purificando: ita enim Serenissimam & à colicis, & ab arthriticis doloribus præservari posse sperandum, absque eo quod peccantes humores ab hac vel illa parte divertantur.

Et quoniam venosi generis status jam ab Excellentissimo Viro fuit Saphenz sectione exploratus, non valde pravus, ideo si libuerit, intermedio inter utramque menstruam purgationem tempore vena superior dexteri brachii magis apparens aperiri poterit; parca tamen, & non nisi ad uncias quatuor sanguinem mittendo, ut major adhuc certitudo de qualitate sanguinis habeatur, siquidem medicamentorum purgantium administrandorum norma esse debet. Et si manus articuli non adeo expedite moveantur, optima erit frequens lotio & immerio in lixivo dulci radicibus althææ alterato.

Quod si Pharmaceutica remedia considerentur, cum jam primæ viæ, ut ex relatione habeo, fuerint expedite, aquas Lettucianas propositas approbo, cautissime tamen cum veniculo dejectionis administrandas, & dimittendas, ne portio earundem vel minima ad urinæ vias deferatur. Inde ad aliquod electivè purgans deveniri poterit, præmissa tamen aliquâ præparatione & earum dispositione; in quem nem Julapij acet. usus, corticibus citri aromatiz. cui succedat potus aquæ stillat. cichor. & agrim. proderit; imò si à aqua observetur in hypochondris obstructio, eidem aquæ grana Tartari vitriol. addi poterunt. Purgans autem erit pilula de tribus & aggregat. simul mista, addito Fiore Cassiæ ad pilul. calorem temperandum, quibus post horam superbibat quoque cyathum aquæ Nocerranz aut hordeaceæ, & tribus horis ab assumpta aqua prandeat; quod repeti poterit, habita sanguinis jam educi ratione, & in progressu aqua stillat. cichor. endiv. aut borag. vice agrimoniz, addenda fuerit.

Quoniam verò melius est medicamentum expertum non experto, ut monebat Avic. ideo ad jus pulli, viperis nutriti, duci poterit Sereniss. Dux; quod pronum magis erit, si optimæ chinæ portio eidem addatur. Verum quia Æstate & Hyeme jam dicta excrementa colligi solent, sicut Vere & Autumno moventur, ut observabat Hipp. ideo ineunte Vere & in Æstatis fine, vinum medicatum solutivum, xxx. saltem diebus assumendum consulo; ut dolores utriusque generis arceantur; cujus descriptio Serenissimæ adaptata talis erit.

℞. Chinæ opt. inc. ℥ ij. radic. caryophyllatz ℥ ss. baccarum juniperi manip. β. lentisci & chio ℥ j. hermodactylorum ℥ i. turbith. elect. ℥ j. fol. senæ rec. mund. ℥ iv. Rad. polypodii ℥ iij. cinnam. integri ℥ iij. cortic. citri rec. pug. j. vini nigri pro mensa consueti syclum, sive situlam unam, reponantur omnia in vase ligneo, & transacta hebdomoda potari incipiatur, sique primus cyathus in mensa, tum in cena. Hujus autem usum præcedere debet tantum unica potio ex man. clarif. citra ullam aliam viarum aut corporis expiationem.

Nec interim vinum medicatum alterans reliquo tempore improbo, china, santalo, &



lentisco, sive ligno rosis marini parandum. Ventriculo robur quoque addere poterunt duo aut tria grana mastiches, statim ab assumpto cibo integra devorata.

Jam dictis omnibus cautior erit addenda vivendi ratio, & præsertim in applicationibus, quarum urgentiores & majoris momenti mane jejuno ventriculo sunt exercenda; reliqua vero ad hunc fontem attinentia, a viro Excellentiss. Adstanti relinquo præscribenda, dum sanitatem inculpatam a Deo serenissimæ ac prudentissimæ Duci ex corde precor. *Joh. Rayman. Fortis consulti. & resp. Medecin. Tom. 2. Cent. 3.*

Nephriticis doloribus jam diu torqueri Comit. Illustrissimum asserunt in relatione Præclarissimi viri, quibus & ego subscribo, quoniam ex Gal. & Hipp. *si in urinis arena subsideant, tollitur omnis questio.* Minor tamen quod in repetitis hujuscemodi doloribus nunquam calculus ejectus fuerit observatus. Colicis item passionibus obnoxiam fuisse a viris iisdem recipio, quoniam excrementa pituitosa & crassa, & viscida non semel excreta visa fuere. Verum tamen est quod inter colicos & nephriticos dolores tanta intercedit similitudo, & affinitas, ut exercitatos quoque viros sæpe decipiat, & Galenum in semetipso semel decepit. Illi quoque superadditi fuere cruciatus, & non semel sed pluries, unum continetur in relatione, utque & situs, & doloris qualitas, & facilis ventriculi consensus, cum actionibus læsis atrestari potuerant, & isti tamen sine evidenti vita consuetudo discrimine. Quamvis autem omnibus jam recensitis affectibus omnia jam dicta symptomata communia esse soleant: quia tamen aliquod peculiare, & pathognomonicum unusquisque sibi habere consuevit, quod a viris Præstantissimis observatum certo fuerit, idcirco isde n de omnibus plena fides habetur; sicut plenissima de jecoris præsertim & reliquorum viscerum obstructionibus, quamvis hucusque totius corporis nutritio illæsa servata fuerit.

Horum verò omnium causa materialis, cruditates fuerunt, non tantum a viscerum dyscrasia & imbecillitate, verum multo magis ab improprietatis objectis generata, quæ in vasis partium stagnantes obstructiones produxerunt, a jecoris & aliarum partium calore ex clausuris adaucto facile exsiccant, quæ ideo medicamentis non adeo facile cesserunt, eoque difficilius, si a vasis, in hepatis etiam carnem aliqua ex parte sese insinnaverint, ut facilius credi potest, si durities & pondus cum aliis symptomatibus considerentur. Nec mirum, si tam diu adeo atrociter perseverantibus malis, & in ventriculo & in intestinis, & in jecore, (ut scriptum fuit) intemperies & imbecillitates introductæ fuerint, naturalis æconomia fuerit subversa, & juges cruditates necessario emergant, a quibus partim in status conversis dolores exacerbantur, partim vero fermentatis, & calorem præter naturam adeptis, febres modò accedentes, modò recedentes excitentur.

Ab hoc statu morbofo prorsus vindicari posse Comit. Illustriss. in sexagenaria ætate constitutum, non adeo facile video; intemperies enim corrigere & visceribus pristinum tonum

restituere ac robur addere non licet nisi prius organico morbo ablato, & interim Quibus circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neque medicamentis, neque aliter solvuntur, in hydropem siccam firmantur, eoque facilius, cum multo abhinc tempore hypochondriaci fuerint, ex quo cum Gal. intemperies habituales colligere licet. Attamen quoniam hucusque coacta potius, quam regularis curatio præstita fuit: ideo novissime propositæ a præclariss. Viris, magnopere hære possumus, cui ego quid addam, aut parum, aut nihil habeo, dum & ego propositis intentionibus recte ordine satisfaciendum esse exillimo, primas vias expiando, mesenterii & cavæ jecoris partis, deinde gibbæ obstructiones aperiendo: mox renes & vasa urinaria mundando, atque subinde intemperies corrigendo, & tandem visceribus robur addendo.

Quibus ut satisfacimus, aliquam sanguinis reductionem non omittērem, prius tamen primis viis expeditis, & obstructionibus quoque pacto immunitis, soluta jecoraria dextra, ad caloris ventilationem, & sanguinis qualitatem explorandam, quo tunc parca, & non sine Medici præsentia erit facienda ejusdem sanguinis missio; clysteres quoque modo evacuantis modo episcratici non omittendi, nec pedum lotiones, aut frictiones prorsus deferendæ.

A fonte Pharmaceutico reliqua depromenda: sic Leniens primum esse poterit ex manna clariss. cum cremore tartari; secunda quoque vice, post prima præparantia repetenda; quæ adhuc a Viris Excellentiss. utiliter exhibitæ fuit. Inde oxymel, cortic. citri aromatizatum, parandum erit, & ad ℥ij. exhibendum, totidem aquæ flor. citri simul mixtis. Inde ad secundam præparationem & ad obstructionum resolutionem deveniērem, & a valde caloricis abstinērem, succisquæ uteretur depuratis & per arenam trajectis, end. cich. & borag. in jure pul. cichoraceis alterato, in quo dissolvantur quoque grana decem tartari vitriolati: ita transactis septem diebus, medicamentum ex cassia, lenit. & pil. de tribus, compositum exhiberem, superbibendo jus tenue maluis alteratum. Inde aqua Tetruciana tuto propinari poterit cum vehiculo manna clarificata, & mellis rosatisolutivi, quæ tribus, quatuor, & quinque quoque vicibus erit repetenda, incipiendo a lib. v. usque ad vi. sat enim erunt expeditæ viæ pro ejusdem aquæ transitu, cum perpendiculariter a ventriculo per intestina procul a jecore ad alium ducantur. Observandus tamen diligenter earum transitus per alium; sicuti & eodem tempore observanda urinx: namque si aquæ portio in urina observetur, ab exhibitione desistendum, vel sequenti vice vehiculum adaugendum. Inde ad jecoris cavam aperiendam deveniendum, quam rite præstare poterit rhabarbari usus, ut quoddam aperire, visceribus amicum, roborare valeat. Hoc autem in substantia, primis vicibus pro cava, in progressu verò, in infusione pro gibba parte referenda exhiberi solet. Præbeatur igitur ad semidrachmam cum pass. aut flor. cass. drachmis duabus immistum, cui superbibat jus pul. endivia & malua alteratum, in cujus usu octo aut decem diebus insistat, mox medi-



medicamentum repetat ex cassia; lenic. & pilulis de tribus confitutum.

Post hæc gibba ejusdem jecoris aperientibus respicienda, in quem finem attisit mihi semper syrupus Ierneliano modo paratus, cujus dosis erit ad ℥ij. in exiguo vino albo dissolutus; absente febre, qua presente dissolvatur in pure endivia alterato; præbeatur autem alternis diebus decem aut duodecim vicibus, & diebus intermediis offeratur cyathus aquæ stillat. cich. & agrimi in qua dissoluta fuerint grana xij. salis tartari volatiliz. & præmittatur bolus ex semisrupulo extracti rhubarb. tart. vitriolati, & salis viperini. Descriptio syrupi Ierneliani talis erit.

℥. Radic. cich. petroselinii, sceniculi, caprarum, polypodii querc. sem. cartami an. ℥ss. foliorum hyssopi, prassii albi, origani, agrio-niz, ceterach, cuscutz, adiantum an. m. j. tenuin. anis. sceniculi an. ℥ij. endiv. melonum an. unc. ss. aquæ grm. ℥ss. m. bulliant ad consumptionem tertiam, in colatura poltea infunde per horas xij. foliorum senz mundat. ℥iv. agarici albi ℥ij. epitylimi ℥ss. gingiberis ℥ij. poltea bulliant parum; & expressioni adde sacchari albi ℥ss. bull. ad syr. consistentiam, deinde adde Rhab. in petra alligati ℥ss. & servetur ad usum.

Quod si fortasse hypochondriorum calor non adeo facile syrupi Iernel. usum tolerare potuerit, tunc hora transacta, superbibenda præbeatur, post assumptum syrupum, seri caprini destill. ℥ss.

Quibus peractis, de ventriculi & jecoris roboratione, & nativi caloris refectione cogitari poterit; & ad hæc præstanda opportunissimum erit jus chinæ a Viris Præstantiss. propositum, cui addi poterit portio ligni nephriticæ, & portuncula ligni lassatras, cum palumba turricola, aut pernice parandum, eidem præmittendo bolum ex terebinthina nostra ad semi drachmam cum semisrupulo salis absinthii & tartari vitriolati; ita namque una cum viscetum roboratione, renum quoque absterfionem, & ductuum mundificationem providebimus, si quis forsitan adesset retentus calculus; quod Deus avertat.

Pro sedandis tandem doloribus, præter infusiones, illutiones, omentorum animalium oleis umbilicorum appositiones; præter levium Narcoticorum usum, decoctionem scilicet papaveris, syrup. de papavere, Laudanum Nep. Quercetani magnopere conferre, & ut usum impune duci poterit clyster ex lacte vaccino, vel ex oleo amygdalino; in quibus dissoluta fuerit drachma philomi Romani recentis; duarum enim horarum spatio prorsus sedabuntur dolores, & conciliabitur somnus, quem tamen clysterem præterito jam dicto tempore excernere debet Illustriss. Patiens, ne ab illo diu detento caput nimis graveatur.

Quibus omnibus addatur congrua victus ratio a Viris sapientibus præscribenda; sicut reliqua quoque omnia pro vera & legitima curatione Patientis Illustriss. ab iisdem proposita, & à me confirmata sñere Johan. Raym. Foris consult. & Respons. Med. T. 2.

Gothofredus Hildesheimius Francisci Hildesheimii Medici olim celeberrimi ex filio Ne-

pos, supremus rerum capitalium in exercitiis Imperatorio Præfectus, otio & crapula deditus, immani dolore ventris maxime sub umbilico, pali infixi speciem exhibente affligebatur; aliis obferata nihil excernebat, per os quidem pituitosa vomebat, sed sine juvamento.

Passionem colicam à pituita natam ipse dolor & vomitiones pituitosæ indicant.

Dolor pali infixi speciem exhibet, ob violentam tunicarum distensionem.

Alius obstructa est, ob impeditam facultatem in excretionem, propter viarum angustiam à copia pituitæ viscidæ factam.

Ad sunt vomitus, ventriculo per consensum ob communem membrarum affecto.

Sine juvamento, quia materia viscida in intestino colo & tunicis pertinacius hærens, per vomitum, nec facile nec tota rejicitur.

Dolor itaque tamquam principale urgens mitigandus, & causa continuum solvens & dolorem excitans; amovenda.

Ad utrumque scopum consequendum præscripti clysterem ex emollientibus, laxantibus & dolorem lenientibus.

℥. Fol. rut. branc. urfin. mercurial. Parietar. malv. c. toto an. m. j. Flor. chamæz. m. j. melilot. summat. aneth. an. m. ss. Rad. altheæ ℥ss. sem. anet. carvi, bacc. laur. ana ℥ij. coq. ex aq. simpl.

℥. Colatur. ℥x. elect. diacath. bened. laxativ. ana ℥ss. hier. simpl. ℥ij. ol. aneth. rutac. ana ℥ss. sal. gemm. ℥j. M. r. Enema.

Ventrem oleo anethino, chamæmelino & rutaceo sapius mungendum præcepi.

Reiecto clystere juleculum ex cremore ptisanæ avenacæ cum paucis saccharo, absterfionis gratia, exhibui. Quievit paululum à somno recruduere dolores, repetivi itaque innunctiones & clysterem.

Cum nihilominus perseveraret dolor, balneum aquæ calidæ in hunc modum adornatum, commendavi.

℥. Herb. origan. calaminthæ, rutæ ana m. j. Flor. chamæmel. m. ij. malv. c. toto m. ss. melilot. m. j. summat. aneth. m. ij. sem. lini ℥ij. tenn. græc. ℥j. aneth. ℥ss. Baccar. Juniper. ℥iij. incisa & conpassata coq. ex l. q. aquæ simplicis; pro balneo.

Ante infusum exhibui Theriacam cum pulvere nieo anti colico.

Hinc dolor sensim remisit: interea de virum languore conquerebatur æger, quarum instaurationi inter cætera optime profuit malvaticum cum mica panis albi.

Ex intervallo trium, quatuorve dierum, ubi dolor ex toto sublatus esset, viresque recuperatæ, ad pleniorē & perfectam humoris pituitosi evacuationem præscripti pilulas phlegmagogas Quercetani, quarum usu ingentem pituitæ copiam rejecit, & sic pristinx sanitati restitutus est.

Cæterum cum recidivam metueret, suasi decocto ligni Guaiaci ad absumendas reliquias & corrigendam intemperiem frigidam, ad tempus uteretur; observatâ convenienti & frugali dieta. Crapulam ante omnia & vitam desidiam ac sedentariam fugeret; corpus quotidie ante prandium & cenam, deambulando, equitando, vel alio quovis exercitio, moderatè moveret,



& ne vitiosi humores iterum cumulerentur, interdum pilulas benedictas, vel phlegmagogas Cratonis, vel aliud scopo huic conveniens medicamentum assumeret. *Baldassar Tamm Respons. Medic. lib. 3.*

Illustrissimus Princeps ac Dominus D. Franciscus Albertus, Dux Saxonie, Angrie, & Westphalie, ætatis consistentis, temperamenti calidi & sicci, Anno M. DC. XXIX. Mense Julio in acutissimos ventris dolores circa coli regionem subsistentes, incidit, cum totius corporis æstu, siti, nausea, vomitionibus biliosis, inquietudine & vigiliis.

Morbum intestini plenioris, quem colicam passionem dicimus, non tantum ab humoribus frigidis, pituitosis, flatulentis, sed etiam calidis, biliosis & acris excitari, vulgò notum est & constat hoc ipsum cum aliorum, tum Illustrissimi Principis exemplo. Is natura calidus & siccus ad acrium & biliosorum humorum productionem cum esset aptissimus, collecta & mota eorundem per tunicas & vasa intestini grandioris copia, facile dolores colicos incurere potuit, adjuvante imprimis & ebullitionem promovente aere externo calido & vini potentioris, cui assueverat, largiore potu.

Totum corpus æstuit ab humorum biliosorum effervescencia, quæ non tantum dolorem in parte affectâ, sed & calorem in toto parit.

Sitis urget, ob humidum, quod calor absorbit, in ventriculo defectum.

Nausea & vomitus biliosi, à concitata, & in ventriculum ex vesiculâ fellis & duodeno intestino effusa bile proveniunt.

Vigilias dolor inducit, quatenus in sensum tactus vehementer agendo sensum quoque communem excitat, quo commoto etiam reliqui sensus excitantur, accidentibus & exhalationibus biliosis, somnum impediunt.

Curatio in doloris lenitione & causæ amotione consistit.

Duos hosce parietes, ut unâ quod dicitur fidelâ dealbare, ordinavi Enema ex anodynâ & biliosos acresque humores evacuantibus.

℞. Herb. Endiv. pariet. Malv. è toto violar. lactuc. ana m. ss. Flor. Chamæ. m. j. sambuc. p. j. summitat. melilot. anethi ana m. ss. Rad. liquirit. rasæ ꝑ. j. Althææ ꝑ. vi. Sem. lini ꝑ. iij. fennicul. ꝑ. i. Coq. ex l. q. aq. simpl. R. colatur. ꝑ. x. Cass. pro Clyster. ꝑ. j. Electuar. diacatholic. ꝑ. iij. Ol. olivar. ꝑ. iij. Chamæ. ꝑ. j. Sal. genim. ꝑ. j. M. F. Enema.

Ventrem oleo violarum & amygdalino dulci repetitum inunxi.

Cum nihilominus continuaret dolor, alium clysterem magis anodynum & abstergentem præscripsi. R. Flor. Chamæ. r. j. Sambuc. viol. ana p. j. pap. Rhead. m. ss. Rad. althææ, liquirit. ana ꝑ. j. Sem. aneth. malvæ ana ꝑ. j. Summitat. aneth. p. j. Coq. ex l. et. dulc. q. l.

℞. Colatur. lbj. Sacch. Thom. ꝑ. j. Vitell. ov. unum. i. M.

Ab usu clysteris exhibui oleum amygdalarum dulcium recentissimè expressum cum jure pulli.

Postquam seniel atque iterum per alvum biliosa excrevisset, dolores magnâ ex parte remittere videbantur. Quare ut cumulati circa primas vias biliosi humores ulterius & plenè

evacuarentur, commendavi vinum passulatum laxativum, singulis vel alternis diebus, pro tolerantiâ bibendum, cujus usus Illustrissimo principi adeo salutaris fuit, ut non tantum ab acutissimis doloribus, sed & aliis symptomatibus, ardore scilicet ventriculi, oris perpetuâ siccitate, & siti, quibuscum antehac subindè conflictatus fuerat, perfectè liberaretur. *Baldassar Tamm Respons. Medic. lib. 3.*

Vir triginta circiter annorum, temperamento calido & sicco præditus, macilentus, & staturæ oblongioris, leg. Dietæ non adeo observare solitus, sed potius appetitui indulgens, cibis delectabatur partim calidis, bilem quæ adaugentibus, partim quoque flatulentis, lapiusque cerevisiam minus defæcatam, vinumque paulò liberalius ingurgitabat. Hinc quandoque adstringi alvus ita cæperat, ut per aliquot dies obserata nihil quicquam excerneret. Ager vero naturæ robori & bonitati, quâ alias gaudebat, hæc committens, de remediis parum cogitavit, hinc permanente adhuc alvi adstrictione, ventris dolores, maxime circa hypochondrium dextrum, & versus umbilicum, oborti, insignem perforationis ejusdem sensum & molestiam excitant, quibus quandoque murrura, & borborygmi, cum ventris inflatione, siti, nausea, & vomitu humoris subamari & visceri per intervalla superveniunt. Doloris itaque acerbitate, metuque mali gravioris indutus Ager Medicum expetit consilium.

Affectus, quo ager præsens laborat, colica est passio, vel dolor colicus, adeoque ex illorum numero, qui nomen à symptomate & parte affectâ habent, monente *Galen. lib. 2. m. cap. 2.* Dolet enim Colon, intestinum crassum, quod *ἡ τρυφή*, à contorquendo & castigando, eo quod doloribus sit maxime obnoxium derivari solet, recensente *Bartholin. Anatom. Reformation. p. 68.* quamquam aliis magis ardeat derivatio *ἡ τρυφή*, quod retardare, remove, prohibere significat, siquidem in hujus intestini cellulis læces alvine retardantur aliquamdiu atque detinentur. Sed mittemus hæc ad Etymologiam pertinentia, remque ipsam potius intuebamur.

Describi potest hæc passio: quod sit tristis sensatio, live aucta p. n. tactus in intestinis, præsertim colô, variaque perceptio, à membranarum & partium nervosarum, in dicto præsertim intestino, continui solutione proveniens. Parec hinc colicum dolorem ad symptomata primæ classis h. e. actionis læsæ pertinere. Nolumus autem eam rem nunc nostram facere, quæ alias, num per actionem depravatam an auctam potius, hæc læsio explicari debeat? Controvertitur: cum quicquid statuatur, defendi, si rectè explicetur, possit, & cæteroquin parum momenti afferre ad curationem videatur.

Esse autem hunc & non alium Affectum, quò noster excrucietur ager, ea quæ in Historia recensentur, haud obscure indicant. Nam ipsa adsunt essentialiter inherentiæ, sensatio scil. tristis, live aucta p. n. variaque in intestinis, & præsertim colo tactus perceptio; quæ duo hujus symptomatis naturam & essentiam potissimum absolvent. Adsunt 2. essentialiter consequentiæ, siquidem Historia refert, præter alvi adstrictionem, etiam ventris murrura & inflationem percipi,



cipi, namque & sitim cum vomitu humoris subamari & vitiosi accessisse. Quod si prægressas examinemus causas tales sane extiterunt, ut ejusmodi passionem haud dunculter producere potuerint, prout postea circa causarum investigationem pluribus ostendetur.

Subiectum nunc, partem affectam quod attinet, partim Ventris in genere sit mentio, partim vero & præsertim Hypochondrii dextri, & umbilici regio, in casu nostro denominatur, ut prout isom obicure pateat, si de parte principaliter affecta sermo instituitur, colon esse, seu superius quoque innuimus; hunc quamvis Colica passio late sumta omnem intestinorum dolorem significet, nostrum tamen ægrum Colico dolore stricte accepto affligi ipsa regio, quam cruciatus hic maximopere occupat & quæ coli dicitur, ostendere potest. Est enim Colon crassorum intestinorum secundum, cæteris multo amplius & latius unde *vicius* quasi, seu cavum aliis dici videtur. Incipit, ut verbis Diemerbroeckii dicam, circa os ilium dextrum, proximo ibidem Reni se jungens, hinc sursum assurgit, & facto sub jecore nexu transversum sub tundo ventriculi (cui mediante omento annectitur) pergit & a sinistris Lieni Renique sinistram tentibus membranis adhæret, usque circa os ilium sinistram, facto flexu, Recti intestini principium orditur.

Quæ situs & contornationis variis distinctæ cellulis ratio in nuncabit utum ut dicto in intestino faeces alunt coacerventur, & usque ad excretionis tempus detineantur. Reliqua, quæ modo recensitis addi possent, apud Anatomicos videantur.

Unde nam verò Æger hoc mali genus patitur inquirere jam imprimis convenit, cum effectus nonnulli remota causa cessare soleat. Ordine ut progrediamur & primo de causa proxima dicamus solutionem continui in membranis, partibusque intestini potissimum coli nervosis non tantactam, quam hientem, superius allata Affectus hujus definitio accusat. Hinc enim augetur p. n. vel depravatur in partibus maxime sensibilibus, illa tactus perceptio, spiritusque in partibus istis hospitantes in varias *ampliationes* vel morduationes adiguntur.

Hanc continui solutionem sub improporcionati objecti schemate produxerunt causæ mediæ, quarum proximiores in *Humores & flatus* rejiciendæ hoc quidem in casu videntur; siquidem non solum bilis sed etiam Pituita glutinosa sed viscida illi permixta symbolum satis evidens conferunt; quam humorum miscellam, Flatum quoque haud infrequentem causam esse statuit Sylv. l. 2. c. 21. §. 9. ipsaque id ratio & experientia confirmant. Hinc quamvis chylificationis in ventriculo vitium primas quali turbas moveat, Bilis tamen aliique humores excrementii ad intestina transmissi potissimum accusandi, quippe qui p. n. intestinis subsistentes, & coacervati particulis suis salino acidis atque glutinosis nervosas intestinorum partes insigni cum cruciatu vellicant; exituque denegato in status resoluti adeo quandoque colon distendunt, ut etiam brachii amplitudinem cavitatis suæ adæquasse observatum fuerit, prout exempla apud *Schenck. l. 3. Obs. de Intest. p. 1. & 4. Præter l. 3. Obs. p. 656* occurrentia testantur.

Quod si jam porro causarum remotiorum instituiamus examen, & eos juxta *duplicem* *reum naturalem, non naturalem, & p. n.* classem consideramus, non parum in lata sententia confirmamur. Nam inter *res naturales* ipsa nobis Historia *Temperamentum* Ægri calidum & siccum s. cholericum ostendit, quod ad evidentem particularem sulphureo salinarum productionem maxime aptum, atque dispositum esse indies experimur. Urne jam dicamus, *habitus corporis* macilentiorum tali temperamento multum debere, præterquam quod *sexus Virilis*, præ muliebri, plerumque hoc malo tragis & frequentius infestari solet. *Res non naturales* quod attinet, patet ex historia affectus, ægrum de legitima *victus ratione* parum fuisse sollicitum qui potius genio suo indulisse, & cibis bilem ac pituit. in adaugentibus statisque generantibus delectatum, *Libero* quoque & *Cereri* strenue litasse jam vero constat, quas Vinum, præsertim recens, & cerevisia minus defæcata excitare turbas & possint & fore. *nt.* Flatuosum omne est multum, ut *Galen. l. 2. de Aliment. facultat. c. 9.* neque insolita res est cerevisiam nimis recentem ventrem inflare, turbare alium, atque intestinorum creare dolores, Vide *Schiz. l. 4. de aliment. facultat. c. 4. p. 1154.* Possemus hæc prolixius deducere, si in Historia morbi observata hæcenus dictæ ratio pauld specialius descripta fuisset. Sed plerumque ægri, quid rei gesserint, Medicam celant; semetipsos potius quam illum decipientes, dumque sanis omnia sana putant, eo facilius mediocritatis, naturæ suæ convenientis leges transgrediuntur. Ad tertiam classem, quæ *res p. n.* comprehendit, accedentes, equidem quibus æger obnoxius morbis fuerit, aut etiam laboraverit, historia non recenset nisi quis forsan illam *alui adstrictionem* quam interdum passus est, eo referre velit, quippe quæ alias tantis non æque accidere solet. Hanc si excipiamus, robur naturæ, quod hæcenus usum fuisse ægrum perhibetur, immere videtur, satis cum bellè, adeoque a morbis, præsertim iis quæ intestinis insidias struunt, plerumque immunem hæcenus vixisse. Silente vero historia, non est ut extra oleas vagemur.

Non destitumur autem propterea rationibus, quibus, deducto nunc causarum examine, symptomata quæ dictus dolor secum traxit, & quorum in casu nostro facia mentio est illustremus. s. enim illa ipsa alui adstrictio & constipatio vix aliunde, quam a viscerum siccitate & materia glutinosa parietibus intestini coli adhærente, commodius deducetur, quandoquidem ipsa ratio dicat, cibos calidos sicciore, imo & crassiores, sicuti coctionem primam valdè turbant, ita in secunda non fieri meliores, sed bilis & pituitæ viscidæ proventum ubique deponere, hincque ad fecum aluminarum duritiem plurimum conferre, præsertim si quis sui curam negligentius gesserit, quod ægrum fecisse ex historia patet. Hinc 1. Dolores ventris præsertim circa coli regionem sunt aborti, eo quod hoc intestinum, seu supra ostendimus, subiecti rationem subeat, hujusque tunicas & membranam interiorem humores biliosi & acres lancinent, ac pituitosi & viscidæ in status resoluti distendant, sicque sol-



solvendo continuitatem cruciatus insignes causentur. *Murmura* interim 3. una percipiuntur, certa statum indicia: siquidem in amplo satis coli spatio modò dicta materia pituitosa glutinosa cum bile juncta, tanto facilius in flatu resolvi, & vagos ventris dolores, quin certa etiam ratione alicubi fixos & terebrantes excitare potest. Subsecuta tamen 4. *Ventris inflatio*, ab excrementorum, quæ externi debebant, durante per aliquot dies retentione; hinc enim flatu ab exitu prohibiti, amplius spatium cum tempore quærentes, Coli cavum non sine molestia distenderunt, & propter hujus intestini ambitum, magnam abdominis regionem irritant. Neque ibi turbæ hæc solum excitatæ, sed 3. etiam *situs* cum *nausea* & subsequente materia subamaræ & viscidæ vomitu supervenerunt, eò quòd talis saburra, in ventriculo æque ac intestino Colo contenta, stomachum quoque irritaret, & præter inductam siccitatem, sitis causam, per consensum excommunicatione Nervorum à sexto pari prodeuntium, ventriculunque & intestina amplectentium, affecto colo, in motus *antrum* una rapuerit.

Quibus ita perpensis juxta ac expositis, quid spei ægro, sanitatem quasi anhelanti superstit, & quale prognosticum, ratione eventus, hinc colligere liceat, proximum est ut edisseramus. Patet autem ex procemio nostro, quam periculi non minus, ac dolorum plenissimus affectus sit dolor Colicus, quippe cujus tanta quandoque ingruit violentia, ut recte dixerit *Tractatus* l. 10, cap. 1. ita laborantes mori sæpius, quàm diutius hoc cum affectu consistere malle; imò nonnulli hos dolores perferre non valentes sibi necem intulerunt, uti testatur *Gal. l. 1. de compos. med. sec. loc. cap. 1.* Interea tamen cum præsentem in casu mali causa non adeò sit vehemens, neque tam altas egerit radices, & symptomata, quæ supervenerunt, paulò remissius agere videantur, tantum abest, ut quandam malignitatem præ se ferant, ipseque Æger valida aliquo corporis constitutione gaudeat, spes bona illucescit, fore, ut modò tæces inclutæ dissolvantur & excernantur, sicque humoribus, hincque oriundis flatibus exitus concedatur, sopito dolore pristinam ille sanitatem brevi recuperet. Quam ut obtineat Æger, maturanda est curatio, neque enim hic affectus patitur moram, quin potius illius symptomata festinationem urgent. Ne verò sine methodo progrediamur, ea, quibus indicationes opus esse ostendent, ita peragere conabimur, ut præsertim urgentiori occurramus. Urget autem doloris vehementia à solutione continui proveniens, objectum itaque solvens, quò commodius removeatur, præter Anodynorum usum tempestivè & cautè adhibendum, ante omnia fæces duriores emolliendæ pariter atque educendæ erunt. Hisce peractis & jam sopitæ fræque doloris vi, primæ viz ulterius ab humoribus peccantibus eluendæ atque liberandæ. Flatuque discutiendi ventriculoque prospiciendum habitæ ubique Virium ratione.

*Præsidiorum* materiam nobis Fontes usitati subministrabunt ubi quidem, ad chirurgicum quod attinet, ventresctionis nullus hic esse locus videtur, cum neque plethoræ in Ægro observetur, neque febris adsit; Cucurbitulam

magnam cum flamma copiosâ circa umbilicum abdomini applicandam nonnulli laudant; (*V. River. in obs. communicat. p. 665.*) nostro tamen Ægro, ob causæ diversitatem, hoc auxilii genus nec necessarium, neque utile arbitramur.

Major interim levaminis spes in us sita est remediis, quæ solum Pharmaceuticus pollicetur; ut pote quorum beneficio excrementa evacuet, flatu discutere, sicque doloris obtinere mitigationem propius licebit. Nulla autem auxiliorum genera id æque cito, tutoque, quam clysteres & quidem emollientes efficiunt, quos ipsa etiam fæcum diuturnior retentio & durities accelerare jubent. Tale igitur Enema, quam primum fuerit paratum, injiciatur.

℞. Rad. alth. malv. lil. alb. ana ʒss. Herb. 4. emoll. ana mj. Fior. Verbasc. Chamomill. Sambuc. ana mß. Prunor. dulc. exollat. n. 9. Coque in f. q. aq. comm. ad ʒ. Colat. ℞. ʒx. add. unguent. pro clyst. nat. ʒj. Elect. lenitiv. Florenzol. ʒß. ol. chamomill. aneth. ana ʒj. Vitell. ov. n. 1. sal. parum M. F. clyster.

Interea quoque veniet ol. amygd. dulc. & chamomill. vel unguent. clysmat. & anodyni iungi poterit. Quod si nihilominus dolor continuet, Enema magis anodynum & abitergens injiciatur.

℞. Rad. alth. ʒß. liquirit. ʒij. Helen. ʒj. Herb. chamomill. c. flor. verbasc. c. flor. ana mß. Fior. sambuc. p. j. violar. papav. errat. ana p. ij. summatat. aneth. p. ij. Coq. in f. q. lact. dulc. ad ʒ.

Colat. ℞. ʒx. Dissolv. sacchar. Thom. ʒj. Vitell. ov. n. 1. F. Enema.

Commendant nonnulli quoque purgantia, eò quòd experientia docuerit, unico sæpe purgante dolores contumacissimos & vel triginta enemata eluentes, fuisse devictos, vid. *River. in prax. lib. 10. cap. 1.* Nostrò interim Ægro potius ab usu clysteris exhibendum duxerem ol. amygdal. dulc. rec. express. ʒijß. cum juscul. carn. gallin. & si non responderit effectus expectationi, ad alia interna pariter atque externa Anodyna accedendum erit. Interne seq. mixturam propinare.

℞. Aqu. carminativ. Dorner. ʒijß. physogon. Cordial. frigid. B. Tim. à Guldenkl. ana ʒß. Pulv. intestin. lup. præp. ʒß. Syr. de Cortic. aurant. ʒij. Vel sumat. cum juscul. pull. gtt. xx. l. xxv. seq. Essent.

℞. Essent. aurant. ʒiß. Anodyn. Zvelsch. ʒß. spirit. anticolic. D. Mich. ʒj.

Non ignoro circa Narcoticorum usum Præricos dissentire, & certum est haud promiscuè illis esse utendum, præsertim si colica à causa frigida ortum duxerit; quandoquidem verò dolor, quem noster patitur, non minus à bile, quàm à pituita provenit, ipseque æger cholericus est, parere puto, haud *anodyna* narcotica, ipsumque adeò laudan. opiat. si cruciatus nimis urgeant, in usum vocari; quæ tamen ut ne nimis citò, neque nimis tardè adhibeantur, cavendum esse reor. Vid. *Sennert. l. 3. prax. P. 1. l. 1. cap. 6. p. 159.* Quare modò laudata præmittenda duxi, quibus etiam externa insublidium adungere seqq. conveniet.

℞. Ol. Chamomill. ʒß. stillatit. aneth. ʒß. cary. sâpicul. ana gtt. v. vel umbilico inungatur



gatur parum Balsam. fœnicul. Horst. cui ol. stillat. modo laudata permisceri poterunt.

Vel ℥. Emplastr. de crust. pan. bacc. laur. ana ʒʒ. Mûlax. ol. menth. & aneth. q. s. add. ol. stillatit. chamomill. ʒʒ. Vel sacculi ex avena vel sale calefactis aut Herb. absinth. menth. meliss. abrotan. fol. laur. flor. chamomill. sem. cumin. in aqu. vel vino coctis abdomini calide imponantur. Quæ domestica licet & in vulgus nota auxilia, si dextre & methodice adhibeantur, singulare sæpius levamen afferre solent. Remittentibus (cui superius jam innui) doloribus, danda erit opera, ut cumulari circa vias primas humores peccantes ulterius & plenè evacuentur. Ubi quidem optimè conferet. Vinum passulatum laxativum, ex rad. cichor. helen. liquirit. herb. meliss. scord. veronic. card. benedict. absinth. flor. centaur. cichor. passul. min. fol. senn. rhubarbar. agaric. Tart. crud. cortic. aurant. & ad imitationem. Dom. Horst. Tom. 2. p. 170. aliorumque Practicorum paratum, à cuius usu postmodum stomachica e. gr. Elixir. polychrest. c. spir. menth. l. sal. dulc. & aliquamdiu usurpanda ducerem.

Quibus tamen omnibus Dieta ratio colophonem addere debet; cum alioquin, monente Galeno, medicamenta parum efficere queant, eaque præscribere supervacaneum sit. Eligatur itaque aer temperatus, vitentur cibi acres, calidiores, difficilis coctionis, & status generantes, castaneæ, mespila & abstineat Ager à multo, & cerevisia recente, bibat potius moderatè vinum, non nimis tamen generosum, & cerevisiam probe defæcatam, cui rad. helen. cichor. & caryophyllat. parum cum cortic. aurant. infundi poterit, alvus servetur lubrica, cibis emollientibus in usum vocatis, vel ubi opus, Elect. de Tamarind. c. fol. senn. sollicitetur. Animi pathemata, præsertim ira, rationis freno moderentur. Joh. Meibomius Præc. sign. spec. Cas. 14.

Vir quadragesima annorum, otio deditus, pituitosus incidit subito in vehementissimum totius ventris dolorem, qui subinde in varias abdominis partes divagatur. Adest nausea, & sæpe etiam pituitosorum vomitus, qui dolorem tamen hactenus non levavit.

Affligitur in hoc ægro ventriculus & intestina: ut ex nausea, vomitu, & doloribus abdominis vagis, est manifestum.

Morbus quo æger affligitur, est intemperies ventriculi & intestinorum pituitosa acris & flatulenta; quæ nauseam, vomitum, & vehementem illum abdominis dolorem vagum excitans, dolor colicus, pituitosus, acris & flatulentus appellari consuevit.

Causa prima huius morbi est otium, & temperamentum pituitosum nostri ægri. Hinc multa pituita in corpore ejus genita, & cum sanguine mixta, ac in intestinis existens, antecedentem huic morbo præbet causam. In intestinorum, ventriculi & præcipuè in coli tunicas & cavitatem effusa, ibique in status conversa, eaque acrimonia sua pungens, & rarefactione distendens, & varie per illa ducit, vomitus, nausea, & doloris istius vehementis & vagi, continens existit causa.

Periculum est, nè hic morbus suâ doloris vehementiâ convulsionem, syncopen, vel intestinorum inflammationem inducat.

Curatio itaque therapeutica circumspiciendè mox adhibenda.

Eaque consistet in humorum pituitosorum evacuatione, statuum expulsiōe & discussione, ac intemperiei per contraria correctione. Mox itaque injiciatur talis clyster.

℥. Herb. malvæ, betæ, mercurialis an. m. j. Rad. althææ, ʒj. flor. chamomillor. p. j. furfuris m. ʒ. sem. anisi, carui, annui ana ʒʒ. fœniculi ʒj. Decoque in aqu. com. ad lib. i. in colatura dissolve elect. de hiera picra. diaphanici ana ʒʒ. Sacchari rubri, ol. camomil. anethini ana ʒvi. salis com. ʒj. m. f. clyster, mox injiciendus. Et oblinatur venter calide hoc oleo.

℥. Ol. anethini camomillor. lilior. an. ʒʒ. Si æger clystere purgatus, à dolore non levatur, exhibeatur ipsi hic haustus.

℥. Pulv. intestinorum lupi, vel testicul. equi ʒj. Vini albi ʒij. Misce F. Haustus.

Si dolor nihilominus perseveret, vel revertatur, in decocto prioris clysteris dissolvi poterunt aquæ benedictæ Rulandi ʒiv. cum diaphanici ʒj. atque ita injici per anum.

Postea si etiamnum perseveret vel revertatur dolor, exhibeatur pilula facta ex gr. v. laudani opiat.

In villis ratione aer sit temperatè calidus, & abdomen, calidis tegumentis bene muniat. Cibus sit facilis digestionis, liquidus, nimirè flatuosus, ex carnibus vervecinis, pullis gallinaceis, elixis potius, quam assis. Conveniunt hic juscula caponum & pullorum, præsertim in quibus thymus, rosmarinus, hyssopus, origanum, apium, similiaque sunt cocta. Prandium sit parcum, cæna parcior. Potus sit cerevisia & vinum generosum. Ante cibum sumptum se exerceat; à cibo quiescat. Somnus sit longior solito. Alvus respondeat arte vel natura. Animi pathemata tristia vitentur.

Juvenis 26. annorum, biliosus alimentis calidioribus aliquamdiu usus, incidit in vehementissimum ventris dolorem, ab umbilicali regione versus inguen sinistram præcipue vergentem, eundemque locum servantem. Cumque ipsi vinum cum aromatibus quibusdam à mulierculis esset exhibitum, doloris cruciatus in universum fuit auctus. Jamque interna lancinari, morderi, & exuri videntur. Adest sitis, linguæ ariditas, insomniæ, atque etiam urinæ in excernendo acrimonia, item nausea & biliosorum vomitus.

Affligitur in hoc ægro venter infimus, & in eo potissimum, intestinum colon. Idque ex ingenti illo dolore ventris, ab umbilicali regione, ubi colon angustius creditur, & quo potissimum vergit, versus inguen sinistram præcipue inclinante, est manifestum.

Morbus quo hic æger affligitur, est intemperies intestinorum, ac præcipuè coli, biliosa, sive calida & acris, vehementissimum dolorem in illis partibus vehementissimo suo motu excitans; Eaque idcirco dolor colicus biliosus, à symptomate, parte affecta, & causa efficiente proxima, appellari potest. Idque ex symptomatibus, in historia commemoratis, innotescit.

Causa præcatalitica huius morbi est diuturnus calidiorum alimentorum usus calidique inde in ægri corpore geniti humores antecedentem huius morbi constituunt causam.



Pars verò eorum in intestina, ac præcipuè in colon propulsa ab eoque inhibita, ibique ab aromatibus cum vino exhibitis exagitata, ac illas partes vehementicis vellicans, humoresque ac spiritus in toto corpore perturbans, intemperiei hujus calidæ & acris intestini coli, vehementissimique illius colici doloris, interna lancinantis mordentis, & exurentis, necnon omnium reliquorum symptomatum, ægrum hunc affligentium, quæque satis facile ex iis, quæ jam diximus, explicari possunt, continens est causa.

Pars enim perturbatorum humorum & spirituum ad os & œsophagum delata, & partes illas exsiccans inducit urini & oris ariditatem; ad cerebri verò ventriculos dejecta, eosque vehementi spirituum animalium dilatatione, & copiosa in ventriculos cerebri impulsione, nimis diu & vehementer distendens, & expandens producit insomniam; vesicam verò cum urinis perveniens, & urethram mordicans, gignit acrimonia in urina excretionem sensum; in ventriculo verò effusa, eumque sua quantitate & qualitate acris & calida ita vellicans, ut fiat in fluxus vehementior spirituum animalium in fibras ventriculi oblique ascendentes excretionique per superiora intervientes, parit nauseam, & biliosorum vomitum.

Periculum est; ne hic morbus, doloris sui vehementia, syncopen, convulsionem, vel intestinorum inflammationem inducat.

Curatione consistit in humorum bilioso. um expulsionem, intemperiei biliosæ correctionem & doloris ablationem. Mox itaque injiciatur talis clyster.

℞. Rad. althææ, malvæ an. ʒij. fol. malvæ, althææ, violariz, lactuca Betæ, mercurialis an. m. j. fl. camomill. p. j. sem. lini foenugræci an. ʒiſs. M. F. clyster.

Per os etiam capiat talem haustum, acres humores temperantem.

℞. S. r. ex infusione rosar. pallidarum ʒij. feri lactis ʒiij. M. F. Haustus.

Postea adhibeantur purgantia, quæ bilem evacuant, quale hoc sequens.

℞. Fol. sennamund. ʒiij. Rhabarb. ʒj. sem. anisi ʒiv. Infundantur in aq. decoctionis mordei q. s. colaturæ fortiter expressæ adde syr. de cichorio cum Rhabarb. ʒj. M. F. Haustus. Ad ventris inunctionem adhibeatur tale linimentum.

℞. Ol. rosæ. camomill. ʒvi. Butyri vulgaris ʒss. Misce.

In magna doloris perseverantis contumaciâ exhibeatur pilula laudani opiatæ gr. iij. vel iv. cum vel sine lacte amygdalato.

Balnea hic etiam conveniunt, ex decocto malvæ & violariz, cum floribus can. omeli.

*Videtur ratio sit frigida & humida.* Cremor hordei hic est utilis, & lactuca sive cruda sive cocta, & alia ejus generis. Laudantur hic pedes, & extrenæ partes vitulorum & ovium. Potus sit cerevisia tenuissima *Henric. Regius apud Theod. Craanen. Medicat. lib. 3.*

Lapius jam decantatum fuit, ob stationes, tanto tempore quotidie sere mutatas, diversissimis potuum generibus, vinis præsertim, modo crassis, turbidis, pendulis & reculentis, modo vitriolum sapore referente, acredine austeris, viscidis & ingratis, summos & imos vivere co-

ctos fuisse. Hinc autem Colicos & Iliacos dolores, & passiones atrocissimas, commotas fuisse quis est, qui non videat? Immaniter n. hæc apud plures grassabantur: ita ut inter equites ad centum iere, simul & semel, acerbissimas hisce doloribus, excarnificarentur: pedire non usque adeo tali lue correpto. Ascribebam hoc duplici causæ: cum quod pedes potius fontibus & scaturiginibus, quæ in Ungaria superiore, mineralibus exceptis, saluberrimæ, sitim restinxisset: tum quod non æque violento motu, qualis nunquam non equestris, vagabundi milites viderentur concussi. Diarrhææ tamen his & alvi profluvia, pravis non pe succis facile, & quidem in copia collectis familiares erant: illos constipationes plurimum dierum, & hinc cruciatus Colici summe atroces lancinabant. Ex pluribus autem, tunc non tam decumbentibus, quam ob violentos dolores circumcuritantibus, unum & alterum exemplum in medium adducam. In his primas sibi vindicat strenuissimus Dominus dignifer Nobilissimus a Nollvitz, &c. Qui satis felici fidere me mature vocans, vix injecto clystere, de quo in Scholio satis prolixè, non modò dolorum qui maxime delatuebant, mitigationem, sed totius morbi rabiem, prorsus consopitam cum sensisset, ad hoc medelæ genus plures, qui alias vix ipsa morte adduci potuissent, tanquam ad præsentissimum remedium (& vere quidem) est exhortatus. Cum enim sub Erigones influxu Silesia sita sit, recte ut Curæus annotavit, subrusticus quidam pudor alumnos ejusdem exercet: qui nonnunquam, reclamante sanitate & salute, nimium rigide observatur. Multos tamen acerbitas dolorum perennis, & atrocissima, tandem ut clysteres admitterent, coëgit: cum præsertim ex eventu secundiore, qui prima statim fronte, alma Hygiza altipulante, satis auspato de meliore fato convincerentur. Accedebat ad ægrotorum felicitatem: quod clysteres ad hos ulius paratos, & necum in castra cum pharmacopolis in arte exercitatis delatos, in promptu haberem: sicut singulis horis sex, septem, plus minusve ægris, applicari possent. Nec enim unicum, toto illius expeditionis tempore in castris, juxta Strigonium semper hærentibus, colicis doloribus correptum videram: quod nos vix non otiose stertentes ex potu, secundo lumine minus turbato, & sic satis jucundo consecutos credo: utriusque hujus rei excessu copias Silesiacis, ut ante dictum, plus satis attritis. Superveniebat his glandium sardianarum, quas Castaneas vocant, utpote quarum salsibus, sicut & prunorum, Ungaria passim convellitur, intempestivior usus: qui tamen solus ad passiones Colicas invehendas satis esse potuisset. Quod enim viscosiore humido folliculo poris non pervio, in sartagine tostæ, cum stridore disruptæ, exsiliant, vel cuius cum notum sit, quis dubitet, crudas à famelicis latrantibus ferventique stomacho infarctas, corpore præsertim duriore non minus, tumultuaturas; Hic autem nobilissimus Eques ex honoris & oneris sui molestiis, cum Signifer esset, hoc malum paulatim mutuatus fuerat: quod diutius sere semper equo adhærens, & in inediis turmis oberrans, naturæ sapius urgenti vim facere coactus fuerit, statibus cum excrementis diutius retin-



retentis. Nam & hoc infelix militia in se habet: quoti sub dio & in luce hominum versantibus verecundia plus nonnunquam negotii facessat, quam Turca ipse: quod secessus secretiores ipsa castrorum conditio penitus repudiat. Videas igitur nonnunquam liberaliter educatos viros primarios, equis adornatis, longissime se ex conspectu hominum proripuisse: pedites quoque non prorsus caudices longe recessisse: quod tamen quanto cum naturæ detrimento fiat, satis constat. Eadem vis cum sæpius à Domino nostro patiente naturæ illata fuisset: tandem coorta diuturniore conspatione, fecibus induratis, Colica, flatulenta quidem, sed permolita, ad triduum correptus fuit: quæ tamen errore externo quodammodo irritata fuit. Avenam in aqua ebullientem cum linteis duplicatis ventri imposuisset, & æger aëri semet exponens ob dolores infeliores refrigeratam massam nocte concubia sibi reinjecisset, torminibus longe vehementioribus exagitatus fuit. Cum tamen summo diluculo Clysterem anodynum admisisset, obstrucone reclusa, discussisque ventositatibus ipso momento melius se habuit: & post meridiem altero enemate infuso, perque tres horas priusquam erumperet, moras neciente ventre, salubriter emollito, cum circa umbilicum ol. nostro laurino inunctus fuisset, belle convaluit: reliquos iisdem morbis correptos ad æque profutura media exhortando.

## S C H O L I A.

Quæcunque præter & contra naturam intestinus accidere possunt: Causæ, Morbi & Symptomata: illis omnibus castra necessario lucumbunt. In his autem, qui Epidemice quasi grassantur, sunt alvi fluxus omnis generis, & horum plerumque prodromi colicæ, de quibus nunc, de illis in sequentibus. His autem semper vehementissimis nulla re dexterius, citius, tutius & juculidius, in castris præsertim aciem obvertes, quam clysteribus, sed illis ad hos usus promptis & expeditis, moxque, quod semper ferè ob dolorum acerbiteratam flagitatur, dolorem sedaturis. Hoc ut consequare, diu ante ratione modoque, quem subjungemus instructus, ea tecum deportes: quæ, necessitate urgente, nunquam satis citò parari, interdum vero nullo modo comparari, malisque urgentibus opponi, possunt. Et primo quidem non sine gravi consilio in tormentis colicis clysteres, ex decoctionibus, & electuariis purgantibus, castris exturbandos suadeo: quicquid ob dolorum vehementiam ægroti oclament. Hi enim nimis interdum molles fractique, interdum doloribus evicti vel cicutam plenis buccis devorarent: dummodo ad breve tempus à tantis luriis respirare possent. Horum lamentis ne nimium commovearis: ut opij incorrectis massis, vel Philoniis, & requiebus dolores stupore inducendo compescere festines, moneo. Qui enim tunc morbo sæviente pugionibus se confodi, sclopetisque se trahici flagitaverint, brevi post, mente prorsus mutata, necem tibi comminari, dirasque precari audies: si paulum pharmacis sanitatem læsam offensamque avinadverterint. Plures enim, qui rectè ob nervos tendinesque exarescentes & corrugatos, manibus pedibusque absque ullo

motu flaccescentibus contracti vocantur, cum in regionibus viniferis obviam habeant, qui progressis cruciatibus Colicis primo labem affligunt, non immerito de subsequutura contractione tibi cavere volunt. Et sane, si per plures continuasque iniectiones & clysmata, intestina sæpius eluantur, sic ut marcorem quendam induant, nativumque, & natura solertissime dispositum mucorem, visciditatemque toties abrasam tandem amittant, decoctiones vero ex herbis diversis exhalationes subtilioribus vasis, quæ humoribus oclusa essent, immittant: evenit utique, ut vel ex hoc solo calamitosa, diuque duratura paralytes subsequantur. Videas igitur passim in ipso ætatis flore utriusque sexus homines resolutos contractosque: quos omnes intolerantia paulo delicatior, quod mori maluerint, quam ad breve momentum dolores mitigandos perferre, in tantas miseras conjecit. ut alienis manibus & pedibus vitam ducere cogantur. Has autem Syrtes sæpius effugerent, nisi Medicos interdum nolentes ad dolores tollendos & prorsus eliminandos, summe semper noxiis equalitibus, vi cogerent. Sunt sane dolores Colici immanissimi; longe tamen, secundum majus & minus, inter se dissidentes. Nollem igitur quibusvis decoctionibus carminativis, dolores mitigantibus, purgantibus denique & quidem salugine nonnunquam nimia, alvum irritantibus, ac intestina excoquantibus, passionibus colicas consopiri: cum tutioribus, & contractiones non introducturis remediis, malo commodius obviam iri possit. In tutissimis autem agnosco clysteres, ex puris puris oleis nulla humiditate prorsus admixta constantibus, & ad usum castrensem hoc modo paratis. Sesquicentum libras olei communis & laurini, partibus æquis recipiamus: in his mense Junio, quo florentissima Austria præ reliquis cis Alpinis terris cunctis ferè simplicibus viret, vigetque, herbarum aperientium, emollientium, laxantium, abstergentium, deoppilantium, & status discutientium manipulos virides tandiu decoquebamus: donec omni prorsus consumpta humiditate oleum solum remanebat. Conquisierat hoc ex herbis simul ebullientibus aromaticum quendam odorem: consistentiam paulo crassiore: sic, ut exterius jucunde in cunctis passionibus colicis pro unguento anodyno uti possem. Hoc vasis cypris, stanno obductis exceptum tanta commoditate deferri, inque miserorum ægrotum salutem erogari potest (in cunctis ferè ventris inferioris morbis) ut nihil ferè supra. Quoties enim ad hanc aram confugiendum est, illico libram plus vel minus hujus Panacæ modico Vulcano tepefaciendam, syphone injicere poteris: è vestigio miras & suaves illius operationes expecturus. Foris verò circa unibilicum eodem calido admoto, cuius Aesculapio æquare: cum ventositates, munnura, tormenta & contorsiones intestinorum, modo alvus tepide foveatur, quasi silentio inuncto, apud plerosque conticescere soleant. Quinimo sola vesica, cui clystere injiciendum inclusum fuerat, ob doloris atrocitatem, unibilico satis calide impositum, apud nobilem quendam, dolores omnes colicos ita mitigasse vidi: ut, alvo relaxata, per se erumpentibus flatibus, illius iniectioni supersedere mus. Inò cum ob nimium infestos dolores qui-



his e medio sublata scio, inter illos homines, qui nisi omni ope humana, interdum etiam munera, destituti fuissent, facile evadere potuissent. Non est igitur, ut tantum cælo solumque hostili, quod cum reliquis Europæ terris plurima communia habet, simelliores expeditionum eventus ascribantur: cum homo homini sathan ubique locorum esse possit. Sunt sine hac in parte mancipia Mahometica, nobis Christianis longe sibi fideliora, & magis devincta: cum non modo in decuriis descripti, tam scite dispositis officiis alter ad alterius placitum se accommodent; ut sanitatem facile tueantur, sed morbis quam minimis correptos, iuncta fide & plus quam fraterna benevolentia complectantur. Dum n. hic tentorium solo affigit; alter aquatun, tertius lignatum, quartus pabulum tendit: quintus penum instruit: sextus coquum agit: reliqui imperando & faciendo sunt occupati: summa frugalitate simul comellantes hoc assequantur: ut aut injurias morborum facile a se repellant: aut eisdem obrepentes, partim abstinentia, partim mutui officiis citius evincant. Ut igitur Turæ nullis fere intestinorum torsionibus vel proluviis obnoxii esse solent: sic nostrates a summo vertice ad imos talos usque (ut dicitur) inter se dissidentes, ejusmodi Furiis Epidemice quasi succumbere & occumbere coguntur. Mespila enim, castanæ, avellana, vix, pepones, poma & pyra, pruna, fructus denique fugaces omnes, cum miles noster in delitiis agnoscat, & illos vesana proflus incontinentia ingurgitet: quis mirabitur, corporibus pravorum, acrium, mordacium & impurorum succorum sentina coinquinatis, ingluviæ helluones pœnas summe meritis dare. Mespila quidem quod etiam ad qualvis diarrhas faciant, modo cum ratione fuerint comesta, dudum diximus: quod vero sedibus naturalibus impeditis Colicas, imò iliacas passiones, si præsertim ciborum potius ad sanitatem, quam beilariorum ad voluptatem ratione, devorata fuerint, excitare possint, cuius est in confesso. Nocentiores his Castaneas proclamamus: cum vel solæ statulentæ suæ vitcolitatis procellis spatiosos coli anfractus distendere & distorquere possint, crassioris suæ substantiæ saburra graciliores meatus infarciendo, Avellanas autem fructu colurnis passim obvias familiare quasi dysenteris & henteris fomentum præbere, nemo nescit. Uvas autem, & illas aut subausteras, aut permaturas, has diarrhas, illas tormina & intestinorum erosiones inducere, per se liquet. De peponebus tamen, in Austria *Pfizer* dictis, in Ungaria longe humidioribus & vix non maligniore qualitate imbutis, paulo disquiramus: cum sapius incautiores, & qui tam suspectas cupedias potius ex inescamento gulæ, quam ex damno subsequuto metiuntur, ejusmodi delitiis, priusquam animadvertant, circumveniantur. Alit Ungaria, & quidem in copia profert pepones, ingentis aliquando molis: qui mense præsertim Augusto à summæ & imæ conditionis militibus maxime expetuntur. Et est sane singularis munificentia Dei patrumque providentiæ exemplum: quod vinis, præsertim sub Sirio nimium effervescentibus hæc humiditatis & frigiditatis jucundæ, licet in excessu contemperate delitiæ ex diametro opponantur, sic ut apud assuetos & cum

calida, siccaque intemperie colluctantes, peponum usum minime red. regerim, uno eorum condaverim, modo non sub melle venena delitescant. Vocabar n. Anno 97. sub Illustri Domino D. Comite de Hollach, &c. ad præfectum quandam selectissimæ turmæ Norimbergen. qui cum post meridiem satis magnum pepone comedisset, & haultum vini dilutioris Rhenensis, cui semper ob longinquius iter cur. Neptuno res est, superbibisset, syncope correptus illico obmutuerat: sic ut extreme refrigeratus, & sudore frigido erumpente, animam agere videretur. Cum n. ob maximam cognationem, quam os ventriculi præ reliquis omnibus humani corporis partibus cum corde obtinet, frigidus humor, stomacho impactus, & haultui, torti quidem, sed aquoso supernatans, ob vicinitatem cor violentè afflasset, tam gravia symptomata infecuta fuerant. Attantes autem licet de toxico exhibitò tumultuarentur quod nudius tertius hostili cœnæ interfuisset: tamen cum belle se antea habuisset, ut ex rejectis corticibus, caute quid facerem, subodorarer, tribus guttis extracti croci, Aloës & myrrhæ in cochleari vini, cum paulum post frictiones se recollectisset, exhibitis, enormis vomitus (mul cum fructis integre fere ob lubricitatem deglutiti peponis erupit, quo vix cessante recte se demde habuit: cum Elixir illud, quod vocant, Proprietatis, etiam si venenati quid obtrusum fuisset, Lernam tamen omnem commovisset. Post cœnam, satis frugalem, quod ventriculum vomitu vehementiore conturbatum distendi nollem, cum prolixè, pepone tantum & vinum dilutius syncopen induxisse contestaremur, contra hoc protestabatur: quod Norimbergæ ex tribus & quatuor etiam, urgente siti, peponebus comestis, & nullo, quam Rhenano, nonnumquam Neccareo vino superhaulto, nihil unquam damni sensisset, multo minus lipothymias: quas non aliunde, quam ex deleterio, clari propinato inductas fuisse suspicabatur. Postquam autem concessisset, Rhenana & Neccarea vina, quæ in Ungaria vappam potius, quam merum sapiunt, in incluta Norimbergæ multo generosiora, reliquos quoque calculos facile exemi. Demonstrabam enim pepones Noricos, Pannonicos longe post se relinquere: quod illi solerti cultura in apricis, & mediocriter arenosis, glareis succrescant: & ad maturitatem deducantur: illi verò, humi tantum repentes, nullo verò studio sponte sua plus ab umbris locis humiditatis & molis, quam à perviis radiis solis ribus suavitatis & maturitatis matuerent. Maxima enim copia peporum ex Congestis (quæ trinis Danubii alveis in plures insulas sejunguntur) ad castra deportatur: qui ob superabundantem humiditatem nunquam non suspecti fuerint. Accedit, quod ex semiputribus glebis noxium quid & virulens, tubercum instar exsugant: quod deinde non sine gravi damno vefcentibus insundunt. Quinimò ipsemet cum in pago non longe infra Pisonium in iisdem Congestis de pepone vix parum gustassem, strangulationem vix evitarem: nisi torti verè Ungarici vini haultu cicuram diluissem: quod tamen factum fuisse non mirabar: postquam mihi potenti locum, quem peponebus designarat, monstravisset. Altissimis n. arboribus opacus, data quasi opera sole exclusus ad nullam minus quæ



peponi sementem commodus erat: ita quidem, ut solo sapore, qui gravior videbatur, fungis & tuberibus præferendi crederentur, ab hortulano plus satis ignavo & imperito terris extracti. Tales autem navi in diætâ caltrenti cum quotidie enormiter committantur, Physicus prudens ut lyncea mentis indagine tam repentinis quod sæpe fit casibus coingruentibus circumspectet, magnopere invigilandum erit: cum nonnunquam ex unico verbulo, fortuito casu prolato, plus honoris & emolumenti, quam si summus animi & corporis contentionebus integram legionem morbis eripuisset, sit relaturus. *Thobias Coberus Observ. Medic. Decad. ij.*

### Observationes.

*Rondeletius* Nobilem Matronam curavit, cum gravissimo dolore coli detineretur ex pituita, & nihil ad manum esset, solo vino hypocrático injecto, eodem modo, & rusticus quidam curatus fuit. *Petrus Forestus in Schol. obs. 7. lib. 21.*

Frigidâ aqua usus sum in iis quorum vires robustas & partes principes illasas deprehendi: ac scio me levasse omnino dolorem, & totum morbum ne reverteretur amplius, prohibuisse.

*Amatus* cent. 1. curat. 2. Historiam habet de muliere colicâ ex calidâ causa laborante, quæ ex potitaque frigida, subito incantamenti instar dolore levata est, non amplius redeunte.

Idem quoque in filio Falconis colica à causa calida laborante, gelidam dedit, & insuper pannum lineum frigidâ aquâ immersum, ac manu pressum umbilico adinoveri iussit: necnon die papav. in rotulis dabat, ac desuper aquam Endivæ, quibus paucis intrâ triduum sanus factus est, non sine multorum admiratione, & artis medicæ decore. *Petrus Forestus Schol. Obs. 12. lib. 11.*

Religiosus quidam obnoxius erat colicæ biliosæ diuturnæ & contumaci, quæ sæpè recurrebat ejusdant consilio, sumpsit mane frustum butyri recentis, superbibendo parum vini, hoc remedio per longum tempus contiguo, ab affectu liber & innoxius evasit. *Lazarus Riverius observ. 71. cent. 2.*

Jacobus Finkius avunculus meus suspiciendus, dolore colico torquebatur, canis milesius ventri impositus, qui cum incaluisse, urgebat exitum, vomuit vehementer, & tormina avunculi remiserunt.

Ancilla ejusdem in dolore dentium, eundem canem genis apposuit, sensitque levamen, sed canis dolorum impatentia hinc inde curitare & latrare cepit. *Thomas Bartholinus hist. 33. cent. 6.*

Adolescens biliosissimus vigente hyeme in colicum dolorem incidit ita atrocem, ut ingenti dolore sitique oppressus velut amens, tres dies innoxius duceret, vocatus usus sum sectione venæ, refrigerantibus clystis, frigidis Julapiis, & aliis quæ furentem & acrem bilem mulcerent, ac lenirent; sed cum dolor ingravesceret, sitis urgeret, ex nive Emplastrum parti dolenti impono, & gelidissimam cum saccharo ad satietatem bibendam offero; non transierat hora, quin se sanum repente exclamaret, ita ut eodem victu frigidulo nutritus, a dolore securus evaserit. *Zacutus Lusitani observ. 23. lib. 2. Præx. admirand.*

Aulicus quidam incidit in dolorem colicum gravissimum: ad cujus sublationem, primo inje-

ctus est clyster emolliens & purgans, postea carminans & evacuator, cum terebinthina a quo levatus est, sed brevi dolor rediit tandem in decocto carminante dissolvi jubeo aq. benedic. 3iv. Diaphn. 3j. a quo quater deiecit, pituitosa multa & omnino liberatus est.

Eodem clystere & alter à simili dolore sanus evasit. *Lazarus Riverius observ. 67. cent. 1.*

Vir quidam quadragenarius gravissimo dolore colico correptus est, qui neque clysteribus laxantibus, & carminantibus, etiam cum aq. benedic. neque fomentis ac semicupiis intrâ 24. horas usurpatis sedari potuit: eoque continuo sæviente sequentes pilulas præscripsi.

℞. Aloës opt. 3j. diagrid. gr. viii. laudan. opiat. gr. v. f. pil. vi. deaurata, has sumpsit media nocte, mane horâ quartâ dolor protinus quievit, & per diei decursum purgatus est quin- quies, sicque omnino liberatus. *Lazarus Riverius observ. 1. cent. 2.*

Juvenem quendam 18. annos natum colico dolore acerbissimo laborantem invisens, statim præscribo ad immanem dolorem coercendum, quem vix sustinere poterat, laudan. opiat. gr. vi. quibus intrâ duas horas dolor omnino sedatus est nec in posterum rediit. *Lazarus Riverius observ. 12. cent. 1.*

Mulier quædam subito correpta est doloribus vehementissimis ventriculi & lienis regionem occupantibus, qui neque fomentis, neque pergartione, sedari potuerunt: sed phlebotomia celebrata satis larga manu è brachio sinistro statim evanuerunt. *Lazarus Riverius obs. 44. cent. 1.*

Mulier quædam sexagenaria doloribus colicis acerbissimis conflictata, post duos clysteres frustra injectos, sumit intestini lupi pulverat. 3j. cum vino & statim dolor evanuit. Post 10. vel 12. dies, licet per Apozemata purgata fuisset, dolor rediit acerbior quam antea, ac licet in clystere philonii 3ij. dissoluta fuissent, dolor non quievit, prædictus pulvis iterum fuit exhibitus, & dolor imminutus est, ac post trium horarum spatium omnino fere sublatus. Sed postredie rediit acerbior quam antea; exhibita fuerunt Laudan. gr. v. & dolor omnino sublatus est, nec amplius rediit. *Lazarus Riverius obs. 86. cent. 1.*

Filiolus meus *Catalus* in ætate 4. mensium correptus fuit dolore colico sævissimo, qui clamores & ejulatus continuos ab eo extorquebat. Exhibui pulv. el. diamosch. d. 3ss. cum lacte, quo dolor quievit per horæ quadrantem, & iterum rediit cum pari sævitiâ; injectus fuit clyster ex decocto anisi & chamam. cum vitello ovi, & saccharo, eoque dolor omnino sublatus est.

Post octiduum eodem dolore affectus est, ira acerbior, ut priori deterior appareret. Sumpsit pulverem sed frustra: Injectus fuit clyster prædictus etiam frustra, tandem admoveo solum toti ventri ex decocto anisi & Chamam. in aq. vitæ, prima applicatione dolor omnino desit, sequenti iterum rediit dolor, eoque aliquantulum prædictis remediis mitigato, postero die mane exhibita fuit syr. ros. 3j. quem assumendo, vomuit pituitam instar albuminis ovi, sed nihil fere deiecit, tormina recurrebant. Iteratus syrupus cum 3j. infus. Senæ, etiam parum præ-



præstitit. Tandem exhibui pulverem comitis ad 3j. cum lacte, eoque blande ac copiose purgatus est, & ab hoc affectu omnino liberatur. *Lazarus Riverius observ. 27. cent. 2.*

Quidam gravissimo colico dolore excarnificatus triduum integrum, cum nullis anodynis levaretur, sumpta 5j. pulv. intestini lupi cum paucis vino generoso, incantamenti instar in pristinam valetudinem erectus fuit. Mille alios colica laborantes hoc unico medicamento restitui, nullo injecto clystere, aut cathartico sumpto; quod admirationem fovet. *Petrus Pachegnus observ. 2.*

Quidam retulit mihi se colico dolori obnoxium fuisse per multos annos, quo frequenter affligi solebat, ab eoque liberatum sequenti remedio, una tantum vice assumpso, ita ut nunquam deinceps in eum incidere, & plurimos alios, quibus idem remedium communicavit, fuisse etiam liberatos.

Hoc remedium est dolij obturamentum, ex subere confectum, quod per plures annos suavitati interfuerit, atque adeo probe vino imbutum sit, illud autem suber igne comburendum est, ejusque cinis exhibendus cum vino albo 5j. pondere, urgente dolore, *Observ. 7. observatio. nam a Riverio hinc inde decerpitur.*

Nobilis quidam 40. annorum tam sævissimis coli & Hæi intestinorum doloribus torquebatur, ut mortem sibi ipsi consciscendi omnem caperet occasionem. Ego accitus dolorem hunc in unum multis rite adhibitis pharmacis demulcere sedulo dedi operam, sed frustra, tandem tale decerno Enema.

℞. Juris pisorum 5viij. aq. nostræ benedictæ 5iij. Sacch. 5ß. ol. communis 5iv. M. simul. S. A. & injiciatur quavis horâ recrudescentiæ doloris calide. Ex hujus clysteris repetitione miraculose omni sopito dolore, & causa doloris noxia exclusa convalescit. *Martinus Rulandus curat. 21. cent. 6.*

Vir quidam colici dolore infestè cruciatus, liber & insulso evasit per sequens infusum catharticum.

℞. Trochisc. zihand. pulv. 5j. feri lactis. 5x. Ma. erentur per noctem in loco calido, fiatque initio: de qua colata bibis calide 5v. sedens in balneo aqu. dulcis tantundem bibis & fecit sequenti die; & statim sanatus est *Martinus Rulandus curat. 61. cent. 10.*

Vir quidam patiebatur sævissimum & crudelissimum dolorem colicum, cum cibi potusque vomitu, hunc ita sanabam.

℞. Spiritus vitæ aurei 5j. hoc valde est expurgatus, itque inde quievit dolor. *Martinus Rulandus curat. 5. cent. 3.*

Studiosus quidam 18. annorum affligitur colico dolore, sanatur à me unico die hoc modo.

℞. Extract. Esulæ 5ß. aqu. tont. claræ 5iv. M. Fiat. Haustus colandus. Colaturam bibis calidam, qua probe expurgatus est cum colici doloris remissione, altero die iteravit hunc haustum, & integram obtinuit sanitatem. *Martinus Rulandus curat. 45. cent. 7.*

Aurifaber quidam colica & diarrhæa subinde corripitur, hoc facili remedio illico se curat, sedendo nimirum per satis longum tempus super incudem probe calidam. *Honoratiss. D. Robertus Boyle libro de utilitate naturalis Philosoph. Part. 2. sect. 5. cap. 14.*

℞. Jusculum cum allio & oleo olivarum, & calidè hauriatur cum vini optimi dimidia parte. Sæpe enim expertum est. *Petrus Borellus Observ. 91. cent. 4.*

Multos qui colicâ graviter affecti essent curabat medicus quidam experientissimus facillimo hoc remedio. Stercoris suilli globulos vi. vii. aut ix. soluebat in vino opt. colabat, & fortiter expressum infusum propinabat. Quibusdam præterea exhibebat magno emolumento pulv. compositum ex part. ij. rasuræ ossium dactylorum & part. j. pulv. ovorum ex quibus pulli fuerint exclusi. *Hieronymus Reusnerus observ. 178.*

Syrupus ex aqua vitæ paratus cum Saccharo in crudis humoribus tormina excitantibus mirifice contulit. In colico dolore præsertim circa ventriculum vexante, conferte dicunt jusculum ex iucco Amygd. d. cum granis aliquot piperis longi ex vino Hippocratico paucis.

An in colicis doloribus sectio venæ? imò præterea remedium si à bile esse videtur cavendum a medicamentis validis, & usû linctorum impense calidorum. Tepore juvantur, & thermalmate. Syrupus violatus confert imò & usus lactis recens mulcti aut calidi *Unil. Ballonius lib. 1. Epid. & Ephemer.*

Vidimus cuidam acerbitate doloris colici defento piacatos esse dolores adhibito umbilico modico Emplastro caustico, & veluti escharam faciente, & intus foras evocante quomodo etiam in doloribus dentium de foris extremo maxillæ inferioris Escharoticon miro profectu applicant quidam. Pericula ista nos debent cautiore & scientiores reddere ad excogitanda assinia remedia, sed illis aliquantò tutiora. *Idem ibidem.*

Efficax ad colicam est oleum Saponis. Quod sic paratur.

℞. Saponis Hispan. part. j. calcis vitæ part. ij. distillantur per alembicum vel retortam, oleum ab aqua separetur, cujus guttæ vi. vel vii. umbilico cum Gossipio imponantur. *Sennertius Pract. lib. 3. part. 2. sect. 1. cap. 2. & inst. 1. lib. 3. part. 3. sect. 3. cap. 6.*

Superato Catarrhō quidam Colicam passus est satis molestam, quæ circa vespertam incrementum sumpsit: ante invasionem ab assumpto cibo per vomitum aliquot libras rejecit aquæ limpidæ, sine chyli crassioris admixtione: Causa colici doloris mihi visa est chyli crassities, quæ liquidi feri defectu, quum liberò cursu per intestina ferri non posset, tormina concitavit. Presbyterum novi colicis doloribus divexatum, qui superveniente vomitu aqueæ materię sanatus fuit: unde hydragogorum usus non raro advocandus in colicis torminibus, quorum beneficio sæpe per alvum liberavi ægros. *Bartholinus cent. 5. observ. 58.*

Puella bimula ordinatis doloribus torquebatur circa inguina, ut nec cubans, nec sedens, nec stans, nec ulnis gestata dolorum requiem sentiret: redibat iste dolor statim vicius à decima vespertina ad xii. interjecto tempore diurno, nocturnoque sana erat, tertio paroxysmo finito, nulla manifesta crisi apparente, postea immunis vixit: vermium nulla fuere indicia. Flatulentem igitur colicam fuisse nullus dubitavi, in musculis potius abdominis delitescentem quàm in colo, alvus enim ex voto



respondit: Inunctione abdominis ex oleo absinthii & cumini destillato, & exhibita theriaca in aqua cornu cervini, sublevavi ægram. *Idem Hister. 59.*

Balneator Viennæ postquam tribus annis quadrantibus gravissimâ discruciatu fuisse colicâ, plurimaque perperam adhibuisset, malumque acidularum usu exasperari videretur, in eisdem uxor juvenis etiamnum eodem affatu nuper defuncta fuisse, idem fatum horrens accersit, hic toto corpore convelli cepit, ita ut ominaret materiam ad nervosum genus translatam Paralytin inducturam, hoc nobis mali facessere: Convulsionibus per medicamenta sedatis, vinum Guajaci, ex *Amali cent. curat. 32.* præcepto, pro eliciendo sudore, per quinque dies ordinavi, & ex toto restitutus fuit: sine dubio colica fuit à pituitosis humoribus flatuum seminariis, intestina occupantibus, qui civino isto diaphoretico liquefacti, & per sudores resoluti sunt. Interjiciebantur quandoque laxativa. *P. de Sorbais. Ephem. German. anni 3. pag. 487.*

Pharmacopæus annos 40. natus retulit mihi se per multos annos colico dolore vexatum, nullum aliud remedium invenire præter hydroposiam, & quamdiu in ea perseverabat, prorsus incolumem permanere, quoties verò ad vini usum redire voluerit, intra biduum eodem affectu correptum esse: Meo iudicio non à bile simpliciter colicus dolor excitabatur, sed majori parte ab humore melancholico, humori bilioso permixto, cum dictus Pharmac. temperamento melancholico à prædominio præditus sit: Cum autem melancholia jugiter a liene in ventriculum effundatur, aciditate suâ vinum assumptum inficit, & ita vinum confectum in ventriculo acescit, ac morbi causam auget: si verò humor biliosus morbi causa existeret, ab aqua potui quidam corrigeretur, sed vini usum tam cito affectum non suscitaret, quia vinum bilis qualitates tam cito non inducit sicut melancholia, quatenus facile acescit, non amarescit. Conjecturam auget, quod dictus Pharmac. cum paroxysmo colicæ corripitur, acida per vomitum rejicit, non autem amara. *Riverius cent. 4. observ. 49.*

Testari possum me sæpius observasse iis quibus cibi in ventriculo acescunt, omnia remedia irrita fuisse quamdiu vinum potarent, eo autem dimisso e vestigio sanatos fuisse: Et vice versa, quibus os amarescit, aquam admodum inutilem inveni, & nihil magis eis contulisse quam merum in pauca quantitate assumptum. *Martianus comm. in v. 434. lib. de ver. Medicina.*

Generosus Dominus Starckenburch, Legionis Groëniæ gentis Præfectus, vir quadragenarius, mediocriter fortis, temperamento frigidior ac pituitoso præditus, mense Septembri vehementi colica passione correptus fuit. Habebat ventrem à flatibus valde turgidum, quos tamen neque sursum, neque deorsum emittere: maximi dolores intestina dilacerare videbantur. Conquerabatur etiam de summa cordis anxietate, quâ tantopere premebatur, ut sudore frigido totus perfluere. Quia autem æger à flatibus pene disrumpi videbatur, ac citissi. ro subsidio opus habebat, sequens enema præscripsi, quod vespere horâ undecimâ (quo tempore vocabar) injectum fuit.

℞. Decocti emollientis lib. i. Elect. diaphanici, hieræ picæ, ana unc. j. s. olei anethini, chamæmelini, ana unc. j. salis communis drach. j. Misce, fiat clyster.

Hoc enema post horæ quadrantem absque ullo fructu rursus deiecit, nullis nec flatibus nec facibus subsequenter: quapropter illud paulo post de novo injectum, atque ut antè sine utilitate emissum fuit. Eo tempore æger nauseabundus aliquantum bilis cum tenaci pituita evomit. Circa horam sextam matutinam aliud enema hoc modo præscripsi.

℞. Herbarum Emollientium, centaurei minor. absinthii, ruthe, florum chamomillæ, anethi, ana m. s. sem. anisi, levistici, ana drach. ij. Cumini, baccorum lauri, ana drach. j. s. coquantur in aq. communis q. s. ad lib. i. in colatura leviter ebulliant foliorum senæ unc. j. deinde exprimantur, & addendo, Elect. hieræ picæ, diacatholici, ana unc. j. s. olei chamæmelini anethini, ana unc. j. salis communis drach. ij. fiat Enema.

Hoc injectio multa excrementa cum plurimis flatibus subsecuta sunt. Postea rursus nauseabundus fuit, & multum bilis ac pituitæ tenacis cum levamine evomit. Bis eâ die jusculum pulli cum holdeo mundato, corticibus citri & arantiorum coctum, sumpsit, & modò pituitam, modò cervicem tenuam pro potu bibit. Vespere hic bolus exhibitus est, à quo sequenti nocte nonnihil dormivit, & dolores egregie sedati sunt, ac postridie alvus ter cum levamine exonerata fuit.

℞. Electuarij nostri anticolici drachm. j. Aloes lucidæ scrup. j. Misce, fiat bolus.

Hic Bolus postea adhuc ter alternis diebus reiteratur fuit. 7. Octobris, cum alvus per triduum rursus constitisset (intermisso usu dicti boli) dolores colici de novo increverunt, tunc, quia æger à clysteribus aliquantum abhorrebat, hautum leniter purgantem exhibui, a quo multum bilis & pituitæ sursum deorsumque exoneravit. 10. Octobris, alvo rursus nimium constipata, enema injectum est. 13. Octobris etiam advocatus fuit. Dom. Harscampius, Medicus peritissimus, atque tunc communi consilio, ad sedandam nauseam exhibuimus bis aquæ cinnamomi cochleare unum, cum olei cinnamomi gutt. ij. atque hoc sequens linimentum ventriculi regioni illinendum præscripsimus.

℞. Olei nucis moschata expressi, laurini, ana drach. j. anethini, foeniculo distillati, ana scrup. j. Anisi gutt. iv. Misce, fiat linimentum.

Vespere assumpsit bolum antea præscriptum. 16 Octobris rursus enema injectum est, à quo tres secessus habuit cum magno levamine. 20. Octobris ad alvum subinde leviter solvendam præscripsimus pilulas ex sola Aloë lucida confectas, de quibus tantum duas tresve alternis vel singulis tribus diebus deglutit, quæ pilule tantopere profuerunt, ut postea aliis purgantibus opus non habuerit. 23. Octobris dedi ægro electuarij nostri anticolici unc. j. s. cui admisceveram Aloës lucidæ drachm. j. s. ejus subinde manè aut vespere assumpsit drachm. sem. vel scrup. ij. cum summo comodo, nam stomachum corroborabat, flatu discutiebat, & pituitam simul ac bilem detergebat. Hoc electua-



Quarto postea utebatur pro preservativo, intermedium diebus subinde sumens pilulas ex Aloe atque ita tandem pristinae sanitati restitutus fuit. *Isbrand de Diemerbroeck. Curat. & observant. Medicin. 49.*

Spectabilis quidam (Septuagenario major, sed adhuc vegetus) Veteris Civitatis Scabini, & Aromatarius opulentus, tendens cuidam Nobili Polono nonnulla aromata, flatus alvini cum fecibus diutius retinuit, ex qua retentione in constipationem alui incidit, quam colici dolores exquisiti mihi consecuti sunt, quorum neque hi vel anodynis vel carminativis, tam interne quam externe adhibitis sedari; neque illa purgantibus aliquoties in diversa forma assumptis, enematumque fortissimis solvi potuerunt, donec tandem sequens portuncula amara & constipationem & dolores una sustulit, quæ talis fuit.

℞. Pulpæ Colocynthid. in petia ligat. ʒ. ʒ. Flor. Chamæ. nostr. Centaur. min. Veronic. ana p. j. capit. papav. num. i. Cuminum el. ʒi ʒ. Sem. anisi ʒ. i. Decoctio in l. q. aquæ chamæ. Colat. ʒ. ii ʒ. ad misce olei amygd. d. sine igne recens expressi ʒ. j. manna calab. ʒ. ʒ. M. f. Potio. Tum ille post liberationem a dolore, & constipatione pertinaci, ejusmodi naturæ negotia se nunquam amplius dilaturum sponte dedit. *Simonis Schultzii.*

Verè sanè Experientissimus Scorbuti Investigator, sedulusque ejus observator, *Doctissimus Engelen* libro de Scorbuto, *Observ. 50.* ita scribit: Tam varij sunt affectum quos hic morbus edit, ut minimas omnium differentias numero comprehendere non magis possibile sit, quam arenam maris numerare. Numerosa scilicet est symptomatum in Scorbuto collectio, quæ tamen non omnia in omnibus, sed hæc in isto, illa in alio subjecto se offerunt. Modo enim plura & graviora, modo pauciora & remissiora observantur: Scilicet pro peccantis materię quantitate, quæritate & loco, quem occupat. Quo etiam diutius duravit Scorbutus, eo pluribus & vehementioribus est stipatus symptomatibus: quanquam *Joh. Petr. Lottebium* Medicus, Philologus, & Poeta insignis observ. propr. lib. 4. c. 6. Observ. 6. signa Scorbuti pathognomonica nimis angustis canallis coarctare videtur. Nos inter alia ejusmodi, in Scorbuto etiam gravissimos dolores colicos apud ægros sæpe observavimus, qui neque selectissimis anodynis sedari potuerunt, præsertim in optimo Viri Casparo Wendland, civis Elbingenli & Pharmacopæo Regio Expertissimo, quem ferè ad finem vitæ vehementer torserunt: tum & virgine quadam lætissima, quæ tandem ex Colica Scorbutica parctica facta est, sed per Dei gratiam, post usum remedium idoneorum, tam è Scorbuto, quam paresi liberata fuit. Denique in *Doctissimo* quodam viro adhuc vivente, qui sæpissimè ejusmodi doloribus affligitur: qui tamen partim medicamentis, carminativis, lenientibus, & laxantibus, partim anti-scorbuticis facillè tolluntur, iterumque revertuntur, de quibus verendum, nè ingravescente ætate in dies magis ingravescant.

Monachus quidam ructibus ventriculi, ciborum fastidio, doloribus hypochondriacis flatulentis, itemque ventris constipatione ad mul-

tos dies sæpius infestatus, inordinatâ dicta ut plurimum vivens, ac casei veterati & semiputridi valde avidus, demum ex usu lenientium & emollientium globulos rophaceos & caseum olentes per plures alvo deiecit ac melius se habuit. *Helvigius in Miscell. Curios.*

Desperata valetudinis senem pluribus annis post modica corpori, exercitia atroci intestinorum dolore cruciatum, & variis ad colicam facientibus remediis defatigatum. Colica non humerali, neque flatulenta, ut plures opinati, ait, autoritate *Julii Casarii Scaligeri*, *Guainerii ac Benivenii de abdit. Morb. causis*. Picendo colica à calculis anfractibus intestinorum in hærentibus, laborare conjecturatus, communioribusve nihil proficientibus, emulsione *Theriacibinata* cum decocto *Forelli* parata, & succo citri acuta, ac clysteribus ex sagapeno & bdellio in decocto emolliente dissolutis, quatuordecim, avellanam mediocrem adæquantem, mucoso oblitos, eliminavi calculos, bonumque senem à diris cruciatibus liberavi. Calculi illos in intestinis genitos esse, quia colore, pondere, & figura à Choleodoci lapillis distinctis, arotratus sum. Et enim cum a *Aristotele* & *Philosopho*, *Hippocrate*, *Galen*o, *Avenzoar*, *Marcello Donato*, *Zacharia Lusitano*, *Capivaccio*, *Forello*, *Fernelio*, *Platero*, *Parac.*, *Schenckio*, *Sennerto*, *Bartholino*, aliisque nostris temporis, in cerebro, aspera arteria, pectore, stomacho, hepate, liene, mesenterio, utero ac articulis æquè bene ac in venis & vesica calculi observati: Idcirco nullam, cur, posita viscosa, quæ intestina abundante pituita, veluti causa materiali, à calore, eorundem tam innato, quam adscitito ut efficiente, vel secundum Neotericos mucilaginoso, quo referta, accedente spiritu lapidifico, calculi in anfractibus intestinorum generari nequeant, adesse video implicatiam. *Nic. Guilielmi Beckeri. in Miscell. Curios.*

Vixit in urbe vicina Vir Consularis, valetudinis adhuc satis vegetæ, etiam si ætas tum excederet annos 78. Huic antè 20. annos & quod excurrit, subortum est tuberculum instar juglandis in interiore senoris dextri parte, paulo supra genū. Radiosum fuit hoc non tam ratione doloris, qui erat exiguus, nisi comprimeretur, sed potius equitationis, quæ impediabatur. Consuluit Medicus apertionem, sed recusavit hanc Dn. Pater, quod non ita pridem viderit à tumore ejusmodi capitis aperto Epilepsiam & mortem.

Contigit tandem ut dolore tuberculi per liberatiorem vini potum apud Syvidnicenses sepulto, animosior, equo domum festinaret, ita ut iter duorum miliarium; intra quinque horæ quadrantes consuerit. Domum recursus ex humoris serosi effluxu sensit apertionem. Chirurgus vocatus post mundificationem & subsidentiam tuberculi tandem consolidationem meditabatur, sed Dn. Pater, cum animadvertisset præter senem cruciari calculos & arenulas, prudenter neglexit consolidationem & foniculum pilis pro more injectis tum ultra 20. annos aluit, nullis molestiis stipatum, sed & deligationi aptissimum. Cruciatu est ante hunc foniculum crebris & atrocibus coli doloribus. Ex eo sedum gestasset hunc, immunem fuisse mihi asseveravit. Moliri quidem subindè cacochymiam



tartaream sibi periodicas afflictiones, sed sine violentia durante, mox enim solito copiosius exsudare e fonticulo calculos friabiles & arenulas rubras cum fero cruento. Collegit quantitatem non exiguam materię hujus tartareę in veritatis fidem.

Mura crisis hæc, sed non inaudita. Lithogenias hujusmodi exempla in partibus externis recenset. *Bartholinus cent. 5. hist. anat. 91.* Admiratu dignior est sudor arenularum criticus *cent. 1. hist. 34.* *Illustris quidam Vir Regius in Selandia Praefectus, calculo & arthritide, domesticis hospitibus, sæpe obnoxius, subinde in largissimum sudorem solvitur, quo non serum exsudat aut sucti per poros liquores, sed quod mireris, manipuli arenularum quas indulta manu abstergit.*

Fonticulos artificiales, ut inutiles abominatur Helmontius, sed historia hæc egregie commendat eorum efficaciam, & credendum est, Archeum exulcerationibus spontaneis expurgando impuritates tartareas, semper intendere conservationem individui, sed ut plurimum in locis minus convenientibus & dolorificis, in quibus casibus ad faciliorem & securiorem consolidationem supra loca exulcerata fonticuli interceptantes suadentur. Hujus interceptionis valorem confirmat apollonia spontaneum & quasi fonticulus naturalis supra tracturam, pedis tracturę periculosissimę salutaris. Vide apud Bartholinum *cent. 1. observ. 84.* *Stigmundus Grassii in Miscell. Curios.*

Memini me quondam ex *Clar. Sylvio*, cum in Noloscomio Lugdunensi ægroti passione colica decumbentis rationem haberet, audire, hoc malum cujusvis medicaminis novumquam vires eludere, difficilisque medelę causam consistere in copia bullarum ex pituita valde glutinosa constatarum flatus intesti habentium: Bilem autem tum temporis sale lixivo acuatam phlegma rarefacere nimis, quo rarefactio hujus latera magis distensa, flatusque recipientia dictas bullas producere: non secus quam aquam smegmatis beneficio glutinosiorem redditam pueri in sphæricas bullas conflare atque formare solent: Quicquid enim ibi præstat smegma, illud in corpore humano efficere pituitam; & sicuti a spiritui calido smegma rarefactum in bullas effertur, ita bilem tanquam humorem calidum in pituitam agentem hoc munere defungi censebat. Quę omnia, uti non a recta ratione aliena omnimodè censenda, ita quoque dictis experientia fidem fecit. Anno 1677. accessit ad hujus civitatis incolam, qui per 5. dies cum passione colica conflictatus erat, ipsius abdomen mirum in modum distensum deprehendi: Quibuslibet medicamentis frustra exhibitis incassum diu sudavi, incertusque fui, qui fieret, quod probatissimis pharmacis hocce malum non cederet. Cum autem in usum clysmatum diligenter persisterem, ægrotus post aliquot dies horum auxilio excrevit mastam ex multis vesiculis contextam, quarum majores juglandium, minores nucum avellanarum magnitudinem excedebant. Hæ vesiculę tam tenaciter sibi adhærebant, ut nulla operâ divelli possent, quin potius disrumperentur, mephitiquę flatulentiam cum fetore adstantibus valde molesto emitterent. Hocce spectaculum

luprate diu intuitus sum, omnemque mihi evulsi hæc observatio admirationem, quare tam infelici Marte Contratympanitidem, colicam flatulentam (quam merito a colica conulsiiva solis humoribus acerbis adscribenda distinguo) bella geramus, cum de verò remedio dictarum vesicularum rupturam promovente adhuc sumus incerti. Sanatus hoc modo nolter ægrotus valet adhuc pancreaticę, liber suis ex passione colica cruciatibus, cum quibus antea tam frequenter ipsi contigendum erat. Simili modo fabri cujusdam ferrarii uxori 66. annos habenti, consilio meo quondam præfui, quę a longo tempore astmatica & anhelosa suffocationis periculum incurrebat. Hinc pertectura omnes nervos intendebat, ut per tussim obstacula liberum aëri transitum denegantia removeret, & hac ratione, post conatus Herculeos, laboresque incredibiles, ejecit interdum vetricam & agnitudine pomi Borstorfiani statum plenam, quę tamen vetrica propter summam glutinositatem rupturam difficulter admittente evocari vix poterat. Hoc peracto aliquot horas libero fruebatur spiritu, donec præterlapsis illis regenerata nova vesica novi laboris faces incenderet, quibus tamen cum ægora in dies magis defatigaretur, factum est, ut exhaustis consumptisque illius viribus brevi post naturę satisfaciens somno consopiretur æterno.

Est apud nos Huxarię ad Visurgium civis, omnibus benè notus, quoties colica, aut ejusmodi ventris tormenta cum cruciatur, subito pulverem lapidis coctilis, in calida cerevisia aut spir. vini sumit, sudat, sicque omnes dolores feliciter debellat. Sciendum, sed non imitandum. *Christ. Franc. Paulini in Miscell. Curios.*

*Georgius Sperling* mercator apud nos mense circiter Novembri, ex esu flatulentorum in colicam incidit passionem, quę per totam noctem miserum vix non ad desperationem torquebat. Ex lecto prostratus abdomen fortiter comprimit, *strigam* ei a conjuge exiuntur calida plurima, ventri facili imponuntur, oleis destillatis abdomen inungitur: quę cum omnia subitani terre opem non possent, calefactę fornaci fortiter abdomen admovent, calore ejus opem sibi laturus: interim me advocari jubet, accedo circa sextum matutinam, & in indusio stantem & fornaci aqualiculum applicantem invenio: monet ægrum de adventu meo uxorem & ut in lectum sese componeret, orat: ipse invertens corpus induitum circa ventris regionem totum combustum, ut flamma etiam hinc inde serperet, animadvertit: perterritus ignem manu in indusio extinguit, & in lectum sese componit. Colica passio ab injecto enemate brevi sopiebatur, adhibitis flatus discutientibus, & aliis remediis internis: sed abdomen totum ita combustum erat, ut undique vesiculis refertissimum esset, quę Chirurgi manū per quinque septimanas tractabantur, & ægrum vix non in rabiem agebant, nam plurimis in locis suppurabatur materia, quę ulcera præbebat dolorifica. Paterhinc, quod uti lumen majus minus obscurat, ita & dolorem minorem præ maiore non percipi: nam ubi leviter tantum pars corporis aliqua comburitur, vel potenciali vel actuali igne, molestissimus sentitur dolor, At hic totum abdomen combustum non per-



percipiebatur præ intestinorum doloribus intolerabilibus. *Joan. Schmidt. in Mifc. Cur.*

Anno 1683. Juvenis Rusticus 20. circiter annorum, cum tempore messis, fervente solis aestu, siti urgentiori, intemptivo frigida potu, satis facere studeret, dolores tandem lancinantes & rodentes; hic illic in hypochondriis perferens sed vagos ac iterum dispercunt, unde iis spectis, operæ ordinariæ ulterius incubuit, sitimque ut prius frigida denuo sedavit, usque dum dolores atrocius sævierint, & appetitus prosternei, alvus pertinaciter supprimit, abdomenque mirum in modum distendi coeperunt: vocati d. i. morbi, bol. ex elect. diascord. cum cinnab. antum & l. udan. op. præscripsimus in antecessum: accedentibus vero retulerunt, aquam quam pridie æger biberat, per os regurgitasse: Cætera abdomen imitatur tympani tentum deprehendimus, nec vel leviozem hujus contactum ferre poterat, pulsus naturali paulo frequentior, alvus respondit: dualius mixtur. ex aq. fl. chamom. tonic. tinct. Castor. &c. cum pulv. ex bol. ebor. & cinnab. antim. Postridie melius habuit, dormivit, sitis remissior fuit: sub vespere autem ingruentibus doloribus, ol. amygd. dulc. cum elect. croc. aliisque antispasmodicis propinari curavimus, a quorum usu deiecit æger, doloresque multum remiserunt, abdomine in priore statu nihilo minus permanente: perrectum in limilibus & juxta usurpata tinct. antim. D. d. morbi affinis ægroti nunciavit, ipsum modice habere, cessante dolore, neque abdomen amplius distendi: inde pulver. ex aperient. nervinum commendavimus, cujus basin constituit diaphor. mart. cum cinnab. antim. & ocul. cancr. non neglectis externe illinendis. Injeçtus quoque fuit per intervalla clyst. ex infus. iercor. equin. Et singula cum successu ut ad pristinam sanitatem rediisse visus sit: abdomen prorsus detumescere, & appetitu viribusque una redeuntibus; factum autem est aliquot septimanis post, cum appetitui, nimis indulgeret, & cibus horariis, caseo præcipuis se oblectaret, ut lenteriam funestam incurrit, cum appetitu aucto, adeo ut continuo cibos ingerere necesse habuerit, quos tamen indigestos mox deiecit, usque dum totus contabescens, diem suum parvo post tempore obierit. *Joan. Jac. Harderus in Apiano.*

Rogatus olim ut saluti consulerem Senis Reverendi morbo colico à multis annis gravissime obnoxii, eam medendi methodum, ac remedia quæ, jam describuntur, adhibui: quorum usu sedulo post mensem unum aut alterum melius habuit atque intra sesqui annum perfecte sanari visus est, ut postea dolorum paroxysmis prorsus immunis degeret: verumtamen Diathesis colica haud diu cessarat, & solennem medicinz cursum ipse omiserat, quin circa gulam in musculis deglutitioni inservientibus, resolutionem crebra vice infestantem passus est, ut sæpenumero ab alimentis ac præcipue liquidis, illic loci hærentibus suffocationis periculum incurreret. Contra hoc malum per remedia antiparalytica juvamen recipiens per 6. aut 7. deinceps annos valetudine mediocri potitus est: ac ultimo in medio itinere, Apoplexia tum primò correptus, mortem obivit. Satis obvium est, in hoc casu liquoris nervi recre-

menta circa abdominis plexus nerveos deponi solita, primò affectionem colicam excitasse, dein eadem ab ea parte exclusa, aliumque sibi nidum circa gulæ nervos, plexusque gangliiformes consenscentia, oesophagi resolutionem, sive Paralyin breviorē intumile, & denique propter eandem materiam uberi nimis copia in cerebri medulla restagnantem, aphoniam lethalem successisse.

Legulejus quidam callidus & vaser, quinquagenarius a multis annis cephalalgia perionica cum sensuum stupore & capitis gravitate insigni molestanti solitus, circa mediam ætatem prædictis affectibus valde laborans, à remediis topicis applicatis derepente levamen percepit: attamen paulo postea colica immani tunc primo corripiebatur; cujus insultus cum tantatrocia eum incessit, ut viribus subito fatiscentibus, crebra animi deliquia cum sudore frigido subiret, qui tamen Paroxysmus intra 24. horas, sine latum eruptione, aut ventris solutione, sensim evanuit. Deinceps vero huic morbo obnoxius accessiones ejus frequentes passus est, quas omnes (uti sedulo advertebant) plerumque capitis dolor cum vertigine & stupore præcedebat, hinc ut dolores colicos brevi postea inscutores præfigere soletet. In quodam Paroxysmo, qui per duodecim dies cum insigni ferocia perstitit, ipsemet ægrotans observavit, & mihi retulit, seie affectu circa abdomen urgente, nihil molestiæ in capite perferens, passionem autem colica remittente, illico vertiginem cum cephalalgia rediisse; ex qua reciproca symptomatum istorum à capite in ventrem, ac viceversa metastasi, arguere licebit eandem materiam morbiticam, in nervosis ductibus scætentem, modo inferius delapsam passionem colicam, modò superius restagnantem pathemata istæ cephalica intulisse. Huc referri debent, quæ Carolus Piso de seipso affectibus cephalicis, & doloribus colicis vicissim, & cum mutua dependentia affici solito accuratissime observavit. Sect. 4. c. 2. p. 35.

Non ita pridem Juvenis quidam Illustris, studiosus, & vitam sedentariam agens, queri cepit de magno sensuum torpore, ac hebetudine, nec non de capitis gravitate, & somnolentia fere continua: porro ventriculus adeo segnis, & stupidus evaserat, ut appetitui prorsus omni destitueretur. Dum contra malam hanc diathesin per remedia, quæ spiritus exsuscitant, eorumque sarcinas excutunt, curatio instituitur, vir egregius in passionem colicam (cui nunquam antea fuit obnoxius) atrocissimam incidit, à qua dolor immanis ac velut perterebrans, medium Abdomen umbilico intus retracto occupabat, atque non obstante remedium cujusunque generis quotidiano usu per tres hebdomadas, cum atrocitate insigni perstitit: ut nec somnum interim nisi à Narcoticis assumptis inire, nec doloris sedationem ullam nisi à fotu calidissimo recipere potuerit. Certè in hoc casu unicuique obvium est advertere, liquoris nervi impuritates ad plenitudinem quandam aggestas, totius ægrotudinis causam immediatam sive conjunctam fuisse: quæ scilicet materies primò in capite subsistens; cerebri torporem insignem & functionis Animalis oppressionem; deinde nervorum ductu in Abdominis



minis plexus nerveos prolapsa, colicam ita immanem, ac diuturnam intulit. *Thom. Willis de anim. brut. lib. 2.*

Prator quidam in provincia Columbæ, misero intellinorum cruciatu, non raro laboravit, hoc autem saccharo semper convaleuit.

℞. Mag. Succini 3ß. Cortic. Aurant. 3j. Nuc. moschat. 3ß. ol. Cinnamom. gut. vj. Anisi ʒj. Sacchar. Candidi 5j. Misc. f. pulvis Dosis 3j.

Capitaneus quidam navalis, per 14. dies colicâ afflictus, insuper Nephritidem habebat. Sub costis spurilis dextri lateris, gravissimum dolorem sentiebat. Debilis aderat pulsus, & sudor frigidus, atque suffocationes, flatibus sursum ascendentes, urgebant. Sequens autem mistura, unius cochlearis quantitate singulis vicibus usurpata, secunda adventus mei die, dolorem penitus repulit.

℞. Aq. Carminativæ 3iij. Spir. Nitri ʒj. Extract. Laudan. aromatic. gr. 6. Syr. Cinnamomi 3ß. misce.

Sequens quoque laxativum deinceps exoptato operatum est.

℞. Elect. de succo Rosarum 3vj. Pulp. Tamarindor. 3ß. Tartari vitriolati nostri 3ß. Tinct. Succini gut. 6. misce f. conditum.

Diebus abhinc quatuordecim redibant tormina, & capem misturâ annihilabantur. Tertiâ, post secundam curationem, septimanâ, symptomata hæc ultimo accesserunt, & illis denuo, per prædictam misturam sanatis, æger calculum sabæ majoris magnitudine emisit, quo facto, optima tandem valetudo huic viro permansit.

Vexilliteri cujusdam uxor, columbæ, laxâ alvo, biliosa excrementa ejiciens, per dies aliquot, crudelissimos intellinorum dolores passa est. Hanc sequens mistura restituit.

℞. Spir. tartari, Tinct. Succini an. 3ß. Laudan. aromatic. gr. 6. Aq. Cinnamomi. Nuc. Moschat. ana 3iß. Misce bibatur cochleatim.

Ego ipse, in prima apud Hollandos navigatione, sæpius colicâ cum vomitu, frigidoque sudore, miserrimè laboravi. Omnia medicamenta, quæ proficua judicavi, inutiliter tum adhibui, donec Tincturam Succini præparaverim, cujus usu non solum sanatus, sed & sic confortatus fui, ut, Dei gratiâ, octodecim annorum spatio recidivam haud senserim, medicamenta externa.

℞. Ol. Laurin. Anethini, Chamomillæ ana 3j. st. carui, Fœnicul. Cumini an. ʒj. Succin. lactid. 3iß. C.C. 3ß. misce f. linimentum. *Herm. Nicol. Grim. Comp. Med. Chemic. lib. 3.*

### Anatomica Inspectiones.

In Germania & præcipuè in Franconia ac in Norimbergico tractu frequentissimum hoc malum est. Quo vero modo & quibus de causis contingat, ex subsequenti historia intelliges; Secui Juvenem mulierem quæ primò ex epatis & vesicæ bilis obstructione in Tertianam notam, deinde in colicam passionem incidit, paulo post Paralytica reddita integrum annum vixit: quæ tamen usû thermarum aliqua ex parte sublevata ad extremum delirio ac Epilepsia correpta occubuit: Paralysis à principio

occupavit brachiorum superiores partes, sensum ad extremitates manuum, ultimo ad crura descendit: ægra atrophia contabescebat de ventriculi ardore, siti, appetitus edendi prostratione, alvi difficultate & dolore illi sinistri tensivo, gravique (sentire enim sese inquebat in illo loco pondus aliquod grave, tanquam plumbi massam) conquerebatur.

Hanc mulierem aperui, & reperi jecur pro corporis ratione nimis magnum obstructioneque minime vacans: Vesicam bilis bile crassâ ac nigra turgidam, Ventriculum humore plenum viridi, atque extensum: Ulterius descendens, inveni colon male atque p. n. conformatum. Siquidem ubi sacculus, sive monnculus situs est, & ubi colon ventriculo annexum est, colon fuit valdè laxum, flatibusque expansum, reliquis in locis ad crassum intellium usque angustum, sæcibus crassis, durisque in globulos concretos infarctum: Eodem modo conformatum vidi colon in multis foeminis. Reliqua viscera, tam naturalia, quam spiritualia, erant illæsa ac integra. Ex cerebri substantia inter disseccandum effluxit aqua tenuis, & colore subrubicundo, quod venarum arteriarumque incisioni adscribendum est: nam aqua, quæ omnes ventriculi scatebant, fuit tum tenuissima, tum limpidissima ac pura, nihil vero pituitæ in ventriculis cerebri vidi: Totum spatium quod in sacra fistula, inter tenuem ac duram membranam est, & ubi nervorum funiculi nervos constricturi a spinali medullâ recedunt, simili aqua plenum extitit. *V. Coiter lib. Observat. Anatom. & Chirurg.*

Matthæus Rumplerus Judicii Suburbani assessor vi probus & pius, constitutionis calidæ & siccæ, doloribus vagis in abdomine sæpe corripiebatur, quos tamen Enemate sibi familiari atque à beato Meisnero nostro in simili casu olim jam ei ordinato dissipare consueverat. Idem hoc anno 1671. quem ætatis suæ septuagesimum numeraverat, postquam per aliquot dies de doloribus infini ventris, non tamen adeò gravibus, ut decumberet, conquestus esset, tandem die 27. April. è horto suo domum rediens, circa vespere hora post quintam media, tam enormes passus est dolores, ut lecto suo se committere coactus fuerit. Adhibuit mox in subsidium enemata consuetum, quod cum nihil levaminis ei attulisset, iterare jussit, Dum vero Pharmacopæus eius præparationem molitur, urgentibus doloribus, iisque atrocissimis me ad se invitat. Adsum, & ægrum, cujus extremitates omnino frigeant, & qui totus copioso sudore frigidus fere disfluebat, de infixis in hypogastrio doloribus misere conquerentem audio, simul quoque arteriæ motum iusto celeriore deprehendo. Repetitur enemata, ex anodynis imprimis paratum injicere jubeo. Simul quoque varia interna atque externa adhibeo. Sic quidem interdum per aliquot intervalia remittere videbantur dolores, qui tamen postea atrociore rediere. Et licet tandem ad ipsa quoque Narcotica descenderim, eaque in desperato hoc malo satis copiosè exhibuerim, simul quoque quartum enemata applicare jusserim, ne tantilli tamen temporis inducias obtinere licuit. Unde viribus planè prostratis, postquam ultimâ ante mortem horâ, primum



COMA.

Vid.

CARVS &amp;c.

## COMBUSTIO.

*Curationes ; Consultationes ; Observationes & Anatomica Inspectiones ex variis.*

*Curationes.*

**A**mbustio tametsi affectus sit omnibus notissimus, clarioris tamen doctrinæ gratiâ cum sic describemus : *Ambustio continui solutio est, cuticula & cutis ut plurimum, nonnunquam & carnis musculoſa, venarum, arteriarum, nervorum, & cæterarum partium subjeclarum, vi ignis impressa.* Hanc autem Ambustionem sequuntur mox dolor acerbissimus, inflammatio, pustula, & si combustio profundior, corpusque cacochymicum fuerit, in sordidum ac difficulter sanabile ulcus non raro degenerat. Etenim in leviori combustionione, particula ignea cuticulam absque continui solutione penetrantes, cutem ipsam, ubi venarum, arteriarum, nervorum, ac lymphæductuum extremitates terminantur, lubeunt; ibidemque has a positione sua alterantes, variè contorquent, & totius texturæ cutaneæ conformationem pervertunt: in tantum ut e valis omnibus summe irritatis, humor aqueus igneis particulis imbutus in magna copiâ expuatur: Lympha istæ, quia cuticulam pertransire nequit, eam a cute separat, atque in pustulas veliculares attollit: è quibus demum sponte, aut occasionaliter disruptis effluit. Sed gravior si sit combustio; particula ignea altius penetrantes cutem non tantum, sed & ejusdem vasa; eique subjectas partes corrugari ac constringi faciunt, atque escaram inducunt; sicut sanguis, alique continuò affluentes humores retineantur, & sub cute illa indurata quali incarcerentur: hinc magis incalescant, effervescent, tandemque suâ acrimoniâ locum affectum erodant, & magnum ulcus efficiant.

Notandum autem, multiplices & diversas occurrere materias, quibus vim & qualitatem suâ magnis imprimit; quæ ut substantiâ differunt, sic etiam una multo vehementius erit, quam altera, sed quamvis combustio à diversis hat materiis, nihil tamen, vel parum ad curationem id facit. Atque adeò nulla desumenda est indicatio curativa à materia ignita, sed potius ab effectu, quem communicavit. Ut verò curatio ritè instituat, omnes ambustiones, à quacunque fuerint factæ materiâ ignita, distribuemus in tres gradus, seu species; viz. in levissimam, mediocrem, insignem.

Enimvero materia quæ urit si non diu adhæserit corpori, & levis fuerit, ut stramen, linum, stupæ, aut leve aliquod lignum, vel aqua quæ cito defluit, solummodo pustulæ seu parvæ vesiculæ eleventur; estque hic primus gradus seu species; cujus idcirco indicia sunt, cutis rubicunda

nium quidam sub viridia, mox atra vomitû rejecit, tandem die 28. Aprilis circa horam quartam matutinam placide obdormivit. Quamvis autem colica biliosa cum extinctum fuisse pronuntiaverim, attamen quia mox post mortem abdomen, alias attenuatum in inmensum crevit, suspicio apud consanguineos de veneno assumpto fuit orta, quæ nobis licentiam viscera scrutandi ultro concessit. Vocatur igitur Chirurgus Antonius; qui ubi primum cepit incidere abdomen, gravis erumpens fœtor magnam adesse corruptionem indicavit: Et merito. Nam Peritonæum cum omento adeo erant corrupta; ut ad levissimum tactum romperent. Intestina, præsertim tenuia cum colo nigerrima apparebant: Quorum illud flatibus, illa materia quadam sublimata, eaque crassioris consistentiæ, repleta erant. Pancreas totum ulceribus nigrioribus oblitum fuit. Hepatis ima pars nigricans, gibba pallida visa; quarum ista steatoma; sesqui pugni magnitudinem excedens, contidebat. Vesica biliaria liquore flavo turgibat. Lien pallidus, quâ parte omento annexatur, plurima fovebat ulcera nigricantia. Ventriculus cum vesica urinaria & ureteribus vacuus & sanis similia observata. Renes sani nihil monstri aiebant. Reliquas partes molestissimus fœtor lustrare prohibuit. *Georgii Segeri in Misc. Curios.*

Virgo quatuordecim annorum, colico dolore atroci laborans cum ventris intumescencia. Dolor iste intra viginti dies eam de medio tollit. Per biduum ante mortem, multum sanguinis nigerrimi per anum deposuit.

Intestina multo humore viscido erant exteriorius perfusa, in eoque frutula casei instar ac varia magnitudine dispersa. Intestina quoque sanguine nigro turgabant. In venis & corde nullus sanguis.

Ex humoribus acris ac viscidis, diu in intestinis hærentibus, sæpe oritur dolor vehementer, qui ab intestino colo, nomen derivat, vocaturque dolor colicus. Si humores, ex glandulis intestinalibus manantes, nimiam visciditatem & acrimoniam sibi ex sanguine adsciscant, istas glandulas obstruunt, liquoresque exillantes acorem contrahunt, intestinorumque membranas vesicant, doloremque inferunt, & hinc illæ lachrymæ.

Credo vasa lactea rupisse, candidumque lac per intestina erupisse, ibique ex diutina mora in coagulum mutasse, unde frutula Casei. Serum interim a coagulo segregatum aciditatem induit, quâ intestina magnopere lædebantur. Hinc non tantum mucus, sed & convulsiones, quæ omnia viscera, totumque abdomen intendeant, ut intympanitide sit. Imò ob vehementes convulsiones, vasa sanguinea, ad rupturam usque ita convellebantur, ut ipse sanguis pere libere currere haud potuerit, unde sanguinis turgescencia, & ob eruptionem, ejusdem ante obitum excretio. *Steph. Blancard. in Anat. Præf.*

## COLICÆ INFLAMMATIO.

RELAXATIO &amp;c.

Vid.

GREGYLIONIS MORBI.



cunda, dolor pungitivus & nisi statim remedia adhibeantur, cuticulæ a vera cute separatio, cum vesicularum eruptione, in quibus limpida quæ continetur.

Secunda Ambustionis species censetur, si materia urens diutius corpori adhaerit, aut violentiore calore imbuta fuerit, quemadmodum ferrum ignitum, aut liquefactum aliquod metallum, lignum durissimum, pix, oleum, cera vel simile: tunc enim non solum elevantur pustulæ, verum & cutis ipsa adurit, exsiccatur, contrahitur, nondum tamen facta est crusta vel cicara.

Tertius gradus excitatur, si res ignita diutissime adhaerit, & violentissimum in se continuerit calorem: tunc enim non solum cutis, verum & caro, venæ, arteriæ, nervi, & ceteræ partes subjectæ, comburantur, contrahuntur, & in escharam siccantur. Hujus signum est, si subjecta cutis nigra vel saltem livida conspiciatur, & quum scalpello pungatur obtuse sentiat, dura nimirum, & exsiccata existente crusta, quam demum deciduam ulcus excipit profundum, putridum.

Caterum levis combustio, ubi solummodo cutis læsa est, quamvis dolorifica, facile tamen & brevi sanatur, vixque cicatrix apparebit, modo recta & methodica instituta fuerit curatio. E contrario insignis Ambustio difficulter sanatur, imprimis quæ, ob cutis contractionem & deperditionem, rugosam reliquit cicatrice.

Combustiones capitis & faciei, si magnæ & profundæ fuerint, glabras relinquunt cicatrices, quandoquidem adeo arefacta, & contracta ab igne cutis est, porique ita sunt occlusi, ut dehinc pili erumpere nequeant.

Oculorum combustio, in primis Ciliorum, ac Tunicarum Adnatæ & Corneæ quantumvis levissima sit, periculosa tamen est, facillimeque visus depravatio, aut saltem imbecillitas sequitur, palpebræque invertuntur.

Periculosa item sunt Combustiones inguinum atque Abdominis, & difficulter sanantur. Periculosa quoque est Ambustio a fulmine, & plerumque lethalis.

Ad vasa majora quæ penetrat Ambustio periculosa est, profunda in primis si fuerit, atque gangranam non raro accersit.

Quoad Curandi Methodum: quamvis passim infinita ad ambustiones in usum sunt remedia, omnia ad hunc finem tendentia, ut empyreuma sive particulas igneas in parte combusta relictas aut suffocent, aut resolvant, dissipentque: docet tamen Praxis, frigida ambustiones non curare; sed ipsam, ignis particulis intro reclusis, dolorem summopere augeri, nec non inflammationem, gangranam, imò & sphacelum quandoque excitari: calida verò, quæ empyreuma evocant, solummodo prodesse; unde & Mebeis aque ac Practicis haud ignotum est, partes combustas non frigida immergendas, sed potius igni admovendas esse.

Ut igitur methodica institatur Ambustionis curatio, diligenter examinandi & inspicendi sunt omnes ejus effectus & accidentia, ut remedia pro re nata applicentur & mutantur. In primis autem, si nondum elevata fuerint pustulæ, evocetur empyreuma, hoc est, igne in

parte affecta relictæ particulæ resolvantur, dissipentur, parte læsa igni admodum, vel calidæ aquæ immersa, aut si fieri id nequeat, intingatur spongia aut linteam reduplicatum aquæ calidæ, & loco ambusto applicetur; vel imponatur Sapo vulgaris seu flores cerevisiæ admoveantur; Cera quoque in mortario cum Sale contusa, & loco combusto applicatur, igneas particulas educunt, nec sinunt ut pustulæ eleventur: Enimvero si præcaveri possit, ne pustulæ oriantur, non est quod Patiens deinceps ullam molestiam vereatur.

Eundem in finem Hildanus lib. de combust. cap. 6. hoc laudat unguentum.

℞. Ceparum ʒi. β. Salis, Saponis Veneti an. ʒj. simul in mortario contundantur, & addito oleo Rosaceo & Amygdalarum dulcium fiat unguentum.

Laudibus suis quoque merentur sequentia.

℞. Saponis Veneti ʒiij. ceparum ʒi. β. Salis ʒvj. Olei ovorum ʒβ. Rosarum, Amygdal. Dulc. an. ʒi. β. Mucilag. Semin. Cydoniorum ʒj. M. F. unguentum.

℞. Ceræ citrinæ, Resinæ, Adipis Ovilli, Olei Raparum an. ʒj. misceantur. S. A. pro unguento.

Barbette ad omnis generis Ambustiones valde extollit sequens unguentum, si liquefactum parti combustæ sapius illinatur, dehinc recens Folium Brassicæ, Betæ, aut Plantaginis superimponatur.

℞. Fol. Salviæ rec. M. j. Plantaginis M. ij. Butyri recentis infusuli ʒvj. Stercoris gallinæ rec. albiss. ʒiij. frixentur per horæ quadrantem, & expressio servetur usui.

Paræus in Xenodochio Parisiensi hoc feliciter usurpari scribit.

℞. Lardi concisi lbj. liquefiat in aqua Rosacea, & coletur per linteam rarum, hinc quater aqua Plantaginis lavetur, tandem add. Vitellos trium ovorum M. F. linimentum. Alii istud commendant.

℞. Tincturæ Saturni, olei Rosarum an. ʒi. β. agitentur probè pro linimento.

De omnibus tamen unguentis hoc notandum, ita comparata esse debere, ut renaciter parti combustæ non adhaereant, sed facile abstergi & removeri possint. Neque enim ulcera hæc ferunt, ut fortiter abstergantur; at fere linteo subtilissimo parti admoto a pure mundari debent.

Notandum quoque pleraque hæc non convenire Ambustioni oculorum neque iis esse adhibenda; quin prius imponendum Collyrium, ex aqua Rosarum & Plantaginis cum mucilagine seminis cydoniorum, fenigræci &c.

Vesiculæ aut Pustulæ si aduerint, nec malum idcirco sit gravius non statim aperiendæ. Si enim mox aperiuntur, ob denudatam cutem dolor excitatur, & tardius curatio absolvitur. Verum tertio circiter die ubi cuticula jam regenerari incipit, aperiendæ: quin & diutius apertio non protrahenda, ne contentus humor acrior fiat, cutemque porro erodat, excadat.

Caterum ad primum hunc Ambustionis gradum pertinet ea, quæ a pulvere tormentario fit, de qua lib. 2. cap. 14. dictum fuit.

Atqui Ambustio si tam alte penetraverit, ut non



non solum pustulæ eleventur, verum & cutis combusta siccata & contracta fuerit, tuncque Cepæ, Sapo, Sal & quæ sunt hujus generis medicamenta sunt applicanda sed imponantur ea, quæ combustam & corrugatam cutem emollire ac lubricam reddere queant, quæque humida & temperate calida sint.

Igitur Pustulæ omnes forficibus in primis incidantur, quò lymphæ particulis ignis imbuta effluere possit. Cuticula quoque, ubicunque separata est, à vera cute abstrahatur, ne laniosa materies sub ipsa colligatur. Dehinc parti combustæ imponatur nunc laudatum unguentum ex oleo Raparum, Resina, cera citrina, & Adipe Ovillo.

Vel ℥. Olei Rosacei, Liliorum alborum an. ʒss. unguenti Basiliconis ʒj. Vitellos duorum ovorum. M. F. unguentum.

℥. Butyri rec. insuli, Pinqued. Gallinæ rec. an. ʒj. Cera citrina, olei liliorum alborum an. ʒss. simul liqueant, & in mortario admisceantur Croci pulv. ʒj. mucilag. sem. Cydoniorum ʒj. pro unguento.

Hildanus hoc laudat unguentum emolliens, dolorem leniens, & paulatim cicatricem inducens.

℥. Butyri rec. & loti aqua rosacea ʒij. olei violarum, ovorum, amygdal. Dulc. an. ʒss. Farinæ Hordei ʒj. Pulveris Croci ʒj. Mucilag. sem. Cydoniorum ʒj. Cera q. s. Misceantur S. A. in mortario pro unguento.

Proderit it. imposito uno ex præscriptis unguentis cum reduplicatis linteaminibus desuper applicare Muriam, in qua Mala limonia conservantur modice calefactam, quæ mirum in modum empyreumati adversatur. In facie tamen hujusmodi medicamenta, quæ acetum aut sal recipiunt, propter oculos, non sunt applicanda.

Emollitæ & satis lubrica facta cute combusta, doloreque mitigato, nonnulli medicamentis exsiccantibus, veluti unguento de Tutia, Diapompholige, similibusve, cicatricem inducendam esse volunt. Sed ut ut fatear, quoniam hujusmodi exsiccantia cutem contrahunt, hinc & turpes non raro efficiunt cicatrices, horum usus semper tutus non est. Præsertim quum supra scriptis emollientibus, ad finem usque curationis usurpatis, voti sui compos plerumque fieri soleat Chirurgus.

Interim quia ambustiones præsertim quæ in cutis sunt superficie, ut plurimum vehementer dolent, observent Chirurgi, ut blandè ulcera hæc abstergant. Hildanus, nè abstergendo ulcera exciter dolores, telâ subtilissimâ, qualis est Cambriacensis, aut syndone cooperire solet totam partem ambustam, nec illam remover, donec ulcera sint sanata, testaturque, per hanc telam pus facillime effluere, & virtutem medicamentorum ad ulcera satis pervenire posse.

Sed periculosior est Tertius Ambustionis gradus, propterea quod in gangrænam & sphacelum nonnunquam soleat degenerare. Enimvero graviore illâ combustione cutis vasa, partesque ei subjectæ corrugantur; ac ita constriunguntur, ut cum sanguis affluens, tum spiritus influentes liberè permeare, atque per partem ambustam radiare, eamque vivificare amplius

nequeant: hinc suffocato extinctoque nativo calore, pars emoritur, corrumpitur.

In hac ambustionis specie pustulæ omnes vesiculares primum sunt incidenda, ut acris, urentique serum effluere possit. Deinceps escara leviter est separanda, aut saltem diversis in locis ad sanam usque carnem incidenda, quo acris sub crusta retenta lymphæ effluere, medicamentum penetrare, & quicquid a combustionem induratum est emolliari possit.

Hæc autem escaræ separatio primo aut secundo die fieri debet, priusquam affecta pars inuletur; estque hoc quoque unguentum statim ab initio adhibendum.

℥. Butyri rec. insuli ʒij. unguenti basiliconis ʒi ss. olei Liliorum alborum, amygdalar. Dulc. an. ʒss. vitellum unius ovi M. F. unguentum.

Dehinc linteam reduplicatum sequenti emulsionem imbutum, tepide ut applicetur suadet Hildanus.

℥. Sem. Cucurbitæ ʒij. Cydoniorum ʒij. fœnigræci ʒj. Contund. in mortario & emulg. cum aqua puræ lbj. in colatura solvatur Saponis Veneti ʒss.

Sed in facie si fuerit ambustio, Sapo minimè est addendus, propter oculos; sed ejus loco admisceatur aqua rosarum & plantaginis.

Vel loco emulsionis ad mitigandum dolorem, cutem emolliendam, & digestionem promovendam imponatur fomentum.

V. g. ℥. Rad. althææ ʒi ss. sem. Cydoniorum, Fœnigræci an. ʒss. Fol. Malvæ, Althææ. flor. Camomillæ, Meliloti an. M. j. coquantur in aqua pura, aut, si dolor vehemens fuerit, in lacte Dulci, & Colatura sit pro tota.

Ubi escara, & quod combustum est separatum fuerit, ulcus mundificandum, carne implendum, & cicatrice occludendum. Verum cicatrifiantia non minus sicca sint, ne turpis & Rugosa fiat cicatrix. Atque ideo hic ab Hildano hoc laudatur emplastrum.

℥. Emplastri Diapalmæ ʒij. gallinæ Anseris an. ʒss. liqueant simul, hinc admisceantur aluminis usti, Plumbi Calcinati, Lythargiri, Lapidis Calaminaris an. ʒj. Agitentur in mortario plumbeo, & addendo mucilag. sem. cydoniorum & fœnigræci q. s. Fiat S. A. unguentum.

At si adeo magna fuerit combustio, ut in gangrænam & sphacelum commutetur, curetur eo modo, ut lib. I. cap. 17. docuimus.

Si vero ad supercilia, labia, aut in Digitis facta fuerit combustio, diligenter ea cutetur, neque partes hæc contrahantur, & ad invicem conglutinentur; quin potius linteamina, filamenta, aut lamina plumbeæ tenuissimæ partibus, ubi conglutinationis periculum est, interponantur. Oculi si ambustione læsi sint, statim instilletur lac muliebre vel Vaccinum recens ac tepidum; idque vel solum vel nuxtum cum aqua rosacea. in qua parum Croci integri, maceratum fuerit. Linteum item reduplicatum, & hoc lacte imbutum oculis tepide imponatur, & quotiescunq; siccum fuerit renovetur. Aut loco lactis usuperetur collyrium: v. g.

℥. Aquæ Rosarum ʒij. Plantaginis ʒj. sem. Cydoniorum, Fœnigræci an. ʒss. croci integri ʒj. macerentur quatuor horas, & Colatura sit pro Collyrio, cui lac muliebre vel Vacci-



num recens admisceri possit.

Dehinc inter duo tenuia linteamina calidè applicetur Cataplasma.

℞. Pulv. Pomorum repurg. ℥iv. Coctæ in Aqua Rosacea & Fœniculi ad mollitiem & minutim contritæ add. Mucilag. sem. Fœnigræci ℥i β. Pulv. Croci gr. xii. Albumen unius ovi Lactis dulcis rec. q. l. M. F. Cataplasma.

Atque horum medicamentorum usui est insistentum, donec ab inflammatione & dolore immunis sit oculus. Tunc enim applicetur Collyrium magis exsiccans & visum roborans.

℞. Aquæ Rosarum, Plantaginis, Fœniculi ana ℥i β. Troch. Albor. Rhalis subit. pulv. ℥j. Tutia præp. ℥ij. Sacchari Saturni gr. s. Misceantur pro Collyrio.

Curandum quoque diligentèr, nè Palpebræ retrahantur: id enim maximum adfert deformitatem. Hoc tamen si contigerit, sique cutis propè oculos indurata fuerit, emolliente aliquo unguento affecta pars inungatur, vel illinatur identidem loco combusto *Pinguedo Anguilla assata*, ut indurata ac retracta, cutis ita emolliatur, & lubrica reddatur.

Inguina si comburantur, quum sint loca humida, laxa, adeoque humorum affluxui obnoxia, remedia usurpentur magis siccantia, quàm in partium aliarum ambustionibus. Atque ideò si pustulæ nullæ eruperint, medicamenta ex *Sapone, Cepis*, similibusque parata utilia sunt. Quòd si elevatae sint pustulæ, statim aperiuntur, ut acris effluere possit humor. Deum applicetur unguentum v. gr.

℞. Unguenti Rosacei ℥j. Basiliconis ℥vi. Olei ovorum, Amygdalarum dulc. an. ℥β. liquefactis admisceantur, Pulv. Aloës, Myrrhæ an. ℥j. Pro unguento, cum tenuibus filamentis applicando.

Insuper totam partem affectam Hildanus coöperit hoc Cataplasmate.

℞. Farinæ Hordei, fabarum an. ℥ij. Pulv. Rosarum Rubrarum ℥β. fiat ex his cum s. q. Oxymellis. S. A. Cataplasma, quod calidè applicetur.

Sed verò articuli seu juncturæ si comburantur, cum partes sint excarnes nervosæ, ac magno sensu præditæ, nè humorum affluxus fiat, hinc & gravius malum excitetur, medicamenta ex *Sapone, Cepis* & huiusmodi acrioribus (nisi combustio levis fuerit) minimè sunt applicanda, sed emollientibus, lenientibus & Anodynis affecta pars est tractanda. Atqui diligenter, præcavendum in magnis Juncturarum Ambustionibus, nè tendines, articulorumque ligamenta retrahantur, & juncturæ incurventur: Quamobrem totum membrum sæpius inungendum Oleo Lumbricorum, Anethino, Liliorum alborum, Axungia gallinarum, Caponum, Unguento althææ, similibusque; ut quæcunque indurata sint lubrica reddantur, & ita serventur. Interim quoque Ferulæ, aliaque ex ligno vel papyro crassiore facta instrumenta, circum Juncturas sunt ponenda, ut tendinum retractio impediatur. Blandè tamen omnia agenda, nè dolor excitetur. Quis si supervenerit, protinus secandus est, imposito Cataplasmate v. g.

℞. Micæ Panis Albi lb β. Coctæ in Lacte Vaccino ad formam pultis add. Butyri Recentis, olei Amygd. dulc. an. ℥j. Ovorum ℥β. Pulv.

Croci ℥j. Vitellum unius Ovi M. F. Cataplasma, calidè applicandum, & identidem renovandum.

Verum in principio si satis diligens non fuerit Chæirurgus, nec ferulas, aliave convenientia instrumenta adhibuerit, sic ut juncturarum combustarum tendines, partesque nervosæ retrahantur; hinc & articulationes incurventur, pars affecta foveatur. Decocto Emolliente, ex Radice Althææ, Bryoniæ, Liliorum alborum, foliis althææ, Malvæ, Chamæpitheos, Floribus Camomillæ, hyperici, semine fœnigræci, Lini & atque deinceps inungatur Unguento Althææ, Pinguedine Gallinæ, Anseris, &c. Tandem applicetur Emplastrum de Mucilaginis in corio extensum. Tendinibus autem & ligamentis articuli sic satis emollicitis ad extensionem accedendum est: quæ sine dolore & periculo satis commodè fieri potest instrumentis ad hoc negotium accommodatis.

Denique post Graves Ambustiones ob nimiam cutis ab igne contractionem & indurationem, turpes non raro relinquuntur Cicatrices præsertim si sicca nimis cicatrificantiâ usurpata fuere. Hæ ut tollantur, in primis durities cicatricum est emollienda, & lubrica faciendâ Litù ex Pinguedine assatæ Anguillæ, Caponum, Gallinarum, oleo Liliorum alborum ovorum.

At in facie si fuerit cicatrix, atque ita elevata, contracta & indurata, ut maxima inde turpitudine & deformitas sit, ea tolli nequit nisi per excisionem. Hildanus lib. de Combust. c. 14. *Joh. Munnike Prax. Chirurg. lib. 3.*

*De Fulminis, & quomodo eis qui ab eo lassi, sit succurrendum.*

Quia ignis cœlestis omnium vehementissimus & periculosissimus, ac in se contineat quasdam facultates supernaturales, quibus homo protinus extinguitur, cunctandum non est, quid faciendum sit. Hanc ob causam, in gratiam tyronum, Chirurgorum castra sequentium, breviter declarare placuit, quomodo eis, qui à fulmite lassi, occurrendum sit; omnibus tamen Chirurgis ad huiusmodi ægrois accersitis, suadeo, ut operam dent, quo possint sibi adjutum habere Medicum.

Quantvis autem ignis ille cœlestis, ut experientia docet in se facultates quasdam supernaturales, & hominis ingenio planè abditas, contineat, id tamen perspicuum est, ignem illum adjunctam habere qualitatem, & materiam mirum in modum malignam, atque venenosam, idque satis denotat teter ille & pessiferus odor, qui tum ex hominibus, tum animalibus, arboribusque à fulmine ictis erumpit. Hinc fit, ut ursi, vulpes, cuniculi, aliaque animalia, iis in locis fulmine ictis, degentia (ut viri nonnulli docti testantur) propter hujus odoris sævitiâ, in eorum speluncis morari non possint. Canes item de carne animalium à fulmine interfectorum non gustant. Ex his perspicuum sit, quàm periculosum sit, uti herbis iis in locis collectis: Conspicitur enim quandoque, ut Olaus Magnus Hist. Septentrionalium lib. 1. cap. 12. testatur, terra quasi sulphure conspersa. Mirum igitur nemini videri debet, aliquando homines lubitò, & sine manifesta causa mori.

Est



Est autem ignis ille, quemadmodum Seneca testatur, triplex. Primum enim subtilissimus est, hinc fit, ut inanimata, veluti arbores & similia illa pervolet. Secundò præter subtilitatem illam, materiam quandam continet siccissimam, & magis terrestrem; hinc fit, ut partes corporis molles, illas penetret, duriora verò, quemadmodum ossa rumpat; id verò non solum animatis, verum etiam in inanimatis accidere observavi. Superiorem anno 1604. cum ligna pro usû culinæ advehenda curassem, occurrit ingens quercus, quæ ante annos aliquot à fulmine icta fuerat, quod quidem ex fistula, quæ in exteriori parte corticis à summitate ad radicem usque conspiciebatur, manifestum erat. Extrinsecus tamen pulchra & virescens erat quercus illa. Fisso trunco inventa est medulla, quæ in quercis arboribus durissima, à summitate usque ad radicem planè cariosa. Tertiò materiam habet adhuc magis terrestrem & crassam, quamobrem non usque adeò penetrat, uti de aliis diximus, sed incendit ea, quæ primum obvia veniunt, quemadmodum videmus civitates, templa, aliaque ædificia à fulmine incendi, & in cineres redigi.

Id autem fit partim propter ignis vehementiam, partim quoque, quod humores ut plurimum ad defensionem & extinctionem ignis negligentes sint, ac tardi. Communis enim opinio est, ædificia fulgure incensa, non posse aquâ restitui. Mihi vero contrarium videre contigit. Anno enim 1591. Hildenz in patria, turrim templi, altam satis & lapidibus tectam, fulminis ictu adeò incensam vidi, ut ex una parte flagrare cæperit, trabesque nonnullæ ingentes ab ictu illo fissæ fuerint, quod tandem incendium postmodum aquâ restitutum fuerat. Sic etiam iurit hæc species ignis corpus humanum, ac post se relinquit velligia satis manifesta, quemadmodum pustulas, maculas nigras, & fractiones ossium. Subtilis autem & abdita illa penetrabilis qualitas prioris ignis, venenum illicò secum ducit ad cor & cerebrum, moriturque animal ipso momento. Secunda quoque huius ignis species, quia subtilis est, statim officit partibus nobilibus, sed quia conjunctam secum habet materiam magis terrestrem, quemadmodum dixi, ossa etiam & vasa abruptit, atque protinus extinguit animal, aut ipso momento, aut paulò post. Tertia verò species, quia (ut dixi) ipsius materia terrestris est, & crassa, minus erit periculosa. Ex his facile apparet, qualisnam methodus curandi sit instituenda. Illa enim in hoc consistit, ut cor partesque nobiles corroborentur & à vaporibus malignis & venenosis defendantur. Ideoque illicò exuendæ & abjiciendæ sunt vestes, non solum, ut inspirationi & expirationi pulmonis consulatur, verum etiam nè malignus ille vapor fulminis, qui vestibus inhæret, partes nobiles planè suffocet. Exutis suffumigata baccis Juniperinis, radicibus Angelicæ, foliis lauri & rutæ, exhibenda illi sunt lapidis Bezoardici in subtilissimum pulverem redacti grana 6. aut 8. cum aqua buglossæ, Cardui benedicti aut Melissæ dissolutæ, provocandusque est sudor, quò natura venenum ad exteriora propellere possit. Si lapis ille in promptu non fuerit, exhibenda est theriaca ad ʒj. plus aut minus, prout

ætas fuerit. Labia, lingua, nares, tempora, frons & arteriæ ad carpum inungendæ sunt vino malvatico, in quo theriaca sit dissoluta. Cordi applicetur sequens Epithema.

℞. Aquarum buglossæ & Melissæ an. ʒij. Vini malvatici ʒj. ʒ. Aquæ cinamomi ʒj. Electuar. de gemmis ʒj. Conf. Alkermes ʒss. Coci ʒj. Mixtis omnibus cordi tepidè applicetur.

Brachia & crura fortiter sunt liganda, lintellisque asperis & calidis fricanda, ut venenum ad exteriora attrahatur. Si pustulæ, vulnera, aut maculæ adsint, applicentur protinus cæpæ cum sale, foliis rutæ & theriaca, quassatæ, applicenturque cucurbitulæ, hirudines, incisis prius velicis. Putrefactia & Escharam relaxantia hic locum non habent. Excidatur igitur Eschara Scalpello, & forficibus, postea ulceræ sequenti unguento sunt mundificanda.

℞. Mellis rosacei ʒij. Pulveris radic. Vincetoxici & Angelicæ ana ʒss. fol. rutæ cum pulveribus quassator. p. ij. Theriacæ ʒij. Aquæ vitæ ʒss. Misce.

Fiat Mundificativum. Mundificatis ulceribus, inspergendus est sequens pulvis Sarcoticus.

℞. Pulveris radicum Vincetoxici & Angelicæ ana ʒj. Myrrhæ, Masticis, Olibani, Fol. Scordij ana ʒiv.

Fiat omnium tenuissimus pulvis, ex quo cum sufficiente quantitate succi Nicotianæ, Saniculæ vel pyrolæ fiant trochisci, qui in umbra exiccantur, iterumque in pulverem redigantur. Is pulvis pretiosissimus est, & in hujusmodi, aliisque ulceribus putridis & venenosis, veluti in Anthrace, Gangræna, & Cancro: Mundificat enim, & putredini adversatur: admixto parum aluminis ussi, cicatricem quoque inducit. Si qua ossa fracta fuerint, reponenda sunt, sed prospiciat Chirurgus, ne Emplastica astringentia & refrigerantia, ut in fracturis fieri solet, applicet; his etenim expiratio & evaporatio veneni impeditur, applicetur ita sequens cataplasma.

℞. Farinæ fabar. Lupinor. ana ʒj. ʒ. Pulv. radicum Vincetoxici & Angelicæ ana ʒss. Fol. Rutæ M ʒ.

Coquantur cum oxymelite ad formam cataplasmatidis. Postea admisceatur theriacæ, aut Mithridatij ʒj. Fractura singulis diebus semel deliganda, & cataplasma renovandum est; membro prius vino, in quo radices Vincetoxici & Angelicæ coxerint, & theriaca parumque; aceti rosacei dissoluta fuerit, abluto. Idque tantisper, dum metus veneti adest; faciendum: Defensivum ad latitudinem palmi minoris supra fracturam applicetur, ut elevatio veneni ad partes nobiles impediatur.

Interim autem dum externa, uti dixi, adhibentur. Cor, partesque nobiles roborandæ sunt; non tantum superscripto Epithemate, verum etiam conservis & Electuariis, veluti conservâ florum Buglossæ, calendulæ, rosmarini, melissæ, corticum citronum. Diamargarito frigido, Lactificante Galeni, Confectione Alkermes, aquâ cinamomi & similibus.

Utatur jusculis carniū recentium, in quibus borrago, buglossum, calendula, acetosa, rosmarinus, majorana, macis, crocus, cinamomum, & similia coxerint. Ab omnibus, quæ difficilis sunt digestionis, abstineat. Prospici-



ciendum est quoque, ut alvus semper sit lubrica, idque si naturaliter nequeat, fiat suppositorius aut Enematibus lenitivis. A purgantibus & venesectione abstinendum est, nisi aliqua adfuerit occasio particularis, ubi consulendus est Medicus. *Guilielm. Fabric. Hildan. libr. de Combustion.*

*Combustionis à fulmine curatio.*

Pertinet huc & ambustio quæ fit à fulmine. Cum verò fulmen malignum & venenatum qualitatem conjunctam habeat, id quod ex tetro odore & summa vi nocendi & interficiendi patet ut & ex eo, quod canes animalium fulmine occisorum carnes non attingunt: statim homini à fulmine tacti pulv. aliquis Bezoardic. vel theriaca, vel aqua Bezoardica, exhibenda, sudorque provocandus. Arteriæ quoque, Labia, Lingua, nares inungenda: vino in quo theriaca dissoluta sit, & carpis ac cordi epithema cordiale imponendum: loco verò ambusto applicanda unguenta ex cæpis, foliis rutæ & theriaca. Exhibendi etiam sunt syrupi, conservæ, & pulveres cordiales.

Si eschara indurita sit, ea scalpello maturè removenda, & tale unguentum adhibendum.

℞. Pulv. rad. Vincetoxici, Angelicæ ana unc. β. sol. rutæ, scordij ana drach. j. Theriacæ drach. ij. Spirit. theriacalis drach. iij. Mell. ros. unc. ij. Misc.

Ulcere mundato pulvis hic sarcoticus inspergendus.

℞. Rad. Angelicæ Vincetoxici ana unc. j. Myrrhæ, mastich. thuris, folior. scordij ana unc. β. Aloës succotrinæ drach. ij. F. pulv. qui irroretur succo Nicotianæ veræ & faniculæ, & F. Trochisci, qui in umbra siccentur, atque ubi opus, iterum in pulverem redigantur.

Si qua ossa etiam fracta sint, non illa vulgata cataplasmata adstringentia usurpanda, ne veneni evaporatio impediatur, sed aliud ex farina fabar. hordei, lupinor. rad. Angelicæ, Vincetoxici, sol. rutæ, scordij theriaca. Idque singulis diebus renovandum, donec veneni vis victa & discussa sit. Supra verò locum defensivum apponendum, ne vapores venenati per vasa sursum ad cor ascendant. *Daniel Sennert. Pract. lib. 5. part. 2. cap. 18. operum T. 3.*

Combustiones omnes seu à pyrio pulvere invento, seu à fervente oleo, aqua, metallo aut aliis quibuscvis rebus fiant, solâ inter se magnitudine differunt. Hæ primò quoque tempore dolorem parti inferunt, & calorem præter naturam imprimunt, qui ignis naturam redolens impressionem illam relinquit quam græci *ἰσχυρὸς* nominant, impressionis illius magis, minuscve expressa cernuntur vestigia, prorei comburentis efficacia, suscipientis, seu patientis partis conditione, & in eadem mora. Si superficialia sit combustio in pustulas & vesiculas cutis exurgit, nisi mature fuerit provisum. Si ima & profundior extiterit scarrha, seu crusta inducitur, ambusta carne vi ignis in crustaceam illam duritiem abeunte. Ignis in quamcunque partem inciderit, vis adurens intemperiem in ipsa relinquit calidam, cutem condensat, contrahit & inspissat, unde dolor: à dolore humorem ex partibus vicinis & remotis at-

tractio: humores illi in aquosos & serosos humores mox versi, dum exitum querunt, sibi ab inspissata cute ignis actione præclusum, ipsam altius attollunt, & vesicas quas cernimus, excitant. Hinc varæ indicationes ducuntur, unde remedium ad ambullia varietas. Alia enim empyreuma, idest, impressum igniti caloris in partem vestigium delent, atque dolorem demulcent; alia vesicularum generationem intercipiunt: alia ulceri curando dicata sunt, procurato scarrhæ ante omnia lapsu, detergendo carnem, & cicatricem inducendo. Tollendo dolori, & igniti calori, comparata remedia duorum sunt generum: alia enim vi refrigerante id faciunt, quâ nempe, calorem præter naturam extinguunt, sanguinemque & humores qui in partem vi caloris & doloris infuebant reprimunt. Alia viribus contrariis prædita calida sunt & attrahentia: quæ nempe cutem relaxando & poros referando, resolvunt & dissipant serosos humores, qui pustulis ortum & materiam præbent. sicque per accedens dolorem & ardorem sedant.

Refrigerantia sunt aqua simplex, plantag. rosarum, solani, hyoscyami, cicutæ succi herbarum refrigerantium, unguentum album, capthuratum, nutritum, rotatum, populeum, recenter parata. Hæc & similia subindè renovabuntur per initia præsertim quousque dolor & calor evanuerint. Cæterum eadem illa remedia tepida sunt applicanda: nam si actu frigida apponerentur, dolorem excitarent adeoque fluxionem: adde quod eorum vires in partem ipsam subire & pervadere non possent, & de potentia in actum educi: protectio sic apposita dolorem sedant. inflammationemque & vesicarum exortum prohibent.

Inter calida & attrahentia, quæ rarefaciendo & foras attrahendo atque dissolvendo, dolorem, ardoremque ambullorum leniunt, primum obtinet locum ignis, cum adustio levicula fuerit, attractionem enim facit similitudo. Itaque ignis extrinsecus intrinsecum & inultum ad se ignem dum foras evocat, mali quod intulerat & creaverat alexiterium est. Paratū etiam facile & expertum remedium est, si quis statim à combustionē cepas crudas & cum sale intritas dolenti parti apponat. Notandum tamen quod remedio huic locus non est, si jam in ulcus abierit malum: dolorem enim exacerbarer, & inflammationem augeter: à cute adhuc integra, ac non excoriata, si apponatur nihil tale facit, sed pustularum & vesicularum exortum prohibet eam ob causam hoc etiam remedij genere utitur Hippocr. in scarrhæ lapsu procurando.

Si quis ejus remedij usum ex principio medico, quod contraria contrariis curari dicunt, refellere contendat, atque ided Cepas Galeni autoritate in quarto gradu calidas ad ambusta non esse utiles asseveret, is intelligat, potestate quidem cepas esse calidas. & actu humiditas: itaque temperie calida rarefacere, humiditate autem activa remollire cutem: quo fit, ut attrahant & foras evocent, dissipentque inultum calorem, sicque pustularum generationem intercipient. Denique ignis ut initio notavimus, igni remedio est. Nec vero Gal. sententia, morbi semper contrariis sanantur, sed aliquando similibus & si omnis sanitas à contrario sit



sit ut legitur lib. 5. simpl. contrarii nomine latiss sumpto, ita enim & phlegmone sæpe curatur resolventibus medicamentis, quæ nempe vacuata phlegmones materia, ipsam phlegmonem sanant. Ergo combustis partibus, nondum quidem exulceratis aut excoriatis est utilis ceptarum usus. Sunt vero & alia pleraque remedia vesicularum generationi prohibenda utilia, cuiusmodi est simus equinus recens, in oleo nucum aut rosaceo defricus, & parti impositus: ad idem valet acetum, succus uvarum immaturarum vulgo verius, atramentum.

Item sambuci aut ebuli folia in ol. nucum cocta & addito paucio sale intrita.

Item calx extincta in pulverem redacta, & cum unguento rosaceo incorporata.

Item jardi & salicis folia cum paulo sale contrita. Prodest etiam ad ambusta fabrilis glutinum in aqua ex vase duplici liquatum, & penna parti ambustæ oblitum.

Item crassior vernix, quo politores seu ensium fabri utuntur. Cæterum si dolor acerbior urgeat, ter quaterve in die ac nocte, hæc erunt renovanda remedia, ut illa demulceatur doloris acerbitas. Quod si his remediis impedire non possimus pustularum generationem, primum atque subortæ erunt, excidenda venient, quod humor conclusus exitu prohibitus acrimoniam acquirit, quæ carnem subiectam erodit, unde emergunt, ulcera cava: sic causarum multiplicatione, & materiz incremento, augetur inflammatio non per novem modò dies, ut vulgus dicitur, sed per longe plures, nonnunquam etiam per pauciores, si corpus neque cacochymum, neque plethoricum extiterit, & dolori, atque ardori, mature opportunis remediis occursum fuerit. Cum combustio tanta fuerit ut scarrham induxerit, ejus lapsus est procurandus remollientium & humectantium medicamentorum usu, ut axungiarum, oleor. butyri cum paucio basilico, vel ungenti sequentis.

℞. Mucillag. sem. psylli. & cydonior. an. ʒiv. Gummi. tragac. ʒij. extrahantur cum aqua pariet. Olei Lilior. ʒij. ʒ. ceræ novæ q. s. fiat unguentum molle.

Ulceribus atque excoriationibus remedia convenientia apponentur: quæ nempe nullam habent acrimoniam; cuiusmodi est unguentum album Rhasis camphoratum desiccativum rubrum, rosatum & nutritum sine aceto concinnatum, vel oleum ovorum in mortario agitatum, itemque calcem vivam novies lotam, & cum unguento rosac. vel butyro recenti salisque experte, & aliquot ovorum vitellis induratis mixtam, Vel

℞. Butyri recentis sine sale ustulat. & colati ʒvi. Vitellos ov. n. iv. cerusæ lotæ in aqua plant. vel rosar. ʒij. tuthiz similiter lotæ ʒij. Plumbiusti & loti ʒij. Misceantur simul & fiat linimentum, Vel

℞. Cortic. Sambuc. viridis & olei rosar. an. lbj. Bulliant simul lento igne, postea colentur & adde olei ovorum ʒiv. Pulv. cervi & tuthiz præpar. an. ʒj. ceræ albæ q. s. fiat unguentum molle.

Cæterum siccantium remediorum quantitas semper augeatur, vel minuat, prout ulceris conditio postulare videbitur. Dolori demul-

cendo sequentia conveniunt, nempe mucagines sem. lini, psylli, & cydonior. extractæ in aqua rosarum vel communi, & paucâ camphora adlita, ac citius quam par est resiccetur id remedium addendo oleum rosaceum. Ovorum etiam vitelli quinque vel sex cum mucillaginibus seminis lini, psylli, & cydoniorum mixti & sæpius renovati dolori sedando valde conferunt, Vel

℞. Laridi veteris per frusta concisi lbj. liquefiat in aqua Rosar. deinde coletur per rarum linteum & frigidum, lavetur quater cum aqua hyosciani, vel alterius generis ejusdem, deinde incorporentur vitelli ovorum recent. num. 8. fiat unguentum. Si acris est dolor, ut in hoc ulcerum genere esse solet, byssina tela erunt velanda ulcera, ne cum detergentur asperiore linteï consistentiâ irritentur. Sic enim per byssi raritatem liber saniet exitus, & medicamentis ingressus atque contactus extiterit. Cavendum etiam, cum ambustæ fuerint palpebræ, labra, digitorum latera, jugulum, axillæ, poplites, cubiti flexus, ne sibi invicem ullius rei interventu committantur, alioqui tandem mutuo contactu sibi adhærebunt. Itaque illi rei providebitur apta membri collocatione ex linteï mollis interjectione. Adnotandum vero venit quod profundiores combustiones, quæque densiorem scharram faciunt superficialis minus dolorificæ sunt. Cujus rei veritas eorum exemplo intelligitur qui sectis artubus candente ferro muruntur, nam mox a combustione exiguum dolorem sentiunt. Ingenus enim illa combustio sensum adimit, sensorii vehementia sentientibus partibus sensum adimente, quemadmodum supra cum de nervorum vulneribus & doloribus ageremus notatum a nobis est. Ejusmodi scharræ lapsus procurabitur profundiore scarificatione qui ad vivum usque penetret, ut sic perspiratû liberiori, subjecti & conclusi humores gaudeant, sitque remollientibus medicamentis patientior ingressus ut perfundere possit scharram, atque sic emollire, ut tandem decidat. Reliquum curationis detergentibus medicamentis & sarcoticis perficietur, additis supra dictis unguentis pulvisculis metallicis, cum præsens necessitas videbitur postulare. Quâ vero quantitate miscere singula hæc debeant, dici nequit propter eam, quæ in corporum temperie & consistentia est varietatem, morborumque contumaciam aut facilitatem. A combustionem cicatrix sere aspera, hiulca & scæda visu relinqui solet. Itaque illa arte complanari ac moliri debet: Non est verò omittendum, hoc loco, quod pulvis pyrius ignescens sæpe in carnem penetrat, haud ulcerata vel excoriata cute: itaque tenuitate sua sic in carnes se insinuat & penitus infigit, ut nullis remediis, nec phaznigmis, nec vesicatoriis, nec scarificatu, cucurbitulis, aut cerniculis eximi & inde elici queat. Aded ut semper impressa maneant vestigia: haud aliter quam barbaris servis inusta semel stygmata, nulla postea arte deleri & obliterari possunt. *Joh. Vigierius Chirurg. lib. 3.*

Præservatoria indicatio est. *Procul ab igne:* apud veteres ratione fulminis se muniverunt vel lauro quam in capite gestarunt, qualem coronam ex lauro concinnatam turpissimus Imperatorum Tiberius Nero ob id gestasse dicitur,



teste *Suetonio in ejus vita cap. c. 69.* sed fabulosum puto. Alij pavidi vituli marini pellem super caput ponunt, alij aquilam ob Jovis armigerum servant, ejusque lapidem, sed omnia tabulosa, superstitiosa, imo irrita esse adversus altitonantis Dei iram credimus, juxta *Psalmistam Psam. 139. v. 7.* quo ibo a spiritu tuo, & quod à facie tua fugiam? Si ascendero in cælum, ibi es, & si stratum fecero in inferno, Ecce tu ades, si assumam alas auroræ, & habitem in novissimo maris, etiam illuc manus tua deducet, & apprehendet me dextera tua.

Missa quoque facimus istorum Impostorum ignem devorantium arcana atque experimenta, quibus se muniunt, ut sine damno possint tractare ac devorare ignem, utut modum nobis tradat. *Plin. l. 29. c. 3.*

Majoris verò momenti est indicatio curatoria, quæ consistit in hoc, ut fibræ aliæque partes combustæ ac dilaceratæ non in tantas concinnationes transeant, & statim applica sequens epithema, cum subtili & duplicato lineo loco ambusto, sicque vesiculæ impediuntur.

℞. Aquæ, Calcis vivæ ℥v. spir. vini Camph. ℥ij. M.

Vel ℞. Spir. vini vel aq. Regin. Hungar. ℥iv. Camphor. ℥ij. aq. ad ambust. Qu. ℥i β. Balsam. nervin. m. d. ℥j. vel elixir. vitæ ℥β. M.

Sunt alij, qui ad vesiculas impediendas apponunt liquorem falsum in doliolis butyri saliti reperibilem, ut & aquam marinam vel salisam, alij saponem nigrum, mel, butyrum, decoctum raparum, muriam Harengorum, aut muriam Brassicæ, præprimis si conquassentur cum oleo lini vel raparum applicant. Alii albumen ovi tanquam volatile constans ex animalibus partibus volatilibus ambustis applicatum pro arcano venditant. A Clarissimo Dn. Muys laudatur creta cum spiritu vini camph. imposita cum arctâ ligaturâ.

Linimentum sequens ad ambusta optimum effectum nobis præstitit, imprimis si combustio à pulvere pyrio fuerit producta.

℞. Cerussæ pulp. rad. consol. maj. ana ℥β. Lithargyr. lap. calaminar. minij ana ℥ij β. Camphor. ℥β. ol. rapar. M. f. l. a. unguentum.

Hoc tamen fateri debemus, liquida, ut decoct. calc. vel ejus aqua cum spiritu vini camph. vel Matrical. plus nobis præstitisse, quam unguenta ac linimenta: Mixture enim his continuo calidè partes combustæ laventur & iis madafacta lintea imponantur.

Si tantum cutis externa fuerit ambusta, mulieres nostrates propriam inungunt salivam sale volatili constantem, alix cepas cum sapone in forma cataplasmati parant, imponuntque. Plures pro experto exclamant remedio calcem vivam cum oleo raparum commixtam, & calidè ambustis partibus impositam. Alii utuntur oleo raparum cum creta. Rustici stercus gallinæ cum butyro & fuligine, additis herbis Salv. cort. sambuc. misc. & ad formam unguenti coquunt applicantque non absque levamine.

Aliquando ad generosiora transeundum est, ubi enim desinit anicula, ibi sæpè incipit Medicus in curandis scilicet morbis, in ambustis ergo profundioribus sequentia eligere solemus.

℞. Ungu. Basil. ℥j. ol. Juniperi ℥ij. Terebinth. Ven. ℥j. ol. anisi ℥vj. macis ℥β. ceræ ℥ij.

croc. ℥j. styrac. liquid. ℥j. gummi. galban. ℥β. M. f. l. a. unguentum.

Quod etiam referri potest unguentum ad ambusta seq.

℞. Cort. med. sambuc. ℥ij. infund. & coq. in olei rapar. ℥β. colato oleo add. axung. ovillæ, ceræ flavæ ana ℥ij.

Liquefactis insperge continuo agitando, pulv. ceruss. minij ana ℥ij β. & si parum refrigerint immisc. Camphoræ tritæ ℥ij. M. f. l. a. unguentum. In gradu secundo, ubi cutis nimis fuerit contracta, ad fortiora transeundum est, & sequens calidè apponi potest.

℞. Sp. Matrical. ℥ij. Tinct. galban. ℥β. aq. ad ambust. vel calc. ℥i β. camphor. ℥j. aq. Regin. Hungar. ℥i β. Balsam. nervin. Tinct. Castor. ana ℥β. M.

Urgente etiam necessitate superponi potest ad calorem partis conservandum sequens cataplasma.

℞. Herb. scord. rutæ ana M. β. rapistr. M. j. melilot. P. j. malv. P. ij. N. M. Caryophyll. an. ℥β. sal. commun. Tartar. sal. arn. oniaci ana ℥j. cum mull. & urin. foetid. q. s. f. adjectâ farina fabarum cataplasma.

Si vero gangræna ac sphacelus parti combustæ imminet, confugiendum est ad sequens cataplasma calidè applicandum, quamvis hoc in casu etiam conducatur aqua calc. cum spiritu vini Camphor.

℞. Herb. saliv. rutæ scordii ana M. j. cep. crud. rec. ℥ij. Sapon. liq. nigr. ℥β. myrrh. aloës an. ℥ij. Croc. op. ℥ij. aq. Tartar. sal. armoniaci ana ℥i β. l. a. c. vin. & mull. f. cataplasma.

Et si malum fuerit intensius, ut cutis planè fuerit contracta, cataplasmati prædicto addi potest unguentum Basilic. styrac. liquid. ana ℥v. gummi. elemi ℥vj. Galban. ℥ij. olei ceræ ℥ij. M.

Oleum Philosophorum etiam externè illitum egregiam sæpe navat operam, ut & omnia salia volatilia, quæ liberum ac convenientem succis motum restituere, meatus obstructos referare & acredinem illius obtundere valent, hic adhibenda sunt. Omnia enim hactenus recensita remedia ex particulis volatilibus constant, quæ à materia subtili facili Marte commoventur ac agitantur, hinc similem motum communicant carni combustæ ac emortuæ. In graviore ambustione faeces cerevisiæ cum pane applicatæ optimum præstiterunt effectum, ut & allium, lentes palustres, empl. diasturni Myrs. mucilag. sem. cydon. cum aqua sperm. ranar. extract. additis camphora & saccharo Saturni quod elegans est remedium tepidè applicatum.

Momordica in oleo lini infusa & ei addit. ol. Saturni citra inflammationem Ambustiones sanat, oleum apum cum paucis olei ovorum vel scorpionum sæpè juvat.

Vel ℞. Calc. viv. lotæ ℥j. sulphur viv. ℥j. ol. lini rapar. an. q. s. m. pro linimento.

Sunt quoque, qui in Ambustione commendant oleum Nucum cum ovorum luteis mixtum.

Si combustio per prædicta remedia sublata fuerit ad cutem deleniendam & dolores sedandos sequenti utere.



℥. Ol. lini ʒ β. N. M. dest. ʒβ. ungu. Basil. ʒ j. gummi. Elemi. galban. ana ʒ ij. Camphor. ʒ β aq. Regin. Hungar. ʒ ij. croci ʒ j. M. f. l. a. unguentum.

Omni enim ope à combustione gangræna ar-cenda est, hinc varia cataplasmata seu j. m. di-cta ex volatilibus & spirituosiss paranda, & ca-lide applicanda sunt, spirituosæ enim obstru-ctiones tollunt, tenacem mucum resolvunt, im-primis si camphorata fuerint simul mixta, hinc sæpè sufficit Spir. vini camph. C. aq. calc. Tinct. castor. spir. coq. par. Matricar. Bals. Nervin. Tinct. Galban. quæ omnia compactas particulas val-dè resolvunt & fluidiores reddunt: sic etiam sa-lia volatilia oleosa adhuc sunt fortiora, quia eorum particule melius penetrant, & solidio-res ac hrmiiores sunt, & omnia optime resol-vunt.

Hic Chirurgo moneo, ut omnia medica-menta in combustione calidè applicent: quia actualis calor ipsam sæpè sanat combustionem; succi enim coagulati per externum frigus à ca-lore iterum resolvuntur ac attenuantur. Capæ etiam locis ambustis applicata magnum affe-runt solamen, quoniam in se continent sal vola-tile, cujus ope visciditates resolvuntur, hinc, seu diximus, omnia salia volatilia, tum inter-ne, tum externe in combustionibus conveniunt.

Sapo Venetus est in combustione egregium remedium, quia constat ex penetranti sale vo-latili & acri, cujus ope visciditates faciliè resol-vuntur, item ex oleosis particulis, per quas cutis fibræ demulcentur, & acidæ salsæque particule temperantur.

Aqua forti si quis combustus sit, non incon-veniens erit imponi externum epithema ex a-quæ sperm. ranar. cum Butyro Saturni. *Minde-rem in Med. Militar.* curavit Chymistam ab aqua forti combustum solo oleo lini atque cre-more lactis, sic etiam empyreuma vulgo di-ctum evocatur. Si in levi combustione mem-brum admoveamus igni, particule antea im-pulsæ & continuum solventes ab aliis ingredien-tibus retropelluntur, atque simul empyreuma. Malè faciunt qui admoveant combustis partibus caulica, quia magis discindunt fibras. Ca-vendum quoque ne applicentur frigida, quæ malum potius augent, quam imminuunt, omnia enim tepide applicentur.

Crusta vel eschara si adsit, illa incidenda ac leniter separanda est, si non potest fieri in tota parte, fiat diversis in locis, ut ita ichor, devo-rans fibrillans, subtus contentus queat efflue-re. Si verò ad nervos usque pertingat, summâ cautione opus est in removenda eschara, & prius applicanda sunt nervina & demulcentia.

Si in oculo est ambustio, ratio præsertim ha-benda est doloris, in quem finem conducet lac muliebre sæpius tamen mutatum, quoniam fa-cilè acescit, reliqua etiam ophthalmica, aqua nempe rosar. mucilag. sem. cydon. fœmigrec. croc. aq. euphras. hic verò apprimè convenit arcanum. Timæi à guldenklees seq.

℥. Pomor. d. num. 2. coq. in aq. Euphras. rosar. ana q. s. ad mollitiem, trajiciantur per setaceum: add. Sacchar. alb. ʒ ij. camphor. gr. xv. Croci gr. v. M. & applicetur calidè.

Si combustio in juncturis circa tendines &

ligamenta observetur, statim ad laudata Epi-themata & cataplasmata confugiendum est. Conducet etiam in hac combustione ol. septem florum Myns. cum album. ovi & mucilag. sem. cydon. Quando oïla simul sunt ambusta exi-mantur frustula forcipe, si vero tota pars fuerit adusta, ense recidenda est.

Cum a pulvere pyrio pars quædam corporis fuerit combusta, & grana remaneant cuti inhi-xa, non statim ea acu vel alio instrumento exi-menda sunt, sed potius suppurationi relinquen-da, quæ dein in conspectum veniunt, si enim grana pulveris pyrii in frustula fregeris, tantum se magis cuti implicant, & difficilior aut nun-quam eximuntur.

Quando vero prælaudata applicaveris medi-camenta, grana illa pulveris e cute ab efferves-cente lymphâ facili marte propelluntur, quod etiam confirmat *Clariss. Musf. dicens in Podali-rio suo reditu. pag. m. 39.* Grana pulveris tor-mentarii relicta in facie quidam ope acus cha-lybeæ eruere conantur, sed supervacaneum est, quandoquidem fibrillas per emollientia in tan-tum flexiles reddere possumus ut grana sponte prolabantur. Ut etiam paucis interna reme-dia in combustione proficua attingamus, scien-dum est, si cacoehymia conjuncta est, & succus nutritius nimis acris sit, ut consolidari nequeat Ambustio, conveniunt omnia ea interna, quæ sequenti capite de vulneribus præscribimus, imprimis hic commendamus diaphoretica ex Antimonio & Mercurio dulci parata. Antihect. Poterij, oculos cancri, Sacch. Saturni, item sul-phurata, camphorata, myrrhata, & semper in-terponenda sunt volatilia, quæ visciditates re-solvunt, in quem finem etiam Chirurgi cum comodo uti solent, decocto lignorum cum Theâ; cum Sarcosis & agglutinatio partium dependeat à chylo, & neutiquam a vulgo di-ctis Sarcoticis emplastris, aliisque Chirurgorum medicamentis; hoc Chirurgis portò notandu. n est, ut fugiant in combustione adstringentia & poros obstruentia medicamenta, tum interna, tum externa, quia his combustio magis exasperatur, visciditates cumulantur, & particule in-clusæ & infixæ marcent partibus combustis.

Si combustio abeat in fistulum & Medicus ni-mis serò advocatus fuerit, sunt qui in hunc fi-nem commendant Butyrum Antimonij rubr. vel lini destillat. ex capit. Mort. Vitrioli, sed nos commendamus potius Balsamum nostrum divinum, raro in fistulis fallens remedium.

In quibuscunque Ambustionibus Agricola ex-tollit sequens.

℥. Sacchar. Saturni q. s. add. ol. rosar. M. F. Linimentum, quo locus ambustus calidè in-ungendus est. Oleum Hyperici n. d. etiam egre-gium est sæpius applicatum: imò sexcenta alia possunt proferri, sed si hæc non satisfaciunt, alia certe etiam vix præstabit: meliora enim & approbata junioribus communicamus Medicis ac Chirurgis, quibus in praxi consummati non opus habent. *Joh. Dalaus Encycloped. Chirurg. rational. lib. 6.*

In cura combustionis interdum simul cum externis primariis usurpantur interna, eaque nitrata quæ febrim ambustioni supervenientem interdum optime compescunt: Hinc nitrum fixum nitr. antimoniatum pulvis pyrius & simi-



lia internè sunt optima, quibus celeberrima ex oculis cancerorum parata Chirurgica aut solum ipsi oculi cancerorum simul commodè subungi possunt.

Externè quod attinet, quoad eorum usum studiosè observandi sunt ambustionis gradus.

Nam in primo gradu remedia ordinariæ Empyreuma & inde ortum nutrimenti in parte alterationem tollentia, & ad ambusta dicta applicanda sunt, qualia primario ferè sunt ex cepis; ex calce viva, ex stercoreibus animalium, ex succo cancerorum & similibus v.g. ex calc. viva usitatissimè fiunt unguenta ad ambusta: si vè applicetur mox aqua calc. vivæ imprimis si pareatur C. decocto raparum; recipiendo nempe decoctum raparum, in quo colato calx viva extinguitur. Hæc aqua calc. vivæ c. linteis duplicatis calidè aliquoties imposita, mirè curant ambusta.

Aliàs usitatum est, ut recipiatur calx viva lota sæpius & ab omni acri sale probè temperata cum quocunque alio permisceatur ingrediente v. gr. Recipienda calx viva aliquoties lota eaque probè subigenda est cum butyro majali non salito in mortario plumbeo ut fiat unguentum, quod ipsum applicandum est, idque liquidum, loco ambusto.

Melius est unguentum quod fit ex calc. viva p. ij. cremor. lactis: mellis despumat. ana p. j.

Hæc omnia probè mista in consistentiam unguenti liquidioris s. linimenti optimè conveniunt ad tollenda ambusta.

Melius est si recipiatur calx viva eaque in aquam simplicem projiciatur, ita ut aqua aliquot digitos 4. vel 5. superemineat, & ubi per se efferverint, infundatur ol. Rosarum; sic enim subito gelaſcent in consistentiam Butyri, quæ ipsa loco ambusto miro cum successu possunt illiniri.

Hinc succus allii aut cepar. illitus recenti combustionis ratione sal. vol. acris præcavet omnem acorem in locis ambustis exulcerationem inferentem, aut ex his fiat tale unguentum insignis commendationis.

℞. Ceparum crudarum ʒi β. Salis. Sapon. Venet. ana ʒβ. M. in mortario affundendo ol. Rosarum q. s. F. unguentum. Egregium in ambustis.

Optimum est linimentum si cum aceto solvatur minium aut lithargyr. solutioni filtratæ addatur ol. raparum rec. expr. q. s. ut coeant in consistentiam linimenti liquidi, quæ aliquandiu ducantur in mortario plumbeo, donec fiat gryscum, & asserva pro usû.

De cancri it. dixi quod mirabile suppeditant remedium contra ambustiones: id quod fit si cancri fluv. vivi contundantur in mortario, & succo inde expresso calidè fomentatur pars.

Vel cancri contus. misceantur cum Butyro Majali non salito ferveant commodè & desumpuntur, donec fiat unguentum subruffum, quod transcolandum est, & experiemini usum efficacissimum contra ambusta.

Nam etiam ex cancri composita remedia conducunt insigniter, si ex pulvere pyrio orta sit ambustio; contundendo scilicet cancrios fluv. c. aqua Rosarum, aut quod melius c. aqua spermatis ranarum ex contulis, mucago crassior

aquæ pennista separatur, eaque pars s. membrum pulvere pyrio ambustum fomentetur & illinatur. Nam hæc sunt egregia in tali casu.

Notum aliàs est quod etiam mucilagines sem. Psyllii, aut quod melius mucilag. sem. Cydoniorum parata C. spermat. Ranarum & cui parum sacchari Saturni sit permistum illita C. pluma parti ambustæ optime conducant ad tollendam ambustionem.

Vulgare est & primâ fronte vilissimum remedium compositum ex p. j. ol. olivarum mista C. album, ovi p. ij. quæ duo conquassentur & exactè misceantur: & nihilominus hoc ipsum applicatum vere est unguentum singularissimi effectus; Cui tamen adhuc præferendum est similiter prima fronte vile apparens, quod fit ex ol. lini C. aqua rosarum lot. ʒβ. Vitell. ovorum an. iv. quæ probe subacta applicantur calidè parti ambustæ idque egregio cum successu.

In graviore combustionis talia etiam, sed tamen paulo fortiora applicanda sunt remedia nempe ubi pustulæ jam sunt excitatæ, citra hoc ut cutis subiecta sit reddita corrugata, relinquendæ hæc sunt ad diem tertium, quo tempore nisi sponte rumpantur aperiendæ sunt, & modo dictis unguentis pars ulterius curanda.

Sin v. à graviore ambustione c. subitaneis pustulis ipsa cutis sit combusta, subito pustulæ sunt aperiendæ, & subito apertis pustulis modo dicta remedia applicanda; aut in apertis vesiculis imponendum est unguentum quod fit ex stercore gallinæ cocto c. Butyro non salito, quæ duo imposita optime talia curant empyreumata.

Potentius adhuc est si Recipiatur sol. salv. recent. M. j. plantag. M. ij. Butyr. recent. non salit. ʒvj. sterc. Gall. recent. & quantum fieri potest albissimi ʒiij. frixantur mutuo per horæ quadrantem, & inde factâ expressione servetur usui.

Notetur hoc, quia bonum aut.

℞. Pulp. pomorum dulcium sub cineribus coct. ʒij. far. Hordei, sennigr. ana ʒβ. Croci ʒβ. M. f. linimentum, vel cataplasma molle, quod illitum & dolores sistit, & cutem corrugatam planam & mollem reddit.

Quod si v. in Tertio gradu ex cute omnino combusta facta sit crusta, & eschara, tunc mox apertis omnibus pustulis opera danda est, ut primis duobus diebus separetur eschara, applicando scilicet desuper linimenta præter empyreuma corrigentia imprimis emollientia & laxantia quæ inter mucilago sem. Cydoniorum C. spermat. ranarum extracta, addito butyro non salito ol. lil. alborum & vitello ovi, non ultimum meretur locum. Quin & commodè applicatur linimentum paratum ex butyro recenti bene agitato in mortario plumbeo C. decocto Malvæ; hoc n. tq. linimentum illitum applicando desuper folia Brassicæ tepida subito separat escharam.

Quod si durior & contumacior non separatur eschara, tum hæc ipso ferro, aliquot incisuris est incidenda, & sordes ac Ichores subtus ac latentes evacuandæ, nè harum acore ulcus profundum putridumque generetur.

Factâ humoris evacuatione modo memorata emollientia applicanda; donec separetur eschara: quâ separatâ digestivis & mundificantibus



bus relictum ulcus est consolidandum: in quo casu m. unguenta ex calce viva tota cum ol. rosar. & vitello ovi. unguentum album: unguentum album camphoratum: it. unguentum Alabastrinum convenienter possunt usurpari & imponi. *Michael Eschmullerus in Chirurg. Med.*

*Consultationes.*

Ancilla 16. annorum, dum imprudenter circa culinæ focum versabatur, evertit vas, aquæ ferventis plenum, in suum crus, ita ut tibia sinistra, ad genu usque, & supra illud, iniuriam in modum aquæ adureretur. Accessit mox ingens dolor, cujus vehementiâ totum crus ad imam usque plantam valde intumuit. Ab initio applicata fuerunt lintea spiritu vini madefacta, ex quorum usu tu nor quidem nunc nihil subsedit: verum cum ægra sequentibus diebus à locis frigidis sibi non temperaret, factum est, ut dolor, inflammatio, aliaque symptomata, in dies magnum incrementum sumerint: Adest jam febris & magna inquietudo: crusque rursus valde intumuit.

Pars affecta est crus sinistrum: quod ad oculum, & ex quærela ægræ patet.

Morbus quicquid affligit est intemperies calida & serosa sinistri cruris cum tumore conjuncta; quæ, ab illapsu aquæ servidæ excitata, combustio cruris vulgo appellari solet.

*Causa* hujus morbi externa fuit aquæ istius ferventis in crus ancillæ illapsus, illa enim suo fervoris motu insensibiles particulas cutis & vicinarum partium ita disposuit, ut subtilis materia sive æther, qui in eis existerat, vehementius se & particulas istarum partium posset agitare; atque ita ultionem in crure produxit. Ultra autem cutis partes vehementi suo motu nervos vicinos agitando, agitationemque illam ad cerebrum & ibidem ad mentem deferendo, ingentem illum cruris pepererunt dolorem; qui spiritus in ventriculis cerebri existentes ita detinuit, ut illi copiosius in partes affectas fluentes, poros vasorum in eis existentium multos aperuerint, quod humores biliosi & serosi ibi à reliquo sanguine separati, & in partes affectas per poros illos nimis apertos copiose ruentes, totum crus ad imam usque plantam, in magnum humorem distenderunt, intemperietque calida & serosa perfuderunt.

Tumor autem ille intemperiesque cruris, ex adhibito cum linteis vini spiritu, valde fuerunt inminuta; spiritus enim vini primum calore & humiditate sua, poros partium combustarum aperiendo, serosos mordacesque vapores & humores foras eduxit; & deinde quamvis spiritus vini in aliis partibus excitet calorem, is tamen partibus ambustis hic profundius sese imminuendo, tales ibi fecit poros, ut subtilis sive æthereæ materia sese vehementius in eis movere non posset, atque ita aliquam refrigerationem induxit.

Cum verò ægra hæc deinde sibi à locis frigidis non caveret, factum est ut frigus aeris poros in partibus ambustis nimium clauderet, atque ita acres mordaces & calidos vapores & humores, alioquin, exhalaturos, in eis retineret. Hi autem retenti moverunt ita partes ambustas, ut inde dolor, inflammatio, aliaque symptomata in dies magnum incrementum, per partium pravam

dispositionem à vaporibus istis retentis orientem, sumperint, febrisque, inquietudo, & tumor totius cruris accesserint.

Morbus hic, propter magnum suum à naturali statu recessum, gravaque quæ adiunt, symptomata, periculosus est: metus enim est, ne si non satis benè curetur, turpetem, gangranam, vel alium gravem affectum inducat.

Curatio itaque recta mox adhibenda; eaque consistat in intemperiei, tumoris, doloris, reliquorumque symptomatum, per peculiaria ambustis contraria ablatione.

Mox itaque ubicumque epidermis nondum separata est, applicetur sequens unguentum.

℞ Caparum crudarum ℥i℥. salis lapidis Veneti alb. an. ℥j. misceantur in mortario, addendo ol. ros. & amigdal. dulc. q.s. ut fiat unguent.

Deinde toti cruri, pedi, & genu, hoc adhibeatur cataplasma, quotidie usurpandum, ad finem curationis usque.

℞ Farin. hordei, f. hær. an. ℥vj. sem. fœnug. ℥j. cydoniorum ℥℥. herb. malvæ, althææ, cum rad. pulveris. an. ℥i℥. Rad. curcuma: pulveris. ℥℥. butyri recent. ℥iv. croci ℥j. Pulveres sem. fœnigræci & cydoniorum primo aquâ parum coquantur, quæ cum refrigerata iterum fuerint, reliquæ farinæ & pulveres, una cum butyro adjiciantur, coquanturque in lactis vaccini q.s. ad consistentiam Cataplasmaticæ, cui admisceantur vitelli ovorum num. 2. appliceturque calidè.

Sub vespèram sumat hunc haustum anodynum, subinde reiterandum.

℞ Lactis amigdalati ℥iv. Syr. de papavere ℥iij. misce.

Postridie sumat talem bolum, subinde repetendum.

℞ Electuar. diapruni sol. ℥ij. scammo. creni. tart. an. ℥℥. syr. rosol. q.s. M. pro Bolo.

Dum Cataplasma adhibebitur, humores illapsi in pus convertentur, quod forsan per poros insensibiles cutis foras expelletur.

Continuandus horum usus ad finem usque: in nonnullis tamen locis magis humilis circa finem curationis adhibeantur linimenta exsiccantia, ut unguentum de cerussa, de minio & similia.

Dietæ sit tenuis & refrigerans; abstineat à vino; utatur cerevisia tenui & decocto hordei, in quo agrimonia & veronica sunt coctæ. *Henric. Regius apud Theodor. Craanen Medicat. lib. 4.*

Filius molitoris cujusdam quinque circiter annorum puer, in ignem culinarium pronus incidens, subuculâ, quæ solâ amictus erat, flammam concipiente, toto corpore, maxime vero in abdomine, manibus & facie adeo ambustus erat, ut ipsa cutis & in quibusdam partibus etiam subiecta caro adusta videretur; dolor aderat immanis & hinc vigilæ perpetuæ cum extremâ viriani imbecillitate.

Ambustionem hanc curatû quidem fore difficilem prædixi, quatenus profunda pluresque partes ambustæ imprimis abdomen, cujus musculi ob varios motus variè extenduntur & contrahuntur, nihilominus tamen tentandam, idque non frigidis, ut vulgi est opinio, sed calidis quæ peculiarem empyreuma evocandi vim habent. Quemadmodum enim partium refrigerata.



tarum frigus optime frigidis, nive scilicet aut aqua frigida, extrahitur, sic empyreuma non nisi calidis evocatur, ratione similitudinis. Prescripti hoc nomine decantatum illud ambustionis remedium, quod ex olei olivarum parte una & album. ovorum partibus duabus componitur, nec inefficax, praesertim in facie deprehendi; Verum in abdomine, ubi profundior & eutem penetrans erat ambustio expectationi nostrae parum satisfacere videbatur, quapropter incisus pustulis loco affecto non solum ea quae empyreuma extrahunt, sed & cutim exiccatam emolliunt, imposui.

℞. Alburnor. in profluente recente capto. ℞j. frigantur in sartagine cum butyri Majalis ℞. q. pinguedo fundatur super aq. frigidissimam, coagulata separetur, hinc add. Unguent. basilic. 3j. Ol. Lil. albor. rosar. amygdal. dulc. ana 3℞. vitell. ovor. num. ij. Croci ʒj. M. Fiat. Unguentum.

Manibus idem unguentum applicuimus, interpositis digitorum spatiis, ne forte coalescerent, linamentis siccis: Tandem separatis escharis ulcera mundavimus, & sarcotica cicatriceque inducentia applicuimus, quae ne turpes & rugosae praesertim in facie fierent, devitatis valde siccantibus, emollientia subinde adhibuimus, qualia recipit sequens linimentum.

℞. Pingued. Capon. hominis, piscis tithymali ana 3ij. Ol. myrrh. 3℞. Lil. albor. ovor. ana 3℞. Succ. lumbric. 3v. M. F. Linimentum.

Interea dum haec fierent, etiam virium inbecillitati prospeximus, exhibendo saepius cochlear unum atque alterum mixturae cordialis.

℞. Aqu. cordial. frigid. 3ij. Flor. borrag. bugloss. ana 3j. Cinam. absque vin. destill. 3ij. Carbuncul. 3j. Confect. Alkerm. 3ij. Spir. rosar. rub. Idæi ana gt. xv. Rotul. man. Christ. perl. 3ij. M. ad arcendas vigilias & conciliandum somnum doloremque qui admodum urgebat sopiendum per intervalla dedi pulvisculum meum anodynum ex syrupo flor. Rhizados & aqua hypnotica.

℞. Pulv. med. anodyn. ʒj. Laudan. opiat. ʒi. M. in mortario marmoreo F. pulv. Baldass. *Timaeus Casuum Medicin. lib. 6.*

### Observationes.

Viggerdus Simonis, super luculentum ignem in cacabo bonam resinae quantitatem liquefiebat, eaque, cum nimis efferveret, forte flammam concepit: hanc extinguere, & pulvini cacabum obturare volens, improvidus nimis ambas manus resinae liquefactae bullienti & jam iucensae totas immerisit, easque vehementer concussit: illud ipsum uxori, eandem flammam etiam extinguere volenti evenit: tandem flammam extinctam, de immenso manuum ex ambustione dolore uterque graviter conquerebatur. Praesentaneum hic remedium necessarium erat, cumque nihil ad manus haberemus, forte venit mihi in mentem atramenti scriptorij, quod paulo ante ad meos usus ipsemet confeceram, cujus integrum cantharum plenum in musco habebam: illud in ollam effudi, eique manus suas ambo immergebant, atque ita aliquamdiu lavabant & fovebant: quod cum per semihorae spatium fecissent, omnino cessavit ardor &

dolor, nullis vesiculis prodeuntibus, nec ullum ex tam vehementi ambustione incommodum retinuerunt.

Petrus Abstece Muskettam explodere volens, forte posterius disrupta fuit machina, & quamvis a ferri frustis illaesus, tota tamen facie pyrii pulveris flammam graviter combuitus fuit, plurimaeque pulveris grana ipsi cuti incompacta remanserunt. His grana cito exenptis, natim oculis parva lintea duplicata butyro bene salito inuncta imposuimus, toti autem faciei corporas crudas cum sale in mortario contusas applicavimus, quas ter prima die, & senel sequenti nocte renovavimus: quo cataplasmate totum empyreuma insigniter extraximus fuit, etiam in ipsis oculorum palpebris (quas ad oculorum defensionem butyro praemunieramus) nullae vesiculae excitatae fuerunt, ita ut postea una aut altera inunctione ex unguento rosaceo & pomato, prorsus sanatus fuerit.

In combustionibus statim omni studio enitendum est ut empyreuma extrahatur, & pustularum ac vesicularum exortus impediatur. Ad hoc efficiendum multa variaeque commendantur. In leviori combustionibus, illud parte laesa igni admotam, vel in aquam calidam immisam, atque in ea, quam calidissimam fieri potest detentam, facile perficitur. In graviore vero, efficacissimum remedium sunt coepae crudae cum sale contritae, quibus in gravissimis ambustionibus multoties egregia praestiti. De his audiat Parvus lib. 1. cap. 9. *Experientur (inquit) plebei homines, ambusta leviter partem ardorem vaneferre & dolorem levare, si partem ipsam ardentis candela, vel accensarum prunarum ardori aliquamdiu admoveverint, attractionem enim facit similitudo: itaque ignis extrinsecus intrinsecum & inustum a se partem ignem dum foras evocat, mali, quod intulerat & creaverat alexiterium est. Parum etiam facile & expertum remedium est, si quae statim a combustionibus corporis crudas & cum sale contritas dolenti parti apponant, &c.*

Hildanus tamen libro de combust. cap. 6. corporas in faciei combustionibus minime convenire, easque oculis damnum & iacturam haud exiguum inferre scribit. Quod verum foret, si coepae ipsis oculis imponerentur, aut si oculi ante caparum applicationem primo aliis rebus non praemunirentur, quod nos linteis duplicatis, vel triplicatis, & butyro bene salito inunctis optime fieri arbitramur; eo quod butyrum salitum empyreuma extrahat ratione salis, & pinguedine sua palpebras leniat ac defendat: minus autem conveniunt aquae distillatae, lac muliebre, ovorum albumina, aliaeque similia, quae statim exsiccantur, & parti adeo firmiter agglutinantur, ut vix absque excoriatione detrahi possint. In faciei combustionibus Hildanus potius utitur hoc unguento.

℞. Saponis Veneti, unc. j. olei amygdalarum dulc. rosarum ana unc. s. mucilaginis sem. cydonior. cum aqua rosar. extracta parim misce fiat unguentum.

In aliis autem partibus scribit sequens unguentum empyreuma potenter extrahere.

℞. Coepae crudae, unc. j. s. salis, Saponis Veneti, ana unc. s. misceantur in mortario, fiatque unguentum cum oleo rosarum & amygdalarum dulcium.



Præter hæc multa alia sunt quæ empyreuma potenter extrahunt. Sic atramento scriptorio illud feliciter peractum fuisse, exemplo docuimus ante observatione quiritæ. Sola muria linteis eâ intinctis, ut & aqua calcis, idem faciunt. De muria sic ait Lev. Lemnius lib. 3. occult. nat. cap. 9. *Muria aut falsitago præstantanea vi ambustis vim igneam, atque urentem servorem extrahit, doloresque intensissimos placat ac mitigat, vel ex pulvere bombardico, vel oleo, pice, aquâ fervida, prunisque accensis, præsertim si tenui peplo falsitagine imbuta perusta partes foveantur; huiusmodi enim irrigatione ignea vis eluitur, atque acerrimi cruciatibus consopiantur.* Idem de muria quoque testatur Matthias Pactzerus lib. d. Sale cap. 16. Butyrum quoque multo sale pulverisato mixtum, linteis inunctum, & sic impositum, egregia præstat. Verum hæc omnia in ipso principio adinovenda sunt, ante quam pustulæ aut vesiculæ excitentur & excoarctatio fiat, tunc enim hæc minus conveniunt, sed curatio alio modo instituenda est. *librand de Diemerbroeck in obs. & Curation. Medicin.*

Puella quædam aquâ ebulliente super ventrem ad umbilicum excocta fuit, undè vesiculæ ortæ sunt, & tanquam mortua jacebat, ad eam vocatus, unguento populneo totum ejus ventrem illiniri feci, & vitis folia superaddere, quo remedio intra 4. horas, puella ad se rediit, & paucis postea diebus, ex toto sana evasit. Quod vero intus intestina, ex aquæ ingenti caliditate, tumuerint, undè symptomata prædicta ortum traxerunt, pro certo crediderim. Ulcera tamen postea ex unguento, à calce sæpè lotâ, parato, sana sunt reddita. *Amatus Lusitanus, curat. 34. cent. 4.*

Mulieres Delphenses in famulis cerevisiariorum, applicant folia hederæ arboreæ cocta in aqua, & sic curant eos, quando ab igne vel aqua calente, quod sæpè fit, adusti sunt. Mulieri consului, ut cruri conibustis folia hederæ decocta in cerevisia apponeret, & illico optimè fuit curata. *Petrus Forestus observ. 18. lib. 1. obs. Chirurg.*

Apud fabros ferrarios, ex manubrio isto ligneo in malleo, si ferro candenti adhibeatur, icaturiet oleum quo loca ambusta felicissimè unguuntur, ceu nuper vidi in Nobiliss. à Greisla Juniore, cujus facies valdè pulvere pyris comburebatur, qui tamen intra paucos reconvalevit dies. Aliique plures certam huius mihi experientiam faciunt. *Georgii Franci in Miscell. Curios.*

Lectissima virgo ex oppido Viburgensi, dum matri in evocando per vesicam zneam spiritu frumenti socias jungit operas, administrato per incuriam calore violentiori ansam præbet infortunio, alembicus enim excutitur, ebullit ferociter magma, & misellæ dorsum quaquaversus ardentissimo liquore perfundit: undè non cutis tantum ustulata mille locis contrahitur, sed & illa tandem à reliquo corpore per summos dolores separata, carneum dorsi aquor in nodos & tubera asperatur, ex quibus alia pugnæ magnitudine æquabant, quædam etiam ampliora, minutiora nonnulla. Dixisses tergum universum aliud nihil esse, quàm glandularum eminentium congeriem: quam Chirurgus licet sæpè aquis causticis depascere, perpetua tamen recidiva crescebat rursus, & quotannis ferè mole auctiori. *Olav Borrichii in Act. Barthol.*

Miserandum spectaculum pulveris pyris mola urbi dedit. Vix ingressi illam Domini Prædictus, servi, pueri, cum icu mallei ad clavum in alere latentem impulso, scintilla excitata materiam pulveri pyris destinatam, carbones nempe & sulfur, accenderet, & dictum factum instantes combuteret, quorum unus sulfure in f. u. cibis flagrantem statim extinctus, ceteri combusti, ut velut assæ carnes in veribus comparent, magnis cruciatibus vel superstitibus vel brevi defuncti. Vidi Chirothecam unius nativam, quæ ex combusta manu exciderat, cute separata à carne tota accuratissimè cum unguibus semicombutis, doluique viri boni acerbum casum, inventi authorem detestatus, præsertim cum is Cimber esse perhibeatur, & re & nomine Niger Monachus, primus pulveris pyris inventor, quanquam Hispani eam prærogativam sibi sumant. Nam si credimus *Garcia de Sylva* in Brevior. Hist. Hisp. p. 114. in obsidione Algerarum 1444. ab Hispaniensibus Arabibus bombardorum tormentum primum inventum, biennio antequam Angli ad Cresc. acium A.C. 1346. in memorabili pugna, qua proligatus Philippus Valesius Francorum Rex, & 36. annis antequam apud Clodiam fossam A.C. 1380. Veneti etiam primum usi, à Genuensibus cruciatam victoriam obtinuissent. Pulverem pyrium Venenatam qualitatem spirare & ita inncere laesos docet *Fr. Plazzonius* c. 3. de vuln. Sclopetorum, sua scilicet evaporatione. In nostris vero ambustis manifesta fuit causa, assatis nempe & constrictis vasibus circulationem impredientibus, & dolore enecante. *Thom. Bartholini.*

S. F. Zollicentis mulier 13. annorum, pedem sinistrum aqua fervida combussit, à Chirurgo primis diebus neglecta, dein acerbis medicamentis tentata per quinque menses miserrimè doloribus vexata est, & affluxus humorum ad affectam partem causatus, ut me convenire coacti fuerint. Re perpensâ, Judicavi, & à curante Chirurgo & ab ægra peccatum fuisse; ille enim corroliva supra tendinem pollicis pedis motorem ad exedendam carnem spongiosam medicamenta imposuit; hæc intemperantem sese gessit, convulsivis motibus obnoxia, vinoque dedita: Ægra vomitum concitavi cum tart. solubili emetico; & infusa vulneraria exhibui, manè vespereque tepidè exhibenda: Pro poti ordinario exhibui Tinct. Rosar. Dietam imperavi; pedem oleo Philosoph. excalefeci, blandisque digestivis atque anodynis deligari jussi, quibus intra duas hebdomadas feliciter curata est.

#### SCHOLIUM.

Aqua fervens dum calore inmodico non tantum cutem, vel ejus glandulas, meatus ac fibrillas violenter invadit, exagitat & constringit, sed & sanguinem cum sero in concitiorum motum impellit, & igneis spiculis instruit, eo ipso etiam in meatibus exilibus, cum tam promptè in venas recipi, aut alias expelli nequeat, stagnare facit: undè acrior ille humor redditus, & præcipuè diutè remediisque incongruis efferatus symptomatum variorum author evadit; hinc quæ liberum atque naturæ convenientem humori motum restituere, meatus obstructos referare, & acridinem illius obnoscere



dere valent, his esse adhibenda concluditur. D.  
*Jean. de Muralt in Misc. Curios.*

*De Fulmine tacta curatione.*

Idibus Junii anni præcedentis 1671. accidit, ut Cælum, quod sudum erat, subito nubibus atris tegetetur; flabat ex austro turbo vehemens, qui & aves violenter ex aëre in terras & ædium tecta dejiciebat. Inter hæc sonus auditur quasi minx alicujus sive cuniculi, pulvere pyrio repleti crepantis, tanto cum fulgore, ut totum oppidulum ignem cepisse videretur, quem fumus densus tetrum & tartarum accensum olens sequebatur, fumus autem hicce domum viduæ alicujus honestæ adeo repleverat, ut domestici sese invicem discernere non possent. Aedes hæc quatuor in locis a cælo tactæ erant sibi oppositis: notabile erat, lignum alicubi fissum, alicubi terebra quasi perforatum extitisse, nullum tamen combustionis vestigium notari poterat. Interim puella quindecim annorum, viduæ dictæ filia, intra hypocæustum quasi attonita concidit, inque eo statim non observata per sesqui horam manet. Domestici cum hoc notarent, statim accurrunt, eamque mortuam tractant. Thoracis indumenta, vulgò caruleo pallidiori colore, quem galli *Bleumourant* appellant, tincta fuerant, sed tum temporis quibusdam in locis fuscum dilutiorem colorem, quam coloris speciem galli *seuille morte* appellant, contraxerant. In lectum cum collocata esset, ipsam visito, & corpore nudato læsionem accuratius considero, quam talem inveni.

Primò mamma tota cum aliqua intermixta nigredine rubebat, ac si pulvere pyrio combustio facta fuisset: sub mamma striz subfusæ in longitudine se acuminantes per transversum ventrem ad pubem usque penetrant, quæ itidem pilis privata & exoriata erat. Hinc striz aliquæ digiti latitudine per crus sinistrum ad pedes usque progrediebantur, & in calcaneo sinistri pedis desinebant. Ad manum erat aqua aliqua apoplectica, cujus cochlearia duo puellæ infundi jubeo, ex quo statim ad se redibat, ad interrogata benè respondebat, nec comprehendebam hic verum esse, quod Alexander lib. 1. probl. 88. asserit, fulmine percussos si non intereant, tamen vel ad aliquod tempus, vel per totam vitam infatuari. Etenim hæc puella optimè ratiocinabatur, nec de alio conquerebatur, quàm de insigni ardore faucium & dolore in parte læsa. Exhibitus statim fuit pulvis bezoarticus Anglicus ad drachmam semis in aqua chærefolii, ex quo benè sudavit, & æstus in faucibus diminutus fuit. Hinc parti læsæ applicabatur unguentum ex cremore lactis & cerussa sæpius reiterandum, ex quo itidem insignis dolorum levamen. Cum autem febricula persisteret, jubeo ut emulsio ad ℥viii. fieret ex sem. papav. albi, aquilegiæ, milii & cardui benedicti, huicque emulsioni ℥ij. pulveris bezoartici Anglici admiscerentur. Optimè hinc habuit & febris cessavit, nec quippiam supererat, quam ut mamma exoriata cuticula sua emplastro diaphanum meo restitueretur. Imposuerunt etiam nihil sensit incommodi, nisi quod cum tempestas aliqua cum fulminibus immi-

neat, insignes dolores & motus convulsivos sinistro in pede experitur. Pudendum tamen debile manet. Hicce casus mihi in memoriam revocat, alium mirabilem fulminis effectum ante tres præter proper annos, qui Danenbergz contigit, ibi turris castri fulmine tangitur, sine tamen ulla noxa notabili, solummodo excubitoris uxori nummus argenteus in pera exili foramine perforatur. *Alardi, Hermannii Cummeni. in Misc. lib. 1.*

*Fulmine icli.*

Anno 1637. 24. Augusti, paulò post meridiem, magna subito ingruit tempestas, cum fulmine ac tonitru horribili. Tunc temporis Noviomagi ante urbem in monte Gallinaceo, forte rustici cujusdam famulus frumenta colligebat, secum habens ancillam, & anum quandam cum infante, ut & currum, qui ab unico robusto equo trahebatur. Ipsi hac horribili tempestate perterrefacti, fugam parant, anus cum infante sub carrum ob pluviam confugit, interea dum famulus cum ancilla equo frenum injicere studet. Dum hæc agunt, validum fulmen ab æthere descendens, famulum, ancillam, equum & carrum ferit, anu & infante intactis. Temo carri, qui ex valido ligno confectus erat, in varia frustra comminuebatur. Equus ipso momento mortuus concidit, nec tamen in toto corpore ulla læsio percipi potuit. Fulmen ancillæ femur & crus dextrum percusserat, quæ partes omnino lividæ & purpureæ erant, præterea partem tunicz & indusii in mille filamenta disseverat: ipsa statim ab icu in terram corruit, ac circiter duabus horis sine loquela prostrata jacuit. Famulus toto corpore percussus erat, præcipua verò icus violentia in latus maximè dextrum sævit, à quo latere thorax, braccia, caliga, indusium laneum, & ipsum etiam lineum indusium, non simpliciter dilacerata, sed quasi discissa & in tenuia filamenta discepta fuerunt, & simul ingentem combustionis factorem retinebant, ac si paulisper in igne jacuissent. Calceus dexter, ex fortissimo corio confectus, quasi miraculosè in tenuia longa filamenta (qualia ne studio quidem quispiam conscindere posset) disceptus, & triginta passuum longitudine à pede projectus fuit. A tanto icu in terram prostratus fortis ille juvenis in syncope incidit, atque sic pro mortuo domum delatus fuit. Duravit hic animi defectus circiter per tres horas, deinde paulatim ad se rediit. Invisi hominem, ac totum corpus inspexi: totum latus dextrum à pede usque ad caput colorem ex nigro purpurascens habebat, eique cuticula plurimis in locis abrasa erat, haud aliter atque ab icu baculi inæqualis hieri solet; magna quoque aderat contusio, cui & ardentem combustionem conjunctum esse manifestissimè apparebat. Eger parum loquebatur, & de maximo totius dextri lateris dolore, ut & de summo cordis ardore (cui tamen febris non erat adjuncta) ac pectoris compressione, atque hinc impedito anhelitu conquerebatur: artus dextri lateris omnino commovere non poterat, atque ita sui impotens per duos menses remansit, & postea paulatim pristinae sanitati resti-



restitutus est. Interrogatus quomodo se habuisset ingruente malo, dicebat sibi nihil aliud inde constare, quàm quòd ipso momento, quo fulmen percussit, sibi cor candenti ferro uri visum fuisset, atque anhelitum quoque trahere non potuisset, & sic statim suffocatus concidisset. Varia ipsi exhibui, varia etiam topica medicamenta partibus percussis adhibui, sed omnia hæc ad ignem illius æthereum nihil vel parum profuerunt, tandem æger sponte sine medicamentis Divino auxilio sanatus fuit, ut & ancilla, quæ sibi nulla medicamenta adhiberi permisit. Anus illa quæ cum infante sub carro latuerat & intacta remanserat, narrabat cum ingenti illo fulminis ictu pessimum simul ingruisse fectorem, cum maximo ardore, quem h. uel aliter se sensisse dicebat, quàm si caput in furnum pistoris ignitum ad momentum immississet, ita ut ob brevem illum ardorem etiam ipsi. anhelitum trahere vix potuisset. Sed cum fulmen corpora solidiora imprimis ferire soleat, mirum est nec in ancilla, nec in equo ullum os contractum fuisse.

Anno. 1110.

Quanta vi & quàm mirabiliter fulmina res inferiores interdum feriant, tam Veterum quàm Recentiorum testimonio satis constat, quod etiam nos ipsimet aliquoties vidimus. Anno 1629. octiduo ante festum Paschæ, subita ingruit tempestas cum fulmine & tonitru horribili, quâ unico fulminis ictu in Blocklandia prope Montfortum quatuor domus & sex horrea penitus everfa sunt, & arborum plus quàm tria millia non solum contracta, sed penitus eradicata, & cum totis radicibus longè è suis alveis ejecta fuerunt, hominibus tamen & bestis omnibus illæsis. Anno 1628. prope pagum Bodegravum rusticus quidam in campis fulminis ictu occisus fuit, in cuius corpore pleraque ossa minutim contracta erant, cute cum carne plane illæsa. Vidimus in Gallia Pictavi in turri quadam fulmen illæso plumbo subjectas tabulas incendisse, quæ flamma non sine summa molestia extincta fuit: quod ipsum quoque nostra ætate seniel atque iterum eventile vitium fuit Ultr.jecti in turri Domicali. Anno 1638. mense Julio, Noviomagi in deambulacro illo, quod Sylvam vitulorum appellant, plus quam mille aviculæ à fulmine simul occisæ fuerunt: eademque illa tempestate etiam boves aliquot in pratis à fulmine percussi & ossibus contractis occisi sunt, & variz arbores dejectæ ac contractæ fuerunt, quarum folia corrugata, & quasi flammâ ignis ustulata erant. Cardanus de rerum variet. lib. 14. cap. 70. refert anno 1521. arcem Mediolanensem vehementi fulmine penitus dejectam, in eaque 115. homines occisos fuisse. Hildanus cent. 3. observ. 26. valde mirabilem refert historiam, de nobili quodam, qui fulmine graviter percussus concidit, ejusque equus, ut & famulus cum altero equo statim enecati sunt: à fulmine præterea nobilis vestes distractæ erant, & gladius, illæsa vagina, circa cuspidem haud aliter liquefactus, ac si ex plumbo fuisset, imò & extremum vaginæ ferrum eodem modo liquefactum conspiciebatur. Cardanus de Subtil. lib. 2. harum mirabilium operationum causas

inquirens, sic inquit: *Verum motus non solum penetrare magis cogit, sed & calorem ipsum accendit, atque ignem igne calidiorem reddit. Nihil mirum igitur est, fulmini tantam inesse vim, ac ignem illum, quasi ab aliorum ignium natura alienum, miracula quædam efficere: namque ob motum celerem non solum magis penetrat, sed ignis ille multo calidior reliquo omni igne existit, &c. Quis verò est alius ignis qui solo contactu occidat? hoc igitur ei proprium est, quod calidissimus sit calidissimorum, atque, ut ita dicere liceat, ignis ignium. Itaque illesâ quandoque crumena, pecunias colligat, &c. Isbride Diemerbr. in Observat. & Curat. Medic.*

*Fulmine percussorum cura.*

Inter saxa & ignes æthereos, ætheris nos summa nuper servavit clementia ac bonitas: Cum enim dies 14. mensis Augusti anno 1669. horam ætigit ferè quintam pomeridianam, copiosissimas inter pluvias horribili derepente exorto nubium fragore cum fulgure satis terribilo, quasi cælum terra miscere vellet summus Jova, in prædio consularis Viri, civitati Bergæ communi, fulgur ignis ille ignium celerissimo ac temulissimo suo motu, unoque ictu quatuor penetravit conclavia, una cum cella cerevinaria, quo factum ut respirationis impedimento, vasa angustina cum fenestris janusque impetuoso fragore ejecerit; Vasa autem stannea ac ferrea (cum fulgur ipso aere sit tenuius) præstantissima suâ vitum impetu hinc inde colliquaverit, fuderitque partim, maculis partim inulerit nigerrimis, dolia, ubi cellam intravit, à loco suo plane dimoverit, ubi exivit, epistomium vacillans reliquerit. Uno in conclavi Bibliorum sacrorum ligaturam a parte posteriori discussit omnino, marginemque à scriptura, illæsis omnibus plane literis tam accurate separavit, ac si cultro fuisset resectus, incipiendo, ab apocalypsi S. Joannis usque ad cap. 1. Corinth. 12. quæ tum Epistola in sequenti die Dominica in sacra Ecclesia explicanda populo veniebat. Eodem in hypocaulo repleto nebula ac sulphuris odore gravissimo, ut respirandi licentia vix ulli data fuerit, sex mulierculas puerperam visitantes, lectoq; assidentes ad terram dejecit, peripetastinata combustit. Sed mirum dictu! puerperæ matrem, uxorem honesti civis, nullo ad resurgendum ferè visû in terram quasi penitus exanimem prostravit, ut cum Persio exclamasset.

*Triste jaces lucis evitandumq;  
bidental.*

Mox verò relictis parumper sensibus, animadvertunt aditantes in hac sola muliere peplam quasi pulvere tormentario esse conflagram, in amiculo catenulam argenteam igne illo subtilissimo fuscâ, ac in quinque partes divisâ, examinant totum corpus illæso indusio reliquisque vestibus, illud infra mamillas usque ad umbilicum palmi unius circumferentia valde combustum ostendunt, quo cum stupore viso, nullum ad curandum hunc affectum præstantius haberi posse medicamentum Lactæ muliebri uno ore asserunt omnes. Annuat illa doctorum acerbitate permota; illæ lac intinctis in



illud linteolis superimponunt. Verum protuberantibus vesicis, & lacte iterum emollitis, inflammatione ac dolor dolore adaugebatur, ut die sexto me vocare fuerint coacti: ego bis in die cum levi penna seq. unguento locum satis sensibilem iungere iussi.

24. Mucilag. sem. cydonior. c. aq. malv. extract. 3ß. Succ. plantag. rec. 3iß. Litharg. aur. subtr. pert. 3ß. m. ad fict.

Post tres dies sedata jam optimè inflammatione, crusta inductus fuit locus, sublitescente quidem pure, sed valdè laudabili. Qua de causa d. 25. Aug. ad maiorem mundificationem ac incarnationem seq. præscripsi Liniment.

24. Mell. rosat. 3i. Succ. plantag. rec. absinth. ana 3iij. per Sarcocoll. Myrrh. ana 3ß. m. pro Linim. D. 28. August. crusta fuit separata, itaque usque ad 3. sept. superscripto Linimento satis superque locum mundificare, mundificato per dies 8. Empl. Spermat. Ranz. c. Mastich. Oliban. Sacch. Saturni ceruss. &c. paratum applicare iussi, & sic ad cicatricem parvo temporis spatio feliciter vulnus perduxit.

Ut jam præconceptum huic mulieri terrorem excuterem penitus penitusque feliciter illi prædixi vitæ ac annorum Seriem, cum idem magis Plutarchus fulmen vocaverit divinum, quod corpora divinitus eo afflata *divina* imputrida, multo tempore perdurent. *Lang. lib. 2. Epist. 32.* cuius rei, cur scilicet animalia fulmine tacta omnino liberentur à veneno, plenior, aliqua tamen sub dubitationis nota, adducit *Hier. Mercurial. de ven. ac morb. venenos. cap. 14.* Quod fulmine tacti evadant paucissimi, diversa passim testantur Doctorum scripta. Evasisse *Johan. Mariam Cardanum* & raro supervixisse miraculo *Hier. Cardan. l. 2. subtil. curiosè notavit.* De homine quodam fulmine tacto, sed illæso similem refert historiam, ut & de milite Romæ ædem sacram custodiente. *Plutarch. lib. 4. quæst. conviv. quæst. 2. pariter Plin. lib. 2. cap. 51.* Marciam Principem Romanam *Cardan. de Rev. Var. l. 8. c. 41.* Scopelianum Pontificis Asie filium, & *Gilbert. Cognatu. lib. 8. narrat.* Cauponem quandam nomine Croës in rarissimum hoc admirationis producit theatrum. *Dora. Tremblerus è Bergis Norv. eg. in Litt. ad D. Barthol. & exinde uratula. ad D. Sachsum.*

*Scholion.*) Vulgata opinio fuit materiam fulminis esse exhalationem calidam & siccam vi caloris à terra in nubes sublata, quæ accensa Coruscationem, & si majore vi è nube erumpat, fulmen, sin minus virium habent, fulgur pariat. Sed *Excell. Joh. Marc. Marc. a Kronland in Philosoph. vet. Restitut. part. 2. sect. 5. sub sect. 1. pag. 148.* aliam fovet sententiam, nimirum ea, quæ à terra sublimantur, materiam ignitis meteoris non posse præstare, sed eadem ipso in aère contineri, ut sint veluti plantæ aëreæ ex invisibili principio in eam speciem nascentes, sicut in æthere quandoque novæ stellæ sint exortæ, unde in aère crasso minusque simplici, quam æther, multarum rerum semina contineri, quæ in suos ortus itatis temporibus maturantur. Necessè verò partem aeris, ex qua meteo- ra segreganda, prius dissolvi in sua principia, Mercurium, Sale, & Sulphur, ex hujus dissolutione pro ratione fermenti varia evas- ci; Mercurium in ventos & procellas abire, aut

cum Sale in pluvias liquecere: Sulphur Meteoræ ignita producere: hoc, cum tardior quam reliqua segregationis, minus quoque frequentia, quæ ex illo ortum habeant. Si Sulphur purum & defæcatum accendi contingat, fulgura & coruscationes absque tonitru fieri; quod si Mercurius sit admixtus, quia hic ignem effugere festinat, ignis verò eundem cum sulphure una sequatur, ex vehementis aeris distractione fieri fragorem illum horrendum Tonitru dictum. Edidit 1669. Cracovia R. P. *Adalbertus Tytkovskè è Soc. Jesu & in Colleg. Warjav. Philos. Prof. Meteorologiam curiosam dictam, ubi part. 1. c. 10. p. m. 23.* definit fulmen esse exhalationem mixtam metallari materiæ, quæ conglutinentur inftar farinæ lenis & sicæ, & conetur in secundam regionem evadere, sed ab obstante nube repellatur, sic agitur & tandem accendatur. Ferri deorsum ex materiæ proprietate eo rapientis ignem, quod pateat ex Auro fulminante & Marte, fulm. flammam ignis fulminei esse coloratam ob alimoniam, à qua ignis colorem assumpsit, eadem ratione si materiæ exurendæ adjiciatur camphora, fieri flammam pallidam lacteam, si pix Græca, fieri flammam rubeam, si sulphur, caruleam, si Sal. ammon. viridem, si Mars crudum, buxam, si pis navalis atram. Flammam ignis fulminei pertinaciter aquis resistere ob mixturam materiæ, quales artificiales quoque ibidem adducit, quæ pariter ubi incendium conceperint, aquis non cedant: ignem fulmineum subinde exæscare ob admixtum exhalationi venenum: obscurum inducere fumum, ob antimonio crudo analogam mixturam: non omnibus æque nocere halitum fulmineum pariter ut non omnibus noceant venena & pestilis. Idem *Tytkovskè ibid. 6. 6. p. 31.* plura effecta recenset fulminis, qualia sunt 1. Omnia sulphureo odore implere, quod exhalatio tartarea illis se imprimat: 2. Alta petere, quia è nubibus una perpendicularis linea ducitur, infinitè ad latera, & turris alta pluribus, casa humilis uni fulminis viz occurrit: 3. Exulto dolio vinum conservari, quia viscosa exhalatio inducit tenuem vino pelliculam: 4. Vulnere à fulmine facta frigidiora cætero corpore, quod à metu & veneno infuso provenit: 5. Fulmen venenata animalia percutiendo, veneno exuit, quia ignis plerumque tollit venena & pestilens aer igne purgatur. 6. Lædit quandoque scærum illæsa matre, quod infanti ex metu matris evenit, unde sanguis & humores alterati valdè concutuntur: 7. Dormientem si tangit ejus oculos aperit, vigilantis claudit, quia hujus perstringit fulgore, illum expergefacerit. Idem 6. 8. pag. 36. Ignis fulmineus denigrat carnes, partim ob adustionem, partim obvenienti affusionem. Solvit Metalla fulmen ob sal. ammon. & nitrum: Metalla frigida reddit ob Mercur. l. a. c. citius extinguitur, quia lac sua glutinositate se affigit rei accensæ ac intra poros ignem suffocat: aqua verò præ vehementia caloris ab ea in vaporem, unde vapore in altum sublato parum aut nihil aquæ ad ignem pertingit. De remediis contra fulmina idem videri potest. L. a. 9. 7. pag. 34. 35. Quod Canes & feles præ aliis animalibus magis fulmine petantur, causam cum *Cl. Bartholin. conjicit Excell. Dom. Joh. Jonston. Philos. & Medicus incomparabilis Thau-*



*matograph. sect. 3. cap. 5. pag. 118.* In halitus ex animalium horum corporibus exhalantes, quos tanquam materiam cognatam & nutrimentum aliquod fulminis spiritus (toras præfertim si pateant, ut libere in aerem ferantur) sequuntur: Quare vina in cella fulmine moveantur, disquirat Dighzus in de Nat. Corpor. T. 1. c. 17. §. 186. Quod dormientes magis securi sint ab ictu fulminis putat. Excell. Marcus Marci lib. 4. *Philos. Rest. pag. 148.* inde præstari securitatem somno sopitis, quod in iisdem sit carenti: metus, qui vigilantibus obversatur: contemnatio siquidem illa cum imaginatione forti velut magnes ferrum ad se trahat. De fulmine ictis & undè cognoscantur tales mortui inventi *Paul. Zacchias in quest. Medic. Legal. L. V. 1. 2. q. 11. §. 7. & seq.* Item historia relata a Jacobo Javello in sua quadam Epistola ad Ferdin. Angelum Fargus, quæ impressa est post ejusdem Medicinæ compendium, digna est consideratione, ubi traditur eorum quos fulmen percussit, eorum curam quoque Hildan. tr. de combustion. cap. 18. *Obs. f. 934.* & Jos. Schmidt. in Exam. Chirurg. f. 310. exponit, quam absolvit meritissimis Alexipharmacis, quæ aliàs pelti debentur.

Brevis quoque curam fulmine percussorum D. Bezæ Medicus Argentoratensis olim communicavit sequentem, dum Argentorati viverem. Statim porrigo Fulmine percussis cordialia sanguinem non detraho nisi summa sit sanguinis abundantia: spiritus namque sunt resoluti à calore & fulminis siccitate, itaque siccatus sanguis indicat humectationem; intemperies vero sicca & calida, quæ impressa est partibus à fulmine, refrigerationem & humectationem indicat; dolor anodyna loca ambusta & exsiccata emolliationem & relaxationem poscunt. Lardum destillatum probatur in aqua ros. cum succo cort. mediani, sambuci & succo sempervivi ac vitell. ovor. inungendi partes ol. rosac. violac. simul mistis & prius lotis decocto chamom. & hord. fomenta item ex althæa, b. Ineum aqu. dule. in quo ebullierit malv. lactuca, folia vitis & hederæ, quia modice laxat & humectat. J. Friderici Treubleri.

#### De Fulmine iclis Renunciatio.

Perquiruntur aliquando signa fulminis in eo, qui mortuus in aliquo solitario loco extra habitata loca, & urbes reperitur, neque ullum vestigium vulnerum, aut strangulationis, aut alterius mortis generis aliàs consueti servat, præsumiturque hunc fuisse à fulmine ictum, & tunc nonnulla signa ad id cognoscendum afferuntur a Paræo ubi alias; & a Fortunato lib. 4. cap. 6. quorum duo priora cuilibet fulmini communia sunt admonente Fortunato. Primum ergo ac maxime quidem evidens signum est odor, quem spirat Cadaver, qui gravis profecto est ac sulphureus, ex quo fit, inquit, Paræus, ut hujusmodi cadavera neque à feris neque ab avibus degustentur: relinquitur autem hujusmodi gravis, ac sulphureus odor non modò in cadaveribus, sed quibuscunque rebus à fulmine ictis, Seneca testante lib. 2. Nat. qu. 53. Persensi cum per æstatum animi causa Viterbii adhuc adolescens commoraretur cum avunculo meo, cujus me-

moria in benedictione sit, ejusmodi odorem ex fulmine, quod nostras tetigit ardes prope arcem ante ecclesiam D. Fautini, qui tam gravis fuit, ut facile mihi gravem capitis dolorem excitasset, nisi mihi metipsum propexissem, itaque odorem hunc, ut dixi, non solum ex cadavere exspirare comperimus, sed etiam ex vestimentis, & ex ipsa quoque circumstante terra, & quibusque rebus prope adjacentibus. Secundum signum color ipsius cadaveris est, contrahunt enim quæcunque cadavera fulmine icta tuscum quendam colorem ea præcipue in parte, quam fulmen percussit. Hæc ipsa duo signa conspiciua fuerunt in historia relata a Jacobo Javello in sua quadam epistola ad Ferd. Angel. Farg. quæ impressa est post ejusdem Medicinæ compendium, & digna est consideratione, ubi traditur brevis cura eorum, quos fulmen percussit.

Tertio dicit Paræus aliquandò nullum Vulneris vestigium in cadavere apparere, sed tamen si diligenter introspectiatur ossa comminuta, ac contracta in ea parte, quæ icta est, animadvertentur. Adnotandum tamen est, non omnes perire ab ictu ipsius fulminis, sed aliquos a solo pavore extinguui. Proth. Casul. *Aethiol. lib. 1. num. 11.* in his autem hæc inquisitio superflua est, sicuti etiam & ea, quæ ex immutato coloris cadavere deducuntur; relinquitur autem solus odor gravis, & sulphureus de quo diximus. Si tamen in percussis aliqua pars vulnerata appareat, eam ex Plinii Sententia reliquo corpore longè frigidiorē perferri dicit Paræus; quod etiam ex eodem Plinio refert Maiol. *Dier. Caniculi. colloq. 1. par. 1.* & Petr. Crinit. de honest. discipl. lib. 9. cap. 12. ejus rei causam quatit, ac reddit idem Proth. Casul. ubi supra, num. 151. absumentque, inquit, spiritus à fulmine maxime in ea parte, quæ ictur, unde ea quasi incineratur. Non tamen admittit Fortunatus, quod in cadaveribus fulmine percussis contusio aliqua, aut ossium semper comminutio fiat, cum fulmen solidum quid non sit, sed spiritus quidam, vel tenuis & clarus, & ob id non adurens, vel spissus, & fumidus, & ob id incendio absumentis, contundere itaque ossa, aut frangere, aut comminuerē non potest, quod consonare videtur cum opinione Casulani.

Quartò, homo à fulmine percussus cadit super partem, quæ icta est, & convertitur in partem, unde fulmen venit, quod tamen nequaquam verificatur in historia relata per Cardan. lib. 8. de variet. cap. 43. nam cum in Lemno Insula, ubi Insula cornu dividitur, octo messorēs sub quercu canarent, à fulmine percussī, atque exanimati manserunt sub ea specie, quā discubuerant, ut unus comedere videretur, alter ori poculum manu admove, alius bibere, cumque nigri omnes essent, imaginem totidem statuarum representabant; illud etiam observatum esse, ajunt, quod si dormiens homo ictus sit, oculis apertis reperiatur, si vigilans clausis; at undè hoc? dormiens ad fragorem expergiscitur, oculosque aperit, vigilans ad terrorem concutitur, oculosque claudit ob timorem præsentis mali. Putant autem nonnulli dormientes fulmine non per-



cuti, ejusque rei causam assignat Proth. Casul. ubi supra, mem. 9. quod tamen an veritatem habeat prorsus ignoro.

Addebat insuper Parvus ex Philippo Cominio, cadavera fulmine extincta non esse reliquorum instar putrefactioni obnoxia, quod etiam admittunt Proth. Casul. ubi supra num. 8. & Jun. Paul. Crass. *quæst. Nat. & Medic. num. 34.* qui idcirco damnari dicit Euripidis Poetæ Clymenem, quæ Phaëtonem de Cælo tactum in vallibus putrescere cecinerit. Seneca tamen lib. 2. Nat. quæst. cap. 31. ex quo etiam Fortunatus ibidem ea verminationem intra paucos dies pati affirmavit; quid experientia doceat adhuc ignoro: si contendendum ratione sit cum priore opinione, sentirem ob sulphuris vim cadaveribus communicatam, & exiccationem a fulmine conciliatam; quæ opinio Casulano quoque ubi supra, & Junio Paulo Crasso accepta est, quod si hæc veritatem habent, inter alia hoc erit signum evidentissimum, quod is, cujus cadaver est, fulmine fuerit peremptus, non vero alio mortis genere.

Est Ultimo loco aliud signum à Fortunato allatum, quod hujusmodi cadavera levia evadant, ob humorum consumptionem à fulmine factam; quod signum in hoc casu videtur magni faciendum, cum alias cadavera se ipsis graviora evadant, ut notum est. Voluit nonnulli absumi in his interiora omnia viscera, quod observatum aliquando experientia esse oculatos testes habeo, in omni tamen fulmine idem evenire omnino à vero alienum est; notum tamen alia ex parte est, fulmina nonnulla interna absumere, externis intactis, & infantem in utero perimere salva matre, & hæc de vulneribus dicta sunt. *Paulus Zacchias Quæst. medico-legal. lib. 5.*

#### *Anatomica inspectio fulmine extincti.*

Vix ausus fuisssem molestiam creare statim repetita vice alia epistola, nisi me moveret casus ille qui hic accidit die 10. Maj. Ameridie illius diei circa horam quartam percepi tonitru remotius. Circa horam quartam tonitru nobis propius accedente, pluvia effundebatur, & mox (pluvia magis in imbrem & nimbum condensata,) tonitru magis intonabat, & frequentius crebro, diuque crepitante fragore, (quanquam non semper æquante ictu fragoris, quem vel alias audivi, sonitum:) & fulgur seu fulgetrum clarissimis (non obstante clara diei luce) & creberrimis, (cum vix minutum unum complerem intercederet duo fulmina, concitatissima fulminum persecutio; aliquando vel antè id temporis secundo fulmine prioris tonitrus fragorem occupante,) radiis seu fulminibus erat conspicuum; tonitrus sonitus ut plurimum percipiebatur octo vel 10. minutis secundis à fulmine elapsis; uti magnam temporis partem ipse ope minutologi observavi; sed semel aut bis observavi immediatè (quodammodo) inlminationem insecutum tonitru, quasi eodem momento; fulgure rubicundo & igneo. Non soleo alias multum terreri tonitru & fulgure, illo tamen tempore (nec satis scio, quare?) maximè perter-

ritus etiam horrore inusitato, metuens ne dæmonum inferret, mihi enim videbatur valde humile & propinquum (adeo ut metirer etiam distantiam fulminis crepitu) & frequentissimum ac summe lucidum, ita ut maxime terribile fuisset, si noctu accidisset. Et quamquam haud excessi domo sensibiliter tamen odoratus sum odorem foetidum sulphureum, quo Aër erat infectus. Hora 7. hinc tempestatem, ante quod tempus nunciatus mihi fuerat casus deplorandus, qui accidit Medleii, quod hinc uno milliari vel paulo amplius abest. Duo scholares collegii Wadhamentis, qui soli fuerant in scapha quadam (sive nauta,) à litore non pridem remota, Medleii, ad redeundum domum, positi in capite scaphæ infelici ictu tonitrus aut fulguris statim ex scapha in aquam excussi sunt. Alter eorum ita ictus est ut planè rigidus moreretur, & ex aqua post vix unius minuti moram [uti ex relatu acceptum] extractus, nullum vel vitæ vel sensus motusve indicium proderet.

Alter inluxus erat limo (pedes deorsum, & partes superiores supra aquam) ad modum palii, neque sibi ipsi auxilium terre valebat; vivus quidem adhuc deprehendebatur, adeo tamen omnem sensum terrore penitus casus excusserat ut immotus maneret, quasi in illo loco palo affixus fuisset. Cæterum nullum in toto corpore apparebat vulnus, sed omne malum ei hoc infortunio inflatum erat, quod ita stupefactus maneret, & quasi extra semetipsum rapti mentem non subibat recordatio, quomodo præcipitatus fuerit in aquam, nec utrum tonitrus, an verò fulgur casus ejus causa fuerit, multumque infirmus erat; constitutio illa hominis duravit noctem adhuc sequentem, (quanquam statim lecto calido unpositus erat) nec compertum mihi est quid ei postea acciderit.

Alii in alia scapha 10. vel 10. orgyis circiter ab illa distante (prout ego ex ipsorum descriptione æstimo) senserunt disturbancem & commotionem in navi sua, sub quorum uno sella ejus excussa super ipsum impetu ferebatur, alias damni omnis expertem. Hi nulla mora aliis appropinquantes (quidam exsistentes in aquam ad eos) extemplo trahebant eos, vel in scapham, vel ad littus; nemo tamen illorum vidit hos duos precipites ruere in aquam (cum non illuc visum dirigerent) sed audivit eorum alterum clamore opem implorantem statim post ictum, & odorabantur fætores valde sensibilem in Aère; qui, de genere fætoris à me interrogatus, respondit similem fuisse fætori percepto ex mutua collisione silicum.

At simul atque ex aqua mortuus fuit extractus, nihil remediorum inexpertum relictum est, (imposito enim in lectum calidum, frictoque, immisus ori aquas distillatas, &c. Quo vitæ restitueretur,) sed frustra erant omnia. Quamobrem postredie ejus diei manè in urbem sepulturæ causa delatus est. Ubi inter plurimos Doctor Willius, Doctor Mellingtonus, Doctor Louverus & ego accessimus avidi lustrandi corpus mortuum, si forte in eo particularia non nulla observanda venirent. In universa ipsius cute nullum apparebat vulneris vestigium.



stigium. Facies & collum nigra erant & livida, sed non in majore gradu, quam solet procedere ex sanguinis sedimento, in dextra colli parte macula quædam parva nigricans, digitum unum longa, quartam vero digiti partem lata, ad summum, notæ ferro candenti inultæ haud absimilis conspiciebatur. Habebat & aliam paulo majorem, ut memini, in alterâ, i.e. sinistra colli parte, infra aurem. Directe infra in latere pectoris sinistro, locus erat novem circiter digitos longus, & duos digitos latus, hic amplius, ibi minus, qui erat adustus, & durus ut corium igni duratum, colore rubro valde sensibili, in nigrum vergente, cuti porcelli assati similis. In parte anteriore humeri sinistri aliam habebat similem maculam unius circiter solidi magnitudine, quæ tamen tam nigra & notabilis naud erat quam illa quæ in collo apparebat. A vertice humeri dextri deorsum versus dictam pectoris partem erat tenuis linea similis cûri adusta; quasi aliquid in eam juxta collum intrasset, & ad finem callis ampliorem campum aperuisset.

Maxima pars globulorum thoracis ejus ablata sunt, quod opinabantur quidam abruptos ictu tonitrus, impulso juxta collum, & suo loco erumpente: cui conjecturæ maximam ansam (mihi) præbebat, quod præter 4. & 5. globulos deficientes ad basin thoracis sex circiter penitus aberant à basi collaris deorsum, neque, quantum memini, videbantur residui prope detriti, sed fere novi. Collare Thoracis ejus præcipue in parte anteriore humeri sinistri fecit disruptum, pannusque unâ cum materia durante, (cujus generis illo loco solet esse os balnearum,) directe deorsum discriptus, quasi dissectus fuisset instrumento obtuso; linteum tantum interius, sive gossipium subductitium integrum erat, ex quo & visitatione asperatum & inæqualium extremitatum, mihi manifestum videbatur, ictum accidisse introrsum (ab extra) non extrorsum ab intra.

Pileus ipsius mirè erat laceratus, non quidem exactè per cacumen, sed per latera pilei & extren 2:

A latere ejus erat foramen majus pugni; quædam eus partes omnino abruptæ, & inde undique hiatus sparsi erant, quasi pileus fuisset dissectus aut laceratus instrumento obtuso, aliqui etiam eorum erant satis longi, fere contingentes marginis extremum. Et præter illos una aut duæ fuit alie erant, quæ non committebantur foramini in latere.

Illud etiam arbitrabar dei accidisse ictu introrsum vergente: non tam ex visitatione extremitatum illarum fissurarum, (ex quibus vix quicquam iudicari poterat de ictus motu) sed quia materia subductitia haud erat lacerata, sed tantum resuta extremitate pilei, [cui fuerat assuta] à latere foraminis. Sed cum pileus ejus non fuerit repertus super capite ejus, sed aliquanto longius distans ab eo, liquere non poterat è regione cujus partis capitis foramen illud fuisset factum. In reliquo vestimento nullo casus istius vestigium cernere licuit; ejus rei causa fuerit, partim quod jam temporis non nihil post casum elapsum esset, partim quod vestimenta statim aquam hauserint in quam inciderat homo sequente nocte, tres Doctores

supra memorati, & ego cum quibusdam chirurgis (præter plures alios) convenimus & capitis aperturam fecimus, ut animadvertere-mus, si quid in eo observandum veniret: Sed nullum contusionis indicium apparuit. Cerebrum erat integrum & optimè constitutum, nervi quoque erant integri & nullo malo læsi, vasa cerebri plena & bene disposita, sic ut nihil in iis extraordinarium oculis nostris subiceretur.

Negandum quidem haud est, aperturam illam factam ad lumen candelæ, neque examinari potuisse pro votis, quamvis partem satis accuratè ob brevitatem temporis, (mox enim humanandum erat cadaver,) & nimiam congregatam turbæ multitudinem, quæ magis impedimento fuit. Nihilominus tamen, si defectus aliquis extraordinarius adfuisset, in tanto spectatorum numero vix fieri potuisse arbitror quin ille protinus animadversus fuisset. Sunt qui vidisse opinantur fissuram quandam in cranio exiguam, quinque illud tenuerunt, dum ferra dissecebatur, allerunt se quandam ibi percepisse rupturam, seu dissonantiam in manibus, apparebatque in oculis simile quid, verum tantillum id fuit, ut perfecte ad lumen candelæ ab omnibus dignosci haud potuerit. Ad tempus dextrum capilli manifestè erant adusti; & inferior pars dextræ auris paulo nigrior partibus circumfictis, sed mollis; & fortassis illius causa tantum fuit sanguinis sedimentum. Pars superior humeri sinistri, & sinistra colli facies etiam aliquando nigriores apparebant reliquis partibus corporis sed aut illud venerit ex ictu erumpente collare & inurente ei rotundam rubram maculam, aut tantum ex sanguinis sedimento, non satis compertum habeo; attamen puto, maximè fieri potuisse ut tam caput, quam partem illam colli læserit prægrandis ictus; cum contusione insequente, (videturque ita accidisse ex dilaceratione pilei & disruptione collaris, & fortassis ex fissura cranii) nullo tamen existente signo contusionis, quia per immediate sequentem necem non licuerit sanguini ad illam partem congregari; ibidemque subsidere; (quod in contusionibus est causa nigredinis) ita ut non secus esset ac si corpori recens mortuo talis ictus inflictus esset, ubi non solet accide-re tale symptoma contusionis, postquam sanguinis circulatio desit.

Examinato itaque capite, pectus quoque apertum est, & inventa adustio transisse penitus totam cutem, quæ in locis illis adustis dura erat & quasi cornea, ac contracta sic ut non esset tam crassa atque tenera seu mollis cutis quæ circa istam erat: interim tamen sub cute nulum ejus rei erat vestigium. Musculi erant in situ suo naturali; neque quidquam ordinarii coloris amiserant, (fortassis ob rationem jam iam memoratam de capite, collo & humero. Tum sublato sterno, pulmones & cor coloris soliti nihil remisserant, neque quidquam alterationis prodebant. Hæc igitur sunt quæ imprimis illo in casu sunt observata; quibus & hoc addo, noctu corpus multò magis tumidum fuisse, quam mane, odoremque sparsisse penetrabilem & foetidum: id quod forte tribuendum æstui tempestatis, & calori, quem multitudo in conclave effusa concitaverat. Ex *Actis Philof. Anglicis.*



## COMITIALIS MORBUS.

Vid.

## EPILEPSIA.

## CONTABESCENTIA

Vid.

## MARASMVS.

## CONCEPTVS VITIOSVS

Vid.

## MOLA.

## CONCUSSIO ET COMMOTIO CEREBRI.

**D**E iis jam vide plura supra titulo casus ab alto. Hic tantum paucissima ex Fabricio Hildano observat. Chirurgic. Cent. 1. Commotio cerebri in principio neglecta, postmodum gr. visumorum symptomatum causa fuit.

Filius Domini Bernardi ab Hatzvelt, Domini in Wildenberg, decennis ex alto cecidit: mox vomuit, sanguinemque per nares & aures egressit: Verum neque loquelam, neque sensum aut motum amisit. Quum autem nec vulnus, nec contusio aliqua externa appareret, nec febricitaret ipse, morbus plane neglectus est, nec ullum initio adhibitum remedium, capite alioqui perpetuo dolente. Post menses quinque aut sex collum relaxatum est, adeo ut nullo modo caput erigere, aut erectum, nisi beneficio numellæ ex pelle & xylo contextæ, continere posset. Postmodum asthmaticus factus est, & relaxatis ligamentis 10. 11. 12. vertebrarum metaphreni gibbosus factus est. Coxam quoque dextram imbecillius movebat: sub claviculis ex utraque sterni parte atheromata conspiciebantur. Quum circiter biennium ita cruciatus fuisset, & symptomata in pejus evaderent, parentes ipsum Coloniam ad Clarissimum Dn. Henricum Botterum, Mistr. Hassiæ Landgravii Archiatrum adduxerunt, qui variis adhibitis remediis, collum in integrum, vocemque & loquelam ex parte restituit. Deinde exortus est ipsi tumor ad sinistram aurem, inter jugulares venas & arteriam asperam, qui sensim in maximum abscessu auctus, quum esset incidendus, aliaque Chirurgica peragenda accersitus fuit. Primo, 2. & 3. diebus ultra libras sex materiz eiecit, extillavitque ea quotidie copia satis magna. Hujus evacuationis beneficio dolor capitis, omniaque ferè symptomata ex parte lenita sunt: at vires in dies imminebant. Circa 18. mensis Martii novus incidit catharrus, qui in pulmonem & stomachum influens, tussim, nauseam, & vomitum provocavit, sinistram lateris resolutum fuit. Nonnulli quoque paroxysmi epileptici acciderunt, & ulcus in collo penitus exiccatum est: ita ut 6. Aprilis 1793. decesserit.

Præsentibus clarissimis viris Johanne Slotano, & Henrico Pallantio, Medicinæ Doctoribus.

Cadavere inciso, viscera sic affecta compertimus:

Incisa cute in tumoribus sub claviculis re-

perta est copia satis magna puris, instar pultis, quæ collis & sterno cariem contraxerat.

Cystis fellis prægrandis, & intestinum duodenum ubique humore bilioso refertum.

Hepar Scirrhum & obstructum.

Pulmo ubique pituitosis & viscidis humoribus oppletus.

Lapides quàm plurimi ex gypsea materiz concreti, & cysti inclusi proxime cor, minimum in ea parte, qua arteria aorta ex corde prodit, & ramos suos versus jugulum mittit: quorum unus magnitudinem nucis superabat: reliqui parvi. Adhærebant autem non tantum arteriz aortæ & ipsius ramis, qui jugulum petunt, verum etiam asperæ arteriz, & sinistro recurrenti nervo. Ex quibus facile colligitur, quibus causis vocem & loquelam ex parte amisisset.

Capite aperto, lapidem ex simili materia concretum & membrana inclusum, in posteriore parte capitis sub sutura Lambdoide, inter duram & piam matrem invenimus, adeo adhærentem duræ matri, ut nonnisi violenter avelli posset.

In tribus cerebri ventriculis, hoc est, in duobus anticis & medio, ultra libras duas aquæ limpide reperiuntur.

Ulcus in collo tum ad asperam arteriam, tum etiam ad os basilare, & foramen quo spinalis medulla vertebrae ingreditur, penetrabat: ita ut materia ex ulcere manans, tum ex pectore, tum ex capite confluisse intelligeretur. Verum propter angustias viarum subtilior pars effluerat: crassa autem in lapides concreta erat, quales propè cor viscebantur.

## Cerebri concussiones &amp; quidem gravissima curata.

Commotio cerebri rectè in morbis acutis numeratur. Verum initio adhibitis idoneis remediis multoties curata, tum ex Doctorum virorum scriptis, tum ex sequentibus intelligitur exemplis.

## Exemplum. I.

Equitò, Generosi Viri Domini Herft, Satrapæ in Lursdorf Lulseldorpiæ, ad dextram partem capitis percussus in terram concidit, evomit, mox loquelam amisit, & cinorem per nares & aures eiecit. Tum in diversorum delatum Cosm. Slotanus, Illustissimi Juliæacensium, Elivensium &c. Principis Archichirurgus adhibitus, variis remediis sanavit. loquela quoque & mens amissa paucis post diebus illi rediit.

## Exemplum. II.

Herman Kikup, venator Generosi Domini à Velbruchin Harrad, ex arbore in congelatam terram lapsus mox evomuit, & sanguinem per nares, aures, & palatum eiecit, loquelam amisit: fuitque ad undecimum ferè diem sine sensu & motu, quasi apoplecticus, febricitans vehementer. Vocatus crines abradi, & caput oleo rosaceo & myrrillorum inuncti, venani brachii secui: Clysteres acres injeci, aliaque quàm plurima remedia adhibui, quæ hic brevitati studens omitto. Tandem divino favore & mea diligentia, stupentibus spectantibus, convaleuit.

Exem-



## Exemplum. III.

Puerum gravissimâ cerebri concussione laborantem cum peritissimo Chirurgo Johanne Crifonio curavi. Variis remediis capiti additis exortus est tandem tumor insignis sub aure, quo inciso maxima puris & sanguinis coagulati copia effluxit: atque sic puer convaluit.

## CONDYLOMA.

**E**st carnis excrecentia callosa, in digitis manuum ac pedum, præsertim verò circa anum & pudenda muliebria occurrens, sic dictum, quod promineat in modum articuli, quem *condylus* appellant. In ano autem faciliè oritur, quia quum sinuosus sit, rugasque coagmentatas habeat, si intumuerit aliqua ex illis rugis propter glandularum per ipsas disseminatarum a sero recente & coagulato turgescientiam, nascitur condyloma; quod aliquando citra inflammationem fit, & molle est; quòdoque cum inflammatione, tumque durum est & dolorificum. De huius in ano & pudendo excrecentis, curatione jam pauca ex Platero.

*Condylomata*, si ab impuro congressu aut contagio alio circa lumen veneream nascentur; tunc evacuato corpore, per venam sectam, purgationem, sudores, eodem modo, ut in aliis vitiis a malignis humilibus progressis, topica loco affecto, quæ ea absumant, adhibentur. Quod si vero à lue venerea infectis erumpant, tunc eadem curâ, quæ huic lue accommodata, per purgationes sudoresque instituta; sicuti in illius cura dicitur, simul plerumque tolluntur; quod si remaneant; integre nondum morbum curatum esse denuntiant; ob id cura repetitur; atque interim topica loco affecto; ut supra dictum, quæ ea absumant; additis etiam illis, quæ hanc luen respiciunt, admoventur; donec penitus evanescant.

*Topica* vero quæ adhibentur, ut Condylomata absumant; cum digerendo, siccandoque, ut in tumescentibus hæmorrhoidibus; id quoque præsent, eadem fere quæ illic exposita sunt; hic quoque competunt. Imprimisque fortiora illic descripta hic præcipue usurpari possunt; cum contumax admodum hæc sit exuberantia; quæ levioribus non ita faciliè cedit, dolorque hic non adeò vehemens, ut in hæmorrhoidæ; in qua interdum major dolor illa ferre non potest; illorum usum non impediat, atque etiam illis adhuc potentiora cathartica medicamenta; nonnunquam adduntur.

*Cataplasmata* proin illic exposita; & infusus; totus ex iisdem simplicibus, bulbis, patata, hic quoque proderunt. Confertque ad hæc præ cæteris hic quoque Scrophularia, Thapsus barbatus; Plantago; Rubi folia; & præter hæc Parietaria; Mercurialis; Barbarea; Sabina, Ballore Capillus ven. Libanotis, Thymus, Thymbra, Ruta; recentia tusa vel cocta vel subacta, uti illic dictum, administrata: maxime ut efficaciora sint, in Vino rubro cum Aqua ferrata, vel Aceto & aqua; aut Lixivio cocta, & in fotu cum spongia vel Sacculo applicata. Confert & radic. Quinque folii

& Aristot. rot. decoctum; cui baccæ Lauri addi possunt, allave potenter siccantia & astringentia, illic quoque descripta. Quibus Sal & Nitrum quoque addi possunt. Cotonea cruda ejulmodi cataplasmatibus addere jubet Dioscorides.

*Stercus Ovillum* vel gallinæ cum Sapone vel Aceto subactum & appositum prodest: cui & Fel capræ addi potest.

Vel Pix liquida & Ammoniacum in Aceto forti dissolvantur & applicentur.

*Unctiones* variz in hæmorrhoidæ dolente traditæ; hic quoque convenient, si efficaciora præsertim ex illis eligantur, hicque imprimis unguentis illis, cathartica illic exposita; addi possunt.

Quibus & sequentia admiscere licet.

℞. Succî Barbarea, Apii veri seu Petroseliniana ʒ. j. β. ol. de Lateribus ʒ. ij. Boli ʒj. Terebinth. q. s. fiat instar autriti.

Vel ℞. Olei de Tartaro ʒ. β. lap. Calamiharis vel Hæmatitis, vel Minii, ʒ. ij. misce: Ungatur.

Item ℞. Cineres Samentorum vitium vinearum & cineres Anethi cremati, & Piscium salicorum cineres, pulveremitem Sabinæ: cum Aceto, subigantur: & inungantur.

Aliud: ℞. Aloës, Thuris, Sandarachæ, ana ʒ. j. β. gummi Ammon. dissoluti in Aceto ʒ. j. Aluminis ʒ. ij. lap. Hæmatitis vel minii ʒ. j. Gallarum ʒ. β. Croci ʒj. Ovi vitellum assum vel utrum num. j. Terebinth. ʒ. j. olei Rosacei & Cera q. s. fiat unguentum.

*Efficacissimum* hoc erit: ℞. Mercurii ʒ. ij. dissolvatur, cum Terebinthinæ ʒ. j. Olei Nucum ʒ. ij. minii ʒ. ij. Aluminis, Vitrioli ana ʒi. zruginis xris ʒ. β. Cera parum, fiat linimentum. Cui tantillum sublimati additum illud efficacius reddit.

*Pulvis* hic subtilissimè tritus, si huic carni laxæ inspergatur, eam admodum exiccat & absumit.

℞. Rad. Aristoloch. rot. ʒ. j. Sabinæ fol. exicc. ʒ. ij. cinerum ossum Myrobalan. & Hermodactyl. distorum ana ʒ. j. β. Aluminis ʒ. j. Chalcitidis ʒ. β. Auripigm. rubr. ʒj. fiat pulvis, cui opium addi potest; vel radic. Mandragoræ.

*Sublimatum* in aqua coctum, aliove modo appositum, ut in anthrace dictum eas aufert. Oleum Vitrioli: & de Antimonio idem facit.

In *Condylomatibus* absumendis; cum magno fructu adhiberi potest oleum causticum, quod & fistulas, scrophulos, & excrecentias Carnis; sine sensibili dolore comburit: hoc ita paratur.

℞. Olei laterum optimi, Mastiches electæ; gummi Arabici pellucidi; Terebinthinæ claræ ana ʒ. ij. pulverizata misceantur; destillentur per alembicum vitreum; quod exstillat incorporetur cum cineribus Hederæ, reiteretur destillatio, oleum prædictum servetur ad usum.

*Fumi sicantes* ad Podicem admissi; Condylomata admodum siccant & auferunt: Quales in narium ulceribus expositi sunt. Imprimis si ex Cinnabari fiant. Cujusmodi in lue venerea; si præsertim inde fiant expositi sunt.

Absciuntur interdum Condylomata, si dura sint verrucarum instar, vel si propen-



deant, setis ligantur aut filo, ut sic marcescant.  
Felix Plater. Prax. Medic. T. 2.

### CONGESTIO HVMORVM.

Vid.

ABSESSVS, TVMOR,

aliique morbi ab illa enati.

CONVOLVVLVS.

Vid.

ILIACA PASSIO.

CONTRACTURA.

Vid. capita de

CONVULSIONE. EPILEPSIA  
SCORBUTO COMBUSTIONIBVS &c.

unde oritur.

CONTRAFISSURA & CONTRAFRACTURA.

Vid.

CRANII VVLNERA.

## CONTUSIO.

**H**ic dicitur de morbo qui solutionis continui species est, dum scil. grave aliquid supra corpus incidit, ac id ipsum collidit & continuitatem solvit, citrà deperditionem manifestam substantiæ, aut externam rupturam; ubi plerumque in parte carnea cruor sub cute colligitur, & suggillatio, *εὐχέρων* sive effusio dicitur, quia venæ exiguae sub cute rumpuntur. In specie quoque Contusio dicitur Cranii vel Calvariae recessus & incurvatio à violenta illusione absque fractura; (& in junioribus, item iis quorum ossa sunt molliora quandoque contingit) quale quid stameis ac plumbeis vasis si foris illidantur advenire videmus. De hac ultima vide in sequentibus ubi de Fracturis Cranii. Hic jam tantum de aliis omissis tamen que de vulnere contuso, item de ulcere contuso capitibus de vulneribus & ulceribus dicenda veniunt.

### Curationes.

Tumor ex contusione sine vulnere manifesto aut magno (nam de vulnere contuso in vulneribus agemus, uti & si per contusionem aliquid frangatur intrinsecus) si levis sit, vel sponte, vel discutientibus adhibitis iterum residet, lividitasque tandem evanescit. Quod si verò major sit, inflammatioque metuetur, vel illa superveniat, primum tepèlèntibus, mox discutientibus remediis, non eodem penitus, ut in phlegmone, sed propter contusam carnem & sanguinem qui coagulatur, idem variante modo in curatione procedimus: Et si discutienteat, sed suppuratio sequatur, tunc maturantibus, ut in abscessu dicitur, eam promovemus, & quando in ulcus convertitur, ut ulcus curamus. Ad influxum autem sanguinis mox à principio arcendum, præmissa, si opus sit, venæsectione, aliisque quæ illum revellant, ut in phlegmone dictum, Repellentia quæ adhiben-

tur, si caro subjecta admodum contusa, sanguinem copiosum contineat, non adeo in alia phlegmone refrigerare tantopereque attingere, vel illa in ambitu potius loci contusi, quam supra illum collocari debet, nè sanguis horum causâ coagulatus retentusque putrescat. Et proin quæ loco affecto adhibentur, & vim repellendi discutiendique nonnihil simul habere debent: qualia in progressu inflammationum usurpari solent, illicque describuntur. Usitatumque admodum est ad hoc præstandum, oleo Rosaceo, Myrtillorum cum albumine ovi, vel mucilagine Psyllii, aliove agitato, locum contusum illinere, pulveresque attringentes & siccantes, ut Myrtillorum, florum Rosarum, florum Granatorum, rad. Bistortæ, Tormentillæ, Sanguinis draconis, Mastiches, Boli, &c. inspergere.

Vel sic, si pars admodum veti & caput percussum fuerit:

℞. Lentium ʒ ij. Seminis Myrtill. Balust. ʒ ij. flor. Ros. sol. Sumach, & Tamaricis, ana ʒj. Acaciæ, Mastiches ana ʒj. Olei Rosac. Terebinthin. & Cereæ q. s. pro Emplastro vel Linimento.

Quibus in inflammatione præmissis, vel etiam omissis, si nulla timeatur inflammatio ac discurrèntia sanguinem affluxum, vel illic coagulatum mox accedemus, illisque etiam nullo tumore vel indicio ex contusione apparente, sed dolore tantum punctorio vel lancinante ex contusione in parte aliqua urgente, cùm in profundo magis materiam latere tunc cognoscamus, utimur: Propinatis simul potionibus quibusdam, si de ruptura aliqua intrinsecus & præsertim de sanguine affatim fluente in cavitates corporis, vel etiam ad locum contusum, & de illius coagulatione suspicio sit. Quæ & solæ potiones circa externorum remedium usum, si dolor ex contusione vel casu natus, nullo apparente foris indicio, vel levi, uti dictum, oritur, ad curationem, tunc, si bibantur frequenter sufficiunt. Quarum descriptiones, cum &c, si ex contusione vulnus intelligatur, ad vulnus quoque hoc sanandum, uti cæteræ vulnerariæ potiones opulentur, una cum reliquis ejusmodi potionibus proponemus. Cæterum quod externa discutientia remedia attinet, sequentia imprimis usurpantur.

Cataplasmata seu emplastra, sunt ex absinthio floribus chamomill. vel Meliloti, Rosis, in oleo & vino coctis, addendo benè contusis farinam fabaceam, interdum & Mumia, Sanguinis draconis ana ʒj. ad lbj. Emplastri.

Si caput contusum sit, Betonica aliavè capiti appropriata addi possunt, non tamen nimis calida, si dolor inflammationem præfagiat.

Absinthii pulvis cum albumine ovi subactus, profuit in multis.

Furur cum pulvere Absinthii & Aceto coctum appositum: addito interdum oleo Rosaceo & Chamæmelino.

Liliorum radix & Dracunculi, cum Melle contusa, addito Stercore caprino.

Farina fabarum cocta cum oxymelice, cui si nervi simul contusi sint, Pix liquida additur. Potest & farina orobi addi.

Cochlearum caro cum farina sem. Farnigræ. vel Fabarum contusa.

Secr-



Stercus bubulum applicatur, addito interdum oleo Rosaceo. Excellens in contusionibus, lividitates quoque tollens, cataplasma fit ex rad. symphyti major, pulverisatâ, decocta in Hydromelite, addenda ad lbj. succi rutæ & Absinthii ana ʒi ʒ. sem. Cynini ʒij. misce.

Vel ʒ. Radic. consolid. pulverisat. lbj. pulverum flor. chamomill. meliloti, Absinthii ana ʒj. farinæ tabarum, & Farnigræc. ana ʒij. Butyri vel oleorum prædictorum ʒij. croci ʒʒ. fiat cataplasma cui & succi, & Cuminum etiam addi possunt; admodum resolvit carnem ex contusione contritam seu mortificatam, ut vocant.

Inunctiones ex oleis calidis discutientibus, ut chamamelino, Anethino, Liliorum, Sambucino, Ebulino, vel simul repellentibus, ut Myrtillorum sunt.

Vel ʒ. Axungia, caponis vel gallinæ, Terebinth. dulcis. in melle & aqua vitæ i & inungatur.

Unguento Anseris in podagra descripto, si Cuminum & Absinthii pulveris portiuucula addatur, in contusionibus etiam convenit.

Unguentum dialthæ per se inunctum vel addito oleo Violaceo, Lumbricorum, Rutaceo Chamamelino, pinguedine Anseris, Butyro, additâ aliquando Muniâ: efficacissimum erit, si inunctioni sem. Cynini inspergatur unguentum de Alabaistro, Agrippæ, de Ceruâ, oxycroceum in usu sunt.

Lixivium ex cinere sarmenticio Vitium vel vinaceorum cum Aceto, Sale & Melle prodelt.

Probatum & cinis Vinaceorum cum Aceto, emplastri modo impositus.

Urina abluatur locus contusus, vel foveatur. Lineus pannus Aqua vitæ irroratus, parti contusa, tepide, subito, admotus, tumorem impedit, sanguinem dissipat & discutit.

Fomentari vel immergi circa finem, ut resolvatur materia, membrum contusum, potest, ex decocto radicum ebuli, osmundæ, sanamundæ, Absinthio, Pulegio, Artemisia, fl. chamomillæ, meliloti, sambuci vel ebuli Rosarum &c.

Involvuntur in Corio arietis modo mactati dum calet, quibus totum corpus ex casti conquassatum est: Alii bubulo utuntur vel alio: Alii in limo eos sepeliunt.

In aurium contusione, Dioscorides Sulphur cum Melle & Vino illinit. Et Bulbos cum Polenta imponit.

Si glandulæ ex contusione intumescant, vel inflammantur, uti & testes quid faciendum, in ipsorum tumoribus fuit expositum. *Felix Plater. Prax. Medic. tom. 2.*

#### Contusionis capitis curatio.

Initio statim repellentia & adstringentia sunt adhibenda, eaque sæpius, ne incallescant, removenda. Ac promtè statim capillis, si in loco capillato contusio sit, prius abradis, adstringentia, supra, cap. 1. & cap. 8. proposita applicanda, & oleo rosaceo locus inungendus: deinde oxialbumen bene conquassatum, vel solum, vel aqua rosacea & aceto mistum, & stuppâ exceptum imponendum. Vel tale repellens applicetur.

ʒ. Olei rosacei ʒij. album. ovor. ʒij. pulv. nuc. cupressi, balastiorum, alum. rochæ, rosarum rubrarum, an. Drach. j. misce, & imponatur.

Vel ʒ. Farinæ hordei, fabarum, an. ʒvj. olei rosacei ʒij. q. s. f. Cataplasma.

Locus ipse paulò arcius ligetur, sitque ligaturæ initium in loco affecto, & desinat eo loco, e quo fluxum in minere metus est. Ligatura enim arcu fluxiones arceat. Medicamenta autem talia sæpius renoventur.

Secundo die vinum auterum, in quo rosæ, myrtus betonica, & aliquid florum chamamel. cocta sint, tepidum imponatur, & si dolor aliquis appareat, medicamentum bis de die mutetur, & locus oleo rosaceo tepido foveatur.

Si contusio major sit, & ob dolorem affluxus major metuatur, vena statim aperienda, & si corpus impurum sit, medicamentum bilem purgans exhibendum, vel etiam clyster injiciendus, & tentis victus imperandus.

Et si dolor vehementior sit, lanâ oleo rosaceo & chamamelino madida locus foveendus, vel decocto, rosarum, radicis althææ, lini fenugraci, betonicæ, vel unguento Alabastrino inungendus.

Ubi jam dolor sedatus, & de affluxu amplius non metus est, danda opera, ut sanguis extra vasa effusus evacuetur: quod ut vel insensibiliter, per *ἡλκιστικὸν*, vel sensibiliter, materiâ in pus conversa, & tumore aperto.

Tutius verò longè est materiam insensibiliter discutere, quam permittere, ut in pus vertatur. Quapropter paretur tale cataplasma.

ʒ. Succi Absinthii M i ʒ. rosar. rubrar. flor. chamamel. betonicæ, sertulæ campanæ ana M. ʒ.

Coquantur in vino ad mollitiem. Postea contendantur, & addatur Farinæ hordei, fabarum, an. ʒi ʒ. pulv. sem. cumini. Drach. ij. olei rosar. q. s. f. cataplasma.

Vel imponatur emplastrum, quod capite præcedente ex Alexandro Benedicto recensuimus; aut emplastrum de betonica, aut de gummi elemi, aut ceratum Isidis, descriptum à Galeno 5. *Κερί πόντος* cap. 2. ceratum de matrisylvia, emplastrum de Janna Fernellii, emplastrum de gratia Dei Fernell. lib. 7. method.

Vel ʒ. Emplastr. diachyl. ʒij. oxycrocei, de meliloto, an. ʒj. olei chamamel. anethini, an. ʒʒ. malaxentur f. emplastrum.

Vel usurpetur, cerotum Vigonis de minio, quod emolit & discutit, & ita paretur.

ʒ. Olei chamamel. lilior. albor. an. ʒx. mallichini ʒij. pingued. vervæcis lb i ʒ. lithargyriauri ʒviij. minii ʒij. vini boni cyathumi.

Bulliant omnia simul agitando, primum lento, hinc fortiore igne, donec massa colorem subnigrum contraxerit, tum adde terebinthinæ lb ij. pulv. mastiches ʒij. gummi elemi ʒj. ceræ q. s. iterum coquantur. f. emplastrum vel somentum tale paretur.

ʒ. Nuc. cupressi contusar. num. x. myrtill. ʒj. rosar. rubr. absinthii fol. salv. majoranæ, storchad. flor. chamamel. an. M. ʒ. aluminis rochæ, rad. cyperi, calam. arom. an. ʒʒ. Coquantur in vini rubri lb iv. lixivii communis lb ij.

Decocto caput foveatur, & post somentationem



tionem exsicceetur, & emplastrum aliquod imponatur. Forestus lib. 9. observ. 32. hoc emplastrum Helidai, quod mirum in modum humiditatem in contusionibus discutiat, commendat.

℞. Flor. rosar. rubrar. chamameli, absinthii, betonicæ, an. M. j. concoquantur ad molitiem, & contundantur adde farin. fabar. ℥iij. ol. rosac. vini nigr. styptici, an. q. s. Fiat Emplastrum, seu potius cataplasma.

Si vero ob humoris effusi copiam is totus discuti nequeat, & suppuratio impediri non possit, medicamentis maturantibus suppuratione promovenda, ut oleo dulci tepido, vel decocto malvæ, althææ, caricarum; vel parando ex his cataplasma, cum farina hordei, adipe gallinæ, oleo communi; vel imponendo emplastrum tripharmacum, quod sit olei dulcis parte una, aquæ communis partibus duabus, & triticæ farinæ s. q. quibus vitellum ovi addere licet.

Ubi ex dolore & loci mollietate materiam in pus conversam esse cognitum fuerit, extrahenda ea; idque ocyus faciendum, ne pericramini, & quæ ei connectitur, duram matrem corrumpat. Quod sit sectione facta in loco decliviori, & ad materiam evacuationem commodiore. Si temporalis musculus est contusus, sectio non in ipso musculo, sed in loco propinquo instituenda; aut si in ipso musculo sectionem instituere libeat, secundum longitudinem fibrarum fiat; ferrum tamen non nimis alte alligetur; Vitandique musculi caput inoffensum.

Abcessu aperto, & materiâ evacuatâ, ulcus detergendum tali, vel simili medicamento:

℞. Syr. de absinth. simpl. rosarum, an. ℥ j, cerebinth. ℥ i β. pulv. irosos, aloës mastiches. myrrhæ, farinæ hordei, an. Drach. sem.

Ulcere mundato cavitas implenda, & cicatrix inducenda, carnis tamen excrecentia seu *caruncula*, quæ in hisce contusionibus frequenter suppullulat, depascenda pulveribus *caruncularum*, aut liquore illo viridi, qui in *caruncula* quacunque utiliter, & sine omni dolore, adhibetur; qui insitit. lib. 5. part. 1. sect. 2. cap. 13. describitur.

#### De contusione Capitis Puerorum.

Quia verò imprimis pueri & infantes, propter capitis molem, tibiæque imbecillitatem sæpius labuntur, caputque graviter offiunt, & contundunt, sanguisque ex contusione collectus sub cute tumorem excitat; de hac in puerorum capitibus contusione in specie aliquid addemus ex Julio Casare Arantio, qui in fine comment. 1. Hippocr. de vulneribus cap. scribit, se juniorem, minusque exercitatum, metuisse, ne sanguis sub cutem effusus ibi putresceret, & ad membranam descenderet, & idcirco sectionem cuti adhibuisse ut sanguis educeretur: sed hoc modo in maximum discrimen infantes adduxisse: cum & ob sanguinem affluentem vires resolverentur, & dolore, ac clamore & ejulatu infantum, fluxio, & tandem inflammatio excitaretur: ideoque longo rerum usu se oculatiorem factum, tandem a sectione plane abstinuisse, ac sequenti curandi modo gra-

ves etiam contusiones feliciter curasse.

Ab accepta contusione protinus, ubi opus, abrado, aut, si ratio ob dolorem fieri non possit, forlice detonso capillo, linteum, vel stypa, ovi albumine, & aceto rosaceo madida, imponenda, & deligatione facta, integro die naturali linteum extrinsecus iisdem madefaciendum, ne exsicceetur; ita enim humorum confluentium impetus prohibetur, & aliqua pars resolvitur.

Sequenti die sequens Cataplasma imponendum.

℞. Pulv. rosar. rubrar. fol. & baccar. myrti, an. ℥ ij. farinæ fabarum, hordei, an. ℥ j. absinthii, betonicæ an. ℥ β. sem. cumini Drach. j. mellis albi ℥ ij. cum vino nigro austero F. Cataplasma, cui adde olei rosar. chamamel. ana unc. j.

Hoc medicamentum, quod appellat Benedictum, bis singulis diebus tepide imponendum est, ut non solum contusam partem, sed & circumscriptas complectatur; sitque ejus quantitas, quæ una vice adhibetur: mediocritas. Si enim sit exigua, parum habet virum, & a partis calore facile exsicceatur: si nimia, locus affectus comprimitur. Atque in istius medicamenti usu, ad diem usque nonum vel decimum perseverandum est. In dies enim partem detumescere, & collectum sanguinem resolvit, ac per poros cutis evaporare animadvertetur, ac si calvaria etiam contusa sit, ad pristinum statum reducitur.

Cum verò dies undecimus præterierit, Emplastrum diapalma Galeni, corio tenuissimo illitum, imponendum, & tertio quoque die immutandum.

Post vigesimum diem ad reliquias humorum absumendas, & collisam calvariam in suum naturalem statum reducendam, emplastrum barbarum corio illitum applicandum. Et quamvis curatio protrahatur, & collecti, & effusi sub cutem humores tardius dissipentur, tamen curatio hoc modo feliciter expeditur.

Forestus ad tumores, qui pueris ex lapsu in capite oboriuntur, oleum anisi commendat, si eo tumor illinatur. Victus interim ætati sit sufficiens, non nimis tenuis.

Eadem curatio adhiberi potest, si infanti recens nato in partu difficili, caput contusum, & tumidum, ob sanguinem effusum, sit: sed simplicior. Solum enim diaphanum ex rosaceo confectum tumores hos discutit. Daniel Sennert. Medicin. Practic. lib. 1. part. 1. cap. 21.

In contusione semen cumini cum caryophyllis & rad. Sigill. Maris applicatum egregie conducit, vel absinthium in vino tollum & applicatum adhibent nostrates. Alifoloso spiritu vini in quo Caryophyll. & N. M. fuerint infusa, ad illinendum vel applicandum utuntur. Omnia enim hic conferunt salia aromatica vegetabilia, quoniam eorum spiritus, salia volatilia, & olea operari, & externè apposita sanguinem resolvere debent, sequens ergo erit egregium.

℞. Elix. vitæ ℥ iij. spir. sal. armoniaci caryophyll. ℥ β. Matriçal. ℥ i β. aq. flor. sambuc. ℥ ij. Camphor. ℥ iij. M. quod remedium omnibus contusionibus & lussationibus applicari potest. Sequens nuper in oculi contusione, & inde nata Ecchymosi oculo instillatum juvit.

℞. Spir.



℞. Spir. Sal. armoniaci volat. ʒʒ. Matricul. ʒʒ. Sal. commun. Saturni gr. iv. Camphor. ʒʒ. Croci opt. gr. xv. Aqu. Fzniculi euphras. ana ʒj. M.

In quacunq̃ue sugillatione sequens proderit Cataplasma.

℞. Rad. sigill. M. ireos fl. sem. cumin. fznicul. herb. Salv. ana ʒʒ. caryophyll. Macis ana ʒij. Coq. in Vin. Gall. & add. Panis bis coct. q. l. ut fiat Cataplasma; quod calide parti imponatur sugillata:

Si sugillatio fuerit ex contusione fortiori, ex qua ut sanguinis è vasis suis effusus, debet discutiti & consumi per sacculos discutientes ex absinthio, malva, ruta, semperviv. fl. Chamom. Sambuc. Sal. commun. Tartar. Sal. Armoniaci &c. paratos.

In magis sæpe contusionibus & plagis metuenda est gangraena, vel exulceratio, vel inflammatio, vel abscessus, in quem finem ad hæc symptomata impedienda nullum præstantius ostendi remedium quam sequens, nunquam me nec in desperatis sere casibus deferens, quod junioribus Medicis communicare libet.

℞. Summi. absinth. m. j. Scordii Marrub. abrotan. ana M. ʒ. fl. chamam. Melilot. Sambuc. ana. Pij. Concisi coq. ex decocto earundem herbarum ut consistent. Cataplasin. acquirat. add. Farin. Hordei lini q. l. Dein add. Sal. commun. Sal. Armoniaci, de parat. ʒʒ. Spirit. Vini camphor. ʒij.

Cataplasma hoc tepidè applicetur, & effectus mirandos in inflammationibus malignis, Punctura nervorum, Gangraena & Sugillatione percipies.

Sunt Agri qui sæpe Emplastra exoptant, inter quæ aliis palmam præripiunt Empl. nostrum Ciunabarinum de Labdano, de Cumino, de Spermate Ceti, de Bryonia, Diachyl. f. & plura alia alibi dicenda: Sæpe etiam sanguinem evasatum scarificatione facta eximunt, & cutem defædatam illinunt oleo Talc. *Joh. Wolan Encyclop. Chirurg. ration. lib. 5. cap. 5.*

### Observationes:

Diui Antonii festo, fenestra lignea satis gravis ex alto decidit in Bregma cujusdam juvenis, cute tamen non scissa. Sed graviter contusa, ex quo casu in terram prolapsus ager, sine sensu, & motu, cum privatione omnium facultatum principum, horæ spatio; ad quem Medicus magni nominis, simul cum quodam Chirurgo vocatus à principio, applicuerunt medicamenta consuetæ, ovi nempe albumen, oleum rosaceum, & similia; ego vero accersitus secunda die, statim ad cutis sectionem, & cranii perforationem deveniendum censui, reuientibus Chirurgis me senioribus, nec non patre ipsius Agri Varisco; Verùm tantummodo præscribentibus cataplasmata, iunctiones, & alia externa remedia. Quindecim vero, aut sexdecim post diebus, de quo accitus, cum viderem tumorem in parte læsa satis magnum, atque sub digitis perciperem pus fluctuans, nedum tamen permiserunt ossis excisionem; at iterum post vigesimam vocatus, annuentibus tandem omnibus, sectionem cruciatim administravi, ex qua maxima copia puris affluxit, cujus ratione summi illi viri te-

rebrationem reprobarunt, nisi post quadragesimam diem, hac observatione adducti; quod natura per porositates ossis cranii purulentam materiam supra membranas, & cerebrum hærentem trans mittebat, quod antea certe nunquam vidi; materia siquidem effluebat per poros, ad unciam unam quolibet die: quapropter ægrum cum terebrasset, ex foramine quotidie copiosum pus emanabat, ipso tamen ægro sexagesima extincto. Huic similem etiam casum in civē quodam Patavino Merio, pila ferrea contuso in capite, observavi, cum effluxu saniosæ materiæ per foraminula, & poros Calvariæ; ad quem tertio tantum invili, aliis Medicis ad ejus curam vocatis, qui à principio prætermissa terebratione, illi mortis auctores fuerunt, quod monco, nè in illos incidatis eriores, si quando præ manibus habueritis hujusmodi vulneratos, cum symptomatibus, quæ nobis demonstrant partes internas læsas. *Petrus de Marchett. in observat. Medico-Chirurg.*

### Contusio nasi gravis, cum fractura, & comminutione ossium ejusdem, felici successu sanata.

Percussus fuit mercator quidam Patavinus gravi ligno supra regionem oleum itali, à quo vulnere non solum ex altero oculo statim humores effluerunt, cum visionis abolitione, sed & sensuum, & motus, horæ dimidiæ spatio; quinimò os nasi comminutum fuit instar granorum milii. Vocatus, recepto motu & sensu, statim imposui lignum accommodatum nasi meatibus, digitisque fracturam composui, & formam naturalem ipsi reddidi; postmodum ligno educto, turundam ex linteolo, ovi albumine, & bolo armeni imbuto indidi, applicito exterius albumine; ovi cum aqua rosarum, & portuncula olei rosacei conquisato, ac supra oculum pulpis pomorum sub prunis coctorum, cum cassia noviter extracta simul mistis. Interim omnia administrata inhibendæ fluxioni, sanguinis scilicet missio, ac medicamenta lenientia, alterantia, & purgantia, ex lege exhibitæ, prout in aliis vulneribus, & contusionibus fieri consuetum; postero die parti affectæ, turundarum vice, immisi pennam anserinam, obvolutam relâ tenuissimâ, imbuta medicamento jam dicto, atque parti externæ applicui prædictum medicamentum, eodem ordine servato, usque ad decimam quartam, inflammatione, & tumore ex contusione cessantibus; postmodum cum partes etiam internæ nasi læsæ essent, quò cicatrix callosa illis induceretur, imposui cannulam plumbeam illitam unguento ex tuthia, atque inspersam pulveribus ex cornu cervi ulso, terra sigillata, ac rosis rubris, quibus cicatrix inducta in iisdem nasi meatibus; partibus verò externis applicui ceratum Diachalciteos, mistum cum pulveribus boli armenæ orientalis; quorum usû spatio quadraginta dierum æger omnino fuit sanatus, eadem naturali & concinna forma nasi illi restituta. Tandem oculo, cessante inflammatione, aquam rosaceam, cum pulvere tuthiæ præparatæ adhibui, ipsumque sanavi, non citrà tamen visus abolitionem, ægro adhuc num in vivis agente. *Petrus de Marchett. in observat. Medico-Chirurg.*

Quod



Quod si verum sit Hippocratis effatum, experientiam nimirum esse fallacem, eo magis verum esse dixerim, fallacissimam esse praxin sine experientia. Mulier quædam è curru cecidit in terram gelu induratum, undè frons tam vehementer fuit contusa, ut ingens statim ibidem elevaretur tumor. Chirurgus Suburbanus tumore explorato, & ægotam aliquoties vomuisse intelligens, cranium esse impressum & fissum, nec sine cruciali incisione & ossis elevatione posse curari, judicavit. Hisce propositis, adstantes me vocari jusserunt, quando ego hanc propositam encheiresin remuebam, nulla quippe cranii fissi signa præstò esse asseverans. Ad hæc respondit audaculus ille incisor, sese digitis impressionem sentire, nullam verò esse impressionem sine fissura. Revera nisi ejusmodi tumores sæpius in capite digitis explorassem, perque experientiam de eorum vera natura edoctus fuisset, dixisset & ego ipse cranium esse impressum: Ita enim tumores capitis post graviolem contusionem sæpius palpatibus sese offerrunt. Quando namque locus inter tumorem & partem sanam digito comprimitur, cranium sæpe videtur impressum, sicque junioribus facile imponit. Proinde cauti hi esse debent, nè in similem incidant errorem. Itaque loco crucialis incisionis fomentum ex optimis cephalicis applicitum est, seu videtis infra scriptum, cujus beneficio tumor intra duos tres vel dies evanescere cepit, atque ægra nostra brevi convaleuit, sine ulteriori magno remedio externo. Non solum autem in hoc casu, verum etiam in cranii vera fractura, in qua symptomata non augentur, haud statim ad incisionem & trepanationem esse confugiendum, existimo. Præstat post venæ sectionem ejusmodi adhibere fomenta cephalica, quæ non parè, nec linteis exiguis, sed laxioribus panis laneis, calidè sunt applicanda, totumque caput isdem obvolvendum. Sic non raro felicissimè opem tulit, quorum capitibus jam scalpellum incisionum imminerebat.

*Fomentum cephalicum superscriptum.*

℞. Herb. Betonicæ Majoranæ ana m. ij. Salviæ. Rutæ ana m. j. f. Flor. Stachados Lavedulæ ana m. f. Rosarum rub. m. j. coq. f. a. ex f. q. Vini alb. ad lb ij. Col. detur usui. *Fredericus Ruyschius in observ. anatomico chirurgic. centuria.*

Vir annuum agens trigessimum in sphaisterio pilam a reticulo summa vi impulsam accepit circa oculum dextrum, unde statim dolor exortus est atrocissimus.

Patiens in memoriam sibi revocans alios, quos antea eodem modo lætos è vestigio vidit sanari sola aqua frigida mox ab ictu continuo admotà, statim applicuit parti contusæ sudariolum suum aqua frigida madefactum, illudque, quam p. inum intepescebat, nova aqua frigida iterum imbuebat.

Postero die ictum subsequente amici, qui hoc infortunium accidisse intellexerant, ægotum invasebant, sed utrumque oculum sanum ac belle habentem conspicientes prorsus obstupescabant, quandoquidem firmiter sibi persuadebant oculum, qui ictum adeò vehementem acceperat, egregie debere livescere ac dolere.

Verum, quid hoc sibi vult? an aqua frigida jam proderit in contusione? illa nocere potius videtur, quia sanguinem extra vasa profusum intrasit, coagulat ac stagnare facit; nonne spiritus vini, aliaque medicamenta, quæ sanguinis motum adaugent, hoc in casu potius convenissent?

Ut hujus difficultatis solutionem clarè concipias, scire oportet, in partibus à pila valde adacta laxis vascula quædam sanguifera valde parva fuisse aperta, quæ si jam sanguinem in tubulos partium lassarum profudissent, tunc aqua frigida nocuisset. Verum enim vero hæc aqua frigida adhibita fuit, antequam sanguis exisset, & sic non tantum hæc vascula valde exigua suo frigore iterum occlusit, sed præterea in causa fuit, quominus novus sanguis hæc vascula intraret per aliquod temporis intervallum; sic faciem nostram, rubentem non alia de causa, quam quia per ejusdem cutim dispersa jacent multa vascula exilia sanguine plena, pallescere cernimus à frigore aquæ, æris, aliarumque rerum, quia illud pro tempore prohibet, ne sanguis hæc exigua faciei vascula ingrediatur, sic jucundum ac juvenes ad hæta stimulantem labiorum in fornosâ Virgine ruborem mutari cernimus in pallidum colorem ab aceto sanguinem à vasculis per labiorum superficiem diffeminatis arcente.

Atqui talia tentare velle, ubi tubuli partium contusarum jam sanguine extra vasa prolapsi repleti sunt, extrema dementia mihi videtur, ac non raro gangrænam in parte contusa exortam novi à frigidis & astringentibus intempestivè usurpatis. *Johan. Mayr observat. chirurgic. decade iij.*

## CONVULSIO.

**C**onvulsio vel Spasmus est musculorum suam originem versus præter voluntatem contractio, per quam membra aut partes varie fluctuant, extenduntur, aut in unum alterumque latus contorquentur.

*Partem affectam*, seu musculum ipsum, seu fibras motrices, seu nervos spirituum vectores dixeris, eodem propemodum res redit. Interim minime dubitandum quin in convulsionibus universalibus, aut saltem quæ plures corporis partes occupant, particula heterogeneæ & explosivæ è sanguine ossa (ut vult Clar. Willisius) cum succo nervoso instillantur, quæ postea in nervosum genus detrusæ, inibi spiritibus accrescant, iisque diathesin convulsivam inferant.

Convulsio autem est vel *universalis*, vel *particularis*. Universalis tres sunt species; *Tetanus*, ubi totum corpus rigidum, & in neutram partem flexile manet: *Empresionos*, quando antrosum; *Opiatornos*, quando retrosum, cervix, spina dorsii, & reliquæ partes incurvantur. Particularis est cum partes quædam, aut membra, ut oculi, os, brachium, pes, seorsim convelluntur. Oris spasmus peculiaris sortitur nomina, & si ab una tantum parte contrahitur, *spasmus cynicus*; si ab utraque, *risus sardonius*; si mandibulæ quoque convellantur, & dentes invicem conentiantur, *trismus* dicitur. Convulsio præterea alia est dolorifica, alia sine dolore.



Distingueret etiam solent Practici *Convulsivum* a *Motu Convulsivo*, autemque in vera convulsione retractione in musculorum esse perpetuam, seu continuam & indefinentem, in motu vero convulsivo esse interpolatam: præterea in vera convulsione membrum esse immobile, in motu convulsivo vario agitari: ut patet in Epilepsia quæ inter motus convulsivos principem locum obtinet. Deinde in vera convulsione sensus omnes plerumque integros esse, in motu convulsivo sæpe lædi. Alias itidem distinctiones & causas petitas afferunt, convulsioneque a *repleione* & *inanitione*, motum vero convulsivum ab *irritatione* fieri volunt. Verum inanitio & repletio jam dudum explosæ sunt. Ad ceteras distinctiones quod attinet, non ita magni ad Praxim momenti esse videntur, quin uterque affectus a Celebrioribus Practicis sæpius confundatur.

*Causa proxima* est irritatio partium nervosarum, quæ in convulsione propriè sic dicta, continua, in motu convulsivo alternans est. Clariss. Willis particulis heterogeneis & valde explosivis, spiritibus animalibus quæ in hac aut illa corporis regione degunt, accrescentibus, atque particularum mineralium iniquas combinationes, explosionesque violentas imitantibus, convulsiones acceptas refert. Quandoquidem, inquit ille, in motu regulari & ordinario, muscoli impetum motivum & vim elasticam concipere nequimus, nisi spirituum animalium explosio quædam supponatur; cerè multo magis, pro insultibus saltem epilepticis, aliisque convulsionibus admirandis quæ passim eveniunt, excitandis, eorundem spirituum cum aliis particulis valde efferis complicationes, atque ab invicem elisiones vehementes requiri, asserere licebit. Pro hujusce sententiæ clariori intelligentia, consulenda dissertatio de Motu Musculari ab ipso conscripta, cui tanquam hypothesei innuitur. Alii Archæi, seu systematis nervosi Præsidis excaulescentiæ id tribuunt. Verum *ἡ δὲ ἀπὸ πλεονεξίας* sine necessitate accersere videntur; potius enim, sive materia irritante sola, salino scilicet acri; sive Willisii explosionibus, ab ejusdem materiz combinationibus ortis; posita præterea spirituum animalium, tum mobilitate, tum motu per nervos reciproco, nullas videmus insolubiles super hac re difficultates.

*Causa mediata* Sylvio sunt humor, halitusve acidus, aut aeris ad spinalis medullæ exortum, in convulsione universali; ad nervum aut musculum quempiam peculiarem, in particulari, delatus. De halitibus, vide quæ Cap. de Epilepsia annotamus. Humores quod spectat; succos acidos, aut acres & salino-sulphureos, bilem adultam, pituitam acescentem, & melancholicam, hujusmodi affectum producere posse, nemo negaverit. Huc etiam referenda venena omnia, & ipsa fortiora cathartica, morsus animalium venenatorum, aut iratorum, vulnera, ictus, punctura, & inflammationes musculorum, aut fibrarum nervosarum.

Affectus hic faciliè dignoscitur, nam musculi præter voluntatem contractio signum ejus est pathognomonicum.

A superpurgatione, aut immodico sanguinis profluvio convulsio malum Hippocr. Aphor. 3. & 4. sect. 5. A Phrenitide convulsio lethalis.

Imò in omnibus febribus ardentibus perniciosissimæ sunt convulsiones; quapropter ex Hippocrate. præstat febrem convulsioni, quam convulsionem febri supervenire. Quæ a veneno assumpto, aut venenati animalis moriu, aut punctura, pessimi semper sunt omnis. Datur autem casus in quo boni ominis sunt convulsiones: Scilicet dum is, quicunque etiam validis, torquentur infantes quibus variolæ mox sunt erupturæ; certo enim significant illas melioris notæ & de genere discretarum fore; quod non tantum observavit accuratissimus Sydenham, sed & alii cum eo Practici, passimque nos ipsi videmus.

*Indicationes* quod spectat; præter illas quæ venenis assumptis, veneni immodicæ, aliisque siue morbis prægressis, siue causis evidentibus, unde sæpius enascuntur convulsiones, debentur: in specie requiritur materiz heterogeneæ evacuatio & eradicatio, & spirituum animalium in motus efferos & inordinatos actorem, ad tranquillitatem, motibus naturaliter peragendis necessariam, reductio.

Hæc duabus indicationibus satisfieri debet per remedia, cum universalialia, tum particularia. Inter universalialia sunt clysteres aciores; venæsectio, (si nihil contra iudicet,) quæ spiritibus multa conciliatur quies; purgantia paulò fortiora. Particularia sunt volatilia omnia, castoreum, &c. Narcoticis etiam cum cautionibus necessariis mixtata, balneum frigidum ex Hippocrate; illaque tandem omnia de quibus in Epilepsia curatione fusè agitur; illuc itaque Lectorem remittentes; jam *Curationes, Consultationes, Observationes* atque *Anatomicas inspectiones* à variis Autoribus petitas adducemus; præmissa Doctissima de his Laurent. Bellini Dissertatione.

## CONVULSIO.

Seu ut Celso distensio, *σπασμός* Græcis *σπᾶν* enim contrahi est (*σπασμὸς* autem est solutio unitatis in partibus nervosis, vel villis musculorum sine vulnere, ut per validiorem contractionem: *σπῆμα* autem est eadem divulsio sine vulnere, sed in carne, & motus convulsivus.

### Antecedentia.

**A**ntecedentia prius desumemus ex variis locis Hippocratis, ut sententia ejus à Galeno, & aliis deinde Medicis partim perversa, partim repudiata clariùs pateat. Itaque

*Convulsio vel à repletionis fit, vel ab inanitione; ita verò & singulium.*

*A copioso sanguinis fluxu singulium, aut convulsio mala.*

*A sanguinis profluvio desipientia, aut etiam convulsio malum.*

*A purgatione immodica convulsio, aut singulium superveniens malum.*

*Convulsio ab helleboro lethalis.*

*A medicamentis purgantibus potione mortifera.*

*Ab ileo vomitus, vel singulium, vel convulsio, vel delirium malum.*



*Propter vigiliam convulsio, aut desipientia malum.*

*Convulsio vulnere superveniens letalis.*

*Febrim convulsioni supervenire melius est, quam febri convulsionem.*

*Si muliebri profusio convulsio, & animi defectus superveniat, malo est.*

*Spasmo, aut tetano vexato febris si accesserit, morbum solvit.*

*Qui quartana corripitur, non admodum convulsionibus tentatur; si vero prius tentari fuerint, superveniente quartana liberantur.*

*In acutis febribus convulsionem, & circa viscera vehementes dolores malum.*

*Convulsionem cum febre acuta perniciem denunciant.*

*In febribus spiritum offendens (hoc est, subsistens, ut Galenus explicat, quasi impedimento illidens) malo est; convulsionem enim significat.*

*Quibus sunt cum ulceribus tumores conspici, ii non admodum convelluntur, aut insaniunt; his vero repente evanescentibus, siquidem postica parte factum sit, convulsionem, & tetani accidunt, si vero à fronte, insania, aut lateris dolores acuti, aut empyema, aut dysenteria, si rubicundi fuerint tumores.*

*In febre convulsio, manuumque, ac pedum dolores malignum quiddam prænunciant.*

*Fiant etiam convulsionem ex laboribus, ex casibus, ex plaga, & si quis onus majus tollat, & excursibus, & luctu, & omnibus id genus (loquitur ibi de convulsionibus venarum, quæ convulsæ varici sunt similes, & earum convulsionem fieri per vim & contentionem ibidem asserit)*

*Ex vulnere convulsio letalis.*

*Convulsio febre succedens periculum denunciat, minimum verò pueris.*

*Convulsionem solvit febris acuta, quæ prius non aderat, aut si prius adsuit ingravescent: confert autem & urina vitrea copiosius pertransiens, & alui fluxio, & somnus: convulsionem autem de repente ortæ febris solvit, & alui fluxus.*

*Quod si convulsio in vena facta sit, hæc quidem per exordia dolorem excitat, & pulsas, progressu verò temporis sanguinem ad carnem transmittit, qui in carne putrescens in pus vertitur (an convulsio aneurisma est?)*

*Nervum præcisus convulsionem facit, & ut minime coalescit, ita vehementer inflammatur.*

*Posidonius quoque tertio die convulsione correptus est, calor non relinquebatur, decimo octavo mortuus est.*

*Vehementes faucium dolores aurium tubercula, & convulsionem excitant, itemque cervicis, & colli dolores.*

*Quibus cum dentes erumpunt, alius crebrius demittit, minus convulsione tentatur, quam quibus sic raro alius subducitur: quibus in dentitione febris acuta accedit, ii raro convulsionibus tentantur: qui cum dentitione bene habito corpore permanent, gravi somno premuntur, periculum est, ne eos convulsio præhendat.*

*Convulsionem autem ideo inius afferunt (convulsionem corporis, de quibus antea dixerat, hoc est, convulsionem ideo à concussionibus producuntur) quod calefactum corpus cutem vehementer tentat: carnem vero minus cogunt, quam cutis, qui in orbem obvenit,*

*eandemque humore vacuant.*

*Pueris convulsionem accidunt, si febris acuta fuerit, venter non desiciat, si vigilent, periercantur, plorent assidue, & color immutetur, & ex viridi pallidus, aut lividus, aut ruber contrahantur: hæc autem pueris quidem recens natis ad septimum usque annum promptissime eveniunt; at grandiores pueri, & viri non adeo per febres convulsionibus præhenduntur, nisi vehementissimum, & pessimum quoddam signum ex his, quæ in phrenitide fieri solent, adjuerit.*

*Convulsione, aut corporis distensione vexato, si febris superveniat, morbum solvit: si febre detentum convulsio præbenderit, febris eodem die, aut postero, aut tertio desinit.*

*Et hæc sola aliis plurimis locis Hippocratis seligimus, ne res in immensum excreseat. Convulsionem autem antecedunt etiam punctio nervi: situs partis per longiusculum tempus incommodus, quo ut convulsio, quæ dicitur Græcis *κράσπος* *κράσπος*, seu spasmus flatuosus, nobis *granchio*. Pulsus similis chordæ tensæ agitatæ, ac vibratæ, cuiusmodi pulsus dicitur Galeno chordosus, & jectigatio, ita fieri ipsi creditus, quia arteriæ sunt juxta nervos.*

### Conjuncta.

*Constans immobilitas ossium ad articulationes, ita ut dimoveri difficile possint etiam valida adstantium opera, nec similiter possint dimoveri à laborante per imperium voluntatis: nulla mentis, aut sensuum læsio. In moribus autem convulsivis alterna ossium dimotio, & immobilitas non raro cum læsione mentis, aut sensuum. In utrisque dolor non tamen semper, febres aliquando, & alia singula, quæ mox accidunt quandoque, non semper: modo calent, modo refrigerantur: facies pallescit, rubet, turget: urina laudabilis, modo cruda, copia ingens supprimitur, vel retinetur. Tremor in unam situm differentiam, & semper eandem, motus convulsivi nullo ordine, hi sine voluntate, ille cum arbitrii concursu. In convulsione nervi, & tendines rigidi ad tactum percipiuntur (ait Bennerius, sed quomodo tactu percipit nervos?)*

### Succedentia.

*Qui tetano corripitur, intra quatuor dies intereunt: si vero hos superaverint, incolumes evadunt. Et idem Hipp. In nervorum distensionibus, & iis, quæ in posteriorem partem sunt dissolutæ maxillæ, mortem afferunt: quin etiam letale est in posteriorum partium distensione sudare, & corpus dissolui, & in eodem malo per nares revomere, aut ubi per initia vox defecta fuit, clamare, & nugari: postridie enim adsuam mortem significat. Quod ipsum confirmat Hipp. primo Prædicatorum textu 118. Quæ ex lumbis in cervicem, & caput redundant, & levi syderationis more resolutionis sensum inducunt, convulsionem, ac mentis emotionem minantur, videndumque est, num talia convulsione solvantur. Qui hujusmodi consistunt, variè morbum trahunt, atque ead. no diutius perseverant. (Quo super Galenus & à se visum asserit, qui alterne paralyticus fieret, & convulsus, & Petrus Salius Diversus id ipsum vidit)*

Hoc



Hoc ipsum rursus asseritur in Coacis paulò divertis extremis verbis hunc in modum. *Quæ ex lumbis in cervicem, & caput rednodantia levis syderationis more resorptionis sensum inducunt, convulsionem, ac mentis emotionem minantur, videnturque est, nam talia convulsionibus solvantur, aut in huiusmodi habentibus atque male habeant, atque eadem diutius perseverent.*

Quod sit implicata difficultatibus convulsionis explicatio, nemo est, qui non noverit, dummodo medicorum monumenta perquisiverit, quibus occasionem præbuit Aphorismus Hippocratis minùs apte, atque perspicue ad ipsius Hippocratis mentem expositus, & doctrix, quam eo super Galenus trucidit, minùs exacta perceptio. Ille est trigessimus novus sextæ sectionis: *Convulsio vel à repletione fit, vel ab inanitione, ita vero & signum.* Exposuit id Galenus tanquam pronunciatum ab Hippocrate de inanitione, & repletione immediata nervorum, quasi nempe non de remota etiam, & universali intellexerit Hippocrates, ex qua necessariò pendeat particularis, & proxima nervorum, atque insuper quasi soli nervi exhausti, vel infarti convulsionem, nulla autem alia causa producat. Hanc vero talem inanitionem, & repletionem nervorum ut exponat Galenus, re remotiorem causam proponit, exsiccationem nempe nervorum, & humefactionem; utroque enim modo breviores fieri asserit, ut chordæ musculæ humido aëre dilantur, & breviores hunc, vel eadem igni admotæ extenuantur, hoc est, humido manuntur, & similiter fiunt breviores: hanc brevitatē, dum sit, sequuntur necessariò appenti musculi, ait Galenus, unde convulsio: quæ sanè vera sunt omnia, licet posteriores Medici vix excusari possent Galenum censeant, & se mille labyrinthis implicent propter incertam. Nos itaque ex eodem Hippocrate ostendemus inanitionem illam, & repletionem non esse particularem, & proximam nervorum, sed valorum sanguinis, seu universi corporis, unde inanitio, vel repletio nervorum necessariò pender, atque ex hac oriri omne genus causæ convulsionem producentis, adeoque etiam exsiccationem, & humefactionem, & vera esse, quæ de iis exposuit Galenus. Stimulum etiam notum fuisse Hippocrati, & annumeratum convulsionis causis, ac demum inanitionem, & repletionem non ad nervos solum, sed ad arterias, & musculos etiam pertinere, & hæc necessariò deduci ex doctrina Hippocratis posita inanitione, & evacuatione universali. Manifestum igitur est ex locis expositis Hippocratis, quoties ipse convulsionem commemorat, aliquid exponere, quod vel inanitionem, vel repletionem totius corporis arguit: sic in Aphorismis superius memoratis. *A copioso sanguinis fluxu singultus, aut convulsio mala.* En evacuationem sanguinis, seu inanitionem. *A sanguinis profluvio desipientia, aut convulsio mala.* Rursus. *A purgatione immodica convulsio, aut singultus superveniens malum.* Similiter. *Convulsio ab helioboro lethalis.* Id ipsum. *A medicamento potu convulsio mortifera.* Quæ sanè singula inanitionem corporis, aut valorum sanguinis, seu universalem indicant. Idem etiam arguit, sed etiam magis nervos. *Propter vigiliam convulsio, aut de-*

*spicientia malum;* absumptio enim ingens spirituum, & siccitas nervorum singularis, sicut etiam partium omnium in nimia vigilia fit. Ulterius. *De muliebri profluvio convulsio, & animi defectus superveniat, malo est.* Quin & Coacis trigessimus inanitionem potest arguere: ait enim. *In febre convulsio, manuumque, ac pedum dolores malignam quiddam præcunt.* Dolores illi in summis partibus nervosis, & articularum plenis acre quid, & liberum, absumpto nempe humido, possunt arguere, quæ uquam & oppositum possit indicari, ut inferius. Sed multo clarius in Coacis. *Convulsio febre succedens periculum denunciat, minimum verò pueris.* Quoniam enim absumpto humido superest calor, & quicquid mobile est, & acre liberum, & sui juris; in iis igitur corporibus minimum periculum alteret eorum partium libertas, in quibus naturaliter plenum humidi continetur, cuiusmodi sunt pueri, eritque huius loci convulsio producta a siccitate &c. humido absumpto per febrim, quod tantum non evidenter arguit succedens textus. *Adultiores, & qui septimum annum exceperunt convulsione in febre non præbentur, alioquin periculum denunciat,* quod explicari potest eo, quod calor sit fixior. Sed uterque hic textus potest etiam ad repletionem pertinere, & in pueris quidem non inoritur erit periculi convulsio febre succedens, si fiat illa ab humidi copia pueris naturali adeoque non præter naturam cumulata, quod secus accidet in adultioribus, & septimum annum excedentibus. Hoc manifestius. *Posidocreon quoque tertio die convulsione correptus est, calor non relinquebat, decimo octavo moritur.* Calor, inquit, non relinquebat, hinc siccitas, seu inanitio. Convulsionem cum febre acuta perniciosam denunciant, & hoc nimii caloris, & siccitatis opus esse potest. Rursus perspicuum illud. *Convulsionem autem ideo intus asserunt, quod calefactum corpus cutem vehementer tenuat, carnem verò minus cogunt, quam cursus, qui in orbem obeuntur, eandemque humore vacuant.* Pariter ad inanitionem. *In febribus spiritus offendens malo est; convulsionem enim significat.* Quia tamen spiritus potest subsistere quasi impingens statim, ac musculi convelluntur, potest ejusmodi dictum referri etiam ad repletionem. Sed repletionem ipsam universalem arguunt clarius. *Ab ileo vomitus, vel singultus, vel convulsio, vel delirium malum;* indicabit enim, materiam ilei vasa subire, & infarcire, vel si sit acrior, in motum agere spiritus, & convulsionem producere, qualem secundo loco in Comate vigili exposuimus. Nimi tamen & hic textus ad inanitionem, si in ileo dolor adsit, aut inflammatio nimis exsiccans, atque absumens sanguinem, ac spiritus? *Febrem convulsioni supervenire melius est, quam febri convulsionem;* si enim illa fiat à repletionem, per motum febris curabitur solvendo: si verò febre convulsio succedat, res erit incerta, an a decubitu, an ex abundantia, an ab acrimonia, & vi proximè expositæ naturæ in præcedenti textu. Huius aphorismi pars, & species sunt frequentes. *Spasmo, aut tetano vexato febris si accesserit, morbum solvit.* Qui quartana corripitur non admodum convulsionibus tentantur: si verò prius tentati fuerint, superveniente quartana liberantur. *In febre convul-*



sis, manuumque, ac pedum dolores malignum quiddam prænunciant. Ait insuper Hippocrates. Si convulsio in vena facta sit, hæc quidem per exordia dolorem excitat, & pulsus: progressu vero temporis sanguinem ad carnem transmittit, qui in carne putrescens in pus vertitur. Et inferius de venæ convulsionem loquens asseruit venas convulsas fieri varici similes, & concludit de ejusmodi convulsionibus: Finit etiam convulsiones ex laboribus, ex casibus, ex plaga, & si quis onus majus tollat, & ex cursibus, ac luctu, & omnibus id genus. Quibus politis patet primò, hujusmodi convulsiones nihil aliud esse, quam aneurismata: secundò etiam in partibus moventibus fieri posse eodem modo, & iisdem de causis convulsionem, dummodo possint simili intra villos earum contenti in totidem velut aneurismata à materia replente trudi. Sed & hoc evidens. Convulsionem solvit febris acuta, quæ prius non aderat, aut si prius adsit, ingravescent: confert autem & urina vitrea copiosius pertransiit, & alvi fluxio, & somnus: convulsiones autem de repente ortas febris solvit & alvi fluxus. Vides omnia comparata ad evacuationem, vel resolutionem, ut convulsi convalescant. Vehementes faucium dolores, aurium inbercula, & convulsiones excitant, itemque cervicis, & faucium dolores. In tuberculis materia, unde convulsio cum materia, seu repletionem, sed an non verius ad inanitionem per dolores absumentes, & exsiccentes; Quibus cum dentes erumpunt, alvus crebrius demittit, minus convulsione tentantur, quam quibus sic raro alvus subducitur: quibus in dentitione febris acuta accedit, it raro convulsionibus tentantur: qui cum dentitione bene habito corpore permanent, gravi somno premuntur, periculum est, ne eos convulsi præhendat. En pleui pueri humiditatem, quas febris motu, & calore minuit, & subductio alui: bona habitudo corporis, & somnus easdem augens. Pueri convulsiones accidunt, si febris acuta fuerit, venter non dejectus, si vigilent, perierreant, plorent assidue, & color immutetur, & ex viridi pallidus, aut lividus, aut rubor contrahatur: hæc autem pueris quidem recens natis ad septimum usque annum pronatissime eventant, ac grandiores pueri, & viri non adeo per febres convulsionibus præhenduntur, nisi vehementissimum, & pessimum quoddam signum ex his, quæ in pueritide fieri solent, adsuerit. Hunc textum conjunge cum superioribus duobus 336. & 337. Coacarum. Ad hæc Hippocrates. In nervorum distensionibus, & iis, quæ in posteriorem partem sunt dissoluta maxilla, mortem asserunt, quin etiam lethale est in posteriorum partium distensione sudare, & corpus dissolvi, ac in eodem malo per nares revomere, aut ubi per initia vox defecta fuit, clamare, & nugari; postidus enim adfuturam mortem significat. Et ad hunc textum reduces eos alios, quos in succedentibus notabimus, nempe in primo Prædictorum textu 118. & in Coacis 313. ubi similiter plenitudo, aut inanitas. Convulsio, aut corporis distensio venæ si febris superveniat, morbum solvit: similiterque si febre detentum convulsio præbenderit, febris eodem die, aut postero, aut tertio desinit, quod contingit ob materis febrilis decubitus ad partes convulsas. Vides igitur, ubique convulsio per Hippocratem, ibi inanitionem, aut repletionem corporis, & vasorum sanguinis: sed ab his pendet inanitio, & repletio

nervorum, & musculorum; igitur illa posita nervi, & musculi manantur, vel replentur oportet, videsque nullibi ab Hippocrate inanitionem habitum aut de inanitione, & repletionem solius generis nervosi, aut de inanitione, & repletionem tanquam causa proxima convulsionis. Insuper ex locis ad singultum pertinentibus vides, ipsum loqui de singultu, qui fit per inanitionem, & repletionem, non qui per stimulum, & de illo promde loquitur aphorismo 39. sect. 6. Notam tamen fuisse Hippocrati causam convulsionis à stimulo petitam, deduci posset verosimiliter ex Aphor. Convulsio vulnere superveniens lethalis: quod idem repetitur in Coacis. A vulnere convulsio lethalis. Stimulus enim vulnereis majorem copiam liquidi per nervos deducit, quæ potest esse tanta, ut musculum in continua contractione detineat. Quin adhuc clarius. Nervus præcisus convulsionem facit, & ut minime coalescit, ita vehementer inflammatur. Inflammatio acer est stimulus, unde in nervos prodeuntes à superiori parte nervi præcisi derivari potest maxima copia spirituum convulsionem producentium in partibus superioribus; in inferioribus vero convelli membrum poterit ad partes oppositas, ut inferius. Ex his igitur satis verosimiliter arguere possumus, stimulum etiam Hippocrati ut causam convulsionis notum fuisse, nec esse quod Galenus allaboret adiciendam tertiam causam convulsionis ab Hippocrate omissam, nempe stimulum, quo singultus etiam fit; de quo enim singultu ille locutus sit, patet superius & stimulum ipsi fuisse notum; licet autem nec stimulum agnovisset Hippocrates, assero tamen, stimulum, quæ stimulus est, non constituere tertiam causam proximam convulsionis diversam à duabus aliis, sed stimulum esse causam remotam, quæ producit repletio in parte, vel partibus, quæ convelluntur, quod ex nostra doctrina stimulum est evidens; stimulus enim facit, ut ad partem stimulatam derivetur copia liquidi naturali major, seu ut fiat repletio; quare stimulus in productione convulsionis ad repletionem redigendus est, atque ex his omnibus abunde constat Hippocratis mens. Cum autem ab inanitione, & repletionem universali inanitiones, & repletiones nervorum, & musculorum succedere necessario debeant, & diversis modis diversas affectiones in iis partibus producere, exponamus jam oportet, quid iis inanitionibus, & repletionibus insit ad convulsionem faciens, & primò ostendemus, verissimum esse, quod Galenus asserit, ac posse per calorem, & siccitatem quamlibet, per quamlibet humiditatem nervos breviores fieri, & cum id contingit, appensos musculos nervis cessuros, & convulsionem producendam. Sint enim ossa quælibet ad articulationem in æquilibrio posita; musculi igitur contrahentes ex æquo in contractionem nitentur, adeoque quæcunque vis alterutri ipsorum adjiciatur, ossa cedent ad ejus musculi partes, cui vis quantumvis minima additur. Intelligatur itaque nervus in alterutrum musculorum abiens quæcunque de causa fieri siccior: fiet igitur etiam brevior, adeoque secum ducet appensum musculum minimæ cuiuslibet facultati cedentem, cum sit in æquilibrio con-



constitutus cum opposito : & siquidem per infarctum humiditatis nervi contrahuntur ut funiculi, id ipsum debere contingere, manifestum est; si vero laxantur; igitur laxato nervo alterutrus musculi contrahentes musculus, cuius nervus laxatur, minus nitetur in articulationem adeoque musculus oppositus contrahetur, seu convellitur; cum autem nervus sit siccior, inanitur humido : cum humescit, impletur liquido; convulsio igitur à siccitate, & humiditate à Galeno exposita possibilis est. Affero jam insuper, hanc ipsam convulsionem in repletionem, aut inanitionem aliqua totius corporis necessariam esse. Primum etenim ita exhauriatur corpus liquido, ut intra vasa sanguinis pars siccior sola supersit : exsiccabuntur sanè partes, & spiritus animales sicciores producentur, unde & ipsi siccitatem suorum canalium augebunt, qui proinde sicclores facti breviores etiam fient, & convulsio succedet, quod si cum siccitate sit conjunctus calor, validior erit siccitatis effectus, unde nervi contractio vehementior, & convulsio validior. Et talis convulsio forte illa est, quæ nimis evacuationi per hæmorrhagiam, aut medicamentum potum succedit : quanquam per utrumque heri potest, & per hæmorrhagiam præcipue, ut convulsio fiat à frigore sublato per ablationem sanguinis, vel per alium calore omni, & motu, unde frigus, quod coagulando quicquid humoris inter villos musculorum, & membranarum continetur, adeo rigidas easdem partes reddere potest, ut cuicumque etiam validæ facultati flexionem molienti difficillimè pareant. Notum id quibuscumque versatis in cadaverum tractatione, postquam à morte per longiusculum tempus dirigerunt; eorum enim partes deprehenduntur inflexiles, & quicquid humidi continetur inter fibras coagulatum occurrit in liquidum viscidius, cuiusmodi coagulationem ne saliva quidem, & mucus narium effugere possunt, cum & utraque hæc liquida à frigore mortis concreverint, & vel intra canales suos, vel extra ipsos ad emulsaria ita coagulata reperiuntur. Verùm convulsionem à siccitate per evacuationes provenire posse arguit vel litis ingens, & ariditas faucium, & partium omnium, quæ a copiosioribus evacuationibus succedit, quæ sane in nervis etiam habeatur oportet, unde contrahuntur, & fiet convulsio per siccitatem. Sine evacuationibus autem cui non totum in morbis plurimis, linguam, & fauces ita siccare, ut æger ne loqui quidem possit, linguam retrorsum retrahi, & videri quid tractatum? Si igitur quod in lingua non raro contingit, contingat in aliquo, vel omnibus nervis abstracta circa eos, vel non perducta humiditate, id ipsum debebit accidere, nempe convulsio; & sapissime in cadaveribus hoc ipsum morbo aliquo confectorum occurrunt pulmones, quorum membranz internæ, vel externæ, vel utraq; adeo siccæ sunt, ut cum divelluntur, aut secantur, sonent non secus, ac exsiccatae pelles; quemadmodum igitur pulmones aliquando tali siccitate laborant, laborare etiam eadem poterunt omnes, aut aliqui nervi, & convulsionem eo pacto producere. Et ridiculum prope est, quod urgent, tabe, marasmo, hæctica laborantes tanta siccitate

non affici, ut convelli possint, quanquam illa eorum siccitas sit summa; in ejusmodi enim morbis illa habitudo corporis extenuatio est, non siccitas, proveniens à dissolutione partium omnium, quam necessario sequitur diminutio molis, quod nemo sanæ mentis non videt : & quod arguunt, nunquam reperiri tantam siccitatem in corpore, ut retrahere possit nervum cum appensis partibus, videant, quanti momenti sit in partibus æquilibratis, atque insuper quantæ sit siccitatis lingua, & fauces in aliquibus morbis, & in aliis pulmones, ut exposuimus. Similiter convulsionem à frigore per nimiam evacuationem fieri posse, illud arguit, quod nimis evacuati languescunt, viribus dehiunt, pallent diluto pallore quasi cadavera, frigent, quæ omnia indicant defectum caloris, & motus, & vim frigoris superantem. Contra contineatur in vasis sanguinis copia naturali major cujuscumque liquidi, quod intrudere se possit inter utramque particulam fibrillarum nervos componentium. Cum igitur liquidum hoc sit naturali quantitate majus, in majori etiam copia sive per externam, sive per internam superficiem, sive per utramque se innuabit, adeoque nervum laxabit, vel contrahet, adeoque vel secum feret appensum musculum, vel contrahentem contrahi permittet, & convulsio per repletionem fiet juxta Galeni modum. Neque hinc orietur paralytis, ut plurimum dubitant; permittetur enim interim intluxus liquidi per nervos, & sanguinis, & villi erunt adhuc minus laxi, nedum sphacelo corrupti, unde deinde, ac postremo paralytis, quæ convulsioni succedet, ut Hippocrates, & Galenus, & Petrus salius Diversus viderunt aliquando. Dolor similiter in his omnibus casibus poterit contingere, prout erit siccitas major, aut infarctus humidi copiosior, & magis divellens, ut patet. Neque est quod dubites, musculum oppositum per imperium voluntatis debere impedire contractionem nervi statim, ac animal animadvertit se in convulsionem venire, licet enim possit per assuetudinem in musculum contrahentem tanta copia liquidi derivari, ut sua vi superet quantumvis maximam vim contractionis in nervo : quia tamen illa contractio haberi non potest, quin nervus, qui contrahi supponitur, extendatur in longitudinem eodem tempore, quo contrahitur, seu sic brevior, inde necessario fieret, ut idem nervus à duabus oppositis partibus validè traheretur, nempe à vi musculi deorsum, à vi nervum contrahente sursum, unde vehementer divelleretur, & acerrimus excitaretur doloris sensus, quem sane vitare, quantum poterit, studebit Animal, & convelli potius, quam divelli cum tanto dolore nervum permittet. Ex his igitur patet, quàm apte de convulsione senserit Galenus ratione causæ ab evacuatione, vel repletionem pendens, si unicum excipias animadvertitione maximè dignum, nempe ntm per modos hæcenus expositos, licet haberi possit dimotio partium ab æquilibrio, & permansio earundem in aliquo situ post dimotionem, sit talis permansio cum tanta illa resistentia ad flexionem, quæ tanquam essentialis supponitur in convulsione, cum ossa in hoc morbo tam immobiliter ad articulationes hæreere debeant,



ut difficillimè, & vix valida adstantium opera dimoveri possint. Sed hoc alii viderint; quicquid enim ea de re sit, illud certè Galenus nimis jejune existimavit, convulsionem omnem non nisi à nervo prolicisci posse, & per unicum hunc ipsum modum siccitatis, & humiditatis. His igitur jam expositis, quot aliis de causis, & in quibus aliis instrumentis operari possit convulsionis causa exponamus. Frigus jam superius explanatum, ex quo vera convulsio, constans nempe contractio: in hoc tamen casu non est vera musculorum contractio, aut aliarum partium, sed vera partium immobilitas per congelationem humidi. Sit autem non naturalis calor in corpore, vel absumpto liquido per labores, curas, medicamenta &c. vel naturaliter cumulatus per vicius rationem, ætatem, anni tempus, regionem &c. non luc urgeo siccitatem, de qua superius agendum, sed illud animadverto, spiritus animales eo futuros vividiores, vel etiam simul copiosiores, unde impetus eorum major, & contractio musculorum perpetua per subitam irruptionem intra villos, antequam iidem prorsus restituantur, ut in Con. nate vigili exposuimus, critque convulsio ab impetu spirituum. Simili de causa poterit, ac debet produci convulsio à siccitate musculi ibidem exposita, si ejusdem musculi villi nimis exaruerint, & etiam si spiritus sint naturales, post aliquot flexiones, & restitutiones demum ab ultima contractione restitui non possunt. Quolibet ex his convulsionibus erit inanitio. Sit insuper sanguis ita viciatus, ut humores quoslibet producat acriores, licet naturalem copiam humidi contineat, spiritus tum similiter acriores producentur, tenuiores, mobiliores, impetus, & nifus majoris in emissaria nervorum intra villos, adeoque, ut mox expositum, in perpetua contractione eosdem detinebunt, unde alio de nomine convulsio. Contra vigeant in sanguine humores levi, crassi, frigidi, qualis pituita, & viscida qualibet; spiritus igitur crassiores, minorisque impetus producentur, adeoque facilius subsistent intra nervos, eosdemque proinde magis extrorsum urgebunt, & in contractionem aliquam deducunt, & saltem principium convulsionis per contractionem nervi parient. At verò deducti in musculos, sicut etiam sanguis crassior rarefcent quidem, aut se subito effundent quaquaversum cum impetu, sed propter crassitatem partium, ex quibus componuntur, aut continentur, non poterit universa earum moles extirpare per poros villorum, immò portio crassior intra eosdem villos subsistet, unde ex toto restitui non poterunt, & musculus in aliquo gradu contractionis persistet. Fiat jam secunda contractio per confluxum, & effusionem eorundem liquidorum; pars igitur subtilior expirabit, reliquum crassius intra villos subsistet, unde minus, quam in prima contractione, restituentur, & persistet musculus in majori contractionis gradu, & repetitis pluribus contractionibus cum restitutione magis, ac magis semper imminuta fiet demum, ut nihil spiritus, & sanguinis possit ulterius influere, quo in casu erit musculus in contractione perfecta, quæ pendeat ab infartu humoris crassi intra musculos eò derivati per nervos, & arterias: & idem

infartus fieri poterit, non solum per successivas contractiones, ut expositum est, verum etiam si sint humores crassiores, & frigidiores absque spiritibus, vel si spiritus sint iisdem humoribus nimis implicati, & fixi, neque humores influant, & coacerventur intra villos absque ulla contractione antecedente, aut spirituum expansione. Hujus autem generis convulsio, si diutius protrahatur, facili poterit in paralyfim facessere dissoluto demum villo per coacervationem illius humoris, coque facilius, quod tanta humorum crassiorum colluvies erit etiam conjuncta cum infartu membranarum ab iisdem humoribus, unde facilitas in paralyfim major. Hæ convulsionibus erunt similiter repletiones, ut patet, atque in his salutare erunt supervenientes febres, dejectiones alui, urinæ &c. quæ in textibus Hippocratis proponuntur, sicut etiam exitialia, quæ inibi exposita sunt, & ultro ex his patent. Insuper sint spiritus, sit sanguis naturalis constitutionis, sed villi musculorum quacunque de causa callo, vulnere, pressione, mala conformatione, & hujusmodi sint duriores, ac densioris texture; illi igitur difficilius flecti poterunt, & difficilius expirare partes resolutæ per rarefactionem, unde intra villos colligentur, ac demum producent convulsionem irreparabilem, nisi tollatur illa durities, & densitas. & hæc erit similiter convulsio à repletionem finium à materia subsistente, & inanitione, aut repletionem membranarum à materia duritiem, & densitatem producente. Ulterius animadvertendum est, ne quod convulsionem aliquando existimamus, sit quidem tale quiddam, quatenus conjunctum est cum constanti, & valida immobilitate partis, non tamen vera convulsio, sed paralyfis oppositi musculi, quo non contrahente musculus alter in suam contractionem veniat, partesque in perpetua immobilitate detineat, vel quia tam frequenter contrahatur, ut vices ipsius sensu percipi non possint, vel quia re vera in perpetua contractione persistat. Frequentius autem contrahi, vel in perpetua contractione persistere poterit etiam naturaliter se habentibus reliquis omnibus, si paralyfis musculi contrahentis pendeat ab obstructione nervi in ipsum abeuntis, ita ut universum ipsius liquidum in musculum oppositum deriveatur, tunc enim aucta quantitas majoris erit nifus ad emissarium, & influet in musculum, antequam restituatur, unde ipsius perpetua contractio. Quoniam autem hæc singula contingant oportet sine læsione sensuum internorum, & externorum; neque enim habent hæc quicquam necessariæ connexionis cum qualibet offensione cerebri, hinc in vera convulsione nulla sensuum, & mentis læsio. Cum vero vasis sanguinis magis infartus oporteat, ut arteriæ cerebri magis infarciantur, & cerebrum proinde magis prematur, dari poterit convulsio præcipue ab infartu, quæ promoveatur à pressione cerebri, quatenus per hanc truditur in musculos copia major crassiorum spirituum infarciendum eorum sinus. In hoc autem genere convulsionum vix fieri poterit, ut non adsit quædam minor vividitas in sensibus, motibus, & mente, & veluti quidam torpor, aut corporis rudimentum, ut ex doctrina motuum, & sensuum patet. Pro diversitate autem convulsionum, & solutione.



tionum in humoribus, qui in eadem convulsione contingunt, & motu materie ex nervis, & musculis in vasa sanguinis, vel ex his in eas partes, vel ejusdem quiete in utrisque, aut alterutris fiunt mutationes colorum, calores, refrigerationes, urinae laudabiles, crudæ, suppressæ, detentæ, nullæ, paucæ &c. cum aliis superius propositis, quæ explicatu facillima sunt. Nemo est, qui spasmus physodem in se ipso non sit expertus: nos enim singuli, si diutius crura exempli gratia in situ aliquo minus apto, ac naturali immobilia detineantur, moveri minimè possumus, cum mox necessitas, aut voluntas exigit, ut moveamur, ac tum facile ad motus potentiam reducimur, si pes validè solo illidatur, quod dum fit, per cruris longitudinem excutere quiddam sentimus frigidum, immò frigidissimum aliquando, atque per tenuissimum quasi filum dilabens quasi rependo, aliquando quid simile calidiusculum, aut calidius, aliquando modo frigidum, mox calidum, & e converso. Quoniam itaque canales sanguinis, & nervorum apte patent, cum in naturali positu detinentur, partibus igitur non naturaliter complicatis, superimpositis, detortè nimis inflexis, & hujusmodi, iidem canales aut penitus, aut ex parte occluduntur, unde in musculos liquida non derivabuntur, sed subsistent ad locum occlusionis, ubi magis trudendo extrorsum canalibus latera validiorem occlusionem reddent, & quo diutius persistet pars in eo naturali positu, eo major fiet occlusio, ac validior, & depositio copiosior. Partes itaque suis humoribus destituta in torporem, aut stuporem veniunt, non autem in convulsionem, qui stupor tollitur derivando liquida ad partes, hoc est, discludendo canales. Cum igitur hi validius occlusi supponantur, discludi non poterunt, nisi vis aliqua major adhibeatur, utque disclulis quæ subsisterant deorsum tuerent, & prout plus minus subsisterent, & plus minus refrigerata fuerant, & prout partes frigidiore, aut tepidiore primo excutunt, excitabitur sensus frigoris, caloris, aut utriusque per vices quasi intus per crurum repentis, unde adacto violentius in terram pede, conciliari tantum in petus poterit liquidis subsistentibus, ut ipsa possint concepto impetu superare resistentiam occlusionis, adeoque canales discludere, & per eos se se agere, & sensum caloris, aut frigoris, aut utriusque per vices parere: sic liquida in angustissimis canaliculis subsistentia sola eorundem canaliculorum succusione valida in fluxum agimus, & ad usque emulsiaria eorundem perducimus. Et sanè spasmum physodem non esse convulsionem, vel ex hoc ipso patet, quod pedem movere, immò validius solo allidere possumus ad arbitrium, quod convulsioni repugnat. Quia vero arteriæ impetu instructæ sunt, adeoque difficilior premii ad usque occlusionem poterunt à distortionem partium, nervi autem ex molli substantia, & nullius impetus facile comprimuntur; in his igitur pressione excipi verosimilius videtur, unde hilem disclulis tenuis ille quasi per filum excursus rei frigidæ, vel calidæ per longitudinem cruris respondens excitati nervorum. Torpor igitur, & stupor est spasmus physodes non convulsio, & inane commentum est status, à quo flatulenta convulsio hic spasmus dicitur.

Postremò quoniam vulnus, contusio, præcisio nervi, inflammatio, & si quæ sunt hujusmodi convulsionem producentia, cum dolore etiam necessariò conjuncta sunt, dolor autem est stimulus quidam, & quidem vehemens, per stimulos verò fit refluxus vividus, & celer, adeoque copiosus liquidi per nervos, ex copia autem perpetua contractio; ab iis igitur singulis proveniens convulsio fieri necessariò debet ratione solius stimuli: inflammatio autem illud insuper habebit adjunctum, calorem nempe vividum, quæ proinde si proxima sit nervo, vel ad contactum ejus, vel in ipso (ut in præcisione ex Hippocrate) calefaciet spiritus refluentes, eosque magis mobiles, ac citius influentes reddet, atque insuper absumet humidum, unde saltem nervum exsiccabit, & producet convulsio gravior a stimulo, calore spirituum, & siccitate nervorum simul proveniens. Hoc ipsum de punctione nervi dicendum esse patet. Quæ sunt summa, & præcipua capita causarum convulsionem producentium, ex quibus locorum omnium Hippocratis facillima explicatio patet, atque insuper patet, convulsionem dari posse, quæ à pluribus ex his causis simul pendeant, easque esse graviore, periculosiores, & magis contumaces. Est itaque convulsio constans immobilitas partium salva mente, & sensibus à calore, frigore, &c. proveniens, quæ licet spiritus, nervos, aut musculos calefaciat, infarciat, stimulet &c. cum iis omnibus, quæ superius exposuimus. Quæ si contingat in musculis collum, caput, & crura, & brachia ad anteriora moventibus, & flectentibus, ita ut animal cogatur ad anteriora se ipsum intorquere capite ad pectus delato, & cruribus eorsum adductis, quales dormientes canes, aut feles, dicitur Emprostotonos: si verò in musculis retrorsum easdem partes moventibus, Opisthotonos: si in utrisque Tetanos, in quo neutram in partem movere se potest animal, quasi rigidum esset, atque ex solido & unco osse: qui sane Tetanus etiam produci potest singulis de causis superius expositis, non tamen omittendum est, oriri etiam posse à validiore compressione, & æquabili per totum cerebrum, ac spinalem medullam diffusa, qua fiat, ut in nervos omnes liquidum naturali quantitate majus, sed ipsi proportionem respondens derivetur, unde majori nisu urgeat emulsiaria, & prius influat, quam villi restituantur, unde contractio perpetua. Hoc ipsum accidere poterit si spiritus generentur natura vividiores, & juxta naturæ leges per omnes nervos effundantur. Atque ita quidem nuncupantur convulsionem magis universales, & ipsa corpus universum affligens Tetanus, sed & particulares aliquot suis nominibus distinguuntur. In musculis oculorum motoribus Strabismus: mandibularum, & temporum Trismus: labiorum ad alterutrum solum partem spasmus cynicus, convulsio canina, & oris tortura: ad utramque partem ritus Sardonicus: musculorum penis satyriasis, vel priapismus. Nec aliæ sunt in usu appellationes, quibus aliorum musculorum particulares convulsionem, seu perpetuæ contractionem, & immobilitates in singulis partibus exprimantur.

Quoniam vero motus convulsivus nihil aliud est, quàm involuntaria musculorum contractio:



animò verò quæ ne per voluntatem quidem cohiberi possit, & est non rarò sine mentis, & sensuum læsione; in his igitur affectionibus motus convulsivi cum vera convulsione convenient, & propterea, nisi obliet aliquid aliud ab iisdem causis, à quibus vera convulsio, provenient. Cum verò convulsio à convulsivis motibus in eo differat, quod illa perpetua, & nunquam cessans musculorum contractio est, hi verò contractiones alternæ, patet, convulsivos motus ab iisdem convulsione causis debere proficisci hoc solum discrimine, quod in convulsione causa sit constans, & nunquam ab effectu desistens, in convulsivis autem motibus ab effectu desistens, alternæ, seu vigens, & operans solum per vices: nec captu, aut explicatu difficile est, quomodo hæc alternatio haberi possit, cum affluxus materiz, vel ejusdem expulsiō alterna esse possit per majora, aut minora temporis intervalla, prout illa est magis copiosa, aut minus crassa, tenuis, villi fortiores &c. Non igitur motus convulsivi semper à stimulo, humoribus nempe acerbis vellicantibus, & hujusmodi, sed etiam ab humoribus frigidis, torpidis, crassis &c. per intervalla in instrumenta motuum decumbentibus, ac tum quidem salva esse poterit mentis, & sensuum vis, nisi humores ejusmodi quacunque de causa à cerebro proveniant. Quia tamen plerumque in his motibus illa læditur, frequentior causa motuum convulsivorum erit, quæ sensus, & mentem lædere potest. Læduntur autem hæc facultates vel in stuporem, vel in actus vividiores redactæ: stupor à valida pressione cerebri, crassitie spirituum, humefactione partium, nempe ab humoribus frigidis, & crassis: actus vividiores à spiritibus mobilioribus, solutis, incerti motus, quaquaversum divagantibus, incerto, & majori cum impetu, nempe ab humoribus acerbis, calidis, vellicantibus, stimulantibus. Utraque hæc, tam frigida scilicet, quam calida vel sunt intra nervos, vel exterius eosdem tangunt, & perinde se res habebit, quomodocunque sit, nisi quod calida, & vellicantia ad nervos extrinsece perducta mentem turbant in refluxum agendo spiritus cæteroquin naturales, & Animal in motus convulsivos venit partim necessitate refluxus ex stimulo, partim voluntate, & visu molestum illud stimulans expellendi. Cum verò eadem sunt intra nervos, ex se ipsis per copiam, vel impetum etiam absque refluxu, & voluntate animalis, immo etiam ipso repugante, & nihil stimuli percipiente motus convulsivos producent. Ex quibus patet, nec bene communiter asseri motus convulsivos semper à stimulo pendere, primò cum dentur per frigidam, & hebetissimam: secundò cum motus convulsivi etiam violentissimi dari possint, ac debeant absque sensu vellicationis: ac demum quoniam hæc ipsa vellicatio habere potest originem ab iisdem spiritibus, non verò ab aliquo extrinsece stimulante, quod unicum communiter supponitur, cum tamen ab ipso non tanquam ab unica causa pendeant convulsivi motus, sed per extrinsecum illud stimulans sit singularis quidam, ac certus modus eosdem producendi. Ex his autem omnibus patet, cur inter præcedentia aut convulsione, aut motuum convulsivorum sit pulsus chordosus, seu jectigatio, qui

sanè pulsus non est, ut Galenus asserit, tenuio quidam, ac vibratio propter viciniam nervi mox in convulsione venturi, quasi ipsius tensio, & vibratio etiam arteriz ad contactum positæ communicetur, sed ut patet ejusmodi pulsus observantibus, in uno digiti loco percipitur pulsus, in alio satis remoto jectigatio, quæ manifestè dignoscitur, ut motus convulsivus debilior, seu convulsione incertum: qui sanè motus satis erit periculosus, nisi indicet convulsione, aut motum convulsivum musculi solum circa carpum casu aliquo contingere; secus enim erit indicio, musculos omnes convulsione corripiendos, vel motibus convulsivis tentandos. Reliqua ex Hippocrate proposita ex nostra hac convulsione expositione abundè patent, nisi quod quæ desiderari possent ad singultum pertinentia, repetenda sunt ex propositione decima secunde partis nostræ Respirationis, in qua singultus distinctè explicatur, & ipsum esse motum convulsivum musculi succingentis ventriculum, ostendimus.

Datur ulterius quædam motuum convulsivorum species in universo corpore & in morbis, & in statu sanitatis, quæ nihil aliud sunt, quam leviores, aut graviores musculorum omnium concussioniones, vel eorundem rarior, frequentior, debilior, validior tremor. Hæc in febribus præcipue intermittentibus ad earum potissimum paroxysmos contingunt, sicut etiam ad quodlibet frigus intensius, aliisque diversis, ut inferius, & nomine horrois, (qui idem etiam horripilatio dicitur Apuleio) vel rigoris veniunt, & horror minus vehemens tremor est, rigor autem concussio major. Quia vero etsi apud Medicos multa super his verba infarciuntur, nemo tamen est, qui rationem, ac necessarium earum concussionum modum explicet, & res est cæteroqui momenti maximi, & secum habet conjuncta mille sanè prodigiosa, seorsim de his agemus aliquantò distinctius; ut res ex sua necessitate plane pateat, de frigore præiis aliqua explicantes, quæ ad eosdem motus pertinent.

#### *Horror, & Rigor.*

Prodigiosa sanè videri possunt quæ in horrore, & rigore contingunt; motus enim ejusmodi excitantur in miculis à sensu rei impensè frigida; sed e contra eadem concussioniones cum sensu frigoris excitantur non rarò per speciem rei nihil cum frigore communione habentis. Sic in febribus cum frigore paroxysmi, & perfrigeratione corporis conjungitur concussio cum sensu frigoris intensi, ac molesti, in quibus tamen non rarò concussio præcedit summum gradum frigoris, ad quem semel provehitur. Sic affusa frigida præcipue nihil tale expectantibus sensum quandam frigoris per varias partes vagum cum majori, aut minori corporis totius, aut earundem partium concussione producit, sed hanc ipsam cum eodem sensu vagantis refrigerit, immò rigoris excitant immatura qualibet, dum manduntur, præcipue verò magis stiptica, & austera, sorba, mespila, pruna sylvestria, acria etiam, & quæ stuporem dentium producant. Ac tam assuio frigida, quam horum sapor sensum illum, & concussione movent in puncto



puncto te igitur, & pariter in puncto temporis producitur similis sensus, similisque concussio sæpiſſime, postquam urinam reddidiſſus, imò etiam cum illa exitu tentans vi ſupprimatur, neque eſſuere permittitur, ut utroque enim caſu, & in primo quidem ad foramen ſummi penis extra corpus patens poſt nictum percipitur quidam acer ſtimulus, poſt quem ſubito corpus totum concutitur cum ſubito rigoris ſenſu per ipſum: in ſecundo verò idem acer ſtimulus percipitur ad radicem penis, poſt quem ſtatim affectiones eadem corripunt. Sed illud etiam magis admirabile audit ſono aris, vel orichalchi, quem edunt, dum torno poliuntur, & ſub ſcalpro acute trident, vel duorum quorumlibet metallicorum, quorum alterum in aciem delinens ad alterius ſuperficiem valide, & celerrime agitatum ſit, ſtupent dentes non minus, quàm cum immatura illa manduntur, & ſuccedit concuſſio ſimilis cum perceptione rigoris. Hæc autem ut in puncto temporis producantur, ſic brevifſimo temporis ſpatio perſiſtunt, & ex ſe ipſis evaneſcunt. Denique nemini ignotum, per frigus vehementius hyemis, nivis, aut glaciei tremere unumquemque noſtrum, & valide, ac diu concuti, quouſque urget frigoris vis. Et minus admirabilis videri poſſet concuſſio à frigore hyemis, & ſenſus acrioris frigoris, quo tempore concutimur, ſicut eadem in febrim paroxiſmis, ſunt enim illa paulatim, ac per longum tempus protrahuntur, quaſi ſenſim vincatur calor corporis, ac demum ex toto ſuperetur: at paulum frigidaſſi affuſum cuti vigente motu ſanguinis calore vivido vividum ſenſum frigoris producere cum concuſſione per corpus, atque illud in puncto temporis, quàm difficile captum eſt? Sed quanto difficilius à ſaporibus in puncto ſimiliter temporis in ipſo vegeto caloris ſtatu eadem excitari, quàm admirabile à ſonnis, quàm incredibile ab excluſione, vel ſuppreſſione urinarum! Neque enim admirationem movet ſolum ſubita excitatio, aut ſenſus frigoris à minimè frigidis, in toto Coelo à frigore diverſis, ut ſoni, ut ſapores, ut urina ſunt, ſed quod præſente calore, neque præſente ſolum, ſed incurrente in nervos, ſed nitente in eodem, & nitente, quanto majori impetu poteſt, exciterur ille ſenſus, atque illa concuſſio, quo tempore nervi tremere debere viderentur tremore calidi urgentis, cum tamen res contraria planè ratione contingat, & ſenſus frigoris in medio calore percipitur. Et ſanè nemo rem prodigio ſimilem ſatis admirabitur. Itaque ut rei ſingularis cauſa, quantum per nos licet, neceſſariè deducatur, ad fluxum, & refluxum liquidi intra nervos confugiendum eſt, ex quibus pendunt hæc omnia, & ad quaſdam certiffimas affectiones à natura frigoris provenientes. Hinc igitur exordiamur oportet. Frigore conſtringi quàm liquida, quàm ſolida noſtri corporis, ſatis cuique notum eſt, & nos ſuperius convuſionem à frigore deduximus per coagulationem liquidorum, & rigorem villorum, & ulterius res confirmari ex eo poteſt, quòd diutius glacie, aut nive tractata intumeſcit manus, & vividè caleſcit non ſine ſenſu doloris extendentis: rubet primò, inde liveſcit, argumento certiffimo, vi frigoris conſtrictas venas, atque inde probiberi refluxum ſanguinis, qui cum coagula-

ri non poſſit propter continuum affluxum novi ſanguinis ex arteriis, partes calidaſſe impetunt, & cohiberi intra gelu nequeunt, neque ſubito expirare per denſitatem pellum, & ſummæ cruſtæ ſanguinis prope cutem, unde calor cum dolore extendente, tumor, rubor, ac livor, poſtquam plurimum ſanguinis confluxit. Ex quo ſacto vides inſuper, rei ſuperius propoſitæ diſcultatem augeri, cum in hoc caſu non ſolum in medio calore non excitetur frigoris ſenſus, ſed e contra in medio, & intenſo frigore præſente, ſed quaſi immobili ſanguine calor inſignis percipitur. Eſto igitur frigus quodlibet, atque illud intenſius ad aliquem nervum ſive per hyemem, ſive per viciniam nivis aut glaciei, ſive per affuſionem frigidaſſæ, ſive per vim febris corripientis; contrahetur igitur ille nervus, fietque durior, ac demor, tenuis, & craſſior. Erit igitur velut unexilis, & undis concipiendis à quolibet impetu ineptus, unde ſi vis frigoris ſit tanta, ut major ſit ſenſio, ac durities ab eadem in nervo proveniens, quamvis à quantolibet circumpoſito, & quantumvis in nervum nitente calido, nullus caloris ſenſus, ſed frigoris, & quidem ſubitus, & cuſcuſque gradus producentur. Admirabile dictu prima fronte, ſed ſi ad deliria reſpicias, ad profundas meditationes, ad aberrationes mentis, in quibus eſſi mille vividiffima ſenſibus, atque animo obverſantur, quia tamen nervi velut obdurnerunt in unicam flexionem delirii, & meditationis profundaſſæ, &c. Nervi inſecti à nullis aliis ſpeciebus poſſunt, ſed per lubricum ſingulaſſe qualibet dilabuntur ad ulque flexionem permanentem, & nihil eſt, quod non idem videatur deliro cogitanti, &c. Cum igitur hoc ipſum contingere debeat in quocunque caſu fiat, ut nervus vel unico, ſed vividiffimo tremore tremat, vel nullo tremore tremere poſſit; ſi igitur ſupponatur nervus vel unico frigoris, eoque vividiffimo tremore tremere, ſi frigus velis poſitivum quid, vel nullo tremat, & nullo tremere poſſit, ſi ſenſum frigoris privationem tremoris velis, manifeſtum eſt, calorem ſentiri non poſſe, etiam ſi idem calor nervum ita atficiat, quoties euſdem nervi conſtrictio à frigore proveniens nervum reddit inſexilem. ſupponatur itaq; intentum illud frigus ad ſummum aliquem digitum; ibi igitur fiet conſtrictio valida nervi, adeoq; introrſum movebitur cum impetu, & contentum liquidu extrudet ſurſum deorſum, ſeu in refluxum ager quaquaverſum, unde excitabitur ſenſus frigoris in ſummo digito, atque ad eandem partem etiam liquidum nervorum evadet aliquanto craſſius, conſtrictum ſimiliter à frigore, ſed propter motum refluxus coagulari planè non poterit: ſemiconcreta tamen pars frigus ſuum communicabit proximæ, atque ita deinceps ex ordine, ſicut etiam prima pars nervi frigidaſſa reddet ſuccedentem, eoque facilius, quod liquidum contentum in ſuccedenti frigidaſſum eſt, & ſemiconcreſcit, & id ipſum fiet in omnibus ex ordine ſuccedentibus partibus nervi per totam longitudinem ejus ad uſque cerebrum, adeoque ad ſingulas nervi ſectiones orietur tremor novi, ac ſuccedentis frigoris per totam nervi longitudinem, ſeu ſingulas ejus ex ordine ſuccedentes partes, quas cum per aſſuetudinem benè diſtinguere noverimus, nempe quæ ſint prima, quæ media, quæ ſumma, atque inter



has comprehendit quilibet, & successive ad earum singulas novus, & successivus frigoris tremor producat, pronuntiabimus, atque ita sane se res habebit, frigus per totam partem, aut nervi longitudinem ascendere ad usque caput aquæ frigidae allabentis, vel auræ frigidioris ascendentis instar, quæ etiam huc illuc divagabitur, prout major ille nervus, huc illuc ad partes varias sese diffundit. Quia verò hæc tremorum successio fit tantum non in puncto temporis, in puncto pariter temporis sensus ille continget. Postquam autem nervus totus contractus fuerit ad usque cerebrum, vis frigoris sese exeret ulterius per cerebrum ipsum, ac spiritus in ipso contentos, unde cerebrum totum constringetur, & spiritus, seu potius lymphæ eorum vehiculum crassescet: & quia inter spiritus per nervum frigore affectum refluent in cerebrum toto impetu constrictio nervi, & cerebrum ipsum pariter contractus est, nempe validius nititur in spiritus; tam igitur spiritus refluentes, quam effluxuri è cerebro à duabus velut oppositis facultatibus prementur valide, adeoque nulla lege huc illuc derivabuntur in nervos reliquos universi corporis, per quod providè totum excitabunt intensi frigoris sensum, & nullo ordine musculos contrahent, & cum liquidum nervorum factum sit crassius; igitur ex ipso pauciores exprimentur spiritus, unde musculorum motus, aut visus debiliores quidem, sed in impeditis à motu frequentioris visus, in non impeditis frequentioris contractionis propter vim validam, qua a cerebro exprimentur. Quia insuper etiam cerebrum tenium est, nec nisi tremore frigoris tremere valens; per eum igitur diffluxum spirituum perturbatum nulla species excitabitur apta moderandis motibus musculorum, aut sistendis: quare non movebuntur, ut fert necessitas illius derivationis, cum arbitrium, aut assuetudo non valeat novum impetum conciliare, vel alio divertere nervorum liquidum ipsis nervis rigentibus. Assero igitur, jam in hoc casu refluxuros spiritus, seu derivandos in musculos natura facilius mobiles, & quibus movendis sapius assuevimus, & qui sapius, ac facilius in usum veniunt, quod evidens est: in hos enim musculos abeuntes nervi patentiores sint oportet, & trahendis spiritibus ferè per quamcunque inclinationem dispositi, cum per mille differentes species eosdem moveamus, hoc est, per mille inclinationes liquidum derivemus, unde majorem copiam liquidi in dato tempore per ipsos, quam per reliquos trahemus, ex quo fit amplitudo immissarii major, seu major derivationis facilitas. Ex his autem assero secundò, fieri, ut Animal moveri debeat motu concussivo, seu tremulo musculorum, & in easdem semper partes, ad quas facilius est motus vel per naturam, vel per assuetudinem, & quia omnes assuescimus facile, ac subito iis motibus, qui natura sunt faciliores sunt antrosum, ac retrorsum, non ad latera; hinc alternè contrahendos illos præcipuè musculos, qui artus movent sursum, ac deorsum, non qui ad latera, multo minus qui circumagunt. Et primò quoniam universa moles femoris, & brachii nititur in suam articulationem, nempe introsum, seu versus centrum gravitatis totius corporis: ex

mechanicis igitur utraq; illæ partes iis motibus minus resistent, per quos ab eodem centro, vel linea directionis ejus minus remouentur, minus autem remouentur ab illa linea, cum antrosum, aut retrorsum ducuntur, quam cum extrosum ad latera, ut patet; illæ igitur partes in motum antrosum, ac retrorsum facilius natura veniunt, quam in motum extrosum, & ad latera. Itaque motus ille sursum, ac deorsum facilius tam in manu, quam in brachio. Non multum dispar ratio est de capite, ac spina, quarum utraq; quam difficile movetur per latera osium articulatione prohibente, quam facile antrosum, ac retrorsum. Maxilla interior & pondere, & assuetudine, & usu continuo, ac necessitate diductionis oris in cibo assumendo, in locutione, in respiratione deorsum, ac sursum agitur potius, quam per latera, quibus etiam adde articulationis modum hæc ipsa exigentem. Adde his, quod cum brachium, & semur possint quidem vi quacunque extrosum per latus agi, non tamen eadem resistent introsum, ne valde impingant in pectus, aut femur oppositum difficulter, & magna attentione moderandum illum impetum restitutionis, quod in perturbato refluxu spirituum, & nulla vigente specie regiminis in intenso frigore contingere non potest. Igitur si quidem ostenderimus, per ejusmodi derivationem non motum tonicum debere succedere, sed motum alternum etiam musculorum contranitentium, rem ex toto confecerimus. Quoniam igitur est refluxus perturbatus sine ullius speciei regimine; igitur non in apta ad motum tonicum, seu æqualem contranitentium quantitate in nervos musculorum contranitentium derivabitur, & derivatur alterne; igitur ille musculus contrahetur validius, in quem copia major liquidi derivatur, nec alter contranitens contrahetur, quousque ille restitutus sit, unde tremor: cum verò cerebri contractio perseveret eadem, postquam eadem derivatio semel, aut iterum, aut pluries peracta fuerit, efformabitur veluti quædam assuetudo, per quam semper eodem modo ducetur derivatio illa cæteroquin perturbata, & tremor idem persistet. Non tamen inde credas, nihil derivari etiam in musculos per latera moventes, imò derivari potest quantumvis copiosum, quod tamen tremorem antrosum, ac retrorsum non permutabit, sed aliquantum obliquum reddet. Quoniam enim & ejusmodi musculorum nervi patent, & diffluxus sit quaquaversum; etiam igitur in ipsos liquidum derivabitur, sed in minori quantitate, unde contrahentur muscoli, ut poterunt, trahendo ossa per latera: trahuntur autem interim validius antrosum, aut retrorsum; igitur idem os à duabus facultatibus non oppositis, sed ad rectum angulum per suas directiones concurrentibus trahitur eodem tempore, quare movebitur per lineam, quæ sit inter utranque directionem media, & directioni validioris facultatis magis proxima, nempe ad anteriora, aut posteriora aliquantum obliquè. Ita autem constituto cerebro, & nervis minor etiam quantitas spirituum ad cor derivabitur, unde pulsus ejus minor, vis sanguinis per arterias minor, adeoque lentus motus, sed & ad piam matrem per frigus cerebri quasi concrevit in tenuissimis filamentis



tis arteriolarum; igitur minor derivatio materię pro spiritibus, unde successive minor generatio, & pulsus cordis, & fluxus sanguinis magis lentus, adeoque non fiet intrusio novi sanguinis, qualis in manu tractata nive, vel inflammatione siltrophica, erysipelatode, vel phlogosi, sed dabitur quies sanguinis serē sine novo affluxu, & frigus ejusdem cum colore fusco, ut in contusionum, vel percussionum vibicibus, in quibus sanguis stagnans sine novi sanguinis affluxu livescit, nec caler. Cum autem decumbimus, ipse lecti contactus motum per latera multo difficiliorem reddit; superanda enim est ejus contactus resistentia per totam illam quamvis exiguam amplitudinem, per quam ad contactum lecti duceretur, ac reduceretur pars in tremore, cum ē contra sursum, ac deorsum non solum non sit eadem superanda, sed adjumento sit, ut vim majorem exerat ad alterutram partem propter eandem resistentiam, quemadmodum pulvis in tormentis bellicis vim maximam per emulsarium exerit ab obice resistentis fundi, ut patet. Ex his vides, cur per voluntatem silttere nequeamus hujusmodi concussionis, & facile patent quæ ad horrorem, ac rigorem febrium pertinent. Sed de his etiam suo loco speciatim. Si verò circa, vel intra musculi sita sit facultas aliqua quemlibet sensum excitare apta, quæ si non in tremorem agere nervos, saltem suo appulsu validius introrsum trahat nervum jam contentum per constrictionem à frigore, tum sensus frigoris fiet acrior cum quodam sensu, quem explicare nescimus, nisi per quid irritans, dolens, pungens, stimulus, vel quid simile: nervo autem magis introrsum actio derivatio in eundem musculum copiosior, & crebrior; tum igitur dabitur crebrior tremor, & vehementior & per frigus, & per quid irritans, quæ ad febres etiam faciunt.

Esto jam sive sapor, sive sonus, sive urina, seu quidvis aliud nervos non quidem contrahens, densans, aut crassiores, & duriores faciens, sed in tremorem tam vividum ipsos agens, ut caloris impetum eludant, & quasi dixerim, ipsum excutiant, erit jam hæc nervorum constitutio planè eadem, ac in delirantibus, & esset delirium planè, si per diuturnum tempus produceretur, & semper eadem conservaretur, & erit tremor ille compositus ex tremore soni acutè stridentis, vel saporis stiptici, vel cæterorum, & privatione tremoris à calore provenientis, seu conjunctus cum sensu frigoris, & fiet in puncto temporis, in puncto temporis evanescet, nisi tremor conservetur ab externa specie rursus impressa: erunt refluxus vividi, derivationes proinde perturbata &c. quæ superius. Non tamen pulsus parvus, nec debilis tremor, immò cum non contrahatur cerebrum, nec coaguletur liquidum, vis erit insignis, & pulsus validus, & cum species sit recens, & in motu consistat, non autem in inflexilitate, & duritie nervi, ut in frigore, erit locus aliquis assuetudini ad excitandas species vividiores, ut saltem nitantur cohibere vim concussionis: erunt proinde vagæ per corpus affectiones etiam caloris, & cessante externa specie, vel remittente ipsius impetu colligentur animi, & nitentur in motus validos clamando, sugiendo, saltando, in quæ simili-

ter venire poterimus per ipsam trementem speciem, cum in eos validiores motus venire allueverimus per species similium validiorum dolorem acerrimum inferentium, unde liquidum derivandum paratum, ac perveni inveniet viam, ut de facilitate superius dictum est. Quæ sanè comparata cum expositione concussionis per frigus rem totam profecto admiratione dignissimam satis perspicue demonstrant. Cur autem orichalchum sub torui lealpro acute stridens stupefaciat dentes, eadem ratio est, ac cur acida, stiptica, immatura eandem novam dentibus inferant, quæ non alia esse videtur, quam talis nervorum motio, ut fere divellantur, unde difficultas illa, & repugnantia ad excipiendam pressionem in dentibus quasi laxatis per laxationem membrane ipsos succingentis, vel quæcumque est alia necessitas ab hoc sanè non multum remota. Atque de his quidem hactenus. Sed & convulsivis moribus annumeratur.

#### Tremor.

Hujus nomine intelligunt Medici alternantem eorundem musculorum contrā utentium contractionem à debilitate proventientem, & luctantem, ajunt, pondus partis cum facultate, quæ ut debilis modo superat, modo superatur, res autem ita se habet. Quoniam nunc cum alternè contrahuntur, & cum sustinendum est pondus per temporis spatium longius, quam unica natura, lis contractio fert, oportet, ut multa, sed frequentissimæ contractiones repetantur, vel ut continue contrahatur musculus, per quantum temporis spatium requiritur, hoc est, ut continue per illud spatium temporis spiritus deriventur in musculos; igitur qui paucis spiritibus donantur, non solum apta ad frequentissimas, & multas contractiones, vel una producta per longum tempus quantitate spirituum destituentur, verum fieri poterit, prout magis, ac magis deficiunt spiritus, ut musculi contrahantur rarius, quam in naturali statu, unde elevabitur, ac demitteretur alternè pondus rarius, frequentius, prout major, aut minor copia spirituum viget, sen in usdem dabitur tremor crebrior, rarior. Hinc in senibus, in imbecillibus, nisi ipsius dissidentibus, qui nempe dubitant, num iis viribus polleant, quæ sufficiant sustinendo oneri, contingit tremor; per ejusmodi enim suspensionem jam excitatur tremoris species, immò verò ipsa suspicio vicens nihil aliud est, quam ipsa tremoris species jam excitata: hinc etiam validi in tremorem venimus, cum calicem vino nimis plenum tenere, & admove-re ori cogimur; statim enim dubitamus, num tanti sumus ad traducendum calicem absque eo, quod vinum desluat, cum opus sit contractione maxime æquabili, atque continua, ejusmodi autem dubium nihil aliud est, quam species tremoris, quæ actu vidente fiat tremor oportet. Et si quæ sunt hujusmodi ex dictis obvia, & non minus scitu, quam visu jucunda, quibus immorari non libet.

#### Curationes.

Curatio hujus affectus varia est pro varietate causarum, quæ ab inanitione fit, rarissime contingit,



tingit, & incurabilis est; ideo illius therapiz non immorandum. Authores humectantia omnis generis præscribunt & inunctiones ex oleis chymicis. Ea vero quæ sit ab irritatione, ab aliis morbis dependet, & illorum curationi subijcitur. Superest igitur ut convulsionis à repletione curationem proponamus, quæ cum à pituita & statû potissimum dependeat, ad illorum sublationem dirigenda est. Hæque primum à venæ sectione auspicanda, si sanguis abundet, & vires sint validæ. In qua tamen evacuatione satius est peccare in defectu, quam in excessu; cum illa causæ principali, quæ pituita est, contraria sit.

Post venæ sectionem, aut eâ omisâ, si conviciens non sit, purgatio instituenda est per pilulas, quæ satis potenter evacuent (habita tamen virum ratione) juxta formulas, in frigida cerebri intemperie descriptas. His vero adjungenda sunt castorei gr. iij.

Si pilulas fastidiat Ager, potionis, pulveris aut alterius medicamenti forma usurpari poterit, prout dicto capite habetur.

Post purgationem admoveantur cucurbitulæ cum scarificatione, si sanguis non fuerit detractus, alioqui siccat: primo quidem partibus remotioribus, postea affectæ parti vicinis. At si crura sint convulsa, natibus & lumbis applicentur: si brachia, collo, & scapulis. Hoc in omnibus observando, ut fluxio versus originem tetrahatur.

Vesicatorium etiam partibus affectæ oppositis utiliter admovebitur. Interim post primam purgationem, materia præparanda est apozemate descripto in curatione intemperiei frigide. Purgante quidem, si vires & reliqua consentiant: sin minus detractis purgantibus.

Finito Apozemate iterum pilulæ exhibendæ, castoreum illis, & omnibus purgantibus adjiciendo.

Si apozema tantum alterans usurpetur, per illius usum clysteres acres frequenter injiciendi, quales in soporosis affectibus fuerunt propoliti.

Fiant etiam inunctiones supra partem affectam linimento convenienti.

℞. Unguenti de althææ ℥vi. Ol. Terebinth. & chamæmeli ana ℥i. Ol. lavendulæ ℥iij. Ol. vulpini ℥ss. Styracis liquidæ ℥ij. Fiat linimentum, quo inungatur pars affecta, calidè frequenter, & spina dorsi. Vel

℞. Ol. anethini & chamæm. ana ℥j. Unguenti martiati. ℥ss. Ol. petrolei & de spica, ana ℥j. Spiritus vini ℥iij. Misce.

Maximè laudatur axungia anatis, in sequentem modum parata.

℞. Anserem pinguem deplumatum, & exenteratum, quem reple materia sequenti.

℞. Fol. Salvie majoranæ, & itæcad. ana. m. j. Gummi ammoniaci & bdellii, ana ℥j. Calami aromat. nucis moschat. macis, caryophyll. ana ℥ss. Contundantur in mortario, & malaxentur cum ol. Lumbricorum, postea includantur ventri anseris, qui benè consuatur, ne quid effluat, in veru assietur. Pinguedo extillans excipiat in vase aceto semipieno, eaque illinantur partes affectæ.

Efficacius operabitur, si usurpetur in sequentem modum.

℞. Pinguetudinis prædictæ ℥vi. Olear. ceræ, nucis moschat. & salviæ arte chymica extractorum, ana ℥ij. Misce, fiat linimentum.

Post inunctionem partes convulsæ contegantur pelle arietis adhuc calente: & cum retrixerit, si novarum non sit copia, recalescat Oleo anethino, aut simili valde calente.

Utiliter etiam parti convulsæ adhibentur pulmones vervecini calentes, tum etiam pulli columbini, catuli, galli, gallinæ per medium sectæ.

Pars etiam affecta in intima bovis aut vervecis aut majoris alius animalis, recens casorum immittitur & ibi tandiù detinetur, quoadiù animal calet.

Balnea ex decocto herbarum cephalicarum etiam conveniunt addita olei tertia parte, vel inunctis mox a balneo partibus convulsis.

Alii hoc Emplastrum commendant.

℞. Colophoniz ℥ij. Resinz, picis navalis, ana ℥j. Thuris, mastiches, cerulæ, ana ℥ss. Sanguinis draconis, salis communis, salis Ammoniaci, Terebinth. ana ℥ij. Ceræ novæ ℥ij. Vitrioli albi ℥ij. Matris perlarum ℥i. Lapidis magnetis ℥ss. Succini flavi. ℥ss. Ol. ovor. roi. ana ℥ij. Fiat secundum artem Emplastrum, quod alutæ inductum imponatur.

Præstantissima verò sunt balnea sulphurea, in diuturnis præcipuè convulsionibus. Conveniunt etiam balnea sicca seu vaporosa ex decocto Salviæ, rosmarin. itæcados, chamæp. origani & similibus cum vino albo lapidibus ignitis, aut scoris ferri ignitis infuso.

Optimum etiam est fovere occiput & cervicem aqua vitæ calente.

Peuotus sequens linimentum mirè prædicat, ad convulsionem brevi tempore dissolvendam.

℞. Ol. terebinth. ℥. ss. ol. caryophyll. gutt. vj. mucaginis bryoniæ q. s. ad consistentiam linimenti. Misce, unge locum affectum cum radice sui nervi.

Alii oleum seu spiritum salis cum oleo terebinthinæ ceræ, chamæmeli & similibus commixtum, membra convulsa citò restituere assentunt.

Linimentum sequens eximie est efficaciz.

℞. Butyri rancidi, & lardi veteris, ana quart. i. bdcilli, ammoniaci, ana ℥. j. myrrhæ, castorei. an. ℥. ij. stor. itæcad. & anthos, an. P. i. nucis moschat. & caryophyll. an. ℥. i. catum parvum exenteratum, excoriatum, & in frusta divisum. His inferciatur Anser, & consuatur, ac torreatur in veru. Præius qui illabit succus magis aqueus abijciatur; secundus vero pinguior, colligatur in vase aqueo semipieno, eoque illinantur partes convulsæ & tota dorsi spina.

Interdum verò dolor ita intolerabilis sentitur, ut ad eum prius cura dirigenda sit, illi igitur convenit sequens linimentum.

℞. Olei Violacei, lilior. & chamæmeli. an. ℥. i. ss. olei amygdalarum dulcium, mastiches, & rosac. an. ℥. Misce inungatur pars affecta. Si potentius agendum sit, paretur sequens Balneum.

℞. Rad. althææ, & liliorum, an. ℥ss. fol. malvæ, violariæ, origani, salviæ, absinthii, an. M. ij. sem. lini & fenugr. an. ℥ss. decoquantur



quantur pro balneo, in quo diu non immoretur æger. Sed dolore sedato confestim egrediatur; sufficiet autem partes convulsas tantum immergere.

Alii parant balneum ex oleo puro, & si æger sit dives, in eo decoquunt Vulpem unam, aut alteram.

Dum hæc fiunt, cerebri expurgationi incumbendum est, apoplegmatis & crassius, suis capitibus descriptis.

Tum etiam eadem pars roboranda est opiatâ cephalicâ, aqua apoplectica, theriacali, aut alia earundem virum.

Rondeletius de aqua sua hirundinum hæc habet. Aqua ex hirundinibus & castoreo parata, exhibita convulsionem à repletionem subito cessare facit. Ejus descriptio est in cap. de Epilepsia apud Authorem dictum.

*Lazar. River. Præcos Medic. libr. 1. p. 17.*

Quod spectat ad curationem, ejusmodi affectionum spasmodicarum, quæ in feminis, aut viris à causâ morifica nervorum origine obsidente, procedunt. Prima indicatio erit morbi fomitem lustrare, scilicet impedire, quominus sanguis particulas heterogeneas, aut in se genitas, aut aliunde a visceribus acceptas, capiti affigat. In hanc rem evacuatio & per catharam & per phlebotomiam nisi aliquid contra indicat, instituta, commodè adhiberi solet.

Vomitus sæpissimè juvamen præstat, quare emetica ex infusione croci metallorum, vel ex sale vitrioli aut vino scillitico ab initio propinentur. Deinde propediem sanguinis detractio aut phlebotomia in brachio, aut hirudinum suctu à venis sedalibus celebretur, dein postea lenis purgatio aut pilulis, aut apozeimate solutivo instituitur, & tempestivè repetatur.

℞. Pilul. è succino Cratonis vel Tartarearum Bontii ʒij. resin. Jalap. gr. xvi. Castorei ʒj. Olei rorismarini vel succini, ʒß. Gummi Ammoniaci solut. in aquâ hyssopæ q. s. f. Pilulæ 16. sumantur quatuor die quolibet sexto aut septimo.

℞. Rad. Polypodii qu. Lapathi acut. præp. Cherefolii ana ʒvi. Pzoniz maris ʒij. Fol. Betonicæ, chamædryos, chamæpityos, verbenæ, Veronicæ maris an. M. j. Sem. carthami, bardanæ an. ʒij. Coquantur in aquâ fontan. lb̄ iv. ad medietatem, adde vini albi lb̄ j. Coletur in matracium, cui imponatur folior. Sennæ opt. ʒj. Rhabbarbari ʒvi. Turbith. Gummosi ʒß. Epithymi, santal. citrini an. ʒij. Salis absinthii, cochleariz an. ʒj. Flavædinis cortic. Aurantii ʒij. Digerantur clausæ, in calore arenæ per horas 12. Colatura usui servetur: edulcoretur (si opus sit) cum s. q. Syrupi Angustani, vel è cichoreo cum Rhabbarbaro. Dosis ʒvi. Semel aut bis in hebdomada.

Singulis diebus quibus à purgatione vacat, remedia cerebrum corroborantia, quin & spiritus animales, à copula heterogenea suscipienda, aut ab explosionibus ineundis, vindicantia, exhibeantur. De quibus tamen juxta ægrotantis temperamentum, corporis habitum, & constitutionem delectus quidam instituitur: nam gracili corporis habitû, & sanguini fervidiori præditis medicamenta minus calida, quæque sanguinem haud supra modum exagi-

tent, propinari debent: è contra phlegmaticis, obesis, quorum urina tenuis & aquosa est, atque sanguis hebetius circulatur, visceraque inflantur; remedia calidiora, & humores intingenter fermentare apta delignentur. In priori casu ad hunc modum præscribatur.

℞. Conservæ flor. Betonicæ, Tamarisci, pzoniz maris an. ʒj. spec. diamargarit. frigid. ʒß. Pulv. rad. pzoniz, & seminis ejusdem ana. j. Coralli rubr. præpar. ʒi. Vitrioli Martis ʒij. Salis absinthii ʒij. cum s. q. Succu Aurantior. f. Electuar. Capiat bis vel ter in die, superbibendo haustulum Julapii infra præscripti.

℞. Coralli rubri cum Succo Aurantiorum in marmore, aut mortario vitreo triti, & exsiccati ʒß. Pulv. visci q. rad. pzoniz maris an. ʒij. sacchari perlat. ʒij. f. Pulvis Dosis ʒj. ad ʒß. bis vel ter in die.

℞. Specier. diamargarit. frigid. ʒij. Salis absinthii ʒij. Rad. Aronis pulv. ʒj. Misce, s. pulvis, dividatur in viginti partes, sumatur dosis manè & hora quarta.

℞. Pulv. rad. Petasitidos ʒj. dos. ʒß. ad ʒj. bis in die.

℞. Folior. bardanæ, ari an. M. vi. incisa, & simul mista destillentur. Dosis ʒij. ad ʒij. bis vel ter in die post dosim Electuarii, aut pulveris.

℞. Hujus aquæ destillatæ lb̄ ij. Chalybis nostri præparat. ʒij. Misce in phiala, sumantur eodem modo.

℞. Aq. Jugland. simplicis, Cerasorum nigr. an. lb̄ß. Limacum ʒvi. Syr. flor. Pzoniz maris ʒij. dos. ʒij. ad ʒj. eodem modo.

℞. Rasur. Eboris, C. Cervi an. ʒij. Rad. Cherefolij, bardanæ, valerianæ an. ʒß. Folior. Betonicæ, chamæpityos, scolopendrij, summantur. Tamarisci, an. M. j. corticum Tamarisci solani lignosi an. ʒß. Coquantur in aq. fontanæ lb̄ iv. ad tertiz partis consumptionem, adde vini albi ʒviii. Coletur in lagenam, cui imponatur folior. Beccabungæ, cardamines an. M. j. f. infusio tepida, & clausa per horas quatuor, colatura servetur in vitris occlusis. Dosis ʒvi. bis in die, post dosim medicamenti solidi. Interdum tali Apozeimate insundantur chalybis nostri ʒij. & sumantur eodem modo.

Tempore æstivo aquar. acidularum usus convenit: in earum defectu nostræ artificiales substituantur.

Quod si ob rationes supra citatas, medicamenta calidiora indicantur, juxta methodum sequentem procedere licebit.

℞. Conservæ anthos, Flavædinis aurantij, Limonij, an. ʒij. nucum Jugland. & Myrobalanor. condit. an. n. ij. Ligni Aloës, Santali citrini, rad. serpentariæ, contrayervæ, Angelicæ, ari an. ʒj. cum s. q. Condituræ nucum Juglandum f. Electuarium, sumatur bis in die q. Nucis moschat. superbibendo dosim liquoris appropriati.

℞. Rad. Pzoniz maris, Angelicæ, Coralli rubri præpar. an. ʒij. Sacchari solut. in aquâ limacum, & ad tabulatum cocti ʒvi. Olei succini rectificatissimi ʒß. S. a. f. Tabulæ, singulæ pendant circiter ʒß. una aut altera sumatur bis vel ter in die, superbibendo dosim liquoris appropriati.

℞. Rad. Serpentariæ Virginianæ, contrayervæ, Valerianæ an. ʒij. Coralli rubri præpar. Margarit. an. ʒj. Cort. Winteran. rad. dictamni



Critici an. ʒj. Vitrioli Martis, salis absinthii an. ʒi ʒ. Extract. Centaurij ʒij. Ammoniaci solut. in aq. hyssericæ q.s. f. massa pilularis. Sumantur quatuor pilulæ mane & hora quarta p.m.

℞. Spir. C. Cervi, aut fuliginis, vel sanguinis humani, vel salis Ammoniaci q. s. Sumantur gutt. 10. ad 12. mane, & vespere in cochleari Julapij, superbibendo haustulum ejusdem.

℞. Folior. Betonicæ, verbenæ, salviæ, cardaminæ, ari, bardanæ an. M.ij. Jugland. viridum n. 10. cortices 6. aurantium & quatuor Limonium, cardamom. cubebæ. an. ʒj. concisis; & contusis affunde seri lactis e pomaceo, aut vino albo facti lbvi. destillentur f. a. dosi ʒij. vel iij. bis in die post do. in medicamento solidi. Hujus lbij. adde Chalybis nostri ʒij.

℞. Aqu. Lumbrior. limicum an. ʒvi. Jugland. simplicis ʒiv. Raphani composit. ʒij. Sacchari albißimi ʒij. f. Julapium. Dosis cochlearia 4. vel 6. bis in die post do. in medicamento solidi.

℞. Millepedum mundator. lbj. Caryophyll. concis. ʒss. Superaffunde vini albi lbj. destillentur in cucurbita vitrea, dosi ʒij. bis in die.

Pauperioribus, per remedia facilius parabilia ad hunc modum consulatur.

℞. Conservæ folior. rutæ cum æq. p. Sacchari facitæ ʒvi. Sumatur quantitas nucis moschat. bis in die superbibendo decoct. sem. & rad. bardanæ in sero lactis cum vino albo parat.

Vel paretur conservæ ex foliis Arboris vitæ cum æquali parte sacchari, dosi ʒss. ad ʒj. bis in die.

℞. Pulveris Millepedum præpar. ʒij. Sem. ameos ʒj. f. pulvis, dividatur in 10. partes, sumatur dosi bis in die, vel aſciliis 12. contusis cum vino albo affuso, exprimatur succus, f. haustus, sumatur bis in die.

Interea dum hæc remedia intus sumuntur, convenit interdum vesicatoris in nucha, & pone aures applicatis ulcuscula excitare; ita namque serosi & acres humores à capite plurimum emulgentur: porro sternutatoria & apoplegmatisimi non raro juvamen insigne præstant. Sanguinis detractio e venis sedalibus aut e pede aliquoties iterari debet, quin & urgente affectu, Emplastra, vel Cataplasmata plantis pedum utiliter adhibentur. Juvat etiam circa suras & femora epispastica admove. *Thom. Willis. de morb. convuls. cap. 5.*

Spasmus, seu Contractio, & Convulsio, Celso Nervorum distensio dicitur; intelligiturque morbus ille quo membra, præsertim musculosa, & nervis referta, contracta simul, rigida, & immobilia observantur. Differt autem convulsio à depravatis illis moribus, qui plerumque Epilepsiam comitantur ut propterea *Epileptici* dici soleant, aliis *Spasmodici*, & *Convulsi*; quoniam in his dum membra retrahuntur, variè contorquentur, & concutiuntur; Quamobrem differunt à Tremore, in quo motus membri spontis suæ est, sitque semper uniformis sursum, deorsum; secus, qui motus convulsi dicuntur, sunt dispares, inæquales, inordinati, & varii.

Spasmus, alter Universalis, toti corpori contingens; alter Particularis, alicui tantum membro. Sub universali, comprehenduntur Tetanos, Emprothotonos, & Opisthotonos, in quibus scilicet corpus adeo arcte occupatur, ut

affecti haud possit. In Tetano autem æquali robore in utramque partem anteriorem, & posteriorem intenditur. In Emprothotono solum in anteriora curvatur. In Opisthotono demum ad posteriora tantum. Has omnes Convulsiones Celsus Rigores appellavit. Particularis adhuc multiplex est, pro partium contractarum diversitate. Unde Spasmus Cynicus, faciei: Strabismus, oculorum: Trismus, musculorum mandibularium: Risus sardonius, labiorum: Satyriasis, penis, Convulsiones appellantur. Huc reducitur spasmus ille, quem Græci *κράμπας* quædæ, & Itali *Cramsum* dicunt, vulgò Neapoli *Granco*, contingens plerumque tibis, earumque suris cum maximo dolore; cunque à flatibus oriri putetur, idcirco Medicorum plurimi *Flatulentium* illum nuncupant.

Creditum est Antiquis cujuscumque spasmi causam, vel ad Repletionem, vel ad Inanitionem pertinere, autoritate Hippocratis 6. *Aph.* 39. dicentis *Convulsio fit vel ex repletionem, vel ex inanitionem*: Cujus sententiam sequutus Galenus in *Comm.* tradit exemplum à chordis, lorisque petiit, quæ tum in humidiori, tum in sicciori aeris constitutione adducuntur, & contrahuntur. Quod etiam confirmat 5. *Aph.* 1. *Sicut enim, inquit, foris videmus lora, & chordas tendi, ubi vehementius exsiccantur, aut multa madent humiditate; sic & in corporibus animalium, par est fieri non raro convulsionem.* Quamquam hoc loco meminisse Galenus alterius causæ, quam ad vellicationem, & morsum oris ventriculi, nervis plurimis referti, retulit. Et 12. *meth. cap. ultim.* aliam causam addidit, videlicet intensum frigus, quale glaciæ.

At pluribus, hæc causas convellere nititur Thomas Erastus disput. de *Convulsione*; & suâ etiam oratione prosequitur Sennertus in *Institutionibus Medicis*, ubi omnes Veterum de hac re opiniones, refert, & exagitat. Ipse vero Erastus neque musculos, neque nervos convulsionis causam subire existimans, tandem concludit in hoc affectu cerebrum principaliter affici a re aliqua mordaci, & vellicante, modo nondum satis perspecto. Et Sennertus depravatos musculorum motus convulsivos dictos fieri quidem a vapore, vel humore tenui, seroso pravo, & maligno, nunc hujus, nunc illius nervi principia vellicante; Convulsionem vero ipsam, nonnisi ab humore in cerebri medullis nervorum origine pertinacius hærente, hancque continenter stimulante opinatur.

Quandoquidem inter plurima, quæ ob stare videntur Hippocratis doctrinæ, speciale illud asserti solet non commode distingui posse a Paralyti convulsionem, si ab humore replente, ac obstruente, hæc pariter oriretur; propterea Riverius huic se putans difficultati satisfacturum, inquit, Paralytim fieri ab humore pituitoso puro, & impetrato, qui partes potius relaxet, quàm distendat: Convulsionem verò, ab eodem humore, at pluribus flatibus confociato, à quibus nervi, & muscoli tendantur, ac versus suam originem contrahantur.

Paracelsus, & Helmontius peculiarem vitam masculis attribuunt, eo quod post mortem aliquis adhuc in ipsis motus remaneat, sicuti in caudis, & partibus insectorum reſectis experimur. Hinc convulsionem quamcumque putæ

Hel.



Helmontius ex naturali sensu, motuque eorumdem musculorum, etiam aliquandiu post interitum superstitie, procedere, concitato tamen illorum spiritu. Quamobrem de lithiasi c. 9. n. 118. concludit: omnem spasmum esse Blas vitale musculorum ex Archeo inuito suscitatum, cuius occasio est malignum aliquod irruens in Archeum, musculorum vita insidians. At verò Hermeticorum alii Mercurium sale acido imbutum, huius morbi causam assignant.

Musculorum cum Tendinibus inflationem, amplificationemque inductam a flatu, à spiritibus, vel ab humoribus, convulsionis causam existimat Gerardus Blasius in sua Therap. speciali.

Willisius licet partium nervosarum irritationes, leviores spasmos afferre posse concedat; graviorum tamen originem constituit, crebras, vehementesque explosiones spirituum, animalium à particulis diversis generis maxime activis, atque nitro sulphureis, potissimum è succo nerveo suggestitis, in nervos adjunctosque musculos; unde pari ratione id accidere arbitratur, ac ex accenso pyro pulvere in bellicis Machinis, eosque idem vehementer violenterque expandi, contrahi, & exagitari.

Denique Sylvius Leboë in ea persistit sententia, ut putet unicam convulsionis causam esse humorum acrimoniam, quæ membranaceas cerebri, cerebelli, & spinalis medullæ, nervorumque omnium partes ita vellicet, & malè afficiat, ut subindè consequatur impetus spirituum animalium in musculorum fibras, adeoque spasmus, seu convulsio. In cuius opinionis argumentum multa affert, quæ idipsum suadere videntur, sed potissimum historiam memorat Caroli IX. Galliarum Regis à Paræo relatam, atque alteram cuiusdam Chirurgi Amstelodamensis, qui ex punctis nervis convulsiones gravissimas passi sunt.

Illud autem animadvertendum occurrit, haudquaquam perpetuo cerebrum, cerebellum, spinam, & nervos affici oportere, ut membra convellantur; cum aliquando absque proxima cerebri, & nervorum læsione convulsiones accedant, ut accuratissime notat Helmontius, sed satis est si muscoli, illorumque fibræ carneæ afficiantur. Neque insuper cum nervi punguntur aut aliter læduntur, spiritus animales (quos fingere non est necesse) in vehementem, ac tumultuarium motum credendum concitari; cum hæc, & alia quæ his affectibus accidunt symptomata, à sola fibrarum contractione, & liquoris nervorum depravatione oriri possint; unde est ut nervi puncti convellantur, cæsi vero minime; quia ex punctione aliæ ab aliis fibræ inæqualiter flectuntur, retrahunturque; in cæsurâ verò æquè complicantur, laxantur, aut retorquentur.

Quæ ex Anatome hæcenus licuit observare, cerebrum, ejusque meninges, plexus, spinalem medullam, nervos, diaphragma, ventericulum, intestina, renes, ureteres, aliavè viscera affecta in hac ægritudine designantur, à sero acri, sanie, pure, abscessu, ulcere, inflammatione, veneno, vermibus, calculis, lotio diutius retento, lochiis suppressis cum placenta uterina, aliisque similibus; ut meritò existimet Helmontius omnem, & quancumque corporis partem sensu præditam, posse convulsiones subire, si nimirum à re vellicanti, & acri stimuletur. Sic pariter ab

usu Hellebori, aliisque cathartici, à frigore nimio, a caustico medicamento, a vulnere capiti inflictio, à punctura nervi, ab acuto odore, luxatione, subito terrore, vehementi animi passione, idem venenato, aliisque innumeris, convulsiones, motusque depravatos esse passim testantur historia.

Quamvis autem abstrusa nimis sit causæ huius investigatio, ut illam omnino desperaverit Averroës, nullo tamen planè negotio Morbus ipse cognoscitur, atque a cæteris distinguitur: etenim eo partes primùm irregulariter moventur, & contrahuntur; mox vero obrigescunt, & nec flecti, nec extendi possunt; dolor tamen plerumque illas excruciat: quare facile à Paralyti, seu Resolutione internoletur. Cæterum tetanus, emprosthotonus, & opisthotonus ex supradictis facile dignoscuntur; sicut etiam spasmus cynicus, strabismus, & reliqui, de quibus infra.

Periculosa est, & lethalis hæc affectio, coque magis, quo plures, vel omnes simul partes convellantur a cerebri vitio. Hippocrates 5. Aph. 1. Convulsionem ex helleboro lethalem esse scribit; sicut pariter ex vulnere text. 1. atque a sanguinis profluvio text. 3. & 7. Aph. 9. itemque ex nimia purgatione, atque ex ebrietate eodem 5. Aph. text. 4. & 5. & 7. Aph. 25. Similiter ab Ileo vomitus, singulus, convulsio, aut delirium, malum dicitur 7. Aph. 10. Malum quoque in fluxu muliebri, si convulsio, & anni defectus adveniat, 5. Aph. 56. Atque etiam si in acutis febribus convulsiones, & circa viscera dolores vehementes fiant, 4. Aph. 66. necnon ex somnis timores & convulsiones text. 67. Si præterea diuturnam vigiliam consequatur 7. Aph. 18. Et ætiam immodicum text. 13. In febre vero non intermittente. Si labrum, palpebra, vel supercilium, vel oculus, vel nasus perversatur, vel non videat, vel non audeat, seu debili existente corpore, mors proxima est. At de Testano speciatim adnotat, intra quatrimum interimere, post hoc tempus vero incolumes ægrotantes evadere 5. Aph. 6. & lib. de judicat. Mulieri autem utero gerenti, si Tetanus superveniat, facit abortum 7. Aph. 27. Convulsio demum, quæ phrenitidem sequitur, lethalis dicitur Actio text. 2. serm. 1. cap. 131.

At contra melius sperandum si convulsioni febris superveniat 2. Aph. 20. Nam qui à convulsione aut distensione nervorum tenetur, febre superveniente, liberatur 4. Aph. 57. A quareana capiti non admodum convulsionibus corripuntur 5. Aph. 70. Si vero prius capiantur, & quareana superveniat, liberantur. Et lib. de judicationibus in fine. A convulsione, aut distensione nervorum vexato, febris accedens, solvit morbum; & si à febre detentum convulsio corripiat, sedatur febris eadem die, aut postmodum, aut tertia die. In ulceribus autem, si tumores appareant, non admodum ægroti convellantur, neque insaniunt. Verum his repente evanescentibus, illis quidem, quibus à tergo convulsiones, & tetani sunt: quibus autem à fronte, insania, vel dolor lateris acutus, vel suppuratio, vel difficultas intestinorum, si tumores sunt rubicundi 5. Aph. 05.

Quæ adversus hunc morbum à Medicis commendantur, plurima sunt. Hippocrates lib. 3. de Morbis in Tetani medelam hæc commemorat: Cataplasma ex pipere, & verato nigro delevanda dato, & jusculum volucrum pingue calidum: i. danda



*enda sunt etiam multa sternutationes, & fomenta adhibenda; & partes dolentes calido oleo, & multo, & sapè illinantur.* In Opisthotono verò specialiter aquam frigidam plurimam superinfundi docet, contextis postea partibus vestimentis tenuibus, puris, & calidis: quod remedium etiam in Tetano convenire subdit; unde *Aph. 21. lib. 5.* scribit: *In Tetano si sit ulceratione, juvene bene carnosæ, astate media, frigida aqua multa perfusa calorem revocat: calor autem morbum solvit.* Insuper *lib. de Internis affectionibus in fine* Linimenta calida instituit, & ad sudorem patientis corpus disponendum monet; interea verò mulsam tepidam, & vinum album quam jucundissimum, multum bibendum esse.

Quoniam verò à plerisque putatur spasmus quilibet, vel à Repletionem vel ab Inanitione progigni; propterea quem ex Repletionem, & præsertim à crassis succis ortum credunt, evacuantibus, & attenuantibus medicamentis curandum aggrediuntur; at ex inanitione, per febrim ardentem, aut hæcticam, immodicas evacuationes, & similes; humectantibus impinguantibus & nutrientibus.

Ab his, qui convulsionem opinantur à pravo, & irritante humore excitari, Medicamenta ad illius remotionem correctionemque diriguntur. Et Sennertus quidem Idiopathicam convulsionem tollere conatur missione sanguinis, si is fortasse abundare videatur; Sin minus, cucurbitulis cum scarificatione, autoritate Æginetæ: mox purgante medicamento utitur, & clysteribus acrioribus; Tandem ad Topica devenit per lituras ex pinguedine animalium, oleo philosophorum, juniper. laur. rut. terebinth. lumbric. terrestr. Adhibet quoque balnea etiam vaporisera, & sulphurea. Interea tamen intrinsecus assumenda commendat castoreum cum mulsâ, vel ejusdem castorei essentiam in aqua salviæ, & aquam hiruudinum compositam, præter alia, quæ apud eundem legi possunt. In sympathica verò, si ex consensu ventriculi, neglecto vomitu à Galeno commendato, nisi ab æruginosa bile fiat, potius utitur pilulis per alvum subducentibus, aut clystere acri. Si ab utero, remedium eundem repurgantibus, memoratis à Galeno 6. *de loc. aff. cap. 5.* Si ab ictu venenato, Alexipharmacis. Si à vulnere, vel punctione nervorum, quibus phlegmone præcaveatur, & vulnus consolidatur, absterfa lanie, sedatoque dolore; & si opus sit, secto adhuc nervo, terebratoque crânio, si meninges malum invaserit. Si postremò fiat à flatibus, illos discutientia affectæ parti adhibet. Huic methodo inhæret quoque Gerardus Blasius.

Apud Paracelsum, & Helmontium nihil peculiare est, quod ad spasmi curationem pertineat; nisi quod oleum Terebinthinæ calidum commendant, cum ille vulnera consequitur. Verim Petrus Jo. Faber sententiam eandem sequutus, huic morbo occurrat, cathartico antum. deinde partem convulsam illinit essentia salviæ, oleo ceræ permixta, iterato etiam, si opus sit, eodem cathartico.

Sicut à Willisio varius fomes proponitur, unde convulsiones, & convulsivi motus oriuntur; ita in illius subtractionem plurima admittuntur, sed præcipue, Phlebotomia, cathartica, emetica, cæteraque in Epilepsia memo-

rata. Quoniam verò ad hos affectus revocat Hystericam, & scorbuticam affectionem, extremam saltationem à morfu (ut creditur) araneæ Tarentinæ, Choream S. Viti, aliasque egritudines; his quoque speciatim occurrere adnoscitur medicamentis antihystericis, & antiscorbuticis dictis, quæ fusè idem Auctor commemorat.

Postremò Sylvius Leboë pro varietate causarum, quas spasmus inferre posse suspicatur, variam quoque exhibet medendi rationem. Primum autem fusa oratione prosequitur historiam & curationem institutam à Paræo in Carolo IX. Galliarum Rege ex nervi punctione; mox huic medendum subdit oleo terebinthinæ calenti cum spiritu vini, Et si his nec dolor, nec convulsio desinat, omnino rescindendum esse nervum suadet. Ex contusione, & tractura Crânii, Terebræ usum adhortatur, superimposito deinde oleo Terebinthinæ cum spiritu vini. A combustionem, commendat oleum expressum è nucibus juglandibus, & seminibus Rapæ: itemque Cerulam, aut minium in aceto stillatio solutum, atque instar linimenti cum oleo redactum. Ab acrimonia demum humorum conferre existimat Thermas sulphureas, vel balnea arte parata ex sale tartari in calcem redacti, cum sulphure ritè permixto, & in congruenti quantitate aquæ diluto. Prodesse etiam putat olea, & axungias præsertim humanas, & anguillarum, quibus affectæ partes liniantur; necnon fomenta, emplastra, & cataplasmata ex herbis calefacientibus, sale volatili, & oleo abundantibus. Intrinsecus verò sudorifera sale etiam volatili prædita, maximèque spiritum Tartari cum aqua theriacali, aut vini spiritu purissimo permixtum; omittis acidis, quæ convulsis nocua omnino dicuntur.

Propria demum in his affectibus medicamenta recensentur, præter antiopileptica superius memorata, Plantæ omnes in aquis crescentes ex Petreio; præsertim autem Nymphaea, itemque Mandragora, Napellum, faba inversa; Æginetæ Acanthi radicem, & spinæ albæ semen magnificat. At præstat uti castoreo, ejusque essentia cum aqua salviæ. Thomas Willisius præter alia plurima, hæc facilius parabilia usu approbat; Nempte pulv. millep. præpar. 3 iij. & sem. anco 3 j. divid. in 10. partes; & binas exhibet in singulos dies.

Itemque *Afell. xii. contund. ac ex vim albo effuso exprim. succ. & f. haust. bis in die.*

Externè verò contulisse visa sunt olea, & linimenta ex adipe vulpis, catellorum, mustelæ; sicut etiam ex lumbricis, terebinthina, castoreo, galbano, ammoniaco, anetho, liliis. Horstius affirmat nervosas, & musculosas partes emplastro oxycroceo roborari. Et Davilloni laudat oleum Terebinthinæ, succini & ex lateribus elicium: ex quibus sequens linimentum componit Rollinchiuss spinæ admoventum. *Unguent. Martiat. 3 j. Aregon. 3 ij. ol. vulp. & terebinth. singul. 3 ss. stillat. succin. 3 j. rorismar. 3 ss.*

Apud Riverium in Observationibus communicatis testatur Pachequus hoc alio juvenem toto corpore convulsam statim expedite ambulasse, esseque remedium divinum; idque habet *butyr. rancid. & lard. veter. singul. quart. j. bdell.*



*bell. & ammoniac. singul. ʒj. myrrha, & Castor. singul. ʒij. flor. stachad. & anib. singul. p. j. nuc. myristica, & caryophyll. singul. ʒj. catum parvum exenteratum, excoriatum, & in frusta concisum. His infarcitur anser, & confutur, ac torreatur in vena. Primus qui desinet succum, abijciatur, secundum colligitur in vase aceto semipieno, quo liniatur spina cum partibus convulsis.*

Simile huic est aliud, quod describitur à Foresto. Anser pinguis evulceratur, atque in minutum incisus imponatur telis cum larido, myrrha, & thure confusus, inque veru torreatur, vase aceto pleno supposito; prima pinguedo destillans abijciatur, sed quæ paulo post extillat usui reservetur. Postea Anser bulliat in eodem aceto, & pinguedo supernatans separetur, & cum prima commisceatur, quæ convulsa membra inunguntur. Eâ Gazmarium quendam curasie refert, cui pedes convellebantur, neque dissimili successu in aliis usum. Addit insuper se vidisse quosdam à dolore liberatos solo balneo olei communis cum decocto vermium terrestrium.

Laudat & aliud Penotus; quod habet *ol. Terebinth. vel olei alb. bass. ʒss. ol. caryophyll. gutt. vi. mucilag. bryoniæ q. sat. ut fiat consistens linimentum. quo calido partes inunguntur.*

P. Bayrus in filio Ducis Sabaudiz usus aliquando fuit *ol. viol. decenter calido supra cervicem instillato.*

Quod si convulsio sit ex vulnere efficacissimum est oleum lavendulæ stillaticium, tam interne ad guttas aliquot, quam externe parti vulneratæ, vel nervo puncto adhibendum. Extollit etiam Mynsicht suum balsamum polycrystallum itemque b. s. m. m. & unguentum spasmatikum, si his membra affecta, & spina foveantur. At ex veneno, vel ictu venenato, refert Petrus mirrice illius vim intringere scabiosam ulsam cum vitello ovi, & pauxillo theriacæ mistam, & superpositam.

Convulsionem epilepticam à malignitate humorum creditas, curavit Riverius in puero decennali, promotò primùm vomitu, & alvi dejectione, mox vero exhibito oleo succini, & spiritu vitrioli singul. ad gutt. v. in aqua betonicæ; ac postremo portione alexipharmaca roborante cum bezoardico joviali. A cæteris causis inductas, remotione, correctioneque earundem, prudens Medicus pro re nata moderabitur.

Pro Coronikæ addendum Tincturam florum hyperici Tremori manuum, aliarumque corporis partium spectraliter conferre ex Francisco Deckers. Capitis Tremores in senibus curari scribit Borellus fimo Pavonis ad ʒj. in suff. quantitate aquæ vitæ soluto, & ter matutinis horis assumpto. Platerus singulare remedium habet electarium *Orvicanum* dictum. Testaturque Forestus sibi à fide digno Pharmacopæo communicatum esu cerebri Leporis asiati Aurificem quendam Bruxellensem à Tremore incolumem evasisse. Et Bayrus mirabiles prædicat has pilulas, in quibus sunt: *Castor. pyretbri. & cinnam. singul. ʒij. pulp. colocynth. & serap. singul. ʒiv. biera pica ʒv. hac liquore convenienti excepta rediguntur in massam. Dosis ʒj. vel ʒiv.*

Interea tamen vult assumi bolum ad magnitudinem nucis ex his pulveribus concinnatum,

singulo mane: certò enim convalescentium ægrum. inquit. *Myrobal. nigr. ʒviij. sab. ʒij. oliv. ʒiv. Cyper. cost. & calam. arom. singul. ʒiv. omnia in pulverem redacta cum passulis commisceat.*

Extrinsècus vero plurimum conferre monet idem Forestus lotionem sapius iteratam ex urina pueri, vel propria. Si ex Mercurio tremor accidat, salutare dicitur decoctum radicis enulæ epotum, & sulphur solare antimonii, vel cinnabaris ejusdem; externe vero unguentum pretiosum ex Auro Zacuti, atque aurum ipsum ex observatione Riverii, & Thom. Bartholini. Cæterum ad Tremorem ob languorem Nervorum, & succi nervei resolutionem commendatur essentia florum anthos, & ambræ griseæ, Aqua vitæ Matthioli, tinctura alchermes, oleum cinnamomi, spiritus formicarum, seu elixir magnanimitatis: atque externe oleum stillaticium ex baccis juniperi, essentia lavendulæ, oleum balsami, & balsamum rubicundum Mynsichti.

Quod autem dicitur, Tremoris causam esse improprietatem potentie moventis ad membrum motum, quod scilicet nequeat sustineri à debili virtute: non levem difficultatem patitur, cum compererim juvenes cæteroqui robustissimos in quibusdam motibus tremulas manus habere; & iratos toto corpore contremiscere. Quidam solius capitis tremore laborant, aut etiam solius manus dextræ, vel sinistræ. Unde crediderim affici potius in his nervorum fibras, & motrices musculorum, inæqualiter concitatas à vapore acido, vel acri ex sanguine, vel succo nerveo procedente, valde simili ei, qui provenit ex perturbato sanguine in subito timore, vel furore. Possunt etiam motrices fibræ musculorum inæqualiter concitari & adeò velociter, ut inter sese non congruant, nec motus unius alterius motui conveniat: Quæ ratione putarim tremorem exurgere in iratis, & violentioribus, ad eum ferme modum, quo lingua in his qui memoriâ aliquid recitant, titubare solet. *Lucas Toxat. Medic. Pract. lib. 1.*

#### In Spasmo & Convulsione.

ʒi. Bezoard. C. C. ʒss. Essent. vulner. ʒi. ss. Tinct. Castor. Croci ana gt. xii. Salm. ocul. canceri ʒj. Aq. centaur. Hyperic. ana ʒj. Misc. f. sudoriferum, seu.

ʒi. Bezoardic. C. & ungu. Alcis ʒi. Antimonii diaphoretic. ʒj. Sal. ocul. cancer. ʒss. Tinct. castor. Essent. succini ana. gt. xv. Vulnerar. ʒj. Aq. Lavendul. Centaur. ana. ʒj. Misc. f. sudoriferum.

Si malignæ associati sunt febri.

ʒi. Bezoardic. corn. cervi. Tinct. Bezoardic. ana ʒss. Sal. ocul. Cancer. ʒi. Extr. croci gr. iij. Rob. sambuci, Juniperi ana ʒj. Aq. Alexipharmac. ʒij. Misc. f. sudoriferum.

ʒi. Bezoardici Viperini ʒj. Extr. gentian. Angelic. Zedoariz ana ʒss. Tinct. Castor. Essent. succin. ana gt. xv. Aq. Alexipharmac. ʒij. Misc. f. sudoriferum.

Convulsione ex canis rabidi, aliorumque venenatorum animalium morsu orta.

ʒi. Bezoardic. Viperin. ʒj. Tinct. Bezoardicæ ʒi. ss. Lap. Bezoar. ʒss. Rob. Juniperi ʒij. Aq. alexipharmac. ʒij. Misc. f. sudoriferum.



## In India.

℞. Bezoardic. corn. Rhinocerot. Corn. Al-  
cis ana ʒʒ. Tinct. Bezoartic. ʒij. Sal. Volatil.  
oleosi Zerumbeth ʒ. Rob. Sambuci Indic. ʒj.  
Aq. camphor. Zerumbeth ana ʒj. Misc. f. fu-  
doriferum. Aur.

℞. Bezoardic C. C. Viperin. ana ʒʒ. Ess. li-  
gni colubrin. gr. xxi. Sal. Volatil. Zerumbeth  
ʒʒ. Rob. Sambuci Indic. ʒj. Aq. Zedoariz,  
Rad. cinnam. sylv. ana ʒi. Misc. f. sudorife-  
rum sive.

℞. Theriac. Ceylonic. ʒij. Aq. Zerumbeth.  
Camphoræ ana ʒi. Misc. f. sudoriferum.

Si in Hysterica passione membra convellun-  
tur.

℞. Bezoardic. C. C. C. Aleis ana ʒʒ. Tinct.  
castor. ʒʒ. Solutionis asæ fetida, galbani ana  
gr. v. spir. Tartari, fuliginis cinnamomi ana  
gr. v. Aq. Fulegi, Naphæ ana ʒj. Syr. Ar-  
temisia ʒʒ. misc. f. sudoriferum.

Cum verminatio spasmus causatur.

℞. Bezoardici C. C. ʒʒ. Tinct. castorei gr.  
vi. aq. Tenellor. cervi ʒj. Misc. f. sudoriferum.  
seu

℞. Bezoartic. C. Rhinocerotis ʒʒ. Tinct.  
Corall. ʒʒ. Castor. gr. v. Aq. Tenellor. cervi  
ʒj. Misc. f. potio.

℞. Bezoartic. C. Rhinocerotis ʒʒ. Tinct.  
succini. Castor. ana gr. vi. Syr. perlarum ʒij.  
Aq. Rosismarin. absinthii. ana ʒʒ. Misc. f.  
potio.

## Pulvis.

℞. Cran. human. ʒj. Sal. Cran. human. Aro-  
matic. Succini volatil. ana gr. v. Butyr. perla-  
rum ʒʒ. Extr. Croci gr. iij. Sacchar. perlati ʒij.  
Misc. f. pulvis, pro ʒ. dolibus.

Adultis, et n. antecedentia, quàm conse-  
quentia in majori exhibeantur Dosi.

## Evacuantia.

℞. Sulphuris antimonii gr. iij. Mercurii dul-  
cis gr. x. Resin. Jalapp. gr. iij. Conserv. viola-  
rum ʒij. Misc. fiat bolus.

℞. Extr. Rhei ʒij. Mercur. dulc. gr. xi.  
Resin. scanthom. gr. iij. Sem. Zedoariz gr.  
xv. Conf. Rosarum ʒij. Misc. f. Bolus vel.

℞. Extr. Rhei ʒʒ. Resin. Jalapp. gr. iij. mer-  
cur. dulc. ʒʒ. Conserv. Rosar. ʒi. Misc. f. bo-  
lus. sive.

℞. Syr. Cichor. cum Rheo ʒj. Chalybeati.  
ʒʒ. Misc. Herm. Nicol. Grimm. compend. Med.  
chim. lib. i.

## Consultationes.

Mercator egregius, quinquagenarius, tem-  
peramenti totius calidi & humidus, carnosus habi-  
tus, capitis humidioris, cum mense Decembri  
à Nundinis Germanicis Patriam repetens, ne-  
buloso atque pluvio cælo, imbris cum vento  
ingruentibus non procul ab urbe propria, itine-  
re non intermisso, capite & tergo madeceret,  
tandem domum perveniens à domesticis expo-  
liatus, linteisque calidis deterfus & excalesca-  
tus, cum alacriter canasset merumque potas-  
set largius, cubitum concedens somno se tra-

didit. Tunc verò sub noctem mediam de ocu-  
litis dolore conqueri cepit, ad spatulas pro-  
tento, itaut non amplius supinus cubare posset.  
capite ad posteriora convertito, quo affectu cum  
dolore, magis magisque celeriter ingravescen-  
te, summo mane cum Medico domestico acci-  
tus ego, ut de agendis simul ambo consulerem-  
us, inveni Patientem capite ad posteriora re-  
tracto convulsus cum dolore & sine febre.

Motus capitis ad posteriora, quanquam na-  
turalis possit esse si voluntarius sit, quoniam  
naturaliter quilibet musculus ad proprium prin-  
cipium movetur, quia tamen in nostro Patiente  
id citrà voluntatem, violenter, & cum dolore  
fieri videmus, idè motum hunc depravatum,  
& Convulsionem nuncupandum esse omninò as-  
serendum, quæ quoniam ad posteriora sit, Opi-  
sthonos, sicut ad interiora, Emprosthotonos,  
& ad utramque partem, Tetanos vocanda foret.  
Si enim anteriores tantum musculi, dexter &  
sinister tendantur, tota cervix arduat, sed posteriores,  
remittit, si omnes quatuor, recti permanet. Est ita-  
que symptoma facultatis motricis depravate  
læsæ: depravatur enim primò, quia motus est  
violentus, secundò, quia præter voluntatem,  
tertiò, quia cum dolore. Cum autem volunta-  
rii motus proprium instrumentum sit musculus,  
musculi Trapezii, sive Cucullares, & forsan  
etiam Splenii, atque complexi erunt pars atte-  
cta, unde singultum convulsionem esse negavit  
ipse Gal. quia ventriculus multum non est,  
convulsio autem solis musculis accidit. Ideo  
concludit, quod ventriculus, sicut & uterus,  
convulsivo modo moventur, adeò ut contrahi,  
at non convelli dicantur. Et licet nervi motri-  
cem facultatem ad musculos devehant, instru-  
mentum tamen motus immediatum musculus  
est, prout Auditus & Gustus, non solus nervus,  
sed auris & lingua sunt propria instrumenta.

At quoniam musculus est pars organica, in  
convulsione læditur quidem, sed ad nervorum  
lætionem, non enim puncto musculo sequitur  
convulsio, ut necessario puncto nervo illico  
motus convulsivus, quo perdurante vera con-  
vulsio accidit, quæ licet succedat quoque pun-  
cto tendine, nervi & ligamenti substantia com-  
ponitur, sit tamen ratione nervosæ substantiæ.  
Ideò dicebat Gal. quod tendo minus convulsionem  
patiatur quàm ipse nervus.

Causa hujus affectus in casu nostro, non po-  
test non esse alterutra harum, cum Hippocrat.  
repletio nimirum, aut inanitio, siquidem in  
convulsione tertiam nunquam observare potuit  
Gal. Et licet Avic. tertiam causam invenerit,  
spasmi scilicet proportionati ad materiam, di-  
cens, & quando sit spasmus qui ad materiam no-  
proportionatur, eveniens causa rei, à qua nervi si-  
gilli & congregantur ad expellendam ipsam, &c.  
Causa tamen hujusmodi est motus convulsivi,  
non convulsionis, cujusmodi sunt in Epilepsia,  
quam idè Gal. appellabat convulsionem non  
perpetuam. Repletio autem, non inanitio est  
causa præsentis affectus, non quidem a statulen-  
ta materia, ut Celsus, necnon Fern. placuit,  
ab hac enim potius spasmus statulentus, Granso  
dictus, citò evanescens nasci solet, sed ab im-  
modica humiditate imbrum in capite adaucta,  
& externa frigidiore densata, quæ à largiori  
vini meracioris potu liquata, ad nervorum sub-



stantiam præfatorum musculorum sese insinuat, & eosdem replevit, unde Lyra chordæ instar intumescens, breviores facti, & ad suum principium contracti convulsionem excitantur.

Neque credo, frigiditatem ad convulsionem hanc efficiendam concurrere, ut causam exprimenter, & inanitionem inducentem; curationem enim diversam postularet, sed potius quatenus cogit & cohibet materiam ipsam, quod expressis verbis Gal. explicuit dicens. *Algor autem & frigiditas omnis, eo quod omnia nervosa corpora efficiunt ad diffundendum diffundit, sunt causæ ut hæc repleantur.* Adulo ego, & si exprimunt; materiam potius ad nervos, non à nervis exprimunt, sicque repletionem, non inanitionem adjuvant.

Affectum hunc superari posse contido, quia Patiens robustus est, nec malum ulterius propagatur, multo namque difficilior esset, si ad partes quoque inferiores serperet, prout difficillimus, imo plerumque lethalis foret letanos; Dissensio dictus; *Quatuor enim dierum spatio interficit;* quoniam ait Gal. in Com. *ultra naturam tantum laborem tolerare non potest.* Dinturnus tamen esse possit, juxta materię conditionem, partis enim laborantis natura, nervosa scilicet, cum densa sit, materiam inhibitam non adeo facile elidi permittit, aut resolvi, quam difficultatem augeat anni tempus frigidum.

Statim igitur inunda curatio; Evacuantibus, attenuantibus, Resolventibus, & Roborantibus.

Quibus ordine executivo satisfaciendum. Quare omnium primò Clyster injiciatur acris, hac formulâ.

℞. Decoct. Mercur. Betæ, Pariet. Chamæmel. utriusque Centaur. ℥j. Mel. Ros. sol. Ol. Chamæm. an. ℥iij. Elect. Diaph. ℥ss. Vitel. ovi m. pro clyst. unde præbentur hoc leniens.

℞. Mel. Ros. salpet. ex man. clarif. an. ℥iij. Aq. Cinnam. parum m. s. p. Primum præparans sit hujusmodi.

℞. Mel. Ros. simpl. oxym. simpl. an. ℥iij. Aq. Cinnam. ℥ss. m. pro syr. & ita pro v. aliis, A quibus.

℞. Pot. ex man. clarif. ℥vi. addendos infus. colat. Agar. troch. ℥ss. & Aq. Cinnam. ℥ss. m. cui superabat mulam dilutam ad ℥ij. Præparans alterum ita parabitur.

℞. Decoct. Cich. Borrag. Melis. Beton. Ivæ, saliv. rorism. Major. Prim. Veris ℥vi. Syr. de Beton. oxymel. simpl. an. ℥j. Aq. Cinnam. cochlear. m. pro syr. & sic pro aliis decem, & quinque transactis diebus, assumat hujusmodi pil.

℞. Pil. de hiera cum Agar. Aggreg. Coch. præpar. an. ℥ss. m. ref. Pil. & aur. sub finem verò Syr. has assumat.

℞. Pil. fetid. coch. præparat an. ℥ij. Malt. ℥j. m. ref. pil. & aur. Pilula namque lætida aptissima sunt, ut considerabat Celsus. ut pote quæ & Castoreum, & succos ferulaceos continent, nervoso generi amicos.

Inde ad Topica, tum interna tum externa est deveniendum. Inter interna Theriaca commendatur à Gal. sicut extollitur quoque Castoreum. Confect. Anacard. à Rhass, ut quæ & sudorem provocare, & febrem excitare possit, convulsioni utilissimam. Succum Cyrenaicum

commendant Paulus, & Aetius. Interim sternutatoria quoque exhibet Hipp. ad movendam & discutiendam materiam, quæ & in casu nostro convenire poterunt, nisi forte a vehementia doloris prohibeantur.

Inter externa in usum veniunt inunctiones, Illitus & potissimum balnea. Inunctiones, à Nucha per Spinam, ex oleo chamæm. lil. alb. cum arom. Vulp. & de Cast. quas tamen præcedant spinæ frictiones, factæ squilla per medium incisâ. Illitus hant ol. nucis moschat. per express. extracto, vel paretur efficacissimus ita.

℞. Folem exenteratum, & in frustula minuta concisum, iudatur in ventrem Anseris, addendo Thuris, myrrhæ, an. ℥iij. Styrac. calam. cast. an. ℥ij. Rorism. major. flor. lavend. Anethi an. p. j. consuatur anser, & ad ignem, de more, assetur, subjiciendo sartagine Acet. ros. semiplenam, in aqua liquor emanans colligatur pro quotidiano illitu.

Quibus non sufficientibus, in Balneum descendat Patiens, & primò quidem ex oleo paratum, ut monet Celsus, & Paulus, tum ad dolores demulcendos, tum ad nervosam substantiam emolliendam, & resolventibus viâ aperientiam. Oleum autem sit constans, sed subjecta decoctione emolliente & aperiente, ex flor. Chamæm. Melis. Pulegii, Calam. en. Abrotani, Salviz, Hyper. radicibus lilior. alb. althææ. Cui succedat resolvers ex aquis sulphureis paratum, quales sunt Aponitanæ nostræ, in quo parum etiam sudare poterit Patiens. Tandem corroborantia aliqua in usum ducenda, ut quinta essentia rorism. rotularum forma, Conf. è flor. Salviz, rorism. Beton.

Congrua tandem vivendi ratio adjicienda, attentans, & mediocris inter tenuem & crassam. Vinum vetus paucum concedit Avic. multum enim ut causa procatactica, convulsiones excitat, concedatur itaque album lassasfras medicatum, à Coturnicum esu omnino abstineat. Capitis motum ad anteriora vi aliqua convertat & salutis futura certus alacri animo vivat. *Raym. Job. Foris Consult. T. 1. Centa.*

Sereniss. Dux 7. annum agens, temperamenti totius & jecoris, calidioris, habitus potius gracilis, atque adeo ad actiones tum animi tum corporis promptissimus & aptissimus, Patre Sereniss. defluxionibus arthriticis atque podagricis obnoxio natus, tribus abhinc annis, præter pustulas plures corporis partes obsidentes, fluxionem quoque ad aurem passus surdaster cum evasisset, in idem cauterio brachio inulto evanescentibus, auditum perfectè, ut antea recepit. Hoc autem tempore ab assidentibus observati fuere motus quidam convulsivi, modò unius, modò alterius brachii, quos tandem sensit quoque Sereniss. ipse in occipite, adeò ut quandoque ad posteriora caput convertere cogatur, qui ingravescenti inclinante ætate & in eunte autumnò, & gravius quidem ab ambiente frigidiori. Sub idem verò tempus passus est quoque apostema in gingivis, & sæpè ad genas fluxionem, quæ semel tantum ad manum quoque descendit, sensus tamen & motus, sicut & functiones omnes principes, semper illæ ac vegetæ fuere. Modo hoc autumnali tempore quid facto sit opus à te, Prudentiss. Vt querimus, ut qui, sicut aliàs præsentia, ita modò



scriptis prælo sis in Serenissimi atque Clementissimi Ducis Auxilium. N. N.

Præstantissime Vir. Dum pro Sereniss. Pueri salute solam præservativam Medicinæ partem, non vero curativam administrare animus est, res pro voto succedit, quod summa prudentia, qua polles, futura longe prospicere & prævertere potueris, non vero præverti. Itaque ego tecum perpendens symptoma in actione motrice depravate læta, tribus ab hinc annis per intervalla Sereniss. Puerum infestans, motum convulsivum tum brachiorum, tum occipitis, potius quam convulsionem iure nuncupandum cenico, quem ad differentiam veræ convulsionis, convulsionem non perpetuam appellabat apte Galen. ut propterea causam immediatam, non inanitionem, ut repletionem, ut convulsio, sed irritamentum cognoscat, quos quidem motus convulsivos aliam sibi adjunctam habere affectionem nullo modo existimandum, cum expressè scripserit Gal. *Motus convulsivos, sine principum actionum læsione, epilepticos non esse.*

Pars affecta, licet videatur musculosum genus, utpote voluntarii motus proprium instrumentum, immedie tamen est genus nervosum, ex læsione capitis, quod quidem intemperie humida, non sine aliqua caliditatis exuperantia essentialiter affectum observatur, unde primo auditus gravis, mox veris tempore ad dentes repullulans apoplema, & ad genas defluxiones, & ad manum semel. Verum ad huiusmodi motum convulsivum producendum, caput sympathice potius quam idiopathice conspirare puto, ex præteritis pustulis, sanguinis biliosioris & jecoris fervidioris sobole, quas medicis auxiliis evanuisse quidem, sed tamen per universalem diaphoresin, tenuiores adhucnum ichores quotidie insensibiliter resolvi proculdubio est, qua ab ambiente autumnali omni, magisq; hyemali, impedita, à toto venoso genere in caput, si non ichores calidi & acres, h. lictus saltem ejusdem naturæ effertur, quorum per ambitum distillationem ac resolutionem prohibet ambientis frigiditas. Ac tandem hoc ipsum confirmare valet affectus convulsivus, trium annorum spatio, non ultra progressus: etenim si essent. lictus caput affectum fuisset, adeo ut causa irritans primam in capite suo originem & productionem habuisset, ad cerebri ventriculos hucusque sese insinuasset, & affectus epilepticos induxisset, tanta enim intercedit affinitas inter convulsiones & epilepticos motus, ut Gal. *Epilepsium definiat, quod sit convulsio non perpetua omnium partium corporis, cum principum actionum læsione.* E diverticulo igitur ad viam redeuntes, dicamus motus huiusmodi convulsivos, in Sereniss. Duce, fieri ab irritamento facultatis expultricis nervorum, excitato à materia acri, vaporosa potius quam humoralis, quia citò sunt, & citò desunt, eaque non in capite genita, sed à toto venoso genere transmissa, ipsius jecoris vitio, iusto calidioris, quæ vaporosa materia detrusa à facultate expultrice per occiput ad quintam & sextam vertebra spinalis medullæ, ibique firmata, resolvitur quidem, sed interim membranofam nervorum substantiam vellicans atque pungens, eorundem, ac proinde musculorum contractionem excitat, licet pars convulsa, pristinum situm statim recipiat,

discussa scilicet materia, quæ, si quandoque vel vaporosa nimis, vel nimis crassa fuerit, atque adeo in nervorum principio, nimium occipite firmetur, totam potius partem convelli sibi percipit Sereniss. apse non tamen convulsionem veram, ut potè à causa acri qualitate irritante quidem ut copia nervos minime replente, producta.

Quibus ita se habentibus, affectus hic, sicut magis faciendus non est, ita neque negligendus, partes enim nervosæ afficiuntur, quæ sicut ægrè humores admittunt, ita tandem ægerrime eosdem excutiunt, cum præterea vaporosa materia, processu temporis, humoralis vehiculum præbere possit, non sine graviorum malorum periculo, caputque natura non adeo firmum, æsturno humorum & vaporum affluxu, infirmius quotidie reddi possit.

Quare aliqua sunt agenda, quæ quidem affectionem remittere, verum tenebrum corpus ac molle, nec turbare neque agitare possint. Primo quidem serositates biliosas à toto educendo. Secundo eorundem acrimoniam contemperando. Tertiò vaporum affluxum revellendo ac divertendo. Et tandem caput atque nervosum genus roborando.

Quibus intentionibus explendis ordinem executivum proponam, adeo ut primò ventriculus & primæ viæ expiciatur, vel cass. cum tart. vel syr. ros. aur. aut pot. ex manna clarif. humores præparando simpl. julap. acet. quinque diebus exhibito, & ab eo, leviante eodem repetito. In usum postmodum erit ducendum Magist. Mechoac. ter aut quater quarto, aut quinto quoque die, ad gr. x. vel xii. cum elect. lenit. ad 3ij. Vel huius loco, elect. de succo rosar. ad 3ij. cum 3ij. flor. cass. quibus superbibat Aquam Nocerianam. Diebus verò intermediis humorum acrimonia demulcenda veni decoct. Malv. violar. end. & hepaticæ, seu portulacæ, in jure pullæ parata, vel emulsione diluta ex quatuor sem. frigid. in aqua stillat. end. aut encurbatæ paranda, addita portione sacchari fini, ad libitum, vel exhibeatur cyathus aquæ stillat. cich. & anguriz, addita conserva de acido citri, ut tandem ad Balneum aquæ dulcis tepidæ ducatur Sereniss. Puer, ut universo corpore transpirent humores tenuiores, & halitus acres caput petentes, ac nervosum genus lancinantes. Nec obstat anni tempus non adeo calidum & minus accommodatum Balnei administrationi, quoniam ambiens cubiculi potest ad libitum calefieri, Serenissimo absente, igne foras exportato antè ejusdem ingressum, neque enim validius aut tutius remedium excogitare possum, quod humores & vapores à capite divertere, atque eorundem acrem & acidam qualitatem contemperare, & nervoso generi irritato opitulari possit. Quo remedio omisso, illi substituatut totius corporis, articulis exceptis, frictio quotidiana, manibus humectis ol. amygd. in quo portio vini malvatici ebullierit.

Tandem Capiti quoque, licet non essentialiter in hoc affectu laboranti, aliqua roboratio debetur, in quem finem sub ingressum lecti, conserva aliqua capitalis erit in usu habenda, modò à floribus Beton. modò salvia, modò lilior. convallium, modò prunæ vel Lilie. Extrinsecus quoque illini poterit occiput & nucha



summo digito, quinta essentia rosinarum, aut oleo ligni heraclei, intincto, ad vapores dissolvendos, & ad caput nervosumque genus roborandum. Collo præterea appendatur sinaragodus aut magna portio radic. pœoniæ recentis.

Atque jam dictis omnibus congrua addatur vivendi ratio a te præscribenda, circa quam præcipua adnotabo. Primo igitur diligenter caput ab injuriis externis, nimio scilicet calore, frigore & humiditate tutum custodiatur, & totum corpus interdiu optime vestibus, noctu verò culcitris munitum habeatur. Secundo abstinere omnino, inter omnes, ab hædina, à coturnicibus aquaticis, palustribus volatilibus, ab omnibus leguminibus, oriza & hordeo exceptis. Cavendum quinetiam quàm maxime à piscibus omnibus carnosus, pariter ab ostreaceis, & ab illis qui squamis carent; Inter herbas verò, omnino ab apio, à condimento caparum & alii. Inter fructus, conceduntur uva pensilis, ficus, pyra cocta, vinum ad mensum sit album tenue, ut quod caput non tentat. Sonitus valde confert nocturnus. Ita & exercitium, sed antè prandium vel sub cœnâ moderatum. Ab applicationibus, nec non à religiosis ac piis meditationibus, ab ætate alienis divertatur, nè Senex in juventute evadat, & alicui animo degere permittatur. Quæ omnia dum à D. O. M. serenissimo Duci salutaria enixe præcor, tunc interem sapientissimæ directioni committo. *Joan. Raym. Fortis Consultat. tom 1. cent. 1.*

Viro 30. annorum vulnus infictum fuit in brachio dextro, quo nervus denudatus est, sed illæsus tamen remansit; decumbit loco frigido, neque, ob pauperatē, adversus aeris injurias satis munitus habitat; Imperitus Chirurgus, subsistente hæmorrhagia, imposuit vulnere petiam unguento Apostolorum & Egyptiaco inunctam, unde convulsio vehemens & dolorosa vulnere brachium corripuit, quàm paulò post cruris ejusdem lateris, deinde & in altero latere brachii ac cruris convulsio subsecuta est, interdum ad semiquadrantem horæ, interdum ad quadrantem aut paulò diutius perdurans, atque sic per intervalla modò intermittens, modò rediens. Eger præ summo dolore adeò turbatus est, ut subinde etiam deliraret.

1. Afficiuntur in hoc ægro nervi & muscoli, quod ex motu involuntario nimisque aucto; & subinde etiam cerebrum, quod ex delirio satis patet.

2. Symptoma hoc, Convulsio appellatur, quæ est nervorum musculorumque suum principium versùs perpetua & involuntaria contractio. Perpetua autem dicitur, quia diutius durat.

3. Causa remota est infictio vulneris nervum denudantis: proxima verò causa est irritatio molesta ab unguento acri & mordicante, nec non ære frigido, nervo illata, cumque vellente.

4. Ubi enim molestia huic nervo illata cerebro est communicata, & à mente percepta, mox, ut ille hostis excluderetur, eique ingressus denegaretur, spiritus copiosiores e cerebro ad locum affectum determinati fuere, à quorum copia nervus, & musculus ille cui nervus infe-

titur, secundum latitudinem magno cum dolore distensus, secundum longitudinem vero contractus est. Postea à maximo isto dolore per nervi vellicationem & dictæ partis contractionem violentam illato turbatum fuit cerebrum, quod ea de causâ spiritus animales inordinate ad has illasve partes inferiores copiosè dimittens, alias quoque partes eodem modo contrahit, sicque convulsio non solum in parte vulnerata, sed in aliis etiam partibus contingit: & à magna illa cerebri spirituumque animalium turbatione delirium quoque subinde accedit.

5. Periculosum est hoc malum, quia præter nervos & musculos, nobile quoque viscus cerebrum afficitur. Et semper, teste Hippocrate 5. Aphorism. 1. Convulsio vulnere superveniens lethalis, id est, valde periculosa. Quia tamen æger hic juvenis ac fortis est, & hæc convulsio oboritur à causa externa, quæ facile removeri potest, magna recuperandæ sanitatis spes affulget, si convenientia remedia adhibeantur.

6. Curatio igitur quàm citissime instituenda, & ante omnia æger loco calido deponendus, ab ærisque injuriis defendendus est. Deinde statim à vulnere removendum est unguentum illud acre & mordicans, ac vulnus eluendum aquâ hordei cum pauxillo hyssopi coctâ, in qua parum mellis solutum sit, eique immitteudâ petia hoc unguento inuncta.

℞. Vitellum ovi num. i. mellis, terebinthinae, ana drach. iij. spirit. vini drach. ij. misce, fiat unguentum.

Denique emplastrum de Betonica vel meliloto imponendum.

7. Fomentari poterunt partes convulsæ, & imprimis brachium vulnere tali fomento.

℞. Herb. majoranæ, rosmarini, betonicae, calamenthæ, hyssopi, origani, an. m. j. flor. anethi, m. ij. chamom. meliloti, an. m. j. l. sem. cumini ʒ j. levistici dr. iij. sem. anethi, ʒ ʒ. vini albi q. s. coquantur ad lb iij. pro fomento.

8. Post fomentationem, cum forti frictione calide inungantur partes convulsæ hoc linimento.

9. Interea præmissis clystere, interdum dabitur haultus apozematis cerebrum, nervosque corroborantis.

℞. Radic. acori, sceniculi, pœoniæ maris, ana drach. vj. herb. majoranæ, rutæ, betonicae, rosmarini, melissæ, origani, calamenthæ, an. m. j. flor. stœchados, m. ʒ. sem. sceniculi drach. ij. passularum mundat. ʒ ij. aquæ q. s. coquantur l. art. & fiat apozema ad lb j. l. cui admisce aquæ florum tiliæ, syrupi de stœchade an. ʒ ij.

10. Subinde etiam exhibeatur particula hujus conditi.

℞. Specier. diambre scrup. iv. rad. acori condit. conservæ flor. salviæ, betonicae, anthos, an. ʒ ʒ. syrupi de stœchade q. s. misce fiat conditum.

11. In eundem finem etiam tale capitium capiti imponatur.

℞. Fol. majoranæ m. ʒ. rosmarini betonicae, flor. anethi, meliloti, ana p. ij. nucis moscatæ drach. j. benzoini drach. ʒ. fiat pulvis grossus pro capitis vel cucupha.

12. Cessante convulsione corpus clementer expurgetur cum infusione foliorum senæ, rhabarbari



barbari, agarici &c. vel cum Pilulis cochis aureis, electuario diaphenico, diaturbith cum rheo, &c. Post purgationem redeat ad usum ante dicti apozematis & conditi.

13. In diæta sit aer calidior. Cibi sint enchymi & cupepti, conditi cum majorana, hyssopo, rosmarino, betonica, salvia, semine anili, feniculi, aliisque similibus. Potus sit prisana, melicratum, vel cerevisia mediocris notæ, bene fermentata. Somnus longus sit, magnæque corporis quies. Excreta naturalia bene procedant, & fugiantur animi pathemata. *Isbrand. de Diæmetor. Medicat. lib. 1.*

### Observationes.

Matrona quædam convulsionibus brachii sinistra cum maximis doloribus correpta fuit, & per dies aliquot laboravit. Ego tandem vocatus brachium & nucham sequentibus oleis inunxi.

℞. Ol. lumbric. vulpin. lilior. an. ʒij. ol. philosoph. & terebinth. an. ʒβ. pingued. human. ʒj. M. circa carpum ungulum, ex corio humano applicui, his convulsionibus cessarunt. *Fabrit. Hildan. Observ. 9. cent. 3.*

Si ex repletionem fuerit convulsio, evacuationem requirit, quapropter victus tenuis instituendus, corpus expurgandum, & vena secanda, parsque affecta, totaque spina dorsi sequenti linimento inungenda est.

℞. Ol. lumbric. vulpin. an. ʒij. ol. terebinth. ceræ de castoreo. an. ʒβ. axung. human. ʒij. succi lumbricor. ʒj. M. applicetur calidè. *Onit. Fabrit. Hildan. lib. de gangrena cap. 26.*

Juvenis toto corpore convulsus erat, ita ut spina dorsi non potest inflecti. Sequenti remedio statim expedite ambulavit.

℞. Butyri rancidi, laridi veteris, an. ʒij. bdeliæ, ammoniac. an. ʒj. myrrh. castor. an. ʒij. stor. stor. anthos. an. p.j. nuc. mosch. caryophyll. an. ʒj. catum parvum exenteratum, excoriatum & in frusta concisum. His infarciatur anser, & consuatur, & torreatur in veru, prius qui defluet succus abjiciatur. Secundus colligatur in vase aceto semipieno, pro litu spinæ convulsæ. Remedium est divinum. *Petrus Pachegum. Observ. 8.*

Ab inanitione cum Nobilis Vir acerbissimis doloribus, à convulsionis vi natis, ferè necaretur. D. Guilandinus cum iussit totum cado olei immergi, unde præclare recreatus fuit. Corallum proprietate juvat convulsionem ab inanitione. *Joan. Henrini ad Hippocr. aphor. 26. sect. 2.*

In convulsione à repletionem, utiliter calida & sicca in usum duces, ut decoctum peroniz, ligni guajacini, sarsaparillæ, ligni assafras, theriacani, mithridatium, castoreum, & talia cætera. *Jo. Henrini ad aphor. 53. sect. 4.*

Ubi a plethora nata est convulsio, venæsectio solatio est: ubi ab exhaustu balneum tepidi olei convenit. *Jo. Henrini ad aphor. 39. sect. 6.*

Puerum quendam 15. menses natum convulsionem opisthotano laborantem tribus auxiliis brevi sanavi; abstinentia à carnibus, vino & ovis, linteis in oleo chamæm. & liliaceo madefactis perpetuo impositis cervici, partibusque quæ contrahiebantur; & medicamento, quod

constabat ex mithridatio, triplo sacchar. rosaceo, & electuario de moscho cum margaritis, hyacinthis, smaragdisque Orientalibus. *Hieronym. Cardanus. Curat. 15. De admirand. curationibus.*

Nullum remedium utilius est, quam embrocatio partis posterioris capitis, nuchæ, & colli, cum oleo violac. decenter calido; sicut ego feci, dum essem in servitiis Illustriss. Domini mei, Domini Caroli II. Sabaudia Ducis, in Illustrissimo Ludovico Principe Pedemonti, Illustriss. Ducis Filio, qui dum esset in cunabulis passus est Erysipelas in tota ribia cum bubone in coxa, & febre valde intensa, à quibus cum convalesceret, incurrit statim in spasmodum à hecitate causa tum, cum continuis maximisque clamoribus, torquendo caput ad posteriora, & nullo modo poterat sugere lac. Ego igitur perfudi nucham, & totam partem capitis posteriorem & collum cum oleo violato decenter calido, permittendo cadere oleum ab alto, manu exprimente petiam in eo intusam, per spatium quartæ partis hujus horæ, & sic embrocando dormire cepit. Mox pannis decenter calidis abstersi caput leviter fricando, & cum dormire permisit, qui post tres aut quatuor horas per se excitatus, fugit lac absque difficultate redeuntibus in eisdem symptomatibus semel aut bis, eodem remedio iterato, cum gratia Dei sanus factus est. *Petrus Bayrus prælic. libro secundo cap. 20.*

Cum medicinam discerem Patavii vidi adolescentem, cujus intestina totumque abdomen convellebantur, testes & vasa spermatica sub osse pubis abscondebantur, rugitus aderat, & tensio hypocondriorum. Frigida huic erat temperies, & ventriculus frigidus cum madore. anhelosus erat oppresso à diaphragmate, ac mente in paroxysmo exuebatur. Præceptores mei adhibebant status discutientia & attenuantia ac ea quæ evincere possunt materiam frigidam coquendo ac purgando, & roborabant tandem intestina. Primum injectus clyster ex decocto anethi, cum hiera, melle rosac. & ol. chamæmeli. Dein decocto agrimoniz, petrosel. preparabatur. Postea pilulis aureis ac alephanginis purgabatur. Alternis diebus clyster repetebatur: toris oleo rutæ & castor. ungebatur. Interdum accipiebat unam pilulam ex castoreo cum syr. beton. hæc inaurata erat. Bibebat vinum salviatum & ex betonica, dianisum illi in deliciis erat, fricabantur crura. *Joan. Henrini cap. 26. de morbis capitis.*

Quædam mulier passa dolores brachiorum, humerorum, genuum cum contractione, cum non posset ullis remediis sanari; tandem vetula asperso malvatico ignito lateri, & adjectis foliis lauri, nepitæ, storachad. majoran. rosmarin. organ. salv. jubeat exciperet funum; & excitato sudore, convalescit, *Solenander Consil. 15. Sect. 5.*

Vir quidam militaris ex ictu tormenti bellici vulnus accepit in brachio dextro, quo totum brachium abscissum est, superfluit tantum parte, quæ numero vicina est, ad 4. transversorum digitorum longitudinem. Curato brachio, & vulnere optime consolidato, quædam convulsionis specie correptus est, quæ retrahebatur caput versus partem dextram, & mandibulas



frequenter agitat. Medici & Chirurgi convocati, uno ore consueverunt in extremitate ossis à tormento bellico præcisi, aliquam eminentiam acutam adesse, quæ nervum aliquem feriendo, talem convulsionem produceret, & ideo rescindendam iterum esse ossis extremitatem, ac diligenter adequandam. Hæc operatio, sedulo celebrata, nihil tamen profuit. Forte fortuna cum ei occurrisset, & ille incommoda sua mihi enarraret, in mentem venit, aliquod virus venereum intus latens hunc affectum forsan posse producere. Et illico ab eo quasi nunc morbum aliquem venereum unquam antea passus esset; respondit se per aliquod tempus antequam vulneratus esset gravem passum esse gonorrhæiam, quæ tamen curata prorsus fuerat. Hoc meam conjecturam auxit, ita ut ægro consuluerim remedia huius venereæ experiri, quibus ille huius morbi curandi cupidissimus, se libenter submisit. Præmissis igitur purgatione universalis & dixta sudoriferæ, frictiones ex unguento mercuriali celebravi, à quibus ptyalismus provocatus est, & post tertium diem ptyalismi convulsionem illæ desierunt, neque ab eo malo amplius ullo modo æger conturbatus est. *Ozias Aymar. Chirurgi celeberrimi observ. 10.*

*Motus convulsivi amuleto sopiti.*

• Anno 1654 Inquilina mea à multis annis Hysterica & sterilis, ex tristitia simul & indignatione, quod marito, qui ipsam primò deseruit & castra secutus, mox ex his audivit, sed deprehenso abscessu fuerint aures, in gravissimum incidit paroxysmum convulsivum non adeò semper obvium, mens constabat, loquebatur interruptis quidem verbis, sed apposite, de nullo dolore queritans, omnibus tamen corporis partibus micro in omnes dimensiones motus patiens convulsivos. Huius carpo alligavi uxoris meæ primæ amuletum, quod illa ob sterilitatem in primo conjugio Epilepsia laborans Hysterica, sibi comparaverat non exili pretio, frustra neco in semet affectu, ecce statim cessant omnes convulsivi motus, sola respiratione remanente intercessa, amoto amuleto iterum recrudescunt iidem, alligato remittunt, sicque ad remotionem & alligationem illius recedunt redeuntque paroxysmi, ita ut tum demum amuletis aliquam efficaciam adscribere fuerim coactus. Credo autem illud saltem fuisse veram ungulam Alcis, quam omnimode referebat. Quod aliquando mutuo datum ad arcendum paroxysmum Epilepticum ad me amplius non rediit, auro quod fuisse circumdatum, cuius sacra fames mihi illud eripuit. *Paulus Spindler. apud Carol. Rayger. in observat. Medicin.*

Virgini quindecim annorum, divexatæ frequenter, à vulva, intervenit tandem, admirabilis quædam nervorum contractio: invadens ipsam, non nisi sedentem. Stanti quippè, & ambulanti nihil peperit unquam negotii; quocirca libuit, illam vocare, convulsionem sedentariam: non secus ac Plautus sedentarios appellavit, calceolarios, sutores, ac sartores; & Titus Livius sellularios, qui in sellulis opera sua peragunt.

Causa, insitanti huius morbi, insedit procul dubio, cum lumbis, tum ligamentis, vulvam

ilei ossibus, utrimque adnæscitibus. Motus enim lumbis, & femore, versus sedile inclinato, movebatur evidenter, noxia materia, illic loci stabulans: ex cuius acri vapore, verisimile est, lacessitos fuisse nervos, à spinali medulla, lumbis concessos: & ex eorum cum cerebro, consortio, expressam sedentariam hanc convulsionem.

Quam conjecturam confirmavit deinceps curatio. Subtulit namque hanc nervorum distentionem, vehemens exercitium: inducens perniciosi sui incelsu, tantum caloris, exagitationis lumbis: ut discussa lentâ pituita, illic hærente, licuerit virgini domum reverti, non modo sedere secure, verum etiam molliter decumbere; sine ulla noxa, ullæve nervorum contractione, à qua in posterum, integrè quoque ipsam asseruit, defatigans hæc lassitudo, quæ etiam summo pere semper proderit iis, qui à lumbagine (quam nostrates *her. spir.* vocant,) infestantur. *Nicol. Tulp. observ. Medicar. lib. 1.*

Raro contrahuntur homini abdominis nervi. Attramen frequentius, quam animadvertant Medici nonnulli: confisi, nescio qua imprudentia, quemcunque ventris dolorem, vel heri à bile acri; Vel ob spiritum, intendentem intestinum colon. Verum inæqualis ventris distentio, & abstricta rigidorum musculorum contractio, arguit satis perspicue, nervos magis quam intestina pati. Alias non contraheretur venter tam inæqualiter: neque latera apparent in obliqua: Vel musculi recti adeo recta introsum incurvati. Uti luce clarius videre est, in hac, de qua hic loquimur, convulsione.

Matronæ locupletis, coacervavit frigidus ac humidus ventriculus, tantum crudioris pituitæ: ut saliva ex ore decidua, repletet quotidie pelvum satis cap. cem. Sed eo nuxu ad intestina converso, vidimus illa protinus adeo fl. cecidit: ut levissimo medicamenti stimulo irritata, excreverint subinde effusissime. Imò interdum vicies, ex quinque granis radice mechoacanæ. Quæ tamen redundantis humoris copia, (nisi illam interdum exhaurirent medicamenta:) continuabat sese sentim, in sensiles illos nervos, quos spinalis medulla dispergit cum per membranam ventrem succingentem; tum per musculos illi proximè incumbentes.

Quibus, à cruda hac materia, obsessis, excarnificabat ipsam subinde tanta abdominis convulsio, quanta potuit esse maxima. Imò interdum ita effera, ac ferox: ut venter videretur, præ cruciatu, quasi disrumpi. Præsertim si foret gravis. Sed nocui semper acerbius quam interitum. Qui tamen urgens dolor vix unquam ipsam deseruit, nisi expurgatâ ritè causa, per radicem mechoacanam: vel discusso acri ipsius vapore, utique & spiritu præcordia dissendente, sive per mithridatum, sub noctem potui datum: sive per clysterem, ante tormentum hoc, maturè insutum.

Quæ curandi ratio evincit certè evidentissimè, insitanti hanc abdominis convulsionem, originem sumere ex crudâ, ac flatulenta pituita. Ex qua eundem affectum utique derivat Philippus Heghsterus, qui ipsum latissimè descripsit observatione primâ, decadis quintæ. *Idem lib. 3.*

Filiolus Joannis ab Udem, infans septimestris,



stris, epilepticis convulsionibus (quas nostrates *Synypkens* appellant) ferè sine ulla intermissione per biduum convellebatur, ita ut nihil aliud, quàm certa mors singulis momentis expectaretur. Tandem meum consilium imploratum fuit tertiâ die, rebus jam pene desperatis, cum nullum medicamentum exhiberi posset. Ego in miserabili hoc infantis statu, sequentem cucupham parari & capiti imponi jussi.

℞. Folior. majorana, verbenæ, rosmarini, florum meliloti, ana p. j. nucis moschatæ scrup. j. f. Gariophyllorum scrup. j. fiat pulvis grossus, è quo in serico rubro conficiatur f. art. cucupha.

Hæc cum per quatuor vel quinque horas capiti inhaesisset, cæperunt paulatim cessare illæ convulsionibus, atque intra duodecim horas prorsus evanuerunt, ita ut non sine admiratione à tanto malo citissime in totum liberatus fuerit ager.

Cum cerebrum in infantibus sit humidissimum, indeq; plurimi vapores aquosi ac pituitosi eleventur, natura ad faciliorem horum vaporum evacuationem, cranium eorum in vertice ad aliquod tempus apertum relinquit. Sed quemadmodum per hanc viam facilis datur vaporum exitus, ita etiam, si in capite bene tegendo, non satis diligens habeatur ratio, per eandem facilis datur frigoris externi introitus, à quo tunc oclusis poris & refrigerato ac debilitato cerebro, vapores intus retinentur, atque in cerebri ventriculis in tenacem mucum coeunt; quo onere gravata cum se ab illo expedire nititur, & tamen non possit, ex illo motu oriuntur illæ epilepticæ convulsionibus, quæ in infantibus valde periculosa sunt, & cum quibus multi commoriuntur; qui vero cum illis evadunt, si malum vehemens fuit, sæpè vel mentis aliquod vitium, vel membrum aliquod paralyticum aut distortum, vel oculos luteos, aliudve malum toto vitæ tempore inde retinent. Differt hic morbus à vera epilepsia, quod convulsionibus in eo sint minùs vehementes, sæpè tamen frequentiores, ac diuturniores quàm in Epilepsia verà: præterea quod hæc convulsionibus ab humorum copia & cerebri in eorundem coctione & expulsionem debilitate, epilepsia verò ab humorum malignitate & certa venenositate inducatur. Interdum tamen factum fuisse visum est, ut illi in cerebro taliter coacti humores, malo diuturniore existente, paulatim malignam qualitatem acquisiverint, & cerebro vel meningibus pravam aliquam qualitatem aut corruptionem infixerint, atque ita morbus hic in veram & omnium gravissimam epilepsiam transierit. Curatio hujus mali in eo præcipuè consistit, ut cerebrum refrigeratum rursus calefiat & corroboretur, simulque pori aperiuntur atque ita vaporibus sursum exitus detur: his duobus satis benè & tempestivè administratis, plerosque hoc morbo correptos feliciter evadere animadverti. Nonnulli oleo succini, rosmarini, aliòve simili, cum pluma in nares immisso, pituitæ per nares & palatum evacuationem moliri nituntur; sed cum cerebrum à nimia pituitæ copia adeò obrutum & debilitatum sit, ut se ad expulsionem liberè contrahere nequeat; sæpè curatio vix quicquam prodest, imò interdum cerebrum hoc onere gravatum & debilitatum ad fortior, quæ impedita est, expulsionem incitans,

maiores convulsionibus inducit. Ita ut longè præstabilius sit, ante omnia cerebrum calefacere ac corroborare, atque ita humorum crudorum coctionem promovere, & vaporum magnam partem per in consolidatum cranium evacuare: hoc enim factò, reliquum pituitæ vel niuci, quod ventriculis inhaeret, cerebrum deinde satis coquit, dissipat, & per huc evacuationi dicatos meatus spontè expellit. In hujusmodi casu cucupham aliquam cephalicam vertici impositam plurimum prodesse multoties comperi: hæc enim omnibus intentionibus satisfacit, cerebrum calefacit, corroborat, poros aperit, & humorum crudorum concoctionem ac dissipationem potenter promovet. Hæc sola cum magno meo honore innumeros curavi. Interdum etiam guttulam unam aut alteram olei majorana vertici primò iungi, ac tunc cucupham supra poni jubeo: interdum etiam, si aliquid assumere possit, exhibere soleo cochleare unum aut alterum ex aqua florum liliorum convallium, vel tilia, partibus duabus, & syrupi de Stachade parte una: atque his & similibus potissimum utor remediis. Animadverti etiam si infantes hujusmodi cucuphas gessent usque ad firmam cranii consolidationem, ipsos non solum ab hoc morbo, verum etiam ab innumeris aliis frigidis cerebri affectibus certissime præservari. Ad puerorum Epilepsiam, Nicolaus Fontanus comm. ad cap. 10. lib. de morb. pueror. Sebastiani Austrii, magnoperè laudat urticam puerorum, atque ibidem refert historiam talis ægri, cui cum felicissimo successu injecta clysmata ex herbis convenientibus in urina coctis, atque etiam syrupum ex urina pueri cum variis cephalicis confectum exhibuit, quorum descriptiones citato loco videri possunt. *Isbrand. Diemerbr. in observ. & Curat. Medic.*

Anno 1643. Vocatus fui ad puellam fusci coloris, capillitii omnino nigri, ac temperamenti melancholici decem undecimvè annos natam, hic Hagæ habitantem, cui brachium, nec non crus sinistrum, nullo tamen dolore accedente, huc illuc valde commovebatur, fueratque in causa ingens quidam timor. Illa tamen puella, satis præparato convenientibus remediis corpore, per me Castorii maxime usui priori valetudini restituta est. *Cornel. Stalpart. observat. rarior. Cent. 1.*

Quàm incautè puerperæ quædam nonnullam frigido sese exponant aëri, nec leve incurant morborum periculum, sæpiusque in eisdem incidant, experientia satis monstrat. Exemplo nobis erit uxor N. Verboom Sutoris Hagensis. Hæc decimo quarto puerperii die, quamquam temerè admodum, & imprudenter, initio Decembris 1683. ad templum sese contulit Deo propter felicem partum gratias actura: Verum brevi post spasmo corripiebatur oris à sinistra parte versùs dextram, ita ut (vitium namque erat valde molestum) me illic ea de re consulverit; ego itaque omnibus ritè perpensis, tertiâ à puerperio hebdomadâ scilicet quoddam præscripsi purgans, partemque affectam unguento nervino ungi jussi: cucurbitulas etiam cervici, emplastrumque phagedanicum pone aurem sinistram ad moveri præcepi: addidi & sternutatoria, decoctumque ex ligno guajaci, salsa parilla, & salisatras: cui sub linem decoct.



coct. addebantur herb. chamæp. prim. veris, & Beton. ac denique sequenti usa fuit remedio.

℞. Fol. lauri: ruta: rosin. majoran. ana M. j. β. flor. Stachad. Salvia lavendi ana M. j. Coq. ex aq. comm. s. a. ad lib. iij.

Hoc gargarismate usa est, partemq; affectam fovit. Ad cerebrum autem cum nervis corroborandum sequens datum fuit Electuarium.

℞. Conserv. flor. rosmar. Salvia ana ʒ i. β. Nuc. Mosch. conditæ ʒ j. Syr. de Stachade q. s. M. f. Electuarium.

Sicque hac Methodo, Divinâ favente gratiâ, intra tres hebdomadas illo incommodo luit liberata. Idem. Cent. ij.

*Famina perillustis* 30. circiter annos nata, constitutione tenera, & gracili corporis habitu prædita, quavis hyeme catarrho in tracheam & pulmones exudante, cum tussi, raucedine, & spuatione copiosa graviter affligi solebat: novissimo tamen anno, cura, & cautione diligenti usa illud malum evitavit: at vero post solstitium Brumale à frigore suscepto immani capitis dolore, aurium tinnitu, vertigine, cum ingenti corporis affliciebatur, ut facile constaret feri colluviem, antehac in pectus exudare solitam, tunc temporis intra caput & cerebrum omnino deponi: cujus insuper effectus erat, quod passionibus quasi hysteriis, quibus nunquam prius obnoxia fuerat, quoties dormire inciperet valde infestaretur: si quando enim somnum initura oculos clauderet, illico in abdomine molis ascensus, in gutture præfocatio, circa præcordia tremores, & subsultus excitabantur; quæ tamen affectiones, cum perfecte evigilaret, protinus cessabant, ita ut ægotans necesse habuerit per plures dies & noctes somno fere & in totum abstinere.

Ad hanc Dominam, postquam plures dies ægotans valde imbecillis evalerat, accessit, medicamentis tantum blandis uti cogebar: Itaque sanguinem ex pede ad ʒ iv. protinus detrahendum, & quolibet die clysterem e lacte saccharato injiciendum curavi, a quo ter, aut quater alvum deicere solebat: porro octava qualibet hora dosim ꝑ. C. Cervi in cochleari sequentis Julapii exhibui.

℞. Aq. Pulegii, juglandum, Ceraforum nigr. an. ʒ iij. Aq. hysterica ʒ ij. Syr. Caryophill. ʒ iij. Castorei nodulo ligat. & in vitro suspensi ʒ β. Margaritæ pulv. ʒ j. Misce. Vescicatoria pone aures, & cataplasmata ex foliis Rutæ & Aronis cum rad. Bryoniæ, sale marino, & sapone nigro plantis pedum cum fructu admove. Interdum vesperi in haustulo Julapii præscripti, Diacodii ʒ β. exhibui, cui somnus moderatus, absque solita spasmodorum consequentia succedebat: cujusmodi effectum ab opiatâ in tali casu exhibitâ sæpius expertus sum. Pro siti restringenda præsanam cum ingredientibus diureticis incoctis propinavi: horum usu intra breve tempus plurimum alleviata fuit. Attamen, quod maximo emolumento cessit, abscessus in aure similis sponte disruptus primo saniem flavam, ac postea per multos dies ichoris tenuis copiam ingentem profudit, à qua evacuatione, viscerum & præcordiorum spasmi in totum cessantibus, morbus perfecte judicatus fuit.

Quod spectat ad prædictæ ægritudinis *Ætiologiam*, extra dubium videtur, affectus istos à colluvie serosa æt. 7. 17. 18. 19. deposita excitatos

fuisse: nam & istius humoris in caput translatio morbum primo intulit, ejusque per auris emulsiorem in eam symptomata quavis fultulit: porro cum materies morbinica spiritibus circa nervorum principia confitis *diathesis* aliquatenus explosivam intulisset, illi, licet tanquam æstro perciti fere continuo agitarentur, qui michi tamen verius cerebrum resistentes spatium in quo possent liberius expandi obtinerent, phantasmam quidem illi solum venementius exercebant, & absque ulterioris incommodo *vigilia* tantum induxere. At vero cum somno interdum obrepente spirituum irrequietorum excursus verius cerebrum cohereretur (quod quidem necessario evenit quando obdormiscimus, liquoque nervoso intra cerebri poros tunc temporis uberius admisso) nervorum paris vagi & intercostales capita iidem tumultuariè intuentes, spirituum intra nervorum istorum duæ scætentium totas series perturbaverunt, adeoque prædictos circa præcordia, viscera, & gula musculos spasmos intulere. Plures hoc ritu tum viros, tum feminas ægotantes novi, qui cum cephalalgia, occipitis gravitate, aut vertigine laborarent, inter edormiscendum illico in præcordiis, aut visceribus, aut simul in utrisque perturbationes quasi spasmodicas sensere, quod quidem contingit a spirituum tumultuantium jactu a cerebro in nervorum origines reflexa: Quod autem huic ægrotæ opiatarum usus somnum placidum, abique solita spasmodorum consequentia accessit, ratio erat, quia spiritus animales, utut irrequieti & furentes, particularum tamen narcoticarum implexu, velut catenis injectis ligabantur, ut deinceps resistentia quavis somno obruerentur. Enimvero graves convulsivorum paroxysmos tum Asthmaticos, tum quasi hystericos opiatu exhibitis, non raro feliciter curavi.

Mulier honesta M. G. 67. anno ætatis, vultu adhuc florido, & habitu corporis obeso; cum prius faciei intumescenzæ, & gravioribus cephalalgia paroxysmis dudum obnoxia degisset, intenso Brumæ frigore in vertiginem valde molestanti, cum tremore cordis, spirituum deliquio, & crebro, vomendi nixu incidit: lecto imposita si oculos aperiret, aut e latere in latus converteretur, statim insigni scotomia, leipothymia incipit, & insuper vomitu inani affliciebatur. Hanc invisens minime dubitavi, quin ægritudinis causa foret materies spasmodica ab exteriori capitis regione ad intus & in præcordia recessus translata: cujus afflatu, sive copula heterogenea spiritus animales tacti, dum inordinate versus cerebrum exsilerent, affectus vertiginosos; dumque isti in nervorum capita tumultuariè irruerent, scotomiam, præcordiorum *anæsthesiam*, & vomendi nixum excitabant. Hujus curationem vescicatoria large nuchæ, & pone aures applicata, enemata quotidie injecta: item frequens ꝑ. C. Cervi, & Julapii cephalici usus intra paucos dies perfecerunt.

Vir egregius 34. circiter annos natus, cum ex longo tempore tulli, cum spato copioso, & crasso obnoxius egerat, insuper cutis poros valde apertos habens, continuo madere, & qualibet ferè nocte sudore multo perfundi solebat: sub initium veris evacuationes istas solennes parcius evenire pensavit: interim conquiescit de manuum & pedum plenitudine, ac



velut intumescencia quadam, ita ut *hydropem* ingruentem vereretur; cæterum & in capite *scotomia*, & *vertigine* crebra afficiebatur: Brevi postea hoc malo ingravescente, circa labia, aliasque oris ac faciei partes leves contracturæ, & subiti spasmi p. alim excitabantur, subinde etiam (materia morbinica, uti videtur, nervorum paris vagi & intercostalis origines influente) cordis tremorem & subultus, cum crebris spirituum vitalium deliquiis, quasi *leipothymia* jamjam imminente, perpellus est.

Scio plurimos, pathemata hæc convulsiva, præcordia ita graviter infestantia, vaporibus à *liene* elevatis ascribere: attamen ratio longè potior videtur, eadem a materia spasmodica intra cerebrum aggeilla, & in nervorum principia irridente deducere; quia scil. excrementi cuiusdam à partibus aliis in caput metastasis præcessit, ipsumque adeo *ad vitiis* deponi, affectus verriginosus ferè continuus, illique partium oris ac faciei spasmi plane testantur: quare huic remedia juxta methodum interius traditam præscribere visum est.

Possem hic plurimas hujusmodi observationes proponere, in quibus *materia morbinica* prope nervorum origines subsistens, cum *vertigine*, *leviores* tantum viscerum, aut membrorum spasms ciet. Cæterum quia illius materie portio quædam a capite descendens nervorum ductus sæpe altius subit, adeoque circa medios, ultimosque eorum processus, & plexus, *semini explosivi*, quasi *pulveris pyrii* fomitem struit; ex re tore videtur hujusmodi casuum exempla quædam subicere.

Puella quædam E. L. procera, & venusta, parentibus sanis orta, ipsaque constitutionis (prout videbatur) originaliter s. nã; postquam Hero longa invaletudine detento diu & fere continuo minitrallet, atque hinc sapius totas noctes evigilare, aliisque temporibus crebro expersisci cogeretur, ut nunquam somnus, nisi brevis & interruptus, capesseretur, tandem de capitis hebetudine cum crebra *vertigine* queri coepit: intra brevem exinde temporis tractum, affectu indies ingravescente, tremores sensit in toto corpore, cum levi membrorum succussu, quibusdam vicibus, licet vagis & incertis, ingruentes: postea dein paroxysmos planè convulsivos, eosque horrendos & crebro infestantes perpeffa erat: paulo ante morbi insultum *Scotomia* brevi afficiebatur, mox *pectoris angustiam* & *oppressionem* magnam, qua præcordia simul omnia strictim contrahiebantur, persensit; tum illico stridorem ingentem, cum forti ejulatu edens, in terram concidere solebat: interrim animo constabat; ac maxima cordis oppressione laborans, se nullo modo relevare potuit: postea cum paroxysmis pertransierat, insigni cordis palpitatione, sensuum torpore, & functionis animalis debilitate magna adhuc aliquandiu afficiebatur. Postquam hæc ægrotans per quatuordecim circiter menses ejusmodi paroxysmis crebra vice repetentibus obnoxia degisset, demum *epileptica* evasit, ut quoties mali insultus rediret, in terram prostrata, *diarria* cum spuma oris, aliisque pathognomonicis caduci symptomatis corripereetur. Neque hic affectus iste gradum sillebat, quin vix elapso anni

spatio, in *maniam* degenerabat, ut denique ægrotans, amissionis usu, modo cum furoræ insaniret, modo cum stupore planè desiperet.

Ex morbi hujus initio, progressu, & crebra metamorph. si liquido patet eum primo in capite prope nervorum origines & causam, & sedem habuisse, & exinde fines suos & in cerebrum & in *sistema nervosum* quotidie latius explicuisse; nam ab initio materies morbinica juxta nervorum principia consistens, viscerum & membrorum leviores tantum spasmos, & succussiones cum *Vertigine* intulit; postea ejus portio in nervos *pneumonicos*, eorumque plexus delapsa, gravissimas præcordiorum, diaphragmatis & ventriculi convulsiones produxit; quin & ejusdem materie portio altera cerebrum ejusque medullia invadens, *amictus*, ac dein caduci paroxysmos inferebat; atque demum spirituum textura in totum vitata, eorumque latice in liquorem acerrium, ac velut *Hygium* degeneri, *affectiones spasmodica* in *maniam* transibant.

Quod itaque spectat ad particulares tum morbi tum symptomatum rationes; videtur quod prædicta virgo ex vita sedentaria (omni corporis exercitatione & aura liberioris usu penitus ademptis) præsertim verò ex vigiliis nocturnis, & somno frequenter interrupto, vitiosam sanguinis & humorum diathesin, simulque pravam & debilem cerebri, & nervosi generis constitutionem contraxerat: quibus accessit, quod illa hero suo gravissimis convulsionum affectibus laboranti perpetuo minitrallet, atque ex eo sorte contagium aliquod, sive miasmata spasmodica susceperat: Et primo quidem particula heterogenea una cum succo nervoso in cerebrum & cerebellum suffusa, ibidemque spiritibus accrescentes, præliminari *Scotomia*, & *vertiginoso* affectu quasi velitabantur, dein materies spasmodica nervorum paris vagi & intercostalis, atque medulla spinalis principia obsidens, una cum *vertigine* viscerum & musculorum subsulit, & succussiones leviores intulit: postea cum eadem nervorum ductus altius subiens, in plexus cervicales, cardiacos, & forsitan intercostales, aliosque deferretur, atque spiritus *respirationis*, & pulsus numia exequentes, copula explosiva imbueret, illi crebra vice ob plenitudinem, vel propter irritationem, una cum superioribus nervorum originis incolis in explosiones adacti, partium respectivarum spasmos horrendos excitabant: Enimvero urgente paroxysmo, à nervis *pneumonicis* contractis, de repente thoracis systole inordinata ciebatur; deinde statim diaphragmate subito & vehementer retracto, ejulatus iste obstrepens succedebat: porro cum ob istam thoracis systolen diutius continuatam, sanguis ne moveri possit impeditus, omnino in præcordiis stagnaret, idcirco durante paroxysmo, cordis oppressio magna, cum *angustia* & *angustia* laborantem urgebat: interim vero, cum adhuc cerebri regio à spirituum explosionibus libera ac imminis perstaret, ægrotans animo constabat; postea vero cum materies spasmodica indies adacta, etiam in cerebri debilitati & præfracti medullia explicaretur, prioribus circa præcordia pathematis *amictus*, dein *Epilepsia*, ac ultimo *mania*, propter rationes modo citatas supervenerunt. Huic ægrotanti medicamenta plurima, & varii generis, a multis tum medicis, tum empiricis, con-



confuse tamen, methodoque incerta, & subinde mutata, præscripta ne hulum proluere.

Mulier quædam venusta & ætate & corpore, a diutino morore in diathecim in valecudinariam incidit: circa meridiem, & horas vespertinas plerunque mediocriter habuit: mane autem cum somno satis, & sæpe plus nimio indulserat, usque magis somnolenta, & torpida evasit: expergefacta, statim queri solebat de gravitate, ac velut stupore in toto capite, cum vertigine ad quemvis motum, aut capitis circumactionem; paulo postea paroxysmum convulsivum, aut avertitum fere constanter expectabant, eanique modo hæc, modo ille infestare solebat: quippe post vertiginem, quasi velut tio velitationem præviam, plerunque in ventriculo, & latere sinistro dolorem gravativum huc illuc transcurrentem sentit; hinc rugitus, vomendi nixus, hiatum eruptiones, necnon abdominis, & hypochondriorum distentiones miræ insequiebantur, & plurimis interdum horis hanc misere exercebant: interdum vero hæc symptomata abesse contigit, & tunc in cerebro affectio immanior successit: namque in crebras avertitum incidens, aliquandiu immota, & clausis oculis, sine sensu, aut intellectu perire solebat: cumque famulæ ejus frictio- nibus, & nicotiana fumigatione ipsam excitarent, mox animo constabat, at denuo statim revolvitur in similem avertitum, atque ita quatuor, aut quinque vices ejus subit, priusquam ad se perfecte, & sine recidiva mox expectanda rediit: Tandem peracta tragædia, etiamnum capitis gravitate & torpore aliquantulum afficiebatur: circa meridiem vero, nebulis omnino discussis, sudum, & serenum mira tranquillitas obtinere solebant; donec proximo mane rursus eadem symptomata reverterentur.

Qui symptomata hæc rite perpendit, non habebit necesse vapores ab utero, aut tene elevatos supponere, atque in illis causam morbiticam frustra quærere, nempe quam multo certius poterit in ipso capite collocare: Videtur enim quod huic ab initio, propter ingentem mororem (prout in feminis crebro assolet) cerebro & nervo generi magna debilitas, simulque vitiosa labes imprimerentur: ita quidem ut spiritus animales in cerebrum & cerebellum derivati, secum particulas heterogeneas mixti generis, scilicet partim narcoticas, & partim explosivas afferrent: cujusmodi copulam cum illi a somnis uberiores conciperent, mera plenitudine ad ipsam excutiendam ciebantur: quamprimum igitur expergeret mulier, iidem spiritus commoti, vel in inferius facta, in nervorum origines deprimebantur, ibidemque explosi viscerum spasmos excitabant, aut versus cerebri medullam resiliences, ibidemque elisi, crebras & terribiles avertitum intulere. Revera hæc affectio Epilepsia aliquantulum affinis erat, nisi quod materies morbitica nondum intra regale cerebri palatium, sive medullam ejus ita commorabatur, ut spiritus illic intra primos ipsorum fontes iniceret: iidem tamen inferius dissociatis, & juxta nervorum origines sese in rivos, minoresque rivulos dividitibus, eadem copula heterogenea arctius adhærebat. Interea spiritus, quo istam materiam excuterent, crebrius explosi, cum versus cerebri arcem tumultuose raperentur, stuporem & avertitum, sin alio vergentes in nervorum principia irruerent, prop-

terea istos viscerum spasmos intulere: Quod autem paroxysmi tantum horis matutinis post somnum pleniores inguebant, ratio erat, quia spirituum copula heterogenea us cum succo nervoso adveniens, eo tempore ad plenitudinem explosionibus aptam congerebatur; quæ si quidem tunc integre discenteretur, reliquo die ægrotans ab antecui immunis perstitit, donec postmodum, cum somnus nocturnus novam materiam morbinæ supplementum capiti intulerat, mane similis paroxysmus redibat; qui forsitan prout somnus brevior aut protractior fuerat, modo intra cerebrum, modo juxta originem nervosum peragebatur.

Nec tantum in sexu feminino, utpote debiliori & magis patibili, avertitum ab origine nervosa principaliter affecta oriuntur; verum ejusmodi affectiones aliquando in viris, a simili provocatæ excitatas observare licet. Ante aliquot annos festinanter accersitus ad hospitem quendam in hac urbe diversantem, ipsum primo intuitu revera demoniacum suspicabar, eique exorcismi potius quam pharmaci opus fuisse rebar. Erat is quadragenarius, qui jam per tres annos itatis quibusdam temporibus moribus convulsivis tentari solitus est; hujusmodi avertitum, dum hic paucis dies fortuito hospitaretur, occasione ingentis molitæ insultum solito majorem perpeius erat: morbi accessionem per duos aut tres dies præsentiscere solebat, nempe ex magna intra caput commotione, continua tere vertigine, & crebra oculorum obscuracione; ingruente autem paroxysmo, primo oculi varie contorquebantur, invertebanturque, dein moles quædam instar vivi animalis, ab imo ventre sursum versus cor & thoracem, & exinde in caput obrepere videbatur: hujusmodi motum egomet manu ventrem ejus comprimens plane persensit, & quamdiu palmis totis viribus obtentis istius gloriæ ascensum inhiberem, se mediocriter habuit; quamprimum vero intumescencia istæ semini superius obrepens ad caput pertigerit, illico membra totius corporis immaniter convellebantur, ut tanquam spiritu malo obsessus se ad parietes & postes illideret: a quatuor robustis viris vix summa vi detineri, & coerceri potuit, quin exsiliiret, & brachia, & pedes, & caput motibus diversimodis huc illuc jactaret: quando ab exsiliione cessaret, membra fuerunt robustissime extenta, & muscoli rigidi, & velut tetino affecti: Talis paroxysmus circiter horæ quadrantem durabat; dein ad se rediens sobrie loquutus est, in cubiculo obambulavit, qualia passus erat conscivit, & veniam ab astantibus petiit; brevi postea oculos inverttere, & occisione volutare cepit; dein statim affectus spasmodes repetens, similem uti prius excitabat tragædiam: atque isto ritu intra tres horas quinque aut sex paroxysmos ejusmodi convulsivos sustinuit: in medio quodam paroxysmo, vena in brachio pertusa, factoque orificio satis largo, sanguis lente effluebat & statim congelari visus est: ita quidem ut in pelvim exceptus, haud liquidorum more in superficiem planam & æquabilem disflueret; at instar sevi liquefacti, & in vas frigidum instillati, gutta super guttam accumulata in molem accresceret.

Si affectio hæc stupenda mulieri contigisset, obvium esset, eam hysteriam dicere, ejusque causam in uteri vitium conicere; eo magis, quia tanquam molis cujusdam ab imo ventre ascensus



paroxysmum inchoavit: attamen cum vulgaris ista solutio, quæ sapissime merum ignorantie subterfugium est, in hoc casu admitti nequit: rationi maxime congruum videtur, omnia istæ symptomata in malas cerebri & nervosi generis affectiones referre. Enimvero morbi causam in ipso capite, latere, ex symptomatibus paroxysmum præcedentibus, quæ spirituum intra *ἰνσφαλον* scilicet scintillarum agitationem insignem denotabant, plane colligitur: ista cerebri *inflatio*, graves *Scotomæ*, quæque insultu jamjam ingruente constanter evenerunt, *oculorum contorsiones*, manifestò arguunt particulas heterogeneas, & explosivas spiritibus intra *ἰνσφαλον* juxta nervorum principia degentibus accrevisse. Adeo ut hic casus etiam ad *Epilepsia* naturam prope accederet, excepto tamen quod intra cerebri medullam spiritus nec copulam heterogeneam admitterent, nec alibi explosi, illic tumultuarie perirumpere; durante enim paroxysmo ægrotans usque animo constabat: at vero materies morbilica in capite uberius congesta, cum illinc in nervorum tum interiorum ductus altius prolaberetur, in visceribus tum ini, tum medii ventris, etiam in membris exterioribus, semini explosivi mineras valde diffusas posuerat; adeo ut cum spiritus animales juxta nervorum origines explodi inciperent, illico statim alii plexus mesentericos, & demum alii alios plexus nervos a meta extrema usque ad caput interjectos incolentes, ordine explosi, spasmos a parte in partem usque continuabant, donec ad *ἰνσφαλον* perveniretur: exinde vero explosione statim ad spiritus spinalis medullæ, & nervorum appendicum hospites translata, musculorum, & membrorum totius corporis convulsiones validissimæ insequuta sunt: Quod autem ille velut *malis ascensus*, qui sæpenumero in imo ventre, circa convulsionum initia percipitur, a spiritibus intra plexus mesentericos in explosiones adactis procedat, inferius cum de passionibus hysteriæ dicemus, fuscè declarabitur.

Virgo letissima circa 16. ætatis suæ annum ab equo decedens, & saxo protuberanti allisa, mammam sinistram graviter læsit, unde tumor cum dolore exortus est; quæ tamen symptomata ab initio remedium usu mitigari, & demum ad longum tempus mediocriter habere visa sunt; post triennium vero à frigore suscepto, ac pessima victus ratione adhibita, omnia exacerbata coeperunt: pars læsa in majorem molem intumescens dolore peracuto, & fere constanti afficiebatur, ut ægrotans præ insigni cruciatu dies & noctes pleræque insonnes degerit, mammaeque glandulas tumidiore tunc factas nec tangi, nec pertractari, imò ne strepitum quenis, aut concussionem in cubiculo lætam sufferre potuerit.

Cum huic tumori versus cancerosum degeneri, lotus & cataplasmata ex cicuta, & mandragora, aliisque stupefacientibus, & repereussivis applicarentur, perillustis Domina affectiones quasdam spasmodicas crebra vice infestantes pati coepit: imprimis quoties in mamma dolor atrocius urgeret, illic loci punctiones, nec non spasmos ac contracturas huc illuc excurrentes persensit: demum statim ventriculus ac hypochondria, & non raro totum abdomen

cum fugitu & vomendi nixu inflari, ac plurimum distendi solebant; mox idem affectus sensim ad superiora translatus a *moderata* excitabat, cui brevi postea motus convulsivi in toto corpore adeo validi succedebant, ut ægrotans vix a tribus aut quatuor robustis viris contineri potuerit.

Hujusmodi paroxysmi primò erant vagi, & occasionaliter tantum excitati; nempe succedebant quoties dolor pectoris à causa quadam evidenti intenderetur: postea convulsiones istæ crebrius infestabant: ac demum periodicæ, ac habituales factæ, bis in die, nempe totidem itatis horis à pastu constanter repetere solebant. Cumque ad hunc modum per sex menses ægrotans miserrime affligeretur, tandem *vertiginoso capitis affectu*, cum fere continuo exercente molestari coepit; cui malo cum fœtus ex herbis aromaticis & cephalicis capiti aliquândiu adhiberetur, quoad *vertiginem* melius habuit; verum exinde novo & plane admirando symptomate, *inssi* scilicet *inani* absque sputo dies & noctes, mihi cum somno obrueretur, perpetuo infestabatur: postquam clarissima hæc virgo diversimoda remedia à variis medicis præscripta absque multo commodo tentaverat, demum *thermis temperatis* apud *Bathoniam* usa juvabatur, deinde statim nupta, à *conceptu* ac *puerperio* sensim convaleuit.

Si totius morbi ejusque accidentium rationes inquirantur, extra dubium est, affectionem convulsivam à *mammæ tumore*, live loco dolente primo excitatam fuisse; cujus causa partim fuit acutissimus doloris sensus, à fibris ac nervis istius partis impressus, partim autem *copula heterogenea* spiritibus istarum fibrarum nervorumque incolis affixa; enimvero suspicari licet humorem acerrimum tumori impactum, qui forsitan aliquatenus nervorum ductibus illuc confluerat, Topicorum usu repereussum, fibras & filamenta nervea per totam viciniam disposita subivisse, proindeque copulam heterogeneam & explosivam spiritibus accrevisse; ad quam elidendam, quoties à dolore incitabantur, explosiones spasmodicas inibant, simulque spiritus alii intra nervos amicos scintillantes priorum consensu (ut crebro affolet) pari ritu explodebantur: dein affectio spasmodica nervorum extremitatibus ubi primo inceperat, per eorundem ductus usque ad *ἰνσφαλον* continuata, a *ἰνσφαλον*, & exinde in totum systema nervosum resiliens, artuum & membrorum omnium motus convulsivos inferre solebat: circa ægitudinis initium paroxysmi ad hunc modum à parte affecta propter dolorem excitari, ad cerebrum & appendicem ejus, secundo traducebantur: postea vero cum spiritus horum incolæ per sympathiam crebro explosi, partium continentium poros ita laxarant & debilitaverant, ut intra eosdem, una cum succo nervoso, particulis quibuscumque heterogeneis aditus patefceret, *procatarxi* *spasmodica* etiam in capite succrescebat, atque spiritus *ἰνσφαλον* incolentes, copula heterogenea infecti, paroxysmum spasmodicum ipsi inchoabant, aut saltem insultibus ejus primos instinctus præbuere, qui plurimum a pastu totidem statim horis redibant; quia se materies morbilica una cum succo nervoso a quali fere dimenso inferebatur: revera in ejusmodi casibus ubi convulsio generalis fere omnes totius systematis nervosi



nervosi partes successive occupat; suspicari licet spiritus animales in toto genere nervoso copulam heterogeneam & explosivam contraxisse, quæ cum stato tempore ad plenitudinem assurgat, ipsos spiritus pariter hora conductæ ad explosionem incitat: eademque explosio alicubi inchoata, fomitis ignarii ritu, in omnes ordine propagatur.

Quod spectat ad *inssim* istam *inanem*, quæ capitis timentationi succedens, ægrotantem istam per plures menses fere incessanter exercuit, videtur quod symptoma istud omnino ab *origine nervosa affecta*, & nequaquam à *pulmonum infarctu* penderet, nihil enim tussis exercebat, & si quando istum tussendi impetum violenter inhiberet, statim in gutture præfocationis sensu afficiebatur: adeo ut verisimilius sit materiem morbiticam prope originem nervosam depositam, à sotu rarefactam, & commotam, nervorum pulmonibus dicatorum capita altius subisse; atque in fibris, & filamentis eorum spasmos perpetuos irritasse: simili quodam ritu ac cum succus nervosus qui musculorum fibras & tendines irrigat, acris ac degener factus, partibus illis subfultus, ac contricturas continuas inducit: Hinc quando spasmus in aliquibus nervorum affectorum furculis siteretur, ita ut tussire non liceret, statim motus convulsivus in furculos alios ejusdem, aut affinis nervi incurrens, præfocationem in gutture excitabat. Libet hic exemplum aliud spasmus e nervorum extremitatibus affectis oriundi proponere.

Clarissima Matrona quinquagenaria postquam ei mentitua per sesquiannum fluere desierant, primo de dolore *pungitivo* in mamma sinistra cepit; dein postea illo affectu cessante, circa *ventriculum* male habuit; illic nimirum tumor durus, & velut *scirrhus* cum dolore gravativo subortus est: huic stomachi inflatio cum respiratione difficili, nausea, & vomitione crebra supervenit: dein morbo ingravescente, dolore magis acuto, & huc illuc quaquaversus excurrente, in affectiones ventriculi convulsivas incidit: tempe illic loci spasmis varie excurrentibus, haud secus ac si ventriculus multifariam distraheretur, fere continuo molestabatur: porro cum *sul* & *vigiliis*, constans animi perturbatio, & crebra spirituum deliquia, quasi jamjam moribunda esset, Dominam ægrotantem exercebant: quæ tamen omnia symptomata ex illo ventriculi tumore semper oriri, eadem plane persensit: Huic medicamina quævis vomitoria, cathartica, antiscorbatica, & hysterica, absque ullo levamine, molestæ potius & nocuimento fuisse videbantur: à sanguinis missione per hirudines, & lactis asinini usu nonnihil commodi recepit, & postea ab acidulis diu epotis plurimum alleviatur.

Predicta symptomata, quæ vulgo *passioni hysterica*, & *vaporibus uterinis* ascriberentur, palam est à tumore circa ventriculi fundum excitato processisse: quippe sanguis Domine isti valde fervidus & atrabilarius existens, cum non amplius catameniorum fluxu purgaretur, recrementa sua & faculentias adultas primo in *mamma*, & deinde novo incepto, in *stomachi membranis* deposuit: à tumore ibidem facto particula acres & heterogeneæ perpetim decedentes, *fibræ*, & *nervi* circumcirca consitos subierant, quæ spiritibus earum partium *insist*, *insist* quo

continuo accrescentes, ipsos ad crebras explosiones; adeoque affectiones spasmodicas in tota vicinia excitabant: quandoquidem vero motus convulsivi illic loci habitus leviores fuerint, hinc apparet totum nervosum genus, ipsumque *σπασμω* (prout in spasmis majoribus assolet) in eundem affectum nondum consensisse: attamen spirituum inordinatio circa partes affectas exorsa, & illinc minori undulatione ad caput traducta, ejusque adeo spiritus intolas leviter tantum afficiens, vigilias cum ingenti æstu, & phantasiæ perturbatione inducebat. Quæ hactenus de spasmis à causa morbitica alterutrum systematis nervosi obsidente disseruimus, clarius elucescent, cum postea de præcipuis convulsionum speciebus, de *passionibus scilicet hysterici, hypochondriaci*, aliisque particulatim agemus: Interea huic, de *spasmo* propter *nervorum extremitates* affectas oriundis, hypothesei *methodi therapeutici* non opus erit adjicere, quoniam *medendi rationes* hujusmodi pathematis postea speciatim tradendis melius accommodari possunt: In præsentiarum vero procedere oportet ad explicandas *passiones spasmodicas*, quarum *causa*, sive *materies morbitica* intra *plexus nervos* subsistere videtur.

De plexibus nerveis alibi satis fuse disseruimus; atque ex illorum *descriptione & usu* verisimillimum esse ostendimus *motum convulsivum* paroxysmos graviore intra hæc partes sæpenumero incipientes; exinde quaquaversus in viciniam, & non raro in longinquum propagari: saltem multo probabilius videri, particulas heterogeneas & explosivas; postquam *σπασμω*, ejusque appendicis medullaris tractus superaverint, inque nervorum canales; eorumque ductus, una cum succo ipsos irrigante altius prolapsas, intra *plexus nervos*, velut *compita*, sive *diverticula*, copias explicare, ibidemque aliquandiu *stativa* habere, donec tandem uberius aggeritæ, quasi collectis viribus affectionis spasmodicæ immaniores producant: hoc, inquam, longe probabilius apparet, quam (quod vulgo fit) ex *utero, iene, ventriculo*, aliove viscere vapores elevatos supponere, in quos omnis culpa ex facili conjiciatur: Nam intra *hæc plexus* pro mineriis morbinis spatia satis idonea conceduntur, ut materies illic sensim deponi possit; & manere, donec ad plenitudinem congeratur: deinde vero quia *spirituum copias ingentes*, supra quam in aliis quibuscunque celulis, illic hospitari credimus, *copula heterogenea* iis accrescens in *explosiones* graviore quasi *fomitum* struit; adeo ut spiritus intra hæc corpora explosi ea non modo inflent, & dilatent, verum de *sum elevem*, & *attollant*; (velut cum ædificium à *pulvere pyris* subvertitur) quare partes supra jacentes subito in tumorem effertur, atque appensus huc illuc violenter contrahuntur. Ad hunc modum atrociore circa præcordia & viscera convulsionum paroxysmos sæpenumero excitari, præter argumenta ex ratione petita; non ita pridem *anatomia* comprobatum habui: Cum enim scemina illustrissima paulo ante obitum *afflictibus* (quos dicunt) *hysterici* gravissime laborantis cadaver aperirem, uterum quidem prorsus infontem reperi; verum juxta *mesenterii plexus nervos* (ut videbatur) in molem attolli; & elevari solitos,



visceris istius membranas ab invicem divulsas & foliatas, ut circumquaque humide & laxæ, quasi in bullulas, sive vesiculas inflatae apparent.

Profecto plura sunt rationum solidorum momenta, quibus adducimur ut credamus *pathe- mata dicta hysterica* sæpissime à materia spasmodica intra plexus mesentericos aggesta, & per vices explosa oriri: quod quidem ubi de morbis istis speciatim agemus, clarius patebit: sed nequid minus probabile est, dolores colicos à materia acriori, & irritativa, *isidemp* plexibus contenta non raro procedere. Cæterum quoties *paroxysmi convulsivi à liene*, aut *ventriculo* incipere videntur, utpote quorum initia sunt partium istarum inflammationes, & perturbationes insignes, verisimile est materiam spasmodicam nidum intra plexus nervos ad *lienem*, aut *ventriculum* pertinentes reconditum fuisse: Quinetiam ejusmodi materies, intra plexus cardiacos gravissimos cordis tremores & passiones, intra plexus pulmonicos, aut cervicales, terribiles *asthmatis insulti* excitare videtur. In Neurologia nostra casum insignem perillustri scemina retulimus, cui materies serosa è *synipite per nares* sinistram exstillari solita, *potius* autem decubuerat: ubi cum dolor atrocissimus infestaret, *spasmi* insuper & *contractiones* admiranda succedebant: quibus scilicet modo *cerebri & totius systematis* compages *deorsum*, modo *gutture, præcordia, & viscera sursum* convelli viderentur: cujusmodi convulsiones partes ita oppositas, & longe distitas per vices afficientes, cum ab una eademque morbi sede in medio confita procederent; obvium erit concipere, locum dolentem, uti & affectionis utriusque spasmodicæ originem, fuisse *plexum gangliiformem*, juxta *parotidæ* situm: in quem scilicet nervi tum *paris vagi è capite descendentes* ingrediuntur, & e quo *propagines* in *gutture musculis*, atque rami in *præcordia & viscera* protenduntur. Porro ab eadem causa, scilicet materia *emaciatâ* intra *plexus gangliiformes* aggesta & per vices explosa, istum in *gutture præfocationis sensum* in paroxysmis convulsivis tam crebro excitatum procedere (nec immerito) arbitramur.

Virgo lectissima & piissima, præcæra & gracilis, patre valetudinario, scilicet gravissimis nervoli generis affectibus, obnoxio genita, circa vicissimum ætatis suæ annum cephalalgia valde atroci & periodica, per plures dies affligebatur; instante demum solsticio brumali 1656. dolor capitis remisit, sed in vicem ejus ingens catarrhus, cum sputo tenui & copioso, nec non ulcerosa, narium, oris, & guttæ affectione successit; cum hujus molestiam aliquandiu pertulisset, tandem ex mulieris cujusdam præscripto, sumum succini per tubulum ore excipiens, derepente sanita est: catarrhus nempe subito litescitur, subinde verò conquesta erat de vertigine insigni cum capitis dolore & aurium tinnitu; die tertio cervicis tendines convellebantur, ut caput, modo antrosum, modo retrorsum, modo ad latus deflecteretur, modo immotus & rigidus perstaret. Brevi post hæc totius corporis membra exteriora, & artus ejusmodi affectio spasmodica invasit. Brachia & manus mirè contorquebantur, ut eorum flexiones & convolutiones haud quispiam agyrta aut gesticulator imitari potuerit; crura &

pedes huc illuc divaricare, mutuo concutere, & alternatim transponere necesse habuit: ad hunc modum aut in cathedra sedens, aut lecto commissa, nisi à somno obrueretur, motibus convulsivis perpetuò afficiebatur: cum que summo musculorum uixu membra paululum cohiberet, statim respiratione difficili & anhelosa, cum præfocationis sensu corripiebatur; interim verò oculi, fauces, os, & viscera interiora spasmis quovis immutata perstabant; nec vomitu, rugitu, neque ventris hypochondriorum inflatione tentabatur. Porro animò usque constitit; memoriæ, intellectus, & phantasiæ munia ritè obivit, nihil delirè, aut insipienter loquuta est, aut egit; quin inter stupenda hæc mala verbis utque piis, & probis fortitudinis & patientiæ Christianæ specimen admirandum exhibuit: appetitus cito dejiciebatur, ut cibos & alimenta quævis valde averfaretur; sitis autem continuo urgebat: vires admodum debiles fuerunt, ut nec stare, nedum pedibus incedere potuerit: urina erat coloris citrini, falsedine plurimum saturata, in cujus superficie pellicula tartarea concreviscebat.

Cum sexto agrotationis die ad hanc *Dominam* accesseretur, admirandi istius affectus hujusmodi *Ætiologiam* instituebam: Etenim ne cum multis aliis statim omnia ad *sagarum præstigia* referrem, patris ejus consideratio effecerat, qui in eadem domo passionibus spasmodicis tunc temporis gravissimè laborabat: quapropter ut symptomatum istorum causas naturales investigarem, imprimis obvium erat, suspicari *dominam* illam *hereditaria affectionum convulsivarum* semina contraxisse, quæ tandem circa ætatis suæ *æta* in ejusmodi fructus eruperunt: cum enim sanguis particulis heterogeneis & explosivis plurimum imbueretur, istæ demum (prout in tali diathesi assolet) in caput suffundi, ibidemque affigi cœperunt; primo igitur in *meninges* depositæ *cephalalgiam* immanem & periodicam induxerunt; dein postea eadem materies, metastasi accidentatè facta, in *gula ac uris emunctoria* decumbens, *cephalalgiam* in *catarrhum* commutavit; cum denique intempestivo remedii adhibiti usu *defluxio* sifteretur, materies morbifica in *cerebrum* regurgitans, *vertiginem* intulit, & exinde in *nervosum genus* detrusa, prædictas affectiones *variè* excitavit.

Quod vero spectat ad *rationem formalem*, seu generationis modum, quo materies spasmodica in nervosum genus decumbens symptomata isthac admiranda produxisse videatur: opinari fas sit, quod eadem ab *influxu*, utpote firmioris, confinio in *medullam spinalem* ejusque appendicem detrusa, ac instar fermenti maligni habens, imprimis succi has partes irrigantis massam integram particulis heterogeneis & summe explosivis infecerat; quæ spiritibus per totas eorum series ubique dispositis accrescentes, ipsosque velut cæstro quodam agitantés in explosiones continuas irritabant: revera cum *succus nervosus*, uti dictum est, à materiam spasmodicam influxu ita fermentatur, qui partes continentes alibique blando allapsu irrigaret, atque spiritus animales cum expansione æquabili per easdem tra-



traheret, nunc idem fibras nerveas in varias contractiones, & corrugationes torquebat, atque ſpiritus tum influos, copula nimirum heterogenea onuſtos, à debita irradiatione inhibebat; tum partis cuiusque *infusos* variè exagitant, *aſſatum* velut *diabolico* incitabat; adeò ut appetitus imperio minimè obſequentes, motus inordinatos iniverint, eoſque huc illuc rapide translatoſ, reciprocatatione perpetua iterarint.

Quamvis autem particulæ heterogeneæ & ſanguine in cerebrum luſſuſ, indeque in *genus nervoſum* protruſæ, haud ex æquo nervorum omnium origines, ſed *ſpinalẽ medullam*; ejuſque propagines nerveas præcipuè, ac ſere tantum lubiere; ita ut *viſcera interna*, inſuper *oculi, oris, & faciei* partes ſpalmo quovis immunes perſtarent; ille tamen impetus exploſivus, quo minus à membris exterioribus obiretur, vi quadam inhibitus, illico velut *ignis miſſilis*, qua data via, in *precordia*, ac imi ventris *viſcera* incurſare ſolebat: quia ſcil. *ſpiritus inſus* æſtro quodam pereiti, & ſpatium amplius in quo bat- chareatur exigentes, ab uno loco excluſi, mox alium alicubi patentem ſubeunt; quapropter *aſtrum* illud, ſi tum à membris, tum a viſceribus fuiſſet repulſum, non dubito quin in *cerebrum* regurgitaſſet, *ſurorem* ibi aut *inundationem* quali *epileptico* illaturum. Quæ quidem ſymptoma ab eſſe contigit, eo quod Dominæ tuus ingenioliſſimæ cerebrum conſtitutione timore præditum, & liquore nervoſo recens inſtillato quicquid congruum & ſpirituolum fuerat, in penum propriam tripebat, eoque fruebatur: interim particulas quaſque morbiticas in *ſpinalẽ medullam* deprimebat, à quibus membrorum motus involuntarii, eo quo dictum eſt modo excitabantur.

Præclaræ huius virginis *curatio* nem moliri cõgatus, factæ imprimis levi corporis præparatione, *portionem ſolativam* ex inſuſione ſenna & *rhabbari*, ad ecis *ſaſale citrini*, & ſale *abſinthii*, propinabam, qua duodecies cum magno levamine purgata fuit; die ſequenti e brachio ſinistro ſanguinem ad 3. iii. detraxi, quovis veſpeti opiatum ex aqua & *ſyrupo ſorum verbaſcenti* cum *pulvere margaritarum* exhibui: inſuper ſemel intra ſex horas doſim *ſpiritus C. Cervi*, cum hauſtulo *Jalap. ſequentis* ſumendam præſcripſi.

℞. Aqu. ceraſorum nigrorum, juglaudum, ſorum prænox; an. 3. iij. Antiepilept. Langii 3. ij. Syrupi è floribus prænox maris 3. ij. Margarit. pulv. 3j. Miſc. f. Julapium: quia *purgationem* multam ſerre nequibat, *enemata* ex lacte *ſaccharato* erant crebro in uſu: præter *linimenta antiſpaſmodica cervici & ſpine* applicata; *frictiones* membrorum affectorum cum pannis laneis oleo appropriato inadeſactis, & excalefactis frequentes inſtitui. uſ.

Horum uſu intra ſex dies *agrotans* plurimum alleviari viſa fuerat; nam motus convulſivi ſerè in totum ceſſabant, membra in debito ſitu, & quiete continere potuit, ſolummodo caput contractione leviori interdum huc illuc leniter deſlectere cõgebatur; porro cathedra exurgere, & parum incedere valuit; ſed dum greſſum faceret, non recta, ſed *in latum* oblique procedebat: Hoc tempore diſcedens, eam multo melius habere viſam in manifeſto convaleſcentiæ ſtatu reliqui: poſt alteram veto ſeptimanam,

cum *Borem* inclementior nocturno tempore exortus, fenestra haud firmiter occluſa agrotanti lecto commiſſæ vehementius afflaret, illa ſtatim à frigore ſuſcepto ejuſmodi *recidivam* paſſa fuit, ut non modo *pathematis ſpaſmodici*, verum & *paralyſi univerſali periodica* obnoxia evaſerit: nam deinceps à *maſe* uſque ad *veſperam capiti & membris* (uti prius) huc illuc *viciſſim* flexis atque jactatis, *arum* ſucceſſive omnes circumagere, deſlectere, ac variè detorquere coacta eſt; donec ſub noctem, motibus ejuſmodi proſus ſedatis, *membrorum reſolutio*, ſive *paralyſis* ſuccederet, ita ut nec manus, aut pedes, neque ullam præterea partem movere, aut corporis nixu a quovis morivum exercere potuerit, intra lectu niſtar ſaxi ſerè *in nobiliſſa* jacens; at aliquanto ſomno reſecta, circa *mane* prout *ſaſtatis motibus regularis* virtutem quandam, ſcilicet brachiis & cruribus huc illuc, imbecillius licet, deſlectendis parẽ recuperavit, ſic etiam *motus convulſivi & involuntarii*, per totum exinde diem perdurantes conſtanter redibant, qui *veſperi* tuſus in *arum reſolutionis* commutabatur.

Ex his liquido conſtat, *Dominam* *agrotantem* & duplici morbo, ſcil. *paralyſi* ac *ſpaſmo* laboraſſe, & utriusque *cauſam* *inadeſactam* aliqui tenus diſtinctam fuiſſe: videtur eni. n. quod *ſpiritus animales* ubique ſeatentes, à particulis *narcoticis* onuſti ſere continuo ligarentur: præterquam quod inter dormiendum, una cum ſucco nervoſo, *particula ſpaſmodica* uberti niſ influentes, etiam ſpiritibus accreſcerent, quarum *expulſionibus* ſpiritus incitati motus involuntarios produxerunt; quin & *caput narcoticum* eo tempore aliquatenus excuſſa, etiam voluntarios, ſeu regulares quadatenus peracere valuerunt. Præter remediis modo citata, alia quæ plurima cuiusque ſerè generis, ſcilicet *antiſcorbutica*, *anriparalytica*, *decoctis*, *ſudorifica*, aqua *deſtillata ſpiritus*, *elictres*, *uſtura*, *bilnea*, *linimenta* cum multis aliis ſedulo adhibebantur; quorum uſa ſymptomata nonnihil remittebant; haud tamen morbus integre ſanabatur: *paralyſis univerſalis* brevi cenabat; ita ut omni tempore artus movere, & huc illuc deſlectere potuerit; quin & membrorum *motus involuntarii* eam rariùs moleſtabant; uſque tamen *languida & imbellis* perſiſtit. Cumque illa conſtitutionis tenerioris ac in tabem procliviſ, & nunc quidem nulli exercitio habilis eſſet, ob tranſpirationem impeditam ſanguinis recrementa in *pulmones* depoſita *tuſſim* inſerebant, qua indies ingraveſcente, demum *phthiſica* interibat.

Ante plures annos accerſebat ad *virginem nobilem*, ſimili ſere ritu & aliquanto gravius agrotantem. Hæc enim *capitis & membrorum motus involuntarios*, nempe aut *ſuccuſſiones*, aut huc illuc *deſlectiones*, vel *circumactiones* ſere perpetua vice redeuntes perpeſſa fuerat: in uſper *diaphragmatis*, & *muſculorum reſpirationis* inſufficientium *ſpaſmo* admodum moleſto, & plane ſupendo ſufficiebatur: Etenim quovis horæ minuto; & ſapiùs, *ſpina doſi* circa medietatem uſque ſubito incurvebatur, ſimulque *pectore* antroſum exiſtente, & *hypochondriis* interiorum contrahis, *ſigallus* valde ſonorus; idemque *duplicatus*, inſido *triplicatus*, niſus tamen, & uſque minùs ſtridulus edebatur: per plures horas huiusmodi *motus*, & *ſtridoris*



*Auria reciprocationes* obire solebat, ut per totas *ades* exaudiretur: si quando breve hujus interstitium contigit, illico *brachia & manus*, modo *crura & pedes* valde concutere, aut contorquere, quin etiam *caput* modo rapidissime conjectare, mox cervicem quasi rigidam, & immobilem tenere cogeantur: quandoque inter loquendum *lingua* eo ritu corripiebatur, ut idem verbum sæpius imo aliquando vices ut minimum repeteret: Cum in membris exterioribus motus convulsi fortius urgerent, ab affectu illo *stridulo*, & *singultuoso* aliquantulum vacabat, atque hoc spatium intermissionis, & levaminis sui tempus dicebat, licet interea caput ac membra motibus violentis huc illuc proriperentur: si quando in latus sinistrum decumberet, statim dextri hypochondrii introsum contractio, cum singultu ciebatur: Intra paucos dies hujusmodi pathematum assiduitate viribus plurimum dejectis, tantam in *lumbis & crurum artubus* imbecillitatem contraxit, ut nec stare, nedum pedibus incedere potuerit: *ventriculus* sive *linguore*, sive *spasmo* affectus, quidvis ingestum vomitu reddebat.

In hoc casu, sicuti in priori plane constat, *spiritus animales*, non modò huic aut isti parti vel regioni *insuos* copulam heterogeneam per vices quasdam elidendam contraxisse, sed & *spiritus nervorum* quorundam *insuos*, particulis explosivis imbutos, motus convulsivos perpetuos & vagos intulisse. Cumque ab initio contigit *spiritum* ita affectos, non omnes simul *nervos*, nec quosvis indifferenter, verum *spinalis medulle* appendices, atque ad *diaphragma* pertinentes, fere tantum subisse, ita ut intra horum spatia, *spirituum* continuo explosorum debacchatio limitaretur, propterea quidem accidit, *affectiones spasmodicas*, in una qualibet istarum parte cohibitas, in alia statim ferocius erupisse; cumque ex proprio instinctu, illorum impetus motivus in una regione intenderetur, in altera idem interea remitti solebat. Porro in hac ægrotante *materies morbifica*, particulis tum *narcoticis*, tum *spasmodicis* constans, affectionem una *paralyticam* ac *convulsivam* inferebat.

Die quarto adveniens pharmacum emeticum propinabam, à quo septies evomuit pituitam viscidam, cum bile flava copiosa, sine quovis tamen levamine: die postero sanguinem e brachio detrahebam ad 3vi. exinde statim sanguine versus caput impetuosius raptò, de *cephalalgia*, & *vertigine* plurimum conquesta erat: intra triduum vero *phlebotomia* in pede celebrata, se melius habuit: sumpsit postea remedia nervorum affectibus dicata, scilicet *spiritum C. Cervi*, & *sanguinis pulvere testaceos*, & *bezgarticos*, *julapia*, & *electuaria antispasmodica*: Horum usu symptomata nonnihil remittere visa, usque tamen aliquatenus, juxta typos modo descriptos, perdurabant: Post duas septimanas, ex præscripto mulieris cujusdam fusticæ, cepit sanguinis ex *aure asini* detracti cochlearia sex in haustu cerevisiæ, à quo derepente sanari videbatur: nam motus convulsi illico omnes cessabant. usque per 24. horas immunis degebat: at tamen morbus cum solita ferocia propediem revertens, neutiquam illi remedio, nec quidem facile aliis quibuscvis cedebat: Itaque in posterum cepit *medicamenta methodice* præscripta: semel intra

sex dies blande purgabatur; præterea sumebat pulverem ex *bezoar*, *margaritis*, & *corallis* cum *rad. & sem. peonia* compositum; item *electuarium* ab *Horslio* ad convulsiones hujusmodi admittendum præscriptum; insuper *julapia*, & *decocta* in affectibus *spasmodicis* appropriata: Enemata erant crebro in usu, *frustillines*, *vesicatoria*, & *linimenta* cum fructu adhibebantur: Intra alteram hebdomadam *affectio singultuosa* prorsus cessabat, quin & reliqui motus convulsi, sensim mutiores facti plurimum remittebant: ab istis verò *pathematibus* convalescens, *catarrho* in fauces decumbente, in tantum inolestabatur, ut *salivam acrem*, & vehut corrosivam fere continuo expueret, ac si ab assumpto *Mercurio salivatio* induceretur: quod equidem remedii genus in hoc calu peridoneum fuisse eventus comprobavit: ab eo tamen adhibendo, quia cum ægrotantis, & amicorum ejus venia minime licebat, prorsus abstinebam.

Postquam *spiratio* isthæc copiosa, & valde molesta per plures dies perstitisset, morbus fere in totum sanari videbatur: adeo ut *Domina illustri* motibus convulsivis libera, foras incederet, & viribus, & stomacho valeret: solummodo querebatur quòd aliquoties in die, subito totius corporis horrore circiter horæ minutum afficeretur; qualis etiam affectus quandoque noctu superveniens somnum abrumpebat. Intra mensis spatium, hoc etiam *symproma*, ac insuper *catarrhus* prorsus cessabant: deinceps vero illa interdum *summo acore* in *ventriculo* & *œsophagi ductu*, quandoque etiam in faucibus & *Palato* affligebatur, ut vereretur ne partes illæ cute interiori detrita, diathesi ulcerosam contraherent; porro sæpius in somnis, aliquando etiam evigilans *incubo* tentari solebat. Huic, *vere & autumno* blandam *catharsin* cum remediis *antiscorbuticorum*, & nonnunquam *chalybeatorum* usu adhibendam præscripsi: Cujusmodi methodum tanto suo commodo observavit, ut per plures annos satis rectè valuerit, & etiamnum valeat.

Inter multa remedia, quæ contra istum *palat & œsophagi acorem*, & diathesi quasi ulcerosam sumebantur, præscripti ut quolibet mane *propriam urinam* recens excretam ehiberet; hæc ut plurimum valde fassuginea, levamen ingens conferre solebat: quibusdam vero temporibus *urina* tenuis & copiosa, quæ tamen minime fassa, verum instar *aceti* plane *acida* effluxit, à cuius potu parum aut nihil commodi recepit.

Calus modo descripti *Ætiologia*, priori non multum absimilis videtur, nisi quod in hac ægrotante *particula explosiva*, plurimum nervorum ductus, scilicet præter istos *medulla spinalis* appendices, quosdam insuper *respirationis* muneris, ac per vices quasdam *lingua* motui dicatos subiecit, atque *spiritus* in ipsis scatentes *astrotere* perpetuo affecerint.

Quod autem morbi hujus solutio per *humoris acerrimi* in *oris & gula immutiora decubitus* contigerit, hinc colligere licet, hujus *cussam materiam* fuisse *particulam heterogeneam*, & quasi *nitrosam* in sanguine progenitas; quæ cum exinde, *cerebro trajecto*, in *nervorum genus* deferrentur, *pathemata prædicta* intulerant: quamprimum vero remedium ope liberior itius *materiæ* proventus inhiheretur, atque *particulæ morbificæ*



fica jamjam producta, tum a sanguine, tum a cerebro & succo nervoso in illa capitis emunctoria derivarentur affectus convulsivi statim remittit, atque intra breve tempus, tali cunctis usque perdurante, morbi solutio perfecta sequebatur.

Quandoquidem *urina*, ex se plurimum *salsa* & quasi *livialis*, per vices quasdam *acetosa* evalit, quæ contra *gula* *acorem*, non uti prior, juvamen præstitit: hinc colligere datur, *sanguinis* & *humorum* particulas salinis per *urina* decedentem *duplicem statum*, nempe *fixitatis*, & *fluoris*, subisse; quare *serum* iis imbutum, modo *hujus*, modo *illis indolis* extitit: videtur enim quod particula salinæ intra massam sanguineam degeneres, *fixiores* manent, & *urina* plerumque *livialem* reddunt: quæ tamen extra sanguinem in succo nervoso secatent, aut circa *partes solidas* deponuntur, in *fluorem*, sive *acetosum* degenerant. Itaque ab *his* in *oris* emunctoria derivatis, in ignis ille *oris* & *æspis* *acore* procedebat: potto cum ejusmodi particula in succo nervoso ac *partibus solidis* ad plenitudinem aggestæ turgescerent, ac fluxione oborta in *sanguinem* & *ulcerant*: hæc statim exinde confertim per *renes* amandata, *utramque* quantitate auctam *acetosam* reddebant. In quantum vero *particula salina*, diverſi *status*, ac minime quæ sunt ejusdem, invicem commissa, in se mutuo agunt, & vires suas refringunt, idcirco *urina* *salsa* ac neutiquam *acetosa* *gula* *acorem* sanabat. Experimento satis vulgari constat *spiritum vitrioli acerrimum*, *salis tartari* aut *cujusvis alius livialis mixtura* plurimum *miscere*: quinimò & *humorem acidum* in *Domina* *hujus oris* & *gula* partes exudatum, prope ad *aceti calcantibus* indolem accessisse inde constat, quia *nicotiana fumus* ægrotantis ore acceptus mire *dulcescebat*, prout nimirum in quibusvis a *vitriolo præmixto* allolet.

Quoniam hic de *convulsionibus admirandis*, quæ non passim eveniunt, & quarum *natura* & *causa* in abstruso latent, agimus; pro meliori ejusmodi affectuum illustratione, libet hic *casum* adhuc *novum* & *alterum*, & prioribus haud minus stupendos proponere.

Decem abhinc annis, *nobilis* cujusdam *filiam* ad motus *convulsivos* eo ritu incitatam, ut nonnulli eam a spiritu malo obsessam putaverint, invisebam, *Virgo* hæc 16. circiter annos nata, pulchra & *temperata*, patre tamen paralytico progenita, sine causa evidenti, circa *brunna solstitium* male habere cepit: primo per aliquot dies *cephalalgia* & *vertigine*, haud gravi tamen modo afficiebatur; deinde in brachio uno, & mox in altero *tremorem*, & subitam *contractionem* persensit; ejusmodi spasmi isto die sæpius repetentes, vix punctum temporis durabant; postridie juxta sororem suam in cathedra sedens, subito exiliens, saltum unum & alterum, multosque alios successive ad distantiam plurimum pedum mira agilitate periciebat; dein cum cameræ extremum limitem attigit, aliquandiu in eodem loco, & qualibet vice ad miram altitudinem saliens præstabat; cum saltationi ulteriori curæ deficerent, in terram concidit ac statim caput cum mira violentia huc illuc conjecit, quasi illud collo excuteret: quamprimum ab hoc motu præ lassitudine cessaret, statim manus, & pedes idem furor invasit, ut necesse haberet membra hæc parietes, aut postes percutiendo,

vel pavementum contundendo validissime exercere: Quando ob pudorem, ut verecundiam amicis aut altantibus debitam, se magna vi ab his motionibus cohiberet, (ulque eam animo continebat, & sobrie loquuta erat) statim affectu interius transmissio, insigni cordis oppressione, cum gemitu, & singultu valde stridulo plurimum intestabatur; dein cum se relaxaret, statim cæstro ad artuum exteriorum musculos transmissio, aut saltare, aut caput, vel brachia immaniter huc illuc conjicere, aut etiam in camera rapidissime cursitare, vel humum pedibus contundere cogebatur; quippe hujusmodi vehementes *artuum*, aut *viscerum commotiones*, affectus *tragædiæ* velut in orbem revertente, se mutuo excipiebant.

Die quinto a quo hæc *domina* primo ægrotaverat adveniens, vomitorium ex *infusione croci melleæ*, *vinis scilicet*, & *sale vitrioli* propinabam, a quo septies evomuit bilem æruginosam in magna copia, cum admittance humoris acerrimi, & quasi vitriolici: postridie *sanguis* è vena *saphena* ad  $\frac{5}{8}$  x. detrahebatur; præterea fumebat bis in die *antidota* ex *pulveribus lapidum pretiosorum*, *cranii hominis*, & *rad. pæonie maris*. Horum usu intra septimanam sanari visa, per plures exinde dies affectionibus prædictis immunis degebat: Attamen post binas hebdomadas, instanti plenilunio, ejusdem morbi recidivam solito atrociorum patiebatur, nam præter *salutem* *admirandos*, *capitis* & *membrorum contorsiones*, *convulsionisque* vehementes, insuper intra cubilis spatia *cursum* huc illuc rapidissimum iterare cogebatur. Cepit hoc tempore, ex aliorum præscriptis, *remedia antihysterica*, & statim quibusdam intervallis *purgantia*, sine quovis tamen juvamine: Denuo accersitus, siquidem robusto corporis habitu, & spirituum effertione insigni prædicta videbatur, *emeticum fortius* propinabam, a quo decies evomuit bilem instar æruginis viridescentem, cum pituita instar aquæ stygiæ acerrima, & subito alleviabatur: Exhumi posthæc quovis mane, *haustum vini albi* cum *aqua cerasorum nigrorum* dilutum, *asellis* *confusum* superaffusum, & fortiter expressum: Horum usu statim curari visa, per mensem & amplius integrè valebat: Cumque postea affectus redituri quævis præludia unquam persensit, mox vomitorii & ejusdem *millepedum expressionis* usu morbi insultum avertebat: Intra tres menses sanitatem pristinam ita recuperabat, ut plures nunc annos affectionibus ejusmodi spasmodicis immunis degeret: attamen a quo tempore pathemata convulsiva prorsus cessarunt, quandoque circa *oris* & *gula* partes *humoris acidissimi* ac instar *slagmatis vitriolici* defluxione afficiebatur: Insuper interdum *malicia* & *pice*, aliquando etiam *russi*, cum *spuio decolori phibis* nunante obnoxia fuit, quæ tamen remediis in ejusmodi casibus usitatis facillè sanabatur.

Quod spectat ad prædicti casus *ætiologiam*, non est cur vereamur hujus morbi, & symptomatum causas, ad *particulas explosivas sanguinis* (cerebro usque impune trajecto) in *genus nervosum* continuo suppeditatas referre: quæ siquidem copia ingenti suffusa, intra privatas mineras tantum per vices elidendæ, minime coercerentur, *spiritibus* ubique tum *insitis*, tum *insitis* accrescentes eos, velut cæstro afflatos perpetim



explodi, & per manipulos huc illuc inordinate elferri cogebant: ita nimirum ut intra partes continentes paulatim regulari nequirent; quia eos in petuose tumultu. ntes, & hic illic, turbis instat, corripit aptos, exercitio valido, ac admodum violento subigi, & perdomari opus fuit: Revera in hac ægrotante non aliter res se habuit, quam in *organis musicis*, quæ si vento nimis insufflato supra modum impleantur, ni statim plures fistularum aperturæ recludantur, brevi totius machinæ compages concutitur, ac in partes dissilire periclitatur: pariter in hac domina cum spiritus animales nervorum quorundam ductus, & fibras appendices astantes, ultra debitum tenorem exagitantur, necesse erat eorum impetus, dum corpora nervosa supra modum instarent, in motus locales una plures & vehementiores impendi: quapropter cum eorum rabies ab una parte cohiberetur, mox uti ventus oclusus alio se proripiens, in quadam alia parte violentius erupit.

In hac ægrotante vomitorii usus semel, atque iterum juvamen præstitit, eo quod *cylis fellea*, quæ & *glandulis* & *emuntoriis*, quæ circa coctionis viscera confita sunt, hoc modo inanitis, *sanguinis* & *succi nervosi* purgamenta in eadem copiosius allicerentur: propterea quidem, ut spiritus animales intra ductus nerveos affectos scärentes, ab iis nunus inlicerentur: Hac ratione etiam *succum asellorum* profuit, quatenus materiam morbificam è *nervoso genere* ad *viæ urinariæ* derivavit: Præter hæc remedia materiam morbificam *radicem* & *ramos* magna ex parte amputantia, cum & alia velut *antidota*, ejus *vegetationem* ubique inpedientia sedulo adhiberentur, quicquid ejus reliquum fuit, natura denum superior facta (solita in his casibus *causæ*) ad *oris* & *gule* emuntoria ablegabat.

Dum hæc scriberem, *virginem* illustrem invisebam, quæ aliusmodi moribus convulsivis, usque universalibus, & non minus admirandis afficiebatur: Hæc circiter annum a tatis *id. ætate*, venusta, & antehac sana, cum grassante in hac vicinia *pestilentia* ejus contagii periculum incaute subiret, in *terrorem* panicum, cum crebra *leipthymia* incidit: sequenti nocte, tanta spirituum deliquia, & *anxia* passa erat, ut planè moribunda videretur: isto tamen malo ægrè eluctata, deinceps quolibet die *paroxysmos convulsivos*, horis tamen primo incertis, & sub specie multiformi redeuntes habuit: verum intra breve tempus morbi accessiones regulares factæ, *hæc* in die, scilicet *hora undecima* ante, & *quinta* post meridiem, constanter repetebant, ut nulla febris intermittens periodos suas exactius servaverit: quin & singula *paroxysmi* accidentia simili ritu quotidie obtingebant.

Cum per tres septimanas hoc modo laborasset, quodam die accersor ut symptomata quævis ac integrum morbi typum advertere possem: Hora decima matutina lecto excitata rectè valuit; vultu, incessu, colloquio optimè se gessit, ut nullus tam quoquo modo ægrotare suspicaretur: hora undecima de *lymphæ plenitudine* & *spirituum torpore*, cum *levi scotomia* queri cœpit; mox in *hypochondrio sinistro* *pulsationem* insignem, & quasi vivi animalis exsultationem pensens; hunc motum lateri manum meam admovens plane percepi; dein *pandiculationis* & *rugitus* suc-

cedebant; quo factio, illico ad lectum ducebatur, & ancilla super pulvinar sedenti tenenda tradita est: Hæc ægrotantem in gremio suo, brachiis circa medium corpus ejus complicatis, durante paroxysmo arctissime constringit: insuper præsto sunt ministræ, affuesque adstantes, quæ modo ejus *brachia* & *manus* cohærent, modo *ventrem* & *hypochondria* in molem ingentem elevata, & sursum nitentia comprimunt. Præcipua morbi symptomata, quæ vicissim excitata, serè totum paroxysmum dividebant, erant hæc duo, scilicet modo *immanes viscerum spasmi* infestabant, ita ut abdomen in molem ingentem assurgens obtentis altantium manibus contraheretur, ut vix, ac ne vix comprimi potuerit; simulque *præcordiis* sursum contractis, cordis & sanguinis motus pene litterentur: quo temporis spatio virgo hæc caput reclinans, cum pulsu diminuto, & serè nullo *spirituum*, & serè insensibilis jacet; post duo aut tria horæ minuta hi spasmi cessant; & dein ægrotans sese erigens, alacriter circumspicit, & aliquandiu morbi impetum in *colliquia* & *canulenas* convertit, quorum utraque lepidissima, & supra propriam indolem elegantissima indefinenter effundit: ejusmodi estatis, & dæsteriis adstantes quosvis prosequitur, ut nihil uspiam in *comædia* facetius occurrat, dein *harmonia modulis* suavissimos, & jucundiores quam aut alius quispiam potest, aut ipsamet alio tempore profert: postquam ita jocando, canendoque circiter sex aut septem horæ minuta transegit, denuo viscerum & præcordiorum spasmos, & *æquum*, uti prius incurrit: atque his brevi remittentibus, spirituum *ipso* a nervis inferioribus in cerebrum resiliens, denuo *loquela cantusque* facetiis impenditur; quoties cum adstantibus colloquitur, si quid ab his acerbius aut ignominiosum reponitur, illa viscerum spasmos graviores & diuturniores subit: Ad hunc modum, scilicet alterna *viscerum* & *cerebri* affectione circiter horæ unius spatium molestari solet; dein paroxysmo versus finem vergente, viscerum spasmi leviores facti ter aut quater cum minima intermissione repetunt: dein his in totum cessantibus, morbi impetus, in membra exteriora erumpit, unde statim penitus evanescit; nam brachia & crura per horæ minutum contracturas, subsultusque patiuntur: illico dein ægrotans excitata, e lecto descendit, omni spasmo, uique dum novus redit paroxysmus, immunis, quæ & viribus mediocriter valens, circa *ædes* obambulat, & durante affectus intersticio consueta vitæ munia alacriter obit, excepto tamen quod stomachus languescens toto die alimenta fastidit, vesperti post secundum morbi paroxysmum modicè cœnat.

Hic præfens morbi status est; in cujus paroxysmis quarundam facultatum *usu illustrior*, aliarum *anomalias* quadantenus compensare videtur: Verum circa ægrotationis initia paulo secus habuit; quippe viscerum spasmi longe graviores fuerunt, usque *anxia* adungebatur: illorum insuper interstitia, *fabulatio absurda*, *canina incantimmi*, quin & *risus*, aut *sternus*, ratione haud conscia erumpentes, excipere solebant: nunc autem spiritus animales in explosiones diuturnas coacti, eas tam regulariter modo hæc, modo illac, qua data via commodior, peragunt,



gunt, ut quodam modo *rationis & voluntatis* imperio heri videantur.

Itaque ut juxta nostram *hypothesin* hujusce affectionis *Ætiologiam* institutus, videtur imprimis quod *timor vehemens*, spiritus *cerebri & precordiorum* incolas in magnas *utrimque* adegerit; ita ut istis extra ordines suos perturbatis, & amentia quædam, & leipothymia crebra succederent. Porro suspicari licet ab eadem impressione *cerebro* ipsi noxam illatam fuisse, ita ut conformatione ejus nonnihil vitiosa, particulæ heterogeneæ & morbificæ, unâ cum succo nervoso admitterentur: dein licet spiritus ab initio confusi atque perturbati, post breves inordinationes sese denuo recuperarent & functionis tum animalis, tum vitalis solita munia exequerentur: attamen ob labem *cerebro* impressam particulæ heterogeneæ constanter admixtæ spiritibus accrescentes, dumtaxat explosivas inducebant; quamprimum enim spiritus copula extranea ad plenitudinem saturantur, ad ipsam excitendam, sive elidendam irritati, explosiones spasmodicas imitant.

Circa *morbi principia*, cum & *cerebri*, & *spirituum* incolarum diathetis à noxa recens suscepta magis perversa & vitiosa esset, copulæ heterogeneæ plenitudo citius contigit, proindeque explosio ejus crebrius & inordinatius succedens, cum majori tumultu peragebatur, postea vero cum regiminis animalis noxa remittente, istius copulæ, non secus ac liquoris nervosi supplementa æquali dimenso quotidie ingerebantur. spirituum explosiones regulares mitioresque factæ, iustas observabant periodos.

Quod ingruente paroxysmo in capite plenitudinem, ac velut inflationem, cum spirituum corpore & *scotomia* agrotans persensit: ratio est, quoniam hoc tempore spiritus *cerebri* incolæ, jamjam in explosiones parati, primo exagitari, & velut turgescere solent; dein pulsatio ista in sinistro hypochondrio successit, in quantum spiritus *plexus fibrarumque nervosæ* circa lienem densissimè confitas incolentes explodi incipiunt; postea cum spiritus intra *plexus* tum *mesentericos*, tum *cardiacos* scitantes, una exploduntur, istæ *abdominis & thoracis* elevationes, & quasi *subtus* inducuntur: cumque in hac affectione *cordis & sanguinis* motus ferè in totum sistuntur, ideo *pulsus* diminuitur & ferè nullus, cum *aqua* & aliquali *viscositate* evadit.

Remittente *viscerum & precordiorum spasmo*, garrulitas & canis succedunt, quia spirituum adhuc explosorum *paræ* è *nervoso* genere in *cerebrum* facta, *spasmos* in *phantasia exaltationem*, & promptiora phantasmatum exercitia commutat. Quamdiu spiritus intra *cerebri medullium* regulariter ac ordinatè exploduntur, facultatum & habituum actus tantum nobiliores, & quasi suprà naturæ vires & tenorem eduntur, prout in hac agrotante: è contra autem, cum in ista regione spirituum explosiones inordinatæ contingunt, ut plurimum amentia, aut saltem potentiarum istarum exercitia incongrua, ac absurda peraguntur.

*Viscerum spasmi & actiones phantasticæ* sese mutuo & alternatim excipiunt; quia scilicet spirituum copiarum ad explodendum dispositæ, velut undulatione *directa & reflexa*, tendentiam suam modo in hanc partem, modo in istam vicissim

faciunt: dein ultimo, cum ferè omnes exploduntur, *viscerum spasmi* crebriores excitantur: cumque explodendorum manipulus tantum exiguus superest, ille denuo tum a capite, tum a visceribus exclusus, in *spinali medullam* excurrit, ultimosque morbi impetus in *brachiorum & crurum* convulsiones impendit.

In hac casu difficultas adhuc insignis restat, quare morbi hujus *paroxysmi*, cum in istis semper horis exacte repetant, periodos tamen adeo inæquales habent; nimirum ut accessio prima tantum sex horas antecedit secundam, & dein secundæ reditus ad primam non nisi 18. horarum spatio contingat. Propter hujus solutionem supponendum erit paroxysmos istos pendere à *liquore nervoso* partibus heterogeneis ad plenitudinem repleto; quæ particulæ huic e *massa sanguinea* omnino convehuntur, atque sanguis eadem e succo nutritio a visceribus suppeditato imbibit. His ita suppositis, considerare oportebit quo temporis spatio *massa sanguinea* particulis istis morbificis saturatur, & dein quali dimenso eas in *liquorem nervosum* suffundit. Super his, in agrotantis hujusce casu, ut melius constet quo ritu habet, sciendum est, eam in toto nycthemero unica tantum vice victum plenum assumere: nempe paroxysmo secundo finito circa horam septimam mediocriter coenat, reliquo die appetitu carens, vix quidquam alimenti ingerit; itaque probabile est *matrem morbi*ficam, una cum *pene nutritia*, potissimum tempore nocturno in *massam sanguineam* suffundi; idque uberius quam ut totum exinde statim in *liquorem nervosum* derivari possit: particulæ heterogeneæ, quæ primo e *sanguine* recens saturata in *liquorem nervosum* convehuntur, ad plenitudinem aggestæ paroxysmum primum excitant; cuius accessio ideo diutius protelatur, quoniam & spatium unum requiritur, quo *sanguis*, & dein aliud quo *cerebrum & nervi* impleantur: post exactum hunc paroxysmum, quia sanguis adhuc satur, plures alias ejusmodi particulas in se continens, eas succo nervoso e vestigio suffundit, ideo paroxysmus alter sub triplo istius spatii quo prior, inducitur: hoc autem finito, quia tum *massa sanguinea*, tum *succus nervosus* sarcina sua profus liberantur, agrotans melius quam alio quovis tempore se habens, alimenta satis avidè capessit; deinceps vero, cum ad paroxysmum proxime sequentem primo *massa sanguinea*, & tunc *succus nervosus* materia morbifica saturari debent; ideo *gemino* huic *pensi* horæ octiduum requiruntur; siquidem vero ad secundum paroxysmum tantum opus est particulas alias e *massa sanguinea* adhuc plena, in *liquorem nervosum* derivari, ideo huic effectui spatium longe minus, sex scilicet horarum sufficiat.

Postquam hanc *Dominam* per plures septimanas ejusmodi paroxysmis periodicis laborantem, denuo inviseram, præcepi ut tres horas ante secundum paroxysmum, *sanguis è vena pedis* ad 3 x. detraheretur, quo factò accessio vesperti expectata, profus eam deseruit, neque unquam postea reperebat; alter vero paroxysmus pristinam vicem observans quotidie redibat, donec phlebotomia paulo ante accessum ejus celebrata, patiens isto die morbo immuniis perstitit, qui tamen postridie rediens, juxta eundem typum eam per plures menses exercuit: interim illa,



illa, quia brumæ frigus gravissime urgebat, remedium usum aliquandiu distulit: attamen inveniunt vere, Illustrissima *Dominus Oxoniensis* adducta sequenti methodo sanabatur.

Imprimis hoc catharticum exhibui, atque sexta aut septima quolibet die idem repetendum curavi.

℞. Sulphuris Antimonii gr. vi. Mercurii dul. ℥i. Resin. Julap. gr. iv. Zinziberis gr. vi. simul terantur in marmore, dein addendo conservæ violar. 3j. f. bolus: bis aut ter vomitum, atque tres aut quatuor sedes provocare solebat. *Catameniorum fluxus* ei itatis temporibus in magna copia constanter eveniebat: quare cum sanguis valde copiosus, & calidus videretur, medio inter periodos menstruas tempore *phlebotomiam* bis aut ter instituebam: porro singulis, quibus à purgatione vacabat, diebus cœpit bis in die quatuor *pilulas masse* sequentis, superbibendo haustulum *Julapii* infra præscripti.

℞. Radicum pœoniæ maris 3ß. Serpentariæ virginianæ, contrayervæ, dictamni cretici, an. 3ij. Cranii humani præpar. 3iß. Ungulæ aleis 3j. Corallii rubr. præpar. Margarit. pulv. un. 3j. Salis absinth. 3ij. Salis corallii 3j. cum f. q. Syrupi de floribus pœoniæ maris, f. massa.

℞. Aqu. florum pœoniæ maris, cerasorum nigrotum, juglandum, an. 3iv. Aqu. Antiopilepticæ Langii 3ij. Syrupi de floribus pœoniæ 3iß. Caltorei nodulo ligati & in vitro suspensi 3j. Misc. f. Julapium.

Quando pilulas fastidire cœpit, iis omisissis sumpsit bis in die, scilicet primo mane, & sero vesperti circiter 3j. Pulveris sequentis in cochleari Julapii, superbibendo 4. aut 5. cochlearia ejusdem.

℞. Lapidis Bezoar, utriusque succini albi, Margaritarum præparat. Corallii rubr. an. 3j. Cranii humani 3ij. Rad. serpentariæ virginianæ, sem. rutæ, an. 36. Misc. f. pulvis, capiat 3j. Mane & vesperti cum dosi Julapii supra præscripti.

Dein cum & hoc medicamentum radio esse cœpisset. Pilular. aut etiam elixiris proprietatis, quandoque etiam per plures dies *sp. C. C.* usus succedebat. Postea deinum ab isto pulvere aliquanto spatio quotidie assumpto juvari cœpit.

Interea dum hæc medendi methodus instituitur, capillitio deorsum, caput tenui solum amictu cooperiebatur. *Emplastrum hystericum*, cum Galbano admixto super abdomen gestavit; pro poru ordinario bochetum ex *sarsa & china*, rad. pœoniæ maris, aliisque appropriatis in aq. fontana infusis, & decoctis bibebat. Intra mensem paroxysmi aliquantulum remittebantur, dein mitiores sensim minoresque facti tandem ferè in totum cessabant: nisi quod instante *catameniorum fluxu* ejusdem morbi insultu uno aut altero affici solebat, porro vertigine ferè constanti & anorexia laborabat. Media æstate bibit *acidulas Astropenses* per sesqui mensem, & perfectè convaluit.

Quod vero spectat ad Therapiæ rationem in genere pro convulsionibus ejusmodi admirandis adhibendam, non facile erit aut remedia morbo huic *Herculeis* paria, aut curationis methodum certam & crebris experimentis comprobatam assignare: præterquam enim quod casus isti similes raro occurrunt, insuper observare

est, quod eadem medicamenta, quæ huic ægrotanti hoc tempore profuerunt, alteri, aut eidem alio tempore adhibita, ne hilum juvarent: cujus ratio videtur esse, quod morbi causa in *succi nutritii dyscrasia* consistat, qui liquor non uno semper eodemque modo pervertitur; verum à multiplici *salium* ac *sulphurum* combinatione indolem variis moris, ac generis morbidam adipiscitur, eamque subiade commutat: quapropter in gravissimis ejusmodi affectibus, *medicamenta* haud *vulgaria* & ex *pharmacopeia* deprompta, sed *magistralia*, & pro re nata, juxta symptomatum admirandorum apparentias præscribantur. Vomitus lenis, purgatio, & phlebotomia imprimis celebrari, ac aliquoties prout opportunum videbitur, iterari debent. Quoad *medicamenta* autem *specificæ* ac in calibus istis appropriata, cum præcipua indicatio fuerit, *succi nervosi* crasin emendare, plurima tentare, & ab effectu eorum virtutes rimari liceat: itaque experiri fas sit, quid remedia *sale volatili* aut *armoniaco* prædita efficiant. In hanc rem *sp. & saler C. Cervi*, *sa. guinis*, *suliginis*, *flores & spiritus salis armoniaci* assumantur: His nihil juvenitibus ad *chalybeata* deveniendum est, *sintura & solutiones corallii*, ac *antimoni* præbeantur: ejusmodi medicamenta in tali dosi & forma, & tam crebra vice exhibeantur, ut ex iis *alteratio* quædam toti sanguini & succo nervoso inducatur: porro si talibus deerit successus, ad *alexipharmaca*, quæ contra *venena & malignitatem* humoribus impressam juvant, procedere oportebit; scilicet ex his *vegetabilium decocta*, *destillata*, *pulveres*, *conservas*, *aliæque præparata* instituire, & alia cum aliis varie componere, & diversimode administrare. Verisimile est, quod ejusmodi medicamina, quæ *demorsis à vipera*, aut *cane rabido*, etiam quæ contra *aconita & toxica* ore assumpta prodesse solent, etiam in convulsionibus supradictis ex usu esse possunt. Lucebit hic, juxta exemplum *Gregor. Horstii* in tractatibus suis de morbo convulsivo maligno, item de convulsionibus admirandis, remedia *magistralia* sub forma *electuarii purgantis*, item *pulveris & antidoti convulsivi* præscribere, eademque ex *simplicibus* partim *alexipharmacis*, partimque *antiepilepticis* varie componere. *Thom. Willis. de morb. convuls.*

Filiolus quidam ferè quadragesimo ii. Junii 1673. conqueritur de tumore circa colli vertebra, qui in dies augebatur, variis cum symptomatibus, calore summo, siti, vigiliis, anorexia, alui constipatione atque inquietudine, 13. Junii hora 4. pomeridiana. Convulsionibus corripitur, ut ut generosa adhibuerimus medicamenta; rediere tamen illæ horis 8. & 11. nocturnis, quartæque natutina (ad eam certas servabant Periodos singulis 4. horis) postremæ omnium erant sævissimæ, ut in illa lucta naturæ, cum malo disrumperetur sponte sua maturum & virulentum apertum, è quo fœdissima effluxit sanies, quo facto statim cessarunt convulsionibus, Deoque propitio, cui laudes, puer rectè convaluit habendus satis vegetus.

Scholion) Observatio hæc stabilitur ratione & verbis *Cl. Willis de morbis convulsivis cap. i. p. m. 12.* ubi convulsionis causam tribuit sanguini, impuritatem aliunde accipienti, inquietis: Ita ut magnis viscerum impuritatibus, ac præcipuè cum partes aliquæ abscessu aut ulcere virulento vel



vel fermento noxio afficiuntur, è talibus enim numeris particulæ noxiæ in sanguinem ebulliunt, ejusque commoatu postea in cerebrum deponuntur. Idem ibidem p. m. ij. scripserat; Novi quibus à humore vel ulcere in mesenterio, utro, alijque visceribus existente convulsiones cum in parte affecta, tum circum circa eam increbescere solebant: cuius ratio non videtur aliunde petenda quam à particulis heterogeneis in loco affectu uberius congestis, quæque simul in fibras nervæ per totam viciniam consiliis irrepentes, in motuum convulsivorum, veluti pulveris pyris igniendi fomitem suppeditant: At verò spasmus ob tales causas oriundi haud sese solum longe lueque diffundere, neque semper ad caput ascendere. Qui ibid. pag. 7. meminit ab ulcere in cuiusdam brachio excitato musculi tendinem prorsus nudatum fuisse; qui cum specillo Chirurgico tangeretur patientem rigore quodam in toto corpore & convulsione illico oborta, aliquamdiu inhorruisse. Nec admodum abluat *πλάσι ἀντιζήδιον* Clar. Sennerius noster, quando *Prax. l. i. p. 2. c. ii.* docet, ex vulnere, capitis fieri convulsiones: ubi præcipue hanc addit causam: quia, inquit, à sanie collecta membrana & nervi vellicantur. Quod ante 5. annos observavi in Rustico Rosbacensi 26. annos nato, qui ab amico per imprudentiam in sinistris temporibus sclopeti globulo vulnerabatur, ubi pars globuli cum aliquot cranii particulis, posticæ cerebri parti ingebatur: Inde homo 17. die post inflicti vulnus spasmò maxillæ inferioris corripiebatur 19. verò die convulsionibus obiit, in cuius apertione materia purulenta in loco affecto cum dictis cranii & globuli particulis inveniebatur. Curationem convulsionis ab apostemate proponit *Forestus 60. observat. 120.* in Schol. hisce. *Curetur apostema, & præ omnibus dolor sedetur unclionibus, emplastris anodynis & membrum ponendo in oleo tepido communi, vel huius rei apto. Et oportet magnam rationem habere originis nervorum, usque oppositis temperatè calefacientibus & humectantibus, & agrum in tinam olei communis tepidi immittere poteris, si commodum videatur; & febres, si adsuerint, admittant, &c.*

De morbi causa accuratè ut omnia Oculatissimus noster *Argens*, sed de periodorum stabilitate addendum videtur, Naturæ frequentissimum esse, morbi modum moresque in quarto prodere, 2. *Aphor. Hippoc. 19.* præsertim in convulsionibus, quod passim constat, & illustri exemplo confirmatur in *Scorzonera mea p. 95.* sic variolæ, sic morbilli & petechiæ quarto plerumque proderunt, & ut breviter totius historiz summam, præsertim in variolis ostendam, tribus quatrividuis aut 4. triduis plerumque absoluitur eorum periodus, in primo maxima humorum malignorum invalescit effervescencia, & convulsionibus est temperanda, in secundo pustularum efflorescit intumescencia, quæ blandis diaphoreticis promovenda, suppurascencia autem, quæ in tertium quatrividuum incidit, Naturæ committenda & providis adstantibus, ne quid impediementi naturæ benè agenti afferatur. Quarto judicantur peracuti, nec quartus est index septimi, quod dicti aphorismi interpretes quidam cum Galeno autumant, sed non ex septem diebus, vel cuiuslibet septimanæ quartus qualis ex mente *Hippocratis*, est etiam 11.

manifestis signis futuram morbi historiam vel longam vel brevem denuntiat; Sanguinis stillæ in quarto sunt tunellæ, & febres ac vomitus vulneribus capitis in quarto supervenientes, quarto febris puerperarum lactaria oritur, 4. quaque septimana menses prodeunt, quarto mensis Embryo movetur, quarto trimestri in lucem editur, vel septem quadragenariis i. e. diebus 180. &c. Oculatioribus causam huius rei intimius eruendam propono. *Georgii Franci.*

Dixit equidem Artis nostræ Atlas maximus, *Com. V. Aph. 2.* *ἡ πρὸς τῷ κρανίῳ ἐκτατικὴ ἰσχυρία* Verum non adeo iuremus in magnitri verba, uti quidem videri possit doctissimus *Bernh. Langwedelius* in *Hippocr. defensione*: nec adeo illum rejicimus, uti *Clar. Georg. Fridericus Laurentius* in *Exercit.* (quorum enim ista litigia & iconiata:) sed credimus sapientissimi num le-nem locutum *ἢ ἢ τὸ πλῆθος*: nulla enim sine exceptione regula *Joh. Valenti. Ebrin. Ann. 12. von Westhofen* in *Palat. inferiore 1675.* ipsa ætate (dum inter imperium Germ. & Gallicum gliscebatur bellum) a Gallo quodam perfido, cui hodogetæ officium præbebat, fraudulenter minoris sclopeti globulo pone tempora dextra tribus transveris digitis supra aurem trajicitur, ut octo vel decem ossicula tracta inde tuerint exempta à perito nostro Chirurgo *M. J. P. Wiclerio*. Homo accepta plaga ab equo cecidit, pro mortuo spoliatus relinquebatur ab interfectore. Verum semi-animis dein inventus, resectus atque (quæ Dei singularis fuit Clementia) curatus fuit feliciter à laudato Chirurgo, cui præerat Nobiliss. *D. D. Steigernus Medic. ordin. Elect. Nofodsch. & Poliat. Heidelberg.* Amicus Suavissimus: utut æger magnas easque repetitas passus fuerit convulsiones, cum aphonia 8. dierum, & notabili deperditione ipsius substantiæ cerebri; adeo ut ex eodem extraxerit reliquias globuli cum adhærente theca papyracea (*von der Patrone*) Chirurgus noster. Homo vivit adhuc cætera sanus; nisi quod à potu generosiore citius ac alii deliret, ac ebrius reddatur.

Scholium.) Similia vulnerati cerebri cum particulæ ejusdem deperditione & convulsione exempla, præter aliorum à *Scherchio lib. 1. observ. Medic. citatorum*, etiam habent *Sachsus noster Ephem. N. C. ann. 11. observ. 119. Timæus lib. 6. cap. Med. 17. & Cabrolus observ. 161.* Hinc, si *Hippocratem* salvum velimus, idem quod paulo supra ex *Galeno* notatum fuit, hic repetere tenemur, ipsum nempe *sect. 6. aph. 18.* Vulnerum lethali-tatem non solum de iis prædicare quæ necessario, suapte natura, & semper, sed etiam quæ magna ex parte lethalia sunt; idque de cerebri vulneribus, *lib. 1. de morb.* inter lethalia primo loco positis, non obscure edixit *Coac. prænot. ἀνδρὶν ἡνίκα ἡνίκα, &c.* Ex vulnere ferè mors contingit, si cui vulneratum fuerit cerebrum, & vertente sic *Foesio*, & clariùs *Prorrh. 2.* inter *ἡνίκα ἡνίκα ἡνίκα, quæ magis lethalia sunt*, sive uti idem *Foesius* interpretatur, fere mortem adferunt, illa quoque recenset, quæ cerebrum læserunt, addens, quæ sanè magnam quidem perniciem afferunt, non eam tamen ut (quod quidam existimant) nemo ex his servari possit. Id quod etiam de convulsione vulneribus superveniente *Galenus commun. sect. 5. aph. 3.* edixerat, *τὴ δυνάμει* idem esse scribens ac periculosum, ita ut convulsio ista ad mortem



capius terminetur, non tanquam ex necessitate ac semper mortem afferens, sed tanquam admodum crebro. *Georgii Franci.*

Mensis nunc est, a quo mulier Holschamin-densis ex Ducatu Guelferbyrano. puellum tere septennem mihi sissebat non uno malo miserum. Nec ambulare nec stare poterat, brachia veluti trunci pendebant immota, rigebant digiti, venter immensum distensus, facies cadaverosa, pedes milari, manus foedissima scabie obduta. Subito mihi oriebatursuspicio de vermibus. Pauperula itaque pulv. ex mercur. dulc. C. C. crud. rasp. &c. largior. Hoc solo cum lacte dato 72. Vermes expuli, quos deinde in scatula collectos non sine gaudio monstrabat. Deo nihique summas agens gratias pro obtenta infanti sanitate. *Christiani Francisci Paulini.*

Idem 8. annorum consilii conferendi gratia ad me adducit mater, cujus caput, brachia & crura in continuo erant motu, & quidem caput a dextro in sinistrum & contra; brachia & crura sursum deorsum ipsa invita agitabantur, adeo ut neuter pes ullibi permaneret fixus. Cui malum hoc originem debeat, dubius primum fui. Ad convulsivos autem motus referre non dubitavi. Nulla præter motum illum inordinatum offensæ valetudinis aderat nota: omnia sua debite fungi munere videbantur: urina tantum pallida & terne aquosa viriditatis leve dabat indicium. Omnibus in agra bene ponderatis, vermes hanc convulsionis speciem producere conieci, licet evidentia illorum signa alia non adessent. Ea enim, latente *Foresto l. 21. obs. 28. feb. 1.* nonnunquam adeo obscura & symptomata adeo multa & cum aliis morbis communia sunt, ut doctissimos aliquando Medicos fallant. Succurrit tum observatio apud *D. Thonerum lib. 2. pag. 49.* quam sibi quoque communicatam tradit *D. Greg. Horstius Epist. Med. Sect. 7. de filia 14. annorum,* quæ a vermibus non tantum ingentem colli constrictionem, quasi laqueo injecto fauces præcludente, cum imminenti suffocationis periculo, sed utriusque insuper tum brachii, tum cruris motum convulsionum passa, ita ut crur in modo dextrum, modo sinistrum ad nates usque invita ægrâ, quasi funiculis agitata, alternatim fuerit flexum. Notam ægram mitius quidem animata colluvies, ut ex dictis videre est, tractavit, gravem tamen sibi remedium omnium apparatus primum respuit, respuere autem desit & tandem emigravit, oblato aliquoties haustu aquæ stillatitiæ raphani rusticani, aliis aquis ob acrimoniâ temperata; quam etiam commendat *D. Sebastianus lib. 2. de alim. facult. p. 400.* ubi hoc condimento, esu sed raphani illius rasi feminam quandam aliis remediis frustra usurpatis plurimos eiecisse vermes notat. Vermibus xi. è puella nostra aquæ dictæ usu eiecitis, convulsivi motus brevi cessarunt. *Joan. Christiani Frommanni.*

Cum anno 1667. Zittavix degerem, curæ meæ committebatur Puer quinque annorum, qui ad quartum usque annum bona valetudine erat usus. Circa initium quinti anni male se habere cepit: cum virium & caloris nativi pæctura. Tandem febris lenta & ventris tumor eum invasit, quibus subsecuta brachiorum, præprimis autem pedum contractura, ita, ut neque

stare, neque ambulare amplius posset. Causam hujus metamorphoseos lumbricos esse ratus, curam, præeunte experientissimo Riverio Cent. 1. observat. 16. p. 13. ad debellandos eos institutam duxi, quod & felicissimo successu præstitit & una vice terrene triginta, sequentibus vero diebus, partitis tamen vicibus, supra quadraginta expuli, partim vivos, partim mortuos, tali cum fructu, ut puer brevi tempore, reliquis ad rem facientibus non omissis, iterum stare & ambulare inciperet. Vermes dejecti omnes erant cornuti instar cochlearum, cum rostellulo acuto, formæ, longitudinis & latitudinis hic exhibitæ. *Melchioris Fribe.*

Anno 1641. Pastor quidam Paræciæ Ringorum, in Ostrogothia, duobus miliaribus. Sudor copia distantis, openi eam implorabat, quem miris convulsionibus, per sesquiannum adeo diu exatum, ut toto illo tempore vix dormire aut cibum capere potuisset, domestici referebant.

Ad ægrum verò accedens inveniebam eum dextri lateris paralyti affectum, resupinum, seminudum (innunum enim ventrem lodece saltem tegerat) pedibus elevatis, & lecti assamentis firmiter applicitis, sine intermissione ferè, & tam miserabiliter afflictum, ut cœnare in ejus præsentia, nam e regione cubilis mensam straverant, prorsus nequirem. Tanta enim vehementia omnes articuli successivè, ter dextrorsum; totiesque inde sinistrorsum, circumgyrabantur, ut sani brachii fragorem in proximo conclavi, ante cubiculi januam, decem ad minimum pedes ab ægro remotus, non obscure interdum perciperem.

Imminenti paroxysmi prænuncijs erat sanæ manus index, is enim, elevato brachio, convellendam sinistri hypochondrii partem, inter superius ventriculi orificium & lienem, bis tribus vicibus apice suo fortiter pulsando, luctæ locum designabat, ac sine mora subjecta viscera ter dextram, totiesque sinistram versus, reciproce circumagi, illique liberatis, quantocyus se in thorace similiter inquietari, licet assantium visum hæc fugerent, patiens referebat. Postea omnes brachii articuli ab humero, ad ultimum usque indicis condylum deinceps cervix & oculi, eodem modo rotabantur. Imò circa verticem quoque ac in resoluti lateris partibus omnibus, ab humero, ad pedis usque pollicem, similem prorsus motum, quamvis a nobis observari id nequiret, se sentire asseverabat.

Eo vero cessante, alter pollex, omnesque insequenter sani pedis & lateris articuli, idem patiebantur, donec in loco, ab indice prænotato, desineret, & furiis his agitato, delatatoque ægro aliqualis redderetur quies, quæ tamen levis admodum erat, & adeo brevis, ut vix centum verba inter hanc & novam similis malæ invasionem, profari quis potuisset.

Sciscitanti, quam diu hanc sustinisset pugnam, & quamnam eius fuissent præludia narrabat? se ante biennium e pago vicino, ubi infantem sacro baptismatis fonte abluerat, equo domum reductum, non procul ab ædibus suis, hemiplexia, in dextri lateris paralytin postea desinente, correptum, & a suis cubiculo illatum, ab usu calidiorum aliquot antapoplecti-corum medicaminum, a Sacerdote vicino, & Gallico



Gallico Chirurgo subministratorum, in ingentem ventris humorem repente incidisse, & instat pila majoris, aëre distentæ, inflatum esse, nec ullo artificio, nisi sapius & fortiter contentum in eo spiritum efflando, alleviari potuisse, semper tamen aliquoties labore isto repetito, ventrem subsedisse, & ad naturalem statum rediisse.

Tandem verò, crebrò ab empiricis illis, exhibitis oleis carminantibus, tumorem quidem omnino desisse, sed motum hunc convulsivum & membrorum agitationem, eidem successisse.

Rogabant amici, ut auxiliares ipsi manus porrigerem, cum autem, omnibus rationis trutina exactè ponderatis, morbum ejus non ex causis incertis naturalibus, sed magica sagæ cujusdam incantatione potissimum oriundum, me statuere, sicque naturalibus mediis non cessurum regerem, faciliè quidem assentiebatur æger, ante biennium æditi sui, venetici insinuatam, & baculo à se percussam uxorem, se non inultam id laturam interminatam sibi esse, recordando, instabant tamen ut, Hebilis ejus conditionis infertus, appropriata nihilominus quedam remedia præscriberem, fore dicentes, ut, si non omnino virtute eorum convalesceret, mitius tamen forsan deinceps assiligeretur.

Quod cum denegare illis nequirem, generosa & selecta nonnulla medicamina hic fieri jubebam, utendique modum & seriem astantes docebam. A quorum usu etiam si indomitus affectus non in totum cederet, multum tamen a ferocia sua illum remisisse & longiores inducias concessisse, ipse æger lætabundus fatebatur.

Cum vero remedia ista munificentia viri cujusdam primarii nactus esset, & deinceps, ipse pauper & inops, plura id genus obtinere non posset, reliquam spem morbo, recrudescente, majoreque vires acquirente in sola Numinis misericordia collocans, & per dimidium ferme annum supplicationibus & precibus publicis in omnibus provinciarum templis, pro benigna ejus dimissione, ad Deum sulis, placidè expirans, miseram hanc cum feliciore vita commutabat.

Et hæc est, Vir Excellentissime, quam in chartam conjicere me volebas, de mira illa membrorum omnium circumgyratione, in cultiore quidem stylo exarata observatio, quam pro accuratissimo tuo judicio lucem videre publicam, vel oblivione obliterari sinas. *Bernardus Helovv.*

Virguncula decennis à fulgure & tempestate conterrita, tam vehementibus brachii ac cruris sinistri correpta est convulsionibus, ut neutiquam ab assistentibus contineri posset, sed mentis compos alteri innixa cruri cubiculi penes parietes discurrere cogeretur: per venæ-sectionem autem aliaque anti-convulsoria ab iisdem vindicata est. Quod concitatori gressu per cubiculum discurrebat, nemini mirum videatur, nam sicuti *Avicen. Sententia Prim. 3. tract. 5. cap. 8.* ubi ait impossibile esse hominem Epilepsia detentum erecto posse permanere corpore, verissima est: ita illa *Galen. 1. de sympt. caus.* ubi nulum in convulsione functionum principum fieri nocumentum docet, intaminata manet atque stabilita, per Marcellum Donatum, qui con-

vulsus non cadentem, Benivenium, qui stantem; Dodonæum qui sedentem; & Erasium qui cursitantem observavit. *Nicolai Guiltelmi Beckeri.*

Rusticus, incolæ pagi Hettlingen, ditionis Vitoduranz, in agro Tigurino, horæ unius itinere a Vitodurano distantis, nomine Franciscus Muller, pater sex puellarum est, & unus filii. Hujus filiarum natu majores, secunda & tertia videlicet, Magdalena & Anna, illa nono ætatis anno, hæc septimo, mense Maio, Anni 1671. cum aliis puellarum more ludentes, prope ædes Sub-præfecti illius loci recens extruendas, lignorum segmenta ab opificibus rejecta tractantes, & convivia ficta nuptialia instituentes, precibus suis, se eorum nonnulla devorare simulaverunt, imò quibusdam ea devorasse creduntur, ipsæ vero puellæ rei sunt incertæ, nec bene memores: hæc verò deglutitio penes nos fidem vix meruit. Ab eo tempore nil sinistri fuere conquellæ, exceptis subinde abdominis doloribus, qui sensim incrementis, compressivi, lancinantes, pungitivi, stomacho, cibo distento, & abdomini Magdalenz iuprimis, negotium facesserunt, præcipue in cursu concitatore, in quo impedita à sociis facile vincebatur: cibo quoque cito satiabatur, ab eoque sudabat, cæteræ sanæ.

Die 17. Decembr. St. V. Anni 1673. istæ duæ, Magdalena & Anna, decumbere cœperunt, accusantes punctorios ventris dolores, salvo tamen appetitu, somno, alviqve officio. Magdalena manè & vespere convulsivis fuit agitata motibus, convulsiones singulis diebus rediere, excepto unico die secundo, videlicet Januarii, Anni 1674. (paroxysmus sæpè per tres horas duravit.) Quum per quatuordecim dies decubere, die Lunæ, quinto Januarii, Parens consuluit, oblata urina, animum medicamentum in *Witfendargen*, quæ, pro more, somniabat, Magdalenam laborare morbo, quem *der Nick* appellavit, & alia futilia edicebat, rationi neutiquam consentanea, dabatque herbas quasdam in aqua decoquendas, cujus decocti sumeret manè & vespere haustum per quatuor dies, videlicet Martis, Mercurii, Jovis, & Veneris.

Die Saturni 10. Januarii, sumpsit ejusdem suasi & præscriptione portionem purgantem, (infusionem vitri antimonii) quæ validissimos excitavit vomitus, nulla tamen segmenta extruxit. Diebus novem sequentibus, singulis diebus semel saltem bibit decoctum dictum. Die lunæ vero, 19. Januarii ultima vice id sumpsit, die Martis, 20. Jan. sub vespeream Magdalenz primo prodit ex ore parvulum segmentum: die Mercurii, 21. Jan. plura & majora eructavit segmenta, per totum diem usque ad decimam noctis horam; nec non & sequentibus diebus semel atque iterum, præsentibus loci sub-præfecto & senioribus.

Segmenta illa lignorum, multis foraminulis perforata, veluti amosa, fuerunt parva, magna, longa, curta, lata, angusta (uti superstites portionis testantur) idest, quedam digiti, quedam duorum, unius vel dimidii articuli longitudine, nonnulla dimidii uncie, nonnulla quartæ, sextæ, vel octavæ uncie partis latitudine, quedam instar spinæ acutæ; nunc paniciora, nunc plura; aliquando una vice undecim, sæpius



tria, quatuor, quinque vel sex eiecit, magno semper nisu convulsivo, nunquam cum vomitu, ac cum labore ingenti ac dolore; resisterunt namque subinde in gulæ medio circa thymum fixa cum dolore, vellicatione, angore & afflictione; interdum ventriculum repetierunt. Hæsero vero nonnunquam in gula per totam noctem, nihilominus dormivit puella: manè convulsivo motu illa reiecit, nunc citius, nunc tardius, nunc majori, nunc minori nisu: decumbens nulla excrevit, omnia sedens vel erecto corpore. Intrà 18. dies trecenta huiusmodi segmenta extrulisse dicitur, (quæ ferè omnia, apud plures licet, supersunt, & maxima eorum pars in Bibliotheca nostra civica, cum teredine attervatur,) cum levamine, salvo appetitu, sine siti, cum somno naturali; ac convulsionibus perseverantibus.

*Anna* quoque singulis diebus fuit convulsa, sub vespèram dièi Saturni 24. Jan. St. V. tria segmenta pari modo, uti *Magdalena*, ab ore dedit, diè sequente solis quartum: præterea nulla.

Diè Lunæ, 16. Jan. Pater denuò vetulæ consilium poscit, monstrans urinas 4. puellarum, quæ convulsionibus agitabantur, videlicet *Magdalene*, nunc undecim annorum, *Anna* novem, *Ursula* 7. & *Elisabeta* 5. an. 6. m. Vetula præter morem aperte confessa, se affectum *Magdalena* non intelligere; iussit saltem oleo olivarum gulam perungere, ut faciliteretur segmentorum exitus: *Ursula* dedit portionem emericam, aiebat enim laborare chloroti, quod falsum & absolum. Reliquæ relictæ sine auxiliis. Diè 6. Febr. *Magdalena* ultima vice elidit lignea segmenta, ab hoc tempore per mensem nulla prius: singulis nihilominus diebus acriter convellebatur.

Diè Veneris 13. Febr. *Magdalena* per totum diem fuit debilis; Vespèri inter octavam & novam sæpè sputum eructavit spumofum; tandem caput viperæ ad digiti longitudinem prodiit, quæ à Matre tum præsentè & ipsa puella obscurè & attonite fuit observata, quæque hinc inde circumspiciens, rotato capite, mox iterum in fauces & stomachum se recepit, cum sensu frigoris; instar lactus coagulati. Noctu dormivit puella, nil de angue percipiens.

Diè Saturni 14. Febr. hora quintâ vespertinâ excrevit ab ore teredinem, unciz ferè unius longitudine, vivam, cum paucis sanguine, sine dolore, tulli & vomitu: teredo vixit in diem Martis usque. Eodem hoc diè Saturni, post horæ quadrantem dolorem sensit pungitivum, tunc ambabus apprehendit manibus totum pectus, quo valde commoto, subito anguis ascendit; ac aliis fororculis Deum invocantibus & ipsa orare coepit. *Psalm.* 23. sed desistere coacta fuit ob anguem magis magisque ascendentem, *Anna* sola ipsi propius adstans, reliquis longius distitis, pone fornacem in obscuro versantibus, vidit *Magdalena* quidpiam in os exurgere, & extra os, spithamæ ferè longitudine, propendere, ac illico regredi. *Anna* asserit fuisse animal in dorso nigricans, & in ventre variis coloribus variegatum, plura non observavit, quoniam præ timore in convulsionem incidit: *Magdalena* vero id ambabus apprehensura manibus, ab eo in monticulo digiti indicis manus dextræ fuit demorsa, cum levi dolore, sine alio subsequuto deteriore symptomate: cujus puncturæ

vestigium nobis tandem accersitis monstravit. Post quartam horæ partem vipera rediit, ostentans se digiti longitudine, moxque refugit. Noctu iterum bene dormivit.

Diè solis 15. Febr. bestia sæpius in os ascendit, atque deinde in stomachum descendit, in ore suxit ac stridit, ut ab adstantibus suctus & stridor faciliè perciperetur. Puella hoc diè suavis rusticorum comedit carnem *saïtam*, haustumque iusculum sensit viperam sitientem avidè arripere. Idem accidit diè Lunæ continuantibus convulsionibus.

Diè Martis, 16. Febr. demum advocatus ego inveni istam puellam convulsionibus gravibus, frequentibus & universalibus distorqueri; serpentem sæpius & facile, illitis labiis vel lingua melle vel lacte, vel ejus calentis odore saltem percepto, in os ascendere, sugere, stridere. Sugente verò & os opplente serpente, puellæ dentes convulsivo motu adeò strangebantur, ut eos à se invicem vel exquisitissimo instrumento nec ego, nec Chirurgus nostras minimum diducere, & os aperire, valuerimus. Retrogradiente vero vipera puella os aperuit, & appositè omnia explicuit, (id quod faciliè adnoto ori pane vel vino procuratum) hiantè ore nunquam plene & perfectè in os ascendit vipera; quamdiu autem in ore præstans erat, os aperire nequit; ac simul ac recessit aperuit os, ut semper. Testatur puella se subinde rosiones, mortus & motus inordinatos frigoris, ceu anguis, in stomacho perlentescere. Exhibui hoc diè. Aq. perlarum cum pulv. march. ut & Aq. Antepilept. Noctu quæta fuit, nec anguis motum sensit. Soror ipsius *Anna* ob convulsionem hodie à Sympulo, meo emetico egregie vomuit.

Hoc diè rem notantatio Nobiliss. atque Excellentiss. Dn. Christophoro Hardeo, Medicinæ Doctore celeberrimo, ac Phytico Scaphusano felicissimo, Patrono ac Patrono meo summo, & in pluribus casibus probatissimo, per puellarum patrem, qui adventum promittit in diem Jovis.

Diè Mercurii, 17. Febr. resecta fuit eadem Aq. perlar. cum pulv. march. & Aq. Antepilept. Hora 10 antemeridiana anguis in os exurgit, edens vocem instar pullorum columbarum, retrocedens in stomachum, eum punxit à meridie sæpius in os rediit. Accessit non vocatus circumforaneus quidam nefandæ famæ, puellæ anguis formam in mensa creta adumbrans, ac fasciam sericeam rubram à collari suo abreptam, odorandam offerens, nam colore rubro serpentes valde delectari, illumque sequi referebat: à domesticis abactus, ac procul ire iussus in diverforio varia artis suæ jactabundus promulgavit dogmata, ejus pretii atque præmii, ut iussu Magistratus in carcerem fuerit conjectus.

Circa quartam vespertinam *Magdalena* diuangebatur, tandem ex cætu hominum se subducens, & ex hypocaulito in pratulum excurrans anguem in præternuentem rivulum, ad quem alvum (salva venia) exoneratura sedebat, ut ipsa narrabat; projecisse dicitur, quæ saltu magno decem circiter pedes alto, peracto, in rivulum iterum decidens, amplius visa non fuit, quoniam se absconderit, incertum: terra enim tunc gelu erat indurata, atque propè rivulum dumeta,



dumeta, ut faciliē se abscondere potuerit, neque investigari. Dicitur quoque anguis, antequam se rivulo immitteret, insectari voluisse puellam cum clamore fugientem, ac nē hospes tam dirus antiquum hospitium repeteret, metuentem, quæ a Patruo abrepta in hypocautum reportata fuit. Anguem istam nemo vidit, quam puella ipsa & ejus pater, per foramen muri domus actum hunc observans. Hinc læta puella optimē habuit, nec quicquam conquerens, comedit, dormivit optimē.

Die jovis, 18. Febr. hora 10. antemeridiana iterum atrocissimis fuit occupata motibus convulsivis totius corporis per integram horam, qui nunc opisthotonon, nunc emprosthotonon, nunc alias figuras referebant. Hoc tempore nulla aderant indicia anguis presentis.

Hora undecima antemeridiana accedens Excellentiss. D. D. Harderus, cum filio Dn. Joanne Jacobo, *philosophi*, rerum rariorum ac curiosarum studiosissimo, invenit puellam convulsionibus quidem liberam, at parum articulatē adhuc loquentem, ob perpetuas convulsiones, sentim vox restituta. Ad excrementa anguis & corruptos in stomacho humores exturbandos *Magdalena* dedimus tyryp. n. ei emetici dosim, purgata bene cum tolerantia, tandem denudā atroces sustinuit convulsiones, & frequentes, nullo anguis indicio. Anx. dedimus iterum dictum syr. emet. nulla subsequuta operatio: *Desula* & *Elisabetta* iidem; hætuere evacuata cum *Anna*. N. m. & hæ, in primis *Elisabetta*, sæpius in die convulsione, in prius opisthotono læcebantur, ut & nra triennis, *Susanna*.

Sub vespēram ipsa quoque Mater iidem, & primā nunc vice, tentatur convulsionibus, ab exhibito tartaro emetico plane non vomuit: convulsiones itentidem rediere; ori intudimus pulv. antepilept. cum Aq. antepileptica: vortibus obtulimus massam pilæ hytetricæ, rutam rusam. *Magdalena* & *Elisabetta* dedimus pulv. antepilept. & granatum: à cœna Matri exhibuimus pulv. march. cum laud. opiat. *Elisabetta* vero ob frequentissimos paroxysmos pulv. march. cum pauxillo laud. opiato.

Die Veneris, 19. Febr. alius apud *Magdalenam* comparuit serpens motu per collum in os: suctu & stridore, necnon convulsivo maxillarum motu sese manifestans: Varia cum lacte, saccharo & melle tentavimus, at incassum. Ab hora nona antemeridiana ad 12. perpetuis fere & horrendis fuit divexata convulsionibus. Nunc & potissimum, opisthotonus ipsam tenebat, nunc oculos ipsi distortos fingeat Spasmus, nunc convellebatur panniculus carnosus capitis, nunc totum corpus circumgyrabatur, nunc serpebat humi instar serpentis, nunc digitos vel manuum vel pedum, alternatim vel extendebat singulos ordine, vel omnes simul, nunc hos vel illos complicabat, diaphragma sæpius convulsivo motu partes inferioris & medii ventris horrendo aspectū quætiebat: ventrem seu abdomen sæpius in altum elevabant instar arcus, subitoque in dorsum cum sonitū recidebant, in primis *Magdalena* & *Elisabetta*: in ipsa vel sævissima convulsione sæpius perstiterunt mentis compotes, audiebant, nonnunquam viclebant omnia, atque spasmō solutæ distinctē acta omnia enarrare sciebant. Finitis convul-

sionibus, ut ante, dedimus *Magdalene* carnes valde salitas, ad irritandum anguem. Annisi quoque fuimus eundem prolectare melle, saccharo, lacte dulci, sed eodem, quo prius effectū, videlicet nullo: simul ac enim viperæ os conscendit, suxit, suctuque dentes validissimē constrinxit: nec in tubulum; nec in vesicam, nec in præterfluentem rivulum, nec in vas latum aqua vel lacte repletum, allici potuit. Stomacho applicuimus cataplasma ex theriaca; umbilico sacculum ruta & absinthio infarctum; vino & aceto incoctum: Interne quoque dedimus theriacam vino dilutam, iterum carnes salitas, tandem lac, cui allia incoxerunt: omnia per intervalla & successivē: Anguis quidem hinc irritabatur, convulsiones excitabat, os petebat, at valido suo suctu dentes stringebat, adeo, ut exitus omnis præcluderetur. Tubulum verò & vesicam (licet ex illo mel omne avidè hauriret) anguis ut intraret, obtinere neutiquam potuimus; nec eo uique caput exeruit, ut torcipibus apprehendi a nobis sedulo ipsam anhelantibus valuisse. Sub vespēram plane quievit serpens. Et puella superatis convulsionibus à solis occasu melius habuit, siveque instar sanissimæ, lætæ, jocosæ, in primis per octiduum; abhorruit hypocautum ingredientem capite pileo recto, & quorum colla martes cingebant, (eandem aversionem & *Anna* passæ est) at parum comedit, saturata prius carne salita, ut dictum, & lacte. Hora 10. noctis dedimus puellæ devorandas pilulas ad anguem enecandum ex Mercur. dulc. M. P. de Aloë cum Rhab. omnes expedite deglutiit cum decoct. pot. ordin. per totam noctem bene dormivit.

Hoc veneris die Matri ob convulsiones, anxietates circa præcordia, oris amarorem, ac insuavitatem, imprimis, quoniam heri planè non ab exhibito vomitorio fuit purgata, dedimus pulverem e tartar. emet. & crem. tartar. qui tardè, at egregie eam evacuavit.

*Elisabetta* propinavimus de pulv. march. quæ sæpius ultra 20. per diem horrendæ, at breviores, quam antea, pertulit convulsiones. Ut omnibus convulsis, Matri, & filiabus quinque decenter succurreretur, pro necessitate repetito usu medicamenti nimis pretiosi præscriptimus pulv. ex rad. prun. valer. sylv. aron. opt. visc. querc. gran. prun. exc. C. C. ust. præpar. & sacch. alb. paratum. Loco potius ordinarii bibebant omnes decoctum C. C. usti, cui calenti adhuc dum immergeretur nodulus ex rad. prun. cinnam. & anis. compositus. Sub vespēram dedimus Matri prædicti pulveris dosim, cum decoct. pot. ordin. item *Anna* & *Elisabetta*, pro ætate; *Susannæ* vero exhibuimus manè syr. emet. unde sat purgabatur. *Anna* hodie bis saltem fuit convulsa.

Die Saturni, 21. Febr. summo mane *Magdalena* quater *Anna* & *Elisabetta* fuit purgata; per superiora excrevit aquam spumofam; per inferiora excrementa viscida. A carne salita comesta sensit motum anguis circa præcordia, hinc convulsiones abominandæ: à melle anguis in os prolecta arripi non potest, nec vesicam vel brevioris colli seu tubuli intrat. Convulsiones itentidem rediere, tandem puella nobis alacris relicta.

Mater & *Elisabetta* iterum sumplerunt pulveris



dicti aut Epileptici portionem, idem faciunt sequentibus diebus mane & vespere: in hunc finem ponderata aliquot doses, & marito tradita. Elisabetha quater vel quinquies passa est convulsionem ex improviso ipsam adorientes, cum opisthotono semper incipientes, atque distortis oculis sat atroces, ac breviores, cum summa abdominis elevatione, ac tandem violento, repentinoque ejusdem relapsu, quibus finis visit, comedit, hinc inde cucurrit, conquerens saltem de dolore quodam dorsi, capitis & cordis suspicamur. & hanc uenenati quid alere, abdomen enim & diaphragma quovis fere paroxysmo mirum in modum convelluntur ac quatiuntur.

Die Solis 22. Febr. Magdalena hora 5. matutina excrevit tres lumbricos per inferiora cum fecibus mucosis, albis & flavis, & cum impetu maximo evomuit materiam quandam aqueam: hora 7. matutina sumpsit bolum ex mercur. dulci, à quo aliquoties alvum soluit, unde vires defecerunt, cum appetitū dejecto: refecta aqua cardiaca melius habuit; convulsionibus hodie ter prehenso.

Elisabetha nil mota à bolo ex mercur. dulc. hodie devorato, ultra 10. convulsionem passa. Pater conquerens de ventriculi & capitis dolore sumpsit emeticum cum *diopsea*.

Die Lunæ, 23. Feb. Magdalena septem longis iisque atrocissimis convulsivis agitur motibus cum linguæ prominentia & intumescencia: conqueritur subinde de morsu & rosiore circa cordis regionem, unde mox aderat hæmoptysis. Anna 10. convulsivos passa paroxysmos, ac breviores ac mitiores. Elisabetha 24. habuit insultum convulsivos, leves, breves; sumpsit hora quarta vespertina pil. de extr. cathol. & mercur. dulc. Susanna hodie ter fuit convulsa.

Die Martis, 24. Febr. Magdalena hoc mane sumpsit pulv. de gutt. cum aq. præn. hoc die sexies fuit convulsionibus distenta. Anna itidem sumpsit hodie istum pulverem, atque itidem sexies convulsionem perpassa. Elisabetha sumpsit quoque eundem pulverem, & 16. paroxysmos innoxie pertulit. Susanna deglutito eodem pulvere quinquies convulsionibus velliata.

Die Mercurii, 25. Febr. Magdalena sumpsit pulv. diagrydiat. cum Mercur. dulc. Hinc quater purgata. & hora quarta vespertina tres excrevit lumbricos; quinquies fuit convulsa: sub vespere accepit pulv. de gutt. dein conqueritur de morsu cordis, hinc hæmoptysis rediit.

Anna hanc quoque pulv. diagrydiatum cum Mercur. dulci, à quo sæpissime excrevit materiam albam, mucosam, cum 2. lumbricis: quinquies exercita convulsionibus; sub vespere accepit pulverem de gutt.

Elisabetha absorbit quoque diagrydiatum pulverem cum mercur. dulci excrevit materiam copiosissimam, tenacem, viscidam, spermatis ranarum instar, cum capillorum flocco conglutinato: sub vespere exhibitus pulv. de gutt. quoniam 24. vices convulsionibus lancinata. Susanna vero iisdem ter correpta.

Siquidem haud vana suspicio puellas istas pluribus scâtere vermibus, præscripti medicamentum ex pulv. contra vermes, de gutt.

merc. & troch. alhand. compositum; & singulis fuit dosis exhibita mane & vespere, cum decocto potus ordin.

Die jovis, 16. Febr. Magdalena duos ejecit lumbricos, vespere sumpsit dosim unam pulv. contra verm. præscripti: novies convulsa Anna septies, ac mire convulsa, accepit dosim pulv. contra vermes.

Elisabetha tres excrevit lumbricos, deglutit dosim ejusdem pulveris; ad 24. vices itidem convulsionibus agitata.

Susanna sex convulsivos sustinuit paroxysmos, & blandos, devorat conf. sem. cinx.

Die Veneris, 27. Febr. Magdalena novem atroces convulsionum sustinuit paroxysmos, varie figuratos: propinata mane & vespere pulv. contr. verm. dosis.

Ursula nullis fatigatur convulsionibus; hodie excrevit lumbricum sine usu medicamenti.

Anna hora 8. matutina egressit 6. lumbricos, cum materia viscida, mucosa, bis fuit convulsa, accepit etiam mane & vespere dosim pulv. ad verm.

Elisabetha propinatis itidem dosibus 2. pulv. ad verm. excrevit hora quarta vespertina una vice 14. vermes, & quinquies convulsionibus exercita. Susanna similiter quinquies convulsionibus afflicta.

Die Saturni 28. Febr. Magdalena circa meridiem sumpsit diascord. Fr. vino solut. mane injectus clyster. ex lacte & melle: sub vespere alius laxans, unde secutus lumbricus: quinquies convulsionibus confictata.

Anna injectum enema laxans, quod evacuavit materiam flavam, nunquam sensit convulsionem.

Elisabetha ante meridiem injectum ex lacte & melle: sub vespere vero laxans, quod extraxit materiam viscidam, & ter convulsionibus, ac brevissimis fuit agitata. Susanna vero bis iisdem molestata.

Die Solis, 1. Martii Magdalene pulvis purgans quinquies alvum subduxit, excreta materia flavâ, 12. convulsionem passa: durantibus convulsionibus conquesta de cordis rosiore, quam finito paroxysmo secuta hæmoptysis, binâ vice sumpsit diasc. Fr. vino dilut. Anguis nec motu per collum, nec suctu se amplius prodit.

Anna à pulvere purgante excrevit plane naturali, colore & consistencia; bis saltem leves convulsionem in oculis animadvertit.

Ursula sumpsit similem pulverem purgantem, octies hinc fuit evacuata, egerendo duos lumbricos.

Elisabetha à simili pulvere egressit quinquies materiam viscidam cum lumbrico unico convulsivum vidit insultum. Susanna omnia relapsus, octo atque vices accessus pertulit.

Die Lunæ, 3. Martii Magdalena duodecies horrendis & diuturnis fuit confictata convulsionibus. Angues iterum comparuerunt, & ut zgra refert, numero tres, alii minores, ordine collum & os conscendentes, vocem edentes instar pullorum vel murum, dentes, ut pridem, motu stringentes convulsivo. Clauso puellæ ore, ego cum adstantibus sibilum, viperarum more, manifestè audi; eo vero aperto, nil soni quispian percipit; ac puella istorum in collo perseverantiam conspicuè sensit. Post cordis mor-



sum; puella (ut mater retulit) expulit ad uncias tres sanguinis clari; botri: sumpsit mane & vespere diascord. Fr.

Anna hodie semel convellebatur, usa sem. cinæ; ut & Ursula & Elisabetha; quæ bis convulsionibus mota.

Die Martis, 3. Martii Magdalena eadem rediere symptomata cum 15. convulsionum insultibus; vespere <sup>ad 7. m.</sup> decem rejecit lumbricos.

Anna bino insultu adorta in longiori paroxysmo sibilus obauditus; hinc aditantes viperam adesse pronuntiavit; & collum ascendere; <sup>ad 7. m.</sup> eliminavit lumbricum.

Ursula 13. excrevit lumbricos. Elisabetha trino insultu defatigata; mane 4. vespere 5. ab usu sem. cinæ expulit lumbricos. Susanna bis convulsionibus distenta exoravit lumbricum.

Die Mercurii, 4. Martii, Magdalena hora septimana matutina ab usu sem. cinæ 7. eiecit lumbricos; hora 10. ob virium defectum exhibui lap. bezoar; & relictis viribus, hora 11. injectum clyisma laxans; hinc 4. alii secuti lumbrici, cum materia nigricante, viscida, tenaci, summum & horrendum foetorem exhalante. Vespere locum habuit enema ex solo lacte. sensit angues in ventriculo hinc inde vagantes; versus superiora denuo seandentes, à quibus ad duodecimam noctis horam admodum fuit inquietata: sæpiissime enim in os exurgebant cum suffocationis periculo & metu; undecim insultus abominabiles convulsionum sustinuit. Plurima quoque tentavi hic, at frustra.

Cæteræ satis bene se habent, utuntur quotidie sem. cinæ; unde complures exturbant lumbricos. Excepta Elisabetha, quæ die Jovis quinquies, die Veneris 14. die Saturni 10. die solis 12. convulsionum insultus toleravit.

Die Jovis, 5. Martii, præscripsi Magdalena pulv. ex rad. Zedoar. dictam sem. citr. in tres dies. Patrus jussu meo. præsentem puella, hausit summum tabaci; tandem & illa circa vespertam arripuit fistulam, hausitque tabaci fumum, à quo <sup>ad 7. m.</sup> nota, per totam noctem optime quievit, duodecies convulsionibus irritata.

Die Veneris, 6. Martii, sumpsit bolum ex mercur. dulc. troch. alband. & cons. ros. paratum, à quo copiosa & flava secunda materia. Eodem die etiam segmenta aliquot lignea, præsentibus à mir. nitibus Dom. Pastoribus loci & excrevit. Nocte sequente tota fuit inquietata ad tertiam matutinam, & 13. vicibus convulsionibus lacerata.

Die Saturni, 7. hujus, me præsentem denuo tabaci fumo usa, quem angues perferre nullo modo possunt, sed quam primum ascendunt, statim abiguntur, & fugantur hinc, convulsionemque statim cessant.

Hoc ipso die præsentem erant viri cives Vitoriani, omnis ordinis plures, puellas vexatissimas visuri, qui ipsi summam inter anguem & tabacum antipathiam experiri tentabant, atque experti maxime admirabantur. Si enim anguis fucturus linguam Magdalena ascendebat, ad motis vel in nimis dissecit tabaci, vel naso, vel ori particulis, quam elutissimè, atque ad idum oculi se proripuit: multotiesque hoc tentatum. Si anguis ascendens ab initio statim tabaco excipiebatur, absque omni molestia atque laesa

puella resilliebat: si verò suctioni ejus in ore mora concedebatur, convulsionem puellam sensim infestare incipiebant, ut languesceret, caput dorsum versus inclinaret; atque oculos distorqueret: sed tabacum admotum illico hostem fugavit atque puellam restituit. Moram aliquando longiore. n fugentem anguem trahere patiebantur præsentem; quam tam horrendus convulsionum paroxysmus infecutus, ut puella à mensa, cui assidebat; alias hilaris; in lectulum deportata omnes ferme attonitos redderet; modo in os ascendit anguis, quam avidissimè sugens, modò in ventriculum rediit; tam inquietè se movens, atque tali cum sono, ac si piscis in vase aqua pleno vehementissime se volutaret. Iterum igitur illi tabaci virtutem expertum fistula assumpta fumum ejus ori & naso puellæ intulerunt, nec defuit effectus; statim enim & anguis sedatus & convulsionem, atque puella, quamvis ad tempus languidior ad se rediit. Sæpius postea anguis irritatus in os ascendit, ac ne misella paroxysmo tam gravi iterum affligeretur, tabaci segmentis admotis absque mora abactus.

Non omittendum hic, quod de carne salita observatum. Collatis consiliis Magd. lenæ caro salita semel atque iterum ingesta; quæ angui gustata illa sitis excitaretur; ad quam sedandam in vasa aquis plena apposita provocaretur. Carnem vero salitam anguis tolerare in ore puellæ non potuit, & vel digitis illam iterum iterumque ingestam, in os ascendens repulit, conatum ita nostrum plus semel eludens.

Hora duodecima ipse propriis manibus extraxi ex ore puellæ segmenta duo lignea, quæ adhaerent in ipso m. dida. Amplissimo Dn. Prætori, Hegnero, Reverendo ac Clarissimo Dn. Rectori Meiero, & dictis jam plurimis urbis notitis civibus (qui paulò ante ab ægrotantium & debentibus monstravi; aliis fuissent <sup>ad 7. m.</sup> quod unice experiri. Viginti excrevit lumbricos, & duodecies convulsionibus agitata. Tabaci fumum nunc petiit sine incommodo, sine vomitu & successu; imò hinc quietiores noctes acquirit. Nobiliss. D.D. Redi in tractatu suo de Viperis Italice conscripto, qui mihi ex dono ejus, ad manus, allert, oleo tabaci & olivarum posse viperas interfici (nam lumbrici & alia animalia, quæ perspiratione vivunt, unctuosius, prohibita perspiratione extinguuntur,) ideo oleum olivarum per 15. dies usurpavit.

Die solis, 8. Martii Magdalena usa fumo tabaci, 13. vicibus convulsionem passa sinicum egressit lumbricum.

Die Lunæ, 9. Martii, itidem hausit tabaci fumum duos vermes excrevit, duodecies convulsionibus.

Die Martis, 10. Martii, ante meridiem continuè semè lacerata convulsionibus; circa duodecimam injectum enema, excreta materia viscida & flava: circa nonam vespertinam serpentis exerto semel capite sese denuo prodidit, referente ita factore Juvene, & Patru conjuge; hinc puella per totam noctem adeò inquietà, ut serpentem jamjam proditurum expectarent. Infusum mensæ lac puella admoto ore, avidè petiit, instar canis famelici & planè absorpsit.

Die Mercurii, 11. Martii mane ob prægressam



noctem inquietissimam una cum Chirurgis vocor, ut angui egressuro opem ferremus, ubi variis technis per aliquot horas anguis exitum procurare molebamur, at hultro: admotum lac avidissima puella quam primum petiit, convulsionibus atrocissimis fuit correpta: corpus enim mirum in modum tendebatur, & ad oblatum lac violento quodam impetu rapiebat, quod horrendo aspectu quam citissime de mensa fugebat: & cum puella de mensa ad lectum, qui repositoris atque scamnis lecti destinatis proxime erat sublatus, deportaretur, erecta & convulsionibus quasi rigida scamna illa petebat, atque summum lactis sugendi desiderium prae se ferebat: remoto lacte convulsionibus cessarunt. Ad præterfluentem rivulum asportata puella, angue cunctante, nec egrediente, subridens edixit: annon nobis serpens imponit, illuditque? Hodie accepit pulv. viperarum & enema.

Die Jovis, 12. Martii, quater convulsionibus, & iisdem fere fuit exercita symptomatibus.

Die Veneris, 13. Martii, sæpius convulsionibus irritabatur, imprimis odore lactis percepto.

Die Saturni, 14. Martii in Xenodochium nostrum fuit deducta, in via autem sæpius convulsionibus præpedita. In Xenodochio hora octava appellens à convulsionibus fuit libera usque ad nonam noctis, dein reliqua nocte bene dormivit.

Die Solis, 15. Martii, quater convulsionibus lacessita sumpsit mane & vespere dosim pulv. de gutt. cum pulv. viperarum.

Die Lunæ, 16. Martii, ab hora tertia pomeridiana à convulsionibus fuit libera, usque ad horam octavam vespertinam sequentis diei. In Xenodochio convulsionibus fuerunt mitiores & rariores, at diuturniores.

Die Mercurii, 18. Martii, quinquies in convulsionibus prolapsa: oblato lacte anguis proripatus, denuo os conscendit, fuxit, & dentes pro more contrinxit. Puella asserit se nunc unicum anguem percipere.

Die Jovis, 19. Martii, nullæ interdum aderant convulsionibus, at vespere, idque cum suctu.

Die Veneris, 20. hujus, adnoto lacte fuit convulsa, at per breve spatium: adhibitus pulv. viperarum.

Die Saturni 21. Martii, jacuit quasi per se quasi horam quasi in ecstasi.

Die Solis, 22. Mart. continuatus pulvis viperarum: quater convulsionibus tentata.

Die Lunæ, 23. Mart. mane & vespere pulv. viperarum datus: hora octava matutina patitur convulsionibus, non motus convulsivos, reliquo tempore fuit libera.

Die Martis, 24. Mart. sub vespere per bihorium fuit inquietissima, & sæpius hinc inde, furiosæ adinstar, cucurrit, adstantes adscripserunt vino largiter ingesto, mane enim conquiescit de capitis dolore.

Die Mercurii quinquies: die Jovis semel fuit convulsa: sub vespere sese ostentavit viperæ, vocem edens instar pullorum. Die veneris tumuit venter, hora demum noctis nona semel fuit convulsa, ut & die Saturni semel.

Die Solis bis, at mitissimas passa convulsionibus, abdomen adhuc tumet, Jussu Magistratus aliquandiu medicamentis supersedit, ut vide-

rent omnes qualis subsequatur sit eventus. Visitur ab Ecclesiæ ministris, cum ea preces privatæ funduntur, & pro ea publicæ instituuntur.

Die 30. 31. Martii & 1. April. videlicet die Lunæ, Martis, & Mercurii optime habuit. Die Jovis, 2. videlicet April. correpta febre cum rigore, capitis dolore, sudore copiosissimo, oris amarore, abdominis, cordis, capitisque dolore; hora nona vespertina vomitu rejecit materiam viscidam, ac sanguinem grumosum; nil comedit: per totam noctem fuit inquieta cum vociferatione, sine convulsionibus; abdomen subsedit.

Die Veneris, 3. April. dormivit, sudavit, & quoniam de iisdem conqueritur symptomatibus, injectus clyster, unde excretis alvi fecibus duris, statim sensit levamen; sub vespere sumpsit syr. emet. unde iterum rejecit materiam viscidam cum sanguine grumoso.

Die Saturni, 4. April. passa capitis dolores atroces, & quasi intolerabiles cum frequenti oscitatione, bis per vomitum spontaneum excrevit materiam aqueam: vespere injectum clysterem non diu retinuit. Frontale dolores lenivit. Sub decimam noctis alvum irritavit suppositorio: totam noctem dormiendo transiegit; progressu die nil ciborum sumpsit: per istam septimanam convulsionibus fuit libera; nunc optime habet.

Per 14. dies febris tertiana intermittente laboravit, imo & dixit morbis suis convenienter respuens, clanculum patriam suam repetiit, malens vivere vitam rusticam, quam Medicorum regulas observare. (Quæstio incidit de usurpanda *Sideritide* à *Schrædero*, aliisque in incantationibus decantata.)

Magdalena domi vitioso utens victu, in primis *lacte & lacticiis*, febris tertiana adhuc dum divexatur.

Die Veneris 15. Maii, plurimas per inferiora & minimas, cum materia mucosa, excrevit huiusmodi, quarum exsiccata corpora penes nos Medicos residua; in primis unam, quam die Saturni, 16. Maii, cum paucissimis alvi fecibus reddidit, quæ diu in urina natavit, sed in aquam immersa frigidam statim se constrinxit, & mortua cecidit. Conqueritur puella de dolore Stomachi compressivo, vomendi conatu & nausea, ideo die 18. Maii præscripsi syr. emet. at simul ac sumpsit, vomitu rejecit: itaque frustraneum medicamentum.

Die Mercurii, 20. Maii, per inferiora absque alvi fecibus vermem, vel potius teredinem excrevit (quem Excell. D. D. *Hardero* transmisit) vivum, quique per septem dies vitam protulit.

Die Veneris 22. Maii, sumpsit potionem ex resina Jalappæ, syr. emet. & elix. vit. M. quæ eam ipsam purgavit egregie, materiamque biliosam in maxima eduxit copia, à qua melius habuit, & licet fuerit dies paroxysmi, tamen illum traduxit. Die Solis ipsa me accessit, nec tum caloris febrilis quicquam sensit. Die ascensionis, 28. Maii sacris interfuit.

Die Veneris, 29. Maii & Solis, febris recidivam habuit, ideoque denuo exhibui syr. emet. unde sursum deorsumque insigniter evacuata. Hinc febris ipsam deservit.

Die Solis, 14. Junii. Pater cum filia me convenit,



venit, referens filiam hora quinta matutina, in lecto alta exclamasse voce: & quasi vi quadam quippiam deglutire conatam fuisse, Matrem tunc statim ab illa petiisse, quid hoc tibi velit? Filiam vero respondiisse, se nulla protulisse verba, nec quicquam sensisse. Idemque eorundem me asservit, nec de quoquam symptomate conquesta est.

Die Lunæ, 15. Junii, *Magdalena* per tempus segmenta domui apportavit lignea, & quadantenus defatigata, per horæ spatium passa convulsionem, sine omni motu tamen, & finitis illis de capitis, & circa cordis, regionem conquesta est dolore.

Die Saturni, 20. Junii, cum sororibus collegit spicas, & ita commota sine motu fuit convulsa.

Die Mercurii, 24. Jun. ab arbore satis largiter comedit cerata, & non canata se cubitum contulit, illa quæsta de capitis & cordis dolore, item nausea, vomendi conatû, vertigine.

Die Jovis exasperata eadem accusavit symptomata, ideo ordinavi syrup. emet. à quo egregie *ma* purgata, optime habuit. Interim tamen semper terrores patitur nocturnos, & solis radios perferre nullo modo potest.

Die 10. Augusti, *Magdalena* interdum adhuc patitur convulsionem, manuum præsertim contracturas, ita ut mensæ accumbens sæpe rochlear prehendere non possit; inter ambulandum oportet interdum, ut sedeat subito, sine convulsionibus tamen, sed oculis illacrymantibus, antè occiduum pedum & manuum digiti per tres dies adeo fuerunt contracti, ut Pater illos vi distendere neutiquam potuerit, quo tempore etiam inarticulate omnia protulit, timore fuit plena: quoties parum largiter, vel etiam consueto more cœnat, inquiete transigit noctem, propterea sæpe cœnam prorsus intermittit. Interim semper conqueritur de dolore circa cordis regionem compressivo, ventriculi ardore, vertigine & lassitudine spontanea.

Die 17. Augusti & 6. Septembris, ipsa una cum Matre me accessit, referens se nil savioris pati, nisi digitorum manuum & pedum frequentes contracturas, in primis quoties frigida manus abluit: lotis vero vino contractura dispareret. Parentes autumant, filiam esurientem potius & finita coctione convulsionibus corripi: cætera bene se habet. Offensa aliquando propè rivulum à sub præfecti filio est, allocuta nullum dedit responsum, stans fixa instar statuz.

Die Mercurii, 9. Septemb. & seq. diebus, exceptis 14. 23. 24. 25. huius mensis, quibus sudavit, singulis manè vel à septima usque ad octavam, vel ab octava usque ad nonam, interdum dimidiam decimam, jacuit in lecto sine omni sensu & motu, oculis tamen apertis, tandem se recolligens conquesta fuit de capitis, laterisque sinistri dolore, cum horrore quodam. In principio paroxysmi observat in pedibus obtusum quendam dolorem, cum sensu fornicationis, qui sensim ascendens perreptat, & superiora petit, cum cordis dolore, qui caput invadens è vestigio malum hoc ciere & spiritus figere solet.

Similes ecstáticas corporis fixationes cum oculorum circumgyratione singulis manè eadem semper hora passa est, ab 28. Sept. usque ad

12. Octobr. quo sumpsit syrup. emet. & egregie evacuata *ma* a convulsione ista immunis perstitit, per mensem ferè, quo semel tantum vel bis in eadem fuit detenta, interim nimia sua obiit domestica, imprimis illa ducendo. Hactenus nullæ comparuere vipere, vel simile quid.

Tandem spasmus iste rediit singulis sermè diebus, eadem circiter hora, eodem plane modo, cum valida digitorum contractione, adeo ut expliciti vi statim iterum contrahantur, nec levamen nunc sentit, ut pridem, lotione vini; in vinum acceptus pulv. epilept. mane & vesperi, cujus operationem se sentire asserit in manibus ac pedibus, ac si quid exitum quæreretur: convulsionem hinc immittuntur; quoties vero istum pulverem negligit, convulsio eo die rediit.

Die Solis 8. Nov. in templo quasi catalepti prehensa, Matrem alta voce bis exclamavit.

Die Lunæ, 9. Nov. tempore cœnæ vel comate, vel catalepti correpta per horam integram, ut sedens instar dormientis capite nectiverit, oculis clausis; ast interrogata respondit, oculos aperuit, verum mox iterum clausit. Hoc paroxysmo manus valde lacerant; ab usu pulv. antepileptici isti paroxysmi mitescunt, evanescent, ea propter 12. Nov. fuit reiteratus.

Die Saturni, 21. Nov. convulsionem rediere, quoniam mane à sororibus ex profundo somno excitabatur.

Die Mercurii, 23. Nov. excrevit per inferiora lumbricum, ideo repetitus pulv. mercurialis cum diagryd. qui sexies alvum movit sine ullius vermis dejectione.

Die Lunæ, 30. Novemb. noctu sensit dolorem pungitivum circa umbilicum, tandem lumbricum excrevit magnum.

Mense Decembri, subinde sensit convulsionem & digitorum contracturas, imprimis; quoties pulv. antepilepticum omitteret; quibus non raro accesserunt ventris tormina sava. Ab esu sem. cinæ maximam lumbricorum copiam per vices exturbavit, cum capitis dolore, & virium imbecillitate.

Anno 1675. Mense Jan. phlegmone in brachio dextro oborta, ad suppurationem perducta & aperta multum puris ludit.

Mense Febr. cibos vomitū rejecit, conqueritur de compressivo ventriculi dolore, syr. emetico & oleis adstringentibus externis fuit percurata.

Interdum patitur manuum tremores, nonnunquam convulsionem.

Mense Maio gliscentibus convulsionibus sumpsit tartar. emeticum, hinc eximie evacuata, nil porro convulsionum passa est in hunc usque diem, & sana vivit cum cæteris sororibus, excepta *Elisabetta*, quæ febrî correpta, & neglectis remediis die 7. Martii, Anni 1676. obiit. *J. Henrici Hegneri.*

Notum est *Caj* elogium 5. *Aph.* 1. spasmus ab Helleboro lethalem, & 6. *Aph.* 39. convulsionem ab inanitione & repletionem oriri, quorum altero generalius, altero speciali exemplo exprimit, fieri ab evacuatione nimia spasmodicos affectus. Ut vero Hellebori virulentiam simul accusent interpretes, alibi scilicet, quem intelligi Pergamenus in commento arguit, putaverunt tamen injuriam fieri Helleboro utrique, quod



quod ſolis tam infamis ſit, tam *ῥαυδὴν, ῥαυδὴν* medicamentum, ut convulſiones poſt ſe excludat, unde & magis exſpiraffe ejus uſus videtur, præcipue cum & ſuppoſitum eundem eadem ſymptomata inducere ſcribatur, ac aſſumptum. Vid. ſpigel. l. 6. c. 4. de H. C. l. Quis verò Mornardum hodie ſequeretur, qui crebro ſe exhibuiſſe ſcribit hellebori nigri integram dragmam, adjectis etiam diagrydii gr. iij. citra vel moleſtam, vel majorem plus debito ſequentem purgationem l. 3. ep. 3. Mitiora dantur, longe optima, & inter hæc præcipua & laudatiſſima gyalapa. Nihilominus dicere auſim, a quovis purgante hypercatharſin, & conſequenter ſpaſmum excitari poſſe, non tam ab inanitione, quàm ſubſequentem acrimonia, plus juſto evacuata ex glandulis inteſtinalibus lymphæ: quam in rem legi merentur quæ *Proſper Martianns* in 6. *Aphor.* 39. commentatus eſt. Notabile verò viſum fuit exemplum conſequentis inde ſpaſmi ſtatulenti, dignumque ut intereretur analectis curioſis. Vir eruditus, ſcholæ collega, 50. annorum, die 10. Februar. 1678. ad evacuandam cacoehymicam ſaburram aſſumit pulverem purgantem ex radicis gyalapæ ſcrupulo, cum granis aliquot cremoris tartari, quam doſin & alias jam aſſuſperat cum ſucceſſu, inde verò cum pluſquam trigeſies purgatus eſſet, remedio ſiſtere fluxum negligens, ſed potius more vulgi ex copia dejectionum medicamento æſtimans effectum, vespere illius diei, & biduo ſequenti ſpaſmo ſtatulento utriuſque pedis dolorifico & permoleſto per vices cruciatur, ubi conſultus exprobravi negligentiam, & dato pulvere cinnabarino cum anodyno brevi abegi moleſtum ſymptoma. *Georg. Wolfangi Wedelii.*

Veteres duas ſaltem admiferunt ſpaſmi cauſas, ſcil. repletionem, & inanitionem, & quidem authoritate *Hipp. l. 6. Aph. 39.* Sed ipſe *Sennertus* l. 1. p. 2. c. 28. qu. 1. prax. p. 586. tertiam addere haud dubitat, ſcil. irritationem, adducens authoritatem *Hipp. Aph. l. 1.* Impugnat hanc doctrinam de repletionem & inanitione. *Clar. Wilſus, Path. cerebri. p. 6. & ſeq.* Et quia in anafarca & tæbe convulſiones non excitantur, rejicere conatur hæſce cauſas; nec, irritatione contentus, altiores cauſas indagare ſatagit. Spasmi ſequentis cauſam ad inanitionem referri poſſe, facile concedo. Si verò alicui placuerit eam ad irritationem ab acredine & ſalſedine ſeri reducere, nec cum illo litigabo. Obſervatio talis eſt.

Anno 1667. vocatus ſum ad acicularum fabricatorem, adveniens inveni hominem ambulanti celeri gradu per hypocauſtum, ſpaſmo pedes, manus imò cervicem convellente, ita ut propter doloris acerbicatem jacere vel ſedere non potuerit, nervi in cruribus retrahebantur, ut foveæ fierent pugni profunditate. De cauſa ſollicitus, inquirenti dixit ſe diarrhœa laborare & ſæpiſſimè alvum exoneraffe, materia excreta erat ſerum bilioſum, ultimo ſanguine tinctum. Ego *Aphor. 4. ſect. 5.* conſiderans, & Epilepſiam metuens, cum periculum in mora erat, neglectis abſtergentibus ad conſtipantia & confortantia properans, ſequens præſcripſi.

℞. Conf. roſ. antiq. ʒj. torment. ʒʒ. primul. ver. lil. conv. an. ʒij. cort. aur. citr. cond. an. ʒ. nuc. moſch. cond. ʒʒ. caru. cydon. cond.

ʒj. decoct. raf. C. C. q. ſ. F. l. 2. contuſum. col. add. conf. alkerm. de hyacinth. an. ʒj. corall. v. præp. ʒʒ. terr. ſig. bol. armen. præp. ana ʒj. malthich. menth. corall. an. ʒʒ. M. doſ. ʒij. & quidem ſæpius. Hiſce uſurpatis hæc ipſa die a ſpaſmo immunis evadebat. Sed vires valde labefactæ erant, cum diarrhœa non totaliter ſublata eſſet. Itaque ſequens ordinavi.

℞. Conf. roſ. antiq. torment. an. ʒj. rad. ſymphyt. maj. cond. cort. aur. citr. cond. an. ʒij. terr. ſig. præp. corallor. præp. bol. arm. præpar. an. ʒj. cum ſir. cydon. q. ſ. F. l. 2. elect. Cum verò artus valde dolerent, nervis ſcil. a ſpaſmo diſtenſis, hoc oleum ordinavi.

℞. Ol. lumbr. terr. vulpin. lil. alb. an. ʒʒ. caſtor. ʒʒ. M. illinantur nervi ubique. Pro viribus refocillandis dedi ſæpius cochlear unum vel alterum ſequentis aquæ.

℞. Aq. cord. citr. cord. cerv. fr. an. ʒij. cinam. cyd. ʒʒ. ſpir. ceraſ. n. ʒij. M. Cum tandem attritione ventriculi laboraret; hæc miſtura profuit.

℞. Aq. memb. ʒiʒ. Zedoar. ʒʒ. galang. cubeb. an. ʒij. ſp. abſinth. ʒj. milt. f. ʒʒ. elzoſach. anis. ſœnic. an. ʒj. M. Et ſequenti oleo ventriculi regio inuncta.

℞. Ol. nardin. ʒj. malthich. menth. ana ʒʒ. abſinth. deſt. g. v. M. Et ſic præter ſpem multorum convaluit *Georg. Wolfangi Wedelii.*

Puer 14 annorum, An. 1679. Menſ. Februar. diarrhœa ſeroſa atroci vexatus; quam dolor ventriculi, appetitus proſtratus, vomitus & artuum laſtitudo, hincque etiam dyſenteria levior comitabantur, noſtram imploravit medelam. Pulſu æquali & blando exiſtente, humorum acrimoniæ bolo ex elect. diaſcord. &c. proſpeximus, additis pulveribus abſorbentibus & nervin. demulcentibus: inde etiam pilulis ex extract. rhabarb. quod ſuperelle poterat, eliminare ſtuduimus: Quibus cum bene haberet, diebus proximis, tempeſtate humida admodum ac pluvioſa, ſignifer per urbem cum commilitonibus (more circa Bacchanalium feſtum recepto) circumvagabatur, diarr. parùm ſtudioſus, quin pomis crudis & aqua frigida poti manè & noctu gulam frequentius oblectaret, unde & moleſtam ſcabiem a multo tempore ſibi contraxerat: ſub finem circiter dicti menſis, deterius habere cepit: facies cum artub. intumuit, inferioribus præprimis, quibus ſpretis æger ſub dio ſoliſque radiis adhuc obambulavit: appetitu inde deſcendi incipiente, & urgente naſcæa ac vomitu materiæ acris, ſeroſæ, denuò accerſiti ſumus: A præſcripto Diaphoretico, tantisper ſudavit, julepum vero vespertinum ilico revomit: ſudor tamen ex parte evanuit: ſub vespere reduces, dolor capitis miſerum torquebat, & materiæ bilioſæ evomitio, pulſu juxta naturali perſiſtente: Ventic. regio ol. baſſa. & nervin. inuncta, & epithem. fronti applicatum: juxta bolus roborans exhibitus ex confect. de hyacintho, circa decimam noctis: Cum jam inducias expectarent adſtantes, ſub mediam noctem motus convulſivi invadunt ilico, qui circa ſiniſtrum hypochondrium incipientes, mox ſemur proximum, & hinc brachium, cum reliquo latere aggrediebantur ſenſim ingravſcentes ſalvo manente dextro: Præſcripta pulveris antepileptici doſi, cum julepo tali per cochlea-



cochlearia sumendo, mane injectus fuit clyster, & myxura cum cinnab. antimonii iterata. Quibus cum ad se redire videretur, convulsionibus non ita crebro affligentibus, insisti iussimus, addit. tinct. Castor. cum spir. urin. naribus ad-movendo, ubi res postulaverit, sacculo item ex carminativ. vino incoctis abdomini, hypo-chonario præsertim sinistro applicando. Somno hinc blando ægrotus capiebatur, hostisque re-mittebat, unde in præscriptis sub vespere per-gi curavimus addito decoct. ex Mercur. vivo, si quid fortè verminosi, quod fœtor oris præsa-giebat, juxta subesset. Postridie melius habuit, noctem quietam transiegit, sed jam pulsus celer & frequens, litis interna, urinæ tinctæ, cum se-dimento crasso: V.S. hinc indicata ad sangui-nis ventilationem, & julepis certatum, addit. bl. nd. diaphoret. Vespere febre remittente, tra-geam ex absorbentibus & antepilept. præscrip-simus, d. seq. urinæ turbidis ac crassis etiamnum exsistentibus, cum pulsu frequentiore, julepo ex alterant. præparante perfectum est, in cra-stinum vero purgans ex syr. ros. sol. compos. &c. paratum, quo aliquot diebus post iterato, cum copiose dejecisset, urinæ sensum clarescere cœ-perunt, cum sedimento utcumque laudabili: ac-cidit autem ut clarescentes sanguinolentæ eva-derent, citra doloris vel in renibus aut perinæo indicia, cui adstringentibus, nibrasque hinc ro-borantibus, pilul. præparatis ex terebinth. rha-barb. & sanguin. dracon. parat. subvenimus, æ-grumque favente Deo pristina sanitati resti-tuimus. *Joan. Jacob. Harderus Apiar. Observ. 37.*

Filia sedecim annorum, à prima natiuitate muta, menstruisque hætenus orba, carnosa quamvis & bene habita, primo Februarii 108, de qualicunque horrore, cum subsequente ca-lore acri anxietate circa præcordia & inquietu-dine tacite conquesta est, cum aliquot menses ante dolore circa lumbos se affligi gestibus monstret: Vocati die quarto, crus utrum-que cum femore vehementer incumuisse notavi-mus: Tumore existente pellucido & doloroso, suisque indicia ex sinistro latere ad eandem mannam usque, multo cum ægræ cruciatu pro-dente: abhinc tamen anxietas & inquietudo cessarunt: pulsus celer & frequens, cum siti utcumque intensæ, præscriptis diaphoreticis vo-latilibus, ad feri discussionem, viarumque, si-cubi natura vellet, refectionem, id impe-trasse videbamur, ut tumor crurum satis tuerit imminutus: Nocturnum interim convulsionum in-sultus, quamvis breviores, ægra bis experta fuit, unde ad volatilia antepileptica postridie confugimus, vespereque symptomatibus pari vi pergentibus, iisdem fortius decertavimus: in sequentibus diebus cum motus isti frequenter ingruerent, mirari subiit medicamentorum inertiam: retulit verò mater, jam à primo or-tu convulsi quid miscellam per intervalla per-peti, d. 7. ad sanguinis ventilationem, parti-cularumque acrum distractionem ac subactio-nem V. S. in brachio dextro imperavimus, quæ feliciter cessit, citra paroxysmi vel ante vel post meridiem invasionem: postridie autem eodem denud ingruente, tinct. antim. in usum voca-vimus, ad gutt. x. vel xii. manè & vespere in idoneo vehiculo sumendam: atque hæc ali-quandiu usitata, paroxysmi manifestè remi-

serunt, ægraque à frequenti horum impetu, sanguinisque febili agitatione liberata fuit. *Joan. Jacob. Harderus Apiar. observ. 38.*

Die 11. Januar. Anno 1686. auxilium nostrum efflagitavit, femina primipara viginti circiter annorum, 14. a partu diebus, conquesta de do-lore pungitivo & lancinante circa lumbos & inguen dextrum, qui in crus & pedem inum ejusdem lateris atrociter sæviebat. In isto tu-mor aliquis subdurus & renitens observabatur, citra ullum ruborem, ægraque pedem nec fle-ctere nec movere, nec eadem insistere potuit: Rogata num ante partum dolorem similem per-sentierit, annuit, & quidem ita, ut incedere in-terdum inde prohibita fuerit: ingruentibus do-loribus partus, crus idem maxime affectum fuit, in convenienti, ceu debuisset, situ non posi-tum: jam lochia fluere desinebant, litis intendit & appetitus prosternei cepit, pulsus celer erat & frequens lumbis & femori ol. lumbric. hype-ric. &c. cum liq. C. C. succin. suræ vero & pedi fomento ex herb. salv. fl. chamom. sambuc. &c. in vino decoct. addita camphora & croco prospeximus; juxta pro en endando acri in massa humoralitabulante tragæcia ex Dia-phor. Martiali ocul. cancr. corall. &c. cum sacch. paravimus. Sub vespere dolor idem urgebat, simulque semur petebat: suavisimus ut dict. liquor. cum tinctur. croc. & aliis illud blande lavaretur & fricaretur, addita mixtura diaphor. ex aq. card. ben. veron. C. C. philos. præparat. &c. D. sequ. retulit se noctem ut un-que quietam transiegit; doloris ex femore in pedem insultum non ita crebrum nec atrocem esse, rigor tamen in partibus musculosis ma-xime sub genu, dolorosus admodum persistit, cujusmodi etiam in femore animadvertimus, & alvi fluxus aliqualis ægram invasit: a sumptâ mixtura parum sudavit, pulsus tamen hesterno n. elior, plenus nec ita frequens: perfectum est in præscriptis, circa tertiam vero pomeridia-nam bolum ex elect. discord. corall. &c. exhibuimus, quem mox evomuit, quod ad medica-menta difficilis erat: sub vespere dolores in inguine recruderunt crure universim, cum pede obrigescente: iussimus illi totum applicare, & suræ cataplasma, ex farin. rad. alth. flor. sam-buc. chamom. semin. lin. carv. addit. axung. can. mur. Alp. camphor. croc. ol. lumbric. &c. Postero mane reducens, dolorem multo mi-tiorem esse audivimus, tetano quamvis adhuc subsistente, sumit hoc mane de tragæcia & in cæ-teris perrexit. Vespere dolor punctorius rediit atrociter, pes tumebat supra modum, & reni-tebatur cum fragore, qualem ubi tantisper in alium locum movebatur cum sonitu edidit: pul-sus celer & parvus: cataplasmati additæ 3. ali-quot fimi caballini: in tomento & oleis per-rectum, juxta paratus sacculus ex radic. bryon. lilior. alb. herb. bryon. flor. sambuc. &c. cum croc. lacti incoquendus & inguini calidè appli-candus: internè vero propinavimus julep. blande diaphoret. in 2. dos. Postridie ex sac-culi usu dolor remisit redux ad tantillum mo-tum, pes vero nec ita renitebatur, nec tanto cum fragore: perstitimus in externis, internè autem julepus similis rursus exhibitus; & quia diarrhæa denud miseram vexabat, emplastr. ex gum. tacamahac. Bals. Peruv. ol. dist. menth.



& pice stomachi regioni applicuimus. Vespere ægra pedem aliquantum moyere poterat, sed non extendere; dolor urgebat præcipue mira genu: in inguine vero nonnulli per intervalla affligebat, in medium femur usque pergens: liquidem in pede imo tensio remiserat, in externis nil immutatum fuit, hora vero somni Julepi dosim dimidiam propinari iussimus. Dissequ. symptomata ferè eadem, nisi quod pes minus tumeret, tensusque esset: jam cataplasma femori applicuimus: suræ vero & pedi imo fumus adhibitus ex flor. Sambuc. sem. aneth. oliban. malliche, thure, &c. juxta præscripta emulsio in duas doses ex amygd. d. sem. nallurt. cardbened. &c. addit. jul. rosac. Diarrhæa remiserat, urinx tantisper lixivæ, nec ita crassæ ut præcedentibus diebus, die postero tensio & dolor in sura paulum ingravuerant: unde ad cataplasma rediimus, auctâ dosi timi caballini, additoque sale volat. C. C. iterata quoque fuit emulsio ex semin. sal. volat. imprægnatis: seq. manè retulit ægra se noctem satis quietè transigisse, remisisse dolorem in pede, adeo ut digitos flectere possit, etiam in sura & femore, nec nisi sub genu aliquid ejus superesse, pulsus erat melior, nec urinx ita saturata, appetitus magis constans: perfectum fuit in externis addit. ol. ovorum Tinct. croc. &c. In crastinum verò iussu est lenem Sudatiunculam pane recens ex furno extracto experiri: cum rediremus d. proximâ, non sudarat, sura & pes inus multum detumuerant, pedemque in lecto faciliè movebat, ipsi tamen ob musculos extensores etiamnum spasmodicè affectos, insillere non potuit: Sudor quoque de reliquo corpore per intervalla fluebat, cæteraque benè habebat, iussimus subsisteret in ordinariis, à quibus illud per Dei gratiam levaminis sensit, ut in seq. diebus genu flectere, commodumque obambulare potuerit.

Die 23. Januar. ægrotâ levi de causâ ad iram commota, dolor vehemens inguen sinistrum invasit, citrà tamen femoris vel imi pedis spasmus, qui succedentibus diebus utrumque horum invasit, accessit febricula, ob quam V. S. parca in perata fuit: sanguis eductus viscidus omnino fuit & corruptus, appetitus prosternebatur, sitis ingruit. Propinati hunc in finem, Julep. & emulsiones ex blande sudorem cientibus, juxtaque Diaphor. Mart. pluribus vicibus exhibitum: Externa vero eadem in usum vocata fuerunt, provocato sub finem sudore ope herb. bryon. flor. Sambuc. rad. bryon. &c. in aq. fervent. coct. atque his per aliquot dies iteratis, sura & pes emolliri, tumorque aquosus, qui comparuit ultimis diebus, discuti cepit, Ægrotâ in hunc diem vegetâ superstitè. *Johan. Jacob. Harderus Apiar. observ. 39.*

Anno 1625. Mense Maio Matrona quædam Bernensis juvenis, convulsionibus horribilibus cum desipientia per dies aliquot laborabat. Tam impetuosè autem corpus ex una in alteram partem concutiebatur, ut duo viri quamvis robustissimi, ipsam vix continere possent. In istis motibus convulsivis autem corpus non aliter agitabat, ac si cum marito suo coivisset. Id cum probè observassem, & medicamenta omnia ipsam respuere vidissem, suasi, ut maritus qui per menses aliquot absuerat, accerseretur, alioquin de ipsâ actum esse. Sequentè die

adveniente marito, brevi restituta fuit & ad se rediit. Membra tamen ab ipsis convulsionibus concussa & labefactata, per dies aliquot sequente linimento inunxit.

24. Oleæ Floribus Stotani ʒj. Lumbricorum, Vulpin. Chamomelin. Lilior. alb. Rosac. an. ʒʒ. Misce.

Ab eo tempore degentem vitam cum suo Medico jugali, nunquam nec convulsionibus, neque aliis morbis ipsam correptam fuisse scio. *Guil. Fabric. Hildannu observ. Chirurgic. Cent. 6.*

Mirabilem illam, de qua sæpe coram, affectionem, Virginis puellæ, æt. annum agentis, describere, totamque varimodè succrescentis, & variis ac stupendis accidentibus subindè efflorescentis, historiam integram, & secundum symptomatum varietatem, concursum ac seriem perfectam calamo concipere ferè mihi impossibile est, citius namque verba, conatuque scribendi defectura sunt, quam ut omnia exactè secundum omnes circumstantias exprihere valeam. Attamen præcipuorum accidentium formam, diversitatem, impetum, accursum & recursum, & admirabilem eorum varietatem breviter enarrare, & ex iis morbi speciem exhibere, quantum possum, quantumque memoria adhuc teneo, enixe laborabo.

Puella est pia ac proba, benè morata & educata: salubriter antehac vixit, nihilque deprehensum, quod corporis offensam argueret: temperatura, ut videbatur calidæ & siccæ, adeoque cholericæ, quæ ad iracundiam levissimè incitatur, fratrem habet Epilepticum, & certè ejus ipsa natura, sicut & Sororis, in idem malum propendere videtur. Ea 7. Julii, anni præteriti 1622. cum pridie leves capitis dolores sensisset, manè circa septimam, cum ad templum se præpararet, subito quasi consternata, concidit, & scamno innixa adhasit, loquelâ impedita, incedere, manus pedesque movere ac attollere nequivit: in lectum translata, quâdam quasi anhelitus difficultate, ita ut ægre spiritum duceret, & pectus scapulasque inter respirandum insigniter attollere cogeretur, premi cepit, & interdum clamorosa suspiria duxit: rediit autem subindè, quasi per paroxysmos, hæc difficultas, atque pressura, in qua nil quicquam loqui potuit; reliqui autem sensus, visus, & auditus, integri manserunt. Paulo post caput hinc inde conjectare cepit. Mox tamen rigidam & immobilem cervicem habere visa est, & quod postea in erectione capitis à me animadvertum, cum quid Sorbitionis vel medicamenti ingerere vellet, capite retrorsum magnâ vi retracto, manumque attollentis deprimente, opisthotono prehensam judicavi: perterritus autem ægritudinis infrequentia, & insueto morbi, qualis nunquam occurrit, insultu, cum diu suspensus hærerem, ea ferè adhibui medicamenta, quæ in Epilepticis invasionibus, utilia existimavi. Sed durabat affectio, & post leves intermissiones subindè recurrebat, ad horam usque duodecimam, quando omnia invalescere incipiebant. Tum majoribus suspiriis anhelans, & ejulans, spiritum traxit, atque cervicis nervorum rigore continuo detenta, pejus habuit ad usque tertiam. Hinc mitigato malo, loqui cepit, delirare, cibum postere, vociferari. Indignari ad usque vespèram, ubi tum ab inquietudine



dine hac languescens extrema debilitate laboravit, ita ut sensu, motuve privata, animam exhalatura videretur: duravit autem languor hic per 2. ferme horas, quibus exactis sensum se recollectit, & ad sese rediit, cibisque refecta per totam noctem placide dormivit. Altero die mediocriter habuit, & medicinam purgantem sumpsit: duodecima autem hora malum reversum est, & prioris diei ferè formamque, modumque servavit, nempe per intervalla tetano correpta, cervicis rigorem, spiritusque difficultatem, atque pressuram passa est: inter paroxysmos de tanto capitis dolore conquiescit, ut ad clariorem etiam vocem & loquelam quiritaret: aliàs loqui, imò linguam movere non potuit, nisi forsàn ubi mitior invasio, ubi tum lingua titubavit, & inexpedite locuta est: Tertiò die sat benè habuit: Quarto post leviores paroxysmum in t. n. tam pedum convulsionem & contractionem incidit, ita ut pedes retracti quasi funibus corpori alligati viderentur, absque tamen omni dolore, tendines a. sub genubus lapideæ ad tactum duritie & rigiditate continua afficerentur. Et quamvis post convenientes inunctiones melius habere videretur, attamen ad quartum n. que diem spasmodica hæc, & violenta contractio, continuo perseveravit, interim corpore reliquo bene valuit, a prioribus paroxysmis plane immutatus: quarto autè die circa vespertinam subito distensio hæc remisit, ipsaque ex in. provisio e lecto prostratus in pedes se coniecit, & parentibus accurrens latibunda liberationem annunciavit: post hæc benè se habuit, sentinque validior facta est, ita ut penitus restituta crederetur.

At post mentem, nempe 6. aug. cum pridie magnos capitis, frontis maxime, temporumque dolores passa esset, in idem ferme malum, alio tamen invasionis modo, incidit: nam mane sumpto jentaculo, cum corporis titubatione, & vertigine vexari videretur, in lectum redire passa, profundo quasi somno abrepta est: in quo t. n. quàm somnians varia loquebatur: subito autem exterrita, quàm cum magna & præcipiti corporis concussione, evigilavit, mox rursus somno se dedit, denique terrore concitata exasperata est, & id per integram horam, vel diutius paulo, duravit, idemque post prandium & cenam, & posthæc sæpius, quam primum aliquid cibi ingessit, evenit, ita ut mox superdormire cogeretur, & terribi tali somno corripere, nocte aliàs placido ac naturali somno semper ferme dormivit, excepta tertia ab accidenti hoc nocte, quam ferè totam deliravit, ita ut omni intellectu orbata videretur: memoria ita defecit etiam, ut orationem dominicam orare amplius nequiverit: per intervalla tamen mens & memoria reversa, post leve autem momentum iterum extincta. Circa vespertinam convulsio invasit nunc hoc, nunc alterum brachium, ita ut extendere ac movere non potuerit: mox pedes quoque eadem contractio corripuit, ita ut jam brachia & pedes convulsi stiterentur, sed paulò post brachia reliquit, hinc etiam pedes, ita ut tam brachia, quàm pedes movere potuerit. Postremo die maxima omnium membrorum inquietudine correpta primum tandem in pedes se coniecit, & in hypocausto discurrere ac sal-

tare cepit: miserabili sanè & stupenda inf. n. specie tentata ac turbata, varios ac turbulentos mores exhibuit. Nam nulla neque vi, neque increpatione contineri potuit, quominus hinc inde cursitaret, nulloque modo subsisteret, sed indefinenter inquietudine hac detenta: in lecto etiam, si forsàn cohiberetur, ex uno loco in alium sese coniecit: imò parietes etiam transcendere, & circa fornacis extremitates discurrere quæsit: Extra lectum dissiliens, scopas, vel aliud quid simile apprehendens, pavimentum a sordibus diverrere, omnemque immunditiam conclavis, omnes angulos evolvendo, exquirere & expurgare nunquam cessavit. Interdum, subitanea pedum contractione inter discurrendum correpta, subsistere coacta fuit, mox tamen, soluto iterum spasio, denuò saltare perrexit: imò defatigata, vel alioquin lassata, si pigriorem interdum cursum inierit, vel subsisteret, pedum affectio ipsa modica mox irruerat: sollebat autem si cursum repeteret, & impetuosius se agitare. Quinetiam paroxysmo hoc tui. ulento interdum repente soluto, subsistit, suisque quod liare posset, acclamavit, lectum etiam ingressa, quævit: mox utem iterum promittens, cenuo saltare compulsa fuit, subinde n. meque per intervalla longiora, jam jam breviora inquietudo hæc ipsam, in xime autem a sumpto cibo, invasit, non raro tamen inter prandendum aut canendum subito de mensa surgens, in pedes se coniecit, nec cohiberi potuit: vi autem cohibita, pedibus tripudiando quasi, humum indefinenter pulsavit. Quod si, ne in pedes se coniceret, prohiberetur interdum, (quod non raro parentes tentant) insigniter affligebatur circa præcordia, maxime juxta orincium stomachi: ubi de validissima compressione quætebatur, quæ mitescebat, si sese saltando jactaret: protinus autem quando subsistebat, denuò iterum dicto loco gravissimas passiones sustinebat, ita ut ab isdem impelleretur, indefinenter discurrendo se exercere: linguebat etiam plurimum, ac debilitabatur, & distensionibus membrorum tentabatur, quando nondum finito paroxysmo sese agitare cessabat, aut prohibebatur. Si initio restuere invasiones, in lecto locoque suo manere potuit, nec evagari coacta fuit: Attamen tum inquietudo nunc hoc, nunc aliud membrum invasit, ita ut incessanter quassare, nempe brachium hinc inde movere, vel pedem sursum, deorsumque trahere, continuatâ serie, cogere-tur. Sæpe caput solum, ut hoc hinc inde indefinenter jactaret, malum occupavit, sæpè saltem ejus partem, nempe linguam, unde titubatio, maxillam, unde dentium collisio atque stridor: aures, nasum, buccam, labia, collum, unde earum partium tremor, atque concussio, totam denique faciem, unde ejus sæda distortio sequuta: Inferiores etiam non raro partes vexavit, pectus nempe ventrem exteriores musculos, unde palpitaciones, & distensiones exortæ, imò mirabili varietate nunc hoc, nunc aliud membrum, nunc unam saltem, sæpè plures partes simul invasit, atque afflixit. Semper autem & in omnibus paroxysmis, linguam simul affectam vidimus, ita ut tremere, vacillaret, balbutiret & impeditè loqueretur, leviter etiam deliraret, ratione aliquantum destituta, licet



alio tempore plus, alio minus, quæ mentis, sermonisque imperfectio & titubatio, mane præsertim cum e lecto surrexisset animadversa, futuram invasionem semper indicabat, quamvis alias in ipsa accessione, dum saltaret, atque discurreret, vel membra jactaret, sensus extiores illæsi ac integri permanserint, quod facile judicare fuit ex eo, quod quodvis audire, & ne sese offenderet, sedulo carere potuit. Interdum loqui omnino non potuit, & ad interrogata nequicquam respondere: sæpè autem quando affectio linguam inquietavit, incessanter garrere, imò canere etiam coacta fuit, & tunc quo plus loquebatur vel canebat, eo minus se circa præcordia affici, & immunem à molestia cordis compressione fieri dicebat: quàm primum autem inquietudo linguam deservit, ipsaque deblaterare & canere cessavit, membri alterius, aut pedis aut brachii quassatio & agitatio secuta est. Interdum ratione omnino privata, interdum mente satis valere visa. Cibus in paroxysmo, maxime vehementiori, assidue flagitavit, crassum imprimis, nempe panem secundarium cum butyro coctum, quem avidissime semper devoravit: quod si denegabatur, urgentissime poscere non distitit, sæpè cum precibus, lachrimis & indignatione; si alius quandoque & diversus ab eo, quem petierat, forsan exhiberetur, pro eo tamen, quem, postulataverat, cupide coniecit: imò interdum, si non confestim adesset, exacerbata, obvia quævis, ligna, stipules, linteos pannos, vel quidvis aliud ori ingessit, dentibusque maxime si malum maxillas prehenderat, laceravit. Et si brachia inquietudo occupavit, illud, quo uteretur inter edendum, adeò hinc inde jactavit, ut difficulter cibum ori admoveere potuerit, adeò ut sæpè ingerendo opem ferre necessum fuerit. In omni invasione frontis, temporumque venæ turgescerent & livescerent apparebant. Frontis autem dolor, cordis tremor, orificii stomachi compressio, deliri sermones etiam, lingue item tremor, ac vocis titubatio futuram invasionem prænuñciabant.

*Dysuria* etiam accessit non raro, ita ut sæpè per integrum diem nihil excreverit, quamdiu nempe paroxysmus duravit; eo autem soluto, urinam emisit. Per totam noctem semper fere dormivit, placideque quievit, quantumvis totum diem inquiete peregerit. In somniis tamen aliquoties turbata est, sicuti & prius, cum sana adhuc viveret.

Prodigiosum hoc malum per 14. continuos fere dies duravit, ita ut in dies, vel membrorum motus convulsivi, vel inquietudines jam enumeratæ exortæ sint: Postea verò remittere cepit, & non nisi certis dierum intervallis recurrere; eandem autem ferme idæam servavit semper, ita ut vel discurrere vel membra quassare cogeretur, cujus invasionis principium delirationes, linguæque titubationes, tanquam prænuñcii indicabant.

Varias adhibui medicinas, purgantes, roborantes, bezoarticas, internas & externas, fonticulum etiam nuchæ impressi: nihil autem, vel parum profeci: tandem autem mense Decembris, cum illa medicamenta, quibus olim Hassiaci Medici, in morbo quodam publicè grassante, huic penè simili, usi sunt, quorum de-

scriptionem ab Excellentia tua accepi, exhibuissem, sensim minui affectio cepit, ita ut primum paroxysmi mitiores facti fuerint, post ipsæ saltationes remiserint, tandem etiam membrorum concussiones mitigatæ. Nec tamen nunc malum extirpatum, nam quotiescunque ad iracundiam commovetur, uti facile fit in re familiari, in quo valde se indultiam exhibet, vel quando terretur, uti maxime accidit vi o fulgure, & audito tonitru, aut impetuosiore, aut repentino sonitu, denuo ejus rudimenta subito eam apprehendunt, ita ut loqui nesciat, aut balbutire incipiat, sæpè etiam hinc unum aut alterum membrum agitare compellatur: nec tamen diutius hæc durant, sed per mediam saltem, sæpè tamen etiam per unam aut duas horas: postea ad se reversa, recte iterum se habet optimeque valet, adeò ut nihil adversi in ipsa animadvertere liceat. Plerumque etiam recrudescit affectio, quando Luna superiora signa, nempe Arietem atque Taurum, occupat, tum a sumpto cibo mane præsertim, quamprimum aliquid degustat, tale quippiam quandoque patitur, ita ut delirare, linguaque tremere, atque titubare, sæpè etiam hinc inde membrum quoddam agitare incipiat. Quando vero pulveris illius, & electuarii bezoartici usum non negligit, sed continua adhibitione subsidium sibi subinde comparat, fere à mali invasione servatur. Et hæc fere est mirabilis illa & prodigiosa affectio, quæ stuporem omnibus altantibus & videntibus peperit.

Cujus naturam & causas veras inquirere & indagare quamvis difficile sit, nihilominus tamen, cum nonnisi ad convulsorii affectus speciem referri posse existimem, generalia quædam de convulsione hic proponere, ejusque naturam rimari, causasque indagare, non abs re duxi.

*Convulsionem*, quæ consideratur tanquam symptoma depravati motus, aliam esse in fieri, quando nempe repetitis vicibus nervuli contrahuntur, & convelluntur, uti in Epilepsia: aliam verò in facto quando ii contracti servantur, nec motus interrumpuntur, ut in tetano apparet, per se manifestum est.

In hoc vero casu, cum primum Opisthorono preheusa, immobilem cervicem haberet, postmodum in varias partes diffuso affectu, variaz convulsionum formæ, ex motuum convulsoriorum varietate exortæ sunt: nunc vero non cervicis tantum, sed & pedum, uti & brachiorum musculos distentos, & immobiles vidimus, mox vero eisdem varia contractionis specie hinc inde agitari & præter voluntatem, iteratâ & continuatâ commotione, totum etiam corpus concitari observavimus.

Ex natura autem arbitrarii motus, qui non est nisi contractio musculorum ad propria principia, capita nempe, à voluntate excitata, convulsivi & symptomatici motus natura & conditio perspicitur & investigatur, ut qui est motus depravatus, vel contractio musculorum ad sua principia, præter voluntatem à causa præternaturali suscitata.

Causa hæc, ut exactius cognoscatur, primum locus affectus seu *seu partes dicitur* hujus indagandum est. Hoc triplex communiter Medici cum Galeno statuunt, nempe 1. *Cerebrum*, 2. *spinalis medulle principium*, & 3. *particularem*



*laxam etiam nervorum vel musculum, Carolus Pisa, in observationibus suis de colluvie & illuvie serosa, argute satis & erudite de affecta convulsionis sede, cerebro nempe, spinalis medullæ principio, differit, quod nempe nervi tanquam funiculi quidam ita continui sint cerebro, ut ejus membranis, tanquam principio nervorum, præter naturam contractis, concussisque, aut rigidis factis, necesse sit nervorum genus appensum, sive totum, sive magna ex parte, contrahi pariter, concutique aut rigescere: membrorum autem contractionem sæpius repetitam, ita & constantem rigorem inferri à corpore alieno sua plenitudine replente nervorum principium ejusque latitudinem seu cavitatem distendente, nempe dum cerebrum corrugatur, seseque ipso brevius efficitur, secum trahere omnia adnata, appendicem scilicet, nervosum genus, adeoque fieri totius corporis convulsionem non proportionatam materię, &c. sed, quod præce tanti viri dixerim, ejus sententia parum firmis rationibus fulcitur. Nam cum anatomicorum teste, cerebrum corpus fibrosum non sit, nec motu voluntario agitetur, certe subjectum etiam convulsionis, quæ non nisi in membrum voluntario aliis motu præditum cadere potest, per se nequaquam erit, sed per accidens saltem nempe propter effusionem materiæ spissam efficientis, in capitis, vel totius etiam corporis musculos. Principium autem nervorum, quod est juxta primas spinalis medullæ partes, etsi fibrosum nonnihil sit, & hinc in substantia sua exiliter contrahi & dilatari possit, quia tamen molliissimum est, & carnis omnino expertus, tantum roboris, virumque habere non poterit, ut convulsorios motus, si ab opplente corpore contrahatur & distendatur, per se excitare queat, cum nec pro arbitrio nostro, vel unum membrum, nedum totum corpus simul contractione sua movere possit. Et qui, quæso, imaginari nobis possumus, nervorum originem aut cerebrum sic impelli posse, aut tam violenter distendi ac contrahi, ut contractione sua ob longitudinis decessionem se cum sursum trahat nervorum, qui ab ipso procedunt, surculos?*

Nervi sane in musculos absumpti, nequaquam tanquam funes eos, & ex consequenti, artus, quibus ii inserti sunt, movent: nam minutissimi sunt nervuli, qui in eos inferuntur, ita ut contractione sua nequaquam partem movere possint: imò si Vesalio credimus lib. 4. Anatomie, quibusdam nulli prorsus distribuuntur: sui verò distribuuntur, in tota tamen eorum corpora nequaquam sparguntur, sed nunc in ventres tantum, nunc in capita, aliàs in tendines eorum ramuli disseminantur, ita ut, & si contrahantur, totos tamen musculos majores simul contrahere nequaquam possint. Imò fere obliqua est, & flexuosa eorum insertio, quæ contractionem, tracturo organo necessariam, moliri non potest; quæ ergo contractiores effecti, musculos, quibus inserti sunt, ad se pertrahere possunt? Et sane si in corporibus mortuis manibus nostris trahuntur, non tamen musculos ad se attrahere percipimus, sicut hos, aut tendines eorum tractos, ossa videmus attrahere.

Nervi ergo nequaquam principalia & immediata motus arbitrarii organa sunt: Nam non ideo contrahuntur musculi, contractioneque

sua membra movent, quia ab iis, nervis nempe contractis, versus originem suam, trahuntur; nam ipsi contracti, musculos tamen secum trahere, uti jam probatum, nequaquam possunt? Sed id à natura destinati sunt, ut animalem duntaxat facultatem cum spiritu, adeoque imperium à cerebro ad musculos deferant, qui ipsi musculi, & potissimum fibrosa eorum caro, omnium Anatomicorum teste, primum & per se instrumentum sunt voluntarii motus. Si instrumentum, ergo etiam subjectum. Et si subjectum motus voluntarii, etiam involuntarii, adeoque convulsorii motus *dicti* erunt: nam voluntarium & involuntarium sunt contraria, quæ idem subjectum alterius occupant, ut de aliis quoque contrariis dicitur.

Nervi autem, quamvis moveantur toto moto musculo, non tamen motio ab ipsorum tractione provenit, sed ipsi tanquam eorum partes simul moventur, adeoque ut per accidens motus voluntarii, ita etiam involuntarii, nempe convulsionis subjectum sunt, licet aliàs ipsi sensuum, motuumque cause, propter spiritum nempe, quem musculis & partibus sentientibus communicant, & distribuunt, rectè vocari possint.

Cum ergo neque in cerebrum, neque spinalis medullæ principium, talis & tam violenta distensio, & contractio cadere possit, ita ut appensum nervosum genus ob longitudinis decessionem, quæ ad latitudinis augmentum & extensionem aliàs sequi solet, sursum trahi necesse sit: ipsi etiam nervi, quantumvis contracti ob causas supra dictas, musculos tamen secum trahere nunquam possint, profecto communem illam Medicorum de convulsionum primo subjecto opinionem rejicere cogemur.

Quamvis namque aliàs omnia corpora laxa atque ductilia nempe membranæ, corrigiæ, lora, vel funiculi, seu chordæ, ex intestinis, fibrosisque animalium partibus concinnatæ, si vel aqua madefiant, vel uvido aere turgeant, tantumdem in sese contrahantur sponte, & de longitudine deperdant, quantum alienus humor, occultos poros subiens ac replens, latitudini augmentum dedit, & è contra, si eadem exsiccantur nimium, aut evacuentur, mox tum quoque incurvantur atque attrahantur: non tamen hoc ad nervos accommodari, & inde convulsionis generatio per similitudinem hinc declarare potest: quia nervi humorum, vel redundantia, vel defectu contracti, tales nati sunt, nec rursus dilatarentur, & postea iterum repetitis aliquot vicibus, ut in convulsionibus evenit, contraherentur, quemadmodum etiam chordæ, vel alia corpora laxa à nimia humiditate & siccitate contracta, contracta etiam manent, nec modo contrahuntur, modo dilatantur iterum, repetitis vicibus nisi in alium transferantur aërem. Insuper, si humor quidam convulsionem faceret, partes convulsæ faciliè in suum naturalem situm torqueri, flecti, aut extendi iterum possent, nec tam fortiter distorquerentur, nec aliquandiu distortæ manerent ac vigentes: Nam humor mobilis est, omnique violentiæ cedit, nulla per se ad resistendum vi præditus: Cujus concretio & congelatio in nervis aut musculis immedicabilem rigorem, non solitam convulsionem, indicaret. Et quæro,



si humoris exuperantia convulsionem progigneret, quo pacto paroxysmi, quantumvis vehementes: interdum, tam cito, uti alias celerum in convulsorios motus generationem & solutionem habere videmus, solvi possunt? Exuperans certe humor tam cito discuti ac absumi nequit, tam cito etiam non procreari, vel de novo rursus impelli ac irruere: imo, si copiosior subinde irrueret, & sic magis magisque impieret, distendendoque longitudinem immuaret, membrorum rigiditatem & distensionem nervorum continuam & constantem, nec contractionem sæpe repetitam, & concussionem talem nervorum efficeret. Deficiens autem humor, sive nervorum exiccatio, multò minus convulsorios motus gignere potest. Nam tam subito is restitui ac reparari non potest, iterumque exiccare, ut tam iteratæ concussionis exoriri, tamque celeris solutio, atque etiam generatio locum habere possit: quin & in vivo hominis corpore nervi eo usque exiccare non possunt, ut intenduntur, quemadmodum chordæ in instrumentis musicis, quæ sic habiles sunt, ut pro conditione aeris humidioris aut siccioris, cui exponuntur, contrahi & extendi possint. Nervorum autem, qui ex seminali materia constant, ea natura & conditio non est, ut per se contrahi & extendi possint; & quamvis intenduntur & contrahantur, per accidens tamen hoc saltem fit, nempe musculis intensis aut relaxatis, quorum ipsi partes sunt: nec etiam in corporibus nervi ita tensi ac sicci, ut in fidibus chordæ, apparent, sed laxi sunt & tanquam pusilli ad musculos accedunt ita ut animo concipere impossibile sit, quomodo sic propter repletionem dilatentur, aut ob exiccationem distendantur, ut manifestè breviores hiant, & hinc sequatur convulsio.

Ex hæcenus dictis patet, quod uti convulsionis subjectum, neque cerebro, neque nervorum principio, nec ipsis nervis assignari, sic humoribus illuc irruentibus & oppletionem suam distendentibus ac contrahentibus, efficiens causa proxima & conjuncta rectè adscribi non possit. Humores namque, sive crassi si sint, sive serosi, & tenues, si in cerebrum & spinalis medullæ principium, & hinc etiam, in nervos irruunt & obstructions faciunt, alios affectus, nempe apoplexiam, carum, Paralyfin &c. inducunt: nec ulla firma ratio adferri potest, cur serositates, si principium nervorum subeant, ibi subsistant, nec secundum nervos decumbant, atque paralyfin progenerent.

Et quamvis Piso effervescentiæ & ebullitioni materiæ causam adscribat, ex qua sursum potius moveatur, quam ad locum declivem delabatur, nihilominus tamen, cur non etiam pars ad nervos transmittatur, eosque affligat, vel si fervor remissit, non ad ipsos decumbat, vel vivente expultrice cerebri virtute eò propellatur, adeoque paralyfin gignat, sicut in apoplexia hoc fit, ratio dari nulla potest: nam materia tam cito, ac penitus resolvi nequit: tam copiosa enim est, ut oppletionem suam, secundum ipsius sententiam, spinalis medullæ principium distendere atque contrahere sufficiens sit. Nec solum paroxysmo per palatum, vel alias vias eam excerni observamus: quamvis enim quandoque exeretam materiam ipse observavit, non

tamen, nisi paroxysmi violentiæ, eam, quæ forsan in capite delituit, commotam, probabile est: sane hic nihil tale observare licuit. Etsi autem quandoque epilepticiis convulsionibus paralyfis vel apoplexia superveniat, non tamen hoc accidit, ob eam materiæ copiam & plenitudinem, quæ plus magis aucta, vehementiores & alios graves affectus jam inducit, sed per accidens hoc saltem fit, nempe ratione convulsivorum motuum per quos humores, antea quieti, nunc extimulantur & agitantur, & sic in iis corporibus hoc evenit, quibus debile caput & pituitosis humoribus oppletum adeoque ad apoplexiam & paralyfin per se dispositum est.

Causa ergo continens convulsionum ac depravatorum motuum alia inquirenda erit, quæ quidem ex voluntarii motus natura & actione exactius investigari poterit.

Nam idem debet esse substantiæ & speciei, quod utrumque motum voluntarium, ac involuntarium naturalem ac depravatum excitat, hoc tantum servato discrimine, quod si illa substantia secundum naturam se habeat, voluntarius, si autem præter naturam sit, involuntarius, & sic convulsorios excitetur motus.

Cum autem motus voluntarius ab animali spiritu qui per nervos deducitur, ac in musculos excidit, eorumque fibras ita movet atque pellit, excitatur, consentaneum profecto est, motum depravatum, & convulsorium non minus à spirituosâ substantia, utpote statu, aut statulento vapore, musculorum fibrarum præter naturam sese insinuante, & pulsu, tractuque illos ad suum principium contrahente, progigni & excitari. Ubi tamen quam maxime observanda diversitas utriusque causæ efficientis. Nam animalis spiritus ab appetitu pulsus, motusque, siquidem si secundum naturam affectus est definitè musculorum fibrarum, agentium quidem intendendo, oppositorum autem laxando, movet, & sic contractionem ad sua principia voluntariam, quam postea totius membri vel inflectio sequitur, vel extensio, qui motus naturalis est & voluntarius, efficit. Præter naturam autem affectus spiritus, & vel admixtione statuum inutilium adulteratus, vel alienâ & infestâ qualitate depravatus, temerè & indeterminate undiquaque subiens, vel propter impetum ac copiam, musculorum fibrarum plus æquo replet, atque distendit, vel propter malignam, sibi quæ intensam, qualitatem exagitatus atque disturbatus, musculos quoque varie impellit atque exagitat, adeoque depravatos & convulsorios motus excitat.

Spiritus sanè statulentus, vel teter vapor animalibus spiritibus admixtus, musculisque inclusus, quam maximam vim habet, invitis nobis violenter movendi, variasque spasmorum species excitandi: nam vel unius musculi fibrarum præter naturam minimum intendit, vel oppositorum copia sua replet, varias convulsiones modo compositas, secundum vel unam saltem, vel duas etiam, aut tres loci differentias gignit: Tot enim cuius membro convulsorios motus accidere possunt, quot modis juxta discrepantes loci differentias membrum illud à voluntate alias naturæ & arbitrio moveri potest. Qualitas autem aliena & substantiæ nervorum ac spirituum



tuum infesta, si & ipsa per nervos in musculos diffundatur, sopitos in musculis spiritus excitare & turbare potest, ut musculos convellat, non aliter atque appetibilia rerum species spiritus secundum naturam impellunt: & quò quidem talis qualitatis violentia major est, quam naturalium impressionum appetitus, tanto quoque naturali ac voluntario violentior excitatur motus: quin & eadem pituitosa qualitas crudos halitus, vaporesque in partibus delitescens transitu suo exagitare, & ad musculos secum quasi rapiendo deferre, adeoque motus præter naturam, & convulsiones excitare potest.

Causa hujus efficientis assertio verificatur, quod spiritus ad movendum, quàm maximè valent, id quod aliæ etiam res, ut terræ motus, tonitrua, & bombardarum fragor testantur: infesta autem naturæ qualitas spiritus perturbare atque cogitare, naturalem eorum vim, pulsus atque motum qui alias à spiritibus sanis appetitu naturaliter motis dehinere excitatur, pervertere & ad summam violentiam pertrahere potest.

Imo convulsoriorum motuum celerior solutio, subita generatio, & repentinus recursus satis declarant, talem ipsorum esse causam, quæ discussionem & regenerationem etiam celeriorum recipere potest: tales autem sunt spiritus, utpote, qui confestim absorbi & expelli, iterumque generari, aliena autem qualitas statim à natura superari & evinci, mox autem iterum ex foco suo diffundi potest.

Quin etiam momentanea spirituum per corpus translatio & celerrima quoque qualitatium, continuitatis alteratione, diffusio: ita ut hinc etiam manifestum satis sit & perspicuum, convulsorios motus, nonnisi ab his causis efficientibus conjunctis & immediatis excitati.

Verum causa hæc convulsionum efficiens alias in ipsis partibus musculosis generatur, quando nempe ibi flatuosi vapores coacervantur & colliguntur, & ex suppressa aliqua evacuatione, humore eò translato, inde evocantur, qui in fibras musculorum penetrantes convulsionem excitant: alias autem aliunde ad ipsas deferuntur, sicuti hoc sit, cum à cerebro, vel spinalis medullæ principio vapor aliquis, vel infesta qualitas ibidem excitata, vel ab aliis partibus, ut stomacho, utero &c. eò transmissa, transfunditur, ut in Epilepticis affectionibus hoc evenire solet.

In his enim pro materiæ copia, alienorumque vaporum multitudinem, potio vel in capitis, ejusque partium, vel in reliqui etiam corporis, ut manuum aut pedum musculus, per nervos distribuitur, & effusa, convulsiones, distensiones, palpitationes, tremores, aliosque consimiles, præter naturam, motus ciet, & excitat. Sic quando musculus, capitis aut cervicis motibus destituitur, flatuosi vapores comminguntur & insinuantur, & ab his æqualiter ipsorum partes tenduntur, convulsis ad principium suum utriusque musculi, tum inclinantis & erigentis, tum flectentis & tendentis, ut nullam in partem insecti queat, tetanus sive rigor exoritur: Si verò in anteriora sentio sit, è convulsione flectentium, si verò in posteriora, è convulsione tendentium.

generatur. Quando verò iidem vapores ad alias partes distribuuntur, quatenus diversimodè earum musculis sese insinuant, alias etiam convulsionum species adferunt: Sic alia convulsio solitaria est, alia conjuncta cum rigore, tremore aut palpitatione, alia plures habet motuum repetitiones, alia pauciores, alia plures membri partes occupat, alia pauciores, vel unam tantum infestat. Imo ex ipsorum vaporum naturæ & conditione varix species producuntur: nam flatuosi si sint, & crassi admodum, cum magna distensione convellent, si malà qualitate præditi, vario modo spiritus animales exagitant, & quemadmodum in ipso cerebro eos ita alterant & perturbant, ut inhabiles fiant, quominus amplius principium, & instrumentum esse possint: ita per nervos ad musculos depulsi, eosdem spiritus ibi contentos ita præter naturam afficiunt ac labefaciunt, ut naturalis & voluntarii motus opifices amplius esse nequeant, sed violenter exagitati, violentos & præter naturales motus excitent. Et hoc quàm maximè fieri potest, si tali qualitate vapores infecti sunt, ut cerebri non penitus tollant & extinguant, uti alias in epilepsia fieri solet, sed labefactent saltem & depravent, ubi tum iidem in musculosas corporis partes, cum animalibus spiritus, delati atque depulsi, depravatos quoque motus varios ac insolentes creare & ferè tot modis musculos ac membra, præter naturam & voluntatem, exercere & exagitare possunt, quot modis aliàs à spiritibus secundum naturam se habentibus, ab appetitu sano ac integro pulsatis atque motis, membra naturaliter moveri possunt. Quod sanè in præsentem hoc casu manifestum est, in quo varias illas convulsionum & perversarum motionum formas, nonnisi a flatulento vapore, malà qualitate prædito, qui spiritus animales in ipso cerebro, quin etiam in nervis & musculis variè affixit, atque exagitavit, suscitatas esse, paroxysmorum invasiones & solutiones veloces, recursus repentinus, insulsus subiti, afflictiones mirabiles, quæ diversimodè & per quævis temporum momenta, nunc hanc, nunc aliam corporis partem, nunc superiores, nunc inferiores, modo dextras, modo sinistras, nunc unam vel plures, nunc omnes simul, nunc mentem, nunc corpus, infestant, ac corporis motum, imprimis naturalem, depravant abunde demonstrant. Ubi autem, & in qua parte materia illa, ex qua præfati vapores mali suscitantur delitescat, vel ubi focus ille resideat, quæ pars fomenta assidua det, obscurum omnino est, cum nulla fere pars, suæ vel infirmitatis, vel alterius cujusdam affectus indicia exhibeat. Capitis quidem dolores paroxysmum præcedentes, aliaque signa etiam, cerebrum affectum, alia vero ex inferiori corpore elevari committunt. Ut sit vapores sanè mali, vel in ipso capite, vel inferiori corporis parte suscitati, modo ad ipsum cerebrum, modo nervorum principium, primasque spinalis medullæ partes delati, animales spiritus perturbant atque labefaciunt, adeo ut principium depravationes, mentis & memoriæ læsiones ac delirationes sequantur. Ex cerebro autem in origines nervorum & spinalis medullæ distributi, & inde per nervos in musculos dispersi & dissecti,



oos ita replent & intendant, ut variz spasmorum similitudines, & tam violentæ pedum & brachiorum distensiones, oriantur. Spiritus autem in nervis & musculis contentos ita exagitat, ut indehntæ membrorum concussiones, & inquietudines perpetuæ suscitentur. Ad quoscunque autem nervos ex cerebro vapores hi deferuntur, easdem illi partes, ad quas ii excurrunt, affligunt, sicuti plerumque per sextæ & septimæ conjugationis nervos hæcenus delapsi, linguæ & stomachi orificio maximum negotium & difficultatem attulerunt.

Sed nolui hic exactè omnium symptomatum & accidentium rationem, generationisque modum describere, sed hæc saltem generatim de causis convulsionum, & præsentis affectionis proponere, & absque omni aliorum injuriâ, & contumeliâ in medium proferre lubuit.

Tibi autem, Vir Clarissime & Doctissime, hæc penitus examinaunda, & discutienda remitto, omniaque judicio tuo submitto. Vale & mihi favere perge. Dat. Memmingæ 10. Julii anno 1621.

S. Grata mihi fuit observatio tua singularis, de mirabili morbo convulsivo, Vir Clariss. & Excellentiss. Fautor & amice pl. colende: digna profecto, quæ posteritati relinquatur, quam ob causam eandem cum aliis meis, si pace T. Excell. fieri poterit, publici juris facere conabor.

Complicatos hic cerebri, nervosique generis affectus concurrere video, primò quidem præcedentibus animalis facultatis, tam quoad sensum, quàm etiam quoad motum læsionibus diversis, opisthotono laborantem puellam affectam dicis, quem tandem vehemens & perseverans pedum convulsio subsecuta fuit, ad quartum usque diem juxta progn. Hipp. perdurans, quæ subito desinente per incultum spatium optime habuit ægra.

Cum autem sub initium Aug. præcedentis anni 1621. capitis dolores ingentes præcessissent, titubatione vertigineque præunte, prædictam puellam in coma quasi vigilans incidisse refert, cum repetita corporis concussione, memoria interim & intellectu quoque deficientibus mox, mox etiam redeuntibus, donec tandem partibus vicibus, jam brachia, jam pedes, præter voluntatem hinc inde convellerentur. Hæc particulari convulsione conquiescente, membrorum inquietudo, tandemque miserabilis infania species, quam saltationem S. Viti nominare consueverunt, ut scribis, successit, cum aliis accidentibus variis, ob varias nervosi generis læsiones in diversis partibus obortis, quemadmodum diligenter & graphicè illa omnia depinguntur. Hujus affectus rari, multumque complicati memini inter alias amicas conversationes, quas de re medica coram habuimus, factam fuisse mentionem, ubi succurrebat memoriæ morbus convulsivus epidemicus, qui quondam inferiorem Hassiam, & vicinas regiones graviter afflixit, cum quo similitudinem quandam prædictum affectum habere putabam, quod etiamnum verisimile redditur, cum addas, appropriatis istis medicamentis, quibus olim Hassiaci medici convulsivum morbum expugnare conati sunt, sensim affectum imminutum, ipsaque convulsiones, jectigationes ac saltationes mitigatas fuisse. Sanè dignus est hic

morbus, in cujus causas penitus inquiratur, quamobrem ea quæ de natura convulsionis subicis, libenter legi, præsertim cum videam, te potius rei veritatem, quàm aliorum auctoritatem, fundamenti loco ponere. Rectissime enim depravati motus causam determinabimus, quando, qui secundum naturam animalis corporis nostri motus perficiatur, exacte satis intelligimus, quemadmodum rectè itatus. Hic tecum præcipuum motus arbitrarii instrumentum, musculum statuo: non enim sufficit, ut objectum, tanquam immobile movens ab intellectu vel phantasiâ cognitum, appetibilem facultatem excitet sed necessum est, ut isto appetitu locomotiva, partibus motui destinatis inhaerens, incitetur, quæ tum demum ager, & motum localem absolvet, quando proportionatum motus instrumentum nanciscetur, cujus beneficio communè facultatis animalis organum, spiritus videlicet animalis affluens, commode recipi possit. Hæc spiritus animalis facta receptio jam hoc, jam illo musculo, motum ex intentione jam hunc, jam illum producit, idque sensibili musculorum agentium contractione, quàm sensualem eorundem in latum extensio, & per consequens induratio quasi, satis confirmat, quemadmodum pluribus in exerc. de motu voluntario demonstravi us. Quòd si motus jam impediatur, necessario musculus præter naturam sese habebit: idque vel per se, quatenus ipsius substantia minus ad spiritus animalis cursum, atque recursum momentaneum recipiendum, propter alienum quid, inhabilis est; vel ex accidenti, quatenus communicatio spiritus animalis, tam qualitate, quàm quantitate peccans esse potest. Ita per se motus omnino tollitur, musculi ratione, in paralyti confirmata post colicos dolores, ubi peccans materia per ~~mutum~~ ad habitum musculosum translata impedit, quominus affluens spiritus recipiatur: Sic morboia musculorum dispositio, vel ob virium dissolutionem, vel ob eorundem oppressionem, concurrente facultate motrice, tremorem producit. Per accidens autem musculus ad movendum inhabilis redditur in paralyti proprie dicta, quando spiritus animalis obstructis nervis penitus non influit: vel ubi communicatur quidem, sed imperfectè, quod fit in epilepsia, quæ motum convulsivum habet conjunctum a musculorum læsione, non per se, sed ex accidente proveniente, quatenus cerebri & potissimum nervorum principium in hoc morbo, qualitate noxia potius in vaporosa, quàm crassa materia subsistente vellicatur, ita ut in surgendo contra malignitatem ejus expellendam, facultas animalis ob influxum animalis spiritus impeditum, totum nervosum genus concutiat. Jam quod convulsionem propè dictam attinet, rectè deducis ex accidenti musculus hic non laborare motu tensionis & contractionis præter voluntatem, idque non principaliter cerebro laborante, nec etiam nervo, vel repletionem, vel inanitionem præter naturam. Juxta communem assertionem, affecto, præsertim cum experientia confirmat, cerebro sæpius integro, nec quicquam præter naturam affecto, quod persistens ejus operationes testantur, nihilominus gravissimas con-



convulsiones jam hanc, jam illam partem torquere posse, sicuti non tantum in morbo convulsivo, Hassix olim epidemico, sæpius, sed etiam in Illustrissima quadam Puella, propter imperfectam variolarum expulsionem diversarum partium miserabiles convulsiones patiente, ante decennium circiter vidi, quemadmodum pluribus in meis observationibus idipsum deducitur.

Nervorum enim repletionem vel inanitionem recte contra communem insufficientem statuis, in quo Erasmo, Sennerto, & aliis subscribis, quorum assertio mihi quoque verisimilior videtur. Miror autem, cur non tantum veteres, sed etiam recentiores ita se torqueant in demonstrando convulsione modo per inanitionem & repletionem nervorum obortæ, cum tamen quibusdam hujus affectus exemplis, coacti tertiam causam, nimirum irritationem, ab aliena qualitate provenientes in musculosis partibus agnoscere cogantur, quemadmodum alicubi apud Galenum, Avicennam, & reliquos videre licet; & unius effectus causæ proximiores toto genere differentes, salvâ philosophica veritate, quomodo statuentur. Necessum igitur erit in omni convulsione proprie dicta (convulsivos enim motus per consensum irritatione principii nervorum tactos excipio) qualitatem aliquam fibræ musculosis inimicam musculis offerri, cujus ratione facultas naturalis ad expellendum irritetur, quam agentem animalis facultas in consensum tracta juvet, ut eo promptius agat, unde motus depravatus oritur, musculis præter voluntatem contractis & extensis. Hanc inimicam qualitatem non crassæ cuidam materię, sed vaporosæ potius substantię recte tribuis, idque non solum generationis, sed etiam resolutionis modus latis confirmat, quemadmodum illud pluribus à te confirmatur. Hoc non tantum sensus testatur in partibus convulsis, ubi subito contractos musculos intumescences, & induratos deprehendimus, sed confirmant idipsum quoque media itatiosam & vaporosam materiam discentientia, qua ratione subito theriacalibus aquis, ita destillato hirudinum cum castoreo & similibus, externa frictione & fomentatione adhibitis, ad miraculum usque tensionem partium dolorificam remissam atque lenitam fuisse vidi, tandem, donec de novo concitata, vel exacerbata vicissim peccans ejusmodi vaporosa substantia facultatem expultricem irritaret, sive in ipso habitu musculoso prædicta causa radicetur, quod in observatione nostræ puellæ Illustrissimæ, propter imperfectam variolarum expulsionem, ejusmodi convulsionibus graviter affectæ, patebat, sive etiam aliunde nervosis musculosis partibus confertim communicetur, quod fortassis in tua quoque puella factum fuit, utpote quæ remediis illis, contra morbum convulsivum viscerum olim obortum, præscriptis bene habuit. Quod tamen his remediis in talibus casibus plurimum tribuendum sit, ipsemet confiteri cogor. In probl. meis Med. Dec. 10. quæst. 7. mentio hæc puellæ cujusdam, quæ Giesæ, anno 1609. recidivam morbi convulsivi patiebatur, cui per prædicta quoque remedia pristina sanitas, Dei boniguitate, restitue-

batur, ita ut ad discessum usque meum per annos multos, nihil amplius de hoc malo conquesta fuerit. Fratrem habet eadem, qui in pueritia similem passus est affectum, cui Clariss. Medic. Dom. D. Henricus Ellenbergerus, tunc temporis Professor Marpurgensis, jam vero Brandenburgicus Halæ Saxonum Archiater, quem honoris causâ nomino, isilem quoque remediis succurrit, idque modo singulari puerulis accommodato, quemadmodum ex addita ejusdem epistola ad prædictorum liberorum parentem, Clariss. Dom. D. Petrum Hermannum Nigidium, Professor. Marpurgensem tunc temporis perscripta, num. 1. colligere poteris. Imò sæpius etiam ubi suspicio tantum vel similitudo quædam hujus affectus adesse videtur, præsentaneum adjumentum præstitisse, prædicta remedia testari possunt, quod sequens historia confirmat. Vivit etiam nunc Vir Reverendus & Doctus Dom. Christophorus Schellenbergerus, Parochus in Schlitz, Ditionis Fuldentis, qui Anno 1614. 4. Maii, gravativos circa collum atque scapulas dolores patiebatur, qui tandem genu sinistrum admodum extruciabant, una cum superveniente tumore, mox locum hunc relinquentes genu dextrum etiam occupabant, imò & brachia, manus atque pedes alternatim vagabundis ejusmodi doloribus intumescabant, absente interim omni viscerum intemperie ciborum appetitum naturaliter se habente. Cum autem, me tunc temporis absentem Clariss. Viri Dom. D. Cornelii Thaureri, Medici Hirschfeldensis, opem imploraret præmissâ primum evacuatione conveniente, potum quotidianum sequentem ordinavit, nimirum vinum medicatum quod

℞. Rad. cichorei ʒj. Vincetox: garyophyllatæ an. ʒß. succisæ, pœon. an. ʒij. herb. betonicæ capill. veneris ivz arthrit. primulæ veris cum toto. an. Mj. Fl. anthos salviz. Thymi an. Mß. fol. card. ben. Mj. incidantur grosso modo pro vino medicato.

Insuper addidit usum quotidianum pulveris convulsivi quem hoc modo præscripserat.

℞. Pul. rad. vincetox. sariaparill. succisæ garyophyllatæ an. ʒij. pœon. bacc. lauri an. ʒj. pul. rosmarini salviz. thymi ana ʒß. sp. plures archont. diamosch. amar. diauth. ana ʒj. f. pulvis.

Hoc pulvere singulis diebus matutino tempore quantitate ʒj. assumpto, simulque sæpius sudore provocato, & per septimanam unam atque alteram continuato, gravissimi dolores & partium externarum tumores ita discussi fuerunt, ut postea paucis remediis corroborantibus pedetentim pristina sanitatis vigori patiens restitutus fuerit. Quanquam verò hoc loco potius arthritidis aliqua vaga, quam convulsivus morbus adfuerit, nihilominus absque ratione prædicta remedia non fuerunt adhibita, propter materię peccantis convenientiam, quæ proculdubio convulsionem produxisset, nisi crassior & serosior, minusque vaporosa fuisset, unde dolorem mox intumescencia partium subsecuta fuit. Sic in Scholæ mihi præcedentibus mensibus hic gravissimam arthritidem vagam, dysenteriam invadentem habuimus, ubi dolores jam hoc jam illud



membrum, cum subsequenter tumoribus graviter affligebant, sæpe simul convulsis etiam partibus quibusdam, imprimis lingua præter voluntatem tremescere, cui non aliter tandem quam per chinæ & sassafras decoctum succurri potuit, qui proculdubio citius restitutus fuisset, si prædictis etiam appropriatis remediis uti potuisset. Mirandum vero quod addis, convulsiones illas *Saltationem, S. Viti*, symptoma rarum & paucis visum, introduxisse. Memini me præcedenti verno tempore cum mulieribus quibusdam locutum quæ quotannis *Sacellum S. Viti*, quod est in sinibus Ulmenium, non procul à Geislingem, diocesis Kechbergensis, visitant, ibidemque saltu cum perturbatione mentis, eò usque sese nocte, dieque exercent, donec Ecstaticorum instar corruant, quâ ratione sibi restituta videntur, ut parùm vel nihil sentiant, per annum integrum, usque ad Maii tempus subsequens, ubi membrorum inquietudine eò usque sese torqueri referunt, ut vicissim circa *festum S. Viti* ad prædictum locum saltationis gratiâ sese conferre cogantur, quemadmodum una ex ejusmodi mulieribus per viginti & plures, alter per 12. annos ibidem quotannis saltavisse dicebatur. Absque superstitione hoc, quicquid est, non est, utpotè cum verisimile videatur exacerbari verno tempore causas convulsivorum motuum in membris naturaliter, quas postea cum singulari vehementiâ animi, spe restitutionis, per *sacrificium S. Viti oblatum*, suscepta saltatio fortassis ita dissipat, ut relictis viribus aliquandiu tales ægrotantes ab invasione liberæ permaneant.

Novi puellam honestam, Mercatoris filiam in hac Republica, quæ jam per annos aliquot verno tempore, cum aliqua, sed levi, mentis perturbatione, similem affectum ferè patitur, ut inquieta jam hoc, jam illud membrum movere cogatur, sæpius & lingua sermonisque operatione intercepta, de loco ad locum hinc inde commovetur, quod per septimanas aliquot singulis annis, nocte dieque continuat: Valde vercor, nè tandem gravius aliquid hic etiam expectandum sit. Quanquam vero non ignorem, ex authoribus, quosdam in *Saltu S. Viti* nihil quicquam convulsi concedere velle, contra alios ex Arabibus, quatenus mens iisdem alienata tantum videtur, cujus ratione perverius saltandi conatus & appetitus oritur: nihilominus si fides adhibenda mulieribus illis, cum quibus hac de re præcedenti verno tempore sum locutus, omnino statuo, convulsivos hic motus concurrere, præsertim cum affirmant quod pluribus septimanis, antequàm *Sacellum S. Viti* accedant, nervosorum omnium artuum dolores, unâ cum lassitudine spontanea, capitique gravitate paterentur, in quo statu permant, eò usque, donec accedentes ad consuetum saltationis locum, organum Musceni, quod in earum gratiam pulsatur, audiant, ubi mente magis, magisque perturbata (fortassis concurrente simul imaginationis firmioris, spe sanationis, impressione) saltare cogantur, ut accidat ipsis ferè, quod iis, quos à Tarentulæ mortuæ lesos dicit *Matthiolus*. Imò tua quoque puella satis hoc ipsum confirmat, quæ non tantum antecedentes & in ejusmodi saltationem degenerantes passa fuit convulsiones, sed im-

pedita quoque convulsiuum, quid in præcediis protinus sentire fuit visa, quâ de causa nequens ista saltationis commotio causam convulsionum in ipsis mitigare videtur. Cæterum ubi focus antecedentis causæ latuerit in puella tua, non faciliè patet. Ex vermibus latentibus, & certis temporibus virus malignum expirantibus convulsivos motus interdum excitatos fuisse constat experientiâ, quemadmodum etiam casus, occasione historiarum tuarum communicatæ per Clariss. Virum *Dn. D. Augustinum Thonnerum, Collegam meum colendum*, ad me perscriptus n. 1. idipsum confirmat. At verò cum diuturnus affectus maxime radicatam mineram innuat, potius in collectione corrupta circa venas splenicæ, & meseraicæ, causam antecedentem relidere putarem, quemadmodum in honesta quoque femina, superiori Anno, similem convulsiuum affectum per excretionem copiosam materiz peccantis, per alvum rejectæ, præeuntibus variis digestivis, maxime mitigatum fuisse memini, sicuti pluribus in lib. 2. observat. meum patet. Verùm cum de occultis & latentibus morborum causis, quod hoc, vel illud individuum attinet, anceps sæpius judicium sit, hic etiam subsisto, tibi que pro communicatione singularis hujus casus gratias maximas ago. Vale Vir Clariss. & Excellentissime, meque posthac etiam amare perge. Dabam Ulmæ pridie Calend. Decembr. 1623.

Clarissime Vir, amice & Collega honorande: quod heri promiseram, me cogitaturum, quomodo filioli tui, difficili sanè & afflictæ valetudini succurratur, uti debui, feci sedulo. Neque causam video, quare sententiam meam de usu pulveris istius mutem: nempe decoquendum potius leniter esse in sero lactis capriini, vel etiam ipso lacte, & hac ratione propinandum. Vitabitur ea ratione difficilis ejus transformatio, & calor puelli imbecillus commodius medicamento utetur. Capias igitur licebit pulveris istius convulsiivi, uti vocant, duas drachmas, & conservæ Betonicæ & florum prunæ, singulorum unam unciam, eaque simul linteolo includas, lacte ad levem ignem incoquito, eique frequenter instillato. Ita vires aliquantulum instaurabis, & morbi vehementiam lenies. Illinire etiam dorsi spinam bis, tervè, de die cum oleo, cujus heri usum commendavi, non poterit non prodesse.

Deus opt. max. suâ benignitate misero puello opem ferat, teque sollicitudine clementer levet rogo. Dabo operam, si vixero, ut crastino die te invisam. Vale tuus Ellenberger, D.

S. Clarissime & Excellentissime Vir, fautor & Collega plurimum colende. Quoad casum puellæ convulsivæ, à *Dn. D. Echoldo*, literis consignatum, & mihi communicatum, quin symptomata illa a vaporosa & venenosa materia, fuerint pronata, hinc amaro: cum, prout subitam habuerit *zincum ita & dicitur*. A qua minera vero vapores illi sublati, qui fons atque scaturigo, qui locus primario affectus, certi quippiam statuere haud obvium nec expectatum, nec liber ea pro tempore *simplicius* investigare. At non abs re fore duxi, non absimilem convulsivum affectum, a vermibus concitatum, delineare, qui mihi ante anno. 11. in Urbe Imperiali Iliensi præxin tum Medicam exercenti,



curandus obtigit. Est etiamnum in vivis Dominus David Wolff, Vir oppido bonus, mercator opulentus, & illius Reipub. Consul, cujus nati 14. annorum, cum hyberno tempore, media nocte levissimis symptomatibus tentaretur, & ego; ut præidia adhiberem medica accorlitus, thalamum ingressus, offendi ægram in lecto sedentem, recta cervice spiritum agræ ducentem, ingentem colli contractionem sustinentem, quasi laqueo injecto ita fauces præcludente, ut præsentaneum immineret suffocationis discrimen, ni subitaneæ auxiliæ manus præsto fuissent. Primo aditu ac contactu attonitus ac dubius, quidnam de morbi genere pronuncians, necnon anxius & sollicitus, quibus remediis succurrendum. Superis cogitationes meas dirigentibus, ilico aquam cordialem Bezoart. ordinavi: vix unius atque alterius cochlearis dosi assumptæ, colli coarctatio protinus, haud sine stupore adstantium, & meo remittit: at quadrantis horæ spacio post rediit: ab usu illius aquæ denuo recessit. Cum id observassem, muliercularum catervæ tum adstanti referebam, me suspicari, ~~videtur~~ illud à vermibus causari, qui dulcedine ac suavitate aquæ Cordialis illecti ac sopiti conquiescant, symptomati illi inducias concedentes: at cuidam Medicatrici, eo loci primariæ, illud meum effatum absolum videbatur, dum rei eventus vaticinium comprobasset. Ab usu illius aquæ contractio colli omnino abiit, ut ægra quali e faucibus mortis erepta crederetur. Interim tamen supervenere convulsiones utriusque brachii, & utriusque pedis, per intervalla repetentes. Modò dextrum, modo sinistrum ad pectus: jam dexter pes, modo sinister, ad nates usque invita ægra, magna violentia alternatim reflectebantur, & quasi funiculis alligata retrahiebatur. Tam miserabile spectaculum mihi haud obvenit per totam vitam. Ad malum illud eliminandum præscripsi hydromel laxativum, scopo in vermes directo, primo haultu absorbito, circa vespertinam, cum colluvie pravorum humorum etiam exeretis vermibus oblongus, & tardius prædictarum partium convulsiones redire, aliquot horarum intervallo conquiescentes. Postea matutina altera dosi assumpta, duo itidem, oblongi & sar crassi vermes rejecti. Tertio diluculo tertio cyatho oblato, unicus adhuc vermis expulsus, & ex in juvencula illa ex toto in integrum restituta, ab omnibus illis symptomatibus libera, ac immunis evasit. Et sic ~~deorsum~~ & ~~superius~~ luculento erat testimonio, præcitata symptomata, prout meum augurium, à vermibus pronata. Num autem in virgine illa, cujus D. Eckoldus mentionem fecit, vermium seminarium delitescat, & symptomata illa sæva invehat, aliis speculandum relinquo: mea cymba lictus legit. Valeas athleticè: Ex Museo, Ulmæ 3. Decembr. Anno 1625. Gregor. Horstius observat. & Epistolar. Medicin. lib. 2.

#### Anatomicæ Inspectiões.

Quidam per biennium conquestus fuerat de dolore in occipite, tandem Phrenitide ac Convulsivis moribus correptus subito interiit. Huic crassa cerebri membrana aliquot locis exesa erat variis foraminibus, idque potissimum in

bregmate sub sagittalisutura, ubi & cum coronali jungitur: ex his foraminibus effluebat, & per membranam dicam ellus erat languis terne concretus, ater ac acutus, admodum fixus: Tali quoque sanguine distenta erant vasa per exteriorem crassam meningis superficiem discurrentia, quæ & ea quæ nunciola per tenuem disseminata sunt: Huic intra cerebellum abscessus humore non naturali scatus, repertus fuit: Erat is humor colore ex citrino: d pallorem vergens, pallida bilis nimirum: Ipsa Cerebelli substantia flaccida omnino, molliorque multo quam cerebri substantia P. Patum observ. d.

Miles quidam cum per integram noctem ebrius in solo decubisset, evigilans tam repente spasmo correptus est, flexo in posteriorem partem corpore, ut omnino rigidus ac incurvus permaneret, ipse nostræ curæ mandatus est: nihil deglutire poterat, & turbide loquebatur, tanquam ex loco subterraneo vocem emittens, truculenter nos intuebatur: at cetera omnia adhibita, intra quatuor dies interiit.

Cadavere aperto Vitalia & naturalia integra invenimus: cerebrum autem ad ventriculos usque dissecuimus, quos repletos invenimus materia quadam viscida ac glutinosa, colore luteo, vitello ovorum perquam simili, sed scitida admodum: hæc incunibens principio nervorum, tam sæva symptomata in subjectis partibus excitavit: Venæ intercurrentes utramque cerebri meningem, admodum turgidæ erant bilioso sanguine.

Eadem modo paucos post tempore affectus fuit lignifer: Sed hic præter prædicta symptomata ipsismo cynico in dextra maxilla torquebatur, ita ut loqui plane durante isto paroxysmo non posset, & intra 24. horas e vivis excessit. Jacobus Boninus in Medicina Indor.

Nobiliss. puerulus bimulus, Generos. D. Dive, Equitis aurati, filiolus, formosus atque optimo corporis habitu præditus, cum per duos tresve dies minus bene haberet, & tussis sicca laboraret, cum inquietudine, nocturno præsertim tempore, & crebris ejulatibus, nutrix cum dentibus laborare putabat, donec tandem in gravissimos & continuos motus convulsivos incideret: quibus pacandis duo mecum Medici in consilium adhibiti: Varia ad eos sedandos exhibita sunt, sed frustra omnia, Nobili puerulo tertio convulsionum die naturæ debitum solvente.

Aperto corpore, diligenti scrutinio nihil invenimus quod lethum accelerare potuisset, donec ad intestina deventum, quibus examinatis, duodenum à terete lumbrico perforatum & exesum invenimus, quem adhuc vivum inde extraximus. Frid. Lessius lib. 2. observ. 33.

In stabulo Regio dissectus fuit à Chirurgis Regiis equus generosus, cujus affectus fuerat quod subito os obriguerit clausumque fuerit, ut pabulo vesci nequiverit, unde sentim contabuit: In cujus affectus causam inquisituri, sequentia in sectione strangulati animalis invenerunt, quæ annotavit D. Simon Pavli.

1. Statim jugulato equo, musculi colli & dorsi (qui vivente animali tensi & duri erant) flaccidi evaserunt. 2. In apertione abdominis, inter peritonæum & musculos abdominis, ichor quidam flavescens observatus, ad os pubis usque



posita fervari potuerint, Unde factum ut misellus hic homo, misera sic transacta ætate, ac tanto amplius sufferendo morbo impar, viribus scilicet paulatim exhaustis, ob repetitos frequentiores crudelis huius sui hostis insultus, vehementissima tandem convulsione aliqua, & quæ os humeri fractum, eâ parte qua cubitum attingit, per cutem transegit, mortuus sit. In tanta tamen miseria de nullo dolore conquestus æger, nec vel minimum vociferatus est, adeo ut sensu quasi omni orbatus, ac mense sibi non satis constare visus sit, præsertim cum toto morbi decursu nihil quidem cibi petierit, nec tamen oblatum respuerit, sed assumpserit.

Defuncti cadaver sequenti post obitum die 30. April. hujus anni 71. Furthæ dissectum fuit, omnia viscera inculpata apparere, & magna bilis vesica, viridi suo colore vicinia stomacho intestina infecit. Aperto brachio sinistro, conspectum id os humeri fuit effractum, & sinistrorsum ex cute prominens. Os femoris ejusdem regionis extrorsum violenter à suo capite divulgatum trochanterem acutum, suæque cuspidem cutem perforantem habuit: Appendix inferior femoris sinistri, atque interior, qua genu efformat, vasto se satis tubere manifestavit. Tibia tandem introrsum reflexa & curvata cum tibia sua in medio violenter fracta visa fuit, atque illius ossis cavitas omnino ita oblitterata, ut nec medulla, aliâs in ea continere solita, vestigium animadverteretur. Sectioni manus cum Willio accommodavit in Chirurgia utraque exercitatus juvenis, *Georgius Brotmannus*, præsentibus inter ceteros *Bambergensis Præfelli*, *Domini Materi filio* & *Theodorico Danckwits. Pharmacopœo Furtensi. Joan. Georgii Volcameri.*

Puella decem annos nata, parentibus sanis similibus orta, ab infantia ranarum, lacertarum, murium, carbonum, cœciliarum, imo & serpentum, omnisque insectorum generis comestione mirè delectabatur, ut quæcunque etiam occurrerent avidè degluteret. Annuum ætatis circiter quintum agens de doloribus ventris & capitis balbutiendum conquirebatur, cum per totum vitæ curriculum pronuciare nec verbum valeret. Emaciabatur lentim misera, dolores perseverabant, tanta interdum atrocità affligentes, ut bellisiter debaccharetur, humique ventre serperet. Varia à variis agyrtis, carnificibus &c. adhibuere parentes remedia, ægrè verò his doloribus eluctata (puella) quolibet die paroxysmos convulsivos, horis incertis, & sub specie multiformi redeuntes habuit, maxime tamen mane & sub vespertam ventriculo jejuno existente invadentes: redibant hi trium annorum spatio singulis diebus, ultimis tandem annis typum & naturam mutantem, capitis hic ibi allisione & succussione, per hypocaustum vel loci cursitatione, atrocique stipati ejulatu redeuntes; per plures sæpe horas hujusmodi motus, stridoris dentium &c. reciprocationes obire solebat, per totas interdum ædes cursitans, caput parietibus allidens, eique simul insistens. Agyrtarum medicamentis parum valentibus triduo affecti, barbitonforis cujusdam opem implorantem parentes, qui partim per superiora, partim per inferiora emeticis aliis catharticis adhibitis lumbricos diversæ magnitudinis diverso tempore ad quadraginta expulit; succe-

debant à fortiore dato emetico duo serpentes aquaticis similes, longitudinem dimidiæ ulnæ habentes digitum parvum crassi; Vivaces valde erant, nec bene contineri poterant, asservabat eos barbitonfor in vasculo luteo leviori operculo testæ, unde ea nocte exsistentes proculdubio, mane nec vestigia amplius apparebant, nullibique nec videri nec deprehendi poterant, sed cum vasculum extra fenestram fuerit positum, facillimè in subjecta prata recipere se poterant: unde tamen infandus in vulgo rumor obortus, puellam dæmone obsessam vivos duos evomuisse dæmones, qui statim nullibi deinceps visi seu reperti, evanuerint. Mitigata post hunc convulsiones sensim remisere nec ad finem usque rediere; sed ventriculus spasmo affectus assumpta nunquam retinebat, verum quavis ingesta vomitu reddebat: barbitonfor ab hoc malo liberaturus, miseræ tres venas secabat, ab hinc indies viribus & corpore deficiens, inclemente hoc fato abrepta animam luit, Quantum licebat, ex morte ejus in prædicti morbi diagnosis, omni parentes peioris suspitione liberaturus, inquirere satagebam: proinde à Reverendissimo Abbate cadaveris dissecandi venia impetrata, symptomatum in hoc affectu præcipue urgentium rationes & vestigia clarius patebant. Cutis per totum erat discolor, in hac parte livida, in illa flava, in ista subnigra apparebat: musculis ejus in membranas penè emaciatis detractis, idque apertum, tetrum spirabat odorem; omentum consumptum fere erat, glandulæ Mesenterii induratae erant. Ventriculus & intestina bene colorata, facie externâ satis bene habebant. Sed ventriculus valdè inflans, apertus materiam liquidam cineritiam, plumas compactas, fila, continebat, ejusque tunica interior absque plicis aut rugis plana evaserat: Intestina tenuia maximam partem erant inanita, flatibus solum distenta, utpote quæ in perpetuas fere evacuationes sollicitata fuerint, quæ etiam pluribus in locis mutuo involuebantur parte unius superficie convexa in alterius concavam intrusa intestina crassa fecibus substantiæ tenuis impensè ex rubro flavescens penitus oppleta conspiciebantur, & quod mirum; nec ulla, vel in ventriculo vel toto intestinorum tractu, semina, quæque vel augurari liceret, etiam sedulo investiganti prodire. Hepar à sana constitutione plurimum defecerat, fuit namque tumidum & subdurum, per totam substantiam mere ochraceum, ex sanguine profusus & exsuccum, in unicum continuum lobum concretum; vesicula fellea ei adnata bilem prorsus viridem continebat. Sanguis in vasis inferioris regionis contentus colore cum hepate conveniebat; Lien qui hystriionibus pessime semper audierat, fuerat prorsus insons, & quavis culpa immunis apparebat, prout in maximè sanis observamus, fuit subatri coloris, mollis & superficiem æqualis, è compage ejus dissecta sanguis copiosus rubicundus effluxit: Renes culpa non omni carebant, quos duriores multò membranarum contextui penè involutos reperimus; alter eorum inusitata erat figura, in plures scilicet lobos findebatur. Pulmones colorem monstrabant lividum & ichore spumoso tenui penitus infarcti videbantur. Ex utriusque cordis ventriculo polypos exemi-



mus, sanguis in substantiam nempe solidam flavescens concreverat, quæ juxta cordis & vasorum in pulmones ascendentium cavitates effigata omnes meatus pertransiit. Nec minus clara morbi hujus vestigia in capite deteximus, nam calvaria ossa cum difficultate detecta (dura enim mater suturis firmissimè inhaerebat) statim vasa meninges perreptantia sanguine plurimum turgescere conspiciantur, quali major cruoris massa in capite aggereretur, venis namque imi ac medii ventris sectis aut ruptis parum sanguinis effluxit. Pars cerebri corticalis & ejus anfractus undique gelatinæ simili humore repleti fuere. Integumentis cerebri substantia profus madida & humore seroso supra modum irrigata videbatur, qualis tamen nulla colluvies ventriculos inundabat: acriter hic humor linguam mordebat, ingrati saporis exsistens. Plexus chorioideus grandior, subdurus & nigricans existens plurimum à naturali detestebatur: Conspectimus glandulae pinealis insignia crura medullaria; Pituitaria vero glandula liquata quasi & dissoluta à viscosiore lymphâ, quæ omnes fere partes irrigabat, vix discerni poterat, digitis contrita instar grandiorum arenularum ossicula plura, ipsi adjuncti obveniebant; Paria nervorum ad sensus facientium grandia duodecim monstrabamus: quas raras etiam demonstrationes adstantibus dedi, eas huc addere supervacaneum censeo: sæpius rariora etiam exanimanda mihi occurrunt, quæ alio tempore differam. *Sylv. Sam. Antonii.*

Die 15. April. 1082. cultum injecimus infanti 7. mensium, matre hypochondriaca pro nato, quæ tempore gestationis præcipue, animi pathematis vehementioribus sæpius se vexari passa est: misellus hic cum primis mensibus bene haberet, parentibus haud parvam sollicitudinem creavit, quod signo masculino in scroto castruit, inde deterius habere incipiens, respiratione anhela, voce clangosa, & abdominis intumescencia subita, quam flatus sonori erumpentes quandoque præcesserunt, matri gravioris doloris causa extitit, usquequæ tamen diu non isthæc durabant, licet in die sæpius interdum, interdum rarius redierint. Causa mali humori acri, irritanti per vices fuit attributa, stagnanti circa ventriculum præcipue & intestina, atque ad hanc medicamenta præcipue fuere directæ: ægrotulo ad se redeunte, alimentum porrectum gratum fuit, ad ultimos fere dies usque, quibus symptomatibus istis mirè reiterari incipientibus corpusculum magis in dies delassatum fuit, tandemque penitus succubuit. Abdomine quod faciem externam tumidam & lividam ostendit aperto, ichor modicus foetidus prorupit. Hepar grandiosculum satis erat in superficie nigricans, reliquæ parte cava admodum corruptum. Vesicula fellis cum ductu hepatico, bile ex atro viridescente plena fuit: Intestina tenuia variis in locis ab humorum acrimonia inflammationem passa fuerunt, citra gangranosam tamen. In cæco nihil delituit vel humoris acris vel p.n. Mesenterium glandulas rutilas hic illic ostendit, lieni itidem corrupto; adiacebat glandula ovalis minuta: pancreas laudabiliter habebat. Renes quasi ex pluribus lobulis constati, quorum alterum etiamnum in sp. vin. custodimus. Testiculi inguina non egrediebantur, quin his adnati hærebant. Unde etiam in scroto illos animadvertere nuf-

quam licuit: Pulmonum lobus sinister, inferior à sanguine stagnante corruptelam evidentem contraxerat. Corculum satis magnum pro ætate, auricula dextra sanguine grumoso turguit, & in ventriculo dextro polypus majusculus hæsit. *Joan. Jacob. Harderus apiar. observ. 100.*

Vir Illustriss. Parentibus, Proavisque aut cerebri, aut nervorum dispositioni alias morbidæ obnoxius, oriundus, circa ætatis suæ ~~maximè~~ primo artuum debilitate, stupore & spasmodicis levioribus tentari solebat, cujusmodi affectibus cum diu laborasset, demum curationis gratia *Barbentam* adiens, *theriac* calidioribus nimis crebro usus, vice remedii tantam morbi exacerbationem retulit, ut ab isto tempore prædicta symptomata non amplius per vices, sed fere constanter urgerent; nimirum singulos artus, imo quamvis partem corporis motus convulsivi, & tensiones dolorinæ incessanter exercebant, ita ut musculi simul omnes suis sultibus repetitis perpetuo convellerentur, idque non sine insigni cruciatu; cujus unica sedandi ratio in hoc sita erat, ut corpus modo totum, modo aliqua ejus ~~membra~~ motu locali perpetim exercebantur: quamdiu enim evigilabat, in lecto vel sedili agitari, aut in curru vehi, aut membra comprimi vel fricari necesse habuit; in quem finem illi parabantur cathedra & lecti cum basi arcuata, uti sunt puerorum incunabula, in quibus cum decumberet, vel erectus federet, huc illuc, motu versatilibus, continuo ageretur, quod si fieret, immensi dolore, & musculorum tensionibus atrocioribus infestabatur: Hujusmodi *diuturnam* affectionis spasmodicæ molestantiam tempore *nocturno*, & statim à *somno* symptomata longe graviora excepere: nam recens expergefacto, illico totum corpus horrescere, musculi tensionibus dolorificis plurimum exerceri, singuli artus, velut instanti mortis agone, sudore lustrali perfundi solebant; qui in tantum corrosivus erat, ut instat *aq. fortis*, lintea, nisi statim abluerentur, cito exederet, & corrumperet. Eger durante hoc conflictu sudores inter & horrores per plures horas torquebatur, donec penitus defatigato somnus obrepens levamen aliquod attuleret; quod si paroxysmo ingruente protinus e lecto excitaretur, melius habuit, adeoque solitam affectus ferociam præcavebat: idcirco quamprimum à somno expergisceretur, licet hoc intra horæ semissem contingeret, illico ut torturam evaderet, domesticis alacris, statim lecto eximebatur: quantum ad appetitum satis valens, absque nausea comedeat, neque à comestis stomachus turbabatur; sæpe tamen de *cardialgia* querebatur, ac interdum *(pueris molesta)*, cum *sapore oris*, velut ab assumpto mercurio, per plures dies cum exerceat. Calidiora quævis, tum alimenta, tum pharmaca constitutioni ejus minime congruebant; vinum, aut cerevisiam generosiorē ne potissimum audebat. Primis ægrotationis suæ annis ad conspectum ignis horrescebat, postea imbecillior factus, licet urgente bruma, prope focum sedere renuebat. Urina semper fuit citrini coloris, quæ si in vase fictili supra prunas evaporaretur, sæculentia salina, supra dimidium liquoris, in fundo relidebant; alvus continuo astricta, nisi à pharmaco, aut enemate irritata, sarcinam nunquam deposuit. Quinimo præter motus convulsivos *paralytici* *spuria* totius corporis membra quævis occupabat; nec enim manus

artollere



attollere, aut pedes gressum accingere potuit: lingua vacillans verba non nisi imperfecta protulit, interdum vero cum ex occasione gaudio repentino gestiret animus, spiritus, & robore nire exultantis, e cathedra subito surgere, & sine alterius ope recta incedere, & salire valebat; quod tamen intervallum vix horæ minutum durabat, quin membra denuo vacillarent, & solito languore & tremore afficerentur. Cum supra duodecim annos Dominus insignis ad hunc modum ægrotabat, Medicorum in tota Anglia maxime celeberrimorum consilia adhibuit, & remedia quamplurima, & terè nullius non generis tentavit, scilicet *antiparalytica, antiscorbutica, diata exsiccantes, sudorifera, purgantia, cantheria, balnea, linimenta*, quin & *salivationem* bis expertus est: verum nulla ejusmodi medendi methodo sanari potuit, quare dimissa penitus curationis spe, per septem posteriores vitæ suæ annos tantum remedia quædam symptomata præcipua respicientia usurpavit; scilicet ter in septimana medicamentum solutivum, ex *sema & rhabbaro*, cum correctivis, in forma modo *syrupi*, modo *extracti* cepit; *opiata* ex conservis & speciebus temperatis dosim qualibet nocte sumere solebat: porro *Zulapium* pro data occasione, cum spiritus fatiscerent, sumendum præsto habuit, insuper *cerevisiam avenaceam*, herbis temperatis & diureticis alteratam continuo bibebat. Horum usu septem ut minus annos, sine magna in pectus alteratione transegit; tandem ingravescente senio, simul ac morbo, spasmodum paroxysmi atrociores, non uti prius, somno peracto, sed quamprimum lecto incalesceret, ipsum invaserunt, ut necesse habuerit lecto suo omnino abstinere, atque vellimenta raro, nisi ut lintea mutarentur, exuere: hinc transpiratione impedita, recrementa serosa, aliaque evaporari solita, in *pulmones* delugebantur, quæ primo *respirationem cerebri*, postea *affectionem asthmaticam*, ac denique *tuberculem* intulere.

Si prædictorum effectuum rationes inquirantur, obvium erit, universa hæc mala à *prava cerebri, & nervosi generis constitutione*, ac immediatius *succi* istas partes irrigantis *dyscrasia*, ac vitio deducere. Nam cum liquor iste, in quo spiritus animalescunt, quoad *temperiem* summe acris, & instar *aquæ stygiæ* corrosivus esset, & quoad *mixturem* particulis tum *narconicis*, tum *explosivis* referebatur: haud mirum est, propterea spiritum plurimum onustos, proindeque à debita expansione cohibitos, ubique in minutas *explosiones*, seu velut *crepiti* urgeri, & *corpora continentia* à debita tenitate, & robore exoluta, etiam in corrugationes dolorificas continuo irritari.

*Affectiones* istæ *spasmodicæ* mox à somno acrius infestabant, quoniam calor lecti heterogeneous *succi nervosi* particulas exulcerat, easque rarefaciens velut in *explosiones* adigit; tum etiam quia *partes nervosæ* in somno *succum suum*, ac cum eo simul allatæ materiz morbificæ penum ubiorem imbibunt; quibus ad plenitudinem saturæ, primo evigilationis instanti, protinus quod molestum est excutere nituntur. Propter hanc rationem observare est *scorbuticorum* dolores, & *asthmaticorum* paroxysmos à lecti calore, atque a somno plurimum ingravescere; ideo statim lecto eximi, ut his, ita ægroto nostro

levamen conferre solebat. Quod autem molestia a continuis musculorum subsultibus, & tensionibus dolorincis excitata, corporis, aut membrorum motu locali aliquatenus sedaretur, ratio est quia spiritus animales, dummodo in actiones diversas ab extra coguntur, inordinationes quasvis ab intra simplicitas remittunt: etenim ut in dolore & *præputio*, qui leviores sunt spasmi, partem affectam comprimere, fricare, aut scalpere juvat; ita musculorum, ac tendinum motus convulsivi, à totius corporis, aut membrorum agitatione inordinata aliquatenus placantur.

Quod spectat ad *pyalismum*, sive copiosam *oris sputationem*, cum fœtore anhelitus, quæ incertis intervallis redire solita est; suspicari est, camforte a *Mercurio* clanculum aliquando exhibitum processisse; quanguam & multos viderim affectibus tum convulsivis, tum scorbuticis laborantes, quibus hujusmodi perpetua spuri ex ore defluxio, citra omnem *Mercurii* suspicionem molesta fuit, nonnullos etiam (uti n. ox infra dicitur) quibus *salivatio* superveniens (materia explosiva ad huc modum critice evacuata) morbum solvit: porro verisimile est, hunc affectum a meris succi nervosi recrementis productum fuisse; *ductusque salivales*, cum plures & satis patentes fuerint, superfluitates a nervis, æque ac arteriis in glandulis copiose depositas excipere, & foras convehere.

Quoad *lucida intervalla* quibus æger inducias quasdam, licet breves, mitigata quasi morbi ferocia, obtinere solebat; ut quem modo ægrotudo cathedræ alligabat, derepente exsilire, & circumcirca deambulare potuerit; in sperato tamen atque evanido hoc robore, mox iterum in pristinum languorem desinente: Dico ejusmodi motus naturæ laborantis, & sub gravi onere prostrata, fortiores quoddam nixus, & ultimos conatus esse, quibus scilicet ad momentum temporis se recoilligit, & quasi morbi jugum excutere tentat; verum quia huic certamini diu sustinendo impar sit, denuo statim relabitur, & pristinx succumbit sarcinæ. Profecto mirum est quod antea supra naturæ vires, ira ac timor, alique animi passionibus quædam nervosum genus intendunt, atque impetus plane stupendos edere cogant: sunt vero exigux tantum durationis hæc conatum prodigia.

Designata ad hunc modum morbi prædicti causa conjuncta, & symptomatum præcipue urgentium rationibus ostensis, adhuc inquirendum restat, circa causam *ætiologicam*, nempe ob quas *ætiologia* *succi nervosi* ita degenerat, primo *paralytin*, ac deinde *musculorum omnium subsultus*, sive *spasmos* intestinos intulerit: porro explicare oportet, quamobrem morbi hujus fructus paulatim accrescentes, *theriacum* usu tam cito ad maturitatem pervenerint: item quare ægrotudo ista nullis remediis cedens, *incurabilis* extiterat.

Quoad *primum*, dicendum esse videtur, quod ægrotans parentibus, qui morbis cephalicis graviter obnoxii fuerunt, oriundus, malam cerebri & nervosi generis constitutionem originaliter contraxerat, adeo ut intra sextum ætatis suæ lustrum *paralyti spuria* laborare inceperit; dein cum *procatarxi* huic *hereditaria causa evi-* dentes sanguini, & humoribus majorem indices



a hem affigentes accedere (erant enim variis casibus atque infortunia quæ viro ex animo inestimationem & melancholiam continuo intulere) propterea quidem liquor nervosus sale fixo, & scorbutico supra modum inibutus, instar aquæ fortis, aut stagnantis vitriolici, summe æris, & irritativus evasit, proindeque spiritus, & corpora eos continentia, non lecus ac prædicti liquores lumbricis suffulti, in corrugationes, & contracturas spasmodicas continuo incitaverit.

Quod autem hic morbus, primo sensim accrescens, thermarum calidiorum usu in statum longe deteriorem cito evehebatur, ratio facile patet: experientia enim constat balnea calida, & sulphurea in corpore humano salinas, aliasque morbidas, quæ intra viscera, aut humores latent, particulas plurimum exaltare, & cito ad æstus perducere: eas scilicet exagitando effertiores reddere, & primis viis in sanguinem, & exinde in cerebrum & nervosum genus urgere, quinimò prius secretas & otiosas coniungere, ac in æstus quandam incitare: quare qui aut arthritidis, aut calculo hæreditario obnoxii, istorum affectuum paroxysmos nondum perpessi fuerunt, à thermarum usu sæpissime alterutrius morbi fructus in se statim maturari sentiunt. Cum itaque in hoc ægrotante & sanguis, & liquor cerebrum nervosum irrigans particulis tum narcoticis, tum spasmodicis imbuerentur: quia & à crassi dulci, & balsamica iste velut salsum, atque hic in acetosum, & stagnans vitriolici amulum degenerarent, tantum abiit aquarum calidarum mineralium usus ab auxilio ferendo contra hæc mala, ut propterea statim omnia plurimum exacerbarentur: atque morbus ab humoribus, quoad temperiem & mixturam ita depravatis procedens, nullis usquam remediis curari potuerit; nihilo facilius scilicet quam acetum in vinum reducat.

Cum Illustrissimi huius viri à phthisi demum extincti cadaver aperuissem, pauca admodum ejusmodi gravissimorum pathematum vestigia detegere licebat. Hinc ut constet, paralyin & spasmus non tam à crassa & copiosa materia, alicubi in mineris congesta, quam à mala spirituum animalium, qui subtilissimi ac invisibiles sunt, affectione pendere. Quæ circa huius anatonem notatu digna occurrebant, paucis exponam.

Abdomine aperto omentum (prout in pleurisque à tubæ, aliisque morbis chronicis interceptis assolet) putridum erat, & ferè consumptum. Interim ventriculus, intestina, pancreas, & mesenterium satis recte habuerunt: scilicet membrana erant firmæ, bene coloratæ, & abscessu quovis aut tumore scirrhuso liberæ: intestinis majoribus excrecentia quædam carneæ instar auricularum muris, adnascabantur; huiusmodi cum plurimæ fuerint, ex utroque intestinorum coli, & recti latere, ad certa quasi stadia, instar ramorum arboris, gemellæ prodibant: Simile quiddam in tabido olim reperi: Huius ratio videtur esse, quod in phthisicis nutritio (licet circa partes solidiores & exteriores deficiat, aliquando tamen) interius prope succi nutritii fontes plus debito perficitur, proinde ut epiphytes non naturales, & superflue excrescant.

Lien, qui semper pessime audierat, & à pleurisque medicis, velut scorbuti, & cæterorum om-

nium affectuum causa principalis damnatus fuerat, prorsus inlons, & quavis culpa immunis apparebat: nam prout in maxime lenu observavi, fuit subatri coloris, molis, & superficiè equalis, obstructione, aut scirrhus quovis liber, sibi, & vasis satis distincta, & firmis præditus: & compage ejus dilecta sanguis nigricans effluxit.

Hepar (quod equidem mirari lubet) medicocriter se habuit, nec à tam gravi & diuturna ægrotatione solito durius, aut scirrhusum, aut tuberculis oblitum evaserat: erat tantum grandius, & coloris nonnihil obliuesci.

Reies, licet calculo ac ulcere quovis immunes, tamen culpa non vacabant: nam in medio dextri renis cavitas ingens à pelvi distincta, eoque multo amplior, aqua limpida impicta conspiciebatur: talem in hydropicis sæpè numero comperi: atque hæc quidem fortasse ex lero in renem illum deposito, quod haud facile permeatus, & poros ejus percolaretur, orta est: quippe serum ubi subillens, ab initio specum sibi exiguum procuderat, quæ semper postea dilatabatur: cumque ob hæc rationem seri secretio, & per ureterem exitus aliquatenus præpedirentur, latex ejus in sanguinem refluens capiti noxam graviolem intulit, quod quidem eo magis suspicari fas erat, quia ren etiam sinister, valde extenuatus, & absumptus, plures hydaïdas, & cavitates aqua limpida repletas continebat.

Pulmones sterni, & costis, & diaphragmati undequaque adnati, sine ulla tere distinctione loborum, unâ tantum compages carnis spongiosæ, putridæ, & materia ichorosa per totum infarcitæ videbantur. Proculdubio ægrotans hoc malum non ita pridem contraxerat, scilicet cum nullo corporis exercitio defungi, nec intra lectum, ut liberius perspiraret, commorari potuerit, sanguinis faeculentia, &crementa, quæ per cutim evaporare solita sunt, in pulmones deposita, in cauta erant quod hi & inter se, & cum aliis partibus concreverent, eorumque tonum & conformationem prorsus viciarunt, ita phthisi demum exorta cæterorum affectuum, quibus diu ac misere affligebatur, effectus, & productum, ac minime causa fuerit.

In utroque cordis ventriculo sanguis in substantiam solidam, albidam, & carnis coctæ amulam concreverat, quæ juxta cordis, & vasorum cavitates, & procellus effigiata, serpenti, cum cauda multiplici & divisa, nguram nonnihil referebat: quo quidem in multis post longam invaletudinem detunctis, nihil utilitatis occurrit: Cujus ratio est, quod sanguis à longa ægrotatione effictus, atque hinc circa præcordia pigre circulatus, in corde & vasis appendis stagnare incipit, proindeque in concretâ ejusmodi carneæ sensim congelatur.

Dum cranium aperto præcipuam morbi causam inter contenta ejus perquirimus: primo occurrebat, cerebri molem justo minorem, & ægri pancreatibus instructam fuisse, unde spiritus animales non satis copiose productos suspicari fuimus: porro universa & iniqua compages justo humidior, latice aquoso madida & prorsus immerfa videbatur: ut integumenta ejus, scilicet meningis integre divellerentur, atque anfractus & ventriculi omnes aqua limpida mundarentur. Probabile est hoc cerebri diluvium nuper accidisse



disse, nempe quatenus ob *algorem impeditam*, & *lousi secretionem* parcius habitam, *serositates* in massa sanguinea aggestæ capiti traderentur: ideoque *cerebri substantia*, & imprimis *corpora striata* uliginosa prorsus & tam madida erant, ut discissa eorum substantia vix compacta maneret, quin, liquidorum inspissatorum, more aliquatenus disfluere: intra *sinu cerebro* ejusque *appendici superstratos ac insertos*, atque *vasa ex iis* prodeuntia, sanguis in *glomeres* durissimos, ac velut carneos, non secus ac intra *cordis ventriculos*, & *vasa iis appensa* concreverat; quod etiam nuperrime cum sanguis pigre circularetur, propter eandem rationem, qua sanguis intra præcordia coagulabatur, accidisse putamus.

*Spinalis medulle* truncus aquæ limpidæ immerfus valdè extenuabatur, ut vix dimidium ossæ cavitatis impleverit: quod equidem à *seri falsi*, cui velut incoquebatur, colluvie effectum censemus. *Thom. Willis de Morb. Convuls.*

Puella quædam nostras honestissimis parentibus oriunda, per duos annos integros miris agitabatur convulsionibus, quibus non solum totum corpus contractum fuit, sed etiam sensuum primariorum organa ita læsa, ut per octodecim menses oculis suis orba degeret, nulla tamen opacitate, aut in tunicis, aut in humoribus apparente: Præterea per aliquot menses, eosque non continuos, at per intervalla longiora, vel breviora, interruptos, surda prorsus viveret, imò identidem loquelam amitteret; perstantibus interim doloribus atrocibus iisque perpetuis ac indefinentibus, quorum conditionem & naturam vix subinde explicare poterat, cum tamen mens omnino sana ac innotata per totum morbi decursum permaneret. Omnis generis sunt adhibita remedia pro tam crudeli debellando hoste, sed omnia incassum; unde etiam superstitioni quidam, quibus quicquid propriæ non subjacet conceptioni, naturæ limites transgredi videtur, suspicabantur diabolicum quid hic subesse. Verum ineunte mense Novembri anni præsentis 1692. ægræ nostræ corpus sensim se expandere, viresque deperditas ita resumere cepit, ut per urbem lento passu ambulare, quamvis non perfectè erecta spina, imò sacrum catum frequentare, bis aut ter potuerit, sicque Parentes spe integræ convalescentiæ non parum lætaverit, cum præcipue viderent, & dolores, & oculorum, & aurium atque organorum voci dicatorum affectus, tum temporis etiam valedixisse. Interim brevis admodum fuit triumphus quem de victoria contra morbum, imò (ut etiam ipsi vulgi erroribus & deliriis, non satis liberi, aliquatenus credebant,) contra diabolum parta, celebrabant, siquidem medio circiter Decembri prædicti anni dolores recruderunt, comitesque habuerunt spasmos tam atroces ut sexta post sui recursus die misellulam hanc enecarent anno suæ ætatis duodecimo. Sic nobis occasio data morbi tam abstrusi causas intimius rimari, quare cadaver cultro nostro subjectum die vicesima 1. Decembris, quò sectionem à capite orsi in eo sanè nihil cui affeum referremus, apparuit, nam neque in cranio, neque in dura aut pia matre, illiusque sinibus, neque in substantia cerebri glandulosa, corticali dicta,

fibrosa que, seu potius tubulosa, callosa vocitata, neque in ventriculis, ac plexu choroide, neque juxta nervorum quæ creduntur origines, ac præcipue juxta eorundem e cerebro egressum, aliquid extranei se manifestavit, præterquam feri parum inter cerebrum & duram meningem effusum, quodque ejusdem portiuncula in filamenta congelata ac polypolum quid efformans, in sinu falconato cerneretur. Observavimus autem in hac juvenili ætate quod cerebrum foret solito compactius & firmitus, glandula pinealis pellucidior, omnesque protuberantiae, quibus nomina, dantur tum natum, tum testium, tum protuberantiæ annularis, tum illæ quæ secundum Willisium faciunt corpora striata, thalamosque nervorum opticorum, &c. distinctiores ac magis quam in aliis cerebris elevata, viderentur. Propterea tam liber erat spirituum in hoc viscere comitatus, ut ratio ac memoria expeditior & promptior in hac puella fuerit, quam in aliis ejusdem ætatis familiaris sit.

Thorace postea resecato, reperiebam pulmones juxta crassiores, & si ita loqui liceat, de corpore verè vesiculari, carnosiores, per sui partem superiorem duorum digitorum transversorum longitudine pleuræ quàm firmissimè adnatos. Cor parvulum, sed alias bene constitutum in tota substantia, ventriculis, valvulis, earundemque columnis; nec minus bene se habebant auriculæ, nisi quod dextra tumidior, in se compieceretur ad integram plenitudinem serum congelatum, quo coniciebatur unum ex iis corporibus quæ polyposa dicunt, magnitudine nucis juglandis mediocris.

Recluso tandem Abdomine in eo veram morbi originem reperiebamus: sed de omnibus suo ordine. Hepar erat grandius, & per totam sui partem gibbam ad extremas propè oras, tum diaphragmati, tum peritonæo ita adhærens, ut ab illis tunc laceratione divelli nequiverit; substantia tamen ipsius integra ac intemerata. Glandulæ mesentericæ non tantum multò grandiores, numerum etiam ordinarium non parum excedebant, & materia sebacea ad absolutam turgescentiā replebantur, ac pluribus in locis rete quodam e vasculis varicosis confecto circumcingebantur, quibus vasis sanguis grunofus, ac quasi tollus continebatur. Quod verò nostram præcipue meruit attentionem, fuit corpus aliquod glandulosum, & pluribus sui partibus prope cartilaginofum, lumborum omnibus vertebrae ita firmiter connexum, ut ab ipsis nulla vi, sine totali laceratione divelli potuerit. Erat autem e pluribus corpusculis ovalibus, rotundis ac angularibus, racematim dispositis, solidiori ac alperiori unica conclusis, contextum, duos pollices crassum, quinque latum, sicque ad dextras ac sinistras, prædictas omnes vertebrae firmiter coniungens. Eo autem attentionem nostram meruit, quod in illo videremus veram causam omnium symptomatum quæ puellam hanc nufere excruciaverant. Corpus enim illud, primo proprio pondere, ac etiam durioribus tuberculis iisque angulosis quibus ex parte coniciebatur, lædebat plexus aliquos mesentericos, quam graviusque comprimebat nervulos illos qui in vertebrae lumbæribus emanantes, obviam eunt ramificationibus



bus quibusdam prædictorum plexuum, quibuscum coeunt, cum iis postea distribuuntur in varia abdominis viscera; sicque procreabatur ex parte irritationem illam spasmodicam tum totius corporis trunci, tum illam in specie quæ & oculos, & aures, & organa vocis, affligebat. Secundò acrior humor qui e tam maligno hico necessariò & continuo exudabat non parum vellicationem hanc convulsivam augebat. Sic autem mens non minùs immota peritabat, ut neque minus manet in mora in pluribus ex iis convulsionibus quæ à punctione in aliqua corporis parte extra cerebrum posita eveniunt. Eo autem tempore quo corpus se expandere & postea lente ambulare ægra cœpit, spinam perfectè erigere non valuit, quia vincula per tumorem descriptum vertebrae lumbares injecta non permittebant ipsarum liberam extensionem, etiam si per excussionem factam pro tempore materiz spasmodeos, propter rationes nobis incognitas, ceteræ partes tum liberè forent.

## CORDIS PALPITATIO TREMOR atque ad illud ipsum pertinens PULSUS INTER- MISSIO.

**D**E Palpitatione ac Tremore Cordis, ut & pulsu intermittente, tanquam præcipuis hac in parte materiis acturi, non est sanè quòd alio exquiramus unde Lectori abundè satisfiat quàm ex iis quæ de Passionibus Cardiacis accuratè pro more differit Thomas Willisius, cuius propria hæc sunt verba.

Post Pharmaciam Cardiacam, ita vulgo licet improprie, dictam, modo tractandum sequitur de Passione cardiaca; in qua nempe cor revera laborabat, proindeque remedia vere cordialia postulat. Sub isto verò nomine duo affectus, inter se nonnihil diverſi, communiter denotari solent; nempe Tremor cordis, & Palpitatio ejus: in utroque pathemate cordis motus, sive pulsus inordinatus, & quodammodo convulsivus esse videtur: attamen prioris inordinationis in Vibrationum ejus crebritate, ac alterius in earundem vehementia consistit. In posterioris hujus Ætiologiam primo inquiremus, & deinde alterius etiam Theoriam, & tandem utriusque curationem tradere nitemur.

Cordis Palpitatio adeo vehemens, & immanis interdum existit, ut non solum tactu manifestius percipi, verum & oculis conspici, imò interdum ad distans quoddam audiri possit. Porro ab Auctoribus fide dignis narratur, à vehementiore cordis vibratione, & costarum percussione, eas interdum effringi, aut in junioribus foras propelli, protuberantesque manere.

At verò hic motus quamvis ad sensum ita multiplicem perceptibilis sit, attamen rationi nondum constat, quæ pars ita moveatur, ut quovis pulsu suo pectoris latus sinistrum exilire faciat. Credo omnes tum doctos, tum imperitos, uno ore profiteri partem ita motam, & fortiter evibratam, ipsummet cor esse; sed interrogo utrum cordis tota compages, aut aliqua ejus pars ita exiliat, & solitam vibrationis suæ

sphæram transgrediatur? si dicatur corpus ejus totum, ita elterri, assignent vellem, an hoc in Systole ejus, aut Diastole fiat: certè non prius, quia dum cor contrahitur, *diastole* patet, motum ejus quoad omnes suas partes minui; nec magis in Diastole dicatur, quoniam in eo statu cor ad situm, & magnitudinem tantummodo naturalem, & ordinariam redit, inque eo aliquantulum manet. Hinc siquidem cor juxta vibrationis suæ, quantumlibet auctæ, aut intensæ, leges, adeò palpitare, & exilire nequit; (Quod etiam amplius constat, quoniam in paroxysmo febrili, ubi vehementissime pulsatur, non extra saltat, & costas percutit) olim suspicatus fui ipsum durante affectu illo, motum convulsivum, & ordinario plane diversum obtinere; quonempe, velut membrum spasmodice agitatam, cor prorsus totum eleveatur, & e loco suo moveatur. Attamen neurologia plenius intellecta, ab hac sententia statim recessi, quia certum est, cor à nullo alio musculo, præter suas ipsius fibras motrices, quaquam attolli aut elterri posse. Quapropter super hac re serio magis cogitanti, demum animo occurrit, quod dum cor ad sanguinem, è sinibus suis excludendum contrahitur, atque mucro, & latera undique concidunt, & propius adducuntur; si tamen sanguis illico totus quaque systole penitus ejici, & eliminari nequeat, necesse erit vasorum radices ad summum impletas, & plurimum intensas cum impetu quodam exilire, dein, propter reverberationem hic factam, totam cordis compagem valde concuti.

Profecto à tali interdum causa, Affectum istum oriri, ex observatione Anatomica nuper confirmatum vidi. Theologus insignis, & pius, postquam palpitationi cordis per crebras vices modo sponte, modo occasionaliter obnoxius degisset, tandem ea continue dies, & noctes, cum gravi dyspnœa affligi cœpit, & deinde intra paucos menses, à morbi molestissimi assiduitate attritus, fatum obibat. Cadavere aperto, Cordis sinus dexter mox sanguine concreto tumidus apparuit; cujus item auricula, in immentum aucta, & extensa, cruoris grumosi copiam ingentem continebat. Contentorum horum ratio statim apparebat, viz. quia pulmones summe obstructi, & cruore atro extravasato, & ubique stagnante infarcti, sanguinem, è ventriculo isto jugiter explodendum, haud totum admittere potuerunt: quapropter dum cor, exclusioni ejus totali summe adlaborans, unaquaque systole juxta conum, & medietatem intus contrahitur, & quoad magnitudinem diminuitur; Basis ejus ob sanguinem ibi coacervatum, ac in transitu hærentem, aut reverberatum, valde impleta extuberat, atque propter Auriculæ molentiam magis tumida amplius evibrat, & latus attollit.

Verum enimvero, haud solummodo ab hac causa, cor palpitare constat; quia non orbis ille, non semper constans, & perpetuus est, sed plerumque vagus, ac incertus per vices quædam infestat, & deinde sponte, aut remedium usu cessat. Porro nonnullos, quorum pulmones satis sani & tamen quavis immunes sunt, passim incessit.

Utrumque tamen licet morbus ille à causis diversis exoriri possit, in iis tamen omnibus



candem usque afficiendi rationem esse judicamus. Videtur enim quod cor solummodo palpitat, quatenus in systole ejus, dum conus, & latera simul contracta angustantur, basis cum vasorum radicibus, ob sanguinem illic aggestum, & non nihil hærentem, aut repercussum, ampliata extumescat. Revera sanguinis cursum hic loci nonnihil præpediri, aut repertum inde constat, quia dum cor in latere vehementer, & fortissime vibrat, arteria in carpo plerumque languide, & debiliter pulsatur, utpote sanguinis rivum non nisi exilem conveniens. Cum itaque morbi, istius causa conjuncta, sive ratio formalis omnino in sanguinis circa basin cordis, & vasorum radices remora, & aggeitione consistat, inquirendum sequitur, quot modis, & ob quas alias causas, ejusmodi affectio produci solet.

Super his, ut cordis carnes, sive fibras proprias motrices non multum culpemus, vitium hoc potissimum, & maxima ex parte, aut sanguini aut vasis cordis appensis imputandum videtur. Prioris ratio satis constat, inquantum sanguine aquoso, atque ad effervescentiam aut accensionem minus apto præditi, uti virgines, & ætate laborantes, atque viri, aut mulieres, cachectici, huic morbo plerumque obnoxii reperiuntur, & insultum ejus à corporis motu quovis citiore fere constanter pati solent. Cujus causa est, quod cruor, liquidem particulis segnioribus, & non satis activis constans, e cordis sinibus non libere & expedite ejicitur, sed partim in iis sæpe relidet, & facile stagnat: idcirco quoties à corporis motu usdem uberius infertur, ut penus ejus totus quaque systole eliminari nequeat, cor summo nisu laborans, in basin suam & vasorum radices, & vix ultra propellit; ubi cum aggeritur, & paululum subsistens partes continentes extumescere facit, passionem cardiacam una cum dyspnoea infert.

Præterea ea non affectio istarum cardiacarum quosdam sanguine præfervido, & prompte satis accendi aut fermentescere apto, prædictos sæpenumero infestat. Plerisque enim passioni hypochondriacæ, Hystericæ, aut alias spasmodicæ multum obnoxii, hoc malum frequens, & familiare est: quapropter in his casibus, Arterias cordi appensas in culpa habendas merito suspicemur. Quo pacto harum obstructio, sanguinis e corde effluxum liberum impediens, cordis palpitationem inducat, historica modo citata manifesto declarat: porro vasorum istorum occlusiones, & infarctiones aliis modis excitata, eundem effectum producere possunt. Novissimè Cervisiz fortioris ac vetustæ, nec non vinorum potui crebro à multis annis assuetum, prædicti morbi insultus crebros pati solitum; cujus postea, à stomachi sphacelo, cum vomitu quotidiano, spirituum languore, aliisque symptomatis defuncti, cum cadaver aperirent, deprehendi arteriarum magnarum truncum mox à cordis egressu plane ossilem, seu potius saxum, ejusque latera valde compressa fuisse, ut immixtum relictæ sanguis vix per dimidium, quo debebat torrentem, effluere potuerit. Proinde ut huic causæ palpitacionem cardiacam, et sæpius molestam, merito ascriberem. Cæterum probabile est pathema istud à sanguine, intra cordis sinus, & vasa appensa grumescere,

ac in frusta quasi carnea concreto, interdum procedere.

Verum insuper his, siquidem palpitatio cardiacæ affectus alios spasmodicos, prout nullo inuimus, sæpenumero comitari solet, etiam suspicari licet; illius causam quandoque mere convullivam esse. Olim in neurologia nostra ex observationibus Anatomicis ostendimus, nervos, & propagines nerveas fere innumeras, in pluribus locis, ac præcipue juxta basin cordis, articularum truncos complecti, & circumligare; quorum usus, & actiones ejusmodi fuisse putabamus, ut diversimodi sanguinis ætus, fluxus, & refluxus immo interdum stagnationes propter vehementes iræ, timoris, gaudii, tristitiæ, aliosque affectus, excitari solitæ, propterea contingant, quatenus funiculi isti nervi vasa hæc sanguifera varie stringunt, comprimunt, aut forsitan aliquando penitus occludunt. Porro haud multum improbabile est, ob vasa ista spasmodice affecta, & paulo diutius contracta, ita ut sanguis e corde exilitionem liberam præpediant, palpitacionis cardiacæ insultus nonnunquam exoriri. Profecto tum hanc, tum alteras istas cordis passiones, tali causæ merito imputamus. Verum efficiendi rationem à sententia ista paululum recedere visum est. Postquam enim nervorum actiones, & usus exactius perpenderam, deprehendi tandem ipsos, eorumve propagines nihil omnino trahere, aut contringere, sed totum hoc negotium omnino a fibris carneis perfici, atque nervos solummodo, in has partes motrices, novas subinde spirituum copias, insuper & motuum obeundorum instinctus convehere: quale pariter munus erga fibras membranaceas pro sensu peragendis exequuntur.

Dum itaque serio perquirerem, quibus visibus totidem nervi per vasorum tunicas disseminati inserviant; denum reperi, Arterias istas proprio Marte, pariter ac alia præcordia se contrahere, & dilatare, atque pro motibus illarum tum naturaliter, tum pathetice obeundis, & spirituum copias, & instinctuum rationes, per nervos istos deferri. Eumvero ex observatione Anatomica plane constat, Arteriarum cujusque tunicam mediam esse plane muscularem, atque fibris carneis (cujusmodi sunt ventriculi, intestinorum, & quorundam aliorum viscerum) per totum constare. Quæ fibræ annulares densæ velut capillamentorum serie; Arteriarum ductum, sive Tubum ubique cingentes, proculdubio systolas suas proprias, & Diastolas, æque ac cor ipsum, obtinent. Quapropter imprimis, dum fibræ cardiacæ, & dein hæc Arteriosæ successive, & seriatim contrahuntur, necesse erit sanguinem e meta una ad alteram rapidissime propelli. Quare haud prorsus de nihilo est, quod medici quidam etiam Arteriis facultatem pulsificam attribuerunt: quippe multum improbabile est, mero cordis tanquam Entboli impulsu, sanguinis circuitum peragi. Quinto verisimilius est, Arteriam in toto ductu suo, a tuncius cuiusque sanguinei tergo aliquatenus contractam, ipsum usque prorsum per rivulos, licet minores, & spatia magis angustata, utgere. Juxta hunc ritum ordinarium, sanguine æqualiter circumpellendo, Arteriarum constantes systolæ & diastolæ vices habere videntur. Quæ licet celeres ad-



modum, & idu oculi citius, successive tamen per omnes tubi arteriosi partes peraguntur. Cæterum vero cum advertamus æquabilem sanguinis cursum, juxta passionum impetus diversimode interrumpi, & perturbari, necesse erit tantummodo ita fieri, quatenus Arterix (propter instillatum per nervos ad fibras motrices datum) variis in locis subito constrictæ, fluentum sanguineum aut sistunt, aut reprimunt, aut prorsum impetuosius adigunt. In timore, tristitia subita, pudore, amore, aliisque pathematis, Animi consternationem, aut confusionem magnam inducentibus, probabile est Aortæ truncum, à fibris istis subito, & diutius constrictis, adeo contrahi, & coartari, ut sanguis ægretantum, & non nisi per minutas portiones e cordis sinibus exiliat. Quamobrem ab illo ibidem aggesto, & stagnante gravamen ingens, & oppressio magna statim sentiuntur: deinde si huic sanguinis Remoræ, cordis ad sanguinem ejiciendum pulsio fortis, & vehemens superveniat, necesse erit, ob cruorem quaque systole in cordis basin ejectum, ibique percussum, partes eas plurimum distendi, proindeque palpitationem cardiacam inferri.

Quemadmodum autem vehementes Animi passionēs, affectum istum fere quibusvis accerunt; ita Hypochondriaci, & spasmodice dispositi insulcus ejus de levi qualibet occasione, immo interdum sine ulla causa manifesta subeunt. Eumvero in quibus nervi sphlanchnici, & cardiaci materia morbifica sæpius obsideri solent; proinde ut illa, ob plenitudinem aut irritationem commota, spiritus istarum partium, & vicinarum incolas frequenter in spasmos, & contractiones inordinatos adigat; passim accidit propter nervos Arteriarum Cardiacarum radicibus insertos, à tali causa affectos, etiam vasorum horum fibras spasmodice affectas, & contractas eo, quo dictum est modo palpitacionem cardiacam excitare. Quo ritu nervi cardiaci à causa propinqua, aut remota, à materie morbifica, aut in capite juxta originem nervosam, aut citra præcordia, aut hypochondria subsistente irritantur, inque, spasmos vari generis aguntur, alibi à nobis ostentum est; unde palpitacionis cardiacæ, quoties eadem etiam spasmodica fuerit, causæ deduci possunt.

Quod spectat ad affectus hujus Therapiam, siquidem causæ ejus varix, & multiplices existunt, etiam curatio diversimoda institui debet. Nam quod nonnulli statuunt, ejusmodi remedia, quæ cardica vulgò dicta, cor resocillare, ejque laboranti suppetias præbere creduntur, in quibusque his casibus convenire, tum rationi, tum experientie communi refragatur. Cum itaque supra declaraverimus; Cordis palpitacionem, vel à sanguinis, vel ab Arteriarum cordi appensarum vitio, procedere, & utrasque horum varias afficiendi rationes innuerimus, modo restat, unicuique morbi istius speciei aptam medendi methodum, una cum selectis remedium formulis accommodare.

1. Primo igitur siquando morbus hic à sanguinis vitio procedat, Intentio Therapeutica primaria erit sanguinem nimis aquosum, & accendi, & fermentescere inhabilem, ad meliorem crasim exaltare, ejusque principia activa depressa, aut diminuta evellere, aut augere; in

quem finem medicamenta spirituosæ, item salina cujusque generis, sulphurea, & imprimis chalybeata conducunt. Quinimo huc referri possint, quæ in Pica, leucophlegmatia, & scorbuto frigidiore, præscribi solent.

2. Conserv. Absynt. pontici, &aved. Aurantii, & limonii, an. ʒ ij. Cort. Winteran. pul. ʒ ij. specierum Diacurcumæ ʒ j. chalybis præp. cum sulphure ʒ iij. salis absynth. ʒ i ss. cum q. s. syrupie cort. citri, f. electuarius: Dosis quæ. nucis Moschat. mane, & hora quinta pomerid. superbibendo Julapii sequentis ʒ iij. & deambulando.

3. Aq. fol. Ari th j. Pulegii, Hyssopi, ana ʒ iv. Aq. Lumbr. Limacum, Mirabilis, an. ʒ j. sacchari ʒ j. misce, f. Julap.

4. Tinct. Antimon. ʒ j. Dosis gut. 20. ad 25. bis in die cum eodem Julapio. Porro huc Tinctura chalybis, aut syrupus ejusdem, item elixir proprietatis cum multis aliis accenseri possunt.

Secundo Cordis palpitatio, & crebrior, & multo immanior ab Arteriis cardiacis in vitio habentibus exoritur: & tunc illarum culpa, aut Obstructio est, aut Affectio spasmodica.

Prior ille morbus plerumque continuus, & non raro incurabilis existit; præsertim vero, si à pulmonibus tabidis, aut Arteriarum radicibus propter tuberculum, aut excrecentiam ossicam semiopletis, aut compressis excitatur. Cujusmodi causæ si quando subsint, & perfecte dignosci possint, frustra esset earum sublationes moliri; quin potius id unice agatur, ut levamine quodam per hypnotica subinde procurato, ægrotantium vita, etsi misera paulo diutius protrahatur.

Cæterum vero non improbabile est (prout modo innuimus) Arterias interdum à concretionibus polypolis ibidem, ac interdum intra cordis sinus, progigni solitis, magna ex parte impleri, proindeque sanguinis exilitionem liberam, & totalem impediri. Hujus vero uti diagnofin valde difficilem, ita curationem non minus raram putamus: quando illius suspicio est, maxime ex usu tore videntur medicamenta salina; & ex iis sale volatili aut Acido prædita exhibenda eadem vero non simul, sed quodam temporis spatio hæc, (quibus non juvantibus) demitæ altera experiri oportet.

2. Sp. salis Armoniaci compos. viz. cum mil-lepedis, vel cum aliis Antasthmaticis destil. ʒ iij. Dosis gut. 15. ad 20. ter in die, cum Julap. vel aq. destil. appropriata: eodem modo spir. C. C. sulig. sang. Cranii defossi tentari possunt.

3. Sp. salis marini, aut vitrioli cum sp. vini herbis pneumonicis imprægnati, destil. & sæpius cohobati ʒ iij. Dosis gut. 15. ad 20. eodem modo. In hos usus sp. Tartari, ligni Guajaci, aut Buxi usurpantur solent.

4. Palpitatio Cordis, sæpius affectio convulsiva est, & à simili causa, & afficiendi ratione, qua pathemata alia hypochondriaca, vel asthmatica produci solet. Cujus item curatio per remedia antispasmodica pariter tentari debet: quorum vero defectus, sub discrimine quodam, juxta quod morbus in temperamento aut calido, aut frigido contingit, instituitur.

1. Respectu prioris sequentia præscribantur.

2. Sp.



℞ Sp. succini Ammoniaci ʒ iij. Dosis gut. ʒss. ad 20. bis in die cum Julap. vel aq. dest. appropriata; eodem modo Tinct. Tart. Chalybis, vel Antimonii per vices exhiberi possunt.

*De Cordis Tremore.*

Tremor cordis (qui etiam sub nomine passionis cardiacæ vulgo cedit) affectus à palpitatio-  
ne ejus distinctus, immo diversus existit. In eo namque ipsius fibræ carnes, sive motrices per se affici, nec, prout in altero isto pathemate, causa morbifica in sanguine, aut in Arteriis cardiacis subsistere videtur.

Cordis tremor optime describi potest, quod sit, carniū ejus convulsio spasmodica seu potius trepidatio; qua nentpe fibræ motrices celerime, et tantum semicontractæ, systolæ & diastolæ vices ocillinas, verum abruptas, & quasi dimidiatas efficiunt; proinde ut sanguis per minutissimas tantum portiones, tum cordis sinubus inferri, tum ex iis efferri possit.

Quandoquidem hæc affectio sit musculi cujusdam, scil. cordis motus convulsivus, ad pleniorē ejus notitiam huc referri deberent, quæ alibi de motu musculari item quæ de pathematis convulsivis disseruimus. Ne plura repetendo tædio fuerim, verbo tantum adnotetur, unumquemque musculum, duobus tendinibus, & ventre carneo constare; atque contractionem inde peragi, quatenus spiritus animales, & fibræ utriusque tendinis, in carneas prosiliunt, quas dum instant, & intumesciunt, propterea decurtant, & contractivas reddunt; motu autem facto spiritus in tendines redeunt, & fibræ carnes relaxantur.

Cum functio motiva sit duplex, sc. spontanea, & mere naturalis; in priore advertimus spiritus & tendinibus in fibras carneas, per appetitus imperium evocari, atque intra has, in actione manere, donec illius motu dimittuntur; deinde vero in tendines revertis quiescere, donec rursus foras jubentur, hinc ut illorum motus, & quietis tempora, sint inæqualia, incerta, & pro libitu nostro varie determinanda.

In functione mere naturali, multo secus habet; quippe spiritus animales, & tendinibus in carnes, perpetua vice sive constanti reciproca-  
tione, effertur, & contractione brevi flecti; mox ex his in illos resiliunt, ac ita vicissim; ad quem modum cor ipsum, arteriæ, & respiratio-  
nis organa, quinimo ventriculi, & intestinorum fibræ carnes, nisi propter objecta sua alias determi-  
nentur, per systolas & diastolas perennes agitantur.

Juxta hos ritus ordinarios, functionis utriusque motiva munia peraguntur. Quæ tamen juxta quod spiritus Animales, motuum illorum executores, varie afficiuntur diversimode perverti, aut perturbari solent. Enimvero satis manifesto liquet, motus cujusque contractivi, a quocunque musculo obeundi, instinctum, cerebro, aut cerebello, juxta appetitus justum, aut naturæ indigentiam per nervos committi; viz. spiritus Animales intra horum ductuscentes, juxta impressionem a capite traditam excitari, ac in tota serie commoti, mox alios tendinum incolas exuscitant, inque motus analogos eunt: pari fere modo ac si quisquam

pulveris pyrii accervos, per funem ignarium ad distans accenderet. Quandoquid igitur spiritus animalium in principio, viz. intra *symplicia*, tum in via, sc. ductibus nervosis, tum in fine, viz. intra tendines conliti, recte ac ordinati habent, motus cujusque ab Anima aut natura requisiti instinctum illi formant, illi convehunt, atque hi demum exequuntur: sin vero spiritus ad functionem motivam destituti, intra quamvis ditionem præternaturaliter affecti; in *zatiis* adi-  
gantur, propterea statim in membris, aut mus-  
culis respectivis motus convulsivi excitantur. Quoritu ob causam morificam, juxta origi-  
nem nervosam in capite, quo item, propter eam alibi intra ductus nerveos confitram, mem-  
brorum aut viscerum aut præcordiorum affec-  
tiones spasmodicæ exoriri solent, alibi satis fute declaravimus; viz. in quantum spiritus in-  
tra nervos secatentes, à causa quadam præter-  
naturali, & vehementi irritati, ac velut æstro quodam perciti, dum in has aut illas partes ruunt, motuum eiendorum signa injusta, & sal-  
sa deferunt, necesse erit in his, vel illis muscu-  
lis, aut membranis, contractiones aut disten-  
tiones violentas, ac convulsivas accieri. Va-  
rias hujusmodi affectuum species, & rationes formales in Spasmiologia elire designavimus; ac vero, quod illic prætermisum, atque ad rem propositam spectat, nunc insuper advertimus, dari alia spasmodicorum genera, quæ sine præsentis aut magno *symplicia* aut nervorum vitio, ob spiritus Animales ipsorum tendinum incolas potissimum, ac fere tantum in culpa existentes oriuntur.

Affectiois hujusmodi singularis, & velut pri-  
vata, dux species observanda occurrunt: una satis vulgo nota est, in qua spiritus injussi sæpe & tendinibus prosiliunt, atque fibras carneas valide atque moleste instantes, non statim, aut facile recedunt. Alterea, licet minus nota-  
bilis, tamen frequenter occurrit; in qua sci-  
licet spiritus musculares, neque intra tendines, neque intra carnes diu permanere possunt, ve-  
rum summe irrequieti, ex his in illos, & vice versa appetitu vel natura invitis excursus, re-  
cursusque suos valde crebros, sed debiles us-  
que & inordinatos faciunt. Super his affectibus spasmodicis (quoniam à plerisque adhuc me-  
dicis fere intacti manent, eorumque notitia ad passionis cardiacæ naturam, & causas rite ex-  
plicandas plurimum facit) operæ pretium hic duco, quamvis extra rem propositam, & quasi in diverticulo, pauca tamen subungere.

Prior iste affectus qui proprie *cramp* (atque Idiomate tum nostro, tum Gallico, *le cramp* ap-  
pellari solet) plerumque exoritur, in quantum spiritus animales injussi, & tendinibus scilicet aut uno, aut simul utroque in muscoli ventrem sponte prosiliunt, unde pro more solito mox re-  
gredi nolunt, verum diutius intra carnes ma-  
nentes, eas valde instant, & summe contracti-  
vas reddunt; dein si qui sem alii musculis hisce neque cedunt, neque in contractione conspi-  
rant, pars rigida, & cum summo dolore tensa evadit. Hujus causa est, materies quædam he-  
terogenea, & quædam quæ per ductus nerveos, una cum succo eorum in musculos descendens, & spiritibus coherens, eisdem elasticos, si-  
mulque obstinatos reddit; proinde ut intra



fibras tendineas contineri nequeant, sed spatia ampliora desiderantes, in carnes excurrant, ibidemque, donec deferbuit eorum tumor, permaneant.

2. Ad posteriorem istam motus convulsivi speciem proprie spectat Passio, sive tremor cordis. Porro ad hunc censum referri debet Affectus satis vulgo notus, & plerisque familiaris; nempe, ut interdum muscoli cujusdam privati, puta, in labro, gena, in oculis, aliisve membris subsultus, sive trepidationes valde crebras, & æquales patiantur; quæ postquam per duo forsan aut tria minuta perduraverint, sponte, cessant. Non ita pridem per literas à Gallia huc missas consulebar pro viro quodam illustri cujus musculos omnes, in toto corpore ejusmodi subsultus, seu velut trepidationes fere perpetim exercebant; adeo ut carnes exteriores, ubique exilientes, ipsius cordis vibrat ones, sive pulsus, ad animum æmularentur.

Hujusmodi Affectuum, uti & Tremoris Cardiaci, ratio formalis in eo consistere videtur, quod spiritus Animales ad musculos quosdam pertinentes irrequieti, ac velut æstro perciti, è tendinibus continue in carnes profluunt, redeantque, adeoque perpetua vice excursus suos recursusque iterent; interea cum exiguis tantum copiis efferuntur, ut fibras carneas haud plene insent, in iisque minimo tantum spatio morentur, nixus motivos, creberrimos licet, tantum non nisi debiles, & valde minutos edunt; in tantum sc. ut membra, & artus à musculis ita perpetuo agitati, haud locomoveantur, & cor, durante tremore ejus, utut celeriter concussum, tamen vix, & ne vix sanguinem circumpellere valeat; uti plane constat ex pulsu parvo, ac velut tremulo, atque virium omnium fatiscencia.

Quod spectat ad pathematum istorum causas, viz. conjunctam, & procatacticam, à quibus nempe spiritus musculares ita instabiles fiunt, sive vim istam desultoriam acquirunt; videtur, quod materies quædam heterogenea, & elastica, cerebrum & ductus nerveos transgressa, demum in musculos, eorumque fines tendinosos defertur; ubi spiritus subinde accrescens, eos irretit valde, ac velut æstro quodam afficiat, proinde ut nullibi consistent; verum huc, illuc continue discurrant, atque interim pensa debita aut omittant, aut non sitenue præstent.

Tremoris Cardiaci causa communiter in lienem rejicitur, etenim vulgo supponitur, ab hoc viscere obstructo, aut alias perperam habente, vapores retros ad cor elevari; qui ipsum ferientes, adeo concuti, & trepidare cogunt, immo quodam velut rigore afficiunt. Opinioni huic fides, aut saltem probabilitas inde astringitur, quod hypochondriaci (seu quod idem fere sonat, splenici) huic passioni cardiacæ plurimum obnoxii reperiuntur. Qualis, & quanta Lienis in præcordia sit influentia, olim sat fusc declaravimus. Ex istis partimque ex modo dictis, satis liquet, sententiam istam, receptissimam licet, de corde à vaporibus affecto, futilem prorsus, ac erroneam esse. Quod autem pro Lienosis, etiamque Hystericeis vulgò habiti, Tremore cordis ita passim infestantur, in causa est, magna ista affinitas, ac intima communicatio, quam nervi

splanchnici cum cardiacis habent, adeo ut non solum partis unius affectio alteram facile in consensum trahat, verum si quando materies spasmodica nervorum ramos, ad lienem, aut viscera imi ventris pertinentes, infederit, raro abest, quin eadem pariter nervos ad præcordia spectes occuparit.

Quod spectat ad Therapias rationem, in tremore cordis adhibendam, quandoquidem hæc affectio sit mere spasmodica, idcirco remedia non cardiaca, quin potius cephalica, aut ~~adiphi~~ indicantur; quæ tamen juxta temperamentum, & constitutionem patientis, aut calidiora, aut moderata, aut modo hujus, modo illius nature esse debent. Ut rem paucis comprehendam, cum in morbo isto tria remedium genera maxime proficua esse soleant, viz. testacea, chalybeata, & sale volatili prædita, cujusque illorum formulas quasdam, & usus hic breviter designabimus. Itaque imprimis, tacta per evacuantia totius provisione, & pharmaciz, quæ magis usui fore videtur, delectu habito, juxta modos præscribatur.

℞ Coralli præpar. Marg. an. ʒij. Bexoar. utriusque an. ʒʒ. succini albis. ʒij. Ambraz grise. ʒj. f. pul. Dos. ʒʒ. bis, vel ter in die, cum aq. destil. aut Julap. appropriato.

℞ Pul. e. chelis compos. ʒij. pulv. rad. Præniæ maris, Cranii humani præpar. an. ʒj. illor. Præniæ maris, Lilior. conval. an. ʒʒ. f. pul. sumend. eodem modo.

℞ Ebor. Coral. rub. pul. an. ʒij. spec. diamb. ʒj. sacchari albis. in s. q. Aq. Naphæ, solut. & ad Tabul. coct. ʒvij. f. f. a. Tabulæ pond. ʒʒ. comedat. j. vel ij. sæpius in die ad libitum.

℞ Conser. flor. lilior. conval. ʒvj. pul. coralli præpar. Marg. eboris, ocul. Can. an. ʒij. vitrioli martis ʒj. q. f. syrupi è corallis f. elect. Dos. ʒj. ad ʒij. bis in die, superbibendo haustum Julapii seq.

℞ Aq. Naphæ, Citri totius, an. ʒvj. è cort. aurant. cum vino destil. ʒij. sacchari ʒʒ. t. Julap.

℞ Syrupi nostri de chalybe ʒvj. Dos. cochl. j. mane, & hora quinta pomerid. cum ʒij. Julapii præscript. sine saccharo, vel cum aq. destil.

℞ Pul. eboris, coralli, an. ʒij. specierum diambraz ʒj. salis chalybis ʒij. sacchari ʒviij. Ambraz grise. solut. ʒʒ. f. Tabul. pond. ʒʒ. Dos. ʒij. vel iv. bis in die.

℞ Fragorum recent. lb viij. cortic. exteriores 12. Aurant. limaturæ ferri recentis lb ʒ. simul contusis affunde vini albi lb viij. fermentari sinantur in olla clausa, per 24. horas, dein destil. organis communibus.

℞ Sp. C. C. aut f. ang. aut similia ʒij. Dos. gut. 20. bis in die cum vehiculo idoneo.

℞ Forum salis Armoniaci, Coralli præpar. an. ʒij. Dos. ʒj. bis in die.

℞ Chryst mineral. ʒij. salis succini ʒj. salis C. C. ʒj. misce Dos. gr. 15. ad 20. bis in die cum aq. destillata.

#### *De pulso intermittente.*

Passionibus cardiacis porro accenseri debet pulsus intermittens, & quidem merito; quoniam in hoc Affectu, aut saltem in quadam specie ejus, cor



cor ipsum laborat; tamen more nonnihil diverso, quam in palpitatione, aut tremore ejus: quippe in his, quoad motum suum, in isto vero quoad quietem, perperam & irregulariter habet; hæc nempe interdum duplo longior est, quam juxta ritum ordinarium assolet.

De Pathemate hoc imprimis distinguere oportet, cujus (ni valde fallor) duæ sunt distinctæ fiendi rationes. Nam licet quandoque pulsus intermittat, quoniam cor pro eo tempore à motu cessat; attamen præterea tactu indice pulsus nonnunquam in carpo intermittere videtur, dum cor in pectore celerrime ac incessanter (uti fit in tremore ejus) vibrare sentitur: cujus causam esse suspicor, quod urgente ista cordis passione, sanguinis portio tantum perexigua quaque systole in Aortam projicitur. Quare hæc inanitas, & flaccescens, atque sarcina promovenda carens, ne frustra sæpius agat, contractionem suam quandoque intermittit. Pariter hoc fieri videtur, ac circa navem exonerandum, viz. quo tempore merces difficilior, & impeditæ admodum depromuntur, bajulatores exportaturi itum, & reditum vices quasdam prætereunt. Porro in febribus malignis, aut funestis, si quando pulsus creber, & debilis sit, etiam is subinde intermittit; cujus ratio est non quod cor à motu interdum cessat, (hoc enim tunc imprimis indefinenter laborat) sed quatenus sanguis non uberi satis penu, quaque systole in Aortam profertur; quare hæc, opere satis agendo carens, nonnunquam oritur.

Verum insuper pulsus quandoque intermittit, quia cordis ipsius contractio, pro vice quadam suspenditur, sive pausa ejus duplo longior existit; quod quidem manu pectori admota quispiam in seipso, aut alio facile deprehendat, imò laborantes per gravamen pectoris, & oppressionem, plane in se persentiunt, quoties cor à motu cessat. Porro hæc affectio non tam languidos, moribundos, aut periculose ægrotantes, quam satis validos, & quoad plurima recte habentes passim incessit: quare non semper juxta vulgi opinionem pro morbo, aut signo pernicioso admodum, aut valde fontico sumi debet. Huic obnoxii plerumque etiam vertigine, cephalalgia, aut pathematis spasmodicis molestari solent. Cæterum iste cordis defectus quoad typum varius est: nam intermissionum periodi modo sunt certæ, & ad pulsus vicem quandam, puta, tertiam, quartam, quintam, aliamve aut crebriorem aut rariorem, determinata; modo incertæ sunt, ac vagæ, ut necessario post pulsus jam pauciores mox plures contingat. Arteriarum vibrationes, dum continuantur, satis validæ sive fortes existunt, & plerumque sunt æquales: quandoque tamen pulsatio prima post intermissionem maxima est, quæ succedit paulo minor, ac ita sensim minuuntur, donec intermissio repetat; dein postea pulsus magnus incipiens, quasi per scalam rursus ad *anapnoeam* descendit.

Novi quosdam pulsus intermittente (quantum observationi nostræ res constare potuit) semper præditos, ut nullo non tempore arteriam tangens, ita habuisse deprehenderem; interim ut illi satis sani visi, de nulla alia ægritudine quererentur; attamen quosdam alios adverti tantummodo cum adesset, vel immineret,

cephalalgia inmanis, aut capitis affectio quæpiam gravior, etiam pulsus solito tardior, & intermittenti habuisse.

Ex his constare arbitror pathematis mox descripti causam, sive rationem formalem, non à sanguinis missione aut crasi, sed tantum ab irregulari spirituum animalium, e cerebello in nervos cardiacos, indeque in tendines cordis dispensatione pendere. Enimvero suspicari fas sit, propter nervos istos nonnihil obstructos, spiritus animales, haud pleno satis alveo, aut influxu, ad muscoli hujus tendines descendere; quare cum penis eorum nonnihil deficit, cordis motus pro unico pulsu subinde cessat, donec spirituum copis mox denuò instauratis, actio ejus redintegrari possit: ita vidimus molendinum à rivo perexiguo circumactum, limpha interdum subsidente, & pene exhausta, paulo subsistere; & deinde mox cum assurgeret aquarum cumulus, circuitus suos repetere.

Quorum pulsus ex se magnus & satis fortis, intermittere solet, illi non tantum cephalalgia, & affectionibus vertiginosis, sed plerumque etiam incubo, & non raro apoplexiæ, obnoxii degunt: nam si contigerit, nervos cardiacos, prius non satis apertos, & expeditos, postea in totum obstrui, propterea necesse erit, corde (quod primus blater est) immobili facto, corporis animati machinam mox totam à motu, & consequenter à vita, cessare.

Quamvis affectio hæc præsentem incommodo, aut periculo sæpiissime carens, curationem præproperam non exigit, attamen præservationis gratia, ne morbi graviores inlequantur, remedia, & methodus quædam therapeutica, adhiberi debent, saltem in tota, quæ supererit vita, ratio victus quoad omnia ritè ordinetur: quummo medicinarum cursus quidam levis, vere & autumnio, sollemniter observandus instituitur; videlicet ut quantum fieri possit, morbida quævis seminari, intra *synchysin* jacta, aut ibidem progigni apta, tollantur, & præcaveantur. In hunc finem huc referimus methodum, cum medicamento contra Apoplexiæ insultus, prophylacticam, alibi à nobis descriptam.

### *Curationes, Consultationes, Observationes & Anatomica inspectiones ex variis.*

#### *Curationes.*

In palpitatione cordis à quacunque causa profecta memorabilis est Lapis Bezoar genuinus non adulterinus ejus gr. ij. vel iij. cum magisterio perlarum & corallorum an. gr. vi. quotidie, usque ad remissionem morbi, exhibeantur in aqua Cinnamomi vel aqua cordiali composita.

Externè applicentur inunctiones ex balsamis cordialibus. Item Epithemata tum calida tum frigida.

*Nota:* Palpitationem cordis inveteratam penitus aufert Mimia hominis sani, aliquoties in aqua Cinnamomi exhibita: aqua theriacalis Crollii. Item aqua theriacalis Camphorata Crollii, quæ ingreditur compositionem mixturæ simplicis. Item liquor margaritarum cum spiritu Guajaci præparatus mirificè proficiunt, si suis dosibus intro dentur.

Uusus



Ufus Olei Cinnamomi in rotulis multum prodest.

Subnasci in corde vel sub capsula Cordis vermiculos extra dubium est, (morbus hic virginibus familiaris.) Morbi dignotio sumitur 1. à puncturis & doloribus cordis. 2. Lumbricis excretis vel non excretis. 3. Signum pathognomoni cum est convulsio.

Cordialia, seu calida, seu frigida, seu etiam specifica (nisi quod Lapis Bezoar ab initio, antequam convulsiones subsequantur, cum sale Tanacetii vel Diptamni cretici aut vulgaris sumptus, dos. gr. 4. 5. 6. & 8. interdum aliquid proficiat) parum aut omnino nihil efficiunt.

Cura specifica est talis. 1. Expurgantur Lumbrici per Mercurium in conserva rosarum exhibitum hoc modo.

℞. Mercurii vivi purgati, verbi gratia usque ad ℥j. diutempera vel mortinca (Mercurius non mortificatur proprie) cum saliva jejuni, vel cum Succo Limonum: Misce cum conservâ rosarum ℥ss. adde benzoës pulverisat gr.ij. aut si Mercurius crudus reformidetur, tantum ejus ℥j. vel ij. infusione in aquâ frigida haultum per noctem facta tandem exhibeatur sine Mercurio (qui non attingitur quidem ab aqua, sed odore suo cam efficit) aut aquâ destillata ex capris vel allio quantitate ℥ij. vel iij. propinetur. Lumbrici certò emoriuntur aut expelluntur.

2. Lumbricis quidem excretis, sed convulsionibus & paroxysmis recurrentibus, unde certissimum signum vermiculi cordialis deprehenditur, specifica extracta allii, raphani sylvestris & nasturtii aquatici exhibeantur dos. ℥j. an. in brodio vel juleculo, ubi raphanus sylvestris maceratus fuerit.

Ab hac cura citissime curantur.

*Nota:* In defectu extracti sufficiunt succi an. cochl. 1. 2. 3. in hoc salia prædictorum simplicium dextre parata idem præstant. *Johan. Hartmann. In prax. Chymiar.*

Ut in syncope motus cordis imminutus, sic in palpitacione est depravatus. Mille à quibusdam tremor cordis nominatur, cum tremor sit passio motus animalis & voluntarii, & nonnulli partibus voluntario motu præditis competat.

Curatio palpitacionis cordis varia esse debet pro varietate affectuum, à quibus dependet, ac primum ea quæ à peculiari affectu cordis aut pericardii curationem non recipit, ideo tota prædictorum curatio ad sympathicam dirigitur, quæ à variis partium inferiorum affectibus dependet, quorum curatio e propriis locis depromenda est.

At præter illa remedia, quæ causæ sublationem respiciunt; usurpanda etiam sunt, quæ symptomatis sedationi, aut lenitioni conferunt, cor reficiendo roborandoque, nec non flatus & vapores, ex humoribus melancholicis, aut crudis, & pituitosis elevatos discutendo. Qualia sunt Julepi, cardiaci, opiatæ, epithemata, & odoramenta in virium imbecillitatis curatione describenda, tum etiam sequentia.

℞. Conservæ melissæ, anthos flor. borrag. & caryophylli nostratis, ana ℥j. confect. alkerin. & theriacæ vet. ana ℥j. pulv. elect. diambæ, & diamoschi dulcis, ana ℥j. Cum syrup. de cortice citri, fiat opiata, qua utatur frequenter.

℞. Aquar. buglossi, rosar. & flor. arantio-

rum, ana ℥ij. Syrup. Caryoph. nostr. ℥ss. aquæ cinamomi ℥ss. Spiritus rosar. ℥ij. Confect. Alkerin. ℥j. Misce, dentur cochlear. ij. per intervalla. Liquor sequens ad imitationem succi ex cordibus sequenti cap. describendi, erit utilissimus.

℞. Corda porci, aut vervecis num. 3. cinnam. & caryoph. ana ℥j. Sem. acetosæ, & lactucæ, ana ℥j. Sem. vini albi unc. ij. aquar. borrag. Scabiol. & rosar. ana unc. j. Sem. Alkerin. ℥j. Bulliant omnia inter duo vasa. De hoc liquore capiat cochl. ij. mane & vespere.

℞. Rosar. rubr. & flor. rosilim. ana ℥ij. flor. lavendulæ drach. j. Sem. Angelicæ, cortic. citri, Caryophyll. cinamom. macis ana ℥ss. Croci scrup. j. Moschi, ambæ, ana gr. vi. Cum sindone rubra fiat sacculus qui irroretur vino albo, & aqua rosar. & applicetur tepidè regioni cordis.

℞. Unguenti rosac. ℥ss. Olei cunam. & caryophyll. ana gutt. vi. Moschi, ambæ, ana gr. iv. Misce nat. linimentum, quo illuatur regio cordis.

Clysteres purgantes, & carminantes frequenter injecti statuofam materiam potenter evacuant, & discutunt.

Sed venæ sectio omnibus remediis præstat, in hoc affectu, urgente paroxysmo. Et Gal. testatur 5. de locis affectis, cap. 2. Se nunquam inutiliter venam secuisse in palpitacione cordis.

Quidam Practici admovent thoraci cucurbitulas sine scarificatione, quibus magnam vim tribuunt discutiendis ac digerendis statuosis spiritibus qui in partibus internis inclusi continentur. Alii hypochondriis admovent, quando in iis mali minera residet.

At Zacutus Lusitanus cucurbitulam scarificatam regioni cordis admovit cum miro successu, ut videre est in historia ab eo descripta in Praxi Medica admiranda, observ. 133 lib. 1.

Alii verò commendant rhaponticum verum ad ℥ij. cum vino exhibitum, aut vinum in quo eadem radix macerata fuerit. *Lazar. River. Prax. Medic. lib. 8.*

Convenit in Palpitacione Cordis & Syncope omnium optime aq. de corde cervi, tinct. corall. spir. C.C. Essent. & spir. melissæ cum vino, aq. cinamom. borrag. cord. Saxoniz, vitæ. Externe verò oleum meliss. carb. & citri: Ex his tribus fit balsamus optimus cardiacus. Confectio Hyacinthos de corde cervi. Cor suillum valde commendatur ab Authoribus, & in defectu cordis cervini ex eo potest aqua destillari. Liqueor cordialis, perlarum, C.C. lolar. tinct. solis cum oleo cinamomi.

Si adest simul malignitas, misceatur balsamo cordiali alexicacus.

Si oritur palpitatio cordis ex morbo virginis β. ex utero non conveniunt, tunc cordialia tantum sed & chalybeata & vina medicata c. lim. *Mart.*

Si à vermibus, conveniunt medicamenta ex nasturtia aquatico, & cordialibus miscenda sunt specifica contra vermes.

Si a causa maligna, prodest theriaca, Smaragdina, Confectio de Hyacintho.

Si à terrore, prodest V. S. ut scil. sanguis ad cor retrocessus, revocetur ad habitum corporis, nam quosdam a terrore suffocatos esse experientia docet.



In animi deliquio convenit balsamus citri apoplecticus & oleum carbuic. aq. cinamom. melissæ cum vino, vitæ cord. lax.

Medicamentis suave olentibus in mulieribus miscetur essentia castorei vel aq. hirundinum cum castoreo ne ex suave olentibus illa ladan- tur. Inultio theriacæ, mitridat. oleum melissæ: Confect. Alkermes etiam addi potest remediis aliis.

In Lipothymia à nimia V. S. nihil magis con- venit, quam sal ori inditum linguaque co- strice- tur Authore Horatio.

Si quis incidat in deliquium animi ex hyper- cathari aliisque evacuationibus nimis, optima sunt restaurantia ex theriaca & aq. cinamomi: vel theriaca externe emplastri modo ventricu- lo imponatur vid. notas in Morellum p. 130. Hartmannus in Praxi p. 176. Grulingius Cent. 1. observ. 4. B. Tim. Præstat, aq. cinamomi Au- thore Grulingio d. l. *Joh. Michael. Præcos Cly- general. part. 1.*

Si in gravidis Palpitatio Cordis aut Lipo- thymia à sanguinis copie mediis gestationis mentibus proveniat, quæ sæpe tuturi abortus in plethoricis, sunt indicium, certissimum & tu- tissimum est venam aperire & sanguinem mode- rate emittere; quo modo prægnantes, & ab his, & ab aliis symptomatibus, instanteque ab- ortus periculo liberatas fuisse sæpius observa- tum est. Alias usu rhabarbari cum conserva rosar. humores leniter expurgare conducit.

Quod si vero à flatibus, aut vaporibus Synco- pe, vel Cordis Palpitatio oritur, assumenda me- dicamenta cordialia, retrosque vapores pel- lentia; ubi profunt bezoardica cum conserva rosar. rad. scorfon. cond. spir. lilior. convall. scord. aq. cinam. borrag. meliss. cum vino, sicut & bal. ex oleo meliss. & carbunculi. Confect. Alkerm. (in his scil. quæ eandem ferre possunt) Confect. de Hyacintho.

Externe prodest unctio olei Scorpion. Mat- thiol. cinam. cum theriaca, oleum meliss. citri. Sacculi cordial. repleti pulvere sem. alii, C. C. carlin. fantas spec. diamb. diamoscha, angel. & flor. cordial. &c. Item Epithema ex mica panis cum malvatico, vel aq. borrag. meliss. succ. citri pauco aceto ruta, lavend. rub. idæi, bezoard. &c. Vel ex croco cum panno scarla- tino, adhibitum calidè. *Idem ibidem.*

In Palpitatione & Tremore Cordis, quando debilis & intermittens pulsus reperitur.

℞. Sp. C. C. gtt. xx. Tinct. cinam. gtt. xii. Tinct. croci gtt. viii. Syr. corall. ʒss. Aq. meliss. menth. ana ʒi. M. detur cochleatim.

Vel, ℞. Spir. sanguin. cervi gtt. xx. Essent. cinam. gtt. viii. Tinct. tart. ʒss. Tinct. croci, gtt. vi. Syr. perlar. ʒj. Aq. naphæ, lavendul. ana ʒi. M. detur cochleatim.

Seu, ℞. Spir. sal. armon. gtt. xxv. Tinct. cinam. & succin. ana gtt. x. Essent. ambr. gryf. gtt. viii. Syr. perlar. ʒss. Aq. aurant. ʒij. M. do- lis anteriori similis.

In India. ℞. Spir. ex ebore gtt. xv. Essent. cinam. gtt. v. Essent. ambr. gryf. gtt. vii. Essent. rorismar. ʒss. Syr. perlar. ʒss. Aqu. flor. carda- momi sylvestr. ʒij. M. pro duabus dosibus.

Vel, ℞. Spir. C. Rinocerot. gtt. xv. Tinct. cinam. & ligni Aloës ana gtt. x. Syr. corall. ʒss. Aq. menth. & cinam. ana ʒj. M. pro dua- bus dosibus.

Seu, ℞. Bezoardici C. C. ʒj. Aq. cinnam- aurant. ana ʒj. Sal. perlar. ʒss. M. pro una dosi. Vel, ℞. Specier. dissolis ʒj. Syr. corall. ʒij. Aq. cinam. ʒss. Rosar. ʒj. M. pro una dosi.

Bezoardicum C. Rinocerotis, hic eodem quoque modo usurpari potest. Pulsu autem tar- do sed forti; sequentia, propter majorem præ- cipitandi vim, meliora erunt.

℞. Bezoardici C. C. ʒj. Syr. corall. ʒss. Aq. citri totius ʒij. M. pro una dosi.

Vel, ℞. Decoct. hordei & C. C. ʒiv. C. C. usli præparat. ʒij. Philol. præp. ʒij. Sal. perlar. corall. ana ʒj. Syr. acetont. citri ʒij. M. detur cochleatim.

Sive, ℞. Decoct. hordei & C. C. ʒiiij. C. C. Philol. præp. ʒj. Sal. perlar. ʒj. niri vitriol. ʒj. Syrup. corall. ʒj. M. dosi præcedenti similis. *Hermann. Nicol. Grimm. Compend. Medic. chy- mic. lib. 2.*

Cordis Palpitatio symptoma aliquando est periodicum, incertis invadens recurrentique intervallis, ex abrupto incipiens & desinens; aliquando continuum.

Ab hypochondriis sæpius origo mali; na- turalium viscerum adeit *καταρραξία*, sed etiam vitalibus partibus multa labe. Dyspnoeam ut- plurimum conjunctum habet.

Notandum eos qui diu partium spiritalium, pulmonum, &c. Vitæ laborant, ut plurimum incidere in hydropem thoracis, & tandem post ingentes angustias & recurrentes respirationis difficultates suffocari.

Obstructiones viscerum potenter aperi: sub- inde humores & crassos & tenues evacua habita- virium ratione: status discute: naturalia viscera corrobora: à vitalibus revelle, deriva: cor refocilla, ac contringe cardiacis reinge- rantibus, vel additis stypticis cum his quæ pe- netrandi vi pollent. Considerationem scorbuti noli prætermittere.

Ad obstructiones aperiendas, malignitatem humoris melancholici retundendam, vapores dissipandos, &c. magna inest vis *cha'zbi*, quem vel in substantia sumere potest æger, vel ca- piat sal sive vitriolum Martis, vel Martem po- tabiliem.

℞. Rad. vincetox. cochlear. Batav. sicc. ana ʒij. Rad. raphan. rusticana. sicc. sem. na- sturt. aquat. ana ʒj. Rad. enul. calam. aromat. ireos Florent. ana ʒss. Cortic. rad. fallast. lign. Aloës, lign. Winteran. flaved. arantior. & citr. ana ʒiiij. Herb. siccar. absinth. vulgar. menth. meliss. colli hortens. agerati, ruta, chamædr. hyperic. centatur, min. salvia rubr. majoran. rorismar. flor. lavend. ana ʒij. Sem. Angelic. fativ. anis. fenicul. pastinac. cardam. macis ana ʒv. Matich. terebinth. Cypr. coctura indurat. ana ʒiiij. Cremor. tartar. utriusque ana ʒv. Ma- gister. corall. perlar. oculor. cancr. C. C. præp. ana ʒij. M. cum syr. ex vino Canarino per solam sacchari dissolutionem præparat. f. *Electuarium*, cui adde pro singul. ʒxvi. Ol. cinam. & succin. rectificat. ana ʒss. Omnia exactissime permis- ceantur.

℞. Hujus Elect. ʒss. Vitriol. Martis vel ani- mæ hepatis nostr. gr. x. inf. ascendendo paulatim usque ad ʒj. & ultra usque ad ʒss. Cap. quotidie mane per dies 30.

Alternis autem diebus immediate ante coe- nam



nam sum. ℞. Pil. Russ. vel istiusmodi ad alvi astringentem praevidendam.

Vel loco istius Elect. sumat æger dosim pil. seq.  
℞. Gummi. guajac. Aloës ana part. æqu. l.  
f. Pulvis subtilissim. excipiendo. f. q. Balsam. Peruvian. nigr. f. Massa pilular. de qua cap. ℞. Vitriol. Martis gr. x. inf. formentur pil. n. j. de auro. addita gutta una ol. cinamomi, exhib. mane horis quatuor ante prandium per dies 30. vel plures, si opus fuerit, augendo quantitatem Martis, & pro re nata addendo gr. j. vel alterum extract. Alhandal.

Ad dissipationem vaporum melancholicorum.

℞. Terebinth. Cypr. mastich. puriss. ana ℞j. Gummi. guajac. benzoin. ana ℞j. Ambr. gris. ℞ss. Moschi ℞j. Sal. absinth. ℞j. Balsam. Peruvian. q. s. inf. f. massa pilular. Dosim ℞j. per dies 8. vel 10. mane. Vel dentur gutt. ij. vel iij. Ol. succin. rectificat. in pane format. in pilulas.

Ad palpitacionem cordis *pilula* hæ multum valent.

℞. Magist. perlar. corall. ocul. canc. ana ℞j. Lap. contrayerv. viperin. Virgin. ana ℞ss. ultramarin. ℞ij. Lap. gagar. præp. ℞j. Ambr. gris. ℞ss. Mosc. ℞j. cum extracto hyperic. f. massa pilular. Dosim ℞ss. per dies 20. aut plures, superbibend. vini Viperini momentum, quod ipsum est remedium haud contemnendum.

Item *Tabella* hæ : ℞. Ceruss. antimon. ℞ss. Magist. corall. perl. ocul. cancr. corn. cervi ad albedinem calcinat. ana ℞ss. Confect. Alkerm. ℞j. Sacchar. crystall. ℞j. Optime misceantur & excipiantur f. q. mucilag. gummi. tragacanth. f. pasta ex qua tabell. lento calore siccand. Tales tabellæ præparentur n. xx. Sumantur mane vel per se, vel cum liquore aliquo convenienti ad faciliorem deglutitionem.

Si hepatis male sit, tactuique istud durum appareat, eidem applicetur *Emplastrum pro hepate nostrum*. At ne contrahatur durities in scirrhum, & ut una opera emolliendo aperiatur, & per urinas ducamus, *pilula* seq. efficacissimæ sunt.

℞. Rad. ari præp. terebinth. Venet. coctura indurat. Gummi. guajac. natural. ana ℞ij. Mastich. ℞ij. Extract. absinth. solid. ℞ss. Salium absinth. cardui benedicti, corall. ocul. canc. ana ℞ij. Gummi. ammon. in succis depuratis meliss. & cochleariz Batavæ dissolut. & inspissat. ad pondus omnium. Mf. & cum f. q. Balsami Peruv. f. massa pilular. de qua capiat. æger per plures dies consequentes (30. 40.) ℞j. quotidie mane, superhaulto cerevisiæ antiscorbuticæ momento, horis, 4. ante prandium.

*Extractum absinthii*. ℞. Absinth. vulgar. m. iij. Rad. chelidon. major. ℞ij. Rad. asari ℞j. fol. siccor. chamædr. chamæpit. menth. meliss. rutæ ana m. j. coq. in vino Canarino, exprime, coagula. Theod. de Mayerne in Praxi Consult.

### Consultationes.

*Pro Illustrissimo Comite Julio Tassonio Ferrariensi febre putrida, hectica primi gradus, macie totius insolita, ptyelismo, lienis scirro quasi consumato, ac demum cordis palpitacione per intervalla laborante.*

Inter vitia, quibus Illustrissimus Comes de-

tinetur, primum est febricula quædam, quam esse de genere putridarum unicuique satis perspectum esse confido, atque in huius serie tu. n. continuam, quia singulis diebus absque frigore, & rigore exacerbatur, tum biliosam esse, ut suadet Illustrissimi patientis temperies, nullo in dubium revocabit; Cæterum propter morbi longitudinem, ac propter ætatem illius inclinantem, ventriculumque frigidiorum, bili pituitam admisceri non dubito, quinimo & propter lienem male affectum succum melancholicum illis duobus adiungi pro certo habeo, ut ex his febris prædicta notha existat. Verum tamen an aliud genus febris, hectica inquam huic adnectatur, tum propter passi habilitatem, tum vero maxime ob febrem putridam à multis diebus Illustrissimum virum vexantem aliquis non immerito suspicari posset; Atque ut ego verum fatear, hecticam saltem primi gradus, qui est difficilis cognitionis, & facilis curationis adnecti ob rationes nunc adductas existimo. Alterum vitium, quod in patiente nobilissimo observatur, est macies totius insolita; 3. est ptyelismus quidam jugis, a Cælio Aureliano Saliciatio vocatus; 4. est lienis scirrhus, quali exquisitus, cum ab omni sensu ferè immunis existat, cui etiam & illud attestatur, quod huiusmodi tumor citra aliquod levamen ipsius ægrotantis medicamentis fuit pertractatus; Postremum tandem vitium est cordis per longa intervalla palpitatio, quæ aliàs majori etiam cum periculo Illustris virum vexavit; Consulto autem sub scapula dextra tumorem omitto, tanquam eum, qui nunc operam medicam haud exigere videtur.

Et ideo ad modum generationis aliorum malorum animum attentè convertens illorum tum principalem, tum communem causam unicam à capite distillationem esse constituo, quamvis illa ipsa ex se invicem aliquo modo heri non ignorem.

Distillatio igitur prædicta sicuti est crassum excrementum præter naturam in cerebro genitum ob vitium facultatis concoctricis dependens ab intemperie frigida ejusdem cerebri (quemadmodum materiz minimè sapida per sputum excreta suadet, ad quod etiam conducit & id, quod ab ineunte ætate distillatione hac nobilissimus pateriens correptus fuit) ita & istud ipsum in subjectas partes decumbens, non solum affectus enumeratos, sed etiam longè plures, longeque majores parere potest, nam in ventriculum, & jecur descendens alimentum impurum reddit, unde macies, cui & calorem febrilem humidum substantificum absumentem non parum favere credo; Pariter prædicta distillatio in eadem viscera decumbens coctionem in illis fieri solitam perturbat, & inde succorum pravorum generationi, obstructionibus in omnibus visceribus naturalibus occasio præbetur; Ventriculus etenim ad generandum humorem pituitosum præparatur, qui a jecore fervidiori attractus insignes in eo parit obstructions, unde succi biliosi, & melancholici proventus arripit occasionem, atque sic pituitoso permixtus, & in liene receptus, secundum vasa obstructions efficit, secundum verò parenchyma replendo propter copiam, & quasi concretione propter trigiditatem inducendo, scirrhum



excitat; At biliosus humor per venas lienis, atque mēseraicas omnes propagatus, putredinem nactus in cor effundit, ac ita febrem accendit, cujus exacerbationes circa antepositionem, & postpositionem ordinem non servant, propter diversum statum Illustrissimi patientis, ac forsitan etiam propter diversam ejusdem vivendi rationem; Ad hæc succi pituitosus, & melancholicus in vapores resoluti Cordis motum vitiant, ea ratione qua vapores hi cavas cordis partes ingrediuntur, ac exitum querendo omnis agitationis præstant occasionem: Postremo eadem destillatio in palatum incidens, pyelismum illum efficit, quin etiam & humiditas excrementitia a ventriculo ascendens eundemmet auget, & fovet.

Quibus ita constitutis, oporteret, ut medicus ratione febris refrigeraret, obstructionsque attenuantibus ac detergentibus auferret, ratione autem emaciationis humiditates excrementitias absorbendo, sanguinem depuraret, & quod jam est absumptum humiditatis substantiæ repararet, ratione vero scirri emolliret, & discutere, Vapores qui Cor adire solent retraheret, ac dissiparet, destillationem illam per alterantia cerebrum ad calidum & siccum mitteret, Ventrículum calefaceret, & Jecur moderate refrigeraret, prius tamen habita de toto providentia, à qua ex vi methodi dogmaticæ medicus primum in destillationem incumbere tenetur.

Verum enim verò, quoniam plura mala simul complicantur, & hæc ipsa cum maximo lapsu à statu naturali conjuncta, atque sine aliquo fructu varia jam suere tentata remedia, ad huc & causæ morbiæ insignis activitatis existunt, à quibus potius graviora mala, hæctica nempe progressa hydropica passio, quinimò & ultimum terribilium imminet, contrariæque occurrunt indicationes, medicum suum opus haud perficere posse suspicior, atque hoc eo magis, quoniam omnia viscera principalia, atque plura his ipsis inservientia laborant, itemque facultas regitiva totius in dies languidior observatur. Quocirca præservationi solum studendum.

Et quantum ad materias medicas attinet, & primum ad chirurgicas præter sanguinis missionem per salvatellam sinistram sectam, ac per venas podicis hyrudinibus apertas, seraceum in cervice, ac mulsionem ad hypochondrium sinistrum factas propono. Ac si destillatio subitum periculum minaretur, à vesicantibus adhibitis capiti non abhorreo: De fonticulis autem, quos nunc habet, ita decerno, ut post aliquot dies alter sanetur ne à duobus macies in dies magis, ac magis augeatur, & qui gestabitur, si in sinistro femore esset inustus magis etiam mihi probaretur.

Pharmaca ad evacuantia, & alterantia reduco, Evacuantia si respiciant totum, atque sensibiliter agant sunt tum lenientia, tum purgantia, in genere priorum conveniunt mel rosatum solutivum completum, de succis vocatum, necnon syrupus de polypodio magistralis. In genere posteriorum probatur infusum Rhabarbari, agarici, senæ, atque etiam Hellebori nigri, adjecto melle ros. sol. probantur & Catapocia de tribus cum Rhabarbaro, vel de hiera cum agarico, dummodo tamen ab istis apoze-

ma ex syrupo de polypodio propinetur, quinimò & aliquibus intervallis Catapociorum de tribus dictorum usus adjecto Helleboro nigro preparato mihi non parum arridet.

Quod si evacuantia hæc agant insensibiliter, jus columbi, vel Galli antiqui cum china, ac guajaci modico, vel lassafiras adjectis simplicibus aliis opportunis medicamentis maxime censetur utilis.

At si eadem evacuantia respiciant, potissimum caput, & sensibilibus agant, hærina medicamenta tum liquida, tum sorda conveniunt, si insensibiliter, Ceratum Montagnanæ sinepiti adhibendum, ac Antidotus magna cum pulvere spicæ nardi, & loli Arriena hora somni devorata non improbantur.

Alterantia medicamenta præparant humores, obstructions auferunt, & viscera in contrarium statum adducunt.

Præparantia itaque seligantur, quæ ex cicorio, agrimonio, boragine, caplio veneris, scolopendrio, lingua cervina, & betonica sunt, eo semper constituto, ut à valde dilutis, & copiosis ad modum abstinatur, quando hæc male lienem affectum implere multum soleant; idcirco omnibus ego præferrem syrupum acetosum ex prædictis paratum.

In genere deobstinentium mihi probantur gummi nempe annoniæ, succus abanthii, & Eupatorii concretus, trochisci de Cappariibus, de agno casto, & de Eupatorio, huc pertinet oxymel ex arte paratum cum decocto radicum nlicis maris, liquiritiæ, altheæ, corticum capparorum, tamarisci, ac simplicium jam dictorum, medicamentum etiam calybeatum maxime opportunum existimatur. Atque ad lienis proprietatem servandam mirum in modum proderit, si hisce omnibus medicamentis plantæ spleneticiæ, præcipue verò pulvis ex equuli liene exiccato adjungantur.

Cæterum & medicamenta hujus generis exterius poterunt adhiberi, Ideo præter communia, pro liene laudo fotum factum cum spongiis madefactis in aceto decoctionis radicum nlicis, in quo lapis pirites ignitus fuerit extinctus, & a fotu linum entum factum ex butyro recenti, oleo nardino, & succis tum seneci, tum radicis cyclaminis, facta decoctione in duplici vase ad consumptionem succorum, ac tandem adjecta cera admovere expediet.

Stillicidia etiam primum emollientia tantum, deinde emollientia, atque discutientia simul alias adhibita, nunc repetita summo opere placeant, à quibus cetata ejusdem prorsus facultatis adhibenda, inter quæ maxime laudo quæ succo tabacchi referuntur.

Postremo in genere alterantium pro capite faciunt lotiones, tum sicca factæ ex fursuribus calefactis, tum humida cum lixivio decoctionis simplicium cephalicorum siccantium valde, at moderate calefacientium paratæ, Embrocæ quoque sive ex thermis, sive ex decocto secundum artem parato fiant, mirifice prodesse solent, cucuræ adhuc, & suffumigia accor modata conveniunt, & præter hæc conservæ capitales, Mithridaticæque confectio hora somni devorata probantur.

Pro corde conservæ cordiales cum confectioe Alchermes, adjecto pulvere cordis lupi.



vel Accipitris plurimum utilitatis afferunt, quemadmodum & extractum croci, ac liquor lullatitius, qui ex succo boraginis conficitur, in quo tamen succo prius crocus fuerit immaceratus. Exterius autem & confectio prædicta, vel theriaca cum croco, & oleum florum citri cum gallia moschata pariter illitum arident, quinimò & sacculus sericus repletus cotò, cum quo aliquot grana musci sint involuta super cor gestatus non parum proderit.

Pro jecore succus cicorii tum assumptus, tum ad motus proprie convenit, sicuti pro ventriculo radix Zinziberis, & nux moschata condita assumpta, & Illicidium ex stomasticis calefacientibus paratum maxime efficacia censetur, pro liene vero illa eadem, quæ obstructions auferunt, ac intemperiem emendant, meo iudicio sunt opportunissima.

Hiscæ omnibus adjiciatur demum accommodatus vivendi modus, qualis jam præscriptus fuit, atque etiam iterum, si oportebit ab Excellentissimo curante præscribetur, solum de vino illud animadverto, ut seligatur quod album, tenue, non dulce, non aulterum existit, quod magis proderit, si cum radice buglossi, ac plantis spleneticis alteretur, & ad alvum subducendam cum sena poterit aliquando alterari, quibus omnibus Deo favente, spero mala illustri. & Nobilissimi viri pro aliqua saltem parte imminui debere. *Julius Cæsar Claudinus in Consultationibus.*

*Pro perillustri, & Nobilissima Matrona tumore duro uteri secundum partem dextram, hæmorrhagia ejusdem, cordis tremore, vigiliis, somnis turbatis, rugitu imi ventris cum timore, & mæstitia, necnon febre putrida quotidiana laborante.*

Fœminæ præter calamitates utrique sexui communes, quibusdam propriis ratione mammarum, ac uteri potissimum subjiciuntur, ut non sit mirum, si Nobilissima Fœmina nonum supra quadragesimum annum agens præter melancholicam hypochondriacam ex timore, & mæstitia, cum rugitu imi ventris, & alui stipticitate, vigiliis, ac somnis turbatis cognitam, præter cordis tremorem sæpius, ac præcipue noctu recurrentem, & quemlibet sexum vexantem, de quibusdam affectibus uteri peculiaribus conqueratur, qui numero duo præsertim existunt, Tumor inquam in parte uteri dextra, durus, ac ferè indolens, qui aliquando augetur, decrescit aliquando; necnon hæmorrhagia, quæ sapit interdum naturam sanguinis melancholici, deinde biliosi, ac tandem ejus, qui loturæ carnis redolet naturam. Cæterum cum tumor ille, ut de se patet, durus existat, est sine dubio de genere scirrorum: at quia indolens, est de genere scirrorum legitimorum; quia verò modo augetur, modo imminuitur, est de scirrorum genere, qui admixtam habent inflationem, nam tumores ob aliam causam affatim non augentur, & diminuuntur, nisi ob statum ipsos, à quibus tumor, qui communiter inflatio dicitur, ortum habet, ut potius scirrus hic spurius, & non legitimus ob inflationem adjunctam dici mereatur.

Sed illud est dubitandum, num febricula singulis diebus post meridiem invadens sit morbus an symptoma; Dico quod postquam febris hæc typum aliquem habet, invadit enim cum extremorum perfrigeratione, sum in ea sententia, ut sit non orbus, & sit ex coordinatione lebrum putridarum, quotidianarum.

Nam mulier nobilissima in somnum est valde propensa, vix sitit, urinas pituitosas excernit, & febris calore fumoso, ac parum mordenti, qualis est qui in lignis viridibus accenditur continetur, in cujus rei certiore adhuc notitiam faciunt excrementa omnia succo pituitoso redundantia, & habitus corporis subpituitosus.

Verum tamen febrem esse de genere intermittentium patet ex frigore extremorum quod paulatim serpit in totum, cui potius quidam horror, quam rigor accedit, quæ tandem intervallum obscurum valde subsequitur.

Verum, & adhuc dubitandum occurrit, quomodo ab utero in tumorem elevato possit prodire sanguis, nisi subsit Ulcus, vix enim fieri potest, ut à tumescente parte sanguis prodeat ubi prius illa non fuerit erosa.

Responderem in hac Nobilissima Matrona uterum secundum partem dextram tantum tumore corripì, ut propterea sanguis ab ejusdem parte sinistra, aut cervice saltem prodire possit.

Rursus dubitabit aliquis, num alui adstrictio inter proprietates affectionis hypochondriacæ, ut videor ego superius asseruisse, sit reponenda.

Cui respondeo ferè nunquam hypochondriacam ægritudinem ab alui stipticitate separari propter multas rationes.

Prima est, quoniam in hoc affectu insignis fervor subest præcordiorum, meritò cujus ltercus valde exiccatum expulsionem admodum reluctatur.

Secunda est quoniam laborantes hoc malo, ut de se constat, pluribus cruditatibus scatere necesse est, quæ tum fœces inviscando, tum etiam bilis acrimoniam expultricis intestinorum destinatam placando, sunt in causa, ut fœces retineantur.

Quibus tertiam addo, quæ calor natus, sine quo intestinorum expultrix nihil molitur unquam, in hypochondriacis valde languet, ut ex inde necessariò fœces haud expellantur. Quod autem calor natus langueat, ex eo facile est intelligere, quod calor extraneus, ut unicuique satis est perspectum, plurimum redundat.

Horum autem malorum productionem in obstructions vasorum chili, uteri, ac jecoris referre non hæreo, quæ sicuti extensionibus, ac aliis Symptomatibus ad infimum ventrem attentibus dignoscuntur, ita non à sanguinis copia, sed ab humoribus fœculentis, & viscidis oriri nemo esset statum hujus Nobilissimæ Fœminæ perpendens, qui dubitaret, est enim in ætate jam inclinanti, & habitus subpituitosi, antequam plurimum frigida potavit, quæ omnia in prædictorum succorum generationem conspiciant.

Verum cum humores iidem sint opus præter naturam, quod necessariò actionem læsam alicujus visceris subsequitur, videre oportet quodnam viscus in casu nostro sit illorum occasio constituendum; Respectu igitur humoris fœculenti, ac terrei jecur ob obstructions in dies



magis, ac magis adactas fervidius constituerem, ventriculum vero respectu succi viscidissimi, & lentifrigidiorem redditum cum ob multas causas, tum vero maxime ob jecoris astum, & frigidæ potum; cui postmodum uteri hæmorrhagia plurimum favit.

Sed interim qua ratione affectus ii omnes ab hisce obstructionibus nascantur examinandum occurrit, sic etenim principium generationis omnibus commune, contractum fiet proprium quod ad curationem instituendam maximum momentum habet.

Suppositis itaque prædictis obstructionibus, in melero, & fundo ventriculi potissimum calor, veluti inflammatorius accenditur, qui fervor in iisdem locis veluti exurens in cor, & cerebrum fumos emittit, hinc affectus melancholicus, ut de se patet, hinc affectus ille cordis, tremor dictus, qua funi illi cum flatibus à ventriculo languidiori productis immixti, & per vasa cordis propagati exitum querunt, quem non assequuti concitato motu, veluti ad invicem inita pugna moventur, atque cor motu illo depravato moveatur, ac potissimum noctu, quia tunc temporis calore retracto, sicuti major copia vaporum gignitur, ita non discutitur.

Pariter eadem obstructiones in vasis prædictis transpiratum impediunt putredinem quandam succis, pituitosis, quibus maxime scatent, necessario inferunt, hinc fumus exustus elevatus cordi per venas, & arterias communicatus febris est causa.

Ad hæc & mala uteri ab iisdem obstructionibus nascuntur, quia si scirtum perpendo nemini dubium est, quod vasa illius prius obstructa tensionem in eo pepererant, à qua materia obstruente parenchymati uteri communicata scirtus est subsequutus; Materia autem illa est tum melancholica, tum pituitosa, crassa, lenta, nec non statulosa in aliis visceribus naturalibus genita, ut ex dictis liquet, ac in uterum imbecillum ex propria natura, & nunc ex accidenti imbecilliorum redditum transmissa, quamquam ob calorem uteri languorem, non bene proprium alimentum confici, sed tumorem à materia cruda, & statulenta in eodem utero genita foveri, & augeri sentiam.

A quo veluti causa principali melancholicam propositam pendere jurassem, nisi Matronam propositam ante hunc uteri affectum hoc vicio detineri cognovissem.

At qua ratione scirtus hic ex prædictis materiis ortum duxerit, non est difficile ex dictis intelligere, nam illud certissimum existit, corpus hoc succo pituitoso admodum scatere, id etiam observatur, uterum valde refrigeratum esse, & nullam causam siccitatem inferentem præcessisse, ergo fateri est necessarium per repletionem à copia, & per concretionem à frigido, non autem siccationem hunc scirtum factum fuisse.

Sed & hæmorrhagiam ab illis ipsis obstructionibus pendere, duplici ratione existimo, una quidem, qua in jecore obstructo sanguis vitiosus generatur, qui ad uterum transmissus secundum sui portionem crassiorem, in parte uteri obstructa retinetur, secundum vero tenuiorem portionem exit, hæmorrhagiamque facit.

Qua ratione autem id contingat melius intel-

ligere necesse est; Quocirca cum sanguis hic præter naturam exiens symptoma sit secundarium, in retentionem uteri lafam referatur oportet, quæ cum laxatur, vel lafa facultate, vel ob errorem externum, in casu nostro laxatur primum facultas ob morbum, non quidem in soluta unitate per erosionem quia calor, non oritur, & dolor à patiente non per sentitur; non in soluta unitate per fractionem, quoniam nec saltus, nec percussio, vel aliquid simile præcessit, non à morbo in mala compositione per effusionem, quoniam sanguis nec paucus, nec serosus exit, relinquitur ergo, ut per Anastomosis, ac uteri venarum apertionem prodeat, quæ cum fiat tum à copia, tum ab acredine sanguinis, & hæc sit excludenda, quoniam (ut dictum est) nullus calor, ac morbus per sentitur, à copia sanguinis hanc Anastomosis fieri concludendum.

Et si quis objiceret, in hac nobilissima ægrotante, ut dictum fuit, sanguinem minime redundare. Dicerem id verum esse in toto, non tamen in utero, qui cum præsertim laboret, ad eundem etiam sanguinem una cum succis excrementitiis confluere puto, quo perventus ob obstructiones contumaces, ob acridinis carentiam non ita subito, sed in ea copia collectus, quæ ab expultrice non possit sustineri, hanc ipsam irritat, ac irritando est in causa, ut retentio ex accidenti lafa sanguinis fluxum admittat, quamquam etiam nunc suspicer ob intemperiem humidam uteri, quam ex jugi fere emanatione humiditatum excrementitiarum elicio vasa ejusdem relaxari, ac per se retentionem quodammodo laxari.

In tanta igitur morborum colluvie, quid sit agendum unicuique perspicuum esse congho, sed quoniam ordine procedendum sit, non ita meo iudicio unicuique perspicuum existit.

Certum profecto est morbos hosce omnes (sicuti & alios quoscunque) haud posse sanari, nisi illorum causa communis abscindatur, quæ est obstructio, merito cuius oportet attenuare, ac detergere, habita prius totius providentia, & ne de novo fiat obstructio, succos crassos, & viscidos jam genitos extra locum obstructionis existentes evacuare, ac novam illorum generationem per alterantia membra generantia prohibere necessarium agnosco, Tumor etiam uteri post hæc erit calefacientibus, ac discutientibus tractandus. Verum quoniam hæmorrhagia tanquam impedimentum occurrit, hinc sine dubio per retrahentia præsidia, motumque sanguinis compescencia erit satisfaciendum, atque primum, & ante omnia, quoniam ut dictum fuit, est veluti impedimentum à quo in morborum complicatione, ex Galeni sententia, quælibet est auspicanda curatio.

Sed an liceat intentum obtinere, ego valde suspicor, quia plura mala, ac penè contraria simul complicantur, itemque sic progressa, ut fere totum naturalem statum corporis per illis patientis jam perverterent, & graviora longè mala imminerent, hydropicæ nimirum passionis, affectus somnolenti, atque alii quicunque frigidi sint, immineret etiam uteri exulceratio, sæpius enim contingit, ut materia morbifica, quæ in huiusmodi fluoribus ab utero prodit, tametsi non sit acris, nihilominus occa-



sione putredinis talis evadat, ac exulceret. Præterea video omnia membra principalia, quinimo totum ipsum (ut ex malo, & fædo colore dignoscitur) esse labefactata, adhuc & mala, difficultique tolerantia præsens est, sicuti ex virium dejectione facile possum intelligere, ut quasi hisce omnibus argumentis adductus mala jam dicta fere incurabilia iudicem; Poterit attamen Nobilissima Fœmina ad aliquod temporis spatium præservari, quod ut saltem assequatur, medicus illi præsto sit materiis medicis oportet.

Inter quas, Chirurgicas ego animadvertens statuo convenire, & quæ sensibilibus, & quæ insensibilibus evacuant. Priores in casu nostro binæ probantur hyruidines, primum naribus, deinde venis podicis applicitæ, neque non cauteria, unum quidem in brachio sinistro, aliud in femore dextro; Posteriores verò sunt trictiones juges, ac deligationes partium supernarum, itemque cucurbitulæ cum multa flamma citra scarificationem subtus mammae appositæ.

Post materias Chirurgicas perpendendæ pharmaceuticæ, quarum aliæ respiciunt materiam peccantem, aliæ viscera; si materiam, vel sanguinem, vel succum diversum a sanguine, sanguis ergo quoniam peccat qualitate, quia pituitosus est, ac tenuis, idcirco medicamenta primum eundem mundificantia, deinde coctionem juvantia erunt necessaria. Quocirca in genere priorum laudo pulverem radicis mechiocani cum decocto myrobolanorum chebulorum, cui immaceratus fuerit agaricus trochiscatus; In genere autem concoquentium conveniunt trochisci de Eupatorio, de Rhabbarbaro, Cyphei non solum devorati, verum etiam & hypochondrio dextro cum oleo nardino vel ablinthino, & modico rosati completi, ac cera excepti.

At si motum sanguinis respicio, moderatè incrassantia sunt opportuna, idcirco præter electuarium de scoria ferri, pilulas de Bdelio, ac tripheram minorem ex arte Phœnonis summis laudibus extollo, antidotum etiam magnam medicæ ætatis, ut quæ pro sistendo sanguine, & roborando calore innato maximè valeat.

Exterius autem duo lumbis, & pelvi applicita mihi arident, unum est lutum factum ex creta, bolo armena, terra sigillata, & sanguine draconis cum aceto, & albumine ovi exceptis. Alterum est quod ex Pini resina, ac sanguine draconis pariter paratur.

Sanguine suppresso, ad alia est deveniendum medicamenta, quæ ad materiam peccantem diriguntur, primum extra uterum, deinde in utero existentem.

Si extra, primum est lenienda alvus mel. ros. sol. ex succis parato, atque syrupo de polypodio magistrali, postea præparandi sunt humores decocto betonicæ, boraginis, lupulorum, fumariz, sem. citri, sonchi, adjectis syrupis accommodatis; tandemque purgatio infuso agarici trochiscati, Epitimi adjectis mel. ros. & syrupo de polypodio solventibus erit opportuna.

Et quoniam insensibilibus evacuantibus erit agendum, idè jus pulli, in cuius ventre incocta sit china cum tantillo sassafras, additis simplicibus præparantibus nuper dictis, necnon ad materiæ obstructis attenuationem, & deter-

sionem capillo ven. scolopendrio, agrimonio, radice apiæ rec. passulis, & coriandris præparatis, quibus omnibus vigente adhuc hæmorrhagia adderem equisetum, vel ophioglossum, vel landalum rubrum.

Pro discussione verò materiæ vaporosæ in corde existentis theriaca medicæ ætatis erit opportuna, quemadmodum & aqua stillaritia ex succo boraginis infusionis croci cum syrupo de corticibus citri simplici data, & item, & sal theriacale cum conservis cardiacis, & corticum citri exhibitum. Quo in casu Epithema etiam ex aquis boraginis, buglossi, melissæ, & horum citri ex croco, & speciebus cordialibus temperatis pro Epithemate vino Cretico, ac aceto rosato paratum, est maximi usus; & eo magis, si ab ipso regio cordis oleo jasmينو, vel florum citri, aut cariophylorum, adjecto eodem croco illiniatur, quinimo & ipsummet oleum croci chinice paratum mirifice prodesse solet.

Verum si prætermittam materiæ extra uterum etiam existentis copiam, qualitas illius, crassities inquam, & visciditas animadvertatur, occurrit statim usus medicamenti calybeati, quod mihi maxime arridebit, si ex calybe de nore præparato, speciebus aromatici rosati sine musco, & ambra, & conserva rosarum, itemque boraginis paratur.

Post hæc omne studium, si tamen permitteretur, ad uterum tumorem erit convertendum; idè præter chinæ decoctum superius propositum adjectis simplicibus matricariis, usum gummi ammoniaci cum succo Artemisiz, vel matricariæ concreto dati omnibus præferendum censeo. Huc usus calybis hunc in modum exhibitum est referendus.

Paratur primum decoctum in jure pulli ex altea, malvis, dactylis, Artemisia, matricaria, radicibus ireos, lignoque sassafras, & in colato per noctem portio calybis præparati maceratur cum tantillo pulveris cariophylorum, atque manè colati & expressi unc. viii. vel x. cum syrupo de Artemisia exhibeantur.

Extra verò præter forum factum cum spongia, vel involucro filii lini crudi, seu lana non lota calefactis cum decocto alter, malvarum sem. lini, fœni Græci, radicum cucumeris agrestis, peucedani, ireos, diptami Cretici, præter illinitionem ex oleo amygdalino dulci, seminum lini, liliorum alborum, irino, laurino, præter unguentum ex altea, & Aragon, & martiatum, præter emplastrum filii Zaccariæ cum tertia parte emplastri de baccis lauri, feligo potissimum embrocæ factam cum aqua lanarum, vel cum oleo amygdalino dulci, seminum lini, in progressu adjectis oleo irino, & laurino: Ab embroca verò Ceratum Diachilon gummatum cum portione cerati sacri erit admovendum.

Tandemque ad viscera, primum autem jecoris alterationem succus cicoraceorum tum assumptus, tum hypochondrio dextro cum aceto perfusus omnibus est præferendus, quod spectat conserva violacea, & rosacea, confectioque ex tribus sandalis.

Ad ventriculum autem alterandum nux myristica condita, radix Zinziberis viridis pariter condita, cydoniatum cum pipere albo, crasso modo contuso paratum assumpta proderunt; Exterius verò stillicidium ex aqua Tettuciana,



vel alia simili, sicuti & ceratum infra scriptum ad motum erunt valde proficua.

℞. Nucis muscatæ  
Cariophylorum } an. unc. j.  
Cinnamomi }  
Absynthii }  
Mentæ }  
Majoranæ } an. m. j.  
Calamenti montani }  
Rosarum rubearum }  
Cyperi orientalis unc. f.  
Aq̃z ardentis lb j.

M. Infundantur per 24. horas, deinde f. colatura cum f. c. adde.

Mastices  
Mirræ  
Laudani  
Stiracis calamitæ } an. unc. iij.  
Benzoini }  
Ammoniæ lb f.  
Musci drag. i.

Iterum infundantur per duos dies, deinde extrahatur liquor per balneum mariæ, fœcibus adde resinæ pini claræ ꝑ. iv. & cum cera f. Ceratum.

Materia Dietetica hujus census tempore hæmorrhagiæ sit oportet, ut nobilissima nempe matrona vescatur cibis aliquo modo inviscantibus, uti sunt extremitates animalium, fercula ex nilio, oriza, panico, & farre, necnon & ovo integro, jureque carniū optimarum cum extrenutibus dictis in aqua calybeata parata, & cum gummi arabico, cumequiseto, & ophioglossio alterata; quo etiam tempore vinum nigrum subaulterum aqua calybeata dilutum offerri poterit.

Citra verò tempus hæmorrhagiæ victus conveniat aliqua ex parte attenuans, boni succi, & affectui melancholico contrarius; Quam ob rem ova, Carnes optima, & laudatæ, uti avium parvarum in Montibus degentium, phasiani, perdicis, pulli, caponis, vituli, vervecis pro majori parte assæ probantur, quo in casu etiam borago, buglossum, melula, petroselinum, fœniculum, panula, pistachia, amygdalæ dulces non improbantur. Potus sit vini tulvi, tenuis cum radice buglossi, floribus cordulibus, china, & ligno sassafras medicati. Somnus fiat primum in latus dextrum deinde in sinistrum, elevato tamen capite, cœrilus retractis ex Oribasio. Corpus, quemadmodum tempore hæmorrhagiæ quietum est detinendum, ita citra tale tempus ambulationibus, gestationibus, aut etiam frictionibus exerceatur. Alvus lubrica reddatur usu psillarum præparatarum, vel conservæ cornarum rosarum communium cum manna conditarum, seu mixto ex aquis portionibus pulpæ cartami, & caricarum parato, vel tandem prunis hunc in modum præparatis.

℞ Infusionis sennæ factæ cum ꝑ. iv. seminum Cartami lb i. f. manz electæ ꝑ. iv. M. & adde prunorum dulcium siccatorum lb j.

Ponantur ad cineres calidos, quousque totus liquor absorbeatur.

Leto denique, & constanti animo perillustris, & nobilissima Matrona vivat, si modo fieri poterit, Deusque Opt. Max. ille sit, qui hæc omnia à me ex animo in gratiam melioris vitæ lu-

jus meritissimæ fœminæ p̃posita secundet, atque fœlicitet. Idem ibidem.

De Vertigine, Palpitatione cordis, & Hypochondriaca. Pro Illustriss. Madruzzia.

Quamquam de variis morboſis affectionibus conqueratur Illustriss. Matrona diligentissime descriptis à Viro doctissimo & Præclarissimo: tres tamen sunt præcipuæ, Vertigo scilicet tenebri-cosa, Cordis palpitatio, & Melancholia hypo-chondriaca. Has inappetentia consequitur, anxietas, talisque ac tanta corporis lassitudo, ut non raro decumbere cogatur ob virium imbecillitatem.

Horum omnium causa licet multiplex in medium adduci possit; Sterilitas enim, ætas decreſcens, mœtores, jejunia, diuturnæ meditationes, & vigilæ, ita labefactant calidum innatum cordis, & cerebri, ut quibuscumque supervenientibus injuriis facillime opportuna fiant; præcipua tamen causa est heterogenea materia, eaque cum melancholica in jecore fervido, tum pituitosa in frigidò ventriculo genita, nec præ suæ crassitie liberè uterum purgata. Etenim hæc majore quam conveniat copia in venis mesaræi acervata, nec liberè ventilata, ab extraneo calore in flatus, & vapores crassos, & opacos conversa, cor petens, anxietatem facit, & pal-pitationem; ad cerebrum elevata, cum mœro-nem inducit, dum mentem afficit; tum vertiginem tenebri-cosam, dum inordinate mota per anteriores cerebri ventriculos circulariter mover spiritus animales, tum maximam totius corporis lassitudinem, dum rectum eorundem spirituum transitum ad principium spinalis medullæ intercipit: ita ut cum Hippocrate dicere possim us, quod sicuti mensibus fluentibus morbi fieri possunt; sic non fluentibus, vel imperfecte fluentibus morbi sunt ab utero.

Afflictus equidem gravissimi, longè quinetiam graviora mala portendentes. Hæc enim, plexiam, vel epilepsiam minantur, cujus præ-nuncia est tenebri-cosa vertigo; hinc repentinum interitum. Quæcumque enim fortiter, frequenter, & absque causa manifestè exsolvantur, de repente moriuntur; ex Hippocr. 2. Aph. 41. Ideoque & de palpitatione peculiariter locutus Galenus, de locis Aff. asseruit, palpitatione laborantes non transcendere quinquagesimum ætatis annum. Quod magis in præsentia metuen-dum, cum habeant us morbos antiquos, confirmatos, contraria remedia exposulantes, nec de mensium revocatione in hac ætate decreſcente sperandum sit. Non tamen propterea est omnino de salute desperandum, cum vigeant adhuc vires, generosæque remedia præscripta sint à Viro doctissimo, & in arte versatissimo.

Quare agendum, & totum corpus diligentissime purgandum, obstructions hypochondrio-rum referendæ, peccantes humores evacuandi eorundemque regenerationem, quod forsitan primas partes tenet, ventriculo in consensum tracto, cum Illustrissima patiens sit moderate carnosa, & hilaris à naturæ primordiis, juvenitumque susceperit ab opportuno refrigerantium usu. Roborandum cor, & cerebrum: &

Nun;



si qua similis materia regenerabitur, ad ignobiliora loca divertenda. Quæ omnia perficientur remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis, & omnium maximè congrua victus ratione.

*Inter Chirurgica*, cæteris omnibus præferenda est sanguinis missio; primò quidem ex saphe-na sinistri pedis, mensibus imperfectè fluentibus; secundo ex jecoraria dextri brachii intermedio tempore; tertio ex hamorrhoidibus, dum adventabunt novi menses; quo tempore singulis mensibus easdem venas fedales aperiendas censeo, ut natura saltem assuescat huic evacuationi, posteaquam imperfectè purgatur ex utero, & jamjam imminet tempus naturalis mensium suppressionis, & sanè hoc remedio ego quàm maximè considerem. Fonticulos, quod spectat duos inurendos censeo infernis partibus, nec de superioribus cogitarem: quoniam, licet caput affici possit essentialiter in morbo diuturno, & pertinaci, credo tamen ipsum ita affici per consensum, ut removeatur consensus, facile cessatura sit etiam idiopathica affectio; hancq; ob causam removerem etiam fonticulum multum brachio, quando per inferiores materia fluere cœperit: ut propterea nec omittenda sint alia leviora remedia revellentia, & ad infernas partes trahentia: imò urgente vertiginosa passione, ut & palpitatio, duo vesicantia internis coxis applicanda censeo, antequam fiant fonticuli, ulcusque aliquamdiu apertum conservandum. Sic enim periculum fiet, utrum fonticuli sint profuturi, nec ne. Et hæc de Chirurgicis.

*Pharmaceutica* remedia sunt exactissimè proposita à Viro præclarissimo. Ideo superfluum judicans singulatim omnia repetere, seligam potiora tum universalia, tum particularia. Quoad universalia præparantia, probantur quàm maximè *syrup. de pomis, & de coriis. citri*, unà cum aliis præscriptis: ita tamen ut post syrupsos simplices deveniamus ad compositos. Quoad purgantia, mirificè proderit *extractum ex helleboro nigro*; nec inconueniens censeo, si aliquando, utamur *pilulis ex lapide lazuli, & coccis præparatum cum helleboro* vel si per noctem infundatur drach. j. *radic. helleb. nigri* ita ʒ iv. vini albi subdulcis; ac deinde imponatur idem vinum expressum in *colocynthide* diligenter à seminibus & interna pulpa mundata, ibique per diem naturalem conservetur super cineres calidos; ac deinde dulcoratum cum portuncula sacchari propinetur. Hoc enim crassiores humores deturbare valebit. Quod si aliquando vomitus provocetur blandioribus vomitoriis; cibo id fiat, dummodo tamen Patiens Illustrissima sit ad illum facilis; alioquin enim suspicium censeo, cum propter vertiginem, tum propter cordis Palpitationem. Clysteres quinetiam acres, & carminativi familiares esse debent; & in secunda humorum præparatione possumus alternis diebus uti ʒ iv. decoctionis *Epithymi Mesæ*. loco decoctionis ordinariæ pro diligentiori expiatione crassioris & tartareæ hujus materię. Quod si vires non videntur sufficere, intercedat aliqua quies, & partitis vicibus sollicitentur evacuationes propositæ; & semper post horum medicamentorum exhibitionem porrigatur peisana hordeacea colata cum carne cocta: hæc etenim detergebit residuum maeris medicamenti purgantis, & compescet fervorem ab eo impressum. Hanc universalem

purgationem absolverem cum aqua Theturtiana per triduum exhibita ad ʒb iv. singulis diebus, unà cum ʒ iv. mellis ros. solut. in cyathis, quod fiet vel continuatis diebus, vel 3. quoque die, si vires erunt imbecilles. His peractis duo potulimur remedia ex usu futura censeo: primum est jusculum galli bimni ex descriptione Viri Exc. paratum unà cum drach. ij. elect. Saxoniani de chalybe: hoc enim si viginti circiter dies utetur, quàm maxime proficiet. Aliud est aqua B. Virginis, modo non absit morboia ventriculi, & intestinorum siccitas; quod non spero, cum multiss. Matrona non sit admodum exsiccata, licet sit manus carnosæ, quàm fuerit præteritis mensibus, & annis. Sed quia ætus longe abiit, ideo laudarem ut post universalem purgationem præscriptam, roboraretur primo ventriculus internis levioribus, & externis remediis; ac deinde sumeret aquam B. Virgin. Inter interna placida placet vinum absynthute ad ʒij. mane quotidie sumptum, prænuila rotula parata ex portuncula sals. f. oleo destil. anisof. spec. diarrhod. Abb. & trochisc. de Gall. mosc. cum aq. ex stor. citri, & saccharo. Extrinsecus probatur magis succidiu ex oleis, quàm ex aquis: ita tamen, ut romana vel prorsus omittantur, vel imponantur in pauca quantitate, & loco cerati supraponendi utatur summitate purpuræ imbuta oleo nardin. melle. & absynt. idque fiat per quindecim dies. Quod si Patavium se contulisset, ventriculum roborassemus luti thermalibus partim emollientibus, & partim digerentibus, quæ status quoque dissolvere potuissent, obstructions referare, & totum ventrem inferiorem corroborare: nec unquam inveni remedium placidius, & efficacius in hypochondriaca debellanda; ut propterea, si per vires licuerit, suadendum sit Illustr. Matronæ, ut post universalem purgationem Patavium se transferat: quod heri poterit etiam sub finem mensis Junii, Adventante postea Autumno præcribatur jus Galli cum elect. ex chalybe jam descripto, quo tempore vinum quoque dilutum, & medicatum parari poterit cum melliss. buglos. rore mar. tam. r. scolopend. & lentisc. quo per totam hyemem utatur.

*Interim* placent topica cerebro, & cordi applicata. Ratione cordis conservæ, Epithemata, & sacculi præscripti sunt opportunissimi. Placet quinetiam conlect. alchemies præscripta: julep. illud genuinatum M. gni Ducis Hetruriz est jucundissimum, & spiritus ipsos recreat celestimmè. Ratione cerebri, post peculiarem capitis expurgationem per masticatoria blanda, placent odoramenta ex *rosis, santalis, & acetos* liummenta temporum, & venarum post aures cum succo beta nigra; vel cum oleo de buxo elymicè extracto, conf. de ruta capr. cum seminib. pæoniz, & sacch. ros. pulvis capiales præscripti: lotiones aliquando capitis facie supina factæ cum lavio non valde calido p. rato cum agar. ro. e. mar. calend. rosas, & radice china; Hæc quæ de remediis Pharmaceuticis: inter quæ laudo etiam balneum aquæ oleis toti corpori hoc ætate ten. pot. post ventriculi corroborationem.

Sed præ cæteris omnibus utatur congrua victus ratione, in utrumque prædictis digestio-nis, & boni alim. curantur nam puli juniores, vitulina caro, perdices, & vicia montana. Concedantur



sur melones, præsertim melopepones, fraga, ficus, pruna, amygdalæ dulcesia cæteris abstinenti-  
do, necnon a lacticiniis, piscibus, placentis, acetariis, & à vinis admodum generolis. Surgat aliquando e lecto, vel etiam domo excedat in curtu non impetuosè moto. Non decumbat intra horam à cibo, semperque sumat à cibo quidpiam subadstringens. Arceantur animi perturbationes, solitudines, nimix vigilæ: aliumque lubricam servet remediis à Viro Excell. propositis. Sic enim spero fore, ut perfectam sanitatem recuperet, quam Deus Optimus Maximus Illust. Matronæ largiri non dedignetur, enixè precor.  
*Bened. Sylvatic. Consil. & Resp. Medic. Cent. 1.*

### Cordis Palpitatio.

Exactissima morbi historia à te, Vir Præstantiss. delineata, & ad nos missa, Illustriss. Patientis statum apprime repræsentat, qui scilicet annum agens 45. temperamenti totius & jecoris ad calidum & siccum vergentis mediocris habitus, multis abhinc annis hypochondriaca affectione obsessus, vitæ otiosæ, ventri gulæque deditus, anno elapso Cordis Palpitatione corripicæperit, non diutamen perdurante, & solum invadente postquam in cibo & potu multum deliquerit, & Hypochondriaca affectio magis eum afflaxerit, quo tempore & pulsus inæqualitas atque interceptio, brevis tamen etiam observabatur.

Verum quoniam, licet de statu proprio Medicos consuluerit, nunquam tamen remediis usus est, ideo palpitatione antehac rara, & nonnisi ab externo errore, repletione scilicet, invadente sex abhinc mensibus, proximo nimirum Autumno, crebrius, & nulla externa occasione præcedente, Pat. invadit, diutius perdurans, tanta quidem vehementia ut non solum manu pectori admota deprehendatur, sed evidentior facta. Pat. in lecto decumbente stragula ipsa leviter eleve, quibus accedit difficilis spiritus, pulsus priter inæqualitas & interceptio diuturnior. Interim decolor Pat. Illustriss. redditus est, viresque totius non parum imminuit. Quare tandem ad opem medicam confugere coactus fuit, quam pro tua summa prudentia, cum solus præstare recuses, nostrum quoque advocari consiliū curasti.

Affectus itaque, quem præ manibus habemus manifestus adeo est ut vel ab ipso Pat. nomine Palpitationis cordis exprimat, quæ mirum non est si non tactu solum sed visu etiam cognoscatur, cum accidat nonnunquam ut ad aures etiam pertingat, unde observavit Bernell. coitas aliquando distringi, vel loco dinoveri. Præsentem autem Palpitationem legitimam esse arbitramur, quoniam à distensione fit, & subsidentia præter naturam, ob crassam & vaporosam materiam, tentatum exitum facile non inventientem. Symptoma itaque est in motu depravato Cordis quoniammodum duas conditiones habet, ad Palpitationem requisitas, cum sit pars concava, ut flatibus impleri, & mollis, ut dilatari possit. Hoc tamen, licet immediate & principaliter sit solius morbi opus, mediata tamen & secundario est quoque facultatis irritata. quamvis enim distensio fiat ab impetu flatulento, difficile erui pente, impetus tamen ille, ab expultrice etiam à flatulenta materia irritata dependet, quæ eandem, vel sola

quantitate nonnunquam distendentem, hoc tamen casu qualitate quæmetiam irritantem, ad expulsiōem sollicitet, unde impetus ille augeatur, in quo Palpitatio cordis sita est: non enim satis intelligimus, quomodo flatulenta materia sola sua levitate tantum impetum facere possit, neque alium motorem præter facultatem expultricem invenimus.

Palpitatio autem hæc, sicut ab initio per consensum ab hypochondriis excitata est, & à Liene potissimum (hypochondriaci namque flatibus abundant, quia ex Hipp. caloris imbecillitate quam maxime laborant) ideoque & rarius invadebat & celerius recedebat, ita in præsens, quoniam nullum medicum auxilium adhibitum fuit, Corde à gravi adeo affectione, & moru, præter naturam diutius conflictato, & imbecilli reddito, tandem essentia lita facta est, unde sicut antea nonnisi post errorem externum Patient. invadebat, ita nunc absque externa occasione, nullaque præcedente hypochondriorum querela, insurgit diutiusque perdurat, cum respiratione difficili, & pulsus inæqualitate ac interceptione, quæ primo quidem, cum in sola hypochondriaca affectione ob flatulentam materiam laeves arterias comprimenter, se proderet, brevi cessabat, ac modo diutius durat eadem materia non solum comprimente veram & ob copiam laeves arterias facile obstruente, quod non alia ratione accidit, nisi quia flatulenta eadem materia ab Hypochondriis non solum elevatur, sed in ipso corde excitatur, unde ob congestum spiritum à frigido Corde palpitationem suboriri asseruit Gal.

Neque de flatu dubitandum. Non enim à succo quopiam, siue humore, vera & legitima Palpitatio fieri possit, illico namque non fieret, neque statim desisteret, quinimo flatulenta huiusmodi materia debet esse crassum partium, & copiosa, nam si exigua & subtilis esset, facile per corpus transfluere, scribit ipse Gal. subdens. Si spiritus tenuis & purus esset, neque replet, neque vacuaret partes concavas distensione & subsidentia sed citra impedimentum transiret. Spiritus igitur crassus turbidus, aut caliginosus, aut flatulentus, aut quomodocumque nominare volueris, palpitationis causa efficitur.

Spiritus autem hic frigidus est, & ideo loco cit. Gal. dicebat, quod Palpitationis huiusmodi generatio ex frigido est. Quare nostro casu, vitæ otiosæ, repletionibus & cruditatibus palpitationis successit, Autumno præterito totaque hyeme adaucta. Et licet ab initio status hypochondriacos, causam agnoverit, ab exulta minera elevatos, frigidi tamen & ipsi sunt post adulationem, quamvis ex eadem geniti, quod confirmavit quoque Avicenna. dicens. Palpitatio fit ex ventositate inflativa, grossa, cujus significationes sunt velocitas resolutio, & quod non est nisi in corporibus frigidis, cum partibus rerum frigidarum. Unde Galen. spiritum appellabat caliginosum, aut flatulentum, sed semper frigidum. Hinc facile elici potest, Cordis palpitationes ob sanguinis copiam & fervorem, cum paulo & ex humoribus pariter biliosis, cum Actuario cordis vero motum depravatum, ex Aquæ in Pericardio, cum Galen. quinimò palpitationes à causa calida in febribus, cum Hippocrat. in silentio, & Adolescente Melibæ, non fuisse veras & legi-



timas, sed motus quosdam palpitationis amulos.

Palpitatio qualibet semper magni facienda, ratione partis præstantissimæ affectæ, læditur enim Cor. vitæ principium. Periculolior autem præsens est, cum sit facta essentialis & frequens; in Syncopen enim & mortem desinere potest, prout in illo, qui dum exolvebatur fortiter palpitans, repente mortuus est, quoniam ob motus vehementiam, dissipatur calidum innatum, eadem ratione qua flamma extinguatur à nimio motu. Quare, *Qui frequenter palpitatione corripitur, Senectutem non attingunt, sed inter 40. & 50. annum moriuntur, aut febre acuta, aut Syncope intercepti.* Neque credendum duos illos à Cratone memoratos, legitima palpitatione laborasse, sed spuria, qui propterea 35. annum attingerunt. Neque Antipatri casus, qui ad 60. vitam protraxit, hic locum habet, obstructæ enim illi erant laves arteriæ, à quibus tandem, accedente cordis palpitatione, quam nunquam antea passus fuerat, resolutus obiit. Nec D. Philippus Nerius, frequenti palpitationi obnoxius, ad 80. annum pervenisset, nisi dux ex mendosis costis sinistri lateris disruptæ fuisset, quæ in accessionibus, foliis instar elevabantur & deprimebantur, sicque suffocationem arcebat, ope quidem naturali, non tamen sine divini miraculi concursu.

Medela itaque præservativa potissimum statim Pat. Illustrissimo afferenda, curativa tamen non neglecta. Ideo omnium primò materia, flatuum minera evacuanda. Secundo obstructions minuendæ. Tertio intemperies, tum frigida Ventriculi, tum calida Jecoris corrigendæ. Quarto cor roborandum, & calidi innati conservatio curanda. Quibus ut satisfiat.

In Chirurgico fonte in primis convenit sanguinis missio, etenim *Adolescentes, & adultos omnes sanguinis detractio juvat, imò liberati sunt, qui post sanguinis missum usi sunt viâ & medicamentis amentibus.* Et licet non semper conveniat ratione causæ, quando scilicet provenit à cruda & pituitosa minera, ab Aqua in Pericardio, ab Aura venetica, Vermibus, Cordis imbecillitate, semper tamen convenit ratione effectus, ad arcendam nimirum suffocationem, & ut Pat. facilius calida ferat remedia. Nostro autem casu, ratione etiam causæ necessaria est, cum minera, à qua fovetur affectio melancholica & exusta potius sit, quam pituitosa. Educatur itaque per venam sectam, & repetatur per venas sedules. Cauterium quoque coxæ dexteræ muratur.

A Pharmaceutico fonte desumenda Lenientia Præparantia, Lurgantia, Aperientia, Intemperies Auferentia, Flatus Discurientia, Cor Roborantia, & calidum innatum Conservantia. Leniens sit Elect. lenit. cum Hiera picra, & Crem. Tart. vel Mel. Ros. sol. cum Man. clarif. addita Aq. Fl. Cit. Primum præparans sit Mel. Ros. & Oxym. addita Aq. Cinnam. uncia. Inde quinque aut sex post diebus repetenda hiera cum Lenit. ut supra, à qua duabus post horis bibat Mulsæ dilutæ lb j. s. Secunda præparatio obeunda Syr. de Cort. Cit. Julap. acet. & Syr. de Pom. in decoct. Cich. Borrage. Melissæ, Buglos. Fl. & Cort. Citri, & septem post diebus præbeatur Elect.

Diacath. & Diaph. cum Hiera 3j. vel p. retur infus. Agar. Rhab. & Sennæ addito Syr. Ros. & de Polyp. à quibus bibat Aq. hordei lb ij. & si in excretis cruditates observentur, præberi poterit Aq. Tectutiana, cum vehiculo Mel. Ros. sol.

Postmodum obstructions referandæ, quæ quoniam, utpote ex materia sicca, rebelles supponuntur, cum inveteratus jam hypochondriacus sit Pat. ideo humectantibus utendum. Quare p. retur hujusmodi potio aperiens.

℞. Succī depurati Borrage. 3j. Cich. Lim. an. 3j. Decoct. Cich. End. Malv. Agrim. Petrosel. 3v. m. sequenti vero mane præbeatur eadem decoctio sine succis, cui præmittantur bolita parati.

℞. Rhab. opt. 3ss. Fl. Cass. 3j. m. ref. bol. ij. & ita peragendum ad 10. dies mox præbeatur medicamentum hujusmodi.

℞. Fl. Cass. rec. extr. Elect. lenit. an. 3ss. Pilul. de tribus cum Rhab. 3j. m. f. b. a quibus bibat. Aq. hord. lb ij.

His peractis, ad corrigendas frigidas tum Cordis tum Ventriculi intemperies, Jus Galli ab omnibus celebratum locum habebit, cautè tamen casu nostro ita parandum.

℞. Ligni Rosism. 3j. Guajaci ping. 3ss. Sassafras incisi 3ij. Fol. Melil. rec. 1l. Cit. an. pug. j. Aq. com. lb iv. m. f. inf. per horas 24. deinde adde quartam partem Galli medix ætatis & bulliant ad consumpt. dimidit, factæque colat. servetur pro tribus dosibus matutino tempore, cui infundantur gutt. x. Julap. Gem. M. Ducis, in cujus usu persistat 30. saltem dies. Interim Jecore & hypochondriis æstuantibus, parari poterit prædictum Jus in Aq. stillat. Cich. & Borrage. cui præterea addi poterit succus Cich. depur. & per arenam percolatus.

Flatuum autem resolutio, licet ad curativam potius quam præservativam partem attineat, nunquam tamen deferenda, idoneo in usum ducat Consec. in Rotulis, ex Ol. de Cort. Cit. vel ex quinta essentia Rosismar. & præ omnibus ex Ol. legit. Cinnam. dissoluto Sac. charo cum Aq. ejusdem spiritus autem vitalis vivificari & instaurari potest usu Aq. Fl. Cit. cum Spiritu Salis Corallino, usque ad gutt. vi. vii. & viii. Illinenda quoque cordis regio balsami veri liquore, vel Ol. de Scorp. Marth. succo Cit. vel Vno Malv. dissoluto.

Quibus omnibus victus ratio addatur quodammodo attenuans. Vinum ad mensam paretur medicatum ligno Sassafras, aut saltem Rosismar. Arceantur cruditates, & alacri animo vivat. Hæcque extra accessionem.

Restat ut de parte curativa aliqua dicamus. Quoniam autem unica est Palpitationis causa, ideo unica curatio, nempe Flatuum resolutio, cum qua tamen & Spiritus fovendi, & cor roborandum, ne in Syncopen incidat.

Omnium itaque primò locum habebit sanguinis missio, si vehemens ac pertinax fuerit ipsa Palpitatio, parca tamen sit, ex jecoraria aut melancholica. Secundum locum obtinent Cucurbitulæ siccæ, quarum altera antea, postea altera, juxta cordis regionem apponenda. Præsens quoque remedium sunt sinapismi, internis partibus appliciti, ex æquali portione Caricar. & sinap. parati. Clysters etiam carminativi maxime con-



conferunt, flatus discutiendo, & à corde derivando atque revellendo.

Inter flatus discutientia efficax est Aq. vitæ Juniperina, efficacissima quoque Aq. Theriacalis, præstantissimum item remedium Theriaca, quo præstantius nullum unquam expertus fuit Maximilianus Imperator, palpitationibus obnoxius quamquam præservativum forsitan potius quam curativum remedium haberi possit. Tria præterea extant validissima remedia. Primum est Aqua Theriacalis camphorata Crollii. Secundum Extr. Croci Paracelsi, ad gutt. j. in cochleari Aquæ vitæ. Tertium Aqua vitæ celebratissima, à nobis experta, ita paranda.

℞. Sem. Ocymi, Caryoph. an. ʒ. β. Cort. Cit. rec. fol. Melis. an. pug. j. Macis ʒ. ij. Cinnam. integ. ʒ. β. Spicæ ʒ. β. Vini albi opt. lb. ij. m. macerentur omnia per diem naturalem, & destillatione fiat spiritus vini, in quo infundatur Moschus, ad gr. vj. ex qua sumat Pat. ad cochlearia. Extrinsecus quoque discutientibus utendu. Sic regio cordis illuminatur Ol. de Cort. Cit. quinta essentia Cinnam. ex Matth. vel Rorimarum. ex Labavio.

Secunda medica intentio fuit, spiritus vitales fovere, cui explendæ conveniunt quidem odorata, sed parce, acutiore namque odores spiritus dissolvunt. Sic intrinsecus confect. Alchermes cum Aq. tot. Cit. vel Cord. Sax. optima erit. Olei pariter Cinnam. guttula in Aq. Scorzoneræ ebibita celeriter spiritus recreat. Extrinsecus paretur Epithema hac formula.

℞. Aq. Melis. lb. j. Flor. Cit. Ros. an. lb. β. Spec. cord. temp. ʒ. ij. Diambræ, Diamosc. an. ʒ. β. Succi Cit. ʒ. ij. Acet. Ros. ʒ. j. Vini albi lb. β. m. pro Epith. quam ocysime spiritus vitales reficiente.

Tertia intentio fuit corroborare, pro qua notandum cum Avic. & ante illum cum Gal. quod evitanda vehementer calefacientia, quia vires dissolvunt, prout & vehementer refrigerantia, quia calorem labefactant, necnon validiora, adstringentia, quia fuliginosa excrementa cohibent. Sic intrinsecus potens est Bezoar, à gr. iv. ad viii. Magist. Perlar. aut Corall. in Aq. cord. Sax. tanquam mirabile remedium proponitur ab Hartmanno. Efficacissima, tanquam à proprietate quoque juventia, Corda animalium.

Ut ℞. Cord. Cervi, Turturis vel Bovis nu. i. Melis. rec. m. j. Fl. Cord. m. β. Cort. Cit. rec. ʒ. β. Sem. Ocymi ʒ. ij. Caryoph. Cinnam. Sant. Cit. an. ʒ. j. Spec. Diambræ, Diamosc. an. ʒ. β. quibus addatur Sacch. fin. q. s. B. M. destillentur, & Aq. exhibeatur ab ʒ. j. ad ʒ. ij. vel sola, Aq. Melis. mista Extrinsecus Epithema jam præscriptum efficacissimum quinetiam fuerit.

Quibus omnibus victus ratio respondeat, attenuans, ut jubet Gal. qui post Sanguinis missionem præcipit medicamenta, & victus rationem attenuantem, non tamen adeo tenuem. Hisque tum pro præservatione, tum pro curatione propositis D. O. M. annuat, & adsit. Raym. Joan. Fortis Consult. & resp. Medic. tom. 2. Cent. 2.

*Motus tremulus Cordis, sive illegitima Palpitatio,*

Nobilis Vir sexagenarius, temperamenti ca-

lidi & humidi, mediocri habitus, deliciis semper vitam ducens, immodicis potibus indulgens, cyathis oris inversi usus, duobus abhinc annis sentire cepit pondus quoddam in pectore, ascensu potissimum locorum acclivium ingravescens; ac paulo post spiritus quodammodo difficilis sibi visus est, licet nulla observaretur in respiratione difficultas; cui molestia in dies graviori facta, aliquot abhinc mensibus motus quidam Cordis tremulus & inordinatus, palpitatio non absimilis, licet non adeo evidens accessit; qui tandem in præsens continuus evasit, Corde veluti Aquæ innatante, ut Pat. refert. Pulsus consueto mollior, corpus paulatim gracilius, floridus faciei color pallore infectus est. Anxius itaque Pat. Patavium petiit, ut nos proprii status certiores faceret, nostrumque consilium scriptis impetraret, quod in hanc sententiam exaravimus.

Regionem spiralem, medium scil. ventrem, in hoc Nobiliss. Sene, lætum esse non est quod dubitemus, prout enim ubi dolor ibi morbus; ita hoc casu, ubi pondus ibi spiritus ipsius coarctatio, suffocationis quodammodo æmula. Quoniam tamen hæc nullo modo respirationi incommoda, deptum ideo & pulmones à quolibet læsione immunes censendi, eaque cordi potius adscribenda, cujus motum turbare depravarique manifestum est, dum spiritus coarctationem tremulus ille consequitur, referente Patientem, se Cor sentire veluti aquæ innatans, cujus pulsus mollior à naturali statu recedit; sicut præstantissima insuper partis noxam sat nobis significat diminuta ac depravata totius nutritio, nulla præsentis spirandi difficultate. Neque obstat, quod Tremor cordi competere non videatur; cum symptoma sit Facultatis Animalis, illud vero à naturali moveatur; minus, quod Tremor sit motus sursum ac deorsum, in quo mobile locum mutat; motus vero cordis distensione ac subsidencia, absque loci mutatione consistit: hæc enim de vero atque legitimo Tremore habenda; non autem de motu tremulo, cui proprium caput assignarunt Avic. Rhasis & Aëtius; quinimò & ipse Gal. qui pulsus tremulis mentionem fecit, tremuli scilicet motus, Palpitationi similis, quem aliqui saltum Cordis, aliqui Cordis Jectigationem appellarunt.

Cor autem lædi potest, tum essentialiter, tum per consensum, prout sæpe in Hypochondriacis à paucis flatu, nec valde crasso in ipsum se insinuante, qui motum quidem tremulum, non verò palpitationem inducere potest. Sic & à lavibus arteriis, quo casu pulsus intermittens observatur; necnon à toto venoso genere calida, & præva conditionis aura ad idem elevata; quam ob causam Adolescenti Meliboræ perpetuo cor palpitabat. Essentialiter autem afficitur cor à materia, nonnunquam flatulenta, quandoque aquosa, ut in casu præsentem, quo continuus est affectus, qui propterea à flatibus pendere nullo modo potest. Aquosa autem hæc materia in pericardio dubio procul, collecta est; unde Pat. Cor veluti aquæ immersum se sentire profitebatur. Neque Gal. latuit hic affectus ab hujusmodi causa, qui proinde motum hunc à vera palpitatione distinguens, ait. Est & alius affectus. Palpitatio videlicet cordis, aut per se eveniens, aut cum significatione quadam, quod in humore cor ipsum moveatur; neque enim



enim inueniri videri debet, tantam humoris in altitudinem cumulari aliquando in ambiente cor tunica, ut ipsum, ne attollatur, impediri possit; quippe in Animalibus dissectis vidimus plerumque plurimum humoris urine speciem referentis, in eo, qui ipsum involuit, particulo contineri; ita & in Simia quadam à nobis post mortem dissecta, inueniuntur in ambiente cor tunica tumor præter naturam, humorem in se continens, qualem Hydatides emittere solent. Et licet Aqua huiusmodi naturaliter in pericardio contineatur, quæ à Columbo, Velalio, Spigelio in Canibus nuper dissectis sæpius inventa fuit, reclamantibus licet Matthæo de Gradibus, Curtio, Lupejo, & Vega, in nostro tamen Pat. iusto copiosior adeit, ob potus immodicum usum, præsertim ex vasis oris inversi, cum habeamus ex Hipp. quod, Pericardii humor est particula illa potus, quæ non obstante Epiglottidis operculo, dum bibimus per asperam arteriam deducitur, quam postea cor per laues arterias trahit; cuius usus est ut cordi calido & æstuanti præstet auxilium. Atque Hipp. subscriptis quoque Gal. his verbis. Per spicuum quoque inde esse potest aliquam portionem particulam ad pulmones deferri; quod si quodcumque liberit Animal ad eam siccum redegeris, ut coloratam Aquam humore patitur, & in x jugulationem ipsum dissectueris, colore eodem infectos pulmones habere deprehendes. Neque obstat quod tussis necessario excitanda foret; namque ex eodem Gal. Percolatur perpetuo per asperam arteriam in pulmones, ipsius potus tam exile quidpiam, ut prout ab instrumentis raptum, per quam facile quocumque distribuatur, absque eo quod spiritus vias exacerbet, & Animal ad tussim irriter; descendit enim per rimam tanquam per parietem. Unde iure idem Gal. asseruit quod, Non solus Ventriculus subundos & minime siccantes facit; sed viscera quoque in thorace contenta, nimirum Cor & Pulmo. Facilius autem in nostro Pat. potuit in tracheam potus penetrare, ob inversa calycum ora; Lambivorum enim ritu potus descendit, unde facilius in asperam arteriam illi aditus patet. Hinc copiosa in pericardio aqua collecta, nil mirum si cordis Jectigationes, pulsusque mollieties & lenitas contingant, ut observavit Avic. prout & quadam spiritus coarctatio, intercepto libero Cordis motu; unde nativo ejusdem calore labefactato atque imminuto, ac proinde debili influente ad naturalia, imminuta depravataque secuta fuerit nutritio; ita enim & Simia à Gal. dissecta, ex aquoso tumore, sicuti & Gallo, ex Scirrholo macies paulatim succrevit.

Affectus hic vix certe sanabilis; cum difficillimum sit copiosam aquam Pericardii, penitionis scil. nobiliorisque partis, exsiccare atque resolvere, hac potissimum senili ætate, atque habitu corporis à consueto laudabili declinante, nativi caloris cordis imbecillitatis indicio. Nilominus non est deferenda curatio, cum vires adhuc validæ sint, Patiensque Medicis præceptis obtemperans.

Prima itaque intentio sit, Aquam exsiccare. Secunda, flatus discutere. Tertia, spiritus vitales fovere & Corroborare; præmissa primarum viarum & totius expurgatione.

Atque à fonte Chirurgico parcissima sanguinis missio depromenda, ut Cordis æstus ventiletur, & totum corpus ad calidiorum medicamentorum usum facilius disponatur. Cucurbi-

tula etiam magna mammarum sinistræ sine scarificatione affixa proderit, cutis meatus patefaciendo, aquositatem ad superficiem attrahendo, eamque ad resolutionem disponendo; in quem finem, rubificantia etiam in progressu applicanda.

Ex Pharmaceutico præcipua desumenda remedia, Lenientia scilicet, Præparantia, Turgantia, Aquam Educentia atque Resolventia, Flatus Discutientia, & Cor Roborantia.

Quoniam autem Pat. Nobiliss. medicamenta omnia sigillatim descripta desiderat; ideo Leniens sit.

℞. Elect. lenit. ʒ vii. Crem. Tart. ʒ ss. Spec. hierz ss. ʒj. m. f. b.

Vel ℞. Pot. ex Man. clarif. ʒvi. Aq. Cinnam. ʒ ss. m. f. p.

Præparans erit ℞. Oxymel. s. mel. ros. s. an. ʒj. s. Aq. Cinnam. ʒ ss. m. pro syr. & sic pro aliis quinque. Inde purgans sit huiusmodi.

℞. Elect. lenit. ʒ vi. Magist. mechoac. ʒ ss. Magist. Julap. gr. vi. Spec. hierz ss. ʒ ss. m. f. b.

Vel ℞. Pot. ex man. clarif. ʒ vi. addita inf. consuetæ rad. Ireos, sambuci ana ʒj.

Inde, licet materia evacuanda aquosa sit, nova præparatio non omittenda, & quidem ratione causæ antecedentis.

Quare ℞. Oxymel. comp. syr. de Hyssopo, de Prassio an. ʒ ss. decoct. cich. hyssopi, prassii, fars. meliss. Botrid. ʒv. m. pro syr. & sic pro aliis; quarto tamen quoque die, aliquod Hydragogum præbendum levius, atque suavius, ut pluries repeti possit, absque virium & nativi caloris offensa; quale erit succus rad. samb. ad ʒj. in vino albo, vel decoctio ejusdem pariter in vino albo; vel Aqua ex eadem rad. destill. ad ʒij. vel iij. in vino albo generoso; sic Magist. mechoac. ad ʒj. Ref. bol. cum lenit. placide namque purgat, & absque ulla ventriculi læsione. Post autem hujus repetitum usum, ad aliquod validius semel exhibendum deveniatur, ut

℞. Extraet. Esulz ʒ ss. Magist. Mech. ʒ ss. Pil. Aleph. ʒj. m. ref. & exhibeatur quatuor horis ante cibum; sequenti vero die, Theriaca medix ætatis, ad cordis roborationem.

Inter aquam resolventia atque educentia, primum locum obtinet decoctum exsicicans, sed cum sudore, ut sensibiliter & insensibiliter Aqua in pericardio exhauriatur; erit autem huiusmodi.

℞. Ligni Guajaci cum cortice, Ligni rorisin. rad. Enulz an. ʒj. Ligni sassafras ʒ ss. Aq. meliss. ʒij. borrag. fars. an. ʒij. m. f. inf. per horas 24. deinde bull. ad consumpt. dimidii, & colatura servetur po tribus vicibus, matutino tempore, hora una ante sudorem exhibenda, cui præmittatur pulvis viper. ad gr. xv. vel xx. Sudor autem proliciatur in hypocausto paulatim, ut sit cum tolerantia, cui insistendum 40. diebus.

Si his res bene succedat, pergat Par. 20. adhuc diebus in usu pulv. vip. in Aq. Card. Sancti; secus verò, sudore non juvante, confugiat ad Aq. Aponitanas sulphureas, primis diebus dejectorias, postea diureticas; quæ licet profuerint, non tamen his absolvenda curatio, sed diureticis insistendum. Quare infcio Pat. præbeat quotidie Urina pueri destill. ad ʒvi. vel vii. cum gutt. xv. spir. Tart. rectif. cui præmittatur bolus ex cereb. Cypr. lota in Aqua Capill.



Ven. ut efficacius, & pectorale evadat medicamentum. Quibus nisi cedat affectus, iure insanabilis iudicandus, naturæque quies concedenda; repetitis tamen alio tempore jam antea usurpatis.

Interim status discutientia adhibenda, ut rotula ex ol. cinnam. vel quinta essentia Rorisinar. quæ præstantissimæ. Item Cor roborantia interna, ut Diambra, Diamosc. Theriaca, Mithrid. confect. & a proprietate Cor Sinuæ assatum & pulveriz. ex Rhali, in Aqua Cord. Sax. Externa verò, ut Ther. antiqua aceto & succo Cic. dissoluta, panno purpureo illita, & cordis regioni admoda. Ol. succini Cordi illitum, præsertim vero oleo de Scorp. militum.

Quibus accedat victus ratio, attenuans quidem, sed non tenuis, habita ratione, & morbi diuturni, & virium, ætatisque Pat. cui integram valetudinem precor. *Idem ibidem.*

### *Cordis Palpitatio.*

Distensionem & subsidientiam p. n. in corde, Puerum hunc per intervalla assilentem, vera quin sit cordis palpitatio, haud dubitamus. Et licet motus quoque tremulus, palpitationi similis cordi competat; ille tamen à vera palpitatio excluditur, utpote à paucis tenuique spiritu proveniens, vel ab aqua in pericardio, quæ nunquam à Gal. legitime palpitationis causa admittitur, quidquid dicant Paul. & Actuarius. De Pueri itaque hoc verba facuri credimus, non per Idiopathiam, sed per sympathiam à ventriculo, & forsan etiam à liene palpitatio fieri; dum ex quotidianis repletionibus vapor crassus, turbidus & stultentus à cruditatibus, per arterias ad cor elevatur, partes concavas ejusdem replet, difficulterque diffilatur, & resolvitur; unde palpitatio, quæ non ita citò fieret & evanesceret, producta à quolibet succo, nec fieri posset à paucis & tenui statu; quia facile per corpus translucet. A crasso itaque, & multo statu excitatur; unde calefacientia, & spiritus attenuantia palpitationes tollunt, quia cujusvis ortus ex frigido est.

Affectus autem hujusmodi quanto celerior, tanto tutior erit curatio, antequam scilicet cor imbecillius reddatur, metu ne essentialis evadat, aut sanatus, declinante ætate, denuo invadat; tunc enim omnes intra 40. & 50. annum pereunt, aut acuta febre, aut syncope extincti, vel ad summum Antipatri annos attingunt.

Certè itaque sanabitur, si congrua præscripta & servata victus ratione, materia in partibus naturalibus hærens evacuetur. Ventriculi intemperies frigida alteretur, status discutiantur, & revellantur; tandemque cor roboretur.

Adolescentes autem & adultos, sanguinis detractione non solum se præservasse, sed & liberasse gloriatus est Gal. quoniam evacuato sanguine pituitoso & melancholico, minera veluti stultentæ materiæ, cor præservari, ac promptius ventilari contingebat.

Dubium verò, an ob ætatem, habitus gracilitatem, & forsan etiam raritatem, liceat ad generosum adeò auxilium accedere. Quo casu nos tutius præcedentes, venas fedales aperi-

das censemus, & sanguinem ad semilibram extrahendum, cum potissimum timeat lien; idque solum peracta prima præparatione & expurgatione. Si vero contumax, quod non speramus, persistit affectus, Cauterium coxæ sinistræ murandum foret. Inaccessionibus cucurbitulas laudamus, cum Avic. coxis, in o. & visceribus naturalibus, potissimum lieni applicitas, prout non placent dorso, ut Rhali, nec regioni Cordis, ut Gal. & Zacuto, nisi in essentiali sola. Conferunt quoque ligaturæ, lotiones calida, clysteres, & hujusmodi alia.

Evacuabunt lenit. cum hiera, vel mel. ros. sol. cum manna, & decoct. sem. citri. Præparabunt syrup. de cortic. citri, Julap. acet. vel oxymel. cum aqua cinnam. absque diluto. Purgabunt verò hiera cum diacath. vel inf. Agar. Rhab. & sennæ, cum melle ros. sol. Repetatur postea præparatio visceri obstructo accommodata, ut & purgatio. Solent præterea conferre pil. mastich. alephang. & aggreg. Et quia Puer est, facile usurpari poterit extractum sennæ, polyp. mastich. correct. Purgatione peracta, si inierit obsequens Puer, aqua Tettuciana, quatuor aut quinque vicibus, alternis diebus exhibita, ex usu erit, cum vehiculo mannæ. Omnino autem assumat per n. censum jus columbæ alteratum china, cassia, ligno tamarisci, melissa, & fl. citri.

Dum hæc omnia sunt, discutientia status semper proderunt, ut confectioes ex tro. h. de gallia mosch. ol. anisor. vel citri, vel cinnam. Sic Diambra, Diamoschum, cochlear. aq. cinnam. vel aq. vitæ juniper. Et tandem roborando cordi placet Matth. quinta essentia rorisinarini, aut cinnamomi. Serapio vero & Avic. usum mellissophylli ad sidera extollunt. Paracelsus gutt. j. extract. croci, cum cochleari aquæ vitæ; vel ol. succini ad gutt. ij. in aqua flor. citri. Nos verò sæpè usi sumus semicyathio aquæ mellissophylli, vel borrag. in qua crocus fuerit maceratus, mane frequenter sumpto; & extrinsecus illinimus regionem cordis balsamo, aut ol. de scorp. Matth. Quæ omnia frustra administrantur, nisi congruè imitantur victus rationi, ex præscripto Excell. Adstantis. Quibus ut Deus adsit, & faveat, enixè precamur. *Idem ibidem.*

### *Cordis Palpitatio, cum Melancholia.*

Virginem Nobilissimam, 18. annorum ab Excellent. Viro descriptam, jamdiu, imò ab ineunte ætate melancholicam fuisse, mæores tandem cum lacrymis confirmarunt. Hujusmodi vero melancholiam, sicut in hypochondriis delitescere non ambigo, ob frequentes vomitus aquosæ & viscidæ pituitæ, cum levamine à vomitu, & forsan cum copiosis rugitibus, ita progressu temporis mineram quoque in toto & utero coacervasse credendum; prout ex fusco colore, & mensium imminutione secuta facile conjicere est. Cordis autem palpitatio eandem itidem jamdiu fatigans, an motus sit completus ex distensione & subsidientia, an potius tremor, ac sola trepidatio cordis, valde dubito; vera namque palpitatio non adeò torsan carnosam Nobilem hanc Virginem hucusque afflixisset. Melancholicam vero passionem ex obstructionibus hypochondriorum ortum duxisse certò



existimandum, & potissimum in sinistri, quod cum plurimis constet arteriis, ad crassi & melancholici sanguinis attenuationem perficiendam, per easdem quoque facilem aditum tumidi, crassi & melancholici vaporis ad cor colligere possumus, qui exitum tentans, nec adeo facile inveniens, cordis veram, aut spuriam palpitationem inducit; non enim ab ullo humore, aut tenui spiritu fieri unquam potest, ut considerat Gal. A fumis autem & halitibus ejusdem crassæ materiz capitis dolorem fere continuum, sicut à sanguinis crassitie mensium diminutionem pendere nulli dubium, prout febres à crudis humoribus, in cavis viscerum aliqua bilis portione mittis, putrescentibus fuisse excitatas.

Sunt equidem affectus non adeo facilis sanationis, cum altas, imò naturales radices fixas habeant, nec mensuris erumpentibus cessent; attamen salus non desperanda, tum quia imminutas purgationes modo medicamentorum ope speramus processuras, cum sanguis ille resiliens in cor, fatuum illud reddens, melancholias augere soleat, ac proinde cordis & capitis affectus; tum quia non exiguam, ex Hippocrate spem nobis facit futurum connubium, atque concubitus.

Medici interim munus fuerit, melancholicam mineram, tum in hypochondrio potissimum sinistro, tum in toto hærentem exhaustire, mensuris vias patefacere, in accessionibus status discutere, & Cor roborare.

Tempore itaque medio inter menstruas purgationes, sanguis à mediana sinistri brachii educendus; mox sub finem consueta purgationis (si imminuta fuerit) saphena aperienda; non enim alio tempore & adolescentes, & adultas missio sanguinis semper juvit, Gal. observatione, qui hæc sola multas quinetiam præservatas facit. Frequentes adhibeantur pedum lotiones, simplici aqua calente. Fonticulus coræ sinistra inuratur, oculo, qui in dextera est.

Præter jam administrata, insistendum primò aperiensibus & contemperantibus, quibus tamen libenter præmitterem aquam lettuce, cum vehiculo de more sumptam; mox probatur usus succi cichorii depurati ad ʒiv. in decoctione cichoraceorum, additis cyclamine, tamarisco, agrimonia, capil. Vener. recen. aut artemisia; cui si addatur etiam fumariz succus depuratus, efficacior foret ad massam sanguinis depurandam, & lienem deobstruendum. Præsentis usus etiam fuerit ʒj. Rhabarb. maturi, infusa in prædicto jure alterato, alternis diebus exhibenda, ita ut xv. aut xx. dies alternatim, succi, & rhabarbarum infusum assumantur.

In accessione etiam palpitacionis, & extra eandem quoque, ob affectum melancholicum, domi præsto sint aliqua suaviora cardizca discutientia, ut aqua cinnamomi, vel aqua totius citri, cum guttulis olei de citro, aut caryophyllorum, vel cum portiuncula aquæ theriacalis: aqua item scorzonera, cum elixir vitæ. Juvat à proprietate aqua succini, cum Marcello. Sicut extrinsecus ex Andernaco plurimum pollet camphora supra cordis regionem continuo gestata. Vinum ligno viridi rosmarini, & recentibus foliis melissæ medicatum, utile fuerit ad mensam.

His omnibus congrua victus ratio addatur,

ut optata salute potiatur, quam mihi a D. O. M. precibus efflagitamus. *Idem ibidem.*

### Syncopæ.

Illustriss. Vir 35. annum agens, temperamentis totius & jecoris, calidi & humidi, plethorici habitus, liberalius vivens, & copiosiori vini potui potissimum indulgens, ventriculū à naturæ primordiis exquisito adeo sensu præditum sortitus fuit, ut à teneris annis, dum edulis vel acrioribus, vel calidioribus uteretur, in ejusdem dolorem incideret, & quidem frequentius usque ad exolutionem, animi deliquium, nonnunquam etiam ad Syncopen usque; quod tamen adhucnum accidit ex acerbis & valde calidis assumptis. Cum autem multis jam annis frequentiarum hæmorrhagiæ assuetus fuisset non inne luculento juvamine, eadem hoc anno omnino suppressa, paucis abhinc mensibus, citra ullam quinetiam causam externam, derepentè exolutus est, cum Asphyxia, extremarum partium refrigeratione, & sudoribus frigidis, crassis & oleagineis. Facies initio quidem rubet, venæque oculorum sanguine turgent, cum aliqua spirandi difficultate, mox tamen pallefcit, plumbeumque colorem induit, cum præcipiti virium omnium lapsu. Restitutus vero, auxilium facultatem excitantibus ab Assidentibus administratis, de virium oppressione, cum quadam spiritus suffocatione conqueritur, adeo ut ægrè incedere, minusque acclivia loca conscendere possit. Quare Medici familiares acciti, nos quoque quid factò opus consulunt.

Affectus, quo corripitur Nobiliss. iste Vir, Syncopæ, propriè dicendus est, cum præceps fiat virium omnium lapsus; cujus nullum hic desideratur signum, cum non sensus solum & motus perturbentur, ut in Exolutione, nec aboleantur solum, ut in animi Deliquio; sed statim concidant totius corporis vires, tum Animales tum Vitales, cum asphyxia & abolitione pulsus, insigniter læso corde, & extremarum partium perfrigeratione, atque pallido, imò plumbeo corporis colore, recurrentibus spiritibus cum sanguine ad interiora, & manantibus sudoribus frigidis, crassis atque oleaginosi, Syncopticiis dictis ex propria subitanea partium humiditate resoluta provenientiibus, ad differentiam sudoris Diaphoretici, qui à colliquatione humorum procedit. Atque idem prorsus affectus ab ineunte ætate Pat. post acria assumpta invasit, licet à diversis causis; quamvis enim Cor semper in Syncopæ lædi necesse sit, quod non accidit in exolutione, & animi deliquio, quibus pulsus nihil inmutatur, à qualibet offensa prorsus immunis; attamen lædi potest, vel essentialiter, vel per consensum, & quidem, præsentis casu, per consensum lædi, & jam læsum fuisse censemus olim à ventriculo. Nulla enim pars nostri corporis adeo exquisitum sensum habet, nec adeo facile in consensum trahit utrumque principium, nimirum Cor & Cerebrum, ac os Ventriculi; præsertim verò in hoc Pat. qui ejusdem exquisitissimo sensu à natura donatus est, unde facile quoque ab acrium & calidorum usu dolore, animi deliquio & Syncopæ eundem affici contigit. In præsens autem consensum à toto venoso genere suscipere credimus, à sanguine



guine nimirum multo & crasso, venarum & arteriarum interceptionis atque occlusionis causa; de qua Gal. cum Hipp. *Quod autem quis repente obintuscat, id venarum interceptiones occlusionesque faciunt; oriuntur siquidem Epilepsie, Apoplexia, Syncopes Cardiaca, Aphonia ex Asphyxia. Cum enim spiritus jam in corde genui per corpus diffundi non possint, simul in corde cum facultate vitali suffocentur; ipsos nimirum intercipientem copioso & crasso sanguine in corde, non adeo expedite suum motum circularem ibi peragente. Neque hæc signis confirmari opus est, plethoricum enim, plurimoque sanguine redundat totum corpus, cujus causa rubet faciei color, & turgidæ oculorum venæ apparent, necnon oppræssa, & sæpe suffocata natura, etiam extra accessione vires imbecilles observantur.*

Copiosum autem sanguinis proventum semper fovit vitæ liberalis ratio, & potus copiosioris usus; sicut, & multo magis, suppressa multis abhinc mensibus frequens & copiosa consuetudine hæmorrhagia, quæ hucusque Pat. liliulri. a Syncope aliisve affectibus vindicavit.

Syncope autem est acutissimus morbus; cum sit mortis imago, quinimo morti quam proximus; unde, *Qui frequenter, atque fortiter, absque causa manifesta exolvuntur, de repente moriuntur.* Attamen quoniam tunc loquitur Hippocr. de Syncope essentiali, ideo dictorum reddens rationem Gal. dixit, *Quia adest virtus vitalis imbecillitas.* De qua & Paulus quoque hæc habet, *Cor primaria affectione affectum medicorum auxilium non admittit;* citius enim mortem inducit, ideo non adeo desperanda salus, si protinus Pat. Illustri propria medica auxilia præsto fuerint. Hinc Aretæus sedulo agendum esse consulebat, natura enim resoluta instaurabilis est; & mortis periculum in unaquaque accessione imminet.

Quare præservationi statim incumbendum, causis occurrendo, quarum sicut immediata semper est spirituum defectus; ita mediata possunt esse defectus productionis, dissolutio, corruptio, vel suffocatio; quam positemam, tanquam magis urgentem, primo expugnandam suscipimus, dissolutione postmodum ob exquisitum sensum ventriculi, a nobis præcavenda & inhibenda.

Et quoniam suffocatio à copioso sanguine crasso, venas replente & naturam ipsam opprimente procedit; ideo statim, injecto clystere, sanguis est ex jecoraria vel mediana copiose educendus, quod & ipsa vigente Syncope præcipit Hipp. ipse. Neque unica missio sat fuerit, sequenti die propterea repetenda. *Habitu enim cum ad extremum bonitatis devenierint, statim solvere expedit.* Quinimo singulo mense repetenda hæc fuerit, ut suppressam hæmorrhagiam suppleamus, & eadem opera Cardiacas affectiones arceamus.

Et quia Hipp. cum Gal. Sanguis crassi ratione habitus, calida fomenta adlubuit ad eundem fundendum atque liquandum; ideo aliqua interna eiusdem facultatis & à nobis exhibenda. Præbeatur itaque, post sanguinis educationem, multa acetosa quodcumque summo mane, vel per aliquot dies ad mensam; mane vero exhibeatur oxymel. aqua hordei dissolutum, & quolibet quarto aut quinto die Crem. Tart. uncia in jure

Cort. Cit. alterato præbeatur; quibus ab accessione præservari poterit Illust. Pat. & quidem facilius, si Cordi quoque aliquam corroboracionem addamus, quibusdam suavioribus, cuiusmodi sunt Aqua Buglossi ad cyathum, mane sumpta, & Julapium ita paratum.

℞. Vini albi dulcis lb j. Aq. Ros. ℥ iij. Cinnam. contusi ℥ ij. Myrob. Citri ℥ j. m. includantur luteo, & bulliant, additis sacch. tin. ℥ iv. ad Julap. consistentiam, cujus duo cochlearia mane & sero assumentia.

Ventriculo quoque opitulandum, nimium sensum ejusdem obtundendo, & eundem roborando. Primum præstabunt remedia calorem nativum minimè labefactantia, & potissimum, cum præservatio in manu Pat. posita sit, ab acerbis & valde calidis abstinendo. Sufficiat igitur nonnunquam potus, summo mane Aquæ Lactucæ, vel Juris Lactucæ alterati, in quo duæ, aut tres Diacodii Rotulæ fuerint dissolutæ; sub ingressum vero lecti Lactuca condita abunde proderit; sicut quandoque e dein roborando Conserva Rosar. cum Diarrhod. Abbatis, in confectionibus prima mensa hausto cyatho Aq. trigidæ. Quæ pro præservacione, satis.

Quod si jam dictis frustra adhibitis, recrudescat accessio, spiritus fovendi; virtus excitanda; & spiritus suffocati foras revocandi.

Prima intentio citissimam instauracionem requirit; quia præceptum est virium casus. Inter alimenta autem celerrime nutrientia est vinum odoriferum; unde Aretæus in solo vino, refrigeratis spem vitæ positam asserbat. Præbeatur itaque Aqua frigida dilutum; spiritus enim resolvi prohibet, cogit humores, & eorum dissolutionem arceat, roboratque ventriculum, cum meracum vires imbecilles feriat. Vino autem succedat aqua carum Cinnam. aromatizata, jus pulli instaurans, & hujusmodi. Verum quoniam & odoribus spiritus resocillantur; ideo naribus odorata admoventia, ut Aq. Ros. cum Cort. Cit. Aqua flor. Citri, Acet. cum Caryoph. Aqua Cinnam. Moschus Ambra, & similia, quibus facies ubertim irroranda & tempora illinenda.

Secundò Facultas Vitalis & Animalis excitanda; sanguinem & spiritus ad partes externas attrahendo; quod præstari poterit cucurbitulis, extremis partibus apposis siccis, & repetitis frictionibus asperis, totius corporis concussionibus, acclamationibus, vociferationibus, pilorum evulsionibus, & picationibus infernarum partium.

Tertiò quia à suffocatione Syncope dependet, spiritus foras, revocandi, idem mox propositis remediis, additis aliis internis & externis. Inter interna Aquæ Theriac. Aq. tot. Cit. mixtæ cochlearia infundantur. Sic Aqua Cord. prima præclariss. Saxoniz. Oleum Cinnam. ad gutt. ij. in Aq. Melissa; vel Quinta essentia Rorismar. Extrinsecus cucurbitulæ siccæ. Frictiones extremorum, Madesactiones Vino malvatico, vel Spir. Vini caryophyllati. Cordis inunctiones, Oleo de Scorp. Matth. cum Trochiscis de Gallia Mosch. succo Cit. dissolutis.

Animadvertendum tamen, quod quando Syncope ab offensa ventriculi procedit, non conveniunt spiritus evocantia, sed eosdem potius ad Cor propellentia, ut aspersio Aquæ tri-



gidæ in faciem, vel Rosacea, vel etiam vini albi austeri.

Quibus aliqua circa victus rationem porissima addenda. Caveat igitur ab usu, & potu acrium & calidorum. Secundo computationes fugiat, & parcius in mensa bibat. Tertio alimentis plurimum sanguinem gignentibus, & valde nutrientibus raro vescatur. Præterea corpus exerceat, imò fatiget. Vigiliæ potius quam diuturno somno indulgeat. Sanguinem, ut dictum est, frequenter sibi detrahi permittat. A negotiis nec nimis absteineat, nec nimis incumbat. Quæ omnia Sapientissimæ directioni Excell. Virorum libenter committimus. *Idem ibidem.*

*Pulsus intermittens.*

Quinquagenarius Vir, temperamenti totius calidi & sicci, gracilis habitus, frigidis potibus affluens, & cibis pariter frigidis, humidis ac lenti sacci usus, cum post febrem diurnam biliosam spuriam, omnino liberæ vivendi rationi se tradidisset, quindecim abhinc diebus pulsus intermissionem passus est, & quidem unius pulsationis, modo post quinque, modo post septem; quæ superioribus hisce diebus adaucta est; siquidem & in unica pulsatione aliqua inæqualitas observatur, licet pulsus magnus, satisque validus, & vehemens sit. Nulla adeo spirandi difficultas, nullus stertor, nec fluctuationes aut borborygmi in abdomine percipiuntur, sed solum in pectore inæquales quædam pulsationes, cum obscuro spiritus defectu, & brevi lipothymia. Et licet affectus hic ipsius vitæ in præsens incommodare non videatur; ejus tamen causam sciscitatur à nobis Pat. opem, si opus fuerit, imploraturus.

Affectus, qui Virum Patientem detinet, est pulsus inæqualitas, cum intermissione, quæ non solum systematica est, sive composita, quod scilicet acervatim, & post multas pulsationes observetur; verum & in una eademque pulsatione percipitur. Symptoma in actione pulsifica, sive Vitali imminutè læsa, dependens non ab imbecilli & dissoluta Facultate; quoniam pulsus magni & vehementes sunt, sed a morbo in via; cum proxima & immediata causa sit angustia lævium arteriarum, vel ab inflammatione, vel à viscido & lento humore, vel à tuberculi præsentia. In casu autem nostro, ab inflammatione fieri non potest, quia omnino febre vacat; non à frigidis & lentis humoribus; quia non ordinata, nec semper eadem foret pulsus intermissio; prout non semper eadem perdurat pituitosorum humorum copia atque qualitas; cum pulsus magnus, validus satis, atque vehemens vigeat. Hæc quoque hypochondriacos læves arterias comprimentes excludimus, ut melancholicis hypochondriacis nonnunquam evenire solet; quoniam in hoc Patientē hæc in abdomine, & murmura, nec antea, nec in præsentiarum observata sunt. Quare reliquum est, ut tuberculum causam angustię necessario constituamus, à sanguine crudo atque glutinoso succo referto, ob pravam vivendi rationem, & à caliditate totius & jecoris incrassato, obdurato, & a gelido potu concreto; quod quia in dies semper majus incrementum suscipit; ideo & major evasit inæqualitas. Nulla

autem adeo respirationis læsio, nullusque stertor; quoniam cum per asperam arteriam potissimum, & ejus ramos fiat respiratio, arteria autem venola nunquam sit vacua, sed sanguine repleta, respiracionem impedire non potest, nisi adeo obstructa fuerit, ut compressione, asperæ arteriæ affectum impertiatur. Sic Antipatro Medico, nonnisi sex mensibus elapsis levis quædam spirandi difficultas suborta est, quia paulatim adaucta, & decimoquinto die difficillima reddita resolutus statim obiit, quia tuberculum, in amplam molem elevatum, asperam quoque arteriam comprimere potuit, tantamque angustiam inferre, ut aëri intercluso aditu, eundem suffocaverit.

Inter pulsus inæqualitates intermissio est omnium periculosissima, quæ sit cum distensionem interpellat quies; ut propterea pulsus abolitus tunc sit, admittit Veterini, aut Apoplexiæ cujusdam; quod enim cerebro, idem propemodum & cordi contingit; atque, sicut *Solvere Apoplexiæ sortem impossibile; debilem vero non facile*; ita quietem pulsuum diurnam tollere impossibile fuerit, brevem vero non citra negotium. Diuturna autem est, quæ excedit duorum pulsuum spatium; brevis verò, quæ intra duos pulsus manet; omnium incommodissima, quæ in uno pulsu contingit, & quæ pulsus parvus, & languidus est. Quare hoc casu, cum inæqualitas quæ ab initio systematica fuit, etiam in uno ictu tandem apparere experit, gravis est affectus, in dies quinetiam semper ingravescens. Nec obstat, quod scribit Gal. *Juvenes magis, minus pueros, minime senes in periculum adduci*; cum in hoc Viro tuberculum causa censeatur, difficillime superandum, imò ut plurimum insanabile. Intereunt autem suffocati, aut suppuratione, aut citra eandem, & citius cum tussi quam absque eadem, quia citius suppurant. Quare verendum ne patiens iste, Antipatri exemplo, pereat.

Agendum itaque omni conatu, ut totius habitus providentia, tuberculum per attenuantia & exsiccantia absumatur.

Et in Chirurgico fonte, duobus casibus convenire posse videtur sanguinis missio. Primò ad inhibendam tuberculi suppurationem. Secundo ratione causæ antecedentis, dum totum sanguine abundat; præsentī tamen casu, admitti tantummodo posset aliqua parca ex venis sedalibus evacuatio, ut quæ magnum cum pectore habeant consensum. Caustica locum non habent, cum sit remedium præservativum.

Ex Fonte Pharmaceutico desumenda remedia Lenientia, Præparantia, Purgantia, & tuberculum Exsiccantia. Leniens tale esse poterit.

℞. Spec. hieræ simpl. ʒj. Elect. lenit. ʒj. m. f. b.

Vel ℞. Syrup. ros. mell. ros. sol. an. ʒiij. Elect. lenit. ʒss. Aquæ melissæ q. s. m. f. p.

Prima præparatio erit hæc. ℞. Oxym. simpl. ʒj. Syr. de hyssop. de passio an. ʒss. Decoct. tart. urticæ, porri, iridis, brassicæ, helenii, ʒv. m. prosyrup. & sic pro aliis. Præparati humores ita purgentur.

℞. Elect. lenit. diacath. diaphæn. an. ʒiij. specierum hieræ Gal. ʒj. m. f. b.

Vel ℞. Agarich. troch. ʒss. sol. sen. recen. ʒij. Cinnam. integri ʒj. Aquæ farfar. q. s. m. f. Intus per noctem; & expressioni adde syr. ros. sol.



lol. mel. ros. lol. an. ʒij. m. f. p. & tribus post horis, præbeatur mulla bibenda ad lbj. f. & duabus horis ab ea prandeat.

Secunda præparatio sit institucunda; ʒ. Oxy-mel. squil. ʒj. Syr. de prassio, de helenio an. ʒf. Decoct. prassii, hyssopi, semi. urticæ, tabaci, Ari. ʒv. m. pro syr. & sic pro aliis. A quibus hæc præscribatur purgatio.

ʒ. Elect. lenit. ʒv. Elect. diaph. ʒij. Pilul. de hiera cum agurio. ʒj. m. f. b.

Vel ʒ. Agaric. troch. ʒf. Cinnam. integr. ʒj. Aquæ pulmon. q. s. m. f. Infus. per horas xii. deinde hac colatura, & expressioni adde syrup. ros. solut. decoct. epith. Mel. an. ʒij. m. t. p. a qua præbeatur mulla, ut supra.

Dum hæc omnia fiunt, prima mensa prandio, & cæna, sumat Patiens huiusmodi pilulam attenuantem & exsiccantem.

ʒ. Ammoniac. ʒ. flor. sulph. ʒf. m. reformetur pilula cum spir. vini.

His peractis, aliquod valde attenuans & resolvens in usum ducendum, quale esse poterit jus galli antiqui, flagellati, exenterati, vino malvatico loti, & modice saliti, ita parandum.

ʒ. Ligni guajac. cum cortice, salis elect. ʒj. Salsitras ʒf. Aquæ beronicæ, farfaræ an. lbj. m. f. Infus. per horas 24. deinde adde quartam partem jam dicti galli, rad. helenii ʒj. prassii pulegii, calament. an. p. i. m. bulliant ad consumptionem dimidii, & colatura servetur pro tribus vicibus, matutino tempore præbenda; cui præmittatur bolus huiusmodi.

ʒ. Terebinth. Cypriz lotæ in aqua farfaræ ʒij. butyri sulph. Iridis Florent. an. ʒf. m. cum oxymel. squillit. q. s. refor. bol. ij. & aur. in cuius usu persistendum ad 30. vel 40. dies, qualibet hebdomada præscribendo pilul. de hiera cum agaric. & flor. sulph.

Huic præstantissimo remedio succedit alterum, non minoris efficacis, valde attenuans atque resolvens: Aquæ nimirum Aponit. sulphureæ, primis diebus cum vehiculo dejectorio, postremis vero diuretico, per xii. dies assumenda; atque in horum usu, non omittenda lambitiva, nec suffumigia ejusdem facultatis. Lambit. sitoxym cum gutt. olei sulphur. Vel oxym. squill. si tolerari possit. Parentur pariter rotulæ Diaireos cum oleo anisorum, ore detinenda. Suffumigia verò præscribantur ex styrace, benjuino, myrrha, thure.

A proprietate verò juvare dicuntur Troch. de Vipera ad omnes occultos abscessus, cum aqua scabiosa, & potissimum ad tuberculum. Sic & aqua ex succo bryoniz parata, cum spir. vitrioli. vel ol. sulph. ad cochlearia.

Victus rationem quod spectat. Aeris mutatio convenientissima, maxime ad siccum, & ad sulphureos halitus inspirandos. Cibus pariter sit exsiccans, & potus parvus Vini tenuis substantiæ, salsitras alterati. Somnus sit moderatus; vigiliæ namque exsiccant & digerunt, unde vigilia vorax. Corpus exerceatur, & frequenter assumat pilul. de agaric. cum Iride & sulphure; atque alacri & constanti animo degat. *Idem ibidem.*

*Pulsus interceptio cum difficultate spirandi in Hypochondriaco.*

Vir Præstantissime. Patiens Reverendissimus

anno rumi sexaginta septem, stature mediocris corporis habitus plethorici, valde carnosus, potius obesi, temperamenti cum totius, tum jecoris calidioris, excrementis capitis, sudori copioso obnoxius atque expurgationi per nares humida materis, quæ hoc anno valde immunita sunt: pluribus pro temporum varietate agitudinibus subditus fuit, hypochondriacis nempe ac nephriticis cum arenularum ac sabuli rufi perenni excretionem, a quibus si non sanatus, saltem levatus est, aqua imprimis Terruciana pro priori affectu exhibita, ac familiari usu succi limonis. His affectionibus quibus in viridiori ætate torqueri cepit, tertia adjuncta est, videlicet febricula quæ Patientem quinquagenarium aggressa est, ex indolenti mesenterii abscessu dependens, quod disrupto copiosaque purulenta materia excreta, convalescit. Sed interim aliquot abhinc annis singula æstate de quadam coxæ crurisque dexteri stupiditate, ac genu pedisque intumescencia cum dexteri, tum sinistri lamentabatur, quæ tamen incipiente Hyeme evanescebat. Præterita æstate parum vel nihil huiusmodi fluxiones Patientem torserunt. Demum Libente Autumno, ex immodico exercitio atque insolatu incallescens, postea frigescent, in rheuma molestem incidit, ex quo copiosæ excretaiones, ut plurimum liquidiores, raro crassæ, cum manifesto sensu decurrentis fluxionis per faciei musculos & verticem capitis, quibus statim anhelitus difficultas successit ultra naturalem morem, quæ quidem in dies invalescit, sine stertore tamen, cum ambulandi impotentia, præsertim per acclivia. Quæ considerans Patiens Reverendissimus Medicum quendam consuluit, ut sibi prospiceret, ex cuius mandato potionem ex manna ac melle rosato solutivo sumpsit, inunctiones etiam & julapia, sed frustra: pannis quinimo lineis calefactis pectori applicitis morbum depellere tentavit, sed potius adauxit; quomobrem me accersivit, ut ipsi opem ferrem, in consilium quinetiam accito Præstantissimo Collega. Interim observavi Virum alioquin prudentissimum, mestum, timentem, quandoque plorantem de frequenti evaporatione conqueri, quam à dextero elevati hypochondrio ad pectus persentit, ibique expandi & musculos perstringere, quod tam diu, quam noctu contingit: vigiles ducit noctes, facile enim in somnum incidit, sed illico ab evaporationibus quas ascendere sentit ad fauces, excitatur; unde de quadam oris siccitate sæpius conqueritur. Facilius erectus spirat; super latus dexterum difficiliter decumbit: alternis noctibus magis torquetur. Quomobrem sæpius è lecto surgere cogitur: rugitus in abdomine patitur, ructus per superiora, per inferiora crepitus: palpitacionem cordis quandoque perpeffus est: non febricitat, febrientium tamen similes pulsus obtinet, celeres, frequentes, vibratos, intermittentes, inæquales, non in unica tantum pulsatione, sed systematice & quoquo pacto durissimos: non tussit: aliquando magna vi à pectore materiam educit ad instar grandinis albescens: faciem habet optime coloratam: parum vel nihil expuit: cauterium gestat in sinistro brachio satis roridum: parum mingit; urinæ sunt sabulosæ & rufæ: faeces biliosæ; sanguis ad nigrum vergit, fibro-



sus est, nec multum serosus. Talis est Patientis status.

*Responsum.* Ex accuratissima relatione à Viris Excellentissimis mihi transmissa facile deducere possum, Patrem Reverendissimum olim hypochondriacum, in præsens melancholicum quoque redditum esse, ad summum præterea eadem affectione hypochondriaca evecta, ut sat superque demonstrant copiosiores rugitus, trumpestes flatuositates, diaphragmatis compressiones, cordis palpitationes, in caput evaporationes, tumores & mæiores insoliti cum fleru. Verum non adeo facilis mihi, sicut nec Viris istis Excellentissimis evadit cognitio alterius symptomatis, difficilis nimirum respirationis ejusque causæ: etenim & ego cum istdem Sapiientissimis Viris haud facile ducor ad credendum spirandi difficultatem asthmaticam, minusque orthopnoicam esse, ab angustia asperæ arteriæ provenientem, cum de itertore qui in bronchiis excitari solet, nulla mentio fiat: præterea cum ipsa viscida & lenta per tussim non externantur, sed tantum aliquando crassa ad similitudinem grandinis, nec tamen copiosa. Et quamvis ab initio intumescentiæ n. viscerum, faciei, & inde in pectus destillationes observatæ fuerint, quæ tunc temporis aliquam quoque spirandi difficultatem excitare potuerint, hæc tamen cessasse credendum, dum quoque cessarunt catarrhalis ejusdem materiæ præsentis indicia: quare difficilem spiritum potius, quam respirationem, ad differentiam Orthopnoæ & Asthmatis, intelligentiæ & Curationis gratia, licebit nobis cum Hippocr. affectionem hanc appellare, cujus causa non in asperis, sed in levibus arteriis repouenda erit; hujus autem sufficientissimum indicium esse potest pulsus non in una tantum pulsatione, sed systematice quoque inæqualis, ut observabatur à Galeno in Antipatro Medico, cui spiritus quidem offende-batur, sed non in sub finem vitæ suæ & prope interitum levis quædam oborta fuit difficilis respiratione, ut ait Galenus, & obiit. Sed adhuc in dubium revocatur causa hujus angustię in levibus arteriis: etenim sicut & ego tuberculum ab hoc casu excludo, ut quod paulatim fiat & augeatur, ita facilius crassos atque pituitosos humores admitto, de quibus certiores essemus, nisi adesset hypochondriaca & flatuosa affectio, & ad summum redacta, quæ læves arteriis & obstruendo & comprimendo, frequentissime inæqualitatem hujusmodi in pulsibus, in corde palpitacionem & in spiritu difficultatem oppressioni non absimilem excitare consuevit, adeo ut plurimos pulsus inæqualitate ex flatuosa materia laborantes, paucissimos vero ex viscida & crassa materia obstruente, & nullum forsan ex tuberculo in praxi observaverim. In hoc autem Reverendissimo P. summa cum ratione de materiæ præsentia dubitatum fuit, cum fere toto suæ vitæ cursu totum corpus excrementosum habuerit, partes principales intemperatæ observatæ fuerint, & modo eidem senescenti consuetæ per varias partes excrementorum evacuationes suppressæ, quæ omnia non minorem hydropsis pulmonum suspicionem asserre valent.

In quo rerum statu periculi pleno, ut Reverendissimo P. quantum fieri potest, succurramus,

primò hypochondriacæ affectioni, utpote origine & cognitione priori incumbendum, deobstruendo, & fervorem jecoris & hypochondriorum contemperando, statusque caute discutendo, postea observandum, si Curatio profecerit, quo casu in eadem erit insistendum, sin minus; ad efficaciora & ultetiora tum attenuantia & incidentia, tum purgantia medicamenta audacius & tutius deveniendum erit; imò tandem ad exiccantia & resolventia; interim nunquam omitrendo expectorantia, a pectore destillationem divertentia, & Cardiaca spiritus roborantia ac reficientia,

Cum autem sat fuerint viæ primæ expeditæ, aliaque medicamenta exhibita, ad majora deobstruentia & viscera totumque venosum genus expurgantia deveniri posse nobis videtur, prius tamen inuratur Cauterium alterum coræ dextere ad revulsionem vaporum superiores partes petentium, & ad diversionem catarrhalis materiæ a capite in pectus delabentis. Aperiens autem validum & evacuans esse poterit Syrupus Fernel. nostra descriptione cum rhab. paratus, qui xii. aut xv. vicibus alternis diebus erit exhibendus ad ʒij. in jure malua & endiu. alterato: intermedus vero diebus præberi poterit cyathus aq. stillat. de succo cicno. & agrim. cum gutt. xv. ut xx. spiritus tartari ter rectif. qui cum in se sal volatile contineat, est Aperiens validissimum, & si fortasse hypochondriorum ætus ægre toleret syrupi Ferneliani usum, præberi poterit in sero capr. destill. to., aut in aq. de succo cichorii: quinimò in hujusmodi casu post horam ab assumpto syrupo, seri quoque aut aquæ hordeaceæ libram superbibendam permitto, & tribus horis ab assumpto sero prandum.

Absoluto syrupi usu, sicut suspectam habeo aquam Tetticianam, ita libentius tribus aut quatuor diebus serum copiosum propinari posse credo, nimirum ad lib. 4. vel 5. singulo mane cum vehiculo syrup. ros. solut. aut portioneis manna clarificat: mox lac live Emulsio arte parabitur, nimirum ex ʒj. semini melon. mundat. & semiunc. semina cucurb. & anguræ xii. aut xv. amygdalis dulcibus additis, cum sacchari albi cochleari, quæ Emulsio extrahi poterit jure tenuimalua alterato, vel aqua malua stillatitia. Interim inter status discutientia validissimum & suavissimum est oleum cinnam. si haberi possit legitime paratum, ex ipso rotulas efformando cum saccharo aqua cinnam. dissoluta: guttulæ quoque ejusdem aquæ cinnam. adduntur, ut cochlearia per intervalla assumantur: status enim egregie discutit, & ventriculo qui magnopere aromatizatione gaudet, ut dicebat Avicennas, est valde amicum. Est quoque discutiens simulque coræ de oleum de corticibus citri eodem modo præscribendum: sicut haustus aquarum cordialium cum Julapiis perlatis, aut etiam gemmatis. Inter Expectorantia in his casibus oleum sacchari commendamus ut expertum, ad attenuandam materiam viscidam & lentam in penitioribus partibus stabulantem, necnon ad flatuositates discutientias, cui, si placeat, aliquod Julapium commisceri poterit. Proderit quoque pectori illinitio externa ex adipe anserino, pulvere irisidis Florentinæ, & oleo lil. alb. reformato.



Jam dictis autem pro voto non succedentibus, siue satis non pronicientibus, parata jam erunt hypochondria ad Decoctum a Viris excellent. præscriptum, ex salsa nimirum & aliqua ligni sassafras drachma in aquis stillat. leviter ferendum & tolerandum, præmissa ipsi decocto terebinthina nostra aqua capillorum Ven. aut fariarum lota: imò & in ipso decocto gr. butyri sulphuris dissolvi poterunt. Conferre quoque posse credo aquam ipagiricam sibi atam, cujus descriptio & exhibendi modus Viris Excellent. notissimus erit. Interea majora lumina quotidie magis relucebunt: etenim si hydrops pulmonum, quam Deus amoveat, manifestaretur, de aquis sulphureis opportuno tempore per os exhibendis cogitandum erit. Hæc sunt quæ potui, solidis fundamentis ab Excellent. Viris adductis innixus, prudentissimæ eorundem considerationi proponere, quibus una cum congrua victus ratione omnia melius dirigenda libenter remitto. *Joh. Raym. Foris Consult. & resp. Medic. Cent. 2.*

*Pulsus inæqualis & intermittens.*

Eminentissimus atque Reverendiss. S. R. E. Cardinalis quinquagesimum octavum annum agens, temperamenti totius, & maxime jecoris calidi & licci, mediocris habitus, ad operationes promptissimus, negotiis gravissimis implicitus, & ad animi alterationes valde pronus, propria prudentia tamen cohibitas, septem abhinc annis conqueri cœpit de cordis affectu cum pulsu vitiato, ut intra diceretur, postquam multo antea pluries repetita salsa decocta assumpserit à Medicis præscripta, facile, ut supponi debet, ad tollend. s viscerum naturalium obstructions: quibus tamen persistentibus, accesserunt cordis & pulsus affectus hunc in modum; Primò namque cordis saltus siue illegitimam palpitationem summo mane, dum in sinistram partem decumbens, percipere cœpit, cum pulsus tanta vehementia, ut ipsi visui pulsationes manifesta apparerent, & tactui vibratio atque insignis durities, cum alicujus pulsationis intermittencia, præsertim summo mane; quibus add. batur lingue & oris fere fuliginosa tædit. s. Quæ omnia mensum progressu adeo adaugeta sunt, ut undequaque pulsu inæquali & intermittente reddito, nuni deliquia successerint, tuncque seri caprini repetito usu curatus fuit, sed non sanatus: siquidem summo mane sæpe corripitur solebat, non quidem animi deliquis, sed pulsus intermittens, quæ ante prandium quoque per horas revertebantur, & interdum tanto cum impetu atque vehementia, ut cor ipsum deorsum trahi, & veluti funiculo quodam ad aurem usque sese extendente, aurem quoque secum ducere & deorsum trahere videretur. Intermittentias autem Eminentissimus ipse percipiebat in corde, absque eo quod sibi metipsum pulsus tangeret, quinimò quandoque veluti aquæ guttulas super cor ipsum cadere sentiebat, tuncque pulsationes non mittebant, sed multiplicabantur. His verò omnibus accesserunt quoque vigilæ: somni namque non adeo diuturni & quieti ut antea erant, præsertim dum summo mane accessio vehementior futura erat, quæ intensius invadebat,

si forte in somno quandoque pollutio contigerat, magisque molestare solebat etiam post prandium paulo uberius sumptum, & præsertim ciborum aut potuum calidiorum. Exacerbari quoque fuit observatus affectus post usum diuturnum Emulsionis hordeaceæ: iterum post usum rhabbarbari, & magis magisque post chalybem potabilem multis diebus assumptum, qui febrem quoque accendere potuit. Tandem spirandi difficultas, præsertim in motu accessit, quæ difficilem etiam decubitus ipsi reddebat in latus sinistrum, accedente exigua catarrhalis atque viscidæ materiæ portione, quæ difficilis creatu excernebatur: usu vero oiei amygdalini & julapii terebinthinati facilius respiratio reddita fuit. Ab usu seri nonnihil levatus fuit: sed multo magis à mora per duos menses in fluvio currenti, pectore adversus impetum aquæ quotidie per horam exposito: namque pulsus intermittencia prorsus cessaverat, & vibratio atque durities valde remiserat; sed relicta Balneo, rursus affectio paulatim in pristinum reveria est. Verum tamen est quod ommissa cœna, & prisana hordeacea tantummodo vespere epota, spatio unius anni cum dimidio affectus ipse valde remissus est observatus. Cum autem Vere præsentem Eminentissimus P. Patavium se contulerit, ut curaretur, pulsus vibrantem, durum, raro intermittentem, frequentius intercurrentem observavi, naturaliaque viscera tactu explorans, obstructions in jecoris gibba parte, majores in mesenterio, & evidentiores atque duriores in pancreate inveni, cum arteriarum magnæ insigni pulsatione. Quare pro ejusdem affectus remissione sequentem Consultationem exarare & executioni mandare decrevi.

Quamvis pulsifica facultas sit cordis propria operatio, quæ læsa, cordis etiam læsionem ostendit, nihilominus cum alia quoque instrumenta cordi inserviant, ut eadem pulsifica facultas ad univerſum corpus deferatur, genus videlicet arteriosum; idcirco sæpiissime contingit ut vitium tactu in ipso pulsu deprehendatur, sine ulla essentiali cordis læsione, ut Antipatro primis mensibus contigit. At si vitiata pulsificæ facultati palpitatio quoque, aut saltus cordis excedat, id citra ipsius cordis læsionem fieri nequit, cum affectus hujusmodi sit propria cordis passio: ut propterea ceniendum sit in Eminentiss. Cardinali, cum non sola vitiata observata fuerit & observetur pulsifica facultas cum cordis illegitimo & depravato motu, non modo tactui, sed visui quoque manifesto, non tantum arterias læves, sed & cor ipsum quodammodo laborare. Verum tamen est quod nec arteriæ neque cor essentialiter afficiuntur, sed per consensum ab aliis partibus: non enim in arteriis laxibus obstructio reperitur à crassis humoribus, minusque à crudo tuberculo; non à crassis humoribus, quoniam tamdiu vivere non potuisset: crassiores enim à calore, & copiosiores exiguo tempore redditi, asperis quoque arteriis communicari, suffocationem ante annum induxissent: sicut tuberculum adhuc citius mortem intulisset, ut sex mensum spatio Antipatro contigit, de quo miratus fuit Galenus, eo quod tamdiu vitam protraxerit, & causam retulit in servatam in omnibus rectam vivendi



rationem. Sed præterea tuberculi signum inseparabile est pulsus inæqualitas & intermittentia, semper eundem ordinem atque rhythmum servans; quæ conditiones omnes absunt à casu nostro. Sed neque cor essentialiter læsum fuisse significat nobis palpitatiois raritas atque brevitatis, imo & ejusdem fere omnimoda remissio sine ullo generoso adhibito medico auxilio. Et præterea cor ipsum essentialiter læsum ex Aristotele tamdiu affectionem sustinere non potuisset sine sui ipsius evidenti imbecillitate, quæ præsentem, pulsus sunt parvi, tardi & languidi, cum tamen in Eminentia sua sint omnino magni, vehementes, veloces, validæ facultatis indicium; & ideo conclusum restat, neque cor neque arterias essentialiter sed per consensum affici, quem consensum suscipiunt ab hypochondriis obstructionibus refertis, & interperie calida affectis, quæ quidem radices sunt, à quibus hypochondriaca affectio germinare solet, in qua cum copiosi status observentur, ideo per antonomasiam affectio statuosa à Galeno nuncupata fuit; cujus signa subdens idem Galenus, ait, quod lædantur à calidis, juvantur à frigidis, ut Eminentissimo Domino contigit, dum decoctis assumptis pejus, ex mora vero adversus imperum aquæ frigida, necnon ab usu feri melius habuit. Sed præterea tactus ipse iudex esse potest, cum obstructiones sicciore atque duriores in mesenterio, jecore, & præsertim pancreate manifestissime percipiuntur, à quibus sicciore redditis, fuliginosi vapores sive potius exhalationes eleventur, & per venam cavam ad cor pervenientes, & cor ipsum distendentes palpitatioem inducebant, dum sequuta subsidentia exhalationes ipsæ exprimebantur & dissolvebantur; nil aliud enim est palpitatio quam cordis elevatio & subsidentia præter naturam, quæ rara & brevis fuit & est, quoniam cor ipsum per consensum, non essentialiter affectum fuit. Quoniam vero fuliginosi vapores ubi ad cor pervenerint, per carotidas arterias ad caput quoque eleventur, hinc fit ut spiritus agitando, noctes inquietas & somnos turbatos reddant, & ipsius affectus exacerbationem prænuncient. Pariter neque essentialiter afficiuntur arteriæ læves, sed per consensum quandoque ab iisdem fuliginosis evaporationibus, arterias ipsas, præsertim carotidas obstruentibus, ad quarum obstructionem retrocedit in cor sanguis spirituosus, tuncque non solum pulsus fit intercurrent, sed cum violentia ipsæ carotidæ nonnunquam cum aure ipsa deorsum trahi Eminentissimo Pat. visæ fuere, quod facilius apparet, cum glandulæ prope aures arteriarum ramis refertæ sint. Frequentius autem contigit pulsus inæqualitas & interceptio à compressione magnæ arteriæ facta ab obstructionibus tum in mesenterio, tum maxime in pancreate existentibus; quam compressionem vidit quoque & observavit Galenus: etenim dum spiritus una cum sanguine magnam arteriam pervadere intendit, eadem arteria magna compressa spirituosus sanguini transitum impedit, qui cum propria necessitate circulare debeat, impetum facit, & conatur sibi metipsum vias patefacere, quo conatu pulsationes ipsas vehementiores atque vibrantes reddit, dum facultas valens

ad repellenda ea quæ molestant, majores læves & vehementiores edit pulsus. Sed interim quoniam quandoque remoratur ipsi sanguini transitus, deficit quoque in pulsu diastole, & sanguis resilit in cor, ita ut intensiori reddita in corde systole, in supplementum præteritæ deficientis diastoles, etiam pulsus ipse inæqualis reddatur, cum sensu vehementioris notus in corde; & ideo inæqualitas non systematica tantum, sed in una quoque pulsatione quandoque observari videtur. Excludenda tamen non est calor intensio in ipso sanguine, quæ impetum auget & appulsu vehementiorem reddit: imo & spiritus vitales dissolvendo, lipothymias olim afferebat. Uniformitas autem semper eadem non est: alteratur enim ante cibum ab otante calore, & post cibum usque ad chyli distributionem ab adaugeta compressione; sed præterea mutatur quoque à flatuositatibus, modo præsentibus, modo absentibus, modo densioribus, modo tenuioribus, quarum causa modo facilius modo difficilius observatur decubitus in Latus sinistrum, qui semper idem esset, si fixa & stabilis esset causa ipsa.

Pulsus intermittentia multos decipit Medicos exemplo Antipatri perterritos, causas necnon pulsus conditiones non adeo rectè considerantes seu non cognoscentes: tunc enim lethalis esse solet, si vel à tuberculo, vel à crassis, copiosis & viscidis humoribus, in lævis arteriis firmatis atque stagnantibus procedat, vel si à languore facultatis vitalis pendeat. Præterea periculo non vacat, si non unica, sed plures, una post aliam pulsationes deficient. At si plures, ut in casu nostro, & fere innumerabiles pulsationes æquales intercedant inter unam & alteram intermittentiā: si præterea non ab obstructione nisi statuosa proveniant, sed à compressione: insuper si arteria spiritu repleta, pulsus vehemens atque vibrans considerentur, in Patientem hypochondriaco, curis & gravibus negotiis implicito, non erit in Arte versatus qui mortis periculum, hujus affectus ratione, non excludat: eoque magis cum inæqualitas potius, quam totalis intermissio à me hoc tempore observata fuerit: licet enim diastole sub digito deficiat, non deficit systole in corde, imo consueto intensior ab Eminentissimo observata fuit; in præsens vero remissior observatur, hæcque systematica & collectiva, multo minus periculosa: sicut periculosior fuit illa quæ contigit Argentario ex nimis studiis atque applicationibus cum virium imbecillitate, à qua tamen, omisis studiis, congrua vivendi ratione & Cardiacis adhibitis, spatio unius anni seipsum liberavit; ita & à Victore Trincavella celebri Medico olim liberatus fuit Marinus de Caballis Patritius Venetus, qui cum à Serenissima Republica ad Regem Christianissimum Legatus missus fuerit, ob intensas applicationes in affectum melancholicum incidit cum pulsus intermittentiæ & inæqualitate quæ Gallos illos Medicos decipit. Mortem enim extemporaneam eidem prænuntiaverunt, ob idque veniam petiit, & Venetias reversus, curatus & sanatus fuit. Quod idem, sed non brevi tempore Eminentissimo quoque Domino concedi posse speran-



randum. Dixi, non adeo brevi, propter antiquas & contumaces obstructions viscera naturalia obsidentes, una cum calida exuberanti intemperie naturalem calorem labefactante & humores colliquante, ideoque Cachexiam potius minantes.

In hunc igitur finem repetitæ necessariæ erunt Purgationes, primas vias expiando. Secundò Melenterii obstructions aperiendo. Tertiò Obstructions jecoris referando. Quartò Pancreas à sanguine crasso & crudo stagnante vindicando. Quintò Calidam intemperiem hypochondriorum, jecoris & sanguinis corrigendo; atque tandem aliqua Cardiacæ, temperata tamen in usum ducendo, quæ status etiam discutiendi facultatem obtineant, addita jam dictis omnibus congrua vivendi ratione.

Primæ intentioni satisfaciendum Leniente ita paratò.

℞. Floris cassiæ rec. extractæ, elect. lenit. an. ʒ β. crem. tart. ʒ ij. m. f. boli. Præparans autem quinque diebus summo mane exhibendum, sit.

℞. Julapii acet. ʒ ij. aq. florum citri ʒ j. m. pro una vice, & sic pro aliis; quod subsequatur alterum Leniens hujusmodi.

℞. Floris cassiæ rec. extr. elect. lenit. an. ʒ β. m. f. boli quibus post horam superbibat seri caprini depur. ℥ i β.

Pro secunda intentione explenda, humores præparandi potius succis depuratis, quam syrupis saccharatis, Hypochondriacis non valde amicis; & ideo.

℞. Succis depur. cich. borag. melissæ, pomorum dulc. an. ʒ j. decoct. cich. borag. endiv. lupulorum, agrim. ʒ iv. salis tart. fixi gr. x. m. pro syrupo, & sic pro quinque aliis, quibus succedat talis Purgatio.

℞. Floris cassiæ rec. extr. ʒvj. elect. de succo rosarum ʒ j. Extracti rhabarb. senæ an. ʒ β. m. f. boli, quibus superbibat seri capr. depur. ℥ ij. & tribus horis ab epoto sero prandeat. Interim prima aut secunda die Præparantium aperiatur Jecorioria dextra, & sanguis ad ʒ vii. aut viii. educatur.

Tertiæ intentioni satisfaciendum Aperientibus hepaticis.

Uc ℞. Succis depur. cich. borag. agrim. an. ʒ j. tart. vitriol. gr. x. decoct. endiv. sonchi, malv. viol. rum, lupulorum ʒ iv. m. pro syr. & sic pro aliis, in usu quorum 20. diebus insistendum; & quinto quoque die præscriptum nuper minorativum Purgans cum sero eodem modo sumendum. Sed interim primis diebus repetenda erit ex interna sinistri brachii vena sanguinismissio.

Quartæ intentioni satisfaciendum erit ita.

℞. Aq. stillat. cich. agrim. an. ʒ vii. tart. vitriol. gr. x. m. pro syrupo matutino. Sequenti vero die.

℞. Floris cassiæ rec. extr. ʒ ij. rhabarb. matur. ʒ j. m. f. boli num. 1. quibus post horam superbibat seri caprini destillati ʒ vii. In quorum usu alternatim decem diebus perseverandum; deinde ita purgandum.

℞. Floris cassiæ rec. extr. ʒ vii. pilul. de trib. cum rhabarb. ʒ j. m. f. boli, quibus post horam superbibat seri capr. depur. ℥ i. & tribus horis ab assumpto sero prandeat. Et quoniam

infusiones facilius ad penitiores viscerum partes pervadere valent; idcirco talis instituitur.

℞. Aq. stillat. cich. agrim. an. ʒ iv. succi limon. ʒ β. rhabarb. opt. nat. ʒ j. m. f. inf. per noctem, & colatura præbeatur summo mane. Die vero sequenti.

Aq. stillat. cichor. agrim. an. ʒ iv. spirit. tart. alchaliz. gut. x. m. pro potu matutino; & in horum alternato usu xv. diebus perseveret. Inde sequatur magis minorativa hujusmodi infusio.

℞. Fol. senæ Orient. rhab. el. an. ʒ j. cinnam. integri ʒ β. aq. stillat. cich. agrim. an. ʒ iv. succi limon. ʒ β. m. f. infus. per noctem, & colatura offeratur summo mane. Sequenti vero die.

℞. Succis depur. cich. borag. agrim. an. ʒ j. decoct. in jure pullæ paratæ cich. malvæ, melissæ fumar. capill. Ven. Cetrach. ʒ iv. tart. vitriol. gr. x. m. pro syr. matutino; & in horum alternato usu pergat Eminentissimus Dominus ad vigesimum usque diem. Sed interim quotidie summo mane admoveatur fomentum hujusmodi.

℞. Fol. malvarum, meliloti, graminis; absinthii an. m. j. radic. althææ, sem. fenugræci an. ʒ j. aq. fabror. ℥ vj. m. bull. ad consumptam tertiam, colaturæ vero adde succi limon. ʒ ij. & spongia madefacta, mox expressa, tepida hypochondriorum epigastricæ parti apponatur. Facta vero fomentatione & absterfione, illinatur totum abdomen hujusmodi linimento.

℞. Unguent. ros. Mel. ʒ ij. malvini, medullæ crurum vituli an. ʒ j. ol. de Ben, amygdal. dulcium an. ʒ β. ol. de absinthio gutt. x. m. quæ illinitio repetenda erit etiam vespere ante cenam, sed sine fomento. Quibus transactis diebus, Purgans erit exhibendum hujusmodi.

℞. Floris cassiæ rec. extr. ʒvj. elect. de succo rosar. ʒ j. pil. de trib. ʒ β. magist. mechoac. gr. x. m. f. b. quibus post horam superbibat jus malvæ aut hordeo alteratum, & duabus horis ab assumpto jure prandeat.

Hanc ad quintam intentionem explendam erit deveniendum, pro qua tria erunt administranda selectoria remedia, usus aquæ, Lactis, & Balnei; & primò aqua debet quidem refrigerare & humectare, non autem exicare: ut propterea minerales omnes sint excludendæ, & Noceriana eligenda, dummodo ab hepate eidem transitus admittatur; quæ tribus primis diebus cum vehiculo dejectorio syrupi ros. solut. aut potius ex man. clarificata propinanda erit: sequentibus vero xii. cum vehiculo diuretico spiritus tart. rectificati. ad ʒj. in tribus primis cyathis dividendam, addito etiam cochleari syrupi de succo limonum ad suavitatem. Incipiendum autem à ℥ vi. ascendendo paulatim usque ad x. & mox paulatim dosim minuendo. Quo tempore ab re non erit aliquod ventriculo robur addere, præbendo statim à cibo pilulam unius scrup. succi absinth. condensati, vel salis ejusdem absinthii scrupulum in exiguo vino dissoluti. Inde ad lactis asini usum erit deveniendum, ut quod ex Galen. sicciores atque duriores obstructions relictas emollire



Cordis motus violentus & irregularis qui intrinsecus à Nobil. Patiente percipitur, & extrinsecus manu quoque adnota observatur, palpitatio cordis, quæ dilatatione & subsidentiâ perficitur appellari potest, ad differentiam tremoris qui intrinsecus tantum sine violentiâ à Patiente percipi solet, sicut etiam ad differentiam saltus live jectigationis ejusdem cordis, quam perpetuam esse observavimus; quem motum depravatum comitatur quoque pulsus inæqualitas, imo interceptio. Et quamvis aliquam spirandi difficultatem secum ducere videatur jam dicta affectio, eam tamen non ab angustia asperarum, sed levium arteriarum pendere statuendum, & propterea difficilem spiritum proprius, quam respirationem nobis appellare licebit: sicut proprie difficilem respirationem non solum ad Dyspnœam, sed & ad Asthma, imo ut decubitus impediens, ad Orthopnœam pervenire censendum sit. Palpitationis causa immediata est procul dubio flatuosa materia crassa & fuliginosa, quæ cordis ventriculos replens, distentionem & dilatationem violentam, sicut cedens subsidentiâ & constrictionem excitat. Nec tenuis & hilituosa esse potest, ut considerabit Galen. quoniam a cordis calore dissiparetur, antequam ventriculos impleat & extenderet: Neque crassior esse potest, ut humorosa, quoniam non adeo mobilis esset, ut cor tam prompte extendere valeret, nec tam cito dissolveretur: & idcirco crassam, turbidam, caliginosam & flatulentam esse debere palpitationis causam, determinavit idem Galenus, Asthmaticæ vero affectionis immediata causa fuit angustia asperæ arteriæ, in ejusdem scilicet bronchiis, à materia catarrhali non in eisdem genita, sed à capite calido & humido & destillationibus obnoxio descendente, occasione præsertim evidentis erroris externi. Non autem adeo facile decerni potest, num primario, an secundario cor ipsum laboret; num scilicet cor ipsum licet manifeste afficiatur à flatuosa jam dicta materia, ejusdem origo in corde sit, an vero in aliqua alia parte generetur, sicque aliunde ad cor transmittatur. Et quamvis affectus diuturnitas & permanentia, cor ipsum materiam lædente sibi in seipso fabricare, nobis indicare videtur. nihilominus si Nobil. Patientis temperamentum & ætatem spectemus: si vitam antea ætam, curis sollicitudinibus, intensis applicationibus usque deditam consideremus, in hypochondriis fontem malitiae, obstructions scilicet cum jecoris fervida intemperie reperiri suspitionem nobis præbent, adeo ut minera hujus natuosa, turbulenta atque fuliginosa materia in visceribus naturalibus facile reperiri possit: proinde namque nimis est, quod ex intensis & diuturnis applicationibus, labefactato & alio concesso calore, iuges cruditates in ventriculo olim genitæ fuerint, quæ in mesenterio aut liene itabulantes, & à calore præsertim jecoris exiccate, terrez, & melancholicæ redditz, exhalationes emittant, quæ per vasa cor ipsum pertransientes, & ejusdem ventriculos replentes, dilatationem præter naturam excitent; sicut ab eximio calore cordis statim consumptis constrictione illico succedat ex quibus duobus moribus palpitatio componitur. Et quoniam ab

hujusmodi illegitimo motu cordis, legitimus quoque perturbatur, idcirco inæqualitas quoque in pulsibus observatur: quinimo dum aliqua crassa & vaporosa jam dictæ materiæ portio laves arterias ingreditur, ejusdem pulsus interceptiones quoque contingunt diu non perseverantes, ut in Antipatro Medico in quo laves obstruebantur arteriæ, non à flatuosa, sed ab humorosa & crassa materia.

Ex duobus jam dictis malis, urgentiori & principaliori est incumbendum, altero non neglecto: palpitatio namque cum sex abhinc annis semper frequentior evadat, verendum ne continuo tandem affligat, corde nimirum primaria affectione laborante, tuncque ante senectutem inrethit, aut febre ardente superveniente, aut syncope ingruente; ita narrat Gal. quendam qui singulo Vere palpitatione corripiebatur, sanguinis missione pluries liberatum & præservatum fuisse; verum quoniam radix ipsius affectus nunquam extirpata fuit, ideo ante senectutem interit; nec mirum, cum vitæ principium in hoc affectu lædatur. Nos autem quoniam cor secundario affectum credimus, vitæ periculum ideo abesse quoque censemus, & ab interitu Nobiliss. hunc lat. præservari posse credimus, congruis adhibitis & repetitis remediis, quæ nonnihil etiam capitis destillationi prodesse poterunt. At vera & legitima ejusdem Curatio in aliud tempus erit differenda, si rursus & frequenter ingruant asthmatici insultus.

Curatio igitur eradicativa præservativam partem respiciet, primas vias mundando; exiccatas obstructions viscerum naturalium reserando; Jecoris intemperiem calidam corrigendo; materiam flatuosam cor petentem revellendo & discutiendo, atque tandem cor ipsum roborando.

Pro prima intentione primum Leniens esse poterit sy. up. ros. solut. & de polypod. aut elect. lenit. cum tartaro. Præparans autem tale esse poterit.

℞. Julap. acet. ℥iij. aqu. flor. citri ℥j. aq. cinnamom. ℥ss. misce, pro syrup. & sic pro quinque, quos subsequatur idem leniens, ut supra.

Pro secunda intentione mellita omnia & saccharata, utpote status moventia, sunt vitanda, & succi depurati herbarum eligendi hunc in modum.

℞. Succi depur. cichor. borag. sonchi an. ℥j. salis prunellæ ℥ss. decoct. in jure pulli malv. violarum, melissæ, agrimon. pentaphylli ℥v. misc. pro syrup. & sic pro aliis. Secunda die horum succorum aperiat vena mediana brachii dexteri, educendo sanguinem ad septem uncias circiter. Transacta hebdomada horum succorum, præscribatur hujusmodi Purgans.

℞. Elect. lenit. flor. cassiæ an. ℥ss. pil. de tribus ℥ss. m. f. b. tribus horis ante prandium assumendi, quibus post horam superbibat seri depur. ℥i. Deinde reperatur succorum usus, ut exiccata minera emolliari, dissolvi, & tandem expelli possit.

℞. Succi depur. cich. borag. melissæ an. ℥j. tart. vitriol. gr. x. decoct. in jure paratæ malvarum, endiviæ, sonchi, card. sancti ℥v. m. pro syr.



lyr. & sic pro alijs. Secunda die syruporum, rursus addatur sanguis ex altero brachio; ait enim Gal. quod sanguinis detractio & adolentescentes & adultos semper juvit, imo quandoque liberavit. Terminata horum succorum hebdomada præbeatur tale Purgans.

℞ Flor. cassi rec. extr. elect. lenit. an. ʒʒ. extracti senæ, extracti rhab. an. ʒʒ. m. f. b. quibus transacta hora superbibat feri capr. depur. lbij. & tribus horis ab assumpto sero prandeat.

Tertiz intentioni satisfaciendum erit lactis assueti diuturno usu; sed quoniam adhuc ventremine a jecoris & hypochondriorum calore in ventriculo corrumpatur: ideo tribus saltem diebus summo mane præmittendum erit serum capr. depur. ad lb. iv. vel v. cum vehiculo dejectorio syr. ros. sol. deinde tutior evadet lactis usus, illud de more quatuor aut quinque horis ante prandium, statim multum exhibendo, cui minime superdormiat, incipiendo ab ʒ. iv. vel v. cum semuncia sacchari albi, & dosim paulatim augendo usque ad ʒ. x. cum integra ʒ. ejusdem sacchari, perseverando ad dies 40. vel 50. Nec formidandus refrigerantium usus, eo quod palpitatio à flatuosa materia proveniat: etenim non vaporis humiditatis, sed sicca exhalationis naturam obtinet, ut ex Gal. verbis satis elicere licet, dum ait Palpitationem fieri à spiritu crasso, turbido & caliginoso, nimirum à sanguinis exustione aut alijs humoribus exustis elevato; quod magis expressit quoque Aet. dicens, Frequentissime palpitationem fieri à vapore bilioso aut melancholico ad cor elevato. Nihilominus palpitatione actua existente, quartæ intentioni satisficere opus erit discutientibus internis & externis, æreæ enim, licet crassam substantiam in se continent ipsi hatus: sic intrinsecus confectiones parari poterunt ex speciebus diambæ, item aromatici rosati, efficaces quoque & non adeo calefacientes erunt rotulæ ex ol. de cortice citri cum saccharo aqua cinnam. dissoluto paratæ; sed efficacissimæ erunt rotulæ ex ol. vero & legitimo cinnam. ut supra confectæ, quod oleum legitimum invenire non adeo facile. Extrinsecus illinienda erit regio cordis oleo de scorpionibus Matth. vino malvatico dissoluto.

Tandem cor in hoc affectu roborat aqua melissæ frequenter ad semicyathum epota, quam ita simplicem præbebat Avicen. sed efficacior evadet; si globulus croci per noctem in eadem fuerit infusus, vel ejusdem croci quinta essentia ad granum unum vel alterum addatur; libavimus autem addebat guttulas quintæ essentia: roris marini. A proprietate juvat os de conle cervi pulverizatum, & cum aqua cordiali exhibitum, quo uti solebat Rhazis; sicut ex eodem proprietate quoque juvat cor simia assatum & pulverisatum; nec spernenda sunt hujusmodi medicamenta oculata qualitate juvenia, à magnis Viris fide dignis proposita, & à me quoque non inutiliter experta.

His omnibus congrua vivendi ratio est addenda; & primo aerem purum incolat, nullo modo crassum atque paludosum. Ex cibis, inter carnes vitanda suilla, bubula, agnina, lepo-

rina, volatilium in aquis degentium. Ex piscibus, vitandi lutosi, palustres. Ex lactariis vitetur caseus. Ex leguminibus, admittitur hordeum, sicut & oriza. Ex Pastiliis, tenuiores tantum, ut vermiculi Apulienses & hujusmodi. Olera permittuntur decocta & optime condita; damnantur fungi, tubera terræ, carduus & apium. Ex fructibus damnantur acerbi & acidi, necnon nimis dulces: admittuntur fraga, pepones, persica matura, ceteri damnantur. Ex condimentis, damnatur pinguedo suilla, nimius usus caryophyllorum, nucis moschata & piperis pulverizati. Vinum ut mediocri conditionis, nec valde generosum, nec valde aquosum, non dulce, non auterum, sed maturum & odoratum, sive album, sive nigrum, æstate moderate frigidum, non tamen nive aut glacie refrigeratum. Somnus nocturnus sit diuturnus, pomeridianus brevis, si consuetus. Exercitia quoque, sed moderata juvabunt, ventriculo vacuo. Venus magnopere lædat. Alvus lubrica servanda passulis & prunis decoctis cum saccharo prima mensa sumendis, nisi sponte respondeat. Atque tandem animi applicationes moderatæ sint, & studiis opportune incumbendum, nimirum jejuno ventriculo. Quæ omnia Nobiliss. Patienti, salutaria precor. *Idem ibidem.*

Juvenis 25. aetatis biliosus, dum æstivo tempore se vehementius exercebat, incidit in vehementissimum & ordinatum cordis arteriarumque motum, qui ipsum adeo torquebat, ut pene in syncopen incideret. Postea ex levi ex-candescencia, vel alio vehementiore animi motu, eodem affectu sæpius correptus fuit; & jam novum patitur paroxysmum.

Afficiuntur in hoc agro cor & arteria; quod ex vehemente & inordinato eorum motu, & syncopes periculo patet.

Morbus qui ægram torquet, est intemperies biliosa & acris sanguinis, quæ in corde & arteriis vehementem & inordinatum motum intromittit & detumescencia, sive dialtoles & systoles, efficiens, Palpitatio cordis appellari solet.

Procatartica hujus morbi causa est ætas juvenilis, & intemperies biliosa nostri ægri. Hinc enim multi biliosi & acres in ipsius corpore fuerunt geniti humores, qui antecedentem huic morbo præbuerunt causam. Pars vero eorum, primo vehementioribus illis exercitiis ab ægro nostro, tempore æstivo, factis, & deinde etiam vehementioribus animi pathematibus, à reliquo sanguine separata, vel ex loco aliquo, in quo extra vasa antea existerat, in venas propulsa, sanguinique commista, & postea ad cor delata, illudque vellicans & effervescentiam pravam ibi efficiens, continens hujus morbi & symptomatum est causa.

Ex vellicatione enim ista, à biliosis & acris humoribus cor defacta, desertur ille motus pravus per nervum sextæ conjugationis ad cerebrum, cerebrique spiritus quo pori cerebri ita aperiuntur, ut spiritus, in cordis fibras vehementius inordinatissime fluentes, inordinatum vehementemque illum motum, qui palpitatio cordis nomine vulgò indigitatur, inducant.

Quia autem per vehementem inordinatum-



que illum motum spiritus, & utiles sanguinis partes valde dissipantur, sanguisque reliquus ad dilatandum ineptus evadit, hinc parum abfuit, quin in syncopem nolter æger incidere.

Morbus hic periculosissimus est, quia, cor, omnium partium pars nobilissima, adeo graviter afficitur, ut lethalis syncope inde sit metuenda.

Curatio itaque diligenter est instituenda, eaque in causa procacitica, antecedentis, & continentis, & intemperiei ablatione, consistit. Primo itaque per triduum tali utatur medicamento.

℞ Syr. de succo acetos. de acetosif. citri, de ribes an. ʒj. aq. cichor. borrag. bugloss. an. ʒiij. M. F. Julspium quod sumat quotidie jejunus per triduum.

Postea tali purgetur potione.

℞ Rhabarb. select. ʒi. ʒi. spic. ʒβ. aq. cichor. ʒiv. post levem ebullitionem infundantur per noctem. Colat. adde diapr. ʒiij. syr. ros. sol. ʒj. M. F. potio.

Evacuato corpore, matutino tempore quotidie utatur tali electuario, tribus horis ante pastum, magnitudine castaneæ majoris.

℞. Conserv. rosar. violar. bugloss. an. ʒβ. melul. ʒiij. Specier. diarrhod. abbatis, diatriumfant. diamargar. frigid. an. ʒij. oss. de C. C. sem. citri an. ʒj. corall. rubr. præp. ʒβ. cum syr. de limon. q. s. F. Electuarium.

Et hoc epithema cordi mane, & vespere admoveatur tepidum.

℞. Corall. rubr. & alb. sant. omnium, specier. diamarg. frigid. an. ʒj. croci ʒj. camphor. gr. iij. aq. rosar. ʒβ. borrag. bugloss. an. ʒij. aceti vini optimi parum. M. F. Epithema.

Post usum epithematis talem sacculum regioni cordis admoveat.

℞. Flor. ros. rubr. exsicc. bugl. borrag. sic. an. ʒj. sol. meliss. exsicc. ʒj. sant. omnium an. ʒi. ʒi. oss. de corde cervi pulver. corall. rubr. pulver. an. ʒj. behen alb. & rubr. an. ʒβ. Omnia in pulverem redacta includantur sacculo serico, multis locis intersuendo, qui aqua rosarum irroratus, & in olla munda calcfactus applicetur regioni cordis.

In victus ratione aer sit temperatus. Cibus eupeptus, elixus potius, quam assus, succo limonum conditus. Potus sit cerevisia, & vinum mediocre. Fugiat vehementiorem corporis motum, & vehementiora animi pathemata. Somnus sit mediocris. Alvus respondeat naturæ vel arte. *Henr. Regium apud Theod. Craanen Medicat. lib. 2.*

Vir triginta quatuor annorum, fortis, sed melancholicus, & simul nonnihil scorbuticus, cibis salis, fumo siccatis, aceto conditis & servatis, aliisque duræ digestionis à longo tempore assuetus, antehac multoties de aliqua ponderosa sinistri hypochondrii molestia conquestus est; jam vero aliud quid accessit, nam sæpe tribus quatuorve horis post pastum, magnam cordis palpitationem per sentit, quam pulsus fortior, admodum inæqualis, & nonnunquam spatio unius aut duorum ictuum intermittens, comitatur; quo tempore magna anxietate premitur. Durat hæc vehemens palpitatio per semihoram, aut paulò longius, postea rursus

cessat redeuntibus subinde levibus quidem, sed brevibus palpitationibus. Cum æger cursu aliove exercitio corpus plus solito movet, mox palpitationes molestissimæ redeunt, eademque per quietem rursus sedantur. Appetitus satis constat, & ventriculus bene digerit. Somnus etiam sufficiens est, excepto quod propter terribilissimam insomniæ multoties turbatur.

Præter alias partes, omnium manifestissimè in hoc ægro afficitur cor, hæcque dicta ejus affectio, Medicis appellatur Palpitatio cordis, quæ est inordinatus & nimis vehemens cordis motus.

Causa proxima est humor falsus & acris sanguini permixtus, qui chylo ex falsis acribusque cibis confectus, tribus quatuorve post pastum horis, in venam cavam effuso, permixtus, cum coque in cor illapsus, inordinata & vehementis in chylo sanguificando fermentationis causa est, propterea quod acres falsæque chyli particule, una cum sanguine venoso, acri isto humore imprægnato, in cor delapsæ, fermentationem nimis augeant: unde tunc illa nimis vehemens & inordinata cordis præter modum dilatati & contracti concussio procedit, quam fortis & inæqualis arteriarum pulsus necessariò sequitur.

Quia in illo falso & acris humore particulis tenuioribus hic illi admiscuntur particule multæ crassiores, magis hæc, & ægre dissolubiles, quæ in corde tam citò dissolvi & attenuari nequeunt, hinc hæc, quod dum cor in earum dissolutione & dilatatione opus habet longiore tempore, illis in ventriculos illabentibus, pulsus ad tempus unius aut duorum ictuum intermittat, unde etiam tunc anxietas oritur, nam quo tempore pulsus intermittit nulli spiritus ad partes propelluntur.

Durat hæc vehemens palpitatio per semihoram, aut paulò longius; quia isto intervallo totus chylus uno pastu confectus, aut maxima ejus pars sanguini cavæ permixta, per cor transit, & prout postmodum aliquæ pauciores reliquæ ejus partes adhuc transcunt, ita nonnullæ leves & breves palpitationes postea oboriuntur.

Quod verò acris ille humor, continuè ad cor cum sanguine venoso profluens, non faciat continuam palpitationem, ex eo fit, quod sanguinis, illiusque acris humoris jam multoties in corde fermentati & dilatati particule sint æqualiores, multum mitigatæ & nimis acres, atque hinc in eo tam vehementes effervescentiæ in corde excitari nequeant, si modò quantitate mediocri & paulatim in ventriculos illabatur. Quod si verò cursu, aliove gravi exercitio corpus admodum moveatur & incalcescat, hincque sanguis copiosior, cum suis acribus inmixtis particulis, rapidè per cor transeat, mox cum ab aucto calore, tum ab acrimie particularum in cor illabentium majore copia, nimis incrementa effervescentia, hinc cordis palpitatio exoritur, eaque per quietem rursus imminuitur & cessat, imminuto scilicet calore & nimio sanguinis motu, copiosoque transitu per cor.

Hic autem falsus & acris humor peculiari vitio lienis generatur, ex eoque per ramum splenicum in hepar effunditur, in quo cum sulphureo succo in chymum excoquitur, atque in cava san-



sanguini ad cor fluenti admiscetur. Vitium illud lienis, est quoddam prava salsaque ejus intemperies, cum aliqua obstructione, ponderosam molestiam inducente, conjuncta.

Ventriculus satis famelicus est, beneque alimenta assumptadigerit; quia primario non laborat, & acres succi sanguini immixti per arterias ad ejus tunicas cum sanguine delatis, fermentationem in eo faciunt.

Somnus sufficiens, sed terribilior est, quia satis copiosi quidem, sed nonnihil acres vapores ad cerebrum feruntur, qui somnum quidem provocant, sed membranas cerebri & principia nervorum subinde nonnihil vellicantes, sicque phantasmia præter ordinem excitantes, terribiliora insomnia procreant.

Affectus hic licet ægrum non repente prosternat, tamen periculo non omnino vacat; partim quia afficitur princeps viscus cor, partim quia lienis illa prava dispositio non tam cito & facile tolli poterit; ægri tamen robur, & morbus non admodum inveteratus sanationis spem faciunt.

In Curatione ad tres scopos collimandum est, 1. ut lienis vitium corrigatur. 2. ut salii acresque humores in sanguine redundantes, partim attenuentur, & minus coquantur. 3. ut cor omni modo corroboretur.

Ut his tribus indicationibus satisfiat, primò bis terve medicamentis melanagogis & phlegmagogis humores crudi, salii & acres e corpore lunt evacuandi, ut pilulis cochis, de hiera, aureis, electuario diaphanico, hiera picra, confectione hamech, infusione sol. lenæ, agar. &c.

Postea hujusmodi apozema præscribendum.

℞. Rad. helen. fenic. an. ʒj. cappar. tamarisc. an. ʒß. herb. chamædr. trisol. palustr. an. m. j. meliss. m. j. cortic. citri, baccar. juniperi an. ʒv. sem. fenic. ʒij. passul. corinth. ʒij. aquæ & vini partes æquales, coquant. l. a. & l. Apozema ad ʒi ß.

Hoc assumpto bibat æger singulis matutinis haustum hujus vini medicati.

℞. Rad. acor. helen. an. ʒß. cappar. tamar. an. ʒij. herbar. chamædr. trisol. palustr. an. m. j. cortic. aurant. ʒß. baccar. junip. ʒvj. cinnam. elect. ʒi ß. garyophyll. ʒj. sem. fenic. ʒij. aloës lucid. & agar. albis. an. ʒiv. F. ex his puppa.

Post meridiem utatur bis terve hujus conditi particula.

℞. Specier. diamb. diamosch. dulc. an. ʒj. cortic. aurantior. & rad. helenii cond. conserv. anthos, flor. saly. meliss. an. ʒß. syr. helen. q. s. M. F. conditum.

In primis autem necesse est ut æger convenientem victus rationem instituat. In aere versetur calidiusculo. A cibis abstineat salis, antiquis, rancidis, acidis, fumo siccatis, aliisque quibusvis duræ digestionis & acris. Item a brassicis & quibusvis leguminibus, a lactucis, cucumeribus, melonibus, multisque fructibus horariis, aliisque pravi nutrimenti. Cibi sint euchyini & facili digestionis, ut carnes vitulina, vervecina, agnina, gallinarum, cuniculorum, perdicum, &c. quarum juscula præparantur cum rosmarino, borragine, melissa, betonica, hyssopo, calamentha, serpillio, foliis

lauri, rad. raphani sylvestris, corticibus citri & aurantiorum, seminibus anisi & feniculi, passulis, nuce moschata, cinnamomo, garyophyllis, zinzibere, &c. Item pisces saxatiles, rapæ, ova recentia. Potus sit cerevisia mediocris uotæ, non antiqua, vel acida. In pastu etiam vinum album bene maturum. Somnus & corporis exercitia mediocria sint. Excreta naturalia curandum ut bene procedant. Fugienda ira, terror, curæ, omniaque tristitia animi pathemata. *Isbrand. de Diemerbr. Medicat. libro secundo.*

### Observationes.

Juvenis quidam vulneratus fuit in dorso sub scapula sinistra, vulnere thoracem transeunte; qui mox febre valida continua, acuta correptus est, & in cordis palpitationem adeo vehementem & violentam incidit, ut etiam extra domum, in qua æger decumbebat, a transeuntibus palpitatio cordis exaudiretur, ut in vita similem casum neque audierim, neque viderim, neque a præceptoribus meis observatum compererim. Ad hunc juvenem cum ingressus essem, hanc gravem palpitationem animadverti ortum habere ex sanguine intus remanente, vel ibidem concreto. Venam sinistri brachii statim tundere feci, & ilico a detractione sanguinis, infcio Chirurgo, melissam viridem & borragine accepi, contrivi herbas, ne ab adstantibus cognoscerentur, easque supra regulam mundam igitam posui aqua rosacea & aceti momento irroratas; quas cum cordis regioni admovissem, miraculis seu incantamentis modo ilico cessavit cordis palpitatio, omnibus admirantibus. Hoc autem arcano, nulli nisi verè Pythagorico revelando, aliquando uti videram præceptorem meum Elidam Iaduanum in Nosocomio Bononiæ. Verum is solo melissophyllo utebatur, nos borraginem adjecimus. *Patr. Ferri. de Cord. & mammill. affect.*

Juvenis quidam multo sanguine abundans, cum subito in cordis palpitationem incidisset, statim venam secari jussi, in mentem enim venit illud Galeni dictum lib. 5. de loc. affect. cap. 2. quod palpitatio cordis, pluribus in integra valetudine degentibus, tum adolescentibus, tum adultis, subito sine alio accidente manifesto evenire visa est, atque eos omnes sanguinis detractio juvit, leniente dein medicamento corpus purgavi, postremo theriacam dedi ad ʒi ß. superbibendo parum aquæ melissæ. Exterius etiam hoc epithema cordi apposui.

℞. Aq. meliss. & borrag. an. ʒi ß. aq. rosar. ʒij. garyophyll. cinnam. lign. aloës, cortic. citri an. ʒß. sem. ocymi ʒj. croci gr. v. vini odoriferi ʒij. ambr. mosch. an. gr. ʒ. F. Epithema cordiale. Quibus remediis, vel his similibus, non solum hic juvenis, sed alii multi convalescere. *Idem ibidem.*

Exterius admotum hyacinthum gemmam, regioni cordis, tum etiam corollam ex rubro corallio, sinistro brachio supra manum aliquoties circumvolutam, continuo gestatam, manifesto experimento comperimus eos juvisse quibus cor tremit & palpitat. Unguentum etiam hic addam quo alias olim præscribente Antonio Guainerio insigni Medico, ad cordis angustias, ego



ego feliciter sum usus in cordis palpitatione.

℞. Olei e flor. nymph. luteæ ʒi. ʒ. flor. nymph. luteæ ʒj. Corall. rubr. Santal. citrin. sem. acet. ana ʒʒ. Margar. præp. ligu. Aloës odori, ossis e corde cervi ana gr. vii. camphor. gr. iij. l. omnium pulvis M. & cum cera alba lota in aqu. nymph. q. s. F. l. a. Unguentum cordiale quo illinatur cordis regio. *Reynerus Solenander Conf. 10. sect. 3.*

Maximilianus 2. Imperator nullum expertus est præstantius remedium in cordis palpitatio- ne, quam theriacam extra adhibitam. Negari certe non potest medicamenta externa, ut sunt unguenta, balsama, episthemata, arteris & cor- di applicata multum prodesse ægrotis morbi gravitate & diuturnitate debilitatis. Sed ad- vertendum talia medicamenta cordialia, & si cor in medio situm est, melius applicaris non in medio pectoris, quod cartilagosum est, sed paulo infra mamillam sinistram, quo vergit cor- dis micro. *Wolfgangus Haferus Herent. Medic. lib. 2. cap. 1.*

Cordis palpitatio, non unam ut agnoscit causam: sic ut quoque vel à vulva, vel à lienis vicio. Quorum partium vapores, turbant non- nunquam tam potenter cor: ut exsuscitata vi sua pulsifica, nihil non molitur, quo expellat fuligines sibi summe inimicas. Quam recipio- cam acceleratorum ictuum, frequentiam, pal- pitationem vocant medici. Cujus licet variz sint causæ: sit tamen illa, quam producit lien, potissimum, ex præstata atra bile: cujus vapor inducit vehementissimum hunc morbum: uti clare docet, Vir jurè Magnus Victor Trinca- vellius lib. 6. part. affect. cap. 12.

Adriano Rkestio præfecto marino, excita- bat induratus lien, tam algidum malæ sinistrix corporem: ut nullis remediis potuerit calor, iterum in cutem evocari. Unde paulatim ob- sideri cor; & à tetro malignæ bilis halitu, tam frequentes produci palpitaciones, visæ sint; ut æger tandem inciderit in lethalem gangranam.

Sed vix accessere unquam palpitaciones; quin triduo ante potuit illas prælagire: ex cru- do ac tenui, quod id temporis reddebatur, lotio. Non secus ac Hippocr. ex pellucida, ac alba urina, urgens phrenitidis periculum: ob- bilem, uti interpretatur Galenus, sursum raptam lib. 4. Aphor. 72. *Nicol. Tulp. Observ. Medic. lib. 2.*

Novi Nobilem Matronam hypochondria- cam, quæ quoties cinnamomo tum in cibo, tum in condimento utitur, palpitationem cor- dis incurrit. Hæc aliquando tantum invaluit, ut meum consilium implorare cogeretur. In cura volatilia & aromatica nihil faciebant. Ab acidis tamen insigne sentiebat levamen, præci- pue à spir. pro acidulis, & spir. nitri dulci. *Alardi Hermannii Cumeni.*

Nobilissima quædam p. m. virgo, cum ei ante aliquot (dum viveret) annos cum ferculo ve- nenum propinaretur, illaque partim natura robore per spontaneas easque plurimas de- jectiones factas, partim etiam ope præ- stantissimorum alexipharmacorum, adjuvante divina gratia, ab ejus nociva vi liberaretur; accidit, ut quotannis ipsa assumpti intoxicati cibi die, nempe sexta Maii, per plures annos, usque ad ultimum vitæ terminum, memorabile symptoma semper recurreret, scilicet anxietas

cordis cum Lipothymia gravissima, quæ tamen accepto aliquo cordiali pharmaco, largissimo sudore solvebatur. *Simon Schultze.*

Virum quendam Illustris nominis in India nostra, crebram cordis palpitationem, cui pul- sus intermittens semper aderat, patientem, quovis tempore semper restituit mixtura se- quens.

℞. Spir. sal. ammon. aromat. ʒʒ. C. C. ʒj. Syr. cinnam. corall. perlar. ana ʒʒ. Aq. menthar, fænicul. ana ʒij. ʒ. M.

Mercatoris uxor Batavientis, cachexia ac suffocatione hypochondriaca interdum labo- rans, maximâ simul cordis palpitatione oppu- gnabatur. Hanc subito talis mixtura sanavit.

℞. Spir. sal. ammon. aromat. ʒʒ. succinati, C. C. ana ʒj. tinetur. Castor. croci ana gutt. x. Essent. cinnam. gutt. vi. Syr. perlar. corall. ana ʒʒ. Aq. menth. fænic. aurant. ana ʒij. M. detur co- chleatim. *Hermann. Nicol. Grunm. Compend. Medic. Chym. lib. 2.*

### Anatomica Inspectio.

Excitari potest cordis Palpitatio à tubercu- lo, abscessu, intemperie calida, sanguine multo obstructionem faciente, vermibus, subita va- cuatione, imprægnatione, inflammatione, aqua tunica inclusa, ac humore putri & male olente plena, lapillis, venenosa qualitate, spirituosio halitu sive ab internis, sive ab externis: Ven- triculis cordis, sive in substantia, sive in peri- cardio, sive arteriis causa consistat: Sive ac- cidat extrinsecus, ut utero, hepate, liene, ven- triculo. E quibus causis nonnullas in dissecis corporibus hoc orbo peremptis exploratas habuimus. In cujusdam pericardio aqua visa; in alio abscessus in vena arteriosa; in aliis peri- cardium flatu distentum, qui tandem solet in aquam concrefcere, nisi cordis calore dissolvatur. *Scoliographus in Holler. cap. 29. de morbis intern.*

Nos in cordis membrana in Palpitationi sub- jectis agris observavimus hydatidas. *Guerrier. Rolfink. Epithom. meth. cogn. & cur. lib. 2. p. 2. c. 1.*

Archidiaconi cordis Palpitatione interempti corpore dissecto, abscessus in cordis substantia inventus. *Forell. lib. 17. observ. 1.*

Nuper in N. corde qui Palpitatione frequen- ter corripitur solitus erat, veluti lapillus quidam niger repertus fuit. *Thom. Erasmus in consp. Schelitz.*

Quidam audacissimus latro palpitacione cordis frequenter corripitur solitus, tota in ita- fixus. Nos hujus cordis visendi cupidi, pulsans adhuc incidimus, ac in ventriculo ejus dextro tres reperti lapilli, ciceris magnitudine, coloris cineritii, oblongi, pondo unius drachmæ, &c. *Zachus Prax. adnir. lib. 2.*

In Imperatoris Maximiliani secundi corde secto, inventi sunt tres lapilli quantitate pifo- rum, unus interim major altero, colore rubigi- neo. Frequenter verò cordis Palpitatione gravi afficiebatur dum viveret. *Wierum de Præstigiis Dæmonum lib. 4. cap. 16.*

Henrici Schrafferi Belgæ annorum 50. cada- ver Hamburgi à M. Kirllenio Anatomico & Medico insigni apertum anno 1651. in quo se- quentia notabantur publico dignissima. In dextro cordis ventriculo repertum est concre-



mentum, seu Polypus ingens, qui amatus erat dextræ auriculæ in parte superiore versus cor, & extendebatur sinuato ductu in ipsam capacitatem dextræ ventriculi, ubi pariter adhaerebat parieti inferiori, implicitus valvularum cuspidibus. Porro progrediebatur sursum & exibat per venam arteriosam, in cuius truncum & deinde ramos tripartitus, sive distinctus in tres ramos porrigebatur. Rami illi rursus in alios multos furculos, & tandem filamenta desinebant. Circa exortum duos prope digitos erat lata hæc excrescentia, longa (spithamam unam & tres circiter digitos. In auricula sinistra inerat alia excrescentia, sed vel nullo modo, vel planè leviter adhaerens. In cavitate auriculæ pars erat latior, referens concretum sanguinem, protendebatur autem in arteriam venosam, ubi candicabat, distributa scilicet in aliquot ramos, inter quos erant tres potiores (qui rursus in alios minimos dividebantur) inserti in ramos minores arteriæ venosæ. In aorta reperiebatur alius polypus ejusmodi insignis, cujus pars lata, sive basis, sita erat in divaricatione trunci, ubi etiam adhaerebat firmiter, ibique peculiaris quidam sinus instar spheræ dimidiæ, vel vesicæ effectus fuerat, in quem una & major ejusdem extuberantia inferebatur. Hic appendix erant duæ quali radices, quarum una in arteriam dextram immittebatur, altera, eaque bifida, in carotidem sinistram. Basis erat subrotunda instar cucurbitulæ balneatorum, & in longum extendebatur versus cor, ita ut illud non ingrederetur, sed ingressum aortæ in cor attingeret. In fine erat appendicula. Longitudo totius quasi quinque digitorum. Omnia vasa cordis, ut & auriculæ, erant ampliata, mireque dilatata, imprimis caudex arteriæ aortæ. Præterea in vasis iliæ ejusmodi vitia sunt reperta, ut in sinu cerebri falcato, ubi per totam prope longitudinem effusa videbatur concretio alia, quæ, imprimis versus posteriora, in duos ramos dividebatur, in plurimos furculos similiter & multas appendiculas distinctas. *Joh. Langelotti.*

Puer 13. annorum temperamenti sanguineo bilioli, passus est post magnum haurium frigidæ in calore, continuam cordis palpitacionem per aliquot annos: accessit Phthisis & Hæctica.

Mortuo aperto, non tantum pulmones accretos, ulcerosos, purulentos reperi, sed etiam cor stupendæ magnitudinis conspiciebatur, plenum & extensum sanguine atro & nigerrimo. Et ut istam sanguinis copiam bene perpendere, incepti à vasis versus cor progrediendo, ejus apertionem, ubi in arteria magna, ad longitudinem unius digiti, à cordis sinistro ventriculo, in sanguine jam jam à corde extruso, particulam quandam albam, instar unguis minimi digiti inveni, quam tanquam ibi planè præternaturalem cum acceperim, erat friabilis instar arenæ, & cum ulterius versus cor progredere, in ortu arteriæ inveni mediam valvulam lunarem, usque ad substantiam arteriæ planè consumptam & deperditam, & illam partem, ubi arteriæ adhaerebat, etiam friabilem in similem arenam, sicut alteram particulam arteriæ sanguine refertam, nullum verò pus. *Ex Observ. J. G. Greiseli Medici. Viennens.*

Dom. de Becherat initio mensis Nov. 1646. ad me venit, & de Palpitatione cordis ab ali-

quot diebus ipsum infestante conquestus est. Pulsus illius contrectans, illum inæqualem invenio omni genere inæqualitatis, ita ut statim in memoriam mihi revocaverit historiam Antipatri apud Galenum, quem ipse censuit habere obstructions in laxis arteriis, vel tuberculum crudum. Nulla erat tunc temporis respirandi difficultas, & æger munia consueta obibat, neque ulla remedia nisi diebus festis usurpare volebat: præscripti statim venæ sectionem iteratam, ac postmodum purgationem, à quibus meliuscule habuit. Post x. vel xii. dies iterum questus est de eodem affectu. Varia præscripti remedia attenuantia & incidentia citra caltactionem, quibus tamen non usus est variis districtis negotiis. Tandem initio mensis Decembr. decubuit, cum difficultate spirandi laborare inciperet & tibiæ inflatæ apparent, & tum temporis remedia præscripta usurpavit cum iterata V. S. quæ cum per dies xii. continuata nihil opis attulissent, sed malum perpetuò in pejus rueret, convocatum est consilium aliorum Medicorum, quorum sententia fuit esse affectum similem illi qui recensetur à Galen. 4. de Loc. cap. 8. Et ita incidentibus & attenuantibus remediis esse oppugnandum. Variæ remedium formulæ in hunc finem præscriptæ, sed æger perpetuò in pejus ruebat, summa difficultate spirandi laborabat, & pulsus nullus apparebat in carpo: Admotâ tamen manu supra regionem cordis, palpitatio sentiebatur frequentissima, debilissima & inæqualissima: aucta etiam erat tibiæ inflatio, ut jam etiam crura invaderet. Remedia præscripta fuere prioribus similia, quibus addita sunt cardiaca interna & externa. Biduo post æger ad extrema reductus videbatur: Suffocatio ingens aderat, & pulsus in brachio nullo modo, in corde vix percipiebatur. Eadem die moriturus putabatur: cucurbitulam apponi jubeo regioni cordis cum scarificatione, cujus beneficio Zacutus Prax. Admir. Observ. 133. lib. 1. quendam ægrum à desperata cordis palpitacione liberasse se testatur. Meliusculè habuit, & nocte insequente cæpi excernere per sputum sanguinem nigerrimum, crassum & glomeratum, cum tussi molesta, unde levior respiratio fieri cepit. Ad expectorationem juvandam utebatur frequenter syr. de tussilagine, cum quarta parte oxymel. simpl. & jusculum galli veteris cum pectoralibus. His remediis per quattiduum continuatis, æger in eodem statu permanebat, sanguinem continuò nigrum & crassum excernens. 5. die à sanguinis sputo 4. Januar. 1647. exhibui elixyr propriet. ad gr. xii. cum tantillo vini generosi, à quo levamen percepit æger, & totâ nocte facilius fuit anacatharsis. Die 6. literatum est elixyr, & jusculum galli veteris, verum inde non melius habuit, sed aucta in dies spirandi difficultate, & sanguinis sputo etiam plurimum aucto, die 8. interiit.

Apertò cadavere, inventus fuit cordis ventriculus uterque sanguine concreto repletus ac distentus, tum etiam totus pulmo sanguine multo refertus visus est, unde caloris nativi suffocatio contigit. Præterea in sinistro cordis ventriculo inventæ sunt carunculæ rotundæ, substantiam pulmonis emulantes, quarum major ad avellanz molem accedebat, & arteriæ aortæ



aorta ostium præcludebat, unde pulsationis defectum in arteriis contigisse puto. *Lazar. River. Centur. 4. Observ. 21.*

Puella annorum sex toto vitæ tempore morbis fuit obnoxia, dein Palpitationi cordis & Asthmæ, tandem Atrophia perijt.

Huic inventa auricula cordis dextra prætumida, cui ierant materia quædam alba, membranosa, crassa, oblonga. In ipso cordis ventriculo dextro materia pinguedini similis. *Gasp. Bauhin.*

Vir annorum 17. gracilis corporis habitus, temperamenti calidi & sicci, quatuor annis laboravit cordis continua Palpitatione, cujus unicum remedium fuit sanguinis missio. Verum symptomate recrudescente, tandem syncope correptus interiit, corde palpitante non in loco proprio, sed circa diaphragma lateris sinistri valde demisso.

Aperto cadavere, cor maximum apparuit, solum unam continens cavitatem seu ventriculum, in quo 3 xvi. sanguinis nigerrimi adnumeratæ sunt. Cordis corpus totum erat emaciatum, arteriæ præ pondere elongatæ & contriventes, ita ut sanguis spirituosus motu cordis non potuerit amplius expelli ad arterias. Loco dextri ventriculi vena cava ascendens in ingentem elevata tumorem. Dicite jam, si ambo ventriculi cordis necessarij sunt, an in uno præparentur & in alio perficiantur spiritus? *Anton. de Pozz. Observ. 4. Miscell. Critic. Ann. 4.*

In ventriculis cordis interdum varia p. n. generantur, sanitatis haud parva impedimenta, quæ tamen in agnoscantibus à Medico vix sciri aut agnosci queunt. Frustula adiposa, ac quasi carunculas molles & albicantes, magnitudinis circiter lemmi ovi, interdum majoris, non semel in his inveniimus & spectatoribus demonstravimus, scilicet in morbo sublati cadaveribus. Inter alia mense Octobr. 1665. Secuimus & demonstravimus c. daver juvenula circiter 15. annorum, quæ vivens diu conquesta fuerat, de summa cordis anxietate & palpitatione, ac leipothymias sæpe passa, sicque tandem extincta fuerat; in quo cadavere etiam tale frustum adiposum, dextrum ventriculum fere replens, & aliud parvum in sinistro ventriculo inanius, atque diligentiori examine instituto, animadvertimus non fuisse corpus aliquod ex sanguinis coagulatione genitum, sed revera corpus adiposum atque firmum, quod digitorum frictione non dissolvebatur: Hicque mortis causam fuisse judicavimus, nullamenim aliam in toto corpore invenire potuimus: nec illa vivens de ullo alio malo quam de prædicta maxima cordis anxietate & palpitationibus ac leipothymias sæpe recurrentibus conquesta fuerat: quam ob causam imperiti domestici illam sæpe levi epilepsia sine convulsionibus, vel hysterica passione laborare judicaverant.

Mense Decembr. 1668. in alia juvenula ejusdem ætatis, simile adiposum corpus satis firmum, magnitudinis semi ovi gallinæ, in dextro ventriculo invenimus. *Lib. 2. de Diemerbr. Anat. lib. 2. cap. 6.*

In Mercatoris cujusdam dissecto cadavere, vidi dextrum cordis sinum, cui vena cava inferitur, interiore sui parte durum, exasperatum, undique & quodammodo squamosum, ut inserta

manus mea squamarum scabritie offenderetur: Quo in loco continebatur frustum condensati humoris pituitosi, lenti, albicantis, longitudine digiti medi, crassitie pollicis, aut amplius, sanguini immersum, quod medullam cruris bovilli castæiani substantiâ & formâ referebat. Laborabat Palpitatione cordis diuturna, ex qua & mortuum narrabat ejus medicus qui me ad sectionem adduxerat. *H. Smetius Miscell. lib. 10.*

Carnosas excrecentias in cordis ventriculo dextro vel sinistro repertas fuisse, in iis qui dolorem cordis & syncopen & passi fuerunt, & pulsum intermittentem habuerunt, refert *Vesalium Anat. lib. 2. cap. 5.*

Nicolaus à Sonnevelt circa 12. ætatis annum ex febre quadam acuta evadens, aliquandiu valetudinarius vixit: nam exinde ferè per sexennium diversis malis obnoxius vixit, diuturnæ lienis obstructioni, crebris ex naribus hæmorrhagiis, cephalalgia, multis catarrhis & tumoribus itumosis in collo. Ad 18. ætatis annum cœpit bene valere, sed morosus valde manebat, qualis in adversa valetudine semper fuerat. Circa 20. annum, crescente robore, a patruo ipsius, qui pennis præparandis operam navabat, ad idem opificium delegatur: ubi mox a suis commilitonibus ad crebras comotationes invitantibus cœpit rursus malè habere. Primo in crebras cordis anxietates incidit, postea in leipothymias & deinde cordis Palpitationes. Cibi potusque erat avidissimus, sed comestum sæpe regerebat, unde debilitas sequuta ipsum decumbere jussit. Tum prædicta mala quotidie augescere, atque Palpitatio tanta suborta fuit, ut in vehementiori animi commotione ab adstantibus audiri posset; quod ipsi tum valde dolorificum erat. 20. Decemb. 1641. è vita decessit & cadaver apertum fuit. In abdomine quidem omnia naturali modo constituta reperiuntur: Sed thorace aperto, inventum fuit cor bovino non multò minus, quippe communem magnitudinem quater circiter excedebat. Inrevera autem æqualiter fere circa substantiam & cavitates, ipsaque substantia naturali erat solidior: sed in villis septi intermedii, tres calculi reperiuntur, pluri circiter magnitudine, non admodum solidi, sed arenacei & novatuli cedentes. Pulmones satis bene habiti, sed utrique lateri paullum fibrillis quibusdam adhaerentes, quod ob angustiam pectoris à cordis incremento, ita contigisse videtur. *Ordo Henricus Observ. 18.*

Ventre Comitæ Belcarrensis, Palpitatione cordis dum viveret laborante, dissecto, compertum fuit omentum esse macrum & parvum: Hepar valde magnum: Spleu etiam magnus fuit, repletus nigro ipsoque humore. Stomachus ejus & viscera omnia vacua, coloris crocei, distenta solo vento. Vesica fellis tumida humore nigro. Reues repleti specie sanguinis grumosi. In Thorace lobi, idest extreme partes pulmonum, erant integri, sed malo colore, in sinistra parte nigricantes & cærulei, in dextra albicantes, cum tubere substavo sub uno loborum. Pericardio dissecto nil aquæ illius apparebat cui cor solitum est innare, ejusque exterior superficies, à basi usque ad verticem, non erat plana sed asperissima: cum seorsim dissectum est quantitas albi inspissati liquoris effluebat.



& infra basin, inter dextrum & sinistrum ventriculum, duo lapides reperiebantur, quorum alter magnitudine æqualis erat amygdalo, alter erat duos digitos longus & unum latus, habens tres aurículas vel crispas angulos: Et in orificio dextri ventriculi erat materia carnosâ pinguis. Totum corpus erat sanguine destitutum, tenue & emaciatum, colore nigro & subcaruleo. Cranio aperto tam cerebrum quam cerebellum erant secundum proportionem corporis magna, & ex eo plus sanguinis effluebat quam in ambabus alijs regionibus visum fuerat. *Ex Act. Philosoph. Societ. Angl. Ann. 1665.*

Cordis involucri pericardium vocatum, continet unum aut alterum viscidâ aut rubeundâ alicujus aquæ cochlear; cum ad faciliorem motum visceris nunquam quiescentis, tamen præ nimio æstu facile excandescat fons caloris, qui instar Solis vitam impertitur corpori universo: Aqua autem vel copia nimiam exuberante, vel calore à statu naturali decedente, exoritur protinus vehemens cordis Palpitatio, cujus indefatigabili motu satagit nobile hoc viscus excutere quod quacunq; ratione sibi molestum est, cujus voti nisi reddatur compos, & se & corpus perdit universum. Stephanum Ionam juvenem vegeti corporis, defatigatum impense ex pedestri itinere, corripuit inopinato quasi insultu acutissimus lateris sinistri dolor cum spiritu difficili, ac summa cordis Palpitatione: Quorum symptomatum impetum, cum nec sanguinis detractio, nec roborantia ulla intringerent medicamenta, actum fuit de ipsius salute, succubuitque sub pondere viribus nimis gravi, contracta, non tantum febre hæctica, verum etiam hydrope, abdomen usque eo extendente, ut necesse habuerit tandem sub sudore frigido, vitam cum morte commutare.

Quorum symptomatum gravissimorum ergo, ubi dissecaretur cadaver, invenimus cor flaccidum, ac iusto majus; aquam vero pericardii exuberantem ad 2j. cochlearia: quæ ipsius copia produxit proculdubio palpitacionem cordis. Pulmo totus erat vitiat, collique accretus. Vena ubique tumida. Omentum putredine infectum; uti venter cum cruribus aqua citrina repletus. Cavendum itaque obnixè à nimia defatigatione, quæ tantum mali corpori dat. *Nicol. Tulp. Observat. Medic. lib. 4.*

In corpore ejusdem Gorzensis oppidi incolæ, Jacobi Lorei, jam pridem Palpitatione laborantis & spirandi difficultate, repertum Pericardium immanem in tumorem elatum, ploribus libris aquæ distentum. *Carol. Piff. de Illuvie Serosa sect. 3. cap. 11.*

Contingit aliquando circa Pericardium tumores & inflammationes fieri; si crudus tumor, vel tuberculum fuerit, palpitacionem, vel tussiculam facit: si vero inflammatio, eadem symptomata erunt quæ in peripneumonia, & hæc nota discernuntur, quod minori anhelandi difficultate laborent & minus levantur frequenti & multa expunctione: Æstus maximus & febris maxima in tali affectione esse solet. Nos hanc affectionem deprehendimus in Nobil. & Genetoso viro, cujus cor erat obductum seroso humore verso in saniem quandam ob partis illius inflammationem. Et ne decipiaris, sentiunt

quoque dolorem in lateribus membranz hypozocotæ consentienti. Ipsi pericardio rarissimus est hic affectus, a quo pauci evadunt, quem nemo, adhuc quod sciam, annotavit. *Kondeletius de dignoscend. morb. cap. 10.*

Calculus ubivis locorum in homine reperiri certum est, sed in arteriis qui invenerit, hactenus quidem inveni neminem; ac proinde optæ pretium facturus videor si ejus exemplum hic universis. Joh. Arminius Pharmacopolæ minister, ob adversam valetudinem frequentibus medicamentis à puero magis imbutus quam adjutus, devenit tandem in tam vehementem cordis Palpitationem, & irrequietum agitati visceris impetum, ut verberantis ictus distincte nonnunquam audirentur prætoribus conclavis, in quo id temporis decumberet. Quibus accessere frequens animi deliquium; præcordiorum angustia, spiritus difficultas, pulsus intermittens, urina nunc flava modo nigra, modo cruenta, vel muco aut arenulis perfusa: Sed ulterius proterpente morbo incidit quoque in anorexiâ ventriculi, cum crebro vomitu, jecinore indurato, abdomine intento, cruribus tumidis, & tanta aquæ copia, ut necesse habuerit ultimè obire diem.

Quorum symptomatum ergo ubi dissecaretur cadaver, inventum omentum putridum ac cruentum, sed jecur magnum & plurima pituita refertum; at reliqua viscera ita parva, ut lien vix dimidiatam manum, ventriculus vix intestini jejuni, & venicula fellis vix articuli digiti æquaret magnitudinem. Vesica urinaria erat admodum corrugata, & præ torrido æstu planè nigra: In pancreate vero omnia dura; at in pulmone nihil non aridum ac maculosum: Cor contra magnum & amplum, sed sine pericardio ullo vel minimo illius vestigio: Intestina vero innatabant aquis, ut pulmo bili flava. In rene dextro latitabant plures calculi, partim rubri, partim nigri, quos inter unus, cæteris major, obrubat integrè ureteris principium. At prope renem sinistram dedit se nobis in conspectum inauditum illud calculi genus, quod à loco cui adhæsit, lubet vocare arteriale: insidebat quippe firmiter illi arteriæ aortæ ramo, qui vergit ad glandulam Eustachii sinistro reni impositam. Disruperat autem caput ipsius (ita appellamus rotundam excrecentiam illius calculi, quæ cum angustiore collo haud male refert caput implumis pipionis) arteriæ tunicam, latitante reliquo corpore in dilatata ipsius fistula: sed ita ut vulneris ora nonnumè hiarent, verum contraherentur tam arcte circa ipsius cololum, ut vix guttula sanguinis potuerit illinc effluere. At vero protuberans hæc pars, quam caput vocamus, ut reliquo calculi corpore fuit durior, sic discrepavit quoque parum à siliçe, sed quod delituit in arteria erat molle: foris quidem ob adusti succi melancholici miscellam, nigrum, sed intus albicans ac concretæ pituitæ simile: at capitis color fuit ex flavo cinereus, ad instar lapidis bezoar occidentalis: totus autem lapis referebat ad amissim implumem aviculam, sed lanci impositus ponderabat drachmas duas. *Nicol. Tulp. Observat. Medic. lib. 1.*

In femina asthmatica & cordis Palpitatione laborante, corpora pituitosa ultra longitudinem



superantia ex aorta extraxi. *Johan. Jac. Wepfer. Exercit. de Apoplex. p. 197.*

Callum eundem in arteria magna loco cordi proximo, natum observavimus. Multis hic animis cordis Palpitationi obnoxius crebro fuerat: Sex verò ante mortem mensibus, in sinistro carpo pulsus tam exiguum habuit, ut nullus sæpe apparuerit, ac sæpe sentiri non potuerit. Fuit palpitante corde: Difficile fuit admodum potum admittere, si ut vix unciam simul bibere potuerit. In pectoris spatio sublutei coloris humor collectus quoque fuerat. *Dodonam Annot. in cap. 3. Beniventi.*

Reverendus N. jugi rerum caelestium contemplationi addictissimus, statim a primis ungulis perpetua, sed quæ in dies, prout ætate proriebat, cresceret, palpitatione laborabat; cumque 42. annos natus esset, multaque medicamenta frustra admovisset, morbi longitudine & fastidio, vel potius impatientia victus, se tandem veneficæ mulierculæ curandum, vel potius enecandum tradidit; nam sumptis 3. aut 4. portionibus, nihil tamen proficientibus, ad colocynthid. elebor. nigr. cataput. seminis decoctum devenit, unde subortæ convulsiones quæ ad mortem comitatæ sunt.

Cadavere aperto singula intestina intus & extra observavi, maxime verò ipsum ventriculum valde magnum; namque in eo crudi humores, plurima & copiosissima pituita vitrea fuit reperta, & medicamento paulo ante assumpto commixta & confusa. Aperto autem thorace, pulmones turgidos & statibus plenos inveni, quibus per medium membranam separatis, cor ipsum valde magnum neque naturaliter formatum apprehendi: atque pericardio dissecto, ecce inter arteriæ magnæ caudicem, & venæ arterialis radicem, in cordis basi, talem excrescentiam reperi carnis, quæ unciam unam, cum sex drachmis libraret, & aliud corculum repræsentaret: adeo ut unica fuerit perpetuæ Palpitationis causa, mortem tamen non tulit, sed potius ejusmodi potionum assumptio. Eam autem excrescentiam summa qua potui diligentia liberavi, vino lotam & mundatam exsiccavi, quam adhuc reservo. *G. Garnerius Einsheimiens. in Observat.*

Filius Parei Typographi adolescens, cum frequenter utraque manu tertæ innixus, uti pueri lusus causâ facere consueverunt, corpus in altum erigendo rotaret, cœpit cordis palpitationem & pulsationem vehementem in sinistro latere, circa ventriculi ferè regionem, sentire, quam à corde eo usque propendente proficisci, sectio post mortem; sed & quod capiti innixus, cor denuò ad superiora ducebatur, satis declarabant. Nam asciticus factus, cum mortuum cum aperirem; Cor, relaxatis involucribus & vasibus illius, quibus suspenditur, subfedit, & mucrone suo, luccingenti tunicæ, circa septi regionem, deprehendi affixum. Dein & præter reliqua, hepatis, lienis, renunisque vitæ, asciticis consuetæ, etiam in medio cordis dissecto, os tribus articulis constans, cavumque & arenosa quadam materia repletum inveni. *Felix Plater. Observat. lib. 3.*

Princeps quidam valetudinarius cum ex cordis causationibus multo tempore gravissimè, affligeretur, à Medicis suo pertinaci malo re-

medium quærit: qui variis lectissimisque medicamentis frustra subsidium quærebant: accidit ut & Medicus tyro quidam, qui Principis Medico familiaris innotuerat, eodem casu cognito, inter alia quoque referret, comperisse sese superioris ætatis conscriptorum consiliorum medicinalium lectione, vermis quoddam genus cordi nonnunquam innasci, quod nullis remediis, præterquam unius alii, ejusdemque mane sumpti, usu cederet atque necaretur: Quod remedium, quia vulgare, atque ob id Principi viro, cui pretiosa & exotica potius expetebantur, neglectum est. Principe igitur morbi diuturnitate & sævitia tandem devicto & mortuo, mortis causa abdita investiganda fuit. Dissecto cadavere, deprehensus est vermis albus, præcincto rostellum, eoque corneo præditus, cordi adhærescere: quem Medici vivum ex alii succo in mensa figuratum conjiciunt circulum, serra circumquaque rependo mirifice se contorquet, & ne circulum contingat cavet; tandem verò alii vi & nidore victa concidens, circulo adhuc conclusa moritur, unde non tam morbi causa legitima, quam certa & indubitata remedium vis manifeste innotuit. *Johan. Hebenstreets libell. de Pesse.*

Cognitum habemus Treveri virginem diu multumque de cordis, tum dolore, tum tremore, conquestam, & mirum in modum tortam & excruciatam fuisse; remediis, quæ ad robur cordis aliàs sunt, frustra tentatis, tandem ægra moritur. Secto ad veri indagationem corpore, vermiculi in corde, mali hujus tam funelli, causæ deprehensi sunt. *Ex M. E. Stakeri.*

Excitari potest cordis Palpitatio a plurimis causis. In quodam vidi genitam ab abscessu in vena arteriosa. *Scholiogr. Hollar. ad cap. 29. lib. 1.*

Repertum est Romæ nuper in Beato Philippo Nerio sacerdote, qui sæpius in cordis Palpitationem incidebat ex vehementi extasi, cor valde amplum, & arteria quæ ducit in pulmonem duplo latior naturali: Eidem dux costæ mendolæ in latere sinistro abruptæ a suis cartilaginibus, follis instar elevabantur & deprimebantur dum palpitationem pateretur: quo remedio divinitus servatus est ne exstingueretur, usque ad annum octuagesimum. *Andr. Casulpin. Casopriæ artis Medic. lib. 6. cap. 20.*

Vidimus palpitantem affectum ob aneurisma in Liene. Quod si in corde ipso aneurisma sit, lethalis est affectus. *Ballon. lib. 1. Conf. 29.*

Non vulgariter nos mirari cœgit Nobil. viri Cor, in cujus sinistro ventriculo glandulosæ, sed nigricantis interim carnis libras duas reperiimus, corde instar uteri ad hujus carnis molem extenso, & homine ante mortem, habitu utcumque melancholico, & ad morbum vigili, & pulsus præditus miris sanè modis inæquali & vario, quique arteriæ contractionem manifestè ostendebat: Ita enim multis mensibus ante mortem (cum tamen ante mortem veluti sanus obambulare) pulsus aut arteriæ contrahi visa fuit, ut trium aut quatuor pulsationum ictuumque intervallo contracta maneret, velutque expulsionem moliretur: Imò postremis vitæ septimanis, ex novem ictuum intervallo, tres tantum, aut dux dilatationes arteriæ, tactui subinde occurrerunt: Deinde animalis facultas cum principis animæ functionibus, ad



mortem usque satis constabat, quæ non tam ex cordis vitio proximè obvenit, atque ex sinistro cruris gangræna, quæ ab impedito arteriæ pulsu occasionem perinde duxit, ac si internissi illi ex cordis vitio pulsus cruris illius nativum calorem aptè ventilassent: Potissimum cum ex Sclopeti ictu, ante aliquot annos, ipsi vitiosa esset arteria quæ fibulam petit. *Vesal. lib. 1. cap. 5. de human. corpor. fabrica.*

Quidam ætatis anno 30. circiter ex renum ulcere laborans, integro die ante obitum sine pulsu jacebat. Dissecto cadavere, uterque cordis ventriculus duabus quasi turundis oblongis, adipis concreti obstructus est. *Vesalius Epigram. Observat. 34.*

Quæ in partibus internis contingunt aneurismata, sunt incurabilia, qualia frequenter accidunt his qui litus & sudores ad curationem luis veneræ multoties pertulere, quod sanguis attenuatus, & nimium inde incalescens, nec jam arteriæ conceptaculis contineri potis, ipsam in eam distendat amplitudinem, ut manum in pugnum complicatam capere possit: Quod ego animadverti in corde veltarii cujusdam, qui ex aneurismate arteriæ venosæ, repente, dum pila palmaria luderet, rupto vase, corruit. Ille dum viveret micantium impetu arteriarum omnium pulsum, ingentemque toto corpore calorem se percipere dicebat, cujus rei occasione sæpe animo linquebatur. Dom. Sylvius interdixit illi vino, aquam coctam pro potu, & pro cibo lac pressum, caseosque recentes esse, atque cataplasmatibus imponi dolenti & tumenti loco voluit. Vespere prisana ex farina hordei & semine papaveris utebatur, clystere verò ex refrigerantibus & emollientibus, aut cassia sola per intervalla utebatur, quibus remediis multo melius sibi esse dicebat.

Dissecto cadavere, magnam sanguinis copiam in thoracis capacitatem effusam inveni, arteriæ vero corpus, in eam quam dixi amplitudinem dilatatum, internamque ipsius tunicam osseam, quò ego, nomine ejus, paulò post, cum magna admiratione, copiam in Scholis Medicorum feci, dum cadaver publicè dissecerem. *Param lib. 6. cap. 28.*

Anno 1654. in Principis cujusdam filiolo octo dierum observavi casum satis rarum. Toto vitæ vix cœptæ tempore submisit nec clarè vagiebat, non aliter ac si hypochondriæ essent inflata, lac sugere recusabat, alvus erat difficilis, excreta dura. Mox & inopinatò paroxysmò quodam corripitur, primò, ut putabatur, Epileptico, qui tamen cessavit, paulò post iterum rediens. Facies tota, ut & corpus totum, rubicundum primò, mox ad puniceum colorem vergebat, respiratio intercipiebatur oculis plane immotis, pedibus manibusque parum saltem calcitrantibus, pulsus nec in carpo nec in cordis regione observatus ullus. Ita decubuit pro mortuo sæpius habitus per quadraginta octo horas, intra quod temporis spatium centenis ejusmodi paroxysmis ex intervallo primum minoribus ad finem vero tendente vita majoribus divexatus, remediis omnibus irritis. Post mortem autem D. D. Wernero Imperatricis Leonoræ viduz Medico administrante me aperto cadavere, nutritioni dicata viscera omnia optimè constituta reperta, aqua saltem citrina in cavi-

tate abdominis cochlearis mensura stagnante. Circa superiores autem utriusque lobi pulmonum partes acuminata duo tubercula conspiciantur, variegati coloris ex rubro puniceo, quò fere totus pulmo conspiciendus erat, quæ aperta vomicas referebant, amurca instar materiæ meliceritidis ex albo nigricante plenas. Quæ vomica proculdubio hujus asphyxiæ causa extitere, denegata circulatione ex dextro in sinistrum cordis ventriculum, quam primis vitæ diebus, anatomolis venæ cavæ & arteriæ venosæ in Embryonibus conspicienda supplere potuit, ea autem pedetentim coalescente, defecit sanguinis motus, & orta ista asphyxia. D. D. Werner causam flatibus ex ventriculo & mesenterio elevatis ob materiam fermentantem adscripsit, anxietque in viscera, ut sententiam contra me, qui pro pulmonum affectu quodam, sub quo *ῥῆξις*, subsit, habui, tutaretur suam inquisivit, exiguum quod in plicis ventriculi hærebant, phlegma tenaciter, antequam pulmones inspexeramus, tanquam flatuum causam accusans, postmodum facillimè in aliam sententiam prolapsus. Renes solito majores reperti & rubicundi. Hepar sat magnum saturata rubedine. Lien nigrior paulò, quàm in infantulis solet, coloris, substantia aliàs & figura naturalis. *Paul. Spindlerus observ. Medic. centur. à Carol. Raygero edita.*

Latro quidam è patibulo quò suspensus fuerat, veluti jam mortuus, sed qui tamen adhuc viveret, depositus atque curatus convaluit; verùm ut erat homo ingenio malo pravoque, ad eadem statim scelera revolutus, pro quibus antea extremum promeruerat supplicium, iterum capitur atque suspenditur. Hominis admirati nequitiam, mortui cadaver incidendum curavimus, & inventum est cor ejus undique pilis refertum. Hoc idem inventum est in corde Aristomenis Græci, qui solus perhibetur integras acies pugnando in fugam vertisse. Est ergo non tantum scelesti ingenii signum, sed quandoque etiam raræ fortitudinis. *Anton. Benivemius de abdit. morbor. & sanas. libro, cap. 38.*

Annorum circiter 20. homo, corpore gracili ac teneri, per aliquot annos cordis palpitacionem passus est, quæ adeò violenta fuit ut costæ extra locum protruderentur, imò tumor à vehementi palpitacione in sinistro pectoris latere manifestè videbatur. In carpis pulsus remissus satis. Se quietum tenere cogebatur, nam ad quemvis motum paulò celeriores anhelus fiebat, & cum animi deliquo palpitatio augebatur. Tandem post crebras Lipothymias, ac paroxysmi exacerbationes vehementiores; cum manuum ac pedum infrigidatione, mors, quæ nihil exorabilius, colophonem imposuit.

Dissecto Thorace, Cor tumefactum erat, præsertim dextra cavitas, quæ & sanguine coagulato non tantum tumuit, ast carnosum latus magis carnosum & crassum, quàm solet, fuit. Arteria & vena pulmonalis coagulato cruore distendebantur, vena autem sinistram cordis ventriculum ingressura interiùs cartilaginosa substantia ferè claudabatur, adeò ut vix aciculam crassam admittebat.

Causa hujus Palpitacionis manifesta est, omne enim malum ab occlusionem venæ pulmonalis depeudebat. Cum enim sanguis per sinistram



stram cordis cavitatem liber transitus non patescit, in cordis ventriculo dextro, ac pulmonibus, eorumque valis certe stagnare cogitur; & per consequens novimus sanguinem stagnantem coagulari; hinc sanguis grumosus & coagulatus ortum habuit, imò & cordis vasorumque pulmonalium intumescit, præsertim dextri ventriculi; qui & magis musculare, crassum & robustum erat, quia occludente venâ pulmonali, fibræ cavitatis dextræ ea fortius sanguinem in pulmones propellere debuerint; hinc vis istarum fibrarum aucta fuit, & fibræ magis magisque distentæ; ut illi qui a juventute continuus laboribus adulescent, robustiores & magis torosi sunt, quam qui delicatiori vitâ fruuntur.

Facile quoque percipimus, quare cor tam vehementer coctis allidebatur, ac costæ extrorsum protruderentur, hoc quippe factum fuit à motu cordis fortissimo, n. m. cum sanguis venam pulmonalem subire non poterat, motus quali duplicabatur, quia sanguis se reflectere cogebatur.

Ad quemvis motum concitatiores anhelus fiebat, ex eo quodd sanguis tunc celeriori motu per pulmones concitatus, ibidem gradum progressionis sistebat: atqui hoc modo impletis a sanguine stagnante pulmonibus aeris introitus excludebatur, & anhelus fieri coactus fuit.

Arteriarum pulsatio in manuum carpis admodum remissa fuit, non mirum nam ex cordis sinistro thalamo paucum sanguinis exibat, unde & succi cerebrales pauca in quantitate in cerebri glandulosa parte segregabantur, qui & elater pulsum, omniumque actionum humano corpore sunt.

Morte tandem appropinquante, sanguis ferè in pulmonibus fixus stagnabat, quare & partium externarum frigus oriebatur, nec non lipothymia crebræ. *Stephan. Blancard. in Anatomia Practica.*

Similem ferè observationem anno 1683. medio Decembr. hic Amstelodami, præsentibus Freder. Ruisch, van deil, van Tongeren, aliisque Doctoribus & Philanatomicis, habuimus.

Vir, nisi fallor, 30. annorum, cum vivebat quotidie de tussi cum anhelatione pectoris, ac gravitate circa hepatis regionem querebatur: ac à motu corporis celeri in cordis Palpitationem incidebat, quæ postea sensim cessabat. Aliquot diebus ante obitum crebras lipothymias patiebatur.

Thorace dissecto, aliquot libris lymphæ, recte ex vasculis lymphaticis effusa, pectoris cavitas repleta erat. Cor duplo majus quam solet. Arteria magna unâ cum valvulis circa cor, ossæ, seu potius petrosam duritiem acquisiverat, & tam arctè occlusa, ut vix crassiusculæ aciculæ glandem admitteret. Hepar planè schirrhosum fuit.

Per angustatam & penitus fere concretam arteriam, tanta sanguinis copia eam pertransire nequibat, quàm quidem decuit: ideoque in ipso corde stagnare, ac motu suo reflecti cogebatur, unde jugis cordis palpitatio, ejusque laterum dilatatio, & magnitudo solitam peripheriam superans. Cum porrò sanguis nec pulmones liberè pertransire poterat, lymphatica

vascula adeò premebantur & coarctabantur, aut ruptis vasculis lymphæ in pectoris cavitatem efflueret.

Sanguis interim & cor & pulmones subire impotens factus, in ipso hepate, à quo ad cor magna quantitate solet ascendere, morari nimis coactus fuit, ac interim ex mora diuturna in eodem coagulatus fuit & corruptus, unde circa cordis regionem dolor gravativus. Cætera viscera satis sana erant, quia a sanguine minùs lædi poterant. *Idem ibidem.*

Civis quidam quinquagenarius de dolore continuo capitis & circa scapulæ dextræ regionem queritur, imò de tussi Palpitatione cordis, atque his aliquot mensibus vexatus fuit.

Aperto cadavere, hepar erat schirrhosum, lien ex obstructione solito major lectus humore lymphatico plenum fuit: pulmonis dextræ pars fere absumpta & sinistra magnopere inflammata. Pericardium h. u. mediocriter dilatatum puris & saniori sanguinis ultra quatuor libras continebat. Cor lætum non erat nisi superficie tenuis.

Ex hepatis schirrho & lienis intumescencia, pulmonisque dextri consumptione, liquet, liquores per universum corpus circulari ductu liberè vehi impotentes, in iis visceribus moram contraxisse: ex mora corruptio, inflammatio, dolor, tussis, cæteraque symptomata. Prima humanæ sapientiæ laus est valde similis posse distinguere. Quis Apollo Hydrocardiam divineret? Est procul à nobis sæpe præsentia veri.

Post mortui cadaveris ~~interitus~~ pectus & pericardium, ex ruptis ab obstructione lymphaticis, lymphæ corrupta plenum. Ager, cum in vivis esset, de destillatione frigida ad latera colli in pectus querebatur. Num ex cerebro, de cujus dolore molestabatur, per membranarum intercapedines, liquor ibi resistans in pulmones & pericardium descenderet, nec ne, dubium, cum viâ non patebat? Fortasse leves nervorum convulsiones fuerunt.

Humores in Pericardio collecti, suâ acrimoniâ ipsum cor affecerunt, unde sæpe in Palpitationem incidit; imò ob copiam collecti in Pericardio humoris, cordis latera adeo compressa, sanguinem dimittere non potuerunt, quod sæpe fit, cum sanguini liber transitus per cordis thalamos denegatur. Nunquam quis in Palpitationem incidit, nisi in corde, vel circa ipsum, obstaculum sit; quod ex inspectis cadaveribus semper manifestum est, *Idem ibidem.*

Vir nobilis post naufragii terrorem queritur de Palpitatione cordis, ipsum ab aliquot diebus infestante: pulsus ei continuo inæqualis. Cum hoc symptoma diu perseveraverat in difficultatem spirandi incidit. Postea omnibus in peius ruentibus, pulsus in carpo nullus; at supra regionem cordis frequens, debilis admodum & inæqualis. Crura & pedes inflati. Ante mortem sanguinem nigerrimum & crassum ac glomeratum exercebat. Ager, ad extrema redactus moritur.

Visceribus perferutatis, cordis uterque thalamus concreto sanguine distentus, imò ipsi pulmones plurimo sanguine referti. In sinistra cordis cavitate, caruncula satis magnæ inventæ substantiam pulmonum æmulantes, quæ arte-



riam magnam obstruunt.

Post terrorem sæpe coagulatur sanguis, quæ in pulmonibus & corde hærens ejusmodi symptomata concitat. *Idem ibidem.*

Quidam à tribus annis in Palpitationem cordis incidit, quæ, cum nimium laborando fatigasset, magis exacerbatur.

Post obitum in aorta supra valvulas semilunares tria corpuscula membranis tecta, invicemque unita; inventa, quibus sanguinis exitus præcludebatur. Ad ejusdem arteriæ ex corde exitum osseum quid longitudine transversæ digiti repertum. *Idem ibidem.*

In Virgine præter propter quinquagenaria post absolutam vigintiquatuor horarum *apoplexiam* extincta, polypos grandiores in corde multo ampliore, quam illud quod tanquam stupendæ magnitudinis depingit Kerkringius in Spicileg. sui Anatom. observ. 16. invenimus. Polyporum autem illorum alter auriculam cordis dextram lato & crasso principio prope opprensus, contractior sensim factus in ventriculum dextrum descendebat, ejusque infimæ parti per sui extremitatem affigebatur, unde quasi revolutus in amplum abibat corpus, quod polypi velut alter truncus, postquam totam prædicti ventriculi longitudinem decutisset, per varias venarum arteriosarum ramificationes aliquantulum divagabatur. Alter polypus e pluribus radicibus, in ventriculi cordis sinistri, tum fundo, tum parietibus, positus, ortus, duos prope digitos eâ sui parte quâ ventriculum occupabat, latus, dimidium crassus, circa prædicti ventriculi exitum multum contrahebatur, & in aortam ascendebat. Prioris substantia firmior glandulosum quid, fibris variis quasi nerveis intertextum exhibebat; in cujus medio per totam longitudinem vas sanguineum visebatur. Posterioris verò substantia e fibris quasi sanguineis glutine quopiam albo infarctis, compaginata erat. De his, ut & de Polyporum generatione plura vide in *Bibliotheca nostr. Anatom. Parte 2.*

## CORNEÆ TUNICÆ MORBI.

*Curationes, Consultationes, & Observationes ex variis.*

### *Curationes.*

**T**unica Sclerotica seu dura dicta, à dura matre oritur, estque crassa & posterius opaca, hinc ejus partem anteriorem nuncupant tunicam Corneam, quia est sicut cornu politum & pellucidum; cui tunicæ plures contingere solent affectus, & primò ipsi accidit *Crassities* quædam & nihil aliud est quam obstructio pororum tunicæ hujus Corneæ; inde ægri hoc affectu infestati quasi per fumum videre coguntur, & ipsis nebula quasi in superficie apparet.

*Nebula* verò est color Corneæ parum mutatus ab humore subtiliori illapso ita factus.

*Albugo* aliis dicitur & *Leucoma*, estque macula alba Corneam nostram tunicam ita densam reddens, ut radiis transitus denegetur. Des-

cribi potest, quòd sit macula quædam Corneæ tunicæ, ex condensatione humoris impacti, vel propter cicatricem vulveris ulcerisque, vel propter obstructionem à viscido crudoque humore inductam oborta, visionem lædens.

*Differt a Nubecula* (*νεφελία*) dura crassitie. Generaliter utraque species cicatricum *idem* nomine venit: nemo Medicorum vix has species discernere potest.

*Pustula* super Corneam tunicam sunt tumores à vi externa, & continui solutione ut plurimum exortæ.

*Hypopyon*, nonnullis *Pyosis*, aliis *Lunella* audicus, est puris quædam sub tunica Corneæ (*seu potius inter lamellas e quibus compaginatur*) collectio, aliquando post Ophthalmiam male curatam, interdum etiam post sugillationem, materia in pus transmutatâ, oboriens.

*Ulceræ* huic membranæ & sæpe accidunt ab acri acido, lympham ex glandulis oculi emanantem ita corrumpente exorta: ut & *Vulnera*, facile enim fieri potest ut à re externa violenta Corneæ hæc membrana rumpatur & humor aqueus effluat. Sic & crosa & rupta Corneæ tunicæ oritur tumor qui Græcis *Staphyloma* dicitur.

*Part affecta* est tunica Corneæ dicta, quæ involvit totum oculum anteriorem, & sub se humorem continet aqueum.

Affectus hi faciles sunt cogniti, & ipsos nostros feriunt oculos. Cognoscitur *Crassities* & *Nebula* exinde, quòd nebula quasi in superficie appareat, & ægri quasi per fumum videant. Sic & *Pustula* quæ sunt tubercula & ipso visu cognoscuntur, magnitudine granum milli æquant. *Nonnullæ* sunt cum inflammatione, plures absque hac; aliæ sunt superficiariæ, aliæ profundiores, aliæ magis videntur, & facile totam carneam corrodere possunt.

*Hypopyon* vero ex eo cognoscitur, quòd pus, vel nigrum totum oculi occupet, vel iridem adimpleat, & per tunicam corneam pelluceat, maximè commotò oculo. vel portio ejus haud ita magna in cornea unguem resectam, vel lunam decreascentem seu falcatam præsentet, unde etiam nomen adipiscitur *Lunella*.

*Ulceræ & Vulnera* nullis peculiaribus indigent signis, & facile à perito Chirurgo solo adspectu, & relatione ægri dignosci possunt.

*Causa Crassitiæ & Nebula* consistit meo iudicio in obstructione pororum tunicæ Corneæ à particulis humoris viscidioribus: dictæ enim particule facile ei agglutinantur, & crassitiem inducunt, atque vel ex massa sanguinea, vel ex lymphæ glandulis exudante sufficiuntur; Plurimumque verò hic morbus fit ab acidorum ac frigidorum applicatione, unde tubuli facili negotio obstruuntur.

*Albugo* seu macula alba, oritur à crassa & viscida materia, circa has partes se coagulante; sic quoque à cicatrice post vulnus vel ulceris facta. Particulæ enim viscidæ tunicæ Corneæ poris intrò foràs spectantibus, adeò sæpe infarciuntur ut corpus aliquod membranaceum præsentent, unde necesse est ut suam amittat perspicuitatem ac crassior evadat, quod in senibus non raro contingit, ob fibrarum durtiem ac rigiditatem nimiam, quod irreparabile inducit damnum. *Idem* ferè contingit à cicatrice



trix ex ulcere relicta, cuius occasione densior redditæ Corneæ *Leucoma* contrahit, cuius magnitudo variare solet.

*Pustulæ* hujus Corneæ oriuntur, vel à solutione continui ab externa injuria facta; vel humor partis coactervatus ac collectus stagnationem & obstructionem facit unde pustulæ nascuntur, aut propter frigus fit tubulorum contractio, aut per acidum humores coagulans, aut per remedium externum malè adhibitum eos incrassans; unde illorum præcipue particula salina malè figurata, tubulos prædictos transire nequeunt; ac propterea tam dense agglomerantur, ut circa tubulos corneæ restitent, ac hæc pustulas inferant.

*Hypopyi* causa proxima est puris collectio in Corneâ. Pus autem exinde oritur, quod ipsi succi in graviore Ophthalmia, aut contusione, vel sugillatione extra vasa diutius constituti corrumpantur, & acescere incipiant, sicque multas particulas acidas inter fibras hujus tunice transmittant, quæ tubulos earum obstruentes, & pristinas transmutantes figuras, materię subtili consuetum denegant transitum, hinc illa fibras impetuosius agit, unde fibræ irritatæ ad sistendum illum in regionibus suis excitatum tumultum, omnes concutiunt canales, qui tum inordinate suos effundunt succos, quo impetus ille materię subtilis vi contraria sedetur. At varia & intemperata sic conluit diversorum humorum, etiam chyli crudioris, miscela, quæ peculiarem sibi efformat fossam, modo in medio Corneæ majorem, & *Hypopyo* cernitur, modo in ejus sine sub initium Uveæ, unde figuræ hujus tunice se accommodare tenetur, & ungulam unguis resecti, seu lunæ falcata præsentat, & propterea nomen *Lunellæ* nanciscitur.

*Vulnera* in hac parte, ut & in omnibus aliis, causa est continui solutio & divisio facta a vi externa. In his vulneribus sæpe particulae ramose extra tubulos prolapsæ, sibi invicem implicantur, & concreverunt in materiam quandam fibrosam ac candicantem, non dissimilem illi materię quæ conspicitur sæpe in aqua, quæ ex V. S. profluxit, & etiam igni imposita inspissatur. Sæpe etiam ex contusione, vascula sanguifera dirumpuntur, e quibus sanguis sub ratione sanguinis emanans stagnat, ac livore inticit partes sibi vicinas. Sic & raro vulnus in nobili hac parte sit, quin fibrilla plures simul dirumpantur, & diruptæ resiliant in cincinnos, atque ita tubulos multos obstruant, in quibus humores circulant. Accumulati premunt vasa sanguifera vicina, sic ut sanguis stagnet, unde etiam coarctes tumor & rubor in toto ferme oculo oboriri solent. Dolor verò & ardor oritur quando sanguis in vasis suis capillaribus stagnans & evalatus brevi acescere incipit. hincque particulis suis: pungentibus secantibusque fibrillas vicinas solito citius & impetuosius commovent. Lachrymæ quoque sæpe emittuntur, & hoc fit, quando particulae acidæ ejusdem sanguinis stagnantis & coagulati imitatione sua leves quasdam concussionem inducunt in glandulis oculi, unde contentus liquor excutitur, adsunt enim octo vel novem ductus novi, ab Anatomicis hætenus non observati, qui e glandulis in oculum stillant lachrymas, & à quibus oculi irrigantur.

Ulcus Corneæ est solutio unitatis ab acredine corrosiva, seu acido corrosivo producta, hic enim pervertitur alimentum Corneæ proprium in excrementum acre, & in saniem transmutatur. Ulcera hæc seu dictum, oriuntur ut plurimum ab aciditate hac peregrina, in sanguine vel lymphæ quacunque occasione oborta, & sibi imperium rapiente circa hanc tunicam corneam, & tyrannidem suam, lacerando, urendo, dividendo, & absumendo exercente. Sic quoque post vulnus factum facile acido exuperante in ulcus fit transitus, cum vasa plura rumpentes plures succi evasantur.

Omnes hi affectus cum partem nobilem occupent, periculosi & curatu difficiles sunt, & cum in Crassitie; Nebula & Albugine acerbis medicamentis opus sit, facile malum his augeri potest. Si Albugo fuerit orta à cicatrice, tum curatio est difficilis, in junioribus, & in senibus nulla. Hæc quæ est à viscida materia coagulata ab acido, facilius curatur.

Pustulæ vero si sunt in amata tunica, facilius, si sunt juxta pupillam, difficilius; si Corneæ in partem internam rumpitur, nulla ratione curari possunt, tunc enim transit in ulcus. Superficiariz etiam profundioribus facilius curantur.

Hypopyon non caret periculo, etenim si materia diutius hæreat sub Corneâ, & majorem induat acrimoniam, quod dolor vehemens subinnuit, fieri potest ut propter spirituum nimiam coagulationem sublequatur gangræna, cum aliis semper difficilis sit curationis, pus enim jam maturum apertionem tunice pollulat, & sui exemptionem, at tunica non sine ulla instrumento pungitur, & foramen minusculum non satis commodè puris egressum permittit, eo autem existente majore humor aqueus facile simul effundi potest, & visus debilitari, quem cicatrix etiam relicta hebetare solet, ob incrassationem tunice ea in parte in qua remanet.

Si Vulnera non totam dilaceraverint tunicam, hoc est si non tam altè penetraverint, apparet aliqua spes curationis, si verò Corneæ fuerit rupta, & humor aqueus effluxerit, quod in Ulceribus accidere solet, omnis curandi spes evanuit. Tum si vulnus sit angustum minus periculi habet, si ad uveam verò procedit incurabile est. Sic etiam quòd ulcus sordidius & profundius latiusque est, eò curatu difficilius existit, quia in his partibus membranosis ichor, seu sanies tenuis, acris & minus albicans emanare solet, quod maxime impedit partis curationem.

Quoad Dietam generatim fugienda quæ sanguini & lymphæ acorem conciliant, eorumque circulationem ac motum impediunt; è contra verò usurpanda quæ acorem temperant, corrigunt & succis celeriore motum impertiunt, imprimis in vulneribus oculorum lumen fugiendum, & ægri in obscuro detinendi sunt. In specie potius Thee commendatur.

In Curatione certè Chirurgia nobilia nobis exhibet præsidia, conducunt enim fonticuli, vesicatoria, & setacea.

Ex Pharmaceutico fonte in Crassitie Corneæ, Nebula & Albugine, conveniunt interna remedia, & præ omnibus saburram quocunque in loco



in loco latentem eliminantia; quod obtineri potest per pilulas Cephalicas sive Ophthalmicas meas sequentes decrefcente luna exhibendas.

℞. Extract. marocost. ʒss. pilular. lucis maj. ʒj. de succin. Craton. ʒj. Diagrid. sulph. gr. xv. sal. euphras. gr. x. succin. volat. gr. viii. Olei fennicul. still. gtt. v. f. Massa. Dentur vesperi cubitum ituro 5. & subsequente mane adhuc 6. vel 7. & dein danda sunt stomachica & cephalica, v. g. sal. euphras. anthos. thee, lavend. beton. cent. min. trifol. aquat. rad. calam. arom. ex his parari possunt infusa, (uti cum Thee facere solemus) decocta, essentia, tinctura, extracta, conservae, &c. Sic & vinum medicatum conducit sequens:

℞. Rad. caryophyll. calam. arom. ana ʒiʒ. Cort. rad. cappar. salisfr. tamar. mediani frang. ana ʒij. Herb. euphras. mj. beton. fol. rosim. ana p. ij. flor. cent. min. anthos, ros. ana p. j. Cort. citri, aurant. sem. anisi, fenic. cinnam. ana ʒiʒ. M. f. nodulus in 5. vel 6. mensuris vini infundendus, de quo in prandio & cena primus haustus sumendus. Praesertim hic pro usu continuo sal. vol. C. C. quod hodie in cena cum vino assumere solent plures, & non absque emolumento; sed ne quid nimis.

Hic quoque topica magnum afferunt saepe solamen, eo enim incumbendum ut pori obstructi referantur, & acidum coagulans & nervis inimicum, corrigatur; specifice in crassitie, nebula & albugine, prodesse dicunt aquam anagallidis ex succo destillatam, quod euphorion erit remedium, si vel vitri. alb. vel sal. vol. C. C. vel succini parum acuat, ad obstructionem tubulorum eo melius referendam & spiritus animales afficiendos, qui quasi freno injecto torpidi in cerebro detinentur, item axungia leporina illata proderit. Imprimis hic prodest aqua Regni Hungarici ad gtt. 2. oculo instillata, mira enim hac praestitit aqua.

Hae tamen remedia commodum aliquod praestare poterunt, si vitium sit ab humorum crassitie vel impuritate, sin a filamento quodam processus ciliaris a membrana sua libero, & humori aereo innatante, quod obscuritate & nigredine sua radiorum lucis transitum impediat & nebulosam praestet visionem, neque haec, neque alia remedia quicquam praestare posse iudico, & optimum in hoc affectu remedium erit, vel neglectus remedium, vel quies & locus non ita luminosus, ne spiritus animales copiosius allecci filamentum illud fortius agitent & plurimum resolutionem intendant. Optime & hic conducunt vesicatoria, setacea, ac frustulum radic. thymeleae apici auris intrusum, sequens vero collyrium erit egregii usus ut albugine.

℞. Decoct. fennigr. & cydon. in aq. rosim. fact. ʒij. Lapid. calamin. ʒj. Sacch. Saturn. myrrh., croci orient. ana ʒss. Arisusti ʒss. f. collyrium. Aqua vero sequens ad oculorum affectus egregia est, roborat enim visum, tollit nebulas, inflammationem, sordes, &c. Paucis guttis in oculum inditis ter de die.

℞. Vin. alb. lbij. Aq. rosar. lbss. Chelid. fenic. euphras. rutae ana ʒij. Tutiae praeparat. caryophyll. sacch. canth. ana ʒj. Caphura, Aloes ana ʒiʒ. Digerantur per plures hebdomadas.

Cicatrix difficillime curatur; notum est nobis est exemplum illud a Platano in oculis relatum de cicatrice casu per pulverem sublimati loco sacchari canthi oculo inspersum curata, quamvis in principio tanta insequuta fuerit inflammatio, ut de oculo periculum timeretur, quare istiusmodi casus non semper adeo prompte imitari licebit.

Pustulae curantur fere ut inflammationes, in primis prodest sequens;

℞. Aq. euphras. ʒij. Sacch. Saturn. ʒj. M. Ubi vero animus est exsiccare & agis, tunc tutia & lapis calaminar, reliquis addantur.

Quando post graviores contusionem aut inflammationem oculi sanguis evalatus & corruptus discuti nequit, ideoque suppurari, & Hypopyon fieri incipit, ipsa illa materia purulenta omni studio discutienda erit, ne ulterius ibi sumat incrementum; quare oculus abluendus erit spiritu vini camphorato, cui succus chelid. maj. & cent. min. immixti fuerint, vel sors instituat ex decocto rad. valerian. raphan. herb. euphras. chelid. maj. flor. meil. chamom. lil. alb. pal. avenae, vel si ne sic quidem discuti possit, imponatur cataplasma ex pulpa pomi putridi & passul. cum mucilag. sem. fennigr. lini, altheae, & paucis stercore columb. Hac etiam de causa illinatur saepe oculus specifico illo ophthalmico Hartmanni, ex fellib. gall. anser. cum paucis melle in vitro in linimentum redactis. Materia autem purulenta tam copiosa existente ut omnino discuti nequeat, instituenda est punctura, & foramen ea magnitudine formandum est, ut pus illud commodè eximatur, & quidem punctio haec ea in parte corneae instituat in qua tunica omnes concurrunt & terminantur, ad iridem videlicet, ubi tutius pungere licet. Prospiciendum quoque est ut pus omne eximatur, ne quid reliduum maneat humores & succos facile inficiens, & novae puris collectioni ansam praebens, qui propter si nec sponte, nec levi pressione emanabit, siphunculus quidam foranini commodè est intrudendus, quo pus a famulo exsugatur, qui affabrè ita aptandus est, ut in medio ventrem quandam contineat in quem pus exsuctum adiuvatur, nec fugentis os cum nausea subintret, & ab ulteriore suctione molestia illa abarceatur. Fure tandem egresso, fiat ablutio vel aqua hordei cum melle rosaceo, vel sequente collyrio.

℞. Aq. verben. ʒj. Chelidon. maj. ʒiij. Succi cent. min. ʒj. Thur. tutiae praeparat. ana ʒj. Myrrh. gr. vi. Vitriol. alb. gr. iv. M. Consolidatio sollicitè instituat, ne cicatrix adeo magna relinquantur, & adhiberi eadem hic possunt quae jam in curatione vulnerum & ulcerum sumus proposituri.

Vulnus Corneae admodum providè debet tractari, quia est pars nervea, maxime proinde eo incumbendum est ut circulus sanguinis & reliquorum succorum restitutus, atque acidum temperetur, & cum vulneris huius curatio consistat in unione partis membranosa, soli naturae, cuius id opus est, ea committenda, si enim succus nutritius, lymphae & sanguis bene constitutus sit, tanquam balsamus easdem partes divisas reunit; convenit ergo decoctum vulnerarium. Chirurgus tantum hic applicet remedia membranosas partes consolidantia,



earundemque corruptionem ab acido inductam impedienda, qualia sunt vulneraria & balsamica, & hic, ut in aliis vulneribus, aer externus & peregrinus ante omnia arcendus est, nihil enim magis lædit quàm aer & lumen, acidum enim inest aëri quod vulneribus maxime est infensum, & acor semper est intensior in partibus nerveis, quàm in aliis. Ad balsami ergo nutritivi & quasi glutinosi aciditatem impediendam, & jam factam tollendam, & motum succorum conservandum, conducunt salia volatilia oleosa temperata, talia enim acidum corrigunt, ut sunt balsam. Peruvianus, balsam. sulphur. oleum hyper. terebinth. e.g.

℞. Aq. veron. euphras. plantag. ana ʒij. ocul. cancr. præparat. corall. præparat. ana ʒj. Sacch. sat. ʒʒ. Tutiz præpar. ʒij. F. collyrium. Sacculi quoque imponendi sunt ex fruogr. hyssop. flor. chamom. euphras. lavend. in vino cocti. Temperata debent applicari, non acrida, non acida, non urinosa, quia nervosis partibus sunt inimica, & magis acidum augent quàm minuunt, nec applicentur acrida volatilia, detergentia, aut mundificantia dicta. Hic & laudanatur Saturnia, imprimis oleum Saturni rubrum, si enim destillatur Sacch. Sat. prodit spir. oleum flav. & rubr. quod Chirurgis secretissimum est, vel instilletur sequens.

℞. Olei destill. terebinth. ʒj. Spir. vini ʒj. Camph. gr. vi. M. Cnosseli experimentum ad dolores compescendos in oculorum vulneribus est sequens.

℞. Pomor. dulc. num. 3. coq. in f. q. Aq. euphras. & rosar. ad mollitiem, trajiciantur per setaceum, pulpa trajectæ adde sacch. ʒij. camph. gr. v. M. applicentur. Aqua album. ovar. Hartmanni, vel cum aq. veron. & cheresol. laudatur, item succus in venticulis ulni collectus, de quo videatur. *Henric. ab Heers in Observ.* Laudat & Burthius, Romæ non ita pridem mortuus aquam vitrioli mart. mysteriose paratam; alii aq. chelidon cum camphora, ridiculâ hac ratione, quod hirundines occæcatis pullis visum restituant, ut sua chelidonia, quod tamen potius fîgmentum censemus.

Ubi simul aliquid in oculum illapsum fuerit, sive pulvis, sive festuca, sive musca, hæc manu Chirurgi ope instrumenti eximantur, & dein applicentur acidum absorbentia & demulcentia, ut sunt mucilag. sem. cydon. psyll. cum aq. appropriat. Sic D. Mutillet Chirurg. Aulicus nolter experientissimus, ex puella rusticæ 17. annorum, oculo sinistro festucam sub tunica cornea super pupilla infixam, forcipula feliciter exemit, & dein appositis collyriis & cataplasmatibus demulcentibus & traumaticis intra breve temporis spatium ægram curavit. Exemplum quoque novius insignis vulneris oculi curati ope unguenti Angelî Salæ, de cerussa antimon. & sequent. collyrij.

℞. Sief alb. sine opio ʒʒ. Tutiz præpar. ʒʒ. Thur. subtilissime pulver. ʒj. Camph. ʒj. Croci gr. iij. Aq. plantag. rosar. ana ʒij. M. In vulnere corneæ ubi aliquid humoris aquei effluxerit, applicetur corneæ jam staccidæ sequens.

℞. Album. ovar. num. 1. conquat. addendo aq. plantag. ʒij. rosar. ʒj. Bol. armen. terr. Japon. ana ʒʒ. Camph. gr. ij. M. Per intervalla applicetur hæc mixtura, & patiens in loco ob-

scuro detineatur. Humor aqueus ab ipso succorum motu restituitur, quia hic humor ex propria glandula, per proprium ductum ad oculum mittitur. Vide de his celeberr. anatomic. Hagenslem Nuck; tunc Professore Leidenfensi. Oculos vulneratos salivâ jejuni illita curatos fuisse testantur Misc. Medic. Phys. Observ. 92. ann. 3. ubi recensetur adolescens cuiusdam 11. annorum, cuspidè cultelli tunicam corneam uveamque ita vulneratam fuisse, ut notabilis quantitas humoris efflueret, initium vulnus, nullo alio quàm matris saliva curabatur; mater enim diductis palpebris linguam salivâ madidam vulnere admovebat, quò sensim ad curam perduxit, remanente tantum exigua cicatrice cum pupilla angustiore. Sic & Hagendhorn Misc. Med. Phys. ann. 9. sequentem historiam habet. Ancilla, inquit, casu quodam rupturam oculi experitur, quâ humor oculi aqueus tam copiosè effluxit, ut oculi figura, quæ antea globosa, jam collapsa appareat, cum hæmorrhagia, partium vicinarum timore & intolerabili dolore. Accersitus Chirurgus varia frustra applicuit, tandem verò Hagendhorn pulvisculum immisit ex cathecu, myrrh. & sacch. canth. quò immisso, & dein aquis ophthalmicis juncto, & calidè in oculum instillato, oculus pristinam recuperavit figuram, & patiens curata fuit.

Ut corneæ ulcerosæ erosio tollatur, applicentur acidum corrigentia, consilium enim tota cura in hujus acidi mortificatione, in quem finem conveniunt Saturnina, tutia, pompholyx, caput mort. vitriol. & hic quoque detergentia & mundificantia non acrida, sed temperata eligenda sunt, ut balsam. Peruv. Esto formula una atque altera.

℞. Aq. Samb. ʒj. Spir. sal. armon. ʒj. Tutiz præpar. ʒʒ. Antim. diaph. ʒj. Myrrh. camph. ana ʒj. Immittantur gutturæ quædam oculo hujus mixturæ.

℞. Aq. plantag. pomor. redol. euphras. ana ʒj. Sacch. sat. ʒʒ. Mercur. dulc. gr. xv. camph. gr. j. F. mixtura vulnere applicanda. Vel.

℞. Spir. vit. camph. ʒj. Bals. Peruv. ʒʒ. M. His præmissis, tandem ad vulneraria balsamica, farcotica & epulotica dicta accedendum est. Hic conveniunt temperata & balsamica, de quibus mox in vulneribus; Infusum flor. balaustr. instilletur oculis variolis laborantium ad exulcerationem eorum impediendam.

Ad aqueum humorem restituendum nihil aliud usurpandum, quàm superius dictum modicè adstringens, nam non aliud medicaminis genus hic necessarium, quam quod mucagine quadam labia vulneris obliniat, & viam elabenti humori aqueo quodammodo præcludat, ne aqua de novo progenita per vulnus elaboratur; dein inflammatio arceri debet, & levi adstrictione extrema vasorum apertura claudatur, quibus indicationibus jam dictum remedium absolutissime respondet: totius rei cardo in eo vertitur, ut aer arceatur à vulnere, aer enim incrassat succos circulantes, hinc non facile coit vulnus. Interne etiam nonnulla adhibenda sunt ad promovendam curam externam: Præmissis ergo universalibus, præsertim Mercur. dulc. & antimonia libus, ut & tinct. Antim. in usum ducta, semper interponendi sunt oculi cancr. cum myrrh. corall. & quando-



que cum aceto destill. propinati. Sic & conducunt omnia viperina, spir. viperar. & earundem essentia, uti & omnia remedia ex lignis conveniunt, in primis decoctum lignorum. *Joan. Dolani Encyclop. Chirurg. lib. 1.*

In albugine & nebula, præter illa communia cuius nota, egregie valet pinguedo ex hepate mustelæ Germ. *quappen Antrauppen*. Lava ex vino, & statim ita implantetur vitro, ne fundum & parietes ipsius vitri tangat, sed libere in eodem pendeat; vitrum optimè claudatur & exponatur soli aliquandiu, & hepar ferè totum in pinguedinem flavam destillat, quam collectam serva. Usus ejus est externus tantum, inungendo palpebras cundo cubitum. Fortius Operatur si intro in cibis aliquoties exhibeatur pulvis ille de carduis minorib. pratorum *Heydelsfel.* In polysteris valet aq. vitri. albi. In ulcusculis hinc (ex phlycteris scilicet natis) valet aqua ex albumine ovor. Infra de ungue, nebulaque oculorum.

Ad phlycteras, pustulas & maculas oculorum.

℞. Fel Anserinum, gallinarum & piscium an. part. æq. vitro inde, adde mellis modicum F. linimentum quo oculi inungantur.

Ad ungues, nebulas, pterygia oculorum feliciter adhibetur speculum lucii piscis.

℞. Fellis luciorum q. v. destilla in cucurbita usque ad crassitiem in aqua destillata solve aliquid camphoræ & postea serva. Crassitiem relictam extrahe cum sp. vini & sp. v. vicissim ab extracto per destillationem separa hujus extracti & sal. saturum. an. gut. i. dissolve in prioris aquæ gut. 3. vel 4. ac cum pluma in oculum mathe & vesperi immitte, videbis felicem progressum.

Alia aqua ex albumine ovorum præstantissima præparatur, quæ qualiacumque vulnera citra aliquam cicatricem consolidat, estque magnarum Virium; coquantur ova ad duritiem, dein per medium dissectis (ungeschelet) ovis eximantur vitelli, postea cum quibusdam albuminibus ad duritiem coctis & tenuiter quasi in pulvem cum cultello sectis cavernas reliquorum ovorum comple, partibusque debite conjunctis & filo colligatis in cucurbita præcisè in medium ex filo suspende, ne spondilia ab iis tangantur. Obstructio orificio cucurbitæ in M.B. collocetur & coquantur, videbis albumina secta paulatim in liquorem destillare, quem probe ex fundo cucurbitæ collectum (est nimirum satis exiguus) ad vulnera oculorum recentia cum pennæ pluma sæpius applica.

*Experimentum meum indubite operationis.*

℞. Ludum seu fortentem tartarum matulis adherentem; exsicca & tere subtilissimè, fiat cum aqua rosar. aut euphrasie collyrium, cum pennæ pluma sæpius applicandum.)

Ad reliqua quoque attende, quæ ab inflammationibus externis oculos muniunt: non dubium est, quin quævis oculorum vulnera violenter impressa, præsertim si solutio continui adfuerit. (modò crystallinus humor cum retina tunica non læsus fuerit) citra visus perditionem sanari possunt. *Joan. Hartmannus in praxi Chymiatrica.*

Corneæ tunicæ superveniunt ulcera quæ quia

sunt incurabilia, ea non attingam: humor enim albugineus, per ulcus exit, & totus diffuit. Galenus tamen asserit se vidisse ulcus in cornea curatum: Verum id in puerulo, partes autem infantium spermaticæ retici & reparari possunt, atque etiam ulcus illud, vulnere ab erosione humorum interna minime genito successerat. Verum cum ejusmodi ulcera adultioribus, & à causa interna accidunt, incurabilia sunt, & in tunica conjunctiva difficilia sunt curatu.

Procidencia tunicæ uveæ accidit cum tunica cornea erosa raptaque fuit. Eam Græci *ἐκτασις*, *ἐκτασις* nominant, cujus tres species connumerantur, ratione varietatum, formarum, licet inter se non nisi magis aut minus differant, ut Paulus & Avicenna scribunt: n. m. si ea exigua & muscæ capiti similis appareat, Græci *μυρμηκία*, & Arabes formicam nominant. Cum verò amplius, & eo usque succreverit, ut acinum uveæ representet, *καρφαλαία* quasi uvatio dicitur: si plurima facta est accessio ut palpebras transiliat, *μύδιον* hoc est malum, si vero obcalluerit *κλῶν* id est clavus tunc dicitur.

Causæ illarum omnium sunt internæ, vel externæ; ut vulnus, vel erosio, quum corneæ *ἐκτασις* ingens est, & uvea per eam procidit nullus remediis locus est. Minores curabiles sunt, & si cicatrices, & vestigia relinquunt.

Præmissis generalibus remediis, tum vacuantibus, derivantibus, tum revellentibus applicabitur parti emplastrum ex cydoniis coctis in cataplasmatis formam, ex acacia sanguine draconis, & bolo arm. simul mixtis. oculus etiam fovebitur cum aqua vel decocto plantag. rosar. rubr. bursa pastor. vel collyrio sequenti.

℞. Myrrhæ 3ij. sacch. candi 3j. aloës 3ß. aquæ fœnic. 3iij. fiat collyrium, instilletur in oculum frequenter vel,

℞. Sarcocollæ nutritæ in lacte mulieris 3ij. myrr. & thur. an. 3j. sang. drac. 3ß. fiat pulvis subtilissimus in formam alcool, & mittatur in oculum vel.

℞. Antimonii usti & loti, cerusæ lotæ, cadmix ustæ, & lotæ an. 3ij. spicæ nardi, aloës, ruth. præparatæ, & sarcocollæ nutritæ an. gr. vi. cum mucilagine tragac. & gummi Arabici, fiat collyrium; vel fovebitur oculus cum vino austero; vel collyrio è lapide hæmatite quod tale est.

℞. Lapid. hæmatit. loti & præp. 3ij. cerusæ lotæ, cadmix, licii an. 3j. amyli, antimon. tris ustorum & lotorum, gummi arabici, & opii an. 3ß. cum succo folior. olivæ, fiat collyrium; vel.

℞. Ostrearum ustar. & hæmatit. an. 3ij. fiat pulvis subtilissimus & insuffletur in oculum; vel.

℞. Ostrearum, antimon. cerusæ lotorum, & siccatorum an. 3j. hæmatit. 3iß. sarcocollæ nutritæ, ruthiæ præpar. acaciæ aloës succotr. & spicæ nardi an. 3j. cum foliorum olivæ vel caprifolii succo fiat collyrium.

Si ruptura sit ingens, & uvea tunica procidat, & in modum uveæ acini promineat, eam intus repones, imperando ut ægrotus supinus decumbat, & remedia repellentia appones, & supra eminentiam laminam plumbeam oculo fortiter alligatam adaptabis.

Sunt qui eam serico filo alligant, sensim & paula-



24. Sem. fenugraeci ꝑ. papav. albi ꝑ. co-  
que in aq. rosarum & decocto album. ovi per-  
misc.

Idem præstat oleum ex linceis combustis,



cum saliva pueri mixtum, & penna illitum elicitur hoc oleum, lintea accendendo, & inter duas patinas suffocando, materiā refrigerata, guttæ illius olei patinæ adhærentes inveniuntur.

Albugo verò à cicatrice producta, curator iis remediis, quæ cicatricem emollire, attenuare ac dissolvere possunt; cum autem ea quæ cicatricem conterunt, acrimonia non careant, majori cura universales evacuationes ac resolutiones præmittendæ sunt, ne fluxio humorum attrahatur ad partem. Illis igitur, ut supra dictum est usurpatis; primum totus emollientes, aut suffumigia adhibere convenit, quæ supra proposita sunt deinde abstergentia & discutientia remedia admovenda sunt. Primò leniora, qualia sunt supra proposita, præsertim aqua mellis composita. Postea vero ad fortiora veniendum est, qualia sunt fella piscium, ut uranoscopi, pallinacæ, lucii, tunc etiam aliorum animalium, ut perdicis, galli, anseris, bovis & aliorum. Eodem modo usurpari poterunt succi chelidon. maj. centaur. minor. anagallidis & similium, quæ melli permiscenda sunt. Tum quod mel abstergendi & discutendi vi præditum est; tum etiam quia liquores in oculum infusi, disfluunt ad canthos, nec in pupilla morantur, in quæ eorum actio desideratur, sed cum melle inspissati faciliè pupillæ adhærent. Si tamen eorum mordacitas tolerari nequeat, dicti succi aut fella inspissari poterunt mucilage gummi tragacanthæ, psyllii aut cydoniorum, extracta cum aqua fœniculi, euphras. aut alia ophthalmica; formula collyrii ex succis talis esse poterit.

℞. Succi fœniculi, chelidon. & anagallidis, an. ʒ iij. succi centaur. min. ʒ i. mellis albi ʒ j. M. instar linimenti. Si cum albugine adsit oculorum rubor, utile erit collyrium ex vino albo, sale & tritico paratum in ophthalmia descriptum. Vel sequens.

℞. Aloës & agarici ana ʒ j. pulverentur, & includantur nodulo, qui maceretur in aqua euphras. vel fœniculi, & confricentur oculi mane & serò. Aloë abstergit, roborat & fluxionem sistit, agaricus potenter abstergit.

Sugillatio, seu color oculi rubeus ex sanguine in eum effuso productus, si recens adhuc tuerit, optimè curatur sanguine columbino in eum instillato. In illius verò defectu lac muliebri instillari poterit cum paucò thure & croco, vel ovi vitellus cum vino admovebitur, quod remedium à Gal. laudatur 4. de comp. med. sec. loc. cap. 8. Si vero contumax fuerit affectus fovendus erit oculus decocto fœnugr. althææ, fœniculi, rutæ, chelidon. vel illius decocti sumus oculo excipiendus est. Ac denique ea omnia, quæ pro suffusione descripta sunt, ad hujus affectus curationem poterunt esse idonea. Speciatim verò, in malo inveterato, quando rubor ad negredinem declinat à Gal. commendatur hyssopi coma trita, linteo inclusa, in aquam ferventem demersa, & oculo admota. Et docet experientia, hoc remedium tantæ esse efficacis, ut cruor sensibiliter attrahatur, & linteo adhæreat.

Ac denique color flavus ictericorum, qui in oculis maximè apparet, curato morbo spontè discutitur. Si tamen illius dissipationem ac-

celerare lubeat, suffitu aceti oculis excepto, id præstari poterit.

Ad curationem Hypopyi præmissis universalibus remediis, si inflammationis reliquæ supersint, auferendæ sunt remediis in ophthalmia descriptis. Postmodum leniter discutientia admovenda sunt emollientibus permixta, ne tenuiori parte resoluta, crassior materia fiat, & resolutioni minimè idonea. Fiant igitur fomenta ex decocto florum chamomil. meliloti, semun. psyllii, & fœnugr. cum pannis lineis, vel sacculis applicanda. In progressu vero addi poterunt decocto folia euphras. chelidon. & semun. fœniculi: vel sequens collyrium usurpari poterit.

℞. Aquar. verbenæ, rutæ, chelidon. rosar. & fœniculi, an. ʒ iij. aloës opt. tuthiæ præparatæ, an. ʒ iij. sacchari candi ʒ j. pulveriscentur & misceantur, addendo lactis muliebris tantillum; & fiat collyrium; de quo his terve in die guttæ aliquot oculis instillantur.

Sequens erit valde efficax.

℞. Croci, aloës, myrthæ, an. ʒ j. vini ʒ iij. mellis ʒ v. dissolvatur crocus in vino. Deinde cum aloë & myrthæ misceantur, tandem mel addatur. Hoc remedio oculi illinantur.

Denique ea remedia, quæ in declinatione ophthalmiæ, in oculorum maculis, & suffusione præscripta sunt, hic etiam conveniunt.

Si resolventibus medicamentis materia discutiri nequeat, ad alia remedia confugiendum est. Gal. 34. meth. refert, ocularium quendam sui temporis Medicum, cui Julius nomen erat, concussione capitis multos hypopyos sanavisse. Collocans enim eos in fella rectos, ac capita eorum utrinque à lateribus apprehendens, mox quatiebat, adeò ut manifeste descendere pus ipsi videretur.

Si neque hac ratione pus visum impediens dimoveri valeat, Galenus loco cit. ad Chirurgiam confugit, quem sequitur Aëtius & alii quamplurimi, quæ oculi punctione perficitur, qualis in suffusione fieri consuevit, quæ quidem operatio ut parum nostris temporibus usitata est, sic peritissimè Chirurgi manum desiderat, & verendum maximè est ne apertâ cornea, cum pure humor aqueus effluat.

In cornea & adnata tunica, quemadmodum in reliquis corporis partibus, generari solent vesicæ parvæ, aqua repletæ, bullis seu vesiculis similes, quæ à combustione aquæ ferventis excitantur, φλυκταιναι Græcis, Arabibus *Bubor* nominantur. Suntque tumores quidam parvi instar granorum milii. Ab acri quodam aut seroso humore oriundi.

Harum pustularum cognitio facillima est, cum sensibus pateant. Quæ in adnata oriuntur, rubrum colorem referunt: quæ autem in cornea, subnigrum, si in illius superficie consistant; album verò, si in parte corneæ profundiore sitæ sint.

Quod ad prognosim spectat, phlyctenæ in adnata minus periculosæ sunt, quam in cornea superficiali pustulæ, minus periculosæ, profundiores verò magis: metuendum enim est ne tota corneæ densitas erodatur, & vel humor aqueus effluat, vel uveæ procidentia contingat.

Curatio in materiæ conjunctæ resolutione tota versatur, & causæ antecedentis aversione.



Et omnimodo pustularum suppuratio prohibenda est, quæ in ulcus degenerat.

Universales igitur evacuationes, revulsiones, ac derivationes; quæ in ophthalmiæ curatione propositæ fuerunt, hic etiam celebrandæ sunt. Postmodum topica administranda, quæ leviter repellant in principio, tum etiam discutiant, qualia in ophthalmiæ augmento proposita sunt, quæ magis convenient, quando inflammatio pustulas comitatur, quod plerumque fieri consuevit.

In progressu verò, magis exsiccantia & resolventia erunt usurpanda, qualia in statu & declinatione ophthalmiæ descripta sunt: ac præsertim unguenta ibidem proposita, quæ pustulis illis discutiendis & exsiccandis aptissima sint.

Ophthalmiæ succedere solent ulcera in cornea tunica & adnata, quando in supputationem versa est. Succedunt etiam phlyctænis, seu pustulis, in cornea oriundis, usque disruptis. Fieri etiam solent ab humoribus acris & erodentibus in oculos confluentibus.

Varie eorum differentia ab auctoribus proponuntur, ex variis circumstantiis desumptæ: prout scilicet vel superficialia sunt, vel profunda; lata, vel angusta, varias figuras habentia, & alia huiusmodi. Sic ulcus cavum, angustum, & durum *sidæm*, fossula nominatur latum & minus profundum *telurum* dicitur. Quod in iridis circulo situm est *iridæm* appellatur, & à nonnullis ulcus coronale. Quod denique profundum, solidius, asperum, & quasi crustosum est, *iridæm* & *iridæm* vocatur.

Cognitio ulcerum non est difficilis, cum per se oculis pateant. Si ulcus sit in cornea, ulcusculum album apparet in nigro oculi; si in tunica adnata; punctum veluti rubicundum in albo oculi conspicitur, ob illius tunice venas sanguine repletas.

Ulcerum oculorum curatu difficilia & periculosa sunt, multo magis tamen in cornea, quam in adnata. Ulcus quod e regione pupillæ situm est, magis periculolum, quia in eo sanato relinquitur cicatrix; quæ corneæ diaphaneitatem aufert, sicque visionem laedit; & si tota tunica erodatur, ut effluxus humoris aquei; & vix procedentia.

Curatio huius affectus quemadmodum & reliquorum ulcerum, detergentibus & exsiccantibus perficitur, quæ tamen mitissima esse debent, propter partis mollitiem; & exquisitum sensum præmittenda tamen ea, quæ fluxionem ab oculis revellunt, eamque reprimunt, qualia in ophthalmia, tum recenti, tum antiqua fuere proposita. Et si inflammatio ulcers conjuncta sit, remedia, illam respicientia cum prædictis erunt permiscenda. Quibus etiam dolorem lementia addere coveniet, quoties ille partem infestaverit.

Detergentia & exsiccantia moderata, sunt saccharum, mel, crocus, myrrha, thus, aloës, sarcocolla, tuthia, & cerussa, ex quibus formulæ sequentes componi poterunt.

℞. Decocti hordei & fenugr. ʒiv. mellis optimi ʒi. vel syrupi de rosis sic. ʒj. Fiat collyrium, quo oculi sæpe abluantur. Vel

℞. Aquar. verbenz, & plantag. ana ʒij. Sacchari Candi ʒss. Misce pro collyrio. Vel

℞. Aquæ mellis in L.M. destillatæ, & aquæ

rosar. ana partes æquales. Vel

℞. Ovum coctione induratum & à putamine mundatum. Dividatur in duas partes, & detractio vitello repleatur fovea saccharo cando pulverato. Optime ligetur & ponatur in cella vinaria. Extillabit liquor, qui detergentis ulceribus sine morfu valde idoneus est. Et si potentius remedium desideres, myrrha pulverata cum saccharo cando admiscenda est.

Montani pulverem sequentem valde commendat.

℞. Albumina ovorum recentium num. xx. ponantur in vase stanneo ad solem, donec exsiccentur; postea pulverentur subtilissime cum æquali pondere sacchari, & pulvis immittatur in oculos, qui sine erosione plurimum adjuvat.

In progressu morbi si potentius detergentum sit & exsiccandum, adde collyriis prædictis trochiscos albos Rhalis, thus, aloën, myrrham; sarcocollam & alia huiusmodi, in parva tamen dosi, ne oculos exasperent, & his etiam iac, albumen ovi, mucilagines, aliaque anodyna addi poterunt.

Tuthia præ cæteris valet, quia minime dolerica est, & sine morfu siccatur, ac cicatricem inducit. Ideo collyria & unguenta ex ea parata utilissima sunt. Et præ cæteris unguentum in ophthalmiæ curatione descriptum, quod magnam tuthiæ quantitatem recipit, erit utilissimum.

Collyrii valde detergentis & exsiccantis, ac cicatricem inducentis formula talis esse poterit.

℞. Sarcocolla nutritæ in aqua rosar. cerussa & aloës lotæ, myrrhæ, tuthiæ præparatæ, ana ʒss. Sacchari candi ʒj. cum mucilagine gummi tragacanthi extracta in aqua rosar. fiat collyrium, quo palpebræ illinantur.

Ut singulis corporis partibus cancer solet accidere, sic etiam in oculis aliquando contingit. Et cum ea quæ communem canceri theoriam & praxim respiciunt, e morborum externorum tractatibus desumenda sint, nos hic tantum ea, quæ ad oculum peculiariter tali morbo affectum pertinent, paucis attingemus.

Cancer vel occultus est, vel ulceratus. Occultus ad tumorum genera refertur, & in oculo tumor c. nerosus, seu cancer oculi nominatur. Ulceratus verò, ulcus cancerosum oculi dicitur.

In utroque tamen adeit durities inæqualis & renitentia, color plumbeus & livescens, dolor intensus & pungitivus; caput & tempora præsertim occupans, venæ lividæ & varicosæ in tumore & partibus vicinis apparent. Sanguis acerrimus & adustus à parte affecta non raro effluit, quando cancer ulceratus est. Ac denique à medicamentis tantillum calefacientibus dolor admodum exasperatur.

Incurabilis est affectus, in oculo; quemadmodum in reliquis corporis partibus, quando jam radices egit nisi operatione Chirurgicâ radicatus extirpetur.

Curatio duplex ab auctoribus proponitur; vera scilicet & palliativa. Vera, ut dictum est, in canero jam genito, & parti valde radicato, non potest obtineri nisi Chirurgiâ. Recens tamen cancer ac fere incipiens, curari potest frequentibus evacuationibus humoris strabilaris, præmissâ venæ sectione convenienti, ut docet Gal. 2. ad Glauconem c. 10. ubi gloriatur se



hunc morbum per initia sæpe sanasse adjuvando remediis prædictis optimam victus rationem.

Curatio palliativa, quæ ad symptomatum mitigationem dirigitur, non solum per dictas evacuationes, sed etiam topica convenientia perficitur.

Primum igitur victus ratio refrigerans & humectans, qualis humori atrabilario debetur, instituenda est.

Postea sanguis detrahatur è directo oculi affectu, hirudines ponè aurem ejusdem lateris applicentur, tum etiam hæmorrhoidibus si aliquantulum tumeant. Cucurbitulæ scapulis admoveantur, & reliqua revulsionum genera celebrentur.

Purgationes & præparationes humoris atrabilarii, fiunt per potiones, apozemata, juscula medicata, syrupos magistrales, & alia hujusmodi. Sed præ cæteris multum confert ad humorem atrabilarium evacuandum Helleborus niger rite præparatus: ejusque extracto bis aut ter exhibito, cancer incipiens aliquando à nobis sanatus est.

Hæc remedia humoris affluxum ad oculos, dolores & reliqua symptomata vehementia valde inminuunt. Ad id tamen non parum etiam conferunt topica remedia, qualia sunt in ophthalmia, ad dolorem leniendum descripta; præcipue autem collyria sunt ex mucilaginis, trochiscis albi Rhatis & tuthia præparata, cum aqua rosarum, solani & plantaginis.

Aqua sequens pro collyrio & oculi ablutione erit præstantissima.

℞. Rad. scrophulariæ maj. & Geranii. Robertiani, ana M. ij. arnogloliæ: borragin. buglos. portul. euphras. beton. ana M. j. ranarum viridum & albuminum ovorum ana num. ii. sem. scæniogr. & cydonior. ana ꝑj. radices & semina contundantur, & folia incidantur. Deinde affunde aquæ rosar. & euphras. ana ℥j. Miscuantur omnia & distillentur in alembico plumbeo.

Pullorum caro ad doloris sedationem plurimum potest, & morbum ipsum. Quando hoc solo remedio curatum fuisse à nonnullis creditur. Sic Mauritius Cordens, comment. 7. in lib. 1. Hippocr. de morbis mulierum, refert historiam nobilis cujusdam femine, cui tota pars dextra faciei cancro, eoque ulceroso obsessa fuit diutissime, quæ cum variis auxiliis, à Medicis Italianis, Gallis, Germanis, Hispanis, petitis usa est, tandem vulgari hoc barbitonionis remedio sanata est. Pullos gallinæos in partes tenues & latas concidebat, quas sæpiuscule commutando interdum admovebat parti affectæ. Alii admovent carnes pullorum Columbinorum, lectas & adhuc tepidas.

Denique curatio veræ canceri confirmati, sola extirpatione obtineri potest, quæ sit omnimoda oculi extractione: quam tuto & salutariter fieri posse docet Fabricius Hildanus, & extractionis modum omnesque illius circumstantias subtilissime describit observat. cent. 1. ut ea hic frustra repetere non opus sit.

Cornea tunica tantam aliquando patitur continui solutionem, ut humor aqueus, interdum tunica uvea egrediatur, & illa solutio rupta cornea ab auctoribus nominatur.

Hujus causa est ulcus, aut vixus illius membrana, aut magnus humorum affluxus, à quo dicta membrana ita distenditur, ut media crepet, & contenti humores effundantur: ut in muliere quadam Parisiensi contigisse, refert Aereus, lib. 16. cap. 13.

Incurabilis est plerumque hæc affectio, & visus privationem relinquit, quandoquidem humores oculi effusi regenerari nequeunt. Si tamen vulnus sit exiguum, ex quo portio tantum humoris aquei effluat, curationem suscipere potest: quandoquidem aqueus humor interdum regenerari potest, ut docuit Gal. 4. de sympt. c. ult. c. 1.

Curatio hujus affectus glutinantibus remediis tentanda est. Et præmissis universabus evacuationibus; venæ sectione scilicet, & purgatione, si ex necessitate sint, astringentia, & glutinantia oculo admoveantur & in oculum intillectur albumen ovi, cui trochisci albi Rhatis admisceantur.

Eadem pars soveatur decoctio rosar. rubr. fol. polygoni, rubi, burse pastoris, & plantag. in vino astringente parato, si non adsit inflammatio, alioqui in aq. simpliciter. Vel

℞. Carnis cydonior. ℥ss. rosar. rubr. ꝑ. 3. acaciæ ꝑij. croci ꝑj. decoquantur in vino astringente, & fiat cataplasma parti applicandum.

Ad integram consolidationem sequens collyrium adhibeatur.

℞. Aloës lotæ, tuthiæ præparatæ, & sarcocollæ nutritæ in lacte muliebri, ana ꝑ. 3. croci gr. v. Cum mucilagine gummi tragacanthi, fiat collyrium. *Lazarus Riverius præcos Medica lib. 11.*

Pars cornex peripicu pupillæ foramini obtrusa vitium obscurat, quando crassescit aut vitiosum colorem contrahit, qui color vel crassities, aut impedit radios aut vitiose statim coloratos transmittit.

Fit hoc vitium 1. quando in nutritione cornex peripicu vitiatæ alimentum nonnihil crassius & viscidius suggeritur: Unde fit ut obscurata nonnihil cornea agris omnia obscura & quasi per nubeculam appareant, quod vitium etiam tunc nubecula oculi appellatur.

Fit hoc 2. quando cicatricula ab erosione tunice cornex, v. gr. in variolis, aut in ejus ulcusculis, aut post ejus vulnusculum remanet. Talis enim cicatricula non secus ac reliquæ omnes cicatrices, cum crassior sit ac spissior reliqua cornex parte, albedinem repræsentat, & tunc albugo seu leucoma specialiter appellatur.

Fit hoc 3. quando post ictum vel calum, item post plagas oculo illatas sanguis effusus & congruatus in albo oculi & etiam in cornea hæret, & ita vitiosos colores rubrum, cæruleum, lividum, &c. inducit in vitio, quod suggillatio oculorum vocatur.

Signa hujus mali non secus atque antecedens malum oculis patent. Nam cicatrix instar maculæ cujusdam albæ apparere solet: (unde etiam vocatur macula) in nubecula verò cornea nonnihil albicans & spissa cernitur, & in suggillatione color cæruleus, lividus, &c. etiam sponte patent.

Causæ antecedentes, item contusiones, plagæ, &c. ex relatione agri patefunt.

Quod attinet prognosin. Vitium hoc est difficilli-



seillimum curatu propter summam subtilitatem & simul exquisitissimam sensum corneæ oculi tunicæ: idque eò magis, quo crassior vel diuturnior fuerit vel nubecula vel cicatricula.

Suggillatio verò facile removeri potest. In pueris tenellis adhuc facilius potest abstergi macula & ipsa tenuis quam in ætate consistente, ubi spissior & contumacior esse solet. Post variolas oculos infestantes imprimis observetur, ut insequens cicatricula vel macula citò amoveatur, antequam in perfectam abeat spissitudinem.

Quod attinet curam. In nubecula materia crassa attenuanda & discutienda. In leucomate macula & cicatricula abstergenda. In suggillatione sanguis congruatus revolvendus & discutendus.

Faciunt huc remedia sequentia. Semen Horniini Sylvestris impositum oculo: hoc enim seminem maculas & albugines abstergere solet: Vid. de hoc Riverius in praxi & etiam in observationibus: unde etiam Poterius folia Horniini Sylvestris in oculorum foveitis præscribit.

Albuginem potenter discutit succus fœniculi recentiter extractus, cui una alterave gutta balsami Peruviani sit admixta. Item convenit huc aqua fœniculi saccharata, de qua locus sum super ophthalmia, quæ colligitur ex saccharo caulibus fœniculi excavatis indito & relicto ut liqueat. Item convenit ol. panni sive linteorum combusto uni cum aqua appropriata mistum & cum penna illitum. Aqu. mellis ad delendas maculas oculorum & cicatrices imprimis commendatur. Hinc convenit aqu. mellis eò nposita Amati Astruciani cent. 6. cur. 33.

2. Mellis qui in ipso savo libij. summitatum florum sambuci, Euphrasie, fœniculi ana p. 1. sacchari candi 5 iv.

Destillentur in baneo M. & aqu. oculis instilletur. Succus anagallidis flore cœruleo imprimis floris ejus expressis, & vel solus oculo instillatus, vel cum melle rosaceo mistus & applicatus, latidatur ad tollendas maculas: Unde & hic commendatur ol. & aqu. Anagallidis cœruleæ destillata non minus quam aqu. Leucorj bulbosi destillata (hoc enim gerit signaturam oculi) experimentum etiam est aqu. Sapphœrea Chirurgorum, sed omissa calce viva, qualiter solet eam præscribere Rivesius cent. 3. obs. 45.

Detur aqua appropriata, in qua dissolvitur sal. ammoniaci tantillum; ut lenissimè linguam feriat. Hæc aqua retineatur per biduum vel triduum in pelvi ænea vel vase orichalcœo donec cœruleum acquirat colorem: Hæc enim sublata sunt maculæ densissimæ in oculo ex diuturna ophthalmia progenitæ. Alias succus rutæ & ipse instillatus maculam corneæ blandè detergit.

Porro experimentum Plateri, quo omnes albugines curat, est sequens cataplasma, quod fit ex pulpa pomi cocti, mista cum macisagine sœnugræci, lapide Hæmatite & corticibus granatorum. Hoc ipsum cataplasma etiam feliciter adhibet. Horstius ad maculas post variolas relictas applicatis simul in tali casu vesicatoriis in nucha. Vid. Horstius lib. 2. observ. 39. Ubi habet integram compositionem. Liquor ex flor. cichorei cœruleis per deliquium sive colliquationem in furno pistorio paratus (descriptio vid. in Sennerto cap. de ophthalmia) similiter

specificus, est ad detergendas maculas & albugines: Porro curavit aliquando Forestus puerum, qui ex variolis in phlyctenas incidit, quæ exulcerata in oculorum cicatrices abierunt, cum collyrio ex aqua fœniculi adjecto felle anguillæ vel paucosaccharo. Denique pulvis ex cruviis serpentum pulverisatis cum oculis cancerorum vel cum melle illitus, vel cum aqua appropriata applicatus etiam delet maculas & albugines: sicuti alias hic pulvis experimentum est singulare in vulneribus & ulceribus, item in cancro oculorum. In quibus oculorum vulneribus etiam experta est aqua Chelidonij cum cancro destillata secundum methodum Mynsichti. Aqua superius allegata cum Mercurio sublimato & ipsa applicata prodest in macula & Leucomate: Cuius fuit hoc inventum. Platerus enim lib. 1. observ. refert, cicatricem in corneæ medio obortam omnino impediens visam curatam casu per Mercurium sublimatum loco sacchari in oculum insufflatum: Obortæ quidem est inflammatio, nihilominus tamen hæc sopita macula reperta fuit deleta; unde legitimè applicatus omnino erit propeus.

In infantibus tenellis, in quibus apparet macula & nubecula: is efficax remedium est, si mater vel nutrix fœniculum masticer, & mox hantum in oculos infantis inspiret: fortius erit si post masticationem etiam lingua tangat. albuginem, aut ipsa saliva fœniculo tincta glande mungat eandem.

Sia vero fuerit sanguis congruatus sive suggillatio: Tunc optimus est focus cum aqua Chæresolij & cum aqua flor. Cyani. Hic enim oculis instillatus & etiam cum linteis duplicatis admotus mirè sanguinem congruatum resolvit. Aqu. flor. Cyani, aqu. Chæresolij, aqu. hyssopi & similes sunt expertissimæ; item cum minimum teratur intra dentes & probe masticeatur, & hinc hantus oris in oculum immittatur suggillatum, mirè confert, & est remedium Burhucit. loco videndum. In pertinaciori malo sumatur coma hyssopi, eaque confusa coquatur & ebulliat in aqu. calida & foris isto postmodum tepidè foveatur oculus. Nam apertè sanguinem extrahere congruatum asserunt, & confirmat hoc Riolanus in tract. de affectibus oculorum. Decoctum radices symphiti cum dimidio radices sigilli salomonis, certissimum est remedium in suggillationibus oculorum tollendis. Mich. Erismullerus in Collegio Practico.

#### De Hypopyo.

Ab oculorum inflammationibus non per resolutionem terminantibus, at in suppurationem abeuntibus (item à contusionibus, &c.) pus aliquando sub Corneâ colligitur, qui affectus dicitur *hypopyon*, aliquando etiam *Unguis*, viz. cum pus iridis circuitum amplectitur, & unguis resecti figuram refert.

Ad affectum hunc curandum, præmissis universalibus qualia in cap. de Gutta sereni, &c. præscripta sunt, discutientia (emollientibus permixta) principem opem conferunt.

Foveantur ergo oculi *foveis* in dicto capite laudatis.

Item Collyrium seq. tepidè oculo instilletur.



℞. Sacch. cand. ʒj. myrrh. ʒss. camph. gr. ij. Indantur duorum ovorum albuminibus, quæ in panno lamineo pinstantur ut artis est, & f. liquoris expressio, cui add. solutionis aloës in aq. extinctionis lapid. calaminaris & ebullitionis tutiæ præp. factæ ʒss. croci nodulo sæpius exprimendo inclus. gr. ij. misce f. collyrium. *N. B.* Proportio aloës est ʒj. ad ʒj. liquoris. Leviusculum tantum dolorem excitat, non est inflammans.

℞. Aq. verben. rut. chelidon. ros. fernicul. consolid. ana ʒvj. calc. viv. ʒij. Infund. in aq. supradictis per 24. hor. Colaturæ add. \*, sacchar. cand. ana ʒij. Ponantur in vase cupreo dum aqua colorem cæruleum acceperit. Pone guttatim in ocul. bis in die.

Si medicamentis istiusmodi pus resolvi & discuti nequeat, quæte annon tentanda sit talis operatio qualis in cap. præcedenti laudatur ad suffusionem non-consummatam curandam, viz. Corneæ punctura, ita ut pus cum humore liqueo effluat? *Theod. de Mayerne in Prax. Medic.*

#### In Hypopyo operatio Chirurgica

Hypopium est collectio puris in pupilla oculi. Hoc pus quandoque ita ebullit, ut pupillam totam occupet. Causa duplex est interna & externa.

Causa externa originem sumit à violento motu, ut casu, saltu, ictu, tusione, vociferatione, elevatione vel ab aliis corporis exercitiis, per quæ venulæ, vel in processibus ciliaribus, quibus continetur humor crystallinus, vel in membrana uvea, nimis aperiuntur aut rumpuntur, ubi intillatus & extravasatus sanguis in pus immutatur.

Interna causa varia est, ut febris, inflammationes meningum, cephalæ, animi pathemata, quæ omnia humores possunt in internam oculorum substantiam ex arteriis propellere, & effundere.

Si hic oculorum affectus generalibus, ut venæ-sectione, cucurbitulis, purgationibus, velicatoris, topicis, exsiccantibus, aut digerentibus collyriis, cataplasmatibus, hisque similibus non mitigetur, Medicus ad Chirurgiam urgetur, quia non est expectandum, ut pus in membranam corneam, sed & uveam & processus perforet, unde non solum Patiens usu oculi sed & ornatu privatus foret.

*Galenus* memorat, suis temporibus expertum ophthalmiatrum, nomine Iulium ægros imposuisse sedi, & manus alligasse lateribus capitis, qui tam diu illud concutiebatur, donec abscessu rupto pus descenderet, discusso pure applicabat topica discutientia, sed providus *Galenus* hanc methodum improbat, & suadet incisionem iridis, ut collectum pus extrahatur, ad quam operationem perficiendam aptum foret instrumentum, quod epistolæ *Burrhi* depinxerunt; quod describetur, pus per incisionem exsurgendi gratia.

Uti hæc operatio ad felicem perducatur exitum, æger imponitur sedi, opponitur autem luci, oculo incolumi ligato linteo, caput pettori ferri imponitur, illudque manibus ferui apprehenditur.

Postquam Chirurgus sinistra manu palpe-

bras deduxerit instrumento apto, intrepide membranam corneam terebrat, quæ re peracta mox pus effluit.

His peractis linum quadruplicatum imbutum hoc aut simili fomento imponitur & applicatur.

℞. Aq. Plantag. ʒiv. Rosar. ʒij. liquor. album. ovi ʒij. troch. alb. thal. sine opio ʒij. mucilag. sem. cydon. & psyll. aq. Euphrag. extr. an. ʒj. M. F. Epithema.

Hoc repellente & anodyno collyrio duobus aut tribus utitur diebus, donec dolor & inflammatio mitigetur, tunc ad abstergentia & consolidantia deveniendum.

℞. Aq. rosar. fernicul. euphorag. plantag. an. ʒj. syr. de absinth. ʒvi. aloës, myrrh. an. ʒss. sal. saturn. ʒj. M. F. Collyrium.

Hoc calefacto, pluma, aut penicillo oculis quater aut quinquies illinitur.

Mundato vulnere oculi præscriptis, utendum stipticis & cicatricantibus remediis.

℞. Aq. Plantag. ʒiv. rosar. ʒj. tut. ʒj. lap. calamin. ʒss. vitriol. alb. gr. v. sacch. cand. albi. ʒij. M. F. Collyrium.

His bene adhibitis remediis sequitur perfecta cura, modo æger sæpius hoc *Mesues* collyrium de die adhibeat.

℞. Ceruss. ʒj. Opii, gr. x. sarcocoll. laet. nutrit. ʒx. ammoniac. thur. an. ʒj. tragac. gum. arab. an. ʒss. aq. pluvial. q. s. f. liq. *Joan. Bapt. à Luzarverde in Append. ad Armament. Chirurg. Sculteti.*

Hypopyum seu oculi purulentia, collectio est puris in interno oculi, mobilis tamen ad pupillam, tanta sæpe, ut integram eam occupet.

Causæ hujus morbi duplices, Externæ scil. & Internæ. Externæ huc faciunt Casus, saltus, ictus, vociferatio; imò exercitia atque labores excedentes, unde valorum subtilium in processu ciliari, crystallini humoris fundamento, aut etiam tunica oculi uvea, ruptura, quam sequitur sanguinis extravasatio, qui facile hinc in pus mutatur.

Interna causa potest esse Oritis dolor gravis, membranarumque internarum inflammatio, unde humorum in oculi interiora per arterias propulsio, quo pars affecta iis liberetur.

Varia in hoc affectu in usum duci solent, & possunt, evacuationes in primis spectantia, venæ-sectiones, scarificationes cum cucurbitulis, purgationes, Topica exsiccantia, resolventia forma lotus adhibita.

Mediis dictis quod si nihil efficiamus necessarium omnino ad operationem Chirurgicam devenire, quæ primo tempore instituenda, ne alia materia purulenta oculo contenta tunicam Corneam variis ex pelliculis, quatuor ad minimum, compositam perforet vi suâ corrosivâ, imò tunicas reliquas tenerioris quæ sunt conditionis, uveam scilicet, ciliariæque dictos processus, exedendo consumat, unde in oculo omnium consilio expectanda, imò ipsius visus, feruim externorum nobilissimi, ablatio.

Tempore *Galeni* referente *Pauso Agineta l. 5. cap. 20.* Oculista quidam fuit, Justus vocatus, cujus etiam meminit *parie. operat. Chirurg. Fabricii. ab Agnapendente*, qui ægrotantem, hypopio laborantem, imponebat sedili, hinc utraque manu caput patientis apprehendebat, idque tandiu



randia agitabat, usque dum purulenta collectio separabatur, fundumque petebat, hoc ex voto succedente, oculo ipsi medicamenta applicabat resolventia. Non semel simili via procedere nobis placuit, alii nihil unquam efficere licuit, adeo ut operationis hunc modum postea iterum tentare nequaquam libuerit. Consultum capropter magis visum, *Galen*i methodo quam *lib. meth. med. cap. ult.* proponit, procedere. Perforat hic instrumento accommodato tunicam Oculi corneam proximè ad tunicarum cum concursum, qui *Córnea* & *iris* appellari consuevit, sicque materiam purulentam per foramen factum effluere permittit. Hac methodo, sexies, imò octies, bono cum successu, malum dictum curavimus.

Operatio hæc & facilis est, & periculi omni caret; Instruit eam, referente *Jacobo Guilemeau*, dexteritate singulari, ætatis anno septuagesimo secundo; Chirurgorum regionum Gallicæ primus *Ambrosius Paræus*. Imo ipse *Guilemeau* in duobus subjectis feliciter hæc viâ processit. Legi hic possunt quæ habentur apud *Paræum lib. 17. cap. 17.* & *Guilemeau part. 4. Tract. de Ocul. cap. 11.*

Ultimus eorum in quibus Operationem hanc instituere nobis concessum fuit lignarius ex ordine eorum qui navibus ædificandis inserviunt, Penultima curationi nostræ subjecta Uxor erat *Iusti Bulzing*, Mercatoris hujus loci; in qua ad hunc modum, præsentibus *Domino Theodoro Wynants*, Medico ordinario, & *D. Petro Surveers*, Chirurgo, processimus: Sella imponebatur us agram, sic ut luci elatiori esset obversa; hinc Oculum sanum regebamus linteo complicato, mox caput ejus manu utraque prehensum, & manibus & pectore servi nostri sustineretur, erēcimus: Hisce sic prægressis, manu dextra apprehensum instrumentum, accommodatum; oculi parti superiori applicavimus, loco qui proximus Tunearum conjunctioni, mox sinistra manus ope dilatatis palpebris; quo certior foret operatio, intrepido animo corneam perforavimus, & illico materia purulenta exitum invenit.

Perforatione peractâ *Empistrium deservium* *Vigonis* parti vulneratæ imposuimus; imò etiam, ope lintei quadruplicati, samentum sequens:

℞. Aq. Plantag. ꝑ. iv. Fœnic. ꝑ. ij. Sief Alb. Raf. ꝑ. ij. Sem. Cydon. Psillii an. ꝑ. ij. F. Epithema, calidè applicandum.

Ephithemate, En plastroque ad dies duos tresque usurpatis, quorum ope & dolor, & inflammatio remiserunt, Mundificantia media applicavimus v. g.

℞. Aq. Plantag. Eufraf. an. ꝑ. iv. Syr. Abfinth. ꝑ. β. Aloës, Myrrh. an. ꝑ. j. M. F. Collyrium.

Pericilli ope quater quinquiesque hoc oculo calidè illinire placuit singulis diebus, & quidem per dies quinque aut sex; coacti enim ea quæ cicatricem inducere, oculumque roborare valerent; assumere, hujus conditionis mixtura hæc:

℞. Aq. Plantag. ꝑ. iv. Tutia præp. ꝑ. j. Lap. Calam. præp. ꝑ. j. Vitriol. Alb. gr. 3. Sacch. Candi ꝑ. ij. M. f. Collyrium.

Et horum usu affectus dictus perfecte sine ulla visus immutatione curatus est.

Sequenti medicamento uti soliti sumus, quoties materia purulenta in oculo se primum manifestare incepit. Descriptio ejus habetur in *subsid. Med. Duranti Schachi cap. 20.* qui eam ex *Mesue* desumpsit.

℞. Ceruillæ ꝑ. j. Opii, Sarcocollæ l. & nutritæ an. ꝑ. ij. Ammoniæ, Croci Thuris an. ꝑ. j. Gumm. Tragacanth. Arabic. an. ꝑ. β. F. Sief cum aqua pluvial. aut cum mutilagine sanigræci. *Joan. à Meekren in observat. Chyrurg.*

#### De depositione Pterygii seu ungula.

Pterygium seu ungula est membranula nervosa ab interno oculi angulo pronascens, & per oculus se obtendens, & usque ad totam pupillam aliquando proveniens, visum atque ipsius oculi motum impediens. Et si autem ungula ut plurimum ab interno oculi angulo oritur, oritur tamen etiam interdum ab externo, aliquid quando à parte superiore; aliquando ab inferiore.

Ungularum varix sunt differentix, alix desumuntur à colore; & sunt rubri, albi, citrini, aut fusci coloris: Alix sumuntur à subtilitate, quarum consideratio magis ad praxin est necessaria; & sic alia ungula est nervosa, adiposa alia: Alix desumuntur à tempore durationis, sic alia est recens & levis, quæ velociter removetur; qualibet suspensione, alia inveterata & dura; quæ difficilior.

Præcipuum signum ungulæ est à sensu, visu facile cognoscitur. Aliud tamen etiam signum est, quod qui eam habeat videatur sibi satulum in oculo habere; cum ungula jam est indurata & solida facta, tunc oculus non potest moveri, versus latus ungulæ oppositum.

Hæc ungula curatur Chyrurgia, in ejus depositione duo sunt pericula, primum ne cornea lædatur, cui ipsa uno suo extremo adhæret: Secundum est, ne dum ea perscinditur circa angulum oculi vulneretur caruncula lacrymalis. Nam si cornea lædatur, fit in ea inaqualitas, & exinde opacitas, & consequenter visus hebetudo, vel cæcitas, Si caruncula lacrymalis læderetur, sequeretur quædam incontinentia lacrymarum & perpetua lacrymatio, & in ipso actu Chyrurgico sequeretur quidam fluxus sanguinis. Itaque agendum est, ut potius aliqua ipsius ungulæ particula supersit, quam ut exactè tota præscindatur, & quod ejus remanet per abstergentia seu erodentia medicamenta removeatur.

Chyrurgix plures modi sunt. Primus est iste: Ager jejuno stomacho in sedili contra medicum collocetur, vel in sinu medici caput resupinum ponat; si in sinistro oculo autem vitium sit; melius est ægrum adversum in sedili sedere; si in dextro præstat resupinum in gremio medici jacere. Tunc altera palpebra à ministro diducatur; altera à medico. Medicus l. anulo argenteo seu unco modicè inflexo; circa medium ungulæ inflexo illam leviter elevet, ne cornea tanica trahatur, quod inflammationem pareret. Dum autem sic elevatur, continetur penna asserina plana, ut illa est quæ cythara pulsatur, vel aliquantulum maiore obtusa cuspide, vel instrumento argenteo cuspidem habente ad similitudinem rosmarini, & à lateribus obtuso



paulatim excoquitur, primo versus angulum lacrymalem, deinde leviter removeatur a cornea; & iterum juxta lacrymalem progrediendo caute apud eum forficibus præscindatur.

Secundus modus est iste: situato patiente ut supra, medicus accipiat acum argenteam longitudinis quatuor digitorum, quæ undique ad ipsius libitum flecti possit; & illa in toramine habeat filum ex serico, & pilum ex cauda equi; vel loco pili imponatur cordula testudinis & adæquatis pilo & filo, & sputo lenitis acus immittatur, & tota ungula apprehendatur. Si acus commode ingredi non potest, primum ungula hamulo attollatur, & acus tum imponatur, deinde filo serico constringatur, & alligetur ungula, & à ministro suspendatur. Tum medicus pilò aut chordula testudinis blande hinc inde exco-riando, ambabus manibus filum sursum ac deorsum trahendo: d. modum ferræ ungulum ab oculo separet, usque ad angulum lacrymalem. Ungula forficibus præscindatur.

Albucasis lib. 1. c. 16. describit tertium modum, sed is valet quidem in ungula fragili & adiposa, sed non in nervosa.

Post operationem super oculum applicentur, quæ inflammationem impediunt. ut sunt illa, quæ in tractatu de cataracta posuimus: postea abstergentia adhibenda. *Thom. Frensi de præcip. Art. Chirurg. Controvers. tract. 3.*

### Consultationes.

*Pro Illustri, & Nobili Bergomenfi Maculam oculi habente.*

Illustris, & Nobilem Virum non detineri ea specie albuginis secundum utrumque oculum, quod ex cicatrice post sanatum ulcus in tunica Cornea orta legitima dicitur, sed quæ spuria, & notha nuncupatur, scilicet non à scirro, sed à pituita crassifecta. unicuique satis perspectum esse non dubito, qui quidem affectus est; qui ab Auctore libri de oculis annus, non autem qui ab Arabibus Sebel, à plerisque panniculus vocatur, nam Sebel ex Rase est panniculus venosus qui ut perigrinum sibi curationem exposulat. Ceterum quoniam visio fere ex toto est ablata, aufertur autem non solum partium simulantium (inter quas tunica Cornea numeratur) verum etiam vitio facultatis, ac partis, cui primò debetur actio videndi, jure quis quærere posset, an vitio Corneæ conjungatur aliquid aliud ex jam dictis, cui statim respondeo præter dilationem pupillæ, quæ oculis ipsis patientis nostri oculos intuentibus conspicitur, de aliis nil certè statui posse, nam si præteritorum ratio habeatur, cum Illustris Faciens occasione destillationis ante multos annos inciderit in Ortopnoeam; & ab hac materia ad oculos conversa affectum nunc propositum incurrerit. facile quis suspicari poterit nervos visorios non passim passos fuisse; Adhuc, quoniam antea fere se totum Vir Nobilis Veneri tradidit, ac tralorum, quibus diu fuit afflictatus, occasione, pluribus remediis evacuantibus atque calore, spirituumque immixtur multum dissipantibus usus fuit, nullus est, qui non arguat, propter hæc omnia coadjuvante etiam ætate senili spiritus

iplos deficere. At quoniam densata, ac ventri indurata tunica Cornea, species visibiles non recipiuntur, hinc de hæc propositis certum judicium ut dictum fuit minime fieri potest.

Sed hæc principia generationis horum vitiorum attendenda, quæ omnia in insignem pituitæ proventum refero, quæ intra laminas tunice corneæ concreta albuginem, in substantia tunice uveæ imbuta mydriasm parit; Proventus autem hic pituitosus primaria quadam ratione ex fluxione suscipit occasionem, coadjuvat tamen, & facultas alteratrix oculorum à proprio scopo [quia non bene conficit alimentum] aberrans, sicuti in morbis longis, & in ætate senili contingere solet: Pituitam coadjuvare docet color ejusdem panni, fluere autem per modum transmissionis, partis imbecillitas ex morbo longo contracta persuadet, quanquam succum hunc pituitosum antea propter inflammationem oculorum attractum, ac dissipatis partibus tenuioribus ob calorem inflammatorium crassifectum fuisse non hæsit.

Quamobrem si affectus ii curandi essent, Medicus omne studium eo dirigere deberet, ut humorem jam impactum discerneret, fluentem ad oculos derivaret, atque reverteret, ejusdem generationem per alterationem tum cerebri, tum ventriculi ad calidum prohiberet, tandemque, & oculorum proportionem remediis oculi-ribus conservaret.

Quas medicas intentiones explere nemo est ex medicis, qui non videat provinciam penitus impossibilem, nam ubi visio ob affectus præternaturam in habitu, qui pluribus, & efficacibus materis medicis sine fructu non semel à Viris Excellentissimis tractati fuerunt, aufertur, ubi plures oculorum partes affectæ sunt, nullam salutis spem remanere quis est qui non videat? Quoniam ablatam visionem sic restituere est opus divinum, non humanum; quia tamen medicina est donum ipsius Dei, ac instrumenta medica, veluti manus ejusdem solent interdum esse proficua (cum sapius ipse, & natura ab inveniendi etiam morte vindicaverit) ideo à materis medicis in hoc quoque casu non est desistendum, quin inquit in hac tum ego proponam, tum Patiens diligentia, & studio Excellentissimi curantis ad usum deducat.

Et propterea (quantum attinet ad chirurgicam) præter vesicantia capiti adhibenda, Cauterium ad aliquot dies in sinuipite gestatum summo opere laudò, & cauterium, atque setacem in cervice, tanquam ea remedia, quæ citra aliquem fructum pluries tentata fuisse non propono, sed præter hæc proposita & aurium perforationem, itemque scarificationem cartilaginum eorundem non improbo. De venæ-sectione, sicuti de remedio, quod sæpius fuit adhibitum, atque ipsius nunc nulla sese offert necessitas, nihil dico; cucurbitulas autem, modo sictas, modo humidas, frictions, ligaturasque partium extremarum proficuas admodum esse possunt scire.

Quantum verò nunc ad medicamenta attineat, mihi videtur opportunum, ut neglectis internis coniumibus, ac aliis, quæ sæpius gratia totius fuerunt usurpata prosequatur Patiens in usu decocti chinæ, & medicamenti ex viperis,



ea tamen ratione, ut quibusdam intervallis constitutis non solum tempore usus huius decocti, verum etiam extra hanc occasionem utatur pilulis lucis tantum, aut etiam admixtis cochleis: Gratia autem capitis peculiariter ad evacuandum masticatoria, ad alterandum embrocæ seu lotionem calefacientem, atque siccantem omnibus præfero.

Et quantum attinet ad topica, quæ detergentia, & discutioria esse debent plura sese offerunt medicamenta, inter quæ primum probò aquam fragorum instillatam, secundo sanguinem galli antiqui eodem modo usurpatum; huc pertinet mulla cum succo sceniculi adhibita, oleum balsami, liquor qui extrahitur ex arundine sceniculi in horto ipso de nodo ad nodum perforata, sale minerali, saccharo, pulvereque Eufragiæ repleta, ac cera per noctem obturata. Sed collyrium ex ovo medicato cum viridi are, & aloë lotis, atque sarcocolla nutrita, tanquam efficax medicamentum, usu experientiaque mihi non semel comprobatum propono, sicuti & illud, quod sit ex mica panis nuper è clibano extracta, in mulla macerata, ac sanguine columbino perfusa, Vapores enim qui ab humismodi mixto intra duo vasa stannea conclusio exhalant, in aquam convertuntur, quæ in oculos instillata mirifice valet ad usum dictum, quo pertinet & collyrium Ralis ex fellibus. Verum ante hunc omnium medicamentorum usum maxime proderit, si oculi foveantur spongia molli madefacta in decocto alteræ, malvarum, foenugraci, seminum lini, ac huiusmodi aliorum emollientium. Ad proportionem autem oculorum dos nucis mulcæ cum conserva Eufragiæ probatur.

Atque demum inter ea, quæ victus rationem attinent, illud noto, ut omnia illius cibaria condiantur pulvere Eufragiæ, verbenæ, seminum sceniculi, rutæ, & sacchari, Vinumque cum Guajaco, salsa, & simplicibus ocularibus jam dictis alteretur. Reliqua verò huc spectantia, sicuti & pleraque alia tanquam Excellentissimo curanti notissima consulo prætermitto. Faxit autem D. O. M. ut hæc omnia Illustri, & Nobili Patientis literis reddantur. *Julius Cæsar Clandinus in Consultatione Medica.*

*Pro Perillustri, ac Nobilissimo adolescentulo Flandro Albugine secundum oculum dextrum, diminutaque visione secundum utrumque oculum affecto.*

Nobilissimum Adolescentulum superioribus diebus ophtalmia secundum oculum utrumque detentum, nunc macula, seu albugine in dextro oculo tantum, membranz corneæ affectu, detineri, præter id, quod sensus attestatur, manifeste, ex his etiam colligere possum quod huius affectus proprium est tum objectum, veluti per velamen, & per rete visibile reddere (idque patienti nostro contingit) tum ophtalmiam, vel facile subsequi (hæcque pariter præcessit) ex quo Albuginem hanc impropiam esse sequitur, quandoquidem propria factam in oculis ulceris occasione cicatricem subsequitur: Verum quoniam adhuc adolescentulus noster difficile sibi remota valet videre, præter dictam maculam imminuta quoque visione (quod &

ad oculum dextrum spectat) sine dubio laborabit; A quibus non solum ut interim liberetur exoptulat, sed etiam ut ab inflammatione jam prægressa tueatur, ac impofterum præservetur exoptat.

Quæ uti ipsi tutius succedant, mihi circa modum generationis affectuum præsentium, & causas eorundem prius, breviter tamen digrediendum. Et profectò immediatam causam illius albuginis densationem corniformis tunicz ab humore crassiori occasione ophtalmiæ in membrana illa derelicto poros ejusdem obstruente productam affirmo, ex quo ne rerum visibilibus simulacra ad chrySTALLINUM humorem usque, præcipuum visionis instrumentum liberè permeare possint, impediuntur, sicque objecta per nebulam veluti à patiente conspiciuntur, qui quidem humor pituitosus existens (ut ex Albédine conjicitur) lux generationis ortum habuit ob errores potius externos, quam quod in vitia facultatum capitis, ventriculi, ac hepatis referendus existat, quamquam & ipsa aliqua ratione concurrisse credidimus, caput scilicet aliquali humiditate, ventriculum vix frigidityte, & hepatis proprio fervore.

Ceterum quæ causæ prædictam visionis diminutionem efficiant, non ita facile dignosci potest, cum etenim, commodius propinqua videre, quam in debita distantia locata ut plurimum illis accadat, qui aut spirituum visioni deservientium defectum, vel impuritatem patiuntur, cumque perillustrem hunc adolescentulum ab his immunem esse Dei beneficio colligatur ex his, quod in ea est ætate florida constitutus, quæ pluribus donata est spiritibus visoribus, nullusque præcessit affectus, qui illos dissipare potuerit, quod secundum oculum sinistrum remota quoque, convenienter tamen distantia, bene videt, idcirco aliunde mihi causa est exploranda, quam dilatationem ob foramen Ragoidis ab humiditate distensum, quatenus per hanc aliquis spirituum disgregatio succedit, immediatam causam huius imminutz visionis constituo; dilatatio oculis sese offert intuentibus, reliquæ vero causæ humorem prædictum foramen dilatantem producentes ex dictis innotescunt.

Quidam autem causæ sit, cur oculi præsertim in hoc nobilissimo puero passi fuerint, & prædictis affectibus nunc dexter detineatur, cum excrementa in corpore quantitate, qualitateque excedant hæc declarant nimirum partium reliquarum robur ad expellendum potens oculorum naturalis imbecillitas ad recipiendum apta, eorundem ad prædictos patiendos affectus hæreditaria ex parte matris dispositio, inflammatio prægressa occasione doloris, & caloris ad attrahendum apta.

Quibus ita de modo generationis, ne non causis horum affectuum constitutis, jam Medici munus erit tum humorem in cornea imbibitum, & illam obstruendo densantem, tum illum in ragoidis infarctum, & illius foramen distendendo dilatantem, prædiis discutientibus resolvere, oculorum proportionem servata; sed quoniam hæc per medicamenta localia consequi oportet, eaque totius providentiam utique supponunt; idcirco ad totius corporis morbosum apparatus, omnem operam Medicus convertat oportet, quod quidem summopere ad præ-

vationem



vationem quam tantopere patiens exquirat, conducet, quod tutius assequetur, si caput demum, & hepar illud potissimum ad siccum, hoc autem ad frigidum alterabit.

Quæ omnia quamvis ob dispositionem matris hereditariam, & ob suffusionis propè imminentis suspicionem aliquam difficultatem præse ferant, hanc tamen posse superari primum Dei beneficio suffultus, mox ætatis vigore, ac anni tempore verno, in quo sumus, vel faciliè arbitror, & quæ huius rei certissimum præstant argumentum, duo sunt, quorum alterum illud est, quod etiam in oculo sinistro post sanatam ophthalmiam albugo, quardam similis visa est superstes, quæ tandem solo beneficio naturæ fuit resoluta: Alterum est quod patiens perillustis prædictos incurreret affectus propter errores potius externos, quam ob internas viscerum diserasias.

Materias itaque præsidiorum aggrediens primum ex Chirurgica (ut præservationi etiam incumbendo tutius oculo nunc affecto topica admoveantur) cucurbitulæ partibus infernis applicitæ, & scarificatæ maximi erunt usus, sicuti, & postulate occasione, venæ basilicæ cephalicæ, aut demum salvatellæ sectionem haud improbo; cucurbitula quoque cervici, vel etiam parti capitis posteriori è directo oculum affectum prospicienti admota, & scarificata, si necesse fuerit, summopere proderit: At revivificante morbo (quod avertat Deus) ad materis interceptionem setaceum in cervice mirifice conferret; interim tamen omnino cauterium brachio dextro infigendum esse censerem, quod quantum valebit ad præservationem præsentium affectuum, ac ophthalmiæ in dies adolescentulus experietur.

Medicamenta ex pharmaceutica Medicinæ parte petita varia sint oportet, & primum quæ ratione non totius habebunt, erunt mel rosatum solutivum & syrupus rosatus pariter sol. vel casia, una cum speciebus hieræ Galeni. Secundo humores præparabuntur cicorii, endiviæ, betonicæ, eustragiæ, & chelidonis decocto, adjectis syrupis accommodatis; post quæ purgans aliquod medicamentum præscribi poterit, sicuti quod ex infuso agarici troiscati, & Rhabbarbo addito syrupo rosato solutivo conficitur, in quem finem etiam radice mechiocanti uti conveniens erit, aut (si fortioribus) pilulis lucis, sine quibus, & assaiaret Avicennæ omnino insitendum. A totius expurgatione deveniendum esset ad partium alterationem, nisi adhuc aliqua impedimenta remanerent tum ratione totius, tum ratione capitis: Et quidem quæ adhuc totum respiciunt, sunt aliquæ excrementorum reliquæ, quæ commodè per medicamentum insensibiliter evacuans consumi, absumi que poterunt, hoc autem erit china decoctum una cum modico salsa, nisi ventriculus obsteret, aut etiam cum tantillo, si opus fuerit, ligni guaiaci, cicoreaceis tamen catigati, betonica, & ocularibus simplicibus adjunctis: Verum & sensibilibus caput masticatoriis expurgari potest, quo in casu solo mastiche, solove papyro contentus essem.

Ac interea medicamenta discutientia oculo sunt admovenda, quæ simul oculi proportionem respicere debent, sed à mitioribus in-

choandum, inter quæ sunt sanguis columbinus, turturis, aqua fragrorum, chelidonis, eustragiæ, Urina pueri per se sola, vel una cum melle distillata, & oculo instillata; vel si patientis oculus lingua ejus, qui sceniculum masticasset lambere, plurimum prodesset.

Quibus non conferentibus ad fortiora deveniendum, ad omnia scilicet fellium generis, perdicis autem potissimum, ad capita similiter hyrudinum detracta in olla exulta contrita, ac tandem pulverata: At quod mirum in modum valet, ut experientia non semel mihi comprobavit, est aqua stillatitia, quæ ex mica panis nuper è clibano extracti aqua mellis macerata, & postmodum sanguine columbino superasperfa, tantillo pulveris calcanti addito in duplici vase destillatur.

Quibus omnibus expeditis, pro capitis alteratione conservæ capitales, saccharum rosatum cum pulvere boli Armeni hora somni devorata, exterius vero lotio ejusdem capitis ex decocto cantomeli, rosarum, betonicæ, & eustragiæ erunt accommodatissima.

Pro jecore autem succus cicorii, vel per se assumptus, vel cum sero depurato, & succo acetosæ, vel extra sub forma perfusionis cum speciebus cerati sandalini, & aceto adhibitus hypochondrio dextro, omnibus præferendus, quibus minime conferentibus ad balneum aquæ dulcis, & Lucenses aquas, Villenses inquam, nunquam satis laudatas, illud de foris administrandum, has verò de more bibendas se transferat perillustis patiens necesse erit.

At quod ipsum summopere juvabit, conveniens est vivendi ratio, quæ ea sit oportet ut in ære in activis temperato, in passivis ad siccum vergente vitam degat, ut hac de causa aerem Venerum maxime proprium dixerim; Cibi erunt carnes gallinarum, perdicum, caponum, turturis, vituli, & hujusmodi proprii succi, ova recentia, pisces saxatiles: Ab omni abstineat repletionem, ab oleis excrementitiis, caveat ab iis, quæ in caput effumant, ab aromatibus, ut propterea ipsi saccharum rosatum, vel coriandri semicooperta, vel cydoniatum à mensa sint assumenda. Potus visum sit cum china alteratum, una cum simplicibus ocularibus, exercitium fiat moderatum, somnus existat brevior consuetudo, alvus quotidie secedat, quod si hoc spontè non accidat, pane utatur nobilissimus adolescentulus ex tota farina subactis, adjectis anisis, passulis, ac sale, vel clysteribus levioribus utatur. Animi passionem, quæ lacrymas præsertim ciere solent, aufugiat. Et hæc sunt, quæ ad curationem præsentium, & præservationem ab ophthalmia in gratiam nostri patientis perillustis volui dixisse, faxit modo Deus, ut in actum secundum deducta optatum sortiantur finem. *Idem ibidem.*

*Ophthalmia cum visionis imbratione ex Albugine.*

Illustrissimus Comes Adolescens annorum septemdecim, temperamenti biliosi, hepatis calidi, capitis præhumiidi; elapsis Bacchanalibus diebus correptus fuit Ophthalmia in oculo sinistro, cum fluxione materis acris in principio, cum dolore, levi tamen. Verum ob ne-



glec̃ta remedia in principio, & oberrata in his præcipue, quæ ad victum & aerem spectant, usurpatis spatio quindecim dierum circiter solum collyrius ab amicis exhibitus, savior facius fuit morbus, & perenni affluente materia, visio incepit imminui, unde ab adveniente Medico iuventa fuit albugo totam iridem & crystallinum occupans, parum reliquo oculi rubente. Illico missus fuit sanguis ex brachio, exhibitum fuit deinde Leniens ex manna, & syr. de rotis, cum superbibitione aquæ hordeaceæ, postea sanguis missus fuit ex hæmorrhoidibus & per cucurbitulas dorso summo & uno, quæ fuere tum sicæ, tum scarificatæ, non omittæ circa nucham incisione. Clysteres fuere in ulum revocati, Phœnigmi scapulis, brachiis summis, retro aures etiam fuere appoliti, cui loco prius admotæ fuerant hiuidues, & ultimo Cauteria brachiis inulta. Remedia ex Pharmacia, post primarum viarum expiationem haurit Nobilissimus Co. infusiones ex sena, agarico & rhubar. cum additione manna, syr. ros. solut. cum superbibitione modo seri, modo aquæ hordeaceæ, interpositis Alterantibus pro moderatâ intemperie hepatis sanguinisque, & cæterorum humorum peccantium. Collyria à Medicis præscripta fuere, ex quibus incepit albugo tolli, ita ut supra dimidium fuerit ablata, superstitæ tamen in præsens ejus portione in oculi medio cooperiente pupillam. Decem dies sunt, ex quo cessante ad hunc oculum affluxu, eodem ordine ad dexterum quoque delapsi fuere humores, unde primò rubor, dolor levis, postea magis affligens, non tamen continuo, ita ut visio parumper fuerit imminuta, & objecta nunc indistincte videat, & in dies depereat visus. Nebula quæ in hoc observatur, est veluti velamen decuplo minus crassum, quàm alterum; dolor est potius gravis. Materia catarrhalis tenuis erumpit per nares, per palatum, & ex oculo lacrymæ manant, non tamen continuo, ubi ex alterato cessant. Quotidie frictiones, cucurbitulæ modo sicæ usurpantur. Collyria in principio huic oculo repellentia immittebantur, nunc additur parum aquæ fœniculi. Ex consilio into progrediendum in expurgantibus corpus, deinde caput, non prætermittis Alterantibus, ut si morbus contumax observaretur ad decoctum exiccans sit confugiendum. Setaceum tenuit Nobilissimus Ægrotans. Hæc in compendio sufficiant viris sapientissimis à quibus consilium in re tanta exoramus.

In Ophthalmiam incidisse Adolescentem Illustrissimum hac tempestate hyemali frigida & humida mirum non est, cum & Hipp. in hac eadem lippitudines viguisse observaverit, eoque facillius in calido & humido capite contingunt, nisi oculi prævalidi fuerint, ut notavit Gal. addita quoque vivendi libertate. Verum cum Ophthalmia sit inflammatio tunice adnatæ totum oculum ambientis, & ideo externæ, quæri potest cur & quomodo alium atque diverſum oculorum affectum secum duxerit, & nun albugo, an vero suffusio, consecutus affectus dicendus sit, & ad primum quod attinet, occasione caloris atque doloris, quæ sunt dux potissimum causæ attractantes, per alia vasa ad oculum humores attractos fuisse credo, sed ad quam partem ambigo, nun scilicet ad corneam tunicam

intrinsecus, vel extrinsecus, & ita albugo Ophthalmia succenerit, vel potius aqueus humor oculis proprius pituitosum excrementum in intercapedine inter corneam & crystallinum exillente exceperit, & tumorem excitaverit. Quod tamen indeterminatum relinquere, nihil universali Curationi, & parum particulari obene, sed tantum prognosticum alterare potest. Illud interim pro certo habendum, Ophthalmiam humidam esse & non legitimam, sed spuriam, ut ex qualitate doloris, lacryma non adeo acri, & tandem ex affluente pituitoso humore facile elici potest: caput vero non tantum essentialiter affectum esse, sed & a jecore, & a toto venoso genere fomitem suscipere.

Ut propterea contra ocuaries Medicos Galenus, Topicis omissis, solis Purgationibus, aut sanguinis missione Ophthalmicos se liberare gloriatur; ut nobis innuat non adeo facile & cito ad collyria & ophthalmica remedia Topica confugiendum esse, ut perperam fecit ante acceritum Medicum Illustrissimus ille Adolescens, toto namque & capite repletis, facillime redundantes humores a medicamentis oculartibus ad oculos ipsos attracti fuere.

Idcirco ex Platonis sententia oculos curare ante caput, & caput ante totum corpus non licere docuit Gal. quod observasse audio Viros Excellentissimos Aditantes, dum evacuantibus, revellentibus, alterantibus, divertentibus & repellentibus primò, progressu vero etiam digerentibus, omnibus tamen anodynis uti fuerunt.

Quibus quidpiam aliud vix addi posse video; etenim revellentia nullo modo deferenda, quotidianæ nempe pedum lotiones & dorsî frictiones; & perseverante fluxione vesicantia quoque, vel scapulis & occipiti, vel saltem brachiorum superiori parti circa musculum Deltoideum ubi Cauteria figuntur, nisi Cauterium impediatur, tum ratione revulsionis, tum diversionis & à capite derivationis. Restat considerandum in occipite setaceum, quod sicut capite essentialiter tantum affecto mirabile auxilium afferre solet, ita consentiente toto, infausum eventum sæpe vidi, & ideo caute valde, & non nisi cæteris omnibus frustra tentatis affigendum. Inter evacuantia, efficacissime à capite & à toto purgant pilulæ capit. Paracelsi, ad semidrachmam exhibetæ circa noctis dimidium à primò somno; continent enim extractum colocynth. elleb. nigri & Diagrydij, diobus Canicularibus paratæ; quæ quoniam Patavij inveniantur, Veronæ autem præsto non erunt, ideo drachmam unam pro duabus vicibus ex ipsis transmittito; cum enim exigua sit dosis, facile forsitan ab Illustrissimo Pat. assumi poterit, & si opus fuerit, iterum atque iterum erunt repetendæ.

Alterantia humorum acrimoniam demulceant, & Præparantia redundanciam respiciant.

Ita Topica medicamenta ophthalmica caute sunt in usum ducenda eo ordine, ut primò Ophthalmiam, mox consecutum affectum secundo loco respiciant; inflammatio enim impedit crassioris materię resolutionem, ita tamen Ophthalmiæ incumbendum, ut nimio repellentium usu, suffusionis aut albuginis resolutio non prohibeatur. Fœnugraci Decoctum Ophthalmiæ spurie quam maxime prodesse, nec suffusioni ob-



obesse voluit Galenus. Albugini externæ linctus à puella aut puero jejuno ventriculo, post fœniculi masticationem certissimum est remedium. Albugini vero internæ potens erit aqua stillatitia ex succis fœniculi, chelidoniz & prassij, à Gal. marrubij dicti, simul mistis, additis feliibus & melle optimo. Suffusioni tandem ut præstantissimum Ophthalmicum à Quercetano proponitur crocus metallorum in aqua chelidoniz, quod tamen remedium à me frustratorium & prorsus inutile semper in praxi observatum fuit: & ideo tincturam ab eodem croco metallorum extrahendam curavi, & parata habetur Venetiis apud Hieronymum Rizzetum Pharmacopœam ad signum Sanctæ Margaritæ, quæ tinctura guttatim oculis infunditur, quotidie tribus aut quatuor vicibus. Meliora in præsens mihi non suppetunt, neque ad majora devenire audeo, nisi de statu Co: Illustrissimi certior factus.

Congrua interim à Viris Excellentissimis erit addeuda victus ratio, ita ut præter cetera prorsus abstineat à vino, parcum sit prandium & parcissima cœna, & uno verbo, sedata Ophthalmia, victus debeat esse tenuis & attenuans, ut Excellentissimis Medicis Adstantibus magis opportunum visum fuerit. *Raym. Joh. Fortis Consult. & Respons. Medic. Tom. 1. Cent. 1.*

*De lesa visione ex Albugine gravi auditu, & semiparalyti. Pro adolescente Polono.*

De tribus affectibus præter naturam conqueritur in præsentia Perillultris adolescens annorum 18. videlicet de visione partim imminuta, partim depravata oculi dextri. Videt enim diminutè, & conspicit objecta veluti per velum, seu nebulam: de gravitate auditus in aure dextra: & de imbecillitate ejusdem brachij, ratione cujus vix potest elevare quidpiam ponderosum, vel saltem non diutius tenere: qualis imbecillitas est etiam in sinistro brachio, non tamen adeo gravis, & cum levi quodam dolore scapularum. Has affectiones, plures & graviores præcesserunt, videlicet apoplexia, 13. ætatis anno, cum octo horas immobilis, & sine sensu jacuerit, cum detentione operationum principum, quæ postea migravit in paralytim infernarum partium, crurum scil. Post aliquot menses supervenerunt variolæ, quibus successit tumor insignis in gutture, cum levi dolore, qui deglutitionem aliquantisper impediēbat, inde tumor, & erosio in palato, cum exulceratione columellæ, quæ tamen vel parum, vel nihil est imminuta. Quarto tumor subortus in utroque genu foveam relinquens dum comprimebatur, cum impedimento, & dolore in incessu. Ac quintò confluxus accessit ad sinistrum oculum ejusdem materiæ, quam nunc in dextro videmus, cum majori visionis offensa: ac tandem inflammatio sinistri oculi, & insignis rubedo. Hæ sunt præteritæ, hæ præsentēs affectiones. Sed quia graves, illæ non egent consultatione, idcirco ipsarum commemoratio præsentium tantum affectuum cognitioni usui erit. Ex præsentibus verò, cum oculi vitium majus facessat negotium, ab ipso initium facientes, videbimus qualisnam sit affectus, in qua parte, & à qua causa fiat.

Quantum ad essentiam, aliud sanè non est

hoc vitium, quàm albugo vel nebula in cornea genita, siquidem est materia alba crassa, & adherens; non tamen est vera albugo à Paulo descripta 3. de Re Medica 22. quæ est macula ab hujus tunicæ cicatrice nulla: neque est albugo scirrhusa inflammationi succedens. Licet enim inflammationem passus fuerit, ea tamen non fuit, à qua ejusmodi macula, vel tumor induci potuerit. Sed est albugo spuria, dependens à materiæ fluxione ad illam partem, quæ & nebula dici potest. Habemus enim ex Avic. quod si materia est superficialis, potius nebula, si profunda, potius albugo vocanda est. At in præsentia cenleo materiam partim esse superficialem, quia si intueamur oculum, apparet inæqualitas in illa parte; partim profundiorē: cum enim cornea tunica ex quatuor laminis sit composita, ut patet ipsam diligenter separanti, materia hæc non solum superficiali laminae adheret, sed etiam ad alias hujus tunicæ lamellas pertingit.

Ideo patet ex his, partem affectam esse tunicam corneam, affectum esse morbum in numero, præsentiam scil. materiæ superfluz, quæ alia non est, quàm pituita, ut ex colore, crassitie, & visciditate ipsius colligitur, à qua laeditur visio; quia talis materia occupat etiam illam corneæ partem, quæ pupillam regit, licet hanc minus, quam alias partes. Continet autem hæc materia a capite humidissimo, & fonte omnium malorum præteritorum, cum aliqua caliditate, quam intemperiem hæreditariam patitur æger nobilissimus; quandoquidem Illustr. ejus parens sexcentas morborum species passus est, ob hanc cerebri intemperiem. Neque est quod pluribus hoc probemus, quin potius dubitandum, an materia hæc à cerebro contiēns, aliqua sui portione contineatur in nervo optico, & obstruat cavitatem ipsius. Ego enim cum oculum sanum clausero, & inspicies affectum oculum, viderim pupillam ipsam parum dilatari, suspicor adesse levem aliquam angustiam etiam in nervo optico; non quidem talem, quæ prohibeat omnino spirituum confluxum, quia non fieret visio, sed quæ saltem uberiorem impediāt, à quo fit pupillæ dilatatio.

Huic affectioni accedit gravitas auditus, quia & nervus tertiz conjugationis ad aurem perveniens est utrunque coarctatus, vel saltem humidatatum est tympanum, quod propterea ab ære externo percussum parum resonat. Adest quinetiam brachiorum imbecillitas, cum dolore scapularum: quia portio hujus materiæ confluit ad musculos, & nervos illarum partium, & prohibet perfectam irradiationem facultatis animalis, solvitque continuitatem partium sensitivarum. Hæ ergo sunt affectiones, partes affectæ, & causæ effectrices manifestæ, quibus cum aliud accedat fovens prædictas affectiones, oculorum scilicet caliditas, quæ se prodit ex venis apparentibus in conjunctiva, & ex facili rubedine oculorum ab applicatione remedium utrunque calidorum. Dubium præterea est, an duxerit aliquod inquinamentum Gallicum ex lacte, quod aiunt ab infecta nutrice sxisse: si enim hæc quoque causa accederet, contumacior esset morbus. Verum non credo causam hanc habere locum, cum quia non adsunt certa indicia infectæ nutricis, tum etiam, quia patiente



tiens nobilissimus non prius male habere cepit, quam anno 13. ætatis. Si enim ab infecta muliere tale inquinamentum suscepisset, etiam ante illam ætatem de quibusdam morboris vitiis querelæ non defuissent.

Utcunque tamen sit; non possumus non determinare, graves & contumaces fore prædictos affectus, cum dependeant à catarrho hæreditario exuberante: in primis verò illa oculi nebula, cum sit quinque annorum; ac promde materia sit impæcta, & firmata. Accedit, quod generosis præsidiiis hæcenus tentata fuit hæc curatio; incassum tamen. Nihilominus, non cenſeo curam omnino prætermittendam; quia si planè non tollantur; imminuentur saltem, & perfectior visio reddetur, intemperiesque aliquatenus corrigentur.

Quare materia pituitosa; quæ ad oculum; aurem, & scapulas; nervosque motorios confluit, erit attenuanda, & digerenda: prius tamen novæ materiæ confluxus est prohibendus; caput diligenter purgandum, & intemperies humida corrigenda erit exsiccantibus; necnon & jecur refrigerandum. At quia impossibile est confirmatam intemperiem ad naturalem statum reducere, ut propterea possit omnino prohiberi materiæ regeneratio, ea saltem ad alias partes est divertenda; revellentibus; & derivantibus: oculique, & alix partes affectæ sunt corroborandæ. Quæ facinus consequemur habita ratione totius corporis. Quare ab eo quod ultimò inventum est curatio est auspicanda, & totum corpus, & caput est diligentissime purgandum; materia fluens est divertenda; fluxa digerenda; intemperies corrigendæ; & partes affectæ roborandæ. Quæ præstabitur Chirurgia, Pharmacia; & Dieta.

Quod spectat ad Chirurgiam, sanguis in casu præſenti necessario mittendus est e vena communi dextri brachii; non ex hæmorrhoidibus: ac tertio ex vena frontis; vel venis in angulo oculi affecti. Gestat fonticulum in brachio dextro: qui locus videtur suspectus, propter partis imbecillitatem. Sed cum majus sit emolumentum; quod ex hac evacuatione suscipit, ob rectitudinem cum parte affecta; quam noxa propter imbecillitatem brachii, illum servare. Ne vero tanta materiæ copia conflueret ad illam partem; alium pararem in interna parte coxæ dextræ; quo revellamus à jecore: Quod si tertium admitteret in sinistro brachio, summopere prodesset: in tanta enim fluxione multis opus est emissariis. Non defuerunt; qui Chirurgico præsidio receperunt affectionem oculi sanare. Sed; ut credo, errarunt in cognitione affectus: Nebulam enim habuerunt pro ungui; qui est membrana quædam ab angulis originem habens, & expansa supra conjunctivam; & aliquando supra corneam. Quæ curatio Chirurgicis præsidiiis perfici potest: quia materia hæc est impæcta in laminis corneæ, neque est in membranam conversa. Quare ad Pharmaciam devenio.

Alvus itaque leniatur mell. ros. sol. & manna: Præparentur humores syr. de beton. de cichorio; & oxymel. simpl. cum decoct. proportionata. Purgentur ægarico; & rhubarb. cum mel. ros. ac syr. de polypod. compos. Deinde validioribus attenuantibus præparentur humores, videlicet syr.

de beton. compos. de cichorio compos. & oxymel. compos. cum portiuncula syr. de stachad. & decoctione betonica, euphrasia, verbenæ, & cichorii, stachadis: & validius purgetur corpus, pilulis nempe aggregat. & satidis, vel pilulis de hermodactylis, cum pilulis lucis: quales debent esse in frequenti usu in tota curatione: Purgetur caput cum masticatoriis, cum errhinis, & deinde ad localia hæc transitus. Intrinsecus autem omnium maxime mihi probatur decoctum ligni guajaci, & salsa; sed temperamenti habita ratione, & ætatis, cum sudore bis in die; & victu tenui, & attenuante, non tamen tenui valde; additis decocto herbis capitalibus, ocularibus, & cichoriæ, præmixto bolo ex Terebinthina Veneta; lota aqua euphrasia; vel simili. Quò tempore localia extrinsecus partibus affectis erunt in usu. Oculi autem convenient attenuantia, digerentia, & utcunque emollientia, cum aliqua corroboracione, ob laxitatem venarum. Quare parantur pulveres ex sepia; combusto punice; cornu cervi; cum portiuncula saniculi, & plantaginis pulverizatorum. Parabitur decoctum ex sanagraco; & meliloto; cum saniculo, euphrasia, malva, althea, & plantagine: vel aquæ jam propositæ, cum portiuncula aceti; & croci: ad penetrationem: deinde validiora erunt accommodata, qualia erunt decoctum sabine, scabiosa; salsa, incisa, cum portiuncula plantaginis; & pulvis ex sepia, & sale armoniaco æquis portionibus; vel etiam pulvis iherosolymitanus, sarcocolla & similia. Commendatur quinetiam sief de fellibus.

Auri verò alia conveniunt; instillatio nempe olei de saniculo; de aniso; sed omnium maxime suffumigium ex decocto saniculi, sanagraci, sabine; salsa, ac bryonia, cum lapide pyrite. Brachii autem inunctio facta oleo vulpino; de castoreo, de lumbricis, & similibus. A decocto verò stillicidium, cum supra suturam coronalem, cum supra nucham erit ex usu, ex aqua Laſtensi: & luta digerentia Divi Petri pro utroque brachio.

Quibus jungenda est congrua victus ratio, quam ut optimè notam brevitatis gratia prætermittendam cenſeo: Intrinsecus juvabunt conservæ cephalicæ, de betonica; de flor. salvia, roſmar. cum Euphrag. conveniunt aq. Divi Petri & vesicans in occipitio; ac tandem repetatur decoctum in Autumno, utaturque vino medicato: Bened. Silvæ. Consil. & Resp. Medic. Cent. 1.

Pro mercatore Bergomenſi Pterigio, seu angue oculi sinistri desento.

Est res mira, quod oculus ea pars nobilis existat; de qua Galenus ausus fuerit affirmare, caput ejusdem gratia factum fuisse, & nihilominus tot malis miserrimè subijciatur, inter quos post morbos attingentes ad partes, quæ eundem oculum movent, primum occurrunt morbi adnatæ; & cõnexæ tunicæ; qui cum varij sint, qui nunc occurrunt in egregio Bergomenſi, pertinet ad magnitudinem auctam; ac tumor dicitur, qui cum in hisce clinicis multiplex esse possit, Pterigium inquam Myrceph, Staphiloma, & Melon. tumor præſens est I terigium; seu unguis; ficti oculis ipsis deprehenditur, nam solet morbus hic in adnata tunica nasci ex altero angulo, vel ex altera palpebra adnasci, cum ea tamen differentia, ut rarissime ex palpebris; Rrr  
rard



raro ex angulo externo, frequenter ex interno prodeat. Cum igitur tumor noster suum initium in adnata tunica ex angulo majori suscipiat, jure unguis vocari debet, quod cum adhuc vel persistere possit in prædicta tunica, vel eadem egredi, & modo corneam solum, modo pupillam attingere, tumor propositus erit de numero eorum, quæ corneam ea in parte obsident, quæ est e regione ipsi pupillæ, quia impeditur visio.

Amplius quoniam, ex Principe, alia est ungula carnea, alia membranosa, alia adiposa, & membranosa, alia alba, alia nigra, hæc partim est carnea, ut potissimum in apice color docet, partim membranosa albicans, ut in basi.

Causa immediata hujus vitii est substantia carnea, & membranæ, quarum utraque fit ab alteratrice residente in carne anguli mediante calore innato per auctricem facultatem, coegit tamen ex Actio scabrities in oculo derelicta ophthalmiam sæpius perpesso, agitur enim Jo. Anus, ex quo oculus hic laborat, ut refertur.

Causa verò materialis respectu substantiæ carnosæ sanguis existit, respectu membranæ pituita, qui humores sicuti ex colore liquent, ita partim per congestionem, partim per defluxionem collecti fuerunt; per congestionem quidem, quoniam tuberculum hoc sensim extuberavit, excrevitque, per fluxionem, quoniam sanguis non in oculo, sed in hepate generatur, ac genitus in prima hujus vitii generatione copiosius, quam par sit occasione ophthalmiæ fuit attractus, nunc verò propter imbecillitatem partis copiosius pariter quam conveniat, transmittitur, ac per venas adnatæ tunice, pro nutritione, ac cretioneque tuberculi suggeritur; Quæ omnia, & de pituita affirmari possunt, quando primum a cerebro ad hanc partem attracta fuerit, & nunc ab eodem in illammet transmittatur ob causas jam dictas, sed & pituitam ibidem aliqua ex parte congestam esse supra tactum fuit.

Ut ergo ager ab hoc malo liberetur, tuberculum est adimendum, & procurandum ne reviviscat, quod fiet, aut si prædicti humores alio desleantur, aut eorundem generatio per alterationem capitis, & ventriculi cohibeatur, ante quæ omnia prius totius (ut dicunt) providentia est habenda.

Et quoniam hoc morbi genus, tanquam illud quod facile materiis medicis cedit, facile vincitur, quod potissimum contingit, quia superficie adnatæ tunice solum adheret, ideo medicus curans proprio sine absque dubio potiri poterit, non negarem tamen aliquam difficultatem esse occursum, quoniam affectus est in habitu, ac pupillæ regionem attingit.

Quare deveniens ad materias medicas, & primo ad chirurgicas statuo, hæc ad tria capita reduci, ad disponentia inquam curantia, & præservantia; In genere disponentium est sectio venæ brachii, tum internæ, tum externæ ejusdem lateris, nam patiens quamquam sit ætatis inclinantis, est tamen habitus plethorici, quando subdominium sanguinis dominio melancholiz inungatur, disponent etiam ad curationem apertio venarum anni, cucurbitulæ scarificata, primum dorso, deinde occipiti adhibita, item & hyruidines post aures appositæ.

Materiæ chirurgicæ curantes hunc affectum, & ipsæ in casu nostro locum habent, quoniam est absolutus, & consummatus, initiatus enim secundum antiquos detergentibus medicamentis curatur, Verum quia pterigium consummatum, vel est mite, vel contumax, si mite, apprehenditur vossella, deinceps ferro incisorio abscinditur, quod si sit contumax, Albuchanis, & Aetius docent modum pulcherrimum, cui est hamulo perforare tuberculum ad basim, deinde filum lineum duplicatum acu transire, utrinque ad basim arte deligare, atque sic tuberculum his istis deligatum, & apprehensum incisario instrumento abscindere, quod opus nec Vere, nec Attate, quibus temporibus humores fluxibiles existunt, ex Celso peragi debet, factaque incisione linteamen imbutum aqua rosacea, ac aloumine ovi est apponendum, tum ut palpebræ non coeant, hæreantque, tum ut dolor sedetur, ac fluxus reprimatur, tandemque applicanda sunt medicamenta siccantia de quibus infra.

Materias chirurgicas præservatorias refero in cauterium cervicis, & brachii ejusdem lateris.

Medicamenta disponentia sunt primum lenientia, sicuti mel. ros. sol. 2. præparantia, uti decoctum betonicæ, cicorii, boraginis, Verbenæ cum syrupis appropriatis, 3. purgantia, ut medicamentum ex Agarico trociscato, sena, cum manna, Et repetenda nec eo judicio erit præparatio, deinde purgatio cum pilulis cochis, & lucis reiteranda.

Medicamenta Curantia, quæ detergentia fuissent, non propono, quia ut dictum fuit, hic non habent locum, solum igitur siccantia adduco, quæ post incisionem conveniunt, hæc itaque parantur ex collyrio de plumbo, de thure Ratis, huc pertinet aqua stillatitia salis ammoniaci, & quæ ex ipso calcinato, si in loco humido reponatur sponte prodit.

Medicamenta præservantia sunt quæ corpus, & caput præsertim a succis excrementitiis expurgant, atque idem caput, & oculum affectum corroborant, priora sunt pilulæ lucis, sine quibus, decoctum guajaci, lallæ, & chinæ cum simplicibus capitalibus, & ocularibus, multicatoria, lotio capitis cum lixivio exiccante; Posteriora sunt, veluti vinum medicatum cum eisdem simplicibus capitalibus, & ocularibus itemque lotio oculi cum aqua stillatitia ex conserva Eufragiæ in succo rosarum macerata.

Quibus omnibus addenda est comparvictus ratio, extenuans inquam, & siccans quæ sicuti & alia præsidia proposita utinam pronè valde in gratiam nostri patientis evadant. *Jul. Cas. Claudin. in Consultat. Medic.*

#### De Visione læsa. Pro Nobili Raguseo.

Agitur nunc annus, cum patiens Illustrissimus conqueritur de visione utriusque oculi sensibilibiter læsa, magis tamen sinistri, tantum non prorsus obcecati. Utrum vero sit immixta tantum vitio, ita ut imperfectè videat, quemadmodum refert Vir Excellentiss. in consultatione ad nos missa, vel etiam depravata, possumus ambigere. Si enim videret veluti atomos, sicuti relatum in appendice quadam, alien. manu addita Epistolæ Excellentiss. Crassi, depravata quæmetiam



esset visio, ratione atomorum, atque ita præsens affectus non pterygion simplex esset, sed potius principium lutionis, vel legitima, vel spuria, pro diversa ratione atomorum apparentium in quam sententiam feror, cum alias ante 20. annos offuscationem passus fuerit, oculosque habeat hæreditaria constitutione debiles, & prominentes.

Utriusque tamen unicum principium agnoscimus, fluxionem scilicet materiæ cum vaporosa, tum humidæ à capite ad oculos à naturæ primordiis admodum laxos; & quidem vaporosa in corneam se insinuans per internos ductus, atomos repræsentat, aut hinc, si vapores sunt crassiores, & quasi in humores converti, aut volitantes, si tenuiores fuerint; humida verò, sanguis scilicet crudus, & crassius, ad angulos oculorum sensim & sensim contuens, & forsitan ad internos: nihil enim hac de re ex consultatione transmissa colligere possumus: inde in externa tunica membranosa illa substantia carnosæ similis expanditur, quæ in dies magis adauctâ, & locum occupans ampliore, non conjunctivam tantum, verum etiam corneam obducit, atque ita visionem impedit. Ideo verò talis materia redundat in capite, quia cum ratione humiditatis excedentis obruto calore nativo, congerit excrementa, tum ratione caliditatis, allicit à jecore fervido, & forsitan à toto corpore calidos vapores, & seroas humiditates biliosas, quæ mixtæ cum pituita, saliedinem inducunt, ob quam alias passus fuit pruritus insignem circa palpebras.

Quod si hi sunt affectus, quibus affligitur patiens, eventus prædictio non est difficilis; siquidem pterygion jam confirmatum nullo prædictorum genere poterit ita removeri, ut pristinam visionem recuperet. Quanquam enim experto chirurgo sese committeret, qualem non habemus, qui carnis illius tentaret avulsionem: quod difficillimum quinetiam est, propter continuum oculi motum; cicatrix tamen inde obducetur, quæ visionem pariter turbabit, ut propterea perfectam sanitatem polliceri non possumus; sed meliorem saltem statum, atoniorum scilicet remotionem, atque præsertionem à majori labe utrique oculo impendente.

Quod ut fiat, status sunt discutiendi: fluxio prohibenda; materia impacta, & in carneam substantiam conversa partim emollienda, partim attenuanda, & insensibiliter digerenda, corroborandi sunt oculi; & corrigenda principalium viscerum intemperies, capitis quidem, exsiccantibus, in activis temperatis, jecoris verò refrigerantibus, præmissa totius evacuatione, & particulari capitis expurgatione.

Caput peculiariter est expurgandum masticatoriis ex mastiche, feniculo, zingibere, confectis cum cera & saccharo; Erthius quinetiam levioribus, ut enim validiora trahunt à capite, ita leviora ab oculis, ex Hippoc. sententia de Locis in Homine. Hæc autem erunt succi feniculi, majoranæ, chelidoniz, & betæ depurati, & per nares attracti. Hisque administratis præscribendum est decoctum ex sassafras, & visco quercino paratum, addito feniculo, euphrasia, & chelidoniz, cum columba tutricola præmisso bolo confecto ex zingibere condito, & trochiscis viperinis: quod etiam validius red-

detur, si loco columba decoquantur duæ viperæ, amputatis capite & cauda: quarum carneam si comederit, summo erit juvamento, utorpatis familiariter pilulis, cum alephanginis. Pulveres quoque parari poterunt ex semine feniculi, cardamomo, silere montano, galanga, & pipere albo, cum cibis assumendo.

Inter cibaria autem à proprietate juvantia, sunt passeris, aves rapaces, caro viperæ, cum feniculo, ruta, chelidonia; vinumque sit oligophorum. Rapas spiritum visum valde luminis reddere scribit Averroës. Collyria interum non omittuntur, parata ex melle destillato cum croco, myrrha, & camphora. Inter cetera à proprietate juvantia, laudatur hepar caprillum exsiccatum, & in subtilissimum pulverem redactum, oculisque insufflatum. Et hæc in casu præsentis, ausim dicere incurabili, proponenda duxi, quæ Deum Optimum Maximum ut uni sint, obnixè precor. *Benedict. Sylvatic. Consil. & Respons. Medicin. Centur. 1.*

Puer octo annorum, post variolas, nondum satis rectè exsiccatus, cum sese atri nebuloso & venoso exposuisset, incidit in oculi dextri inflammationem, quæ per collyria adhibita curata apparuit in eodem oculo membranula densa & alba, per tunicam conjunctivam & corneam, usque ad mediam iridem, sese extendens, eaque visum aliquantum imminuit.

Afficitur in hoc puero oculus dexter, secundum tunicam adnatam & corneam, quod ex alba tunica in iis excrecente & conspicua pater.

*Morbis*, qui illum affligit, est dextri oculi pterygium; sive excrecentia quædam membranæ alba & densa tunicæ adnatæ & corneæ dextri oculi adnascens, & ad mediam pupillam sese ibi extendens, visumque in illo oculo imminuens.

*Causa præcatartica*, unde hic morbus principium cepit, est aer nebulosus & ventosus, cui hic puer ante justam variolarum exsiccationem sese exposuit. Inde enim pori corporis & præsertim faciei & oculorum clausi, halitus acres & calidos, libere exhalaré solitos, in corpore facie & oculo dextro retinuerunt: itaque in istis partibus retenti, constituerunt hujus morbi causam antecedentem. Pars vero eorum calidior in tunicam adnatam dextri oculi, per poros ibi nimis apertos delata, ibique vehementius incallescens, vellicandoque eam suo calore & acrimonia majorem ad eam humorum calidorum affluxum faciens, induxit, tanquam causa continens, primum oculi dextri inflammationem, quæ per adhibitionem convenientem collyriorum fuit quidem sublata; sed quoniam pars allapsorum humorum circa superficiem tunicæ adnatæ, ob tenacitatem suam, & pororum vicinorum nimiam angustiam ibi fuit retenta, & in membranæ albæ rudimentum, secundum particulas suas insensibiles disposita & formata. Hinc dum copiosiores humores in illud rudimentum magis magisque affluebant, factum est, ut primum in tunica adnata membrana alba & opaca fuerit nata; eaque deinde majus incrementum paulatim sumens, & pedetentim per tunicæ corneæ superficiem prorepens, partemque iridis & pupillæ tegens, jam aliquantum sua



opacitate, justum radiorum ingressum impediens, inducit visus imminutionem.

Quoniam hoc malum acia remedia desiderat, quæ ab oculis ægè feruntur, ideoque difficilis ejus curatio est; quæ sæpè non satis feliciter succedit.

Ea tamen in hoc puero, cum morbus non sit antiquus, per membranae istius ablationem tentanda.

Primo itaque purgetur hic puer tali medicamento purgante.

℞. Syr. de passulis laxativi ℥j. scammonii gr. iv. aq. decoct. hordei ℥i β. milce F. haultulus brevis aliquoties reiterandus.

Deinde adhibeatur oculo bis terve in die tale Collyrium.

℞. Aq. rosarum ℥iv. Salis ammoniaci q. s. ad levem acrimoniam lingua percipiendam, eaque mixta indantur pelui æneæ barbitonforum, & in ea relinquuntur per biduum vel triduum, donec colorem viridem acquirant.

Hoc remedium si non suffecerit, ad aciora erit procedendum, quale hoc est.

℞. Lap. hamatit. ℥ij. vitrioli alb. usti, virid. æris usti an. ℥iij. myrrhæ, croci an. ℥j. piperis longi ℥β. Sacchari candi ℥β. M. Pulveriscentur subtilissime.

Hujus pulveris ℥j. misceatur cum aq. raphani ℥ij. & applicetur bis terve in die, prout puer ferre poterit.

Ante & post horum usum, ad dolorem leniendum, oculus fovendus erit decocto emolliente malvæ, althææ, flor. camomill. meliloti, sem. cydon. fœnigræci, papaveris.

Si his localibus medicamentis pterygium tolli nequeat, ad Chirurgiam; quam Celsus; Paulus, Aëtius, Aquapendens, alique scribunt si placuerit, erit deveniendum.

Vistus sit attenuans & incidens. *Henric. Regium apud Theodor. Craanen Medicat. lib. 1.*

### Observationes.

#### Pro Albugine.

Puellæ cujusdam sinister oculus admodum rubebat, pruriebatque, lachrymæque continuo ex illo stuebant, & quia jam diu hic affectus duraverat, albugo in oculo nata, mediam ferè iridis partem obtexit, ita ut de visus amissione, esset periculum, jussi cucurbitulas cervicis regioni aliquoties applicare, & cataplasma sequens oculo clauso imponere, continuoque gestare, & bis in die renovare.

℞. Pulp. pomorum odor. acidulorum quart. i β. incid. minutim, & in aq. ros. & fœnicul. coq. donec in pulsem redigatur cui contulz, adde mucilag. sem. fœnuigr. ℥ij. album. ovorum nu. 3. cortic. granat. pulv. ℥j. lapid. hamatit. exactè eriti ℥β. ol. rosac. parum M. F. cataplasma.

Hujus remedii per dies 5. usu, oculus ad colorem statumque naturalem rediit, albugoque & macula penitus sublata sunt. *Felix Plaurm, observ. lib. 1. pag. 113.*

#### De oculi cicatrice in pupilla visionem impediens casu deleta.

Puellæ cum ex cicatrice in cornea media se de nata, visus impediretur, Chirurgus sacch.

cand pulverem oculo inspergere volens, ad eam extergendam, errore quodam pixidem eam arripuit, in qua sublimati pulvis continebatur, quem cum imprudens oculo inspergeret, tanta suborta est inflammatio ut periculum esset de oculo: tamen sanata, tantum abfuit ut quid obfuerit, ut potius multum profuerit. nam cicatrice pene universa deterfa, remanente levi duntaxat macula, visum recuperavit: quod indicio est, globum oculi, fortia quoque perferre posse medicamenta cum cornea ipsius tunica sit durissima & insensibilis. *Felix Plaurm. Obs. lib. 1. pag. 113.*

#### Pro Oculo perforato.

Quatuor annos natam puellam vidimus, cui dum nodum in pannu solvere acuto gladio niteretur, resiliens mucro oculum dextrum percussit: quo perforata ipsius oculi tunica, plurimus statim inde fluxit humor: quare etiam visum prorsus amiserit, ipsum tamen haud multo postrite curata recepit, tanta enim inest vis tenellæ illi ætati, ut huic ipsum oculi humorem (quod sæpè accidit) in integrum rencere possit. *Ant. Beneven. c. 74. lib. de abditis Morbor. & Sanationum causis.*

Quindecim annor. adolescentem cum *Dom. Joan. Griffonio* Chirurgo præstantissimo curavi, cui acus sutoria perforaverat adnatam membranam prope iridem: hinc factum, ut humor aqueus statim efflueret, & adolescens illico visum planè amiserit. Oculo imposuimus in primo apparatu album. ovi cum aq. rosac. & nonnihil croci: fronti autem defensivum ex bol. arm. terra sigill. cum ol. ros. paucaq; cera & aceto in formam ungu. redactum atq; iniecimus statim enema. Sequenti die catharticum exhibuimus, & anodynis ad septimum usque & amplius vulnus tractavimus. Deinde collyrio ex aq. euphras. sacch. & tutia præp. cicatricem induximus, hic curatus fuit nullo superveniente symptomate: haud multo post curationem visum quoque recepit. Curavi etiam puerum cui infixæ sagitta perforata fuit cornea, quia parte conspicitur iris; effluxit nonnihil humoris aquei, unde contracta est cornea; & puer protinus visum amisit. Vulus curavi ad modum supra dictum: puer hic quoq; non multo post visum recepit. Omnino his ægrotis crystallinus humor compunctus non fuit: est enim ille humor præcipuum visus instrumentum, ac sua propria continetur membrana arachnoide; qua dilacerata, amplius humor crystallinus officium facere nequit, effluxit autem in his aqueus tantum humor, qui cum sit excrementum aliquando renascitur, præcipue in pueris. Id autem hic notandum, vulnerata pupilla visum recipi non posse, quamvis humor crystallinus sit illæsus, & aqueus renascatur: inevitabilis enim cicatrix impedit, quo minus radii eorumque visui obijciuntur, ad humorem crystallinum perveniant. *Guil. Fabric. Hildan. obs. 26. cent. 1.*

*Franciscum Plazconu* 12. annor. puero medebatur cui cornea pertusa, humor aqueus oculi totus effluerat. Sed intra binos menses spontè sic preparatus fuit, ut oculi usus ipsi omnino fuerit redditus, ob reliquarum partium constitutionem humidam. Idem *Gal. lib. 1. de Symptr. Causis, c. 2.* annotavit. *Jo. Rhodini obs. 82. cent. 1.*

#### Pro Oculi tumore carneo.

In muliere vetula paupere, tumor in oculi sinistri



nistri latere juxta pupillam ante biennium exortu; cum oculi immenso ardore & dolore; adeo accrevit ut medium tert occuparet oculum, prominebatq; ad avellane majoris magnitudinem, carnem ex rubro nigricantem representans, adeo deformi colore, ut pavorem insipientibus incuteret, tandem suppuratione facta per dies quatuordecim, ater ex eo effluxit sanguis, remanente nihilominus carne illa ex atro rubente & nunc virecente. Ad me consilii gratia veniens, jussi ut pomum putridum applicaret exiguam spem sanationis habens, verum cum non proficeret, jussi ut lumeret cortic. gran. pulverizaretque & adderet sol. plant. rec. eaque simul in aq. fabrorum ferrata decoqueret, addendo albumen ovi, simulque decoquendo, & sub finem pulv. vi- trioli albi ea quantitate, quam oculus perferre posset. hocque cataplasma noctu oculo impone- ret, illiusque usum continuaret. Post duos men- ses reversa, vidi tumorem media ex parte ab- sumptum, quapropter in huius applicationis usu, pergendum esse consului: quod cum adhuc men- sibus duob. fecisset, tumor omnis præter omnem spem evanuit. *Felix Platerus obs. lib. 2. pag. 387.*

*Pro Oculi vulnere.*

*Lithuonius* quidam qui ab omnibus medicis, æ- gyptis, anubus, venenecis, chymicis, in tota quam obierat *Europæ & Asiæ* secreta ut vocabat prece- vel pretio, vel permutatione, plurima college- rat; inter alia gallum gallinaceum, utraque illum manu tenens, mihi ostulit, jussitque me oculum sapius acutissimo scalpello punctum interq; di- gitos pressum, orbitæ cranii reponere: affudit illi liquoris guttas duas, obligatoq; capite cista in- cludit; qua post horas octo eduxit utroq; oculo ita sibi simili, ut nec ego qui secueram, nec ad- stantium ullus, secum oculum a sano posset di- stinguere. Sucus ille erat is, ut mihi fatebatur, qui in vesicis ulmorum Majo mense invenitur, quique nisi tum colligatur, in granula quædam rubra vermiformi mutatur. Hanc ego artem ludicram nullique tanquam profuturam diceus, cum scire non possemus, an cum oculi externa pulchritudine visus servaretur: Cum tamen ali- quot annis succum hunc colligi curassem, est e- nim vulnere, sanandis commodus: casu duabus sororibus a puerulo colludentibus, junior adul- toris linteum suæ brachium vi elevans, acum in mediam pupillam altè adigit, extemplo, à patre principis consiliario accitus, observo a- queum humorem, & partem vitrei effluxisse: ap- plico oculo tumentis velicarij ulmi succum sub quartam pomeridianam; jubeo sub mediam no- ctæ linteum admotum novo liquore imbui, quem Othonnæ certius, quam tot ignoratum herbarum succos nominarent Botanici. Manè testor Deum & Fidem externa sanam offendi, sed illius oculi lumine capram, etiam nunc vige- simo ferè post anno, nullus excæcatum oculum à vidente, etiam si curiosè indaget, discriminare potest, imò multis annis cum marito orbitatis ejus infelix vixit. *Henricus ab Heers obs. 4. lib. 1.*

Ad Oculorum vulnera Beryllus aliqui cele- brant, sive illa pupillæ, sive alteri parti insista- fuerint. Reducitur Beryllus contusus & tritus in pollinem exactissimè ut impalpabilis sit. Deinde lentis quantitate pulvis quotidie manè, supino jacente ægro, in oculum donec sanetur, infundi-

tur, ac præcipitur ut æger immotus aliquandiu supinus permaneat. Si pupilla vulnerata fuerit, etiam cominodè sanari non possit, tamen ita emen- datur, ut oculus deformis non fiat. Si laxisio extra pupillam fuerit, præclare sanat beryllus, quem- admodum etiam omnes oculorum contusiones. Suaderem ad contusiones & sugillata, ut infusio heret aquæ verbasci. Si adjuncta esset inflamma- tio, aq. rosar. plant. euphras. vel Simili. Si vulnus esset, aq. beton. tormentill. vel plant. *Anselmus Boetius lib. 2. De Lap. & Gemmis, cap. 71.*

*Pro Corneæ male affecta à Scoria Chalybe.*

Rusticus quidam cum Chalybem emeret, op- timumq; eligere vellet, & proinde ut fieri solet, frustum contra frustum allideret; Scintilla ipsi in illam corneæ partem, ubi iris conspicitur, profi- lit, ibidemque membrana firmiter inhæsit, idq; non sine dolore maximo, cum frustra per plures dies adhibita fuissent remedia. En uxor mea re- medium longè aptissimum excogitat. Interim enim dum ego ambabus manibus palpebras a- perio, illa magnetem bculo quam proximè æger id sufferre potuit admovet, id cum aliquoties & quidem repetitis vicibus fecissemus (non diu enim lucem quæ tamen hac in re summoperè o- pus fuit, sufferre potuit tandem Scoria ex oculo nobis omnibus videntibus ad lapidem profiliit. Postea applicato collyrio anodyno brevi con- valuit, fuit hæc quidem curatio ingeniosa satis. *Gail. Fabrii. Hildann. Obs. 21. cent. 5.*

Quædam mulier infimæ sortis maculam habe- bat in oculo cui consilium dedi, ut bis in die succi rutæ guttam unicam in oculum instillaret, quod cum satis diu continuasset macula prorsus absumpta est. *Samuel Fornius. obs. 28.*

*Vulnus Tunicæ Corneæ, cicatrice obductum.*

Anno 1654. mense Decembri, scemina pagana adduxit ad me filium quasi octenniem, cui ocu- li corneæ prope Iridem cuspidè cultri usque ad Uveam pertula erat: & humoris aquei particula cum Uvea illa, extra Oculi vulnus ad lentis magnitudinem protuberabat. Illi poscenti auxi- lium consilium dedi ne quicquam remediij lasso adhiberet Oculo; alias enim facile fieri posse ut Uveæ protuberans particula medicamentis præ- sertim acrioribus adhibitis, corroderetur, & A- queus humor omnis efflueret, atque adeo Ocu- lus perdetetur; Futurum enim esse ut ipsa Natu- ra vulnus coalescere faciat, atque prominentem Uveæ folliculum, obducta cicatrice, sine effu- sionis periculo dirumpat; id quod postea acci- dit, Reversus enim ad me puer sequenti anno, quinque hebdomadam intervallo, oculum mon- strabat, id quod cicatrix perfectè coaluerat, & ruptæ Uveæ quædam laciniolæ extra propende- bant, pupilla vix ad sensum in ellipsim distorta, visu integro: Præcepi puero ut oculo à contu- sionibus caveret, nam alioquin, rupta denovo cicatrice, nullum contra oculi effluxum super- fore auxilium. *Stephanus Splessi.*

*Vulnus Oculi & coalitus humoris Cry- stallini.*

Juvenis 20. annorum in pueritia, ex illa ve-



hementiori manubrioli cælli æneo nodulo instructi corneam cum profusione humoris aquei, tum & pupillam dirumpens, omnique inde actione visus orbarus; oculo affectio, qui sinister erat, indies ad deformationem usque excrecente; hunc suasu Medici cuiusdam illustris corrigere attentavit. Convocato itaque Chirurgo, ac preparato prius corpore, consultum, ut evacuatis per incisionem corneæ oculi humoribus oculus detumesceret; ac sano multo minor evaderet, sicque daretur locus impositioni corticis vitreæ, ad figuram oculi sani assabre efficeret; uti Venetius, & Luteius Parisiorum frequenter fieri assolet. Dictum factum: consentit Patiens, Chirurgusque operationi (collocato ægro in sedili humiliori in loco lucido, obfirmato oculo sano, ac affecto per speculum immoto detento) sese accingit: Incisio fit transversim per Corneam absque ullo ægri dolore. Prorupit proximus cum inpetu ad notabilem distantiam humor aqueus cum portione vitrei, crystallino ad labia vulneratæ corneæ adhærescente, quo conspecto Chirurgus humorem illum specillo argenteo immisso propellere conabatur, sed irritò conatu: firmissimè enim coaluerat, cum cornea lens illa Crystallina, tum quod & æger, cui imminerebatur animi deliquium ob profundius immisum specillum & commotionem fibrillarum retinæ ulteriorem tentationem renueret. Inde subsecuta inflammatio oculi affecti cum hæmorrhagia levi propter læsas venas, quæ varicosæ usque ad continua corneæ protendebantur, dolore insigni, hemicrania & sibilo auris sinistra, quo necdum, elapso ferè sexennio, adhuc liber est Patiens. Coaluit vulnus corneæ spatio ferè decem dierum nullo alio adhuc ito medicamento externo præter cataplasma molle, confectum ex sedo majori, farin. sœnugræ. pulvere Euphrasie, mucilag. sem. cydon. c. aqu. rosar. & plantag. extracta. Perseveravit dolor & tumor oculi ferè per hebdomadas quinque tracto etiam in consensum oculo sano: abhinc per intervalla repetiit dolor, usque dum totaliter intermitteret, oculus detumuit, & in hodiernum usque diem tabescit Coalitum humoris Crystallini, qui etiamnum in oculo est patientis; inde deducendum putat patiens, in Medicina non adeo hospes, quod disrupra ex vehementiori illisu pupilla pressisque omnibus humoribus oculi: humor Crystallinus non impediens amplius pupilla antrosum proruperit ad corneam, illique arcibus accumbens & propter adquealem contusionem quasi adhærescens, tandem adhibitis medicamentis corrosivis ac potenter exsiccantibus, quasi cum cornea induruerit. Patet etiam ex hoc casu insensibilitas corneæ, & periculum quod sano oculo ex talibus operationibus imminet. *Laurentii Wolfstrigel.*

*Oculi vulnus scalpello influctum feliciter curatum.*

Puellus biennis, Filius Tabellionis Neocomedensis infeliciter sidere natus, lotum enim non emittebat statim natus, quia urethræ extremum obtegebat membranula tenuis, quam scalpello pertudit meo iussu Simon Puri Chirurgus, indita postmodum cannula plumbea, hunc libere profluente lotio: Hic ipsa prima die qua libertas in-

cedendi per cubiculum absque in nudatione concessa est, obvium Patris Scalpulum, cuius manubrium osseum erat, mucron. tum ant. p. p. p. post aliquot gressus cadit, impactò manubrio remanente vola manus dextræ, Scalpelli autem cuspidè penetrante plano parte membrana a cantlio oculi externo, ad internum, adeo ut duplici vulnere transfixa essent membranae. Intra scalpelli maxima ex parte sub his delitescens: Hic sagacitas matris emicuit; quæ tam dextera manu primò manubrium alte innoxum eduxit, postea scalpelli aciem oculo impactam, ut hic salvus rem. nferit. Pupilla enim subditq; humores illasi fuerint. Præcipit desentius fronti & oculo admoventum, vix jam conspicua cicatrice: Hæc contigerunt anno 1619. *Th. Boneti.*

*Vim Catechu in Vulneribus oculorum.*

Ancilla quædam in servitiis cognata meæ, antehac visu oculi dextri orbatæ, remanente tamen ejusdem figura debita, iterum casu quodam ex improvilo rupturam illius experitur oculi. Humor inde aqueus tanta effluit copia, ut volam manus tantum non adimpleret, subsidente statim globosa oculi figura, cum hæmorrhagia non vulgari, dolore intolerabili, tumoreq; vicinarum partium singulæ. Accersitus ætutum Chirurgus collyrium immittit, ex aq. ros. alb. ov. & bol. arm. externa applicat epith. ex tuxi, bol. arm. camph. croco, cum aq. scenic. euphrag. rosar. &c. paratum: verum exiguo cum juvamine. Hinc ego in consilium unà vocatus, iussu pulvisculum ex catechu ritè præpar. myrrh. sacch. cand. &c. concimatum per vices in oculum immittere, unde, elapso paucarum horarum spatio, sanguinis humorisq; aquei fluxus cessavit. Cujus tamen usum ob metum recidivæ alicujus reiterare iussu, ita tamen, ut, cum ob dolores formam pulveris ægre ferret, pulvis ille cum aquis quibusdam ophthalmicis jungeretur, tepideque in oculum instillaretur. Sic oculus pristinam, sanato vulnere recuperavit figuram, præterquam, quod per vulnus ita bis infectum visus planè fuerit amissus. *D. Ehrenfridi Hage dornii.*

*Oculi vulnus curatum: Humor Aqueus restitutus.*

Anno 1660. die 30. Junii, Vittarii aulici filius, eidem opificio addictus, fenestram reparans, ab alio pætro ex nequitia fragmento vitri, longitudine digiti minimi, latitudine dimidii transversi digiti, vulneratur punctum in oculo sinistro, & quidem in tunica a uvea, ita ut transecta esset tertia pupillæ pars versus exteriorem & minorem oculi angulum, effluxit materia albicans instar Margaritarum, (ut referebat) quæ nihil aliud, quàm humor aqueus fuit. Corrugata erat tam aduata, quàm cornea tunica. Principio statim repellens, sequens præscripsi.

℞. Album Ov. aq. ros. an. ʒiij. Agitentur & conquassentur probè, adde bol. arm. præp. ʒß. M. imponatur frigide. Crastino die cum nulla inflammatio adesset; sed omnia tranquilla & sedata, sequens ordinavi.

℞. Sief alb. Rhaf. sin. op. ʒiij. Thut. præp. ʒiij. Camph. ʒß. aq. ros. ʒiij. M. pro Collyrio. Quod optime contulit. Cum vero e corpore impuro Symptomata metu n. iaciterent, d. e. 2. Julii purgationem institui hoc pulvere.



℞. Spir. Bened. Lax. Diat. c. rhab. ana ℥j. Crystal. Tartar. ℥ss. Diagryd. gr. j. M. F. Pulv. Dejecit 10. cum Euphoria. Interim collyrio præscripto usus est usque ad 6 Julii, ubi sequens magis exsiccat & conglutinans præscripti:

℞. Myrrh. Sarcocoll. lact. nutr. Bolivar. en. Thut. præpar. & aq. plantag. probe lot. 3j. Pulv. Qiteocoll. gr. vi. Mell. ros. q. s. F. instar Linim. Quo per sp. cium 10. dierum usurpato, vulnus egregie coalluit, imò *regeneratum* fuit aliqua ex parte *blenor aqueus*, cujus testimonium exhibebat tunica oculi repletior, & non ita corrugata, ut antea. Cum sic curationi Colophonem impositum putassem, ipsi Dixeram optimam commendans, ille hoc negligens, se cerevisia nimium quantum ingurgitavit, & ita tenuitatis præceps cecidit (salv. ven.) in cloacam, non quidem profundam, tamen straminibus multis refertam, ita ut vulnus de novo apertum esset punctura culmi, vel, ut ille dicebat, scitux Lignex acuta. Inflammatio statim, ac major quam in principio subsecuta, quod non tantum oculus sed & partes circumjacentes valde intumuerint, imò merus suppuracionis accesser. Priora remedia repeti, sed non tanto successu, ut antea. Mihi inter peregrè abundum erat ad Nobilem quandam agrotantem, donum reddens omnia exasperata inveni: præscripsi unguentum Angeli Salæ de cerula 5ij. Non possum satis deprædicare ejus vires, nam saltem circumferentia oculi secundum Authoris nomen sapius illinita, & dolor & inflammatio sedatus, oculusque ad primitivam figuram redactus. Tamen ad revulsionem materiz purgationem priorem exhibui, qua septies dejecit, & sequens Collyrium applicui:

℞. Sief. alb. Rhat. T. o. 5. 3j. Thut. præpar. 5ss. Thut. subtiliss. pulveris. 3j. Camph. 3ss. Croc. gr. iij. Aq. plantag. ros. ana 5ij. M. Quo vulnus iterum coalluit, ita ut eum rursus dimiserim. Sed die 5. Augult. nescio qua de causa Erysiplate illa p. rte faciei, ubi erat oculus affectus, laborare cœpit; quod etiam oculus simul intumesceret, & vulnus iterum dehisceret. Dedi statim sudoriferum ad discussionem materiz, ultimumque Collyrium rursus adhibui, cujus usu tandem perfectè sanatus est, ut saltem ab illa parte, ubi cicatrix erat, quæ tamen admodum exigua, visus impediretur.

## CORNUA.

**D**E Cornuum morbosa vegetatione impræsentiarum acturi, rem propriis Illustriss. Malpighii verbis contitemur; ille siquidem in hoc argumento Dissertationem Epistolam ad Clar. Jacobum Sponium conscripsit, quam nos ex utriusque communicatione jam ab aliquot annis in Bibliothecæ Anatomicæ parte prima, primum evulgavimus. Sic autem ille.

Inter reliqua quæ de externo tactus organo alias habui, nonnulla de ungulæ natura & generatione indicavi, quæ ut ulteriori fruantur luce; anatomica observatione firmanda veniunt. Duodecimus jam excurrit annus; quò mactandum bovem lustravi cum præclarissimis viris duo. Carolo Fracastato, & Domino Sylvestro Bonfiliolo, à cujus collo in dextris, ubi jugum

apponitur insigne pendeat cornu: hujus longitudo decem & sex digitorum crassitiem equabat; non longe a basi, ubi latius erat, octo digitorum latitudinem explebat. Ejus forma conica erat, & in osculum deducta apicem non parum versus finem circabatur; in basi tamen, ubi collo necebat, arctius erat. Color circa extremitatem subniger, lucidusque erat & persimilis ei qui in ungula bubula passim observatur. Exterior superficies aspera erat præcipue à basi usque ad medium; etenim cuticula, & subjectum reticulare corpus cum contentis papillis (quæ in alius partibus perpendiculariter attolli solent; & tactus organum constituunt) sensim produci inclinarique incipiebant, non dispari specie ac in nostrorum digitorum extremitate quilibet prope unguum radicem observare potest. Papillæ igitur laciniatæ cuticulæ, & reticulari corpore circumdantur; majorem longitudinem sortitæ, ita inclinabantur, & invicem hærebant, & ferruminabantur, & extremis finibus; ut squamosum piscium integumentum æmularentur. Circa basim squamosa hæc corpora breviora erant, sensim verò producebantur, & prope collum longissima reddebantur. Varius quoque erat substantiæ modus, nam in basi mutuo connexa conglutinabantur; sed solutis ipsorum nihilus laciniatum, & asperum excitabatur corpus; ultra tamen medietatem densiori donabantur compage, unde & lucida, & lævia videbantur. Interius expositum cornu concavum erat; ita ut crassities ipsius in basi nativam corii altitudinem parum excederet, gracilescendo cute; & attenuato corio, ad naturam quasi membranæ intus anhebatur, quod sanguinea vasa irrigabant; hocque detracto solidum & læve corpus occurrebat. Tota concavitas referta erat sublimi, turbidoque sero; quod igni appositum totum fere in naturam albuminis ovi concrecebat, sub bali glandulæ conglobatæ, depresso tamen, insigniter luxuriabant. Hoc itaque famigeratissimi Aldrovandi musæo dono dedi, ut exterorum præcipue curiositati prælo esset. Ex hujus igitur diligenti inspectione patet, papillas, (quas non incongruè externi tactus organa credidi) cuticulæ; & reticulari corpore custoditas; ubicumque plus justo produciuntur, & invicem intime unitæ ferruminantur, in solidum definire corpus: quod commune est ungulis & cornibus, quæ sola exteriori configuratione, & majori minorive partium densitate donata, ab invicem discriminantur, unde veluti sensorii additamentum; censenda veniunt, & tactui quoque non parum conducentia. Cornuum è carnis erumpentium observata productio his multum lucis confert. Hanc itaque vegetationem in bove deprehensam in Physicæ additamentum audire ne graveris. In foetu igitur adhuc in utero contento, crani os in situ cornuum serè cartilagineum est, & postremo osseam naturam acquirit. Pili ibidem primò erumpunt glabrò existente corio præter labia, quæ quibusdam pilis ornantur. Hic taliter locantur; ut ipsorum ordines à circumferentiâ versus centrum situati & inclinati minimum quasi corium efforment. Postremis quoque mensibus in foetu adhuc concluso, ossæ lamellæ (quibus cranium compaginatur) obliquari



incipiunt, & fractâ directione extra eminent, excitatis intro subrotundis spatiosis, unde supra cranium osseus tumor primò emergit, lenticulare corpus præferens. Hoc extenso corio cooperitur, quod præ reliquis crassum est, & turgentes exhibet glandulas. Inter osseum corpus & corium periostrion, seu osseæ substantiæ inchoamenta locantur, quæ paulatim manifestantur. Extra uterum sensim osseus tumor lenticularis parum assurgit, turgentibus osseis lamellis. Supra os crassum luxuriat periostrion, seu futuri ossis inchoamentum. Corium quoque obducitur, à quo tactus papillæ assurgentes reticulari, & cinereo corpore ambiuntur. Altero elabente mense ossea substantia, laminulis & spatiosis contexta extuberat, ita ut cornu rudimentum emergat, dimidiam digiti crassitiem æquans, & conoidem parabolicum representans. Huius exterior superficies lævis, & glabra sensim redditur, nigroque inficitur colore. Corium crassum de more extenditur, à quo tactus papillæ erumpentes, superato reticulari involucri, quod cinereum est, elungantur, & nigro ambiente succo conglutinantur. Hæ circa cornuum basim inclinatæ versùs apicem diriguntur, reliquæ vero ab apice exortæ perpendiculares quasi assurgunt, & reticulari corpore custodiuntur, earum longitudo vix scrici villosi longitudinem æquat. Interea inclusa ossea appendix augmentum capit, & interiùs varie configuratur; etenim ut plurimum radix fistulosâ excitatur substantiâ, quæ osseis fibris reticulariter implicitis componitur; reliquum vero usque ad apicem spongioso constat corpore sanguinea vasa intercurrent, & apex perpetuo submolli firma partium compage non gaudet. Corium quoque; extensum osseam substantiam investit, & in basi crassius est; Ab hoc itaque; emergentes tactus papillæ, ita propter redduntur ut inclinatæ versùs apicem, simulque reticulari corpore unitæ, tot conica corpora concava efficiant, & ex horum unione (quasi tot lamellis, cæparum instar, intra se positis) solidum cornu corpus efficiatur. Papillarum ordines in basi erumpentes, licet non omnes apicem attingant, ut plurimum tamen rectâ deducuntur, & serè cornu ambiunt, alix quoque sub diversis planis à producto corio propagantur, quæ longiores reddunt, breviores cooperiunt & includunt: unde secto per longum cornu, non solum ossea substantia occurrat sed etiam corium, à quo molles papillæ emanant, quæ in cornuum substantiam immutatæ solidescunt, & nigrescunt; avulsoque osse cum ambiente corio, fistula in cornu à reticulari opere excitata patent. Occurrunt quoque papillarum tactus varii exortus & plana, ipsarumque productio ad apicem; unde cum diversa plana extremum corium constituent, hinc est quod apicis substantia crassitiem serè digiti æquat. Exarata papillæ basim cornuum excitantes molles adhuc sunt, & de facili lacerantur, vel in furescunt abeunt; circa finem verò & apicem ita addensantur, & reticulari corpore ferruminantur, ut solidæ factæ nigro, lucidoque; inficiantur colore. Horum progressus evidens est: nam tot quasi filamentis per longum ductis coagmentari videntur. Proce-

digitorum crassitiem æquent, inclusa appendice ossea longior redditur, & ubi continuo & pleno osse non coagmentatur, variis cellulis concameratur, & excavatur, secto autem per longum cornu singula dilucidius patent. Primo enim frequenter exarata appendix ossea lamina componitur, ita ut tubus efficiatur, portiones tamen osseæ obliquè per transversum ductæ intereruntur; unde relictæ areæ concavitates oblongas, inæqualis tamen longitudinis & figuræ efficiunt, in quibus alix quoque ad assurgentes parum osseis parietibus designantur. Omnes hæ concamerationes membrana tenui obducuntur, sub qua sanguinea vasa in miras propagiâs diramata custodiuntur. Versùs apicem ossea substantia spongiosa est nullis cellulis excavata, unde impensè rubet ex innumeris vasculis, quibus irrigatur. Expositam appendicem osseam extenuatum corium ambit, à quo molles de more tactus papillæ emanant, quæ reticulari corpore custoditæ, simulque; ferruminatæ, versùs apicem deductæ cornu componunt, ita ut cornuum parietes in basi graciles sensim ex papillarum additione crassiores reddantur, & tandem in apice ex omnium unione, duorum digitorum crassitiem æquent, horum interior superficies nigra est & fistulosis foraminulis versùs apicem directis exasperatur, quibus papillæ admittuntur. Exterius apex acuminatus, solidus, lucidus & ater est, versus medium tamen subalbescit cornu, & circa basim parum nigrescit, & de facili in squamas solvitur. Ulterius tandem augmentum sortiuntur cornua, ita ut urgente interiori ossea appendice primi papillarum ordines à basi erumpentes avulsi à corio separentur, & ita diversi fines & papillarum limbi appareant, non dispari ritu ac in conchis marinis conspiciamus, quarum compositio diversis testulis superpositis inæqualibus tamen, coagmentatur, ita ut extremi fines quarumcumque; testularum, minimum elegantique; exhibeant planum. Hæ eadem structura evidenter quoque in Dorcadis cornibus elucescit, unde à radicibus usque ad medium asperitates quasi nodi observantur, quæ à diversis papillarum lamellis vario tempore à corio avulsis, & sursum retractis exoriuntur, quæ omnia diligenti microscopii lustratione patent. Postremo tandem cornua ultimum sortita incrementum non parum immutantur; nam exterius ipsorum color varius efficitur; substantia quoque solidior reddita, diaphana serè evadit, & continuo usu lævigatur. Interiùs ossea appendix obtuso terminatur sine, totaque ipsius longitudo gracilescente corio adhuc tegitur. Ab hac emergentes olim tactus papillæ obliterantur præterquam in apice; Interior nimirum cornuum superficies, evanescentibus vaginulis, seu reticularis corporis finibus, ex ferruminantis succi exundante copia, tota serè circa basim lævis & perpolita redditur, ita ut papillarum productiones quasi obscurentur. Analogam quoque generationem in Gallorum calcaribus observamus, quæ ex cuticula & subiectis papillis reticulari corpore conditis, constantur, ita ut turgente intus ossea appendice, exterius quoque corium multiplicibus cuticulæ involucri obductum rapiatur, & novum quasi cornu, licet minimum, erumpat.



Ex his igitur conjectari licet monstruosum cornu in bove ortum traxile, non tam ex ulteriori papillarum corii & reticularis corporis productione, sed ex conatu interioris tumoris, & ex compressione facta in cervice a proximo jugo. In naturali namque cornuum eruptione emergens ossea appendix, extensam sibi corii portione sensim urget secumque rapit, ita ut papillæ versùs apicem inclinata: elongentur. Proceriores autem redditæ sunt in monstruoso cornu tactus papillæ ex copioso fortasse lacte per filamentorum reticularem contexturam, qua corium componitur, excurrente, vel elabente in continuatas papillas, & in mucosum, reticulareque corpus, ut in ungularum vegetatione contingit, quæ cum extremis papillarum finibus excitentur, in deformem producerentur longitudinem, nisi vel arte vel attritu mutarentur. Probabile quoque est ex urgente assidue jugo proximam cervicis partem compressam, & inde callosam redditam fuisse; sanguinis namque motus non ita feliciter celebratus est; & ichoris quoque ac leni humoris per exaratum corii contexturam ulterior fluxus impeditus est; & sudoris halitusque effluvia, per propria sudoris vascula suppressa sunt, unde corii papillæ ultra augmentum, in novum situm & compagem adaptatæ sunt, & reticulare corpus, quod alias mucosum est, pene ossæum nactum est consistentiam. Hæc autem seruminatio probabiliter contingit ex vitriolato humore per excretoria sudoris vasa effluente, vel saltem ab acidis effluviis coercitis & fixatis, dum interim evaporantibus alcalibus & aquosis particulis, sanguinei instar seri, solidum, lucidumque pene corpus excitatum est.

Franciscus Trouillou nomine, homo staturæ mediocris, corpore satis obesus ac repletus, calvus (occipitio excepto, quod capillis aliquantum investiebatur) aliàs morosus admodum, moribus ac gestibus rusticis planè præditus, ac pelle vulpina vellitus, adeo ut aspectu horridus omnino esset: natus in viculo quodam, Gallicè les Mesieres indigitato, qui ad D. Laverdinum, Regis Galliarum Polemarchum spectat. Huic a teneris in locis sylvestribus à carbonariis educato, ad annum septimum usque ætatis suæ nullum adhuc alicujus cornu indicium apparebat, quo tamen tempore è fronte primum extuberare cœpit, adeo ut circa annum 17. ætatis suæ ad instar apicis alicujus digiti magnitudinem promineret. Quod postmodum progressu temporis paulatim ejusmodi incrementum accepit, donec tandem circa annum ætatis suæ 35. tam magnitudine quàm forma cornu arietis prorsus referret atque adæquaret.

Cornu hocce è medio frontis enatum, supernè ad verticem, suturam coronalem usque rectorum, progrediebatur, ut cutim eo loci omnino firmè attingeret, quod etiam (ipso met id referente) jam semel antehac firmiter ad eam cuti inhaeserat, ut doloris evitandi gratia, id ipsum necesse fuerit aliquantum refecare atque rescindere. Quoties cornu illud palpabatur, vacillabat, cornu tum verò inde dolorem maximum persentiebat, ita ut tandem ab adstantibus vix amplius sibi istud palpari passus fuerit. Hoc autem an in ipso frontis osse,

vel cute solummodo radices suas fixas habuerit, ulque adeo mihi non constat: credibile tamen, quia cornu tam amplum atque ponderosum, radices omnino in cranio ipso egisse. An item cornutus ille dentibus molaribus præditus fuerit, non observavi. Quæ autem ratione & ex qua materia cornu illud in hoc homine generari potuerit, id omne tibi perpendendum relinquo.

Tandem cum cornutus ille per duos menses Parisiis conspiciendus, expositus fuisset, Aureham verius conductus fuit. Quo loci quum pervenisset, paulo post diem iustum obiit, intellexi. *Gaulem. Fabric. Hildan. Observ. Chirurgic. tent. 2. Ex communicatione Emanuelis Urstis.*

Hujus viri cornuti & monstruosi meminit quoque Jacob. Augustus Thuanus, homo quinto, lib. 125. pag. numi 574. qui & ipsum Lutetia vidit anno 1599.

Delineatio cornu non omnino cum descriptione Thuanianæ convenit: scribit enim, cornu non spiralis lineis, sed porrectis striatum fuisse, sed hæc non usque adeo magni sunt momenti.

Porro de cornibus natis cum pueris, aut ex adultis excrecentibus, plura vide apud Dn. D. Schenkium, observat. Medicinalium lib. 1. de cute capitis, mihi pag. 732. Singulare quoque exemplum lector apud Barthol. Cabrollium, Chirurgum longè celeberrimum observat. vide- re poterit: qui & methodum quomodo abscindenda sint, proponit: dummodo universalia neglecta non fuerint.

Anno 1612. puellam octodecim circiter annorum, ex pago quodam Bernam adductam, ibidemque Nobili ac Doctissimo viro Dn. Paulo Lentulo, pro tempore D. Medico ordinario, à Magistratu Amplissimo, curandam commissam fuisse memini. Hujus puellæ dorsum, brachia & crura, cornibus scatebant: eorum nonnulla duos transversos digitos erant longa, nonnulla incurvata, sed major pars recta, & fusci coloris erant. Ego cum 18. Novembr. ex Belgio reversus essem Bernam, puellam hancce in Nosocomio sanam vidi, cicatrices quinetiam, & vestigia cornuum palpavi, omniaque quæ acciderant à D. Lentulo mihi relata fuerunt.

Methodus autem, quæ D. Lentulus ipsam curavit hæc est. Præscripta optima victus ratione, apozematibus, & julapiis humorem atrabilarium præparavit, & Melanagogis aliquoties expurgavit, mensesque provocavit. Postea apozemata, julapia, Melanagoga iteravit. Sic satis expurgato corpore, tandem ipsam ad Thermas, hic in vicinia sitas, misit: quibus cum per dies aliquot usa fuisset, cornua per se deciderunt, & sana ad Nosocomium rediit, ubi mihi, à D. Lentulo, ut dixi, monstrata, omniaque quæ acciderant, relata fuerunt. Post usum Thermarum, refocillatis viribus ac iterum expurgato corpore, ad suos ipsam remisit Dom. Lentulus.

Cornua autem non ossibus, sed cute & carne saltem adhaeserant; Ideoque à Thermis emollita, facile deciderunt. Sanam & incolumem ipsam per annum circiter vixisse, Clarissimus & Doctissimus D. D. Barthol. Dunus, qui mortuo D. Lentulo in Medicum ordinarium receptus fuit, aliquoties mihi asseruit. Quum verò propter egestatem, præscriptam victus rationem obser-



observare non possit : purgancia quia etiam ( quia a Medicis remota erat ) intermisset, cornua recrevisse, retulit Dn.D. Dunus, sed non tanta in copia, ut antea. Interim tamen cum sine dolore vix stare, multo minus ambulare, sedere aut supina cubare non posset & a Medicis remota esset, tandem exhaustis viribus, pie obdormivit.

Aqua autem prædictarum Thermarum in loco paludoso erumpit, & per tubulos ad proximum diverforium publicum ducitur, ubi in alieno magno calefacta in diversa lavacra distribuitur. Constat ex sulphure & alumine. Thermae hæc nervos partesque nervosas emolliunt, dolorem leniunt, ulcera iuveterata, scabiem, aliaque vitia cutis sanant : mirum in modum enim mundificant & exsiccant, præsertim si limus qui tubulis & canaliculis adhæret, exsiccatus, & in pollinem redactus, ulceribus inspersus fuerit. Articulorum doloribus & eorum tumoribus, ex causa frigida ortis, conveniunt, & lassitudines membrorum tollunt. *Guilielm. Fabric. Hildan. observat. Chirurg. cent. 2.*

Mulierem quandam tabidam, unguibus pedum non tantum, ut in his morbis uti venit, aduncis & incurvis, sed etiam ad speciem cornu arietini contortis, duobus fere digitis longis armatam vidimus. Novissimè præterea die 16. Novembr. ann. 1683. Virginem pauperculam 30. circiter annos natam invisimus : Ea ante 14. annos scabie totum corpus occupante infestata fuerat : quæ cum ad apices usque digitorum, tum manuum tum pedum serperet, ab extremis unguibus proticisci, iisque continuari videbatur : donec tandem ipsi ungues non prolongari tantum, sed in cornuum speciem facessere ceperunt. Cornua illa, quo tempore ea vidimus, digiti è quo nascebantur longitudinem fere æquabant, at multo longiora per vires fuisse asserbat. Teretia in manibus erant, in pedibus figuræ admodum inæqualis, intus concava, in apice obtusa, quadam grisea, quadam nigricante, sensus eorum exquisitissimus, nec sine dolore, vel leviter attingi poterant. Incerto intervallo, sæpius annuo, decidere aiebat : tuncque ex eorum cavitate productionem quampiam nerveam, transversum digitum longam, pulpæ quæ e chelis cancrorum fluvialium, dum comeduntur, extrahitur, non absimilem prodire. Ipsum cum invisimus ceciderat non ita pridem unum ex his cornubus unâ cum ungue annexo. Locum vacuum vidimus, at productio nervea se se jam maxima ex parte contraxerat. Pars horum cornuum tantum unguis continua videtur, pars verò ipsum apicem, non secus ac surculi cortex truncum in quo insitus est, obteggit. Illa aquæ tepidæ immerfa, & emollita frustillatim quandoque non tamen sine dolore refecantur. At cum Chirurgus quidam nostras ea evellere aliquando tentasset, in convulsiones & syncopen incidit, nec sanguis, qui larga satis manu stillaverat, impedivit quod minus iterum pullulaverint, & pristinam penè longitudinem intra octiduum, recuperarint. Fera insuper scabies miseram malè mulctat : Vires manuum, plantæ pedum & calcanei pustulis duris, & veluti corneis, per intervalla etiam deciduis, obsidentur. Unde salibus acidis, qualia in scabie maligna, seu piora

affectorum sanguine luxuriare verisimile est, eò quod facile concrevant, & ad succorum coagulationem ac terruminationem non parum conducant ; Salibus, inquam, illis cornuum memoratorum primordia, vegetationem & augmentum, attribui merito posse, existimavimus. Bibit tamen, comedit, & quæ nunquam ægre, ambulat ; menstrua statis temporibus patitur, nec adeò tritis aut melancholica apparet, quin dum eius manus & pedes depingi curabamus, minima data occasione subinde ridebat & jocabatur. Hæc ex *Bibliotheca nostra Anatomica parte primâ*, quibus in ulteriorem affectum horum cornuatorum illustrationem adiciemus illa quæ Dominus Dionisius Parisiensis Medicus, in suis assert ephemeridibus Medico-Philosophicis. Sic autem ille : Vivit impræsentiarum Florentiæ rusticus quidam septuaginta annos natus, vultum gerens caprinum, corpusque aridum, & exsuccum, in cuius poplite dextro natum est cornu a vulnere per tres annos neglecto. E vulnere scilicet effectum ulcus primo crassa crassiori operiebatur, quæ in dies augmenta summit ; donec è materia ad instar glutinis stillante efformaretur cornu pedum longum, & ad basim duorum pollicum diametrum habens, quod cornu sensim a basi ad extremitatem minuitur, & tandem e nodo proxime ad apicem elevato ad inferiora contorquetur. Coloris est subcinerei flavo admixti. Substantia est firma & dura, fetorem intolerabilem de se emittens. Superficies non est lavis ac polita, sed pluribus concavitatibus à superioribus ad inferiora descendentibus sinuata. Basis quæ ossi adnascitur, excresecntia carnea ad instar coronæ, cingitur. Hoc cornu cum post duos à nativitate annos evulsum fuisset, cito repullulavit multoque majus tactum est. Rursum à paucis diebus resectum est, & igne illius reliquias consumere sibi proponunt. Quis demum hujus operationis, futurus sit eventus expectabimus. Schenckius historiam etiam penè similem refert, inquit enim ; Vidimus in Creta vulnerato genu sagitta, cornu nigrum prodisse ; & materia quæ in ossis substantiam debuerat converti, aeris afflatu in corneam naturam conversa est. Quibus historiis non incongruum fuerit addere aliam quæ Nobilem quandam Florentinum spectat. Is ab aliquot mensibus excresecntia ungularum, tum manuum, tum pedum, ad instar avium quadrupam rapacium, falcularum, contortarum, affigitur. Unde ipsi non licet nisi cum maximo dolore, ambulare. Si autem eas resecet inde ulterius sumunt augmentum.

## CORPULENTIA NIMIA.

**D**issertatio de Corpulentia nimia causis commode perfici potest per oppositionem ad ea quæ supra ubi de *Atrophia* attulimus ; illuc itaque Lectorem remittimus ; & quandoquidem, & de morbi definitione, parte in eodem affecta, differentiis & diagnosi, quæ satis sunt nota, non opus est aliquid addamus ; reliquæ, scilicet prognosis ; indicationes, & cura infrequentibus videri possunt. Ubi,



*Curationes, Consultationes, Observationes  
& Anatomicæ inspectiones ex  
variis Autoribus.*

In corpulentia nimia *Borellus lib. 2. Observ. 2.* solâ masticatione foliorum tabaci viridum hominem enormiter pinguem pristino restitutum esse statui scribit. Folia lauri linguæ imposita aquas multas educunt.

Conveniunt autem maxime purgantia, quæ habent vim exsiccandi, v.g. Aloëtica, myrrha, polypodium, *Vid. Zacutus Lusitanus lib. 3. Observ. 102. Prax. Admir. Epiphanius Ferdinandus Hist. Med. pag. 273.*

Incisionem abdominis ad educendam pinguedinem non suadet, cum sit modus periculosissimus.

*Prosum* hæc herba absinthii, cent. min nasturtii, mentha, salsaparilla, gentian. bistort. aristol. rotunda polypod. lign. sanct. leutiscin. allium, oleum amygd. amar. fructus anacard. Aloës, myrrha, sandaraca, Nitrum, lumen de quo *vid. Forest. Tartar. spir. vitriol. coagul. Sol. Tartar. It. Medica venta ex viperis, balnea naturalia & artificialia cum Nitr. & sulph. acetum squillicum, rutaceum. Item Cuminum sæpius sumtum, elix. proprietatis, essent. absinth. myrrha, trem. & crystal. Tartar. species diutaceæ, diacumini, diaspolicum Galeni, (hoc Dn. Langius pro arcanissimo habet propter Nitrum,) pilulæ de hiera, de sandar. Myns. p. 154. (quas in arcanis habet Dn. Olwaldus) it. elect. antipod. majus & minus Epiph. Hist. 8. p. 154.*

Externe decoctum nucis cypressi Mynsichti.

2. M. P. de sandar. Myns. 5 ij. sal. vol. viper. 3 ij. elix. propr. q. s. pro forma. Pilularum imitar pisorum minorum S. *Sonderliche Pillen* Dos. 3 j. vel 3 j.

4. Sandar. ch. 3 ij. Extract. Aloës, myrrhæ, absinthii, ligni sancti ana 3 j. spir. vitriol. coagul. 3 ß F. l. a. Pilulæ Dos. 3 j.

4. Spect. diaspolit. Galen. 3 ij. flor. sulph. 3 j. M. S. *Sonderlich pulver.* Dos. 3 ß. ad 3 j.

4. Loch. de squilla 3 iv. Syr. de s. rad. acetosæ simp. an. 3 j. M. S. *Safft auf etlich mal.* Dos. 2. *Löffel voll.*

26. Essent. absinth. lignor. ana 3 ß. S. *Sonderliche Essent.* Dos. 40. *Tropfen.*

Ex foliis rutæ, Nitr. pipere, &c. potest fieri pulvis in mensa usurpandus: potest quoque addi sal. absinthii. *Joh. Michaelis Prax. Clyn. Gener. Part. 2.*

In cura corpulentia nimia 1. Impediendus est copiosus alimenti laudabilis proventus. 2. Alimentum jam genitum removendum est antequam partibus sese uniat. 3. Unicum jam partibus alimentum est resolvendum ac liquefaciendum, ut sero abluenti imbibitum foras amandetur. Serum enim uti primò est vehiculum alimentorum ita postmodum vehiculum est excernendorum.

Dubium videri possit an corpulentia jam facta resolvendo semel assimilatum nutrimentum possit tolli. Affirmari facile potest: Videmus enim crassos & obesos sub febrium ardentium ardore insigniter emaciar: præterea Scorbutus confirmatus corpus etiam ad atrophiam per-

ducit, unde atrophia scorbutica. Ad hæc viscerum ulcera dum Hæticam inferunt, ita massam sanguineam iniiciendo phthificos & macros reddunt. Denique excretio copiosa lymphæ absumendo nutrimenti rorem corpus emaciat. Præter istam tamen urina copiosa & conserum facta evacuato corpus emaciare solet. *Vid. Heim. Tr. jus dumviratum & Tr. latex. humor neglectus*, ubi refert exempla insigniter obesorum per portiones diureticas subito emaciatorum. Talia exempla habet etiam Schenck. in *observ.* ubi de Diabete, ibi enim refert multos Diabete affectos per copiosum urinae profluvium subito fuisse extenuatos. Nec minus efficax etiam est copiosa saliva excretio: notum enim est quod lue venerea ditati, curati per inunctiones Mercuriales Gallis frequentes, ubi continuam ac copiosam excernunt salivam, quod exinde admodum astenuentur. Item refert *Borell. cent. 2. Observ. 2.* Nimiam corporis crassitiem & pinguedinem continuâ masticatione foliorum Tabaci fuisse curatam. Jam notum est quod tabacum sit egregium masticatorium dum elicit copiosam salivam: id quod etiam de foliis Lauri dicitur si masticentur: Salivam enim eliciendo corpus emaciant. Hæc & similia persuadent quod corpora pingues facta post resolutionem jam assimilati nutrimenti a latice aquosio partes ambiente imbibiti, & sub forma urinae copiose & ubertim evacuati aut etiam saliva emacientur. Hæc inter ergo quæ huc faciunt ut corpus denudò emaciatur primum obtinet acetum & omnia ex aceto vini filio degeneri parata remedia: *Vid. Carr. cit. loc.* ubi refert. Exemplum viri admodum obesi, qui loco vini aceto utens in potu ita rursus extenuatus fuit ut 87. lb. pondere decreverit. Id quod confirmat *Stephanus in operibus Medicæ tr. Cosmética*, ad obesitatem tollendum nihil melius esse quam acetum Scylliticum jejuno stomacho hauritum.

Item acetum rutaceum, aut etiam potius ordinarius ex aqua chalybeata aceto temperata: Item acetum Scylliticum in quo Absinthium est maceratum. Ratio hujus est quod acetum stimulat fermentum stomachicum adeoque alimenta potenter dissolvit & incidit eademque in chylum tenuem & admodum aquosum colliquetacit, qui accedente in duodeno bilis attractu transmutetur in fæcibus diureticum quæ diuretica fæcibus non tantum chylum aquosum potenter exhaurit, sed præterea quoque nutrimenti rorem dissolvit ut per urinas excernatur. Acetum ergo si cohobetur aliquoties super nitrum, eò magis evadit diureticum & eò magis emaciat antea crassos.

Faciunt huc etiam Purgantia quæ promptè corpus emaciant. Hinc etiam *Celsus* inquit crebris purgationibus adflescere est corpus non nutrire. Nam purgantia etiam nutrimentum succum putrilagine afficiunt, & sub forma stercoreum exhauriunt: Verum cum purgantia fortiora cæu venenata non semper tuto in usum vocari possunt propterea Aloëtica & abstergentibus mista conducunt imprimis. Hinc *Fernelius Consil. 15.* inquit quod corpora obesa optimè curentur per pilulas ex rhabarbato aloë, & agarico paratas.

Hinc etiam Elixir proprietatis sæpius sumptum corpus nihil emaciat, uti etiam omnia insigniter



ter amaricantia, v. gr. Myrtha, aloë, pilula de tribus s. Pestilentialia, pilula de hiera, abstinthium & ejus essent. Essent. myrrhæ gentianæ, centaurei, minis, mentha, nasturtium & similia quæ omnia amara attenuant & resolvunt forem nutritium ac sero involvant, qui interdum excernitur sub forma urinæ interdum sudoris. Præ cæteris tamen omnibus eminent Diuretica fortiora: quæ inter eminet Radix asparagi (quæ & ipsa urinæ foetido odore corripit) radix tenniculi, petroselinæ; item alliata ac cœpacea omnia. Syrupi dicti de duobus, item de quinque radicibus, qui diuretici sunt. Decoctum Uicerum rubrorum; item Cappares, olivæ, Amygdalæ amaræ, & similia condimenta diuretica.

In specie huc facit Tartarus remedium vino ipso nobilius cupus volat. aciditas potenter absterfiva ac attenuativa simul blandè interdum copiosè urinam mover. Sic refert Forestus lib. 3. obs. 12. de Aurisabro adeò crasso ut ferè expiraret qui tamen fuit curatus hoc pulvere.

℞. Tartari ʒ ij. cinamom. ʒ iij. (potius ʒ iij.) zingiber. ʒ j. sacchar. ʒ iv. misc. & lubinde absumpsit.

Sic etiam Epiphanius Ferdinandus conf. 8. in specie commendat Tartarum in pulverem redactum contra nimiam pinguedinem.

Aliis secretus est Pulvis contra nimiam corpulentiam paratus ex Tartaro & Cymis s. Julii coryliani. mistis & pulverisatis. Hujus pulveris mane jejuno stomacho & vesperi sub introsum lecti ʒj. aceto destillato irroratus est assumendus, idque continuò donec corpus egregiè emacietur; (quæ dico de tartaro simplici etiam intelligenda de sal. volat. & nobilioribus præparatis quod præsuppono. Pertinet huc etiam Tartarus vitriolatus & ipse ad emaciandum aptus.

Deinde post tartarum est nitrum & ipsum diureticum ac specificum admodum proprium contra pinguedinem nimiam. Nitrum vitriolatum s. arcanum duplicat. Mynsichti specificè etiam contra obesitatem commendetur.

D. Langius seu singulare habuit arcanum Diospoliticum Galeni ex Nitro & Cuminò quod sæpius usurpatum per urinam corpus maciat. Pertinet huc Tartarus nitratus Bartholeti ex sal. tartar. & spiritui nitri invicem multis paratum, egregium sanè appropriatum contra nimiam corpulentiam.

Facit huc etiam Juniperinum gummi aliàs dictum Sandaracha Arabum; (Græcorum Sandaracha est auripigmentum.) Unde elegantes sunt pilulæ Mynsichti ex Sandaracha s. gummi juniperi contra obesitatem quarum dosis est ʒj. singulis manè jejuno stomacho assumenda: D. Olwald. est author qui primus composuit has pilulas contra obesitatem à quo habuit has Mynsichti.

Semen fraxinis seu lingua avis ad ʒj. manè in haustu vini propinatum insigniter commendatur ad evacuandam urinam, ratione cujus & hydropicos curat & emaciat crassos.

Secretum D. Eberbeni est semen esula pulverisatum & omni manè quantum cultelli cuspidè capitur usurpatum & continuatum: Hoc enim dicitur expertum remedium.

Nec omittenda Terebinthina ratione virtutis diureticæ, refert Forestus cit. loco de viro valdè crasso, qui insigniter extenuabatur, per pilulas ex terebinthina cum saccharo paratas assumendo earum majuscularum v. aut vii. per 2. horas ante prandium. Denique sudorifera sunt quæ & ipsa corpus emaciant, unde omnia lignorum decocta in specie Guajaci & ligni sancti dicta sudorifera propinata corpus emaciant. Alii salia vegetabilium hæc sal. abstinthii, Card. benedicti, item salia theriacalia propinant, quæ corpus insigniter macrum reddere dicuntur. Alii salia viperina vol. sunt commendata, item alia remedia viperina sunt commendata, quæ & ipsa corpus extenuare & pinguedinem resolvere dicunt.

Denique ex fonte Chirurgico sunt ven. sect. & Fonticuli. Venæ sect. cum cum sanguine simul nutrimentum exhaurit: unde subtracto nutrimento emaciat. Fonticuli verò uti successive partis cui inflicti sunt nutrimentum resolutum exhauriunt, ita etiam mass. sang. depravant & corpus necessario emaciant. Michael Echinell. Collegii Medic. part. 2.

### Consultationes.

#### De insigni obesitate corporis.

Historiam morbi scribente D. Melino ad D. Fernelium: pro D. de Boisselphin.

Claudius Lavallensis tibi notus, nonum jam mensem agit hic legatum Regis Christianissimi, atque tandem incidit in affectum, quem corporis gravitatem appellat ipse, ego vero plenitudinem vires prementem. Præterea ventrem inferiorem natura jam bis laxavit, ex quo ea ejecisse, quibus premebatur, credibile est: quandoquidem facile toleravit dies aliquot, & melius habuit. Erant autem quæ sponte naturæ exierunt fusca, ut plurimum, & graveolentia, & inæqualia, & intus pituitosa pauca, viciata. Alvum sponte fluentem juxta ʒj. senarum in jure prunorum macerata & expressa. Ergo cum jam intelligat vacuæ tione opus esse; mihi autem, atque his, qui hic medicinam faciunt, non satis videtur rem totam ad te, cui plurimum fidei, tuamque auctoritatem, deferre. Plenitudinem ad vires duo potissimum arguunt, corporis gravitas, & quod levibus ex intervallo repetitis vacationibus feliciter utitur.

#### Responsum Fernelii ad literas Melini.

Sic summa fide & diligentia literis expressam video Domini tui Boisselphini valentinem, ut eam mihi quasi ob oculos proponas, & in memoriam revoces, quam sæpè coram animadverti. Obesus corporis habitus, variæque mœles, quia non nisi pleno liberalique victui sustineri potest, magnum facit excrementorum proventum, nunc maxime ætate inclinate, deinde vita, celo frigido, & humido solo. Atque licet D. Legatus frigida, pituitosaque illuvie plurimum icatere videatur, non pauca tamen bile exastuat, quam memini interdum sponte illi ab alvo impetu prorupisse, & quotidie ter saltem alvum movere, eamque semper quam tenerri-



nam servare. Jam si supervacuorum humorum exuperantia præter naturam & consuetudinem succrevit, quid mirum videri debet, si eorum mole pressum corpus ingravescit, minimeque sit ad consueta munia comparatum.

Ne quid autem posthac gravioris mali contingat tentandum, ut quam exuperantiam vicius parcior ac tenuior prorsus absorbere non potuit medicina subtrahat: quandoquidem observatum est, alvum sive sponte, sive arte solutam cinolumenti non parum contulisse: id autem sensim ac lentè præstandum, quòd alvus lenissimis illis proritetur, quòdque minime tutum sit tantam illuviem vi & impetu concutere, ne universa corruat: itaque accommodatissima purgatio fuerit per cataportia ex rhabbaro & aloë, an. ʒij. agarici ʒj. cinnamomi, & santali citrini, an. drach. s. quæ concinnentur cum syrup. de cichorio. Hac autem lege utendum, ut primum quidem ʒj. offeratur mane, hora una aut sesquihora antepastum.

Duobus tribusve diebus interjectis ʒʒ. aut ʒij. dentur horis duabus ante cibum. Sic sæpè repetenda erit purgatio ex intervallis brevioribus, sensimque vis illi augenda & continuanda, dum omnem videatur cacochymiam sustulisse, pristinumque corporis robur & integram valetudinem reduxisse. *Joan. Fernel. Consilior. Medicor. 15.*

*De Obesitate præter Naturam. Pro Eminentiss. Cardinalis Hippolyto Aldobrandino.*

Cum moderata corporis constitutio omnium sit perfectissima, & optatissima; amplior vicissim ejus moles, ut & nimia gracilitas pro virili sunt curandæ; non solum quod indecoræ, sed & actionibus sint incommodæ; & quæ vitam breviorē efficiunt, cum suffocato derepentè calore nativo à nimia mole, tum eodem extincto pabuli inopia. Quamobrem Eminentissimus Cardinalis æquo corpulentior, veritus ne corporis moles, qua laborat, ingravescat in dies, & operationibus animalibus, quas in præsentem leviter tantum afficit, tandem noxia evadat, cum potissimum sit ipsi innata, non immeritò ad nostram confugit opem; quò nimia obesitas coerceatur, quæ laborasse antehac fractum natu majorem duos, conscius est; alterum quidem Eminentiss. Cardinalem, alterum verò Illustriss. & Excellentiss. Principem.

Nos itaque Eminentissimi Viri mandatis morem gerentes, præservativa remedia tunc præscribenda censuimus, cum crassitiei hujus causas brevibus in medium adduxerimus. Quæ copiam pinguis, & carnosæ substantiæ consequitur, lumpo indicio ex totius ampla mole: pinguedo tamen substantiam carnosam copiam superat, cujus causâ cæterarum partium crassities ventris inferioris amplitudini cedit, qui secundum naturæ leges pinguedine infarctus esse solet; ut propterea ad obesitatem hanc producendam duo potissimum concurrere sit necessesse, primò quidem copiam sanguinis alimentalis tenuioris, fluidi, & oleosi, ut causam materiale, tum remissum calorem partium corporis, à quo hic concrevit, & in pinguedinem cogitur, tanquam effricem, accedente quintam corporis densitate, materiæ effluxum in-

tercipiente. Neque novum videri debet, quod in Eminentissimo Cardinali hic sanguis redundet, atque in pinguedinem copiosam adedò concrevit, cum ejus ventriculi frigida, & humida intemperies invaleseat in dies familiari usu vini aqua diluti, necnon cibi, & potus nive & glacie impensè refrigeratum, quæ causa est frequentis pituitæ vomitus, & flatu copiosorum, non sine periculo umbilicalis herniæ. Jecoris insuper est humidioris æquo, cum aliqua caliditate, non tamen exsuperante; cui etiam respondet totius corporis temperies; atque hinc fit, ut ex chylo in frigido ventriculo non perfectè elaborato sanguinis copiosi in jecore sit proventus, non quidem exulli, sed plurimum tenuis, oleosi, & pinguis; qui in venas permeans, à musculis allicitur, & in carnosam substantiam concrevit, atque affusus parte magis oleosa membranæ exsanguibus; & densis, in his crassitiem quandam adeptus in pinguedinem cogitur: quam auget in dies nova ejusdem sanguinis generatio, & attractio, concurrente potissimum densitate habitus corporis, illius exhalationem, & dissipationem inhibente. Cujus præbent indicia difficilis sudor, atque ex levi qualibet ambientis frigiditate cutis densitas, & febris, cum insigni corporis lassitudine, rigore, & aliarum partium dolore, cessante plerumque frictionum usu, & sudoribus toto corpore erumpentibus. A qua corporis densitate caloris ventilationem prohibente, calorem in internis partibus acriorem fieri vero consentaneum est; atque sanguinem in venis conclusum loco calidiori assari; tenuiorem scil. oleosam magis ejus partem, quæ in pinguedinem concrevit; atque in bilem facessere, quæ in excretis copiosissima ferè semper se prodit; crassiorem verò in sanguinem melancholicum, nigrum, & crassum converti, qui selecta vena plurimum effluit: quam ob causam corpus hoc remissiori calore præditum, ac proinde bilis minus ferax, hac tamen abundat maximè, potissimum in primis viis, ob crassitiem corporis, liberam caloris ventilationem intercipientem: quæ fortasse causa fuerit frequentis illius æstus, & ruboris in capite, & facie.

Crassities itaque hæc tenuanda, vel saltem coercenda. Quod consequetur in primis Eminentiss. accurata victus norma; cibo videlicet, & potus; somno, & vigilia; motu, & quiete; excretis, & retentis; atque aere. Cibus autem sit pareus, in cæna potissimum; pauci nutrimenti, ac facultatis attenuantis, & exsiccantis; carnes scil. & pisces saliti, assati potius, quàm elixi, conditi aceto, vel fructibus acidis, inspersis pulveribus exsiccantibus coriandri, anisi, cum petroselinis, & apio, nenon sal ex viperis combustis, ficus, olivæ, asparagi, & hujusmodi ex tempore parata. A ferculis, placentis, lactariis, melonibus, uvis, cerasis, passulis, pro virili abstineat. Parce bibat, & quidem vinum modicè generosum, album, antiquum: quinimò familiaris usus ʒj. aceti scyllitici, in quo maceratum fuerit absinthium, summo perè ex usu foret. Somnum fugiat diurnum; nisi à valido exercitio quotidie per duas saltem horas, vacuo stomacho, & quidem parvæ pilæ lusu; neque ad nocturnum se componat, nisi altera hora à cæna; otium vitet, quo humores in corpore suc-



crascent; ut & exercitio moderato, quo dum exsuscitatur calor innatus coctionis autor, corporis excrefcit moles. Quod si ab exercitio adhibeantur frictiones validæ, pannis asperis, vel pulvere corticum fabarum, lupinorum, amygdalarum amararum, & sale, ab his corpus magis attenuabitur. In quam rem commendantur summopere balnea ex Aquis nitrosis, salitis, sulphureis, & aliis medicatis, non tamen aluminosis, vel quibuslibet aliis adstringentibus. Alvus continuo sollicitetur vel usu panis ex fufuribus medianis, cum caricis, & fœniculo, semihora ante cibum; vel sex, aut octo sicubus, cum siccis, tum recentibus, per semihoram pariter ante cibum assumptis; vel etiam aliquando, usu pilular. ex aloë lota cum succo ros. ad 3 j. statim ante cœnam; vel pilular. de tribus Rufi, quæ omnium maximè exsiccent, ut eas Rufus ad arccendam pestem validissimas censuerit: non omittis interim diureticis, in quibus potissima erunt semina fœniculi, anisi, petroselini, & rutæ sylvestris. necnon sal viperinus, species dialacæ magnæ Mesues, species diacurcumæ, sal theriacale, & huiusmodi. *Bened. Silvatic. Conf. & Resp. Medic. Cem. 4.*

### Observationes.

#### Pro obasitate.

Nobilissimæ Dominæ adeo obasæ ut vix incedere posset a medicis consultum est, ut iter unius miliaris subinde jejuna pedestri itinere absolveret, sed cum præ asthma ambulare amplius non posset, magis ei profuit purgatio frequentior: aurifaber quidam cum extreme obasus foret, ita ut proximus suffocationi videretur, huc sequens pulvis etiam in cibo datus est, & ita liberatus fuit.

℞. Tartar. 3ij. cinnam. 3iij. zinzib. 3j. sacch. 3iv. F. pulvis Gilbertus Horitius hoc sequenti pulvere, modo per se, modo in conditis, in obasibus commodè vius est.

℞. Tartar. vini albi aut rubri 3ij. cinnam. 3iv. zinzib. 3ß. sacch. 3iv. M. hæc etiam subsequencia maximè extenuare obasos expertus erat; cepe, allium nasturtium, porrum, semen rutæ & potissimum acetum scyllinum: utantur larga ventris solutione, utinam ac sudorem provocent labore multo tum veloci utantur antequam comedant; famem tolerant, diu vigilent, sitim patiantur in balneo aëreo sudent, dormiant parum, & in lecto duro, multum coeant, & morentur sub sole: hæc omnia corpus pingue macrescere faciunt. *Petrus Forestus, obs. 10. & Schol. lib. 31. de fucis.*

Purgatio corpore, quoniam præcipuus scopus propositus est, ut caro & pinguedo deterrantur, simulque continuò perspirationi & exuantiioni via paretur, ad eos absolvendos conducturum id remedium esse confido, quod hæc faciendi insignem potestatem habet; cuiusmodi est ligni guajaci & sarzæ decoctum pluribus diebus cum tenui & exsiccati dicta, sudorisque provocatione assumptum: hoc enim (si modo prudenter administretur) minime dubitare oportet, quin blandè exsiccet, sudoremque provocando cutis meatus aperiat, & consequenter faciendæ insensibili transpirationi magnopere

auxilietur: post cuius usum non parùm mihi aridet eorum consilium, qui diureticis utendum esse commendant, ut asparago, apio, fœniculo, porro: similiter quoque tacere non possum, quin laudem usum ejus lavacri, quod vim habeat exsiccandi, quale est aqua marina, qua tepida utatur *Hier. Mercurialis tom. 3. consult. 122.*

Abstineat a potatione inter prandium & cœnam, nam talis corpora multum pinguefacit: laudant aliqui maximè in æstate per plures dies cyathum unum aceti in nẽ, nam potenter corpora siccant & emaciat; sit ejus ergo assiduus maximè in condimentis & acetariis: verum hoc fugiant qui imbecillos habent articulos nec non & uterum: hyeme ut ejus nimia acredo refrangatur, immiscendæ sunt uvæ passæ: sint in assiduo usu capparees cum aceto conditi, & olivæ: cauteria maxime probantur, præsertim in tibiis, cum sensim evacuent totum corpus, frictiones etiam commendantur asperæ pannis asperis donec cutis rubeat: sit assiduus ulus linguæ ovis i. seminis fraxini ad 3 j. cum vino exhibit. Ex Plinio hydropicos curat. & corpore obasos ad maciem reducit Arabibus etiam maximè commendatur. *Epiphanius Ferdinandus histor. 82.*

#### Pro Obasitate.

Nobilem virum adeo pinguem vidi, ut equo insiltere nequiret, quin statim sopiretur, nec loco fere moveri posset: ille tamen nunc huc & illuc vadit, mole illa deperdita, & pristinum habitum recuperavit, quod sola malticatione fol. tabaci peractum fuit, ut ipse mihi asseveravit, pituitosis enim & frigidis corporibus utile est: folium lauri linguæ inpositum aquas multas etiam educit. *Petrus Borellus. Observ. 17. Cem. 2.*

#### Rara corpulentia incommoda curatio.

Notissimus hic tribunus militaris jam sexagenario major, sed vivax, & vegetus, ita terè quinto quoque anno abdomine tardus evadit, & pinguedine nimia distentus, ut aliis gravis, sibi invisus sit; cui malo cum varia quæsierat remedia, in diem, acida, exercitia, frustrante expectationem ingrato eventu, novissime in Mercurio dulci opem sollicitavit, & invenit. Progreditur enim pilulis Mercurialibus ad eam paulatim dosin, ut apertis gingivarum laxitatibus ptyelismus consequatur, nec is perfunctorius, sed qualem in adultis Veneris nepotulis efflagitant Medentes, ut sordam luem exspuant. Per has vias omasum sese exonerat, & lætum, alacremque tribunum ad munia sueta reddit expeditiorem. Ex eo triennium integrum exigit ab infesto aqualiculi pondere liberum. Tandem redit sensim malum, & quinto post anno novam curam deposcit. Igitur ille iterum supplicat Mercurio, iterum in palæstram redit promptior. Jamque ter quaterve iterato eodem æquore, vivido faciei colore, toris robustis, corpore alacri ad negotia sua consurrexit. Exploratum hæcenus fuit, sordam pituitam per glandulas salivares excludi, hoc novum, nimis pinguedinis causam per eosdem ductus foras posse amandari. *Olai Berrichii, in Act. Barthol.*



*Anatomica Inspectio.**Pinguedo anomala.*

Pinguedo, quæ musculis insernitur & inæqualia habitus intervalla eleganter rotundat, tam copiose sæpe luxuriat, ut corporis formam, quam ornare debebat, mirifice descenderet. Requiritur ad justam gratamque corporis proportionem æqualis partium omnium pro ratâ accretio; quod si pinguedo copiosior sit & molem cæterarum partium vincat, jam gravis est eam habenti; namque subiectos musculorum ventres pondere suo reprimunt, & prohibet nefasile insentur, & inflati perdurent. Vocantur hi Græcis *gymnæi* *μυεδοι*, homines abdomine graves. Inter nos reperimus, qui monstro quam hominum similiore corpus circumferant, non crassum duntaxat ut adiposum, verum etiam inconcinnum & difforme. Nobilis quidam statura & protenso aqualiculo magnus varia agitabat contulia, quibus à molestiâ & iucetâ pinguedine liberaretur. Sed cum pleraque in corpore scorbutico & segnitie corrupto vana essent, contentus erat abdominis molem, in hanc enim imprimis omnis pinguedo conjurasse videbatur, fasciis sustinere eventumque satis committere hæc quidem compendiarîa, ut succincto ventre obambulare nonnihil in domo, deque uno membro in aliud transferre se posset. Sed postquam unum alterumque animum sic vitam tolerasset, morbus intervenit isque interneccinus, quippe compressa à nimia pinguedine venæ sanguini motum & spiritum elidere. Vivus roganti mihi ægrè concelebat ventris conspectum atque contrectationem; ibi ego præter omnem opinionem abdomen reperi totum inæquale, glandis usque duriusculis & magnis, velut colliculis, distinctum, inguinis vero limbum, jam fere ad genua prolapsum, in plurimos lobos fimbriatosque duriorum glandularum processus evagantem, citri videbantur aut laciniaz ventris penduli. Hæc moles corpus, ætate imprimis, multa intertrigine excruciat; quare etiam interpositis linamentis ei occurrendum fuit, sed exiguo cum fructu. Pinguedo autem illa tam anomala atque inæqualis non in alio, quam vitiato glandularum adiposorum contextu, sic esse videbatur, ut quæ in scitum aut steatoma durat, collecta pingui amurca, corporis habitum tam misere tordaverint. Nicol. Pechlinus in *observat. Phil. Medic.*

*Pueri præ pinguedine nimia extincti**Anatomia.*

Macie confectum vidimus & examinavimus puerum biennalem; examinemus nunc pingui- culum & crassiusculum medio anno seniore, qui oblatus fuit 25. Novembris ejusdem anni, & nescio an alio morbo, quam nimia pinguedinis abundantia obierat. Vidi candelam non raro nimia sua pinguedine extingui, præsertim dum flamma ellychni exigua debilior erat, quam ut affluentis sevi absumeret copiam: idem hic factum, si affirmem; omnes corporis partes sanæ & integræ, sed pinguedine undique obrutæ, meæ sunt ag ibuntur sententiæ, si enim pueri exterius pellem tangeres, indicem usque ad primi articuli finem imprimebas: interius autem exi-

les musculos pinguedo copiosa circumdabat & abscondebat. Aperto thorace, cor abesse sacerdotum veterum quispiam, qui eâ ratione populo imponebant, exclamasset: latebat enim ita pinguedine obvolutum, ut non appareret, hodieque à me servatum sub eadem pinguedine delitescit, uti & pericardium, cujus membrana vix conspiciebatur. Inferior venter viscera omnia sana, sed omnia vix semestris pueri magnitudinem exæquantia dabat, ita erant omnia una pinguedo; omentum & mesenterium adeps pura. Cum cerebro autem flaccido ventriculis inclusa erat aqua insipida; plexus choroïdes obsessus hydatidibus, quarum una ad nucis avellanæ excreverat magnitudinem. Ossium tota compages nec forma, nec magnitudine usquam desciscit à pueri perfectissimi ætati; minimeque monitrosi ossibus. Theod. Kerkring. in *Spicileg. Anatom.*

## CORYZA.

Vid.

## CATARRHVS.

## CRAPULA

Vid.

## EBRIETAS.

## CRANII FRACTURÆ.

**F**racturæ quæcumque corpori obvenire possunt, periculosiores, difficiliorisque curationis nullas reperire licet iis quæ Crani sunt.

Numerus earum insignis admodum, ut symptomatum subsequen- tium infinitus.

Paulus lib. 6. cap. 7. Quinque recenset species; quibus in infantibus addit sextam.

Hippocrates lib. de vulner. capitis à Paulo adductis aliam addit.

Placet nobis, quo curatio certa, quantum possibile, exerceri queat, ex fundamentis certioribus, diversas species, earumque appellationes adducere, nulla habita ratione controversiarum quæ circa varium vocabulorum usum etiam hic proponi possunt, & solent, cum inutiles omnino sint, convenientiusque sit ad res ipsas veramque medendi methodum respicere, quam vocum varietatem variam.

Inter species omnes Cranio obvenientium fracturarum primo nobis loco occurrit fissio, quæ continui solutio est Tabellarum Cranium constituentium, vel primam seu anteriorem solam, vel insuper & alteram seu posteriorem, in totum, vel ex parte, dividens, observabilis sæpe, non raro obscura adeo, ut vix notari queat.

Fracturæ huic Vasorum sanguiferorum rupturæ accedit, venarum imprimis, modò earum quæ Cerebri corticem perreptant, quandoque quæ medullam, non raro & illarum, quæ duram matrem s. crassam cerebri meningem. Prior rupturæ vasorum dictorum species lethalis licet habeatur, ultima tamen Cornelium Celsum valde reddit sollicitum; adeo vel etiam Cranium trepano hic perforari velit primo tempore, ne materia purulenta, ex sanguine extravasato genita, meningem tenuem accedat, eandemque premat, *Sanguis enim hic (verba ejus sunt lib. 8. cap. 4.) corruptus atque inflammatus partes vicinas ledit, unde deliria, febres, convulsiones, tandem mors ipsa.*



Dicta considerantes haud videbimur inutilia proponere, liquidem exemplo quodam singulari quum verè benequæ sollicitus Celsus, minus sæpe debito sollicitos Chirurgicæ cultores doceamus.

Tempore eo, quo Maria Medicea, Regis Gallic Ludovici XII. mater, urbem nostram Amstelodamensem intrabat, puer v. vel vi. annorum, cujus nomen Rikardt Karsboom, reginam, quæque in honorem ejus extructa, videndi animo, fenestraz alicujus domus insidens, procidit in terram, eoque casu, præter vulnus cutaneum satis insignis, fissuram contraxit parte suprema ossis parietalis dextri.

*Signum* fracturæ notis bene perspectis, quod enarrata tollerentur mala, non obstant quod somnus jam adesset inquietior, febris continua, vomitus continuus, sanguinisque per nares & aures fluxus gravis, vulnus cutis, horis matutinis dici secundis, cruciali sectione duplex quasi effecimus, adeoque sic constitutionem Cranii obvii magis, certius cognoscere licuit, digitis enim non solum fissuram ejus, sed & ossis tracti ex una parte elevationem, explorare concedebatur. Plumaceolis hinc vulnus replere hoc tempore, circa vespertinam vero Cranium trepano perforare necessarium duximus.

Trepanum ubi ad Diploen pervenit, medium scil. tabularum duarum cranium constituentium, impetu sanguinis notabilem quantitatem prodire observatum, notabilior hæc, ubi, absoluta trepanifactione foramen patens.

Foramini huic, adeoque, ejus ope, ipsi meningi crasse, linteï tenuioris quadruplicati in spiritu vini, cujus parti uni duæ partes mellis rosarum mixtæ, madefacti, quantum loci conditio permittebat, imposuimus. Sequenti die mentem vulnerato constare, linguæque usum concessum, observavimus, febrem eti. m. somnum, vomitum, hæmorrhagiamque vale dixisse, curationi quapropter nos accinximus, labia vulneris, secundum monitum Jacobi Carpi, crathio ipsi imponentes, brevi hæc absoluta, satisque feliciter, fragmentis quibusdam squamiformibus,isque valde exiguis, separatis.

*Secunda* Fracturarum cranii species Excisio est, continui soluti in cranio ab externo instrumento secante producta: fissuræ hic nonnunquam signa adsunt certa, quandoque nulla; quod si excisioni fissura jungatur, utriusque ubi illa tabulæ est periculosa valde conditionis, ad ipsam usque duram meningem penetrare potest.

Squamæ nonnunquam etiam in Tabulâ separantur prima, nec tamen lethalis semper hæc separatio, quod verum observavimus in quoniam Joachimo Ulrico Magistratus nostri iussu à nobis curato. Percussus hic à milite quodam ebrio, ense lato, in sinistra ossium parietalium parte, proximâ futuræ sagittali, graviter adeo, ut ex exciso cranii osse dicto, & quidem tabulâ ejus exteriore, particulam ossis satis magnam separatam, solutamque, forcipis ope extrahere licuerit, quæ ablata, adhibitis medicamentis convenientibus integrè sanitati æger restitutus.

Hujus conditionis fragmenta varia, (quæ Cranium tabulâ primâ, i. extima exhibuit, ubi

Excisio aderat) aut oblique magis separata, forcipe commoda auferre mihi concessum in Cranio fracto filiolarum natu nimirum Joannis van Os, contusam cutem ubi cultro aperuimus. Occurrebant hæc parte inferiore ossis parietalis sinistri, casu gravi in objectum acutum dicto modo lassi. Auferre particulas has licuit nobis die à casu 10. & 11. præmissâ, ut dictum, apertione cutis, integumentorumvè reliquorum commoda, aut non sine insigni purulentæ materiæ effluxione. Et hac institutâ curâ integrè restituta puellula, brevissimo temporis spatio, hoc quo hæc scribimus optime valens.

Fragmenta hæc Cranii ossium antequam desceramus, observationem aliquam Artis Chirurgicæ studiosis exhibere, utile ducimus, quam vir Theologus, Dn. Engebertus Sloor, verbi divini in Sloomerdijk præco, à Dn. Joan. Kraanvinkel, apud eos qui Christo nomen dederunt in Moscoviâ Evangelistâ, accepit, declaratur ea quomodo in nobili quodam Cranii particula ense ablata, alia vero ex canino capite desumpta ejus in locum repõsita, quæ etiam reliquis cranii ossibus firmiter unita. Accipite ergo quædam eorum, quæ Epistola dicta fabulis annumeranda proponit. Occurrit hoc tempore, Tibi communicanda excommunicatio admiranda, imò risu digna, quam Theologi Russi exerceverunt in nobilem quendam, cujus nomen. Butterliin. Tartarus quidam in capiti hujus gratius adeo ense vulneraverat, ut, præter integumentum cutem nempe pilosam, aliæque, ossis cranii etiam particula quædam ablata, adeo ut caput inspicienti denudatum non solum, sed & vulneratum, occurreret cranium. Chirurgus locum apertum quo repleret, accisi canis ex cranio particulam desumpsit, figurâ & magnitudine ei quæ ense ex capite nobilis ablata respondentem, eamque loco læso adaptavit; & hac methodo integrè sanitati redditus nobilis. Hic miraculose restitutus, rem gestam, gaudio exultans, amicorum notorumvè variis, enarravit, qui ea idem Theologis, & per hos Metropolitano communicarunt. Sicque effecerunt, quod, excommunicatione institutâ, ad loca ea quibus conveniebant Christiani, per totam Russiam, accessus Nobili d. flo denegatus fuerit, usque dum ossis capiti canini particula indicata ut ita maneret ossibus capitis christiani hominis. Nobilis Ecclesiæ membris annuntiarî illens, quam, ad veram exarationem, quævis non perferre, Chirurgus ossis canini fragmentum auferre iussit, sicque, curatione aliâ adhibita, excommunicationis vim effugit.

*Tertia* Fracturarum Cranii species Paulo habetur Expressio, quæ contingit quoties cranium per casum, ictum, percussionemvè in partes varias dividitur, sic ut etiam fragmenta quadam eo usque se ad inferiora dimittant, ut non solum membranam Cerebri deprimant, dividantque, sed & Cerebro ipsi continui solutionem inferant, quorum quædam ad ventriculos ipsos quædamque descenderunt, quod artis Chirurgicæ cultorum in gratiam, doctrinæ gratia observatione sequente illustrare confirmareque possumus.

Bernardus Diderici Wèghüysen, Sartor, gravi læditur ictu dextro osse parietali, sic ut fragmenta varia cranii vulnerati non solum meningem duram, tenuemque læderent, sed & ad ipsas usque ventriculorum cerebri cavitates se dimitterent; & quidem vehementia summa, uti in aperto post



post mortem cadavere spectatoribus notare licuit.

Vulneratus domum petit, nullius auxilium implorans, jussu amplissimi Magistratus civitatis nostræ, rogatus hospitis, cum accessi, cujus ex cerebri interioribus incredibilis magnitudinis particulam a cranio læso separatam, præter fragmenta alia minora: instrumenti commodi beneficio extraximus.

Die vigesimotertio Februarii curæ nostræ commissus æger prædictus qui nono Martii obiit. Consideratione nostrâ dignum quam maxime in hoc ægotante, quod singulis diebus, à tempore eo quo ipsum accessimus, usque ad diem mortem penultimo præcedentem substantiæ Cerebri quantum cochleari contineri poterat per Vulneratum locum effluxerit, loquela, ingenio, judicio, integrè se habentibus. At instantè, ut diximus morte, febris, delirium, hemiplegia, inter alia symptomata, superveniebant.

Materiæ huic, quæ Expressionis historiam, variaque symptomata, exhibet, antequam hunc imponamus, consultum omnino censuimus exemplum priori simile, aut ejus terminus longè felicior, hic proponere. Chirurgus hujus loci eximius Bernardus Heems, cujus curæ commissus æger, quinque mediocum conventuum opera pristinæ valetudini eum restituit, ejus nobis copiam fecit, literis ea de re scriptis, inscriptisque nobis.

## AMICISSIME.

*Cum consules, rerum variarum, rarius occurrentium, perquisitorem Te esse, atque jam à multis annis nos junxeris necessitudo, intermittere haud posui, quin singulare singularis fractura cranii in puero 10. aut 11. annorum, ex casu gravi, indulta, tibi communicem. Frontis hic os, aliis coronale dictum, læsum adeo, ut particula quadam separata, quæ & Meninges vulnerabat & Cerebrum ipsum, præterquam quod externa capitis tegumenta vulnera exhiberent insigniter amplum. Locus læsus substantia Cerebri notabilem quotidie exhibebat quantitatem, quam vel ipse, præter Chirurgos alios, non semel inspexisti. Nec vomitus, nec delirium, nec sanguis per nares, aures, aliavè loca fluxus in ægotante hoc unquam observabantur, insignis licet amplitudinis apertura, restitutus brevi æger. Considerabilem hunc casum tibi publicoque haud invidere placuit. Vale.*

## BERNARDUS HEEMS.

*Quarta Fracturarum cranii species Decessio est, ubi os læsum versus inferiora procidit, sicque meningis Cerebri deprimuntur.*

Lethalis sæpe affectus hic, quo sic humores ad meningis ipsas defluunt, nullâ datâ evaporatione, quod inhibere valde arduum est. Observavimus hoc in Capite textoris alicujus, cujus nomen Simon Joannis, qui à textore alio graviter cantharo stanneo percussus, sic tamen ut exterius vix aliqua solutio occurreret; in osse frontis circa suturam coronalem, os reperire nobis licuit, teretis omnino figuræ, Vulneratus, nullius considerationis vulnus inflatum æstimans, per tres septimanas oleum ra-

parum loco læso inunxerat, & tamen erysipelas faciem universam occupans, febris, convulsio gravis, fracturæ supervementia e medio eum sublulerunt.

Via longè aliâ processimus cum Francisco Henrici à West-Reenem, qui ex loco satis alto procidit in saxum, sicque præter vulnus cutaneum ad ossis frontis suturam coronalem, a parte sinistra, Deffensionem ossis dicti contraxit. Ægrum hunc accedentes vulnere ad sanguinis fluxum inhibendum, labiorumque separationem iustam promovendum, plumaceoli quantum necessitas exigebat inposuimus, non neglecto Emplastro Defensivo. Nec inconsultum visum fuit eodem hoc die, quo prima instituta visitatio, venæ-sectionis ope sanguinis aliquam auferre quantitatem, fuit hæc fere integræ libræ; aperta autem vena in brachio corporis sinistro. Quin & suppositorum ex sale, hierâ picrâ & melle eidem applicari, antequam discederemus, curavimus, unde semel largiter deiecit.

Altero die stupiditatis se exhibebant iudicia, febrisque, nullus aderat vomitus, licet sitis gravis, cordisque anxietas considerabilis, nocte prægressa valde fuerint molestæ. Vulnus ipsum fragmentum ossis dicti exhibebat, & quidem utriusque Tabulæ, quod ad ipsam matrem duram descenderat, elevatorumque opera à nobis extrahebatur.

Fragmento hoc ablato, sanguinis extravasati, præter naturam hic collecti, insignis quantitas, pulsu, quasi continuo, per vulnus effluebat. Procedebatur hinc methodo curandi ea, quæ adhiberi solet in trepano perforatis craniiis, quæ etiam paucorum dierum spatio sanitati pristinæ redditus æger.

Quinta fracturarum Calvariæ species Cameratio est, quæ diviso dicti ossis est, in quâ pars affecta camera modo exaltata relinquitur, ut Galenus tradit, ac intro à sanis fractura partibus ossa magis recedunt, membranisque Cerebri inniuntur, quas contactu suo premunt.

Hujus conditionis fracturam nobis non nisi semel toto præseos tempore notare licuit, in puero 14. annorum, qui, ex casu gravi, & Cranii fracturam contraxit, & utriusque brachii circa ligamentum annulare, sic ut cubiti utrumque os notabiliter loco fracto pronineret. Ossa hæc brachii reponere impossibile nobis, quamcunque etiam adhibebamus diligentiam, forsitan quod muscoli versus suum principium violentius traherentur. Ne ergo in casu dolorifico, desperato, frustra laboraremus, maxime cum vomitus continuus, febris, narium auriumque hæmorrhagia, valde molestant, sine sensu itidem, loquelaque decubiteret æger, Naturæ negotium in totum commisimus, quæ, arte nullâ adjuncta, symptomata enarrata tollere haud valuit, unde tactum, quod nox sequens lethalis ipsi fuerit.

Materiam hanc antequam deferamus, è re Chirurgorum fore censuimus, siquidem quæ de fracturarum Cranii specie hæc, Cameratio quæ appellatur, à veteribus proponuntur; minus attridere dicamus, quod enim inferiora versus cranium hic deprimi tradatur, sicque foveas, quas fornices representare volunt, constitutere, unde meningum ab incumbente osse



pressio, parum certitudinis habet. Notasse nos in defuncti nostri osse parietali arcum unum alterumve, sursum tendentem, negare nolumus, imò plures se exhibuisse inferiora petentes, certum quoque, aut quo jure fornicum s. testudinum nomen tribui hisce queat non video, cum omnes ex loco inferiore versus superiorem se extendant, neutiquam à superiori ad inferiorem descendant. Antiquitati hic multum debemus, cui nomen dictum fracturæ huic imponere placuit, modo inversam camerationem à nobis vocari, concedant.

*Ultima* fracturarum Cranii Paulo Collisio est, hanc in infantibus solis locum habere tradit, quod tamen falsum, cum etiam in adultis, senibusque eam notare licuerit, describitur ab ipso, *quod Calvaria diviso non sit, eoque nec fractura rectè dici queat* ejusmodi affectio. Quibusdam, imprimis in infantibus Contusio appellatur, sic tradente Hippocrate *lib. de vulner. cap.* Mulieribus atque infantibus propria magis affectio habetur, quod ossa calvariae molliora, tenuiora, adeoque flexilia magis possideant.

*Hic ossis calva in interiorem partem impulsio est aut inflexio, concavitate integra existente calva continuitate tantum efficiens*, ut licet in cantharis aliisque vasculis ex plumbo, stanno, aut cupro confectis, si foris percutiantur, conspici. Continui solutio vera licet nulla hic, unde fracturis annumerari nequit, symptomata tamen varia, eaque haud levis, non raro ipsi uncta.

Anno 1656. decimosexto Augusti, ex mandato Ampliss. hujus loci Magistratus accessi mulierem, *Alidam, Wilhelmi filiam*, in qua præter vulnus satis magnum, proximè ad oram musculi temporalis sinistri, Contusionem reperi insignem in osse parietali.

Per octiduum & vigiliæ, & vomitus graves valdè, sine tamen febre notabili; aut die nono somnus invasit cum stupiditate quadam, laterisque sinistri paralyti; depressum os, quod tabulæ utriusque credebamus esse, beneficio instrumenti quod jam ante accuratè à Scheelhanffio, Chirurgo celebri, nuperrimè à Joanne Schulteto accuratissimè depictum, & Triploides vocatur, levi manu elevare allaboravimus, quo facto illico & Paralytis & somnolentia remittere ceperunt, ægraque sic sanitati red-dita.

Contingit nonnunquam Cranii impressiones exiguas, casu, ictu, percussione, similivè violentia externâ, obvenire, imprimis junioribus, nullo præsentè Capitis integumentorum vulnere; fracturæ, fissuræve quod si his nulla accedant, saltem quæ à Chirurgo notari instrumentis digitivè queant, symptomatum verò graviorum authores sunt, imò, impressione permanente, si quæ superveniant, ferè tolli solent.

Veritatem dictorum in infantibus puerivè variis notavimus, inter omnes in filio Abelis ter Laan, cujus ossi frontis plumbeo instrumento Impressionem infixerat puer alius; toto vitæ tempore in filio dicto observabilis ea fuit, neutiquam tamen molesta ipsi vel ulla fuerunt symptomata.

Prægressio fracturis Cranii Paulus Ægineta

loco citato aliam addit, quam Capillationem dicit, sensum hæc plerumque fallit, fere latens, quia non facile se ostendat, mortis causam sæpe adfert.

Capillationem hanc notari nobis datum in defuncti alicujus viri, ab alio variâ commotione in pavementum lapideum adacto. Dolor hic in principio obtusus admodum, parte capitis interiore, latere dextro, hinc intolerabilis, cum hæmorrhagia dextri nasi continua. Duodecimo die sopor ægrotantem invalid, sine febre, sicque brevi obiit.

Præsentè in arte medicâ celeberrimo Viro Dn. Samuele Costero, Nosocomii publici Medico ordinario, separatis integumentis Capitis mollioribus, Calvariae partem superiorem qua fieri potuit curiositate abstulimus, huius in basi, circa meatum auditorio nervo destinatum, latere dextro, Capillatio occurtebat, subtilis valdè, sub osse petroso ad basilare se extendens, cui cruoris, foetidique humoris exigua jungebatur quantitas.

Meningibus sanguis nullus incumbbat, imò ne quidem ipso in Cerebro aliquis reperiebatur; nisi loco modò indicato, qui inter cranium & meningem duram per fissuram dictam huc erat delatus, ubi spiritus Animales incalefacti, suffocatique, sicque mors inducta.

Missis Fracturarum Cranii speciebus, quæ Paulus Ægineta de fracturis Cranii proponit, accedemus examen illius quam Celsus, Hippoc. aliique varii describunt, singularisque considerationis habent, imò omnium ferè fracturarum periculosissimam, eò quod etiam si externo adspectu, & quantum Chirurgica manus præstare valet, post fracturas omnes, quæ oculis notari queunt, & tamen curabiles reperiuntur, curabiles sint, nihilominus Chirurgum sæpius ab incepto desistere faciant opere.

Fractura hæc Hippocrati *ἰσχυρὰς*, Contrusio Galeno dicitur, *Os hic medium desidit, intraque recedit, quoties violentia quadam externa, ictus, casus, simileque infortunium præcessit*, simili omninò ratione, ac glaciem vi externâ frangi, ejusque particulam reliquo quod integrum est supponi facimus; quod enim medium desidit (verba sunt Hippocratis *lib. de vulner. capitis*) ab alio osse naturaliter se habente abruptum tractumque introcedit, adeoque necessariò rima adest.

Sollicitos valdè veteres Fractura hæc fecit, quod ex Hippocrate loco citato colligere licet, quem consulere non sine fructu Artis Chirurgicæ cultores poterunt; & sanè, non semel nobis occurrit, fractam Cranii particulam profunde aded, sub osse cranii integro, fuisse protrusam, ut etiam si terebrationes variae, variaeque ossis sani separationes, accesserint, neutiquam tamen vel ulla arte, ex loco eo quem occupabat alienum, auferri potuerit, quin ferè Chirurgi industria, laboresque summi, frustra adhibiti, sicque interierit æger.

Rei difficultatem, quodque ipsi supervenire potest periculum non video quomodo, meo iudicio, accuratius describi possit, quam quidem factum legimus ab Ampliss. Reipubl. hujus Consule D. Nicolao Tulpio, dum *lib. 1. observat. cap. 1.* hæc proponit verba: *Cranium uti supereminet omnibus corporis nostri partibus, ita omnes fracturas ejus longè superat ea qua Hippocrati ἰσχυρὰς dicitur*,  
int,



rar, difficillima curationis. Exemplum ejus rei Magnif. Consul loco citato proponit, addemus nos aliud.

*Jacobus Cornelii* graviter ligno duriore vulneratur parte Capitis dextra, ad os bregmatis, proxime ad marginem musculi temporalis; ita sapius inter milites, nautalvé a verbis ad verbera itur. Per octiduum *Daniel à Suvieten* Chirurgus vulneris curationi præfuit, accessimus nos cum *Georg à Loon* Chirurgus alio, pulsus hic moderatus, sic ut febris inuicta nulla, mens coultans, quantum ex verbis colligere licuit, in vulnere ipso fragmentum cranii sat notabile desiderabatur, quod ab osse reliquo integro, cui subiacebat, tegebatur; imò & fissura, ad os petrosum se extendens, hic occurrebat.

Vir erat vulneratus vitæ dissolutæ, ad ea quæ de periculoso ipsius statu proponebantur, neutiquam attendens, quin potius maledictis atque blasphemis Deo ipsi se opponens. Nostrium fuit in re gravi nulla negligere tempora; decimo adeoque die à tempore inflictionis Trepanationem Cranii aggressi sumus, ad modum mox declarandum, quo sic particulam ossis fracti, firmiter admodum sub eo quod integrum adhuc hærentem, auferre, imò & sanguini extravasato sicque loco alieno detento exclusio- nis locum commodum concedere, liceret, sicuti hæc in re Magni *Hippocratis* inter alios doctrinam, qua prima occasione Cranium perforari debere tradit, antequam vel febris, vel alia symptomata, sese manifestant, quo si facilius, in commodum æquæ Chirurgi ac ægrotantis, os absconditum in conspectum veniat, imò extrahi queat.

Trepanatio antequam institueretur, necessarium duximus sectione triangulari locum cum ubi trepanum applicandum præparare, latus intimum hujus trianguli musculi temporalis in margine, quod tamen displicet *Vesalio*, *Fallopio*, aliisque Anatomicis, qui musculi hujus circumferentiam ferro ullo lædi, admittere nullo modo volunt. Arridebat quam maximè Chirurgica hæc operatio, in ipsâ musculi dicti circumferentia instituta, utpotè quam fructuosam sapius, nunquam exitialem, reprehendimus.

Die Trepanationem sequente fragmentum profundè submersum, cranioque arcissime adhærens, qua fieri potuit dexteritate, Triploides ope eximere allaboravimus, at inexpectatus, illic valde notabilis, sanguinis fluxus, ab opere incepto desisteremus, fecit. Fluxu nihilominus hoc usu Iungi (neutiquam pulveris styptici) sedato, ossis fracti labia inæqualia, asperitatem maximam adferentia, quo fragmento ipsis exitus commodior concederetur, auferre die altero studuimus.

Die decimo tertio repetere placuit fragmenti dicti ablationem, instrumenti modò indicati beneficio perficiendam, at irritum omne conamen, qua enim & dexteritate, & circumspeditione procederemus, impedire minimè potuimus, quin sanguis impetu summo, rivulose admodum, prodiret, undè subitanea expectanda mors. Ab opere adeoque ipso desistere coacti, nulla præsentè febre, vulneris habendam quam maximè rationem consultum duximus, quo puris boni proventus promoveretur, & sic Deo atque naturæ negotium totum commissum.

Successit curatio ad diem usque vigesimum octavum, quo tempore nil nisi mel rosarum cum spiritu vini vulnerato ossi applicatum, Emplastro de Betonica super imposito, at post dictum diem omnia in pejus ruere videbantur; vomitus etenim graves, alvi fluxiones largæ, febres continuæ, convulsiones considerabiles, valde affligebant ægrum, imò quæ circa vulneris labia, purisque constitutionem alias exitum salutarem morbi prædixerant, mortem instare jam, præter naturam constituta, indicabant, quæ etiam brevi secuta.

Consideratis fracturarum speciebus iis, quæ manifestæ magis sunt, aut saltem hætenus notæ, cum etiam proponamus necessarium omnino, quæ occulta magis, eo quod conjecturâ potius quam sensibus adesse constet: statum eâ laborantium his verbis deplorat magnus *Hippocrates*. *Certe infelices omnes, ad quorum occultos morbos, nec oculis, nec judicium peringere potest.*

Morbus hic occultus Chirurgis Contrahisura dicitur, *Est enim Fissura infortunio, casu scilicet ictu, percussione in parte cranii eâ qua læsa aut vulnerata opposita, producta, ad eum modum, quo ollam eâ parte quam duriore quodam corpore percussimus minimè lædi notamus, at vero eâ quæ opposita est frangi.*

Haud crediderim existere Chirurgorum ullum, quem lateat Contrahisura hæc, si modò Cranii fracturas omnes ritè cognoverit, frequentius occurrere quotidiana experientia tradit, quam varii sibi persuadent; legi hæc de re possunt quæ observ. Med. 2. l. 1. proponit *Cl. Nic. Tulpius*.

Experientia dictæ, omniumque ferè Chirurgorum placitis loc. cit. sese opponit *Paulus Ægineta*, seipsum se decipere omnes eos docens qui Cranium una parte lædi, oppositâ verò frangi, vasis adinstar vitrei, sibi persuadent. Ratio ipsius à futurarum multitudinis desumpta est.

Quid opponere hic licebit? non nisi experientiam, sapius etenim Contrahisuræ nobis occurrerunt. Tot auxilia medica suppeditari vellem, quibus ad curationem Contrahisurarum cum fructu uti liceret, quot se rationes exhibent quibus errores eorum, qui *Paulum* hic sequuntur refutare concessum.

Cum ergo mediocum medicorum in hoc casu penuria adlit, imò partem læsam certo cognoscere haut liceat, certi etiam aliquid quoad curationem hætenus constitui non potuit; placet tamen Contrahisuræ hujus, cujus exempla varia occurrerunt, unicum hic loci exemplum proponere, ne revera eam dari, dubitare, negareve pergant varii.

*Fredericus Hermannides* sutor, ebrius, mediâ nocte obviam venit virorum eorum quibus excubiæ nocturnæ hic loci demandatæ aliquibus, indicetur hora noctis exigit, displicet responsio, subortæ altercationes, has excipiunt verbera, unus enim excubitorum hastâ, quæ erat armatus, capitis sutoris partem dextram, ad aurem, ubi os se exhibet bregmatis, graviter adeo percussit, ut coactus fuerit, aphoniâ vertigineque correptus, in terram procidere. Somor illicò supervenit, & hemiplegia, at haud diu vulnerato molesta fuerunt symptomata hæc, non minimum terroris & reo & consanguineis vulne-



rati adferentia, priusquam enim duodecim transirent horæ vivis annumerari desinit.

Caput iussu Amplissimi Magistratus aperimus, præsentibus Scabinis variis, loco dextro, qui hastæ impetum sustinuerat, contusio cutis levis occurrebat, pericranium aliquomodo sanguinolentum, in Cranio vero ipso nec rima, nec fissura, nec fractura ulla; imò sanguinis nihil omnino vel in substantia Cerebri, vel inter Cranium & Meningem duram, at verò in latere opposito sinistro, circa inferiora ossis bregmatis, proximè ad ossa auditus non solum sanguinis observabatur notabilis quantitas, Meningem molestam, sed & in ipso cranio fissura duplex.

#### *De abscessu hepatis fracturam Cranii secuto.*

Innumerabiles affectus quibus obnoxium caput, exterius sive spectetur, sive interius, variis & illi quos communicat partibus aliis. Capiti obvenientia vulnera, levia licet quandoque habeantur, periculosa tamen ut plurimum, symptomatibus variis stipata, quorum præcipua cæcitas, surditas, aphonia, delirium, fatuitas, paralytis, epilepsia, convulsio, suppuratio partium internarum, & centum alia.

Abscessum secutum partium internarum Cranii fracturam non uno confirmatur exemplo; Nosocomium hujus loci publicum exhibuit & nobis & aliis considerabile. Rarius talia cum obveniant, utile omnino duximus, quæ de causâ certi aliquid constet, Medicis nonnullis questionem hanc proponere.

Cum non raro vulnus Cranii & Cerebri sequatur suppuratio hepatis, queritur per quas vias Purulenta materia ex Cerebro deferatur ad hepar?

Questionem hanc proponere placuit hujus loci Medico celeberrimo Paulo Barbette, his verbis:

#### *Vir Celeberrime.*

Quo penitus Chirurgia penetratâ pervestigamus, eo magis quæ in eâ occurrunt difficultates nos confundunt. Hic hæremus; Chirurgi Regii Ambrosius Paræus lib. 10. cap. 12. & Petrus Pigræus lib. 4. cap. 8. mentionem faciunt abscessum, qui in hepate, ventriculo, mesenterio, aliisque ventris imi visceribus superveniunt Cranii fracturis. Exemplum nobis exhibuit in Nosocomio nostro decumbens Otto Reyner-son Oldeburgensis; vulnera hujus capiti influxerat triplicia socium, quorum præcipuum occipite occurrebat, ad sursum lambdoideam, fractura Cranii quæ in phæsi Hippocrati vocatur, ubi nempe fragmentum se dimittit ad inferiora, sic ut sub osse integro abscondatur, stipatum. Ad remotionem fragmenti illi Trepanisationem instituere consultum duximus, quod etiam successit. Ad diem usque 20. liber omnino eger ab omni febre, convulsione, paralyse, sopore, vigiliis, vomitu, imò symptomatibus omnibus, quæ fracturis Cranii supervenire solent. At paucis diebus antequam moreretur, de dolore gravi circa hepatis, ventriculi quæ regionem conquestus est.

Querelas inter purulentia in vulnere existens, quæ copiosa valdè, imminuebatur admodum laborumque vulneris, simuliter ac fundi ejus, insignis notabatur siccitas; accedebat febris gravis, cum delirio, & sic vigesimo octavo die obiit.

Eodem die ex mandato Ampliss. Magistratus, præsentibus Samuele Costero & Henrico Lons,

Medicis, Caput defuncti aperivimus, in quo fractura occurrit, cujus conditionem suo tempore ex diario meo tibi prælegam, at ad ventrem imum, cujus dolor valdè fuerat molestus, ubi pervenimus, Hepar invenimus valdè tumidum, abscessu notabili correptum, ex eo enim aperto purus ea effluxit quantitas, quam pinta dimidia vix continere poterat.

Ex capite hanc materiam eo defluxisse probabile valdè, at per quam viam hoc factum, ignotum nobis. Tu quæso, Vir Doctissime eruditâ tuâ pennâ eam indica, quo non solum eruditiores evadamus, sed & quantum possibile & proficuum, in commodum ægritantium, vias tales tollere, corrigere quæamus; cedit hoc in nominis tui gloriam, proximique salutem. Vale, Vir Optime, responsorias primo tempore expectamus. Fuerunt hæc sequentes.

#### *Chirurge celeberrime.*

Monarcha perfectus similis neutiquam imperfecto Alexandro Magno; intui hic mi novum crearetur orbis, aliquid restare, cujus se victorem dicat, ille in antiquo novam indies suggerit materiam, quo diligentia atque curiositati nostra semper aliquid occurrat, quod melioris notæ sit, quæ ante hac inventa cognitaque fuerunt, nulla artis nostræ pars, in qua non jam ab aliquo tempore vera hæc esse experti sumus, nec licet nobis, nisi ingratum, excellentiorem eam profiteri eâ quæ ante annos centum exulta. Constabit hoc, inter alia, ut spero, ex iis, quæ ad questionem à te propositam ex veterum fundamentis respondere licebit. Est hæc: cum vulnus cerebri sapienter sequatur suppuratio Hepatis; queritur per quas vias purulenta materia a cerebro ad Hepar deferatur?

Consensus qui totius est partiumque omnium in specie spectatarum, magnus valdè, atque diversus, ob spirituum, vasorum sanguiferorum, nervorum, &c. Multitudinem atque diversitatem, quorum totum corpus pererrantium beneficio quoties vel abjectissima pars corporis male constituta, illico status præternaturalis communicatur cerebro, imò toti microcosmo; Constat tamen, nec inspicari licet, notabiliorem esse consensum, qui est partium triplici corporis ventre contentarum, eo qui est partium his inclusarum ipsorumque artuum. Ratio hæc quæ proponimus confirmat, confirmat & experientia; imò autoritas virorum Doctorum suum huc contribuit. Perpende quæ magnus noster præceptor Comus hæc de materia habet, Vir sanè, quem majoris æstimamus in arte nostrâ quamoties Poëta Bartalius 2. jour de la 2. semaine, in arte sua populari, hæc proponendo,

Marot que je revère aussi qu'un Colisée  
Noirci, brisé, mouffu; une médaille usée,  
Un écorné tombeau non tant pour leur beauté,

Que pour le saint respect de leur antiquité.

Artifex noster post tot secula idem sapientibus nostri ævi, felices omnes quibus volupe fuit temporaria scriptorum ejus lectione consumpsisse; Accipe artis nostræ cultor variis locis ab eo proposita consensam viscerum internorum clarè declarantia.

Coac. Prænot. cap. 4. §. 1.

Capitis dolor vehemens cum febre acuta & alio signo maligno lethalis est: cæterum sine signo malo, viginti diebus transactis, sanguinis fluxum aut purum e naribus, aut abscessum ad infernas paries significat, &c.

Ibid. §. 28.

Affectiones soporem, fatuitatem & catocen inducentes, variantia hypochondria, & ventrem tumidum



midum habentes, cibum fastidientes, alvo suppressa exsudantes, num his turbidus spiritus, & genitura simile quid prodians singultum significat? nam & alvum biliosa isuper egerit? spumofus in his multus prodest; ventres quoque hu insuper turbantur.

Libro de aëre, aquis & locis.

Seclio venarum pone aures (nobis nunc tam inusitata quam incognita) infundendo facit.

Aphorism. lib. 6. Aph. 50.

Quibus praeciditur cerebrum, hu febrem, & biliosum vomitum supervenire est necessum.

Galenus, Erasistratus, Macrobius, alique, ob intelligentiam summam, judiciumque singulare à multis minus, ab ob errores plus debito, laudati, non solum confirmant ea qua Antecessor allegari locis docuerat, sed & rati res addunt varias, à distributione varia Nervorum, scilicet imprimis conjugationis, quorum ingens in ventre medio & infimo datur copia, maxime in Ventriculi orificio superiore scilicet sinistro, desumptas.

Haud displicuisse, si Meninges cerebri praegressis addere placuisse, eo quod pectorum, imique ventris interiora regant, mutique consensus eorum vel maxima causa sint uti in sterntatione, suffi, vomitu, &c. evidentiissime patet.

Hic via ferè detecta qua manifestior foret, signidem cum Glissonio nutrimentum partium nervosarum per nervos adduci, statuere liberet, nervorum par sexum, vagum antiquis dictum, facillimo negotio purulentam materiam ex cerebro ad hepar deferret, ast cum minus hoc placere curiosis sciamus, alia nobis querenda via, eaque commodior.

Primo, cerebri vulnere supervenire hepatis abscessum, certum judicamus, observationem tuam, accuratè satis notatam, testimonia variorum in arte nostrà exercitatorum, Medicorum aequè ac Chirurgorum, imprimis Balionii, Paracelsi, Pigerii, &c. confirmant adeo, ut de certitudine ejus dubitare nec queamus, nec debeamus.

Secundo prout idem, numero & specie, à cerebro ad hepar deferri, (contra ac Te judicare scimus) minime admittimus, at hic collectum prout aliam omnino agnoscere causam, mox declarandam, quam qua est puri in cerebro.

Tertio sollicitum me neutiquam declavo, qui inquiram in rationem, cur veteres solliciti adeo fuerint, ut, qua affectus huius duplicis causa, constaret, certam etenim eam exhibere neutiquam in datum, doctrina circulari de sanguinis fluxu (quam magno Hippocrati notam fuisse vanè admodum plurimè contendunt) eaque sola lucis plurimum huic negotio conferet, nec crediderim, rationem qua satisfacere veruatis cultori queat dari posse qua eidem haud insillat.

Sic ergo hac ad quaestionem tuam responsio. Cerebri vulneratio vasa sanguifera arteriosa similiter laesa, cerebri ipsius sive sint, sive membranarum ejus, sanguini contento, ubetius, parciusve exitum concedunt, hic calore spiritusque privati sensum putrescere incipit, veramque in materiam purulentam convertit; Accedit, quod sanguis nutritivus circa vulnus ex debito mutari nequeat, unde facile in pus convertitur; & hac ratione suppurationis datur incrementum, nisi natura vel ars inhibeat. Circularem suum motum interim absolvit sanguis, mutationis plurimum non solum in corde, sed & partibus principibus aliis, assumens. Corporis sic partes omnes pertrans sanguis, ipsumque adeo cerebrum malè constitutum, non potest non pravam contrahere dispositionem; pravè hic dispositus per arteriarum carotidum ramulos cerebri substantiam percurrentes, Meningis dura exhibet sinibus, qui receptum deferunt in Venas jugulares, & per has ipsam venam cavam, sicque in ventriculum cordis dextrum, ex quo, postquam in sinistrum deductus;

facilis ad hepar descensus; in hepate, nobili satis parte, sanguinis ulterior coctio, à bile iidem aliisque extremis separatio perficitur. Difficultatis adeoque quid subest, quo minus sanguis, impurus adeo, hepar accedens, suppurationi ejus ansam materiamque prabere queat.

Via hac patens adeo, ut nullus dubitare queam, quin mecum eam inire haud recuses. At instabis; cum sanguis corporis partes omnes periret, cor, pulmones, lientem, renes, &c. quid causa subest, quod solum hic afficiatur hepar? Ad quaestionem hanc respondeo, Cor substantià constare solidà, compactà, caloreque infuso vegeto, hinc paucis subiectum esse morbis, hostem suum vi singulari expellens; idem quoque Lienem prestare, reticulari nervorum ex plexu compositum, hancque sua structurà non solum ab aliis partibus plurimum differre, sed & quod rarissimè in cadaveribus malè constitutis reperitur, efficere; Pulmonem ob substantia raritatem, vasorumque amplitudinem haud adeo facile affici posse; Renes impuritates suas sero communicare, sicque per urinam evacuari permittere ac longè aliter cum Hepate constitutum esse; eo quod per venam portae sanguis illi offeratur multò crassior, fixilientiorque eo qui per venam Cavam, quod & color diversus, & consistentia varià clare, satis induant; ductum lympham ad chyli glandulas receptaculaque ventium numerus adsit insignis; in quibus ob sumam subtilitatem, parvitatemque facillimum humorem subsistere; sanguinis purificationi coctionique continuo inserviat; prater vasorum, biliorum, sanguiferorumque, maximam copiam, mixturamque complicationem, vix aliud, ut substantiam componentem, agnoscent quam sanguinem concretum, unde & parenchyma jam à longo tempore dictum, qua quidem soliditatis aliquid habet, ast fibras possides firmas minus iis qua sunt cordis, renique; quibus accedit, quod arteriis gaudeat paucis, iisque exiguis admodum, respectu nempe aliarum partium, hinc spirituum vitalium quantitate minore, unde est quod hostium imperii resistere minus queat, sicque morborum plurimorum nutritula. Scriptis his qua desunt, ad plenioris explicationem data occasione, verbis addemus.

BARBETTE.

Litterarum hanc quod si Chirurgiae cultoribus haud satisfecerint, non scio quid adferri queat, ad id ut, quo modo, quave via materia purulenta ex Cerebro vulnerato ad hepar deterri possit, declararetur; in gratiam juniorum ea quae Medicus eximius Nicolai Zessius ad Epistolam nostram ea de materia ipsi missam respondit, praegressis addemus.

Celeberrime, Doctissimeque Vir.

Quaestionem Medicis aliis propositam ne quaso agere feras, quod & politico tuo iudicio, experientiaque singulari offerre ausus fuerim, est ea: cum vulnus cerebri saepius sequatur Hepatis suppuratio.

Per quas vias materia purulenta à cerebro ad hepar deferatur?

Ad hanc certius ut respondere queas necessarium omnino ducimus casum cum proponere qui nobis occasionem suggessit eam insiliendi.

12. Mensis, Junii in Nosocomio publico Amstelodamensi cura nostra subiectus juvenis viginti prater propter annorum, melancholica temperiei, statura media, tribus locis in capite vulneratus; vulnus gravissimum in occipitis occurrebat declivior parte, proxime ad suturam lambdoideam, cui iungebatur fissura similiter ac fractura ad meningem penetrans duram; fractura inbatabat fragmentum ossis deorsum dimissum ad spatium quod est inter duram matrem & cranium ipsum, sicque fractura



fractura eam conficiens speciem, qua Hippocrati *ἰσχυρὰν* appellatur.

Fragmentum hoc, molestum valde vulnerato, doloris graviori causam, impedimentum singulare evacuationis materia purulenta fragmento disto succumbentis, quo tolleretur, instrumenta varia adhibita, elevatoria imprimis, ast frustraneus omnis labor, Trepano cranium perforare necessarium fuit.

Primo à tempore ad diem 20. immuni ager fuit à febre, siti, vigiliis, sopore, vomitu (nisi quod lumbricum evomuerit) delirio, convulsionibus, ast à die dicto puri per vulnus effluere soliti, sub cranio collecti, copia immixti capiti, accedente febre, doloreque hypochondrii dextri summo; Tertio ante mortem die febris, ast ultimo delirium, valde augebatur, dolor contra hypochondriacum imminuebatur, 28. mensis dicti obitus.

Defuncti & Caput, & ventrem intus aperiri placuit Amplissimo Magistratui, tum quod ventris dolore gravi circa hypochondrium dextrum laborasset defunctus ante obitum, tum quod ad vulnus Cerebri non raro abscessum hepatis sequi, ex nobis percepisset Magistratus dictum; pro me adducebam auctoritatem Ballonii lib. de morb. Epid. Paræi lib. 10. cap. 12. & Pigræi lib. 4. cap. 8.

Catvariâ ablata puris exigua valde quantitas sub loco vulnerato reperiebatur, eaque dura incumbebat matri; circa os occipitis, ubi fissura aderat cuius supra mentionem fecimus, Trepano facta perforatio, fragmentumque elevatorio remotum, puris nihil omnino invenire licuit, ast omnia hic, mater imprimis dura, laxa admodum, madoreque perfusa.

Ad foramen ossis occipitis, per quod spinalis medulla ad vertebrae spinæ descendit, ubi devenimus, omnia, membranas imprimis medullam investientes, musculosque cervicis caput retrorsum moventes, sero sciatere reprehendimus, quæ tamen humiditatis collectio gravis nunquam egrotantis fuerat.

Relicto capite anatomen agger ssi sumus Abdominis, ubi primo nobis occurrit Hepar, & in eo abscessus, pila magnitudine respondens, puris libram semis exhibens.

Finem huius observationi nostra, quam nondam adeo proponere placuit, quo quæ illustrationis loco exhibere Tibi Viro literato animus pleniori stylo nobis offerantur; sententiarum nostros inter Medicos Chirurgoſque mira varietas; sunt qui volunt puris collectionem hepatis constitutioni morbosa adscribi debere, adeoque ex cerebro minime defluxisse; Placet aliis, quorum numerus insignis, purulentam materiam à cerebro per vias occultas ad hepar defluxisse, & huius dictæ rationem inde imprimis deducunt, quod notatum fuerit, quoties in cerebri vulnere puris imminutio, toties in hypochondrio dolorem augmentum sumpsisse. Lympha sua lucis plurimum commodiori huic deductioni puris ex capite ad hepar adferet; Galenus lib. 6. de locis affect. cap. 4. Puris sincerum ex Pulmone deferri posse scribit per arteriam venosam in ventriculum cordis sinistram, ex hoc in arteriam aortam, hinc in emulgentia vasa, sicque ex vasis per ureteres ad vesicam, quo cum urina evacuetur.

Ambros. Paræus lib. 17. cap. 51. in Secretariis Sarlet, quoties brachium vulneratum parum exhiberet puris, toties urina, alviſque fœces multum ejus permixtum fuisse, testatur.

Ampliss. D. Consul. Nicolaus Tulpius obs. Med. lib. 2. cap. 6. & cap. 27. Historiam nobis proponit, ubi purulenta pectoris in sponsâ quadam per umbilicum via sibi elegit, imò hepate collectum pus per os & alvum evacuari posse notatum.

Clar. Medicus Guilielmus Piso, Brasilia præxin exercens in servo cuius Cranium fractum, casum similem

observavit, & hac observatio occasionem ipsi dedis, ex me, aliisque, etiam me paratio, ex Te, quibus vis materia dicta translatio perfici queat, inquirendi.

Vale Vir summe, brevique quæ habes huc facientia communica, nihil unquam, considerationis alicujus, huc occurre, cujus te non primo tempore participem faciam, interim.

Officia mea & hic & ubique  
Tibi offero

JOB. à MEEKREN.

Responsoria hæc sunt.

Vir curiosissime, Chirurgæ expertissime.

Ad solutionem questionis propositæ respondeo, abscessum cum quem in casu proposito hepatis innatum scribis, ad instar pile luforia, materia purulenta non exiguam copiam exhibentem, visceris illius contusioni, aut læsioni cuiusque adscribendum esse, unde putrefactio sicut.

Sententiam meam confirmant abscessus circumscriptio, extensio, quæque eo faciente, pile ætatem figuram formamque habebat in hepatis parte convexa notabilis.

Quærelas quas dolores hypochondriaci causant Hippocrates defendit in aphorismis, dum dicit: dum pus sit dolores & febres augentur at eo facto imminuuntur, imò desinunt.

Sequi nihilominus quandoque abscessus hepatis, & mesenterii capitis vulnera libens concedo, sola auctoritate Petri Pigræi motus, cuius cap. 12. lib. 4. videri potest. Placet ipsi abscessum Hepatis & Mesenterii originem ducere ex consensu partium, qui nervorum recurrentium distributioni varia debetur. At hoc in hepate locum non invenit, cum Nervi dicti à sexto pari provenientes hic non inveniantur, Placent nihilominus quæ proponit Vir citatus, cum certum mihi sit (concedantur pro libertate animi sensum proponere) similiter ac nervi nihil aliud sunt quam cerebrum expansum, membranas etiam nil nisi nervos extensos & ampliatos esse, adeoque consensum partium aequè membranarum quam nervorum ope perfici.

Vias ubique exactas eligere mathematici est, in cerebro nostro talis fingere licet, ast ipsa invenire impossibile.

Ipsa per ossa purulentam materiam natura trajiceret novis, Hippocrate teste, quid obstat, quo minus, faciliore etiam negotio, per arterias, vel etiam ligamenta ipsa, quorum beneficio hepar toti coheret, eadem efficiat, corpus ut enim totum perspirabile est, sic & fluxile.

Imò ex sententia Galeni lib. de loc. affect. 6. cap. 4. (si bene meminimus) pus omne, per arterias, venasque totum corpus variè agitato sanguini jungitur, sicque minime eidem mixtum, ad renes deductum, cum urina excernitur, quæ omnia epistolæ tuo proponere nobis placuit. Hæc similitudine natura alicui proprietati, quæ chymicum archæus, faber, artifex, & adiciunt naturæ, vocatur, adscribuntur; opus hæc suum persuad non ratione vel iudicio, sed ut sola atque virtute facultatem secreticis atque expultricis, uti in sibilis loqui solent, viis sibi eligens occultas. Serosus liquor, aequè in vasis ac extra ea detentus, vias secretarum immonitatum accessu sapient impervire an disponat, adeo ut puri ad hepar facili conduceret aditus, considerari meretur.

Serosam quod spectas humiditatem, quam copiosam repertam fuisse scribis circa integumenta spinalis medulla, de quarum tamen partium læsione nunquam conquassus fuerat ager, lympham eam credimus fuisse, innoxiam corpori, eo à naturâ ablegatam, quo à periculis præservarentur partes.



*Hæc ad propositum tuum. Vale, salutem meo nomine indices Clar. Guilielmo Pisoni, cuius labores in describendis Brasilia fructibus, herbisque valde probamus.*

NIC. ZAS.

*De Fracturâ iisdem.*

Ad quæstionem propositam quæ responderunt Medici adducti, Artis nostræ cultoribus satisfacere posse credimus; nihilominus cum plurimi reperiantur, quibus ea displiceant, imò observata nostra æque ac sententiæ diversorum Authorum fabulis annumeranda habeantur, ex eo, quod, si quando abicellus in viscerum internis reperirentur, haud adeo fracturis Cranii adscribi debeant, quam quidem morbis eorum variis, placet observationem aliam prægressis jungere.

Die 7. mensis Junii curæ nostræ subiectus *Henricus Henrici Osnabrugensis*, in quo ex ictu os frontis fractum, depressumque notabatur; duodecimo aut hoc tempore die obiit æger.

In hoc, æque ac in aliis decumbentibus, de dolore lateris dextri, puris in vulnere immixtione, denique febre, atque delirio, querelæ fiebant.

Calvaria ablata purulenta occurrebat, eaque corrupta materia, non solum in latere capitis dextro circa piam matrem, sed & in sinistro (eò quod ex concussione Cerebri arteriæ lacerata) circa sinus.

Relicto capite, quod de dolore hypochondrii dextri, dum in vivis æger, valde conquestus, purisque in loco affecto immixtio considerabilis, Ventris inferioris viscera accipimus; ad hepar ubi devenimus palmæ fere magnitudini accedentem inflammationem in eo reperimus, quæ sine dubio purulentæ collectioni ansam dedisset, siquidem diutius in vivis fuisset jam defunctus.

Observata hæc nostra ultima quibus satisfacere nequeunt legant, quæ simili de materia habet *Petrus Marchette obs. Medic. sçlog. obs. 14.* Quinto inquit observavi læpissimè, quod quando in his vulneribus collum incipit dolere, parte potissimum postica, & laterali, tunc materia purulenta delabitur ad Thoracis, & abdominis cavitatem, quæ longiori mora cum pulmones, tum pleuram, aliquas nempe ipsorum partes, erodit, ex quibus multa sanies emanat, quæ postmodum ad abdomen deliuit, cum Jecoris, & Lienis labe, in quibus varias pustulas excitat, quibus disruptis perinde ac ex pulmonibus, & pleura, ita & ex his materia purulenta effluit; quanquam huius observationis ignari, existiment, abscessus obortos in his partibus, quorum ratione patientes moriuntur, non ex capitis vulnere, quòd ex capite copiosum pus, posse ad inferna viscera delabi, non sibi persuadeant: prout in plerisque observavi, mediam thoracis, & abdominis cavitatem pure fuisse repletam. Quam observationem multis tum in Theatro Anatomico, tum in Valetudinario S. Francisci demonstravi. *Job. à Meekren in observ. Chirurg.*

*De Trepano, tanquam ad Fracturas Cranii pertinente.*

Trepanum est apertio cranii, ut aliquid sub

cranio contentum per illam educatur. Illa apertio sit ferreo instrumento terebrante, quod eodem etiam trepani nomine vocatur: itaque trepani verbum habet duplicem significationem, vel enim significat ipsum remedium, seu capitis apertionem, vel ipsum instrumentum quo apertio fit, modo in una, modo in alia significatione medicè sumitur. Primo dicemus de eo, ut significat instrumentum, ab aliis ipsum instrumentis destinguentes. In medicina sæpè contingit ossa debere perforari, instrumenta quæ hoc præstant generali nomine vocantur terebra. Ossa quæ perforantur sunt quadruplicia, vel enim calvaria perforatur, sternum, vel costæ, vel ossa artuum. Calvaria perforatur, ut aliquid sub ea præter naturam contentum evacuetur. Aperitur calvaria variis modis, vel ulatione seu cauterio, vel scalpura, vel serratione: cum aperitur scalpura, tunc potest aperiri, vel solâ scalpri abratione, vel cum prævia simul terebratione communi terebro factâ, sed tunc non aperitur trepano, nam nec scalprium, nec commune illud terebrum vere est trepanum. Interdum aperitur serratione cum instrumento rotundo in orbem serrante & ossis rotundas particulas exscindente, & illud instrumentum vocatur trepanum, & cum sic aperitur, tum vere trepano aperitur. Costæ & sternum aliquando perforantur, ut aqua e thorace effluat, ut post audiemus. Ossa artuum terebrantur, ut caries ex iis auferatur caustico per foramina infuso. Illud trepanum est quoddam terebrum & species ejus, terebra enim sunt diversa, alia enim sunt triangularia, alia torculata, alia lata, alia cannulata & serrata, terebrum cannulatum & serratum vocatur trepanum, reliqua terebra à trepano sunt diversa. itaque terebrum est genus, trepanum est species, & sic omne trepanum est terebrum, at non contrâ. Trepanum ergo propriè dictum est instrumentum seu terebrum ferreum rotundum, cannulatum, dentatum, acutum, quo in orbem ducto serratione ossa, ac præcipue calvaria perforantur ita, ut ejus fructum integrum exscindatur. Per hanc definitionem à trepano excluduntur omnia alia terebra, quibus aliquando caput aperitur: excluduntur etiam cauteria & scalpria, quibus etiam caput potest aperiri, & cyclisci, de quibus mentionem facit Hipp. & Gal. Trepanum vocatur etiam Chornix, Græcè, & Latine à Celso modiolus, propterea quod instat mensuræ modii dictæ sit rotundum. Hipp. mentionem facit cujusdam instrumenti, quod vocat *περίον*, quod videtur trepanum nostrum indicare. Aliqui putarunt, quod cyclisci de quibus Hipp. & Gal. meminere, essent trepanum nostrum, eo adducti quod ipsi doceant aliquando caput cycliscis aperiri sicut caput cycliscis aperiretur, ergo ajunt cycliscus esset trepanum, sed errant, nam non omne instrumentum quo caput aperitur est trepanum; dixi enim suprâ etiam cauterio & scalpri & terebro communi cranium aperiri, sed tantum instrumentum cannulatum, rotundum serratum, &c. Quod autem cycliscus non sit trepanum ex eo patet, quod cycliscus malleo adigatur, trepanum verò non. Ideò Gal. ait, quod cycliscorum usus non sit ad eò securus, eò quod caput quatiant, scilicet propter mallei percussione, & id comprobatur Paulus, qui ait, quod



quod cum os est imbecillum, ex fracturâ oporteat scalpri incisoriis cavis, quos Græci cyclifcos vocant sentim malleo adactis, ne caput concutiat uti, ex quo patet, quid cyclifci sint, scalpri & malleo adigantur. Sic Avicenna loquens de iis inquit, & administra facilitatem in percussione parvâ & magnâ: non lædatur caput & inquit & ipsum. Itaque cyclifcus est quoddam instrumentum oblongum, rectum suo extremo scindens, quod extremum in formam semicanalis, aut semilunæ est excavatum, quali fabrilignarii utuntur ad ligna circulariter excavanda, nos nostro hoc idiomate nominamus, cenrent, beitelidus, & cyclifcus est sine dubio illud instrumentum, quod Celso vocatur scalper lunatus, & Paulo scalper excisoriis cavis; cyclifci, ut cuiusvis scalpri usus, imò & per se est os radere, & eo utebantur antiqui ad rimas fracturarum scalpendo & radendo extirpandas, cum parvæ erant, at cum majores & penetrantes erant, tum utebantur, iisdem etiam ad cranium perforandum. At quomodo dicitur cranium posse cyclifco perforari, si cyclifcus est scalprium. Respondeo, quod antiqui primum locum in orbem terebro multis foraminibus perforabant, postea adhibebant cyclifcum, eumque malleo adigendo squammatum quicquid calvariæ intrâ foramina inclusum erat auferrebant, quousque tota ad meningem usque ablata esset. Itaque & cyclifcis & terebris olim cranium perforabant, neutrum tamen instrumentum trepanum vocatur, sed sicut modus perforandi eorum à perforatione trepani est diversus, ita etiam instrumenta sunt diversissima. Aliqui putant, quod cyclifci sint scalpria recurvata, quibus hodie Chirurghi utuntur, quæ habent acumen à latere, & scalpunt lateraliter, sed errant, cyclifci enim sunt recti, non recurvi, & scalpunt acutie sui extremi, non autem lateris.

Per trepani nomen etiam significatur ipsum remedium, seu ipsamet cranii apertio, in illâ significatione illud foramen quod in osse est factum, essentialiter est trepanum, non autem ipsa operatio, quâ trepanum fit, non enim illa operatio Chirurgica effectus, propter quos trepanum expetitur, sed ipsum foramen per illam operationem inductum, effectus enim trepani est sub cranio aliquid educere, illud autem non educitur per ipsam operationem Chirurgicam, sed per ipsum foramen: sic in cauterio quod fonticulus vocatur, non ipsa ustio est remedium, sed ulcus & foramen ustione inductum, itaque ipsum foramen est verè trepanum: ex eo cognosci potest, quale remedium sit trepanum, nempe evacuatorium. Verum cum remedia vacuantia, alia sint generalia evacuantia ex toto, vel pluribus partibus, alia particularia evacuantia, tantum ab una parte, & alia sint evacuantia hunc humorem, alia alium, quaritur quale evacuans sit trepanum, unde & quid evacuet. Dico ergo quod trepanum evacuans particulare sit, faciens evacuationem simplicem & à parte affectâ, scilicet à loco cui supponitur, nempe à capite, sed ex quo loco capitis evacuat, an ex toto an ex parte tantum. Respondeo, quod aliquando possit trepanum adhiberi pro evacuandis fumis & vaporibus in caput ascendentibus, ut in melancholici morbo,

vertigine, epilepsiâ, &c. Sicut post audiemus in tali statu, trepanum, ex ipso evacuat cerebro, quatenus illi vapores tenuitate suâ possunt ex cerebro meninges pertransire, & per foramen cranii exire; sed cum trepanum adhibetur pro fracturis, pro sanguine extravenato ad meninges hærente, vel pure ibi contento aut squamulis, quæ ab osse cesserunt, & membranas pungunt, aliisque evacuandis, tum dico quod trepanum, non possit per se evacuare meningibus contentum, sed tantum quod suprâ eas est. Dico per se, quia per accidens, si meninges sint vulneratæ, potest pus sub meningibus contentum per trepanum exire, propterea quod dura mater sit tam crassa & solida, posset equidem bene in tali casu meninx phlebotomo aperiri, & aperta posset tunc per eam, & consequenter per trepanum evacuari, quid sub ea continetur, sed id facere est lethale & nimis temerarium ac periculosum, præcipue cum nimis difficile & nimis conjecturale sit, scire analiquid quod evacuatione egeat sub meningibus continetur: ergo concludendum est trepanum, imò & per se est remedium evacuatorium materiam suprâ duram matrem tantum sub cranio contentam: sed quid est, quod trepanum evacuet? Dico id esse vel sanguinem extravenatum, vel in pus conversum, vel vermes ibi contentos, ut aliquando fit, vel squammas & frustulas ossis, quæ ita à cranio secessere, & meninges, pungunt, vel frustula teli aut pugionis sub cranio relicta, vel omata & tubercula, quæ subtus cranio aliquando adnascuntur, pro iis omnibus evacuandis potest terebrum adhiberi.

An Trepanum sit remedium periculosum? Aliqui affirmant, aliqui negant, ego distinguo, pro quo notandum, quod aliqui videntes periculum esse in hoc remedio, ne sic meninx vulneretur, dicunt quod ad illud evitandum oporteat trepanare, usque ad ultimum cranii, sic ut totum cranium non perforetur, sed aliqua tenuissima portio ejus adhuc supersit, & quod illa debeat relinqui naturæ superanda. Alii dicunt quod oporteat trepanare, non trepano proprie dicto, sed aliis terebris desquamantibus, si foramen fiat in cranio, illis inodis tunc dico, quod non subsit notabile periculum, propterea quod iis modis caveri possit, ne meninx tangeretur, à cuius læsione est præcipuum periculum, sed illi modi sunt incommodi, & habent suas difficultates, propter quas etiâ raro usurpantur, at si foramen fiat trepano proprie dicto, seu rotundo illo & cannulato terebro serrante, & simul & semel usque ad ipsam meningem penetrativè perforatio fiat, sicut hodie Chirurghi omnes faciunt, tunc dico trepanum esse remedium valde periculosum. Illud periculum consistit in multis, Primò in eo, quod meninges & aliquando etiam cerebrum denudentur, & sic exponantur aëri frigido à quo læduntur, etiam cerebrum, cum sit pars princeps, à frigida, & membranz sint corpora nervosa, & acuti sensus à frigore plurimum offenduntur, verumtamen illud periculum non est valde magnum, nec ejus ratione puto hoc remedium adeo esse periculosum; imprimis enim aër potest à longè admoto igni sic temperari, ut frigore suo non oblit. Secundò experientia docet, quod multi post



post trepanum convalescant, quorum tamen meninx luit aëri exposita, si aer tantum obesset, omnes proculdubio pariter offenderet. Tertio quod aer frigore eas non offendar, ex eo colligi potest, quod membranae deberent livefcere, & trepanati deberent reumate & catarrho corripi, quod ab aëris frigiditate fieri solere est manifestum, quod tamen in trepanatis non fit. Secundo periculum est in eo, quod ossiculum trepano excisum, sæpè fibris, venuis, arteriolis fortiter cranio adhæreat, & sic non possit extrahi sine disruptione earum, quæ disruptio dolorem, inflammationem, febrem, convulsionem potest inducere. Aliqui dicunt ex ea parte non esse periculum, propterea quod trepanum plerumque in fracturis adhibeatur, in iis autem à contusione jam fibræ illæ divulsæ sunt, & membrana ab osse separata, & super cerebrum lapsa, & hoc probant experientia, quia in cadaveribus sæpè apparet meninx ab osse separata. Sed hoc verum non est, vel valdè rarum & experientia vidimus, semper frustulum jam excisum non iusti violentiâ quadam fibris illis fractis à meningi separari, ita enim fortiter cranio meninx adhæret, ut non facile ab eo possit separari, aut supra cerebrum decidere. Aliqui dicunt meningis non hæreere cranio per tales fibras, nisi ad futuram, sed hoc est falsum, nam ideo in cranio insculpta foramina & sulci ac tramites quidam, ut in illa foramina fibræ membranarum ingrediantur, quæ eas cranio alligent, & ut per illos tramites arteriæ & venæ perreptare possent, quas necesse est ad calvariam pervenire, nam nisi in illis tramitibus vasa illa sic occultarentur, & fibris amisterentur, non possent suum situm servare. Iterum tamen neque illud periculum ego permagni facio, nam mox rosaceo & vitello ovi supposito ille dolor & inflammatio facile possunt sedari, ut experientia docet, convulsionem autem inde sequi per se nec credo, nec animadverti. Tertio nonnulli periculum ponunt in eo, quod non possit os perterebrari, quin asperitates quædam & fragmenta ossium relinquantur sub cranio, & quædam pariscidia seu squammulæ subtus ab osse secedant, quæ cum intus relinquuntur meningem lædere & inflammationem inducere possunt, eodem modo quo videmus, quando asserem perterebramus vel serramus & perventum est ad imam superficiem ipsius intra frustula plana ab eo secedere, quod fit, quia asser suas fibras habet propter quas finditur, quales quia etiam cranium habet, verisimile est, quod etiam sic findi persæpè possit, verum etsi id fieri benè sit possibile, benè præcaveri, & raro fit propterea quod os terebretur levi circumactione, leviterque sine pressione comminuat, illa autem pariscidia secedunt tantum propter fortem compressionem, quæ squammulæ decedunt, quando serramus, aut perforamus acuto instrumento, aut levi serratione sine forti trusione, cui accedit, qui tales squammulæ per trusionem sic secedant, cum asser est siccus, & non cum humidus, cranium verò in vivente homine est humidum, & ideo cum volueris trepanare calvariam siccam alicujus cadaveris tales squammulæ facile tunc secedunt, sed non cum calvariam hominis viventis, deinde ut hoc aliquando fiat inspecto ossiculo illo quod excin-

ditur potest animadverti, & si fortè aliqua secesserit, potest subtus, à meningi abstergi vel educi, itaque neque ex hac parte trepanum adeo est periculosum.

Quarto periculum est ex eo, quod cum trepanando pervenitur ad ultimum cranci, & trepanum jam penetrat vix fieri posse, quin dura mater, & venæ, & arteriæ, ejus dentibus acutissimi ferrei instrumenti divellantur & vulnerentur, & hoc periculum est summum, & difficulter evitabile, & hujus ratione trepanum est maxime periculosum, quia vulnere meningis sunt lethalia, nam si fibræ venarum & arteriarum lædantur, imprimis effluit sanguis ex iis, qui se insinuat & disabitur sub cranio, & corrumpitur & inflammatur, interdum etiam potest sequi hæmorrhagia, si majores venulæ ac arteriolæ vulnerentur: quia ipsa est nervosa, & acutissimi sensus, sequitur inflammatio ejus febris, delirium, & aliquando convulsio, & cum ipsa inflammatur tunc incallescet, & elevatur in foramen cranii, & claudit ipsum, & facit ut apertio fiat inutilis quatenus quæ sub cranio est non possit exire, hæc latio propter tres causas sæpè fieri potest; una est propinquitas & adhesio arcta cranii ad meningem, propter quam fit ut tam cito atque os est penetratum meninx tangatur. Secunda propter inaequalem ossis crassitudinem, habet enim os interioris quasdam cavitates, & processus propter quas fit, ut trepanum cum una parte transivir, altera adhuc debeat perforari, ex quo fit, ut antequam crassior pars cranii sit perforata, altera jam trepani dentes transmittat, qui ibi meningem vulnerant. Tertia quia Chirurgus trepanum sæpè non recte tenet, nec ortogonaliter ponit super cranium, ex quo fit ut uno latere tangat meningem, antequam perforaverit, alterum, hoc autem ex eo sæpè contingere potest, quod oculus Chirurgi ex alto aspiciens, non benè possit videre, an trepanum rectè stet, nec ne, nisi ab altante medico admoneatur. Quarto hoc fieri potest, cum trepanum est æquale sine aresto, & cum Chirurgus nimis fortiter premit ipsum, ex quo fit, ut si os tenuius sit, quam ipse putet, & sic citius perforatum sit, quam ipse cogitet trepanum, jam impetu quodam pertranseat, & demergatur in meningem, antequam ipse advertat, est benè verum, quod circumspectissimus Chirurgus has omnes causas benè sæpè advertere, & cavere possit, sed tamen non semper, & ideo manet hoc remedium valdè periculosum, avertere potest, si sæpè eximat trepanum, & animadvertat quam vere os sit perforatum, & trepanum versus crassiorem ossis partem inclinet, & trepano utatur abaptisto, id est, quod non possit demergi, & habeat arestum.

Diximus supra trepanum esse remedium evacuatorium, itaque tantum in illis effectibus convenit, qui sunt ab aliqua materia sub cranio contenta per trepanum evacuabili materia, quæ si est evacuabilis vel immediate sub cranio continetur, vel profundius in cerebro, & sub membranâ; materia quæ profundius sub cranio est, quæque per cranium est evacuabilis tantum est vapor & fumus, non autem materia aliqua humorosa & crassa, talis enim gravis est & spissa, & sic nec ascendere potest nec meningem



gem penetrare, vapor verò cum tenuis sit, & sursum ferri & meninges pervadere potest, itaque in morbis, qui fiunt ab humoribus in cerebro contentis non potest trepanum convenire, verum in effectibus difficillimis, qui a vapore & fumo maligno ac venenato fiunt potest trepanum locum habere, evacuando causam eorum, quæ alioquin per solidam ossis substantiam exire non satis possit, tales morbi sunt, Epilepsia, Vertigo, Melancholia, dolores intolerabiles capitis, addo in morbis gravissimis & maxime diuturnis, quia cum remedium per se sit magnum & periculosum, non debet temerè, & non nisi in maximis, diuturnis, & intolerabilibus morbis postquam, alia omnia remedia non profuerint adhiberi; cum verò prædicti morbi aliquando fiant ab humoribus, a vaporibus aliquando non convenit trepanum in eis, nisi quando a vaporibus sunt generati, etsi autem propter remedii difficultatem raro in illis effectibus trepanum adhibeatur, tamen rationi & experientie consonum est ipsum aliquando adhiberi: Rationi, quia si in talibus effectibus cauteria sæpius supra suturam coronalem adhibeantur, ut per ea facilius eidem vapores exire possunt, multo enim facilius exibant, cum etiam ipsum cranium est pervium foramine, quam cum tantum ipsum pericranium & capitis cutis. Verum quidem est, quod aliquis obijcere posset, quod vapores capitis per suturas cranii sæpè exeant, sed non satis commodè, & in sanis: cum vapores sunt pauci, non autem cum nimii sunt & crassiores. Experientia verò patet etiam hoc remedium, etiam in illis effectibus convenire. Nam Saxonia scribit in Cephalalgia capitis post alia omnia remedia, etiam trepanum convenire, & se cuidam intolerabili & diuturno morbo laboranti caput trepanasse, & invenisse os subtus cariosum, & multam pituitam supra meningem, & quandiu foramen cranii erat apertum, ipsum melius habuisse, sed cum obturabatur, a carne meningi supercrescente dolorem iterum sævisse: Hollerius quoque propriis observationibus, quas citat Schnellius lib. Observat. E. Dc. d. c. dicit in intolerabili capitis dolore in Epilepsia, mania, melancholia, themicrania constare permultos melius habuisse, terebellis, vel cycliseis aperto capite. In melancholice morbo etiam scribit Guamerius, se ducati magnitudine mulierem trepanasse, & trepanum mense uno apertum reliquisse. Memini quoque mulierem quandam, dividimus Leodii capitis incredibili, & nimis diuturno dolore laborantem, cui ego quoque remedia scripseram, importunè semper flagitantem à Domino Rictio Doct. Medico trepanatam esse, & à dolore liberatam. Certè in huiusmodi nimis diuturnis; intolerabilibus & aliter incurabilibus capitis doloribus, qui sub cranio in eodem semper fixi loco sentiuntur, credo trepanum sæpius necessarium esse, sæpius enim tales dolores fiunt ab ossis carie destillante, & supra meningem aggregato, ac ossis particulis propter cariem secedentibus, à vermibus etiam ibi generatis meningem pungentibus & erodentibus, sæpè à lumbricis ibi cranio subtus adnascantibus, ut in morbo Gallico aliquando fit, in quibus casibus, malum sine trepano curari impossibile est, quia enim

alia ratione, quod ibi contentum est, posset evacuari. Præcipuus autem morbus, propter quem ordinariè hodie trepanum appetitur, est cranii fractura, ideo de ea paulo latius disseremus.

Cum cranium ex ictu, vel casu fractum est, contingit aliquando ipsum valde contra meningem deprimi, ac ipsum cerebrum lædere, aliquando frusta ejus inversa esse, & cuspidem suam meningem pungere, vel in eam esse adacta, vel squamulas quasdam subtus secedere, quæ meningem infestent, plerumque vero sanguinem contra cranium, propter ictum est verius elapsum, per ipsam fracturæ rimam meningem in ipsam delabi, interdum concussionem venas & arterias sub cranio contentas rumpi & offendere sanguinem, interdum ab ipsis ossis frustulis vulneratas sanguinem emittere, illo casu sanguis extraventus concrevit, & ut semper solet, inflammatur, & in pus vertitur, & calore suo meninges & cerebrum inflammatur, & acrimonia id ipsum stimulat, dolores, febres, deliria facit, frusta vero, quæ secesserunt, & membranam pungunt ac vulnerant, etiam eadem accidentia inferunt, simulque convulsiones, Epilepsiam, &c. Illa vero omnia sunt educenda, ut æger curetur, educi non possunt cranium non apertum, nec osium ergo est, ut si ipso ictu non sit apertum, trepano aperiatur; hunc in fracturis trepanum convenit.

Adhiberi trepanum non potest, nisi cute capitis primum longe lateque divisâ, & cranium detecto: hic ergo queritur: An quando cranium per se non est detectum, sit necessum à Chirurgo detegi; & cutem capitis detegi; Videtur Hipp. lib. de vulneribus capitis indicare quod non: dicit enim, si os est denudatum, ergo vis ictus non penetravit usque ad os, ergo non potest esse læsum; si non sit læsum, ergo non est opus trepano, nec consequenter cutis divisione. Sed respondeo, cranium posse ab ictu lædi, & quæ sub cranio continentur, etiam si cutis externa cranii, non sit usque ad cranium fissâ, hoc imprimis sæpius fieri potest, cum læsio facta est per contusionem à casu & baculo crasso, tam sæpè cutis est integra & cranium fractum: sæpè etiam in pueris, quibus ossa adhuc sunt mollia: à contusione cranium potest esse depressum, cute externâ integrâ, sed cum læsio est facta, à re acutâ scindente vel perforante, tunc si vulnus non transierit usque ad os, & os non sit denudatum, sequitur quod nec sit læsum, nec consequenter cutis sit dividenda, nec cranium denudandum, vel trepanandum, nihilominus tamen adhuc fieri potest, quod gladius non fuerit acutus, & sic etiam si non vulneraverit usque ad os, tamen ictu suo causarit aliquam sub cerebro concussionem, ex qua venulæ fractæ sint, & sanguis exierit, & in illo casu est cutis dividenda, & trepanum ponendum. At hoc factum cognosci in principio non potest, & ideo in principio in vulneribus sic factis, si non penetrant usque ad cranium, nonnunquam est trepanandum; esset enim temerarium & sine causâ, sed si decursu dierum videatur, quod pessima succedant symptomata, & majora quàm ab externo illo vulnuscule produci possint, est indicium, concussionem & fractionem venarum subtus factam esse, & tunc est



trepanum figendum, si autem per contusionem rei gravis & obtusa læsio facta sit, ac cutis divisa, atque cranium denudatum manu vel specillo tangi potest, an os sit fractum, si cutis non sit divisa, & ictus sit levis nullà vi impressus, non est opus cutem dividere; sin est contra, & gravia symptomata ad sint, casus vomitus eruginosus, sanguinis per os & nares exitus, &c. cutis est dividenda, nam in eà dividenda nullum est periculum, & facile refanescit, nisi ubi magna arteria aut musculi temporales sint dividendi, si tunc os fractum apparet; qualis fractura sit est videndum, ad sciendum, necessarium trepanum sit nec ne, non enim in omni statu fracturæ necessarium est, sunt nonnulli qui dicunt, quod in nullis fracturis sit trepanandum, hoc dicit Vidus Vidius super Hipp. de dolore capitis, nisi auctoritate Jac. Penin. i. sanctissimi Chirurghi, qui dicebat, se longo ulu observasse, magis levare eos, qui sine cutis divisione partim lenientibus, partim siccantibus curantur, quam quibus cutis inciditur, & os aperitur, hoc etiam prob. ratione quam inquit, si cutis non scindatur, tunc calor innatus manet concusus & integer, & melior saniem & sanguinem collectum discutit, & ossa conglutinat, si scindatur, tunc ait, calor evolat & externum frigus accedit, & sic à duplici causa calor fit debilior, & debilior factus non potest illa opera exercere. Secundo sæpe sanies & sanguis tali loco sunt, ut non possint per trepanum evacuari, sæpe enim ut trepanum ab una parte, & pus est ab altera, aut sæpe pus collectum est loco imò, nec ad foramen à meningē inflammata occluditur. In illis casibus imprimis frustra agri exponantur periculo ipsius remedii. Secundo est, nec posse esse eos mori, quia sanies inprimis non exit, & propter calorem à foramine debilitatum, tunc non potest à naturā discuti, in quibus si trepanum factum non fuisset, calore manente unito & valido sanies discuti potuisset. Tertiò quando sanguis subtus & ab it: propter ruptionem venarum, factam à concussione, tunc ille plerumque exit è venis pia matris, non autem duræ matris, si ex venis pia matris, ergo colligitur sub dura matre, ergo si tunc trepanum fiat, frustra sit, & non possit sanguis per ipsum evacuari, ergo tales trepanati propter caloris dissipationem debeant mori, quod sine trepano, calore permanente vegeto possent sanari calore, &c. Sanguinem & saniem discutiente. Quod exeat è venis duræ matris potius, quàm dura, colligi potest ex eo, quod pia mater magis abundet venis, & sit tenuior ac venæ eius tenuiores, dura verò mater sit densa & solida, nec sit verisimile, quod à contusione venæ ejus frangi possent. Quarto quia saltem, cum sic sub crano sanguis est extraventus, dubium est an ex hujus an verò illius membranæ venis exierit, & sic semper tunc erit dubium, an trepanum juvabit, temerarium aut videtur uti renidio tam periculoso, cum semper dubitatio est de ejus utilitate. Quintò quia videmus, quæ alia ossium fracturæ bene curentur sine cutis divisione, & quod natura sanguinem tunc ad fracturam collectum bene discutiat sine eo, quod necessum sit illum sensibiliter per aliquod vulnus vel foramen exire, ergo eadem ratione fractura cranii poterit bene consolidari, & sanguis extraventus subtus contentus ac sa-

nies à naturā discuti sine eo, quod necessum sit cutem dividere & cranium perforare, imò videmus, quod fracturæ ossium aliorum membrorum longe facilius curentur, quando nullum est conjunctum carnis vulnus, seu nulla apertio facta, quam quando est. Sed respondeo, ad primum & secundum certum est, quod aliquando capitis fracturæ bene possint absq; trepano curari, quod quando sc. os solum fractum est & nullus sanguis sub crano collectus, quia fractura, ut talis, trepanum non requirit, aut apertionem, sed tantum unionem. Dico secundo quod etiam bene possibile sit aliquando illas fracturas curari, cum quibus sanguinis aliquid sub crano est collectum absque trepano, quatenus sc. natura cum sit uti in aliis fracturis & inflammationibus facit, aliquando discutere potest, sed est nimis temerarium illi dubio eventui exponi & expectare, an natura eum discutere poterit nec ne, quod si enim non discutiat, sed in pus convertat, an non tunc recta mors sequitur, adde quod calor non potest talem sanguinem discutere, nisi sit paucus, cum enim multus est, tunc nunquam discutiet, sed suppurabit, quomodo ergo tunc illud pus sine trepano exibat, nec valet dicere, quod etiam aliquando trepanum frustra ponatur, & sanguis tali loco collectus sit, quo non possit per trepanum exire, quam certum est ipsum sæpe non juvare, nec educere, sed tunc talis læsio est incurabilis, & saltem factum à nobis fuit, quicquid humanitus fieri possibile est. Neque etiam valet dicere, quod in illo casu, si non fuisset trepanatus, potuisset æger adhuc curari calore valido saniem discutiente, quia invicem quod hoc semel fit, aliquando continere potest trepano non facto, decies è contra possibilis erit, enim curari trepano facto, quam si factum non fuisset & curari qui non facto fuisset moriturus. Quod dicunt calorem propter trepanum evanescere, & sic debilem factum, non posse sanguinem discutere, quem crano integro validior existens discussurus fuisset, falsum est, non enim adeo propter illam apertionem calor debilitatur, quin ita bene sicut ante sanguinem discutere posset. Ad tertium respondeo, quod videtur, sæpe ex pia matre sanguis effluit propter multitudinem venarum ejus & tenuitatem, sic è contra ex durā matre etiam sæpius exit, quia ipsa à concussione plus patitur, propterea quod crano sit vicinior, & quia à crano quasi pendet, cum altera suprā cerebrum firmiter jaccens nequeat, sic ab ictu conquassari, ut sit, quia dubium semper est, an sanguis ille sub dura matre, an suprā eam sit, ideo in omnem eventum est trepanandum, ut saltem à nobis non steterit, quin æger sit curatus, quia casu quo sub durā matre contineatur, propterea non magis enim tunc calor natus discutere impediatur, calor enim sub meningē includitur, nec ita notabiliter expirat. Ad quartum respondeo, quod multo magis temerarium esset relinquere ægrum sine trepano soli nature, quæ sanguinem qui plerumque multus exit discutere nequit, aut vix unquam discutere, nam etsi trepanum aliquid periculi habeat, si illuc relinquatur. Ad quintum respondeo, aliud esse de fracturis membrorum externorum, aliud de fracturis cranii: in fracturis illorum inflammatio forti fasciatione impeditur, quæ partes constringuntur & coarctantur. In cra-



nio illæ fasciæ locum non habent, cranium enim non potest fasciendo constringi sicuti brachia & pedes, quia propter sit hoc certum quod in fracturis sæpius trepanum sit necessarium. Dico sæpius, quia non est necessarium in omnibus, ut itaque sciatur, in quibus hoc necessarium sit, & in quibus non; Notandum quod os vel est fractum, vel contusum: fractum os, vel est fractum usque ad diploem tantum, vel usque ad meningem: fractum os usque ad diploem, non est trepanandum, sed radendum: si usque ad meningem, tum fractura vel est valde parva, sicut sit tantum quædam rima, vel valde magna, aut cum frusti notabilis effractione, sicut ipsa meninx, imò & per se vel illius frustuli effractione extrahere videri possit, vel mediocris si tantum sit rima atque tenuis, aliquando trepanandum est, sæpè tamen minime, tum tamen in dubio si suspicio & quid propter rimam simul ab ipsa concussione subtrus vena aliqua disrupta esset, & sanguis effluxisset, quia ille absque dubio extrahi non potest sine trepano, eo quod per tenuem rimam non possit exire, esset trepanandum, non propter rimam per se, sed quatenus cum rimâ per accidens subtrus extravasati sanguinis collectio juncta esset, verum si ejus suspicio non esset, tunc si rima sit tam tenuis, ut non sit verisimile per eam aliquid sanguinis supra meningem destillasse, non est absolute necessarium trepanare, quia cui usui trepanum fieret, rima enim per se non indicat apertionem, sed potius conglutinationem, sed tantum quatenus suspicio est, quod per eam aliquid sanguinis supra meningem effluxit, quod si propter rimæ tenuitatem factum non esse sit verisimile, & nulla mala symptomata indicatione appareant ubique neque est trepanandum; Dico quod non sit trepanandum absolute, quia aliquando etiam si rima tenuis sit, nihilominus tamen est trepanandum, propterea quod ab ipso osse in rimâ aliquando colligitur sanguis aliquis, qui ibi putrescit, & os corrumpit, & simul afficit meningem, quod apertione trepano factâ debet impediri, hoc autem postea cognoscitur, cum mala symptomata incipiunt apparere, & propterea quamdiu talia nulla apparent, non est necesse, propter rimam in principio trepanare: sed tantum oportet uti medicamentis cephalicis egregiè exsiccantibus & discutientibus, ad talem in rimâ putredinem impediendum, & quod collectum est discutendum, & rimam callo claudendam. Si fractura sit valde magna, ita ut jam frustulum unum notabile, aut plura sunt effracta quæ extrahi possint, ex quibus extractis jam meninx denudetur, & cranium sit apertum, non est necesse trepanare, quia idè trepanatur, ut exterebrato per trepanum uno frustulo cranium sufficienter sit apertum, si ergo jam à fracturâ satis apertum sit, quid est opus amplius trepano aperire: si fractura sit mediocris, & fortè cum aliqua fracti ossis depressione est trepanandum, nam in tali casu semper probabilis suspicio est, quod per fracturam sanguis à pericranio sit delapsus, vel in fracturâ sanguinis ex ipso osse & diploem exiliens colligetur, qui ibi putrescens os corrumpat & saniem versus meningem dimittat, unde pessima accidentia, & mors sequeretur, idè talis sanguis & sanies facto foramine est educendus. Porro si vulnus & fractura

cranium sit illata ab ictu vel puncturâ plerumque squammæ subtrus à cranio secedunt, illæ verò trepano sunt educendæ, si os fractum sit & simul depressum, sic ut portio depressa cerebrum & meninges comprimatur idè, quoque magis trepanandum est, ut simul auferatur illa, illis enim ex depressione coarctatis apoplexiæ, convulsio & mors sequuntur. Hæc cum os est fractum, aliquando etiam est contusum: contusum est duobus modis, ut cum est contusum in substantiâ, vel cum in situ, si in substantia est contusum, sic ut substantia ejus sit condensata, sine eo quod deorsum secundum situm sit depressum, tunc tantum conveniunt medicamenta cephalica, quæ impediunt ossis contusi putredinem & sanguinem ex compressione in diploem solum penetrans, si os est contusum sic ut figuram rotundam perdidit, & sit cum foveâ quadam depressum, & tamen non sit fractum, quod in teneris ossibus puerorum potest fieri, tunc trepanum non requiritur, sed tantum elevatorum, aut medicamenta attrahentia, sed si cum contusione suspicio esset, ex concussione sanguinem sub cranio extravasatum esse, omnino trepanum necessarium foret, proinde generalis regula esse debet, seu cranium denudatum sit, seu non, seu os fractum sit, seu non, seu fractura magna sit, seu parva, si ex magnitudine accidentium suspicio sit, sanguinem aliquem subtrus ex venis exisse, & sub cranio collectam esse, trepanum esse adhibendum: talis concussio & venarum subtrus factio plerumque evenit, cum à re gravi, obtusâ, & contundente cerebrum læditur, attus etiam cum cassim & punctum læsum est, præcipue cum instrumenta non sunt admodum acuta aliquando contingit, sicuti memini me quoque observasse. Quæritur autem, an etiam in resonitu trepanum sit ponendum: Resonitus est, cum caput unâ parte percussum, non frangitur illâ, sed in opposita; talem resonitum animadvertere licet aliquando in vitris & ollis fieri, quæ videmus unâ parte percuti, & frangi oppositâ, proinde eadem ratione etiam in cranio aliquando fieri Medici animadvertunt, nonnulli tamen negant illum resonitum cranio evenire posse, propterea quod cranium non sit unum os continuum, sed ex plurimis coagmentatum; resonitus autem, inquit, non habet locum, nisi in iis, quæ sunt unum quid continuum: verum etsi cranium ex multis partibus sic est compositum, quia tamen illæ valde arcte per suturas sibi mutuo coherant, sit ut ipsum quodammodo sit, sicut unum continuum corpus, & idè in eo resonitus fieri potest. Hippocr. lib. de vuln. capitis testatur, etiam talem resonitum aliquando fieri, quod infortunium cum accedit non potest, inquit, juvari, propterea quod nulla via possit, ut inquit prehendi an os fractum sit nec ne, & quo loco? ubi videtur judicare, quod si aliqua adessent indicia loci ubi os fractum sit, quod etiam tunc isthic deberet cutis dividi, & trepanum poni, sed quia cum consideramus partem capitis istam, & cum videmus ibi non esse fracturam, valde dubium est & obscurum scire, an opposita pars sit fracta, nec ne, & quam valde temerarium videretur ibi secare, ubi non rectè con-



constat, an os sit fractum, & quia posito casu, quod in opposita parte certe fractum esse constaret, tamen adhuc incertum est quo loco sit fractum, an sursum an deorsum; ante aut retro ideo præcipue quaritur, an in tali casu medicus auderet tentare cutis capitis in oppositam partem divisionem? Et respondet bene Cora Celsus, si inquit percussio fuerit gravis, si mala indicia adint, & ea parte qua cutis scissa est rima non appareat, non inuicem modum est, inquit, altera parte quoque considerare nunquid locus mollior sit, & tumeat, etenim aperiri rationem insinuat, nam si adest fractura jam certum est, quod trepanum requiratur, si non adest, quod cutis facta divisione certissimum constabit, jam nihil est peccatum, & solummodo frustra semel cutis divisa est, ex qua divisione, nullum venit damnum, cum possit facile resanari.

Circà trepanum hæc præcipue consideranda, modus, quo trepanum industriè adhibeatur, ut nihil vel minimum tempus noceat, quo adhiberi debet, quantitas & locus; hic de modo; cranium non potest perforari, nisi imum sit denudatum, non potest denudari, nisi cutis & pericranium divisione, videndum ergo, imò an in capite sit vulnus nec ne, si est magnum vulnus sic ut cranium late sit detectum, aut tantum ut in vulnere commodè trepanum circumducere possit, non est amplius actus dividenda, si est parvum ulteriore sectione est dilatandum donec sit satis magnum, si non est debet vulnus fieri, secatur plerumque cutis in crucem usque ad ipsum cranium, sic ut totum pericranium perficeretur. Dico plerumque quia aliquando secatur in figuram trianguli, cum nimirum vel suturæ, vel arteriæ aliquæ, aut venæ sunt cavendæ, tunc pericranium quod suis fibris fortiter cranio adheret, obtusiore instrumento, vel novacula dorso est separandum, ut quatuor anguli carnis seu cutis capitis sunt attollendi, & diducendi, & subrustentis pluribus ex stupa idoneo medicamento imbutis infarciendi & sustulcendi, ut diducatur & a se invicem late separentur, quo postmodum spatium latum pateat figendo trepano, imbuuntur illæ medicamento habente virtutem repellendi, sanguinem sistendi, & dolorem sedandi, ex scissione enim illa, & pericranii violenta divisione potest dolor fieri, & febris, & locus inflammari. ex divisione venarum & sæpe etiam arteriarum copiosus sanguis effluere, qui restringi debet, & venulæ claudi, & ideo curandum, ut postmodum totus sanguis sit restrictus, alioqui trepano impediretur, medicamenta illa sunt, bolus, sanguis Draconis, spodium, ovum totum, aqua rosata, acetum, oleum rosatum, &c, si nullæ arteriæ, vel saltem exiguæ sint præcisæ, facile sanguis sistitur, si majores metuendum quod illæ non tam citò aut facile à medicamento claudantur, debet uri vel ferro, vel caustico, vel debent transmissæ per carnem acu ligari: Interim æger debet victu tenui, & refrigerante vivere, ut sic minus ad febrem à remedii magnitudine contrahendam disponat. Est enim alius modus cranii denudandi, quo cutis non scinditur, sed exurit, hic cauterio & potentiali, actuali, præstari potest, Cauterium actuale illud est rotundum per modum cannulæ & acutum, illud cum incanduit ponitur super cutem

& carnem capitis, & exurit eam usque ad ipsum cranium, unctione facta pars cutis intra cauterium inclusa, una cum pericranio detrahitur & avellitur ab ipso osse, & tunc ibi os pulcre est detectum, talis modus cranii denudandi habet multas commoditates imprimis quod non habeat tales angulos in carne, qui sæpe obstant trepanationi, sed tantum rotundum foramen. Secunda quod avertit omne periculum hæmorrhagiæ ab arteria aliqua secta, cauterium enim urendo claudit arterias, & ideo cum ab arteria est periculum valde convenit. Tertia ac præcipua commoditas ejus, cum est necessitas cito trepanandi, ut cum trepanum nimis diu fuit delatum, aut periculum est in mora, tum enim facta hac sic cutis exustione statim post licet trepanare, quod non licet, quando cutis novacula est divisa, tunc enim ad minimum una nocte expectare debet, imò sæpe duabus & amplius, si vulnus recens iterum sanguinem emittat. Quarta commoditas est, quod ab ipsa unctione cranium excalescit fibrae meningum lubius cranio adherescentibus contabescant, & sic sine violentia frustulum cranii exterebratum abduci & secedere possit: Verum si novacula cutis fuerit divisa, postmodum illa & dente fortiter pilis & cuti ratione aluminis adherentes sensim & blande sunt auferendæ, ne si rudius auferantur, iterum venis divulsis sanguis effluat, qui trepanationem impediat. Si ergo sanguis restiterit trepanum est affigendum, si adhuc tuat, multus iterum trepanum est differendum quousque sit restrictus, in trepanando tota difficultas & artificium in eo consistit, ut foramen sic in osse fiat, ne meninges lædantur, nam si lædantur est lethale, quia verò hoc est difficile, & tamen tanti momenti, ideo medici varios modos excogitaverunt, ut varia genera instrumentorum quibus hoc fieret imprimis, video cranium posse aperiri tribus modis, serratura, sculptura & limatura, serratura sit per modiolum seu trepanum proprie dictum, & illius usus hodie est maxime vulgaris, cum eo uti volumus sic est agendum. Claudantur aures ægri cotone, ne à strepitu trepani offendantur, tunc caput ab uno vel duobus hominibus teneatur, anguli carnis divisæ tegantur emplastro aliquo, ne à trepano circumducto lædantur & doleant, tunc trepanum imponendum valde orthogonallyter, & sic continuo tenendum, & non magis in unam, quam in alteram partem inclinet, & inæqualiter perforet, circumducendum verò mediocriter, nam cum nihil premittitur, nihil ferrat, cum nimis fortiter non circumagitur facto jam circulo parum profundo, seu facta jam sentita trepani, trepanum est eximendum, & stilus pungens, qui est in centro trepani, etiam eximendus, & solum trepanum suo inducendum, nam si per oblivionem stilus ille non eximeretur, cum is extet ultra margines trepani; diu pertransisset cuspidem suam cranium antequam ipsum trepanum, & sic perforaret meningem, trepanum aliquando est eximendum, ut dentes ejus extergantur ab ossis serratura, & nimis continuata serratione, una cum ipso osse nimis incalescat, & in oleum rosatum est imponendum, ut facilius ex lubricitate circumducatur, antiqui in aquam imponebant, sed oleum præstat, quia quando ferè os est perforatum, tum



exempto trepano sæpè videndum est, quàm prope finem pervenerimus, ne nimis profundè perforemus & meningem lædamus, & ut videamus an os non sit una parte citius quàm altera perforatum, ut secundum hoc possimus trepanum inclinare versus partem crassiorem, & si trepanum tale est, ut possit perfundari, tunc summa cautela curandum, ne ex improviso immergatur, itaque valde suspensa & timida manu tunc est perforandum, & mox ut osculum incipit mutari, tunc est tentandum, an extrahi possit suaviter potius quàm usque ad ultimum extremum undique perforaretur metu semper tangendæ meningis. Hippocrat. voluit ut os non perforaretur usque ad extremum absolutè, sed ferè tantum, & tunc relinqueretur naturæ separandum, os enim sic divisum & læsum corrumpitur, & simul libræ quibus meningi adhæret contabescunt, & tunc ab osse bono à naturâ separatur & excutitur, & hoc ideo fieri volebat, ut ea ratione, omne tangendæ meningis, & fibras violenter divellendi periculum evitaretur. Ille modus, ex illâ quidem parte est securissimus, sed ex alterâ iterum est periculosus, propterea quod illa separatio non fiat à naturâ, nisi valde serò & lentè, & interea in mora periculum sit, itaque ubi effectus inducias concedit, ille modus est securissimus, aliàs non hodie simul & semel omnes Chirurghi perforant: Os terebratum suaviter est extrahendum, cum forceipe cannulatâ ad id comparata, perforare trepanis, quæ possunt immergi est valdè periculosum, ideo nulli diligentes Chirurghi unquam deberent istis uti. Trepana quæ mergi non possunt abbaptista illis ferè absque periculo uti possumus, quia non possunt contra nostram voluntatem ex improviso in meningem demergi, pleraque etiam eorum non possunt ad latus inclinari, & inæqualiter perforari quin animadvertatur, ideo talia trepano non possunt immergi, quia habent quandam exstantiam seu arrestum, quo hærent supra circumferentiam cranii, & impeditur descensus, & ideo illa vocantur trepana securitatis. Illa trepana in duplici præcipue sunt differentia: aliqua sunt quæ habent arrestum, seu supercilium, seu circulum extantem serratim, qui cum ipsum trepanum cranium profundius est ingressum, superius super convexa cranii superficie hæret & arrestatur, & circumductione etiam ibi serrat, quo impeditur, quod circulus inferior non possit profundius serrare, quam circulus superior descendendo serratim permittit. Aligua sunt, quæ habent utrinque processus acutos scalptim scindentes, qui superius cranio hærent, & ut trepanum profundatur superius circumductione cranii scalpunt, quo fit, quod non magis profundetur trepanum, quàm scalpturæ superioris profunditas ostendat & permittat. Aligua sunt, quæ habent unum simplicem circulum extra trepanum sursum deorsumque per spiras & helices mobilem, qui circulus facit, quod trepanum non possit profundius penetrare, quàm ipsi volumus, & cum trepanum jam usque ad circulum est ingressum, si os adhuc non est perforatum illum circulum per suam helicem, quantum volumus circumdando adhuc parum abtollimus, quousque to-

tum os est perforatum. Aligua trepana habent multa foramina, quorum unum altero est elevatius, per quæ stilus ferreus crassitudine foramini respondens transmittitur, qui utriusque extra coronam trepani paululum extans impedit trepanum profundari, qui stilus moveri potest, & vel in altius vel in demissius dimitti foramen, prout plus minus volumus trepanum vel profundari, & major minorve crassities cranii exigat. Aligua habent appensas à latere alas acutas scalpentes, deorsum angusto in conum desinentes, sursum versus latera utrinque unam vel duas quæ serræ succedentes, & os paulatim magis, & magis exscalpentes perforant quidem, sed ita ut dum major semper fit perforatio, trepanum alarum latitudine suspendatur, ne repente incidere in meningem possit. Hæc sunt genera veri trepani, seu trepani serrando perforantis. Verùm quia ejusmodi trepana habent dentes acutos, & qui omnes æqualiter simul cranium transeunt, & propter ossis cranii inæqualem crassitudinem possunt una parte, transisse, & meningem ibi vulnerare, antequam transierint altera parte, in quo non est parvum periculum, ideo nonnulli ad majorem cautelam & securitatem invenerunt adhuc alium perforandi modum, & alia trepanorum terebrarum genera, quæ non sunt quidem verè trepana, sed cum habeant eundem perforandi cranii usum, & sicut trepanum vertibulo dicantur, sæpè communi nomine trepani appellantur, inventus ergo etiam modus cranii usque ad meningem scalpendo squammatim extenuandi, scalpturæ varii sunt modi, aliqui eam faciunt cum nostris scalpris communibus in circulum semper scalpendo donec factum sit foramen ad meningem usque. Antiqui ut supra multis foraminibus perforantes, cum cycliscis malleo adactis, quicquid cranii foraminibus comprehensum erat squammatim decutientes: verùm ille modus propter percussionem cum malleo erat molestius, & à multis eo nomine fuit damnatus, quod percussione illa cerebrum & spiritus valdè quaterentur, & turbarentur secundo etiam ille modus periculum habebat ratione terebræ quæ perforando toties cuspidem suam meningem subspungeret, vel ex improviso penetrare potuisset. Aliqui invenerant scalpra, quæ non adducuntur manibus, sed imitant terebri manubrio circumducuntur, talia sunt, certa trepana quædam alata, subcava, disquamatoria, quæ perforant non unum frustum & terebrando, sed unum rotundum locum manubrii circumductione in ordine scalpendo. Illa trepana, non sunt verè trepana sed sunt vera scalpra manubrio circumducta, vel terebra quædam scalpentia, tale unum trepanum ponit Fernel. pag. 271. suæ Chirurgiæ quod vocat trepanum desquamatorium. Sunt etiam trepana alata, quæ constant alis à latere secantibus plurimis, quibus paulatim cranium scalpendo excinditur. Sunt etiam trepana habentia sulcos acutos & scindentes, quæ verticillo ducta cranium atterunt. Apertè etiam cranium limaturâ. In eum usum sunt inventa terebra limata habentia caput crassum, quod est limatum, quod caput supra cranium vertibulo in orbem ducto ipsum raspando & limando usque ad



ad meningem diminuit : factum jam foramine usque ad meningem eaque denudata, omnis osium ferratura est extergenda, & videndum ne illum ossis pariscidium intra remanserit, simulque ossis asperitates à ferrà relictæ scalpro leniculari orbem sunt adæquandæ. Deinde arcedendum à meninge aeris frigus, itaque si aura est hiemalis & frigidior, semper cum vulnus curatur, candens sartago, aut vas aliquod ignem continens, aut quid simile à longo est exhibendum, quo meninx tempore quodam foveatur, aut aeris frigus corrigatur, mox perforatione facta, quid olei rosati solum, vel cum molli rosato, vel etiam vitello ovi est exhibendum, quo meninx dolore à trepano & laceratione fibrarum affecta demulceatur, & ab inflammatione defendatur, dolore sedato, vel rosa tum cum tenui sindone supra meningem ponatur, supra os ipsum denudatum, non sunt unguenta seu olea applicanda, quia os corrumperent, sed vel succus sindon, vel lintei particula, quod sic ab aeris etiam attractu aliquo modo defendatur, nam si os aëri multum sit oppositum nigrescit & corrumpitur, & quantum nigrescit, tantum à natura postea separatur & excutitur. Cavendum ne ipsa meninx tantis suprapositis gravetur, nam cum ipsa ab osse sit suspensa pondus ei incumbens dolorem & fibrarum ejus faceret divulsionem. Itaque supra ipsam meningem & in foramine nihil nisi tenuis sindo est ponendus, superius tamen vulnus multis tentis, emplastro, & linteis tegumentis est cooperiendum, quo aeris externi frigus difficilior possit intrare, & calor internus cerebri iis mediamentibus includatur, & non exhalet interrim labra vulneris in carnem per divulsionem primam facta, semper impositis tentis deducta sunt servanda, tuberoscens foramen cranii ne obturent, sæpe meninx meninge phylace instrumento deorsum ab osse parum præmenda est, ut puri quod sub eo continetur, facilius exitus detur, quando nihil amplius purulenti è cerebro per foramen effertur, & quicquid præter naturam sub eo contineri creditum fuit, id vacuatum putetur, tempus est foraminis claudendi, claudatur autem foramen caone succrescente, in locum enim ossis ablati nunquam aliud os succrescit, sed partim supra meningem, partim supra calvariam, nova caro accrescit, partim labra vulneris excrescunt, & omnibus in unum conglutinis, carne foramen impletur, quæ raro propter ossis viciniam durior, cum tempore callosa evadit, & sæpe non minus bene, quam si novum os aggeneratum fuisset cerebrum defendet.

Locus trepani figendi desumitur vel ab ejus, quod per trepanum evacuari debet situ, vel à natura partis trepanandæ: Ab eo, quod evacuari debet sumitur indicatio loci; sic quod scilicet trepanum eo loco poni debeat, per quem judicamus commodissime posse evacuari quod subitus est, is autem locus est ille, qui rei subitus contentæ est vicinissimus. Itaque si vel cuspis pugionis vel teli in capite sit relictæ, si os est in fractura comminutum & depressum & cerebrum premit, aut ibi metus sit ne pariscidia quæ secesserunt membranas pungant, aut ei sint infixæ in ipsissimo loco trepanum est ponenda.

Si in aliquo loco fixo intolerabilis dolor fuerit, semper presentibus metu ne os subitus sit cariosum, aut putredo aut sanies subitus lateant, aut gummata sint adnata, illo ipso doloris loco est perforandum. Si trepanum ponatur pro educendis funis in melancholia, epilepsia, vertigine, locus superior ad suturam coronalem est eligendus, nam cum vapores cavitate sua recta sursum ferantur isthic omnium commodissime exhalabunt, & propterea etiam ille locus pro cantheriis in ejusmodi affectibus ponendus eligitur. Si trepanum pro fractura adhibeatur, ubi fractura est ibi ponendum, si tamen pro sanie, quam subitus contineri suspicio est, eductione adhibemus, præstat paululum demissiorem fracturæ locum eligere, pus enim semper deorsum labitur, versus fundum meningis, & difficilior sursum fertur, & ideo per demissiorem locum melius evacuetur, non oportet tamen à fractura decedere, eo modo supra fracturam trepanum est ponendum, ut fractura non sit extra ipsum, sed ejus circulo comprehendatur, interdum terè medio ipsius, interdum à latere prout judicabitur expedire. Cavendum tamen semper, ut cuspis trepani, seu acutus ille stilus, qui est in centro eis non cadat in ipsam fracturam, si os in multa frustra sit comminutum, super ea trepanum non est ponendum, quia inprimis stilus super is poni non potest. Secundo quia nec trepanum ea potest excindere quia cedunt pressioni. Tertio pressione trepani si quæ pariscidia subitus sint, aut penetrant meningem magis aut profundarentur. Quarto illorum fructulorum agitatione meningum fibræ cum maximo dolore avellerentur. Itaque in fracturis si cutis non sit divisa, ubi ictus est receptus, ibi est dividenda, ibi enim verisimilius est fracturam subesse, quod si fractura non inveniatur, & tamen pessima symptomata aliquam subesse indicent, & sic periculum sit resonitus, opposita parte qua tumor, aut dolor, aut mollities est, est etiam cutis dividenda, & si ibi fractura inveniatur trepanum figendum. A natura partis etiam sumitur indicatio loci, quia aliqua loca capitis non patiuntur trepanum, propter periculum, quod ex earum perforatione sequitur, aut saltem non nisi extrema necessitate. Imò dicit Hippocrat. suturas esse cavendas, quem omnes medici sequuntur, suturarum enim vulnera sunt lethalia, & hoc propter fibras nervorum, venarum & arteriarum, quæ per suturas decurrunt, quæ omnes trepano ibi posito miserè dilacerarentur, unde periculum doloris, inflammationis, febris, spasmi, convulsionis, &c. Secundo manet, ut pericranium non tangamus, quanto minus fibras meningum, nam illa trepanatio est quædam dilaniatio, & ideo plus offendit meninges & fibras, quam simplex vulnus. Etsi autores omnes fateantur periculum esse in suturarum trepanatione, aliqui tamen putant, id non esse admodum magnum, proinde cum fractura in suturas incidit, licere etiam suturas trepanare, & probant experientia, quia videmus & legimus plurimos fuisse sanatos, qui in suturis fuerunt vulnerati, imò etiam qui in sutura fuerunt trepanati: & Carpus scribit se sæpe in suturis trepanasse, nec invenisse



difficultatem. 2. Non est eis fidendum, certoque tenendum, non debere futuras vulnerari, si ergo in futuris est fractura, trepanum est ponendum, utrinque ad latera futuræ quam propinecam. Dico utrinque quia illo casu sanies potest esse collecta, & pariscidia excussa, tam bene ab uno latere, quam ab altero, si tum tantum ab uno latere apertio fiat, quod ab altera parte est collectum, non posset per illud unum foramen evacuari, nam meninx quæ futuræ adhæret tanquam quoddam septum est intermedia & impedit ne quid ab uno latere capitis posset ad alterum pervenire. Secundo paulum super supercilia in osse frontis non est trepanandum, ibi enim sunt quædam cavitates aere plenæ, & humida quædam substantia per quam aer per nares in cerebrum transiens attenuatur. Ideoque si ibi os fractum esse aliquando contingat debemus meminisse illius cavitatis naturalis, ne putemus sic illud nos intro adductum esse. Tertio debemus etiam vitare occipitis demissorem partem propterea, quod ibi sit exortus nervorum & spina, quæ si laderentur, aut apertione frigus aut noxam contraherent, essent paralitici aut mortis causa. Quarto non licet etiam os temporum trepanare, & propterea cum illud fractum est paululum supra musculos temporales in osse sincipitis trepanum est ponendum. Causæ quinque sunt, quas Gal. Meth. sexto cap. ult. adfert. Ima est durities illius ossis, propter quam petrosum dicitur, quæ est, quod illud non possit sine magna cerebri concussione perforari. Secunda futuræ squamosæ quæ ibi sunt. Tertia situs dimissus, qui est causa quod cerebrum ibi in foramen exeat & perfrangat, & magna mole decumbat. Quarta quia ibi est apertus nervorum qui a latere cerebri sunt, quia antequam ad os perveniatur, debet musculus temporalis præscindi, quod periculosissimum, & certum fere convulsionis adducit metum, tum etiam per eum arteria magna percurrit, quam præscindere maximi periculi est.

Maxima est difficultas in definiendo tempore quo trepanum sit ponendum, propterea quod authores antiqui circa illius determinationem ita differentes varii & sibi ipsis contrarii fuerunt. Hippoc. in lib. de vuln. cap. videtur velle quod ultra triduum non oporteat expectare, dicit enim hæc verba: Postquam autem os scalpro raseris siquidem ad perforationem tundere ossis sauciatur videatur perforare oportet, & citra perforationem triduum non excede, sed in hoc perforare tum aliàs tum tempore calido si ab initio curationem susceperis, circa finem porro ejusd. lib. videtur dicere contrarium his verbis: Si ab initio assumptam curationem admistras non oportet statim os ad membranam perforare, non enim conducit membranam osse nudatam multo tempore manere afflictam, sed postea cum madore corrumpi & putrescere ipsam periculum est, ibi enim dicit, non quidem ante tertium diem perforandum, sed tam diu expectandum, donec putredinis initium & periculum jam incipiat, & hoc confirmat Hippoc. adhuc alio in loco ejusd. libri, cum dicit: Quapropter cum intellexeris febrem hominem invadere, ex aliisque signis aliquid ipsi accidere non oportet cunctari, sed os usque ad membranam perforare ubi indicat, non esse statim

perforandum, sed tum imò cum mala signa incipiunt aperiri. Paulus Aegineta lib. 6. cap. 9. ponit hoc tempus, ut nimirum in æstate trepanatio fiat ante septimum diem, hieme vero ante decimum tertium. Corn. Celsus in temporis definitione non etiam satis sibi constat, etenim cap. 1. lib. 6. ait quid oporteat eos imitari, qui osse nudato diem tertium expectant, & tunc exciunt propterea, quod omnia sint duriora, priusquam inflammatio sit oborta; ubi dicit statim intra tertium diem esse trepanandum, priusquam mala symptomata sese manifestent, at vero cap. 4. ejusdem lib. contrarium dicit: dicit enim sic: In omni verè fissa fractovè osse protinus antiquiores, medici ad serratamenta veniebant, quibus id exciungere, sed multo melius est inquit, prius emplastra experiri, quæ calvariæ causa componuntur, quibus verbis indicat, in fracturis non statim trepanandum, sed prius tentandum medicamentis tantum, & si tum videatur mala symptomata oboriri, & medicamenta non sufficere, trepanum tunc primum ponendum est, & addit postea sic usque ad diem 17. esse faciendum, & nec tunc trepanandum nisi febris invaserit, vigiliæ aut somnus turbulentus sequatur dolor ingravescat, cibique fastidiantur. Halialbas etiam in illo tempore designando fuit diversus, nam novo practica cap. 84. imò dicit accelerandam curaturam in capitis vulneribus antequam, inquit, bilis accidat rejectio & convulsio & delirium, & syncope, & febris acuta, & postea dicit sic: At si membrana à cranio separata fuerit hyemsque sit, Omnino ante 14. diem, si verò æstas ante 7. est trepanandum, priusquam dicta illa accidentia oboriantur, imò si fractura piam matrem pungat etiam primo die putat esse trepanandum. Avicenna lib. 4. sic, quinta, t. 3. imò sic definit tempus, & non oportet, ut tardetur, inquit illud in ætate ultra 7. dies, & in hyeme ultra 10. & quanto velocius erit melius, & longinquius abest ut accidant nocumenta magna. Albucasis in parte tertia suæ Chirurgiæ cap. 3. & Ravus lib. 1. 10. de nocumentis ante 14. diem in hyeme, ante 7. in ætate debere cranium excendi existimabat, & Raves in eodem loco dicit sic, quod debet ferrari de cranio capitis cum celeritate ferretur, & non expectetur, ut accidat de eo quod descendat ad matrem cerebri ærugo, sic ut faciebant, quidam expectantes, &c. Ego hac autorum contrarietate & dubia temporis definitione dico primò, trepanum poni propter fracturas, vel propter alios morbos cephalicam, melancholiam, vertiginem, &c. si propter hos morbos ponitur tunc non ita definitur tempus trepani ullis diebus, nec est necessum accelerare in trepano ponendo, quia tales morbi sunt longi, & inducias dant, in his autem non oportet trepanum adhiberi, nisi cum jam amplius tolerari nequeant, vel desperatissimi sint, & alia omnia diu ante tentata in hilpro fuerint. Sed si trepanum ponatur pro fracturis de quibus omnes supra posite autoritates sunt intelligenda, tunc saltem hoc ex omnium superiorum consensu, imò rectum est, quod semper in ætate citius, in hyeme serius sit trepanandum: ratio est, quia ætate calor natus est debilior, & ideo vires tum citius labascunt, unde fieret quod illæ trepano non sufficerent, quando serius

pone-



poneretur, secundo, tunc multò citius sanguis extravenuit ob contusum & meninx concussa inflammatur, & putrescunt quam hyeme. Tercio propter eandem causam, & etiam propter temperamenti temporis similitudinem citius tunc & febris & omnia mala symptomata oboriuntur, pro tempore verò exactius definiendo. Neticorici aliqui dixerunt, quod nunquam oporteat perforare priusquam mala accidentia oboriantur, horum opinio fundatur in eo quod trepanum sit periculofum, & sæpe fracturæ a natura possint curari sine trepano, unde si in tali casu trepanum poneretur, medicus exponeret ægrum periculo à remedio sine necessitate, & quia si tamdiu expectet donec mala symptomata oboriantur, adhuc tunc satis tempestivè ponitur. Verum hæc opinio est falsa, & ab omnibus hodie reprobata, nam imprimis trepanum non est tam periculofum, expectare donec mala symptomata oboriantur. Aliqui dixerunt sic quod cum fractura est magna & evidens suspicio internæ læsionis quam citissimè sit trepanandum, non expectatis malis accidentibus, sed cum fractura est parva, & dubium est, an subtus aliqua læsio sit, quod in tali dubio casu non sit temerè trepanum ponendum, sed tam diu expectandum, donec mala symptomata appareant, ne nimis temerè statim trepanando antequam ejus necessitas appareat æger frustra afficiatur periculo mortis à trepano. Verum hæc etiam sententia falsa est, contrà quam sunt Avicenna, Polus Hali, & Neticorici multi, nam in dubio casu illud faciendum, à quo est minus periculum, sed est minus periculum à trepano si ponatur frustra, quam à nimis longa expectatione, si trepanum sit requisitum, etenim ex nimis longa expectatione cerebrum & meninges corrumpantur, unde certa mors: ergo in dubio casu præstat adhuc trepanum mox ponere non expectando mala symptomata, quàm ea expectare: Ego sic distinguo, ubi certa suspicio fracturam esse magnam cum depressione, aut sanguine extravento, aut pariscidis membranam pungentibus statim perforandum est, sine malorum accidentium expectatione, & hoc est in confesso, verum in casu dubio dico sic: Si fractura putetur esse in tali loco, in quo prima divisio cutis est periculosa, vel ipsa etiam perforatio periculosissima, uti in temporibus, tunc non esse tentandum cutis incurrationem, aut trepanum ponendum priusquam mala symptomata incipiant apparere, nam tempora incidere est nimis periculofum, & idè in casu dubio non est tantum periculum aggrediendum sed expectandum donec manifesta necessitas appareat, tunc enim satis tempestivè perforari potest. Quod si contingat propter diuturniorem expectationem ægros sic aliquando mori posse, nihil refert, præstat enim ægros mori ab ægritudine; quæ non potuit certo per artem cognosci, quam per nostram temeritatem, ejusmodi periculoso remedio sine certa utentem necessitate: At in casu dubio perforatio commodo loco fieri potest, præstat semper citò trepanare, quàm tam diu expectare, donec prava accidentia appareant, cum cerebrum & meninges graviter affici & corrumpi inceperunt, nam etsi trepanum periculum habeat, illud tamen longè minus est, quàm illud quod provenit à nimis

diu, seu donec mala symptomata appareant expectando, & idè minus potius, quàm majus periculum est subeundum. Sed quaeritur quando sic diutissimè esse trepanandum, quodnam illud tempus est, & quot diebus prænitur, an semper tunc intra triduum, uti Hippoc. determinavit est perforandum. Dico quod illud tempus non possit certis diebus prædefiniri, quia mala accidentia non eodem tempore in omnibus incipiunt apparere, sed prout complexionis sunt, in aliis serius apparentur, quia itaque illa sunt præveniendæ citius trepanandum est, in quibus putantur, citius oboritura; in quibus verò serius, etiam serius paulò licet expectare. Verum tamen ubi trepanum necessarium putatur, & nihil obest ibi, semper præstat illud citius, quàm serius poni, potest ergo poni intra diem tertium, sed etiam in die quarto & quinto, & sexto, verum in æstate non oportet expectare, ultra diem 7. aut ad summum 14. Ratio est, quia trepanum ponitur, ut aliquid subtus putrescens auferatur, at illa putredo, illo tempore inducitur, ergo intra illud tempus est aperiendum, etenim post illos dies cerebrum & meninges incipiunt corrumpi, unde etiam si tunc postea trepanum poneretur, tunc aut vix, aut non juvaret. Accedit quod intra illud tempus vires ægri adhuc sint fortes, & trepanum valeant tolerare, post verò debiles, virtutis autem debilitas remedia prohibet, itaque intra illos dies poni potest, ultra non. Quod autem non sit necessarium semper illud poni intra triduum ex eo probo, quia vix intra triduum poni potest, primo enim die tantum sanguini sistendo plerumque incumbitur. Secundo fractura ferè primum exploratur, ergo non nisi illo latius cutis dividi potest, ergo tertio potest tantum trepanum fieri, sæpe & hæmorrhogia adhuc impedit, ne illo fieri possit. Imò aliqui dicunt, non licet interea triduum trepanare, sed esse semper diutius expectandum scil. usque ad quintum & sextum, & non posse commodum ullum provenire, ex eo quod tam citò trepanetur, sed tantum nocumentum. Rationem dant, quia plerumque trepanum ponitur, ut sanguis supra meningem lapsus evacuetur, at ille sanguis non potest evacuari tertio die, quia tunc est coagulatus in grumum, & non est educibilis, sanguis enim per trepanum, non educitur, sub forma sanguinis sed saniei, ergo non est educibilis priusquam in saniem est conversus, in saniem autem adhuc non est conversus tertio die, ergo, &c. Interim verò si citius trepanum ponatur quam prodesse possit, jam tum oberit, quia variet meningem, tanto diutius aeris frigiditati sine necessitate expositum esse, imò facit ut calor internus exhalando difficiliter sanguinem in saniem convertere queat, nihilominus tamen tenendum est, quod citius, èd semper esse melius trepanum ponere, præcipuè si suspicio sit, frustula aliqua meningi infixæ esse, tunc enim vel primo die si fieri posset esset trepanandum. Sed quaeret aliquis, si ergo medicus est, præscriptos supra dies primum vocaretur, & adessent omnia pessima accidentia, & æger videretur desperatus, an non liceret tunc adhuc trepanum ponere: Respondeo cum tempestiva vocetur, nunquam debet ultra illos dies expectare, at si verius sit vocatus in re



desperatissima adhuc præstat in remedio ancipite quam nullo, sed cum prævia periculi prædictione, ne remedia infameantur, quæ plurimis saluti inere.

Foramen quod in cranium fit interdum majus, interdum minus: ad hoc debet Chirurgus diversa trepana habere facere foramen magnum periculosius est, quam parvum, ideo non debet magnum fieri sine necessitate, nam imprimis magnum ponitur, cum majori periculo, & in multa spatii comprehensione est major convexitas, quo autem est major convexitas, eo difficilius potest cranium perforari æqualiter, & facilius meninx ab aliquo latere trepani tangitur & laceratur. Secundo in magna spatii comprehensione comprehenditur major inæqualitas ossis cranii, ex eâ autem fit perforatio periculosa, nam cum ab una parte trepani cranium est valde tenue, ab aliâ valde crassum, difficulter potest crassior perforari, quin periculum sit, ut oppositâ tenuiore jam perforata meninx tangatur. Tertio quo majus est foramen plus cerebrum & meninx aeris injuriæ expolita est, & plus ex eo calor cerebri potest exhalare. Quarto quo plus cranii exscinditur, plus adhuc potest à naturâ separatur, & si foramen in fine sit maximum, & si cerebrum majore sic operculi naturalis parte privetur, ex quo postea sit debilius, & ad singulas aeris mutationes facilius alteratur. Quinto quo foramen est majus, eo facilius meninx tumida & inflammata in illud attollitur, ac ipsum claudit, minus vero cum foramen est parvum, è contrâ verò si foramen valde parvum sit, poterit aliquando evenire, quod squammæ quæ subtus secesserunt, per ipsum exire non possint, præstat ergo plerumque mediocriter esse, cum trepanum poni debet loco quo est exortus nervorum, aut quo cerebrum gravius offensus, foramen minus est faciendum, ut in temporibus & occipite: cum autem trepanum ponitur loco imo & demisso, non est etiam magnum foramen faciendum, nam ibi cerebri molli substantia gravitate sua in illud incumberet & clauderetur, cum autem trepanum poni debet, ubi cranium est valde crassum foramen debet fieri majus, cum fractura est magna, & pars ossis aliqua secessit, quæ per foramen extrahi debet, tum magnum debet fieri foramen, ut illa per illud transire possit. Sciendam tamen quod non omnia ossa fracta sint extrahenda sed aliqua, & si depressa sint, elevatorio sunt attollenda & consolidanda, nec tam longè, quam fractura currit ossa extrahenda sunt, sed tantum callo unienda, illa autem extrahenda sunt, quæ meningis aut cerebrum pungunt. Verum cum tantum sanies sub cranio collecta est evacuanda parvum foramen sufficit. Quod attinet ad numerum foraminum, si fracturæ plures numero diversæ sint, in cranio plura etiam foramina facere utrinque scilicet unum. Si periculum est refonitus, si à latere quo ictus fuit receptus, cutis divisio facta fuerit, & ibi non inveniat cranium fractum in opposito itidem dividenda est, ut etiam an ibi fractum sit cognoscatur, quandoque pus aut sanies, aut quodcunque noxium quid trepano evacuari intenditur, ab utraque parte collectum esse putatur, utrinque est perforandum, quia quod ab uno latere continetur, non potest evacuari per foramen in opposi-

to latere factum, propterea quod meninx intermedia tanquam septum ad suturam coronalem pendens impedit comeatum, seu transitum ab uno latere ad alterum. *Thom. Fienus de præcip. Ari. Chirurg. Controversiis.*

#### Pro Cranio depresso.

In pueris sapissime hujusmodi depressiones cranii abralis crinibus, & apposita cucurbita, naribusque & ore clausis quendam modum Ambr. Paræus Chirurgus æterna laude dignissimus, lib. 10. cap. 5. recte docuit, in naturalem situm reponui: vel emplastrum aliquod tenaciter adherescens, veluti ex pice, resina, colophonia, & gummi elemi in medio ossis depressi applicetur, vel hoc quod tenacius adheret.

℞. Farinæ tritici, ʒj. ichthyocoll. in aq. beton. & saliv. dissolut. ʒβ. pulv. malthæ. thur. tarin. volatilis, sang. dracon. gypsi. an. ʒiβ. M. coque in aq. beton. & salivæ, ad justam consistentiam applicetur calide, quamprimum undique agglutinatum & exsiccatum fuerit emplastrum vi auferatur, sic enim attracta cute & pericranio, cranium depressum simul elevabitur: id si prima vice minus successerit, ab opere tamen minime desistendum, sed de novo novum emplastrum applicandum, & ut antea vi auferendum. Sit emplastrum ejus magnitudinis, ut tantum tertiam circiter partem impressionis cranii cooperiat, sic enim in ablatione minor erit dolor, & facilius impressum cranium elevabitur. Si hunc dolor aliquis oritur, locus innungendus est oleo rosæ. aut myrtino, & de vitell. ovor. habeat præterea emplastrum in medio funiculum, quo à Chirurgo apprehendi possit. Dum vero Chirurgus emplastrum auferit, os & nares infantis claudenda sunt, sic inflato cerebro propter retentionem in ipso spirituum, cranium unpressum facilius in situm naturalem relevabitur. *Gul. Fabric. Hildanus obs. 5. cent. 2.*

Puellula quædam 18. menses nata per scalas decidit, & capite illiso in lapidem, facta fuit cranii depressio inter suturam sagittalem & coronalem magnitudinis dimidiæ nucis: ad quam vocatus, raso capillitio, parti cucurbitulam admovi sine scarificatione, & consequenter iterum admovi cum scarificatione. Postea applicui cataplasma ex fursure, pane, cum rosæ & vino compositum, idque iteravi bis in die, per quinque vel sex dies, iterando cucurbitulæ applicationem sine scarificatione, ante singulas admonitiones Cataplasmatibus; deinde per quatuor aut quinque dies solum Cataplasma admovendo, tumor à cucurbita excitatus discussus est, & depressio sublata apparuit, atque os ad suum naturalem locum restitutum. *Samuel Fornerius obs. 14.*

In multis Cranii depressio curata est, admota post unam vel alteram phlebotomiam, supra depressionem cucurbitula cum multa flamma; addita interdum incisione, & multis aliquando scarificationibus, & interdum sine illis. *D. Des Grands præz. Obs. 3.*

#### Pro Cranii fractura.

Underimo die morbi cum æger pro deplorato habebatur, cranium ejus successu perforatum fuisse observavi. Historiam huc recensere non gravabor.

Anno 1786. Sexagenarius quidam in bregma sinistrum



sinistrum percussus fuit, cum cranii fractione & depressione cecidit mox in terram, cibum indigestum evomit, & loquelam amisit. Curatio ab initio Barbitorum commissa fuit: quum vero omnia in pejus ruerent vidissent adstantes, *Antonium Saracenum* Medicum longè celeberrimum, & *Johannem Griffonium* Chirurgum peritissimum præceptorem meum fidelissimum in consilium vocarunt. Pervenimus itaque ad ægrum decimo die morbi sub vesperam, ipsumque ardentissima febre laborantem, delirantem, & absque loquela invenimus: vulnus angustum & fractura cranii aderat: verum etiam in angustius positam satis superque nobis palam esset; adstantium tamen petitionibus commoti, facta prius prognosticatione, curationem sic aggressi sumus: injecto enemate & exonerata alvo crines abradimus, totumque caput ol. rosac. & myrtill. inunximus: deinde cutem & pericranium in formam crucis incidimus, craniumque denudavimus, necnon pulvillis ex stupis suavis preparatis & albumini ovi intinctis vulnus implevimus. Sequenti die ossiculis nonnullis quæ à prima tabula separata erant, extractis, cranium perforavimus, & quod asperum in osse instrumento lenticulari, levigavimus. Postea pannum sericeum melle rosaceo parumque ol. rosac. (propter dolorem immensum) tinctum cerebro imposuimus, totum vero vulnus sequenti digestivo implevimus.

℞. Terebinth. lotz in aq. beton. & sal. ʒj. ol. rosac. ʒi ʒ. ol. de vitell. ovor. ʒij. Gummi elemi lentissimo igne cum supradictis oleis dissoluti & percolati ʒj. croci-pulveris. ʒj. vitell. ovor. num. 2. M. f. Unguentum quo imposito vulnere, Emplastrum Basiliconis applicuimus; totumque caput & collum ol. rosac. & myrtill. inunximus. Eo die iterum Clysterem injecimus, optimamque victus rationem præscripsimus; atque ista methodo per dies aliquot processimus. Interim pus per factum foramen effluxit, & febris reliquaque symptomata paulatim remiserunt: sedato dolore & inflammatione, melli rosato quod membranæ imponendum erat, guttulam unam aut alteram aquæ vitæ admiscuimus, & vulnere sequens mundificativum imposuimus.

℞. Pulv. rad. caryophyllat. angelic. aristol. rot. irid. fl. an. ʒj. Extract. sal. beton. an. ʒij. Gummi elemi in oleo rosac. dissolut. ʒij. M. & F. cum melle ros. q. s. parumque aq. vitæ unguentum in mortario. Tandem sequens Emplastrum applicuimus.

℞. Emplastr. de beton. ʒiv. Gummi elemi in oleo rosac. dissolut. ʒj. Pulv. ros. odorifer. myrtill. an. ʒj. Mastich. cal. aromat. angelic. caryophyllat. an. ʒi ʒ. cum q. s. ol. rosac. parumque ceræ fiat emplastrum.

Interim dum vulnus hac methodo curavimus, singulis aut alternis diebus, alvo spontè non respondente, clysteres injecimus: per intervalla quoque syrupo rosac. solut. comp. cum rheo. agar. & senna, manna item, & cassia corpus leniter expurgavimus. Sic divino favore, magna cum admiratione adstantium sanitati restitutus fuit. *Guill. Fabrii. Hildanus obs. 4. cent. 4.*

Emplastrum de betonica cujus hic fit mentio, describitur in hunc modum à *Foresto. lib. 6. observ. Chirurg. observ. 43.*

℞. Therebinth. resin. pini ceræ novæ. an. ʒi v. Pulv. beton. ʒi ʒ. Mastich. thuris, an. ʒj. Mummix, ʒij. l. massa S. A.

Ante annos 10. vocatus fui a quodam rustico ut ipsius inviserem sororem, quæ vulnus contusum in dextro osse bregmatis, cum fractura & impressione Cranii acceperat. Evomit mox ab initio biliosum humorem, & cibum indigestum; sinistrum latus resolutum est: in dextro autem convulsionem patiebatur, abrasis crinibus, fragmenta aliqua cranii & portiunculam ad instar labæ ex cerebri substantia digitis extraxi, altero die adventit *Sloanus*, qui dilato vulnere denuò extrahit fragmenta quædam ossis, & portiunculam ipsius cerebri, ad nucis avellanæ magnitudinem. Postea aliquoties ipsemet *Sloanus* me præsentem de cerebri substantia detraxit, & tandem convaluit plenissime. *Guil. Fabrii. Hildanus observ. 13. cent. 1.*

*De magna cranii fractura & meningum ruptura sine trepano curata.*

Filiolo *Theodori Baertens*, puello septem annorum graviusculus Baculus obtuso acumine ex alto cecidit in caput pileo tectum; artionitus ac pro mortuo domum delatus est, sanguine ex naribus, & oculis profliente. Ad eum vocatus, sentii magnam in bregmatis regione cranii depressionem & fracturam. Aperta atque detracta cute vidimus ossa ad latitudinem magni nummi ducatonis diffracta, & ad crassitiem pollicis intorsum versus depulsa; imò & ipsam cerebri substantiam inter fissuras nonnullis in locis transeuntem. A bregmate sub cute extendebatur eadem fissura usque ad summitatem nasi, eaque in fronte & prope nasum adeò lata erat, ut calami scriptorii crassitiem admittere potuisset. Chirurgis trepano cranium aperiendum, & diffractæ ossis particula eximenda videbantur: Nobis illud consilium displicuit, quandoquidem exemptis istis particulis nihil erat, quod cerebri substantiam loco suo continere posset, quæ membranæ disruptis, modo per fissuras exituriens conspiciebatur. Vulnere igitur in dicto statu relicto, convenientia fomenta imposta, totique capiti circumjecta fuerunt, alvus laxata, & convenientis victus ratio à nobis præscripta est. Tertia die intumuit frons, hinc cutem paulo supra nasum è regione fissuræ pertundi curavi: è quo vulnuscule per aliquot dies copiosus sanguis cum pure effluxit, sicque æger multum levatus est. Tali modo processimus in curatione per quinque sexve hebdomadas, & sic puer ille, præter nostram & omnium expectationem sanatus est, profunda ista depressione in capite remanente, nullumque in actionibus animalibus incommodum subsequente: duodecimus jam agitur annus, quo bene sanus post dictam curationem vivit. *Joh. Baptist. Lamxveerde in Appendice ad Armatum. Chirurg. Sculteti.*

*De cranii fissura & dura meningis gangrana trepano curata.*

*Ægidius Spryge*, Nauta, mense Aprili anni 1661. in dextro bregmatis osse lapidis icæi graviter vulneratus fuit, cum magna fractura cranii



& depressione. Perforatione trepano facta, ex-minus diffracta ossa ad latitudinem Daleri imperialis. Duram matrem a contusione ista graviter laram invenimus, quæ & ipsa post paucos dies nigricans sponte separata, & eadem latitudine exempta fuit. Postmodum carne, præter expectationem, ex tenui meninge largiter succrescente, vicesque duræ meningis lubeunte, ac sese cum carne ex dyloide orta conjungente, desperatus æger, qui jam cum Charonte de naulo pacisci videbatur, sanatus fuit, etiam nono post curationem anno pancreaticæ vivit. *Idem ibidem.*

*De occulta cranii fissura, morâ trepani minitante Lethum, inopinato restituta.*

*Lambertus Loefsecoot*, Nobilis Bataviensis, circiter 25. annorum, 7. Martii. anni 1637. a generoso, cui infidebat, equo excubus, caput in vicinam trabem illisit. Mox vomuit, & assurgens, vertigineque correptus bis terve rursus concidit. Tandem rursus equum conscendens domum venit, inscius quod ab equo cecidisset, & quasi deperditâ omni memoria, penitus inscius quid sibi contigisset, aut ubi fuisset. Dum pileo contactus fuerat, atque hinc nullum vulnus, nullaque manifesta contusio in capite apparuit, etli gravia symptomata maximam cerebri & cranii læsionem indicarent. Suasi cranii apertionem, sed eam non admiserunt consanguinei, qui curationem soli Chirurgo committendam censuerunt. 15. Martii doloribus capitis acerbissimis ægrum excruciantibus, & simul febre, delirio, validissimisque convulsionibus accedentibus, rursus meum consilium imploratum est, & unice petatum, ut cranium trepano perforarem: quod renui, propter signa lathalia, quæ modò aderant. Post biduum ægro in eodem miserabili statu permanente, & consanguineis obnixè cranii perforationem rogantibus, die 18. Martii facta sectione, carnem in postica bregmatis parte dissolvimus, ac postridiè cranium ibidem perforavimus, idque magna cum molestia, propter deliria & convulsionem intercurrentes: cum autem per cranii foramen nihil effatu dignum efflueret, ferramento nonnihil plano & obtuso per foramen immisso duram meningem depressimus, & sic è capitis latere cum impetû exsiliit multum sanguinis & puris, ægerque sequente nocte à delirio, febre, & convulsionibus omnino liberatus, atque postmodum, præter omnium opinionem, integræ sanitati restitutus est. Cujus exemplo docemur, in curationibus ægrorum interdum (ut inquit *Averrhoës*) monstrari fieri, & maximè desperatos ægros insperato remedio nonnunquam servari: ac proinde non semper derelinquendos esse eos, in quibus deplorata signa omnem salutis spem amputare videntur. *Idem ibidem.*

*Cranii sutura pavore quodam desuncta.*

Animi motus insolitos etiam corpus tangere, atque agitare, propter arctam, quæ illum, & hoc jungit, unionem, palam est: quâ non tantum, quæ ipsis obveniunt, bona, sed & quæ turbantur, mala continuo secum communicant. Quantas autem turbas hi motus dare, quantisque ipsis corporibus xumnas excitare queant,

quamquam vel quotidianæ experientiz invictò constet testimonio, evidentius tamen, opinor, atque lucidius hac observatione, patefcer.

Uxor *Friderici* cujusdam, qui Hortulanus, ac cultos fuit magnificentissimi prædii suburbanii Illustriss. Viduæ *Friderici Henrici* Celliss. quondam *Arausionum* Principis, quod in Hagienli viuitur nemore, usque adeo expavit, furibus nocturnis non procul ipsa infractionem ausis, ut præ nimio, quo corripiebatur terrore, cerebrique ipsius agitatione, & concussione, quam & febris Cephalalgiaque sequebantur, ossa parietalia à se invicem dissilierint. Quam quidem suturarum disjunctionem non, nisi post unum, & alterum demum animadvertit mensem, quamquam illa vel adulti hominis minimum admitteret digitum. Hæc tamen mulier à Chirurgo *du Foix* (vulgò *Lucq.*) priori sanitati, adhibitis fasciis, & ligaturis, restituta fuit.

Sicuti suturarum separatio, cujus modo è citamentio, ab externa causa subito provenerat, & quam minimo temporis intervallo; ita scriptus in *Hibernia* (prout *Arnoldus Boonius de affectibus ommissis cap. 4. pag. mibi 17.* memorat.) capitis ossa evidenti distantia disjunguntur, præsertim quæ coronalis, quamvis & quandoque, quâ sagittalis excurret futura.

Quod tamen lente, atque interna causa, quam exterior vis non præcessit, tam masculis, quam feminis, nec minus robustis, quam tenellis accidit. Hanc suturarum ab invicem separationem gravis, sequitur *Cephalalgia*, quæ ex duræ matris et nio multis membranosis fibris ut plurimum adhaerentis, ac dictâ ossium divulsionem tensæ, atque dilatatz sin ulis oritur. Qui dolor tolli vix potest, nisi conjunctione dictorum ossium, ac in priorem sedem reductione.

Quod quidem imprimis Chirurgi manibus efficitur, quem laborantis caput, si Coronalis disjungatur futura, oportet comprimere, & una manu frontem, altera occiput adducere; si verò sagittalis aperiatur futura, ab utraque parte tempora comprimantur necesse est. Quo facto, requisitis fasciis, quæ dicta ossa suo loco contineantur, obvolvendum caput est. De modis, quibus juncturarum distantia in ossibus capitis firmentur, legatur *Hippocrates de officio Medici.*

*D. Sennerini prax. lib. 1. part. 1. cap. 25. pag. mibi 52.* Etiam nonnihil de hoc mali genere refert, cum dicit internis aliquando causis suturas capitis, quæ alias contiguz sunt, ita disjungi, ut evidens inter eas sit distantia, quod ab humorum copia fieri judicat, quæ distendendo facit, ut futura magno spatio distent, ut docet *P. Agneta lib. 3. c. 7.* nec non *Jacob. Fontanus, qui Prax. lib. D. cap. 3.* exemplum profert juvenis ejusdem, cujus capitis futura tanto disjunctæ erant spatio, quantum quatuor adimplerent digiti.

*F. Fabri. Hildanus centur. 1. observ. 1. pag. 1.* duo etiam adduxit exempla divulsarum suturarum, quarum prima disjunctio è diuturna Hemictania orta erat, quâ durante, ac inflammatione, necnon humorum copia in cerebro urgentibus, futura adeò hiabant, ut se systolen & diastolen cerebri facis distinctè sensisse memoret. Altera autem disjunctio è morbo graviori, ardentique febris, cum dolore capitis acutissimo provenerat.



Quin & Thom. Mercurius Consult. 4. lib. 1. fol. 15. Cephalæ, qua præcipua quædam puella laborabat, mentionem facit, eaque futuram quædam capitis parte disjunctam testatur.

*Sutura capitis*, inquit Joubertus de Cephalalgia cap. 9. pag. mihi 437. inuicem à se invicem separantur, quod ego semel observavi in fronte cujusdam puella, cui natus lateris os alterius superabat altitudinem post pertinacem in infantia capitis dolorem.

Ex inflammatione hoc malum oriri posse asserit. Aëius lib. 6. cap. 25. ut & Hippocrates 7. de morbo popul. Idem affirmat Avicenna sen. 1. trakt. 3. cap. 40.

De futura cap. Lambdoide hiscente in Infante vide sis Miscell. curiosa German. decur. 1. anni 9. observ. 139. fol. 438.

Thom. Bartholinus cent. 5. hist. 92. pag. mihi 173. hujus etiam rei mentionem facit, ut & Fabrici. Hildanus centur. 2. observat. 7. pag. mihi 84. necnon Anthon. de Pozzis Miscell. curios. Med. Phys. Decur. 1. an. 2. observ. 34. de Tribuno quodam narrans non militiæ minus, quam potandi egregiè gnaro: qui cum se aliquando vino annoto plus æquo ingurgitasset, ob sanguinis inflammationem, & inde ortam vasorum cerebri dilatationem, divulsa magno cum cruciatu durâ meningē, nunquam quieverit, nisi cum cranii contiguz extremitates circa coronalem futuram ad pollicis latitudinem essent disjunctæ. Ex hoc tamen malo id percepit commodi (si fas ita dicere) quod nempe postea absque cerebri perturbatione abunde se Liberi patris flore aspergere, ebrizque compotorum turba solus mentis compos superesse posset.

Petr. Marchettus observ. Med. Chirurg. c. 15. pag. mihi 31. mentionem injicit vulneris frontis usque ad Diploen penetrantis, ac gladio inflicti, citra ullam cerebri & membranz labem, omnibus licet symptomatibus vulneris capitis præsentibus, quare ipse postmodum trepano ulus est, subiectam membranam nonnihil inflammata inveniens, cui apta procuravit remedia. Cum vero vulnerati, ac 14. die mortui caput aperiretur, constitit à vulnere nec membranam, nec cerebrum quidquam incommodi sensisse, imò ipsam vit eam tabulam mansisse illasam: licet futura Lambdoideæ tam latè esset aperta, ut minimum intramitteret digitum, dum saniei non multum inter ipsas futuras, ac supra duram matrem lateret. Haud absimile exemplum describit Job.

Baptist. à Lamzveerde observ. 8. pag. mihi 232.

Denique cranii futuræ etiam disjunguntur in infantibus, qui Hydrocephalo laborant. Cornelius Stalpari. observat. rarior. cent. 1.

#### Cranii dedolatio.

Inter multifaria capitis vulnera meritò numerandam existimo ipsius cranii dedolationem, sive amputationem, cujus rei exemplum ipsemet cum fratre meo P. M. Job. Stalpartio van der Wiel (qui tempore belli inter Federati Belgii proceres, Regemque Gallia gessi, vulneratis militibus cum Chirurgo Cornelio van der Hoog medebatur) hic Hagensi in Nosocomio in milite vidi, cui ægro ossis parietalis pars, nummi, quem Imperialem vocant, instar, cum utraque tabula, inferiore tamen superiori magnitudine cedente, prope verticem amputata erat, quam partem pollicis

aliquid, ac membrana carnosâ etiamnum affixam tenebat. Quamprimum autem dictum os detractum fuit, pelle sua adherente caput iterum contactum est, non expectatis, pluribus vulnerati cranii extremitatibus separationibus: Atque ita dictum vulnus quam brevissimotempore omnino percuratum est.

Jobus Mekeranus cap. 1. observ. Medic. Chirurg. pag. 4. Meminit incisuræ ossis parietalis sinistri ad sagittalis futuræ latus acinace factæ, quâ a prima separatam fuerit tabula ossis segmentum ejus figuræ, quam ille ibidem exhibet de incatam. Scultetus in Armament. Chirurgico observat. 17. fol. mihi 214. primæ tabule Dedolationem narrat, ejus nummi, quem modo nominavi, magnitudinis, inque ipsum penetrantem medullium. Haud absimile quid P. Marchettus pag. mihi 10. memorat. Illius. utem casus quo utraque cranii tabula uno, eodemque ictu sublata, vulneratus vivus permansit, unum ego vel alterum tantum proferte exemplum habeo. Refert Philp. Jac. Sachs. Miscell. Med. Phys. curios. Germ. decur. 1. an. 1. observ. 119. fol. 195. de Polono quodam benè poto, quidum digladiaretur, in sinistro capitis summo latere per futuram coronalem usque ad frontem, tale reportavit vulnus, ut non solum cutis cum carne duos transversos digitos lata, uno ulnæ quadrante longa, sed & magna cranii pars penitus dissecaretur, quo facto latus semianimis in terra aliquantisper prostratus jacuit, mox dein resiliens, manu caput tangens, partem cranii fere abscissam, & parumper cute adhuc hærentem detrahere voluit, sed in hoc furore frustum saltem cranii arripuit, & in terram projecit. Chirurgus postea accedens reliquam carnosam portionem vulnere denudâ adaptavit, & licet varia prava symptomata dein supervenerint, integræ sanitati nihilominus restitutus fuit.

Legitur etiam apud Cabrolum observ. 29. & 34. pag. 18. & 25. Simile quid, quam historiam ob mirum rei eventum ipsi adscribam Cabrolis verbis: *ne alii*, inquit, exemplo meo sapere discant, quod mihi olim Juveni contigit, dum Gailiac degere, paucis enarrabo. Ad divitem quendam rusticum curandum vocatus sum, qui maximo gladii impetu ictus fuerat, ita ut magna pars brachii ablata esset, cumque eo portio quadam tam dura, quam pia mater, necnon substantia ipsius cerebri. Adspicere primo obstupui, deinde ita egi, ut ejus curatio aliis committeretur: hic quoque vulnere inspecto, nullo modo curari posse cogitans, patientem absque auxilio deserui, donec rucicola quidam advenit qui ardenti veru laridum transfixit, quod tu vas aquâ plenum destillabat, ex coque sæpius abluto, ita ut nixem candore superaret, medicamentum confectis, quo linamenta omnia, turundas & lanas carpias insuccabat, cujus præsidio paucis integram valetudinem intra duos menses adeptus est, posteaque diutissime vixit, hujus rei gnarus, miserie semper succurrendum, nec unquam desperandum esse didici.

Nescius equidem non sum, Jobum Mekeranum dicto cap. 1. suarum observ. fol. 7. & 8. referre Nobilis cujusdam caput Tartari gladio ita fuisse vulneratum, ut frustum ossis ab ejus cranio cum pelle, ac capillitio avulsam esset, ipsumque quam latissime hiaret cranium, necnon Chirurgus, ut factum foramen clauderet, haud dissimilem ossis partem e cæsi canis capite sumptam



hianti cranio super imponeret. Quod os postquam cum aliis ossibus conjunctum, & capitis cute contextum esset, dictum Nobilem priorem valetudinem recuperasse ait, hæc autem ipse scriptor, quam sibi a Theologo narrata, videtur ridere, nec immerito, meo quidem iudicio. *Idem ibidem.*

### Depressio Cranii.

Cum filiolus G. P. civis Hagienfis quatuor natus annos hic Hagæ in vicis luderet, casu factis intelici vexillum quoddam, quod è sublimi fenestra spectandum propendebat, obverso in illius latus sinistrum ossis frontis Minubrii acumine incidit, unde non tantum vulnus, sed & ossis depressio facta est. Vulnus tamen hoc satis feliciter Chirurgus sanavit, quanquam quondam vulnerato, nunc senescenti, etiannum cavitas in illo osse superstit tanta, ut adulti hominis pollicis extremam intromittat partem.

Cranii depressio haud aliter se habet, quam flamma, aut plumbea vasa, quæ casu, vel concussione intus cedunt, deprimunturque. Hic autem animadvertendum est, licet ossis calvariarum tabula hoc fracturæ genere non perspicitur à se invicem recedat, fieri tamen in ipsa diploe totius separationem, quæ primæ tabulæ impressione contunditur, friaturque. Dicitur autem hæc fracturæ species Græcis *θλασμα*, sive *θλάσις*, infantulis sæpius ac tenellis contingens, test. *Galenus lib. 2. de morb. causis cap. ult. classe 3. p. mibi 9.* Quoniam in his multo facilius fieri potest, ut pote quorum ossa tenuia etiannum, atque infirma sunt valde. Neque enim fieri potest, quin id, quod contunditur, cedat retro, intusque; quod verò ita cedit, tenue sit, nec omnino durum, requiritur.

Tales cranii depressiones in pueris, facile absque instrumentis Chirurgicis curantur.

De considerabili ac magna ossis frontis infantis depressione supra os temporis ex lapidis jactu orta, pessimisque symptomatibus subsequentibus, absque ullis tamen mali reliquis ope fomentum sanata, agit *Lyserus pag. 279. Item P. Marchettus pag. 18. Riverius observ. p. 315. Sculteti Armament. Chirurg. pag. 109. Rossius p. 121. necnon Smerius pag. 563.*

Ossa capitis depressa, inquit, *Parvus lib. 9. cap. 5.* aliquando per se resiliunt resurguntque pristinae æqualitati restituta, quod aliquando puerorum, seminarum molliorum, humidiorum, ac pituitosarum, ossibus contingit, quod si ipsa per se non resiliant, admovenda est cucurbitula cum magna flamma, & imperandum ægro, ut ore, naribusque compressis, spiritum magnâ contentione sursum exprimat, &c.

In adultioribus hujusmodi Depressiones (cute præsertim integrâ) rarissimè cernuntur. Quibus autem contingunt iis, aliorum intuitu, tenue admodum est cranium, quod si tale non sit, haud dubiè, si in tabula superiore non annuadvertitur fissura, infima tabula magis erit divisa, quam suprema, quoniam docente *Hippocrate*, illa in medio sui subsidere nequit. Id verò quibus contigit vitis, absque crani terebratione vix sanantur nisi forte in exteriori ossis frontis prominentia depressio foret, cujus exemplum cent. nostræ secundæ observatione quat-

tâ daturi sumus. De plurimis jam adultis, quibus nec cutis, nec exterior cranii tabula, sed interior fracta fuit, narrat *Tulpius fol. mibi 4. Sculteti Armament. fol. 212. Smerius pag. 570. Marcellus Donatus pag. 560.*

De cranii depressionibus in adultis, absque manifesta fractura, cutisve solutione, quæ fomentationibus, ac emplastris sanata fuerit, scribunt corpus de fractura cranii, *Marcellus Donatus pag. 531. lib. 5. cap. 1. Lac. Riverius observ. pag. 327. Scultetus Armament. Chirurg. fol. 3. & 140.* Quætere equidem hic liceat, utrum cranium depressum loco suo restitueretur necesse sit?

G. Fabric. Hildanus observ. cent. 2. observ. 3. & cent. 3. observ. 21. ut & epist. 90. fol. 1023. id ipsum asserit, adducens exemplum pueri honestæ familiæ decem jam annos nati, subtiliorisque ingenii, qui caput cadendo læserat, unde cranii depressio prope futuram *Lamboiden* orta erat: Quod vero gravia non adessent accidentia, parvi fecere parentes hunc casum, ita ut ille puer postea memoriæ dono non tantum privatus, sed & pedetentim tantâ ingenii obrutus fuerit stupiditate, ut denique ineptus fuerit, qui quidquam addideret.

Verum *Wurzius part. 2. cap. 6.* ait, non tanti faciendam Chirurgi cranii depressionem, præstare judicans rem ipsam Naturæ perficiendam relinquere, parumque referte, utrum cranium nonnihil maneat depressum, necne, quoniam non semper, nec necessario inde impeditur cerebri motus lato satis spatio duram matrem inter, ac cranium superilite. Meo quidem iudicio Chirurgi operâ supercederi potest, si in infantibus collisiones cranii reperiuntur, non multum introcedentes, quas nec fissura nec fractura, aliæve comitantur accidentia graviora, ita tamen ut, detonsis pilis, læsum locum fomentis adjuvemus, modum invenient Chirurgi Tyrones apud *Julium Cæsarem Aranium ad calcem comment. in lib. Hipp. de vulneribus capitis.*

Quando autem sive in infantibus, sive in adultis, depressio, sine exteriori fissura deprehenditur, ac gravia sese manifestant accidentia, omnino perforationem requirerem. Quo pacto infantum depressionibus eundem sit obviam, vide *Lyserum pag. 278. Paræum, Fabric. Hildanum cent. 2. observ. 5. fol. 83. Sculteti Armament. fol. 110.* Cranium in pueris sub illis tegumentis, & citrà divisionem depressum, cucurbita communi in suum situm naturalem reducunt quidam,

Quomodo verò adultorum sananda sint depressiones, vide *Job Mekerum pag. 18. Sculteti Armament. Chirurg. fol. 8. 112. & 193. 197. 100. 108.* Item *Riverium p. 316. 354. necnon Fabric. Hildanum cent. 2. observ. 3. & 4. fol. 78. &c.*

Perficitur hæc cura ut plurimum cerebrum quadam *Tripluide* dicta, quâ pars depressa elevatur, cavendo tamen ne hæc ambas cranii laminas perforet, & duram matrem pungat. *Idem ibidem.*

### Fissura Cranii.

Petrus ab Evvick, eques Capitanei Coigners, vir 34. annorum cum 1. Februarii in edibus vice Capitanei Joannis Couper detecto capite cum vice-Capitaneo super arcem colloqueretur, famulus quidam magnum lignum, pon-



ponderis decem vel duodecim librarum, per tenebram altiore in detectum caput dicti equitis imprudenter deiecit. Ipse ab ictu momento in terram prolapsus obinuit, ac p[ro]b[abiliter] mortuo in vicinum stabulum delatus fuit, ubi per hor[um] spatium taliter apolecticus jacuit, ita ut illum mortuum esse omnes judicarent. Tandem aliquantulum ad se rediit, sed tota lita die & nocte sequenti deliravit. Chirurgus ad ipsum vocatus, cum leve tantum & superficialium vulnus adesse animadverteret, nullum periculum adesse credidit, ac se zgrum tribus quatuorve diebus facile sanaturum promisit. Dominus Couper tamen huic Chirurgo non satis fidens, cum nuper infelicem minoris vulneris eventum in Thoma Greverer vidisset, tertia die me rogavit ut zgrum inviserem. Juveni ipsum sine magnis doloribus, sanæ mentis, cum levi ac contemnendo vulnere in syncipite, vix autem penetrante: oculi in circuitu livecebant. Propter pauca symptomata Chirurgus & atlantes totum negotium flocci fecerunt. Ego autem totâ nutoria a principio diligentius examinata, certissime affirmavi cranium non posse non esse fractum, seu fissum, & summo opere necessarium fore dixi, ut illud quam primum trepano perforaretur, ut hoc pacto sanguis extravasatus subtus latens extrahi posset, neque expectandum esse donec alia gravia symptomata subsequerentur, utpote quibus apparentibus operatio hæc nimis serò institueretur: Ægre, sed tandem tamen in meam sententiam itum fuit. Itaque alio statim clythere subductâ, eadem illâ vesp[er]â in sinistro bregmatis osse, ubi vulnus erat, incisio satis magna facta est ad formam litteræ T & cranium triangulariter denudatum est. Tunc ob hæmorrhagiam nihil videre potuimus, at posttridie invenimus duas in cranio fissuras satis magnas, & ab unico latere particulam longit[er] adius semidigiti, parum depressam, quæ particula à reliquo osse quasi in circulo undequaque soluta & disrupta erat. In vicina parte h[er]ma cranium trepano perforavimus, hincque sanguinis circiter unc. s. (qui inter cranium & duram meningem ex disruptis à casu venulis effluerat, ibique delituerat) effluxit: quo deterio, parvum lintecolum melle rosaceo imbutum meningi impositum, ac vulnus forniceus carpiâ sicca oppletum, & emplastrum de crotonca contectum fuit. 6. Februarii adhuc aliquid sanguinis effluxit, sequentibus autem diebus nihil amplius. Interea alvus medicamento leniente exhibitio leviter commota fuit. Porro vulnus usque ad 12. Februarii eodem modo tradævimus, & capitum ex herbis aliisque cephalicis confutum toti capiti imposuimus: postea hunc pulverem cum melle rosaceo mixtum meningi imponere cœpimus.

℞: sanguinis draconis, thuris, aloës, myrrhæ, ana scrup. j. pollinis taminæ hordei scrup. j. f. nac pulvis subtilis.

18. Februarii ab interiore cranii parte caro succrescere coepit. 1. Martii, meninx carne contexta fuit. 16. Martii, Squamula à superiore denudati cranii osse separata est. Deinde caro exterior undique succrescens cranium brevi contextit; atque in principio Aprilis xger perfecte sanatus foras prodit. *Isbrand. de Diemerbr. in Observ. & Curat. Medicis.*

*Cranii ex contusione fissura ipsas suturas  
pervadens.*

Quam male usum Partium comprehendant ij, qui duras eum solummodo in unum hominem esse datas asserunt, ne, uno cranii osse fisso, alterum quoque findatur, norunt ij, qui contrarium citius nobiscum observarunt. Anno 1670. moles illa lignea, qua palos humo infigunt (Belgice *een Heyblok*) in cuiusdam viri bregma devolvebatur, unde in terram prolapsus, omnique sensu interno privatus, sanguineque auribus effluente, brevi post animam Deo reddidit. Oblatum mihi fuit, mali causam investigandi ergo, cadaver. Cranium denudato, os bregmaticum (si bene memini) sinistrum a parte superiore ad inferiorem ex toto fissum reperi: Quae fissura progressum fecit per futuram squamosam, totum os petrosam, & os occipitis, ad magnum ejusdem ossis foramen; futuris ad fissuræ cursum sustinendum nil valentibus. *Freder. Russch. Observ. Anatom. Chirurg. centuria.*

CRINONES ET COME-  
DONES:

**D**E iis cū sub nomine vermiculorum capillarum, Dissertationem admodum accuratam scripserit Doctiss. Geōrg. Hieron. Velschius, placet huc illam integram adducere. Sic autem ille.

§. 1. Cùm sectundò prioris exercitationis capite draconiculan seu Venam Medinensem ab aliis morbis dicereremus, ut eo magis elucesceret, quantum ab illo infantium affectu differat; quem vulgò pilarem vocant, & invicem confundunt, polliciti sumus, singulari exercitatione, priori subjungenda, de illo nos dicturos esse. Hoc igitur nunc agamus. A nomine incipimus; nam, teste Aristotele, *ἡ ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τοῦ ἀδιδίου ἀπὸ τοῦ ἰσθμίου ὀρίσματος*. Ex Medicis antiquioribus nemo, & e recentioribus paucissimi affectus hujus meminere. Vulgus Germanicè appellat: *Miresser, oder Muffass*: Notici, scribente sic Viero in tr. German. de Varis vocant: *Die darre Maden*: Unde fortasse corrupta vox illa Mich. Papæ Rochliciensis tract. German. de pellend: vetm. & au. venenatis. pag. 191. *Darm Maden*: Gall. *Tarmes*: malleus enim: *Darre Maden*: Nam *Darre*: Idem quod macies aut tabes corporis. Aliis: *Die Zehrentee Wurme*: dicuntur. Latinus Vieri paraphrastes apud Henric. Smetium III. Miscell. Med. Germanicum nomen versionì ineptè intrudens: *Miresserrens*: reposuit, non levi sanè crimine, & quod Orbilius aliquis vel in puero objurgaret: Comedones aut vermes comedentes quorundam sententia rectius di erentur. Nec desunt etiam qui vermiculos consumptores appellant. Cujus nomenclaturæ rationem optimè edidit Johan. Schenkius V. observ. 188. quòd alimentum infantium, quos infestant, abripiant sive absument; adeoque maciem inducant. Quæ cùm ad extremum jam deducta est, etiam aliud nomen affectui parere solet, de quò Theod. Corbeius aut verius Jo. Magirus II. Pathol. scd. VII. c. V. his verbis: *lis affecti tandem citra anore-*



xiam vermiculis humorem alimentarium depopulantibus in eam atrophiam & maciem incidunt, ut cuncta deperdita carne vix ossibus hæreant, cum tanta artuum citubatione, ut ne quidem pedibus inniti possint, & tunc: *Den alten Vatter* nominant. Henricus Varenius disp. 21. Nosolog. Herm. & Gal. §. XI V. Crinones vocat, eosque duplices facit: priores locis maxime articulis vicinioribus generari, ac tumorem cum dolore mordicante & lituras subingras, scorbuticis non dissimiles; excitare atque interdum in ulcera Chironia terminentur, atque tum demum à suis vocari, *der Haarrizum*: posteriores vero absque ullo tumore cum dolore tamen, lassitudine, imbecillitate virium, & insigni atrophia infestis esse, quo mox §. XV. etiam refert, infantilem illam (sic enim vocat) cum pfora conjunctam atrophiam, doloribus lancinantibus, vespertinis & nocturnis potissimum horis tenellis corpusculis mirum in modum molestanti, atque à suis *die Bernegrand*. nominatam. Ambrosius Parvus VII. Chir. XXI. *abscessus*, inquit, *rarum genus in membris revoco, id Crinones, (credo à crinibus) nostrates Galli nominant: pueros præsertim divexas ac quasi spinularum aculeis compungeretur dorsum. huc illuc se jactant, quietis impatientes: ab exiguis quidem, qui vix acicula longitudinem equeant, sed crassius & spissius pilis oritur id malum.* Nos tamen Parvum putamus Crinones scripsisse, non *Crinones*, quam voculam fortè typographus depravavit. Crinones etiam & dracunculos a qualicumque similitudine vocabat Balth. Timæus V. observ. cas. 13. Galli enim *Crinons* appellant, à crinibus hanc dubie, qui isdem *les Cri* & dicuntur, & cum vermiculis illis magnam habent similitudinem. Imò si verum fiteri oporteat, & ipsi vermes capillares sunt ulceribus pedum scotentibus innati, *קרינן* Hebræorum, *vitium pedum quod à vermibus fit*: & *קרינן* vermis pedum, in Lex. Rabbin. Talmud. Buxtorfii. Quales à Joachimo Jauraviensi Lixivio fraxineo, immaceratis speciebus fecalibus, & decocto Corticum quercus novellæ, ac denique inspersione pulveris extormentilla aristoloch. rot. bolo Armen. & myrrha curatas recensuimus inter observationes Hieron. Reusneri CXLV. ad quos & diapysmate non v. lde absimili feliciter utebatur Wolsig. Theodericus Cneringius vir nobilis reique Medicæ peritissimus in Mss. nostris. Cum Crinonibus etiam Persicis apud Jo. Eusebium Nierembergium dracunculis, & varis confundit Val. Andr. Mollenbroëcius tr. de Varis sive arthrit. Vaga scorbut. c. 1. Jo. Schenkus l. c. *pilos infantes infestantes*: Item: *Vermiculos intercutaneos* vocat, additque quibusdam morbum sive adfectum pilarem dici. Græci *vermiculi* & *vermiculi* nominassent dubio procul, si morbum cognovissent. Non unum enim adfectum ita appellarunt, ubi Latini interpretes semper morbum pilarem, seu malum pilare reddiderunt: Sic enim primò ciliorum & palpebrarum triplicem adfectum nuncupant, *καλαρυς* videl. *αδωδινος*. Tum mictum pilorum, cujus nos supra mentionem fecimus. Fracturæ item cranii speciem quandam, quæ, cum tenuissima sit, sensum omnem effugit, ideoque sæpè letalis deprehenditur. Denique & mammarum dolorem, à pilo, ut quidam suspiciantur, ex Aristot. VII. hist. an. XI. in potu

fortè haulto, excitatum, seu potius à Vermiculo pilum referente, quæ Guil. Rondeletii sententia erat. Rarus quoque adfectus, trichiasis aurium A. M. Venusto part. II. Consil. XXVI. memorata, in opere à Josepho Lautenbacino collecto, filamentis ex pituita, à longa surditate, lternutatione ejecis: Et Lingua, pilis sat longis in eadem ex-rescentibus apud Amatum Lut. Cent. 6. cur. 65. *καλαρυς* & *αδωδινος* Francisco Joeli Pr. Med. N. 11. 12. §. XI. quos vet. omnibus Gr. Arab. & Latin. incognitos putabat, non secus ac dracunculi vet. olim nostris omnibus ignoti & inditi er. nt; antequam navigationes in utraque orbis partem excolerentur. Verme in dorso Galice *Masclon*, dicit Petio Moreno Cent. 1. observ. 1. quos capillaribus in facie, totoque corpore p. uigmatis haur inepte comparabat, isdem ne. pe cu. a festis Nabonenibus Meyfanderii, ac quibus priori exercitatione. Alech impio tamē in hist. plant. Rovilliana, Halimus verus, Galicè, *Herbe du Masclon*, dicitur, cujus usus Tolosatis frequenter. sinus ex vino albo ad tormina colique dolores, adientibus Jo. Bauhino in hist. plant. & Do. amico Chabreo eundem compendio class. 8. Quamvis & Coli cruciatus haur raro à vermiculis oriri notissimum existat. At verò J. C. Claudinus V. empir. rational. lect. 1. cap. 4. & 5. utrumque adlectum distinguebat, non planè quidem ab re, sed ipsa experientia edoctus, sapius complicitum, & maximam adtinentiam vicissim habere fatebatur, nimirum ut priori exercitatione haur raro dracunculus obicurrissimè motus ostendimus, unde quibusdam omnino nullo prædicti videbantur, ita etiam vermiculi capillares interdum pilos tantum immobiles, non animalcula referre solent. Hercules Saxoniz utique observatione & Gregori Horlhi part. 1. Epist. sect. 5. quam Guil. Fabricius Hildanus Cent. 5. observ. 1. repetit, puelli capite totoque corpore pilosi nati, sponte cadentibus pilis, nunquam deinde vermiculis laborant, quibus Langue ulla destituti per omneque sunt odnoxii. Georgius Cuthærus in append. libri de morb. infant. à Leouello Victorio Fa. centino ed. cap. 12. *Exstus*, ait, *in puerulis subcutanea quedam agitantia viva, lumbricorum formam præ se ferentia. Dracontia vulgari appellatione nominata.* Magirus l. c. *dracunculos* vocat. Et Georgius Cuthærus disputationem suam inauguralem Basilicæ habitam, cujus ex Jo. Nic. deupani Medicina Theorica supra meminimus, de dracunculis inscripsit: Verum quantopere err. verit, dum venam Medinensem cum adlectu hoc infantium comudit, statim seq. §. 11. demonstrabimus. Nam quod Gasp. Hofmannus 111. Instit. 124. §. XIV. alterum genus dracontii apud Paulum Æginetam existimare: & doctissimus Jo. Ant. van der Linden Meletem. Med. lib. 1. Patholog pag. 21. minorem dracunculum subcutaneum, in jori in venis similem, & acarum antiquorum subdubitari, nullo sat gravi argumento probari potest. Clarissimi tamen Sennerti sententiâ 11 l. r. part. 1. cap. 24. hæc quoque appellatio tolerari queat. Sic enim censet: *Nam Crinones nominant, alii dracunculos, ob similitudinem cum dracunculis, qui in Egypto & Ind. sunt familiares.* Ipse tamen, ut prioribus monuimus, dubio pro-



procul sparguntur obscuritatem & confusionem iugens, vermes dorsi appellare maluit, quod præcipue in dorso infantium pascantur. Nec aliter Claudius V. Empir. rational. sect. 1. c. 4. similitudinem aliquam admittebat, ipse tamen *intercitantos puerorum lumbricos* vocabat: & Claudius Deodatus X. Panthei Hygiastici c. 41. *vermes sub cute*. Quod si omnino dicere liceat, quod res est, similitudo horum vermium cum dracunculis vet. aut plane nulla est, aut certe adeo exigua, ut merito contemni queat. Cum igitur morbus sit antiquioribus ignotus, nemo nos, speramus, reprehendet, quia vermiculos capillares infantium vocavimus. Hoc enim nomine nili fallimur, naturam adfectus huius sat bene exprimi existimamus, de qua mox plura differenda erunt.

§. 11. Quamquam verò cuius ex antecedentibus intelligere prout sit, vermiculos capillares infantium a vena Medinensi Ebninx, sive draconis Græcorum plurimum discrepare, ut tamen nemo hac de re ultra dubitare possit, p. uelissimis ostendere non pigebit. Primo igitur dracunculos Orientalibus plagis peculiare esse diximus, hos autem vermiculos plerique septentrionalibus magis familiares adscribunt. Deinde adfectiones vena Medinensis supra cap. 3. propositæ vermiculis istis nullo modo conveniunt. Illam enim corpus crassissimum rubicundum aut album, figuræ teretis, insignis longitudinis, & varios in circulos sive anfractus circumflexum docuimus: hos autem pili spissioris & crassioris forma nigricantibus capitulis, parvos omnino, breves & vix aciculæ longitudinem æquant, nec in ullos gyros circumvolutos omnes consentiunt. Præterea symptomata dracunculorum à vermiculis his valde aliena sunt: Non enim pustula, non dolor, non tumor, non exulceratio hic locum habet, sed in balneo vermiculi medicamenti prolecti per poros cutis capita tantum exserunt, toti verò vix unquam prodisse vii sunt: E contrario inquietudo, vigilæ, compunctio, & tabes adsunt, quæ mala in vena Medinensi nemo observavit. Porro dracunculi ritè curati nunquam sunt periculosi, vermiculi autem isti ob tabem, quam inducunt, sæpius exitiales observati sunt. Tandem & curatio utriusque morbi diversissima est, de qua partim supra jam vidimus, partim postea dispiciemus. At Petrus Monavius Epist. 25. ad Hieron. Mercurialem apud Laur. Scholzum ægitudine bovinæ potius, quam Venæ Medinensi similem conjiciebat, quod tamen magis, ac illud admitti posse, inspecta priori Exerc. nostra cap. 2. facile colligitur. V. C. Hieron. Reusnerus in disput. quadam Medica 1582. Bafilæ habita, quam Schenkius adduxit, vermiculos hos capillares infantium cum Varis Vespaliæ & Batavici videtur confudisse: Cum infantes, æiens, circa anorexiā in tantam incidant ægriam, ut omni deperdita carne vix ossibus sustineant, obstruuntur vasorum adesse certum. Vespaliæ & Duhinari Danicæ proximæ videtur hic citari, qui ipsam Varum nominant, nostri den Mieser, Ribbuchen, den lauffenden und zehrenden Wurm, ab actione naturalis lesa ducta symptomatis appellatione. Henricus Varenius disp. 21. thes. 27. huic non obscure consentit, quando inter alia Crinonum suorum signa, etiam hoc empiricis

probatum adfert: *Tare lumbricum dolenti loco impositum plantarum pedum suppositum max. emori, contubescere, vel corrugari animadvertunt*. Hoc enim inter certissima varorum signa plerique numerant, quamvis haut parum dubium nobis videatur. Ab illis autem jam olim Vicrus vermiculos capillares infantium sive Comedones suos distinctos pronuntiavit, quod neque proprietate morbi, neque curandi ratione, utpote conveniant. Nos quoque de variis pluribus diximus cum cap. 1. eisdem a dracunculis jure sejungeremus. Præterea & aliud quoddam vermium genus est, quod vulgus Germanicæ, den Genzworm, vocat, (ac si avatum Latine dixeris) infantes æque ac capillares illi in perniciosam tabem conjiciens, a quibus tamen omnino discerni debet. Ajunt autem cognosci, si umbilico gubius fluvialis imponatur, horisque 24. elapsis piliculus adrosus aut ad spinas usque consumptus inveniatur. Quo viso deinde quidam pulverem Savinæ & vitri Veneti melle mixtum juglandis putamini inditum umbilico adponunt, ut eo degustato vermis emoriatur. Hæc omnia tamen plerique olim cum fabulas ridebant. At Jo. Georgius Brenggerus Medicus valde indutius epist. ad Philippum Hechtletterum periscripta, quam hic in fine observ. suarum edidit, testatur vermem illum in nobili puella sibi conspectum, eumque in vena umbilicali latitare putat, semipedalem appellans, figuræ teretis latiusculæ, pallidi coloris, & pellicula non tenui ac lævi, sed duriuscula seu subcrustacea contextum. Viderunt etiam Platerus lib. 1. Pr. cap. 15. Frid. Olevianus ap. Hieron. Reusnerum observ. 97. & Rupertus Sultzbergerus apud Sennertum 3. Pr. part. 10. c. 4. Matthæus Millerus Senior Profess. in Academ. Tubing. disp. singulari 162. habita, cujus etiam meminit Rudolphus Camerarius Cent. memorab. Med. 12. §. XCIV. A quo fortasse nonnisi magnitudine differt alius quidam & ipse infantes periculosè tabefaciens, quem Zacutus I. Prax. admir. observ. 124. à Lusitanis suis, Omaso nominari, atque a se Castorei scriptulo in lacte dissoluto ter exhibito aliquoties per alvum proturbatum refert: vermis scil. ut ipsi nominare placuit, obesus, illique similis, qui in corrupto caseo occultantur.

§. 111. Quid igitur, qualesve sint vermiculi isti capillares infantium pauci accurate describunt. Felix Platerus, Medicus exteroquin experientissimus: In brachiis, inquit, cruribus, siccis, interdum & lateribus, vermes se in adfessu quodam exserere, quos dracunculos vocant, German. Mieser, scribunt: quorum utique nobis incognitorum descriptionem aliis concedimus. Parus I. supra c. ad Gallorum suorum mentem eos pro pilis spissioribus habuisse videtur. Nam quando etiam abscessus rarum genus nominat, nequaquam audiendus est, aut potius de alio quodam adfectu intelligendus, cum quo fortasse vermiculos confudit, eumque sequutus Samuel Haseurefferus lib. 1. de cut. adfect. cap. 11. quamvis laxissimam abscessuum nomenclaturam, etiam apud Hippocratem non ignoremus. Utrique verò quod iudicium de pilis attinet, assentiuntur Saxonia lib. de plic. Polon. cap. 41. & Greg. Horstius part. 1. epist. sect. 5. & apud Fabricium Hildan. Cent. 5. observ. 51. At



Henricus Varenius ut §. I. dicebamus, infantilem atrophiam cum pfora conjunctam appellavit. Reliqui omnes veros vivosque vermes esse statuunt, quorum sententiæ accedimus. Non tamen inefficaci hoc argumento, ut quidam illorum, permoti, quod alimentum infantium absument, eosque in maciem deducant: Possent enim eodem & cæteri opinionem suam de pilis firmare, ac alimentum corpusculo infantis debitum in liorum generationem & nutritionem impendi nobis objicere: cum præsertim non pauci hodiè reperiuntur, qui pilos non e fuliginibus & excrementis generari, sed vel ipso sanguine, aut aliis humoribus alimentariis nutiri contendunt, quam etiam sententiam ab aliis suppresso suo nomine evulgatam olim querebatur Greg. Nymmanus tr. de apoplex. c. 10. nostris tamen temporibus detectis lymphæ ductibus & circulatione laticis cum sanguine adfertâ, multò facilius intelligitur. Amplissimus Roslincius lib. 15. Meth. Consult. cons. 3. excrementa tantum cutis viscosa, in poris condensata existimat. Nos, ut vermiculos veros vivosque credamus, motu illorum præcipuè adducimur, qui omnium consensu tunc inprimis manifestus est, & quasi subitaneus cernitur, cum in balneo infantes melle aliisque dulcibus, & vermibus gratissimis, oblinuntur: Ut & recursum eorundem in corpus, & sub cutem, nisi illico abradantur sive eximantur, qui sanè neque pilis, neque etiam excrementis densatis, porosque obstruentibus, convenire potest. Ideoque talem descriptionem edimus: *Vermiculi capitales infantium sunt vermes tenues & exigui, pilis crassioribus quodammodo similes, sub cute in artubus & præcipuè dorso ex humoribus vitiosis, proprioque seminio, caloris sive naturalis, sive etiam putredinem comitantis opere generati, infantes inprimis prius, vigiliis, inquietudine, & corporis extenuatione infestantes.*

§. IV. Causa, ut Philosophi vocant, efficiens primaria, horum Vermiculorum est ipsa forma sive anima in seminio suo latens, non calor, aut putredo, ut plerique opinantur. Hæc enim rectius in generatione illorum instrumenti tantum vicem gerere statuimus. De seminiis autem animalculorum, quæ sponte solent nasci, rem omnem accuratè confecit, & exposuit Clar. Sennertus Hypomnem. Physic. §. cap. 8. quem consulant, qui dubitare non verentur. Quidquid enim de vi illorum & formis latentibus, antequam exferantur, in contrarium alii excogitarint, egregio illo Theodoretî dicto epit. de divin. decret. lib. 5. facillimè everti potest, si modò, quod ille de temperatura corporis, anima quibusdam Medica constituta, de istis spontaneorum formis accipiantur, naturali sua cognitione, non minus, quam sensu & ratione animæ nobiliores, instructis: *Oportebat, enim aiebat, ipsos considerare, quod etiam qui lyra fecit, si non rectè aptam & instructam lyra fuerit, suam non ostendit scientiam.* Sic formæ scilicet animæque omnes nonnisi loco, tempore & instrumentis commodis præsentibus operantur. Parum sanè ab isthac sententiâ abluunt, quæ plerique de sanguine menstruo ad mentem Arabum, sive meconio Aristotelis memorarunt, inter quos non postremus Jo. Colle III. Cosmit. Med. pag. 247. infanti recens nato, dum Umbilicus

secatur, sanguinem copiosum effluere permittebat, quod isthac præservatione paucissimis rarissimisque deinde variolis, aut etiam nullis corripitur observavit. Neque id abnuens, Jo. Zechius de puer. tuend. valetud. §. IX. ad Aentii mentem retrah. 1. serm. 4. cap. 3. per alvum potius expellendum docebat, melle cocto, vinoque modico diluto exhibitio: (Id enim butyro præferendum arbitrabatur) quod etiam de Coloistro suo ut minus propriè vocabatur, Ezechielis nomine Petrus à Castro puncto; pag. 21. testabatur. Sic autem vocabatur *μακρόν* Aristot. (*pauerculum* non adeò bene Theodorus Gaza reddiderat, quia id Diosc. IV. 65. trochiscos ex succo capitum soliorumque expresso, non ipsum papaver, significat.) 7. histor. anim. 10. *αφίμα* & *χρῆμα αιμαίνε* & *σφοδρὰ μέλαν*, & *πύλιν*, *μυρ* & *τάπη* & *μακρόν*. Excrementum colore sanguineum, & valde nigricans aut piccum, interdum & lacteum, quod Plinius 18. 4. *Sordes infantium alvo editas.* Jac. Dalechampius propemodum ridiculè, Gallorum suorum consuetudine, Syrupum infantium appellavit. *κόποι τῶν πρώτων* Auctor 4. de morb. inter Hippocratis scripta, vocabat, primum puerorum iterum, cum quo permulti etiam rotundos latosque lumbricos excreverint, & *σφοδρὰ* & *μακρόν* *αφίμα* *αἵμα* *τῶν πρώτων* *τῶν πρώτων*. At Petrus à Castro subtilius distinguens aliud lacteum, ut Aristot. à Chyli reliquiis, aliud feculentum à sanguinis fecibus nominabat, quod Roderico à Castro part. 2. lib. 5. de morb. mul. cap. 29. Hispanis à colore ferrugineo iccirco: *ferrado*: dictum monebat, sæpius vermiculis & ascaridibus refertum, quales in caseo nascuntur, in dissectione abortuum visum, quemadmodum & variolas à miasmate vermiculante subortas microscopice observationes docuerunt, quarum præsidio pathologiam suam animatam sive vivam mortis imaginem & putredinem animatam instruere quondam cogitabant Augustus Hauptmannus & Christianus Langius Medici Lipsienses celeberrimi, si per fata licuisset, quamquam ex postumis alterutrius scriptis egregii quidpiam proditurum nec dum spes omnis decollarit. At *Colustra*, lac novum in mammis Lucilio & Laberio Mimographo apud Nonium Marcellum de propr. sermon. cap. 2. §. CXVII. quod cum ferossius existat, utrum infantibus præbendum sit? pluribus disquirebant Illustris Veslingius epist. ad Georg. de Medicis Brixensem. observ. 28. lacte utique, quod chylum ipsum, non sanguinem ex chylo genitum & denuo dealbatum, curiosis nostræ ætatis experimentis constat, non secus ac in sanguine seminia vermiculorum & vermiculi ipsi sæpiissime conspecti sunt. Reliquiæ sanguinis menstrualis, qui erat in hora imprægnationis Ebnstini IV. sect. 1. tract. 4. cap. 6. *lpy* in homine Jauhario, quod in brutorum generibus *lpy* primum recens natorum excrementum, antequam quidquam ederint, emissum: plurimum sanè à Coloistro differens, quod 1827 lac primum à foetu edito mulgeri solitum.

§. V. Cum ergo forma quævis propriam habeat materiam, in qua & subsistit, & commoda occasione oblata corpus operationibus suis aptum ex eadem sibi ipsa exstruit: iccirco & proprio seminio etiam capillares infantium vermiculos



culos produci in nostra descriptione diximus. Cum vero illa valde sæpe sit exigua, ipsius Aristorelis ingenua confessio, cujus 5. hist. animal. 19. hæc verba sunt: *αἱ δὲ τὴν ἐκ τῶν ἀνθρώπων μικροὶ* (minus sanè admiratione digna quam illud Plinii 17. 10. *Cupresso semina tam parva, ut vix conspici possint, non omitiendo natura miraculo, è tam parvo gigni arbores*), imo iudicio Sennerti Hypomnem. l. c. & Liceti . de spont. viv. orit. 46. animula illorum etiam in atomis latere possit, quas uterque ideò atomos seminales appellat, propterea & vitiosos humores tanquam materiam latis copiosam, generationi eorum idoneam, meritò addidimus. Pituitam imprimis sub curè & inter poros contentam, ac transpiratione prohibita, putrescentem nominabat J. C. Claudinus Empir. rat. l. c. Neque dissentiebat vir subtilissimi ingenii Joan. Chrysostomus Magnenus in Democrito suo rediivo, sive disp. 2. de atomis c. 4. propos. 35. vermium scilicet & lumbricorum minima terræ ordinis (id est nec atomos simplices, nec secundarias) cum alimentis adsumpta vim concoctricem effugisse, atque quod debiliior esset, non ita potuisse edomari, quin servarent seminales spiritus, formamque parciales. Quod supra nos etiam de seminis dracunculorum c. 7. adseruimus. Nec aliter explicari debet Sennerti opinio 4. Pr. tr. de morb. infant. part. 2. c. 32. de materia viscosa venis capillaribus conclusa, & propter transpirationem prohibitam in vermium genus mutata, quando quid de spontaneo animantium ortu in humano corpore severius censuerit, satis ex aliis ejusdem scriptis planum est. Nec enim aptitudo materix ad vermium generationem, quam requirebat, commodius, ac de seminis propriis exponi potest: quod de ichoribus aliisque serosis humoribus è quibus cridones sive dracunculi, tinea, Vari, vermiculi morbillorum, pustularum, & scabiei cyrones, acari, aliique oriuntur, pariter adfirmabat Augustus Hauptmannus epilt. præliminari ad Petr. Joan. Fabr. de viva mortis imag. c. 19. quamvis semina illa in elementis contenta, sola putrefactione, corruptione, & influxu cœlesti generari minus doctè minusque verè opinatus sit, primariam scil. efficiendi facultatem instrumentis præponere committens. Multò sanè candidius veriusque vir Nobilissimus Franciscus Redus neque ex animalium demortuorum carnibus vermes nasci curiosissimis experimentis circa generationem infectorum exploravit, nisi ab aliis animalibus vivis semina tuerint apportata. p. 51. obs. de viper. Sed hæc quidem materia proxima dicitur. Remota enim dubio procul eadem est, quæ aliorum lumbricorum, quorum frequentissimus in pueris ac infantibus proventus observatur: de qua cum aliis in locis, & ab aliis abunde actum fuerit, nil opus est multa hæc adferre. Hoc vero in transitu moneamus: ridiculum & valde scabiosum nobis videri, quod Henric. Varenium 5. 21. de crinonibus suis scribere non puduit: *In hisce numerantur, si scabiosis pedibus tibialia lanæ superinducantur, huiusmodi auleusculi barentia postmodum animentur.* Quamvis non ignoremus Franc. Bonamicum etiam ex iisdem filis pediculos nasci aliquando credidisse. Ita haut rarò quidam nubem pro

Junone lubenter amplexantur. Similitudo enim, quam vermiculi cum pilis Lineis obtinent, memorata Joeli 10. Pr. Med. sect. 3. §. 11. causam tamen non arguit, nec generationis modum evincit. Quin etiam scabiei mentio, satis arguit, non alios hos vermiculos esse posse, quam quales in ulceribus fordidis generantur, & in scabie microscopiis observantur. et si vel linea vel coriacea semoralia induantur. Nec filum illud sericum in supetilio mulieris Toniensis, a vulneris futura relictum, atque deinceps continua vegetatione, quamvis abscissum, sæpius excresecens, de quo libellum singularem à Petro Duncan Medico Montalbaniensi pererudito conscriptum, nec tamen editum, memorat Petrus Borellus 1. obs. 10. ad animalia sponte nascentia, nec etiam ad plantas ejusmodi pertinet, quas hominum corporibus insertas augeri & crescere posse, exemplo Rocci Martini in Hispania, cujus pectori spina pruni silvestris infixæ radices egisse & germinalle. ostendit Petrus Servius diss. de ung. arm. p. 51. & contra Liceti dubitationes tr. de Lithosphoro c. 51. satis tueretur Peirescii testimonium in §. de vit. ejusd. apud Gassendum, & qui cum ipso surculos communicavit, nobisque etiam Romæ sincere adfirmavit *sericum Multituli.* Eques Cassianus a Puteo, cujus virtutem & eruditionem omni majoris fortunæ apparatu adiuventem, avito stemmate splendidissimam, nemo satis pro dignitate laudare unquam valuit. Sed neque ipsa serici ulla vegetatio fingi debuit, ut quod artificij manu netum atque contortum filum forma naturali propria vegetante omni omnino destitutum, à natura aliter produci & continuari non potuit, ac membranosi aut nervosi alicujus corporis accretione quale interdum fidibus non absimile etiam sine ulla serici præsentia densatione atque coagulatione laticis nervosi nutriticii quandoque progenerat, ut prioris Exerc. c. 2. de setis Narbonensibus dicebamus.

§. 6. Causas Georgius Cunelius in disp. sua de dracunculis, id est, vermiculis infantium capillaribus, recte quidem internas & externas constituit, sed quas rimari atque ex. minare oportet pretium exillimamus. Externas §. 10. quatuor proponit: *Conceptionem fœtus fluentibus mensibus; Obstetricum & nutricum in sordibus ablucendis extergendisque negligentiam: Lintheorum, quibus infans involvitur impuritatem aut etiam humiditatem, si scilicet non suis succata, aut etiam non fumo aëri & radiis Lunaribus exposita fuerint: & denique victum impurum.* Internas verò §. 12. quinque enumerat: *Vitiosam corporis statim ab ipso ortu constitutionem: Humores vitiosos & corruptos ad partes atendas derivatos: imò & probos sed in tertio collisione depravatos: Ipsarum musculosarum partium substantiam corruptam: Et excrementa tertie collisionis benigniora, quæ aut expultricis imbecillitate è corpore non pellantur, aut ob parorum cutis constrictionem diffusi & transpirare nequeant.* Nos quasdam ex his omnino reprobamus, reliquas autem quas admittimus, ad causas jam commemoratas reducemus. Quod ergo primum conceptionem fluentium menstruorum tempore concernit, cum id à nemine, quod quisquam sciat, observatum sit, nullaquæ ratione vel in speciem probabili nitatur, non injuria rejicimus.



Nec enim credimus ab hominibus legitime in matrimonio viventibus quidquam tale patrari. Certè adfectum infantibus satis frequentem tradunt. Et notatu digna est Arabum phrasis, de muliere, quæ menstruorum tempore concepit, apud auctorem Oceani Arabici כהון אלפוח עפלה tanquam *per incuriam & balucinationem* id factum sit, aut *errore insigni ac vecordia*, quam כהון significat. Olim sanè Hebræi Dei mandato capitis penas dabant, quicunque scientes volentes cum menstruata concubissent Levit. 20. 18. cæteri, qui inscii, aut per incuriam fecissent, septendio unmundi, lotionibus & expiationibus opus habebant, Levit. 15. 23. Unde 7. *unmundicie parer*, (ut Talmudici vocant,) deducebat Majemonides præfat. in Seder, Tahoroth. טבעה אבוב אלפוח, quos gonorrhœicis, & leprosis ex Magistro-  
rum suorum mente æquiparabat. Hæc talia vero quamvis ad legis Cerimonias pertinuerint, ex intimis tamen naturæ arcibus deprompta, ad sanitatem simul corporum, & posterorum curam, quam maxime spectasse, nemo dubitare debet. De negligentia vero nutricum & obstetricum nemo dubitabit. Harum enim incuria sæpissimè, imò & malitia, malè est infantibus, Sordes igitur sive in utero sive postea in cunis contractæ minus diligenter abstergæ gemina ratione nocere possunt: aut enim per poros ipsum corpus subeunt, aut meatus cutis obstruunt & excrementorum transpirationem impediunt. Quò referenda erat etiam cunabulorum impuritas. Humiditas enim eorundem, si absque sordibus iola fuerit, potius alios adfectus producit. Radios autem lunares, quemadmodum mala plurima in corpore humano, vitiosis maxime succis referto, excitare certum est, commotis videlicet & liquatis humoribus, ita cur eosdem in linteo metuere debeamus, nondum intelligimus, & debuisset Cune-  
lius nobis explicare. Exoleta quippe illa opinio, neque naturæ consona, quam Manichæis de Luna fuisse Augustinus epist. 119. ad Januarium commemorat, beatus à castris illorum impiis transfuga, *repleti eam, sicut navis, sordibus principum tenebrarum, & fugitivam Dei partem. In herbas quoque salivam venenatam despumare, illas præcipue, quæ Magia destinata, gentilibus quibusdam credidit.* Hadrianus Turnebus 8. advers. 26. ostendit. Nam ceteroquin verè Ptolemaeus 1. Tetrabibl. f. quadrip. Lunæ vim in corporeis rebus efficacissimam propter terram vicinam pronuntiabat, & humorum evaporationem, *αἷμα τῶν ἀνθρώπων ὁ αἰὼν τῆς σελήνης ἀναρπάζει*, quam terræ atmospheram hodie appellant lunari contiguam, cujus virtute mirificè commoveretur. Et huic sanè multò aptius conveniēt, quam quod Alemanem Poetam Plutarchus Sympos. 3. probl. ult. *ἐπὶ τῇ αἰθρᾷ ἡ γυναικὶς ἐκείνης* constituit, *rorem aeris & Lunæ sobolem*: verius enim ex aqua, aut terraquo globo vapores sunt à Lunæ radiis elevati, quo sensu & illa accipienda quæ l. c. problem. 10. adserbat *αἷμα ὑπερβαίνει τὴν ἐκείνης*, *ἡ ἀρετὴ τῆς σελήνης τὴν ἀρετὴν τῆς γυναικὸς*. *Humorem a Luna diffusum aggravare corpora*: Ideoque nutrices cavere jubebat ne infantes sibi commissos Lunæ ostendant, ne corpuscula eorum humoris plena, viridum ad putat lignorum convellantur, & per-

vertantur. Præterea vitius, quem impurum vocat, pravus potius dicendus, talis nempe, qui vitiosos humores vermium notissimam materiem progignat. Inter internas causas non valde placet nativā illa ab utero constitutio. Nullo enim fundamento huc trahitur: Et qui hæc talia nobis obtundunt, quid quæso agunt aliud, quam quod ignorantiam fateantur? dumque se aliquid dixisse putant, nihil tamen dixerint? Certè Fernelius 6. pathol. 12. cum inter calculi causas insitam renum arenosam calculosamque constitutionem nominasset, dici nequit, quam diversis studiis voces illæ à Medicis exceptæ sint! Theodorus Baronius 1. de oper. menjendi tripl. lxf. 18. & Gasp. Hofmannus 3. Instit. Med. 129. mirè eas exagitarunt. Et tamen Fernelius de hereditario adfectu loquebatur, qualem vermicularem istum esse nemo adfirmabit. Humores vitiosos non malè quidem duplices Cune-  
lius noster fecit, aut enim sua natura tales sunt, aut ex corruptis alimentariis geniti. At partes musculosas adeo corrumpi, ut vermiculi illi inde nascantur, vehementer est absurdum, quemadmodum quæ de excrementis sequuntur, ad humores vitiosos, atque etiam sordes reduci debuerunt. Cæterum Varenius §. 20. cum causam dracontiorum materiam viscidiorē & malignam nominasset, de qua nos supra egimus, subjungit Crinones suos ex ichoribus humorum pro vario temperamento variis omnibus tamen malignitate inbutis generari. Quod sanè non videtur esse verosimile. Nam pituita & humores viscidi omnium generi aptiores censentur. Malignitas vero absque ulla necessitate fingitur: Nisi, ut supra monuimus, de variis potius, quam vermiculis capillaribus loquutus sit: attamen & hos cum variis & crinonibus confudit, uti ex §. 15. clarissimè apparet.

§. 7. Subiectum ut vocant, in quo vermiculi capillares frequentissimè conspiciuntur; ætatis ratione præcipue consideratur, atque ex ipsa appellatione nostra satis percipitur: Sunt enim pueri & infantes, sicut in iisdem lumbrici quoque reliqui sæpissimè nasci solent. At pars adfecta & generalius & specialius considerari potest. Generalius quidem, crura, brachia, & imprimis dorium sive totum, sive intercapillum tantum, ut Cussnero placuit, ab omnibus nominatur. Specialius vero sunt partes illorum membrorum, subcutaneæ & maxime musculosæ, de quibus omnes omnino consentiunt. Nec tamen cute semper exclusa, per cujus poros exeunt: nam & in istis microscopii subsidio vermiculos observavit Petrus Borellus: ut mirum profectò sit viros quosdam doctissimos negare voluisse, quos tamen etiam in solidissimis corporibus, ut auro, hydrargyri penetratione, Alphonsus Borellus de renum struct. ed. Joan. Henrico Paullino, & singulari dissertatione V. C. Erasmus Bartholinus luculentè adseruerunt.

§. 8. At formam externam alii aliam describunt. Nos pilis crassioribus quodammodo similes, tenues & exiguos plerorumque sententia vocavimus. Cl. Senertius etiam cinericios & nigricantes. Phil. Hechletterus Brenggero in epist. respondens, eosdem in liberis suis nec fere omnibus observatos illos pilorum radicibus comparavit, quas vulgus in achoribus:



*Volben*: vocat. Cunei. & Reufner. ascaridum figuram ipsis tribuunt: Magirus autem & Schenckius illius vermiculis similes aiunt, qui putrescentibus caseis innascuntur: quod tamen idem fuerit, si Gualtheri Bruelii sententia admittatur, ut qui inter utrosque parum discriminis agnoscit, eumque, ut videtur, sequutus J. C. Claudinus §. Empir. rat. sect. 1. cap. 4. De capitibus autem quæ in balneo exferere dicuntur, dubitanti propior Joan. Nic. Stupanus Med. theor. semiot. cap. 4. disp. 8. §. 173. de seipso sic loquebatur: *Ego incidi aliquando in huiusmodi abrasionem pueri, sed capita vermium prominula nulla potui videre.* Verum cur ea non videntur, plurimæ causæ fingi poterant, unde tamen nemo concludet, capita nunquam exferi, nec una hirundo, ut proverbium est, ver facit. Andr. Dudithius, Orator Cæsareus, vir ipse doctissimus, & doctorum omnium amantissimus, in liberis suis non solum conspexit vermiculorum capita, sed etiam in epistola ad Venceslaum Raphanum Med. Oppaviensem, egregie descripsit ap. L. Scholziū ep. 27. *Humeros, inquiens, & brachiola inunximus farina aceto permixta. Vix peracta unctio & abluta statim emebant ex cute diversis locis tubercula quadam pusilla; ut papavera, coloris cinericii (qua ab illis vermium capita esse dicuntur) castanæ cultello abradebantur; nisi id opus fieret, recondebantur iterum & intra cutem se recipiebant, hi quoque vermiculi, siue quovis alio nomine vocentur, primo multi se proferbant, postea pauciores, postrema unctio prorsus nulli. Remina summis harum vermiculorum capitellis nigricantia aliqua quasi puncta inesse adseverabant: que tamen ego etsi penè cum ipso lynce certare possim, nunquam videre potui. Visum mihi est tota illa res propè eadem specie aut certe non dissimilis sordibus illis, que poris impacta in angulis præsertim narium exterioribus digitis exprimi solent: duritie sunt p.ullo solidiore.* Hinc igitur clarissimum apparet Dudithium capita vidisse, licet puncta nigricantia non conspexerit. Possunt enim hæc, more aliorum accidentium, abesse aut adesse, ut tamen ipsi rei nihil hinc accedat aut decedat.

§. 9. Signa Diagnostica præcipue suppeditant symptomata illa, quorum descriptione nostra mentionem fecimus. Inprimis atrophie & tabes, citra anæmiæ aut alium adfectum manifestum adiligens, imò interdum, in grandioribus maxime, cum insigni voracitate conjuncta. Inquietudo item pulsus celeriore reddens, non sine febriculæ suspitione, quam *adynamia* plerumque producere consuevit ephemeram non tantum brevem, sed plurimum etiam dierum, & in putridam, ut vocant, transuentem. Ubi enim vermiculi, Schenckio dicente, *concrevantur & accrescunt, viva carne pedicularum instar abstinentes; alimentarium humorem, qui tenellis corpusculis alendo esse debet, absorbunt, ex quo in præsentaneam maciem & tabem transiunt.* Tumorem quidem & suppurationem addit Franc. Joel 1. sæpius c. sed id dracunculis verr. potius quam his vermiculis convenire satis manifestum apparet. Quamvis Illustris quoque Rollincius l. supra cap. puero illi, cui consulebatur, curatione jam peracta, tumorem in scapula enatum commemoravit. Hoc enim ut complicatione facile fieri potuit, ita ad morbi naturam propriam non pertinebat. Ap-

petitum tamen dejectum; & urinas imminuentem adducit Hafenrefferus l. supra c. quod in quibusdam fortassis experientia responderit: non semper; nec in omnibus animadversum. Corbeius seu potius Magirus; etiam alvi constipationem; & vermiculorum excretionem tam per alvum, quam per urinam adjungit. Verum si modo id aliquando observaverit, quod fieri potuisse non inticiamus, non tamen iccirco semper animadverti concluditur, adeoque nec inter signa pathognomonica locum habere potest. Imprimis cum excretio per membra ab adfectis partibus tam remota; intestinorum, aut renum, aut vesicæ potius læsionem aliquam merito significare crederetur.

§. 10. Prognostica paucissima trademus. Primum enim adfectui non admodum periculosus est. si debito modo & tempore curatio instituitur; Deinde: propter vigilas tamen & corporis extenuationem interdum letalis deprehensus est. Cunctius §. 14. addit, infante n, cui hic morbus congenitus sit, ultra septimum mensem vitam non producere: quæ de re experientia consulenda, sicut & de altera illa; quando Cuscheri sententiam sequutus curatione non adhibita noxiam suppurationem induci scribit: Neutra sane est vero similis. Nam de tabe exitiali non amovendum; quæ ipse Cunctius filiolam suam se amissile refert. Hieronymus Montanus de morb. infant. tandem & epilepsiam magna ex parte letiteram accedere adfirmat quam ille ab excremento fuliginoso per corpora nervosa à dorso, (aut verius per lymphæ ductus cum succo nutritio) ad cerebrum delato præcipue excitari putat. Quod valde probabile videtur cum etiam a pedibus remotissimis, imò vel eorundem unico digito epilepsia oborta legatur; & alias quoque infantes huic adfectui valde sint obnoxii. Quò nomine in corde etiam tremorem & palpitationem interdum excitare posse Hafenrefferus l. de cut. adfect. cap. 11. recte advertit: non secus ac alios vermes sæpiissime fecisse observatum. Neque spernendum quod obstruktionem meatuum, in hepate maxime, leucophlegmatum quoque inducere idem advertat: percolatione nimirum; & depuratione sanguinis impedita, cui sane non ultimum minus quam generationi in corde tribuendum videtur. Adficiente Rollincio l. c. & maciem inprimis à cordis hepatisque consensu deducente: Nec sane ab re inter Chronicos hunc adfectum refert, magnosque morbos, cum ratione actionis læsæ, tam naturalis scilicet facultatis, quam animalis, tum ratione recessus à naturali statu, à quo plurimum deflectat, & ratione eventus, quia haut raro letalis observetur. Quibus addamus nos, etiam ratione *adynamia* quæ omne vermium genus cordi infestum est, & illud ex accidente respectu spatii, quod ferè universum corpus habet.

§. 11. Indicationes huic adfectui percurando hæc fuerint præcipue. Primum vigilæ, si urgeant, mitigandæ: Nam diuturnæ corpus vehementer infirmare atque extenuare solent. Deinde vermiculi ipsi cum inter illos morbos referantur, quos vulgò in numero excedente appellant, omnino sui ablationem postulant. Hac autem absoluta denique tabes sive macies relicta removenda. Quæ omnia cum triplex ille medendi



foliis, vulgò notissimus, suppeditet: Chirurgia scil. pharmacia & Dieta. Nos ordine videbimus.

§. 12. Quod ergo Chirurgiam attinet, hanc primo loco recentemus ideo, quod apud vulgus terè sola in hoc morbo admittatur. Solent enim mulierculæ Cunelio narrantes §. 4. posthabitis Medicis plerumque tonsores tantum ad curationem accersere aut etiam ipsamets, quæ conferre putant, suo arbitratu, suisque manibus moliri. Omne verò artificium in cutis abrasione collocant, quam in Laconico inuncto prius infantis corpiculo, novacula adnota instituunt & Schenkius optimè sic describit: *Mulier ad hypicausta & sudatoria infantes deducunt, musculosas adjectas partes blande primum indurata manu perfricant, post etiam melle perungunt. Hac arte ubi prolelli fuerint plurimum, tunc Chirurgus imperat, ut novacula exteriorum capitula abradat & demetat, atque hac vulgi non tam recepta quam compendiosa vermiculos huiusmodi necandi ratio:* Probata etiam Felici Wirzio append. de morb. infant. quæ postremæ ejusdem Chirurg. editioni, curante Joan. Rudolfo Wirzio, accessit: quæ tamen fere tota empirica est, & rationi adversatur: Cum enim capita tantum non totos sermes auferat, adeoque maiorem partem in corpore relinquat, non videtur indicationi suæ satisfacere, utut cæteroquin poros cutis aperiat ac dilatet monente Joan. Dan. Horstio Manuduct. ad Medic. part. 1. cap. 1. §. 2. Cui accedit & hoc, quod portiones in corpore residuæ, dum vita privata, quod fieri necesse est, sub cute emarcescunt, non possunt non alia mala & symptomata, aut etiam recidivam inducere: cum tamen hæc omnia in curatione perfecta, legitima, & methodica sedulo cavenda & fugienda sint, advertente etiam Claudino Empir. rat. l. sæpius c. Ita ut rectius fecerint, qui Parzi sententiam sequuti exiguis vossellis integros extrahunt prominentes. Hoc enim modo & Hieron. Montuus à nobili matrona infantes plures servatos accepisse testatur, part. 3. Pr. lib. 1. de morb. infant. p. 110. quamvis illa ex Didymo de porcis epilepticis valde incerta sint, aut saltem non satis heic tempestiva. Reusnerius quoque abrasionem plerisque frustrari deserit. Borellus quoque Centur. 1. Observ. 8. evulsiones Chirurgicas, & suffumigationes narcoticas cum Seni. hyoscyami, nec non asperiores lineo rudiori frictiones, experimento in fratre suo germano inductus præferebat. Suffutium utique Hyoscyami & decoctum sive lixivium ex Cineribus paleæ avenacæ laudabat etiam Gynæceorum scriptor hypobolimus, qui Erotis nomine imperitis inposuit cap. 54. Inunctiones autem, quibus evocantur, diversæ a diversis proponuntur. Claudinus empiricas quidem has omnes, sed tamen à ratione non alienas concedebat, ideoque nec omnino repudiandas. Schenkius, ut modò dicebamus, folius mellis meminit: cui Vicius, & plerique alii pollinem triticeum addiderunt. Dudithius farinam triticeam aceto permiscuit, egregio successu, ut supra narrantem audivimus. Joan. Michaël Savonarola tract. de vermibus, quem Praxi de febribus Venetiis à Vincentio Valgrisiõ editæ subjunxit, cap. 4. hæc protulit:

*Stercus pecudis cum oleo & melle inunctum, dicitur quidam, quod fixæ hoc spina dorso inungatur, multi capita lumbricorum per spinam deorsum egredi videntur, quibus abscessus egrotantes curantur, quod via à me creditur, si quamvis se vidisse testentur: & tract. 6. practici operis cap. 16. rubric. 25. Inter medicamenta vermes intestinorum necantia recenset stercus pecudum cum melle inunctum. Ex quo tamen Vicius, dum allegat, sterces facit, bubulum, contra auctoris mentem, qui haut dubie ovillum intellexit. Itali enim oves, pecore, appellant, & Medici semibarbari talibus idiotismis lectori plurimam nauseam movere consueverunt, ut in Marcello Cumano jam ostendimus, Unde Cunelius quoque sensum verborum §. 18. satis non capiens ait Savonarolam sterces animalis non admodum fortens cum ol. & melle permiscuisse. Casum tamen potius ovillum proponit Michaël Papa de pell. verm. & an. venen. pag. 191. Georgius Cusnerus l. c. curationem talem proponit: Si non prominu' ultrò fuerint hoc est, adhibito calido fano, edulcatoque (quale melioratione est) condimento, forissecus illud, capitella sua non exsertant, violentioribus modis ad progrediendum foras quærendi sunt. Accipienda nimirum radix Viticella seu vitis alba, quantum manu pressa capi potest. Bullias in lixivio e quermis cineribus concinato, quo circumfusum hisce lineolis infantile corpusculum persundatur & lavetur. Quo facto draconiarum ora progressa novacula præsecantur, quibus sic obtruncatis infans denudò prædicto diachysmate pura Conja balneariæ & ablundus erit, denudatusque vel diffusa pellicula Commageno perlinda. Hæc ille pluribus, quæ paucioribus dici poterant, remedio ex Loniceri Herbario delumpto, part. 2. cap. 276. ex illo autem nec Joan. Hartmannum transcribere piguit in Pract. Med. Chem. tit. de atrophia, pag. 142. hoc tantum discrimine, quod rad. bryoniæ unciam unam aut etiam duas accipere iusserit, lixivio in puliculam percoquendas, qua infans potius in balneo iungi debeat, non autem decocto illius, ut Cusnero placuit, persundi aut lavari. Quam Hartmanni opinionem Sennertus quoque l. c. probabat, aliorum præterea experimenta addens è stercore gallinaceo sacculo incluso & per noctem in lixivio macerato, cui postero die infans ad eorum usque immergendus, & postquam sudaverit, melle inungendus, ut novacula radatur, quod ter in septimana faciendum consulebat Gothofredus Welschius additam. ad Scip. Mercurii obstetric. cap. 60. At quod de crusta panis auferendis capitulis adiciebat, nonnihil asperius, & tenellis infantulis minus conveniens videtur. Quamvis puellæ trimulæ meticulosæ, novaculam non admittenti eandem adhibuerit Balthas. Timæus lib. 5. cas. 23. Dudithius mulierculis in Polonia usitatum, sibi que miraculi loco refert, quod sequitur, quoque liberos suos, ipse percuravit: Inieciatur in librum aqua calida, in quo pueri lavabant, panis in micæ friati Manipalus, cineris item parum, elotis pueris aqua percolata panis ille in massam compingebatur. Hæc massa in diversis partes manibus distilla magna subtilissimorum pilorum vim oculis offerebat. Quos tamen non veros pilos fuisse existi-*



existimamus sed vermiculos pilis similes, non enim est credibile, pami tantam trahendi vim inesse ut pilos, si qui sunt, sub cute latentes evelletur queat: sed longè vero similis videtur, ad eundem tanquam gratissimam escam vermiculos prorepisse, caliditate aquæ etiam poros dilatante, quanquam Dudithius se nullam ejus rei causam investigando reperire posse fateatur Claudinus l. c. farinam aceto permixtam integr valentiora enumerat, lotionem item ex lixivio querno aut colurno admixto lacte caprillo in quo rad. vitis albæ decoctæ. Franciscus Joël 10. Pr. sect. 4. §. 4. Cataplasma ex limbo anserino & scobe æris c. succo Cardui lactei ad vermes capillares digitorum commendat, quod etiam his dorli infantium convenire potest. Petrus a Castro tract. de Colostro, qui Sci-  
pionis Mercurii Obstetricio additus est, puncto 3. mulierum Lusitanarum experimento fuliginem caminariam c. melle & lacte mixtam dorlo illitam laudat. Locum quoque habere potest, quod varis expertum à Distimarhis remedium ex Viero adducit Mollenbroëcius tract. de var. sive arthrit. vaga scorbut. cap. 15. §. 18. Cataplasma ex rad. Cicutæ aquaticæ stappa obvoluta & sub cineribus allata deinde tula c. melle & applicita, quemadmodum & remedia Joan. Agricola ad trichiāsin pedum sive ulcera verminosa experta satis sunt idonea, decoctum nempe ranarum & lacertarum, aut pulv. earundem adjecto Caphuræ momento tract. 5. Chirurg. parv. pag. 630. Decoctum etiam bacc. lauri & lil. alb. in vino quod contra vermes cardiacos ex Mss. Experimentis Philip. Edoardi Com. Fuggeri excerptum J. Udalic. Rumlerus valde proficuum expertus est. Decoctum item secalis c. absinth. & radic. graminis laudatum Petrus Franciscus Phrygio part. 1. Comm. in histor. Epidem. Hippocrat. ægror. 12. Decoctum item spicarum filiginis, sive rectius secalis laudatum Joëli. c. & tela emplastica Cera nova indurata, cui vis eximia ejusmodi animalcula extrahendi, sive sola sive etiam pice crassiori, melle & axungia ut rusticitim vocat, campanarum additis. Nam quod de incisione tumoris suppurati & consolidatione adjungit, nihil ad rem facere videtur, quia ad hunc adfectum, confusione minimè probanda, imperitius trahi jam supra diximus §. 9. Adolphus Occo in Pr. Mss. experimentum de Secali suo quoque calculo probans, vicissim etiam vermes secali innatos segmentis abiegnis insertis extrahi posse comperit, quod sponte prodeuntes iidem adhererent: Unde decoctum quoque illorum huic morbo utile conjicere possumus. Vermibus quoque tam hominum quam equorum expellendis nihil valentius expertus est lapathio lilvestri latifolio, quod alii Uncinosum, Vulgus bonum Henricum appellat, in balneo præcipue solum aut aliis adjectis, decoquendum. Succum veronice & eupatorii experimento suo commendat Anonymus in Pr. Med. apud nos Mss. Portulacam c. aceto rosam & sedum minus vi detergendi insigni præditum proponit Aretæus 2. Chron. cur 13. seu potius Paulus Aegineta, ex cujus 4. cap. 11. hanc illi laciniam adfuit Georgius Henrichius: *ομαλὴ ὁ ἀνδραγαθὸς μετ' ὅζου λευκῆς*. & *ἡ ἀνδραγαθὸς*. Minus enim malimus redde

re quam tenue, quia & huic folia nullo fecius crassiuscula obtigerunt. *ἀνδραγαθὸς* apud Arjilid. in Orat. *exigua spes*: & *ἀνδραγαθὸς*. Luc. 21. 2. *nummi parvi*. Decoctum Chærephylli c. aceto paratum lotioni commendat Samuel Hæserfferus l. c. una cum Cataplasma. ex sanguine Draconis vini latice probe contrito: quod minimè contemnendum, nisi quod cutem colore pertinaciori inhiat, haut facillè eluendo. Nam alterum, quod ex fermento & autipigmento compositum emplastri nomine describit, intutum nobis, nec in tenellis maxime corpusculis usu admittendum videtur. Plurimum quoque prodesse poterit vi detergendi strigmenta cutisque sordes eximia pollens herbula, quam alteram Sideritidis speciem Joach. Camerarius vocat, & huic intentioni Austriacorum experimentis tantopere extollit Volsig. Hæserus 7. Hercul. Med. cap. 6. præcipuam causam in pororum cutis obstructione repouens, propter difficilem primæ lanuginis egressum calorisque nativi negatam eventilationem, ut quæ deinde maciem corpusculis inducat. Nec obstat, quod doctissimus Anonymus in Ephem. eruditorum Gallicis vermes vervecum jecinoribus frequenter innasce scripserit, si lanionum observatione Sideriti glabra, arvensi pascantur, cujus etiam folia latiuscula aperte representent: verosimilius enim videtur animalia, seu ipse innuit, morbida & vermibus istis sortæ, herbam illam occulto quodam instinctu naturæ remedium appetere, non quod ex illa vermes generentur. Nec sane improbanda Clusii sententia, qui marrubium lannonicum nec Theodori & Gerardi, qui alyssum vocabant cùm Dioscorid. 4. 33. dixerit *φύλλον ὁμοῦν τῶν σκελετῶν* eidem tribuat & *ποδύλον ἀνδραγαθὸς ἀνδραγαθὸς*: Folia marrubii similia, & orbiculata verticilla, qualia marrubii sunt. Hoc vero non minus quam alyssum vermibus inimicum nemo peritiorum ignorat. Picris item Veronensium flor. Cyaneo campanulato, quam monte Baklo copiosam omni vermium generi adversissimam commendabat Alex. Benedictus. 11. Pr. cap. 3. gentiana scilicet fruticescens, aut pneumonanthe: Nam picris Dalechampii in opere Rovillii Lugdunensi ad hieracia pertinet, floremque habet chondrillaceum & papposum. Omnibus autem externis aliis meritò præferenda sunt aloëtica qualis Tinct. Timæi in Consil. p. 432. in aq. aliqua vel decocto convenienti, abluendo corpori plane eximium remedium ex aloës 5 j. myrrhæ el. 5 iij. croci 5 j. cum sp. vi. s. q. Cui tamen ne nimium tenellam infantum cutem exsicce, aut exasperet, aqua aliqua destillata addenda est. Succus item hederæ terr. cum Aceto aloëtico mixtus & prioris exercitationis capite duodecimo laudatus. Aqua etiam aloëtica totum corpusculum Timæus 5. observ. cas. 23. inungi jussit, postquam & balnea & linimenta, & rationes frustra adhibuisset. Infuso quoque aloës in aqua solior. Persici nonnihil myrrhæ & salis ammoniaci addebat quondam Jerem. Martius in experimentis suis Mss. successu non contemnendo. Infusum aloës in vin. & aq. ros. æqualibus partibus Platearius proponit tr. de simpl. med. c. 1. Aquam item rosaceam feniculatam cum aloë soluta Joan. Baptista Montanus



in Consiliis ap. nos Mss. & nondum editis. Butyrum etiam Aloeticum Ant. Saporæ ad morpiones expertissimum in Euporitis Mss. Petri Asselinzi, Med. Veneti. Unctio denique Aloëtica Alzaravii de qua prioris exerc. cap. 11. Conveniunt præterea & plura alia vermibus inimica in balneis adhibita: Ut amaranthus luteus, stratiotes seu myriophyllum, polygonum, buphthalmus, gentiana, petasites, thymus, asarina, abrotonum, Selenium, Calamintha, Carduus benedictus, gratiola, tanacetum, verberna, Centaurium minus, nigella, leucogonum, fol. & baccæ lauri, aliaque cuiusvis obvia. Inprimis absinthium, quod quidam non secus ac cæteri gentianam, Aloë Germanicam a viribus (non forma) nominant, ut e contrario Apocal. 8. 11. pro absinthio, stella caduca (originem plerorumque opinione significante) Paraphrastes Æthiops (עֲוֹסֶתֶר) reposuit, id est, *herba amara aculeata*, quæ Ludolphi sententiâ Aloë Folia Solares seu *marissalvia* aut homini hort. maximæ cum aceto & melle applicita ad vermiculos, ut vocat, consumptores, cute illita, antequam capitula exserant, proponit experimento suo Petrus Uffenbachius in Castoris Durantis hort. Sanit. à se vernaculè converso: (Cui consentit anonymus noster in Pr. sua Mf. partic. morb. fol. homini sativi quod Ital. *Ovala*, trita & imposita etiam aculeos spinasque extrahere expertus: Cui tamen *Callitrichon silvestre*, ut efficacius in Unguento Glencino præfert Jo. Jac. Vuckerns Antid. spec. lib. 1. §. 8.) Magisterium vitri, cum melle & savina, ut contra vermem cardiacum & Umbilicalem, laudavit Thom. Kelslerus Cent. 1. process. Chem. 83. cuius descriptio 81. habetur. Ut enim unctiones & balnea isthæc omnia tandem dimittamus, satis hinc patere censemus, eorum, quæ commemoravimus, alia vermibus grata & jucunda esse, ad quorum præsentiam sive capita exserant, sive etiam tori, licet rarius, egrediantur, alia autem inimica & adversa, quæ acrimonia, amarore, fædine, & subtilitate sua corpus penetrantia vel invitos expellant, aut ab illis ipsis exeundo fugiantur. Nec enim Claudini opinio perpetuo tibi constare potest, qui amara exterius applicita non probabat, quod vermes illa proflus refugiant. Si enim satis sint penetrantia remedia, quæ ultra poros, subcutaneas quoque partes pervadere, & per extrema vasorum ora in venas, lymphæ quam ductus transsumi queant, feliciter omnino adhiberi non dubitamus: quemadmodum & dulcibus invitari ac prolici nemo negare poterit, inter quæ Comagenum Plinii præcipue virtutis, eisdem laudatum (non tamen dissecta prius pellicula, qua nihil opus, quippe ex confusione cum Vena Medinensi aliisque vermibus subcutaneis adducta) cuius verba adscribere operæ pretium fuerit, X. 12. *Aliud reperit Syria pars, qua Comagene vocatur, adipis eorum in vase æneo cum Cinnamo nive multa obrutum ac rigore gelido maceratum ad usum præclari medicaminis quod à gente dicitur Comagenum.* Hac sanè intentione, & mixtura eorum quæ partim amica vivæ mortis partim inimica existunt, topica sua remedia, (quamvis occulta & nondum prodita) conficiebat Augustus Hauptmannus epil. prælimin. ad Petr. Jo. Fabrum pag. 172. quibus ad instar

minutissimarum macularum rubrarum prolectos q. Cridones adfirmabat, ut in balneo abradi potuerint.

§. XIII. Pharmaciam vix unus aut alter Medicorum in hoc adfectu attingit. Cunctius §. 16. humoris peccantis evacuationem proponit, sed remedia, vel tironibus notissima, silentio transmittit. Nam quod de Venæ sectione addit (ut id obiter perstringamus, cum ad Chirurgiam pertineat) in tenella hac ætate, & insigni macie viriumque imbecillitate locum habere non potest: Neque sanguinis missio vel in adultis & robustis contra vermes rectè instituitur, nisi is ipse simul peccet, optimè sic limitante Hier. Capivaccio. 3. Pr. 14. Purgationem verò cum Reulnero, lenem admittimus, quæ nisi imbecillitas & tabes obstituerint, onni ratione necessaria est, antequam infantes ad balnea deducantur: Saltem ut alvus emolliatur absque ulla contradictione opus erit, maxime si constipata sit, ut voluit Corbeius aut potius Magirus. Ideoque minoribus ac nuper natis infantibus anisum exhibere utilissimum videtur, de quo Jo. Heurnius 11. method. ad Pr. c. 20. *Usu comperi à seim. anisi scriptulo crasse comminuto jam recens natos puerulos commodissime à viridi bile & fæda pituita purgari, cum pultem saccharatam sumunt, primo cochleari inditur ac illis exhibetur.* Nam & contra lumbricos anisum cum alii commendarunt, cum ipse Ebnasina 9. sect. 16. tr. 5. c. 4. 3. sect. 16. tr. 5. c. 4. Majoribus autem alia magis conveniunt: Poterunt turundi, ut Marcellus Empiricus vocat, sive, ut vulgus, suppositoria, ex idonea materia confici & adhiberi, aut etiam clysmata infundi, quæ cuiusvis in rem præsentem varia parare integrum erit. Ore Mannam accipiant ad Unciam dimidiam vel etiam integram pro ætatis ratione, eaque vel oleo amygdal. dulc. miscèatur, vel in iusculo, aut aqua aliqua stillatica idonea solvatur, cui & Medici arbitrio Serapia quædam immisceri possunt, aut etiam sola exhiberi, uti sunt, Serapium ex manna, ros. sol. simpl. viol. sol. simpl. è flor. acaciæ, mel. ros. sol. viol. sol. & similia: inprimis serapio de Cichorio c. rhab. Nic. Horrent. quod Scipio Mercurius 6. de error. popul. Ital. 4. tantopere celebrabat, quod alio loco examinabimus. Diacordium quoque purgantibus utiliter permisceri docet Nobilissimus Sebizio Specul. Med. Pr. part. 4. sect. 2. 7. Aq. ex flor. Persici destillatam addito scammon. & turpeto, tanquam ingens arcanum Jo. Heurnius 1. meth. ad Pr. p. 70. proferebat: sed quod res est, modicè purgare fatebatur. Nimirum perparum aut nihil de purgandi vi cum aquis transire solet, ut quæ in plerisque aut sale fixiori, aut resina sulphurea residet. Aquæ solventis nomine a 3 ij. ad 3 ß. exhibendæ, laudabat etiam Joh. Bapt. Cortesius Antid. Mellan. cap. 6. experientiâ Hier. Rubei, sed parum isthæc, ut ille, animadvertens. Neque majori veri specie Jo. B. Montanus Emplastrum Mediolanense succus ex electo de Sebett. & Cont. Hamech. extrahere solitum per destillationem adfirmabat in discursu de aq. destil. Mf. Edl. live Extr. flor. Persicorum spir. vini paratum & aq. eorum solut. in fliolo suo expertus est Phil. Gruelingius Cent. 3. observ. 39. Serapio etiam ex iisdem flor. parato Extr. Zeduaræ, & CC. vapore calcinatum, & sal tartari, atque



atque absinthii c. spir. salis guttulis immiscebat. observ. 44. Majorem sane laudem meretur Serapium & flor. Persici paratum, rectius tamen per infusionem quam succum expressum qualem Petrus à Castro proponebat, opportune nimium recordatus, quam parum succi præbere queat vel maxima fiorum copia, & quam non valde magna illa ubivis haberi queat. Extrahabat autem tincturam aqua ruta Capraria, stilia, prœniz, aut lil. convall. cum Merc. vitr. acidulata, quam melli deinde ros. Saccharino, sive quod idem est, Serapio rosato simpl. jungebat. Sunt qui e Manna etiam aq. laxantem destillare conentur, atque inter arcana referant, tanquam infantibus morosioribus & pharmaca abhorrentibus gratiorem: quam tamen nonnulli feliciter cum spir. vini, quam aq. stillaticia peragunt, nisi quod tunc medicamentum intemperatius prodire soleat: Unde & liquidam vulgo dictam aq. convên. solutam & alb. ovi depuratam, quam Jo. Kuesero Medico experientissimo acceptam refert Joh. Schroederus 4. Pharm. §. 446. hodieque communi usu omnium frequentissima nec pueris ignota est, destillatæ multum præferendam putamus, qualis etiam illa Bikeri in Herm. redviv. cum rore Maj. li. concinnanda, quamvis Spiritus nomine descripta à Schroederò 4. Class. 4. §. 446. Nos sane vesica bubula destillata purgationi mutilem, neque cum nitro ad mentem Jo. Osvaldi elicitam satis respondisse ad vota nostra compertimus, quæ causa videtur, cur l. c. edit. 1644. proposita, postremâ 1662. omisa fuerit. Prævallet sane illi vis sudorifica, notante Febureo part. 2. Chem. cap. 7. & spir. quoque ejusdem potius diaphoreticus est, sive additamento vini laticis, sive nullo, solus sit destillatus. Neque adientiendum Jobo Kornthauero, qui Comm. in Paracels. de peste ad Striacenses. pag. 79. cruorem Leonis sive flores Antimonii rubros, cum Tart. & sal. præparatos, ad vermes capillares commendabat, cum etiam adultis sæpius novuisse historiz & observationes Medicorum contestentur. Sic vero vacuato leniter corpore ut Reusnerus ap. Schenkium habet, detur pulv. lumbric. ten. c. oxysaccharo, aut theriaca cum lacte & jusculo pulli, vel succus raporum cum saccharo Cautio vel species Electuarii Diarrhod. c. Rhabarb. hinc collocetur in balneum aquæ dulcis ex cineribus Columis & lacte capillo paratum. Alii plerique, ut supra diximus, in balneo sicco sudare jubent, ideoque Hidrotica exhibent. Quò sane referri debent decoctum raporum cum succo scenic. in taleolas sectorum filoque suspensorum, ut arefiant, quod Phil. Scherbii Erasti consilium sequi, experimento tantopere celebrabat Gasp. Hofmannus 5. Instit. Med. cap. 11. §. 2. Cui propterea ipsum vapor. aut etiam vaporum sem. quemadmodum in variolis (plerumque etiam à miasmate vermiculante productis) quotidie cum successu fieri videmus. Omnia certè his ipsis contraria vermibus quoque capillaribus expellendis maxime idonea sunt, & rapis ipsis longè efficaciora sive tollis quæ Bart. Brunnerus Conf. 9. præscripserat, sive passis i. e. siccatis Conf. 43. & Christoph. Henric. Ayrenus apud Franc. Hildeshemium Spicileg. de c. adfect. 2. p. 280. sive denique expressis, ut succum præbeant, quem J. C.

Claudius l. c. eligebat. Nonnulli etiam quæ alias vermes necant, propinant. Sennertus sem. nascuntii mentionem facit, quod olim Diosc. 11. 185. contra vermes commendarat. Lumbricos autem terrestres quidam immerito suspectos habent. Putant enim sumpto illorum pulvere vermes potius copiosos generari quam expelli: quod tamen non est verosimile. Quis enim credat v. g. horula spatio tot lumbricos, & tam grandes, quales sæpè statim ab illius usu deiciuntur, in corpore nasci potuisse? Neque nos movet, quod Heur. ab Heer. observ. 9. vermes vino lotos & in regula siccatos exhiberi non probet, quia pituita permixta pulv. iterum animetur, sicut & mulæ subiectæ multis diebus mortuæ, si non premantur, sed simpliciter exstinguuntur, soli denuò expositæ, vitam volatunquæ recuperent. Ut enim dicamus, quod res est, nihil ad rhombum facit. Si verè muscas emori & reviviscere unquam credidit, idcirco fuit Philosofo indigna: Nam a privatione omnimoda ad habitum, ut loquuntur, Naturæ vi aut ordine nullus regressus datur. At lumbricos terrestres in regula siccatos & in pulv. contritos vitam omnem amisisse quis negat? Non igitur reviviscunt. Dicat fortasse quispiam, nos ipsos supra affirmasse, talium animalculorum animas etiam in atomo latere. Non diffitemur, posse diximus: In atomo tamen non quavis, sed seminali. Nec etiam semper est, quod esse potest. De lumbricis igni siccatis, & in pulv. redactis, qui id nobis persuadere voluerit, experimento ostendat necesse est, nam alias in specialibus istis progressus in infinitum fieret: & neque oniscorum neque scorpionum pulveres, quos plurimi contra calculum summo opere extollunt, aut similia alia tuto exhiberentur, quin potius metuendum esset, ne in corpore novi cruci & scorpi repullularent. Utut enim id quid. fieri posse putent, non magis tamen admitti debet, quam quod de musco Corallino marino Valencius mulieribus in Hispania persuasum a vero longius abesse ostendit J. Mich. & schalius l. P. 51. Non quidem ignoramus resuscitationem lumbricorum & muscarum ex pulvere siccatorum etiam a viro summo Athan. Kircherò propositam 12. mundi subterr. sect. 2. cap. 1. & 4. veremur tamen, ne aliquid fortasse subesse possit, quod experimenti deinde fidem dubiam reddat. Nunquam certe ex solo pulvere resuscitantur. Adfusa autem aqua jam mox suspicio oritur, non tam ex pulvere, quam seminis in aqua latentibus produci, de quibus supra plura ad Nobilissimi Boglæ mentem diserebamus. Si tamen quod Kircherus sect. 1. cap. 4. de panspermia & animis post mortem quoque cum seminali virtute remanentibus, non tamen ut formis, sed tanquam in vase, admitti a severioribus queat, fortasse nec isti resuscitationi multum refragari licuerit. Vix tamen a nobis, ut id credamus, impetrare possumus. Viliorum iccirco ejusmodi animantium natura non debuit præstantiorum animas tali prærogativa exsuperare, cum non minus materiales sint, ideoque morte aboleantur, & nova propterea animalcula, non anima residua numeroque eadem, sed corpuscula spermatica animata producant. In calculosis sane plerisque non minus



quam verminosis & calorem & pituitam plurimam adesse constat, ne quis reliquarum etiam causarum absentiam calumniari queat. Nos de lumbricis contrarium ostendimus. Ebnusina II. tract. 1. ed. Alpagi cap. 198. pulv. illorum ad icterum, urinam provocandam & calculum commendat. Diosc. II. 72. *ἀπὸ τῶν τῶν γὰρ ἐν τῇ σπινθίᾳ ὡς ἂν ἐν τῇ αἵματι ἐκείνῳ γὰρ οὐκ ἔστιν. Vermes terreni triti & cum passo poti urinas ciunt.* Contra dicitur suriam etiam ex aqua dulci & myrtina dabat Aabdorrachmanus Aluithensis I. de propr. & virt. an. med. 10. §. 309. quem ex Arab. Latin. factum Abrahamus Ecchellenfis edidit, majorem gratiam promeriturus, si Latinis Arabica voluisset conjungere. Ad icterum laudabat Masfarias 3. Pr. 15. & Lxl. à Fonte Consil. 115. contra hydropem vero Raym. Mindererus in med. milit. inprimis sirhabarb. quidpiam adjiciatur. In pulv. quoque Monspelienfium ad pallidos virginum colores usitatissimum quem Henr. ab. Heer observ. 6. Jo. Schyronio adscribit, lumbrici siccati recipiuntur. Altmarus de med. hum. corp. mal. cap. 81. tam adultis, quam infantibus, etiam feбри presente, contra vermes omnis omnino generis, etiam latos, confidenter dari jubet, Aetium haut dubie sequutus tetrab. I. ferm. 2. cap. 168. Ad lactis etiam generationem omnibus tam Græcis quam Arab. usitatum docet Mercurialis 3. de morb. mul. c. 1. Unde apparet, quam vanus ille metus sit, quandoquidem nemo horum omnium lumbricos ex eo genitos observavit, cum tamen in plerisque adfectibus enumeratis & calor & humoris vitiosi copia adsit. Sed & Theophr. Paracelsus cujus experientia in iis, quæ absurda non sunt aut inopia, plus tribuendum est, quam quorundam rationibus I. de verm. cap. 10. *Vermes, ait, terrestres habent vim curandi non solum panaritium, verum etiam alios vermes omnes in hominibus ortum & sustentationem habentes, siccati scil. in pulverem redacti, necnon intrinsecum administrant cum quovum liquore (in caprillo lacte melius) vermes omnes ad hunc modum expellunt ab intestinis & stomacho per secessum. Per eundem etiam Syrones expulsi fuerunt, aridura sanata (tabem intelligit aut asrophiam, atque hanc ipsam de qua loquimur) nec non membrorum dolores maximi.* Itaque ab re non fuerit ea quæ lumbricis inimica sunt, sudoriferis permixta exhibere, sic enim vis illorum cum sanguine & humoribus nutritiis facile ad cutem usque & partes musculosas penetrabit. Hæc Sim. Sethi *ἰατρικὸν ἀνταρτικόν* c. de mentha vocat, quibus Cardiaca semper miscenda prudenter monuit Cahagnefius seu quisquis auctor est Enchir. Pr. Med. c. propr. è quorum tamen numero, ut infantibus gratiora eligenda Sem. Coriandri præparat. rad. Contrayervæ seu Tragopogonis Hispan. & Indici, dictamni alb. personatæ, labri veneris, H. & flor. stæch. citrin. Adriano Spigelio adeo celebrata tr. de lumbr. lat. ut tincariam Marcelli Burdegalenfis ac Scribonii Largi plerique putarint. p. 73. Flores fecalis lacte incocti experimento Arn. Vucicardi I. thes. pharm. cap. 14. aliaque plurima, quæ lumbricis pariter pediculis, dracunculis necandis recensuit Johan. Georgius Macasius prompt. Med. lib. 1. sect. 9. cap. 19. & Melch. Sebizius Man. Pr. Med. part. 4. sect. 1. cap. 7. Vieri theriacæ lumbricos quinque tritos admiscet

c. Cinnamomi & Sacchari pauxillo, quamvis & theriaca sola id præstare queat, in qua utramque facultatem, sudores scil. commovendi, & lumbricos etiam latos expellendi jam olim Galenus agnovit. Quam licet Leonellus Victorius Faventinus tr. de ægrit. infant. cap. 3. & Claudinus I. c. parum tutam pueris putarint, atque propterea calidiori multum prætulit pulv. Card. benedicti ad 3ß. vel 3j. substituendum, qui tamen cum amaritudine valde ingratus sit, omitti, ejusque loco aq. stillaticia aliis sudoriferis mixta exhiberi feliciter posset, ut sem. hyperici, quod adeo experimentis suis efferebat Jo. Georg. Brenggerus epist. ad Rumler. 2p. nos Mf. aliaque quæ minus injucunda & infantibus commoda subungere heic placet. Theriacam tamen, ne id quoque dissimulemus, bimulis magno emolumento Hippolyti Salviani Med. Rom. imitatione dabat Thom. Jordanus tract. 3. de pest. phænoin. cap. 7. cum vermibus laborarent: Huic autem aptissimè alia admisceri possunt lumbricis inimica, ut Terra foliata tartari Paracelsi tract. 3. paragraph. lib. 2. tantopere celebrata & Crasio theatr. Herin. Hippocr. lib. 3. cap. 4. plerisque deinde pro summo arcano venditata, aut Mag. cæruleum vitrioli laudatum à Timæo 6. epist. & Consil. 1. pulvis item Callimi, malignis quibusvis adfectibus præstantissimus Cornelii Gemmæ experimento 2. Cosmocrit. pag. 256. aut Magist. Aetitz, quem olim jam Solinus polyhist. 40. contra serpentes & vermes collaudabat. Mag. item & flores Chemini CC. Eboris, & Unicorni fossilis, quæcunque cum spir. Nitri conficiuntur, omni vermium generi adversantur. Cui nil efficacius subrogari poterit, quam ipsa medicamenta Viperina, ut pulv. serpentum Jo. Prevotii ex angue Esculapii paratus: pulv. item viperinus Petri à Castro cum anodyno minerali seu nitro præparato & spir. vitrioli digestus, tandemque infuso guttatim ol. tartari præcipitatus, aquisque cardiacis denique elorus, cui tamen aut solum Merc. vitr. aut solum Merc. nitr. adfundi mallems, quia conjuncti ipsam Chrysulcam constituunt: Aut pulv. viperinus Card. Richelii, ex illa præcipue viperæ parte, per quam hepar distenditur: cui nonnulli solas vertebrae destinare solent. Aquam etiam ex capp. caudisque vulgò abjici solitis, facto cum sale, ut vocant, strato super strato, & febribus, & aliis adfectibus plurimis proficuum, experimentis cognitum nobis quondam adfirmabat Illustriss. Eq. Cassianus à Pureo, cujus inusitata eruditio, prudentia, & humanitas toto terrarum orbe celebrata, antiquam Romanorum virtutem non æquabat, sed infinitis modis exsuperabat. Spir. viperarum cum spir. sanguinis hum. Illustris Veslingius ceu singulare & specificum arcanum prædicabat. Jo. Georg. Agricola Med. Ambergensis I. de us. Med. Cervi dissect. cap. 3. §. 37. Cornu Cervi ust. c. aq. Card. ben. commendat ad Comedones per sudorem expellendos, non male, nisi quod remedium hoc Vieri esse dicat, in cujus tract. de Varis, quem adlegat, nihil ap. Smetium comparet. Quod etiam in pil. Regis Serenissimi Ferdinandi Ducis Mantuæ & Montisferrati ad morbos malignos omnes, & vermes celeberrimis, positum. Nos nondum in vulgus cognitæ, heic propalamus,



mus, quia spei suæ non impares compertæ sunt. Extract. galegæ, angelicæ, bacc. lauri, genistæ, theriacæ ana ʒij. Sal. comm. C. Cervi, Corall. rubr. ana ʒij. Rhinocerot ʒiʒ. contrayervæ ʒijʒ. terræ signatæ. ʒij. c. Serapio Citrior. acid. F. M. Pil. Cujus dos. ʒβ. c. Serapio flor. aurantior. vel Card. benedict. Neque absurda Kessleri cogitatio Cent. 1. process. Chem. 99. qui decoctum C. C. cum aq. hyperici præferebat in quo stannum Britannicum aliquoties extinguitum esset. Quin isthac indicatione Gelu potius rec. paratum c. Magist. Jovis aut Badzahardico Joviali, tanquam egregio diaphoretico commodissime exhiberi posset: Tale autem cum ol. sulphuris paratum, præcipitatione cum liq. Tartari procurata, Tartari Saturnini nomine invernæ etiam usibus aptum Raym. Mindetero Poliatro nostrati quondam frequentatissimum erat. Badzahardicum tamen Martiale præferebat Illust. Rollincius method. consult. lib. 13. cons. 3. Quin etiam Solare & Lunare, & quod simplicius Minerale dicitur, omnia his ulibus apta, quippe egregiè sudorifica & alexicaca. Tinctur. Antimonii cum successu exhibuit Timæus V. cas. 23. ritè nimirum præparatam. Utilia præterea Magist. Eboris, & Rhinocerotis Eq. Fr. Ponzæ experientiæ tr. de venen. cap. 15. talorum item Vaccin. & Ebur ipsum foissile, Unicorni marinum Greenlandicum & Badzahardica omnia ap. River. Cent. 1. observ. 91. decocta & infusa L. Colubini seu Moluccani (cujus primum inventum ap. Clusium Henrico de Luna Lusitano & Lud. de Tayde Proregi debetur, bestiolæ autem Quil. cum serpentibus dimicatura potius adscribit Jo. Hugo Linscotanus, in cujus adnot. ad cap. 75. alterum eadem genus cortice versicolore maculosum à Sim. à Iovar dono datum describit Bernardus Paludanus) & Columi nostratis, Cerasi item aviaræ sive Mahaleb Arab. valde commendatum ab Ebn-Jezla direct. sanit. 26. Aq. item acida ex præparatione Antimonii Diaphoretici, aceta sive spiritus acidi succini & Lignorum, imprimis Heraclini, quo nomine aut Columnum Rulandus olim aut buxum intellexerat, c. Tinct. Corall. serapiis jucundioribus edulcata, ex acid. Cit. Card. ben. intubo, fl. hyperici, scordio & granatis. Magist. item Castorei vertebr. Viperin. & CCj. c. Spir. terr. signatæ & Tinct. Lunæ, aut Lap. Badzahardico & pulv. Agagropilorum, in aq. filicis, hyperici, Card. ben. marrubii cum serapiis jam dictis egregia remedia præbent, qualia nobis subinde usitata. Conveniet etiam, ipsæque Tinctura Lunæ efficacius comperietur, si quis in usum ducere voluerit, Leucocephalicum Corvi nigri metallici sive Chemici, Carolo Vuidimanno Poliatro quondam nostrati arcum laudatum, cujus descriptionem protulimus Hecatortæ nostræ 2. observ. 74. ad illustrem societatem curiosorum in Germania, prope diem prodituræ. Quibus & hoc addamus, Pulv. fol. Nuc. jugland. & persici arbor. magna cum laude utebatur quondam Phil. Clauserus, Empiricus Germanus III. Pr. Med. cap. 6. simulque infantem decoctio marrubii & rad. bryon. aut lixiv. pineo c. aq. pluvia parato lavari jubebat: aut sem. Nallurtii ex vino dato decoctio L. querni fimique Gallinacei imponebat. In Saxoniæ autem locis quibusdam montanis,

ubi fodinæ Metallicæ, valde familiare & sæpius expertum novimus: Infanti myrrhæ rubr. opt. el. q. cultri cuspidè prehendi potest, e Cervina exhibent, atque deinceps aliquot diebus sudorem excitant vapore aquæ calentis helcysniatis seu scoriis argenti à tornace calentibus adfusa. Amarum quidem & ingratum hoc medicamentum, quod tamen nostratibus etiam utilissimum, pulciculæ myrrhatæ, nomine Adamo Hebelio Poliatro feliciori successu celebratum ex myrrh. purissima in pollinem trita ʒj. Mellis virginis. ʒvʒ. Ol. amygd. dulc. rec. ʒiij. & Confect. margarit. ʒiv. permixtis. Parum tamen ab isthoc pharmaco differt pulvis Alexii Pedemontani inter secreta memoratus lib. 1. p. 33. edit. Vucceri curâ procuratæ. Sed istis missis, postremo medicamenta, quæ vigilas infantibus molestas mitigare possunt, enumeranda superessent, cum tamen etiam mulierculis notissima sciamus, volentes præteribimus. Qui verò sic volet Sennertum IV. Pr. part. 2. cap. 9. consulat, cujus copiis abundè instructur.

§. XIV. Dicta denique sive victus ratio curationi & præservationi conveniens, talis omnino instituenda, quæ crudos vitiososque humores non progeneret augeatvè. Inprimis pulles non satis idoneæ videntur, quod ciborum genus in victu infantium cum alii damnarunt, tum Jul. Alexandrinus Comm. in Gal. 1. olim fac. 5. & Guil. Fabricius Hildanus Centur. 6. observ. 34. Germaniæ hanc pessimam consuetudinem jure reprehenderunt, quæ illo tenella corpuscula usque ad nauseam inferre solet: quod olim quoque Aristoteli VII. histor. anim. 11. non minus improbatum, viscidum, & lumbricis gignendis aptissimum notavit etiam Vinc. Alsarius Crucius Centur. 3. quæsit. per Epist. pag. 220. Neque ab re nonnulli iccirco panis pulciculam prætulerunt. Sic enim vocabat *ῥαψαν* Græcorum Soranus Ephesius interprete Aureliano I. Tard. I. quod radula, *ῥαψαν* in micæ contereretur, de qua haut ita pridem not. nostris in Marcelli Cumani observ. 31. mentionem fecimus. : חביצה : חביצה Hebr. in Menach. fol. 75. 2. Hispani *edulum* sive *pulmentum* ex pane friato, *Migas* appellant ap. Paschaliū I. method. med. cap. 36. & Jo. Paleum in Dict. Hisp. Gall. & medullam panis, *Migajon*, ex qua præcipuè paratur. Ebn-Jezla in direct. sanit. ord. 32. §. 2. eleganter *חבצלה* vocat, tanquam *farinam panis* dixeris, imprimis similaginei, Germanis nostris: *Semmelmeel*. In declinatione autem enaciati infantes alimentis commodis reliciantur, quæ omnia ludum ab aliis copiosius explicata sunt.

§. XV. Coronidis tandem loco & animi causa disquiramus, verumne sit, quod de Henrico IV. Imperatore Cunelius §. 4. commemoravit? hoc ipso nempe vermiculorum capillarium morbo 113. extinctum esse? Viderum scil. sequutus ap. Henric. Smerium II. Miscellan. pag. 226. qui ex Alberti Crantzii historia Saxoniæ idem retulerat, dracunculos appellans, adfectum congenitum, & Henricum V. non IV. sed Quartium filium, qui patrem in carcerem conjecit, seu vi seu dolo circumventum, conspirantibus regni Proceribus imperium deponere, tandemque Leodici mœore & penititudine



confectum mori coegerat, narrante Jo. Nauclero, Præposito Tubingensi Chronograph. vol. 2. gener. 37. Tanta illorum temporum turbulentia erat, ea animorum in Pontifices & Cæsares divisio, ut quisque partium commodis addictior, gloriæ quoque immoderatus faveret, verique cura propemodum nulla esset, & scriptis utrimque libellis vituperarent alii, alii impensius laudarent, ac Imperatorem bellicosissimum, qui sexagies bis acie dimicaverat, invicto semper animo, Filio tandem supplicem factum, neque hoc satis, in vincula confectum, maleque habitum, exemplum præclari apophthegmatis præbuisse dolerent, quod olim in symbolum adlegerat: *Multi multa sciunt, seipsum nemo*. Hinc enim Valtrami Nienburgensis Episcopi defensio, & acrior responsio Bernardi Corbientis monachi: pleraque item non sine adfectu ab Anonymo vitæ Henrici I V. auctore, & Davide Scoto, Mariani Virzpurgensis socio scripta, qui vitam Henrici V. tribus libris complexus est. Antonini item Florentini historiam, & Æneæ Silvii descriptionem Concilii Basileensis non omnem extra culpam, causasque amoris ac odii non valde procul habitas cuius animadvertere licebit. Multi idcirco singularem aliquam vindictam Numinis in filii obitu suspiciebant, morbumque non tam infantibus proprium, quam viris etiam abominandum sive *carbunculo* fingebant, quam diu oblectatus, celare tamen frustra conatus fuerit, ut Nauclerus gen. 8. & Cour. à Liechtenau Abbas Urspergensis in Chron. prodiderunt. Hunc utique familiarem Imperatori non tamen congenitum, dracunculi nomine insigniebat etiam Carolus Sigonius in 10. de regn. Ital. pro quo deinde Theod. Zvvingerus volum. 2. Theatr. vit. hum. lib. 7. p. 516. Carbunculum substituebat. Quod sanè ut à præclaro Medico profectum nostris conjecturis & expositionibus de venæ Medinensis tumore atrabilario & anthracode prioris Exerc. c. 3. adlatis non valde dissentaneum apparet, ita putamus, istum non alium quam anginosum quempiam adfectum sæpius ob bilis exuberantiam aliasque tam corporis, quam animi commotiones vehementiores ex intervallis invadentem, postremò letiferum extitisse. Aut verius tumorem cancriformis carbunculi nomine falsò habitum, & quandoque retrocedentem ac delitescentem, tandem tamen occultari non potuisse, quin cordis regiam malignitate mortali expugnaret. Jam supra autem plura tumorum genera ab Italis dracunculorum nomine censi c. 1. monuimus. Hoc quia non satis plerisque intellectum, causa fuit, ut hunc in errorem puerilem delapsi videantur, ut ipsum quoque Imperatoris adfectum puerilem existimarent. Cum enim tum temporis Cæsares sæpius in Italiam proficiscerentur, ejusque sat magnam partem, nondum amissam, imperio tenebant, Itali autem vicissim alieno plerumque in supremam Majestatem animo, jugum excutere conarentur, ut sanctius scilicet sed gravius induerent, nec à conviciis plebeiis quandoque sibi temperabant. Ita Fridericum I. Imperatorem Ænobarbum, Italica sua, *Barbarossa*, vocabant, & Carolum Crassum, Ludov. filium, levicula paralyti ex apoplexi noxi nonnihil debilitatum, tanquam stolidum, non maleferiatum,

sed vernacula, *malferito* appellabant, quod perquam opportunè ex Annalibus Fuldensibus ad A. C. 12. 487. Thom. Reinesius advertit 1. Var. 4. Maximilianum quoque I. Imp. magnanimum & optimum, *pocodinarium*, tanquam *malferito* & Consulem Augustanum (quod sæpius Augustam concessisset, ibique convivis, choreis, pugnis equestribus, aliisque exercitiis familiaribus non minus, quam publicis negotiis operam dedisse visus esset) contemptum vocabant. Hinc igitur Henrico etiam 5. morbi letiferi Nomenclatura Italica: *Dragoncelli*: de carbunculo quodam haut dubiè cancroso, aut cancro etiam anthracode, cui propterea cum vermiculis capillaribus infantium nihil commune erat. *Hæc Clar. Velschius. jam sequuntur Observationes quædam.*

#### *Macies à Crinonibus sive Dracunculis.*

Puella trium annorum, Filia Domini Olai Helleparts excubiarum inter stationarios Colbergenfes Præfecti, mediocri corporis habitu prædita, ante mensem & quod excurrit, sensim contabescere cepit, & licet quoad cætera bene valere, satisque comedere videretur, attamen parum aut nihil nutriebatur, quin & pruritus in dorso, brachiis & cruribus percipiebat.

#### *Resolutio.*

Cum in causam hujus maciei accuratius inquirerem & puellam jam pridem ablactatam, nulloque morbo affectam rectè valere, satisque cibi assumere intelligerem, nec ulla lumbricorum in intestinis latentium adessent indicia, de vermibus cutaneis, sive dracunculis cogitare cepi, ac proinde emaciatum corpusculum in balneum aquæ calentis collotenus demergendum, musculosque dorsi, brachiorum & crurum partes linimento ex farina triticea & melle illinendas, molliterque fricandas, suavi, quod dum fieret animadverti subtilissima quædam vermiculorum capita cineritii coloris e cute erumpere; Hæc ut subito, crusta panis, novaculam enim non admittebat meticulosa, abraderentur jussi, idque aliquoties per triduum quatuorve dierum intervalla, repetivi, verum cum subinde plures ejusmodi vermiculi proreperent, quotidie deinceps balneo inunctionibus & abrasioni insistendum duxi; At cum ne sic quidem satis proficerem, ad sanguinem vitiosum depurandum mitiora quædam purgantia exhibui, interjecto subinde usû tincturæ antimonii, cujus mira in vitiis cutaneis est efficacia, tandem universum corpus aquâ meâ aloëticâ quotidie inunxi, & sic puellam lepidissimam à molestissimo pruritu, vermiculis & macie. Dei gratiâ, liberavi. *Baldassav. Tymam casuum & Observation. pratic. lib. 5.*

#### *Vermis umbilicalis.*

Vermis umbilicalis & animalculum vermiforme, toto genere præter naturam, in vena umbilicali pueri puper nati, aut non longè post ex nimia sanguinis pituitosi præsertim, copiâ, obstetricis imprimis incuriâ & negligentia eò protrusi & corrupti, virtute tincturæ & principii cujusdam seminalis, & adjuvante calore earum duplici, putredinali, & *τὸ αἷμα αὐτῶν αὐτὰρ* pro-



productum, & postejus incrementum, mirè infantulum, ad longam interdum ætatem, variis symptomatibus, imprimis verò sanguificationem, & totius nutritionem impediens. Ejus autem sequentem habeto historiam.

Puella quædam lenæstris valdè inquieta erat, cum febricula quædam inordinata, cum autem pharmaca parum proficerent, Mater ejus Nobilis læmina suspicata quod erat, Umbilico hinc impositum unum è pisciculis quos fundulos vocant, vivum, fascisque alligavit quotidie semel & per horas 24. ita relinquebat, vermis autem depascebatur pisciculum, semper relictis oïculis ac mox subducebat se iterum in venam umbilicalem, cœu habitationem propriam. Accidit autem post 8. vel 10. dies ut fasciæ prædictæ laxatæ, nonnihil deorsum delatæ, ab umbilico recedentes pisciculum secum traherent, hinc vermis prædam infecutus ex umbilico totus excidit, unde regressum in vas Umbilicale invenire non potuit, & sic extra corpus per ventrem infantis extenuis mortuusque repertus fuit, semipedali magnitudine, figura terete latiuscula, pellicula non tenui ac levi, qualis lumbricorum esse solet, sed duriuscula, seu suberustacea, colore pallido ex luteo albicante. Hinc *auræ* didici famam illam quam superstitiosam & aniefigmentum antea credideram, non vanam sed veram esse; licet Medicis Practicis vermium hoc genus sit ignotum.

#### *Judicium super hoc Verme Umbilicali.*

Historia de Verme communicata grata est, fido videnti, fabulam hæcenus putavi. Fundulum ex una parte vidi contunptum, adscripsi calori abdominis, non vermi, ignarus unde illuc pervenire possit, & cur rodar pisces, non carnes hominis, ibi generari vix mihi possum imaginari. Rati sæpe muliercularum medicamentum, quod ex pulvere sabine & vitro pulverisato ac melle excepto, in formam Electuarii conficiunt, & in put. melle juglandis umbilico superponunt, ac si glitres interficere cogitarent.

Doctiss. Collega D. Lucas Byler, referebat se in consilium vocatum fuisse ad puellam quandam 7. annorum, quæ & consumpta, & dolores patiebatur circa umbilicum. Quam mulierculæ à Lumbrico Umbilicali rodixit imabant, ea propter fundulos tribus vicibus applicuerunt, quos à Lumbrico consumptos putabant. Cum vero rem penitus consideraret, putrefactos potius (ob factorem ingratum) vidit, quam a Lumbrico voratos. Tertio die puellæ defunctæ cadaver ipso præsentem fuisse apertum, secta quæ, peritonæum eo in loco, quò dolores patiebatur vivens, à seroacri & bilioso, etofum fuisse conspectum; qui à lumbrico excitari putabantur.

#### *Vermis umbilicalis cura.*

In Umbilico vermem lactentem, applicatione farinæ lupinorum in aceto coctæ, produximus, & extraximus, sine læsione aliam curam requirente. *Joan. Rudolphi. Camerarius in Memorabilib. Medicina Cent. 12. ex variis.*

## CRUSTA LACTEA. SEU ACHORES.

**S**unt Capitis ulcera manantia, tenuissimis foraminibus cutem perforantia, ex quibus glutinosa sanies effluere solet. Causa proxima est humor acris, serosus, nitrosus & mordax, crasso admixtus: Remota, malum regimen in sex rebus non naturalibus, præsertim in cibo & potu. Puerilis ætas est huic morbo maxime obnoxia; sed mulieres & viros acrius & molestius intellat. Achoribus affinis est alius affectus qui favus latinis, græcis *χρῆμα* dicitur. Hæc statuitur inter ipsos differentia, quod in Achoribus foramina sunt minoræ, in Favis vero majoræ, & quod humor, qui in Favis emanat, sit melli consistentia similis, unde modò Meliceris, modò Cerium dicitur. *Thom. Burnet. in Thesaur. Medic. Pract.*

#### *Curationes.*

Prodest in Achoribus syrupus de fumaris simplex, non vero composuitus, hic enim purgat. It. Essentia fumaris.

Antimonium diaphoreticum tuto potest dari infantibus: Potest muciari cum C.C. ullo. Aqua betulæ valdè expellit. Item syrupus & conserva rad. helenii.

℞. Aqu. fumar. scabios. ana ʒʒ. syr. de fum. ʒj. essent. fum. ʒʒ.

℞. Aqu. fumar. ʒiʒ. C.C. sine igne præp. ʒj. antim. diaph. ʒʒ. spirit. flor. sambuc. ʒʒ. edule. rot. man. christ. perl. q. s.

Vel infundi potest in cerevisia C.C. rasura cum flor. aquileg. fumaris, scabiosæ &c.

Si oriatur vitio Matris, dentur illi, vel nutrici pilulæ de fumaris, syr. de fumaris composuitus, extractum catholicum, serum lactis cum succo vel essentia fumaris.

Lotiones non statim adhibeantur, neque inunctiones, sed præ illis expellentibus talia externa usurpare denum licet.

Continuato igitur usu expellentium internè, inunctiones heri possunt ex unguento diapompholygos, lacte sulphur. ol. nuc. bals. peruviano &c. alias addi quoque possunt folia scordii, nicotianæ, rad. lap. acuti.

℞. Fol. beton. scordii, helen. an. m ʒʒ. nicot. exlic. p. ij. Rad. beton. lapathi n. aj. an. ʒiij. incis. & contus. grosso modo. D. S. species in kochen.

℞. Unguent. de helen. diapomphol. an ʒiʒ. flor. sulphur. ʒij. lact. sulphur. ʒj. c. s. q. ol. nuc. f. l. a. Linimentum S. Galbe.

Ad promovendam consolidationem autem in fine curationis potest exhiberi essentia vulneraria confess. lignorum. It. putr. crani hum. præpar. cum ocul. cancr. præp. *Joan. Michael. Prax. Clyn. General. part. 1. lib. 6.*

In crusta lactea imprimis præcipitandum est internum acidum nimium, & bl. nda diaphoretica ad partes ambientes beneficio sudoris est promovendum.

Conveniunt E. internè imprimis aqu. spiritus & ess. ex floribus & rob. sambuci parata: It. remedia ex fumaris & card. benedicti. in specie

X x x ;



Viperina sal. vol. viperarum earundem est. sunt optima.

Inadultioribus infantibus una alterave gutt. olei destillati viperarum foetidi, miram vim sudorem pellendi & hujus medio hos affectus curandi obtinet: juxta hæc ex ceruo parata diaphoretica imprimis utilia sunt. Hinc myrrha cum oculis cancrorum propinata & saepius repetita, curationem horum ulcusculorum mire faciliat.

Purgantia præmittenda studio reticeo.

Externè conveniunt imprimis lotiones factæ ex decocto radicis oxylapathi, chelidon. major. bértonicæ, saponariæ & similibus, quibus commodè furfures addi solent.

Achores equidem per se sepe curantur, sed tinea capitis his lotionibus imprimis indiget. Convenit etiam decoctum rad. altheæ, c. urina infantis pro lotionem capitis usurpatum.

Vulgo etiam decocto Nicotianæ utuntur ad capitis tineam abluendam, quidam etiam pulvere Nicotianæ utuntur, sed pravo sapissimè cum successu. Observavit enim Dn. Boyle in sua philosophia experimental, quod lotio capitis facta c. Nicotiana in infante tinea correpto, eundem reddiderit ægrum & ebrium: sicuti similem ebrietatem observavit Fehr. tr. de ablinth. pag. 90. ex pulvere nicotiana ulceribus capitis manantibus inperfo.

Duo præter propter sunt menses, quod hic etiam infanti cuidam aliquot annorum propter ubertatem pediculorum inunctum fuit caput unguento ex nicotiana parato, quo facto brevi post infans fuit admodum anxius, vomitus copiosi, diarrhœa ingens & tantum non lipothyriæ superveniunt, causa omnibus latet: tandem deveniunt in suspensionem unguenti: Hoc E. abluunt, & eo abluto sponte postmodum cessant supradicta symptomata.

Propterea cauti: sumus in usurpandis remediis ex nicotiana.

Potius decoctum malvæ c. pisces pro lotionem capitis optimè conducit ad tineam, sicuti etiam unguentum n. c. butyro non salito paratum, addita tamen pauca camphora, quin & ulterius conducunt Balsamus sulphuris temperatus c. axungia porcina & illius, quæ axungia porcina c. sola camphora subacta in mortario plumb. dat unguentum admodum conveniens ad capitis tineam, sicuti etiam unguentum diapompholygos aut unguentum enulatum, mistum c. floribus sulphuris & n. alaxatum c. oleo nicotianæ, sunt remedia satis efficacia in tinea capitis. Unguentum ex amiantho paratum experimentum est Boorii in tract. suo de genim. quo etiam non sine successu usus fuit sculterus in Observ. Chirurg. 96. quo ipso capitis tineam contumacem curavit.

Vulgo his ipsis remediis etiam addunt mercurialia, nunc ex mercurio crudo, nunc vario modo præparato constantia, id quod tamen non citra cautelam fieri debet, periculum enim est imprimis in tenerioribus, ne capitis periculosiorem affectum, v. g. epilepsiam inducant. Sic namque Timæus in suis responsis p. 106. refert infantem acoribus laborantem ex inunctione capitis mercuriali epilepsiam lethalem contraxisse. In robustioribus etiam infantibus mercurialia caute sunt usurpanda propter me-

tum salivationis quæ superveniens tam sponte & facile listi nequit.

Ob id Mercurius vivus necessitate cogente in pauca quantitate est permiscendus remediis: Tutius adhuc quam Mercurius vivus usurpatur mercurius præparatus, imprimis c. spiritu nitri præcipitatus: communiter appellatur arcumum corallinum.

Item conducit etiam mercurius dulcis qui non inconvenienter unguentis & linimentis permisceri potest. Notum alias est, quod cingula mercurialia s. ut vocant, cingula sapientie lumbis circumdata optima & experta sunt remedia præmissis universalibus contra tineam capitis, uti etiam contra phthirium: paratur ex cingulo ex panno parato, bene infuccato, ut sic dicam, c. mercurio vivo, vel subligatur mercurius vivus c. axungia porcina & bene illinatur in cingulum ex panno paratum: Tutio usurpatur in adulto tale cingulum; si præmissa fuerint universalia, si continuo simul usurpentur corpus in blanda diaphoreli conservantia, & tertio si ipsum corpus non nimis exponatur frigori, quin calidum & probe munitum continuo conservetur. Aliàs ad tineam capitis contumacem præmissa convenienti c. decocto malvæ lotionem commendatur hoc unguentum.

℞. Lithargyrii. cerussæ an. ʒij. flor. sulphuris mercurii vivi saliva jejuni extincti an. ʒj. c. l. q. olei rosacei subigantur probe in mortario plumbeo, & fiat unguentum contra tineam non inlegans. Panarolus in pent. 5. observ. 31. ceu expertissimum & a se crebrius usurpatum, laudat unguentum paratum ex sulphure, axungia porcina, & succo limonum, quo ipso unguento abrasis capillis tineam inungendam suadet vespere, tribus vicinis alternis diebus, quo facto per 7 dies nihil agendum est, quibus transactis fiat ablutio capitis c. decoctione malvæ, & sic brevi curabitur tinea, Oleum non contemnendum contra capitis tineam est & hoc.

℞. Vitellorum ovi ad duritiem elixatorum nu. xvi. Myrrhæ ʒij. Rad. ari. Serpentariæ an. ʒij. Helleb. nigr. iv.

M. probe & coquantur super carbonibus ignitis absque flamma, donec spumescere incipiant, tuncque exprimatur oleum usui reservandum. In specie decrecente luna commodè instituitur cura tinea: nam acores & favi sponte naturæ cessant ubi pertinaciora, aut periculosa fuerint ulcera, lapis medicamentosus Crollii (descriptio prostrat in Beguino & aliis) dissolvatur in aqua nicotianæ & ita levi manu inungatur, valde enim juvat.

Quod si verò ex malo incrementum cranium fuerit laesum, præmissa ablutione ulcerum cranium laeso inungendum est mel rosaceum c. spiritu vini, hinc applicetur pulvis aristoloch. subactus c. balsamo Peruviano, sic enim successive deletur caries, & os denuo sanescit. Michael Errmullerus in Collegio Prædico speciali de morbu mulierum, infantum &c.

### Consultatio.

Adolescens annorum quindecim, mala diætâ diu usus, postquam questus esset aliquamdiu de dolore capitis gravativo & somnolentia, ac cepit



cepit multos honores, in capitis cute apparentes. Qui postquam deinde essent dissipati, postea redierunt, foraminibus plurimis perforati. Ex hisque glutinosa & flava effluit sanies: quæ in crustas lædas & tuberosas, ferè totum ejus caput regentes, concrevit.

*Afficitur in hoc ægro cutis capitis;* quod indicant tubercula illa saniosa, in ejus capite apparentia. Afficitur etiam *cerebrum*, quod ex somnolentia & dolore capitis gravativo patet.

*Morbus*, qui hunc ægrum affligit, est intemperies quædam acris, salis, & nidorosa cutis capitis, quæ ulcuscula plurima manantia, & sædis ac tuberosis crustis tecta, in ea producentis, nomine *Achoria*, vel *Tinea capitis* appellari solet.

*Causa præcædēns* hujus morbi est mala dieta, qua hic adolescens fuit usus. Magna vero copia materis acris salis & nidorosa, in corpore ejus inde genita, *antecedentem* huic morbo præbuit causam. Pars vero ejus à corde cum sanguine per arterias in caput delata, & cerebrum gravans, *inducit* primum *somnolentiam* & *capitis dolorem gravativum*. Cutis autem capitis sua acrimonia multis locis perforans, & erodens, & *capitè ex erosa cute emanans*, & *in crustas lædas & tuberosas*, totum ferè caput regentes, *concrevit*, continens hujus *Achoria*, sive *Tinea capitis*, est causa.

*Morbus*, hic valdè contumax solet esse. Atque ideo difficulter curabitur.

Curatio itaque diligens adhibenda, ne æger in apoplexiam, epilepsiam, lipothymiam incidat, vel alia graviora symptomata incurrat.

*Æque* in cacoehymie corporis ablatione, & intemperiei correctione, & ulcerum capitis sanatione, per contraria instituenda, consistet.

Primo itaque sumatur tale purgans.

℞. Mercurii dulcis benè præp. gr. xiv. scammonii optimi gr. viii. vel ℥i. Electuarii diaphani ℥ij. Misce F. Bolus, subindè reiterandus.

Postea ad humores cacoehymicos alterandos, & ulterius evacuandos exhibeatur tale Apozema.

℞. Rad. cichorii ℥ij. enulæ campanæ, althææ, Chelidoni major, an. ℥ss. herb. betonicæ, fumaris, borrag. scabios. an. Mj. Flor. borrag. violar. an. p. j. sem. genitæ, agni casti an. ℥j. decoq. in aq. hordei q. s. ad lib. i. s. Addendo sub finem decoctionis sol. lenæ ℥ij. sem. anisi ℥i ss. Colaturæ adde, syr. de cichorio cum rhabarb. ℥ij. Misce F. Apozema, pro sex dosibus, manè sumendis.

Corpore ita per universalia purgato, si tubercula non cedant, ad medicamenta topica sive localia est deveniendum. Tumque crustæ, quibus tubercula teguntur, sunt emollienda tali fomento, ut deinde facilius à Chirurgo tolli queant.

℞. Herb. malvæ, althææ, fumaris, an. Mj. Scabiosæ, agrimonis, betonicæ, M ss. flor. genitæ, sambuci an. p. j. sem. genitæ ℥j. decoq. in aq. comm. pro lotu, quo foveatur caput calide & frequenter, spongia liquore illo imbuta, & moderate expressa.

Postquam crux fuerunt remotæ, evellantur vossella pili ex tuberculis, donec subsidant. Quo peracto, sumatur cochleare unum aceti acerrimi, cui addantur guttæ vi. vel vii. olei vulgaris, ac linteo his mixtis imbuto & madefa-

cto omnes sordes abluantur, fortiter fricando, ut per poros apertos humores pravi expelli possint.

Si malum adhuc perseveret adhibeatur quotidie hoc unguentum.

℞. Piperis, sulphuris an. ℥j. fuliginis furni ℥j. Pulverisata misceantur cum butyri veteris liquefacti ℥ij. & F. unguentum.

Vel adhiberi poterit illud à Foresto summo pere commendatur unguentum.

℞. Litharg. aur. & argent. cum aceto acerrimo & ol. ros. nutriti ℥ij. aluminis rochæ combusti ℥ss. fuliginis furni, rad. enulæ camp. exsicci & in pulv. tritæ vel combustæ, chartæ, quæ persluit, exultæ an. ℥ij. olei ex vitellis ovor. axung. gallin. porc. an. ℥ss. ol. Laurini, rosacei, & aceti q. s. incorporentur in mortario secundi art. ut coeant in formam mollioris unguenti.

Cui etiam, malo nondum cedente, addi porit Mercurii saliva extincti ℥j. & vitrioli rom. recte calcinati parum.

*In vitæ ratione*, Aer sit purus, temperatus: Cibi sint boni succi, qui temperiem acrem nidorosa & salis temperant. Et contra, qui mali sunt succi & acrimoniam augere possunt, vitentur.

*In Potu* sit cerevisia benè defæcata. Viterur vinum. Panis sit benè fermentatus. Alvus sit lubrica. Exercitium sit moderatum. *Henric. Regius apud Theodor. Craanen Medication. lib. 4.*

### Observationes.

#### Pro Achore seu tinea crustosa in puero

13. annorum.

Puerum hunc sequentibus remediis ita curavimus.

℞. Fumaris Mij. scabios. beton. borrag. acetos. viol. agrin. on. an. Mj. sem. endiv. acetos. anis. an. ℥j. rad. enul. ℥ss. sol. seu. ℥vi. Epithim. ℥j. uvarum passerum exacinat. ℥ss. liquirit. ℥ij. t. omnium decoctio in aq. communis & fumaris an. pr. xqu. & q. s. pro ℥b j. in colat. dissolv. Syr. de fumar. ℥ij. Syr. de Epithymo, borag. & itæchad. an. ℥ss. m. f. apozema, capiebat bis in die, erat facilis solutionis; quotidie enim ter ad minus hoc decocto alvus solvebatur, aliquando & quinquies alvum depohebat. Deinde ut hoc capitis lavacro uteretur mandavi.

℞. Fumar. betæ, lapath. acut. cum toto; chelidon. cum toto; malv. fol. Heder. arbor. rad. althææ, an. Mj. flor. Chon. æm. melilot. & fursur. an. M ss. coq. in aq. q. s. pro ℥b ij.

Deinde ut crustæ melius emollescere, jussi ut post lotionem iungeret caput infrascripto linimento.

℞. Mucilag. scænuget. sem. lini cum aqua; malv. extract. axung. gallinæ, ol. ex vitell. ovorum an. ℥ss. Croci ℥ss. Mf. pro linimento ut artis est. hisque sæpius reiteratis, caput deinde radi jussimus novacula, continuando lotionem & inunctionem manè & hora quartâ pomeridianâ.

Post sex deinde dies paravimus iterum apozema purgans sicut ante, addendo polipod. q. ℥ss. ras. ligni sanct. quart. j. ex quo sumebat aliquando semel, aliquando bis in die, si alvus



minus responderet. Novacula rursus abrado capite, ut materia magis foras evocaretur, ad lotionem hanc plus detergentem devenimus.

℞. 1. unterr. scabios. Caul. rub. betæ, fol. Heder. arbor. malv. ras. ligni Gu j. c. an. Mß. rad. enul. Chelidon. alth. an. ʒj. fl. Chamœm. fursur. an. p. j. furin. fabarum, lupinorum an. ʒiß. Coq. in aqu. pro lb. iv. Post lotionem hoc linimento inungi mandavimus ad detergendum & magis exsiccandum.

℞. Pulv. rad. enul. camp. litharg. auri & argent. Ceruif. alumin. roch. combust. an. ʒiß. terantur subtilissime & incorporentur cum linimento prius descripto; addendo ol. vitell. ovorum, q. s. & ceræ albæ modicum ut in unguenti formam coeat.

Post quinque rursus dies propinavimus infusum fol. orient. Epithym. & rhei in aq. fumar. scabios. & beton. addendo cassiæ & confecti. Hamec. an. ʒij. Syr. de fumar. ʒi. quo sexies multa & varia excrementa deposuit, die sequenti rursus exhibuimus, & adhuc sexies deiecit. Postea lotionibus dictis urinam antiquam adjecimus, & inter bulliendum vitrioli exiguum quo ter tantum caput ablui imperavimus, eo quod robustius medi. amentum esset, exterum post istam lotionem caput infra scripto unguento inungebatur.

℞. Litharg. auri & argent. cum aceto acerrimo & ol. ros. nutriti ʒij. ceruif. abluta cum aq. solan. ʒj. alum. roch. combust. ʒß. fuligin. furin. rad. enul. exsicc. & in pulverem trita vel combusta, chartæ exusta an. ʒij. ol. ex vitell. ovorum, axung. gallinæ, porcine, an. ʒiß. ol. laurin. ros. & aceti exigui q. s. Incorporentur in mortario S. A. ut in forma unguenti mollioris coeant.

Illud unguentum est apud me magni pretii, & mirabile m. quæque efficacit, ut patet ex illis quæ ingrediuntur. Galenus sola charta combusta, & aceto diluta locum affectum illinebat, & uno aut altero die, hoc medicamento utens exsiccante, plurimos curavit.

Tandem unguento ultimo præscripto adjunximus argenti vivi cum saliva extincti ʒj. vitriol. rom. optime calcinati ʒj. & bis inungebatur, his dictis remediis ab achore seu tineâ humidâ liberatus est puer spat. duorum fere mensium. *Petrus Forestus, observ. 17. lib. 8. de extern. capitis vitii.*

#### *Pro Achore in puero octo annorum.*

Post lotiones & universalia remedia præcedenti observatione dicta, topico remedio sequenti fuit curatus.

℞. Succ. fumar. ʒij. Succ. scabios. borrag. Chelidon. succ. rad. enul. lapath. acut. an. ʒj. cum p. auxillo facis ol. antiq. & ol. ros. addendo axung. porcine q. s. & aceti exiguum, bulliant lento igne ad succorum consumptionem, in fine addendo pulv. litharg. auri & argenti, pulv. ireos, lupinorum, an. ʒj. pulv. ros. lign. guajac. ʒß. benè incorporentur & f. linimentum. S. A. Expertus sum etiam valere decoctum guajac, ut in morbo gallico uti solent, cum optima victus ratione; interea adhibendo lotiones, linimenta, & unguenta, in observatione præcedenti præscripta. *Petrus Forestus, observ. 3. lib. 8. de externis capitis vitii.*

#### *Pro Achoribus in puero 15. annorum.*

Contra hoc malum sequens lixivium inveniebam.

℞. Absinth. fl. Chamœm. serpill. matricar. an. Mß. bacc. Lauri, rad. Ireos an. ʒj. Rad. asar. ʒiß. incidantur & sacculo condita, coq. in lixivio ex ligni juniperini cinere tacto. Hoc luna decrescente caput lavabatur quotidie. ac brevi sanitate recuperavit. *Martinus Kulundus, curat. 54. cap. 1. l.*

Quendam achoribus tuncque per multos annos turpiter affectum, (cui varia fuerant incassum applicata remedia) præmissis cathartico, linimento ex oleo in quo ad exactam coctionem buse, live rana terrestris ebullerat, optime curavi, quippe simplici hoc remedio per paucos dies in capite utens, sanus, & capillatus factus est, durante autem linimento pilæ emortui, vulsellis à Chirurgo extirpabantur. *Julius Casar Baricellus, in hortula gentili.*

## CUTIS MORBI.

*Sic traduntur à Clar. Williso.*

**D**E Cutis morbis, & diversimodis remediis, rum generibus illos spectantibus pertractaturi, de partis affectæ fabrica p. uis præfabimur.

Quoad Cuticulæ ac Cutis fabricas, ac usus, non est ut omnia in libris Anatomicis jam jam accurate descripta, & passim nota hic repetam. De Cuticula annotasse sufficiat, hanc pelliculam esse tenuem ac densam exanguem & exanimem, ut pote vasis & fibris destitutam quæ cuti coherens, eam integit & ab externis injuriis tectur. Hæc ubique perforata est, in cujus foramina, sudoris vasa excretoria hiant, quæ Malpighius per microscopium accuratius inspicit, paulo ante hiatus suos, quibusdam quasi valvulis, pro sudore detinendo, aut liberius emittendo, donari asserit: verum hæc me latuisse fateor.

Cuticula per phænigium, aut ignem detrahitur, cutis nuda, & ob vasa sanguifera rubens apparet. Est autem hæc, membrana crassior, quod maximam partem ex filamentis vasorum sanguiferorum, nervorum, fibrarumque nervearum, varie inter se complicatis contexta quibus glandulæ numerosæ, & lymphæ ductus, sive sudoris, & vaporum vasa excretoria densissime interponuntur. Hujus substantia duplex à pleisque anatomicis perhibetur, exterior nervea, & interior carnea, seu potius glandulosa pro hujus exemplari, mali aurantii cortex adducitur. Si cutis nuda per microscopium inspicitur, ex observatione Clarissimi Malpighii, primo sese offert corpus reticulare, cujus crebris foraminibus continentur non solum ductus sudoriferi sed & plurimæ papillæ pyramides, per ordines parallelos e cute erumpentes, & in cuticulam, ubi in plures velut fibrulas dividuntur protensa; quas idem author tactus sensorium statuit. Insuper his, substantia cutis habet glandulas plurimas, quibus medicamentibus lymphæ, sive materies hydrotica, ex arteriis per lymphæ ductus sive vasa excretoria ad poros de-



deducitur. Enimverò observavit accuratissimus Stenon singulis poris suas glandulas subjacere, quæ juxta ipsarum usum majores, aut minores existunt: sudor, aut vapores ex his per vasa excretoria foras constanter emanantes, papillas nerveas, ne torte arefcaant, in transitu suo madefaciunt.

Quoad poros sive foramina sudatoria, per microscopium detegitur eos bini generis existere, scil. majores, in quibus plerisque radices pilorum consistunt, & per intervalla, ex utroque latere cujusque rugæ cutaneæ, ordine parallelo disponuntur: vel secundo sunt meatus isti minores, quorum innumeri spatia omnia prioribus interjecta quasi punctis creberrimis adimplent. Enimvero tota cutis, cum rugis suis, instar agri ab aratro sulcati, & dein cum ordinibus vertis, seu potius obliquis occati, apparet; ita ut plano suæ areæ supra sulcos utriusque generis eminentes, figuræ ut plurimum rhomboidis existunt; & juxta quod sulci isti; cum rugis, sive areis, breviores ac minores, aut etiam profundiores ac majores fuerint, textura cutis delicata sive tenuis, vel crassa sive levidentis videtur. Hujus constitutio licet plurimum nativitati, ac primogenæ staminum ac humorum concretioni debeatur, ea tamen propter diversimoda vitæ insequentis accidentia, multatim alterari solet. Vitiis crassior, labores duri, aeris inclementia, ac imprimis caloris, ac frigoris excessus, cutim asperiores: etiam è contra educatio mollis & delicata tenorem ejus magis subtilem, ac leviores reddunt.

Ut cutis magis tersa, polita, & æquabilis, evadat, multum interest, poros ejus omnes humore benigno, miti, ac velut oleoso adimpleri; ita namque dum meatus omnes pleni, ac tenses fiunt, totius cutis planities levissima apparet: attamen si humor vitiosus poris istis suppeditatur, aut qui insuit benignus, nimis exhauritur, cutis proinde aspera & rugosa fiet. Quare si cujuspiam cute mollissima ac planissima præditi manus aqua saponata, lixiviali, calcaria, aut etiam sanguine calenti aliquandiu madefient, propterea mox humore salino, per sales alios è poris extracto, sulci & rugæ illico majores & profundiores evadent: quare scemina delicatiora lavacra saponata, & quævis alia cutim sulcantia, religiosè evitant.

Nec tantum humor è poris nimium exhaustus, sed etiam in iis supra modum ac indebitè retentus, cutim asperam ac inæqualem reddit. Foramina pilosa (quæ & sudatoria & si non unica, aut plurima ita fuerint) ob transpirationis beneficium, effluvia copiosiora constanter emittunt, quare majora semper illa, ac patentiora videntur; sin verò à frigore externo hæc subito occludi contigerit, vapores intus coerciti, cutim circa eruptionum loca undique intant, ac in moleculas attollunt: hinc si quando corpora nostra boreæ nuda exponantur, aut fluvio immergantur, superficies exterior prius glabra, ac mollis, mox cuti auferis deplumati similis scabra & confragosa evadet. Proculdubio majora isthæc foramina, juxta cutis sulcos parallelos & velut quincuncis ritu seriatim consista, quasi totidem foveæ, propilis velut arboribus conferendis instituuntur; ita namque in qua-

drupedibus, imò & in quibusdam hominis partibus hirsutis, aliquatenus habent.

His ita breviter de cuticula, & cute, quoad eorum fabricas & usus designatis, via satis præstruitur, ad indagandos & explicandos partium earundem morbos, & medendi rationes. Itaque imprimis ad cuticulam, cum sit vitæ ac sensus expers, morbi vix ulli propriè spectant. Hæc interdum densa nimis diaphanè impedit; quandoque item propter accidentia quædam in nonnullis locis nimis crassa & æmule minimè ægrotat, attamen hæc in causa est quod affectus quidam, forsitan per evaporationem dissolubiles, circa cutis superficiem hæreant; in quantum scil. sanguinis, & humorum recrementa, & fæculentiæ exterius propulsa, & totam cutim transgressa, cum ob cuticulæ densitatem prorsus evaporare nequeant, super cutim extimam defixa, varias ejus discolorationes, & defædationes producant; cujusmodi imprimis sunt maculæ *Ephelides* dictæ, necnon scorbuticæ, & malignæ item *Lentigines*, & quæcunque aliæ siccillationes, sine tumore, aut asperitate cutim, vel cuticulam notis, sive nubeculis quibusdam aspergere videntur.

Ac verò quoad ipsius cutis affectus in genere spectat, liquidem hi varii ac multiplices fuerint, sub vario respectu distingui solent, atque imprimis quod sint vel cum, vel sine tumore: posteriores hosce modò notavimus.

Affectus cutanei cum tumore, vel sunt universales, per totum corpus dispersi, vel particulares in his, aut istis membris sporadicè, & quasi fortuito excitati.

Priores vel febri superveniunt, uti imprimis *variola*, *morbilli* aliæque exanthemata maligna, quibus etiam accedunt infantium efflorescentiæ volaticæ; vel sine febre contingunt, ut imprimis pruritus, impetigines, & affectus leprosi. Tumores externi particulares, sive sporadici, plerumque non meram cutim, sed & partes subjectas, scil. modò carneas, modò tendinosas, aut membranosas, aut glandulosas occupant, proindeque variz indolis ac formæ diversimodè existunt. Super his omnibus particulatim disserere, & singulorum *Ætiologias* & *Therapeias* designare, non modo integri tractatus, sed magni voluminis res esset: itaque impræsentiarum de affectibus nunc, aut maxime ex parte cutaneis (cujusmodi imprimis sunt *maculæ omnes*, ac *lentigines*, necnon *scabies* sive *pruritus*, *impetigines* sive affectiones *leprose*) breviter dicemus: de tumoribus cujusque generis speciatim edisserendi, olim fortassis aliquando opportunitas dabitur.

Primo igitur (ut à maculis uti pathematis minoris momenti ordiamur) occurrunt *ephe- lides* dictæ, quoniam ab insolatione potissimum excitari solent; atque id propter in vere, ac æstate plurimum increbescunt, circa hyemem rursus evanidæ, porò cum in formosioribus, ac cutim rarissimam habentibus maxime contingant, in iis præcipuè locis, ubi cuticula soli, ac aëri exposita, densissima est, scil. in facie, ac manibus maxime erumpunt. Coloris subflavi, aut fusci, circa magnitudinem morsus pulicaris, inæquales tamen, & quoad figuram irregulares existunt, parum aut nihil hæc differunt à puncturis istis subfuscis, aut flavis, quas nonnulli



nulli lentigines, vocant quæ lentis magnitudine, faciei partes crebris quasi guttis insigniunt.

Harum materies videtur esse, humoris biliosi portio tenuior, vi solis illam attenuantis, & poros cutis aperientis, exterius prolecta, quæ evaporari incipiens, in cute extrema, aut cuticulæ, quam pertransire nequit, concavo, defigitur, profecto has maculas à bile, aliisve sanguinis recrementis flavis procedere indicio est, quod maxime familiares sunt iis quorum pili etiam flavescunt. Porro quod in complexione sæpius pulchriori, ac præsertim in partibus soli, ac aëri expositis oriuntur, ratio satis liquet, utpote quorum cutis rarior, humorem ab æstu solari rarefactum eousque transmittit, donec à cuticula densiori prope exitus loca sistitur. Hic affectus quoad valetudinis statum, nihil mali indicat, aut ominatur; & quamvis in apparentia nonnihil turpitudinis refert, id tamen compeisatur, quatenus ita maculosos puriori constitutione præditos, significat.

Præter has maculas exiguas lenticulares, occurrunt alix multo ampliores, supra palam magnitudinem, quæ cutim variis in locis, præcipue vero circa pectus, & dorsum lituris modo fuscis modo luridis, aut subnigris conspurcant. Hæ certis temporibus, ac uti in multis observavi, certis in partibus exoriri, ac evanescere solitæ, vulgo maculæ hepaticæ dicuntur, iisque plurimum insigniti, jecur minus sanum, aut saltem bene sanguificum habere creduntur; quod tamen sub hac ratione verum non est, at solummodo quatenus humores biliosi cum non satis intra hepar à massa sanguinea secerantur, ad cutim protrusi, eam ita discolorant: quod vitium quodammodo etiam lieni imputatur, enim vero defectio hæc oritur, eò quod sanguinis fœculentiæ, ac recrementa, cum non satis à secretionum officinis excipiuntur, unà cum sero quo diluuntur, ad cutim feruntur, ibidemque sanguine exuta, ac à seroso latice inter evaporandum derelicta, circa poros extimos & foraminula (tanquam lanugo muscosa fluvii angustis hærens) defiguntur.

Lituræ istæ potissimum in ætate apparent, & maxime supra pectus & corium, vid. quo tempore & quibus in locis homines ad sudandum sunt plurimum apti: ipse nimirum latex serosus, qui fœculentias istas e massa sanguinea in cutis angustias provehit, eas penitus evaporare inhabiles, illic relinquit. Affectio hæc nihil mali conjunctum habet, neque enim morbi præsentis symptoma est, nec ullum brevi futurum portendit, porro cum locis plerumque tectis obveniens, nullam deformitatem, aut molestiam adfert, curatione ejus parum aut nihil opus esse videtur: sed quoniam apud vulgus opinio increpuit, hepar ob maculas istas insigniter periclitari, & medicinam necessariò requirere, idcirco ut quibusdam pharmaca importunè efflagitantibus satisfiat, præter cosmetica externa, etiam remedia hepatica interna præscribere solemus: quorum usus etsi non admodum necessarius, quia tamen exinde sanguinis depuratio, & viscerum ~~etiam~~ sataguntur, haud profus inania existunt medicamenta interna ad hunc finem utilia, supra inter remedia hepatica describuntur: externa sive topica profus eadem in

his, ac in aliis quibusque macularum generibus conveniunt; quorum formulas quasdam selectas subdemus.

De maculis pestilentialibus, uti & scorbuticis, cum alibi ex professo egimus, non operit hic eadem repetere; præsertim quoniam ad has methodus profus alia, quam ad modo descriptas requiritur; quatenus nimirum, in uno macularum genere, medicamenta sere tantum externa, absque splanchnicis aut cardiacis, inque altero tantum interna, sine ullis cutaneis adhiberi solent. Itaque ad maculas ephelidas, lentigines, & hepaticas vulgò dictas, ars decorationis proprie spectat; & propter hæc cutis deturpamina tollenda, sine quavis medendi methodo, pharmaca tantum cosmetica præscribuntur. Horum apud Dominas curiosas, aliosque de cute curanda sollicitos, cum ingens ubique & uberrima sit seges; ea tamen omnia quatenus duas solum medendi intentiones respiciunt, ad binæ hæc capita reduci possunt: illa nimirum aut cutis accuticulæ poros aperiendo, atque hanc interdum excoriando, humorem exterius attrahendum & profus evaporandum moluntur, vel è contra, & sæpe non minori cum successu adhibentur illa, ut materiem maculosam è cute repercutiant, ac intus adigant. Topicorum utriusque generis formulas quasdam ordinarias rationaliter inventas, & non raro sat feliciter usurpatas, hic ordine subdemus, quandoquidem non licet sine nugatum offensa, secretiora artis cosmeticæ mysteria detegere, & apud vulgus profanare.

Primò igitur ad cutim detergendam, & materiem macularum foras extrahendam.

℞. Lixivii è sale tartari minus saturati ℥ iv. olei amygdalarum amararum per expressionem facti q. l. in tali proportionem misceatur, ut totus liquor illico lactescat, ac ita perstet; cum hac mixtura partes affectæ mane, & vespere illinantur, & blandè confricentur.

℥. Radic. Ari, bryoniæ. sigil. Salomonis recentium an. ℥ j. pulv. sem. scænuæci ℥ j. camphoræ ℥ β. simul contulis affunde olei tartari per deliquium ℥ iij. f. expressio, applicetur cum petia intincta bis in die.

℥. Sulphuris vivi pulv. ℥ j. saponis nigri ℥ ij. ligat. in petia, suspend. in aceti fbj. per ix. dies, dein in usum adhibeatur, loca affecta bis in die abluendo, & confricando.

Secundò propter alteram intentionem, scil. maculas è cute discutiendas, earumque materiem repellendam ac intus adigendam, lac virginis celebre apud antiquos remedium fuit, & etiamnum à pluribus commendatur, ac in usum adhibetur. Hujus præparationes satis innotescunt: nempe solutio lithargyri in aceto destillato facta, ab oleo tartari per deliquium affuso, in liquorem instar lactis albicantem præcipitatur, quo facies, & manus bis in die laventur, & blandè confricentur: Medicamentum huic simile aut idem, saltem ejusdem virtutis, paratio ex solutione minii, vel ceruissæ, in eodem menstruo facta, & cum aqu. Aluminis aut salis gemmæ præcipitata.

Vel ℞. Camphoræ incis. ℥ ij. teratur in mortario vitreo, sensim affunde succum unias limonis, dein adde vini alb. fbj. F. Colatura & camphora residua, petia ligata, in vitro suspendatur.

℥. Vi-



℞. Viridis aris ℥ iv. affunde aceti vini albi lb ij. cucurbitæ vitreæ indita destillentur in calore arenæ: phlegma primo extillans ad usum servetur, quo facies illinatur bis in die. In hunc finem etiam ros aut phlegma vitrioli per se destillati egregie convenit sufficit nonnullis aqua storum fabarum, aut sumaria simplici stillatitia, aut etiam vitis succo limpidus, e ramis ejus verno tempore sectis extillante uti. Attamen semina curiosiores & artem cosmeticam maxime callere per se ferentes, vix ullis remediis cutaneis, nisi mercurialibus contenta sunt; quapropter aqua sequens ad omnes faciei turpitudines commendatur, & ab empiricis magno pretio venditur.

℞. Merc. sublimati ℥ j. pulverisat. ponatur in vase stanneo cum aq. fontan. lb ij. stent. per xxiv. horas cum spatula lignea subinde agitando, donec totus liquor nigrescat, qui tamen per chartam emporeticam colatus limpidus exadit; cum petia aut pluma huic intincta, facies semel intra diem unum aut alterum blande obducitur.

Medicamentum hoc contra turpitudinem quamcumque cutaneam insigniter juvat; quatenus nempe humores intra poros, & foramina utut minutissima impactos expedit, salium aut sulphurum combinationes inveteratas & pertinaces dissolvit, totamque ubi applicatur cutim quoad meatus ejus male contormatam restituit, & <sup>etiam</sup> facit; Quapropter non tantum ad faciei maculas abstergendas, sed etiam ad pustulas, & ruborem ejus nec non ad affectus erysipelat<sup>os</sup> tollendos utile est. Porro interdum accidit, plerasque faciei partes, præsertim vero nasum, & frontem, punctis nigricantibus creberrimis quasi à pulvere pyrio exploso inustis insigniri: quod tamen inde procedit, quia foramina sudatoria, modo humore atro crassiori, modo verniculis capita nigra habentibus implentur quæ quidem animalcula e poris expressa, & soli exposita vivere, & se movere facile cernuntur; atque in tali cutis affectione, lotionem aut litus nulli præter mercuriales prodesse solent; attamen huic melli aculeus plus nimium malignus sæpe præsto est; neque hydrogyri particula, una cum salibus (à quibus in minutias dividuntur; acunturque) faciei applicata, materiam inde noxiam & defædatoriam poris excutiunt; ac depellunt, eam vero intus repressam insequuntur, & prope diem sanguini & liquori nerveo (quorum crasses lxdunt; se facile insinuant, quinimo horum conmixtu sæpissime, cerebro, & nonnunquam præcordiis, & partibus aliis virulentiam suam non raro postea indelebilem imprimunt, hinc frequens observatio est, feminas aut viros cosmetico mercuriali dies ac multum utentes, vertigini, & affectibus spasmodicis, aut paralyticis obnoxios fieri, eorumque dentes nigricare, & nonnunquam vacillare.

#### De Psora sive Scabie cum pruritu.

Post cutis affectus simpliciores, qui nempe sine tumore, aut ulceratione contingentes, eam solummodo apparentiis maculosis defædant, jam ordine dicendum erit de pathematis gravioribus, & continuitatem solventibus, at-

que imprimis de psora sive scabie, quæ in variis, & crebris totius corporis locis, cutim pustulis sive eruptionibus exiguis, modo siccis & sæpe squamosis, modo humidis ac ad ulcerationem dispositis, cum pruritu valde molesto infestat; atque hujusmodi affectio propriissime illius partis morbus est, utpote quæ in ipsa cute propter contagium externum sæpe incipit, & frequenter per remedia quædam tantum cutanea sanatur; saltem utriusque ratio eatenus tenet, ut raro aliter perfecte aut suscipiatur, aut curetur.

Psora sive scabies vulgo describitur esse pustularum in toto corpore sparsim eruptio, ab humore acri, & sasso, intra poros cutis aggesto procedens, & inde ut discutiatur, ob pruritum insignem, scalpendi necessitatem inducens.

Ut morbi hujus causas, & symptomatum rationem ritè intelligamus, paulo altius de materie <sup>psoræ</sup> & causa ejus conjuncta inquiremus, numtum ut innotescat, cujusmodi sit humor iste intra cutim aggestus, quo pacto illic aut generatur, aut aliunde adveniat, dein quibus poris aut loculis contineatur, & quomodo foras erumpere nitens pruritum adeo molestum creat.

Itaque circa hujus morbi ortum ut non cum veteribus jecori, vel lieni, culpam nimium imputemus, materies ejus non esse quilibet humor singularis, e quatuor vulgo suppositis, viz. non pituita, nec bilis flava, vel atra, nec etiam ipse sanguis per se extravasari aptus, porro nec illa e duobus vel pluribus horum simul mixtis constare videtur enim vero ut dentur tales humores, ex iis tamen si morbus hic semper conset, non ita facile per merum & leve contagium suscipi, litu vitri solo curari possit. Quomobrem potius opinari tas sit, materiem morbificam esse humorem lymphicum, in glandulis cutaneis constanter, residem attamen ab indole sua genuina, scilicet salino volatili in acidam aut alias vitiosam degenerem. Enimvero cum huic ita depravato, & perpetim evaporanti, supplementa continua à sanguine adveniant, lactices isti, vetus & recens, non facile congruunt, aut ununtur, ac salum dissimilium ritu mutuo effervescentes, in materiem recrementitiam coagulantur, quæ poros cutis implens ac distendens, ubique passim in tumores attollit, insuper sanguinem in transitu nonnihil impedit, & extravasari cogit. Hinc pustula crebræ excitantur, & quatenus materies ista in ichorem faciens, à sero & sanguine subsequenter usque prorsum, & foras urgetur in moleculas assurgunt, dein spiritus animales fibras nerveas, ut ichoris istius excretionem promoveant, inordinate subeuntes, molesti pruritus sensum efficiunt.

Profectò humorem quendam lymphicum in glandulis cutaneis, quæ singulis foraminibus sudatoriis subjacent, propter usus quosdam recondi, quin & juxta copiam, & moram ejus diversimodam, glandulas has plus aut minus turgidas existerre, inspectio microscopica planissime detegit. Latex iste à sanguine per arterias in glandulis hisce deponitur, nempe ut sarcinula hac exuta, facilius ille per venas redeat, interim illic repositus, suos usus habet, scilicet imprimis papillas mliares, quæ cum fibrillis suis nerveis substratæ proprium tactus sensum



rium sunt continuè madefaciens, ab ariditate qua sensatio impeditur præservat; insuper eadem effluvia adusta a sanguine accenso perpetim decedentia, juxta cutis transitum humiditate quadam inibuit, & halitiosa reddit; dumque adeo laticis hujus pars cum sanguinis effluviis continuè evaporat, impendia illa per lympham usque recentem a sanguine arterio (uti dictum est) jugi exutam, reparantur.

Attamen suæ cutaneæ regionis æconomia non ita regulariter usque servatur, quin humor iste glandulosus, ab indole & functione sua deficiens, non modo in cute sed interdum in toto corpore affectiones præternaturales diversimodas excitabit. Hic lentescens, inque loculis pertinaciùs hærens, diaphnoen obstruit; ab eo nimis ubertim foras exudante sudatio immodica, ab eodem intus restagnante diuresis debito copiosior procedunt. Porro ad scabiem, & eruptiones pustulosas quod spectat, humor iste cum pluribus, ita potissimum tribus hisce modis depravari, proindeque diathesin cum sero a sanguine recens affuso coagulativam inire solet, viz. Primo ipse sanguis valde impurus, simulque dissolutus, corruptelas & recrementa sua ubertim in glandulis cutaneis relinquit, quæ ibidem fermenti magis corruptivi naturam induentia, cum succis aliis adventitiis, aut pertranscutibus effervescent; & varie coagulantur, adeoque non solum affectus *furunculæ* verum & leprosos diversimodos pariunt. Hinc piscium crustatorum, qui etiam aliorum, & quadrupedum salitorum, & sole aut fumo induratorum comestio crebra & assidua, item potus incongrui, & pharmaca venenata assumpta, eruptiones cutaneas passim, & non raro horrendas ciunt.

Secundo humor glandulis cutaneis aggestus, interdum mera stagnatione non tantum *furunculæ* sed etiam frequenter *phlegmonæ* evadit; quare non tantum diu incarcerati, sed etiam qui vitam sedentariam agentes squalori insuper, & pædori assuefiunt prædictis affectibus obnoxii degunt; quatenus nempe latex cutaneus minimè ventilatus, liquorum putrescentium intus, mera stagnatione corrumpitur, adeoque fermenti *phlegmonæ* indolem adipiscitur, cui insuper a sanguine perinde etiam depravato putredinis complementa accedunt.

Tertio si forsân hæc causæ defuerint, ut cutis humor glandulosus, nec a sanguinis vitio, nec propria stagnatione libem ullam contrahat, attamen miasmata virulentum ab extra communicatum, cum quoad morbos istos nihilominus prolificum reddit. Ex observatione maxime vulgari hoc liquido constat, in quantùm maximè sani, & constitutione optima præditi, vix unquam in eodem lecto ubi scabiosus simul decumbit, aut nuper decubuit, impune dormiunt: nec ita tantum, quin & scabiosorum sudaria aliis in eodem lavacro lotis, ejusdem affectus sæpe contagium impertiunt. Nullius certe morbi labes (pelle tantum excepta) faciliùs, aut certius quam pforæ propagatur.

Quod si hujus ratio inquiratur, statim occurrat, liquorum miasmatis *furunculæ* susceptivum, ad illud maxime exponi, & facillime disponi; ad utrumque certe nullo promptius quam aut sanguinem, aut succum nerveum. Enimvero

cutis latex glandulosus, in extrema corporis superficie scatens; atomos quascunq; per foramina & meatus ubique patentis intronitilas, primo imbibit, & a sanguine anticipat. Porro quod iste a contagio scabioso tam cito inficiatur, faciunt tum fermenti communicati activitas, tum liquoris glandulosi ad degenerandum eo modo proclivitas. Enimvero effluvia a cutis scabiosæ efflorescentius decidua, satis apte comparantur cerevisiæ floribus, summitatem ejus quasi pellicula extrema occupantibus; quorum si portio perquam minima inde demta alteri cervisiz novellæ fermentata committatur, totum illico massam quantumvis magnam fermentat; ac in liquoris unde admittitur indolem commutat. Magna certe energeia est, quam particula, utcunque minimæ ac paucæ, ad summam activitatem evectæ præstare valent, præsertim vero si in liquorem (cujusmodi est cutaneus) e particulis subtilibus cujusque generis, tum a sanguine tum a succo nerveo delibatis, conflatum, proindeque citissimè fermentari aptum inciderint. Ubi- cunque igitur miasmatis prædicti effluvia, corporis sani parti cuius externæ inpingentur, imprimis humorem cutaneum tantum illic loci constitunt: inficiunt, deinde vero hujus ita infectæ particula, a sanguine venoso susceptæ, & mox arterioso traditæ, per totum corporis habitum diffunditur, adeoque brevi humoris istius totam massam coinquinant, & *furunculæ* efficiunt.

Ex his de Pforæ causis tum conjunctis, tum procatartæcis explicatis, Symptomatis primarii, sc. eruptionis pustulosæ, ratio satis liquet. Quoad alterum vero, sc. pruritum cum sit sensio molesta, ut ratio ejus formalis innotescat, considerare oportet, ad quod sensorium proprie spectat, & cujusmodi ejus affectio sive passio fuerit.

Circa hæc, primo certum est pruritum ad sensum *Tactum* pertinere, atque hujus instrumenta primaria esse papillas militares earumque fibrillas per totam cutim dispersas supra ostendimus. Insuper hoc sensu fibræ omnes nervæ ubique per totum corpus diffusa donantur. Attamen cum *Tactum* duæ sint passionis supremæ, & quasi genericæ, sc. *Dolor*, & *Voluptas*, merito ambigitur, cuinam ex his *Pruritus* referri debeat. Pro cujus solutione ostendere oportet, quo ritu spiritus animales tactus sensorium incolentes afficiuntur in dolore, quomodo item in voluptate: deinde eorundem gestu etiam circa pruritum designato, facile constabit, cujus ditionis hæc passio fuerit, & in quibus ejus natura, & fiendi modus consistunt. Hæc quamvis in digressu si plenius & forsân ad tardium usque exponam, ignoscat lector, quoniam Aetologia hæc ad affectus plerosque externos tum dignoscendos, tum curandos perquam necessaria videtur. Dolor à Tristitia distinctus, & ad Tactum pertinens, definiri solet, *sensio molesta à continuæ solutione procedens*. Et quidem exoritur iste, quoties, & quatenus sensibile incongruum, aut improporcionatum, sensorio illi applicatum, fibras ab invicem dividit & divellit, proindeque spiritus animales in his hospitantes a solita & placida emanatione sua repellens, ab invicem diltrahit & quasi in fugam vertit; deinde propterea statim, quatenus iste spirituum exterior repullus, continuata aliorum serie ad



spiritus ad invicem communicatur; spiritus illic degentes in parem confusionem ciet, doloris, sive molestiæ exterius inflicte, perceptio efficitur. Revera tota spirituum animalium quæ dolore afficiuntur series, quasi animæ sensitivæ membrum quoddam singulare, ab objecti impressione velut anxietatem concipiens, cum molestia corrugari, inque dimensionem minorem sese contrahere cogitur.

Cum solutio continui doloris causa statuitur, non ita intelligendum est, ac si affectio hæc tantum à vulnere, aut plaga corpori inflicta ciceretur, namque eadem à frigore, calore, flacibus, à sanguinis aliorumque humorum extravasatione, aut alicubi aggestione, sæpe membri conformatione adhuc integra manente, passim induci solet; in quibus talibus licet continui partes, ac imprimis fibræ & filamenta nervæ, minime præscindantur, ista tamen in omni doloris affectu, aut ab objecti pressione, aut à particulis alienis cuneorum milar adactis, à solita positione divelluntur, inque tensionem nimiam, aut distorsionem, aut divulsionem adiunguntur; proindeque spiritus incolæ, à mutuis amplexibus divulsi, & dissipati, gravate hebent, & molestiæ sive doloris passionem eunt.

Dolori opponitur voluptas, estque sensationis modus uti plane contrarius: qui nempe oritur, quatenus blando mulcimine supra sensorium factis; spiritus illic confluunt, & mox densius conglobari, & delectatione quadam perfusi, in organo quasi exultant & conjubilant: dein quatenus spiritus intra corpora striata insimul parem ovationem incunt, voluptatis perceptio accipitur.

Maxima voluptas quæ Tactui affertur, in eo consistit, ut doloris causa amota partes ab ea prius affectæ temperiem & conformationem pristinam recuperent; ita namque spiritus animales prius fugati, & ab invicem dispersi, se recolligunt, & ad loca quibus exularunt, copius duplicatis irruentes, quasi ad ovandum se accingunt. Hinc Peripatetici voluptatis rationem formalem solummodo in molesti cujusdam remotione posuerunt; uti cum frigoris, aut caloris excessus, à statu opposito, & magis congruo excipitur. Profecto objectum tangibile (siquidem hoc crassum usque ac hebes fuerit) vix aliud (*aphorisma* si exceperis) spiritus animales ad sensorium conglobatim allecat, nisi quod eorum confusione præcedenti succurrit.

Ex his circa passionem istas designatis, facile constat, prurium quoad rationem ejus formalem plene & perfecte, nec dolorem esse, nec voluptatem, verum imperfecte, & inchoative, de utroque statu participare. Enimvero materies *pruritus* intra cutis poros aggesta, & pluribus in locis continui solutiones faciens versus dolorem inclinat: attamen cum illa sit volatilis, mobilis, & versus exitum properat, idcirco spiritus animales à fibris etiam divullis non fugantur, nec cum molestiæ sensu retrovertuntur, verum è contra, quasi humore infesto se potiores, eique ejiciendo pares sentirent, intra fibras cutaneas densius, se inordinatim agglomerati, eas varie convellunt, & deducunt, quo citius materiem morbosam excutiant, & foras depellant. Quapropter quatenus spiritus animales minime fugati, aut repulsi, sed extrorsum

conglobatim in tactus organa confluentes, ibidem *stertens* & tumultuarie se gerunt, atque fibras leniles velut titillando, in leves spasmos ciant, non voluptas, verum sentio molesta, quæ item nec dolor est, sed passio ab eo plane diversa exoritur. Quamprimum autem tritando aut scalpendo, spirituum copiarum ubique circa sensorium aggregatarum melius disponi, ac quasi in ordinem redigi incipiunt, maxime exinde voluptatis perceptio inducitur. Quare pruritus medius quidam inter doloris & voluptatis initia status, sive spirituum ab illius rudimentis versus hujus complementum transitus videtur. Verum à Physiologia hac parerga, ad pathologiam nostram revertamus. Ex supra dictis facile erit morbi hujus differentias colligere.

Primo igitur Psora quoad originem suam, aut per contagium accipitur, aut propter malam victus rationem, incendiculum & lomes ejus à chylo, & sanguine vitiosi communicatur, vel ob pudorem & transpirationis defectum in ipsa cute generantur: quibus addere licet, infantes quandoque hanc labem à parentibus hæreditario contractam nancisci.

Secundo eruptiones cutaneæ quoad formam suam, juxta diversimodas affectorum constitutiones variant: nam in quibusdam temperamenti siccioris biliosi aut melancholici, scabies tantum sicca, & quatenus ob seri defectum minus evaporat, cum pruritu non adeo molesto excitatur: in aliis vero temperamento humidiori, & sanguine impuriori præditis, exanthemata plurima ichore imbuta, & summe prurientia, ad scalpendum valde irritant, & propter ulcera inde concitata, pruritus subinde in dolorem commutatur.

Quoad *prognosin*, licet hic morbus ex se nunquam exitialis, aut valde periculosus, & curatu semper facilis existit: attamen sæpe malum eventum habet; in quantum scilicet diu continuatus, & sanguinem & liquorem nerveum summe depravat, atque ab eo confestim sanato, propter materiem, dum poris excutitur, intus susceptam, præcordiis & cerebro, aliisque partibus nobilibus labes perniciose infertur.

Maximum à scabie periculum pueris & cachecticis imminet; utpote in quibus utrisque, labes ab humore cutaneo partibus nobilibus facilius imprimitur, quæ deinceps cum lues exterior *varicella* deletur, intus manens, non nisi larga pharmacia, (cujus neuter capax aut patiens est) penitus expugnari potest; quapropter tales omni cura & diligentia adhibita, à scabiei tanquam à pestis contagio præservari debent.

Circa scabiei sive Psoræ *curationem* dux occurrunt primariæ indicationes, ac utraque duplex, viz. prima *cursatoria* hæc duo respicit, ut humor glandulosus (fermento ejus corruptivo penitus extincto) ad debitam crasin reducat. Secundo dein, ut ipsius cutis pori & meatus, concretionibus ichorosis liberati, conformationem pristinam seu *id est* recuperent.

Indicatio secunda *præservatoria* hæc duo præcavet, sc. primo, ne Psoræ impuritates & miasmata corruptiva è cute (dum fermentum expugnatur) excussa, in sanguinem ac liquorem nerveum regurgitent, illisque non tantum dyscrasias, sed insuper (ut sæpe assolent) cerebro



Aut præcordiis noxam graviores inferant. Secundo item navetur opera; ut humorum & partium nobilium labe a materie prius contracta, dum cutis vitia emendantur, eradicari possint.

Omnes hæc medendi intentiones, per remedia tum interna, tum externa simul usurpata, una complicari, aut saltem intercalari debent; nempe ut materies morbifica loculis suis excussa, in nullas usquam latebras secedere, & delitescere queat, quin ex omni parte: intus & foras per medicamenta, impetita in totum amoveatur; itaque purgantia hanc medendi methodum inchoare semper & finire debent. Quamquam Helmontius pharmaciam cathartica cum magna pompa exagitat & quasi triumphatam ducit, quia per se scabiem non curat, affirmare tamen licet, morbum hunc sine medicina ista, vix unquam facile, nunquam vero tuto sanari. Porro *Phlebotomia*, nili aliquod contradicat, mox ab initio celebretur; insuper his *alterantia* quæ sanguinem purificant, & viscera corroborant, ac contra materia *phlogistica* incursum muniant, vices suas habeant; atque interea linimenta, aut Balnea, aut alius generis remedia Topica, & proprie cutanea adhibeantur: utpote sine quibus non tantum Cathartica, & *Phlebotomia*, sed & *Diaphoretica*, imò remedia quæcunque sanguinem ac humores evacuantia aut alterantia, incassum cedunt. Medicamentorum cujusque generis modo recensitorum, formulas quasdam selectiores subdemus. Et primo ad Catharsin rite moliendam, detur ab initio pharmacum purgans, aut emeticum; item post *Phlebotomiam* (si opus fuerit) celebratam, Apozema, vel cerevisia, cathartica, sumatur per 7. vel 8. dies.

℞. Electuarij diacarthami ℥ iij. spec. diacarthi cum Rhabarbaro ℥j. cremoris Tartari, salis absinthij, ana, ℥ss. Syrupi de pomis purgant. q. s. f. bolus sumend. cum regimine. Vel,

℞. Sulphuris Antimonij gr. vii. Scammonij sulphurati gr. viii. cremoris Tartari ℥ss. f. pulvis.

℞. Radic. polypodij qu. lapathi acuti præpar. ana ℥j. foliorum sennæ 3x. Turbith, Agurici, Epithymi, ana ℥j. sem. Carthami ℥ss. santali citrini ℥ij. sem. anisi, carvi, ana ℥ij. incisa & contusa digerantur clausæ & calide in vini albi ℔ iv. per xxiv. horas, liquor clarus effundatur, sine expressione, dosis ℥ vi. per se, vel cum cochl. j. Syrupi ex Epithymo.

Vel. ℞. Ingredientia prædicta, & coquantur in aqu. font. ℔ vi. ad medietatem, dein adde vini albi ℔ j. & statim coletur. f. Apozema, detur eodem modo.

Vel, ℞. Radic. Polypodij qu. lapathi acuti, ana ℥ iij. sennæ opt. ℥iv. Epithymi, Turbith, Mechoac. ana ℥ij. santali citrini ℥j. sem. coriandri ℥vi. f. a. præparentur, f. sacculus pro iv. congiis cerevisiæ, post v. vel vi. dies hauriatur, & sumatur ad ℥xii. plus, aut minus, omni mane per viii. vel x. dies.

Pro potu ordinario dolichum iv. congiarum impleatur cervisia tenui, cui imponatur sacculus sequens.

℞. Summitatum Tamarisci, sumariz seccar. ana M. iv. Radic. lapathi acut. seccar. ℥vi. corticis solani lignosi ℥ij. incisa & contusa, misce.

Vel, sumatur Bochetum ex decoct. Sarsaparil. santalo, cum rasur. eboris C. cervi, liqueritiz, &c.

11. Ad remedia alterantia quod spectat, præter cerevisiam medicatam pro potu ordinario, non multis aliis opus videtur, sed tantum ut recta victus ratio observetur, vitando cibos saltos & piperatos, pisces crullatos, aliosque muria conditos; etiam a vino, aquis ardentibus, cerevisia fortiori, & a liquoribus quibusq; sanguinem incitare nimis ac fermentare aptis temperetur. In psora contumaci & corpus cacochymicum occupante, expediet electuarium sequens cum aqua destillata bis in die exhibere.

℞. Conserv. sumariz, radic. lapathi acuti, ana ℥ iij. Trochisc. de Rhabarbaro, specierum diatrion sant. l. ana 3 i β. salis absinthij, ℥j. Vitrioli Martis ℥iv. cum f. q. Syrupi e cichoreo cum Rhabarbaro, f. Electuarium, dosis ℥j. ad ℥ij. bis in die superbibendo aqu. destillat. sequentis ℥ iv.

℞. Summitatum Abietis M. vi. sol. sumariz, Agrimoniz, Elatines, Epaticæ, Becabung. ana M. iv. Radic. lapathi acuti ℔ ij. corticis sambuci M. ij. cortices exteriores vi. Aurantiorum. Incisis, & contusis affunde feri lactis cum cerevisia media facti ℔ viii. destill. organis communibus, liquor totus misceatur.

11. Unguenta cuti illinenda communissime, & efficacissime, pro scabie curanda præscribi solent; attamen quæ aliis plerisque tumoribus, aut ulceribus adhibentur, minime hic juvant; verum *Sulphur*, ejusque præparata, in hoc morbo virtutem quandam specificam habere videntur, adeo ut linimenta fere omnia *phlogistica* ingrediuntur, & totius compositionis basis sunt. Receptum apud vulgus maxime tritum est hoc.

℞. Pulveris, aut flor. sulphuris ℥β. Butyri non salici ℥ iv. Zinzib. pulv. ℥β. f. linimentum.

Paulo elegantius, etsi non multum efficacius ad hunc modum præscribitur.

℞. Unguenti rosacei ℥ iv. Sulph. vivi pulv. ℥β. olei Tartari per deliquium q. s. f. linimentum, cui odoris gratia adde olei Rhodii.

Si quando sulphuris energie aliorum adjectorum virtute corroborari, aut intendi debet,

℞. Unguenti emulati sine Mercurio ℥ iv. Pulv. sulphuris ℥β. olei Tartari per deliquium q. s. In eundem linem unguent. ex radic. Oxylapathi in butyro, vel oleo, cum vino albo ad vini consumptionem coctis, cum sulphure & oleo Tartari componitur. Porro unguenta ista interdum per se, curiosioribus tetrum sulphuris odorem abhorrentibus sæpe cum fructu usurpantur.

3. Tertium linimenti *antiphlogisticum* genus fit ex Mercurio, nullo præterea sulphuris, aut vegetabilum satellitio indigens. Quin ex se hoc nimis efficax, non toti corpori, sed brachiorum, & crurum solummodo juncturis applicari, aut cingulo inclusum circa lumbos gestari solet: ita namque de scabie curanda spes fere nunquam deficit. Attamen periculum est ne praxis hæc (uti sæpe assolet) symptomata mala, & perniciofa inducat; nam e litu Mercuriali salivatio frequenter, quandoque item scotomia. vel affectus soporosi, aut convulsivi succedunt. Porro nonnunquam charmæci virus intra præcordia, aut viscera, horrendos *Asthmas*, *leipsothymias*, aut *dysenterias* affectus producit.



Unguenti Mercurialis ad pruritus formula vulgaris, & maxime usitata hæc est.

℞. Hydrargyri cum acido in minutias redacti ac ( ut dici solet ) extincti ꝑ. β. pinguedinis porcini recentis ꝑ. vi. incorporentur optime, dia terendo in Mortario lapideo, aut vitro.

Nec tantum sub forma linimenti, sed & pluribus aliis modis prædicta medicamenta uti pari solent. Nam Cinnaberis ( quod ex Mercurio cum sulphure paratur ) carbonibus injecti fumus ore exceptus, aut corporis superficiem feriens, Pforam curat. Aq. Mercurialis cosmetica superius descripta subduplo imbecillior, sicuti in locis maxime ulceratis cum petia applicatur, scabiem omnem tollit. Attamen horum usus non usque adeo tutus est, ut passim omnibus adhibeantur.

Ex sulphure, ac vegetabilibus, vel serosim utriusque sc. per se vel conjunctim, aqua incoctis Balnea parantur, quæ non lavacri communis ritu, cutis tantum sordes eluendo, sed & fermentum ejus destruendo, morbum hunc sanant. Insuper his, restat adhuc alius facilior, & multo elegantior pruritus sanandi modus, nempe ut camisia aquæ fontanæ cum sulphure pulverisato incocta, & per solem, vel ignem exiccata, super nudum corpus per quatuor vel quinque dies gestetur; ita nimirum morbus ille sine balneatione, aut litus squalore, aut male odore, curari solet.

Quod si horum Ætiologia inquiratur, & imprimis quare sulphur adeo specificum Pforæ Antidotum sit, ut pauperes & plebes ( quibus alia pharmacia utendi deest copia ) contra affectum istum tantummodo sulphuris pulverem cum lacte intus sumunt, & cum butyro exterius adhibent: dico hujus rationem superius, ubi sulphuris virtutem erga pulmones Balsamicam explicavimus, ex parte ostendi. Illud nimirum in utroque casu prodest, quatenus sanguinis, & humorum aciditates, ac asperitates quasvis exoticas, & corruptivas destruit, ac unicuique latici indolem benignam, scil. mollem & quasi oleosam restituit: atque ita sulphuris particule quoquo modo exterius applicatæ, cutis poros facile subeunt, atque intus admixtæ protenus in ichorem ulcerosum illic scatentem agunt, sales inibi præpollentes mortificant, & latici cutaneo n. curam Balsamicam, deinceps ut bene congruat cum sanguine & sero continue affluis, conciliant.

Quoad *Mercurium*, nihil mirum est si medicamina ex eo parata, cutis loca, ubicunque applicentur, *furunculæ* persanant, siquidem hac applicatione exanthemata, & ulcera quævis cacodæthæ, sc. venerea, & scorbutica dnrque perdomari solent. Porro nec res stupenda est, quod Pharmaca hæc privatis quibusdam locis adhibita, dummodo salivationem erient, pruritum universalem curant; at verò quod sine sputo talem effectum producant, uti cum zona hydrargyrum includens circa lumbos gestata totius corporis scabiem tollit, idque interdum sine ulla evacuatione sensibili, aut noxa exinde concitata, hujusmodi ratio non ita facile patet.

Attamen pro hujus solutione dicendum videtur Mercurii particulas, fermenti cujusvis *furunculæ* extinctivas, cum privata cuipiam parti applicentur, illico istius loci scabiem tollere,

etque insuper à sanguine venoso susceptas, per totam hujus massam diffundi, & paulo postea per sanguinem arteriosum, non solum in eundem ubi suscipiantur locum regeri, sed quaqueverius extrorsum latas, ubique in totius corporis cute deponi, ibidemque scabiei miasma quodvis destruere: dein si forsitan contigerit particulas hæc Mercuriales, post medelam peractam rursus omnes cute evaporari, nulla deinceps salvatio, aliudque incommodum sequentur.

#### *De Impetigine, sive Lepra Græcorum.*

Post *Scabiem* cum *Pruritu*, agendum sequitur de affectu alio, huic ob pustularum eruptiones nonnihil affini, qui communiter *Impetigo*, à quibusdam *lichen* & *vitiligo*, atque ab aliis *Lepra Græcorum* appellatur. Hic uti diversa sortitur nomina, ita eadem ab Authoribus varie applicatur, & ab iis morbi speciem unam, ab aliis aliam designare perhibentur. Quare cum affectus hujus appellationes varie confundantur, & forsitan quoad naturam, & rationem ejus formalem in diversis regionibus diversimodè habuerit, neque prorsus idem sit in nostro hoc seculo ac fuit olim: idcirco non ex libris, sed ex propria Ægrotantium observatione morbum hunc describere satagam.

Impetigo ad hunc modum exoriri, & afficere solet, viz. imprimis papillæ, sive pustulæ rubræ modo singulares, modo plures congestæ, in variis corporibus partibus, præsertim veto in brachiis aut cruribus excitantur; quibus singulis ( morbo incrementum sumente ) undique novæ adjunguntur, & brevi ejusmodi molecularum plures velut aggeries, sive corymbi fiunt. Etenim papillæ juxta unamque stirpem, primo indies erumpentes, & latius usque serpentes, sese in orbem distendunt, adeoque exanthematum aggeries quasque ampliari faciunt. Cujusque harum superficies aspera, & nonnihil albidæ, & squamosa apparet, unde, si scalpatur, squamæ decidunt, & ichor sape tenuis exudat, qui tamen mox excitatus, in squamam rursus crustaceam indurefcit.

Hi papillarum corymbi primo exigui, & pauciores existunt; in brachio, aut crure, aliove membro singulari, tres forsitan, aut quatuor ad magnitudinem denarii, aut semidrachmæ apparent: postea vero, si morbus crescere sinatur, crebriores ubique erumpunt, quæ quidem, quoad areas sensim auctæ, postea coronam argenteam aquant aut superant, verum non semper rotundæ, aut figuræ regularis, sed variformes existunt. Porro in hoc ita non sinitur, in pleribus usque locis ebulliens, & latius ubique serpens, tandem hand solum membra integra, sed & totum corpus vitilagine leprosa obducet: atque hanc impetiginis speciem, sive gradum potius summum veteres propter efferationem ejus *æpæm* appellaverunt, & plerumque incurabilem censuerunt.

Hinc morbi hujus differentia præcipue innotescent; & imprimis, quoad morem ejus plus aut minus malignum, distinguitur, juxta quod propius ad scabiei, aut Lepre naturam accedit, vel statu medio se habet.



beat. Insuper notare est, affectum hunc quandoque membra quædam singularia, uti brachia forsan aut crura, corporis reliqui partibus intactis, infestare, interdum verò in iis omnibus simul incipere & ubique sparsim papillas, aut earum corymbos excitare. Porro huiusmodi eruptiones in quibusdam temporariis, adeoque diversimodis existunt; namque in his ferè tantum in hyeme infestant, circa ætatem evanescentes, item è contra in aliis quasi Brumam horreant, hirundinis adventum & exitum observare solent: in aliis verò plerisque hic morbus continuus, nullas inducias concedit, imò nullam remissionem, vel mediocritatem habet.

Porro impetiginem, à morbis aliis affinis, atque imprimis à scabie, & lepra distinguere oportet. A priori differt, quoad pustularum formas: namque in Pfora ubique ferè singulares, & spatiis licet exiguis, ab invicem remotæ existunt, hic plures conglobatim, & quasi per racemos magis intervallis sejunctos erumpunt. Verum inter hos affectus, discrimen maximum inde nascitur, quod scabies per contagium facillime & vix aliter exoriri aut propagari solet, impetiginis verò infectio tantum rara aut nulla est, ut miasma à viro uxorem, aut ab hoc illum assidue concumbentibus, minime transeat.

Hic morbus etiam à lepra discriminatur, tum quoad eruptionis formam, tum respectu contagii, quod in hac pariter activum est, ac in Pfora, ipsaque *scabie* multo imm maior, & horrenda est, viz. crustacea, & squamosa, ubique continua, & per totum corpus diffusa.

Hinc constat impetiginis causam materiam, non esse humorem mere cutaneum propter miasma ab extus susceptum, aut ob alias occasiones depravatum & à crasi sua degenerem; quia nimirum, non uti in Pfora per contagium facile aliis communicatur, neque statim per totum corpus dispergitur. At verò pustulæ circa morbi initia primo erumpentes, inde procedere videntur, quod in massa sanguinea concretiones quædam acidosalinæ (instar Tartari in vino) contingunt, quæ cum subigi, aut rursus dissolvi nequeant, hic in cutim, quemadmodum illi in dolii parietes, depelluntur. Huiusmodi concretiones donec parvæ ac pauciores fuerint, in membro forsan uno, aut altero, perque unicum aut alterum forsan arteriæ ramum in cutim convehuntur; dein quatenus natura, eundem quem coepit, excretionis modum continuare solet, materies per eadem vasa ad eisdem ubique nidos advecta, juxta pustulas primas, aliarum circumcirca confutarum aggeries facit; postea verò cum sanguinis dyscrasia, indies aucta, materies ista Tartarea intra massam ejus uberius progignitur, plures ejus portiones per arterias alias, & tubinde alias exterius convehuntur; & propterea pustulæ etiam plures, tum in aliis membris erumpunt quas nova materies per easdem arterias continue accedens, & juxta posita, pustularum aliarum adjectione indies ampliat ac undique dilatat; & demum si huiusmodi sanguinis Tartarus in immensum accrescat, per plurimas, aut simul omnes arterias extra delatus, in cute defigetur, & processu temporis superfi-

ciem ejus omnem incrustatione squamosa, aut plane leprosa obducet: atque tunc humor ipse cutaneus per totum corruptus, in morbi partes cederet; namque hic sanguinem & humores, dum inter circulandum pertranseunt, magis inquinando, seu potius venenando, materiem morbosam penum augeri faciet, quin etiam effluvia *venenosa* sive corruptiva à se dimittens, ejusdem morbi contagium aliis traderet.

Itaque affectus hujusce *causa* cum *procatarrhica*, tum *conjuncta*, in eo consistunt, quod imprimis absque ullo cutis vitio, sanguinem particulis salinis diversimodi statim ac indolis saturari contingit; (in cujus diatheseos causas *corruptivæ* mox inquiretur) atqui salia ista præsertim ubi fixa ac acida præpollent, (uti eorum mos est) se mutuoprehendunt, adeoque in coagula quasi Tartarea concrescunt; quæ portiones in sanguinem protrusæ, papularum eruptiones, quasi totidem morbi hujus nidos inchoant; dein illæ sensim juxta materiem supplementa tum numero, tum magnitudine indies auctæ, morbi hujus incrementum, & *auspiciis* producant.

Ad causas *corruptivæ*, & *evidentes* quod spectat, duo sunt præcipua occasionum genera, à quibus hic affectus plerumque originem sumit; scilicet mala victus ratio, & morborum aliorum, uti imprimis *scorbuti* ac *luis venereæ* male, aut minime curatorum miasmata in corpore relictæ. Singulorum ex his rationes paulo expendamus.

Quoad prius, præter communes circa dietam inordinationes, quibus nonnulli carnium salutarum, & dein sole, aut fumo induratarum esui, simulque vinorum acidorum potui nimis dediti, hunc morbum facile contrahunt; insuper vulgaris observatio est, plures in eum à carnis porcinæ, & piscium præcipue crustatorum comestione nimis crebra, aut assidua disponi. Prioris instantia satis notabilis est, quod potissimum in morbi hujus prophylaxin, cibis iste Judæis interdicebatur: dein alterius exemplum est, quod olim in Angliæ Cornubienses, oram fere undique maritimam incolentes, quatenus ex iis pauperiores ferè tantum piscibus vescerentur, affectibus leprosis plurimum obnoxii fiebant; in tantum ut propter horum sublevamen, multa in ea regione Nosocomia conderentur. Horum rationes ut paucis innuam, opinari subest utrumque cibum sive quæ rancidus, sive alias improporcionatus, sanguini nostro particulas non rite miscibiles, aut facillè domabiles convehere, quibus ita heterogeneis, & dein longo talis dietæ usu in magna copia aggestis, particulae cujusque generis salinæ se facillè associant, adeoque coagula Tartarea in cutem exterminanda, & affectus impetiginosi, aut leprosi semina constituunt.

Attamen uberrima ejus seges, à scorbuti ac luis venereæ miasmatis in corpore relictis, & demum quoad salium, ac sulphuris efferatarum combinationes ad *auspiciis* evectis progignitur. Morbi prioris, & speciatim symptomaticis prædictis eidem *improporcionatis*, rationes alibi explicavimus, quæ ad hypothesein modo propositam accommodatæ, magis elucescunt. Atque



que luis venereæ inveteratæ, imò interdum curari vix, ita passim accidit ejusmodi eruptiones pustulosas supervenire, ut nullus ferè huius affectus, morbi illius pudendi suspitione careat; saltem medici, quoties in tali casu consultitur, prima statim quaestio est, annon patiens iste labein veneream aliquando prius contraxerit; Enimverò sanguinis corruptelæ, postquam diutina mora heterogenæ prorsus, ac indomabiles fiunt, tandem particulas salinas sibi consciscunt, quibuscum in coagula ejusmodi Tartarea concrecentes, ac in cutim protrusæ, exanthemata impetiginosa producunt.

Quoad Prognosin hic morbus, etsi mortem; aut imminens periculum raro minatur, tamen postquam radices altius egit, curatio ejus perdifficilis aut nulla est: Impetigo primo incipiens, atque pustulas earumque aggeries, in membro forsan uno aut altero pauciores excitans, quandoque Therapeiam, sed vix sine Pharmaca efficaciori procurandam admittit; Sin morbus eo processerit, ut papillarum corymbi crebi, ac lati in toto corpore ipsam appaerant, tunc parva remedia nihil efficiunt; atque magna utcumque sedulo observata curationem non facile perficiunt. Quod si morbus, invitis quibusque remediis, indies in pejus evectus, tandem in affectionem quasi leprosam accrescet, pronunciat Celsus *hanc curare non posse, ideoque ab ea abstinendum esse.*

Circa Impetiginis Therapeiam dux sunt primariae Indicationes, scil. *preservatoria*, quæ morbi causam, & *curatoria*, quæ symptoma, viz. eruptionem pustulosam respicit. *Vitalis* in hoc casu nisi plane deplorato, ubi somnus ac vires deficiunt, raro locum habet. Medendi methodus semper incipere debet ab Indicatione preservatoria, quæ morbi causas per remedia interna amovendas procurat, secus enim exteriora ferè nunquam (ut in Psora) cum fructu adhibentur; attamen præcisis intra sanguinem morbi radicibus, efflorescentiæ cutaneæ cito emarcescunt: propter istas vero tollendas, alias procedendum erit ratione. quando Impetigo per se incipit, & nonnihil diversa quando icorbutio inveterata, aut luis venereæ malæ, aut minime curatæ supervenit; singulos hosce casus icorbuti & distincte perpendemus.

Quando igitur hic affectus simplex, & primarius, item adhuc recens fuerit, causæ evidentes & externæ amoveantur; mala victus ratio; & aeris insalubritas emendentur; itaque cibis salioribus, & porcorum aut piscium carnibus dudum ac nimis assueti, ad thuram *exurgit*, & *transit* transeant; porro oram maritimam, aut loca paludosa incolentes, auram deinceps sicciorem, & apricam hauriant; interea non minor potus ratio habeatur, vitando cerevisiam crassiorem, & fœculentiorum, atque vina tenuiora, & acida, Tartaro nimis repleta: demum caveatur ne potus, vel edulia, parentur ex aquis mineralibus lapidescere aptis.

2. Respectu causæ conjunctæ, & procatactiæ, dux sunt præcipue medendi intentiones; nempe ut viscerum, & humorum impurities cito expurgentur; item ut sanguinis, & liquoris, nervi, dyscrasiæ acidosalinæ; (quo

minus in iis materies Tartarea progignatur) in melius reducantur; propter quos lues, medicamenta tum evacuantia diverſi generis, tum alterantia præscribi solent. Attamen quia non omnia, sed remedia ferè tantum magna hic conveniunt, ideo quæ potissimum in & maxime prolicua deprehenduntur, sunt *Cathartica*, *Phlebotomia*, *serum lactis*, *acidula chalybeata*, *herbarum expressiones succulenta*, *decoctum ex lignis*, *medicamenta chalybeata*, & *salivatio*, cujusque horum formulas quasdam, ac utendi modos subdemus.

Imprimis itaque purgatione universali, & Phlebotomia, (quemadmodum in Psoræ Therapeia) celebratis, *infuso* sive *Tinctura Cathartica*, sequens instituatur, cujus dosiſ  $\text{ʒvi}$ , ad  $\text{viii}$ , intra 6. vel 7. dies repetenda.

℞. Radic. Oxylapathi siccat. polypodii qu. an.  $\text{ʒß}$ . sennæ  $\text{ʒx}$ . epithymi  $\text{ʒvi}$ . Rhabarb. Mechoac. ana  $\text{ʒß}$ . santali citrini  $\text{ʒij}$ . spicæ celticæ  $\text{ʒß}$ . salis Tartari  $\text{ʒij}$ . ponantur in vitro cum vin. albi lib. 5. Aqu. hortum sambuci lib. 1. stent. clausæ in frigido per dies 3. dein in usum depromantur effundendo quotidie q. s. liquoris clari.

Secundo ad sanguinem edulcorandum, ejusque sales eluendos, serum lactis simplex, vel cum sumaria, Cichoraceis, & Oxylapatho infusis bibatur omni mane ad lib. 2. vel 3. per dies 20. vel 30 si stomacho congruet; simulque vespere, & mane primo sumatur dosiſ Electuarii sequentis.

℞. Conserv. rad. lapathi acuti  $\text{ʒvi}$ . oculor. Cancri, Corallii præpar. ana  $\text{ʒij}$ . Eboris  $\text{ʒj}$ . Pulv. ligni A'oes, santal. Citrini, ana  $\text{ʒß}$ . salis prunel.  $\text{ʒij}$ . Vitrioli Martis  $\text{ʒß}$ . Syrup. c. Meco lululæ q. s. f. Electuarium, dosiſ  $\text{ʒij}$ .

Tertio propter eandem rationem, qua serum lactis, etiam Acidula ferratæ, contra hunc morbum præscribuntur, & non raro insigniter juvant, quippe cum cætera quavis medicamenta incassum cessere, cum his solis impetiginem gravem, & pene leprosam aliquoties curavi. Porro his etiam majoris efficacitæ gratia, salis prunel. aut vitriolis Martis, aut Electuarii modo descripti vius commode adjungatur.

Quarto in quibusdam sero nimio; & constitutione aquosiori præditis, ubi feri luctis, aut acidularum potus minus convenit, nonnunquam expedit, decoctum ex lignis horis medicis, ac insuper pro potu ordinario constanter sumi.

℞. Raf. ligni salicis, lib. 1. radic. sarsaparil.  $\text{ʒviii}$ . Santal. albi, ligni lentiscin. ana  $\text{ʒij}$ . rasur. Eboris, C. Cervi, ana  $\text{ʒvi}$ . Stanni, Antimonij crudi, ana  $\text{ʒiv}$ . in petia ligat. liqueritæ  $\text{ʒj}$ . f. a. infund. & coquantur in aq. fontan. lib. 16. ad medietatem, colatura servetur ad usum.

Quinto *Medicamenta Chalybeata*, quoniam inter remedia præstantiora passim habentur, raro in hoc morbo omitti, quamvis non sæpius cum fructu exhiberi solent: pleraque enim ferri præparata, in quibus particula sulphurea præpollent, quatenus sanguinem fermentant, inque effervescentias *excitant* cient, eruptiones impetiginosas augeri potius quam diminui faciunt; attamen sal. syrupus, Tinctura & infusiones vitriolicæ, quatenus sanguinem figunt, & salium efferationes nonnihil cohibent, me-



endi intentioni modo propositæ satis apte quadrant; sed potentia minores contra morbum adeo Herculeum minime valent.

Quamobrem, sexto, his & plerisque aliis remediis nihil juvantibus; multi *Salivationem* quasi Athletam fortissimum, ac tanto hosti unice parem commendant. Atiamen prægrandi huic expectatiori eventus non semper respondet; fateor enim me hoc remedium in quatuor personis impetigine graviore, & medicamentis aliis obstinatè laborantibus, sine commodo expertum fuisse. Quidam ex his per inunctionem ex hydrargyro, alique per catapotia ex præcipitato solari, in sputationem copiosissimam, quam per 20. circiter dies pertrulerunt, ciebantur; quò temporis spatio elapso, eruptiones omnes squamosæ, & papillarum Corymbi evanuerunt; nihilominus ad Therapeiam confirmandam potus diætericus ex decocto sarsæ, cum crebra sudatione subtus cratem & debita purgatione interjecta, institutus per mensem continuabatur: attamen hoc cursum finito, cum nulla tunc impetiginis vestigia relinqui viderentur, intra mensem alterum, novæ ejusdem morbi seges pullulare incipiens, brevi tempore ad solitam maturitatem accrevit. Porro cum unus ex iis hæc medicinam repetere, atque alter post duas morbi reciduas, eam vice tertia experiri voluit, uterque denum post immanes tot ærumnarum perpeffiones, de curationis spe decidit: unde constat lucem veneream, quamvis summe malignam, atque ulcera foedissima & Cacæthæz carnes ac ossa depalcementa excitantem, multo facilius certius quam Impetiginem sanari posse.

Cujus ratio si inquiratur, obvium erit concipere; posterioris hujusce Affectus causam, in miasmate maligno, & prorsus heterogeneo, sanguinem & liquorem nervosum ad tempus quoddam inficiente, & quasi venenante, eorundem verò crases non prorsus evertente, aut quoad futurum penitus depravante, consistere; quapropter à salivatione, aut dicta sudorifica, virus illud totum extirpantibus, atque superflue dein genuina sanguinis & humorum indole, cura peragitur: verum in Impetigine graviore, sanguinis particulæ elementares, & primitus constitutivæ corrumpuntur, adeo ut nisi harum crasis, & legitima diathesis restituantur, evacuationes quæcunque, atque materiz malignæ venenosæ, aut heterogeneæ cuiuspiam expurgationes, ut ut copiosæ, & eradicativæ, parum aut nihil efficient. Quare non immerito plerique olim celebres medici, morbum hunc confirmatum, ac ad lepræ confinia evectum, vix ac ne vix curabilem censuerunt.

2. Hunc morbum scorbutico inveterato supervenientem eventus nequicquam melior attendit; forsitan hinc medendi intentiones paulo certiores eliciantur, quando hic affectus, istius basis sive radix supponitur; nempe ut Indicatione Therapeutica primatiz inde sumpta, remediis antiscorbuticis potissimum insistatur; verum hujus generis acria, & calidiora, uti *cochlearia*, *Nasturtia*, *Rhaphanus Silvestris*, *piperitis* aliaque sanguinem nimis incitantia, quatenus crasin ejus plus dissolvunt, & coagula Tartarea ad cutim uberius propellunt, semper noxæ potius quam emolumento esse

deprehenduntur; atque ob hanc rationem, *Therinarum usus* sive *balneatio* in aquis calidis, quæ siquidem per diaphoresin copiosissimam totius corporis humores evacuat, atque cutis poros abiterget, ac summe mundificat, in hoc morbo valde proficua videatur, spissime in tantum à juvando abest, ut eruptiones exinde plurimum augeri, & exasperari soleant: novi enim plures haud graviter impetiginosos, Bathoniam, nostram ad Balneandum in aquis calidis profecto, inde prorsus leprosos rediisse. Quapropter, si quando hic affectus symptoma scorbutico *imperfecto* existit, acrioribus, & elasticis quibusque vitatis, temperatiora solum, atque *sale nitroso*, aut *viridico*, aut *volatili* prædita exhibeantur. Cujusque horum generis species & formulas quasdam proponemus; *sale nitroso* imprimis præpollent *Chrysalalum minerale*, *herbarum quarundam succi*, vel *decolla* & *acidula quædam purgantes*.

℞. Chrysalli mineralis, sive nitri summe purificat. ʒj. florum salis Armoniaci ʒj. simul trantur in mortario vitreo; detur ad ʒj ter aut quater spatio 24. horarum.

℞. Folior. sedi majoris Mij. contusa coq. in lactis recentis lib. ijss. donec in serum, & coagulum vertatur, colatura facta, liquor clarus sumatur ad lib. i. bis in die.

℞. Foliorum Taraxici Mvi. in massam contusa ponantur in olla hñili vitreata cum operculo, quæ clibano post panes extractos indita, stet per horas 6. vel 8. dein massa in colum effusa, liquor clarus effluat, cujus dosis ʒiv. ad vi. ter aut sæpius in die.

Fructus Cucumeris virtute nitrosa præditus, & per experientiam contra hunc morbum utilis probatur; quare loco Acetarii, ubertim & sæpe comeditur; porrò tres aut quatuor eorum in taleolas incisi, aquæ fontanæ lib. ʒ. per noctem clausæ infundantur, liquori clero effuso, adde salis prunel. ʒij. vel ij. dosis lib. ss. ter aut sæpius in die. In eundem usum etiam decocta ex foliis, una cum fructibus in aq. fontan. facta conveniunt.

Acidulæ sive aquæ quædam minerales Cathartice, cujusmodi imprimis sunt istæ de *Morth Hall*, Analysis per evaporationem facta, salem nitrosum quo imbuuntur manifesto referunt, earumque potum per plures dies ad iv. circiter libras assiduam, contra impetiginem leviozem juvare, aliquoties comprobavi.

2. At vero *Acidulas sale viridico* præditas, cujusmodi sunt *Spadenses*, atque nostrates *Tumbrigenes*, cum *Astropenses*, istis nitrosæ, imo & quibusque aliis medicamentis longè præstare, & pro curanda impetigine, plus valere; superius innui. Quibus, his utendi non datur opportunitas: aquas communes chalybe nostro imprægnatas, adeoque acidulas istas exactissime reterentes, bono cum successu, contra hunc morbum propinare soleo, Propter sales minerales, aut saltem ob particulas in iis mercuriales, usu venit, quod *Laurum* & *Antimonium* pro curanda impetigine à multis prædicantur. & cum aliis remediis præscribi solent. *Rasura stanni*, & *pulvis Antimonii* crudi in cerevisia pro potu ordinario infundantur: item decocta ex *sarsa* cum lignis contra hunc affectum instituta ingrediuntur.



3. *Salis volatilis*, pro impetigine graviori, imò plane leprosa curanda, virtutem insignem satis commendat *vipera*, ejusque preparatorum usus. Hoc morbi istius Antidotum, experimento casuali primo inventum fertur, quatenus nempe (uti Galenus refert) potus è lagenâ cui *vipera* imponebatur, ad quendam Elephantiasî laborantem, venenandum, ipsumque adeo è miseria sua liberandum datus; protinus in remedium cessit, & affectum neci destinatum, à morbo insanabili viso expedit. Huc etiam refertur Analogia, ab animalis hujus natura desumpta, unde colligitur ipsum in hoc morbo juvare: quandoquidem enim *vipera* exuviam suam squamosam quatuordecim deponit; ideò putaret quispiam, particulas ejus ad excutiendam leprosi pelliculam crustaceam valere; verum his, ut non multum tribuamus, quandoquidem ex crebra observatione constat remedia viperinâ in impetigine, ac lepra prodesse, certe juveninis ratio salî volatili, quo plurimo hoc animal præditum est, adscribi debet. Hujus enim particule, salia fixa, & acida in affectuum sanguine præpollentia destrunt, eorumque combinationes dissolvunt; attamen *Sal*, *Spiritus* ac *oleum* è viperis chymice extracta, ob particulas quas ab igne extrahunt empyreumaticas, & summe elasticas, in hoc morbo minime conveniunt, uti etiam nec *Spiritus*, aut *sal volatilis*, *Cervi*, *fuliginis*, *sanguinis*, alique consimilis *Armoniacki*; quia nempe sanguinem & humores supra modum exagitandos, eorum crases dissolvit, & corruptelas uberius in cutim propelli faciunt. Quare simpliciora *viperarum preparata* uti *insculâ* ex earum carnibus Aquæ incoctis; *po* in earundem infusionibus, aut incoctionibus imprægnati, atque pulveres ex iis siccatis & tritis confecti, contra hunc morbum utilius præscribuntur. Porro non tantum *viperarum*, sed alius generis *Anguium* ovipararum carnes elixæ, & loco cibi ordinarii comestæ, opem sæpe egregiam præstunt.

3. *Impetigo*, sive papillarum eruptiones squamosæ, & in figuras velut corymbeas efformatæ, *suis veneræ* inveteratæ, adeo frequens, & familiaris symptomata est, ut quosvis affectione istâ laborantes, annon aliquid istius malignitatis cuius consensum lateat, imprimis interrogemus; atque ita rem habere si deprehenditur, statim *specificum* contra hunc morbum quibusque ac *Antiscorbuticis* omissis, protinus ad *decocta ex lignis*, iisque parum, aut minime juvantibus, ad medicamenta ex *hydrargyro* deveniendum erit. Et quidem hac methodo, plures pro impetiginosis, & leprosis habitos, cumque aliis remediis ad hos morbos appropriatis diu incassum tractatos, & misere divexatos, facile ac cito curavi: atque hanc impetiginis speciem, ad luis veneræ, cuius appendix est; *Pathologiam* referimus.

*Indicatio secunda Curatoria*, morbum ipsum & symptoma primarium, sc. Eruptiones squamosas, & pustularum corymbos respiciens, *remedia Topica* cuti exteriori; propter affectus hosce tollendos adhibenda præscribit: in quem finem *balnea*, & *linimenta* imprimis conveniunt: quæ tamen nisi causa procacitætica, viz. *sanguinis diathesis Tartarea* prius expurgetur, raro aut nunquam per se juvant.

Hujusmodi *Topicorum* farrago ingens, tum apud Authores medicos, tum apud empiricos, & agyras vulgo prostat: quibus tamen universis, *Balnea* aut *linimenta* è pice liquida confecta, cæteris quibusque utriusque generis rem diis longe præstant, revera ut illis unicis, ni quod odorem valde tetrum emittunt, utendum fuerit; quapropter compositionum, & cum & sine pice liquida formulae quasdam subdemus.

Itaque pro *Balneis* usitatum est, *æquis* dolis, in quibus pix liquida includebatur, aliquandiu contentas, & infusione imprægnatas adhucere: vel;

24. Pice liquidæ lb 2. incorporetur cura cineribus albis, & cribratis in massam crassissulam, quæ coq. in aq. fontan. s. q. addendo folior. hederæ terrestris, fumariz, Marrubii albi, radic. lapathi acuti, Enulæ Campan. an. M. iv. f. Balneum cum regimine usurpandum: vel paratur hujusmodi decoctum, sine pice liquida. pro impetiginosis odorem ejus horrentibus.

*Balnea sulphurea*, tum *Naturalia* tum *artificialia* minus convenire, imò priora sæpius officere; crebra experientia deprehenditur: quin etiam *Balneatio* quæcunque caute admodum adhiberi debet: nam quatenus administratio hæc sanguinem exagitat, & effervescent, trasin ejus (uti modo dictum est) plus dissolvere, & corruptelas in cutim uberius suffundere periclitatur.

2. *Linimenta* quorum usus & tutior, & commodior est, triplicis sunt generis sive gradus, sc. *lenia*. *Mediocria fortissima*; cuiusque horum exemplar unum aut alterum proponemus.

1. Primo igitur in *Impetigine leviore*, ubi eruptiones & papillarum corymbi pauciores, & perexiguæ sunt, commendatur *saliva* jejuna; item liquor ex lignis viridibus, dum utuntur exudans; item mera tritatio cum radicibus lapathi acuti contus. & aceto macerat. Vel;

24. Olei Tartari per deliquium, olei nucum, vel Amygdal. amararum per expressionem, ana p. a. f. unimentum locis affectis bis in die adhibendum.

2. Secundi Generis linimenta; pix liquida ingredi, ac instar omnium haberi solet.

24. Unguenti rosacei 3vj. pice liquidæ 3ij. simul liquefacta misceantur. Vel,

24. Portionem carnis vervæcinæ pinguiorem, quæ frustis radic. lapathi acuti, consista, & veru infixa, assetur: atque interea; dum pice liquida sensim instillata continue imbutur, utriusque deliquium, in vase supposita exceptum, pro unguento ad impetiginem præstantissimo servetur.

3. Linimenta contra hunc affectum fortissima; sunt Mercurialia; quæ nimirum aut hydrargyro, aut præcipitato constant. Prioris formulæ, & compositio eadem sit, ac quæ supra contra scabiem præscribitur. Quoad alterum.

24. Præcipitati albi 3ij. unguen. rosac. 3ij. misce, pro litu partium maxime affectarum: horum usus in hoc morbo maxime suspectus esse debet; nam si forte sputatio ciebitur, materiæ poris cutaneis impactæ saburra perquam immensa movebitur, quæ si tota confertum nimis versus ductus salivales irruens; circa gutturus partes aggeretur, suffocationis periculum incurretur.



Ante aliquot annos *Virgo Illustris* familiaris, temperamenti calidioris, utpotè sanguine acriori, & falso originaliter prædita, postquam *Impetigini* perdiu, tere usque ab Ephebis obnoxia degisset, circa pubertatem, graviori modo, eadem laborare cepit; nam pustularum squamosarum Corymbi, non tantum brachia, & crura, aliasque corporis partes obtectas, ubique obfiderunt, sed etiam manus, & faciem, in tantum defædarent, illam ut in publicum incedere, cumque aliis ordinis sui conversari puderet. Remedia minora fere innumera, sine ullo successu adhibebantur; Thermarum usu primo melius habere visa, exinde tandem deterior facta est. Acidulæ Astropenses, quæ nonnullos impetiginosos integre sanarunt, huic parum, aut nihil opis contulerunt. Quapropter cum methodus quæpiam ordinaria minus affecisset, proposui demum ut salivationem, quasi remedium cæteris quibusque potentius (ac uti dicitur) ultimum, experiretur. Hunc consilio cum & patiens, & parentes ejus facile consentirent, statim corpore per Cathartum, & Phlebotomiam rite præparato, juxta morem nostrum, exhibui pilulas ex præcipitato solari per duos dies, & post unius intervallum, & Pharniaco tertia vice repetito sputatio copiosa & laudabilis incepit, & sine malo quovis symptomate per mensem processit; cui tamen in debito tenore sustinenda, artuum juncturis, & locis maxime affectis, modo his, modo illis, *litum subinde mercurialem* applicandum curavi. Ante cursum hunc finitum eruptiones omnes evanuerunt; nihilominus in medela confirmationes, simulque ob Hydragryri extirpationem, mensem alterum purgationi, sudationi subtus cratim, & dietæ ex decocto sarissæ, chinæ, &c. impendebat; quo tempore perfecte sanari visa, ita per quadraginta circiter dies perstitit. Dein vero quamvis exactam victus rationem observaret, morbus idem repullulare cepit, atque sentim accrescens, demum in statum uti prius *assurrexit*. Hoc verum eventu confusus, suasi ut à fluxu menstruo qui nondum eruptus, brevi expectabatur, alterationem in melius speraret. At tamen post longam inde moram, *istam* tandem eveniens, & deinceps regulariter habens, nullam morbi istius curam aut levamen, sed porius exacerbationem intulit. Quare iterum ad Pharnaciam recursus habetur, atque remedia divertimoda, cuiusque fere generis tentantur: quæ cum omnia incassum fuerint, efflagitabant amici, ut salivationis cursum de novo subiret; viz. in hanc spem adducti, methodum istam, quæ imprimis pro tempore brevi curarat, secunda vice adhibitam, pro longiori saltem, aut forsitan integre sanaturam. Itaque ex illorum votis, eodem sputationis, & sudationis cursu per bi-mestrem spatium repetito, indeque pustulis, & eruptionibus squamosis, ubique evanidis, puella insignis tunc de novo ad valetudinem recuperari videbatur. Verum intra sesquimensum, à medicina finita papillæ, earumque aggeries, sive Corymbi rursus apparent, atque sensim indies numero ac mole auctæ, tandem majorem quam antea totius corporis defædationem accivere: adeo morbus iste, Hydræ similis post unum caput amputatum, cum septemplex reviviscit.

Novi alium virum robustum, & habitu cor-

poris Athletico præditum, qui postquam Impetigine per multos annos laboraret, morbo tandem ingravescente, ac ad statum *evecto*, per totum corpus vitilagine alba, & quali leprosa obducebatur; ut unaquaque nocte, squamæ instar fursurum magna copia intra lectum decideret, in ætervos colligi potuerint. Hic curationis ergo, imprimis remedia cuiusque fere generis ordinaria, sine ullo tamen fructu tentabat; deinde vero salivationem ex Mercurio leviolem expertus, nihilo melius habuit; postmodum ea methodo repetita, à sputatione longa & graviori ad sanitatem restitui videbatur; verum intra tres menses, idem morbus repullulans brevi ad pristinam feritatem pervenit; quinimo cum tertia vice molestissimum illud medelæ genus subiret, affectus iste pro tempore quodam abigi visus, redibat; & deinceps invictus tum hac, tum alia quacunque methodo durante patientis vita, Tyrannidem suam exercebat. Non opus erit de *Lepra* hic quidquam disserere, quæ morbi prioris tantum gradus intentior, medelam fere nullam admittit. Quod spectat ad alios Tumores eorumque sc. species multiplices, & cuiusque illorum Ætiologias divertimodas, fateor me vix continere posse, quominus in amœnissimum hunc speculationis campum descenderem. Verum hoc perinde *ac inolens* videatur, ac si quis longo cursu defatigatus, ac ad finem anhelans, ultra metam excurrens, illico stadium inchoaret novum. *Hælenus Clar. Willisus. Sequuntur jam alii.*

*De Maculis quibusdam levioris momenti, quæ Ephelides, Lentigines, & Hepatica vulgo nuncupantur.*

1. Inter Affectus merè, aut saltem maxima ex parte Cutaneos primo occurrunt maculæ, *Ephelides* vulgo, Nostratibus *Sproetelen* nuncupatæ, quæ Vere & Ætate, quoniam ab Inolatione potissimum excitari solent, plurimum increbescunt, atque circa Hyemen rursus evanescent.

2. Sed cum in Formosioribus, ac cutem rarissimam habentibus maxime contingant, in iis præcipue locis, ubi cuticula, soli & aëri exposita, densissima est, scilicet in facie ac manibus maxime erumpunt. Porro coloris subflavi aut fusci, ad magnitudinem morsus pulicaris, inæquales tamen, & quoad figuram irregulares existunt. Atque hæc Maculæ parum aut nihil differunt à Puncturis illis subfuscis, aut flavis, quas nonnulli *Lentigines* vocant, quæ lentis magnitudinis faciei partes crebris quasi guttis insigniunt.

3. Harum Macularum Materies seu Continens Causa videtur esse, *Biliosi Humoris tenuior portio, vi Solis illam attenuatur, & poris cutis aperientis, exterius prolestat*; quæ evaporare incipiens, in cute exteriori, aut cuticulæ, quam pertransire nequit, concavo deligitur. Et certe maculas hæc à Bile, similibusve Havis Sanguinis Recrementis procedere indicio est quod maxime familiares sint iis, quorum pili flavescunt.

4. Equidem præter exiguas hæc Maculas Lenticulares & Ephelides, aliz insuper occurrunt multo ampliores, palmæ longitudinem ac latitudinem nonnunquam exæquant, quæ



cutem variis in locis, præcipue circa Pectus & Dorsum, lituris modo fuscis, modo luridis, aut subnigris coniprescant, ac *Hepatica Macula* nominatim solent, usque plurimum insigniti, jectum minus sanum, aut saltem haud bene sanguisquam habere creduntur: quod tamen sub hac ratione verum non est; ac solummodò quatenus humores biliosi, cum non satis intra hepar à massa sanguinea seceruntur, ad cutem protrusi eam ita discolorant.

5. Lituræ istæ potissimam tempore æstivo apparent, & maxime supra pectus & dorsum, viz. quo tempore, & quibus in locis ad sudandum homines sunt plurimum apti: ipsum nimirum sanguinis serum, quod feculentias istas è cruoris massa in cutis angustias provehit, eas penitus evaporare inidoneas, illic relinquit.

6. Affectus hi quoad valetudinis statum, nihil mali indicant, aut ominantur; & quamvis Ephelides, Lentiginisque nonnihil turpitudinis reterunt, id tamen compensatur, quatenus ita maculæ puriori constitutione præditi observantur.

7. Ad Curationem verò horum Affectuum quod attinet; cum Maculæ hæc plerumque sint criticæ eruptiones, Pharmaca intus sumenda, quibus illarum Materies, seu Continens Causa tolli possit, vix ulla occurrunt; nisi quod sudoriter. Blanda aliquando Usurpata biliosihumoris recrementa, in cute, aut cuticulæ concavo delixa, magis evaporare faciant. Sed ad Ephelides, Lentiginæ, & Maculas Hepaticas tollendas, Ars Cosmetica propriè spectat: & propter hæc cutis deturpamina delenda, sine quavis medendi methodo, Medicamenta quibus cuticula decorari solet tantum præscribuntur; quorum apud Domicellas, Aliosque de cute curanda Sollicitos, ingens ubique & uberissima est leges. Ea tamen omnia, quatenus duas solum medendi intentiones respiciunt, ad bina hæc capita reduci possunt: illa nimirum aut cuitis ac cuticulæ poros aperiendo; atque hanc interdum excoiando, humorem foras attrahendum & profus evaporandum moliantur, vel e contrario, & sæpe non minore cum successu adhibentur illa, quæ materiam maculosam è cute reperiunt, ac intus adigunt.

8. Primum igitur ad cutem detergendam, & macularum materiem foras extrahendam, sequens conducit Linimentum.

℞. Unguenti Rosacei ℥ij. Florum Scinci; hoc est, Magisterii Marcassitæ ℥ij. Miscantur exactè pro latu, quo vesperi Faciei inungatur, hinc mane cum panuo laevo mundo denuò detergeatur.

Etiam Facies subindè lavetur Aquâ Florum Fabarum, cui admixtus Liqueor Tartari; siquæ Aquam hanc efficacem magis desideremus, aliquot guttulæ addantur Aquæ Aluminosæ seu Mercurialis.

Cl: Willsius *Pharmacut. Ration. part. 2. sect. 3. cap. 5.* illud præscribit;

℞. Lixivæ Sale Tartari minus saturati ℥iv. Olei Amygdalarum Amararum q. s. idque in tali proportione misceatur, ut totus liquor laesceat. Cum hac mixtura Partes hujusmodi Maculis Affectæ mane & vesperi illinantur, ac blandè fricentur.

9. Sed ad Maculas è cute discutiendas, ea-

rumque materiam repellendam intusque adigendam, Lac Virginis à pluribus commendatur, quod ad hunc modum sæpe conficitur; viz. Solutio Lithargyri in Aceto Destillato facta ab affuso oleo Tartari per deliquium parato, in liquorem lactis instar albicantem præcipitatur; quo facies bis in die lavetur & blandè fricetur.

Vel ℞. Camphor. ℥ij. Teratur in mortario vitreo, sensim affundendo Succum unius Limonis, dein adde Vini Albi ℔j. M. exactè, & detur usui.

Vel ℞. Benzoini optimi ℥ß. Spermat. Cæri ℥j. Spiritus Vini summe rectificati ℥iv. Stent in Digestione per aliquot dies, dein fiat per Chartam Emporeticam Colatura. Hujus liquoris (rubicundi) tantillum misceatur cum Vino albo Gallico, (quod illico laesceat) quod facies lavetur, & blandè fricetur.

Forestus lib. 31. obs. 1. pro Faciei Maculis hanc commendat Aquam;

℞. Albumina ovorum ad duritiem coctorum, eaque more Chymico destillato, & liquorem destillatum usui servato.

Idem lib. 5. Obs. Chirurg. 4. ad delendas Lentiginæ mirum in modum extollet Aquam è Cochleis destillatam.

Ad easdem maculas tollendas vult Sennertus prax. lib. 5. part. 3. Sect. 1. cap. 3. facies ut sæpius abluatur Aqua Florum, Sambuci & Fabarum, cui aliquid Camphoræ in Spiritu Vini Solutæ addatur.

Platerus prax. med. tom. 3. libro primo capite secundo ad faciem decorandam proponit Aquam, qua Maria Medicea Regina Mater uti solebat,

℞. Tres Capones albos statim post jugulationem; axungia detracta, concisos, Cales duos recentes ex lacte caprino confectos, Pulpam sex Limonum corticibus detractis, Albumina octo Ovorum Boracis, Sulphuris an. ℥ß. Camphoræ ℔j. Aqu. Florum Fabarum, Nymphæ an. ℔j. Collocentur in B. M. atque in alembici rotulo aliquot grana Moschi, Destillentur S. A. & liquor extillans servetur usui; eaque sub noctem facies lavetur.

10. Attamen scemina curiosiores vix ullis nunc remediis cutaneis, nisi Mercurialibus contentæ sunt; quapropter sequens Aqua ad pleræque Faciei turpitudines summo opere commendatur,

℞. Mercurii Sublimati ℥j. Pulverisetur & ponatur in vase stanneo cum Aquæ Fontanæ ℔ij. Stent per xxiv. horas, cum spatula lignea subindè agitando, donec totus liquor nigrescat, qui tamen per chartam empetoricam colatus limpidus evadit: cum petia aut pluma hinc intincta facies semel intra diem unum aut alterum blandè obducatur.

Hujusmodi medicamentum contra turpitudinem quamcunque cutaneam insigniter juvat; quatenus nempe humores intra poros, & foraminula ut ut minutissima impactos expedit, totamque ubi applicatur cutem, quoad meatum ejus malè conformatum, restituit. Sed quandoquidem hydrargyri particulæ, unâ cum salibus (à quibus in minutias dividuntur, acerviunturque) faciei applicatæ, materiam de-

scida;



sedatorem intus repercussam inaequuntur, sicque sanguis & lymphæ se facile inmutant, hinc & gravia æconomiz animali non raro patiuntur incommoda, Cosmetica Mercantilia haud immerito mihi admodum suspecta sunt.

II. Porro accidit interdum, pleraque faciei partes, præsertim vero nasum & frontem, Punctis Nigricantibus creberrimis, quali a pulvere pyrio exploso multis, insignitis, idque procedit, quod pori cutanei, seu valculorum sudoriferorum ostia, humore atro crassiore, vermiculos nigra capita habentes referente, implentur; atque in tali cutis affectione lotiones, & litus nulli præter Mercuriales prodesse solent.

### De Herpete.

I. Post Affectus Cutaneos simpliciores, qui nempe sine tumore aut exulceratione contingentes, Cutem solummodo Maculis descendant, jam ordine agendum erit de Affectibus gravioribus, & continuitatem solventibus, atque imprimis de Eo, qui ab Effectu & Symptomate Græcis Herpes dicitur; viz. a serpendo, quod nimirum proserpere videatur, quodque una parte sanescente, morbus in proximam serpat: Arabibus *Forica Corrosiva*, C. Celso Ignis Sacer nuncupatur. Est autem Herpes Tumor, sive Pustulosa Inflammatio cum pruritu & rubedine, partem, in quam serpit, exulcerans: vel dicatur, Tumor Biliosus, qui cutem serpentibus minimis pustulis exasperat, roditque.

II. At verò Herpetis Species duæ sunt. Primamque Simplex est Herpes, qui intra cuticulam consistens minimis pustulis, nulli semini similibus, cutis superficiem exasperat, unde Herpes miliaris, Belgis *Springend vuer*, *ofte voorickrypenden Haar-vorm* nuncupatur. Vel est Exedens, Græcis *ἰσχυρὸς*, qui ipsam exulcerat cutem, lateque in ambitum serpit, cujus medium citius sanatur, quam extrema, nostratibus *Inetenden Haar-vorm*.

III. Veruntamen Ignis Sacer C. Celso dictus, fit maxime in pectore, præcordiis, aut lateribus: estque hic affectus, cujus meminit Ampullæ: Iulpius observat. med. lib. 3. cap. 44. quippe Plinio Zoster, Scribonio Largo Zona, Nostratibus *Ommeloope* live Ambitus nuncupatur; quod in extimo Diaphragmatis ambitu variis circulis, diversimodè dispersis, hominem aliquatenus ambit.

IV. Affecta igitur Herpetis Miliaris Pars est Cutis Superficies seu Cuticula. Herpetis vero Exedentis Tota Cutis, cum species hæc integram cutem ad subjectam usque carnem soleat exulcerare.

V. Efficiens autem, & Conjuncta Herpetis Causa est Humor tenuis, biliosus, acri-salinus, simulque glutinosus, qui sanguini inexistens ab eodem secernitur, ac cum eo ad corporis superficiem per malam crisin propellitur: impeditur tamen in sui excretionem per poros cutaneos ob admixtum ipsi humorem glutinosum, nec non poros in cuticula, quam in cute arctiores, hinc circa cutem sub forma pustularum hæret, unde vitiosa ibidem contingit effervescencia, & quidem calida, ob

quam summus in parte affecta Pruritus & ardor deprehenditur. Talis porro noxius humor in corporis superficiem expulsum, amplius ibidem vitatur, quoniam allabentis sanguinis partem simul corrumpit, & pruritus ac dolorem in vicinis partibus excitat. Cuique humor hic cuti inhærens sit tenuior & minus acris, Herpes oritur Miliaris; sin acrior magisque glutinosus, Herpetem producit Ferrum, Exedentem.

VI. Cæterum Herpes cum sensibus pateat, non ita difficulter cognoscitur: est enim tumor latus, sine omni fere altitudine, ut vix attollatur pars, potiusque exasperari quam intumescere videatur. Adiunt præterea pustulae exiguae, nulli semini similes, calor, pruritus, & quamvis pustularum quædam sanantur, aliae tamen oriuntur, ut malum ad vicina proserpere videatur. Si pustulae rumpantur ichorosis effluit humor; estque subrubicundus locus affectus. Ferus autem, seu Exedens dicitur Herpes, cum ulcuscula serpentina ac foraminula multa apparent, quæ tamen ultra cutem non procedunt; seu, ut C. Celsus lib. 3. cap. 20. ait, est malum cum summa cutis excoriatione, & exulceratione sine altitudine, latum, sublividum; inæqualiter equidem, mediumque sanescit extremis procedentibus; atque non raro id quod jam sanum videbatur, iterum exulceratur.

VII. Herpes porro periculosus affectus non est, nisi sit valde exulceratus: nihilominus tamen difficile curatur, & non raro diuturnus est morbus. Atqui prout humor ille, è quo oritur herpes, mitior vel acrior, magisque vel minus glutinosus, eo etiam magis vel minus periculosus est.

VIII. Equidem ut Affectus hic tuto curetur, ratio habenda est & Causæ Antecedentis, & continentis Partisque Affectæ. Atque ad Causam Antecedentem quod attinet; quum ex humore tenui, bilioso, acri-salino, simulque glutinoso Herpes oriri soleat, hic imprimis per convenientem rerum nonnaturalium usum est corrigendus, deindeque e corpore purgandus: nisi enim totum corpus exactè purgetur, nunquam Patiens perfecte sanatur & quamvis uno in loco adhibitis Topicis Medicamentis pars sanescere videatur, in partibus tamen vicinis denuò malum sese prodit.

IX. Dietam itaque quod spectat; Aer, Cibum & Potus sint Refrigerantes: nocent omnis generis Acris, Calid., Salis, Fumo siccata, Pinguis, Dulcis, similiter & Motus Corporis nimius, Vigiliæ, Alvi Durities, Venus, Ira.

Insuper summè utilis hic est Purgatio, quam biliosi, acri-salini, ac glutinosi humores, in partem affectam alioquin ruentes atque morbum foventes, toto è corpore vacuentur.

Eum in finem præscribi possunt Pulveres, Vinum Medicatum, Decoctum.

X. Cremoris Tartari 3 ii β. Tartari Vitriolati gran. xxv. Diagridii 3 β. M. F. Pulvis, dividendus in doses num. vii æquales, quarum singulis vel alternis diebus mane Patiens unum sumat cum iusculo.

XI. Rad. Helenii, Polypodii Querc. an. ʒij. Summ. Absynthii. Fol. Eupatorii Cannab. ana 3 i β. Cort.



3j β. Cort. Med. Sambuci siccat. Baccar. Juniperi an. 3 iij. Fol. Senae Mund. 3vj. Aloës, sem. Carum an. 3 i β. Incisa & Contusa dentur in Sacculo, suspendendo in Vin. Albi lb. iv. de quo quotidie mane Ager bibat cyathum.

℞. Rasuræ Ligni Guajaci 3 iv. Sassafras 3vj. Rad. Sassa-parilla 3 i β. Macerentur per noctem calidè in Aquæ Puræ lb. v. dein S. A. Coq. add. Rad. Lapathi Acuti rec. 3 iij. Herb. Fumariæ Mj. Chamæpitheos Mj. Pulpæ Colocynthidis 3j. Liquiritiæ rasæ 3vj. Fiat Colatura lb. iij. de qua semel vel bis quotidie Aegrotans bibat. Venæ-sectione hic non conducit, nisi in Plethoricis. Theriacum ac Acidularum Usus sæpe singularis est: Tales enim Aquæ debito tempore sumptæ tuto eum Affectum tollunt.

Decoctum Sassa-parillæ, Chinæ, &c. continuò usurpatum, plurimum etiam valet ad vitiosos illiusmodi humores corrigendos, atque, transpiratione aucta insensibili, provocatiue liberius urinis, consumendos; hinc & Sudorifera quoque huic morbo curando multum conducunt.

10. Ubi jam Causæ Antecedenti satisfactum est, ad ipsam Continentem accedendum; cui tollendæ multum sæpe efficimus inunctâ Salivâ hominis jejuni, cujus ope acris, biliosus, glutinosusque humor cutis porositatibus inhærens attenuatur, resolvitur.

Scribit Barbette, summo cum successu multoties adhibitum se vidisse Pulverem Lapidis Scissilis cum Aceto mixtum.

Sunt qui Sinapi usurpant cum Butyro liquefacto & affato, quibus Alii Pulveris Pyri aliquid addunt.

Ipsa Urinæ affectui huic sanando prodest aliquando.

Multum sæpe efficimus Lavamento ex Aqua Pura, cum Sale Communi, & Vitriolo Albo. ex. gr.

℞. Aquæ Pluvialis lb. ij. in ea dissolve Salis Communis 3 β. Vitrioli Albi 3 ij. pro Lavamento.

refert Aquapendens, aliquoties se feliciter usum fuisse Aquis Theriacum, quæ brevi tempore sanant Herpetem: atqui ubi desunt theriacum aquæ, sumit Aquam Marinam; aut Aquæ Salitæ admiscet Sulphur & Alumen atque in hac membrum effectum detinet.

Summoperè quoque morbo huic curando conducit inunctum Unguentum Enulatum cum Mercurio, quod pustulas tabefacit, exliccat, ac viscidum glutinosumque humorem absorbit. Conducit & hoc,

℞. Unguenti Rosacei 3 ij. Mercurii Præcipitati Albi 3 ij. Misceantur exactè pro Litu.

Vel ℞. Butyri affati Unguenti Nutriti, Populei an. 3 β. Sulphuris Vivi pulver. 3 i β. Crete albæ 3 β. M. F. S. A. Linimentum.

Pulvis Crete cum Lactis Cremore mixtus, & illitus hunc affectum non raro sanat, præmissâ fomentatione calidâ cum Vapido Vino Gallico.

Joan. Heurnius pro Herpete commendat Focem Vini inter duo lintamina applicatam.

Hartmannus in Praxi Chymiatrica cum linteo disseperto applicat Aquam Calcis Vivæ, cui aliquando Alumen Dulce, aliquando Saccharum Saturni addit.

Folia Tussilaginis viridia membro affecto im-

posita, identidemque renovata, Herpetem nonnunquam sanant.

Equidem sequens Lac Virginalè huic Malo Curando admodum conducit, si Agra ars cò frequenter lavetur & blandè fricetur,

℞. Rad. Hellebori Albi, Enulæ Campanæ, Iridis Florentinæ, Althææ an. 3 β. Pulpæ Colocynthidis 3 ij. Fol. Sabinæ, Nicotianæ an. 3 iv. Aluminis Crudi 3 j. Lithargyri 3 iv. Contund. & Coq. in l. q. Aquæ Pluvialis ad 3 xvi. colat. add. Aceti Vini 3vj. Misceantur Usui. Vel ita conciat,ur,

℞. Rad. Hellebori Albi 3 j. Althææ, Esulæ minoris, Enulæ Campanæ, Iridis Florent. an. 3vj. Fol. Sabinæ Mj. Pulpæ Colocynthidis 3ij. Aluminis Crudi 3 β. Sem. Staphisagriæ 3vj. Lithargyri 3vj. Ciner. Ligni Quercini 3viii. Coq. in l. q. Aquæ Pluvialis ad lb. iij. colat. add. Aceti Vini 3vj. Misceantur.

In Herpete Pertinaci Barbette sequentia proponit.

℞. Unguenti Fusci Felicis Wurtzii 3 iij. Albi Camphorati 3 i β. Cerussæ, Sulphuris, Myrrhæ, Lithargyri an. 3 i β. Mercurii Dulcis, Æruginis an. 3 β. Olei Rosacei q. s. M. F. S. A. Unguentum.

℞. Lapidis Prunellæ 3j. Floris Sulphuris 3 β. Sacchari Saturni 3 i β. Olei Raparum veteris q. s. M. S. A. pro Linimento.

Aliquando in Pertinaci Herpete prudenter applicetur Aqua Aluminosa seu Mercurialis, secundum Pharmacopœiam Ultrajectinam, vel sola, vel potius additis Vino & Aqua Pantaginis magis temperata, cujus vires & facultates in huiusmodi affectu curando non semel observavimus, Sed notandum in iis, qui sunt calidioris temperaturæ, hanc Aquam minus convenire, & facile Inflammationem excitare.

#### De Scabie, Eiusdemque Speciebus.

I. Morbus Herpeti admodum Affinis generali vocabulo *Scabies* dici consuevit, quæ in variis totius corporis locis, Cutem pustulis exiguis, modò siccis & sæpe squammosis, modò humidis ac ad ulcerationem dispositis, cum pruritu valde molesto infestat; atque huiusmodi Affectio propriè istius partis morbus est, ne potè quæ in ipsa Cute propter contagium externum sæpè incipit, & frequenter per media tantum cutanea curatur.

II. Dicitur autem *Scabies* seu *Scabrities*, quæ cutem scabram & crustulis obductam diversis certisve in locis reddit. *Pso*ra vero, *scab* *furfur*em mutatum excerno, quia in cute non tantum est asperitas, sed & levis exulceratio, & excoariatio pustularum, à quibus furfuracea quadam decedunt, & nonnunquam sanies, quæ tunc *Scabies Humida* dicitur. Enimvero variae sunt Scabiei species, de quibus omnibus, aut saltem plerisque agere constitui.

III. *Scabies* igitur, seu *Pso*ra definitur, quod sit ea in cute asperitas, quæ est cum pustulis humidis, & insigni pruritu. Vel describitur, pustularum in toto corpore sparsim eruptio, ab humore acris & salis, intra poros cutis aggesto procedens, hinc pruritum insignem, adeoque & scalpendi necessitatem inducens.



IV. Continens hujus morbi Causa nec videtur esse Pituita, nec Bilis, nec Melancholia, nec etiam ipse Sanguis per se extravasari aptus; porro nec materia hic peccans è duobus vel pluribus horum simul mixtis constat: si namque ex hujusmodi humoribus hic morbus unquam oriretur, non ita facile per merum & leve contagium suscipi, aut solo litu curari possit. Quamobrem potius censemus, esse humorem lymphaticum in glandulis subcutaneis constanter residem, qui ab indole sua gemina desciscens, à salino-volatili in acidum & acrisalinum, nec non aliter vitiosum non raro degenerat. Enimvero cum humori huic lymphatico ita depravato, & perpetim evaporanti, supplementa continua e sanguine adveniant, humores isti, vetus & recens, non facile congruunt aut uniuertur, ac salium dissimilium ritu mutuo effervescentes in materiam recrementitiam coagulantur, quæ poros cutaneos implens ac distendens ubique passim in tumores attollit: insuper sanguinem in transitu nonnihil impedit, & extravasari quasi cogit. Hinc pustulæ crebræ excitantur, & quatenus materia ista in ichorem facescens, à sero & sanguine subsequenter usque prorsum & foras urgetur, in moleculas assurgunt: dein spiritus animales fibras nerveas, ut ichoris istius excretionem promoveant, inordinate subeuntes, molesti pruritus sensum efficiunt.

V. Insuper ad Scabiem & Eruptiones Pustulosas quod spectat; humor hic lymphaticus tribus potissimum de Causis depravari solet. 1. Ipse sanguis valde impurus, simulque dissolutus, corruptelas & recrementa sua ubertim in glandulis subcutaneis relinquit, quæ ibidem fermenti corrupti naturam induentia cum aliis succis adventitiis, aut pertranseuntibus effervescent, & variè coagulantur, adeoque non solum Affectus Scabiosos, verum & Leprosos diversimodos pariunt. Hinc carniū & piscium salitorum, & sole ac fumo siccatorum usurpatio crebra & assidua, aliaque incongrua comesta aut epota Eruptiones Cutaneas passim cient. 2. Humor glandulis subcutaneis aggestus interdum merà itagnatione Scabiem producit; quare non tantum diu incarcerati, sed & qui vitam sedentariam agentes, squalori insuper, & poëdori assuefunt, huic affectui obnoxii degunt. 3. Humor hic cutis glandulosus à miasmate virulento ab extra communicato, non raro vitatur; idque observatione vulgari liquidò constat, in quantum maximè sani, & optimâ constitutione præditi, vix unquam in eodem lecto ubi Scabiosus simul decumbit, aut nuper decubuit, impune dormiunt: nec ita tantum, quin & Scabiosorum sudaria aliis in eodem lavacro lotis, ejusdem affectus sæpè contagium impertiunt.

VI. Itaque Scabies quoad originem suam, aut per Contagium accipitur, aut propter Malam Vitæ Rationem incendiculum & fomes ejus à Chylo & a Sanguine Vitiosis communicatur, vel ob Padorem & Transpirationis Defectum in ipsa cute generatur; quibus addi potest, Infantes quandoque hanc labem à Parentibus hæreditario contractam nancisci.

VII. Cæterum Cutaneæ Eruptiones, quoad formam, juxta affectorum constitutiones diversimodas variant. Nam in quibusdam siccioris

temperaturæ, biliosæ viz. aut melancholicæ, Scabies tantum Sicca, & quatenus ob feri defectum minus evaporat, cum pruritu non adeo molesto excitatur: in aliis vero temperamento humidior, & sanguine impuriore præditis, Exanthemata plurima, Ichore plena, & summo perè Prurientia ad scalpendum vehementer irritant, atque, propter excitata inde ulcuscula, pruritus subiinde in dolorem mutatur.

VIII. Scabies porro, ob turpitudinem & deformitatem, molestus est affectus; non autem ita periculosus, & in ætate juvenili sæpè ab aliis morbis præservat, imò & alios morbos sanat. Equidem tuta semper Scabies non est, si que diu continuata sit, in Leporam mutari potest, in senibus pertinax est, ac curatu difficilis.

IX. Circa Scabiei sive Pforæ Curationem dux occurrunt primariæ indicationes, ac utraque duplex; viz. prima Curatoria hæc duo respicit, ut humor glandulis subcutaneis inherens, atque vitiosus, ad debitam crasin reducat: deinde, ut cutis pori & meatus, ichorosis concretionibus liberati, pristinam conformationem recuperent.

Indicatio secunda Præservatoria hæc duo præcavet. 1. Ne Scabiei impuritates & miasmata corruptiva e cute excussa, in sanguinem & lympham regurgitent, iisque non tantum dyscrasias, sed unuper Oeconomiz Animalis noxam graviolem inferant. 2. Item navetur opera, ut humorum & partium nobilium labes, a materia scabiosa prius contracta, dum cutis vitia emendantur, eradicari queant.

X. Omnes hæc Medendi Intentiones, per Remedia tum Interna, tum Externa simul usurpata, una complicari debent: nempe ut materies morbifica loculis suis excussa, in nullas uspiam latebras secedere, ac nullibi delitescere queat; quin omni ex parte per medicamenta convenientia in totum amoveatur. Itaque Regula Vitæ Ratio in primis observetur, vitando Cibos Salitos & Piperatos, nec non Muria Conditos; etiam à Vino, Aquis Ardentibus, Cercusis Fortiori, & à liquoribus quibuscumque sanguinem incitare nimis ac fermentare aptis, temperetur. Insuper in scabie pertinaci & corpus cacoehymicum occupante, expedit Pharmacæ exhibere Cathartica, quibus acrisalini, glutinosique toto in corpore redundantes humores expurgentur, v. gr.

℞. Cremoris Tartari ℥j. Cholagogi simplicis, Mercurii Dulcis an. gr. viii. M. F. Pulvis.

℞. Extracti Catholici ℥j. Mercurii Dulcis gr. viii. F. Pill. num. 5.

℞. Rad. Bardanz, Lapathi Acuti rec. an. ʒi ss. Turbith Gummosi, Santali Citrini an. ʒi ss. Herb. Fumariz, Agrimoniz an. M i ss. Fol. Senz mund. ʒj. Glycyrrhizæ rasæ ʒiij. Coq. in l. q. Aquæ Puræ ad ʒ xxx. Fiat Colatura, de qua semel vel bis quotidie Patiens haustum sumat.

℞. Rad. Polypodii querc. ʒss. Helenii ʒij. Fol. Eupatorii cannab. ʒiij. Turbith Gummosi. Baecar. Juniperi an. ʒss. Aloës, Sem. Carui an. ʒv. Incisa & Contusa dentur in Sacculo, suspendendo in Vini Albi Gallici lb iv. de quo quotidie haustum bibat Aegrotans.

Insuper Lenæstho, nisi aliquid contraindicet, ab initio celebretur. Adhuc Alterantia, quæ sanguinem, cæterosque corporis humores secundarios



darios purificant, vices suas habeant: quem in finem conducit *Seruum Lactis Dulcis* frequenter potum, vel *Decoctum Salsaparilla, China, Santali Citrini, Rasura Cornu Cervini, & Liquiritia*. Etiam *Sudorifera* aliquando usurpata multum prosunt.

XI. Interim commodus ulus hic est *Balneorum*, tum dulcium, tum mineralium ac calidorum, inter quæ præcipuè laudari solent *Sulphurea*. Sed cum Balnea ista Mineralia non ubique reperiantur, alia pro iis substituere licet, quæ facultatem digerendi, detergendi, & poros cutaneos extergendi, atque purgandi vim habent. Ea ex Sulphure & Vegetabilibus parari vulgò solent; atque non lavacri communis ritu, cutis tantum lorde eluendo, sed & incongruum ejus fermentum destruendo, morbum hunc sanant.

℞. Aluminis crudi ℥ i. β. Sulphuris vivi ℥ ij. Salis communis ℥ iij. Nitri ℥ j. Fiat omnium Pulvis, qui in Aquæ Calentis labrum conijciatur.

*Barbette sequens proponit,*

℞. Rad. Bryoniz, Lapathi Acuti an. ℥ vi. Fol. Fumariæ M vi. Florum Camomillæ M iij. Furfurum M j. Sulphuris crudi ℥ ij. Nitri ℥ j. Aluminis crudi ℥ i. β. Salis comm. ℥ ij. Contusa coquantur in Aquâ pura pro Balneo.

Equidem restat alius Pruritus sanandi facilius modus; nempe, ut camisia Aquæ puræ cum Sulphure pulverisato incocta, & per solem vel ignem exsiccata, super nudum corpus per quatuor vel quinque dies gestetur: ita namque morbus hic sine Balneatione, aut Litus squalore, nonnunquam curari solet.

XII. Sed & *Unguenta* cuti illinenda pro Scabie curanda præscribi solent: atqui aliis plerisque tumoribus aut ulceribus quæ adhibentur, minimè hic juvant; verum *Sulphur* ejusque præparata in hoc morbo virtutem quandam specificam habere videntur, adeo ut linimenta ferè omnia contra Scabiem ea recipiant, & totius compositi basis haud immeritò habeantur. Exempli loco hæc sint:

℞. Sulphuris comm. pulver. ℥ i. β. Zinziberis pulver. ℥ v. Butyri insulsi ℥ iv. M. F. S. A. Linimentum.

℞. Sinapi confecti, Nostratibus *Mossaart*, ℥ iv. Sulphuris comm. pulv. ℥ vi. Olei Raparum Veteris. q. s. M. F. S. A. Litus.

℞. Unguenti Rosacei ℥ iv. Sulphuris comm. pulver. ℥ β. Olei Tartari per deliquium parati. q. s. F. S. A. Litus.

℞. Butyri insulsi assati ℥ iv. Pulv. Zinziberis, Sulphuris, Vitrioli Albi an. ℥ j. M. F. Linimentum.

℞. Unguenti Rosacei ℥ i. β. Vitrioli Albi ℥ ij. Misceantur exactè.

℞. Unguenti Enulati sine Mercurio ℥ iv. Pulver. Sulphuris comm. ℥ β. Olei Tartari per deliquium parati. q. s. F. S. A. Linimentum.

Sin verò talia Affectum non curent, aut grave vel inveteratum sit Malum, ad *Mercurialia* veniendum.

℞. Argenti vivi ℥ β. Aquæ fortis ℥ j. Solvatur Mercurius in Aqua forti, dein simul exactè Misceantur cum Axungia Porcinæ ℥ viii. & Fiat S. A. Unguentum; quo partes affectæ leviter illinantur, & blandè fricentur.

℞. Axungia Porcinæ ℥ ij. β. Olei Veteris, Therebinthinæ commun. ℥ iv. Pulveris Cerullæ

℥ viii. Aluminis ℥ β. Mercurii sublimati ℥ ij. Misceantur exactè in mortario pro Litu. Maxime vero hic conducit Unguentum Enulatum cum Mercurio.

Sed de Linimentis Mercurialibus notandum, quod pueris, aliisve tenerioris constitutionis non facile sint adhibenda; verum adultis tantum, iisque fortioribus, quia in nonnullis Salivationem facile movent, quæ in infantibus scillimè, & non nisi summo cum periculo contingit.

Insuper Mercurialia Linimenta non semper omnibus locis scabiosis sunt inungenda, præsertim Ea, quæ copiosum recipiunt Mercurium, quia scillimè tunc sequitur Salivatio; sed tantum manuum carpis, ac artuum majorum juncturis. Quem in finem a multis laudatur hoc Unguentum,

℞. Axungia Porci, Butyri insulsi an. ℥ j. Succu Citri, Radicis Enulæ, Lapathi Acuti an. ℥ i. β. Salis communis calcinati Sulphuris, Reagalæ, Rad. Zinziberis, Hellebori Albi pulver. an. ℥ iij. Therebinthinæ, Mercurij vivi an. ℥ iij. Misceantur S. A. & Fiat Unguentum.

XIII. Nec tantum sub formâ Linimenti, sed & pluribus aliis modis prædicta medicamenta usurpari possunt. *Aqua Mercurialis* seu *Alumino-sa*, vel sola vel temperata magis, si cuti in locis maxime ulceratis cum linteo discerpto applicetur, Scabiem non raro tollit. Vel præparetur Lavamentum.

℞. Rad. Ari, Lapathi, Enulæ Campanæ an. ℥ j. Hellebori Albi ℥ iij. Salis Gemmei ℥ ij. Coq. in Aqua pura ad ℥ xvi. Colaturæ add. Spiritus Salis Armoniaci gutt. xxvi. Misceantur pro Lavamento.

*Barbette laudat id, quod sequitur.*

℞. Gypsi Ultri ℥ i. β. Calcis vivæ ℥ ij. Lithargyri ℥ β. Boli Armeni ℥ j. Fol. Nicotianæ siccat. ℥ iij. Vini Albi Gallici ℥ j. Aquæ puræ ℥ ij. Coq. simul S. A. & Colaturæ detur usus. Alij volunt, ut circa nudum corpus gestetur Cingulum, cui Mercurius crudus insutus est.

XIV. Si vero omnibus hisce remediis Scabies non cedat, sed inveterata & valde pertinax sit, omni studio annitendum, ut per crebras Purgationes, Sudationes, & Venæsectiones sanguis hac labe impurus imminuatur, ac humor cutaneus variis modis corrigatur, hinc & Affectio hæc curetur. Scribit Riverius *Cent. 1. observat. 62.* quendam adolescentem eis paucos dies à Fæda Scabie fuisse liberatum exhibito pulvere ex Mercurii dulcis ℥ j. cum Diagridii ℥ β. refert *Platerus præx. tom. 1. cap. 17.* Empiricum quendam Decocto Stibni Calcinati cum Salsaparilla, additis & aliis, perniciosas Scabies aliquoties sanasse. Tandem Bartholinus *Observ. Cent. 6. Histor. 73.* inquit: Nihil utilius detritis calceis. Novi tamen Puerum Melitensem toto corpore fædis crustis obsitum, qui asperso cinere corij combusti calceorum, cum oleo rosaceo, convaluit.

XV. Inter Scabiei genera numerantur & *Tinea*, & *Scabies Fera*, Affectus nimirum infantibus in primis molesti. *Fera* hæc *Scabies* omnes corporis partes occupare potest, quamvis frequentius faciem & Pectus, quandoque & Brachia afficiat. *Tinea* verò Caput, præsertim secundum partem ipsius capillatam, vexare solet,



let, unde vocatur *Hair-Worm*, sicut prior Affectus *Dau-Worm* dicitur; ac si a veribus exiguis perforata forent cutis partes varix, ex quibus humor tenax erumpit ac effunditur iustaroris, crustas varii coloris producens, unde nomen accepit *Dau Worm*: sicut *Hair-Worm*, quando in specie nocet capillis, adeo ut sapius excidant, & segnius, vel nunquam iterum excrecant, relictis plagis in capite undosis pilis carentibus.

XVII. Continens horum Affectuum Causa est humor tenuis, acri-salinus, & quidni acidus quoque, qui glutinoso humori iunctus, sicque sanguini inhaerens ab eodem seceratur, ac cum eo ad corporis superficiem propellitur; ubi in glandulis subcutaneis existens, & ab indole sua genuina indies magis desciscens atque degenerans, nec non vitiose ibidem effervescens, poros cutaneos implet ac distendit, hinc pustulas crebras summo cum pruritu & ardore producit. Caterum vitiosus hic humor in glandulis porisque cutaneis haerens amplius vitiat, quin sanguinis ac lymphæ allabentis partem simul corumpit, & pruritum ac dolorem, nec non erosionem, exulcerationemque vicinis in partibus excitat.

XVIII. In Scabie illa *Fera* erumpere solent primum parva pustula, hanc aut illam cutis partem obsidentes, ac praesertim faciei, aurium, brachiorumque, quandoque totius pene corporis, summo cum pruritu: Ob quem infantes, quoties possunt, unguibus partem affectam scalpunt & lacerant, & si scalpere nequeant, cuius rei occurrenti faciem afficiant, nec desinunt, licet post frictionem succedente rubedine, mox & cutis externæ apertione, tum liquor acer mordaxque, cum sanguis effundatur: quibus omnibus non minuitur, sed augetur potius malum, latius nimirum serpendo, & novam molestiam itidem alibi producendo. Humor porro frictione illa promanans observatur variis, aliàs aqueus, aliàs flavescens, vel magis etiam obscurus. Equidem tenax plerumque est, ac glutinosus, partibus adhaerens, tandemque iterum concrescens, atque Crustam excitans, quæ, nisi nuda sit pars, ut est facies, accrescit quoque indutis aliisve linteis aut vestimentis parti affectæ proximis; quocirca sine crustæ abruptione, ac plerumque sanguinis quoque, vitiosique humoris nova eruptione nequeunt ab ipsis removeri.

XIX. Tinea verò, seu Scabies *Fera* in infantibus ad valetudinem facere haud absque ratione à plerisque creditur, cum vitiosi in toto redundantes humores robusto naturæ conatu in corporis superficiem expelluntur, unde &, si sponte ac subito affectio hæc evanescat, in febres non tantum, sed & morbos alios longe graviores infantes non raro incidunt. Huc spectat, quod Hippocrates, *lib. de Morbo Sacro*, scriptum reliquit: viz. infantes, si ipsis ulcera in capite, vel circa aures, vel in facie, vel reliquo in corpore excitentur, liberari ab Epilepsia.

XX. Quoniam igitur infantes vel Tineâ, vel Scabie *Fera* laborantes, à variis, illisque gravioribus morbis sæpius immunes sunt, atque hoc malo affecti hilares plerumque, & iucundi observantur, hinc Doctissimorum Medicorum

auctoritate, nisi parentibus urgentibus, à Curatione multi abstinere. Quod si vero insistent parentes, medicamenta duntaxat levia adhibent, ac precipuam curationem in nutricem rejiciunt, quam per intervalla blandè expurgant.

XX. Ipsa interim Affectuum horum Curatio solis externis medicamentis aliquando absolvitur. Sed quum observentur insuper alia in humoribus vitia, ob quæ interna opus sit Medicina, eadem hic esto indicatio, ac in Scabie. Equidem ipsa illa medicamenta assumpta Tineam aut Scabiem *Feram* non curant, nisi forsitan producta sit a sudore quovis modo impedito: quo in casu utile erit, *Sudoriferum Blandum* sæpius usurpatis denuò viam parare humoribus in corporis superficie hærentibus, ibidemque ita corruptis, ut *Feram* hanc Scabiem producant.

XXI. Atqui quum criseos modo ad cutem expulsi sit humor acer, qui ob admixtam glutinositatem ibidem hærens Tineam aut Scabiem *Feram* produxit, ceteris functionibus illæsis, solis Topicis hoc malum sæpius curatur; imo Pharmaca intus sumenda, quatenus corporis humores exagitant, tunc obesse aliquoties observavimus. Hoc igitur in casu variè à practicis laudantur, & præscribuntur remedia. Sedulo tamen cavendum, ne in horum Affectuum Curatione cutis poros occludant imposita medicamenta, adeoque peccantem humorem ad interiora repellant, unde gravissima excitari solent symptomata: quapropter talia sunt usurpanda Topica, quæ cutis poros servant apertos, quin eosdem aperiant, quæque humorem acidum ac acri-salinum temperent, glutinosum incidant, abstergant, sicque Partem Agram restituant, consolidationemque promoveant: quæ omnia præstant, absolvuntque *Saliva Volatilia Blandiora*. Igitur Affectæ Partes identidem laventur *Vino Gallico*, quod ex vase per epistomium æneum gutturim stillavit, Nostratibus *Leck-Wiin*. Vel præscribatur Lavamentum,

℞. Aquæ Plantaginis, Solatri an. ʒiʒ. Florum Sambuci ʒiij. Camphoræ in ʒiʒ. Spiritus Vini solutæ ʒj. Spiritus Salis Armoniaci gutt. xxv. Misceantur. *Forestus lib. 8. observ. 13.* hanc præscribit Lotionem,

℞. Malvæ, Betæ, Lapathi Acuti cum Radicibus, Hæderæ Arboreæ, Centaurii Min. an. Mj. Caulium Rubrorum Mʒ. Colocynthidis ʒiij. Agarici ʒj. Hellebori Nigri ʒiʒ. Fol. Sennæ Mund. ʒʒ. Coq. in f. q. Aquæ puræ ad lb iʒ. colaturæ add. Salis comm. p. i. M. pro Lavacro. Idem *observ. 17.* hoc laudat Unguentum,

℞. Lithargyri cum Aceto acerrimo, & Oleo Rosaceo Nutriti ʒij. Cerusæ cum Aqua Solatri lotæ ʒj. Aluminis Usti ʒʒ. Fuliginis Camini, Pulv. Rad. Helenii, vel Chartæ Combustæ an. ʒij. Axungia Gallinæ, Porcinæ, Olei Ovorum an. ʒʒ. Rosarum, Laurini, & Aceti an. q. s. M. S. A. pro Linimento. Et *observ. 10.* pro Tinea Inveterata istud habet,

℞. Butyri saliti, Axungia Porcinæ an. ʒj. Sulphuris pulv. ʒʒ. Vitrioli crudi ʒj. Argenti vivi cum Saliva extincti ʒj. Misceantur exactè in mortuario pro Lxu. Alii laudant id, quod sequitur,

℞. Butyri Majalis insulsi lb ʒ. Pulv. Sulphuris, Olibani an. ʒʒ. Sabina ʒj. Mellis comm.



comm. 3ij. M. F. S. A. Unguentum. Laudatur quoque Linimentum Plumbi compositum, seu de Amiantho Boëtii de Boode, quod describit Scroderus *Pharmac. Med. Chym. lib. 2. cap. 87.*

℞. Amianthi 36: Plumbi Usti 3 xij. Tutie præpar. 3ij. Calcinentur, dein pulverisata macerentur cum Acetō stillatitio; ac per mensem quotidie agitetur materia: quæ dein ebulliat per horæ quadrantem; iterum quiescat; donec clarescat. tum,

℞. Aceti hujus clari, Olei Rosacei an. p. æq. Misceantur exactè in formam Linimenti. Interim dum hoc modo hi affectus curentur, danda opera; ne crustæ à partibus subjectis faciliè separentur; cum sub ipsis felicius tota constituat cura.

#### De Impetigine seu Lepra Græcorum, &c.

I. Post Scabiem cum pruritu, similesque Affectus Cutaneos, agendum sequitur de Affectu alio, hisce ob pustularum eruptionem nonnihil Affini, qui communiter *Impetigo*, quibusdam *Lichen* & *Vitiligo*. aliis *Lepra Græcorum* appellatur. Morbus hic uti diversa fortitur nomina, ita eadem ab Auctoribus variè applicantur; & ab his morbi speciem unam, & ab illis aliam designare perhibentur.

II. *Lepra* igitur, *ἀνὰ τὰς ἀκνίδας*, à squammis denominata, summus quidam *Psora* seu *Scabies* gradus est. Hanc *Græcorum Lepram* Arabes dicunt *Albaram Nigram*; cujus species est *Albarus Alba*, quæ Græcis *Vitiligo*; *Leuce*, aut *Alphus* nuncupatur. ut colligere est ex Avicenna, qui *sepr. 3. quæst. tract. 1. cap. 9.* sic ait: *Albarus Nigra* est, illud, quod etiam *Impetigo Excoriativa* dicitur, etque Scabiositas accedens cuti, asper, rævehemens, & facit squammas, sicut squammas pisceum, cum pruritu; atque est cum humore melancholico, & est de antecedentibus Leporem.

III. Leporem verò, seu potius *Impetigo* (quæ initior tantum Lepre gradus, adeoque curatu facilior est) ad hunc modum oriri & afficere solet: viz. in primis pustulæ Rubræ modo singulares, modo plures simul congestæ; in variis corporis partibus, præsertim vero in brachiis & cruribus excitantur, quibus singulis (morsus incremente) undique novæ adjunguntur, & brevi ejusmodi molecularum plures velut aggeries seu corymbi fiunt. Etenim Papillæ juxta unamquamque stirpem, primò indies erumpentes, & latius usque serpentes, sese in orbem diffundunt; adeoque Exanthematum aggeries quasi ampliari faciunt. Cujusque harum superficies aspera; & nonnihil albida; ac squammosa apparet, unde si scalpatur squammæ decidunt, & ichor sæpe tenuis exudat, qui tamen mox exsiccat in squamam crustaceam rursus induit.

Hi Papillarum Corymbi primò exigui, & pauciores existunt; in brachio, aut crure, aliove membro singulari, tres forsan; aut quatuor ad magnitudinem denarii circiter apparent: postea verò, si morbus crescere sinatur, crebriores ubique erumpunt, quæ sensim augentur. Porro in hoc statu non sistitur; sed Affectus, nisi per Medicinam cohibeatur, in puribus usque locis ebulliens, & latius ubique serpens;

tandem non solum integra membra, sed & totum corpus *Vitiliginè Leprosâ* obducit: atque hanc *Impetiginis* speciem Arabes quidem *Lepram*, sed Græci *Elephantiasin*, Nollrates *Lazarus*, *Melaatsbeyd*, *Quasad-seer* appellant; etque summus hic *Impetiginis* gradus ex sententiâ Veterum plerumque incurabilis.

Totam hujus mali idæam C. Celsus *de Re Medica lib. 3. cap. 15.* ita describit: Totum corpus afficitur; ita ut ossa quoque vitari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas, crebrosque tumores habet. Rubor haerum paulatim in atrum colorem convertitur. Summa cutis inæqualiter crassa; tenuis; dura, mollisque; quasi squammis quibusdam exasperatur; corpus emarcescit, os, suræ, pedes intumescunt. Ubi vetus morbus est; digiti in manibus; pedibusque sub tumore coaduntur, febricula oritur; quæ faciliè tot malis obrutum hominem consumit.

IV. Ex dictis itaque *Impetiginis* Differentiæ præcipuæ innoteant; ac in primis juxta morem ejus plus aut minus malignum, distinguitur. juxta quod propius ad Lepre aut Scabiei naturam accedit, vel statu medio se habet: Insuper notare est, Affectum hunc quandoque membra quædam singularia, uti brachia forsan; aut crura, corporis reliqui partibus intactis, infestare; interdum verò in his omnibus simul incipere; & ubique sparsim papillas excitare.

V. Causa *Impetiginis* Materialis non est humor mere cutaneus, propter miasma ab extus susceptum, aut alias ob occasiones depravatus; & à naturali ejus constitutione degeneratus; quia nimirum non tam faciliè, uti in Scabie, per contagium aliis communicatur; neque statim per totum corpus dispergitur. Sed pustulæ circa morbi initia primò erumpentes, inde procedere videntur, quod in massa sanguinea concretaiones quædam acido-salina contingant, quæ cum subigi; aut rursus dissolvi nequeant; in cutem pelluntur.

VI. Igitur Affectus Hujus Causa Continens seu Conjuncta in eo consistit, quod imprimis absque ullo cutis vitio, sanguis particulis salinis diversimodi status & indolis saturetur; atqui salia ista, præsertim ubi fixa & acida præpollent, se mutuo præhendant; adeoque in coagula quasi tartarea concrecant; quæ portiones in sanguinem protrulæ; papillarum eruptiones, quasi eodem morbi hujus nidus inchoent; dein illæ sensim juxta materiam supplementa tum numero, tum magnitudine indies auctæ, morbi hujus initium, incrementum, & vigorem, qui Græcis *ἀκνίδας* dicitur, producant.

VII. sed multa occurrunt; quæ ad humoris istius acido-salini generationem faciunt. Enimverò nonnullis hic Affectus Hereditarius est, ab impuro Parentum vel Avorum semine communicatus; interdum Contagio contrahitur; quandoque etiam spontè, proprioque vitio producit: atque huc etiam facit frequentior usus ciborum salitorum, acrim, & crassorum, simulque immoderatio vinorum acidorum potatio: insuper vulgaris observatio est, plures in hunc affectum à carnis porcine, & piscium in primis crustaceorum comestione nimis crebra, aut assidua disponi. Atque hujus rei in-



stantia satis notabilis est, quod potissimum in morbi huius Prophylaxin seu Præservationem, cibus iste sub lege Mosaitica interdicebatur: & scribit Willisius in Pharmacopœia Rationali part. 2. sect. 3. cap. 7. olim in Anglia Cornubienses, oram fere undique maritimam incolentes, quatenus ex iis pauperiores ferè tantum piscibus vescerentur, Affectibus Leprosis plurimum obnoxios evasisse, in tantum, ut propter horum sublevamen, multa in ea Regione nosocomia conderentur. Insuper ex esu carniū humanarum, præsertim leprosarum, hunc affectum quandoque excitatum fuisse, refert Scultetus post *Arma-ment. Chirurg. Observ.* 100.

VIII. Hinc Affectus Leprosi, etsi mortem aut imminens periculum raro minantur, postquam tamen altius radices egerunt, Curatio eorum perdifficilis aut nulla est. *Incipiens Impetigo*, atque pustulas carumque aggeries, in membro forsitan uno aut altero pauliores excitans, Curationem quandoque admittit. Sin vero morbus eo præcesserit, ut papillarum corymbi crebri ac lati toto in corpore sparsim appareant, adeoque vera sit *Græcorum Lepra*, raro admodum curatur. Quod si morbus, in vitis omnibus remediis, indies in pectus erectus, tandem in *Leporam confirmatam & inveteratam*, quæ & *Elephantiasin* dicitur, accrescit, Curationem plane respuit, & pronunciat C. Celsus, hanc curari non posse, ideoque ab ea abstinendum esse.

IX. Quoniā nō igitur Lepra confirmata aut inveterata, hoc est, Lepra Arabum, seu Elephantiasin Græcorum, nunquam curatur, & Lepra Græcorum similiter vix ullam medelam admittit; quidam de levioris ejus speciei, *Impetiginis* viz. *Therapœia* breviter adjungemus. Circa hanc dux occurrunt primariæ indicationes, scilicet *Præservatoria*, quæ morbi causam, & *Curatoria*, quæ symptomata, puta Eruptionem Pustulosam respiciunt. Ab indicatione Præservatoria semper incipere debet Medendi Methodus, quæ morbi causas per remedia interna amovendas procurat, secus namque exteriora fere nunquam (ut in Scabie) cum fructu adhibentur; sed præcisis interea sanguinem morbi radicibus, efflorescentiæ Cutaneæ cito emarcescunt.

X. Quapropter cum Affectus hic recens fuerit, Causæ Evidentes & Extremæ amoveantur: mala Victus Ratio, & Aëris insalubritas omni modo emendentur. Deinde respectu Causæ Conjunctæ, dux sunt præcipuæ Medendi Intentiones: unum ut viscerum & humorum impuritates cito expurgentur; item ut sanguinis dyscrasiæ acidofalvæ in melius reducantur: propter quos fines, tum *Cathartica* validiora, tum *Medicamenta Alterantia* (quæ in Herpetis, ac præsertim Scabiei Curatione præscriptissimus) præscribenda; nec non *Phlebotomia* celebranda: & quoniam pertinacissimus sit hic Affectus apprimè convenit, usurpato validiore Decocto Sudorifero ex Guajaco, Salsaparilla, &c. in hypocausto quotidie Sudores movere; ut hoc modo, seu in Luis Venereæ curatione fieri solet, mali tomes penitus eradicetur. Eandem ob causam, remediis aliis nihil juvantibus, multi Salivationem, quasi ultimum remedium, & tanto hosti unice par, commendant.

XI. Interim ut sanguinis dyscrasiæ usque

magis corrigantur, pro potiori ordinario sequens aut simile decoctum bibat Patiens,

℞. Raturæ Ligni Guajacæ ꝑ. iv. Rad. Salsaparillæ ꝑ. i. β. Chinæ ꝑ. ij. Contulis affunde Aquæ Puræ lb. x. stent in infusione calida, dein S. A. Coq. addendo in fine coctionis, Liquiritiæ rasæ ꝑ. vi. Fiat Colatura lb. vi.

Similiter ad sanguinem alterandum præscribantur pulveres,

℞. Salis Prunellæ ꝑ. vj. Floris Salis Armoniaci ꝑ. iij. Simul terantur in mortario, atque hujus pulveris circiter ꝑ. iij. detur bis, terve in die, cum jusculo, vel superscripto decocto.

vel quotidie bis exhibeatur pulvis ex gran.

viii. aut circiter, Salis Volatilis Cornū Cervini. valde quoque hic laudatur Sal Viperarum similiter utruptum.

Scribit Solenander in Consiliis Medicinalibus, se in Lepre Curatione felici cum successu hoc usum esse: Accipit duas aut tres Viperas, aut si haberi nequeant Viperas, alios Serpentes, quos vivos dissecat, atque in vitro adjecto Hordeo in Aqua coquit, donec hordeum crepitet. Hordeo illo, & ipsa etiam carne Serpentum pullos alit gallinaceos, ac aliud nullum iis alimentum præbet; quo ubi aliquot dies nutriti fuerint, implumes evadunt, tandemque plumis rursus velantur. Hoc postmodum Carne, & Jusculo paulatim ægrum alit. Et usitatum fuit Antiquis remedium ex Viperis: viz. receperunt Viperas, & cauda ac capite abscissis, cuteque adjecta, omentas earum carnes ægris comedendas dederunt.

XII. Quoad *Topica Remedia* cuti exteriori, ut Squamosæ Eruptiones & Pustularum Corymbi tollantur, adhibenda; eadem ferè hic conducunt *Balnea Arsenicalia*, *Linimenta*, & alia medicamenta, quæ in Herpetis ac Scabiei Curatione proposuimus: quæ tamen nisi *sanguinis diathesis acida salina* ac *torrea* prius tollatur, raro aut nunquam per se juvant.

In *scabie humida* prodest Tinctura lignorum, Tinctura coralliorum cum spir. ligni sassafras vel spir. lignorum.

*Profectum* remedicamentum pituitam educentia & sanguinem purificantia, serum lactis mistum cum succo & essentia fumariz, Tinct. tart. antimonii.

*Sudorifera* profunt & in specie antim. diaphoret. sulph. aur. tum antimonii, essentia & spir. Lignorum. Essentia, sal. & spiritus fumariz.

In *scabie sicca* magis humectantia profunt, & quidem magis in forma liquida, quam sicca, quod in scabie volatili præcipuè observandum. Hic ergo prodest fumariz, serum lactis &c.

*Purgantia* optime dantur in infuso v. g. in sero lactis. Si vero bolus vel pilulæ placeant, post eorum assumptionem hora una vel altera superbibatur haustus jusculi pisorum vel seri lactis.

In illa scabie, quæ *malum mortuum* dicitur, profunt optime medicamenta ex universalibus & antim. purgantia & purificantia sanguinem: Omnia medicamenta ex viperis, trochisci de viperis, quæ tamen non sunt adeo commendanda: magis



magis enim profunt essentia, magisterium vel spiritus viperarum pulverisati. D. Osvaldum medicamenta habet ex sanguine humano, cervino, viperis.

*Profunt quoque hepatica, essentia lignorum, essentia sudorifera, bezoardicum martiale, item bezoardicum joviale uti & alia supra citata.*

In genere in utraque scabie profunt extractum catholicum Andernaci, panchymagogum crollii, extractum hellebori nigri, resina catholica, jalap. gummi de Peru, extract. esulæ.

In scabie humida pilulæ de fumaris; Mercurius dulcis dulcis simpl. & compositus, merc. vitæ, arcanum corallinum, mercur. cum sol. mercur. præcipitatus.

In scabie humida & contumacissima prodest decoctum contra scabiem mynsichti, syrupus de fumaris compositus, &c.

Externè circa gulam merc. non semper prodest, & sæpè gravia secuta sunt symptomata aq. & decoctum merc. Si in aq. calc. viv. solvatur aliquid de merc. dulci, bonum est remedium externum Balneum fieri potest ex herbis saponariæ, scabiosæ, fumaris, meoti. næ, malvæ, radicibus lapathi majoris, helenii bryoniz. It. ex sulph. sal. nitr. fursure tritici, silig. farina fabarum. Prodest quoque externe aq. viridiuscula aurifabrorum quæ post præcipitationem argenti remanet; aq. nicotianæ, oleum nic. oleum tart. per deliquium, unguentum medicamentosum mynsichti, unguentum de lythargyrio & cerussa, rosatum cum arcano corallino seu aliò mercur. ritè preparato, vel præcipitato.

*Nota tamen, quod si unguenta adhibeantur, tamen adhuc benè dentur interna, præcipuè antim. diaph. essentia fumaris helenii &c. aliàs retropellitur materia:*

℞. Crem. tart. ʒij. sal. fumar. gr. viii. M. D. in duplo.

℞. Croc. mart. aperit. ʒj. sal. fumar. ʒß. M. D. in duplo.

℞. Aq. fumar. ʒiv. essent. fumar. mart. liq. an. ʒj. syr. de fumar. ʒi. ß. S. Digestiv. pro duabus vicibus.

℞. Herb. fumar. Mij. flor. cichor. epat. an. p. iij. sem. carthami ʒj. vel (ii a pituita nitrosa) agar. alb. ʒvi. mechoacanæ albiß. rad. jalap. p. an. ʒj. cantali rubri citrini an. ʒij. crem. tartar. albiß. ʒiij. F. l. a. nodulus. Prodest si malum est à pituita. Si ab humore melancholico.

℞. Herb. fumar. epithymi an. Mij. flor. borrag. buglossæ genitæ an. p. ij. fol. senæ sine stip. ʒj. rad. helleb. nigri præp. polypodii estile præp. rhab. mon. an. ʒj. gualappæ ʒvj. cinnamomi ʒiij. caryoph. matris an. ʒi. ß. crem. tartar. albiß. ʒij. sal. fumar. ʒj. F. l. a. nodulus.

Si oriatur a pituita hæc profunt:

℞. Mechocacanæ albiß. agar. albiß. an. ʒi. ß. rad. jalap. ʒj. tartar. albiß. ʒi. ß. vel ʒj.

Infunde in f. q. aq. fumar. in vitro clauso per octid. mane coq. ad dissolutionem tartar. in colatur. dissolve syr. de fumar. ʒvj. Scammont. sulph. gr. v. aq. cinnamomi borrag. ʒi. ß. M.

Si ab humore melancholico.

℞. Fol. senæ s. s. ʒiij. Rad. helleb. nigr. præp. ʒj. flor. borrag. buglossæ an. p. iij. crem. tartar. albiß. ʒj.

Infunde in f. q. aq. fumaris vel feri lactis, stent

in infusione per noctem. mane coq. ad dissolut. tartar. Col.

℞. ʒiij. adde essent. fumar. ʒj. tinct. tartari antimoniata g. xx. syr. fumar. comp. ʒß. m.

℞. Conserv. fumar. ʒj. pulv. cathol. purg. ʒj. antim. per infer. purg. gr. x. c. f. q. syrapi de fumar. F. l. a. Bolus.

℞. Extr. cathol. Andernaci Panchym. Crollii an. ʒj. merc. dulc. ritè par. gr. xv. extract. troch. alhand. gr. ij. cum essentia fumaris F. pilulæ.

℞. Extr. melanagog. helleb. nigri an. ʒß. scammon. sulph. gr. vi. antim. per inter. purg. gr. x. cum essent. fumar. F. Pilul. pro una vice.

℞. Essent. fumar. mart. liquid. an. ʒiij. m. Dos. gutt. ʒo. vel ʒo.

℞. Ess. fumar. tinct. tart. antimoniata an. ʒiij.

℞. Essent. lignor. fumar. an. ʒiij. m.

℞. Tinct. corall. c. spir. lign. ʒß.

#### Sudorifera.

℞. Antim. diaphor. ʒj. sal. fumar. gr. vj. m.

℞. Essent. fumar. ʒj. liquor. ʒß. m.

℞. Aq. fumar. S. ʒj. syr. de fumar. S. ʒß. essent. fumar. ʒj. antim. diaphor. ʒj. spir. flor. samb. ʒß. m. In scabie sicca.

℞. Aq. fumar ʒj. flor. samb. ʒß. essent. fumar. liquor. ana ʒß. tinct. antim. gr. vj. m.

#### Balnea.

℞. Herb. fumar. sapon. scabiosæ flor. helen. lapathi maj. ana ʒiv. sulph. crudi lb. ʒi. nitr. lb. i. ß. batucarum lauri ʒj. incis. D. S. species, pro Balneo.

Potest quoque addi radix bryoniz, lap. medicamentosus sal. vitriol. & alia.

In scabie contumacissima eadem possunt, si addantur folia nicotianæ.

℞. Unguent. diapomphol. enulat. ana ʒß. flor. sulph. ʒij. ol. nicot. q. f. F. l. a. unguent.

℞. Unguenti enulati ʒj. flor. sulph. ʒj. sal. tartar. ʒj. ol. nicot. q. f. m.

℞. Decoct. calc. viv. lb. j. merc. dulc. ad extra ʒß. aq. rosarum ʒj. m. pro lotionè.

N.B. Potest quoque addi aliquid de saccharo Saturni; si adsit inflammatio.

In omnibus speciebus; etiam desperatissima, nil melius, quam medicamenta ex viperis.

Si oriatur ex scorbuto, antiscorbutica miscantur, v. g. Tinct. corall. antiscorbutica, tinctur. corall. cum spir. lignorum, essent. fumaris, ligni; item medicamenta ex viperis.

#### Phlyctena, Sudamina, Sirones ac vari.

De Phlyctenis vid. Halessefferus de affectibus cutis p. 93. Primario instituatur purgatio; ut affluxus cohibeatur, Profunt quoq; sudorifera.

Externè lixivium è cineribus pini confert, it. Succus plantaginis expressus & simul, ■ adsit inflammatio, succus solani. Exsiccantia pariter, ut empl. de lapide calaminari, unguentum diapompholygos.

In sudaminibus convenit decoctum calcis vivæ, unguentum de lythargyrio.

In sironibus confert unguentum ex sapone Veneto seu Batavico cum sal. comm. Item muria hulecis, unguentum ex aloë, sulph. & lacte sulph. cum oleo nicotianæ.

In Varis (vide Halessefferum de affect. cutis



lib. 2. pag. 293.) prodest sanguinis purificatio. It. aq. sigilli Salomonis, lil. alborum, rosarum, cosmeticum Cluvii ex marcasita, lac sulphur. saccharum saturni. canphora, oleum tartar. per deliquium, merc. dulcis, lac virginis, decoctum sulph. unguentum è flor. & lacte sulphur.

Internè verò confert hepaticum rubrum, Tinctura florum, bellidis cum sp. vitriol. mart. mane & vesperti.

Facies quoque abluatur & innungitur aq. florum fabarum & sero lactis.

℞. Aq. flor. fabar. lil. alb. sigilli Salomonis rosarum an. ʒj. cosmet. Cluvii ʒj. merc. dulc. gr. xv. camphora gr. vii. M.

℞. Unguent. rosati ʒij. flor. sulph. ʒij. lactis sulphur. ʒj. sacch. saturni ʒβ. olei rosac. q. s. F. linimentum.

℞. Aq. omnium florum, spermat. ranarum, lil. alb. flor. fabarum, pulpæ citri, sigilli Salomon. an. ʒβ. ol. tartar. per del. ʒij. sacch. saturni ʒj. cerussæ, boracis Venetæ, an. ʒβ. camphoræ ʒβ. merc. dulcis gr. viii. M. est expertissimum.

#### *Epinyctides, Leuca & Alphas.*

In Epinyctidibus sanguis purificetur: Deinde purgandum: Denique ad Topica deveniendum est. Riverius specince oleum juniperi commendat.

In Alpha seu Morphea (vid. Hassenrefferum de aest. curis p. 24.) si à sanguine melancholico, post digestiva purgantia etiam omnia quæ supra de scabie notata sunt, interna & externa, balnea serum educentia profunt v.g. fumarica. It. medicamenta hepatica: Prodest quoque oleum tartar. cum oleo amygd. dulcium & lil. alborum &c.

NB. Radix lapathi, si parti affectæ affricetur, omnes tollit maculas. It. lac virginis. Unguentum ex calc. viv. & sulph. vivo, aq. spermatis ranarum, aq. falsa.

In Leuce (vid. Hassenrefferum lib. cit. c. 3. p. 31.) conveniunt noduli purgantes, sanguinem purificantes, & pituitam educentes &c.

Sudorifera hic quoque profunt & hepar roborantia, v. g. hepaticum rubrum, ebur sine igne, species diatrachodon Abbatis, diatrion santalon.

Deinde Topica v. g.

℞. Floe. sulphur. camphoræ an. ʒj. Sublimentur artificiosè, dein solvantur in aq. serophul. & sigilli Salomonis. Hoc pro arcanissimo potest adhiberi quoque in varis.

Balnea item fiant ex rad. lapathi, sulph. vivo, nitro cum aliis appropriatis.

#### *Impetigo & gutta Rosacea.*

Impetigo seu lichen species est seu primus gradus herpetis.

Profunt hic medicamenta serum educentia & sanguinem purificantia. It. quæ in scabie commendantur, e. g. fumarica, merc. &c. Item serum lactis, si in eo reliqua medicamenta assumantur ex purificantibus sanguinem & serum educentibus.

Topica post universalia applicentur. Profunt hic omnia in præcedentibus annotata, aq. spermatis ranarum, aq. omnium florum, lac sulph. oleum ovorum, Prodest quoque decoctum calc. vivæ, liquor mercurii saccharatus mynlichti, it. ejusdem liquor mercurii acetosus, unguentum

medicamentosum & nobile ejusdem, unguentum è saturno ex oleo camph. & cerussæ. empl. ex saccharo saturni, & bals. sulph. ol. lil. alborum, ol. tart. per deliquium. Unguentum secretum Riverii, quo illæ sæpius utitur, hoc est:

℞. Unguenti rosati ʒij. mercur. sublimati ʒij. M. mercurialia enim quam maximè profunt.

Ubi dolores in impetigine adsunt, sequens adhibeatur.

℞. Pomor. putridorum n. vi. adde ol. rosati ʒij. lactis muliebris parum, F. cataplasma, & applicetur parti dolenti: Riverius in suis observationibus hoc valde commendat.

Non minus tamen prodest aq. spermatis ranarum, decoct. & infusum sulphur. vid. Poterius.

In gutta Rosacea profunt purgantia ex rhubarbaro & aliis hepaticis purgantibus: Semper enim purgantibus admisceantur hepatica, v. gr. sal. & conserva cichorei. Hiat nodulus ex purgantibus & hepaticis: Prodest tinctura rosarum, violarum, bellidis, epat. rubr. conserv. flor. & rad. cichor. syrup. fragorum cum essent. hepatica.

Sunt qui commendant menstruum virginis in aq. appropriata solutum & externè applicatum.

Scarificationem auriculæ singulis mensibus commendat Hartmannus & alii.

Optima interim hic sunt medicamenta ex calc. viva, merc. flor. sulph. & camphora eaque, quæ alias de variis commendata sunt. Joan. Michael. Præcos chymica generalis part. 2.

In scabie remedia præparantia.

℞. Crem. tartari ʒj. sal. fumaricæ gr. viii. flor. sal. ammon. martial. gr. ʒ. Misc. F. pulvis in aq. fumaricæ exhibendus.

℞. Vitrioli martis cum spir. sal. amm. acido præp. ʒβ. crem. tartari ʒj. sal. commun. fumaricæ gr. viii. misc. f. pulvis.

℞. Essent. fumaricæ ʒβ. syr. de fumarica ʒj. Tinct. martis gut. v. aq. centaur. ʒij. misc. Detur cochleatum bis in die. Purgantia.

℞. Resin. Jalapp. scammon. an. gr. v. Mercurii dulcis gr. 15. conserv. Fumar. ʒij. M. F. Bolus.

℞. Extr. Rhei, sennæ tartaris. an. ʒβ. Resin. scammon. gran. vii. conserv. fumar. ʒij. misc. f. bolus.

Pilule. ℞. Extr. diacatholici nostr. ʒβ. mercurii dulcis gr. 12. misc. f. pilul. n. vii. vel.

℞. Extr. Panchymagi, crollii ʒβ. Mercurii dulcis gr. xv. misc. f. pilul. n. vii. Sudorifera.

℞. Antim. diaphoretic. ʒj. Sal. C. C. gr. vi. ocul. cancr. ʒβ. Rob. sambuci ʒij. aq. fumaricæ ʒij. misc. f. sudoriferum, Vel.

℞. Flor. antim. diaphor. gr. xv. tinct. tart. antim. gut. 21. spir. lign. guajac. gut. 24. Rob. sambuci ʒij. aq. sambuci ʒij. misc. f. sudoriferum.

℞. Bezoartic. C. C. ʒj. Rob. sambuci ʒij. aq. fumar. ʒij. misc. f. sudoriferum. Vel.

℞. Bezoartic. viperini ʒj. Rob. sambuci ʒij. ess. fumaricæ gut. 24. lignor. gut. 15. aq. centaur. minor. ʒij. misc. f. sudoriferum. Elixiria.

℞. Essent. fumaricæ, lignor. an. ʒj. tinct. tartari antimon. ʒβ. misc. Dosis mane & vesperti gut. 20. ad gut. 24. vel.

℞. Spir. tartari cassiatæ ʒj. essent. fumaricæ, tinctur. tartari antimon. an. ʒβ. Misc. Dosis gut. 15. ad 20. mane & vesperti. Medicamenta externa.

℞. Ungu. alb. camphorat. ʒiv. ol. coct. ʒ2. nar.



nar. ʒij. Sacchar. Saturni ʒij. Mercurii dulcis ʒj. Sulph. citrin. ʒß. Misc. f. linimentum. Vel  
 ʒ. Unguent. alb. camphor. ʒiv. ol. coct. Ranar. ʒij. Sacchar. Saturni ʒij. Cinnabar. antim. ʒj. solut. sulph. in lixivio sal. tart. ʒß. Misc. f. linimentum. Vel

ʒ. Unguent. rosar. ʒij. ol. Ranar. ʒj. Mercurii dulcis ʒj. Sulph. citr. ʒß. Calcis vivæ ʒij. Misc. f. linimentum.

#### Balnum.

Hoc potest parari ex decocto Herbar. absinthii, Fumariz, Centaurij, fol. Quercus, & solutione sulphuris cum lixivio Calcis vivæ.

#### Lepra Græcorum.

In hoc morbo purgationibus repetitis opus est: possuntque fieri sequentibus.

ʒ. Extract. Hellebor. nigr. ʒj. Sennæ ʒß. Resin. turbith. Jalapp. an. gr. v. conserv. rosarum ʒij. Misc. f. Bolus.

ʒ. Extract. Sennæ ʒj. Esulæ ʒj. Resin. scammon. gr. vii. Mercur. dulcis solaris gr. xii. Conserv. fumariz ʒij. Misc. f. Bolus.

ʒ. Extract. Agarici, Ellebor. nigr. an. ʒj. Resin. turbith. gr. x. Mercur. dulcis solaris gr. xv. Conserv. absinth. ʒij. Misc. f. Bolus.

ʒ. Extract. diacatholici ʒj. panacæ antim. gr. viii. Conserv. fumariz ʒij. Misc. f. Bolus.

ʒ. Panchymagog. Croll. ʒj. Turbith. Merc. solaris gr. iij. Misc. f. Pilul. num. vii.

ʒ. Penacæ antimon. resin. scammon. an. gr. viii. Conserv. fumariz ʒij. Misc. f. Bolus.

#### Sudorifera.

ʒ. Aur. diaphoretic. gr. xii. Bezoartic. viperin. ʒj. Essent. fumariz, lignor. an. ʒj. Aq. Centaurij ʒij. Misc.

ʒ. Bezoartic. duplicati ʒj. Pulv. sipin. viperin. præp. ʒß. Sal. viperin. ʒß. Spir. tartari saturati, tinct. tart. antim. an. ʒj. decoct. salisepar. & chinæ ʒij. Misc.

ʒ. Flor. antim. diaphoretic. ʒj. Pulv. viper. præp. ʒß. Sal. C. C. gr. viii. tinct. sulph. antim. ʒj. rob. sambuci ʒij. decoct. cortic. & lign. Guajac. ʒij. Misc.

ʒ. Cinnabar. montan. gr. x. Pulv. viperin. præp. ʒß. Sal. C. C. gr. viii. Ess. lignor. ʒj. decoct. fumariz & centaur. ʒij. Misc.

ʒ. Cinnabar. montan. de Touchino ʒj. Pulv. viperin. præp. ʒij. Pulv. viperin. præp. ʒij. Sal. viperin. ʒj. sulph. aurat. diaphoretic. gr. xvi. Misc. f. Pulvis pro 3. dosibus.

In decocto salis & chinæ exhibendis.

#### Medicamenta externa.

ʒ. Aq. calv. vivæ lb ij. Mercurii sublimat. ʒß. Succ. solan. Plantag. an. ʒij. Misc. f. lavamentum

ʒ. Fol. Quercus Miv. herb. chelidon. solani an. Mj. Absinth. centaur. an. Mj. Rad. Aristoloch. rotund. ʒj. coquantur in sufficienti quantitate aq. communis, & in colaturæ lb iv. solvantur. Mercurij sublimati ʒß. solutionis sulph. in lixivio sal. tart. ʒij. Misc.

ʒ. Decoct. Calc. vivæ lb ij. Mercurij sublimati ʒij. Sacchar. Saturni ʒij. Aq. rosar. ʒij. Succ. solan. chelidon. an. ʒij. Misc.

#### Unguenta seu Linimenta.

ʒ. Unguent. Apostolor. albi camphorat. an. ʒij. Sacchar. saturni ʒj. Zinabar. factitij ʒij. ol. Ranar. q. f. Misc. f. Unguentum. Vel

ʒ. Unguent. alb. Camphorat. Rosarum an. ʒij. Mercurij saliva extincti ʒß. Sulph. in sal. tart. solut. & inspissati ʒij. Pulv. Ranar. viper. an. ʒij. ol. Ranar. q. f. Misc. f. Linimentum.

Hisce remediis in omnibus horrendi hujus morbi generibus tantum effeci, ut mihi visum fuerit superfluum, plura hac de re scribere, & sic concludamus.

#### Consultationes.

*Pro Egregio Viro Laurentio Fachineo Cive Florentiensi scabie ferina, tumor extremarum narium, necnon ulcere internarum, & vena detento.*

Duo ni fallor sunt vitia, quæ virum egregium male habent, unum est scabies per totum corpus repens, ut ex cutis asperitate, & evidentibus tumoribus parvis, pruriginosis, cum, & sine scalpillatione, vel afficatione pus, ac saniem humidam valde, corpusculaque fursuracea emittentibus.

Alterum vitium est ulcus tum narium internarum cum tumore externarum rubente, ac crustis referto, & cum deperditione pro majori parte interstitij, tum columellæ, cum ejusdem ad anteriora non parva abrasione, cujus utriusque ulceris non tantum pus prodiens, verum etiam & visus ipse idem facit.

Verum tamen scabies, ut ex dictis liquet, non sicca, sed humida valde, quia nempe insignem copiam ichoris tenuioris emittit, est constituenda, sicuti est in habitu, & veluti hectica, quoniam a pluribus annis patientem afflixit, itemque contumax, & ferina existit, quoniam tametsi generosis admodum, & efficacibus valde præsidis fuerit tractata, non modò non cessit, sed magna potius incrementa suscepit, & quod pejus est suscipit in dies, ut parum absit, ut in lepram permutetur, sicuti enim pruritus est via ad scabiem, ita scabies, potissimum ubi pervicax nimis erit, est via ad lepram.

Ulcus verò quoniam saniem fetentem profundit copiosum, sordidum idè, & aliqua ex parte malæ naturæ; cachectæque erit constituendum, non tamen cancerosum adhuc, cum dolor illi non associetur, & pus nigricans haud emittat.

Horum autem malorum principia generatio- nis immediata ex parte agentis, & ex parte passi non sunt meo judicio difficilia cognitu, si quidem ex parte agentis constituerem ego succum serosum, salum, quia sanies tenuis, & alba, prius jugi, ac pereuni pruritu infestante prodiit; mixtum tamen aliquando cum ichore melan- cholico, ut color subnigricans cum rubore sua- det, hæc enim succorum miscela copiosa, hu- more crasso, & viscido referta in cuti recepta, & non mota, ob idque putredinem aliquam na- ta non tantum asperitatem, sed intemperiem calidam, & siccam, tumoresque parvos, & pru- riginosos parit, quod à Galeno secundo de Symptom. causis sexto, & à principio ii. simpli- cium decantatum fuit. Pariter eadem excre- mentorum colluvies ad nares, & columellam decumbens, ut abradens ulcera corrosiva infert, ut verò copiosa tumores illos externos circa nares efficit.



Ubi autem localem, & propriam habeant generationem excrementa jam dicta sic decernunt. Profecto cum sint meri partus caloris vehementis, ut nemo potest in dubium revocare (nam pituita falsa ab exulto tempore, live per putredinem, live per ipsam exultionem concitata, cum humiditate aquea permixto producitur, sicuti & succus melancholicus exultus, ichorque biliosus ab insigni fervore sunt) & cum in visceribus illis, in quibus non solum alimenta, verum etiam & excrementa generantur, generari quoque debeant atque inter alia viscera jecur primas partes habeat, in eodem ideo fieri pro majori parte certum habeo, quoniam in capite succum falsum procreari non dubito.

Principia ex parte passii penes temperamentum totius corporis calidioris, habitusque simili proprietatem, ratione psoze, penes autem conditionem locorum affectorum, ratione ulcers, ac tumoris, quando partes narium, & oris internae valde humidæ, ac putredini noxiæ sint, attendantur oportet.

Cæterum his principiis proximioribus remotiora quoque sunt addenda, quæ omnia refero in errata externa, potissimum verò in potum immodicum, & intempestivum ipsius vini meracioris.

Sed jam de Methodo curandi est agendum, quæ in scabie prius, quantum ego existimo indicationibus præservationis est pericienda; quocirca ante omnia danda est opera, ut materia fluens per evacuantia a cuti retrahatur, secundo materia fluxa ut putrida, & copiosa est evacuanda, ea tamen ratione, ut quæ hæret in superficie, ripticis abstergatur, quæ est impacta ecartartiscis discutiatur, sicceturque, ut qualitate nocet eadem materia est in contrarium alteranda; Deinde & curatoris indicationes occurrant, ut propterea pruritus, qui est species doloris anodinis sit amovendus, ac intemperies viscerum malos humores generantium alterantibus sint dinovenda. Verum & vitales indicationes haud sunt negligendæ, saltem ratione partis affectæ, hinc cutis tonus est confirmandus subadstringentibus, modeste tamen usurpandis, à quibus ne medicamenta impediuntur, ut alius penetrent, tenuia tanquam vehiculum addere oportebit, quo nomine Avicenna acetum, & acida, Galenus vero nono simpl. capite de sulphure, sulphur tanquam tergens, & poros absque adstrictione purgans omnibus aliis admiscebat. In ulceribus pariter ablata omni occasione fluxionis, ipsisque deterfis, & exiccatis ad consolidantia est deveniendum.

Quas indicationes explorare posse Medicum vix credo, quando mala omnia cum suis causis sunt in habitu, & inveterata ut lepra, ulcera cancerosa, deglutio, ac respiratio vitiata immineant, nullaque sit pars corporis, quæ ab aliqua labe sit intacta, ut propter has rationes indices magis ingravescant, & proinde difficiliter tolerantur, quando etiam ex Platone in Philebo scabies præter turpitudinem dolorem inferat, qui vigiliis adjunctus vires ipsas plurimum deiecere consuevit. Danda igitur est opera, ut egregius patiens à majori saltem ruina præservetur, quod forsitan haud erit difficile consequi, si illis ætati vegetæ prudentia, & obsequentia ejusdem adiungatur.

Quocirca si animum ad materias medicas converto, ita de Chirurgicis autumo, ut scilicet quamprimum sanguis copiose perfectam venam in cubito, non quidem unica vice, sed repetitis vicibus educatur, propterea ex utroque cubito meo iudicio sanguinem mittere præstabit, deinde habita totius providentia; Cuti tum hyruidines, tum cucurbitulæ parvæ, seu corniculi dicti (quos magis probo) numerosi tamen applicati mihi quam maxime arrident, sicuti & fonticuli in brachiis, & femoribus multi non improbantur, quinimo & si alter in tuncipite, vel occipite de more excitetur, ratione ulcers, narium ac uvæ plurimum prodegit.

Pharmaca respiciunt materiam, & morbos, si materiam, vel fluentem, vel fluxam, si fluentem sunt lenientia, ut syrupus de polypodio magillralis, & rosatus solutivus, sunt & præparantia, sicuti est decoctum scabiosæ, sonchi, hepaticæ fumariz, lupulorum, & betonicæ, adjectis syrupis de succo cicorii, de fumariz simpliciter, de succoque betonicæ, sunt demum & purgantia, in quorum serie, quod sit ex infuso hellebori nigri, agarici trociscati, & senæ cum syrupo de polypodio magillrali est opportunum.

Verum tamen repetenda erunt & præparantia, & purgantia, fortiora tamen, quare syrupi de fumariz compositus, fabor regis, de cicoreo compositus diluti cum decocto simplicium antedictorum in sero caprino parato, & purgatorium ex confectione hamech, ac hiera aliqua magna Aloë (quæ tantoperè in scabie inveterata ab Avicenna celebratur) donata, necnon electuarium ros. Mes. cum lenitivo vocato paratum, esse poterunt ex usu.

Cæterum & sudores moventia huc referenda, quapropter maxime conducturum esse credere, si salsa, chinæ, & sandalorum cum tantillo guaiaci decoctum, adjectis cicoraceis pararetur, & bis in die sumeretur, manequè instrumento ligneo sudor (ut in lue Venerea fieri solet) moveretur, novi etenim quamplurim os similibus morbis laborantes hoc remedi genere sanatos fuisse; Atque ut magis, ac magis medicamentum roboraretur, curarem, ut bolus ante syrupum matutinum & extracto guaiaci trociscis viperinis cum speciebus confectionis ex tribus sandalis paratus deglutiretur, ac eo tempore, quo simili medicatione patiens uteretur, eundem ut singulo quinto, vel sexto die syrupum de polypodio sol. assumeret, etiam atque etiam hortarer.

Medicamenta interea ad materiam fluxam sunt tum interna, tum externa, in genere internorum decoctum viperarum in aquis hepaticæ, scabiosæ, fumariz, & betonicæ excoctorum, omnibus esse præferendum confirmo; quinimò & ipsamet viperarum Caro in conserva cicoracea esset assumenda, huc referatur & medicamentum, quod & auctoritate gravissimum, & experientia ipsa est præstantissimum, & me nunquam in similibus casibus fefellit, est autem Pilosella decoctum ad quadraginta dies ebibitum, sal quoque theriacale sub aëre frigidiore in conserva boraginis assumptum mihi non displicet, quod scio etiam cum fructu alias ab egregio patiente sumptum fuisse.

In coordinatione externorum primum irrigatio totius corporis cum aqua stillatitia the-  
rebin-



rebintine, primum sola, deinde cum modico oleo sulphuris permixta, usu, & experientia mihi valde est comprobata, quo refero thermas Pisanas sub forma lavacri adhibitas, ea tamen ratione, ut quater balneum ex illis aquis, bis verò illud ex aqua dulci tepida, ac ita alternatim successivè adhibeatur. Et unguentum, quod mihi in scabie ferina, atque contumaci est in usu proficuo, non subtricebo.

*℞. Aluminis Rochæ assii } an. unc. 5.  
calcanit assii }  
Aristolochia rotunda } an. dragm. ij.  
Viridis Aeris }  
piceis navalis unc. 1.  
pinguedinis Anatis unc. 5.  
succ. emule unc. 1.  
olei rosati completi } an. unc. 3.  
butyri antiqui }*

*M. & f. unguentum f. a.*

Probo item medicamentum, quod conficitur ex sulphure, succo tabacci, unguento rosato, oleo tartari, & camphora, & cum Avicenna adunctionem ex hydrargirio, at cum Galeno ex radice Camaleontis, vel sublimato adscendere non abhorretem, nam sub hisce calibus melius est remediis paulò anticipibus uti, quam patientem deferere.

Medicamenta ad ulcera varia sunt, & primum occurrunt, quæ erosionem emendant, inter quæ, quod sit ex succo plantaginis, & almine ulto, tum naribus, tum uveæ adhibitur maxime probo, secundo tum virgæ aureæ succus, una cum urina Asini destillata, tum liquor stillatitius mellis in quo myrrha, thus, Aloës, ac pulvis iecos sint macerata, si per nares attrahantur, vel cum catetere injiciantur, opportuna videntur, quorum calor etiam succo plantaginis calligari poterit, & si majori attemperatione opus sit, ab illorum usu lac Asinum, vel serum lactis Vaccini injecta, vel unguentum ex succis per se, & una cum unguento albo usurpatum conducent, sicuti & pro agglutinatione unguentum ex pompholyge præcipue convenit, tandem ad uveam sanandam oris collutio ex aqua Villensi decoctionis boracis mineralis, tutæ præparatæ, & corticum granatorum, heri poterit; Exterius autem pro naribus medicamentum ex plumbo ulto, succo solani, & oleo rosato cum cera erit opifertum.

Post hæc verò studendum, ut morbi auferantur, aut mitigentur saltem, idcirco ratione pruritus nihil præstantius excogitari potest ipso Iuliano Romano aliquot intervallis ad scrup. i. hora præcipue somni devorato. Et præter Balneum aquæ dulcis probarem, ut patiens egregius hora pruritus manibus inunctis oleo amygdalino dulci in aqua endiviæ loto se scilicet perceret.

Intemperies verò jecoris thermis à Valle Sancti Marini, Porrextaneis veteribus, & Liconcellensibus, sæpèque caprino, cui scabiosa, tumaria, betonica, sonchus, & pilosella sint immacerata, satis emendabitur. At intemperies capitis usu conservæ violaceæ, & cicoraceæ hora somni devorata, item & lotionem ejusdem, ex aqua thermalis Lucensi, decoctionis sandalorum adjecto aceto commode corrigi poterit.

Et ne alia remedia sint irrita, una cum Ga-

leno addenda est proba vivendi ratio, erit autem hæc si patiens tempore localium detineatur in ære calido, alias verò in temperato, ut vescatur ovis, carnibus optimis, & piscibus petiolis elixatis, caveat a cibariis crassis, calidis, acris, ut propterea illi plantæ, fructus, & semina ejus conditionis, quæ refrigerare, & humectare valent, possint esse ex usu perutili. Et si ad certum aliquod tempus abstineret a vino, & loco ipsius, vel Liconcellensem vel Lucensem aquam biberet, vel aqua solum in qua, passulæ fuisse incoctæ, sibi summopere proficuum esset, quemadmodum & si in aquis illis propria cibaria coqueret non parum prodesset.

Victus tempore salutaris, & chinæ, sit ille, qui in usu communiter esse solet, poteritque commode ab excellentissimo curante præscribi, semper tamen alvus respondeat necesse est, quod si sponte non succedat, arte erit agendum, idcirco prunæ, passulæ præparatæ, atque clysteres ad utrum deducuntur. Animi accidentia omnia molesta vitentur, sicuti immodicum, & intempestivum exercitium, somnus sit moderatus, omniaque secundum proportionem jam dictis respondeant, quibus illud non possum non adicere, ut nempe ab omni cibo vel saccharum rosatum antiquum, vel cydoniatum sine mosco, ad juvandam coctionem, & reprimendos vapores vir egregius assumat. Deus autem optimus maximus ille sit, qui prædictis malis potissimum medeatur. *Jul. Cas. Claudius in Consultationibus.*

#### *De Impetigine. Pro Nobili Puella.*

Sæva illa impetigo (Herpes miliaris,) quæ ab ipso pene ortu in parte capitis dextra, dextraque coxendice, ventre etiam inferiore, nonnunquam & aliis partibus, non sine molestissimo pruritu, humorisque cujusdam viridis, flavi, albique transudatione, puella nobilis divexitur, causam habet insignem copiam serositatis, biliosa, cum humore pituitoso, nec non atrabilis materię portione permixta, in jecore ardentissimo à mixto sanguine, nutritisque lacte calidiore genitam, vinis generosioribus, malvatico, ac succi vitiosi cibis uti solita, concurrente etiam ab initio perangusto, ac admodum calido loco, dum fasciis esset involuta. Cum vero malum hoc cum à plurimis cruditatibus, ob ciborum copiam, capitisque catarrhò laud levi, tum ab impense calida partium affectuum intemperie, a continuo materię similis affluxu contracta, foveatur, mirum videri minime debet, esse puellam hanc & febri, & inflammationi nonnunquam oculorum obnoxiam, stabulante videlicet in visceribus hoc humore, quod hyemali peritunc tempore solet accidere, per concentrationem poris cutis ab ambiente frigore coarctatis.

Judicamus igitur necessarium fore remedium, quod non tam partes affectas, quam mali causam respiciens, eam molestiam, quæ nobilis puella cruciatur, quoad ejus fieri poterit, impediat, præservetque a majoribus malis, morbo huic supervenire solitis, lepra, scilicet, quam facillime incurreret, nisi præsentī malo quam primum iretur obviam. Siquidem ætatis mutatio nocumento potius futura est, quam auxi-



auxilio : calor enim in ætate hac ab excedente quadam humiditate temperatus, ea tempore juventutis immunita, multò fiet quàm ante mordacior. Sed & menstrua, perseverante ea, quæ adest, sanguinis acrimonia, aut nihili aut parum admodum sunt profutura. Si vero jecoris, sanguinisque calorem temperantes, prohibuerimus, quo minus tanta sanguinis acris, & mordacis generetur copia, tunc dubio procul menstrua per uterum purgatio esse ei poterit adjumento.

Laudamus igitur mox instituendam totius corporis expurgationem. Leniatur alvus flore cassie cum pulpa tamarindorum, sale tartari in jure, electuario de prunis, infusione rosarum solutiva, nonnunquam & modico manna cum jure. Præparetur humor insculis soncho, cicorio, fumaris, borragine, liquiritia, & seminibus cicutæ alteratis, addito nonnunquam succo sonchi, aut hepatica depurato. Purgetur deinde corpus repetito aliquo ex lenientibus propolis, cum infusione modici rhabarbari, aut mechoacanina, quæ & in pulverem redacta, aut forma confectionis poterit exhiberi : est enim gustui gratissima. Purgationis tempore laudamus & jecoraria utriusque brachii modicam sanguinis evacuationem, hircudinibus duabus brachiis singulis applicitis, aut etiam iisdem (si id fieri poterit) venis hæmorrhoidalibus admotis.

Corpore ritè expurgato, è re futurus est usus lactis aut asini, aut caprini duorum, aut trium mensium spatio, quatuor uncias in pondere, quotidie matutinis horis continuatus, permixta subinde aquæ rosarum, aut aquæ acetosæ modica portione, cui & infundi aliquando poterit modicum rhabarbari, aut mechoacanina, tumque quantitate majore porrigeretur. Suborta hæc, quindecim diebus intermitteri poterit ejus exhibitio, postea repetenda, modico interim aquæ rosarum recentis, alembico vitreo destillata, mane quotidie exhibitio. Si vermes adesse suspicio esset, destilletur (florent nunc persici) aqua è floribus persicorum, atque ab una ad duas uncias propinetur. Movebit corpus, vermibus resistet. Extrinsecus quam maxime laudamus balneum aquæ fluvialis tepide umbilicotenus, alteriusve aquæ dulcis malva, lusuca, salice, vite, papavere alterata, non omisso epithemate, atque unctione refrigerante regioni jecoris adhibita. Si vero & de lue Venerea non omnis abfuerit suspicio, proxime venturo Autumno, exiguo china, ac salsa decocti illi poterit obviari.

Memoratis remediis accedat recta victus ratio est necesse. Cibi refrigerantes sint, & humectantes, cujusmodi hordenum, cicorium, semen melonum; conferet & usus frequens prunorum, cucurbitarum, melonum Venetorum, anguriarum, aliorumque hujusmodi. Cæna sit modica. Alvus servetur lubrica prunis, vni passis, aut cassia recentis. Temperetur vinum aqua multa refrigerante; aut certe vinum conficiatur ex succo pomorum, quod & gratissimum futurum est, & utilissimum. Cæterum remedia hæc & facilia & utilia, quæ occurrerunt in hujusmodi casu præscribenda, ut puellam nobilem integræ sanitati restituant Dñm Opt. Max. obnixè precamur.

#### De Lepra. Pro Illustrissimo Comite Vicentino.

Illustrissimus Comes ætatis annorum 30. temperamenti calidi & humidi, habitus carnosus, duobus ab hinc annis consequitur de pruritu totius corporis, cum pustulis, cutis asperitate squamosa, ex qua scalpello decidunt squamæ velut piscium: multis curatus præstidiis, sine ullo tamen juvamento, de agendis consultit, usus est cibis salicis, vinis generosis, ac exercitio valido.

Affectus hic ex accidentibus relatus est ille, quem Avicenna a baram nigram vocavit 3. tract. 3. cap. 9. Græcis lepra dicitur; differt tamen ab Arabum lepra, in qua secundum Avicennæ doctrinam 3. 4. tract. 3. c. 1. non adest tantum cutis asperitas squamosa, sed corruptio complexionis membrorum, formæ item, & figuræ, cum insigni adeo membrorum corruptione, ut sit veluti cancer communis toti corpori, à Græcis Elephantiasis dicta.

Fit autem hæc affectio a sanguine atrabiliari permixto cum pituita salsa, intemperiem calidam & siccam inducente, non in superficie tantum, sed in profundis cutis partibus, unde & tumores & ulcera cutanea, quorum ratione dici potest morbus in intemperie, mala compositione, & in soluta continuitate, spectans magis ad exornitoriam, quàm ad salubrem medicinæ partem: generationisque ipsius causa est, cum intemperies calida jecoris, tum & magis error in sex rebus non naturalibus, & præsertim in exercitio, & in assumpris humores calidos & acres generantibus, cibis scilicet salicis, & vinis generosis.

Affectus curatu difficilis, quia confirmatus, & dependens à prædicta intemperie cutis, apta nata corrumpere etiam succos alimentales; ideoque non difficulter degenerare potest in lepram Arabum, sive Elephantiasin. Sicut enim scabies est affectus medius inter pruritus & lepram; ita lepra est affectus medius inter scabiem psoræ dictam, & Elephantiasin: ideoque summa cum diligentia curari debet.

Pro ipsius curatione attenuanda, emollientia, & ad circumferentiam protrudenda est materia in partibus cutaneis; detergentibusque, & epicraticis abstumenda; refrigerantibus & humectantibus intemperies corrigenda: prohibendaque est talis materię regeneratio refrigerantibus & humectantibus jecur, sanguinem, & totum venosum genus: atque refrigerandum est & humectandum caput, & si quæ materia generabitur, divertenda per ea quæ evacuant totum corpus, præmissa humorum præparatione. Hæc præstabitur remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis, & dieteticis.

Chirurgica erunt universalia, & particularia. Quare sanguis educendus erit primo ex jecoraria dextri brachii, ad unc. 10. deinde, ex venis sedalibus, ad unc. vii. & tertio per parvas cucurbitulas, vel per hircudines variis partibus affixas.

Pharmaceutica universalia erunt lenientia, præparantia, & purgantia. Pro alvi lenitione flor. Cassia cum pulpa Tamarindorum, vel Syrup. ros. solutus, de psyllidis extractus, erit accommodatus. Præparantia sunt cicorium, fumaris;



ria, borrag. & fenchu, cum unc. i. Syrup. de pomis, & unc. sem. Syrup. de acido citri. Pro purgatione rhabarbarum, agaricus, & senna, cum Syrup. rosar. sol. & de polypodio compositio, ex usu erunt. Reperantur preparantia, & purgantia, nempe Syrup. de pomis compos. de fumaria compos. de biconica composum, cum aqua fumaria, cichorii, & borraginis, alternisque diebus, loco prædictarum aquarum, præscribantur unc. iij. decocti Epithymi Mesues; ac tandem purgatio fiat infusione radicum heliebori nigri, cum agarico in sero caprino, & addito Syrup. de polypodio compos. fiat potio. Hisque peractis, duo genera remedium interna, & duo externa debellabunt affectum. Primum internum erit serum lactis caprini optimi depuratum, cum succo citri, sumptum singulis diebus quindecim dies ad lib. 2. modò cum infusione seminis; ut fiat dejectorium, modò cum emulsione seminum melonum, ut fiat diureticum. Aliud remedium quod erit alimentum, & medicamentum, est caro viperarum cocta cum oleo, aqua, petroselino, & passulis. In prandio, & cœna, mane & vespere comedat duas vipersas amputatis capite, & cauda, neque alio cibo utatur, præter panem & vipersas spatio quindecim dierum, sic enim purior fiet sanguis, transmissio excremento ad cutem, & interna viscera roborabuntur, ita ut perfecta sanitas subsequatur: quod bis vel ter felicissime experientia comperi. Externa erunt linimentum, & balneum. Linimentum fiat ex farina lupinorum, sulphure vivo pulverizato sale nitro, unguento rosato, & oleo amygd. dulcium cum hydrargyro saliva extincto. Quod hunc in modum parari poterit.

℞. Farina lupinorum libram unam  
Sulphuris vivi pulverizati } an. unc. ij.  
Salis nitri, }  
Unguenti ros. unc. viii.  
Hydrargyri saliva extincti. unc. iij.  
Olei amygd. dulcium q. sufficit.  
Misce pro linimento.

liniatur totum corpus alternis diebus hora forni. Aliud remedium erit balneum universale, & hoc alternis diebus fiet ex aquis sulphureis, in quibus per semihoram moretur moderate calidis, & tertia quaque die ex aqua fluviatili tepida, in qua maneat horam circiter, primum administrabitur ter aut quater, alterum plures dies, ad tollendam intemperiem calidam.

Addatur congrua victus ratio, quæ sit ciborum boni succi, refrigerantium, & humectantium, abstinendo ab aromatibus, acetariis, salitis, & cibus crassi succi, bibendo vinum oligophorum; moderate corpus exercendo. Ita namque superabitur affectus: qui & curatus fuit in nobilissimo hoc patiente.

#### De Herpete in mento. Pro Nobili Adolescente.

Affectus quo nunc detinetur Patiens Nobilis, ratione partis affectæ, mentagria dicitur: non est tamen ista mentagria antiquorum, quæ depalcebatur totam carnem menti, sed sunt tubercula quædam in ulcuscula degenerantia, statimque exarscentia, & ad circumpositas partes sese diffundentia. Ideoque non immerito

herpes miliaris nominanda, eaque genita à fluxione bilis & pituita permixta jecore præcalido, & humido cerebro genitorum, atque in mentum tanquam ad partem imbecilliorē conuientium post sanationem abscessus in podice suborti, & cicatrice obduci.

Affectus non ita sanatu facilis, cum ratione fluxionis, tum ratione malæ qualitatis, & intemperiei calidæ in parte affecta contraxit.

Ideoque pro ipsius sanatione divertenda est materia fluens, illuxa lentibiliter & insensibiliter evacuanda; impediendaque similis materię regeneratio per ea quæ jecur refrigerant, & caput exsiccant; ac tandem per subaltringentia pars affecta est corroboranda.

Pro curatione præsentis affectus, plura quidem hactenus, rite & recte præscripta fuere: non tamen omittenda & alia posthac administranda. Quare si de Chirurgicis sermo fiat, cum jam sanguis per venam sectam fuerit eductus, poterant iterum applicari cucurbitulæ dorso pro revulsione: ac deinde in progressu non displicent hirudines indique mento applicandæ, quippe quæ evacubunt humorem illum vitiosum, qui parti affectæ est impactus. Placet quin etiam pro revulsione fonticulus interno dextro femori inustus, summa cum ratione à Viro præclarissimo præscriptus: nec displicent frequentes pedum lotiones cum aqua dulci, vel lixivio alterato malva, lapathio, flor. chamæmel, & viola.

Pharmaceutica quod attinet, licet alvus sponte fluat, non ob id improbantur aliqua blandè evacuantia, nempe stor. cassia recens extractæ ad unc. sem. sæpe parum ante cibum sumptus: diaprunum cum senna, aut passula cum senna; aut quid tale; nec de aliis preparantibus, aut purgantibus generosis quidquam dicam, cum diligentissima totius purgatio fuerit jam peracta, decoctum exhibitum, seu potius vinum alexipharmacum, & solutivum per plures dies: ac tandem serum lactis caprini. Quare supposita accurata totius purgatione jam facta, & non sine ratione repetenda dejectorium per aliquod saltem, ex rhabarbaro, senna, & agarico; Iudo aquam Villensem per quindecim dies circiter eamque diureticam reddit, cum syr. quinque rad. & emulsione sine melonum; post cujus usum proderit etiam saccharum ros. recens ad unc. i. mane sumptum itidem quindecim dies, facta intunctione partis affectæ cum lythargio aureo, cerussa, & gravis quatuor sublimati dulcis.

De Scabie, & Hamorrhoidibus dolentibus: & an pro ipsarum curatione pulvis viperinus cum sale prunella assumi tuto possit. Ad Excell. Hieronymum Durantem.

Ex scheda mihi tradita ab admodum Reverendo Patre Franciscano, nomine perillustri & Excellent. D. Hieronymi Durantes, duas difficultates video obijci opinioni meæ de Scabie, & Hamorrhoidibus consiliantibus Nobilem patientem: quarum prima est, in scabie nullam pulveris viperini indicationem, nullamque utilitatem futuram, dum suspecta est acrimonia illa, quam in sanguine pulvis viperinus excitare potis est; non enim, inquit Vir Doctissimus, & optimè, in scabie curanda medica-



menta admittuntur, quæ sanguinis acrimoniam augent: altera est, sanguinem per hæmorrhoidas fluxurum acriorem a pulvere viperino reddi; hoc enim addit, repugnat experientia; nam eo sumpto viginti dies, & quod excedit, nunquam ab illis venis sanguinem fluxisse observatum est, quin potius fluxus frequentiam remisisset. Quibus propositis, obtrinit se in ea opinione, quam longa observatione ante pulveris viperini usum conceperat, sanguinem scilicet in Nob. patiente exitum sibi parare non acrimoniam, sed copia: sanguinem enim fundunt venæ illæ sine ullo irritationis sensu, vel repletæ, vel laxatæ, ut inquit: ac proinde si copia desit, tunc neque in maximo egerendi scæces conatu sanguinis guttula exprimitur, soluta autem alvo a fructibus horariis, vel à medulla cassiæ deglutita, promptè sanguis rejicitur non irritando, non comprimendo, sed laxando. Hæc Vir Doctiss. perquam doctissime in medium protulit.

Quibus ego pro viribus satisfacere conabor, non tanquam alter Hippoc. qui omnium inime in arte me versatum fateor, sed tanquam doctrinæ Hippocraticæ admirator, & pro viribus imitator. Atque ideo cum Hippocr. & Galeno jam scripta confirmare non gravabor, quo supponens ut verissima; quorum primum est, me semper locutum fuisse de pulvere viperino, & sale prunellæ simul junctis, quum scriptum ad me fuerit, Nobilem patientem nunc uti sale prunellæ, & pulvere viperino, quod à præclarissimo Viro in hac scheda confirmatum video, dum scribit, quod hæret animus in iis in usu scil. pulveris viperini, & salis prunellæ non esse ulterius progrediendum. Quare difficultates non emergunt solum ex usu pulveris viperini, sed ex usu utriusque simul sumpti. Sicuti enim in viperæ carne intemperiem calidam, & siccam constituit Gal. 2. simpl. cap. de vipera, ita in sale prunellæ, ex sale nitri & flore sulphuris confecto, acrimoniam aliquam adesse mihi persuadeo, ideoque à me scriptum fuit, quod medicamentum hoc vi exliccatoria cum mordacitate aliqua præditum est. Suppono secundo tanquam indubitatum, sanguinem in Nob. patiente non sola copia peccare, sed & acrimoniam aliquam, & mala qualitate, idque non solum ex ætate consistente, in qua viget sanguis melancholicus, sed longè magis ex loco per quem effluit, & ex annexa scabie, hoc argumento. Humor ille, quo præsentem sunt affectus, & participes cujus absentia præservantur, & curantur patientes à morbis dependentibus à materia mala qualitate peccante, est humor non sola copia, sed mala qualitate peccans; Atqui in Nob. patiente scabies aliam non agnoscit causam, quam sanguinem in venoso genere contentum, & per hæmorrhoidas expurgari consuetum, scabiesque sit à materia acris; ergo sanguis hic acrimoniam habet. Sic atra bile vexatis, & renum passionibus hæmorrhoides supervenientes bonum, inquit Hippoc. in Aph. atque idemmet divinus senex subjunxit 6. Epid. sect. 3. *Hæmorrhoidas habentes neque pleuritide, neque peripneumonia, neque phagedæna, neque furunculis, neque cerebri in febrem habentibus, jactasse neque lepra detineri.* At morbi prædicti non à sola sanguinis copia, sed & à mala qualitate proveniunt. Ergo sanguis per hæ-

morrhoidas excerni consuetus non sola copia, sed & mala qualitate peccat: non negando tamen sola copia peccantem aliquando per has venas evacuari, quod a Galeno cum in Aphorismis, tum in Epidemiis, & alibi confirmatum legi: sed in casu nostro, cum scabiem soveat, & conservet, non potest non habere aliquam acrimoniam, quam si Nob. Patientis non observat in ipsius excretionem, hoc aliunde non provenit quam quod dum effluit, non permeat loca sensibilia, sed facta venarum anastomosi, effunditur. Quod si in magno conatu ne guttula quidem effluit, hoc fit, quia tunc est in paucâ copia; quod si excernitur, liberalius ab usu fructuum horariorum, & flor. cassi. hoc fit cum ob serositatem, ratione fructuum; tum ob impulsionem à loco altiori, ratione cassiæ, non tamen à sola venarum laxitate: hunc etenim non tam facile silteretur, & ex valido conatu denuo funderetur. His itaque suppositis, primæ difficultati respondendum censeo: in scabie nullam indicationem, neque ullam utilitatem futuram ex usu pulveris viperini, quotiescunque sumetur cum sale prunellæ, ratione acrimoniz ipsius sed si solus pulvis viperinus vel etiam caro viperina exhibeatur, usui erit, protrudendo humores ab internis visceribus, & a venoso genere ad cutem, non secus ac facitatum fuisse in lepræ curatione nos docuit Gal. 2. Simpl. cap. de vipera, ubi retulit tres, aut 4. casus lepræ curatæ potu vini, in quo extincta fuit vipera. Ubi enim vitiosus humor ad cutem detrusus fuerit, levata massa sanguinea, tunc facilius sanatur scabies: quæ non aliam ob causam verno tempore alioquin saluberrimo efflorescere solet ex Gal. & Hippoc. 3. Aph. 10. tex. & com. Ex his facile etiam tollitur alia difficultas, nempe, quod si acrimoniam haberet pulvis viperinus, sanguinem hæmorrhoidalem concitatiores reddidisset. Respondetur enim primò, quod solus pulvis viperinus sine sale prunellæ sumptus nullam habet acrimoniam; addo secundo, quod si sumptus fuit cum sale, & nihilo minus juvit, duplicem ob causam prodesse potuit. Primo quia propellendo humores ad cutem, divertit ab hæmorrhoidibus & sic inminuit, non tamen fluxionem: secundo quia si etiam jam copiosa sanguinis effusione, requiritur aliquod tempus ad novæ materiz collectionem, quæ denuo à natura expurgeretur: non secus ac evenit in mensuris muliebribus purgationibus. Si enim copia desit ut optime scripsit Vir Excellent. non succedit evidens sanguinis evacuatio. Atque hæc dicta sunt, ut pro virili quæsitis satisfaciam, committe non hæc solum, sed & cætera Nobiliss. Viro necessaria prudentissimo & acutissimo ingenio viri præclarissimi, & in arte versatissimi. Benedict. Silvæ. Consil. & Respons. Medic. Cent. 1.

#### *Affectus totius Corporis pruriginosus.*

Serenissimus Dux Dominus meus, cujus temperamentum est Illustrissimæ Dominationi velite notum, natus ex Patre, qui infectus fuit impetigine, cum pustulis quibusdam per corpus dispersis, quæ dum delitecebant, atrum in cute relinquebant colorem indelebilem, quando desit impetigo, incidit in dolores arthricos & podagricos immanes, semper qualibet septima die



die repetentes in toto vitæ suæ cursu, cum hac lege ac ordine, quod quando dolores & arthritici cruciatus remittebantur, statim Diarrhœa humoralis succedebat, invitaque medela à variis Medicinæ Proceribus instituta, humores adeo venefici facti fuere, ut in ætate annorum viginti septem diem suum obierit, postquam ex vigesimo primo coeperit præfatis vexari doloribus, ex pingui carnosoque, velut macie consumptus factus, & per annos septem ab illorum insuitu nullius fere diei ab illis intermissionem expertus, cum maxima admiratione Anglorum, Gallorum, Patavinorum, Romanorum & Bononiensium Medicorum, præter plures Spagyricos, qui illum inviserent. Dux meus præfatus ex eo natus, nulli in proceritate, forma, partium concinnitate, structura corporis & animi dotibus admirandis secundus, in annorum ætate quatuordecim constitutus, dum Natura cum sanguine & spiritu gliscere incipit, per annos multos inculpatam valetudinem sortitus post medelam ei adhibitam, pro qua simul convenimus, in gratiam cujusdam destillationis ad aures, & pro prurigine corporis, omnino sanus factus est usque ad ætatem annorum quatuordecim, in qua post varias animi & corporis fluctuationes propter matrimonium Sororis Serenissimæ, præter hæreditarium à Patre in eo relictum inquinamentum, plus justo in antedicta ætate incalescente sanguine, adjecti corporis exercitiis laudabilibus quidem, sed inanius incongruis, incidit in impetiginem totius corporis, cum maximo pruritu, cutis asperitate, & parvis rubris, miliaribusque efflorescentiis per ambitum totius dispersis, ut in collo, pectore, dorso, brachiis, ventre & cruribus, quæ nunc incipiunt redolere naturam humidæ scabiei, dirumpuntur enim nonnullæ efflorescentiæ, aliquamque tenuem emittunt saniem, maxime in collo & manibus, & non in alia parte de præfenti. Jam notum est, quod Bacchanalia dissipant Leges victus rationis, erroresque inferunt in motu, hinc factum est, non ex hoc capite simpliciter, sed jure hæreditario, quod incidit in dictam impetiginem, hoc tempore, semper tamen ab ejus ortu plus & minus vitæ pruritus persensit, non obstante optima congruaque victus ratione, vinæ parva, non dulcis & aqua symphata in quantitate minima bibens, sicut semper parce comedens cum modis ejus temperamento idoneis. Hæc sunt, quæ currenti calamo scribo circa præsentem affectum, pro quo, quid, quale, quantum, tempus & modum omnino subijcio prudentiæ Dominationis vestræ Illustrissimæ, cui me totum voveo.

Dum ego quolibet alio, quam Medici titulo, Serenissimo nostro Domino inservire cupio, ægro animo pro eodem operam medicam exerceo. Verum cum humanæ vitæ alterationibus sublunariis obnoxia prospexit Altissimus, Artem medicam, ut necessariam, ipse creavit, præcipue in Regum atque Principum gratiam, quorum & ipse potissimum curam semper atque custodiam habuit, ut subditis omnibus præstet, eoque recte custodire ac gubernare possent. Et nos igitur ingenium totis viribus intendere debemus pro conservatione hujus meritissimi Principis, quemadmodum te, Vir Excellentissi-

me, præstitisse video, dum ex tua exactissima relatione facile conicere mihi licet, tum ideam, tum causas affectionis in præfens Serenissimum divexantis; etenim sicut scabies sicca, ad impetiginem redigi potest, ita impetigo quodammodo humida ad scabiem certo redigitur; quare dispositio totius corporis pruriginosa, quæ Serenissimus detinetur, mediam quandam affectionem esse inter impetiginem & scabiem, dubio procul decernere debeamus, cujus causa non solum in errores in vivendo commissos, nimirum in animos, tum corporis, tum animi motus, sed multo magis in naturalem & hæreditariam pravam diathesin à Paterno semine contractam referenda est, cum etiam in tenella ætate sex annorum ante errores commissos affectum non ab similem passus fuerit, quo Pater Serenissimus magnopere iterum atque iterum affligebatur; quod non aliunde provenit, quam à jecoris & cordis intemperie calida, alimentalem sanguinem calidum producente, necnon à sanguine congenito, qui cum justo calidior existat, alimentalem quoque calidiorem reddit, cujus ebullientem tenuiorem partem ejusdem spumolam ad universi corporis cutem Natura pro minori malo transmittit, cutem eandem pustulis magna ex parte siccis, nonnullis etiam humidis inficit, & pruriginosam affectionem efficit.

Pro cujus extirpatione, major difficultas in anni tempore consistit; etenim si vernum esset, ut est hybernium, certa foret, & cum minori Serenissimi molestia sanatio; at tamen quoniam à Vere multum distamus, & interim affectus impetiginosus certo augeri, & cutaneæ partes universæ progressu facile & infici, & pravam diathesin atque corruptivam dispositionem adipisci possent; ideo transactis hæc diebus Bacchanaliorum, incongruo quoque anni tempore, opem medicam Serenissimo præstandam esse consulo, ut à præfenti molestia vindicetur, & ab alio aliquo imminente affectu, augescente causa, præservetur.

In quem finem primæ viæ erunt expediendæ. Venosum genus à biliosis impuritatibus purgandum. Jecoris, cordis & sanguinis calor contemperandus; atque tandem cutaneæ infectioni incumbendum.

Quibus intentionibus ut satisfaciamus, ex fonte Chirurgico duplex erit de promenda sanguinis missio ex utroque brachio, sed parca; tertia quoque facile erit suo tempore addenda à partibus cutaneis, cucurbitulis hinc inde una vice appositis, ut subcutaneus tantum & infectus sanguis extrahatur, non autem à profundioribus partibus attrahatur; Cauterium quod jam gestat, custodiatur, & alterum in coxa, quod inuri posset, omittatur, tum quia non adeo ad præfervationem necessarium videtur, tum quia equitationi valde incommodum evaderet.

Ex Pharmaceutico fonte, Lenientia, Præparantia, Purgantia, intemperiem corrigentia, & cutem universam respicientia, sunt defumenda.

Lenientia esse poterunt cassia, aq. cass. syr. ros. vel viol. sol. Prima Præparantia erunt jura pullæ, Cichoraceis, violis, malva alterata, addito julap. viol. vel rosato. Prima peracta



viarum expiatione, ad ulteriora Præparantia erit deveniendum; in quem finem potius aqua stillatitia, quam herbarum succi, erunt eligendæ, cum hoc anni tempore herbarum folia suis viribus careant, ad radices contractis; quare aqua stillatitia ex succo cichorii efficacissima erit ad integrum cyathum, cui immisceri poterit Conserva de acido citri, vel syrup. de acido citri & de succo limonum. Prærogativam etiam habet sal prunellæ ad 3j. eidem aquæ commissus; pariter spiritus vitrioli ad gutt. vi. Tua autem erit, Vir Sapientissime, electio. In horum usu perseverabit viginti saltem diebus; & singula hebdomada biliosus humor erit purgandus elect. de succo rosar. cum cass. vel infus. rhabarb. addito syr. ros. solutivo, quibus superbibat serum capr. depur. ad lbj.

Hæc purgatione peracta, residuum peccantis humoris ad cutem expellendum, ad nasam sanguineam prorsus defœcandam; quod egregie præstare poterit caro viperina, sive ejusdem decoctiones in jure, sive in substantia pulvis cum aqua stillatitia borraginis & cardui sancti exhibendus. Nec quicquam de calore timendum, cum Vipera inter Animantia frigida apertis verbis à Galen. enumeretur, est tamen tenuum partium & diaphoretica, adeo ut Galen. idem de Vipera dixerit, quod Caro Viperæ valde digerit, & ad cutem properet; ut propterea Philosophum quendam, & alios quam plures observaverit Galen. à morbis cutaneis potu vini viperati sanatos. Dum autem viperata remedia præbentur, frictionibus universalibus totum est exercendum, imo & cucurbitulis siccis cito detractis & repetitis; totumque corpus indumentis munitum est custodiendum.

Post hæc, ut viscerum & sanguinis fervor contemperetur, & simul ejusdem acrimonia edulcoretur, Alterans anni tempore proportionatum erit præscribendum, & hujusmodi esse poterit.

℞. Sem. melon. mundat. 3j. sem. cucurb. angur. mundat. ana 3ß. contundantur, & cum jure pullæ junioris ad 3vi. extrahatur Emulsio, cui addatur sacch. albi cochlear, vel julap. ros. 3j. & m. summo mane assumenda; in cujus usu perseveret xx. aut xxx. diebus: non enim prorsus deleri poterit cutanea affectio, nisi ejusdem radices evellantur & extirpentur.

Interim topica quoque medicamenta sunt administranda, sed toti corpori, cæteris omnibus peractis; pro manibus autem & partibus apparentibus atque detectis, quolibet alio tempore Serenissimus iisdem utatur: jucundiora autem & minus molesta sunt eligenda; inter quæ apud me paratur aqua hunc in modum.

℞. Vitrioli Rom. calcinati 3ij. Aquæ rosarum lbj. Aquæ scabiosæ lbß. m. fiat inf. per horas 24. deinde fiat colat. & servetur ad usum; qua aqua madefiat spongiola, & tangantur pariter affectus.

Quibus omnibus erit addenda, & à summa prudentia tua præscribenda congrua vivendi ratio, ita ut victus sit refrigerans. Potus sit vinum album, tenue & aquosum. Somnus no-

cturnus sit diuturnus. Exercitia sint moderata, motus enim est causa caloris. Alvus obediens servanda, vel jure malva alterato, vel flore cass. ad 3ij. in prima mensa. Et tandem animi motus, ita niñarum, cæteræque perturbationes sunt arcendæ. Hæcque sunt ab anni tempore permissa administranda, ne affectus hujusmodi in præsens habitudinalis, in progressu habitualis evadat. Ita D. O. M. meritis serenissimi Ducis assistat, & vota nostra secundet. *Joan. Raym. Forster Consultat. & Resp. Medic. tom. 2. Cent. 3.*

### *Pruriginosus Affectus.*

Illustrissimus Comes & Gubernator, annum agens quinquagesimum quartum, temperamenti secundum totum & jecur, ad calidum & siccum vergentis, mediocris habitus, in Castris superioribus annis vitam ducens, & ideo, etiam inuitus, eduliis pravi succi, præsertim salitis & vinis generosis, sulphure conditis enutritus fuit. Tandem mense Septembri proxime præterito prurigne quadam brachio sinistro molestari cœpit, quæ ad alterum brachium, & inde ad pectus ac dorsum paulatim sese propagavit. Et quamvis à Medico suo domestico varia fuerint adhibita remedia, nihilo tamen mitior unquam facta est: quiniio adeo increvit, ut somnum interrumpat, & noctes inquietas reddat: ut propterea etiam hoc tempore hyemali ad Purgationes incongruo, medicam opem quære cogatur, ut, si non ex toto auferri, saltem minui atque mitescere possit molestissimus iste affectus.

Pruriginosum affectum pro quibusdam abhinc mensibus molestari cœpit Illustrissimus Comes, ab impuritate sanguinis provenire non est quod dubitemus: cujus impuritas consistit in redundantibus serositatibus, iisque potius acidis & melancholicis, quam acris & biliosis, quæ in declinante ætate & autumnali tempore vigere & abundare solent, & ideo Senibus ut plurimum familiaris est ista affectio: sicut Scabies aliis ætatibus accidere consuevit, quæ crassis non solum, sed crudis quoque succis abundat ob vivendi libertatem. Multo facilius vero huic Illustrissimo Viro contigit molestus affectus iste pruriginosus, cum alimentis pravi succi, & frequenter salitis, necnon vinis meracioribus ac sulphureatis (vel inuitus) multo tempore nutritus fuerit: quibus non solum cacochymum sanguinem, sero caliginoso & acido refertum, verum & calidam in jecore intemperiem sibi comparavit, juges serositates reproducentem: quas, utpote nutritioni inutiles, provida Natura ad ambitum corporis, tantquam ad universale Emunctorium pro minori malo deposuit. Et cum ab ambiente, autumnali tempore, frigidiori reddito, cohibita fuerat insensibilis earundem transpiratio atque resolutio, hinc factum fuit quod sub integumentis detentæ atque densatæ, indeque ad cutem & cuticulam detrusæ, pruriginosam affectionem constituerint, quæ molestior (ad aucta ambientis frigiditate) facta est, prout semper magis insensibilis transpiratio atque discussio inhibita fuit.

Est ille affectus molestus. Et quamvis in præsens periculo vacet, vigilias tamen inducens, coctio-



coctionibus obesse poterit, & Cacochymiam adaugere; & idcirco spernendus non est, sed quamprimum ejusdem radices extirpandæ, antequam prava diathesis putrilaginosa sub integumentis compateretur, quæ postea non modo difficilem, sed frequenter impossibilem Curationem reddit.

Quare spe pristinae salutis concepta, Purgatio regularis incunda erit, primas vias expiando. Secundo Venosum genus ab impuritate vindicando. Tertiò Massam sanguineam edulcorando; atque tandem jecoris & venarum calorem contemperando, pruriginosamque molestantiam demulcendo. Quibus intentionibus sub fine Veris tantummodo satisfieri poterit: tunc enim ex Jecoraria sanguis erit mutendus: cucurbitulae plures, vulgo dictæ *Cornetti*, in fine Purgationis universo corpori affigendæ. Expediatis primis viis, succis cichorii, borag. pom. dulc. fumariz depuratis in decoctione Cichoraceorum; additis foliis malvarum, violarum; sonchi; hepaticæ, erit multo tempore utendum: & quinto quoque die minorativum aliquod Purgans exhibendum, ex flore cassiz, electuario de succo rosarum; Extracto sent. & Magist. mechoac. paratum, serum depuratum superbibendum propiando. Et ut ex toto serositates a massa sanguinea segregentur, & ad cutem impellantur, viperata quoque medicamenta erunt ad usum duccenda, ut viperinis pulvis, aut jus pullæ carnis viperina nutritæ. Inde ad duo præcipua & necessaria remedia erit deveniendum, internum unum, & erit lactis caprini usus quadraginta aut quinquaginta diebus: externum alterum, eritque Balneum universale aquæ dulcis, foliis malv. viol. scabiosæ, salicis, & in fine etiam saturæ alteratæ, viginti diebus administrandum. Tandem Conservæ rosarum usus aptissimus erit, præsertim si superbibatur aqua stillat. de succo cichorii.

Sed quoniam affectus urget, & in præsens quoque medicum auxilium expostulat: idcirco summariam & coactam, non adeo regularem Curationem, quamvis tempus permittit, proponam: & primo ventriculum & intestina ab excrementis mundare est prorsus necesse, quod præstabitur electuariis lenit. cum crem. tartari bis repetito; & intermediis quinque diebus, cremore tart. ad semitunc. in jure frustulo cinnam. alterato, dissolutò. Hinc statim ad usum lactis arte facti deveniendum, hunc in modum parati.

℞. Seminum meloni. anguriz, cucurbitæ mundat. an. ʒ ss. amygdalarum dulc. num. xv. m. contund. in mortario; & cum jure pullæ tenui extrahatur Emulso ad ʒ vii. cui addatur Syrupi de pom. ʒ j. m. pro potu matutino, quatuor horis ante prandium; & in hujus usu perseverandum ad quadagesimum usque diem: sed quarto quoque die assumat Minorativum hujusmodi.

℞. Aquæ stillat. de succo cichor. ʒ vii. succi limon. ʒ j. rhubarb. maturi inc. in petia alligati ʒ j. m. f. infusio per horas duodecim & mane facta colatura, præbeatur tribus aut quatuor horis ante prandium. Interim pro pruritu sedando. illiniendæ partes oleo amygdalino recenti. Hæcque in præsens sat sint.

Quibus congrua erit addenda vivendi ratio, præsertim in cibo & potu: cavendo ab acribus, acidis, salicis; a viis generosis; a condimentis aromaticis, allii, caprarum: & potius vescatur edulius ex lacte paratis, Emulsione seminum melonum & amygdalarum dulc. conditis, & in reliquis Excellentiss. suo Medico Adstanti prorsus obtemperet. *Idem ibidem.*

### Consultatio. I.

#### *Scabies universalis crustacea.*

Admodum Reverendus Pater quadagesimum quintum annum agens, temperamenti secundum totum calidi & humidum, hepatis tamen calidioris, habitus satis carnosum, liberam quidem; at non licentiosam vitam ducens; anno elapso molestari cepit à pruritu quodam qui paulatim serpendo, ab extremis partibus ad universum corpus sese propagavit, & progressu intensior factus, adeo Admodum Rev. Pat. ad scalpendum cogit, ut ichores non solum simplices, verum & cruenti erumpere cœperint, crustas subinde relinquentes & postea succrescentes. ita ut scabiosum cum pruritu & crustis undequaque refertum factum fuerit universum corpus: crustis interim & flavis, & albi coloris copiosis in lecto noctu decidentibus, & novam reproductionem iterum habentibus: quam affectionem nec contactu, nec mihi Venereo congressu contraxit. Multa hoc tempore præstita fuerunt modica Auxilia, refrigerantia, purgantia, sanguinem fluidentia, & Topica, sed omnia incassum administrata fuere; forsitan quia sat non fuit massa sanguinea depurata; nec jecoris intemperies calida satis remissa: & quod ego magni facio, necessaria aliqua omissa sunt, ablatio nimirum diathesis putrilaginosa sub integumentis latentis. Quæ omnia mihi considerata & perficienda; dum Vere præsentem me de agendis pro salute consiliet.

Affectus itaque cutaneus à planta pedis usque ad verticem capitis Admodum Reverend. Patris, totum corpus occupans, sicut ab initio pruriginosus tantum fuit, ita progressu ad Scabiem & Psoam pervenit; nondum tamen Lepre naturam attingens: Etenim quamvis crustaceus factus fuerit; crustæ tamen decedentes flavi & albi, non nigri & atrii coloris apparent & quod magis est, colorem in cute rubrum, non atrum, cutemque ipsam humidam potius, quam aridam relinquant. Hujus autem affectus causæ externæ forsitan esse potuerunt potus vini generosi; aut dulcis, & incolatus in aëre lacultri & crasso, quæ & jecoris naturalem fervorem adaugere, & sanguinem cum spiritibus incrassare & inquinare potuerint; cum nec lues Celtica, nec aliud contagium hic locum habuerit. Verum causa interna & immediata in impuritate totius sanguinis est referenda, hæcque à calida jecoris intemperie producta, quæ impuritas consistit in nimis fervido, & quodammodo exusto sanguine, cum serositatibus, tum acribus, tum acidis, imò & cruditatibus additis, atque ex admixtione sanguinis redditus; ut propterea



ab iisdem oppressa & irritata Natura cum diutius pravorum huiusmodi succorum praesentiam tolerare nequirit, eisdem à partibus internis nobilioribus ad externas ignobiliores propellere conata fuerit, sicque ab initio tenuiori ichoris portione ad cutem detrusa, prurigo tantum in summa cute excirata fuit, at excreta deinde crassioris & heterogenei excrementi portione ad cutem ipsam, Scabies & Pfora crustacea secuta est.

A qua omnino liberari posse Adm. Rev. P. non est quod dubitemus, quamvis non adeo facile: operosam enim ac diuturnam exigit affectus iste Curationem, ne migret in Leporam; pro qua Curatione explenda, primæ viæ sunt explendæ. Secundo Massa sanguinea ab impuritatibus vindicanda. Tertiò Fervida jecoris atque sanguinis intemperies calida corrigenda; Quarto totum corpus extrinsecus à scabie & crustis mundandum. Quintò Diathesis putrilaginosa latens sub integumentis removenda; atque tandem tota massa sanguinea edulcoranda.

Quibus intentionibus ut satisfaciamus, remedia à Chirurgico Pharmaceutico & Diætético fonte sunt depromenda. Et à Chirurgico duplex saltem sanguinis missio ex utroque brachio, seu manu: etenim & tertia ex hæmorrhoidibus non parum prodesse posset. Reliqua ex hoc fonte desumenda, ordine executivo erunt proponenda.

Pro prima intentione adimplenda, primùm Leniens ita parabitur.

℞. Pot. ex man. clarif. ʒvi. aq. florum citri parum, m. pro potu. Preparans quinque diebus assumendum, erit.

℞. Julap. acet. ʒij. syr. de pom. aq. florum citri an. ʒj. m. pro syr. & sic pro aliis. Secundum Leniens erit.

℞. Syr. ros. solut. de polypod. compos. an. ʒij. aq. florum citri parum, m. f. potio; cui, tribus transactis horis, superbibat seri capr. ʒij. & duabus horis ab assumpto sero prandeat.

Pro secunda intentione, Preparantia ex succis herbarum depur. ita paranda erunt.

℞. Succī depur. cich. borag. fumariz an. ʒj. decoct. endiv. sonchi, melissæ, lupulorum ʒv. m. pro syr. & sic pro quinque aliis. Interim his diebus prima vice educatur sanguis. Septima die Purgans huiusmodi exhibeatut.

℞. Pot. ex man. clarif. ʒv. addendo infusioni consuetæ rhubarb. opt. ʒj. agarici trochisc. ʒij. cinnam. integri parum, sicque facta colatura, fiat potio; cui pariter superbibat serum depur. ad ʒij. ut supra. Deinde repetantur succi cum decoct. ita.

℞. Succī depur. cich. borag. fumariz an. ʒj. decoct. melissæ, lupulorum, violarum, malvarum, sonchi ʒv. salis tart. fixi gr. x. m. pro syrupo, & pro sex aliis; Et interim his diebus fiat secunda sanguinis detractio. Inde aliud Purgans est exhibendum, ita.

℞. Decoct. Epith. Mel. syr. rosati solut. rec. an. ʒij. aq. florum citri parum, m. f. potio; cui superbibat serum capr. ad ʒij. ut supra. Et inde repetantur succi hunc in modum.

℞. Succī depur. cich. fumariz, agrim. an. ʒj. decoct. borag. endiv. melissæ, lupulorum.

scabiosæ, cardui sancti ʒv. salis tart. fixi gr. x. m. pro syr. & sic pro quinque aliis; quibus Purgans succedat.

℞. Decoct. Epith. Mel. syr. de polypod. compositi an. ʒij. aq. florum citri parum, m. pro potu; cui superbibat serum capr. ad ʒij. ut supra. Inde reperantur succi ita.

℞. Succī depur. cichor. fumariz, beton. an. ʒj. decoct. borag. violarum, endiv. hepaticæ, melissæ & scabiosæ ʒv. salis tart. fixi gran. 10. m. pro syrupo. & sic pro quinque aliis. Hisque diebus, si sanguis secunda vice extractus valde impurus fuerit, aperiantur venæ fedales pro tertia extractione. His autem postremis succis assumptis, sequatur huiusmodi expurgatio.

℞. Decoct. Epith. Mel. helleboratæ ʒvi. irroretur guttulis aquæ cinnam. f. potio; cui, tribus transactis horis, superbibat seri capr. aut asin. depur. ʒij. & tribus horis ab assumpto sero prandeat. Hac eadem portio bis adhuc tertio quoque die repetenda erit, cum eadem seri quantitate. Diebus autem intermediis bibat aquam ita parandam.

℞. Aq. stillat. de succo cich. ʒx. salis prunellæ ʒβ. m. pro potu tertio quoque die assumendo.

Pro tertia intentione explenda, potus aquarum sponte nascentium necessarius erit; inter quas, Nocerianas eligendas esse censeo, quæ cum minerales non sint, jecur refrigerare, & sanguinem edulcorare quoque poterunt, præbeantur autem tribus primis diebus cum vehiculo dejectorio syrupo ros. solut. aut portiois ex man. clarificata, reliquis vero xii. diebus cum vehiculo diuretico; ex syrupo de succo limon. & guttulis spirit. tartari rectif. parato; in fine exhibendo portionem ex man. clarif. ut educatur portio aliqua aquæ relicta forsan, & non educta.

His præactis, ut residuum impuritatis totum ad cutem propellatur, ad usum pulveris viperini deveniendum, cujus dosis erunt gr. 20. in aqua cardui sancti ad ʒiv. additis ʒij. vini albi aquosi tenuissimi; in cujus usu x. diebus perseverandum. Nec obstabit anni tempus calidum: siquidem Vipera est animal frigidum, licet valde siccum & diaphoreticum.

Interim quartæ intentioni satisfaciendum erit remediis externis. Sic quatuor aut quinque diebus, mane, & vespere manibus madefactis aqua, nunc describenda, illiniatur totum corpus; mox paretur Balneum, in quo maneat per horæ dimidium quotidie matutinis horis per alios quinque dies; & à Balneo statim fiat illinitio, ut supra, eadem aqua ita paranda.

℞. Arantiorum acidorum in frustula incisorum num. 10. ponantur in B. M. & destillentur; deinde.

℞. Aquæ ab iisdem destill. ʒj. Mercurii dulcis. ʒβ. m. dissolvatur. Balneum verò paretur ita.

℞. Aquæ com. simulæ ʒv. salis com. ʒβ. m. bulliant, & spuma detrahatur; mox adde foliorum organi, pulegii, calamenthi montani, malvarum, mercurialis, borag. salvia, sativæ an. manip. j. bulliant ad consumptum, quartæ partis aquæ; quæ in labello ligneo oblongo, aqua communis lythi repleto afundatur,



& simul misceatur, pro Balneo universali tepido.

Decem jam dictis transactis diebus, Cucurbitulæ parvæ, Cornetti dictæ, undequaque dorso, uaribus & coxis apponantur, & paucis incisionibus factis, extrahatur primus tantum sanguis, mox removeantur, ut quintæ intentioni satisfiat: pro qua perficienda, sequentibus diebus parva spongiosa, aqua describenda imbuta, partes magis affectæ tangendæ sine deterfione: ita namque residuum latens prorsus extirpabitur; aquæ vero descriptio est hujusmodi.

℞. Vitrioli Rom. calcinati ꝑ. iv. aq. rosar. aq. scabiosæ an. ꝑ. j. m. infund. per 24. horas, deinde fiat colatura ad usum.

Tandem postremæ intentioni commode satisfacere poterit lac asininum, summo mane de more cum saccharo sumptum ad xxx. vel xl. dies; quo tempore Balneum aquæ dulcis horis vespertinis, malvis, violis, soncho, nymphæa & salice alteratæ, conveniens erit. Vel saltem pro Balneo substituaturs natatio in frigida.

Et his omnibus concurrat congrua vivendi ratio, præsertim in cibis & potibus, adeo ut vitentur alimenta & condimenta calidiora, & vinum generosum, ut recuperatam sanitatem conservare possit Admodum Rev. P. quam ego à summo Deo eidem ex corde precor.

### Consultatio. II.

#### Pro eadem.

Jam tertius percurrit annus, quo non minus fœdo, quam molesto affectu cutaneo; pruriginoso primò, mox scabioso atque crustaceo summopere vexatus fui, & in præsens, licet remisse, divexor: ob quem summam Virtutem tuam, Vir Præclarissime, consului, & præscriptam Purgationem executioni mandavi, cum maximo levamine; sed subsequenti anno. ineunte Vere recrudit affectus ipse. Et quoniam Tu ad Sac. Cæsaream Majestatem accersitus fuisti, ad Eximios Medicos Vicentinos confugere coactus fui, qui Purgationem ineundam, à tuis Præscriptis non valde dissimilem, descripserunt: qua absoluta, evidentissimam quidem utilitatem, & affectus diminutionem percepi non tamen prorsus affectus unquam evanuit: imo sub initio hujus mensis Martii increvit affectus ipse inguina & scrotum occupans, necnon sub axillis erumpens, cum pruritu, qui me frequenter manus admoveere cogit, & unguibus scalpere, à quibus affectis partibus veluti fursures decidunt. Quare pejora timens, dum & à præsentis molestia vindicari cupio, ad Te, tanquam ad unicam spem meam rursus confugio sanandus.

Quoniam veritas una est, & morbum, ut dicebat Hippocr. ostendit sanatio, idcirco in eadem sententia maneo, in superiori Consultatione à meipso exarata, nempe affectum hujusmodi cutaneum pro causa immediata sanguinis impuritatem cognoscere, quæ in acris & acidi humoris redundantia consistit: sicut à fervida jecoris & cordis intemperie, tanquam à media-

ta causa procedere. Quam veritatem confirmavit levamen bis jam sequutum ab electivè purgantibus medicamentis, necnon ab intemperiem calidam corrigentibus. Verum quoniam intemperies ad summum gradum redactæ, non adeo facile, nec brevi remitti possunt, ideo ab eodem exuberante calore eorundem humorum reproductio quamvis minor secuta est: ut propterea repullulaverit affectus ipse, non tamen per universum corpus, ut antea, neque sub forma Scabiei, sive Pioræ quoniam humor ipse nec adeo copiosus, nec adeo activus est, sed ut exiguus, e jecore ad inguina & scrotum: è corde ad axillas, tanquam ad propria emundoria facile deponitur, & pruritus fursuraceus constituitur.

Et quamvis Axioma Medicum sit, quod quæ semel administranda juvant, repetita sanant, non tamen omnino locum habere debet in casu nostro: etenim intentiones quidem medicæ eadem, non tamen eadem medicamenta usurpanda erunt: siquidem, expiatis primis viis, massa sanguinea erit depuranda. Intemperies calida viscerum corrigenda. Sanguis ipse edulcorandus, & Topica affectis partibus admoveenda; at tot repetita valida Purgantia, nec impenſe refrigerantia, convenient, ne Charybdim evitare cupientes, incidamus in Scyllam: Epicraticam enim evacuationem excrementorum exigua & perseverans reproductio desiderat: sicut paulatim, sed diuturnam correctionem expostulat intemperies, cum dicat Hippocrates, quod impenſe & confertim calefacere, aut refrigerare, non sine periculo sit, quod vero paulatim sit, tutum est; Quare his jactis fundamentis, sequens erit instituenda Curatio, Paschate peracto incipienda.

Et primum Leniens sit hujusmodi.

℞. Syr. ros. solut. pot. ex man. clarif. an. ꝑ. iij. aq. florum citri parum, m. pro potu; cui post tres horas superbibat aquæ hordeac. libram, & duabus horis ab epota aqua prandeat. Primum Præparans quinque sequentibus diebus assumendum, erit.

℞. Julapii acet. ꝑ. ij. syr. de pom. aq. florum citri an. ꝑ. j. m. pro syr. & sic pro aliis; quibus succedat idem Leniens præscriptum.

Hac prima exacta intentione, ad secundam explendam erit deveniendum præparantibus & purgantibus medicamentis. Præparans autem erit hujusmodi.

℞. Succī depur. cich. borag. pom. dule. an. ꝑ. j. decoct. in jure pullæ paratæ endiviæ, sonchi, violarum, malvæ, melissæ, ꝑ. iv. m. pro syrup. & sic pro aliis decem. In quorum intermedio & hinc assumat Minorativum hujusmodi.

℞. Floris cass. rec. extr. ꝑ. ꝑ. Ele&. de succo rosarum, confect. Hamech. an. ꝑ. j. Extracti senæ, rhabarb. an. ꝑ. ꝑ. m. f. boli, quibus post horam superbibat feri capr. aut alin. depur. ꝑ. ij. tribus vero horis ab epoto sero prandeat. Interim primis diebus aperiatur Jecoraria dextera, & educatur sanguis ad ꝑ. vii. His peractis in eadem intentione insistendum: sequenti namque die succi depur. erunt ita repetendi.

℞. Succī depur. cich. borag. fumariz an. ꝑ. j. decoct. jam præscriptæ, additis hepaticæ



foliis, ʒ iv. m. pro syrupo. Aut si magis ad aquæ potum inclinet Adm. Rev. Pat. ita præscribatur Alterans.

ʒ. Aq. stillat. cich. anguriz an. ʒ iv. salis prunellæ ʒ β. syr. de pom. ʒ j. m. pro syr. & sic pro aliis. Die vero sequenti assumat syrupum Fernelliano more usui nostro appropriatum, ita describendum.

ʒ. Fol. cich. borag. endiviz, hepaticæ an. manip. j. sem. melon. mundat. anguriz, cucurbitæ mundat. an. ʒ j. aq. stillat. de succo cichor. fumariz, agrim. an. lb j. m. bull. ad consumpt. tertiz, deinde f. fortis expressio, expressioni vero adde foliorum epithymi, senz Orient. rec. mundat. radic. polypodii querc. an. ʒ ij. radic. veratri nigri præpar. ʒ β. cinnamomi integri ʒ iij. m. f. inf. per hor. xii. deinde f. expressio, colaturæ vero adde sacchari albi q. s. & bull. ad syrupi consistentiam, cui in vase reposito adde rnabarb. opt. maturi in tenui petia alligati ʒ j. & servetur ad usum, ejusque dosis erit ad ʒ ij. vel iij. in vino albo tenuissimo; & in hujus alternato usu integro mense perseverandum, ita ut alternis diebus assumatur, & intermediis Alterans præscriptum ex aquis debeat.

Inde ad tertiam & quartam intentionem explendam deveniri poterit usu lactis asinini, de more cum saccharo quotidie, quadraginta aut quinquaginta diebus assumendi; & decimo quoque Leniente aliquo erit utendum, ut Electuario lenit. ad sex drachmas unica hora ante prandium. Hoc tempore Balneum aquæ dulcis opportunissimum erit, foliis malvarum, violarum, salicis, lapathi & satureiz alteratæ.

Tandem affectis partibus pruriginosis levissimum aliquod refrigerans & exiccans medicamentum erit admovendum, quod parabitur ita.

ʒ. Aquæ rosarum lb j. vini albi tenuis austeri lb β. Vitrioli Cyprii, quod est carulei coloris, ʒ β. m. f. inf. per hor. 24. vas pluries agitando, ita ut liquor caruleum acquirat colorem, & spongiola hoc liquore madefacta tangantur partes affectæ. Eadem Vitrioli quantitas potest infundi etiam in infusione rosarum solutiva, & erit efficacius remedium.

His autem omnibus addenda congrua vivendi ratio alias præscripta, & Adm. Rev. Pat. notissima: cui addere mihi libet, quod per integrum annum in prima mensa hauriat jus endivia, vel acetosa, aut hepatica alteratum. *Idem ibidem.*

#### *Scabies, Muliebre Profluvium, & Infecunditas.*

Ad me pervenerunt Jugales Illustrissimi, pruriginoso, scabioso, & crustaceo pertinaci, ac turpi affectu per universum corpus laborantes: præterea Uxor Nobiliss. muliebri profluvio diversi coloris, nempe modo albo, modo flavo, quandoque obscuro, & nonnunquam rubro continuo molestabatur, sicut Vir Illustriss. lacrymalem sinum potius recentem, quam fistulam, paucis abhinc mensibus purulentam potius, quam ichorosam materiam edentem, gestabat, & ambo Juvenes de sterilitate con-

querentes, prolem summo opere desiderabant atque desiderant.

His igitur habitis, consideravi vitium sanguinis in utroque & cutanei affectus, & profluvii muliebris, & ipsius sterilitatis causam facile certo fuisse: licet enim contactu contagioso contracta fuerit affectio cutanea, non adeo invaluerit, nisi sanguinis vitiosus apparatus occurrisset, quem facta & repetita phlebotomia, autopsia ipsa confirmavit, siquidem niger valde cum sero, non valde depurato, & tere sanioso apparente fuit observatus, jecoris fervidioris in utroque indicium; & ideo nil mirum, si continuo ab irritata Natura ejusdem portio deterior non solum ad ambitum corporis verum & ad Uterum transmissa & extrusa, cutaneum affectum & muliebre profluvium constituerit. Et quoniam ad conceptionem non solum Viri & Mulieris semen, sed & sanguis menstruus, utpote tertium generationis principium concurrere necessarium puto, ideo ex utriusque sanguinis impuritate, impuritatem quoque & seminis, & mentrui necessario secutam fuisse credo, conceptioni parum, aut nihil idoneam; præterquam quod Uterus continuo profluvio muliebri irrigatus, & lubricus redditus, ideoque semen virile itinere nequiens, sterilitatis causa ipse solus esse potuisset. Ab ejusdem sanguinis prava conditione in Illustriss. Juvene exiguus ille abscessus, & inde sinus in angulo oculi sinistri sobolescere potuit, nisi quoque dicamus, caput ab injuriis externis alteratum, ejusdem sanguinis portiunculam ad locum jam dictum emisisse, & abscessulum illum efformasse.

His jam dictis omnibus consideratis, Curationem intrepide aggressus sum, spe certa concepta, fore ut non solum ambo ab affectu crustaceo immunes omnino reddi, verum & Prolem exoptatam consequi possent.

Sicque congrua præmissa primarum viarum expiatione, sanguinis impuritatem, & repetita phlebotomia, & succis herbarum depurantibus, & sæpius iteratis electivè purgantibus medicamentis expurgavi; partes cutaneas & integumenta ab infarctu pravorum humorum & cucurbitulis, & Balneis, & aliis exiccantibus liberavi; Uterum antea humidiores & laxiores redditum, infessionibus ex aquis sulphureis atque nitrosis exiccavi & roboravi; atque tandem jecoris calidam intemperiem, ut mali fontem, aquis stillatitiis & thermalibus satis remissi, sicque Jugales Illustrissimos ad pristinam sanitatem restitui. Supererat tantum Chirurgo, sinum cuspide cultri, aut lanceolæ aperire, detergere, Sarcoticis carnes implere, & Epuloticis consolidare: quod licet facile à me exillimatum fuerit, facillimum quoque reddere placuit Decocto refrigerante & exiccante, nullo modo calefaciente, eoque suavi per destillationem reddito.

Restat in præsens, ut alia nonnulla subdam in usum ducenda, ut conceptionis finis obtineatur, quorum aliqua interna, aliqua externa, & alia à modo recto vivendi erunt deprecanda.

Domum itaque reversi, quoniam adhuc aliquam mordacitatem, tum in acrimonia, tum in aciditate consistentem, forsitan reliquissimè



fuisse suspicandum, & præterea quia ambos humectatione subitanea egere non est dubitandum; ideo lactis usus iisdem erit quadraginta diebus institutus, Mulieri Illustriss. amini primis diebus, reliquis Caprini, Illustrissimo vero arte facti, ne lac. naturale caput petens, oculi sinus humectando, Curationem impediatur & differat. Ambo igitur omnium primo assument Cassiam cum Tartaro ita

℞. Floris cass. rec. extract. ʒ vii. crem. tart. ʒ iij. M. f. boli, quibus post horam superbibant aqua Nocer. aut hordeac. ℥ ij. & tribus horis ab assumpta aqua prandeant. Mox incipiat Illustrissima usum lactis ad ʒ iv. cum semicochleari sacchari albi, & paulatim dosim augendo, perveniat ad octo, & ad decem uncias, cum integro sacchari albi cochleari, quinque horis ante cibum, neque ab assumpto lacte dormiat, ne caput nimium repleatur. Decimo vero quoque die sumat Cassiæ ʒ β. cum ʒ ij. crem. tart. ne lactis aliqua crassior residentia in Ventriculo, aut primis viis retineatur; quo toto tempore cœna sit aliquantulum parcius, ut lactis usum ventriculus facile admitat. Illustrissimus vero utatur huiusmodi lacte

℞. Sem. quatuor frigid. major. mundat. ʒ ij. juris pullæ ʒ vii. M. f. Emulsio, cui adde sacchari cochlear & semicochlear aqua florum citri, aut rosarum, m. pro potu quotidiano, matutino tempore, quatuor aut quinque horis ante prandium assumendo. Et si aqua potius stillat. quam jus pullæ Illustrissimo Viro ardeat, extrahatur Emulsio aqua ex succo cichorii ad ʒ x. & frigida atque suavis ita paretur quotidiana potio; quo tempore si alvus inefficaciola fuerit, flore cassiæ ad semunciam in prima mensa aliquando sollicit. ri poterit.

Inter interna a proprietate conceptioni conducentia, erunt, quod Mulier Illustriss. in prima mensa utatur sale Satyrionis ad gr. x. vel xii. in haustu vini albi, instantibus & præsentibus quoque Menstruis: reliquo vero tempore paratum habeat pulverem ex matrice leporis, prius optimo vino abluta, mox in furno exiccata, cujus sit frequens usus mane jejuno ventriculo, aut in jure, aut haustu vini albi ad pondus gr. xxx. Extrinsecus vero statim a menstrua purgatione secuta, alliniatur regio Uteri butyro recenti cum coagulo leporino, ut

℞. Butyri rec. unc. i. coaguli leporini unc. β. m. reformetur. Vir quoque Illustr. iisdem diebus assumere poterit Extractum Diasatyrini ad ʒ j. vel prima mensa bibat jus salvia & herba stellaria alteratum: & in coitu præcedat inunctio glandis ex balsamo sacitio Peruviano. Abstineat autem omnino a coitu octo aut decem diebus ante menstruas Uxoris purgationes, ut statim iisdem præteritis, quum adhuc parumper fluentibus, concumbat: tunc enim facilius retineatur semen, & sit conceptus.

Quibus omnibus nonnulla in vivendi ratione observare inutile non erit. Primò Custodiendus est Uterus ab ambiente frigido. Secundo & calidorum, & frigidorum ciborum excessus est evitandus. Alimenta sint boni succi; Volucrium sylvestrium optima, Condimenta ex aromatibus opportuna, ex cinnamomo nimirum, & nuce myristica. Evitetur autem mentha, menthastrum, ruta in condimentis, ut con-

ceptioni adversantia: Semen cruce saccharo incrustatum, & ab utroque comansum, semper utile erit. Vinum vero ut mediocre, nec valde tenue, nec valde generosum, sed moderate sumptum: Bibaces enim steriles credidit & Aristoteles ipse. Tertiò somnus valde conducit, præsertim nocturnus, quo deficiente, suppleat diurnus. Quarto exercitium, potissimum ante prandium, vel sub cœnam, conceptioni utile: ideo apud Scythas famula, quia corpus exercebant, facile concipiebant: sicut Dominæ steriles, quia otiosam vitam ducebant; motiones tamen corporis sunt Illustrissimæ vitandæ statim a coitu. Quintò coitus sit rarus, & ad tempus jam præscriptum potius servetur. Sextò animi passionnes, molestæ potissimum, sunt arcendæ, & alacris vita degenda cum genialibus consocietibus, quam diuturnam atque felicem Conjugibus Illustrissimis a Deo Opt. Max. ex corde precor.

#### *Appendix ad Scabiem, Muliebrem Profluvium, Sterilitatem.*

Quoniam post præscriptam Consultationem accepi Mulierem Illustrissimam nondum omnino a profluvio mulibri immunem esse, sed quodammodo guttulas flavæ materiæ stillare, magisque pituitosæ & viscidæ, ideo restant aliqua addenda, ad huiusmodi fluxum omnino sistendum.

Transactis igitur consuetæ menstruæ purgationis diebus, quotidie bibat summo mane ad decem aut duodecim dies unc. 8. tincturæ rosarum, factæ in aqua plantag. & extractæ cum spiritu vitrioli, a qua potione, ut innui, abstinere debebit diebus aliquot ante menstruas purgationes, ne a potione imminuantur, aut supprimantur. Ita agendum duobus sequentibus mensibus, in usum familiarem quoque ducendo duo aut tria grana maltiches, hora una ante cœnam integra deglutienda.

Interim parabitur pulvis, incunte hyeme, triginta aut quadraginta diebus, quotidie summo mane assumendus, accipiendo Turturæ exenteratæ & vino nigro ablutæ, qui granis maltiches electi impleatur, deinde filo consuetur, & in furno reponatur, & ita exiccetur, ut in pulverem omnia simul redigantur, cujus pulveris ʒ j. assumat quotidie Illustr. Mulier in cyatho aquæ ex tenerissimis quercus foliis destillatæ, a cujus pulveris usu abstinere debet quatuor aut quinque diebus ante futuras menstruas purgationes, quibus terminatis, rursus eundem pulverem, ut dixi, sumat. De reliquis præscripta omnia in præterita Consultatione confirmo. *Idem ibidem.*

#### *Scabies post febrem num suppressi debeat.*

Ab accuratissima Viri Excellentissimi relatione de statu Nobilissimi Viri accipio, affectioni hypochondriacæ inveteratæ, olim Virum Nob. divexanti accessisse biliosam febrem, febri vero sanguinis per tussim excretionem; quibus omnibus congruis adhibitis medicis præstidius sedatis & in totum ablatis, cutis universi corporis molestissima scabie, aut impetigine saltem scedata fuit, non obstante iterata & copiosa sanguinis missione, aliisque medicamentis alterantibus atque purgantibus adhibitis; quam cum ægerime ferat Vir Nob. querit, num Scab-



bies ipsa supprimi prorsus ac deleri possit, an vero permitti, & quid agendum?

Ego quidem sicut in præterita Consultatione de affectu hypochondriaco, eoque etiam melancholico hæsitare non potui, ita de statu universali venosi generis anceps per venamsectam explorandum illum esse necessarium existimavi, veritus ne vitiosus, acris nimirum & biliosus, necnon acidus ac melancholicus in toto venoso genere abundaret, ut exitus comprobavit; primo enim redundans in ipso bilis, tertianam febrem excitavit, eamque facilius à regione calida in frigidam Nob. Patientem profliscente, reddito nimirum ab antiperistali interno calore intensiori, & imminuta à cutis densitate excrementorum resolutione, ac propterea capite quoque magis intemperato reddito & excrementis referto, catarrhalis inde fluxio in pulmones delapsa tussim vehementissimam excitavit; ad cuius impetum alicujus venæ osculum fuit adaptatum, & inde per anastomosis tussis sanguis excretus, non autem per diuresin, hoc est, erosionem, neque per diaurosin, sive per venæ eruptionem: non enim adeo facile suppressa fuisset sanguinis excretio, imò alia symptomata, de quibus abunde Galenus, subsequuta fuissent. Verum facilior reddita fuit venæ apertio à prava sanguinis acris & acida qualitate intus agente, quam à calore febrili ad auctam corrigere satis non potuerunt ejusdem sanguinis artificiosæ eductiones, nec spontaneæ per tussim excretiones, & idcirco residuum pravi sanguinis Natura expulit ad universi corporis peripheriam per modum decubitus, sive per imperfectam crism, tanquam ad totius venosi generis emunctorium, unde Scabies emerfit.

Hanc autem num suppressere nobis liceat, intelligenti Medico patere potest. Quoniam vero quandoque implorantibus Aëgis Medicus indulgere cogitur (ut facile etiam in casu nostro) hoc tamen nonnulli magna cautione permittendum esse censeo, ne bene operanti Naturæ adversetur, & excrementa ab ignobilioribus ad nobiliores partes cum Patientis vitæ discrimine repellamus: certissimum enim est quod exteriora indicant interiora.

Quare necessarium fore existimo, ut primo Naturæ motum à centro ad circumferentiam adjuvemus. Secundò ut internis & externis humorum acrimoniam remittamus. Tertiò ut Scabiem detergamus; atque tandem ut cutis universæ siccitatem laxemus & humectemus. Et quamvis non pauci forsitan alii Medici massam sanguineam purgantibus depurandam esse existimarent: his tamen ego subscribere nequeo, in corpore hujusmodi nuper sanguinis missione & medicamentis evacuatio; ita ut reliquis tantum ad cutem una cum Natura expellendis incumbere debeamus, ne ipsi Naturæ contra operemur.

Expeditis itaque primis viis congruente Leniente, devenirem ad usum pulveris viperini; de hoc enim dicebat Galenus, quod valde digerit, & ad cutem properat, ac præterea non ab impetigine solum, & scabie, sed à lepra & elephantiasi vidit liberatos ipse Galenus potu vini, in quo vipera demersa fuerat. Quare pro prima explenda intentione nil præstantius esse poterit, & ideo quotidie assumat pulveris vipe-

rini ℥j. in aqua Cardui benedicti, cui bene coopertus superdormiat, si possibile fuerit; in hujus usu perleveret 15. aut 20. diebus; mox multis parvis cucurbitulis, dictis Cornetæ, universo corpori applicitis, primus tantummodo sanguis exiens educatur: deinde spongiola aqua madefacta tangantur partes impetigine affectæ, non semel, aut bis, sed pluries in die, & mane, ac vespere corpus universum: aqua autem talis erit

℥. Aquæ stillat. arrantiorum incisorum ℥j. Mercuri dulcificati 3 j. m. dissolvantur ad ignem, & servetur ad usum quotidianum. Vel

℥. Aquæ ros. ℥j. vitrioli Romani calcinati 3 j. M. f. inf. per horas 24. deinde f. colatura, qua spongiola madefacta tangantur frequenter partes affectæ. Interim jecoris & ipsius sanguinis calor, & prava qualitas erit corrigenda potu quotidiano, matutinis horis semel hauriendo, ita parato

℥. Aq. stillat. de succo cich. 3 viii. tincturæ coralliorum chymicæ gutt. vii m. pro una, & sic pro aliis duodecim aut quindecim vicibus. Tandem ad demulcendam sanguinis acrimoniam uti poterit aliquot diebus Emulsione seminum frigidorum, aqua stillat. de succo cich. extracta; & totum corpus illiniri quotidie oleo amygdalino recenti. Quibus addendum restat, totum corpus vestibus abundantibus ab externo frigore muniendum esse. His etenim observatis, tuto liberari poterit Vir Nobilissimus à præsentis molestia, ut Vere venturo altera efficaciore purgatione, si opus fuerit, totum opus perficiatur, & bona atque prospera valetudine gaudere queat, quam ego ex corde à Deo Optimo Max. summopere precor. *Idem ibidem.*

#### *Medicatio juvenis, Scabie laborantis.*

Juvenis 25. annorum, ex Gallia in Bataviam redux, postquam aliquot septimanas patrio aëre & victu rursus esset usus, incidit in cutis totius corporis pruritus; quem postea secutæ sunt multæ pruriginosæ & purulentæ pustulæ, manus, brachia & crura ipsius potissimum obsidentes. Nonnullos etiam ex familiaribus contagio ita infecit, ut ipsorum corpus multis locis simili ulcerosâ & pruriente asperitate sit affectum.

Affecit in hoc ægro potissimum brachiorum, crurum, femorumque cutis; quod ex pruritu & pruriginosis ulculculis, partes illas obsidentibus, est manifestum.

Morbus, qui eum affligit, est intemperies cutis manuum, brachiorum, femorum, & crurum, acris, falsa, nitrosa, & contagiosa; quæ pruritus & ulculcula saniosa & purulenta in illis partibus producit. Scabies vulgò appellatur.

Procuratilis hujus morbi causa in hoc juvene est aëris victusque, per reditum in Bataviam, mutatio; quæ novi frigidioresque in corpore ejus geniti fuerunt humores; qui cum fervidioribus acris & adustis humoribus, in Galliâ natis, mixti, & propter aëris nostratis frigus, poros cutis claudens, & acrium fuliginum exhalationem in ipsius corpore impediens, intra corpus ejus retenti, instar calcis vivæ, aquâ frigida perfusa, in corpore ejus effervesceere cœperunt; atque antecedentem huic morbo præbue-

runt



runt causam. Pars verò eorum ad cutem totius corporis, ac præsertim crurum, brachiorumque delata, easque partes sua acrimonia vellicans, & erodens, continens huius intemperiei acris, pruriginosa, ac cutem in pustulas saniosas & purulentas excrucians, hoc est; ut verbo dicam, scabiei, in hoc juvene est causa.

Ipse verò in suos familiares, contactu manuum, mantiliū, aliorumque communium linctorum; saniosum illū & contagiosum liquorem, e corpore suo emanantem, insensibiliter transferens, similem qualitatem acrem & contagiosam in illis produxit, atque ita ipsos simili brachiorum crurisque scabie infecti.

Malum hoc ubi temporis diuturnitate radices profundas in corpore egit, difficulter solet eradicari.

Ideoquē celerī Curatione erit impugnandum. Eaque in ablatione causæ antecedentis, continentis, & intemperiei, per evacuantia, attemperantia, detergentia, acrimoniam retundentia, & exsiccantia, consistet.

Primum itaque purgetur hic juvenis tali medicamento, ad humores acres educendos & temperandos aptissimū:

℞. Mercurii dulcis ℥j. Scammonii optimi ℥ss. Electuarii diapruni ℥ij. Misce F. Bolus.

Potridie educatur, per venæ sectionem, sanguis, ad uncias octo.

Et porro quotidie bibat haustum ℥ij. vel iv. de sequenti Apozema:

℞. Rad. cichorii ℥j. Polypod. lapathi acuti an. ℥ss. Herb. fumariz, acetosæ, agrimoniz, Scabiosæ an. m. j. Sem. 4. frigid. major. an. ℥j. Flor. borrag. m. ss. Passul. r. ℥ss. Decoq. in aq. hord. q. s. ad lib. i. ss. addendo sub finem decoctionis sol. sennæ ℥ij sem. anisi ℥ij. Colaturæ adde syr. de cichorio cum rhubarb & sol. sennæ ℥ij. Misce F. Apozema.

Loca scabiosa unguantur omnia hoc Unguento:

℞. Terebinthinæ lotæ in aq. scabiosæ ℥j. Ol. rosacei ℥ss. Butyri recentis, axungiz porci an. ℥ij. Salis comm. ℥ss. lithargyri ℥j. Vitell. ovor. num. 2. Nucis limonum ℥vi. Ceræ q. s. fiat Unguentum.

Vel adhiberi poterit huic malo sequens unguentum, quo scabies felicissime curatur.

℞. Butyri veteris, in fictili novo ad rubedinem Frixi lib. ss. Huic intepescenti infunde muriz, in qua Pomæ limonia macerantur & conduntur ℥ij. Vitellos ovorum conqussatos n. 2. Pulv. sulphuris ℥j. Zinziberis ℥ss. Piperis ℥j. Fuliginis e fumaris collectæ ℥j. Hæc misceantur calide in formam Unguenti; quo articuli manuum, pedum; & reliqui corporis, & loca scabiosa, vesperi, ingressu lecti, unguantur.

Innumeri etiam a scabie liberati fuerunt sequenti Unguento:

℞. Rad. lapathi acuti, in mortario pisti m. j. Pulv. Zinzib. ℥j. Baccar. lauri, Ariloch. rotund. an. ℥ss. Cum pintâ dimidiâ floris sive cremæ lactis, coquantur per horam dimidiam in ollâ nova, & redigantur in formam Unguenti, qua loca scabiosa vesperi unguantur ad ignem.

In istius ratione, utendum Cibus optimi succi, qui sanguinis acrimoniam emendent & temperent. Carnes gallinarum, vitulinæ, ova sorbilia, pisces salaciles id præstant. Sal, acetum, aromata, allia, cypæ, & herbar calidæ omnes vi-

tandæ. Cerevisia tenuis, serum lactis, aqua hordei, in potu sunt utilia. Inter herbas culmarias, borrago; buglossa, violaria, malva, extructibus, poma; ex cerealibus, hordeum & triticum commendanda. Panis esto triticeus. Ira, vigiliz multæ, Venus, vitanda. Henr. Regius apud Theodor. Craanen Medication. lib. 4.

### Herpes exedens in facie.

Admodum Rev. Rector, annos natus quadraginta sex, temperamenti calidi & sicci cum subdominio sanguineo; hepatis præcalidi, ventriculi frigidi, cerebri humidi, corporis habitus modice carnosus, coloris totius albi flavescentis, aliquo tamen in facie suffuso rubore roseum referente colorem; in actionibus, ingenui præstantiæ promptus & expeditus, moribusque maxime urbanis, facilis tamen exandescens, & ad iracundiam pronus; Juventutis tempore sub diversarum Regionum Cælo, a nativa quinetiam maxime longinquarum commoratus, variaque proinde vivendi norma est usus. Quare duodecim, vel quindecim abhinc annis in Patriam reversus, una cum sodalibus per sepe comestiones celebrando, cibos aromatibus conditos comedendo, generosa vina bibendo; ante decem annos fluxionibus factus obnoxius, articularibus doloribus; Podagrâ se. Gonagrâ, aliisque arthriticis affectibus frequenter laborare cepit; hinc ab hypochondriacâ quoque passione, juxta cum variis symptomatibus, ab eadem ortum ducentibus, fuit correptus: cui tandem hæmorrhoidali sanguinis fluxu accedente, ab eodem hepate, aliisque visceribus naturali diathesi, ac nativo calore depauperatis, Cachecticus evasit; quinimo ad Hydropem maxime pronus. Licet Medicus ejus curationi adhibitus malorum horum syndromen, opportunis quidem remediis effugaverit, ideoque per annos serè quatuor Patiens bene valens, munera ac negotia, ut prius, subiens promptè peregerit; duobus tamen abhinc annis, cum Comam qua solitus erat caput cooperire, sub inclementi cælo deposuisset, ejusdem caput gravari, ac catarrho repleti cepit: hinc coxyza suborta; quam ut dies magis magisque exasperari Patiens expertus est, adeo ut nares catarrho crassescente per multos menses, obstructas habuerit, per quas nonnulli fædè, materiæ mucositæ, ac sanguine torrefacto permixtæ, magnos quidem conatus expurgare poterat. Tandem cum nasus inflammari incepisset, ulcera crustacea in ejusdem pinnis apparverunt, quæ post multum tempus, cum ut dies magis ac magis serpere & augmentam suscipere viderentur, ad Medica prælidia confugere, tum interna, tum externa, Patiens fuit coactus. Nihilominus ulcera per genas hinc inde, ac per totam faciem ad oculos usque, & putulæ, adinstar milii, dento efflorescentes, ac in ulcuscula tandem desinentes, serè continuò augentur. Idcirco non magis pro contumacia affectus, quam pro cruciatu, quem serè semper se pati asserit Patiens, anxie Virorum Excellent. Consilium efflagitat, ut a tam fævo ac Molesto Morbo quam citissime, si fieri possit, liberetur.

Sicuti de affectus natura, Admodum Rever. Patientem divexantis, nihil præter adducta &

Viro



Viro Excellentiss. mihi restat scribendum, ita agendorum pauca valde supersunt addenda: Etenim & ego cum Viro Doctissimo iudico, universam massam sanguineam jam conspurcatam fuisse, dum à prava victus ratione, & viscerum naturalium intemperiebus adhaerētis, excrementorum copia succrevit: prout caput denudatum, ab ambiente intemperiem contraxisse censendum, sicque duplici ratione affectum fuisse, essentialiter scil. & per consensum ab hypochondriis & à toto: ut propterea excrementa multa idiopathice cumulaverit, & sympathice susceperit: quæ longo temporis spatio per nares obstruatas non expurgata, ad faciei superficiem tandem eruperunt, & herpetem exedentem excitavunt, dum catarrhalis materia, serositatibus acerbis biliosis, & acidis melancholicis immista, salsa & acida facta fuit: quinimò ob contumaciam, & affectus adversus medicamenta generosiora ritè & rectè administrata resistantiam, labem aliquam putrilaginosam, intemperiem scil. & imbecillitatem in ipsa parte quoque reperiri sub cute, & forsitan etiam sub integumentis, juremerito suspicandum, quæ præter excrementorum affluxum, proprii quoque alimenti portionem corrumpat, & morbum soveat.

Quare cum jam primæ viæ exinanitæ fuerint: tota massa sanguinea ab excrementis abundè depurata: jecoris fervor congruis remediis non parum remissus, de Topicis quoque tum internis, tum externis, erit cogitandum, quæ humores in capite existentes, & purgare & à facie divertere valeant, & præterea diathesim illam putridam in parte removere, necnon dolores demulcere possint: non tamen omitrendo quæ jecoris & hypochondriorum fervorem contemperandi, necnon sanguinem ipsum demulcendi facultatem habeant.

Primum igitur in usum ducantur quotidie matutinæ dorsi ad inferiora frictions, & vespertinæ ante coenam pedum lotiones. Et quoniam Cauterium, nuchæ inustum, parum in his casibus prodesse solet; ideirco setaceum cum filo serico tanquam eximium remedium, transfigendum contulo. Interim, semel saltem per hebdomadam, pilule capitales Paracelsi, quæ continent extractis diageydia, hellebori, & colocynth. exhibendæ erunt ad semidrach. circa noctis dimidium: quibus summo mane superbibat aquam hordeac. aut Nocerianam; & iisdem addi quoque poterunt aliquot grana Mercurii dulcis ad facilitatorem materię contumacis expurgationem: subscribere tamen nequeo Mercurialibus medicamentis caput petentibus, & per sputum humores ducentibus. Intermediis autem diebus assumat summo manè lac arte factum, ita parandum.

℞. Semin. melon. mundat. ʒj; sem. anguriz, cucurbitæ mundat. an. ʒi. Aq. stillat. de succo cich. ʒ vii. contind. semina, & cum aqua extrahatur emulsiō, cui adde syrupi de pom. ʒj. m. pro potu quotidiano matutino. Extrinsecus autem affectæ parti modò anodyna quæ dolores demulceant, modò exiccantia quæ ad ulcusculâ quinetiam spectent, sunt applicanda atque inter demulcentia summopere mihi placet fœnugræci decoctum, à G. d. eno etiam in doloribus oculorum commendatum: cui, urgentibus

doloribus, addi poterit etiam caput papaveris albi. Quandoque etiam parabitur tenuis emulsiō seminum papav. albi, extracta cum aqua nenupharis. Lac etiam asininum tepidum, eidem scopo satisfaciet. Verum interponi debet usus exiccantium, & ulcera respectantium, quæ varia, & plura esse poterunt; selectiora autem, & delicatiora erunt, aqua fabrorum; infusio rosarum solut. chalybeata; & omnium maxime infusio vitrioli Cyprii in aqua rosarum, ita ut aqua ipsa caruleum colorem acquirat: nira bilis enim est exiccandis herpeticis hujusce ulceribus; quibus omnibus, spongiolâ imbutâ utendum est.

Tandem jam dictis congrua vivendi ratio erit addenda, à Viro Doctissimo præscribenda, cujus prudenti iudicio ceterorum etiam omnium rectum usum committo. Joh. Raym. Fortis Consult. & Respons. Medic. Tom. 2. Cap. 11.

#### Herpes exedens.

Pater Provincialis Reverendissimus, quinquagesimum quartum annum agens, temperamenti secundum totum ad calidum & siccum vergentis, hepatis autem fervidioris, sicut calidi & humidi capitis, mediocris habitus, ad actiones promptissimus, negotiis sive Religionis multis adhuc annis magnopere implicatus; tertius jam currit annus, ex quo exigua excoeratio, levissima occasione prægressa, in crure sinistro excitari coepit, quæ paulatim quotidie magis increvit, & diuturno postmodum secuto itinere in Hispaniam, major semper reddita fuit, adeo ut non solum cutis superficiem & integumenta, verum & carnem ipsam erodere coepit, & ulcus excitatum fuerit, quod topicis medicamentis curatum & cicatrizatum, proximas partes infestare non desit; quinimò non unam tantum, sed plures, & vicinas, & distantiore partes progressu temporis, in eodem tamen crure tantummodo occupavit, & hinc inde ulcera exedentia atque serpentina, eaque satis profunda & putrilaginosa, ichorosa materiam frequenter, quandoque etiam saniosam & purulentam emittentia, excitata fuerunt; quæ ad ambulandum in præsens Pat. Reverendissimum ferè impotentem reddiderunt. Additur postremo aurium tinnitus non continuus, sed tamen nonnunquam infestans. Medicos non semel pro salute adipiscenda consuluit, qui cum hanc polliceri non solum non potuerint, sed profus denegaverint, medicamenta omittere decrevit; satius esse existimans à solo morbo divexari, quam ab assumptis quoque medicamentis exagitari. Verum cum malum ruat semper in pejus, causis internas à quibus procedit, dubio procul vires majores acquirere non est dubitandum, quæ pejora quoque in antea superventura; & ideo Prudentissimus Pater ad me confugit, ut imminetia mala evitentur; & præsens si non ex toto tolli, saltem non parum iramini possit; quod licet non sine diuturnâ & operosa Curatione consequi posse sciam, id tamen possibile fore spero.

Damianus quidem G. l. nomina quædam ulceribus imposita, ut Chironia, Telephia, eo quod à Telepho & Chirone Medicis curata fuerint, ac multorum aliorum ulcerum appellationibus subscripsit, ut quæ eorundem conditionem atque naturam, quinimò & quodammodo causas



causas nobis insinuare valeant, & ideo si ulcus aliquod stabile, cavum, diuturnum & contumax fuerit, eo quia ab aliqua excrementorum fluxione, vel a toto, vel a peculiari parte transmissa, foveatur & conservetur, Dysepulotum ulcus appellari solet, sicut Cacoethicum nominatur illud, quod eadem continet conditiones, sed præterea ab intemperie & prava diathesi partis ulceratæ contumax redditur, ita ut probi quoque humores ad partem fluentes corumpantur in parte, & ulcus conservent. Alia demum ulcera quæ non semper eadem occupant sedem, sed priori loco relicto, ad proximum serpendo procedunt, eorumque progressus diuturno tempore durat, Herpitaca, sive Herpetes quasi repetentes, ab Hippocrate edentes dicuntur, cuiusmodi sunt ulcera, fere crura totum Rev. Patientis hunc inde exedentia; hoc addito magni momenti discrimine, quod sicut ulcera superficiem tantum exedentia simpliciter Herpetes vocantur, ita si non solum integumenta, verum & partes carnosas profundas erodant, ut in casu nostro, Herpetes Ethromenos cum Veteribus appellamus, cum quibus non sunt Phagedanica confundenda, nisi improprie, ut fecit Galenus: sunt enim hæc potius firma & stabilia, quam exedentia atque serpentina. Serpens quoque est Herpes miliaris, sed sine ulcere, & mili tantum figuram in superficie representans. Herpetes autem omnes à bilioso humore procedunt, adeo ut sub genere Erysipelatis à Gal. constituantur; sed ab acriori, nec crassiori bile Herpes sit, quam Erysipelas, ut pluribus in locis notat ipse Galenus; ut propterea nonnisi in corporibus cacoehymis, bilioso & pravo succo abundantibus Herpetes exedentes contingant; quo succo abundare Reverend. Pat. non est dubitandum, si ejusdem hepatis, cordis & viscerum intemperiem calidam consideremus, calidioremque redditam à diuturnis applicationibus atque animi perturbationibus, quas necessario incurunt, qui Regimina exercent, & Claustralibus præsumunt; animi namque motus multo magis, quam motus corporis calorem inducunt; his adduntur longa & laboriosa itinera peracta, & horum occasione ciborum & potuum improprietas, quibus omnibus non solum calor viscerum magnopere fuit adauctus, & pravorum succorum apparatus genitus, verum & pars ipsa, crura nimirum, recipiens, equitando quotidie magis semper imbecillius fuit redditum ut mirum postea non fuerit, si totum excrementosum humoribus scatens, ad crura, ut partem imbecilliorum eosdem detruserit, quos tamen humores in R. P. non sincere biliosos, sed & heterogeneos, nimirum & biliosos & exustos, necnon pituitosos, sive catarrhales simul commistos esse credendum, si non solum viscerum naturalium, ut dixi, calida intemperies spectetur, sed si capitis quoque calida & humida consideretur, cujus ratione humido abundat excremento, & ipsius portio ad aures delata, atque in halitus conversa, tinnitum inducit, dum vaporosa ipsa materia aëri implantato atque immobili, qui à tympano in auditorio meatu clauditur, movetur & agitur, sicque sonitus sequitur p. n. qui, resoluta vapore, cessat.

Quam difficilis sit futura hujusce morbi Cura-

tio, ac difficillima sanatio, non est in Arte peritus qui non prævideat; etenim si ulcera simplicitate, dum annis sunt, difficile sanantur, quid erit censendum de herpeticis profundis & mali moris trium annorum? Verum quia ex Herpete, ut ab ungue Leonem, viscerum internorum pravam conditionem in R. P. conicere fas est, idcirco præsens malum semper in pejus abiturum, & multiplicatis excrementis, pejora quoque imminere, prospicere debet Medicus observans, quod Gal. Herpetem enumeravit atque reposuit inter Carbunculos, Cancros, Ulcera phagedanica, Chronica atque Telephica. Quare providendum ne pejora mala succedant, & præiens certo non parum imminuatur, & forsitan ex toto aboleatur.

In quem finem quod est primum in intentione, nimirum ulcera cicatrizare atque sanare, debet esse ultimum in executione; ut propterea jure merito arguat Gal. Illustrem Matronam Romanam Herpete in crure laborantem, eo quod de ulceribus cicatrizandis, non autem de toto purgando, neque de intemperiebus corrigendis sollicita, nunquam sanari potuerit; quare primo totum a redundantibus excrementis, & potissimum à biliosis est oxonerandum ac vindicandum. Secundo eorundem reproductio est inhibenda, intemperies partium mandantium & sanguinis pravam quantitatem acrem & acidam corrigendo. Tertiò partes easdem roborando. Quarto, & ultimo ulceribus incumbendo, primo Catharticis, si opus fuerit, secundo Sarcoticis, atque tandem Epuloticis.

His autem satisfaciendum erit remediis à Fonte Chirurgico, Pharmaceutico atque Dietetico desumendis.

Et à Chirurgico universalia primo, mox tandem Topica depromenda. Inter universalia autem est sanguinis missio, quæ necessaria erit, cum vitium in toto, nimirum in sanguine reperiatur, eaque bipartita potius & parca, nempe ex brachio dextero, & secunda vice ex altero lateris affecti. Cauterium, nisi non getter, erit inurendum in coxa sanæ partis, ad diversionem; licet enim coxæ affectæ partis multum ad interceptionem inservire posse videatur, interceptio tamen in distantiore parte fieri debet, alioquin excrementitius humor, duceretur & evacueretur per partem affectam. De Topicis vero suo loco dicendum.

Pharmaceutica remedia debent esse Lenientia, Preparantia, Purgantia, intemperies corrigentia, viscera roborantia, hac servata animadversione, quod in R. P. alvus levioribus quoque medicamentis obediens est (biliosis humoris redundantis indicium.)

Primum igitur Leniens ad primarum viarum expiationem esse poterit syr. ros. solutivus; vel slos cass. cum crem. tartari; sicut primum Preparans Julap. acet. aqua ex flor. citri dissolutum; & quinque transactis diebus, idem Leniens erit repetendum, cui superbibat serum depur. capr. aut asinum.

Inde ad præparandos humores in venis existentes aprissimi erunt succi herbarum depur. nempe cichor. borrag. endiu. pomorum dulc. ad unc. iij. in decoct. sonchi, buglossi, malv. violarum; in quorum usu saltem diebus xv. perseverandum



randum erit: & quinto quoque die Purgans electivum a venis, cholagogum erit exhibendum, quod esse poterit elect. de succo rosarum & confectio Hamech. cum flore cass. cui superbibat serum depuratum.

Purgato toto, & caput erit peculiariter purgandum, quo egregie præstabunt pilulæ Paracelsi, cum earum compositio contineat Extracta diagrydij, hellebori nigri & colocynthidis; poterunt enim, duabus vel tribus vicibus sumptæ, caput purgare, & totum venosum genus omnino depurare; diebus autem intermediis aliquo quoque levi Errhino utatur ex pulv. rad. ireos, majoranæ & nigellæ parato; necnon succis depur. præscriptis.

Toto & capite ab excrementis purgatis, eorundem reproductio est inhibenda, intemperies partium mandantium corrigendo, quarum præcipua est naturalium viscerum fervor, mox capitis excedens humiditas; pro qua intentione explenda, magna industria opus est, non solum in quantitate & qualitate, sed & in tempore, ac ordine remedium adhibendorum; itaque ordinem huiusmodi servandum esse censeo, ut primum Exiccantibus quæ non calefaciant, calida & humida capitis intemperies corrigenda, deinde Refrigerantibus & Humectantibus viscerum atque sanguinis fervor sit contemperandus. Verum quia priori intentioni satisfaciendum erit decocto sudorifico, idcirco viscera naturalia præhumectare utilissimum erit, præmittendo quinque saltem diebus usum seri capr. depur. aut aq. Nocer. ad lb v. cum vehiculo dejectorio syr. ros. solutivi, ut inde ad decoctum cum sudore tutius deveniri possit, ita parandum

℞. Salsæ alestræ, chinæ opt. santal. alb. ligni visci pomac. an. ʒiij. Aq. stillat. cichor. beton. an. lb j. m. f. inf. per horas 24. deinde bull. ad consumpt. dimidij, & facta colat. servetur ad usum pro tribus vicibus, summo mane, una hora ante ingressum hypocaufti assumenda; & ut facilius sudor evocetur, præmittat bolum ex pulv. viperino paratum. In cuius usu 30. diebus ut persistat, erit satis, cum victu non tenui, nec valde attenuante. Decimo vero quoque die præbendæ erunt pilulæ aggregat. & aureæ, vel elect. de succo rosarum cum cassia, quibus superbibat serum depuratum, ut quod visceribus naturalibus R. P. valde amicum sit, nec præmissio vehic. deject. caput petere possit.

Terminato sudore, totis viribus visceribus refrigerandis & sanguini edulcorando incumbendum erit, primo aquarum acidularum refrigerantium potu, aut B. V. aut Nocera, tribus primis diebus cum vehiculo dejectorio syr. ros. solutivi, reliquis vero quindecim cum vehiculo diuretico spir. tart. rectif. & succo limonum; in fine autem præbeat potio ex man. clarif. ad educendum aliquod aquæ residuum. Hoc tempore quo propinantur aquæ, vesperti sub ingressum lecti aliqua Conserva capitalis & stomachica præscribi poterit ex flor. beton. rosarum & rosimarini.

His peractis, pro remittenda sanguinis acrimonia atque aciditate, aptissimus erit usus lactis asin. quadraginta diebus, summo mane cum sacchi de more assumendi; hoc enim utpote tenuis substantiæ cum Galeno celerime per

corpus digeritur; & ideo caput non tentat. Universale quoque Balneum aquæ dulcis, foliis malv. viol. lactuæ, nenuph. salicis alteratæ, efficacissimum esset remedium pro fervore viscerum & sanguinis contemperando; verum quoniam crus affectum ab humectantibus atque laxantibus maximopere læderetur, idcirco omitendum, & ipsius loco Epithemata jecori apponenda, ex succo cich. & infusione rosarum cum succo limon. paranda.

Tandem topica medicamenta proponuntur, quæ in tota quoque præscripta Curatione sunt apponenda; hæc autem esse debent omnino refrigerantia & exiccantia, quorum sylva à Scriptoribus proponi solet, ut unguentum de litharg. de calce, de cerussa, de tutia; at nos in casu nostro, si Cathereticis, paucis diebus, fuerit opus, ob aliquam alicujus ulceris sordiciem, applicari poterit Unguent. de minio, vel componatur ex litharg. vitriolo & camphora cum oleo rosato, addita cera quantum sufficit. Inde ad Sarcotica deveniendum; inter quæ Unguent. de succi Bononienfium præstantissimum erit, ut quod contineat quatuor succos refrigerantes & exiccantes, & propterea lithargyrum, aurum, plumbum ultum, tutiam, bolum Armenam, camphoram cum cera. Tandem ut cicatrizentur ulcera, Epulotica conveniunt; & ideo ex tutia, cerussa, lithargyro & antimonio cum cera, & oleo myrtino, ceratum S. A. erit conficiendum & componendum. Nec omittenda Balnea quotidiana, crus totum immergendo in aquam montis Grotti, sive Agrotorum, quæ magnopere exiccat atque corroborat.

Quibus omnibus erit addenda victus ratio, quæ refrigerans, in passivis vero qualitatibus mediocris esse debet. Caveat igitur R. P. à cibis calidioribus, à condimentis aromatum, alijs, caparum, ab usu aceti, à carnibus & piscibus salitis, & à potu vini meracioris. A vigiliis, à nimis exercitiis. Bis in mense, proximis à Curatione temporibus, in usum ducat aliquod familiare medicamentum, tum biliosas, tum atrabiles ferositates educens, quale esse poterit pilula de tribus cum rhabarb. ad ʒiij. additis gr. viii. aut x. pulv. grisei, aut Magist. mechoac. atque tandem animi perturbationes arceat, & in applicationibus moderate se exerceat. Hæcque pro salute Reverend. Patris, quam eidem à Summo Deo enixe precor. Idem eodem Tom. Cent. 4.

#### *Herpes miliaris in Crure, & Verruca in Mamma.*

Princeps Illustrissima atque Excellent. cujus res naturales, nonnaturales, & p. n. Dominatio Tua Excellent. plene novit non minus ab exhibita Scheda (quam reassumere non dedignaberis) quam ex aspectu ipso, cum Venetias & Patavium profecta, prudent. consilio tuo curatione se subjecerit annis abhinc quinque. Post reditum Romam, præscripta mandata tua exequi non opus habuit, cum à languoribus illis immunis, pancreaticæ affatim valuerit. Et quævis affectionibus hypochondriacis uterinis, quibus obnoxia vivit, non omnino vacaverit: mitres attamen & leves adeo fuerunt, ut nullam suscipere Curationem magnam unquam coegerint.



gerint. Tractu temporis Verruca, quam in papilla dexteræ maninæ gerit, absque ulla manifesta causa cepit sanguinolentum emittere ichorem, cum pruritu & fursure, nullo externo apparente rubore; nullo tumore, aut tactus renitentia; lancinatione nulla. At quia creber exitus & facilis recursus timorem inferebant, apud Medicos & Chirurgos fuit decretum, cruri dextero sub genu fonticulum inungere, habito respectu non minus ad corporis obesitatem ac molliem, sero multo scætentis, quam ad expletum Menstruorum tempus, & præcipue ad Uterum, una cum naturalibus visceribus, dyscrasia cum materia donatum, & idiopathice patientem. Res secundis votis successit; nam illico sanie multa, & sanguinolenta, ac mordaci manante, mamma bene habuit; & integre sanata est. sic stantibus, Junio proximo præterito dexteri cruris Herpete miliari afficitur, sine febre; cum ardore & inflammatione, crustisque crassis adultis, pituitam saliam cum assata bile præse ferentibus. Quare iterum consultis Medicis & Chirurgis, de fonticulo sinistro cruri inurendo, primo sancitum fuit: deinde transacto Sicro, instituta Purgatio fuit, Lenitivis celebrata, scil. Triphera Peruræ ꝑ. ss. & drachma una rad. mechoac. pōderosi pulv. cui superbibebat juris longi insulti, acetosa alterati, libram, & quater sedem habebat cum conferentia ac tolerantia, eductis tantummodo biliosis lixivis & serositatibus adultis. Nullus fuit mittendi sanguinis locus, tum ratione morbi; tum præpollentis Cacoehymix in visceribus, tum quia noxia alias evale phlebotomia, & sanguinis motus nunquam observatus fuerit proficiuus. Purgatione perfecta, imò quater iterata eodemmet Lenitivo, serum caprinum destillatum ad refrigerandum exhibuit, sine tolerantia: nam stomacho repugnante dimissum. Succos accepit endiviz, sonchi, cichorii depuratos; eadem cum renitentia: ita ut solo jure cichorio hortensi sativo alterato, sit contenta. Cæterum status Excell. hujus Matronæ quoad antiquos & habituales morbos hypochondrii & Uteri, bonus est & laudabilis; quoad vero recentes, accipe: Si quando humores hypochondriaci uterique fermentantur, & vel cordis palpitatione, vel aliquo alio hysterico-symptomate afficitur, Verruca in mamma ichorem sanguineum guttatim emittit non continuum, solo tantum pruritu & fursure. Cruris vero dexteri & tumet, & dolet, & ardet, recurrente per affluxum mordaci serositatis, Herpetem exedentem minantem, ni purgationis iudicii tui auxilio succurratur.

Hypochondriaca affectione jam diu detentam Principem Excellentissimam excrementiis humoribus abundasse necesse fuit, cum affectio ipsa naturalium viscerum intemperies supponat, & primo atque principaliter fervidam jecoris, indeque sanguinis, secundario vero privative ventriculi frigidam; ut propterea etiam in habitu carnoso atque obeso, exuberantis caloris indicia semper apparuerint; Etenim Verrucam in mamma potius ut signum, quam ut morbum, vel causam ego jam consideravi, & ideo Purgationem præservativam tunc temporis scriptis mandavi, superventura prævidens, quæ à statu satis salubri neglecta, postea successerunt; Sat enim non fuerit excrementorum calidorum co-

piam extraducere; minusque alio abducere, sed pro præservatione absolvenda, intemperies jecoris atque sanguinis erat corrigenda, & sanguis ipse acris atque mordax edulcorandus, ut multo minor evaderet biliosæ serositatis proventus, & sanguis ipse ad probiorem conditionem redactus, ab ipsa Natura commode in vasis pro totius nutritione detineretur, nec modo ad mammam, modo ad crus ab ipsa irritata Natura detruderetur; sicque modo in mamma verruca, modo herpes miliaris in crure excitarentur. Et quamvis Cauterium summa cum ratione coxæ iussu mamma profuerit, avocatis nimirum biliosis serositatibus à superioribus ad inferiora, non tamen exiguum foramen tot tantisque humoribus educendis, quibus scætet Excellent. Princeps; sufficere potuit; & idcirco quid factum opus sit, unicuique vel medio critter in Arte perito, nedum Tibi Viro Doctissimo patere potest: expiatis enim primis viis, obstructions sunt quodammodo referendæ. Deinde massa sanguinea à serositatibus tum acris, tum acidis elective purgantibus, vindicanda. Mox jecoris calida intemperies corrigenda; atque tandem sanguis totus edulcorandus: Topica vero aliqua externa effectibus partibus apponi poterunt; quamvis, dempta atque recisa radice, plantæ, frondes & fructus de se necessario decidant. Jam dictis vero intentionibus in præfatis satisfacere anni tempus non permittit, sed in Ver venturum regularis jam dicta præservatio erit differenda. Interim tamen ne uterque affectus majus augmentum suscipiat, imò potius nonnihil imminuatur, aliqua pauca agenda proponam, quæ excrementitios humores per alvum & urinam educere, & eorundem acrimoniam atque aciditatem commoderare valeant. Singula igitur hebdomada assumat.

℞. Elect. lenit. ꝑ. ss. Elect. de succo rosarum ꝑ. ij. Magist. mechoac. gr. x. M. f. boli, quibus duabus transactis horis; superbibat aquæ hordeac. vel Nocerianæ, vel stillat. malvarum ꝑ. ss. aut ꝑ. ij. & tribus horis ab epota aqua prandeat. Diebus autem intermediis aliqua potio offerenda erit, quæ quam celerrime ad hepar feratur, & per univarium corpus distribuatur, ut ideo conditionem aliquam diureticam in se continere debeat; erit autem hujusmodi.

℞. Sem. melon. mundat. sem. cucurbitæ mundat. aq. ꝑ. ss. aq. stillat. malv. ꝑ. vii. m. contusis sextimibus, cum aqua extrahatur Emulsio, quæ erit valde diluta, cui adde sacchari albi cochlear, vel syrupi de pomis; aut de succo limonum, aut violacei ꝑ. j. pro potu matutino quadraginta diebus hauriendo. Quod si fortasse Emulsio hujusmodi non adeo facile toleretur, substituat potus aquæ stillat. malvæ cum syrupo de pomis, aut violaceo. Mirabiles autem effectus non semel observavi ab usu aquæ stillat. ex anguriis decorticatis; & B. M. destillatis, quas Romæ adservatas invenire difficile non erit: diu namque in ventriculo non immoratur, hypochondriorum fervorem contemperat, anodynâ facultatem obtinet, & sanguinis acrimoniam atque aciditatem egregie edulcorare solet: non omisso tamen consueto jure cichorio alterato, sed prius a mensa cum cæteris edulis haulto. Interim quo tempore verruca in-



mamma evanuerit, Saturni balsamo illiniri possit, quod tamen tutius administrabitur, absoluta universi corporis præservativa purgatione, quam Vere venturo; Deo dante, describam, cum de statu Excell. Principis tunc temporis certior factus ero: nec deerit purgantium, aperientium & alterantium medicamentorum Sylva, qua tuto & jucunde Excellentiz suæ inservire valebimus. *Idem ibidem.*

### Observationes.

Juvenula quædam sexdecim annorum cum novem annis scabie infecta fuisset, nec ullis remediis curari possit, ad me tandem consilii causa venit; huic sæpius decocta sanguinem purificantia præcipimus, quæ conticiebantur ex borrag. bugl. acetos. & similibus in sero lactis decoctis. Deinde corpore rite expurgato, eam nudam per horam in balneo sequenti posuimus, idque quinque diebus continuando.

℞. Lapath. acut. cum rad. sum. r. malv. scabios. viol. hederæ arbor. tursur. opt. sal. communis, an. M. ij. coq. in aq. communi pro lavacro, facta absterione totius corporis, lecum calidum intrabat & sudabat: sic materia sufficienter ad cutem propulsa, tunc tandem eam in unguento ad scabiem in præcedenti observ. descripto; eo cum aliquandiu inuncta fuisset à scæda scabie curata est. *Petrus Forestus. Observ. 11. lib. 5. Observ. Chirurg.*

Quendam scabie & pruritu totum corpus foedante laborantem ita sanitati restitui.

℞. Decocti sennæ 3 iv. confect. hamec. 3 vi. M. F. potio; quæ recte & copiose expurgatus est. Postea venam brachii aperuit, multumque sanguinis emisit.

A sanguinis missione septimo die tale ipsi ordinabam balneum.

℞. Alumin. 3v. salpetræ, 3 iij. sulph. vivi 3 ij. redigantur in pulverem; qui coquebatur in aqua fluviali quanta sufficit; tertio quoque die renovatur, balneabat mane & vespere, & intra viginti dies ab ista scæda lue & symptomatibus liber sanusque evasit. Potus erat decoctum mellisæ saccharatum. *Mari. Rulandus cur. 80. cent. 3.* Post purgationem.

℞. Rad. lapath. cum fol. num. 3. hord. cum cortice suo, p. 3. radic. alth. 3 ij. sol. malv. M. ij. rad. helleb. nigr. 3 j. bulliant omnia simul in aq. f. q. ad dimidiam partis consumptionem. Deinde fiat fortis expressio, colatura adde ol. ros. 3 iij. Terebinth. 3 ij. sal. nitr. 3 ss. bulliant omnia ad 2q. consumpt. deinde addantur succi limon. 3vi. removeanturque ab igne, dumque incipit retri gerari, adde vitell. ovor. num. 3. conservetur postea in vase mundo & bene cooperto, & illinet loca scabiosa omnia, scaldendo prius apud ignem, & sic hat alternis diebus vespere ante introitum lecti, septem vicibus ultimo ingreditur balneum, & mundificetur totum corpus, postea mutet vestes & Chirothecas. *Joh. Baptista Montanus. consil. 171.*

℞. Resinæ terebinth. lotæ 3 ij. butyr. rec. 3 j. sal. 3 ij. ol. rosæ. coltin. sulph. vivi an. 3v. ovor. lutea ij. M. F. Linimentum. Hoc linimentum multum profuit. Postea sequens pro absterione institutum.

℞. Sulph. vivi 3 ij. bacc. lauri 3 j. baccar.

juniper. 3v. sal. 3 iij. contund. omnia & ligentur in petia & imponentur in olla recondito, & sic aliquantulum bulliant. Postea accipiat illa petia, & cum ea fricetur corpus, quando vadit dormitum, seu singulis noctibus, seu alternis. *Joh. Baptista Montanus. consil. 176.*

Inter topica remedia scabiei convenientia, hoc primum obtinere tanquam expertus contumo, quod habet.

℞. Rad. enul. campan. virid. 1 lb. pingued. porcin. 3v. in mortar. marmoreo pistentur, & ad lentum ignem parum bulliant, & f. unguentum, quo æger pustulas insingat, est enim admiranda virtutis unguentum hoc; ut incantamento ejus opus simile videatur; cujus vires si expertus fueris, nobis consenties. *Annus Lusitanus. cent. 2. curat. 98.*

Quid in scabie vulgari in manibus & pedibus intestatus, sic curatus fuit. Sumpsit primum purgans sequens.

℞. Catholic. 3 ss. confect. hamec. 3 ij. syr. de fumar. 3 j. cum aq. fumar. & endiv. an. 3 ij. M. F. Potio. sequenti die secta fuit vena brachii. Deinde apozemate hoc usus est.

℞. Radic. liquir. 3 ij. Radic. lapath. (quod Rhab. monach. vocant) 3 ss. Rad. polipod. 3 ij. cort. tamarisc. 3 ss. fol. endiv. mercurial. tum. r. summitat. lupul. an. M. j. fl. bugl. borrag. scabios. an. p. j. passul. paria x. prunor. num. 10. epithymi 3 ss. sen. 3 ij. sem. cartham. contus. 3 j. sem. anil. lœnic. an. 3 ij. f. omnium decoctio, in colat. q. f. pro 4. vel 5. vicibus adde sacch. q. f. aromatiz. 3 ij. cinnam. absoluto apozemate adhuc semel purgetur sequenti potione.

℞. Rad. liquir. polipod. an. 3 vi. sen. 3 ss. sem. anil. 3 j. fl. cordial. p. j. f. decoctio in colat. 3 v. intund. rhei 3 iv. agar. 3 j. spic. Zinzib. an. 3 j. f. expressio. dissolv. syr. ros. solut. 3 ss. f. potio. Absoluta purgatione, capiat capitum iturus mithrid. 3 j. Vel,

℞. Conserv. cichor. bugl. ros. an. 3 ss. spec. trionfantal. 3 j. cum syr. de endiv. f. elect. superbibat semper aquam suam. & acetos. fumar. electuar. alternis diebus quod intemperiem sanguinis contemperabit. Balneo dein hoc utatur.

℞. R. d. bryon. lapath. acut. sol. scabios. malv. mercurial. parietar. viol. hederæ, salicum, an. M. ij. decoq. in aq. pluviali: add. aquæ extinctionis ferri & lixivii, an. mensur. a liquor tartar. 3 ij. sulph. 3 j. sal. M. j. ut f. balneum, in quo sedeat per horas duas in die; dein in lecto se siccet: a balneo ungatur ita.

Ol. ros. r. viol. an. 3 ij. succ. lapath. acut. & plantag. an. 3 j. aceti 3 ss. butyr. rec. 3 ss. coq. ad succ. consumptionem; adde litharg. 3 ij. Rad. serpent. 3 j. sulph. 3 ij. ceræ, q. f. f. Unguentum; restitutus mox fuit. *Felix Platerus. observ. lib. 1. pag. 314.*

Adolescens quidam scæda scabie torquebatur a qua liberari nequiverat venæ sectionibus & purgationibus multis intra sex menses per intervalla usurpatis: tandem ei exhibetur merc. d. 3 j. cum diagrid. 3 ss. quibus optime purgatus est, & a scæda illa scabie intra paucos dies liberatus. *Lazarus Riverius. Obs. 2. 6. cent. 1.*

Quidam Empiricus decocto subii calcinat. cum lapiis additis etiam aliis, perniciosus sanabat scabies. *Platerus. prætic. Tom. 1. cap. 7. pag. 767.*



Certissima experientia comprobatum est ad omnia genera scabiei in capitis infantium, plurimum opitulari camphoram, si super ferrum candens aduratur, & in pulverem redigatur, & scabiei inspergatur, aut cum pinguedine veteri suilla commisceatur, & capiti inungatur. *Franciscus Joel. praxie. lib. 9. sect. 2.*

Nihil vilius detritis calceis. Novi tamen puerum *Melitenensem* toto corpore cruentis sordis oblitum, qui adperso cinere combusti corii calceorum cum oleo rosæ, convaluit. *Thomas Bartolinus. hister. 73. cent. 6.*

Ad magnam illam scabiem quæ in tibias excutitur, post morbos longos, & præcipue febrem quartanam, doloribus sævissimis mundam, nihil inveni in tota medicina efficacius quam sequens unguentum.

℞. Unguenti basilici ʒiv. Terebinth. ʒij. olei ros. ʒiv. vitell. ovorum num. 3. ceræ tantillum. F. unguentum, quo inungantur partes scabie laborantes. *Petrus Pachecus. Observ. 35.*

Quidam scabie perpetua sicca illa quæ perpetuo pruritu vexat, mirum in modum vexabatur dies ac noctes; somnum capere non poterat, cibum respuebat, vertigine tentabatur identidem. *Cracovienses* quidam Medici aliquot annis hominem variis medicamentis (alioqui macrum, siccum & melancholicum) excarnificaverunt. Fuit qui salsamparillam, deinde chinæ radicem, alias guajacum præberet; denique hydrargyro unctus fuit: sed hæc frustra omnia, non potuit morbus his armis propulsari; tandem consilio *Itali* cuiusdam *Job. Pedemontani*, qui tum in *Dacia* ei, qui nunc *Potonorum* Rex est, ministrabat, ad Antimonii grana iv. devenit. Quid multa? Morbus tam diuturnus, tam pertinax paucis mensibus depulsus est; jam sex anni abierunt, etiam nunc bene valet. Addam hoc quoque quod mihi magis mirum videtur; is, quem dixi *Pedemontanus*, jam à quindecim annis singulis fere mensibus decem, duodecim, quatuordecim, cum lubet & necesse esse putat, grana ebibit; morbosum se fuisse antea ait, post usum stibii recte semper valuisse, itaque magis ut imminenti morbis obviam eat, quam ut præsentem aliquem curet, stibio se tam frequenter uti affirmat. *Andreas Dandinius. Ep. 17. lib. 6. consil. & Epist. Cratonis & aliorum à Scholtzio editorum.*

℞. Olei glandis unguentat. ʒij. Spiritus salis ʒß. Mosch. vel Zibeth. gr. ij. ceræ q. s. F. unguentum: quo facile & jucunde (cum bonum spiret odorem) scabies curabitur. Pauperes & Milites illam mirè fugabunt sola saponis nigri lotionem; at non diu cuti inhaerere debet, sed citò abluendus ne cutem excoriet. Decoctio malvarum cum alumine ad libitum est etiam optima ad scabies curandas, si ter ea corpus abluatur tepide. *Petrus Borellus. Observ. 7. cent. 2.*

#### De Nevus maternis.

Vivit adhuc nobiscum hic Thorunii Vir quidam Consultissimus, cui uteri materni claustris adhuc inclusio imaginatio materna ad dextra tempora impresserat pellis murini signum pilosum, quia mater gravida, cum ei forte fortuna obvis factus esset musculus, ex terrore manum

dextram dextris imposuerat temporibus. Tetigi hunc nevum, cum pueri esset, usque, læpilline. Is vero adultior factus, & turpitudine sua, notè commotus, aqua regia locum antea cum subtilissime unxit. Unde primum pili, mox & cuticula secessit, tandem vero Chirurgus ten pora erosa mundavit atque obduxit, apparentibus jam hinc inde quibusdam cicatricibus.

Sub finem Februarii Anni hujus 1672. nupta est hic Thorunii scoto cuidam in viinia habitanti, virgo, & scoticis quoque parentibus orta, cujus sinistra manus dorso n. fere totum rutilus occupavit color, a matre gravida, incendium subito ortum advertente, atque ex terrore sinistra suam contrectante, ei impressus. Hæc ante paucos annos ex consilio cuiusdam vetulæ sanguine Secundina affectum locum obleverat, sed tantum abest ut nevum abiterent, ut potius ingentem inflammationem cum insigni tumore ac dolore excitavit, quam tandem Chirurgus, non sine multo labore & industria compescuit, remanente nihilominus nevo. *Georgii Segeri in Misc. Cur.*

#### Macula quotannis stato tempore efflorescentes.

Curavi anno superiori adolescentem quendam, qui per sex vel plures annos maculis rubicundis, oblongis, elatis & prurientibus, ungula ætate redeuntibus, & juxta motum lunæ nunc apparentibus, nunc evanescentibus, deturparetur; Data sunt feliciter sanguinem purificantia, cum laxantibus per aliquot continuata dies, succedente pulvere meo Renovativo, ut voco, aliquot usurpando vicibus: componitur ex Antimonio diaphoretici alkool. spina viperarum & Antim. sublimat. Ita non amplius vix sunt efflorescere. *Ehrenf. Hagendorn in Misc. Curiosis.*

#### Macula corporis ex sanguinis ebullitione.

Sæpè ignaros causarum terrent phenomena in corpore apparentia, quæ nullum secum periculum trahunt. Primum notæ & formæ femininæ, sibi metuens, consilii causa me revocavit de maculis in corpore universo enatis sollicita, sanguineis, latis parvisque in crute & brachio efflorescentibus. Nullo quidem incommodo actionibus officium, nescio tamen quas animo sollicitudines ingerunt. A scorbutico enim derivandas opinatur. Aliter persuasus ego, & temperamento mulieris & cæteris conutantibus signis, credidi querulæque persuadere cœpi; ebullitionem esse sanguinis nullo vitio depravati, sed copia peccantis. Menses enim inordinato cursu fluunt. Nunquam concepit. Disparent maculæ quando ægritudine aliqua corpus conficitur, redeuntque ad sanitatem redeunt. Post venæ sectionem non comparent. Unde de alio remedio frustra cogitandum censeui. Non ita pridem similes proflus maculæ sanguineæ crux speciosum ancillæ pulchræ deformaverant, ut territa illa revelare cum verecundia quadam partes illas mihi ausa sit. Latam bono animo esse jussi, solo sanguine evacuato, nullum corpori nevum superfuturum promittens. Abundare enim sanguinem in corpore, qui extremam cutem petit cum angustioribus valis excluditur. *Thomas Bartolinus.*



*De livore totius corporis periodice Recurrente.*

Unius anni infans bene valens, circa medium Februarii hujus anni derepente, sine ulla præcedente causa toto corpore factus lividus, non aliter ac si strangularetur, integra tamen mente, sine ullo sensu doloris, nili, quod caput parum inclinaret, ac si somnolentus esset. Perterrita rei novitate mater me vocat, sed ad adventum meum jam remisit ille livor universalis, qui ultra horam duravit. Et licet infans, jam in facie tantum & manibus sublividus, bene se habuerit, tamen suspicatus aliquid epileptici subesse, cum antea huic affectui fuerit obnoxius, quotiescunque enim nutritrix menstrua experiebatur, insultibus epilepticis tentabatur & ille, dedi *Pulv. March.ep. cum Spec. de hyac. & arr. diaph. in Aq. Ceras. nigr.* sic disparente omni livore ad pristinum colorem naturalem rediit, diemque ac noctem insequentem commode transegit. Tertia die hora octava matutina, pro ut ante triduum, iterum rediit livor, magis tamen in facie & extremitatibus pedum, manuumque, quam in reliquo corpore conspicuus, nec ita intense, sed tantum, ac si membra ex frigore liverent, quæ calore tamen naturali sufficienter erant prædita. Curavi reiterari pulverem, & post meridiem applicatur Clyster, sic iterum per diem & noctem bene valuit, sed rediit tertia, quarta, quinta vice, semper de tertio in tertium, subinde tamen minus. Tandem purgato corpore penitus emanavit, parvulusque ad hunc usque diem optime valet. Utrum autem hic aliquid epileptici aut febrilis subsuerit, difficile est judicare. *Caroli Raygeri.*

*Menstrualis partium in Puella quadam externarum, utpote aurium, narium, digitorum, &c. mortificatione.*

Cum anno 1660. tertia vice Bataviam per-migrarem, in civitate Delphensi Chirurgum, in operationibus suis expertissimum & solertissimum, in tota Hollandia & Zelandia celeberrimum, & ante aliquot annos mihi familiarissimum, inveni mortuum, quare à vidua petii, ut MSS. relicta aliquantulum perlustrandi mihi copiam faceret, quod quidem illa lubens concessit. Ille autem, inter alia memoratu digna, observationem raram annotaverat sequentibus verbis, quam ex Belgica Lingua, in gratiam benevoli Lectoris, transferendam putavi. Hæc autem ita se habet:

Anno 1629. die 11. Martii st. n. Ego *Bernardus Schrader*, una cum fratre meo Joanne Schrader, & Alexandro Lax, Chirurgiæ studioso, veni ad ostium aquæ in pagum, cui nomen est Geest, & quidem in diversorium, cujus hospiti nomen erat Joh. Brandes, hujus filia, quæ annum ætatis agebat 13. tali affectu misere affligebatur. Singulis mensibus patiebatur dolorem insignem in digitis manuum & pedum, ut & extremitatibus aurium ac narium, cum tumore cedematoso, in facie, pedibus ac manibus: quem sequebatur paulo ante & post plenilunium partium istarum corruptio & mortificatio, sicut earum extremitates albæ & siccæ factæ, absque sensu, dolore, humore & fœtore deciderent.

frustulatum, eo quod istarum partium supererat naturalem formam & figuram retinente. Ego autem, cum diligentius apud parentes de his accidentibus inquirerem, pater mihi monstrabat scatulam, in qua centum & plura frustula demortuarum partium, quæ spatio trium annorum abscesserunt.

*De singularibus morientium maculis.*

Occubuit nuper inter nostrates Johannes *Densehmann*, civis optimus & vis probus, affinis & compater meus, annos tres supra sexaginta natus, marasmo consumptus, cui nono ante mortem die maculæ purpureo lividæ per totum corpus plurimæ erumpebant, & manus dextræ carpus cum meracarpio ad cubitum usque livido & ad nigredinem vergente colore totus tinctus apparebat: quæ omnia ad finem vitæ perdurabant, neque post mortem disparebant; qualia signa mihi, quantum memini, nunquam aut rarissime in morbis chronicis ante mortem, nisi in scorbutico, aut febrilibus malignis pestilentialibusque: post mortem autem sæpissime observare licuit. Sed Dn. D. Johannes *Blümig*, gener meus, quinto die ante mortem in carpo sinistræ manus maculam livido purpuream rotundam cum radiis quibusdam in matre sua charissima se animadvertisse mihi narravit, quæ autem altera a morte die planè evanuit. Tales Joh. *Telemannus* in *Explana-tis Aphorismis Hippocr. p. m. 137.* maculas agonizantium appellat, indicesque mortis instantis vocat. Verum ejusmodi macularum doctrina in libris Medicis parum adhuc excolta est. *Simonis Schulzeii.*

*De intolerabili totius corporis Pruritu.*

Solus aliquando pruritus, inquit *Sennertus lib. 5. Præf. part. 3. Sect. 1. cap. 8.* homines vexat, & adeo molestus est, ut etiam Medici auxilium implorare cogat, raro autem curatur in senibus, præsertim decrepitis. Expertus hoc ante annum Senator Ratisbonensis, de Republ. quoad vixit, optimè meritis. Usu quoque id venit cognata meæ, aliquandiu non mediocriter excruciatæ. At quorsum attinet colligere exempla fere quotidiana? Id potius curandum, ut ex adverso nobis consent observationes aliquando relictorum. Unicum exemplum ex *Mercuriali* adducit prælaudatus autor. Huic jungemus nos obstetricem, octuaginta sex annorum, abstemiam vini pariter & cerevisiæ, quadratam tamen, viribusque isthac ætate satis adhuc constantem. Sensit primo horrorem cum stridore dentium conjunctum, quem hora post tantus exceperit totius corporis pruritus, ut aliquot dies ac noctes nec somnum capere, nec cuiquam rei vacare potuerit. Creberrima vehementissimaque frictione pustulæ confertim excitatæ malum haut leviter exasperabant, cutemque paulo post usque adeo fœdabant, ut cum leprosa mihi rem esse prorsus suspicarer. Præscripsi morsulum purgantem (ab aliis enim formis dici non potest, quantopere abhorruit) quo sumpto quinquies deposuit alvum. Partes prurientes adspersæ aliquoties pulvere *glycyrrhizæ, ceruss. alb. ac myrrha*, ex quo notabile le-yamen



vamen capit. Propināta præterea sanguinem purificantia, quorum vehiculum erant, quibus ab iuvene ætate allueverat, lac & aqua. Utroque nullo non die se nimium quantum ingurgitabat, unde horrorem non raro excipiebat horrores. Tandem præter spem universum corpus positis exuviis fœdissimis, novam prorsus induit faciem, nullo post se relicto pruritu, vel dolore, vel denique deformitatis vestigio. Secunda adhuc usque utitur valetudine, nihil hoc morbo, ad obeunda consueta munia, segnior reddita. Numquid largior lactis potatio partem curationis sibi vindicare possit? haud inconsiderata est quaestio; notum enim ex historicis, apud Scythas lactis potatores nunquam ferè apparere lepram. *Job. Petri Pruckelii.*

#### *De scabie ex retentione mensium.*

Non procul à Patria mea Fridlandia in Ditione Reverendissimi Abbatis Brunovientis, in pago *Wernerisdorff* dicto, Ancillæ anno 1637. nuxus menstruus subsistebat. Ex qua retentione primo tumor, deinde inflammatio utriusque Mammæ, in ulcera tandem delinens exoriebatur. Mater ex incantamento evenire iudicavit, sed falso. Postea quolibet consueto mensium tempore scabiosa fuit reddita: Elapsis autem diebus fluxus consuetis, scabies orta, sine Medicamentorum ope, sua sponte decidebat. Molesta hæc cutis fœditas, quolibet mense redire, usque ad annum 1638. quo Curæ meæ committebatur, illam divexavit. Evacuato prius benè corpore, nec intermissis totam massam sanguineam repurgantibus & emendantibus, venant Salvatellam bis secundam ordinavi, postea & utramque Saphnam, porrectis simul Medicamentis menstrua expellentibus. Virgo à fœda scabie, & ignominia luis veneræ, qua vicini illam infectam iudicant, restitutis mensibus, ordinariæque fluentibus, Deo benedicente, fuit liberata. *Melchior Fribe.*

#### *Scabiei intempestiva & empirica curatio periculosa.*

Juris quidam studiosus, Berenburgo-Anhaltinus, Lugduni Batavorum vivens, Anno millesimo sexcentesimo quadragésimo nono, sub finem ætatis, & principium Autumni *sicca scabie* corripitur, cui fortasse ex parte occasionem dedit mutatio æris; eo ipso enim anno præterito vere Witteberga se Hollandiam contulerat: hæc cum ipsi nimis molesta esset, tum a me, tum ab aliis Medicinæ studiosis convictoribus suis (qui erant *M. Hayrio Rigim* Hamburgensis, *Nicolaus Wille*, *Riga Livonus*, *Tobias Scholtz* Thoruniensis Prussus, *Sebastianus Meier* Lubecensis) pro ea abigenda consilium petiit. Ego (utpote ipsi admodum familiaris) corpus ejus Caco-chymicum, falsis & serosis humoribus scatens, considerans, suasi ei, ut primò Dixæ rationem haberet; & tam cibo, quam potu moderato bonique succi uteretur: secundo, medicamentis idoneis Caco-chymiam expurgaret: tertio, falsos & adustos humores per habitum corporis expelleret, & quarto, si tribus hisce præmissis *scabies* haut evanesceret, externa quadam adhiberet. Ille verò licet quoad primum, Dixam

param curaret, me tamen ut juxta secundum scopum purgans aliquod præscriberem, sollicitavit. Itaque diversis vicibus purgantibus Medicamentis usus est; operatione semper benè succedente. Elapsis iterum aliquot septimanis, juxta tertium scopum sudorificum Medicamentum à me exigebat: quod ipsi etiam bis præscripsi, non sine succellu. Interea dum his utebatur, me in scio; suasu cujusdam *Empyrici*, abluerat externe corpus *Aqua* quadam cujus compositionem, ut ex eo intellexi, *Mercurius* ingrediebatur, tum etiam *cingulo*, cui idem *Mercurius crudus* insutus erat, medium corpus nudum cinxerat, atque ita brevi tempore, *scabies* evanuit, humoribus scilicet ad extra se moventibus, intro pullis, sed, ut ego prædixeram, facili occasione gravius aliquod malum corpori illaturis. Cum itaque studiosus hic, elapsis paucis septimanis, jam nihil mali metueret, & decima nona atque vigesima Januarii nui millesimi sexcentissimi quinquagesimi vino *G. llico* se nimium ingurgitaret, insimulque inter tumultus nocturnos inter Studiosos & vigiles civitatis exortos, corpus nimio motu exercebat, die vigesima prima Januarii nianè è lecto surgere volens, gravissimum dolorem circa os pubis percepit, ita nec recte incedere, nec stare posset: Circa noctem febre correptus, & sopore quodam obrutus est, quibus vigesima secunda Jan. perseverantibus, *Dr. Elemanum* tum temporis Practicum Leidensem ad se venire rogat: cui advenienti rem omnem retulit: *cingulum* etiam illud *Mercuriale* (quo ille tanquam Præservativo contra scabiem utebatur) corpori alligatum monstravit; Eo abjecto varia ipsi prædictus Medicus præscripsit Medicamenta purgantia & sudorifera, donec febre post aliquot dies cessante, tumor durus cum magno dolore circa os pubis inguina occuparet, qui vesicæ urinarie collum comprimendo, urinae liberum exitum impediret. Tumoris hujus causa Chirurgus vocatus est, qui Emplastrum, primum *Diachylon*, dein *Oxycroceon* & alia applicavit, quorum ope ad decimam quartam februarii dolore paulatim cessante; viribus quoque restitutis, melius incedere cepit, tumor quoque sensim resolutus evanuit. Huic tere similem casum recenset *Greg. Horstius* *Parti priore observ. singul. lib. 2. observ. 10. p. m. 103.* qui ibidem videatur. Tandem sanitati planè restitutus, sub finem Anni mecum Angliam visitavit, & facetum vix comitem se præbuit.

Scholion. ] *Mercuriale cingulum* importunè adhibitum multoties maxima damna attulisse exemplis confirmant *Obernædorf. in Apolog. Medic. Chym. Pract. p. 30. Ruland. in Alexica. Chymiair p. 44.* Idem unguentum *Mercuriale* colli distortionem. *Thoma Bart. cent. 4. hist. 48. in Arthritico* summorum dolores & initium gangrænarum *Hildan. c. 4. obs. 82.* *Equino Ferd. Ponzetta l. 1. de venen. c. 21. Epilepsiam. Heurn. de aff. capit. c. 23. mandibulæ casum Angel. Salain Planet sp. 37. p. 204. 5. 3. & mortem repentinam intulit Zacut. l. 3. Prax. Adm. observ. 50. & 85. De aliis nocumentis ex Mercuriali illitione *Unzer. tract. de Mercur. l. 1. c. 16. p. 108.* Cum ipsemet Argentorati Anno 1649. viverem in convictu Excell. *Dr. D. Joh. Alberti Sebizzi* Avo & Patri in Professione & Physicatu Successoris dignissimi, retulit forinam quandam scabie laborantem*



*Mercuriali cingulo adhibito tam enormem Lingua umorem expertam fuisse, ut ea extra fauces plurimum protensa, cum metu gangræne, post aliquot dies vix magna ipsius cura & studio imminui & iustæ quantitati reddi potuerit:*

Ex scabie suppressa febrem continuam, cæcitatem & Epilepsiam productam *Sennertus* Paralipom. pag. 157. Quartanam p. 176. & *Ictericum Camerarius* mem. 10. §. 65. memorant. *Simonis Schulzii*.

#### *De Contagiosa cutis fœditate ex accubitu.*

Anno 1661. Landishutæ in Silesia virgo quatuordecim annorum cum dimidio, Curæ mez se submittebat, quæ alias, quoad formam & nitorem, fuerat elegantissima. Hæc cum ancilla impura per noctem in uno lecto dormierat, inscisa illam esse impuram, ea nocte magnam sibi, solo accubitu, attraxerat fœditatem. Eruperant ab initio in cute pustulæ rubræ, quæ successu temporis in squammas fuerunt commutatæ, & postea in eam accreverunt densitatem, ut ferme dimidium transversum digitum æquaret, quod facile creditur, quia Chirurgus, cum meo iussu, præviis evacuationibus, venesectionem tentasset, cum phlebotomo non cutem, multo minus venam attingere potuit. Curam internam quod attinet, dedi ab initio Mercurii dulcis grana xvi. Diagrydii ʒss. in vehiculo conveniente. Purgante hoc sumptu multa mucosa & biliosa exercebat. Reiterabatur hoc purgationis genus, semper cum euphoria. Purgato probè corpore, quia paupercula erat, ad externa progrediebamur. Internè manè ad sudoris elicium præsto erat Decoctum Lignorum. Externè cubitum itura illinebat cutem Linimento sequente:

ʒi. Unguent. rosat. ʒvi. Vitriol. albi (*Gallienus*) ʒvi. M. pro litu. Quibus adhibitis, & ad necessitatem reiteratis ad quatuordecim dies & ultra, quolibet diluculo Mater Patientis duos manipulos integros squamarum e lecto facili negotio colligebat. Apparuit tandem, proligatis squammis, cutis rubra & quasi renata, dolens tamen, quapropter à Litu superiori abstinere duxi consultum, & illius loco balneum dulce simulque cutem mundificans adhibui, sicque Deo benedicente, parcioribus sumptibus miseram gratis in integrum restitutam reliqui. De hac cutis fœditate non multum disputabo, utrum Lepra, aut Elephantiasis sit dicenda. Lepra fuit, sed ut species sub genere, quia squammosa fuit: Elephantiasis vero, quia *Jonstonus* Id. *Univ. Med.* lib. 6. cap. 9. pag. m. 289. sub hac tanquam genere, varias comprehendit species, nimirum Leontiasin, Satyriasin & Lepram, asseritque has species esse tumorem totius Corporis canerosum ex atra bile, venenata qualitate infecta, & in totum Corporis habitum effusa, exortum, multaque Symptomata inferentem. Sed quoniam Autor nominatus quatuor species capite eodem pag. 290. constituit, & eam, in qua albedo, squamæ & furfures apparent, Elephantiasin Tyriam, à serpente squammoso Tyro, Vere spoliū exuente, vocat, iure meritoque & hanc à me curatam cutis fœditatem Lepram sive Elephantiasin Tyriam fuisse autumno.

#### *Vermes in Scabie animadverti.*

In scabie videntur vermes, *Borellus* obs. 32.

In Scabie Venerea vermes limacum instar tantæ fœcunditatis vidit *Kircher*, ut intra dimidiam horam ad 50. altos similes sibi partus ediderit. lib. 12. mundi subterr. s. 1. c. 10. Ex *Massi* observ. Microscopic. *Melchior. Fribe*.

#### *De scabie epidemica felium.*

Eleganter *Hemerus* lib. 1. *Iliad.* pestilentiam refert a pecuibus esse inchoatam: quando morbus, antequam in homines posset irrepere, facilius capris pecudibus incubuit, cui loquitur *Macrobius* lib. 7. *Satur.* cap. 5. pag. 540. Prout enim aer impurius huius vel illius animalis speciei temperamento est contrarius, ita unum sæpè epidemici tentatur & perit morbis, alterum sine ulla contagionis lue servatur incolume, unde non raro observata est pestis ovium, boum, anserum, canum, &c. Neque verò ob Temperamenti solum dispositionem seu idiosyncrasiam, talis-modi animalia bruta corripit lues; sed etiam, veluti elegantissime *Eustachius Comenti.* in lib. 1. *Iliad.* pag. m. 31. scribit, διὰ τὸ ἰσχυρὸν αὐτῶν τῆς προσηλυτικῆς ἀφροδίσιας, & ἰσχυρὸς μεταλαμπάδων αὐτῶν τῶν ἀπὸ τοῦ γῆινος πυλῶν, quod propioribus quasi sine primū affecto aeri, imminque citius prono ad terram nutu hauriant.

Pertinet huc Scabies Epidemica felium, quæ à duobus annis in Westphalia, aliquot milliarum spatio adeo grassata est, ut nulla prope modum felis manserit superstes. Scabie caput oppletur, imprimis vero aures penitus cruitur quibusdam obducuntur, oculi quasi cute videntur obduci, quamvis adhuc videant, donec tabo quodam disfluant, & hinc moriuntur. Perpetuus urget ipsas sopor, & non aliter dormiunt, quàm si illam de somni enormis audivissent Orationem, unde vix ad epulas veniunt. Ultra caput & collum non progressa fuit scabies. Nulla ferè domus, in qua non fuerint hoc malo correptæ, & nisi fallit conjectura, videri poterat generatione quoque communicatum, præter communem aeris usum, quippe eas quoque occupavit, quæ sine ullo cum aliis commercio accuratè fuerunt custoditæ, ne vi contagii corripere. Putantur quædam curatæ pinguedine balneæ, in plurimis verò Medicina non valuit, paucæque evasere. Testem huius rei oculatum nominio Dn. M. Joh. Prætorium, Gymnasii Sularensis Directorem, amicum longe carissimum, qui illud ad me pericripit 1671. Mense Novembri. *Georg. Wolff. Wedicii in Misc. Curios.*

#### *De Morpha Nigra.*

Si quis cutim humanam Nosodochium seu receptaculum omnium morborum dixerit, ne ille brevis multa eaque verissima exprimet. Qualis enim in corpore intus delitescit morbus talis efflorescit in cute. Hinc squalet in *Helica*, & fluat in *Febribus*, flavescit in *Mellero*, pallet in *Cachexia*, tumet in *Hydrope*, deformatur variis maculis in *Scorbuto*. Necessatis est aliarum partium in se suscepisse atque notasse vitia, suos proprios insuper patitur manes & innumeros de-

tur,



turpatur modis. Quis enim omnes ejus defædationes, impetigines, vitiliginis, lichenes, variolas, papulas, maculas & sexcenta alia enumeret exanthemata? Inter quæ non extremum locum occupat species illa vitiliginis, quæ *Morphæa nigra* dicitur, affectus primo aspectu magis terribilis quam periculosus, apud nos satis rarus, à me nunquam adhuc observatus, nisi hoc præterlapso anno binis vicibus. Nam circa initium Januarii cum *Dn. D. Schilpachero* collegæ meo honoratissimo, accessi puellam quandam triuannorum ex morbillis convalescentem. Huic tota cutis una nocte maculis nigris conspersa, sine calore aut dolore. Dubitavi ad quoddam exanthematum genus referrem, extra periculum tamen constitutam puellam videns, suavi si forte quid scorbutici subisset, ut *Mixt. simpl. cum spir. cochl. & syr. de sumar.* ad aliquot dies propinetur, quo facto brevi omnes evanuerunt. Circa medium Augustum eadem iterum observanda venerunt maculæ in filiola trienni Chirurgi nostri *Alexandri Schels.* Laboraverat illa prius dysenteria, epidemialiter tum temporis apud nos grassante, sat pertinaci, inde autem convaluit: post aliquot septimanas, cum bene de nocte quievisset, mane expergefacta toto corpore maculis nigris defædata reperitur. Vocatus à terrefactis Parentibus, agnovi statim morbum, priori penitus similem, nec dubitavi amplius *Morphæa nigra* nomine hæcce insignire jam melius à me considerata exanthemata, quia exacte conveniebant omnia cum descriptione, quam habet *Joan. Taganti. lib. 1. Inst. Chirurg. cap. 2. & Cels. lib. 3. cap. ult.* Nulla quippe aderat cutis vel exasperatio, vel exulceratio, sed superficies tantum ejusdem maculis nigerrimis guttatim quasi aut squamulatim sine inæqualitate defædata, aberat calor, dolor, pruritus omnis, unguibus asperius aut acu etiam punctim tractatz sanguinem fundebant, quod pro signo habet *Cels. d. 1.* Puella cum ad interna medicamenta sumenda valde fuisset refractaria, neglectis etiam externis, quæ varia describit & commendat *Aetius Teir. 3. Sermon. 1. c. 132.* brevi is liberata, non multo post tamen in variolas incidit, unde jam jam convalescens importuna balneatione, ad nitorem corpori conciliandum, recidivam passa obiit. Recordor sæpius me vidisse maculas cum variolis erumpentes hisce simillimas, semperque funestas, quas ex communi sententia pro Petechiis nigris habui, illas tamen extra variolas in multis aliis Petechiis laborantibus nunquam inveni, forte idem est affectus, nisi quod quandoque cum malignitate conjunctus perniciosior: *Caroli Raygeri in Miscell. Curios.*

#### *De dorsi ineffabili pruritu.*

Nuper percurrenti aureas nostræ naturæ Cuiusmodi Ephemerides, mihi oblata est *Dn. Andrea Cnassellii* observatio oppido rara, de Pruritu Dorsi ineffabili; quæ in memoriam revocavit similem dorsi pruritus in Generosissimo & Strenuissimo quodam Domino in Ducatu Mecklenburgensi; Ille Generosissimus Dominus mihi non semel confessus est, quomodo olim & adhuc dorsi pruritus tam vehemens illum divedet, ut sæpius equo descendere, & dorsum fa-

muli unguibus subficere, strenue illud fricare, coactus fuerit, & si pruritus ille ingruit, nihil ipsum placare vel demulcere valet, quam si expertus sit aliquandiu unguum auram: erat hic nobilis (parco nomini) ex nobilissima & antiquissima *dr Bulovv.* prolapsia, cujus filiorum informationi etiam præfectus, inque hujus pruritus ætiologiam alii me doctiores inquirant, malo quippe hic alios audire, quam proprium iudicium subnectere.

*Scholium.* Causa hujus pruritûs molestissimi non alia videtur fuisse, quam serum particulis multis acribus terrestrioribus vel fixioribus acuatum in glandulis cutaneis à massa sanguinea separatum, quod transpiratione alias in statu naturali sensim & insensibiliter exhalare solitum, hic tenuiorem tantum partem dissipari permittens, crassiorum in ipsis tubulis excretoriis stagnationem, & consequenter earundem, majore blandiorum & attenuatiorum divaporatione subinde facta, concentrationem sensim procuravit, quæ ita ferociores redditæ acredine suæ nervosas cutis partes pungendo & vellicando molestum illum pruritus sensum induxerunt; usque dum forti fricatione spiritus majori numero allecti non poros tantum magis dilataverint, sed & crassioribus istis excrementis exitum faciliorem concesserint, sed etiam una hæc attenuaverint, atque promptiorem ad divaporationem deduxerint. Hinc quoque maximum illum dorsi pruritus à *Celeb. D. Cnosselio* descriptum sustulit tum Anti omni diaphoretici & Bezoardici mineralis internus usus, quæ vitiosi seri particulas acres absorbendo, atque ita quasi volatilizando liberiores transpirationem effecerunt, tum & Mercurii sublimati in aqua soluti externa adplicatio, qui actiis suis particulis in poros penetrans serum in cute retinens & coagulatum liquando ac dulcificando vim suam exseruit. Unde non minus curam à *Petr. Borello* (cent. 4. hist. 36.) tentatam prospere successisse credi potest, qui pruritus ibi descriptum ab humoribus biliosis & acribus procedere autumans, vini usu interdicto, quæ ad bilis, & ita acriorum una humorum evacuationem facerent, juxta cum pilula aperiente & viscu inactassante, rebus utpote ad seri contemperationem facientibus, ordinaverat, Nec immerito in exemplo à se prolato *Nob. D. Prückelius Ann. 9. Eph. Nat. Cur. obs. 11.* lactis potus non ultimam curæ feliciter peractæ causam assignaverat. *Joann. Ludov. Hannemannii.*

#### *De Dorsi ineffabili Pruritu ex Obstructione mensuræ.*

Fœmina quædam annorum triginta sex patiebatur mensium obstructionem, compressionem thoracis, gravitatem anhelitus & inappetentiam cibi, cum eruptione maculatum, quas vulgo vocant *Lebersflecken.* Post sex fere septimanas, ut referebat, insignis & horrendus sequebatur dorsi circa scapulas, & ad costas usque spurias se extendens pruritus. Omnia vestimenta debebant dilacerari & crudelitas unguum magnâ atrocitate in propriam carnem læviebat, nec poterat satiari sanguine, donec largiter fluebat, quod unicum erat diu id horæ levamen. Obduratus sanguis novæ prur-



ginis prodromus existerat. Non enim tam cito sanguis erat incrustatus, cum jam manus ad prillinam scuritiam se armarent, misero neque satis lacrymis deplorando spectaculo.

Applicatis medicamentis primo internis solventibus, evacuatione facta generali, sequente phlebotomia in pedibus, nihil levaminis sensit patiens. Deinde externis, Unguentum enim nutritum absque fructu tribus diebus applicabatur; Nitrum fixum in aëre solutum pro salis volatilis cōtrollivi præcipitatione paucula quantitate aquæ spermatis ranarum commixtum, noluit obsecundare voto medentis.

Tandem cum Antimonii diaphoretic. gr. xv. & bezoard. mineral. gr. viii. cum vino interne, sæpius assumptis ad diaphoresin red. eta, & aqua Mercuriali exterius sæpius illita esset, cessit pruritus, cutisque, quæ deinde Emplastro de Minio consolidabatur, renascebatur & ægra D. A. evasit sana.

*Aqua Mercurialis taliter preparatur.*

℞. Mercur. Sublim. 3j. affunde aquæ ℞j. Coque per horæ quadrantem, ut ebulliat, Servetur pro usu. Præsentissimum alias remedium ad guttam Rosaceam Paracelsi.

Quod autem hoc loco admiratione dignum, erat urina tremula vel saltans. Nam urina recens è corpore excreta statim ebullire, & per sex fere horas semper moveri conspiciebatur cum gravi fœtore, successu temporis etiam per integrum diem talis motus continuabat, inexistens contrarii salis sufficiens index. Quæ tamen omnia ulterius pensitanda, doctissimorum & experientissimorum Virorum iudicio, relinquenda duco. *Andr. Cnoessetti.*

#### *Herpes miliaris in capite.*

Puellus septemnis, temperamenti calidi & humidi, corpore gracilis, gestu agilis, facie ac ingenio liberalis, bimeltris quondam inlans variolis laboraverat, exactis illis, achores subsecuti per septimanas aliquot puelli caput affligerant, posthinc ille usque modo nullo fere morbo infestatus fuit. Att Anno Christi. 1671. Ratisbonæ sub fine Octobris incipiebat queritati de pruritu sub capillitio, ac brevi momento post iricationem & lavationem capillorum sensit levem & obtusum dolorem capitis, quem mox insequiebantur in vertice ad spatium circiter semichaleri pustulæ albide parvæ, milii seminis magnitudine, sine omni terè humiditate, sicca, cum paucula, & vix sensibili intumescencia, sed quum malo interea nullum remedium adhibebatur, quod pro levi ac puerili affectu haberetur, temporis progressu in tantum adauctum fuit, ut a dicto verticis spatio, ubi mali radix certè latuit, se dilatans majorem partem capillitii, veluti Ophiūsis serpentini more perserperet. Post iteratam capillorum lotionem pustulæ illæ siccatæ granulorum instar decidebant, locus rubescebat cum paucis subtus calore, sine omni tamen dolore, & triduo post granulosa illa exanthemata semper redierunt, citra omnem aliam corporis internam vel externam affectionem, & isthuc ubi malum serpsit, pili, qui alias coloris spadicei, parum albescentes, tanquam ad radicem usque desinebant, atque locus quidem affectus conspiciebatur planè sa-

natus, malo tamen alia semper loca novo variatim cursu petente; puellus interim in suis actionibus vividus, juveniliter exultans, ac animo liberali degebat, præter nunc, cum nescio ex quorum intempestivo augurio, malum periculosum & lethale fore percipisset, hoc nonnunquam animo revolvens, morsus incederet. Multi etenim putarunt sub malo hoc gravius quid latere, metuentes ne subtus cutem erosiones simul cranii subsequantur, atque cerebri meningis ipsæmet, cum vitæ periculo exederentur. Præsertim cum nobilissimi Parentes Anno 1671. mense Julio circa festum D. Jacobi illam ætatis undecimo ac dimidio, non orbis tunc graviter decumbentem & demortuam habuissent, quæ per biennium ante hujusmodi capitis affectu, herpete scilicet, infestata fuerit, cum prius affectus hic post multas catarrhas fluxiones, & ingentem odontalgiam initium sumpserit, tamen absque ulla superioris capitis sensibilitate dolorifica, cæterique corporis ægritudine notabili, ut & Medicus loci ordinarius, cum eam morbillis laborantem visitabat, de hac capitis affectione, ejusque prognosi, ac curatione simul requiritus, responderet, affectum hunc nihil periculi habere levem & infantilem saltem morbum esse, itemque facile profigari, aut temporis progressu sponte evanescere. Chirurgus verò quidam arte sua & scientia non incelebris quoque accersitus, inspecto ac contrectato loco morbo, statim præfagierat puellam brevi morituram, referens, se talem ægrum aliquando vidisse, nec eum diu supervivisse. Quod & hic factum; namque ægra sub medio morbillorum affligentium statu, semper alioquin hilaris pro more consueto, & morbillos facile ferens, subitò de insigni cephalalgia queritans, intra paucas horas mortem obierat, & post obitum spatium illud in vertice morbosum cum mollitie quadam denigratum & sphacelatum erat inventum, itemque per nares purulenta & foetida materia profluxerat, non absque suspitione ulceris sub cranio latentis. Proinde Parentes eundem eventum in filio metuentes, consilium ac prognosticum a me, diversisque aliis Medicis anxie petierunt. *Joan. Helvoigii.*

*Scholium Helvoigianum*] Herpes est affectio p. n. quæ & Serpigo dicitur a serpendo, quod anguium more serpere videtur, & quod una parte sanescente, non orbus in proxima parte serpit, ortum habens à bile flava excrementitia, sincera, subtiliori, æri vel exurente, quæ sensim, nulloque fluxionis impetu è venis expurgata, tenuitate sua omnes corporis partes, præcipuè carnosas transgreditur, usque densiorem cutem attingat, in qua tandem decumbit, & detinetur, illamque densitatem cutis exurit, (unde etiam inter inflammationis species refertur) & aliquando pustulas milii semini similes excitat, quæ aridæ & ruptis paucæ, vel nulla materia effluit. Galenus lib. de tumor. p. n. non inconditè censet, bilem hanc pituitæ quid admixtum habere. Herpetis autem species Peccetius lib. i. oper. Chirurg. cap. 15. cum Barth. Castello in Lexico med. dnumerat tres: primam, quæ solum serpendo cutem superficie tenui saltem exurit, ac simplex dicitur; alteram miliarem à similitudine, quia in cutis seu cuticulæ superficie pustulæ semini milii similes excitantur: has duas



duas, puto, secundum magis & minus tantum inter se differre. Tertia herpetis species Græcis *ἰδίομερος*, sive fera dicitur, ex crassiore bile orta, totam cutem exulcerare solet, ad suppositam carnem usque. Secunda specie, miliari scilicet, affectum fuisse puellum nostrum, ocularis inspectio testabatur: tertiam vero observavi in festasse Emin. Arch. S. G. C. de T. qui anno 1672. Ratisbonæ affectu hoc afflictus, & Medici convocati ob mali vehementiam & contumaciam valde defatigabantur; fuerat iste a natura temperamenti biliosi, calidi, & sicci. Videatur etiam de curatione hujus mali, cum aliis authoribus *Anth. Saporiti tract. de tumor. p. II. l. 2. cap. 7. & 8.*

#### Additamentum Schroekii.

Quod Latinis Serpigo, & serpendo, id Græcis *ἰσμή* dicitur ab *ἰσμεν*, quod serpere itidem vel repere ipsis denotat. Licet diversos ex duplici hoc nomine morbos quidam sibi fingant, cujus specimen videre est apud *Gust. Ballonium lib. 2. conf. Med. etn. 18.* de diro herpete cum serpigne brachii sinistri consultantem. Hujus, ut Auctor etiam noster monet, diversa sunt species, quarum una miliaris, Græcis *μυζέουσι*, i. e. milio similis adpellatur, & communiter à bilioso humore, cum aliqua pituita parte commixto, ortum habere statuitur; quam permixtionem in hoc præcipue puelli herpete contigisse, dicendum erit, cum doloris absentia pituitam copiosam insipidam bili conjunctam, ejusque acrimoniam, dolores excitaturam, temperantem abunde teltetur. Serum autem sanguinis hic accusandum sæpius esse, arbitratur *Paulus Barbetre part. 2. Chirurg. lib. 1. cap. 8. dñctus enim lymphæ*, inquiens, *mali constituit mutationes in corpore humano produciunt, antea ignotas.* Et certe, paulo strictius si naturam sequi velimus, potiores hic serum ludere partes, fateri necessum est, cujus acridinem à sale in eo vitiato, & a core hostili imprægnato, dolorificum inducere sensum, nec non lentorem pustularum generationi perquam adcommodum, nemo est qui negare queat; quod si sal illud bilem, & serum crassius pituitam, ad Veterum mentem quis nominet, idem dicturus est. Qua vero ratione lymphæ ductus mutationem hanc in corpore producere queant, paucis disquirendum. Conspiciuntur quidem vasa illa seriosa, liquorem suum à circumferentia ad centrum vehentia, si quid hic conferant, vix alio modo, quam ubi obstructionem patiuntur, quod vel ab ipso sero crassiore fieri posset, id præstabant, ita ut lymphæ per meatus istos versus cor reditura, in eos non recipiatur, & sic restagnans ad cutis potius circumferentiam feratur. Istos tamen lymphæ ductus, sive sudoris vasa excretoria, quæ juxta cum glandulis densissime in cute esse consista, superius Schol. ad Observat. 22. ex *Willisæ* monui, excretioni huic morbo sæpius potissimum inservire credibile est, non alia tamen ratione, quam ut canales tantum sint, per quos ichor ille præternaturalis, in glandulis separatus, ad exteriorem cutis ambitum evacuari queat. Quæ quidem excretio modo universalis est, qualem affectum, quem ad herpetem referunt, ex *Hier. Reusner, Georg. Hier. Welfchius in Syllog. ob-*

*serv. num. 22.* nec non *Exc. D. D. Simon Schultzeius Ephem. Germ. cur. Ann. 3. obl. 5.* describunt; modo particularis, caput, seu in præsentia Auctoris Casu, artus superiores, inferiores, aliasve partes occupans; *Sacer ignis sit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, præcipueque in plantis*, ut habet *Celsus lib. 5. de re med. cap. 28.* Curationem non multum ab Erysipelatis recedere, communiter judicant; in quo autem differant, à Galeno lib. 2. de arte cur. ad Glauco. 2. docetur; Speculem si quis desiderat, præter alios, ordine expositam inveniet apud *Bald. Timæum cas. medic. lib. 6. cap. 10.* Consilium etiam in herpete capitis apud *Rein. Solenandrum* occurrit lib. 1. conf. 2. Externa inter præsidia, saliva quoque hominis jejuni & sani insita, à plurimis commendatur, qua multum sæpe effecti *Barbetre* testatur, & utilissimam vocat *Cl. D. Frider. Hoffmannus Clav. pharm. Schroder. lib. 5. sect. 1. §. 23.* Scilicet, quod agnoscit *Exc. D. D. Otto Tachenius cap. 16.* Hippocr. chim. Latens in eo alcali, acido isti morbooso contrarium, vim ipsius pungentem infringit atque absorbet, vel si acidi quid, ut aliis placet, natura ejus una continet, abstergendo etiam utilitatem præstare potest; velut ipsum rorem fenestrarum, ex halitu humano concentrato collectum, serpiginebus, ratione salis in eo delitescens, abstergendo, mederi, Venerandus *D. Simon Pauli* *cap. 8. de febrib. malign. §. 43.* auctor est. Unde etiam salivam tumores, ob subtilem suam & attenuantem naturam discutere *Corn. ab Hogelande*, notis ad histor. Oecon. animal. p. 73. judicaverat.

#### Herpes in pectore exedens.

Eminentissimus C. S. G. C. de T. temperamenti calidi & sicci, assuetus dixta liberaliori & vino generoso, ac iracundia facile percitus, cum Anno 1661. sub initio veris sentiret molestiam circa pectus cum calore quodam præternaturali, infestatus pruritu exurente, ac pustulis parvis cum cutis inflammatione & exulceratione dolorifica valde, à sero bilioso acri, impatiens & ægerius e ferens malum hoc, convocatis duobus Medicis, sed non ad gassum atque placitum ei servientibus, postulari jubet *Monachio Archiatrum Electoris Bavarici* supremum, qui severe injuncta dixta decente, alteruatis per episcopi cholagogicis ac bilis fervorem infringentibus, simulque externe adhibitis emplasticis & epuloticis, feliciter pristinae sanitati restituit *Joan. Helwigii.*

#### De Puella Herpete miliari laborante curata.

Elisabetha, Joannis Goldneri Consolis Thorunensis cognati mei jam piæ defuncti, minor natu relicta filiola, annos tredecim nata, Herpete Miliari correpta, per aliquot septimanas male habuit. Ego ad ipsam Anno 1670. 24. Novembris vocatus, offendi pustulis exiguis per summam totius corporis cutem, excepta facie, veluti ex densione misere defœdatam: quæ tamen e collatione signorum omnium à tenui & minus acri humore oriebantur: nam in sola superficie cutis: milii seminibus similes apparebant pustulæ levi cum pruritu, ob quam similitudinem



tudinem affectus hic Latinis *Miliaria Herpes* nominatur: Græcis verò quibusdam post Hippocratis ætatem *μυζα* ob eandem rationem dictus est: *μυζα* enim Græcis, Milius nobis dicitur: Atque hæc species Galeno Autore lib. 2. ad Glauconem Hippocrati generis sortitur appellationem, cum simpliciter & sine additione illi Herpes vocatur. Alibi tamen Herpetis nomine Galenus Herpetem Elthiomenum, id est, exedentem intelligit: Hic autem non protinus ulcus facit, ut alter, qui excedens dicitur, sed admodum exiguas pustulas ad speciem Miliæ, quæ & ipsæ, interposito spatio, ac procedente tempore, cum disrumpuntur, in ulcus abeunt: quod tamen in Herpete Miliari raro accidere solet. Quia verò Puella hæc teneræ constitutionis erat, & Medicamenta non adeo grati saporis valde averfabatur, præscripsi ei sequentia alterantia, quibus sine nausea utebatur.

℞. Syr. de endiv. sem. Cichor. nymphææ an. ʒij. m. de quibus quotidie manè & meridie H. 4. unum cochlear cum haustu cerevisiæ albæ calidæ: cubitum autem itura de sequenti Condito ad quantitatem nucis juglandis assumebat.

℞. Conser. rad. cich. ʒij. flor. Nymphææ, Viol. an. ʒvj. Lap. cryll. mont. præp. ʒij. c. f. q. Syr. rubidæit. l. art. conditum. Die 29. Novemb. istum Syrupum laxativum ordinavi.

℞. Syr. Diafer. Andern. ʒvj. Fulv. rad. Jalapp. ʒj. Crem. Tart. ʒß. Aqu. Cinnamomi cord. ʒij. M. post cujus usum purgatio aliquoties subsecuta. Die 1. Decemb. alterans.

℞. Syr. de endiv. f. de duab. radic. an. ʒij. quem pro tribus vicibus cum haustu cerevisiæ calidæ ebibeat. Die 3. Decemb. bolum laxativum deglutiebat.

℞. Elect. laxat. Extr. fol. Senn. nostr. ʒv. cum Saccharo. Canar. f. l. art. bolus pro una dosi. Hisce ita præmissis sequentia ordinata sunt die 5. Decembr.

℞. Rad. Chinæ pond. non lign. in taleol. sect. Salsæ paril. an. ʒvj. Salsaf. ʒij. Santal. Citr. ʒij. Infunde per horas 18. in aqu. font. fbi ʒ. cal. tum l. art. decoque in M. B. sub finem decoctionis adde Cinnamomi el. ʒij. liquirit. rasæ ʒj. Colaturam per residentiam optimè depuratam serva pro usu. Hujus decocti sexies parati quotidie manè & à meridie h. 4. Uncias duas cum Syr. acet. Citri ʒß. consumeat, subsequente sudore. Die 17. Decembr. Balneum artificiale hoc paratum est.

℞. Rad. Scrophul. Lapatii, Herb. lapp. maj. & min. leutr. palustr. plantag. fl. Chamæm. meliloti an. m. ij. Herb. fumar. m. j. Sulph. vivi, Alum. rochæ an. ʒß. Incisa crassiuscule d. ad Chartam pro Balneo. Die 19. Decembr. Isthæc inunctio instituta est.

℞. Rad. Lapath. maj. Emul. an. ʒj. contusa coq; in f. q. aceti ad formam cataplasmatidis, tractis per setaceum adde Sulph. pulv. ʒi ʒ. Alumin. ʒß. Crete pulv. ʒij. Butyri non saliti Ung. rosat. Mef. an. ʒx. Cereæ albæ parum, f. l. art. Linimentum: quo post balneum corpus calidè inungebatur. Inunctionem, quam Valescus de Taranta cap. proprio de curatione formicæ miliaris ex lana ovis succida corresecta & pulverisata, atque cum aqu. rosar. in pollinem redacta, hoc in affectu instar arcani commendat, puella ferre non poterat: Siquidem post hujus

inunctionem de summo dolore conquerebatur. Ab istorum usu puella per Dei gratiam melius habere cepit: Nihilominus tamen partim ad reliquias humoris vitiosi exturbandas Electuarii Laxativi nostri ʒß. partim Epatis corroborandi & refrigerandi gratia tale conditum præscripsimus.

℞. Conserv. rad. cichor. rosar. an. ʒi ʒ. fl. Cichor. cort. Citri. cond. an. ʒß. Spec. Diamarg. tr. ʒß. c. f. q. Syr. de endiv. S. l. l. art. conditum. Atque sic pustulis in totum evanescentibus, puella pristinae sanitati restituta jam optime valet. *Simon. Schulzii.*

#### De Herpete brachii lethali.

Nobilis quidam senex conquestus est aliquoties de pruritu in summo capitis vertice molestissimo. Lucidit in febrim malignam cum horrore maximo. Propinquantur bezoardica, intumescit collum, erysipelatode tumore descendente ad brachium cum vehementissimo calore & dolore, apparentibus vesicis ichore mordacissimo plenissimis, Pergimus in usu roborantium & bezoardicorum, Brachio repellentia nulla, sed extrahentia apponimus. At vires sentim decrescunt, ægerque post aliquot dies & ætate & morbo fractus & devictus ad alteram beatam vitam avocatur.

*Scholium*) Crisis fuit imperfecta, etsi enim pars aliqua malignæ & corruptæ materiæ per herpetis excitationem excreta, tamen reliquæ adhuc sufficientes fuere ad suffocandos & extinguendos ætate exhaustos spiritus vitales. Calido enim nativo exhausto, naturæ quoque vires languent, ita ut in expellendo, etsi excitata & stimolata, tamen segnis evadat. De crisis & earum causis hic agendum esset, sed cum ipse *Galenus l. 3. cap. 10.* Deos immortales invocet, se invitum de iis scripsisse, & in hisce propositis angustiis quoque impossibile sit, aliquid lectione dignum proferre, de iis hoc loco scribere supersedeo. *Daniel Wincleri.*

#### Pro Impetigine & Serpigine.

Duo filii mei patiebantur diu in brachiis ventre, ac cruribus feras, tristes atque debiles impetigines, quas manè & vespèri juxta ignem illinebam oleo sulphuris: quo intra paucos dies dolor, pruritus, omnisque infectio submota est, nec unquam postea recruduit. *Martinus Rolandus. curat. 83. cent. 1.*

Vir quidam in facie & cruribus impetigine laborans, post universalia remedia, curatus fuit hoc lavamento.

℞. Malv. cum toto, fol. salicis heder. arbor. & lappæ: an. M. j. coq. in vino. Laventur eo crura, & apponatur fol. lappæ; ad idem valet & fol. hederæ appositum: sed & hoc commodè usus est, & ego in aliis quam plurimis expertus sum.

℞. Fol. salic. heder. arbor. lapp. unguil. cabal. an. M. j. coq. in vino Picavienti. Deinde apponatur fol. ung. caball. valet egregie ut expecti sumus, etiam si in facie sit, linapi recenter molitum, & supra linitum, quod quidam pro maximo arcano tenuerunt: etsi apud antiquos quosdam authores ejus quoque mentio fiat. *Pe-*



*Ann. Forestii, obs. v. 10. lib. 2. obs. Chirurg.*

Pro hoc malo depellendo quod faciem & maxime mentem deturpabat; quidam infallibili remedio utebatur; inapi rec. mollito quo loca imperiginosa oblidebat, atque eo remedio cum ipse curatus est; tum plurimi alii post eum; quibus hoc communicavit consilium. *Petrus Forestius, obs. 12. lib. 2. obs. Chir.*

Mulier quædam impetigine in crure graviter affecta; cum per Chirurgos plurimos curari non poterat, ex consilio cuiusdam mulierculæ accepit butyrum ferri squamam quæ intercudentum excutitur, quam pulverisabat, & cum pice navali (vulgo *Tart.*) componebat linimentum; inungens crurum letiter, & curata fuit. Sed postea ut ipsamet mini retulit loco squamæ ferri, accepit carbones fabriles eosque pulverisatos cribro excipiebat, illumque pulverem una cum butyro & pice navali bulliebat in olla leniter donec in linimentum coiret: quævis autem satore non satis molestum ex se remitteretur hoc unguentum, egregie tamen ad rem faciebat, adeo ut hoc solo remedio a fæda illa impetigine tandem sanata sit.

Dum *Koma* agerem, post febrem, qua corripiebar, malignam, die septimo in fronte apparuerunt impetigines quasi per modum cruris: inrer *Giberium Horstium*. & me concluamit, ut incuratas sinerem, uxor aphor. 10. sect. 1.

Tandem tamen cum post aliquot dies viderem eas per se non evanescere, sed turpiores evadere, magisque intumescere, omni mane propria saliva, idque jejune, simul etiam in die sapius perfricavi; nam hoc contra serpiginem & impetiginem præsertim hominis jejuni valde commendatur: & ita tandem cœperunt sanari ac evanescere absque ullo alio remedio, neque ullum vestigium putularum in fronte remansit; aut impetigo illa revescit. *Petrus Forestius, obs. 13. lib. 2. obs. Chir.*

#### Pro impetigine.

Post universalia remedia unguento infra-scripto egregie curatus est.

℞. I. lumb. uli mini an. ʒij. pulv. præcipit. ʒxii. litharg. auri antim. camphor. an. ʒiv. unguent. lb. camphorat. ʒxvi. omnia commiscendo probe ducantur cum pistillo calido quam diutissime in mortario ad unguenti consistentiam: hoc utor felicissime in scalcie illa dicta *Hærvorm* quæ species proculdubio est impetiginis ac serpiginis vulgo feræ: Leviter autem inungitur, sed purgationibus & universalibus remediis semper præcedentibus; appellamus autem unguentum album camphoratum cum antimonio: sed & *A. emaria* in officina tale unguentum paratum habebamus ad hanc serpiginem *Hærvorm* dictam.

℞. I. icis naval. vulgo Tart. ʒj. butyr. majal. axung. porcini an. ʒβ. mell. terebinth. an. ʒiij. aceti vini ʒi. sal. vitriol. rom. tartari, cathart. an. ʒj. aris ult. sulph. an. ʒij. fulig. camini vel *Acabi* ʒij. M. F. unguentum f. 2. *Petrus Forestius, obs. 4. lib. 2. obs. Chir.*

Sulphur. cum aceto iociliciter adhibetur: maxime probatur unguentum hoc nostrum, quod ad omnem impetiginem & scabiem tollendam mirifice valet.

℞. Terebinth. lotz ʒij. ceruss. ʒβ. butyr. rec. ʒj. sulph. ʒij. ol. ros. ʒv. album ovor. uvin. ʒi. F. unguentum: cui adde camphor. & mosch. an. gr. v. item paretur linimentum in hunc modum.

℞. Pulv. lithargyr. pulv. tartar. an. ʒij. sulph. pulv. ʒij. ol. nucum. ʒij. aceti rosæ. ʒvj. ceræ q. s. F. linimentum. Ubi vero partes jam antea illas lavare voluerit, aqua utatur thalybeata in qua traxialia præbulerint: primum deturbare vitiosos humores oportet, & salubri victus ratione uti, mox localia remedia exhibere exsiccantia, incidentia & detergentia. *Joh. Zecchum consili. 79.*

Domina quædam laborabat fæda, færaque impetigine utriusque manus; propter quam tædio maximo afflictebatur; venæ sectionem; cathartica & omnia alia remedia respuebat, hanc paucis diebus sic curavi.

℞. Unguenti rosæ. ʒij. præcipitati alb. ʒij. M. pro litu partium, hoc remedio prædicta Domina Matronam quandam magni nominis, ut mihi retulit, eodem morbo afflictam curavit. *Petrus Pachegnus obs. 48.*

Mulier quædam færa impetigine laborans, cum summo dolore irritis omnibus remediis, sequenti cataplasmate mirum in modum luit levata.

℞. Putria poma num. vi. per setaceum transmittantur, quibus adde ol. ros. ʒij. lactis muliebris partim I. Cataplasma, parti dolenti admovendum. Longa experientia didici putria poma dolorem magis lenire quam cocta. *Petrus Pachegnus.*

#### Pro Herpete Effluviato.

Rustica mulier quinquagenaria hinc inde in coxis, brachiis, utroque genu, & cubito, pectore & facie, maculas habebat elevatas, crassas, scabras, asperas, latè serpentes, & de novo hinc inde erumpentes; ad me veniens hoc pacto sanata est:

Præscripsi vinum purgans pro quatuor vel quinque matutinis, quo bene purgata fuit. Deinde jussi scabras maculas semel in die madefacere sequenti aqua penna ea intincta.

℞. Sublimati ʒi. lithargyr. ʒij. borac. ʒβ. camphor. ʒj. F. pulvis; adde aq. ros. & plantag. an. ʒiv. coquantur; ab illius usu dolorem aliquem percipiebat, qui tamen mox remisit: statimque crassis sublateis macula hæc obduci cœperunt crassis & duris; quæ cremore lactis aliquoties emollitæ deciderunt; remanente subtilis cute sana. *Felix Platerus, obs. lib. 2. pag. 544.*

Post corpus decenter purgatum, & venam apertam, jussi hac aqua herpetem madefacere.

℞. Lithargyr. ʒvj. ceruss. ʒij. vitriol. alb. ʒij. aq. ros. ʒij. aq. sublimat. ʒβ. aq. virid. (cujus descriptionem vide supra lib. 6. sect. 4.) ʒij. M. diligenter. Postea hoc unguento inunge.

℞. Unguent. popul. & pomphol. an. ʒj. succ. lipath. & aceti scillit. an. ʒij. litharg. ʒi. tartar. ʒij. rad. serpentar. ʒj. lip. calamin. ʒij. ceruss. ʒβ. laticæ parum. ol. de tartaro ʒij. F. int. r. nutriti. Hoc tacto aliquandiu, sanatus fuit. *Idem obs. lib. 2. pag. 546.*

Alteri ad herpes hoc unguentum præscripsi,

℞. Succ.



BIBLIOTHECÆ  
 MEDICO-PRACTICÆ  
 LIBER QUARTUS

*De Affectibus à Litera D incipientibus.*

*DÆMONIACI.*


Vid.

*TITUL.*

De

*MANIA.*

*DEGLUTITIONIS VITIA.*



**L**EDITUR deglutitio quando 1. impeditur sive imminuitur & aboletur, vel quando depravatur. 1. œsophagi ex parte: 2. stomachi seu orificii ventriculi superioris culpa.

Œsophagi vitium est; (1.) quando musculorum

3. paria, fauces sui ampliatione efformantium, una cum sphinctere paralyti resolvuntur, (2.) quando ipsa musculosa ejus tunica simili malo corripitur. De posteriori vid. Willis. Pharm. rat. vol. 1. pag. 11. de priori Tulpus lib. 1. observat. 42. (2) quando angustatur nimis, sive hoc fiat (a) vel a tumoribus tam propriis, quam partium vicinarum. Illud quando inflammatur dynanchi, ut quando scirrhuso tumore obsidetur, aut quando a caruncula excrecente vitatur. Exempli quorum vid. Rhod. observ. 46. 47. cent. 2. Hoc quando tonsillæ, aspera arteria, aut uvula intumescunt, inflammantur, &c. Sive hoc fiat (b) 2. ab areta nimis clausura, & strictura fibrarum ejus, idque nunc ex spasmō sive convulsione, quo pertinent hypochondriaci subinde, non secus ac mulieres hysterice, gulæ adstrictionem & contracturam per nervorum spasmos ob consensum patientes, quod alii ex vaporibus stypticis ex hypochondriis elatis fauces stringentibus male derivant, nempe pertinent huc gulæ stricturæ ab utero; cujus mentionem facit Helmont. Tr. Asth. & Tussis §. 11. Hinc etiam in Epileptico paroxysmo difficillima aut nulla solet esse deglutitio. Nunc ex illarum nimia exsiccatione in febribus ardentibus continuis. Quo suo modo etiam pertinet defectus salivæ, deglutitionem plus minus impediens, nunc ex illarum ab assumptis constrictione & corrugatione, quo Hochstetteri facit observat. decad. 3. cap. 3. adstrictio gulæ ex potu vini malvatici, in quo radix consolid. major. infusa fuit. Sive hoc fiat (g) 3. ab obstructione,

propter deglutita varia aut majora in faucium isthmo sive principio œsophagi hærentia, ubi boii majores, nux Persica, ovum gallinaceum, &c. aut acuta gulæ innoxia, ibique tam sui insolita præsentia, quam propter dolorem, & hujus occasione inflammationem aut abscessum, deglutitionem impediens, v. gr. ossicula, spinæ piscium, aciculæ gulæ infixæ.

Orificium superius ventriculi sive stomachus in culpa est, quando rite licet, per œsophagi iter demissa, nihilominus adnittere debita recusat, id quod fit imprimis, quando quacunque occasione irritatus sive laceratus, contumacius se stringit & claudit, adeoque assumpta ulterius progredi impedit, id quod fit, (a) quando vel inflammatum, vel velut excoriatum; aut plus minus exulceratum, vel tumore quocunque, a priori nullo modo cognoscibili, obessum fuerit, quo facit curiosa & notabilis observatio Willisii Pharm. rat. vol. 1. p. 45. (b) quando copiosiores, plus minus acriores, status in ejusdem angustis inclusi fuerint, quorum nimica præsentia utrumque, speciatim superius, orificium ad pertinem suam stricturam irritatur. Unde assumpta nonnisi difficulter admittit, aut admissa eadem copiosi status eructantes, insequuntur, eaque plus minus simul una rejiciuntur, quo facit non inelegans observat. Riverii 11. de morbis infrequent. Item Plateri observat. 1. 1. pag. 123. (g) Quando quacunque de causa nauseat, aut assumenda horret ventriculus, nam & sic orificium claudit, non assumpturus sibi hostilia. Hæc ratione familiare est febricitantibus, quælibet liquida aut esculenta fluida deglutire, sed carnes, ova frixa, vel similia pertinaciter respuere, & oblata nullo modo, aut non nisi difficulter admittere.

Pertinet huc Amat. Lusitan. cent. 6. cur. 49. ubi post scretum sanguinis, & assumptorum vomitionem, deglutiendi omnimoda difficultas etiam aquæ, solæ vini assumptione salva, conf. Wilsan. cent. 5. obser. 14.

Depravata tandem deglutitio est, 1. quando liquida difficulter, solida facile, & contra deglutuntur, de quorum affectuum theoria in Philosophicis, ubi de deglutitione pluries actum 2. quando in eodem assumptorum vel solidorum vel liquidorum genere, quædam facile, quædam difficulter, quædam omnino non degluti possunt. De ejus ratione ex superioribus, speciatim ex nausea ventriculi jam constat.

Cccc



*Quoad Prognosin.*

Igitur deglutitio quò magis vel minus tollitur, eo magis vel minus periculum vitæ imminet. A paralyfi musculorum faucium nata difficilis deglutitio periculosum & difficulter curabile malum est. Quod si ob spirituum moventium defectum, & adeo insignem virium resolutionem, prout in acutis interdum accidit, malum evenit pessimum signum, & mortis futuræ iudicium, si cum sonitu, quasi in lagenam vacuum decidat potus. In vulneribus si accadat ex convulsione deglutitio laesa, periculosum, sicut alias convulsiones faucium in acutis periculosius, in chronicis minus. Si a tumoribus per se quidem, & ex interna causa naturali oriatur malum pro tumorum vel facile vel difficulter, vel omnino non curabilium natura, prognosin facilis est. Sic v. gr. ex ulcere œsophagi cancroso omnimoda, adeoque lethalis deglutitio impotentia. Sic ob œsophagum cartilaginofum factum deglutitio penitus abolita: *Ann. 3. M. C. pag. 26.* adeoque lethalis.

Deglutitæ res alienæ in faucium isthmo vel hærent, vel extra hunc, vel ad ventrem tandem descendunt. Dum in faucibus hærent, præter iniuriam sui præsentiam interdum simul dolorem excitant, unde tumor, inflammatio, abscessus, iique vel lethales, de quo vid. *Hild. cent. 1. observ. 35.* Item *cent. 5. observ. 35.* ex officulo œsophago infixo, tumor, dolor, febris, inflammatio, mors: Vel hoc rupto abscisso, rei peregrinæ cum pure excretionem, aut descensum faciunt. Confer item *Hild. cent. 1. observ. 35.* ubi mulier officulum devoratum, quo penè suffocabatur, septimo tandem die, excitata supuratione, eiecerit: Vel per alia plus minus vicina loca, exitum sibi quaerunt. Quo facit exemplum notabile *Paræi lib. 24. cap. 29. Chirurgia,* de graminis ramulo deglutito, qui postea integer per intercostale spatium erupit. Item *Hild. cent. 1. observ. 33.* ubi spina piscis gutturi biennium infixa, post, excitato abscessu, in extrema colli parte extracta. Dum verò ad ventriculum quocunque modo descendunt, vel inferius per anum successivè denuo excluduntur: dum v. gr. quidam metu, ne in itinere spoliaretur, 6. ducatos deglutivit, eosque post aliquot dies, injecto clystere abstergente, sine noxa rursus reddidit, teste *D. Michael.* Vel dum fistula deglutita tertio die sine noxa per alvum fuit reddita, auctore *Barolinio cent. 1. hist. anat. 59.* Vel in stomacho pertinaciùs hærentes, varia mala inferunt, dum v. gr. pylorum obstruunt, quæ obstructio, si contumacior fuerit, mortem comitem trahit, auctore *Kirking. in Specileg. Anatom. observ. 1.* Confer etiam *Hildanum cent. 6. observ. 35.* Quod etiam pertinent aciculæ, quarum quædam sine periculo, quædam cum summo periculo deglutitæ observantur, conf. *M. C. Ann. 4. pag. 77.* Vitri frustula aut annulus, cujus asperitate excitatam dysenteriam notat *Zacutus Lusitan. lib. 1. Med. Princ. hist. 84.* Cæterorum huc facientium affectuum prognosin ex dictis facilis est.

*Cura.*

Pro causarum varietate, & mali inde nati diversitate, etiam variat. Paralyfis partium deglutitioni inservientium curatur per decoctum

salvæ in vino, & continendo in ore v. s. infusio-  
nis thymi vel decoctum salvæ & crucæ g. rg. ri-  
zatum, aut in ore contentum egregium est. Nux  
morchata masticata & deglutita est egregia ol.  
succini destill. aut ol. destill. anisi saly. guttatum  
intra fauces assumpta, sunt efficacissima. Essen-  
tia castorei, spir. cerasorum nigrorum, liliorum  
convallium, spir. theriacal. cum essentia castorei  
uncti; Item aqua anhaltina est egregia, illinatur  
collum ac nucha ol. lumbric. terrestr. collum. ol.  
destill. succin. anis. lavendul. & S. Tumores ha-  
rum partium, siquidem cogniti fuerint, quales  
sint, more talium tumorum curari debent.  
Claustra faucium & Oesophagi a spasmo, aro-  
maticis & nervinis, blandis opiatibus additis, tam  
internis quam externis curanda. Si a vitio hy-  
pochondriorum per acidum absorbentia &  
opiatum, item castoreat. Sin ab exsiccatione in  
febris, interne mucilag. sem. cydon. cum aq.  
spenn. ran. extracta est egregia. Externe un-  
guent. Zacuti ad hunc affectum, compositum ex  
unguento filii Zach. unguento rosato, resum-  
ptiv. ol. amygdal. dulc. violar. & mucilagini-  
bus cum lacte muliebri. Salvæ defectus potu  
præsertim vini, vel cerevisiæ secundariæ refarci-  
tur: Item *crystalli frustula* in ore circumacta  
salvæ copiam nonnihil provocant. Assumpta  
externa pro sui varietate oppositis curanda, ut  
in illo *Hochstetteri* exemplo, propinato aceto  
strangulatio & faucium angustia sublata fuit.

*Quoad res alienas deglutitas*, sed intra œso-  
phagi superiore tractum adhuc hærentes, ex  
quanto ocyus iterum artificiosè eximendæ ve-  
niunt, vel ad ventriculum, si innocuæ sunt; de-  
trudendæ, cui fini inservit, vel instrumentum  
*Willis. Pharm. rat. vol. 1. pag. 45. aut Hildani cap. 1.  
observ. 31.* Quod si his modis non succedat ne-  
gotium, instrumentis res tentanda, in quem fi-  
nem vel forcipes rostris longis, vel instru-  
mentum *Hildani cent. 1. observ. 36.* aut hujus suc-  
cedanea *cent. 6. observ. 34.* Vel candela cerea,  
vel spongiola cum filo, it. pro aciculis *Flamm-  
lus Hildan. cent. 6. observ. 36.* Adhibetur ol. amygd.  
d. & saccharum in forma electuar. ante paltum,  
ut dolor per oleum leniri, per saccharum verò  
ulcus forte præsens abstergi possit.

Quod si aciculæ, vitri frustula, spinæ piscium,  
aliæve acutiores per deglutitionem in ventricu-  
lum penetraverint, opera danda, ut hæc sine  
noxa per inferiora tandem excludantur. In  
quem finem propinetur puls aliquanto spissior  
ex oryza, vel milio, vel panico, ita quidem, ut  
aliquandiu æger à potu abstineat, ut ita per hu-  
iusmodi spissiora involuta res deglutitæ acutio-  
res sensim ex ventriculo per intestina ulterius  
promoveri queant.

In stomacho si fuerit vitium, priori ex causa,  
vel mala ejus methodicè curanda, vel instru-  
mento *Willis. Pharm. rat. vol. 1. pag. 45.* utendum.  
Si ex secunda causa carminantia interna & ex-  
terna propinanda, infra de inflammatione sto-  
machi præscribenda. Quoad tertiam causam  
stomacho gratis & acceptis insistendum, ven-  
triculus nondum cogendus.

*Depravata deglutitio*, cum quædam curabilis,  
quædam non curabilis sit, illa vero *nervorum ex  
vitio* speciatim oriatur, parti n. ex dictis vel suo  
loco dicendis curatio manifesta erit. *Michael  
Ettmull. Colleg. Præf. lib. 1.*



## Consultationes.

*De Lasa Deglutione. Pro Adm. Reverend. Patiente.*

Patiens Adm. Reverend. annorum 66. temperamentum à natura ortu calidi & humidi, habitusque mediocriter carnosi, duodecim abhinc annis hernia hydrocele laboravit, ex qua quot annis arte educebantur sex circiter libræ aquæ. Anno præfenti ab hac liberatus conqueri cœpit sex ab hinc mensibus de lasa deglutione cum solidorum, tum liquidorum; siquidem ubi primum duos vel tres bolos deglutiverit, replentur ei fauces, & œsophagus pituita viscida albicante, in quibus tantum angustiam parit, ut nil prorsus deglutire valeat. Quod si vim sibi tunc inferat, dolor intensissimus suboritur, cuius ratione assumpta evomuit, cum copia pituitosæ materiæ; nec quicquam appetit; imo nec panem, nec cibos ex pasta deglutire potest, carnem vero paucissima copia, & minutissime mensam. Propterea extenuatus de agendis consultit.

Ex hac historia constat, Adm. Reverend. Patientem lasam habere deglutionem, ac proinde œsophagum esse partem principaliter læsam, à Latinis gulam, & ab Hippocr. hitulam vocatam à linguz radice ad os ventriculi pertingentem. cum ex omnium consensu deglutionis munus œsophago à natura demandatum sit. Tripliciter autem læsa est deglutitio: deperdita, scilicet imminuta, & depravata est. Deperdita, ratione panis, & aliorum solidorum ciborum, quos nullo modo deglutire potest; imminuta, ratione carnis, & aſſorum minutissimas partes incisorum; & depravata, ratione doloris intensissimi provenientis ex violenta deglutione. Cum autem deglutitio dupliciter lædi possit, per essentialem scilicet affectionem, & per consensum cum aliis partibus. In casu præfenti œsophagus utroque modo afficitur; atque essentialis ipsius affectus compertissimus est ex dolore, *Ubi enim dolor, ibi morbus.* Affici etiam per consensum patet ex inappetentia. Appetitus namque est actio oris ventriculi. Et cum œsophagi morbus triplex esse possit, intemperies scilicet, mala compositio, & soluta continuitas, ex enarratis ab ægro Adm. Rever. constat esse morbum in mala compositione, obstructionem scilicet factam à materia pituitosa, crassa, viscida, albicante, quæ ad instar globi, ubi deglutionis canalem ita ocludit, ut propterea usum ciborum intermittere cogatur. Non tamen perfecta est ea obstructio, alioquin neque liquida deglutirentur; cum tamen junctam esse censeo intemperiem humidam fibrarum transversarum œsophagi, ob quam non possunt ita constringi, ut cibos solidiores detrudere possint ad ventriculum, concurrente laxitate oris ipsius ab eadem materia producta, cuius causa non sit ipsius corrugatio, appetitum ciborum præcedens. Dolor autem sit à violenta solutione continui tunicarum ab eodem cibo facta.

Ac propterea causa præcipua huius affectus est copia pituitosæ materiæ, cum à capite fluentis, intemperie frigida, & humida laborante;

hac ætate in primis ultimi senii, tum à ventriculo frigidiori quam par sit, non sine consensu imbecillioris jecoris, quod loco sanguinis ferrosam materiam generat, quæ antehac ad serotum confluxit, & hydrocelem produxit; nunc vero ad partem affectam re.urrens eam magis humectat, & relaxat. His ergo sic constitutis, cum neque in ventriculo chylus, neque in jecore sanguis sufficienti copia generari possit, nemini minus videri debet, quoniam subsequuta sit macies, & totius corporis imbecillitas.

Ex his cuilibet in arte versato compertissimum esse potest, quam difficile sit præsentem affectum, hac ætate, & hoc virium languore, superare: ut propterea metuendum sit, ne in marasimum senem labatur æger, & fato cedat. Non tamen superledendum est medicis præliis, ut vita saltem longius protrahatur.

Quare materia fluens à capite derivanda; à ventriculo, & jecore reveſtenda ad infernas partes, fluxa sensibiliter, & insensibiliter evacuanda; viscerum intemperies corrigendæ contrariis; & viribus consulendum. Quibus intentionibus satisfaciendum remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis, & Dieteticis.

Ex Chirurgicis tres præliorum materiæ locum habent, cauteria, cucurbitulæ, & punctiones. Sanguinis missioni nullus locus, cum potius infundendus, quam effundendus esset. Duos fonticulos inurendos censeo, alterum quidem sinistro brachio, pro derivatione scilicet alium vero interno femori, pro revulsionem à ventriculo, & jecore, & revocatione serositatis ad serotum. Quam ob causam setaceum per illud transmissum proſuturum censeo. Neque ex his emillariis majoris maciei imminet metus; evacuant enim materiam excrementitiam, non alimentalem. Rubescens applicatum futuræ coronali fluxionem revellet, & exticcabit. Cucurbitulæ cum flamma infra ventriculum, attractionem cibi sollicitabunt. Punctiones eidem ventriculo bis in die administratæ sanguinem alliciendo, juvabunt coctionem: imò non præter rem censeo applicare velicans infra scapulas, ad evocandam, & digerendam materiam in œsophago contentam.

Pharmaceutica sint alvum subducentia, per clysteres, qui admittant hieram picram Galeſi, cum melle ros. simpl. oleo rutaceo, & decoctione betæ, mercurialis, malvæ, & flor. chamæmeli; mox & validiores, paratos ex hiera Pachii, vel Logadii, cum decoctione symphyti, utriusque centaurei, colocyntidis, nodulo inclusa, addito electuar. de benedicta laxativa: alternis clysteribus nutrientibus, ex vitellis ovorum, carne contusa, & jure caponis. Licet enim clysteres medicamentosi non pertingant ad intellinam tenui, cum ab ipsorum facultate non attrahantur; renutrientes tamen alimenti inopia attrahi possunt, atque ita nutrire. Interim per os ex usu erunt attenuantia, & incidentia; oxymel nempe simplex, scilliticum, vel mel scilliticum, ad attenuandam materiam vomituque expurgandam, quibus addi potest modicum farinæ lupinorum, vel fabarum, quod diutius hæreant, & magis detergant, vomitu provocato oxymelite simplici, & succo raphani tum mulla. Mox exhibeatur mulla, vel aqua Teturtiana, pro majori deterſione; præscriptis



intetum rotulis ex tribus piperibus, vel ex radice iridis in ore detinendi. Applicetur extrinsecus supra vertebrae unguentum Agrippæ, vel Marciatum: vel fiat inunctio cum oleis de castoreo, rutaceo, & theriaca antiqua. Caput evacuandum per ethina, non per masticatoria, ne majori cum impetu fluat materia ad œsophagum: ideo succus betæ, radix cyclaminis, agaricus in lacte dissolutus, vel etiam pulvis nicotianæ præscribatur in curationis progressu. Quum vero œsophagus minori pituitæ copia redundabit, exhiberi poterit mel. ros. solut. cum aqua fetutiana, tres vel quatuor dies; moxque reliqua materia insensibiliter digerenda, & partes affectæ erunt exsiccandæ decocto ex ligno indico, salsa parilla, & modico salsafras, cum jure columbæ, additis symphyto, betonica, stœchade, salvia, & origano, cum spiritu terebinthinæ, vel spiritu vitrioli. Quod si deglutire poterit, paretur bolus ex castoreo, & trochiscis cyphæos: pergatque in usu ipsius plures dies.

Victus sit attenuans, incidens, ac valde nutriendus. Propterea fiat contusum ex pulpa caponis cum pistaciis, succo citri, & cinamomo: fiat consummatum ex capone asso, adperso succo citri, & caryophyllis: intinctus item ex petroselino, pane asato, pistaciis, & pulpa perdicis: concedantur carnes, & pisces saliti minutim incisi, ferculaque nutrientia. Vinum sit generosum, sed pauca copia. Atque parum & sæpè nutriendus est patiens, & in cibis familiariter utatur melle Hispano, vel Cretico, quod in senibus non difficulter in sanguinem vertitur. Sic enim sperandum est fore, ut vita protrahatur & vires conserventur. *Bened. Silvatic. Consil. & Respons. Medic. Gen. 2.*

*De Solidorum Deglutione lasa, & Motu colli impedito. Pro Illustrissimo Comite.*

Duo sunt Affectus Comitæ Illustrissimi, tumor scilicet scirrhus glandularum faucium, solidorum deglutionem prohibens; & motus impeditus colli, & scapularum, cum aliquo dolore accedente, & recedente, magisque, vel minus intenso.

Quorum uterque dependet à catarrho, qui à capite fluxit ad partes affectas, crassiori quidem ad glandulas, ubi in scirrhum conversus: tenuiori vero, & fluxiliori ad tendinosas, & musculosas partes colli, & scapularum. Quo sanè catarrho abundat Comes Illustrissimus, qui copiosius congeritur in ipsomet capite, cum per modum generationis, ratione humiditatis excedentis, tum per modum receptionis, ab imbecillo ventriculo, & à venoso genere; tertio, quia suppressus, ob antiquam narium angustiam, propria excrementa non expurgantium. Collectus autem in capite, liquefactus est à calore ex motu, & insolatu contracto, fluxitque ad partes subcutaneas colli primò, deinde & scapularum, ubi ab ambientis frigiditate detentus, stipatis porositatibus cutis est, causa læsionis motus, & doloris prædictarum partium.

Affectus equidem non adeò facilis curationis in hac senili ætate, & hoc inæquali anni tempore: non tamen incurabilis, quoad motus impedimentum. Glandularum verò intumescen-

tiam quod spectat, aliis utique remediis curari non poterit, quam amputatione alioquin ipsarum, quæ non difficulter fieri poterit, quoniam tumor est externus, & non amplius, ad radices lingue hærens: tunc enim ligata radice glandulæ filo sericeo, amputari potest fornice: prout mihi non semel feliciter successit. Atque tunc hæc operatio, fieri debet, quando deglutitio & respiratio erit graviter læsa.

Cæterum hoc affectu nunc prætermisso, si agitur de difficultate motus, hæc curabitur digerendo materiam fluxam, divertendo fluentem, atque prohibendo regenerationem similis, per correctionem intemperiei, jam peracta universali totius corporis evacuatione, de qua propterea non est quod pluribus agamus.

De peculiari capitis evacuatione difficultas aliqua occurrit: credimus tamen caput expurgandum esse etiam per os; siquidem tumor ille scirrhus indicat nullam amplius fluxionem adesse. Tentanda quin etiam est expurgatio per nares, eas laxando oleo amygd. dulcium, & alliciendo n. acriam tabaco pulverizato attracto, & insufflato. Per futuras quoque insensibiliter expurgabitur frictionibus, pectinationibus, & similibus. Hi que peractis, decoctum præscribetur ex medulla ligni sancti, & salsa, cum visco quercino. Opus est enim valido medicamento, attenuante, & ventriculum roborente: quod omnium maxime præstabit lignum Indicum; parato decocto cum carne, renutritionis cujusdam causa. China enim debilius est virium, *santalum* subadstringunt, & refrigerant, quibus non admodum opus in hac ætate: si permitteretur Terebinthina Cypria, esset accommodata. Sudor interim allicietur doliolis, vel cucurbitis repletis aqua fervida, alterata salvia, rore marino, stœchade, majorana, calamento, carduo sancto, & similibus. A quo inungatur occiput, & scapulæ oleo laurino, rutaceo, de castoreo, & chamæmelo, superposita lana succida, vel pelle agnina, quam continuo gestabit, excepto tempore sudoris.

His remediis speramus fore, ut Illustrissimus Patiens xx. dierum spatium circiter pristinam sanitatem recuperet, si præsertim jungatur congrua victus ratio. Circa quam notandum est, quod abstinentia à vino conferet: cujus loco in usu erit secunda illa aqua decocti, parata ex coriandris. Quoad purgantia, laudamus generosiora, puta pulverem hermodactylatum sæpè repetitum, vel jalappam, vel mechoacam, cum pilulas non possit deglutire. Et hæc est nostra opinio de affectu præsentis. *Idem ibidem.*

*De Sublata Panis Deglutione. Ad Perillustrem Hieronymum Odasium Medicum Brixensem.*

Ex doctissima dissertatione constat, Nobilem Patientem quinquagenarium, mediocris constitutionis, habitus sanguinei, cum bilis subdominio, dum cum sodalibus cibum sumeret, atque panem attritum deglutiret, motum quandam circa os ventriculi persequisse, panemque ad fauces regeßtum fuisse, atque ejus frutulum, quod hæserat in faucibus rejectum, quod toties contigit, quoties ipsum ingerere tentavit; ac proinde nunquam panem deglutire potuisse, siue solum, siue cum potulentis; huncque affec-



etum sex menses perdurare; quamquam panem sumnoperè appetat, cæteris alimentis cum liquidis tum solidis deglutitis; ita tamen, ut solida gravitatem aliquam circa os ventriculi inferant, qua levatur, dum liquidorum beneficio præcipitantur, solo pane etiam cum liquidis superbibitis vomitu rejecto; cibo aliquo suavi cum liquido, tum solidiori aliquando deglutito. In ciborum assuptione observantur, a primo, vel secundo bolo deglutito eructationes midorulentiæ, quibus resolutis progreditur in assumptione cibi, quæ etiam extra illud tempus aliquando superveniunt. Quod si in deglutitione impedimentum aliquod observat, subsistit aliquantulum, atque tunc erumpunt status, materiamque catarrhalem aliquando expuit insipidam, ac deinde pergit in cibi usu: nunquam tamen panem deglutire potest. Persentit aliquando ardorem in ore ventriculi, nullo observato tumore in visceribus naturalibus. Multa frustra hactenus fuerunt administrata, lenientia, præparantia, purgantia, & alterantia, cum interna, tum externa, sanguine misto ex jecoria, & hæmorrhoidibus, stilacidium ventriculo ex oleis, frequentes clysteres: & tandem dejectorii usu multa bilis copia fuit evacuata, vehementisque syncope supervenit; æstus causa aquam endiviæ quandoque cum juramento sumpsit; quod nullum fuit in panis deglutitione. Propterea queritur præsentis affectus causa, & quoniamam medicis prædiis superari possit.

Quod ut fiat, supponam tanquam verissimum cum Viro Præclarissimo, flatulentam materiam à ventriculo erumpentem, & pituitosam, quæ à capite confluit, ciborum delensum remorari possit. A flatibus namque repelluntur, & à pituita crassitie retardatur solidorum descensus, quousque potulentorum usu fluxiliores fuerint redditi. Quam ob causam gravitatem inferunt in ore ventriculi. Suspiciari quin etiam possumus, adesse humiditatem excedentem in œsophago, impediens validam contractionem fibrarum ejus transversarum, cibos ad ventriculum detrudentium. Verum cur panis neque solus, neque cum liquidis deglutiri possit, perobscuro æ cæleo. Respondere, quidem possemus cum Galeo, & Hippocrate, panem esse viscidioris, & magis glutinosæ substantiæ, quàm alia assumpta; hæc tamen visciditas, & lentor est qualitas, quæ in pane semper inest, & nihilominus antea deglutiebatur absque impedimento. Verum quidem est, quod tunc non aderat ille renixus in pallo, qui nunc apparet, quoniam neque tanta flatuum copia, neque adeo copiosa pituita observabatur: attamen flatus erumpunt, & pituita cum sponte, tum medicamentorum beneficio sæpius fuit deterfa, & expurgata, & nihilominus nunquam successit panis deglutitio; ac forte alia assumpsit viscida & leuca, ut oryzam, far, cibos ex pasta, limaces, & similia a quibus impedimentum nullum accidit. Ac proinde in eam concedo sententiam, quod hoc proveniat ab antipathia ventriculi, & aversione specifica ab ipso pane, non verò liorum à sumptorum. Plures etenim sunt, quibus à specificis quibusdam assumptis afficitur ita ventriculus; ut non solum ea revomant, sed etiam graviora superveniant ipsis accidentia. Aliqui enim abominantur Allium,

teste Julio Alexandrino, Secundo de Tuenda sanitate, Cap. 13. qui scribit, novisse se, qui ita allium averfabatur, ut nunquam, illud comederit; quod & ego fide mea possum testari de Nob. nostro Patavino Anaxarte Pigna, cui propterea cum ab amicis invitato ad comedendum acipenserem piscem variis modis præparatum, & conditum, cum patinis allium affricatum esset, interdictum illi fuit ejus usu. Refert Amatus Lusitanus, Stephanum Sordalium Hispanum a piscibus adeo abhorruisse, ut si cum aliis cibariis eo inscio ipsi exhibiti fuissent, in animi angustias, compressiones cordis cum vomitu, aliisque dejectione incideret. Petrus Aponensis, referente Matthæo de Gradi, hac ita abominatus, ut nec illud comedentes sine nausea videre posset. Brasavola in Lib. secundum Hipp. de Ratione Victus in Acutis, comm. 34. hæc scripsit: *Vidimus Illustrissimam Juliam Tarraconensem, Federici Regis Neapolitani filiam natam minorem, quæ carnes edere non poterat, imò nec gustare. Si enim bolum in os immittebat, in gravissimam incidebat syncopen, ac vehementem ciuitatem edebat, in terram procidens volutabatur, idque hora semis spatio contingebat, deinde ad se redibat.* Alii abhorrent a caleo, & eo quidem quocunque modo sumpto, alii seorsum ab aliis alimentis; atque alii eo veteri non recenti delectantur. Aliis acetum vomitum excitat; ut mulieri Burgundæ; alius sedat. Nec solum in assumptis alterationes observantur, sed etiam absque his. Scribit enim Autor v. Epidem. Hippoc. adscripti, historiam 79. affectionis Nicatoris, qui cum ad potum progrediretur, tibicinem sonantem cum audiret horis nocturnis; præ timore vix se sustinere poterat, interdum autem eundem audiens nihil commovebatur. Aliam jocosam synopathiam retulit Scaliger de Subtilitate ad Cardanum, Exerc. 344. Reguli Vasconis Equitis, qui, dum viveret, audito phormyngis sono, urinam illico emittere cogebatur, qua quendam ex turba aspersit; qui radiculam illi molitus est ultionem: pone accumbentem adduxit eum quendam cum phormynge; ejus, ut solebat, sono permotus, ibi sub mensa in clarissimorum convivantium sodalities quin pedes permeieret, continere sese non potuit. Quinimò nec desuerunt alii vinum averfantes, alii panem ipsum raro comedentes: inter quos liceat mihi referre Patrem Cæsar Augustinianorum Excalceatorum, nunc Præfectum Cænobii Viennæ ex Nob. Familia de Ramerithal, olim S. Cæsar. M. puerum nobilem; nunc vero ætatis annuum 40. excedens; qui nunquam panem quocunque modo coctum degustare potuit, nec in præsentia potest, & in primis a pane calido abhorret. A pane autem calido ventriculum quam maximè affici asseruit Hippoc. Secundo de Ratione Victus in Acutis text. 34. Cur autem facta sit hæc panis abominatio in casu præsentis; si quis querat, respondere possum cum Scaligero Exerc. 274. de Subtilitate ad Cardanum; *Harum rerum causas neque ego scio, neque scire labores in: sapientia vera est nolle nimis sapere.* Addam nihilominus duas causas ab Hippoc. assignatas Secundo Acutorum citato; quarum prima est, repentina præter consuetudinem panis deglutitio; secunda æstus ventriculi. Prima habetur ex morbi historia, dum referunt juxta Italici sermonis vim,



quod in convivantium consuetudine, dum veller comedere, assumpto pane, eum manducasse, & deglutisse, sed cum tenuisset quandam commotionem circa os stomachi, rejectum esse panem. Ex quibus colligitur, a pane confertim deglutito lationem aliquam in ore ventriculi subsecutam esse, cujus sensus semper exquisitus primam renovat molestiam, ideoque panis rejicitur. Secunda habetur illis verbis historiarum, quod eructationes sunt nidorulentæ, dejectiones biliosæ, & quod insignis æstus percipitur in ore ventriculi; atque ita panis attritus, conversus in naturam recipientis rejicitur tanquam ventriculo insensibilis; cum habeamus ex eodem Hippocrate. Secundo Acutorum citato, quod passis calidus assumptus maximam turbationem facit in ventriculo, sitim infert, & repentinam plenitudinem inducit. Has ergo ob causas, præter occultas, panem deglutire non potest, quantum ipsum appetat, ex memoria delectationis ab ipso perceptæ, quando ventriculus erat naturaliter constitutus. Plus enim potest præsentia objecti molestiam inferentis, quam memoria præteritæ oblectationis. Ita usu venit in aliis omnibus naturaliter abominabilibus, quod tunc tantum averfionem inducunt, quando sunt præsentia, & actualiter operantur.

Ex his apparet, difficillimam fore præsentis affectus curationem; non tamen impossibilem. Quoties enim cunque expurgatus fuerit ventriculus ab excrementis biliosis, discussique status, ac tandem æstuans ventriculi intemperies refrigerantibus contemperata, convalescet æger.

Purgatio propterea ex Viri Præclarissimi consilio instituenda. Atque inter ea quæ proposita sunt, valde commendo fonticulum dextro femori inustum. Aquas Carafanianas tanquam deterforias quam maximè laudo, cum dejectoriis triduum potui datas ad libras tres circiter. A quarum usu aquas Villenses in agro Lucensi, vel nostras Beatæ Virginis, vel aquas Ficuncellæ in agro Senensi, vel etiam Nocerianæ summopere profuturas existimo. Copiosè bibantur quindecim dies circiter, cum diureticis non dulcibus: puta emulsione sem. melonum, cremore tartari, ■ spiritu vitrioli, vel salis, incipiendo a libris sex, & singulis diebus addendo libram, ad tredecim usque: mox singulis diebus libram subtrahendo, ad libras sex, præmissa parca cœna, quod facilius permeent. Quod si liberè fiat, ut spero, cum hypochondria benè habeant, supersedebit quindecim dies ipsarum usu plus minus ad libitum: atque iterum ipsas assumet. Nil enim magis extinguet æstum ventriculi: suntque aliquando dejectoriæ, cum majori dosi cremoris tartari; ita namque excitabitur appetitus, juxta Hippocratem in Epidemiis: Aqua vorax, & vigilat voraces. Caput interius Errhinis purgetur: hepatis refrigerantia applicentur: alvus continuò lubrica servetur. Ventriculo nil extrinsecus apponendum: quoniam à jecoris refrigerio ventriculus roboratur. Panis interim siligineus variâ formâ aniso, fœniculo, & coriandro condiatur. Et hæc in medium quæ afferrem habui, committendo omnia prudentiori alicujus judicio. Obiit autem sex mensibus à morbo, impedita deglutitione omnium solidorum, vel liquidis ipsis dissolutorum. *Idem ibidem.*

### Anatomica inspectio.

Vir honestus 56. circiter annos natus in tantam incidit deglutendi difficultatem ut cum aliquid in ventriculum exinanitum ingerendum pro vita conservanda veniret, non tantum solida viam sibi in medio œsophago præclusam invenirent, sed etiam liquidorum illac transitus adeò impeditus foret, ut plures conatus quolibet vice per horæ ad minimum quadrantem essent impendendi, subsequenter etiam ingestorum quæ à parte læsa ad fauces usque reitagnabant vomitionibus, antequam guttula una aut altera sibi viam aperiret in ventriculi concavum, quò demùm peracto aliquid liquidi ulterius absorbere imò pulsem tenuiorem ex lacte & farina aut pane confectam vorare valebat. Nec aliquid in subsidium poterant vel instrumenta Chirurgica ordinaria, vel alia quæcunque a nobis excogitata, quin vitam sic miseram per annum & dimidium transfegerit, tandemque marasmo, nulla tamen adveniente febre, præterquam ultimis diebus, confectus obierit. Cadavere in casu tani rari causam relegendam aperto, vidimus tuberculum in parte œsophagi media eo latere quo trachæa arteriæ adjacet situm, non equidem admodum magnum sed quod in cancrum quid jam abierat, lividum enim atque etiam saniosum, varicosissimè vasis refertum apparebat. Unde satis constitit non tantum tumoris corpore viam impeditam fuisse, sed etiam succo sliptico inde continuo quasi transudante œsophagum eâ parte contractum non parum alimento transgressuro, obstitisse. Similem propè historiam proponit Clariss. Willis Pharmaceutices rationalis parte prima sect. 3. cap. 3. his verbis. Vir robustus, & aliter satis sanus, à longo tempore vomitu crebro laborans, comesta quæque sæpius, etsi non semper, mox rejicere solebat: Tandem victis omnibus remediis morbus in eum statum devenit, ut valde esuriens comederet ille, donec œsophagus ad gulam usque impleteretur, dein nihilo in ventriculum illabente, ingesta quæque cruda regereret; Cum pharmacis nihil juvantibus præ fame summè elanguesceret, & prope diem interire periclitaretur, instrumentum ei instar virgulæ, e pinna cetacea, cum spongiæ fibula apici ejus affixa parabam; hoc ægrotans statim à cibo & potu assumptis gutturi, unaque œsophago immittens, alimenta secus reitagnantia in ventriculum, orificio ejus referato, detrudebat: atque hujus ope per sedecim annos pabulum quotidie sumit: eademque adhuc machina utitur, & etiamnum vivit valetque, secus inedia periturus. Procul dubio in hoc casu os stomachi, sive à tumore, sive à paralyti semper occlusum, nihil, nisi violenter referetur, ut ventriculum admittit.

### DE LIQVIVM ANIMI.

Vid.

### CORDIS MORBI.

DE-



## DELIRIUM &amp; PHRENITIS.

**D**E Hisce morbis uno & eodem capite agimus ob maximam affinitatem, propter quam etiam de iis simul, atque uno capite scribit Clar. Willisus, quod integrum mox jam adducimus, sic itaque inae.

## De Delirio &amp; Phrenitide.

Haftenus de morbis cephalicis, à quibus functiones animales per se, & quatenus corporeae sunt, sine respectu ad animam rationalem inuheri, aut perverti solent: In quibusdam ex illis; scilicet *vertigine*, & *Paralytice*. Et plerumque clarus, & vegetus perit, atque in ceteris, tanquam oculius in obscuro loco positus, species aut plane nulas, aut paucas tantum *phantasmata* rudiori objectas inuenit; in errore vero magnum, aut *furor* non facile rapiunt; cuiusmodi symptomata, propter alia, & *phantasmata* usque spirituum inordinata affectione, de quibus modo agendum erit, passim inducuntur. Nam si quando *imaginatione* perturbatur, aut pervertitur, ut species, & notiones à sensu vel memoria oblatas, aut perpetui concipiat, u. m. le componat, vel diuà & propterea statim *collecta* conceptus, & non tam tantum deformia, & inuicem distracta, & u. de commutata u. u. u. aut effingit: quae quidem illi à cerebro male affecto velut *phantasmata* à speculo variegato, & distorto repraesentantur. Cum plures sint modi, quibus *imaginatione*, & per consequens *mens* & *voluntas*, aliaque operantis à mente potentiae, perverti, aut depravari solent, ita omnes communi de *sapientia* uoc. buio magniuntur. Haec autem *affectio* distinguitur in *breviorem*, quae *delirium* appellatur; ac *longiorem* seu continuam, quae aut febre conjuncta est, & dicitur *Phrenitis*, vel sine febre contingit, eaque aut *rabies*, aut *tristitia*, aut *stupiditas* adiungitur, proindeque in *mania*, *melancholia*, & *phrenia* dividitur: de singulis hisce ordine dicemus ac in praesenti de *Delirio*, & *Phrenitide*.

Et *delirium* non per se *mors*; sed tantum *symptoma* est, ab aliis artibus procedens, quomodo uero in normam, quibus superuenit, inuoluit, illi per remedia appropriata plerumque o. c. u. solet, incerto ex e. ore tractat in *mutare* & *cure* ejus paulo strictius inquirere. Vocatum autem illud *speciè* si nolo sumptum id in est quod *delirium*, & denotat ejusmodi functionis animalis *affectionem* qualis in *paroxysmo* *febris*, ebricitat, & quandoque in *passionibus* diutius *extrema* exorta, homines ut ad breue tempus à *sensu* cogitent, loquantur, aut agant (*phantasmata* uocant *mentis*, aut simul omnia) inducit.

*Delirium* excitatur in quantum spiritus animales aut nimis irritati, aut in confusionem acti, huc, illuc intra gloriosam cerebri compagem (ubi *phantasmata* in *memoria* sedes habent) *inordinatè* & tumultuose feruntur; ita namque dum variae *phantasmata* & *memoriae* species simul excitantur, inuicem conuaduntur; *phantasmata* tantum absurdè, & incongrua *animae rationalis* obijciuntur, & proinde tam intellectus, tum

*voluntas* actus solummodo inordinatè eliciuntur. Ob spiritus animales intra cerebri *modum*, u. e. corpus *callosum* irregulariter commotos, ut anima rationali conceptus incongrui, & uocata confusa obijciuntur, pariter contingit, ac cum à diuturna corporis circumgyratione uisibilium species interuntur *sensui communi*, unde omnia circumagi, modo in alterum eleuari, modo in in unum deprimi videntur; ut nihil stabile, & consistens, in debito situ, ac positione conipiciatur. In cerebro rectè disposito, spirituum animalium motus, certis quasi numeris, & modis, velut in tripudio peragitur; dum spiritus quidam in his tractibus iusculantur, alii in illis quiescunt, deinde illi in motu succenturitur, & singuli cujusque facultatis actus, quasi totidem in nauio aquarum undulationes distinctè fiunt; verum in *delirio* spiritus simul omnes exiliunt, & sibi inuicem tumultuose occurrentes, aut se variè proripientes, uent choreas bacchantium agunt: Porro quemadmodum hic intra cerebri compagem, tali castris perciti, cogitationes multiplices, & valde perturbatas cient; ita dum extra hujus continia in *originem nervorum* feruntur, loquelam incongruam, corporis, & membrorum gestus absurdos, & non raro motus convulsivos produciunt. Siqui dem verò talis spirituum orgasmus (secus ac in *Phrenesi*, aut *Mania*) ita tim deservescit, & è tumultu illorum peractio nulli tractus deu in cerebro cuditur, *delirium* cito, pertransit, & affecti mox iterum animo constant, sine relictis *desipientiae* vestigiis.

Quod si inquiritur, unde hic *furor brevis* spiritibus cerebri incolis imprimatur, ut excussis *animi* habenis, ita in *oeconomia* sua omnia susque deque habeant; dicimus eos *duplici ratione* hujusmodi inordinationem concipere; nempe autem hoc aut e *sanguine* cerebri compagem perluente iis immediate confertur; aut *spiritus* quidam animales exterius, intra *nervorum* genus degente, *affectione* quandam primò inuenit; deinde eadem cerebro per ductus nervos communicata, spiritus ibidem hospitantes pariter afficiunt; in *delirium* ciet. Utriusque horum variae sunt *species*, & *causae*; quorum praecipuas hic breuiter attingemus: & primò ostendetur, quomodo, & ob quas *affectione sanguis*, aut nimia effervescencia tumidus, aut materia venenata pragnans, quatenus vel particulas efferas & indomitas, vel magnas, & regimini animali infestas cerebri poris, & meatibus insinuat, *Delirii* parens existit.

1. Quod prius in *febrim* intermittentium paroxysmis & continuarum *affectione* sanguis incendio immodico effervescens interdum mero ebullitionis suae impetu *delirium* concitat; in quantum scilicet iste plurimum turgescens, dum exiles arteriarum propagines, per cerebri exteriorem ambitum ubique diffusas pertransit, eas valde indat, & distendit; proindeque cerebri substantiam comprimens, spiritus variè impellit, & quasi in turbas valde confusas cogit: Porro e *sanguine* cum spumosa rarefactione ita turgescente, caloris effluvia, cumque iis particulis heterogeneis cerebri poros & meatus iubeuntia, spiritus exagitant, & huc, illuc tumultuarie corripunt.

2. Propter similem serè huic rationem, *phrenia*



aut altum soporem, aut delirium infert; in quantum scilicet, massa sanguinea, spirituosas vias particulas (a quibus effervescit) in cerebri poros, & meatus insinuat, a quibus spiritus in iis hospites, aut plane obruuntur, aut in motus inordinatos, & confusos aguntur. Quippe indomita vini aut cervisie uberius epotæ corpulcula, cerebri cujusvis utut firmi, & sani claustra referant, atque altius in ductus medullares penetrant, & rationis & imaginationis actus perturbant, & plane evertunt.

3. Nec tantum sanguis particulas febriles & turgidas, aut vinosas, & indomitas, sed interdum malignas, & quasi venenosas regimini animali suggerens, cum, vel sine febre delirium ciet. Quoad prius in peste, variolis, febribus malignis (etiam si color moderatè habeat) materies maligna ad cerebrum translata, quatenus spirituum copias dissipat (potius quam quod eos in tumultus adigit) notiones abruptas; incoherentes, & tandem distractas parit.

Ob parem huic rationem toxica quædam & venena intus sumpta, ac (uti nonnulli asserunt) exterius applicata delirium citò accersunt. Hoc de solano furioso, mandragora, & plantis quibusdam aliis, vulgo fertur; de radicibus passinacæ silvestris res notissima habetur. Narrabat mihi quondam amicus intus, & vir fide dignus, perinde ac doctissimus, se generosi cujusdam ædes intrasse, ubi mater familias, filia & ancillæ omnes (unica excepta) simul delira tæta, incongrua & absurda loquentes, & saltantes per domum discurrebant; cum illas plane sympharæ suspicaretur, didicit ex puella seria, cui niens & ratio constabant, totum illud a comestione radicum passinacæ, quas ipsa tantum non gustaverat, contigisse. Id quod etiam eventus comprobavit; nam postquam delassata somno indulerant, omnes demum sobriæ evigilabant. Utrum hæc, & alia ejusmodi toxica regimini animali potius, quam virali infesta labem suam aut tantum sanguinis commeatu, aut etiam aliquatenus spirituum in ventriculo residentium contactu, cerebro communicant, non otium erit hic disquirere.

Verum insuper advertimus, delirium a spirituum animalium inopia, & dissipatione magna nonnunquam excitari; quippe illorum series abrupta, & ab invicem distracta, non secus ac tumultuariè conglobata, notiones confusas, & incongruas suggerunt. Hinc observare est, quosdam a magnis hæmorrhagiis, aut longis vigiliis, & diuturna inedia delirare: propter hanc rationem plures moribundi delirè & incongrue loqui solent.

Restat altera delirii species, in qua sanguine & forte spiritus animales, alicubi in nervoso genere scatentes, primo alacrii subeunt; dein eadem affectio per ductus nerveos ad cerebrum perrepta, spiritus medullæ eius incolæ in delirium ciet. Hoc satis obvium est in passionibus, quæ dicuntur hysterica; nempe post ventris intumesceniam, & cordis oppressionem, demum modò æmulationem, modò fabulationem absurdam, cum metu & risu succedere: ita iter in Colica utroci observavi interdum immanes circa viscera aut lumbos cruciatus, mox delirium cessisse, dein paulo postea hoc cessante, tormina rediisse. Novi puellam quæ (prout alibi memoravimus) ab assumpto pharmaco emetico, donec ope-

raretur, constanter delirare solebat. Huc etiam facit quod sæpius adverto à Gangrena in membro quodam externo incipiente delirium accieri: Atque hoc pro signo lethali, in vulnere, aut ulcere passim habetur; quia denotat spiritus animales in parte affecta interfectioni dato.

Nec meliorem prognosin symptoma istud diu in valetudine trahit, ac pene attritis superveniens exhibet, in febrium intermittentium paroxysmis, sere semper tutum est, in continuis vero dubii & nonnihil suspecti eventus, in malignis sæpius malum ominatur; in morbis convulsivis primi Delirii insultus ut plurimum periculo vacant, attamen ejus frequens accessio, diathesin in Carum Apoplexiam, aut paralyseos non raro parit.

Hæc affectio, quoties satis tota videtur, curationem non exigit: nam paroxysmus citò ac facile pertransit: Attamen quia nonnulli, quibus cerebrum imbecillius & laxum est, atque spiritus animales nimis dissipabiles, in fugam, & confusionem apti sunt, de levi quavis occasione perturbati, statim delirè agere, aut loqui solent; idcirco his medicina opus est, non Hellevoro tamen, sed remediis cephalicis, quæ cerebrum corroborent, & contra materiem morbificam incursum muniant, item quæ spiritus animales fortificent, eosque fixiores & ad resistendum fortiores reddant. Hujusmodi medicamentum (cum ad morbi cujusque alterius cephalici procatarxin tollendam utilis sunt) formulae & administrationum modos superius descripsimus.

De iriam febribus continuis & malignis superveniens, peculiarem medendi rationem postulat: Namque imprimis indicat materiem morbificam versus caput periculosè translata, exinde quoquo modo revelli debere; in quem finem veficatoria cervici, emplastra, aut cataplasmata, aut animalium carnes aut viscera calentia pedibus admoventur; intus cephalica temperata, uti pulveres e corallis & margaritis, aqua Cerasor. nigr. flor. Paralyseos, papaveris, aliaque spiritus refocillantia, ac demulcentia, propinantur.

His ita præmissis circa primum, & levissimum desipientie modum, ad gradum ejus altiorem, sc. phrenitidem, quæ priori affectu longe major, & durabilior est, ascendamus. In Delirio, spirituum cerebri incolarum perturbatio, velut aquarum in fluvio à lapide injecto undulatio excitata, verum in phrenesi illorum commotio, quasi fluctuum a turbine insanientium æstus videtur.

Phrenitis definitur, quod sit desipientia continua, seu principum cerebri facultatum depravatio, ab inflammatione meningum orta, cum febre synocha. Huic morbo alter affinis, sc. paraphrenitis vulgo accensetur ejusque causa non membranarum quæ *synispha* regunt, sed cyaphraginitis inflammatione statuitur. Poitò in utroque affectu (uti etiam in pleuritide, sed perperam) febris quasi tantum esset symptomatice, ab eadem causa conjuncta, sc. partis eius phlegmone exoriri perhibetur. Verum enim verò phrenesin potius febre succedere, & quia sanguis effervescens recrementa sua dusta e pituita transfert, produci, Hippoc. olim, vult quicquid vel e plebe observat, in quantum se febricitantis urina, à turbida, & crassa, in tenuem, & aquosam mutata, *phrenesin* innotuit.



imminentem indicat: cuius idcirco affectus causa exinde colligitur esse, materiæ febrilis in cerebrum metallatis:

Quod autem spectat, ad Phrenitidis, & paraphrenitidis causas conjunctas, facile erit ostendere, illam non semper à meningum, & hanc non omnino à septi inflammatione procedere. In dissectionibus Anatomicis sæpius vidi meningas, immò nonnunquam, & cerebri exteriorum ambitum tumore phlegmonodei obseſas, atqui laborantes minime phrenitis: verum è contra torpore affecti, à Caro, aliſve morbis soporosis interibunt. Et quidem rem ita habere ratio planè dictitat; nam meningis inflammata, eoque magis tumida, cerebrum valde compriment, & circa ambitum ejus spirituum ductus & vias occludent: proinde ut vigilæ, & memoriæ functionibus impeditis Lethargus (uti de facto liquet) necessario sequatur: Attramen longò secus in phrenesi, cerebri meatus, & pori omnes pro spirituum excursibus amplo ninis patere videntur, in quantum sc. ex ultimis, simulq; omnibus memoriæ Thecis species recondita una suscitantur quæ, libinet invicem aliſque à phantasia & sensorio communi tumultuarie suggestis occurrentes rationes adeò multiplices, & maximè confusas pariunt. Tantum animæ abest sensitivæ intra *meningum* expansionem (quam certe *meningum* inflammatione efficeret) angustari, ut potius supra modum dilatari, & cerebri poris omnibus reſeratis, ultra solitum ambitum efferri videatur. Eveniat forſan à diuturna illius morbi mora sanguinem intra *meningum* vaſa copioſius aggeſtum, ibidemque ſtagnantem, demum in iis *phlegmonem* parere, sed tunc propter ea ſuſpicamur (quoniam ita cerebrò aſſolet) *phrenitida* in *Carum* aut *Lethargum* transire, à quibus nuntium Phrenitici cerebrò emoriuntur.

Nec minus rejicimus *Diaphragmatis* inflammationem, quam *Paraphrenitidis* causam *Galen.* olim, ejusque autoritate moti plerique in omni deinceps ævo Medici assignarunt: *Observationes Anatomica* hujus oppositum plane evincunt. Olim puellæ leipothymia subita interemptæ cadaver diſſecantes, in carnosa *Diaphragmatis* parte abſceſſum magnum cum cysti ſanie & vesiculis aëquolis impleta, reperimus; nec tamen unquam illa delirio aut phrenitide tentari solebat. Quondam item viri *Illustri Academici* (cujus in nupero tractatu mentio facta est) à *Pleuritide spuria*, & diuturna defuncti cum *Anatomen* faceremus, manifesto liquebat abſceſſum magnum in *Pleura & musculis* intercostalibus suppuratum, ac interius disruptum, puris copiam ingentem in Thoracis cavitatem profudiſſe, quod *Diaphragma* subſtratum corrodens ingens in eo foramen excuderat; nec tamen hic in tota ægritudine sua phreneticus, aut animo delirans fuit. Quapropter hunc affectum vix unquam à tali causa produci arbitror: verum opinio isthæc inde nata videtur, quod sæpenumero in vera *Phrenitide* una cum desipientia continua *Diaphragmatis* motus impediri aut perverti solet; uti colligere est ex respiratione inæquali & difficili, sc. modò anhela, & quasi suspensa modò crebra & celeriter repetita cum inspiratione interdum duplicata; cujuſmodi ſymptomata, simulque mentis alienatio, dicuntur à septo inflammato, & propterea convulſo procedere; quàmobrem Anti-

quiores *Diaphragma* *phrenitis* appellabant: verum illis non opus fuerat, si conſideraſſent, *Diaphragmatis* actionem omnem à spirituum animalium è cerebello effluxu pendere, & propterea necelle, esse ſi materia phrenetica cerebrum invadente, quædam pars ejus una in cerebellum irruet, ut præter desipientiam, inſuper ſepit, ex ſe licet inſontis motus alteretur, prout alibi ſuſius oſtendimus.

Itaque *Phrenitidis* ratio formalis in eo conſiſtere videtur, quod ſpiritus animales, imprimis in toto cerebro, plurimè irritati, in motus inordinatos, & valde conſuſos, ſimulque impetuoſos adiguntur; proinde ut functionis cujuſque animales actus depraventur, & varie pervertantur: rerum Ideæ ſimul plurimæ, è memoria ſuſcitata, veteres cum novis, aliæque aliis malè conjunctæ, aut diſſæ mire confundantur; phantasmata multiplicia, & penè innumera, eaque tantum incongrua, imaginatio ſuggerat; ſenſibilium ſpecies diſtortas, duplicatas, aut incoherentes ſenſorium commune repræſentet; hinc ut mens & voluntas conceptus, & paſſiones non niſi ridiculas, & impertinentes eliciant, atque corporis actiones ſere tantum irregulares edi faciant. Porro non tantum in cerebro, ſed etiam in cerebello, & ubique in nervoſo genere ſpiritus, velut æſtro perciti, tumultuantur; quare phrenitici non ſolum delirè loquuntur, ſed inæqualiter reſpirant, vociferantur, pugnos cædunt, manus, & pedes jactant, quin & membra quæque viribus intentis cumque impetu validiſſimo exerunt; revera ut tota videatur anima in toto corpore furioſa excandescere, & debacchari, ſeu potius velut incendio correpta inflammari. Et quidem *Phrenitis* nullo modo aptius definiiri poteſt, quam quod ſit *totius anime ſenſitiva*, ſive *ſpiritus animalium* quoad totam eorum hypochreſin phlogos ſive inflammatione. Incendium hoc à ſpiritibus cerebri incolis ſemper incipiens, & exinde in reliquas animæ ſenſitivæ partes emigrans à ſanguine, igne febrili prius aſſuante, tum materiem primo incendentiam, tum conſtans incendii pabulum accipere videtur. Enimvero probabile eſt ſanguinem febriliter ardeſcentem, particulas interdum ſulphureas una cum ſpirituosis cerebro offundere, quæ ſemiaccenſæ, & quodammodo efflagrantes, ſi una cum alteris penetrarint, exinde mox omnes ductus medullares, & nervos ſubeuntes, ſpiritibus ubique adhærent, eoſque adeò inflammatos ſumme efferos, & in placabiles reddunt. Certè veriſimilius eſt, *Phrenitiden* hoc ritu à *ſpiritus animalium* phlogos potius quàm à *meningum* aut *cerebri* inflammatione, quæ *Cephalæam*, aut *Lethargum*, certius quàm furorem (prout ex crebris *Anatomie* compertum habui) inferrent, excitari.

Et quidem ita fieri haud noſtra tantum aut nova proſus opinio eſt, verum Hippocratis præcipuus ille ſectator & interpres optimus, Proſper Martianus, idem expreſſis ſerè verbis ſtatuit; videlicet comment. in lib. de morbis 3. verſ. 99. pag. 151. dicit Hippocratem vocare *phrenitin*, delirium cum febre, quod continuum eſt, & à ſirma & ſtabili affectione dependet, viz. ab inflammatione earum partium qua natura inſtituto, & rationi, & menti inſerviunt; Ita enim ſpiritus animales, quorum vitio deliria ſiunt, non ſimplied qualitate, quatenus incaleſcunt, ſed etiam ſecundum ſubſtantiæ alterantur. Hic maniſeſto diſtinguit inter



inter calorem & flammam, atque istum respectu qualitatis, & hanc respectu substantiæ alterationem esse statuens, Phrenitis causam spirituum inflammationi planè ascribit. In eodem loco plura habet ad rem nostram maxime apposita, nempe quod Phreneseos causa continens fuerit, non meningum, sed spirituum inflammatio, quorum substantia siquidem alteratur, hoc est, quandoquidem ignea facta est, delirium adeo continuum excitatur.

*Spiruum* à sanguine in cerebro productionem, destillationi chymicæ sapius comparavi: De qua observare est, si liquor spirituo-sulphureus igne nimis intenso urgeatur, cum inter extillandum quandoque ignem concipere, ac efflagrantem cum flamma aperta in Alembicum ascendere. Hoc de oleo Terebinthinæ per se, aut cum floribus sulphureis ebulliente quibusdam in gno suo, damnosus innotuit. Pariter opinari licet; sanguinem intensius ardescientem etiam spiritus de se extillatis non raro incendium communicare, sc. particulas quasdam seminadustas cerebri poris insinuare, quæ in spirituum ductus omnes, tum ibidem, tum in appendice ejus irruente, spiritus ubique accendunt, atque in motus perniciosissimos, ac velut fulguratos cogunt.

Quod autem febribus non omnibus, nec tantum maxime ardentibus, Phrenitis superveniat, rationes ex sequentibus patebunt: Nempe, cerebri claustra in tantum obserata esse debent, ut non modò iis nihil extraneum suffundatur, sed nec sanguinis, ut ut summè flagrantis, & circumcirca consiti, flamma intensior ea perrumpere valeat; quare nonnullis febre causo affectis, etsi cruor totus ardescit, torrentur viscera, æstuant medullæ, lingua & fauces velut à carbone vivo assantur, usque tamen cerebro firmiter occluso functiones animales satis recte perstant. Verum è contra alii, quibus cerebrum debilius, & nimis laxum est, atque sanguis plus debito sulphureus, non tantum à febre ardente, sed interdum à mitiori visa phrenetici evadunt. Propter qualem procataxin, & ob quas *prophasi* sive causas evidentes, hoc fieri solet, jam proxime inquiremus.

Ostenso igitur phreneseos subiectum immediatum esse animam sensitivam, sive spirituum animalium hypostasim, & morbi rationem formalem in illorum inflammatione consistere, atque causam conjunctam esse particulas sulphureas à sanguine, in cerebri claustra suffusas, ibidemque spiritus continenter accendentes; quod modo incumbit non difficile erit causas ejus procataxeticas assignare quas partim in sanguine, partimque in cerebro ac incolis ejus inveniemus.

*Sanguinis* prævia diathesis ad Phrenesin disponens modo simplex, modò duplicata existit; prior est constitutio ejus calida & acris, sive biliosa, nempe quod plurimas in se particulas sulphureas contineat, quæ plus debito in febre accensæ sanguinem magis efflagrare, atque incendium suum cerebro insinuare aptæ sunt. Dispositio hæc, quando potens & summè actvata fuerit, morbum istum per se non raro producit; plerumque verò subest altera sanguinis diathesis quæ priorem adjuvat, & magis efficacem reddit, nempe quod præter particulas sulphureas, & inflammabiles, adsint aliæ asperæ, & penetrativæ,

quæ videlicet subeunt, & aperiunt, adeoque priores facilius introducunt. Hoc corpuscula salina sulphureis conjuncta quodammodo efficiunt; hinc biliosi & melancholici feblicitantes in tutores sunt magis proclives; Atamen longe potius particula heterogenea cum sanguine sunt, à febre commota, cerebri ostia aperiunt, & inflammabiles quasque intronittunt: Quapropter variolis & febribus malignis, ac pestilentibus Phrenesis cerebro supervenit.

*Aliter*, qui cerebri est apparatus ad Phrenesin partim in istius temperie, & conformatione, partimque in spirituum incolarum indole constituit: Quoad prius; cerebro calido & sicco præditi in Phrenesin maxime proclives reperiuntur; non quod ea constitutio inflammationi sive phlegmoni magis obnoxia sit, (nam ad hanc minus apta est) sed quoniam in tali cerebro, secus ac in calido ac humido, vel frigido & sicco, pori, & meatus apertiores sunt, & nimis dehiscences materiæ incentivæ à febre suggestæ aditum præbent: Quæ insuper nullo facilius admittentur, si spiritus admodum fugaces, & pathetici, levi quavis occasione in tristitiæ, timoris, iræ, aut odii passiones apti fuerint; proinde ut materiæ extraneæ incurribus minus obsistant, ipsique incendium proprius concipiant.

Phreneseos causæ evidentes, aut remotiores sunt, sc. quæcunque res intemperiem febrilem excitare solent; uti crapula, ebrietas, corporis, aut animi perturbatio vehementior, evacuationes solennes suppressæ, cum multis aliis; aut proximæ, uti febris, ejusque appendicula & adjunctæ; nempe si ea pestilens, maligna, aut mali moris erit, si propter crapulam a cibis aut potu maxime incongruis orietur, vel passionibus violentis, amoris, odii, invidiæ, indignationis, aut tristitiæ, aut studiis immodicis succendet: Hujusmodi etenim *prophasi* & sanguinem, & spiritus animales febriliter æstuant ad affectionem phreneticam valde propensos reddunt.

Quandoquidem hic morbus ab anima potius & immediatius quam ab humoribus aut partibus solidis, affectis dependet, species & differentia ejus nec varix, nec multiplices erunt: Respectu magnitudinis Phrenesis intensa aut mediocris, it. continua vel intermittens est, nempe juxta quod spiritus animales plus aut minus inflammantur, atque incendii sui pabulum à sanguine continenter, vel per vices accipiunt. Secundo prout incendium vel à cerebro tantum, vel ab hoc simul & cerebello incipit, vulgo in Phrenitidem & Paraphrenitidem distinguitur; quod tantundem est, ac functiones animales spontaneas ferè tantum, & potissimum, aut una cum his etiam vitales lædi. Cæterum hic morbus quoad febrem, cui appenditur, naturam & morem, malignus, aut malignitatis expers; etiā pro ratione temperamentum ægrotantis Phrenitis in sanguineam, biliosam, pituitam, aut melancholicam distinguitur; atque hoc non improprie, namque spirit. animales juxta varias ipsorum indoles, diversimodè ab hoc morbo excandescere solent.

*Prognosis* in hoc morbo semper dubia est, & cum mali eventus suspitione instituenda est: Nam Phrenitis ex se (ut inquit Trallianus) *non est letalis* & *modica* sed deinde si febris pestilenti malignæ, aut quæ mali moris est superveniet, exitum



exitum non nisi funestum expectare licebit.

Si *Phrenitis* corpori sano, *iuvēni*, temperamento sanguineo, ac in ætate juvenili, contigerit salutis spes major erit, quam si ægrotans an-nosior, macilentus, biliosus; & passionibus violentis obnoxius fuerit.

Si *Phrenesis* crebra vice remittens, lucida intervalla habet; melius est, quam si furor sit indifcontinuus: Sin ægroti interdum melius habere vili, post somnos moderatos furiosi semper evigilant, indicium est morbum pertinacem, & proinde periculosum fore; inquantum scil. novus materia incentive penus lubinde cerebro suggeritur, quod quidem in somno longè uberius quam in vigilia fieri, alibi ostendimus.

*Phrenitis*, aut brevi tempore in salutem, aut mortem, cum febre terminatur; aut diu protrahitur, & post febrē superstes, demum vel sanatur, vel in alios morbos, nempe aut *Lethargum*, aut *Maniam*, aut *Melancholiam* transit.

Si febris crisis laudabilem per sudorem, aut urinam copiosam habens, integre solvetur, plerumque etiam *Phrenitis* prius cessabit: Sin febris minime judicata materiam usque morbificam *in* iugeret, adeo ut præter functiones animales depravitas, vitales fatiscere incipiant, (quod ex pulsu, & respiratione in pectus aiteratis liquebit) si urina sit pallida, si crebra sanguinis e nare stillicidii, si vomitus, & convulsiones evenient, mortem in propinquo esse medicus concludat.

Interdum febris etsi non semel; & integre judicatur, postea tamen sensim, ac lente transiens, *Phrenesis*, sive desipientiam superstitem relinquit; quæ si nondum morā suā spirituum in cerebro tractus priores oblitteravit, deinceps aut sponte paulatim desinit, aut remediorum ope sanatur.

Quod si ob *Phrenesin* diutius protractam, meningis, aut cerebri cortex a sanguine, aut sero ibidem aggesto, & stagnante, demum tumore phlegmonodei aut illuvie serosā occupatur, lethargus aut morbi soporosi succedunt, quorum curatio sæpè difficilis, aut nulla est à longā *Phrenesi* aut spiritus animales (eorum incendio licet cessante) indolem vitiōsam contrahunt, aut cerebri meatus & pori pervertantur, desipientia non rarò perpetua (morbo priore in maniam, aut melancholiam, aut *papaveris* transiente) non rarò succedit. Quare vulgo dicitur *Phrenitis* non citò curatis, cerebrum fractum esse, proinde ut semper insaniant, aut delirent.

In *Phrenitidis* curatione respicere oportet unā febrē & furorem sanguinis incendium febrile, sive effervescētia immodica, quæ plerumque alterius effectus causa antecedens est, imprimis compesci, & sedari, simulque spiritus animales mulceri, & excandescētia quavis immani liberari debent. Si *Phrenitis* circa febris-initium, aut medium contingit, eadem ferè remedia, & medendi methodus in utrumque finem conducunt: Sin vero ille affectus huic, dum in statu, aut *papaveris* est, superveniat, sanandi rationes sæpè mutuo repugnant; & summa cautione opus est ne, dum uni morbo occurrimus, alterum augeamus; in hoc indicatio vitalis circa vires conservandas primum locum obtinet, atque sanguinis missio, aut purgatio non temere, & copiosè celebrentur.

In priori casu, cum febris, & *Phrenesis* ferè *in* sunt phlebotomia, raro aut nunquam omittenda, statim adhibeatur, & si vires ferent, postea aliquoties iteretur: Nihil enim æque ac remedium sanguinis flammam immodicam deprimat, ac diminuit, nihilque incendium ejus è regimine animali magis avertit, aut revocat: Quapropter si res exigat, vena modò in brachio, aut manu, modo in crure aut pede, modò in cervice, vel fronte aperiatur: quandoque forsitan expediat arteriam temporalem pertundi; qui etiam ex aliis locis per hirudines nonnunquam aut cucurbitulas sanguinem detrahi: Hoc enim potissimum auxilium, juxta Galenum; *in* plurimas in *Phrenesi* indicationes explere solet.

Ceterum ad præcavendos materię febrilis è visceribus in caput raptus enemata præcipui erunt usus; quibus, si opus fuerit, alvus continue lubrica servetur vomitoria, & cathartica nui tantum lenitiva rarius hic locum habent. Cataplasma ex Ruta, chamomelo, Verbena, rad. Bryoniz floru in Papaveris erratici, cum sapone totis pedibus admoveantur; vel eorum loco columbæ, & pulli dum calent discissi applicentur; interim Julapia, Apozemata, pulveres confectio, à quibus tum sanguinis ætus, tum spirituum excandescētia sedetur, pro re nata præscribi debent.

℞. Aqu. l. omorum, Cerasorum nigrorum, Paralyseos an. ʒ. iv. Citri totius ʒ. ij. Margarit. pulv. ʒj. Syrupi è succo citri ʒ. j. Misce f. Julapium, sumantur ʒ. iij. ter vel quater in die.

℞. Rad. Graminis, foliorum Liniulæ, Pimpinell. an. M. j. hordei ʒ. ʒ. Pomum inc. f. uvarum Corinthiacarum, vel tragorum, aut fructuum rubi l. dei M. j. coquantur in aq. font. lib. iv. ad tertiz partis consumptionem. Colaturæ clarificatæ adde syrupi violacei ʒ. j. salis punellæ ʒ. ss.

℞. Foliorum Borag. recentium, & teneriorum M. iv. l. iululæ M. ij. duo poma curtispendula, salis prunellæ ʒ. ij. pulsam unius Auranti, sacchari albi. ʒ. j. simul contusis affund. aq. font. lib. i. vel ʒ. f. expressio fortis, servetur in vitro per subidentem m. depuranda; capiat ʒ. vi. vel vii. ad libitum sapius in die. Pro siti restinguenda bibat Palmeri potum divinum, scil. aq. fontanæ cum saccharo, & succo limonii, vel aquam, aut serum lactis cum foliis ulmariz, aut pimpinellæ infusis, aut decoctis, emulsiones ex decocto rad. & floru nymphæ, cum sem. Melonum, vel aq. fontanam aut destill. cum pulpa pomorum coctorum dissoluta.

*Hypnotica* in hoc morbo sæpè necessaria sunt, fortiora tamen hand statim ab initio conveniunt, nec crebro in usu sint; quia somnus opiatu inductus, plus materiam morbificam cerebro ingerit, eamque illic penitus infigit.

℞. Aq. flor. Paralyseos ʒ. iv. Syrupi de Macconio ʒ. ʒ. Margarit. ʒ. j. f. haustus sumendus sera nocte.

℞. Sem. papaveris albi ʒ. ij. Sacchari caudli ʒ. ʒ. simul contusis affund. aq. papaveris albi ʒ. vi. f. expressio sumenda eodem modo.

*Narcotica*, quæ ex merè frigidis constant, caute exhibeantur; quia nonnullis, quorum stomachi fibras valde teneras & sensiles habent, minus conveniunt. Sæpius observavi hujusmodi hypnotica magnam in ventriculo oppressionem exci-



excitasse, dein statim inflationem ejus, & paulo postea spirituum in cerebro, imo in toto corpore distractiones, & inordinationes insequentas fuisse; proinde ut non tantum somni frustratio, sed maxima inquietudo ciceretur.

℞. Laudani liquido, cum sale Tartari, aut succo Cydoniorum parati. Dosis in convenienti liquore propinetur.

Quæ somnum, invitant etiam epithemata temporibus, fronti, & syncipiti sæpe cum fructu adhibentur; cuiusmodi sunt oxyrrhodinum, embrocatio ex aqua vel lacte linimenta ex oleo nucis moschat. per express. & unguento populeo; cui interdum opii gr. v. vel vi. adjiciantur: aut placenta rosacea, vel florum papaveris cum aceto, & nuce moschat. &c. Porro in hunc finem, potius quam ad tollendam meningis inflammationem, agni, aut vervecis pulmones calentes, item columbæ vel pulli diicissi opem non raro egregiam præstant. In hunc usum sedum majus contusum, & cum lacte muliebri mixtum, & syncipiti raso applicatum mire laudetur, item Venoti epithem. ex moschi. gr. 12. Camphoræ ℞ss. & aq. rosaceæ tinctura sunt. rubri imprægnat. ʒxxx. à nonnullis commendatur.

Porro non tantum capiti, sed etiam cordi, hepati, aliisque partibus epithemata adhiberi solent: Sacculus ex syndone cum speciebus cardiacis interpassatim cum bombyce insutus atque aq. destill. vel aceto rosaceo irrigatus, præcordiis applicetur; Item lintea aceto rosaceo madida imponantur testibus: Pedes decocto foliorum salicis, lactucæ, capitum papaveris albi balneentur. Hujusmodi autem topica infri-gidantia tantum & demulcentia, circa morbi principium usurpentur; in statu verò his resolventia, & emollientia, uti sunt flores chamomeli, meliloti, sambuci, &c. Item folia malvæ, atriplicis, majoranæ, hyssopi, & similia adjiciantur; in morbi declinatione resolventia tantum, atque ea parvis adhibeantur.

Interea virium maxima ratio haberi debet, namque his nimium labefactis, curationis spes omnis deperditur. Vires autem cito atteri solent, propter magnas vigilias, animi, & corporis agitationes perpetuas, victum tenuem, & phlebotomiam quandoque sæpius requisitam. Quapropter sedulo cavendum est, ne dum cathartici, aut crebriori sanguinis missione morbum eradica-re facessimus, functionem vitalem subito debilemus: si hæc vacillare incipiet, neglecta phrenesi, & victu magis iuxta concessio, cardiacis præcipue utendum erit.

℞. Tincturæ coralliorum ʒss. sumantur gr. 20. bis vel ter in die cum dosi Julapii cephalici, aut cardiaci, vel detur solutio coralliorum lactescens cum succo Aurantii facta ad cochl. j. sæpius in die.

℞. Rob. vel conservæ rubi Idei, oxyacanthæ ʒj. Margarit. præ. Magisterii e coralliis an. ʒj. Confect. de hyacintho ʒij. Syrupi de succo chermes q. s. f. confectio, sumat quantitatem nucis moschatæ, ter vel quater in die superbibendo Julapii sequentis ʒiij.

℞. Aq. florum Nymphææ, rosar. rubr. solior. ulmariz, an. ʒij. Syrupi e coralliis ʒij. Aq. cordialis Saxoniz ʒj. Misce.

℞. Conservæ florum Nymphææ, violarum

an. ʒj. caulium lactucæ condit. ʒss. pul. coralli rubri in marmore cum succo Aurant. triti & exsiccat. ʒij. Specier. diamargarit. frigid. ʒj. sem. papaveris albi ʒi. cum q. s. Syrupi de succo lunulæ, f. electuarius, sumat. quant. nucis moschat. sæpius in die.

In Phrenesi non tantum alvus, sed & vesica officii sui immemor, cerebro sollicitaria, ut etiam irritari debet.

Quapropter Agrotantes monendi, & matulæ oblata rogandi sunt, ut urinam reddant; cui si non obtemperant, regio pubis decocto parietariz, flor. sambuci & seminum apii, & Danci cum spongia foveatur, & post totum oleo scorpionum, & unguent. Dialtheæ illinatur: in longa urinz suppressione candellam ceream urentem immittere oportet.

Phreneticorum historia, & casus tam multi, ac diversimodi ab Hippocrate in libri Epidem. accurate describuntur, ut parum opus videatur hic alias adjuce; præsertim quia immensi operis, ac tædii esset varios insanientium mores, & gestus referre: interim quoad morbi eventum haud magna diversitas occurrit; quippe ut plurimum aut febre indicata phrenitis paulatim cessat, aut illa crasin nullam, aut malam habente, mors, aut longa desipientia succedit. Attamen, quo hypothesis nostra de spirituum inflammatione illustretur; libet hic instantiam unam rariorem proponere.

Olim ad Ancillam robustam, quæ febricitans, & summè insaniens, continue in lecto vineta tenebatur, curandam accersabar. Huic sanguinem copiose, & dein iterato mitti, alvum ab enemate crebro subduci, quin & alias quasque administrationes, in hoc casu usitatas ordine celebrandas præcepi; interim Julapia, emulsiones, & hypnotica propinari: Verum his parum aut nihil juvantibus, per septem, vel octo dies illa insomnis usque, & furiosa admodum persistit, potum frigidum ejulando, & clamando perpetuo exsolcens; quapropter hydropotia, ad libitum imò ad satietatem concessa, nequaquam sedatior, aut sitibunda minus facta est; itaque (si quidem tempus æstivum fuit) ut mediâ nocte a mulieribus sublata, & foras perducta Cynibz imponeretur, dein vellibus exuta, & vinculis soluta fluvio profundo immergeretur, fune tantum circa corporis truncum, ne forte submersa interiret alligato; verum istiusmodi, retinaculo nihil opus fuit, namque puella ut vix melius vir quispian artem hanc probe edoctus, sponte natabat: post tertiam, aut quartam horæ partem, sana, & sobria aquis eximitur, dein lecto commissa dormivit, & copiose sudavit, posteaque sine alio quovis remedio convaleuit. Curatio hæc tam subito, feliciter successit, quantum flamma tum vitalis, tum animalis simul immensum auctæ excessus, à proprio ignis intensioris remedio, scil. humedatione, & infri-gidatione ab aquis tollerentur.

Is quæ hactenus habet Clar. Willis subjungimus quæ de Phrenitide sua de morbis Captivi tractatu scripsit Clar. Bellini in absolutiorem hujus affectus theoriam; sic autem ille.

Antecedentia Phrenitidis sunt.

Calidorum usus nimius, insolatio, meri potio, ira, & hujusmodi: vulnus, percussio, contusio capitis,



capitis, mox febris, eaque ardens eodem fere tempore cum expositis, tum somnus interruptus, insomnia terrefactio, & in eodem somno vociferatio. Sunt qui e lecto exiliant, delirium interruptum potissimum ad accessiones, & exacerbationes febris: oculorum præcipue, & faciei rubor, aurium sibilus, sonitus, strepitus, tinnitus, objectorum apprensus geminatio, oculorum lacrymatio, & perturbati motus, jactatio, & motus variis corporis, excretionis natus sine necessitate, urinx ex coctis crudæ, albæ, tenues: oblivio eorum, quæ dicuntur, responsiones iracundæ, & jam jam invadente phrenitide torvus, ac fixus intuitus, & in accedentes irruptio.

*Conjuncta cum phrenitide mitiori, seu, ut appellant, in dispositione.*

Febris acuta continua, delirium perpetuum, vigilia, dolor capitis, & cervicis, qui mox evanescere videtur: floccos, & festucas legere videntur alterna summorum digitorum explicatione, & complicatione: in iram facilitas, dentium stridor, oculorum rigor, tremores, & concussionis corporis: petunt matulam, inde abstinent ab urinx excretionem: exerunt linguam, neque inde retrahunt: Pulsus parvus, durus, celer, frequens, respiratio magna, rara, lingua arida, aspera, nigra, citrina, tremiscens, nullus tamen sitis sensus. Torvus aspectus, oculorum rubor cum squallore, nec ipsi vividus, & micantes, iidem lucem averfantes, sed & facies tota rubet. Acres lacrymæ, paucae, densæ, oculorum angulis adhaerentes, vel lacryma una, aut altera ex altero tantum oculo acris similiter, & densa: stilla sanguinis e naribus, eaque nigra, urinx suppressio, & cum excernitur, albæ, & pellucida: alvus adstrictior, dejectiones albæ, convulsio, extremorum rigor, capillorum evulsio, faciei laniatio per ungues, & quilibet alius in proprium corpus faciendi modus.

*Conjuncta cum phrenitide in habitu Hippocratico, & deinde Medicis Hælica dicta.*

Sensuum omnium amissio, siue externi sint, siue interni, unde nulla molestia, nullus dolor, non delirium, non responsio, vix, aut nulla locutio: faciei, & oculorum rubor, mox corporis languor, & impotentia motus ita, ut raro decubitus mutant ægri dormientibus similes: manus tremulæ, & sæpè motæ quasi apprehendendum aliquid queritantes.

#### *Consequentia.*

Gangræna, vel sphacelus cerebri, convulsio, lethargus, Coma: vox clausa, tremula, singultus: fecum, & urinx involuntaria, nec percepta dejectio: sudor universi corporis calidus, & copiosus præcipue à capite: copiosior sanguinis fluxus e naribus, pus per os, & aures. Delirium cum risu (quod inter signa melioris exitus, & phrenitidis in sanitatem abituræ ponunt.)

Quoniam calidorum usus nimius effectum non nisi à caliditate proveniente potest producere, nempe calefactionem: ab ejusmodi autem usu phrenitis oritur; igitur erit illa ca-

læfactum: aliquid. Hinc fit, ut febris ardens, atque acuta corripit ex humoribus solutis, & in calorem abeuntibus excitata. Somnus autem exigit humidum, & frigidum; ubi igitur hæc desunt, adsit autem calidum, quod non solum frigido contrarium est, sed insuper exsiccat, somnus continuus, qualis naturalis dari non poterit: erit itaque plus minus interruptus, prout calidum illud exsiccat qualitate, quantitate, aut utroque erit validius. Quia vero vis calidi exsicantis est acrior, & momenti majoris; igitur calidum illud expirans per corpus, cerebrum, & nervos, & materiam suppeditans generationi spirituum, movere poterunt hi, vel illud species momenti majoris, quales sunt terrificæ, utpote ad indignationem, vel violentiam cujuscunque generis comparatæ, & siquidem species, quæ excitatur, conjuncta sit cum metu somnantis, vociferabitur ille per assuetudinem propter metum. Si vero species, quæ excitatur, ipsum somniantem ad minus, & indignationem moveat, erit vociferatio similiter effectus assuetudinis conjuncta cum motu indignationis, & minarum. Poterit etiam casu id contingere tum ratione sonni, tum ratione delirii etiam in vigilia. Iisdem de causis, vel ut fugiat, si timenda somniet, vel ut manus inferat, ulciscatur, &c. si iracunda: proinde e lecto poterit dormiens, quod etiam iisdem de causis præstare poterit vigilans, si per delirium, quod est somnium vigilantium, timoris, vel iræ species excitentur. Quia insuper motus delirii est motus specierum incertus, vagus, & per varias brevissimi temporis species; excitabitur igitur illud à corpore maxime mobili, & nullius certi motus (ut in somno naturali à perspiratione,) qualis calor, quod tamen continuum non erit, nisi continuè calor urgeat, & tunc majus, cum idem magis urgebit, quod in accessionibus, & exacerbationibus febrium continget, vel tum sanguine magis fermentescente, vel cum stagnet in partibus corporis, tum magis premente cerebrum propter obstructionem, vel eo pervenientibus solum particulis calidioribus utpote tenuioribus. Quoniam verò per calorem sanguis rarefcit, adeoque majus spatium exigit, igitur nitetur extorrum intra vasa, eaque majoris reddet amplitudinis, unde subcutanea magis conspicua fient, seu faciem, & oculos colore sanguineo, seu rubicundo inficiet. Sed quoniam non corpus universum contrahit ruborem; calor igitur auctus non erit sufficiens causa producendi ruborem in facie etiam ab extrinseca superficie conspicuum, nec ullum iudicium est ullius obicis ad cor, aut pulmones, quo sistatur sanguis è trunco ascendente venæ cavæ refluus; adsit igitur in capite obex aliquis oportet, quo impediatur, vel retardetur motus sanguinis per arterias, & rubor ille ab infartu arteriarum pendeat: obex autem in arteriis facit, ut per continuum affluxum sanguinis earundem canaliculi minimi in molem attollantur, & veluti totidem parva aneurismata producant, vel sanguis extra easdem exsudet in spatia interarterialia, adeoque eadem infarciat, & in molem majusculam extendat; minima autem quæque pars plurimis arteriis instruitur, quæ simul sumptæ tumorem insignem producent, si singulæ etiam parum intumescant, &



tumor ille fiet à sanguine, seu inflammationem constituet; ille igitur rubor faciei, & oculorum ab inflammatione, & quidem sytrophica poterit provenire, nempe cum tumore conjuncta: quòd si infartus fuerit minor, poterit pars affecta vix in tumorem attolli, sed solummodò vividè rubescere, eritque inflammatio sine rubore, quæ dicitur Phlogosis. A quacunque autem ex his causis proveniat, aderit calor acer, & pressio intra cranium major, quæ si tanta ob tumorem, vel locum tumoris sit, ut cerebrum plus minus comprimat, ea omnia producentur in animali, quæ ab insigni calore ad cerebrum, & ejus pressione producantur oportet. Per caloris impetum quaquaversum nitentem excitabuntur species, quæ poterunt. Quia verò arteriæ truncis majusculis distribuuntur per aurem internam sub membrana tympani, & earum pulsus augetur per obicem inflammationis, poterunt illæ tum eo ipso pulsu, tum calore copiosè evaporante in membranam incurrere, eamque movere excitando hanc, vel illam soni speciem, quæ excitari potest ab incurrentis caloris impetu. Rursus quoniam oculorum nervis allabuntur Carotidum majores trunci; iis igitur occurrat oportet sanguis toto impetu, & qui per obicem inflammationis sit naturalimajor, instructus, sed non utrinque æqualis, cum id non sit necessarium; quando igitur non erit utrinque æqualis ille impetus sanguinis naturali major, dimovebitur uterque opticus inæqualiter ab axe optico, seu objecta videbuntur gemina. Insuper quoniam propter obicem inflammationis major copia sanguinis in arteriis colligitur, subsistit, ac premitur; igitur secretiones excrementorum, quæ ab illo sanguine fieri possunt, copiosiores erunt, hoc est, glandulis lacrymalibus major sui liquidi excernetur quantitas, quæ quantitas naturali major cum lacrymas constituat, oculi lacrymabuntur. Quoniam vero calor nulla certa lege moveatur, nulla etiam certa lege movebit spiritus, & nervos, per quos expirat; muscoli igitur omnes nulla certa lege, vi, ordine, ac tempore movebuntur, sed modò quiescent, modò contrahentur, & quidem modò rariùs, modò frequentius, modò plures, modò pauciores, prout incertus caloris impetus trudit spiritus in hos, aut illos, unde non solum oculis accident perturbati motus, sed jactationes, & varii motus in corpore toto, è quorum numero est excretionis nifus sine necessitate, cum ejusmodi nifus sit musculorum motus, (ut ex doctrina nostra excretionis patet in secunda parte respirationis exposita) quem tentat tum homo non adactus necessitate screandi, sed per influxum spirituum vi caloris præter voluntatem intrulorum. Hæc autem inconstantia, & varietas motuum eo magis fieri debet, si adsit cerebri mediocris pressio, quæ spirituum motus retardet, quibus proinde non detur liber fluxus in musculos, nisi post certum tempus, quo cumuletur spirituum certa quantitas vim pressionis excedens. Quoniam verò sanguis ad tumores derivatus ab eorum obice sistitur; igitur præterfluere non poterit, nisi quod est tenuissimum, ac liquidissimum subsistentibus ad eundem tumorem partibus minus ad motum aptis, ejusmodi sunt partes terræ, & salis. Ab his autem urina

constituitur crassior, & coctior; igitur hæc ad inflammationem subsistent resluentibus per corpus solum fluxilioribus, nempe aqueis, similibusque, à quibus hic urina crudior, & tenuis, unde urina ex coctis in crudas, albas, ac tenues abibunt. Quia igitur per caloris vim hic perpetua quædam, & varia spirituum agitatio; species igitur eorum, quæ dicuntur, non tremunt solæ, neque toto suo momento libero, sed cū aliis illis incerta, & semper varia agitatione spirituum permotæ, unde iis animum advertere non poterimus: cum autem contentione animi maxima opus sit ad memoria retinendum, (quod maxime assequimur quiete omnium aliarum specierum excepta illa, quam memoriæ mandare volumus;) igitur aliis, ac semper variis eodem tempore trementibus memoriæ mandari illa non poterit, & ejusdem obliti videbimur, unde eorum, quæ dicuntur, oblitio. Similiter quoniam iræ species majori sunt impetu excitandæ, & hoc instructus est calor; & hæc igitur excitabuntur, & æger iis excitatis motus illos in responsionibus exeret, qui sunt cum ejusmodi speciebus conjuncti, nempe motus iracundos. Quod si jam invadat Phrenitis, erit tum maximus calor, unde motus omnes ad violentiam comparati, & propterea, ut in Comate vigili dictum est, torvus, ac fixus intuitus, & in accedentes irruptio, & hæc non solum à calore provenient, sed à pressione inflammationis augebuntur, quæ licet statim invadens major esse debet, quam antecedenti tempore, unde tum primò totum cerebrum magis premet vel mole sua, vel arterias magis infarciendo, quare spiritus copiosiores exprimet, qui speciebus iracundiæ obtemperantes ducentur in musculos torvo obtutui, & illationi manuum servientes. Quoniam verò extendi membranz non possunt, quin fiat aliqua inter ipsarum partes divisio, ex hac autem pendet dolor; in phrenitide igitur aderit dolor capitis: dolor autem est sensus quidam, nec sensus sine influxu spirituum; nisi igitur influant spiritus, dolor percipi non poterit, licet divisio perseveret, imò etiam angeatur: sed per continuum, ac semper majorem canalium distractionem nervuli intercurrentes tandem ita comprimuntur, ut nihil spiritus ulterius possit influere; igitur post dolorem primò excitatum licet non cesset, imò angeatur inflammatio, cessabit ejusdem doloris sensus. Quoniam verò viget cum insigni calor; igitur humidum quodlibet absumitur, unde somni impotentia, seu vigilia, sed insignis hic calor semper viget; igitur semper vari, ac perturbati spirituum motus, seu delirium perpetuum. Absumptis autem liquidis superest in arteriis, & venis sanguis acrior cum certa obstructione in capite; hinc igitur febris acuta, ardens, continua, in qua & obstructio, & fermentatio sanguinis, & acuti motus musculorum, licet non omnium, neque semper, quæ singula ex se sola, ne dum omnia simul sumpta ad febris productionem sufficiunt. Cum igitur, ut superius, per calorem, & pressionem ab inflammatione spiritus nullo apto, & certo motu moventur, tremunt, & concutientur corpora, prout spiritus in musculos influunt: stridebunt dentibus, prout in maxillæ inferioris musculos alterne influunt spiritus contrahentes cum impetu



petu; unde enim fiet mutua dentium validior illio, ex qua eorundem itridor: oculi rigebunt, nempe motu aliquo tonico detinebuntur, cum æquum momentorum spiritus in musculos eorum oppositos deducuntur. Simili de causa scitucas detergere, illos velle, & colligere videbuntur, cum ejusmodi motus nihil aliud sint, quam certi quidam motus certorum musculorum, qui contrahuntur, prout influunt spiritus. Quoniam vero in Phrenitide perpetuum est delirium; igitur petitio matulæ potest etiam esse petitio delicia, non autem per meiendi necessitatem facta, quare hoc supposito phreniticum non meiendi post petitionem matulæ non erit indicium oblivionis. Insuper quoniam urinx emissio, cum illa intat, & urget, est opus tam proprium necessitatis propter stimulum, ut etiam nostri compotes illam suppressere nequeamus; eandem igitur suppressere multo minus poterimus, cum delirio detenti arbitrio minime uti possumus; quare tunc maxime urina sponte fluit: non sunt autem, ut supponitur; non igitur quia obliuiscatur phreniticus, sed quia per obstructionem, & vim morbi, vel pressionem cerebri minor est vim musculorum expellentiæ, quam constrictoris colli velicæ deficientibus spiritibus, vel quia ob morbi calorem, & siccitatem convulsus est tam musculus constrictor, quam musculus velicæ ad vultus, ita ut velica occlusa detineatur, nec in ipsam induere ab ureteribus urina possit, vel denique quia nihil urinx seceratur humido per morbi calorem absumpto, duro autem ad inflammationem detento. Par est ratio, cur linguam exerant, neque retrahant, quod de ore diducto perseverante post oscitationem in lethargiis exponimus non ab simili necessitate. A caloris autem vi jam superius ostensum pendere facilitatem in iram, & torvum aspectum, quin etiam ruborem faciei, & oculorum a mora, vel quiete sanguinis intra arterias caput petentes, unde illæ extenduntur, trahuntur magis extorsum, & colorem sanguinis subcutaneum exhibent: non erunt tamen oculi vivi, micantesque, sed squalidi, cum desit alimentum aptum, apta humiditas, & apta spirituum quæritas movens, & quasi per pellucidum ipsorum corpus expirans, sed squalore, & quasi languore pressi, adeoque multo infirmiores, & sustinendo luminis incursum sine fastidio, ac dolore impares. Insuper vel à delirio, vel adhuc sensu doloris non solum in capite, sed in toto corpore per tantam morbi vim excitati phrenitici rapiuntur in quamlibet sævitiem, & offensionem proprii corporis, & capillos evelient, & faciem lamabunt unguibus, & sibi manus inferre quoquo pacto machinabuntur, imo & inferent. Per calorem insuper morbi partes exsiccabuntur absumpto humido, unde arefcet lingua, & pili, qui per ipsam distribuuntur, dirigebunt, nec tactui cedent molliter, sed ipsi ferient, quasi parva totidem, & disjuncta spicula, unde aspera videbitur: nigra etiam, vel quia substituat solus sanguis sub eius superficie destitutus humido aqueo, à quo color ejus sit dilutioris rubedinis: vel citrina, si sit permixtus humori bilioso, nisi hic color à cibis substituentibus, vel halitu ventriculi pendeat: tremiscens vero ratione influxuum inestorum per

spiritus, ut de cæteris motibus dictum est. Ulterius per vim morbi absumptis plurimum liquidi cum sanguine fluentis, & ratione obstructionis plurimum ejusdem detinentis ad inflammationem continebitur in arterijs copia sanguinis naturali multo minor, unde pulvis parvus: propter siccitatem partium omnium, adeoque etiam arteriarum durus: propter parvam quantitatem sanguinis, ejusque mobilitatem celer: propter stimulum in corde ab ejus affluxu nimis calido, mobilitatem spirituum, & pressionem ab inflammatione (nisi hæc pressio sit æquo major) frequens. Quia vero ad movendam universam multitudinem musculorum pectoris multo majori quantitate spirituum opus est, quam ad movendum unicum musculus cordis, videmusque musculus non vellicantur extorsum, ut cor à sanguine ventriculorum, neque interius tam vellicantur, quam villi cordis, cum intra villos pectoris sanguis sit minoris impetus, quam intra villos cordis, in quos derivatur ab ipso statim trunco arteria; igitur in musculos pectoris vix quicquam spirituum influit per motum derivationis ratione stimuli: per influxum autem naturalem inveniunt multo pauciores, quam in naturali statu, cum multo pauciores spiritus à tam unminuto sanguine generentur; igitur rarius moveatur pectus, seu respiret Animal oportet; interim vero cumulabitur in nervis copia liquidi major, quæ intra musculos tandem deducta respirationem magnam producet. Quoniam vero partibus arefcenibus nervi concidunt, ita ut spiritus vix possint fluere; igitur ab objectis hebetibus produci non poterunt suæ species, hujusmodi autem est sensus sitis, & in arida lingua comprimuntur nervi, tollitur igitur sensus sitis non secus, ac de dolore capitis dictum est. Ulterius absumpto liquido cum quicquid inest sanguini sit acerrimum, & possit per glandulas lacrymales secerari, erit illud acre, sed non nisi minimæ quantitatis, cum in his glandulis aqueum quiddam seceratur, & aqueum supponatur absumptum; erunt igitur lacrymæ ex utrisque, vel ex altero oculo tantæ, una, aut altera, vel plures, & paucæ, prout plus minus liquidum adhuc superest in sanguine: acris autem illa materies erit maxime tenuis, seu mobilis, sive perspirans, atque evaporans, adeoque ad oculorum angulos relinquet suum vehiculum crassius, quod utpote satis siccum brevi densabitur, cito exarefcet, & oculorum angulis adhaerebit. Erunt autem hæc lacrymæ pessimi omnis, tunc quia minimum liquidi arguent, tunc quia argumento esse poterunt, ipsas non per secretionem naturalem effluere, sed potius villis erosas, aut lassas, adeoque corpore jam ad dissolutionem tendente. Quoniam insuper color sanguinis eo sit ad nigrum magis vergens, quo major copia liquidi pellucidi ipsi detrahitur; gutta igitur sanguinis nigra dabitur jam absumpto humido, & gutta singularis arguet acrimoniam ejus, paucitatem, & validam obstructionem prohibentem ipsius fluxum, vel debilitatem naturæ, seu villorum disrumpi patientium, unde & hoc pessimi omnis erit. Insuper absumpto humido urina ex sanguine generari non poterit, unde suppressi videbitur vel per convulsiones musculorum, ut superius: quod si



reddatur subsistentibus duris partibus ad obstructionem inflammationis, erit alba, & pellucida. Similiter absumpto humido etiam alvi fœces erunt sicca, & villi intestinorum vel a sicco morbo convulsi, vel a siccitate rigidi, vel ab utroque moveri non poterunt, unde fœces premere, quæ etiam ex se ipsis propter siccitatem suam expressioni magis resistunt, non poterunt, nec ipsæ ex se fluere, cum duræ sint, unde alvus adstrictior: Cum verò deicientur, erunt coloris albi, cum quicquid terreum eadem inticit, vel intendit ad flavedinem, vel colorem quemlibet alium saturum, detineatur in capite, nisi forte etiam prohibetur chylo influxus in lacteas per siccitatem partium occlusas, unde color albus in fœcibus. Convulsio quibus de necessitatibus fieri possit, facile patet ex superioribus: quia tamen in phrenitide adest delirium perpetuum, & est morbus caloris, ac siccitatis, maximæ convulsionem in phrenitide contingere potissimum debere dixerim per siccitatem ea ratione, quam in Comate vigili exposuimus. Denique extremorum rigor effectus est febris, obstruentis ramulos capillares, à quibus exprimitur omne calidum, præcipue autem cum reliquum sanguinis adhuc fluens tenuissimum sit, & facile evaporans: quæ sunt cum phrenitide in dispositione conjuncta. Quod si phrenitis vel sit per plures dies confirmata, vel paulo ante quidem apprehenderit, sed fuerit vehementior, ita ut obstructio, & inflammatio totum cerebrum validissime prefferit, ita ut omnis refluxus, & subitus spirituum motus impediatur, tum nullus sensus, siue internus, siue externus operari poterit, unde nulla molestia, nullus dolor, non delirium, non responsio, vix, aut nulla locutio, nempe sonus per linguæ motum editus; superesse enim poterit per aliquod breve tempus debilis aliquis motus, quousque pressio non occluserit ex toto nervos, & spirituum generationem pariter premendo impederit. Hinc sensim illis occlusis, & impedita horum generatione languescet magis corpus, & motus reddetur impos, nec mutabunt ægri decubitus, & similes dormientibus videbuntur, & imperitis medicis sub ea falsa imagine imponent, tremantque partibus magis pendulis, & a fulcimento remotissimis, ut sunt manus, per alternū influxum spirituum, qui adhuc supersunt, & influunt, per quem influxū cum complicantur & explicentur digiti ab alterna contractione musculorum iis motibus inservientium, videbuntur manus quasi apprehendendum aliquid quaritare. Aderit tamen & in hac phrenitide vel maximè oculorum, & faciei rubor, cum inflammatio intensior fluxum, & derivationem sanguinis ad caput magis impediât, unde ruborem hunc provenire superius ostensum. Ex his autem omnibus facile innotescit, quæ ratione per vulnus, ictum, aut contusionem capitis excitari possit vera phrenitis, nempe delirium continuum cum febre acuta continua, quæ ab inflammatione pendeat; si etenim vulneri, &c. succedat inflammatio intra cranium, quæcunque de Phrenitide hæcenus exposuimus succedere debere manifestum est: per simplicem autem pressionem absque inflammatione, & febre aliqua quidem ex iis, quæ phrenitidi competunt, produci poterunt, ut ex superioribus

morbis facile patet, sed non omnia, ut per singulas phrenitidis affectiones excurrenti statim innotescit. Sed neque illud est omittendum, spirituum penuriam in phrenitide non provenire solum ab expositis causis, verum etiam ab ipso inflammationis loco, quo fieri potest, ut cerebrum plus minus, prout explicatum est, prematur; ea enim pressione prohibetur, ut sanguis, ex quo generantur spiritus, in glandulas influat, atque insuper etiam si inflammatio non premat, cum tamen ejus obice impediat fluxus sanguinis, & derivatio ad arteriolas quatuor capillares, illa omnes, quæ sanguinem non trahunt, facient, ut in glandulas cerebri deriveretur quantitas sanguinis naturali minor, unde spirituum copia minor generabitur. Itaque perdurante inflammatione si vi ejus erodatur quicquid continet, laceretur, mortificetur, ac demum veluti diffuat plane corruptum, & pertingat ejusmodi erosio, & corruptio ad usque, & intra cerebrum, succedet phrenitidi Gangrena, vel sphacelus cerebri, quod erit proximæ mortis argumentum. Convulsio etiam succedere poterit, quæ facillime orietur ex siccitate, & calore, ut superius expositum: hæc autem quanquam maximè periculosa, cum arguat summam humorum, & solidarum partium siccitatem, & quasi rigidam tensionem per humectantia difficile superabilem, tamen quia nondum datur partium solidarum corruptio, aliquid spei relinquet. Ad convulsionem pertinet singultus, & vox tremula, quorum ille à materia acri, calida, & sicca, vel in cavitatem, & os ventriculi, vel identidem pro spirituum, & humorum paucitate per nervos in muscolum ejus derivata, sicut etiam ab iisdem, ut superius, vox tremula; tremor enim vocis à tremore musculorum linguæ, faucium, & maxillæ inferioris; asperitas autem illa vocis, quam clangorem dicimus, ab asperitate instrumentorum vocem efformantium, quæ asperitas à siccitate, & calore, unde hæc plus minus arguunt periculi, prout cætera in eo statu morbi plus minus sunt gravia. Excrementa vero præter voluntatem, & sensum excernuntur vel jam ad extremam dissolutionem tendente animali, ita ut etiam humidum ab iis seceratur, & tantum auxilii ipsis conciliet, ut ex se ipsis effluere ex intestinis, & vesica possint, vel iisdem sponte fermentescentibus, atque ita partim stimulo, partim vi fluxus per fermentum acquisiti sibi viam aperiant, vel extrema contractione musculorum per ultimum, & copiosorem spirituum influxum, qui ultimus ideo copiosior, quod circa cerebrum stagnat sanguis totum ipsum magis comprimens, & quicquid continetur spirituum exprimens: siue sensui autem, vel quia nervi jam arverunt, vel quia propter extremam rigiditatem tremere non possunt, vel quia spirituum mobilitas, & tenuitas impressioni non paret. Hæc igitur excretiones sunt supremæ depurationis. Quod si sudor calidus, & copiosus præcipue à capite proveniat, minuet ille inflammationem, & indicabit reliquum corporis minus obstructum esse propter calorem, cum quo effluit: sicut sanguis è naribus copiosus, aut pus per os, & aures; hoc enim inflammationem ad suppurationem venisse, & pus excerni, & fluere cum sanguine, ille verò exitum materię



teriz morborum ostendit, unde hæc omnia salutaria. Delirium cum risu nimis mali omnis esse, asserunt, quod non crediderim adnitterendum, tum quia in paraphrenitide vel hic idem risus est maximè exitialis, tum etiam præcipue quia cum delirantium motus sint omnino vagi, incerti ordinis, & nullius connexionis, potest excitari risus casu, sicuti ceteri motus delirii, & nihil indicabitur, & id quidem fiet facile, cum eum motum oris, quem risum dicimus, non exeramus, nisi per contractiones musculorum labia ad latera, & ab invicem distrahentium, quæ sanè contractiones per incertos delirii motus heri poterunt absque eo, quod delirus ille speciem risus in nervis moveat, & propterea non vere rideat, sed ridere propter motus labiorum, quales in ridentibus, videatur, quemadmodum spasmo cynico affecti, quamquam labia movent sicut ridentes, etiam a vulgaribus Medicis non dicuntur ridere. Si verò tutus, ac certus esse possit Medicus, motus illos labiorum excitari per veram speciem risus (quod in delirantibus vix fieri posse à quolibet Met peritissimo crediderim, nisi delirium sit circa eandem rem constans, & de ea ipsa re loquatur ager, eamque ridiculam esse, & ea super se in risum moveri ager testetur,) cum res in risum moventes non sint tanti impetus in excitatione specierum, quanti truculentæ, & irarum plenæ: si in phrenitide hæc species præcesserint, inde verò succedat delirium cum risu, argui poterit humorum calor, & siccitas minor inflammationis pressio, unde spei aliquid affulgebit. Hinc igitur deduces, quid sit phrenitis, eamque esse morbum à calore, & siccitate maxima proveniente, ex qua pendunt febris acuta continua, delirium perpetuum, & quæ hucusque exposuimus singula: cum autem hæc ab inflammatione intra cranium facile oriri possint, hanc ipsam inflammationem intra cranium esse ut plurimum, & præcipuam causam cæterorum omnium, & cum vasa sanguinis non solum per membranas cerebri, sed & corpus ipsum ejus distribuuntur innumera, & membranæ, & cerebrum inflammari poterunt, & phrenitis provenire ab inflammatione cerebri, vel membranarum ejus, vel utrarumque. Non tamen inde fit, ut nullus detur modus producendi phrenitidem, hoc est, omnia, quæ phrenitidi competunt præter inflammationem, absque hac ipsa inflammatione. Fac enim qualibet alia de causa sanguinem calidum, ac siccum, qui tamen obstructionem non producat in capite, nihil erit, quod phrenitidem non mentiat. Denique prout alii humores admiscuntur sanguini, fit phrenitis sævior, aut mitior: si humores pituitosi, mitior: si biliosi: sævior: si atrabiles, adhuc sævior: sed hæc patent. Phrenitidem in lethargum, vel Coma facessere maxime ominosum, & deploratum; cum etenim ejusmodi affectiones ab humoribus frigidis, & humidis oriuntur, manifestum est, phrenitidem excitantes humores calidos, & siccos ingravescente ipsa phrenitide non posse in frigidos, & humidos commutari, adeoque lethargus ille, vel Coma superveniens phrenitidi nec verus lethargus est, nec verum Coma, sed privatio sensus, & motus, quæ phrenitide perdurante à nulla alia causa provenire potest, quam à prohibita prorsus spi-

rituum vel generatione, vel motu, vel utrisque, & hæc non nisi ab inflammatione immensum aucta, & cerebrum ex toto comprimente, vel à gangrana, aut sphacelo ejus. Phrenitis per consensum dicitur paraphrenitidis, de qua seorsim breviter propter ea, quibus à vera phrenitide, quam hactenus exposuimus, distinguitur.

## PARAPHRENITIS.

*Conjuncta.*

Cum Paraphrenitide omnia conjuncta sunt, quæ cum phrenitide præter inflammationem intra cranium, intentionem calorem capitis, ruborem oculorum, & faciei, respirationem magnam, & raram. Itaque in paraphrenitide adeit inflammatio diaphragmatis, calor capitis remissior, rubor oculorum, & faciei dilutior, vox acutior, delirium cum rursu, risu, dolore lateris, calore ad unum pectus, & hypochondria, hæc ipsa palpitantia, & sursum, & introrsum revulsa, ut Hippocrates primò Epid. Agro secundo. Aunt insuper tantum non omnes, in paraphrenitide respirationem non esse magnam, & raram, ut in phrenitide, sed parvam, & frequentem, & id semper, cum tamen Hippocrates ibidem in Sileno paraphrenitide laborante per totum morbi tempus respirationem fuisse magnam, & raram asserat. Melius itaque cum aliis modò parva est, & frequens, modò rara, & magna, modò inæqualis, & incerti ordinis. Sunt etiam qui ab inflammationibus aliarum partium internarum oriri paraphrenitidem asserant, sed nullius partis inflammatio præter septi transversæ producit delirium perpetuum, & hanc solam appellavere Veteres paraphrenitidem.

Quoniam in inflammationibus à cerebro distantibus calor cerebro non communicatur, nisi à sanguine per ejus arterias fluente, qui in cerebro subsistere ad locum inflammatum non potest, cum hic locus in cerebro nullus sit supposita alibi inflammatione; igitur in inflammationibus à cerebro distantibus multo minorem à calore vim patietur cerebrum, quam in phrenitide: ab hoc autem præcipue pendet delirium perpetuum in phrenitide, agitatissimum nempe continuè spiritibus incertis motibus ob copiam caloris in cerebro semper incertis motibus expirantis; ad hoc igitur, ut excitetur delirium per inflammationes à cerebro distantes, oportebit, ut cumuletur insignis copia caloris in capite, qui totus simul nitens intra cerebrum moveat denum se ad spiritus, nervosque, quibus occurrit, atque delirium excitet. Quia tamen interim evaporat, nec calor affluentis per unicam vicem sanguinis sufficit ad ciendos incertos spirituum motus, cessabit delirium, quousque tantum sanguinis per plures pulsationes influxerit, ut per ipsum conceperit cerebrum illum calorem, qui delirio excitando sufficit, quod proinde excitabitur rursus, rursus cessabit. Si verò etiam in inflammationibus à cerebro distantibus detur alia causa, quæ caloris insignis in capite vices gerat, poterit etiam in ipsis delirium continuum dari. Quoniam igitur septum transversum est musculus magnam, & continuam vim exerens, &



validè, & copiosè tendinosus; inflammari igitur non poterit, hoc est, alicubi in tumorem accendi aliqua ipsius pars, quin cum movetur, distrahatur ad partem tumefactam valide, & periculum divulsionis subeat, seu, quod idem est, vehementer doleat, præcipue si tumor sit ad tendines acerrimi sensus, adeoque refluet liquidum per nervos diaphragmatis vi maxima, cum dolor sit ingens. Neque refluet solum per nervos ejus, sed cum per eundem musculum transeant nervi ad ventriculum tendentes, etiam per ipsos fiat refluxus oportet. Quia insuper inflammatio est tumor maxime calidus; igitur excitabitur ad diaphragma sensus caloris intenzi, & dolor præcipue ejus lateris, ad quod inflammatione affligitur septum. Refluet igitur liquidum per nervos septi, & ventriculi duplici vi in refluxum actum, calore nempe, & dolore, adeoque liquidum refluens statim accipit ad confluxum nervorum, huc illuc nulla lege per vim à refluxu conceptam nitetur, ac fluet, & contentos spiritus nullo ordine dimovebit, seu delirium excitabit, & cum calor, & dolor ad septum continua sint, continua erit etiam refluxus vis, seu continuè produceretur, seu, quod idem est, continuum erit delirium. Eò autem erit major vis illa spirituum refluorum ad nervorum confluxum, quod tam nervi diaphragmatis, quam ventriculi quasi recto ductu ab his partibus in cranium feruntur, & sunt insignes trunci, seu fasciculi ex plurimis nervis collecti; ex altero enim fit, ut impetus refluxus minus minuatur, per alterum vero, ut maxima sit quantitas spirituum refluentium, & major prominde quaquaversum diffusio, & motus varius ad confluxum. Cum autem hæc in reliquis partibus non reperiantur, nullum etenim est viscus, quod tam sentiat, ut septum, quod tam crassis nervis instructum sit, quod tam validè moveatur, & continue excepto Corde, quod sentiat per nervos ad cerebrum tam recta tendentes, quin imò ne ullus quidem alius musculus, aut pars quilibet artuum; his igitur inflammatis excitabitur, & ponetur delirium alterne, prout alterne colligitur calor agitatus in capite, & evaporat; septo verò inflammato per impetus continuos, validos, & incertos spirituum e nervis refluentium, & incidentium in spiritus contentos ad confluxum nervorum fiet delirium continuum. Quia verò ab his ipsis nervis, per quos fit refluxus, deducuntur aliqui ad musculos faciei, & labiorum; in hos igitur derivabitur copia liquidi naturali major, & cum, dum fit respiratio, os semper aliquantum diductum teneamus, vis musculi constringentis labia minor erit viribus trahentium ad latera, & deorsum, adeoque nervi horum musculorum paratiores erunt (ut desint alia) ad recipiendam majorem quantitatem spirituum refluentium, quam nervi constrictoris, unde ille contrahentur validius, & os deducetur magis labiis ad latera, & deorsum actis, seu risus imago excitabitur, qui sane non erit verus risus, sed contractio musculorum, & motus labiorum, qualis in risu factus non per veram speciem risus, sed per refluxum liquidi, cujusmodi motus contingere solet etiam in vulneribus septi, quod vidit Hippocrates in Tychone, qui risit septo vulnerato, & relicta

intra vulnus hastilis parte, qui die tertia mortuus est, quemadmodum pariter Silenus ille supra laudatus occubuit undecima, qui risit tertia. Ex quibus intelliges, nec delirium cum risu in vera phrenitide esse certo posse melioris ominis, cum dubitanti occasionem præbeat, an inflammatio sit etiam in septo, & hæc sit maxime periculosa, cum affecti diaphragmate, licet ridentes, facile moriantur. Quoniam verò septum propter tumorem non potest ex toto contrahi, & vim suam exere; igitur in cavitatem abdominis nitetur minus, & in eandem movebitur per multo minus spatium, unde muscoli abdominis introrsum contrahi libere poterunt, & contenta viscera sursum agi, unde videbuntur hypochondria, seu præcordia introrsum, & sursum revulsa, Quia verò septo non se penitus contrahente motus pectoris fit minor, atque ex hoc respiratio etiam minor, & inflammatum septum se minus contrahit; igitur in hac ejus affectione respiratio parva. Neque verò minus se contrahit septum ob solum impedimentum tumoris, verum etiam per voluntatem animalis, qua prohibet, quantum potest, motum validum, ut majorem dolorem à divulsione ad tumorem evitet: quia tamen dolor adest, ergo refluxus per derivationem naturali major, seu influxus frequentior, seu contractio septi frequentior, hoc est, respiratio etiam frequentior, unde his ita se habentibus erit respiratio parva, & frequens, & frequentia etiam sollicitari poterit ab assuetudine, ut arceatur fastidium restitantis intra pulmones sanguinis in respiratione parva. Si verò ultra hæc laboret æger magna spirituum penuria, ita ut pectus moveri non possit, nisi ipsorum expectata copia, quæ sensim cumuletur in nervis, tunc respiratio continget rara, & ad extrudendum sanguinem è pulmonibus aucta copia per assuetudinem Animalis, fiet motus validior, seu respiratio etiam magna, quæ etiam fieri poterit, si tanta identidem, vel alterne spirituum copia refluat à nervis septi, ut nec vis assuetudinis ipsorum derivationem in idem septum, & ceteros respirationis musculos impedire possit; tunc etenim etsi cum acriori sensu doloris respiratio magna succedet, quem tamen ne rursus sentiat æger, poterit per assuetudinem suppressere similem secundam, cum jam tantum spirituum non fluat, ac refluat. Insuper hæc eadem magnitudo cum raritate dari poterit, si septum validè contractum ita detineatur, ut se restituere nisi lentissimo motu possit, quod per impedimentum tumoris, vel loco motis, vel quasi divulsis villis fieri facile poterit; absoluta enim restitutione jam per nervos plurimum spirituum cumulatum erit, & magnam respirationem parient, sed lenta restitutio raritatem faciet. Ex his autem, & incertis fluxibus in nervos ratione delirii facile patet, respirationem in paraphrenitide esse posse magnam, parvam, raram, frequentem, & quomodolibet inæqualem. Quia verò muscoli abdominis, præcipue autem transversi contermini sunt, ac tantum non coherentes septo, & communi peritonæi tunica succincti, & contrahatur oportet ad locum inflammatum, & caloris sensum concipiat; per hæc igitur etiam iidem muscoli præcipue qua parte per hypochondria septo proxima ducuntur, trahentur à contractione



etione peritonæi, & pressionis sensum cum calore conjunctum patientur, unde motus derivationis alternus, & contractio minima illi derivationi respondens (cum pressio illa, & calor non sit maximus) seu, quod idem est, præcordiorum palpitatio, quæ sanè affectio potest etiam aliis superextensis musculis abdominis convenire, sed transversis plane necessario competere videtur. Quoniam verò motus tussis est violenta quædam musculorum pectus moventium contractio, quæ propterea fit ab influxu liquidi per nervos naturali quantitate copiosioris, per calorem autem, & dolorem septi refluunt spiritus copiosi, & cum impetu per nervos ejus, & ab his iisdem nervis derivantur rami in nervos, & musculos moventes pectus; igitur per hunc solum refluxum (quod idem accideret etiam sine horum nervorum communione perducto refluxu ad usque cerebrum, & inde tacta derivatione in nervos musculorum pectus moventium) tussis excitari potest. Quia vero septum est pars pectoris, cui inhaeret molestum quiddam in loco inflammationis, abripiendis autem e pectore molestiis tussim excitare assuevimus; igitur si per delirium contingat, ut species illa assuetudinis excitetur, tussis in eum finem excitabitur etiam absque refluxu, quanquam ejusmodi finem nec paraphreniticus tum intelligit, neque molestia aversionem forte procurat. Quia verò in paraphrenitide sanguis impense calet non secus, ac in phrenitide, sed in hac detinetur in arteriis ad caput tendentibus, ita ut ipso infarciri, & maxime extendi cogantur propter obicem inflammationis intra cranium, in paraphrenitide vero libere per ipsas fluit, & in venas refluit; igitur in paraphrenitide minor quantitas sanguinis in dato tempore intra arterias capitis detinebitur, eruntque illæ minus distractæ, seu extrorsum trahæ; quare primo quidem de nomine minorem calorem in capite excitabunt, quam in phrenitide: secunda autem de causa ruborem in facie, & oculis dilutiorem, qui tamen uterque erit vividior, quam qui à solo fluxu sanguinis proveniret, respiratio enim non libera in paraphrenitide, & inæqualis subsistere cogit sanguinem ad cor, & pulmones, & truncum venæ ascendentem, unde tumere possunt venæ in capite, & colorem, & calorem vividiorum producere, quod in phrenitide non continget propter respirationem raram quidem, sed magnam, nempe totum sanguinem e pulmone protrudentem. Postremo quoniam septum est ad contactum pulmonum; ipso igitur inflammato calor communicabitur pulmonibus contingentibus, & aëri contento, qui per expirationem recludendus est. Membranz igitur pulmonum minus flaccidæ, seu aridiores fient, & magis tremulæ tremore vivido per densas undas: aer vero contentus similiter fiet aridior tenuatis particulis aqueis, cum quibus permixtus redditur, & ex quibus fit tardus motus, ac minoris impetus, & tremoribus per densas undas ineptior, unde per has ipsas tremet facilè. Si igitur per ipsum formetur vox, erit illa sonus vividus, & per undas densas tremulus tum ratione instrumenti rigidi, nempe tensi, tum aëris similiter tensi, ut ita dicam, quare, ut in doctrina de sonis, erit vox acutior. Latet igitur, in paraphreni-

tidem esse collectionem omnium expositarum affectionum cum delirio continuo ab inflammatione diaphragmatis præcipue proveniente.

Hactenus Willsius & Bellini, hic pro explanatione Phrenitidis & Paraphrenitidis in specie, ille tum pro Phrenitidis, tum pro Delirii explanatione, ac etiam pro eorundem curatione: sequuntur jam *Curationes, Consultationes, Observationes, & Anatomica inspectiones ex aliis variis.*

#### Curationes.

Quando depravatur ratiocinatio, ita ut à consuetâ lege & ordine aberraret, dicitur *Delirium*.

Aberratio hæc fit, secundum omnes tres mentis operationes. Nam 1. in simplicium objectorum, indeque formatorum conceptum apprehensione v. gr. dum delirans quid pro quo, vel aliud pro alio concipit, ut dum quendam vulgarem hominem Regem Hispaniæ appellat. 2. & 3. in conceptuum apprehensorum compositione & divisione indeque facta conclusionem & ratiocinationem, v. gr. dum aliquis existimans sese consultum esse ex butyro? ob id nolebat accedere ignem, quia metuebat, ne exinde incallescens colliqueceret. Omnes hæc aberrationes a recta ratione uno nomine *Delirium* appellantur, Græcis *ἡγεσθη* depravatio nempe rationis & aberratio ejusdem ab ordinaria cogitationis lege, qua deliria varia, subinde ridicula, subinde etiam seria, sed absque nexu & ordine & sine fundamento confuse ut plurimum profertur.

Causa horum in genere consistit in *spiritu animali*; Mens enim immutabilis eadem semper est nec potest mutari, aut ab ulia alia causa externa lædi & inquinari.

In spiritu ergo hæret vitium, idque varium & diversum. Unde etiam varia deliria, varique eorundem species. Rem exemplo declarabo: Quemadmodum enim in *ebriis* idem vinum diversa tamen subebrietatis exorbitantia parit deliria, eaque diversa in diversis subjectis, dum unus sit furiosus, alius sit amarus, tertius sit canorus, & cantans. 4. fit somnolentus. 5. se existimat maximè divitem. 6. omnium evadit sapientissimus, &c. In his utut unum sit vinum, quod omnes inebriat, indeque omnes etiam delirantes reddit, nihilominus tamen pro diversa constitutione subjectorum, eorumque alia habitudine diversâ, ex massæ sang. crassi naturali & seminali distincta & inde pro varietate spirituum animalium varia & distincta fiunt deliria.

In genere deliria omnia vel ex interna oriuntur causa, sive habent fomitem quendam internum in corpore stabulantem, vel ab externa oriuntur causa sive ab assumpta, sive ad extrinsecus admota pertineant, sive ex animali sive vegetabili regno orientur.

Ex regno vegetabili 1. omnia narcotica simul cum virtute fixativa seu quasi ligativa spirituum animalium certam vim obtinent determinandi certo modo spiritus animales, ut pro dicta eorundem determinatione, diversi conceptus in mente formentur indeque deliria oriantur: v. gr. refert *Hirscherm de Peste* quod 2. Monachi ex



esù cicutæ fuerint redditi amentes, & quidem ita ut cicuta iisdem impresserit talem imaginationem quasi transmutati essent in anates, & anseres, unde isti monachi piscinas petiere & in iisdem se submergere & natare cœperunt.

Pertinet huc Pharmacum phantasticum Bartholeti (de quo suo loco plura) ex scammonio paratum, quo vult determinare imaginationem ad certum conceptum & determinatam imaginationis speciem.

Sic opium copiosius & frequentius assumptum uti mos est in Provinciis Orientalibus, in India, Persia, & similibus, inducit somnia jucunda quasi versentur in viridariis, in paradiso, ibique hilariter & jucundissime vivant.

Contrarium fit in nobis Occidentalibus & Septentrionalibus, in his enim opiata frequentius usurpata, familiare narcotica inducunt somnia horrenda, quasi vexarentur à dæmone, quasi vulnerentur & versentur in jurgiis.

Hinc etiam Hyoscyanus ridiculum infert delirium.

Sic Borellus cent. 3. obser. 45. refert quandam rusticum cum sua familia ex esù radicis Hyosciami totum fuisse lamentatum, ita ut quasi istius varias gesticulas & ridiculas actiones perageret.

Pertinet huc vis narcotica nucis Metellæ de qua Bartholetus tract. elegant. de respirat. lib. 4. cap. 3. pag. 405. Quod nempe nucis metellæ semen ad certum pondus datum lætam afferat stultitiam, cum risu, cum jucunda animi hilaritate, & cum insigni liberalitate, ita ut qui sumpserit istud semen liberalissimi omnia sua dare & offerat, omnia occulta promulgeat, & omnia delicta profiteatur, & omnibus jussis obsecundet: E contra semen & cortex hyosciami peruviani eodem auctore referente delirium facit ecstasticum, quo delirantes putant se versare in viridariis in conversatione angelorum: E contra semen hyosciami nigri infert delirium cum jurgiis & contumeliis: & semen solatri majoris dat delirium, quo se à dæmonibus vexari & à serpentibus ac satellitibus malè tractari existimant.

Similia verò non inelegantia leguntur in Doringii tract. de opio ejusque virtute, ubi inter alia pag. 72. observat artificialem dementiam quandam, qua ægri putant se naufragium pati.

Sicuti idem Doring. cit. loc. pag. 79. observat. dementiam similiter ex medicamento, quo ægri primò hilares, hinc iracundi, tandem admodum mœsti fiunt: adeo determinata deliria vegetabilia inferre solent, determinando certo modo spiritus.

Præter vegetabilia etiam animalia certa & determinata inferunt deliria, imprimis animalia nobis dicta venenata, & hinc etiam animalia rabida: Notum enim est, quod in cane rabido demorsu ex delirio in mores caninos transformantur: sicuti iidem semper hydrophobia siue insigni omnium liquidorum & aquarum metu corripiuntur.

Præterea notus est Tarantismus quando à Tarantulis demorsu ad Tarantularum gestus & ad musicam determinantur, & telarum texturam & similia exactè imitantur, ut in delirio. Nota etiam est rabies felina, dum quidam esitantes de felibus, rabiosi exinde & delirantes fiunt,

ut instar felium unguibus se lacerent & morficando invicem congregiantur. Huc similiter lupina & suilla rabies pertinet, quorum esu homines similiter in talia deliria feruntur.

Pertinent huc Philtrea tam vera quàm falsa. Falsa, hæc enim ipsa sæpius maniam inferunt & furorem. Vera habent simul vim determinandi spiritus animales, ut ferantur in determinatam personam sua inclinatione. De quo veri philtrea parandi modo per munus naturalis conformationem cum certo subjecto & hinc transplantationem suo loco plura. Ab his ergo externis certo modo determinantur spiritus animales, ut exinde anima rationalis tam deliros format conceptus, ut antea dixi.

Quod quomodo fiat certo nondum constat: Cum nulla adhuc constet opinio, quæ animum scrupulosum simulque veritatis avidum possit exfatigare.

Præ cæteris equidem ideæ ab Helmontio aut Marco marci tract. de Ideis operatricibus, item tract. de Philosoph. restituta, hæc inquam, ideæ rem equidem illustrant, & prima fronte maxima probabilitate nobis imponere solent: sed tamen si exactè paulò ad rectæ rationis trutinam examinentur, & ad primarios usus fundamentales vera fiat inquisitio; si etiam paulatim in nosmetipsos faciamus reflexionem, ut possimus concipere quid & quale sit, & quomodo operari possit talis entitas idealis seu intentionalis & immaterialis sub compage materię, & quomodo hæc ipsa aut involui aut evolui possit: Certus sum, quod tunc omnis ista Idealis imaginatio instar fumi seu variz cujusdam ideæ subito sit transpinitura & evanitura.

Hinc est quod multi curiosi & exercitati naturæ scrutatores, quos inter meritò refero nonnullos Anglos, & hos inter Dn. Boyle, non sine nominis honore nominandum, maximi æstimat & admiratur Helmontium, ubi in praxeos & philosophiæ materialis terminis se continet: Ubi verò in extravagantias ideales prorumpit, ejusdem somniis, quidem indulgendum, non verò inhærendum arbitrantur. Et quidem fundamentum istius opinionis & quò subinde probat existentiam suam idealem Helmont. desumptum est à formatione fœtus in utero ejusque per imaginationem maternam transformationes: hoc ipso tamen obscurum per æque obscurum declarare nititur, obscurum enim magis formationis & transformationis fœtus per maternam imaginationem est negotium, quam tota superstructura idearum doctrina adeo ut obscuro per æque obscurum declaratio non satisfacere possit nobis. Hæc de delirio à causa externa in genere.

Ea deliria quæ sunt à causa interna, & ipsa pro somnitiis interni varietate sunt varia & diversa, prout diversimodè spiritus afficiuntur. Quomodo autem talia vitia interna possint determinare spiritus ad certum quoddam delirium, declarabo itidem per exemplum.

Nam consideretis semen surgescens in vasculis & vesiculis seminalibus ibique titillationem suavem excitans, determinat istud semen spiritus ut exinde fiant somnia venerea, quibus somniando imaginamur nos venerem cum formosis puellis exercere, indeque etiam seminis excre-



cretio seu pollutio nocturna ordinario succedit.

Optime huc facit hoc exemplum: ut enim semen turgescens titillando infert somnium verum, ita etiam similiter modo series vitiole, vel alia quæcunque causa interna determinando spiritus infert deliria certa.

Nam recte in somniantibus insomnia dicuntur dormientium deliria: sicuti contra vigilantium deliria recte dicuntur vigilantium insomnia, cum tale quid patiantur delirantes, quod patiuntur somniantes.

Unde etiam delirantes interdum recordantur eorum, interdum non recordantur, quæ sub delirio fecerunt, non secus atque sit interdum cum somniis paulo profundioribus. Qui recte novit declarare naturam, & fendi modum somniorum, hic ipse etiam manifestatam habebit Theoriam deliriorum; illud exemplum de pollutione nocturna curioso potest adimplere an alius meditando in somniorum & deliriorum naturam.

Quo etiam pertinet Delirium dictum Furor uterius, cum alias notum sit quod somnia naturali ordine soleant insequi temperaturam ut vocant, sive naturalem corporis crasin.

Hæc quoad generalia Deliria; Quæ ab interna oriuntur causa sunt varia. Et 1. quidem sunt vel cum febre vel sine febre. Delirium cum febre aut est levius aut est gravius. Illud delirium simplex alias etiam Paraphrenitis appellatur, hoc vero nempe gravius ordinaria appellatione, nomine phrenitidis addit, eamque phrenitidem ex inflammatione membranarum cerebri oriri vulgo æstimant. De hac phrenitide ita explicata jam superius monui, quod nempe proprie secundum primos auctores medicina diaphragmatis inflammationem innuat: 1. Quod idem inflammatio cerebri, usque membranarum vocata fuerit sphacelus, malum ut rarum, ita ut plurimum funestum & lethale. Verum cum loquendum sit cum vulgo, sentiendum autem cum paucis, ob id & nos non neglecta veritate phrenitidis vulgari modo acceptum nomen usurpabimus, idque imprimis quia ratione medendi methodi, & in diaphragmatis inflammatione, & in sphacelo cerebri eadem sit curandi ratio, quæ in vulgo sic dicta phrenitide.

Causa ergo tam levioris quam gravioris universalis delirii sive phrenitidis est, spirituum varius & confusus in cerebro motus, cuius occasione (dico occasione) varia & in variis coherencia & diversa phantasmata ab anima efformantur, quorum index & nuncius sunt inconditi sermones, risus aut fletus, flosculorum qui nusquam sunt, collectiones, vigilæ, jectigationes, muscularum insolitæ venationes & varix artuum motiones, donec aucto & nimis impetuoso spirituum reddito motu, tandem convulsionem sæpe lethales superveniant, aut donec spiritibus tantum non absumptis, vel incendio narcoticorum univertatis phrenitis in lethargum mutetur, vel in affectum caroticum potius.

Causa remota inconditæ istius spirituum agitationis in cerebro est nimia cerebri incalescentia ob effervescentiam insignem massæ sanguinis, unde subtiliores & fervidiores redditi spiritus, agilius quidem, sed simul confusius & pertur-

batiùs in cerebro moventur, unde prius vigilæ pertinaces hinc phrenitides, tandem convulsionem oriuntur.

Unde etiam in incremento febrium continuarum, aut in principio statim ipsius status, febri ardentium & continuarum imprimis delirium affligere solet, ubi nempe maxima est sanguinis effervescencia.

Ubi enim in principio morbi absque insigniori febrili sanguinis effervescencia vigilæ pertinaces cum leviori delirio se manifestare volunt, malignitatis anguis latet sub herba, & causa maligna perturbationis spirituum motus solet esse origo: uti fit in peste & aliis morbis malignis, quod probe observetur pro praxi. Interdum vero illud inflammationi cerebri, vel membranarum inflammationi, vel saltem cum inflammatione corticis cerebri est conjunctum.

Exempla talia subinde prostant & reperta sunt post apertionem cadaverum phrenitide mortuorum: Sic enim Rhodius cent. 1. obi. 39. phreniticum biduo extinctum, in cuius capite aperto cerebrum & membrana ejus cum intenso rubore adeo tumebant, ut facile vena ab ipsius substantia potuerint separari. Sic etiam Nicolaus Fontanus in Analectis cap. 2. Ubi nempe phrenitide mortuum refert, in cuius resecto cranio cerebrum ubique maculis sanguineis conspersum & meningis, in specie pia mater tumida admodum & sanguine nigrescente turgida visa fuit, & insigniores ejusdem rami per cranium dispersi sanguine congruato tumidi reperti fuerunt.

Et tales inflammationes membranarum cerebri imprimis corticis ejus tunc adsunt, quando per metastasin materia sit phrenitis, id est, quando post erysipelas externum aut post pleuritidem sive peripneumoniam aut post uginam subito curatam sequitur phrenitis: Signum enim tunc est sanguinem coagulatum in istis partium inflammationibus solutum denuo hæere in membranis cerebri, aut ipso cerebro, & ibidem novam inducere inflammationem. Unde interdum in phrenitide adest inflammatio cerebri & membranarum, non tamen semper.

Causas quod attinet remotiores, certum est quod *aras juvenilis, ær æstivus & usus potuum generosorum* in specie vini admodum promptos nos reddat ad phrenitides, uti videmus in ebriosis.

Exempla sanè prostant ubivis ex abusu vini Juvenum correptorum phrenitide: quia & excretionem sanguinis suppressa, uti febres ita etiam stagnationem sanguinis postmodum in cerebro inducunt: Qua ratione ex insufficienti puerperii seu lochiorum purgatione phrenitidem abortam in puerpera refert *Morison lib. 2. observ. 25. & cit. loc. observ. 26. ex retentione hæmorrhoidum* abortam phrenitidem recenset. Affectus animi graviores, quos inter primum obtinet ira quæ admodum nos disponit ad febres, & hinc ad phrenitidem. Nam ipsa ira quasi est parva febris naturalis, dum in ira sanguis effervescit circa præcordia, unde corpus caler, facies rubore tincta perspicuo, pulsus est frequentior & major ex aucta sanguinis fermentatione. Unde non mirum si superveniat febris & phrenitis.



Febres malignæ etiam uti monui, sæpius conjunctas habent phrenitides; & quidem hæ phrenitides in febribus malignis superveniunt citra insignem sanguinis effervescentiam & corporis incalescentiam: Unde & sæpius in principio Medicus talia deliria observat, ne perditos reddat ægros.

Differentias quod attinet omne delirium in febribus, quo etiam fuerit phrenitis, vel est ridiculum, vel serium. Ridiculum est, quando ægri varia, absurda, incondita & minus coherrentia cum quadam hilaritate interdum cum risu &c. proferunt. Serium verò delirium est, quando ægri quasi aliquantisper irati cum impetu & quodam furore proferunt varia & incondita, & interdum tam inscii quam excogitando in varios sermones prouunt.

Quæ differentia observatur propter Hippocratem, qui dicit, quod deliria ridicula sint tutiora & minus mala, quam deliria seria aut cum jurgis.

#### *Quoad Signa.*

1. Quidem in febribus necesse est ut delirium imminens præcognoscatur, ut possimus præcavere. Et quidem imminens delirium fere solet facile cognosci ex quadam garrulitate & nimia loquendi promptitudine, item ex mutatione morum, si nempe is qui alias mitis est sit nonnihil ferox & temerarius: item fiunt nonnihil proclives ad iram: Item si is, qui alias est taciturnus, fiat loquax, si corpus indecore moveat, aut etiam corpus denudet, si eorum quæ legit vel locutus fuit, subito obliuiscatur: si eundem sermonem sæpius citra rationem repetat. Item si vigilæ pertinares adsint aut saltem somnus admodum turbulentus præcesserit. In talibus casibus delirium imminere patet, id quod imprudens confirmant oculi: sic enim si fiant aliquantisper mobiliiores solito, si fiant splendidiore & quasi fulgidi, si fiant instabiles, tunc metus est non leve imminere Delirium. Ipsum delirium præsens facile cognoscitur ex inconditis sermonibus, variis actionibus ex quibus facile præsens vel adstans deliramentum vel delirium agnoscitur.

Porrò an in vera phrenitide revera adsit inflammatio Diaphragmatis aut inflammatio cerebri & membranarum, an vero tantummodo incalescentia indeque natus fervor spirituum ex sequentibus agnoscitur: quod nempe immanis dolor adsit in phrenitide in qua est inflammatio cerebri: nam ex natura partis facile patet, quod dolor sit vehementissimus, cum dura mater cerebri simul sit affecta, quæ est sensibilissima. Unde est quod tales phrenetici soleant avellere capillos, inscii tamen propter immanem & acutissimum dolorem, quem percipiunt. Item perpetuo manus capiti admovent, & vario aut quasi furioso motu caput agitant.

Dolores ergo adsunt acerbissimi in inflammatione cerebri & membranarum: Unde est adeò brevis affectus cum non possit durare propter insignem dissipationem spirituum. Accedunt præterea interdum convulsiones, idque quando inflammatio cerebri incipit in gangranam abire, nam omnis inflammationis finis

est gangrena. Deinde in tali casu pulsatio adeit vehementissima, de qua ante delirium conqueruntur ægri, quæ quanta sit percipitur, si attente conspiciatur collum, ibi enim arteriæ carotides quam in petuolissime pulsant propter sanguinem influentem & ob inflammationem in cerebro stagnantem: Unde etiam Hippocrates arteriam pulsantem in temporibus prænuncium æstimat phrenitidis imminens.

#### *Quod attinet Prognosin.*

Phrenitis omnis malum est periculosum & auctum. Majus tamen periculosum: in qua inflammata sunt membrana & ipsum cerebrum, minus periculosum quando est spirituum tantum fervor & sanguinis incalescentia. Si vires sint languida: in phrenitide ut plurimum moriuntur ægri.

Quod si accedant phrenitidi convulsiones, linguæ aphonía, aut singultus, aut dentium stridor, aut vox tremula item fecum & urinæ inscia dejectio, hæc phrenitidem lethalem indicant. Phrenitis si vertatur in lethargum aut affectum comatosum ut plurimum est lethalis.

Observeur autem quod-quædam deliria in febribus phreniticis vel paraphreniticis sint interdum critica. Probe ergo sunt distinguenda deliria febrium critica a symptomaticis, propterea quoniam symptomatica necesse est curet Medicus: Criticum vero delirium omnino intactum est sinendum.

*Signa ergo Delirii critici*, quod ut plurimum sequitur Hæmorrhagia narium sunt sequentia. Si coctionis signa appareant in urina & pulsus sit inæqualis, sit nonnihil magnus, & nonnihil validus: item si tranquillitas quædam in symptomatibus sit in ægro: si ex oculis splendores videantur elici, si delirium superveniat à subito nata cephalalgia, si nares pruriant, si facies rubeat & adsit tensio mollis hypochondriorum, ætas sit Juvenilis & forsitan alias æger consuetus sit excernere per nares sanguinem; In tali delirio caveat Medicus, ne illud solvere conetur, quia est criticum, salutare, adeoque naturæ motus: Quod delirium Criticum uti dixi hæmorrhagia narium ut plurimum sequitur: & tale delirium est salutare & saluberimum, reliqua symptomatica semper sunt suspecta.

#### *Quod attinet curam.*

In Cura sanguinis & hinc spirituum fervor temperandus, imprimis sanguinem evacuando; 2. Effervescencia sanguinis febrilis est compescenda, & 3. spirituum turbatus motus ingentibus nonnihil tam internis quam externis sistendus. Hoc ut fiat observeur, quod sibi debeat cavere Medicus imprimis Junior; ne ad ebrium vocatus, cum morbi deliroso curationem instituat, uti aliquando observatum fuit factum fuisse ab incautis Medicis, ne hac occasione se risui exponant ignaro popello.

Deinde cum iis adjunctus sit sæpius somnus deficiens sive Agrypnia, quæ delirio admodum favet, subinde Hypnoticis blande & etiam narcoticis agemus, idque tam in medicamentis internis quam externis. Cautè autem usurpentur internè omnia talia in specie opiata.

Nam



Nam si opiata non sitant spiritus & eorum motum compeſcant potiùs delirium gravius reddunt, cum ipſum opium ſomnia inducat turbulenta & truculenta.

Sin vero Narcoticis ſpiritus nimium ſigas, metus eſt, ne ægrum ſopiendo, tandem non poſſis amplius exſulcitare, aut metus eſt ne per opiata phrenitidem in lethargum mutes. Cum enim ſpiritus in phrenitide ſint admodum volatiles & ſubtiles, & ſimul propter motum continuum auctum pauci, ob id facile ex Narcoticorum doſi aucta permutari in lethargum ſive carum poteſt, quæ mutatio eſt periculouſſima.

Certum eſt, quod Narcotica & opiata legitime adhibita ſint magna remedia & optime in phrenitide febrili commendantur. Verum ſi tempore non opportuno aut non legitime parata adhibentur plus nocent quàm proſunt.

In eorum ergo uſu obſervetur 1. Quod ſint legitime præparanda in febris quidem imprimis per acida ut acetum. 2. Ratione temporis adhibeantur opiata non nimis tardè, ſed imprimis in incremento morbi ubi incipit æger vigilare: Melius enim eſt tempore vigiliarum quàm delirii adhibere Narcotica. 3. Ut his opiatis ſemper adjungantur Bezoardica & Diaphoretica.

Non tantum quod in phrenitide ſæpius ſubſit malignitas, ſed etiam quia blanda diaphoreſi concitata efferveſcentia ſanguinis febrilis inſiguitur placetur & mitigetur. Unde etiam per conſequens talibus ipſa phrenitis non raro tollitur. Ante omnia mox Ven. ſect. inſtituenda, quo citius eò melius. Nam ſi erit febris ardens phrenetica abſque malignitate, optime convenit hæc ipſa, aut licet adſit malignitas, tamen in principio primo ſine tanto periculo poteſt ſecari vena.

Larga autem ſit ven. ſect. Auctore Lindano, quid reſert ſuum parentem cum D. Tulpio Viro cuidam phrenetico uno die 3xxxvi. ſanguinis emiſſiſſe, tertio die totidem, & quarto die 3xxv.

Sic enim inquit: Medicus, ubi adeſt furor morbi, Medicum ſe præſtare debet. Verum in ipſa ven. ſect. quoad locum eſt notandum, quod ſi forſan præceſſerit ſuppreſſa quædam ſanguinis evacuatio, ut in puerperis, in partibus inferioribus in talo, & poſtmodum in brachio ſecanda vena.

2. Quod tempore ven. ſect. Medicus mittat manum ſuper caput ægri, ut ex pulſu agnoſcatur, quando forſan ſufficiens ſit ſanguinis evacuatio: item ut ex pulſu agnoſcat an æger ſit animo deſecturus.

3. Ubi æger minus fert ſanguinis evacuationem, in ipſa evacuatione ſubinde digito obturandum eſt Foramen denuò aperiendum, & denuò obturandum, donec ſufficiens ſanguinis quantitas ſit extravafa, ſic enim cum meliori euphoria, & minori ægri debilitate ſanguis evacuetur.

In topicis ſive externis utur aliquantisper acetum addere ſit conveniens, tamen multum ejus non addendum quoniam Vigiliæ & Agrypnias auget. Unde etiam nimis gravia odorata in externis ſunt vitanda, ne talibus volatilibus augeatur phrenitis propter continuam ſpiritus inſitationem.

Medicamenta ergo quæ conveniunt in cura deliriorum, ſive etiam ipſa phrenitide, prætereâ

quæ in febris ardentibus externè & internè conveniunt, ſpeciale ſpecincum eſt Anagallis flore Phæniceo de qua vide Gabelchov. cent. 6. cur. 13. qui in febris phreneticis & paraphreneticis experientia frequenti compertum habet decoctum Anagallidis flore rubeo: Præcipit. ut Mij. Anagallidis hujus decoquantur in vino & aq. an. mentura 3 ad conſumptionem tertiæ partis: de quo decocto mane & vespèri detur bonus hauſtus, ſimulque fiat ex iſta planta ſacculus ſimiliter in prædicto decocto humectandus, & ita futura coronali extrinſecus applicandus.

Conſirmit hoc Hildeſheim in ſuo ſpicilegio, qui ad deliria febrilia & phrenetica commendat hoc decoctum.

2. Herba anagallidis (ſol. & flor.) Mij. coronarum capit. papav. alb. nu. 20. Hæc invicem coquenda dicit in 3xvj. vini malvatici & Rhe. nam ad caſum 3vj. colaturam forti expreſſione trajicit, & pro duabus vicibus hauriendam propinat in ſpicileg. 2. p. 190. Poſt anagallidem eſt lactuca, Nymphaea, ſedum majus, item ſemina 4. frigid. major. & exinde paratæ emulſiones: Succus ſubacidi granatorum, ribium & berberum. Porro ſerum lactis, & cum eodem parati julepi. It. 2q. Anagallidis, aq. verbenz, aq. Nymphaez, papaver erraticum, & omnia ex eodem remedia. Item ſpiritus acidi minerales in ſpecie ſpiritus nitr. dulcis & ſpiritus ſal. dulcis, Camphora interne cum aliis commodè propinatur.

Hæc enim licet ſit ſubtiliſſimum, & penetrantiſſimum remedium, tamen virtute quadam occulta ſpirituum fixativa & narcotica pollet, & tamen hæc camphora, mirum eſt, quantum ad curandam phrenitidem cum aliis externe & interne conveniat. Externe in epithematis: Interne in potibus ſomniferis (NB. obſervetur, quod non præſcribenda ſit integra opii doſis, quando ſimul præſcribitur camphora, quod ego ita ſemper obſervo) Saccharum Saturni & Medicamenta ſimilia ſaturnina ſimiliter commendantur ad phrenitidem.

Item miſtura ſimplex: Tinctura Bezoardica: uti etiam nitrum antimoniatum potui ordinario injectum. Verum primatum obtinent legitime applicata opiata, v. gr. Syrupus de papavere albo, qui eſt magis uſitatus quàm de papavere nigro; Emulſio ſem. papav. albi, cum aliis opium, & laudanum opiatum.

Bartholetus non immerito commendat eſſent. opii cum ſpir. vitriol. vol. paratam. Veteres in uſu habuerunt Philonium Romanum, Diacordia, requiem Nicolai, & ſimiles: Horſtius aliquando curavit phreneticum poſt vini generoſioris abuſum per potionem narcoticam die 6. uti reſert lib. 2. obſ. 12.

Item Fontanus in cur. & reſp. l. 2. p. 20. reſert juvenem 22. ann. qui poſt univerſalia remedia per 3j. Philonii Romani fuit curatus. Inter externa commendatur admodum cataplaſma exportulaca, ſempervivo, & roſis capiti circumligatum, cui etiam nonnulli addunt Nymphaeam, chamomillam & melilotum.

Bartholetus commendat in phrenitide, carnem cucurbitæ cuſam & raſo capiti impositam. Quæ præter omnem ſpem deſperatus phreneticus fuit curatus: quo etiam fuit obſervatio Borelli cent. 4. obſ. 24. de ruſtico, qui alterum phreneticum per taleolas cucurbitæ capiti impositas curavit:

Con-



Confirmant etiam hæc quæ habet Gabelchovius supra cit. loco cent. 3. cur. 23. in Scholio, quod scil. si excavetur cucurbita per medium dissecta, & in eandem immittantur pedes ægri ad tempus, idque subinde repetatur, tollat insigniter & fervorem febrilem, & etiâ ipsum delirium phreneticum. Sedum majus contusum & instar cataplasmati cum aceto plantis pedum applicatum etiam conducit, quin etiam solum syncipiti admotum blande demulcet delirium, sed detrahendum est cataplasma, quando incipit dormire æger. Epithema fronti admovendum conducit ex malliche & myrrha cum linctur. Santali. Vide descriptionem in praxi Riveriana, pag. 117. decoctum radicis Mandragoræ & Hyoscyami cum similibus externe applicatum tepide fronti, commendatur ceu expertum à Zacuto Lusitano.

Egregius est succus cancr. fluv. Virorum expressus qui ad imitationem Rulandi fronti applicatus mirifice confert: Sicuti idem Rulandus sequens epithema cum linteis duplicatis utiliter admovent.

℞. Aqu. rosarum ʒ x. opii ʒ j. croci ʒ β.

Hoc ipsum cum linteis duplicatis admovent tepide fronti. Nam sic blando conciliato somno mens redit.

*Bartholinus* commendat usum aq. spermatis ranarum extrinsecus applicatum (& credo quod sit potens remedium) Potentius est si misceatur, cum succo cancror. fluv. & fiat tale epithema ad imitationem Rulandi quod credo non futurum inelegans.

℞. Aq. Sperm. ranar. ʒ viii. succi cancr. fluv. contusor. expressi ʒ ij. opii, acet. correcti ʒ β. ad ʒ ij. camphoræ ʒ β. croci ʒ β. M. pro epithemate.

Veteribus in usu fuerunt animalcula viva, anates & palumbes per medium dissecta & calentia syncipiti aut toti capiti raso applicata. Nihilominus tamen apud nos in desuetudinem abierunt. Lindanus interim dicit hoc remedium esse inextimabile ad curandos phreneticos: qui curat phreneticos sanguinem primum mittendo, hunc propinando sub noctem ʒ ij. syr. papav. & hunc adhibet columbam viventem, vel gallum viventem, vel catellum viventem, quæ animalcula secatur per pectus, & statim cum omniibus intertaneis ita applicat capiti si fieri potest raso.

Et ita applicato animalculo imponuntur lintea vel culcitæ, nè subito cesset omnis calor, mirum dicit quantum juvent hæc animalcula: remoto uno, post hoc subito applicetur aliud, idque aliquoties.

Nam sic statim & dolor remittit, & ipsum delirium nonnihil imminuitur. Dicit si per horam relinquatur, & postmodum removeatur, sit horrendus fœtor in animali applicato, ut necesse sit subito immergere in aquas propter fœtorem intensissimum.

Præter hæc & similia observanda sunt ea, quæ conveniunt in febribus ardentibus. Fit interdum ut phrenetici non percipientes urinæ stimulum continuo eandem retineant, non absque nocumento.

In tali casu impositæ perinæ cepæ costæ cum pinguedine anserina urin. provocant. Aut.

℞. Fol. parietariæ Mij. herb. petroselini cum rad. Mj. Fiat decoctio: decocto addatur ole. scorpion. ʒ ij. & ita hat. Fetus pro pube.

Dabo exemplum pulveris propinandi in phrenitide maligna.

℞. Cinnab. antimonij gran. xii. bezoard. lunaris gran. vj. laudani opiatî can. phoræ gr. j. M. dentur in dupl.

Quod propinari potest in decocto Anagallidis vel in aqu. Anagallidis aut in emulsiōne tenui seminis papaveris albi, paratæ cum aqu. Anagallidis, Nymphetæ, Hyperici & similibus. Præterea nunc conveniunt julepi acidi, dum effervescentiam sanguinis compescunt, quibus adduntur pro alvo referenda, si adsit ejus obstructio, pulpa Tamarindorum, quæ laxat blandè, & simul sanguinis effervescentiam compescit. *Mich. Euthymus in Colleg. Practic.*

Cum imaginatio, & æstimatio depravatur, Delirium accidit, quod dicitur Declinatio à recta Rationis semita, unde ægri absurda, & incongrua loquuntur, aut imaginantur.

Deliriorum Medici constituunt idiopathicum unum, sympathicum alterum, & quidem ab hypochondriis, diaphragmate, utero, aliisque partibus. Aliud sine febre; aliud cum febre. Atque ex his Phrenitidem, Maniam, Melancholiam, à diversis etiam humoribus deducunt: de quibus sigillatim.

#### De Phrenitide.

Phrenitidem intelligunt Galenici Delirium perpetuum, & continens cum febre acuta, & continua; quod ab inflammatione cerebri, & membranarum ejus à sanguine bilioso ibidem putrescente oriri arbitrantur.

Quoniam autem in quocumque delirio potissimum in phrenitide animales operationes, nempe imaginatio, & ratiocinatio depravantur, ab illarum læsione tres deducunt phrenitidis species ex Galeno tum *lib. de diff. sympt. c. 3. tum 4. de loc. aff. c. 2.* Aliquando depravari dicitur Imaginatio sana Ratiocinatione, ut in Theophilo Medico qui putabat Tubicines esse in angulo domus, eosque tamquam sibi molestos esse ejiciendos. Simile quid fateretur Galenus sibi accidisse *4. de loc. aff. cap. 2.* evellendo floccos, & colligendo festucas. Interdum vero dicitur offendi Ratiocinatio illa sine imaginatione, ut in eo, qui singula vasa rectissime nominans, illa tamen projecit, ut & puerum, quem adstantes confractum sustulerunt. Nonnunquam etiam utraque lædi solet; quin & memoratrix quoque, ut ex Thucydide refert idem Galenus *civ. lib. de sympt. diff.* quod a Peste Athenis grassata evasi omnium immemores remanserunt, etiam suorum nominum. Contingit quoque frequenter Phreneticos memoriâ deficere, cum non raro obliviscantur egisse quæ gesta sunt, & quàm anxie cupidissimeque petierunt aquam bibere.

At impossibile existimat Eustachius Rudius, illas à ratiocinatione imaginationem lædi posse: quod & Nos aliàs innuimus; cum hanc illa persuscepta phantasmata, quo modo apprehensa sunt, necessariò prosequatur. Unde Theophilus ille Medicus assererat esse abjiciendos Tubicines, quia imaginabatur illos adesse in angulo domus



domus. Tunc enim Ratiocinatrix facultas sana dici deberet, cum corrigeret, non sequeretur errorem imaginatricis.

Ab inflammatione præterea cerebri, & membranarum ejus Phrenitidem minime oriri Anatomicis observationibus ostendit Thomas Willisius, qui se pluries vidisse fatetur Meninges, imò & cerebri exteriorem amittum tumore phlegmonode obsessas, laborantes vero minime phrenesi, at potius torpore, & Caro peritille. Adnotarunt etiam Sennertus, Heurnius, Valsæsius, Volcherus Coiter, alique cerebrum inflammatum cum membranis absque delirio: & phrenitidem absque illius inflammatione.

Neque insuper perpetuo lepti transversæ phlegmonen comitatur delirium illud sympathicum, quod Paraphrenitis appellatur: Nam aliquando conspectum est Diaphragma citra delirium fuisse affectum, ut ex dissectis cadaveribus idem Willisius deducit. Quod autem diaphragmatis viscus nervis plurimis refertum sit, adeoque maximum consensum ineat cum cerebro, haud congruenter evincit Phrenitidem subsequi cum ipsam inflammatur: etenim stomacho, pleurâ, mesenterio, phlegmone obsitis, phrenitis plerumque non succedit, quæ tamen sapissime corripit peripneumonia, & hepaticæ laborantes, quare cujuscumque visceris inflammationem sequi potest.

Causam Phrenitidis quæsit Helmontius in duumviratu, præsertim vero in stomacho ex Hippocrate dicente: *Cui vena in hypochondrio fortiter pulsât, is mox mente alienatur.* Et Neoterici in spiritibus animalibus collocarunt, vel nimium irritatis, vel in confusionem actis. Unde verisimilius est, inquit Willisius, Phrenitidem à spirituum phlogosi potius, quàm à Meningum, aut cerebri inflammatione, quæ cephalam aut lethargum certius quàm furorem inferrent excitari.

Verum in Phreniticorum cerebro credere licet tantam vaporum, qui in liquorem nerveum commutantur, copiam acritate præditam aduari, ut nedum motione plurima, & irregulari per ejusdem cerebri poros, & nervorum substantiam concitetur, undè phantasmata varia, & confusa cum impetu, & vigilia; verum etiam confluxu vehementi, sensus externi, licet depravate, acuantur, & motus animales musculorum roborentur, ut vix detineri queant. Universus namque sanguis, qui ad cerebrum fortè laxius defertur, plus justo in auras abit, totusque in liquorem nervorum & quidem tenuiorem, maximeque volatilem, permeabilemque, commigrat; undè Phrenitici, quamvis deficient viribus vitalibus, animalibus tamen plurimum valent. Porro hbræ nervorum, & musculorum motui dicatur, ejusmodi liquore tumida, nimium vigent, & firmiter tenduntur; multoque magis in Maniacis, quibus febris deest. Quoniam vero vapor iste nerveus acritudine præditus est, & immoderanter, violenterque in nervos, musculosque adigitur, trepidi, & temulentorum ad instar Phrenetici in tanto robore esse solent.

Proximam itaque causam hujus affectus in liquore iste nervorum constituendam opinor, qui tenuior, & acrior evadat à sanguine in cerebrum confluyente pari conditione, vel vitio sui,

vel vitio viscerum, affectio: quemadmodum in febribus acutissimis, & ardentibus, atque in internis inflammationibus, & affectionibus hysterics. Atque hinc contingit, aliquando delirium heri interruptum, cum scilicet ad tempus solummodo liquor nervorum inticitur.

Congruunt his, quas Practici ex observationibus Anatomicis plurimas memorant paraphrosynes, & phrenitide, ortas a retrocedente erysipellate, a tero, a felle cystis acriori, ab inflammatione ventriculi, & pulmonum, à varicibus meningum, à disruptis abscessibus, à venenis, præsertim solano furioso, mandragorâ, & radice pastinacæ sylvestris, ex cujus usu lepidam historiam narrat Willisius *hoc loco*.

Notissima sunt signa Phrenitidis, & cujusvis delirii præsentis, cum gestibus, tum verbis parum consonis. Imminentis verò recensentur nimia garrulitas, immodica vigilia, somnia perturbata, oculorum rubor, & turgor, motusque inordinatus, præteritarum rerum oblivio, responsio ferox, loriorum, quæ prius crassa erant, tenuitas & perspicuitas, decubitus incompositus, oblocutio inter dormiendum, aurium tinnitus, linguæ ariditas absque siti, torvus, & immobilis obtutus. De reliquo sympathicum & interruptum delirium facile ex superius dictis internoscetur.

Undecumque autem illa semper periculosissima est; longè vero gravior censenda, si dejectiones decolores, & urinz aqueæ appareant: nares modicum sanguinem stillent: pus erumpat: dentium stridor accidat cum maxillarum, & temporum convulsione: itemque singultus, tremor, aphonía, vomitus: si in veterum commutetur, vel in delipientiam Hippocrati obscuram dictam. *A Peripneumonia quoque inflammatio cerebri, malum, 7. Aph. 12.* Copioso autem sudore, urinz profluvio, & naribus hæmorrhagia, & quandoque etiam alvi fluxu, dummodo vires consent, salubriter terminari consuevit.

Cum ferè communiter hæc ægritudo putetur sequi viscerum inflammationem, proinde ad hanc tollendam illius curatio dirigitur: Et quidem venæsectione iteratâ, mox à principio repellentibus oxyrhodinis, cum decocto foliorum lactucæ, rosarum punicarum, violarum, capitum papaverum alborum, florum nymphææ, pariterque cucurbitulis, frictionibus, clysteris, & lenientibus pharmacis: postmodum somnum conciliantibus, tum internis ex opio, tum externis ex lotionibus, & linimentis capiti, & pedibus adhibendis ex medicamentis hypnoticis; itemque applicitis ranis, gallo, aut catello per medium sectis supra suturam; institutâ interim diatâ refrigerante, humectanteque; detentoque patiente aut in tenebris, aut in luce, pro varia ejusdem conditione, & virium robore, ut admonet Celsus. *lib. 3. cap. 18.* Strepitus verò, & animi, ac corporis motus omnino prohibendo.

At Phrenitidem à septo transverso curandam proponit Hippocrates per ea quæ tussim, & spiritum promovent ut in Peripneumonia. Alterius etiam delirii meminit in virginibus, de quo tamen alibi.

Hermeticis præter venæsectionem, & cucurbitulas scarificatas, sunt quoque in usu irrigationes supra suturam coronalem, & pedum lotiones cum herbis soporiferis, necnon linimenta  
Eccc hypnoti-



hypnotica, & purgantia leviora, ac opiata, moderate tamen exhibita. His non suffragantibus, consult Paracelsus cranium esse terebrandum, ac foramen per mensem patulum esse detinendum. Hac enim ratione, inquit, quamcunque amentiam certissime curari. Vult etiam Cardilucius præter suum præcipitatum aureum, cunctis impensè commendatum succum nasturtii hortenlis, vel aquatici, mistum cum tertia, quarta, vel quinta parte aceti acerrimi, ac pugillo salis communis decrepitati, additoque oleo olivarum in affectibus pectoris: cujus misturæ cochlearia duo in singulas horas assumenda præcipit, atque ita etiam interna apostemata dirumpi, febresque omnis generis, præsertim verò intermittentes, cum ingruunt paroxysmi, omnino fugari fatetur ut raro quartum repetere opus sit. Aliam hujus morbi curandi rationem memorat ex Carrichtero, quam apud eundem legere est. ●

Helmontio sicuti ceteræ ægriitudines cerebri, ita & deliria, remediis eustomachis, non cephalicis, curantur, præmissis tamen vomitum promoventibus, præsertim ex helleboro. At verò P. Jo. Faber potius diureticis, & humores deducentibus insilit, inter quæ potissimum magnificat suum tartarum vitriolatum, & liquorem Mercurii acidum, quem summum arcanum adversus Phrenitidem fatetur.

Antiphrenitica demum recensentur saccharum, & spiritus saturni, Bezoardicum lunare, liquor Margaritarum, qui mirificus celebratur ad compescendum sanguinis fervorem, ferturque aliquot illius guttis vini spiritum ligi & coagulari. Magnæ etiam existimatur virtutis essentia florum hyperici, eorumque extractum in decocto glomorum cynosbati. Ac postremo opium, & quodcunque ex opio conficitur, ad somnum conciliandum, quoniam in deliriis nil somno conducibilius. Quare Zacutus in *prax. hist.* pilulas componit ex opii gr. v. croci gr. iv. & castor. gr. ij. atque in jure, aliove liquore per intervalla exhibet. Verum enim verò opiatarum usum vituperat Helmontius in amentis, cum omne opiatarum ipsi dicatur esse in se amens, & amentia nil aliud, quam somnium vigilans: inesse præterea opio monet, præter soporiferum, aliud virus, quo amentes acris læduntur; quinimò vix decuplam opii dosim somnum insano conciliare, & cum labore. Ejus autem loco commendat sulphur vitrioli spir. quod somniferum & suave illi est.

Externe verò sedum majus contusum, & cum lacte muliebri mistum, syncipiti admotum, phrenitidem sedare, & somnum allicere plerique testantur: at cum primum dormire coeperit æger, removendum, ne coma subsequatur. Tutiora existimant alii ramenta cucurbitæ cum albumine ovi. Riverius in praxi ex Penoto hoc epithemate ægrotum sopiri, & convalescere testatur: quod conficitur ex Aqua ros. punic. cum tinctura santal. rubr. irabuta ad 3xx. Camphor. gr. xx. Mosch. gr. xii. Vult autem per diem integrum calidè futuris apponendum. Est aliis in usu decoctum musci terrestres pari modo applicitum; aliis Rana viva, aut Tina dissecta, & plantis pedum imposita.

At quamvis hæc prodesse possint, non tamen omittenda diaphoretica superius memorata, &

quæcunque acrimoniam, fervoremque sanguinis temperare possunt: hæc quidem potius in principio, illa verò circa statum Phrenitidis, præsertim cum de interna inflammatione dubitatur. Quamobrem pro varietate causarum, modò his, modò illis utendum.

Isdem fere Pervigilio occurrere expediet, ac præterea unguento Alabastrino, populeo, somnifero Auguitano oleo papaverum, & hyoscyami, extracto croci, pinguedine lucii piscis, temporibus, & plantis pedum illitis. Langius parat oleum mirabile ex capitibus duobus allii, & uncia una opii simul contusis, atque in B. M. distillatis. Conficit etiam aquam quandam Hypnoticam dictam: & Mynsicht. vinum hypnoticum, & pulverem anodynum Michal. Alii, alia. Sed omnibus præstat laudanum opiatum aliquo liquore dissolutum, & parum, ac sæpè propinatum. Invaluit nunc tandem apud nostrates usus cujusdam potionis ex expressis seminibus melopeponum, & papaverum alborum cum amygdalis dulcibus, & conditura florum nymphææ in aqua lactucæ dissolutis. Illam autem post cœnam potissimum potandam offerunt, ut opportunius somnum alliciat.

### Consultationes.

#### Phrenitis essentialis.

Egregius Juvenis 35. annum agens, temperamenti secundum totum & jecur calidi & sicci, negotiis impensè deditus, & ideo vigiliis valde obnoxius, liberè vivens, potissimum in meri potu, cum Venetiis æstivo tempore Patavium migrasset in Navi tectâ & cum sodalibus, ac commensalibus mero plurimum indulisset, nocte sequenti sævissimo capitis dolore, atque acuta febre correptus fuit, cum siti molestissima, vigiliis, vel somnis saltem turbatis, cum clamoribus, à quibus insueta temeritate loqui cœpit. Tertia autem die respiratio magna & rara, pulsusque minores atque duriores, squalescentes oculi, necnon venosi, sive sanguine pleni apparuerunt, & tandem quarta, floccos vellere, festucas carpere, & demum non solum verba plurima facere, & nugari, sed etiam continuò plane delirare incœpit, prout & nunc delirat, cum familiares non distinguat, servum fidelem æconomum furti accuset, eodemque tempore adblandiatur & benè excipiat. Urina autem tenuis & decolor, cum tenui nubecula apparuit. Quæ omnia ita succreverunt, quamvis à medico domestico rectè hætenus fuerit curatus, qui secunda die leniens, & tertia ex brachio sanguinem educi jussit. Modò in quarta accersiti, hæc habuimus.

Cum tria sint genera delirii, sub nomine desipientiæ, tanquam sub genere contenta, cum febre unum, Phreneticum scilicet; duo verò sine febre, Maniacum, & Melancholicum, Phrenitide modò laborare egregium hunc Juvenem palam constat, ita dicta à Phrene, mente scilicet. Hinc cum Antiquiores observarint septo inflammato mentem aberrare, hanc in ipso residere suspicati sunt. Est itaque phrenitis mentis alienatio continua, cum febre acuta. Cum autem mens alienari, ac depravari possit, quoad imaginationem, ut in Theophilo Medico, qui



ex principiis falsis veram conclusionem deducebat, vel secundò quoad rationem, ut in illo, qui Romæ Lanicini puerum post vasa per fenestras projecit, & ex principiis veris falsam deducebat conclusionem, vel tertio quoad memoriam, ut contigit Athenis l'este à Thucidide descripta apud Gal. quam memoriæ depravationem, vel circa tempus, vel circa locum, vel circa personam credidit Valerius, confirmarunt Fernel. & Capiv. in casu nostro, omnes actiones principes depravari censemus, cum falsa imaginetur, neque ex imaginatis veram inferat conclusionem, ad quarum operationum depravationem, depravari quoque memoriam, non contra, necessarium existimamus. Hanc verò mentis alienationem ulterius progressam credimus, atque adeò plane delirare egrum statuimus in historia: plures enim delirii phrenitici gradus ab Hipp. diversis verbis descriptos observamus. Si quidem primum, ac leviozem significavit, dicens. *Parum delirabat, vel Nugam est. Vel. Sermones ac verba fecit. Vel. Parum mente contabui:* aut *Aliguumulum delirabat*, ut de Melidia. secundum gradum gravioris delirii explicuit hoc verbo, *Deliravit*, ut de Herophonte, Epieratis Uxore, & Glazomenio. Tertium gradum sic expressit, *Plane deliravit*, ut de muliere, quæ decumbebat in Littore. Quartum gradum deterioris delirii ita, *Mulum deliravit*, ut de Uxore Dromedai, & de Philini uxore in Thaso. Quantum delirii gradum, sic *Omni id deliravit. Magis pere de iravit*; ut de Philisco. Postremum autem, omnium intensissimum, profuique lethalem descripsit dicens, *Tremula, obscura, blandeque & convulsibiles desipientia, valde phrenitica*, ut Didymarco in Coa obvenita, hæc enim & consummatas phrenitides significare voluit Hippoc. ut Gal. in Com.

Est itaq; mentis alienatio in nostro Pat. multum progressa, continua enim est, sicut & febris, quia essentialis unde Gal. dicebat, *Nisi febricitet eger, & continuo deliret phreniticum non est, in virgibus enim febrim desipientia phrenitica non sunt.*

Ad hanc autem phrenitidem excitandam, conspirant primo causæ omnes antecedentes, tum internæ, tum externæ, ætas juvenilis, temperamentum totius & jecoris calidum & siccum, anni tempus æstivum, intensæ applicationes, & ab his vigiliæ. unde *In vigilia convulsi, vel desipientia m dum.* Præterea tectum navis à Soie excaletactum, caput accendens, & meraci potus copiosior. Sic *Adolescens Melibæ, ex nimio potu, & Venere diu excaletactus, decubuit, & phreniticus factus est.* Sic *Ex multa potatione, rigor, & desipientia, malum.* Ac tandem febris acuta, de genere ardentium, cum molestissima siti invasit, & phrenitidem, ut causa, præcessit, cujus & causa & comes esse solet. A quibus omnibus causa conjuncta, & immediata, nec non continuo fovens introducta fuit, caliditas scil. præter naturam in cerebro: eo namque intelligimus & deliramus. Quæ caliditas intensa sic oportet, quia alioquin fieret sola mobilitas in spiritibus & opinionibus, ut docebat Gal. Hæc autem inducitur calore solis, & meri potu, potuit quidem continuum membranarum solvendo (cum cerebrum parum, aut nihil sentiat) capitis dolorem, vigilias, somnosq; turbatos inferre, verum ad delirium continuum excitandum, necessaria

est inflammatio membranarum cerebri, imò præter hanc requiritur humor biliosus in cerebro redundans, & in eodem commotus, atque discurrens, unde Gal. dicebat, quod *Bilis in cerebro, & ejus membranæ phrenitidem facit, & alibi. Phrenitis fit à bilioso humore.* Quod desumpsit ab Hippoc. dicente, *Morbus hic fit à bile, cum multa fuerit.* Subministratur autem cerebro biliosus humor, à membranarum inflammatione, facta à sanguine bilioso, & biliosum ichorem in idem per transudationem ac diaporesin eructante, non secus ac in pleuritide evenit, in qua sputa cruenta & biliosa excernuntur. Quam veritatem omnino aperit & confirmat Gal. cum Hipp. dum enim Hipp. ipse phrenitides confirmatas, & hæcenas nobis ob oculos posuit, dicens, *Tremula, obscura, blandeque & convulsibiles desipientia, valde phrenitica.* Gal. in Com. ait. id fieri, *Quoniam biliosus succus non amplius confusus & tumultuosus in cerebrum decumbit, sed a velutivulter permissus est, ut in fluxu in latus, & id o ut bellicum insolubilis est.* Quod vero bilis decumbat in cerebrum, ab inflammatione membranarum, ita expressit Gal. idem: *Phrenitis a bilioso humore, lethargus à pituitoso, hic, ex ipso potius cerebro illa extenuis meningi, & septo.* Et clarius adhuc; *Phrenitis fit ex inflammatione meningum cerebri, & si magna fuerit, etiam musculorum temporalium.* In cerebro vero, licet aliqua plogosis & calida dispositio in phrenitide dari possit, vera tamen in membranis requiritur inflammatio, si enim daretur & in cerebro, longe deterior phrenitide ipsa contingeret affectus, sub titulo de corruptione cerebri ab Hipp. descriptus, de quo dicebat. *Quibus cerebrum sphacellatum est, in tribus diebus pereunt, si verò hos effugiant, sanati sunt.* recedente scilicet inflammatione. Sic Aët. & P. ut. inflammationi cerebri proprium caput assignant, à phrenitide distinctum.

Phrenitis igitur essentialis affligit Pat. nostrum, tum quia nulla præcessit querela de alia interna parte male affecta, tum quia delirium continuum habet. Et licet continuum videatur in facta per consensum à septo, unde Gal. *Ab altarum partium consensu, nulla delirium perpetuum habet, dempro solo septo.* subdit tamen. *Cujus vitio excitatum delirium, parum à continuo distat.* sed præterea, delirium à septo risum tumultuosum secum ducere solet, ut Tyconi, septo in bello vulnerato. In nostro autem Pat. signa præcesserunt phrenitidem præmonstrantia, à Gal. proposita, vigilæ nimirum, ob siccitatem in cerebro inductam, ob quam & somni turbati cum clamoribus fiunt, ob somnia conspicua, temeritas non consueta, à membranarum & cerebri incalescentia, respiratio magna, & rara, dum à copia phantasmatum occupatus respirare obliviscitur, quod supplet respiratione magna; squalentes oculi, propter vigilias, à sanguine turgidi, ob incipientem membranarum inflammationem. Pulsus autem minores & duriores sunt, ex membranarum inflammatione; ob duritiem enim arteria non adeò dilatari potest, sicut urna decolor atque tenuis biliosum humorem per venas in caput efferri significat, atque tandem floccos avulsit, & festucas carpsit, dum ab imaginatione oculi decipiebantur, unde & Gal. Ardente febre detentus, dum mente quidem sanus erat, sed imaginatio depravari



incipiebat, exclamabat. *Amici mei, auxilio mihi  
esse, ne phreniticus evadam.*

Affectus quidem, Phrenitis, acutissimus atque  
periculosissimus, ut proinde nihil certi pronun-  
ciare possimus, præsertim cum adhuc in princi-  
pio reperitur, & usque ad ii. progredi soleat,  
unde dicebat Gal. quod si quinta die inceperit,  
decima septima judicabitur; si 7. inceperit  
20. tantum, quod forsitan ab Hipp. desumpsit,  
dicente. *Judicatur hic morbus, brevissimus, 7. die,  
longissimus, ii. Solus ægrotus 4. 3. Epid. descrip-  
tus 3. die phreniticus defunctus est, acutissimæ  
phrenitidis exemplo, qui tamen obiit ex qua-  
litate succorum virulentorum, tanquam ab  
epoto veneno, non à phrenitide, ut notat Gal.*  
Progressus itaque attendit: observandus, namque  
si pulibus accedat crebritas modica, mortis  
periculum: si vero immodica, mortem proxi-  
mam prænuntiatur. Urinæ si fiant albæ & per-  
spicue, malæ. Unde dicebat Gal. in Com. *Se-  
nullum Phreniticorum vidisse saluum, in quo urina  
alba & perspicua, id est aquosa apparuisset.* Quod  
idem confirmavit quoque Lib. de Urinis. Alvi  
quoque albæ dejectiones malæ essent, ut Ar-  
cheerati, sursum enim flava bilis ferebatur,  
scribit Gal. propterea Hippoc. *Egestionis albæ in  
Phreniticis, mala.* Respiratio quoque attenden-  
da, spiritus namque magnus & rarus in toto  
morbo, & hypochondria palpitantia utrinque  
demissa, phrenitidis sunt notæ, morbo ad exi-  
tium spectante, in quo statu somnus potius de-  
lirium excitat, accedit stridor dentium, & la-  
biorum, atque totius tremores.

Quod si ad salutem vergat, vel per resolutio-  
nem, ut Pythioni contigit: vel per crism, &  
frequenter per hæmorrhagiam narium, & sudo-  
rem, ut contingit ei, qui dum Romæ erat, Athe-  
nis se esse credebat. Sed nonnunquam & per  
abscessum, & per transmutationem in alium af-  
fectum desinit. Si per abscessum, cerebrum spha-  
belatur, & pereunt, nisi pus ad anteriora ver-  
gat, & per nates, aut os expurgetur. Si per  
transmutationem, vel in lethargum, de quo  
Hipp. *Non utiliter phrenitis in Lethargum se conver-  
tit.* Gal. in Com. *Phrenitis contra tollit veterum.*  
Vel transmutatur in peripneumoniam, de qua  
Hipp. *Si phrenitis in peripneumoniam transit, pauci  
effugiant.* Vel mutatur in convulsionem, exicca-  
tis nimirum membranis, quod succedit exitiali  
maximè Phrenitidi, ex Gal.

Medicæ itaque intentiones pro hac phreniti-  
de curanda, erunt reliquis inflammationibus  
communes, ab initio scil. repellere, in augmen-  
to repellere & digerere, in statu digerere ma-  
gis quam repellere, in declinatione tandem di-  
gerere, quibus addimus, quod sit revellendum,  
& ratione febris refrigerandum, humectandum,  
& evacuandum, ac tandem symptomatibus  
occurrendum.

Atque omnium primò convenit sanguinis  
missio per venam sectam, omnium Medicinæ  
Principium, cum Gal. & Avic. consensu. Et li-  
cet Gentilis, Arculanus, Mesue, Rudius aliter  
sentiant, falso tamen supposuerunt phrenitidem  
à sola bile fieri. Quem errorem corrigit. Aven-  
zoar dicens, *Et scitis quod non generatur apostema  
in hoc panniculo ex uno simplici humore, cui etiam  
alius humor non sit adjunctus, sed denominatio fit à  
majori.* Recte igitur ex brachio missus fuit, tum

ratione refrigerationis, ne sanguis adeo facile  
in bilem vertatur, tum ratione revulsionis, ne  
adeo præceps ad partem fluat, nulla namque  
datur revulsio major, quam per sectam venam.  
Ex venis sedalibus repeti poterit, ante septi-  
mam, sicuti tandem in jam tacta, ratione deri-  
vationis, ex vena frontis, cum sit remedium  
locale. Cucurbitulæ quoque scarificatæ, dorso  
prius, ac tandem occipiti, & revellere à synci-  
pite, & derivare possunt. Reliqua omnia revul-  
sionum genera conveniunt, frictiones, storiones,  
sinapismi, imò & vesicantia.

Interim adhuc in repellentium usu persisten-  
dum, oxyrrhodino ex rosac. & succo citri pa-  
rato, aceto omisso, pace Gal. non adeo bene ab  
Herodoto edocti, ut ipse fatetur, dum acetum  
rosaceo, ad penetrationem addebat in phreni-  
tide. Applicetur autem frigidum, prout & veme-  
tepidum. Et quoniam urgent vigilie, succus  
lætucæ, vel nymphææ adici poterit, qui alio-  
quin penetrationem impedit. In augumento ali-  
qua digerentia ex usu erunt, ita

℞. Ol. ros. omph. 3 ij. chamæmel. 3 j. succi  
lim. 3 j. m.

In statu æquali dosi repellentia ac digerentia  
immiscenda, atque ita in ol. ros. serpyllum, aut  
pulegium, decoquatur, vel.

℞. Ol. ros. compl. chamæmel. an. 3 ij. succi  
lim. 3 j. m.

In declinatione, solis digerentibus erit uten-  
dum, sic applicetur solum chamæmel. in quo  
serpyllum ebullerit, vel animalia per medium  
dissecta apponantur, ut Columba, Gallina ni-  
gra, pulmones adhuc calentes, minus tamen  
operosum fuerit fomentum ex decoct. chamæ-  
mel. meliloti, origani, pulegii, serpylli, saturæ,  
spongia capiti admotum.

A Pharmaceutico desumenda Evacuantia,  
Alterantia, & biliosum humorem Contempe-  
rantia. Inter evacuantia, lenientia sunt usurpan-  
da, nullo modo purgantia. *Concocta enim medi-  
canda, atque movenda, non cruda.* Et præterea. *In  
acutis morbis raro, & in principio medicamentis pur-  
gantibus uti, & id cum præmeditatione faciendum.*  
Sed aureum documentum ab Hipp. traditum, &  
à Gal. receptum, in omnibus inflammationibus,  
ad memoriam revocandum. *Quicunque ea qua in-  
flammanur, morborum inter initia, medicamentis so-  
lvere conantur, non solum ab intensâ, inflammataque  
parte nihil adiuvant, cum non cedat nec obsequatur ea  
qua cruda adhuc est affectio, verum quoque & qua  
morbo resistentia, ac sana sunt, absumunt atque colli-  
quant, datoque ad imbecillitatem corpore, morbus  
superior evadit, qui ubi corpus vicerit, remedium non  
habet.*

Leniens itaque sit medicamentum, differendum  
tamen post sanguinis missionem, præmissio leni-  
clyst sit autem syr. ros. violac. solut. cum decoct.  
pulpæ tamarind. vel ros. cass. cum eadem pulp.  
vel crem. tart. à quibus si fieri possit, propinquetur  
ser. depur. aut aq. hord. ad lib. 2. ut factum fuit.

Alterantia & bilem incrassantia quotidie re-  
perita conveniunt quam maximè, ut decoct.  
cich. end. acet. sonch. hepaticæ, viol. portul.  
lætucæ, additis succ. depur. acetos. end. Vel  
syr. de ribes, & viol. Et quoniam litis urgere  
solet, licet eam non sentiunt ægri, ideo serum  
copiosum propinandum, vel aquæ stillat. end.  
acet. cucurbitæ, hord. cum syr. de ribes, de  
gra-



granatis, de acido citri, quæ nive quoque refrigerentur, siquidem & Aret. frigidam permittit. Denique jam dicta omnia, tum lenientia, tum alterantia, suis loco & tempore repetenda, si possibile fuerit.

Et Symptomatibus interim occurrendum; quæ esse solent vigilæ, motus violenti, sup-  
pressio urinx, & alvi stypticitas.

Somnus igitur conciliandus, cum sit delirium remedium; & ideo Hipp. *Ubi somnus delirium sedat, bonum*; Unde Gal. dicebat quod *Sopire, ac stupescere principem facultatem spiritus, cerebrum supra modum excalescentem refrigerando*; Cavendum tamen ne narcoticorum incauto usu ad Lethargum deducatur æger, ut propterea ab Asclepiade somnifera supervacanea censentur: A levioribus itaque, & extrinsecis inchoandum; sic fiant à cœna pedum lotiones ex decoct. mal. violar. lactucæ; anethi, salicis, cap. pap. albi. Nares & tempora illinantur lad. Nep. aqua ros. dissol. Irrigetur sutura coronalis ol. nenuph. copioso ex Rhase. Fiant capitis perfusiones decoct. lactucæ, viol. nenuph. & in pertinaci affectu, radic. m. ndrag. sem. jusquiame, cap. papav. addito lacte vaccino.

Intrinsecus emul. amygd. dulc. in cibis, & sem. papav. albi extracta cum aq. lactucæ. Papav. decoct. proponit Celsus. Diacodium Tral. ac tandem Nep. Quercet. Theriac. quippe rec. nec plul. Rom. in hoc biliosiss. affectu fidendum.

Ad urinam vero ciendam sollicitetur Pat. vesica comprimatur, titillatio in meatu urinario excitetur. Pubi somenta ex decoct. pariet. fornic. petrosel. radic. asari in vino albo parata applicanda; vel cataplasma ex radic. raphani & pariet. contulis, additis ol. de scorpi. aneth. chamæmel. Inunctiones perinæo iisdem oleis quinetiam adhibendæ.

Fæces provocentur suppositorio parvo, & acri repetito, ex troch. almand. lucra, sale gemmiz, & melle parato.

A propietate juventia non sunt omittenda. Intrinsecus quidem corallum nigrum ad 3j. in aq. ros. r. Aqua item stillat. ex hiru. junioribus. Extrinsecus verò spuma lactis, Aprogala dicta, capiti appolita; Succus Anagallidis, vel Ruta sylv.

In vivendi ratione primò de aëre dubitatur, num locus obscurus, an luminosus phreniticis conveniat; cùm Asclepiades. ita referente Celsus, quem sequutus fuit Paul. in lumine esse detinendos reddiderit, Hippocr. vero in Conclavi obscuro. Quæstionem tamen Celsus, & post ipsum Aret. & Aret. sic dirimunt, neutrum periculum esse dicentes; siquidem in tenebris detinendi, qui lucem: in lumine, qui tenebras formidant. Ex neutris autem, debiles in tenebris fortes in loco luminoso sunt collocandi. Picturæ amoveantur. Et sæpius in a. sentiendum quam repugnandum; ut paulatim mens in melius refoceatur. Cibus sit refrigerans, humectans & intransiens, non valde nutrens; quia scil. in ediam ægre tolerant; biliosam enim humorem & animum demulcet ipse cibus, ex Aret. Vinum omnino denegatum à Gal. concedi videtur ab Hippoc. aquosum, prorsus inodorum, & exiguum in declinatione, ut decidit Tral. Somnus & quietes procuranda. Clyst. mollioribus ex lacte, butyro, & saccharo paratis alvus solici-

tanda, ita permittente ægro. Et amici familiares, non domestici, aut cognati assistant; & de rebus gratis ac delectabilibus cum eo agant. Quæ omnia, imò pauciora quoque, Deus salutaria reddat. *Ragm. Joh. Forus Consu. & Respons. Medic. Tom. 1. Cent. 1.*

*De Phrenitide.*

Juvenis robustus, temperamento biliosus, sanguine abundans, & intemperanter vivens, cum in symposio vinum copiosius bibisset, atque hinc multum incalueret; tandem ab alio contumeliis anectus, magna ira incanduit; cumque a presenti vindicta detineretur, ac domum deduceretur, tota nocte non dormivit, sed furentis initar per cubiculum discurrat, nil nisi de vulneribus, pugnis, litibus & vindicta loquutus, idque cum ferocia & n. l. admixtis ineptiis. Postridie omnino deliravit, & ipsis quoque domesticis violentas manus interre cœpit, ita ut à robustis viris detineri debuerit. Secundam quoque noctem vigil cum summo delirio ac furore transigit, modo inaccessos & festucas colligens, modo in altantes irruens. Oculi rubent, torum videt, vociferatur, valde sitit, febricitat, urina pilet. Die tertia Medici consilium impioratur.

1. Continuum & ferox delirium cum vigiliis cerebrum in hoc ægro graviter laborare demonstrat, sicut febris renouum quoque corpus male afficit.

2. Morbus quò affligitur est inflammatio membranarum cerebri, hincque procedens intemperies calida cerebri & spirituum; unde producuntur febris continua, & illa mentis emotio, quam *phrenitidem* appellant Medici, quæ est *delirium ferox & continuum cum febre continua, cum inflammatione membranarum cerebri*.

3. Remota morbi causa est intemperies vitæ, quò biliosus sanguinis magna copia in corpore genita, antecedentem causam præbuit. Sanguis ille biliosus à nimio vini potu & ira excalescens ac vehementer commotus, & ad caput copiosior delatus, ibique in substantiam membranarum cerebri nimia copia effusus, morbi hujus continentem causam constituit, quem morbum hoc symptoma sequitur.

4. In illis enim membranarum nimia copia percalidus irruens, ibique putrescens, illas inflammavit; ac parte illius putredinis per venas cordi communicatâ, indeque fervidiore per arterias ad totum corpus expulsâ, febrem accendit, cujus magnum calorem œsophagi & oris siccitas cum siti immanis sequitur.

5. Ab hac membranarum inflammatione etiam calida intemperies ipsi cerebro & spiritibus ejus inducitur, à quorum nimia caliditate ac mobilitate & inordinato motu, principes cerebri functiones depravantur; sicque delirium generatur: quod ferox & continuum evadit, & cum vigiliis conjunctum est, propter nimium continuumque calorem; spirituumque ferventium rapidum motum.

6. Morbus hic variis de causis periculosus est. 1. Quia pars princeps laborat. 2. Quia continuæ vigilæ ægrum valde fatigant. 3. Quia febris adeit continua. 4. Quia hoc delirium non est cum risu, sed cum ferocia. 5. Quia



dicta inflammatio inde etiam multum fovetur & augetur, quod biliosa materia, quæ urinam tingere solebat, tota ad caput abripiatur, sicque urinam pallidam relinquat. Sanationis tamen spem faciunt virium robur & absentia pessimorum symptomatum, quæ sunt, convulsiones, aphonia, singultus, dentium stridor, aliaque similia. Ac proinde curatio quamprimum erit instituenda, antequam malum in pejus vergat.

7. Hæc curatio consistit in causæ antecedentis ac continentis ablatione, & intemperiei correctione.

8. Biliosus sanguis qui ad caput copiosior affluit, necessario quamprimum est evacuandus, revellendus, derivandus, & repellendus. Quapropter clystere emolliente præmisso, vena in brachio aperiatur, & sanguinis unc. x. vel xii. extrahantur: quæ venæsectio postmodum in altero brachio reiteretur, atque etiam tertia die, si necesse videatur: primum enim in hoc malo remedium est sanguinis detractio; quæ, si æger id permetteret, non incommodè secunda vel tertia die institueretur, in vena frontis.

9. Ad humorum biliosorum expurgationem detur hic haustus.

*Rec.* Rhabarbari optini, fol. senæ mundat. ana drach. ij. Tartari rhenani drach. ij. Sem. anisi scrup. i. aquæ cichoræi q. s. fiat infusio s. art. colaturæ addantur. Elect. diapruni solut. drach. ij. diagridii gr. ij. Misce, fiat haustus. Si sequentibus diebus alvus quotidie non respondeat, clysteribus proritetur, & tertia vel quarta die præscriptus haustus iterum exhibeatur.

10. Bis terve de die inungantur tempora & frons hoc linimento:

*Rec.* Unguenti populei drach. vi. Olei papaverini drach. ij. Misce, fiat linimentum. Post hujus inunctionem sequens oxorrhodium cum linteis capiti tepidè applicetur:

*Rec.* Olei rosacei unc. ij. Succu lactucæ unc. ij. Succu sempervivi majoris, aquæ rosarum, aceti rosacei, ana unc. j. s. Misceantur bene, & fiat oxorrhodium.

11. Ad materiæ morbificæ diversionem columbæ vivæ dissectæ, vel hoc suppedaneum plantis pedum applicetur.

*Rec.* Lol. brassicæ rubræ, betæ albæ, ana m. j. s. Contundantur in mortario, & cum fermenti acidi unc. iv. Salis drach. ij. Aceti rosacei q. s. fiat pasta suppedanea.

12. Sub noctem exhibeatur pilula ex laudani opiatu gr. iv. Vel si pilulam respuat, aut abiciat æger, dissolvantur illius laudani gr. ij. in decoct. hordei unc. i. & additæ syrupi papaveris rheados unc. i. fiat haustus ad somnum provocandum.

13. Interea dum hæc fiunt, bibat æger pro potu ordinario cerevisiam tenuem vel tenuissimam, vel serum lactis acidi, vel aquam fontanæ, in qua possum citri in frusta confectum immaceratum est, additæ pauxillo sacchari & aquæ rosacæ, vel hujusmodi julepum:

*Rec.* Lol. lactucæ m. iv. Endivæ m. ij. Fruct. ribesiorum rubr. m. j. Aquæ hordei q. s. coquantur ad lib. i. Colaturæ refrigeratæ addantur syrupi violacei, de limonibus, ana unc. j. De papavere unc. s. Succu citri recentis q. s. ad gratum æorem, Misce, fiat julep.

14. Utatur etiam sæpè de die particulâ hujus conditi:

*Rec.* Pulveris diâmagaritæ frig. scrup. iv. pul. pæ tamarindorum, conservæ viol. rum, rosarum pallidarum, rob. ribesiorum rubr. ana drach. ij. Syrupi violacei q. s. nat. conditum. Circa vespèram (neque cum laudanum opiatum non sumit) bibat haustum unum aut alterum hujus emulsionis:

*Rec.* Sem. 4. frigid. maj. ana drach. ij. Sem. papaveris albi unc. s. Decocti no. d. i q. s. nat. emulso ad unc. viii. Cui addæ, syrupi papaveris rheados, violacei, ana drach. v. Misceantur.

16. Cum malum nonnulli incipit mitescere, ad materiæ peccantem citius resolvendam, capiti admoveatur gallina viva per medium dissecta, vel pulmo vituli aut ovæ recentier è mactato animali e. u. su, tepidus imponitur.

17. In dicta sit ac aliquantum ad frigidum & humidum inclinas, & sublecidus. Cuius sit parvus, & refrigerans, cum lactuca, endivia, borragine, aceto, aliisque refrigerantibus præparatus. Qualis potus conveniat, ante dictum. Absint ab ægrob multa colloquia, multaque colloctores, & quies ac somnos omnibus modis concilietur. Furibundus animi affectus paucis ac blandis sermonibus demulceatur, imprimis a talibus; quorum præsentiam tempore sanitatis amavit æger. Alvus quotidie vel spontè, vel arte respondeat. *Isbrand. de Diembrace Medicat. lib. i.*

### Observationes.

#### *Delirium Anginæ & Calculum in renibus sequuntur.*

Non alienum est in Febris malignis, diebus præsertim Criticis, aliena loqui; sed notavi idem in simplicibus anginis, nulla febris suspitione, quandoque contingere, quoties malum est paulo vehementius, & materia peccans jam in pus resoluta sanguini se miscet, unde nervosæ cerebri partes ultra solitum vellicatæ notiones confundunt. Sed cum malum hic usque adeo vicinum sit sensuum metropoli, causam symptomatis assequitur facilius, in calculo autem renum officina mali à cerebro longè remota tumultuatur. Vidi nihilominus, qui calculo gravius infestante non constarent sibi, nec nisi delira loquerentur, sed momento post, translato in vesicam hoste, dictorum ejusmodi essent obliti, & cum corpore, tum mente validi. Tandem excluso calculo animadverti causam mentis emotæ in acutissimos lapidis angulos rejiciendam esse; quippe nulla unquam deliria, in eis deprehensa mihi calculosis, quibus calculi rotundi, aut obtusioribus angulis molesti fuere, sed tantum (nec tamen semper, propter mentis majorem in quibusdam constantiâ) in istis. Scilicet pelvis renum vestitur tunica *serosa*, quæ & ipsa interiorem uteretur membranam constituit, hæc punctiunculis acrioribus sollicitata contrahit se violentius, & tandem nervosa cerebri in consensum rapit, unde nocturna quandoque turbare credibile. Quin & visus mihi Parisiis, à la Greye, qui rotis fractus, pectore nondum continuo aliena loquebatur. Jussus enim ab ætante monacho, ut pendens in cruce salva-



toris, quem oculis ejus identidem objiciebat; nemo: esset, quod in propinquo mors expectaret; An ergo, inquit; laevis sum, si tam subito moriendum; annuente sacrificio gravior laevis erit. Cur ergo; excepit, in nosocomium non deportor, ut manu Chirurgi sanari queam. Verisimile, ossium in cruribus, femoribus, brachiis fragmenta acutiora; totidem cuspides fuisse, quot in calculosis illis exquisitiores anguli, adeoque in utrisque eadem secuta quandoque symptomata. Nec fortasse in somnis aliena loquuntur nonnulli ob aliam causam, quam quod vel in partibus solidis, vel fluidis cuspidatæ quædam particula nervosa pungendo quietem spirituum interturbent. Sed nec illud fortassis ubivis obvium, quod verminosi pueri quandoque aliena loquantur. Id mihi præ cæteris compertum in H. Brechlinii filio sex annorum, qui postquam miserabile triduum inter convulsionem & deliria exegisset nullo febris argumento, propinatis liberaliter quæ vermes exiguæ, novendecim tandem excrevit lumbricos vivos longos, crassos, & propemodum spithameos, quibus exclusis præter spem Parentum convaleuit. Olai horrichii.

*Ex tra Phrenitis.*

Ira furor brevis est, & ex ira nuper Phrenitis: Uxor enim cujusdam derinarii temperamento cholericis sanguineo, cum menstrua ipsi, confecto equidem te: porre erumpere cœpissent, cum Vicina sua altercari coacta est, hinc ex illa animi commotione sublitere menstrua; quid sit? circa noctem phrenetica ex lecto prosilit & varias movet turbas, hinc optimus maritus me summo mane vocat & auxilium implorat; suadeo Venæ sectionem in pedibus, sed nolebat ad nitere etiam coacta: ut ergo sedatior esset, propinavi ipsi potiusculam anodynæ, cui immixta erant extracti Anodyni *Hydant* gr. x. (quod extractum nihil aliud est quam succus capitum papaveris immaturorum expressus & l. a. inspissatus) hinc post levem somnum paulo sedatior admisit V.S. in utroque pede supra talem (qua largius celebrata; rubebat enim facies valde ex sanguine sursum delato) sensim ad se rediit, Divino aspirante numine: *Casspar: Colichen.*

*Phrenitis Aphrodisia.*

Juvenis quidam amore puellæ cujusdam ardens, cum spe exciderat, in gravissimum morbum incidebat, febrem nimirum cum vehementi delirio, quo nunc se Cæsarem, nunc Dei Filium esse somniabatur, aciem instruebat, nunc remeabat, nunc vincebatur, nunc resistebat, nunc ad judicium perveniebat. Tandem ad se rediens adhuc vibices monstrabat, quas accepisse à latronibus se dicebat. Balneum exposcens, quo concessio indies ad saniores mentem rediit.

*Scholion.*

*Improbe amor, quid non mortalia pectora cogit?*

Amor etsi à principio nec delirium nec melancholia sit, tamen, si id quod amat nancisci non potest, multis sollicitudinibus & mentis perturbationibus; in delirium & melancholiam d. generare potest. Mærore enim & curis melancholicos humores gigni & coacervari, ne-

minem latet. Accedunt vigilæ & imaginationes varæ ineptæ, ita ut vel mediantibus huic solis homo ad mentis vacillationem pervenire possit. Balneum verò haud sine ratione concessum; exsiccatum enim corpus humectare, humores servidos attenuare in hoc malo multum ad rem facit. Quapropter etiam balnea à Paulo lib. 3. cap. 17. commendantur in hoc affectu. D. Danielus Winsleri.

*Anatomica inspectiones.*

*Phrenitis à cerebri inflammatione & membranarum.*

Phrenitici biduo extincti caput apertum, in quo cerebrum & membranae cum rubore adeo tumebant, ut venæ ab ipsius substantia separari possent. I. Rhodius Cent. 1. Observ. 39.

*Phrenitis à Pia matris inflammatione illaso cerebro.*

Fabricii Bartholeæ mihi fassus est se in plurimis phreniticorum cadaveribus invenisse piam matrem sine omni cerebri noxa inflammata. I. Rhodius Observ. 4. Cent. 1.

*Phrenitis à dura matris excoriatione, Vasorum ejus plenitudine & Pia, cum Abscessu in cerebello flaccido.*

Quid in per biennium conquestus fuerat de dolore in Occipite, tandem hic Phrenitide ac convulsivis moribus correptus subito interiit. Huic crassa cerebri membrana aliquot locis excisa erat variis foraminibus, idque potissimum in bregmate sub sagittali sutura; ubi ea cum coronali jungitur: Ex his foraminibus effluebat, & per membranam dictam effusus erat sanguis ferè concretus, ater ac adustus, admodum fetens. Tali quoque sanguine distenta erant vasa per exteriorem crassæ meningis superficiem discurrentia, quin & ea quæ numerosa per tenuem diffeminata sunt. Huic intra cerebellum abscessus humore non naturali scatens repertus fuit: erat is humor colore ex citrino ad pallidum vergens, pallida nimirum bilis. Ipsa cerebelli substantia flaccida omnino molliorque multo quam cerebri substantia. Petrus Parvini Observat. Anatom. 8.

*In quodam ab ostia Phrenitide extincto reperta sunt vena cerebri varicosa, medulla cerebri siccissima, membrana siccissima.*

Adolescens medio Octobri capite doluit; febris sed ea fallax, cum se febrere non putaret; nulla dum intermissio officii, lex vitæ neglecta, dolor tamen capitis aggravescerebat: Externa accusabantur; ut ætas ad omnia prona: Tandem febris aucta, dolor capitis auctior; febris verè æstiva *Typhus*: nihilominus tamen sui negligens ruri, modò in urbe fuit, securus omnium, tandem lecto affigitur & affligitur: fallax pulsus; ut in morbis capitis, urina fallacior, ille febrì non respondebat, & in capite secus erat; segnitie alvi, nec nisi arte provocata quicquam ex alvo profluebat: astus viscerum sed major capitis, oculus ardens, facies rubra maxime



digitorum utriusque manus, brachiorumve contracturæ graves, quales in demortuis aliis haud notari solent. *D. Blajus Obs. Med. 2. p. 6.*

*Phrenitis absque inflammatione cerebri & membranarum ejus, ab aquo & vitioso humore in pluribus partibus cerebri;*

Anno 1567. mense Augusto, Mulier ex ingenti animi moerore, febris ardenti cum capitis dolore, cui postea Phrenesis supervenit, correpta, vulgus dixit Hungaricum illum morbum fuisse: Signa omnia attestabantur hanc Phr. ex sanguine fuisse, ridebat, jocabatur, omnibusque gestibusque hilaritatem exlungebat: interim ad interrogata responsum dedit, aliquando non; frequenter manum capiti, tanquam illic dolorem perferentem, admovebat: tempestive fuit levibus medicamentis purgata & vena secta; sanguis erat majori ex parte pituitosus, crudus & serosus: tandem resipuit & paulo post obiit.

Aperiui caput: dum ferra cranium removebam, effluxit aqua lotura carniū similis: Tenues membranae & plexus choroidis vasa aquosa & pituitosa sanguine turgabant: uterque ventriculus, tam dexter quam sinister, plenus aqua fuit inventus: Nullam nec in membranis, nec in cerebri substantia deprehendere quivi inflammationem: Ex sinibus duæ membranae cerebri ut alias ex suspendio enecatorum cerebri, extraxi fibras, seu filamenta crassa, lumbricis non dissimilia, ex alba pituita constata; similes sumpti ex cordis ventriculis. *Volch. Coiter. lib. Obs. Anatom.*

*Phrenitis absque febre, cum inflammatione cerebri & meningum.*

Avicennas & Rhazes nobis describunt quandam Phrenitidem verè similem, tamen absque febre atque adeo sine apostemate, ceteris autem similem inflammationi meningis: In hac, inquit, stringitur ipsius anhelitus, & litis ejus, & cum bibat aquam, strangulatur ea, & expellit ipsam, & plures noctes ipsorum sunt cum strangulatione &c. Dices, non est hæc phrenitis idiopathica, quia sine febre & apostemate, sed tantum similis in multis accidentibus? fateor, verum eadem ratione, imo majori, potest contingere in ea vera Phrenitide quæ fit cum febre & apostemate, si sit maligna & ferina, ut ex bile acerrima & quasi venenosa, ut aliquando accidit, imò in plerisque: Et possum ego sancte hoc affirmare, vidisse in Medicinæ praxi aliquos Phreniticos, qui statim 1. aut 3. die hæc symptomata passi sunt usque ad mortem, quorum unum memini me præsentem dissecum, qui ex phrenitide notha & remissa incidit in paralytium & apoplexiam, ex quibus periit: Ei intra crura est meninx purulenta, & medulla cerebri exterior pars vicina inflammata, partim ex rubro nigricans, partim purulenta: Alios aliquos omnia idiopathica Phrenitidis signa habuisse, qui idem passi sunt quod diximus: nulla tamen inflammatio diaphragmatis aut angina primariæ experti sunt: Ejusmodi affectus, aut phrenitis idiopathica, cui similis est, necessario habet

spirituum parvum & frequentem, ob necessitatem ventilationis, atque adeo vocem acutam quæ prius non fuerit: Quare spiritus, parvus, frequens, ac vox acuta non sunt tecmerium inflammationis diaphragmatis (quod vult Laurentius) sed communia Phrenitidi idiopathica. *Theodorus Collado Adversar. lib. 1. cap. 20. §. 56.*

## DENTALIS LAPIS.

Vid.

## DENTIUM MORBI.

De quibus jam per

*Curationes, Consultationes & Observationes ex variis.*

**D**entium vitia sunt si deficient, si vacillent, si stupore aut dolore afficiantur.

Deficiunt dentes, vel proprio vel alieno, gingivarum vitio, infra, ubi de dentium vacillatio ne, prolixius explicando. Proprio vitio, dum evelluntur, aut excutuntur à quavis causa externa, vel ita alterantur, ut tanquam minus viventes non amplius cum gingiva viva coherere queant, sed sponte sua decidant. Ut enim mortificatum, v. gr. cariosum os, cum vicinis partibus, vita communi & propria pro ratione spiritus influi & insiti gaudentibus, uniri nequit, sed necesse est, ut excidatur & separetur, quo cum viro esse partes subjacentes molles, viventes, consolidatione debita, nutrimento mediante uniri de novo queant: ita & dens minus vitalis non jungitur amplius gingivæ, sed ab hac separatus excidit, idque.

1. Si mortuus fuerit propriæ ætatis, adeoque senii sui ratione, de quo videatur *Helm. alimenta Lactari infans §. 25.*

2. Si ab externis nimis lædatur & vitietur ut sunt nimis frigida, aut copiosius assumpta dentibus inimicissima, & quæ senium eorum accelerant, item nimis calida, dentes & gingivas quasi amburendo alterantia, eaque vel crebrius assumpta, vel dentibus admota, à quibus successive ita penetrantur & arroduntur dentes, ut frustulatim tandem excidant. Quò facit perversa plurium consuetudo, dolores dentium vel aceto simplici, vel per coctionem medicato curantium, à quibus stupefiunt non solum omnino dentes, & insensibiles sic sunt subtiliores illorum intimæ fibrillæ, sed & ipsi dentes sin ul mortificantur & corroduntur.

3. Nimis viscida & glutinosa dentibus inimica sunt, ut sunt omnia dulcia, saccharum, ficus, uti & caseus &c. hæc ipsa enim, ut prompte & tenaciter dentibus adherendo, transpirationem eorundem propter necessariam nutritionem impediunt, ita & successive a corem attrahunt qui continuata sui adhesionem, successive eosdem alterat hinc & lac, & quælibet lactici, ob hanc rationem inimica dentibus observantur eo usque ad sui corruptionem sive cariem & successivam deficientiam disponente. Hæc ipsa gingivas simul plus minus attrahendo, & laxiores flaccidiores reddendo, indeque



deque nutrimentum pro dente, per gingivas transmittendum, corrumpendo, ipsos dentes insigniter lædere valent.

4. *Cariæ* denique plus minus exesi dentes à lapide dentali sive lithodonto obsessi seu sordibus variis inquinati, nigrique ac fœtidi redditi, minus firmiter gingivæ coherent sed successive decidunt. Quæ posteriora vitia non nisi ex vitiata dentium nutritione privata, undecunque primarius orta, originem ducunt. Inquent finem noto, nutrirî dentem, non solum per propria sua vascula, arteriolas & venulas, circa sui radicem implantatas, sed lateraliter etiam, ex adhære ut tibus ipsis gingivis, unde & tam firmiter earum quousque sani sunt est nexus, ut dens sive osseum concretum, ex se indolens, quousque gingivis investitur, acutissimi tamen sit sensus? adeo nututuz vitæ & nutritionis dentes sunt participes.

Ac sanè particularis, ac præ aliis partibus, propria dentibus est nutriendi ac augmentandi ratio, adeo ut, eum continua attritione necessario imminuantur, nisi nova eaque continua augmentatione reparentur, brevi penitus absumerentur. Quod ulterius ex eo patet, quod uno evulso vel elapso, vicini utrinque se dilatare magis soleant, & ex opposito ipsi respondens oblongari nonnihil, & prioris spatium aliquantum subintrare observetur.

Cariem igitur dentis quod attinet, hæc est *arrosio dentis, nunc major, nunc minor, quæ insensibiliter substantia ejus absorbitur, & nunc successive excavatur, nunc altero latere pedetentim consumitur, donec successive magis corrosus frustulatum excidat.* Inchoat malum ut plurimum in parvo puncto extrinsecus quod nigrescit primitus, hinc foraminulum aperitur, sicque ad interiora ejus penetrat, quæ quò teneriora ac molliora, indeque facilius dissolubilia, eo promptius absumuntur, & dentem cavum reddunt. Conjugitur tunc, ad interiora, ubi penetraverit corrosio, dolor, nunc major nunc minor, prout radicem dentis nerveam diversimodè simul arrosit. Ex corrosio ita dente nata sanies, ubi per dentis foraminulum relictum, ceu per fistulam, liberum spatium effluendi haud nacta fuerit, sed interiora magis ac radicem dentis unum alterumve, speciatim in maxillaribus, vitiaverit, acrimonia sua nunc gingivam, nunc ipsam maxillam rodit & præsertim per illa hujus foramina, per quæ vasa in dentes subeunt, sensim extra effluit, & & tubercula, nunc in gingivis, nunc sub maxillis, excitat, quæ tandem exesa saniosum acre liquamen fundunt. Et licet curetur tale tuberculum & excitatum ulciculum, subinde tamen, quoties ex carioso dente sub nutritione vitiata nova sanies generatur, recidivat, & interdum in fistulam vel gingivæ, sive maxillæ, degenerat, adeo ut talia curari nequeant, nisi dens læsus evulsi fuerit. Fortorem etiam subinde dentes carioli inserunt, halitum oris insipientem præsertim si major fuerit eorum excavatio, ut alimenta carnosa retenta in eadem putredinem attrahere queant: Imò ex nutrimenti dentis carioli proprii corruptione, aut alimenterum maxicatorum in iisdem retentorum putredine, vermes in eorum cavitatibus generantur, gravissimorum dolorum aliorumque malorum auctores.

Causa cariei est læsa dentis quacunque occasione nutritio sive gingivarum vitiatarum, & a contiguo dente abscedentium, indeque eorum lateralem nutritionem impediendum, (unde scorbutici, gingivæ vitio, omnium frequentissimi cariem patiuntur) eveniat causa, sive ipso dens sub nutrimenti assimilatione, aut hujus successiva transpiratione frustratus ex illius corruptela, & in acidum corrosivum degeneratone, cariem pedetentim contrahat. Acidum itaque ex nutrimento dentis degenerato, tandem corrodens cariem inducit. Causæ renovationem habent tum omnia dentes alterantia supra allegata. quam infra circa gingivas, alleganda.

Quoad lapidem dentalem sive lithodonton (ut vulgo ex varia persuatione vocant Tartarum dentium;) hujus ortum & genitum optime delineavit Helms. *Tract. alimenta Tartari insontia* §. 22. nempe nutrimentum dentium laterale ex gingivis depravatum, ubi sui perfecta cum dente assimilatione frustratum & vitiatum, sicque in excrementitium plus minus naturam degenerans, adhærebit saltem, superficie tenus denti, ibique quia jam ad duritiem dentalem ex aliquo sui pro nutriendo dente alteratione, determinatum fuit, ad indurescentiam quasi lapideam dentalem, coagulatur saltem, & talem, plus minus tamen habitilem duritiem acquirit, tumulque quicquid mucilaginis ciborum ac potuum imbibitis, simul secum fortiter induat. Nunquam igitur sanæ gingivæ & quæ cuspidi figura ad dentis medium attingunt, hæcque firmo complexu retinent, dentalem hunc lapidem generare solent, bene autem laxæ; flaccidæ, cruentæ, nimulque præ dentibus adherentes, adeoque externis injuriis ad sensilem dentis partem aditum permittentes, nec contrarium nutrimentum suppeditantes, sed potius etiam laudabile pervertentes, hoc malum inducunt. Par omnino est et hoc sordidum, nigrorum aliove modo male coloratorum dentium: quicquid enim hic subest vitii, novum productum in orbosum ex frustrata ac depravata privata dentium nutritione enatum, sive externa illa supra circa dentium casum, memorata speciatim viscida & dulcia primam occasionem suggererunt, sive gingivarum morbosus status, alterando nutrimentum dentium, & vitiando lateralem ejus nutritionem, in causa fuerit. Sane ut scorbuticis nil æque familiare est, ac gingivarum varias subire passiones, speciatim cruentam flacciditatem, ita & in talibus dentium nigrities & sordities frequentissima est. Nigrities sane dentibus adhærens, quid nisi extravenati ex gingivis, plus minus corrupti, & acore infecti cruoris dentibus adherentis velligium est; à cujus hostili presentia, ut irritantur gingivæ, & inviscantur dentis pori, ita ex facili hinc acescentia crasso & cariei successivus progressus. Juxta læsionem gingivarum & dentium læsio, indeque sordium excrementitiarum pluralitas ac veritas altioranda. Hinc & ab inunctione Mercuriali pro cura huius veneret similive concitata salivatione, uti notabiliter viciantur gingivæ, ita nigrescere subito, & pluribus sordibus inquinari solentur dentes.



*Quoad Caries.*

Dentes excidentibus aut deficientibus reparare, solius naturæ est, quæ in junioribus, per recentium dentium subnascentiam priores alveolis suis extrudit, & defectum ita restituit. Quamdiu itaque dentium novorum primordia & quasi semina inter gingivas resistant recondita, novi dentes, post priorum defectum renasci facile possunt; id quod non tantum genuini sive sapientiæ dicti dentes comprobant, sed quod etiam interdum in senectute dentes renati observati fuerint. Arti quod relictum est, saltem defectus illos naturæ nonnihil supplere, artificiales dentes, ex ebore, vel dente hypopotami, fabricatos in istorum locum substituendo, pro loquelæ saltem gratia, non autem pro melioris masticationis beneficio. Equidem exempla quædam prostant dentium sanorum ex homine recenter revulsum, in proprios vel alienos alveolos denuo insertorum firmiter cum gingiva coalitorum, tanquam si nunquam dens detulisset, ita ut etiam masticatio fortis hoc modo perfici potuerit. Sed quoniam adeo incerta res nondum confirmata est, eam in medio relinquo. Vid. observat. Schenchii pag. 20. ex Paræo l. i. c. de dentib. Item Riverium in observ. comm. pag. 357. vel 615. Borell. lib. 2. observ. 10. p. 18.

Quoad cariosos dentes, equidem præsentissimum remedium est cariosi evulsio, interdum etiam necessarium, si longius processerit caries cum facile aliàs contiguus dens contagio carioso innici, & hinc idem malum contrahere possit. Ut taceam, confirmatam cariem, alia ratione quàm evulsione, curari non posse. Quamdiu vero vel nondum eousque processerit malum, vel propter pericula, sub dentium evulsione interdum observata, hæc nimis metuatur, remediis res tentanda est, cariei scilicet progressum ulteriorem inhibendo.

Evulsio appropriato peragitur instrumento ac succedit eo melius, quo minus firmiter dens hæserit, & quo magis idem vacillaverit. Quo autem disponatur ad facilem, magis & minus dolentem, evulsionem, remedia quædam à nonnullis adhiberi solent verbi gratia, Tithymali succus denti inditus: aut si ex eo sale & ammoniaco formentur globuli, aut cum farina triticea fiat pasta, & cavitati dentis indatur.

Præter tithymali lac alia ex simili lactearum genere, pari virtute pollent: ut lac ficulneum farinæ admixtum, vel ex lacte tithymali cum farina triticea subacta fiat pasta, quæ frixa in pinguedine ranæ facit dentes sine dolore cadere: vel farinæ siliginis misceatur cum lacte cataputicæ, instar pultis, indatur denti, caveo, neque aliquandiu permittatur, brevi sic cadere affirmant. Succus pariter chelidoni majoris, cavis dentibus inditus, eos frangit & ejicit. Pinguedo item ranarum viridum, dentibus affricata, aut iisdem indita, dentium casum promovet, nempe coquantur ranæ in olla vitæata affusa aqua communi, & pinguedo quædam innatabit, quæ dentis evulsionem promovet.

Vel ʒ. Gummi ammon. sem. hyoscyam. succi ejusdem an. 3 i ʒ. Miliis addatur Pinguedinis ranæ viridis ac ceræ parum f. unguent. denti extrahendo applicandum vel videndum.

Cariei vero ulterior progressus per artem, & medicamenta inhibetur, efficacissime imprimis per multationem dentis cariosi in loco carioso cum cauterio actuali, sive ex ferro, sive ob subtilitatem commodiorem, ex argento vel auro facta, quo facta auro foliato dens cavus repleatur: præservatur enim sic à majori putredine & corruptione: vel ex cera cum mirrha probe subacta, vel potius ex cera viridi, propter admixtam aruginem, impleatur dentis cariosi excavatio. Ipsa myrrha denti indita, egregia est in hoc casu. Confer hic River. in observat. communic. pag. 399. ubi refertur, quod dentes terebinthina impleantur, & cauterio actuali dens inuratur in carie. Loco actualis cauterii, ubi necesse visum fuerit, potentiale adhibeatur: Sic aqua fortis denti carioso admota vel spiritus vitrioli ad gutt. 1. vel 2. bombaci inditæ, ac denti adhibitæ, mirè corrosivum juvare & præservare dicitur. Item Zingiber in oxymelite coctum, & in cavernam dentis immixtum, præservat corruptionem coralliorum pulvis denti cavo inditus, vel ossa sepiæ, item camphora cariei ulteriorem progressum inhibent: vel ex pulvere coralliorum alborum cum melle rosato ad consistentiam linimenti crassioris redacto dentibus illitum cariem inhibet.

Fortiorem dentium ablata caries sponte curat: sin minus gallia moschata cum cypero & mastiche multa, denti cavo indatur. Tollitur & fortior dentium, si abluuntur aqua in qua sal armoniacum solutum, post prandium & cenam.

Vermes ex dentibus elicere subinde necesse est. Præstat hoc optime Sabina in vino decocta & in ore retenta, quæ copiosius vermes elicit. Fumus item seminis hyoscyami specificus est, per infundibulum susceptus ore, mirabiliter vermes expellit. Confer. Act. Med. haiff. volum. 1. pag. 209. Suffitus item sive fumus ex fructu haliacabi contuso, cum cera mixto, facta exinde patta, & in laminam ferream ignitam injecta, fumum suggerit, quo ore excepto, catervatim vermes cum sputo copioso rejecti, & crudelissimi dolores sopiti, observati fuerunt. Spiritus sulphuris quoque dentibus cum bombace inditus vermes optime necat, & dolorem inde oriundum placat, vel ex pulvere gallarum, cum succo rad. pyrethri imprægnato paratur remedium, quod denti inditum vermes expurgat serum cervinum quantum contra vermes dentium valeat. Vid. Bartholinus centur. 3. histor. 96.

Quoad Tophos (sive Lithodonton) dentium eorumque sorditiem & nigritiem, ne ab his dentium caries, crebrior dolor, aut præmaturus casus superveniat, cura instituenda venit, per ea, quæ sordes dictas abstergere, vitiosum earum acidum, gingivis & dentibus hostile, absorbere & hinc blanda adstrictoria vi gingivarum tonum roborare valent: quod si longius



longius processerit malum, & tenacior mucus dentes vitiauerit, potenter incidentia & dissolutiva, & quidquid heterogenei fuerit absummentia & quasi exedentia adhibenda erunt habendo semper respectum ad scorbutum plus minus. Convenient igitur in leviori malo ossa sepiæ, C.C. ust. mandibul. luc. pisc. testæ ovorum calcin. cinis majoran. rorismarin. urina calida, cum qua fricentur subinde dentes & gingivæ: Tartarus calcinatus aut parum salis tartar. ust. &c.

Duriora subjecta lapidea ex silicibus, pumice, & vitanda sunt, quia crebriori usu gingivas atterere & absumere valent, ut rectè monet Zvvelferus in Pharm. reg. pag. 101. nisi ubi fortius agendum: tunc enim paulo tamen rariùs adhibita, talia minus nocent. Exempli loco sit farina virginea Mynsich. egregie dentes dealbans, & à tartaro corrolivo purgans.

Hisce modo dictis convenienter radix Irid. Flor. additur, præsertim quod & ipsa conveniat propter odoris gratiam, propter quem ultimum finem non inepta. Paratis dentifricis aliquot guttæ olei destill. caryoph. aut lign. Rhodii possunt addi. Quod si dictis pulveribus color purpurascens conciliandus, Coccionigiam in aqua aluminis solvamus, & soluto aspergamus pulverem, qui exinde rubescit, sed leni admotus igni idem purpurascit. Quod si pertinacius fuerit malum, sordes tenaciores, obitinata nigrities firmitus dentibus impacta, ac firmitus conglutinata lithodontes, optimum remedium est spiritus salis cum melle ad gratiam saporis, vel quantum placet mistus, & ita gingivis illitus. Spiritus vitrioli suspectus est, cuius loco oleum sulphuris in aqua communi dilutum, vel cum melle rosato subactum adhiberi potest. Pertinet huc opiata Borelli cent. 2. obser. 65. ad gravius malum præsertim conveniens. Non incommodum est, si recipiatur vinum, cui permisceatur spiritus sulphuris, ut acescat, huic immitte radiculam polypodii per 24. horas, hunc sicca & utere pro dentifricio, firmat, mundat, & candorem iisdem inducit. Et ea quæ de spiritu vitrioli refert Riverius in libro sexto prax. capite secundo, potius spiritui salis, quam spiritui vitrioli applicanda veniunt. Quo etiam facit ejusdem liquor ex auro ulso, hic egregie conveniens citato loco.

**Pulvis dentifric. Principissæ Altenburgensis.**

℞. Oss. sepiæ, C.C. ust. pumic. præp. an. ʒiij. moschi ʒj. M. F. pulv. cui adspargatur spir. rosar. ʒss. & sicca. Interim.

℞. Gran. cherm. Santal. rubr. an. spir. vini q. s. pro extrahendo Tinctura, qua irroret aliquoties prædictum pulverem, & sicca. Non incommodum est hujusmodi pulveribus dentifricis sal armoniacum subinde addere, dentibus, gingivæ, ac omnibus oris partibus imprimis conveniens.

Quod attinet dentes vacillantes sive minus firmiter gingivis connexos hoc vitii contrahunt propriâ vel alienâ, gingivarum culpâ. Propria eadem est, sed in minori saltem gradu, quæ & dentes decidere penitus & cadere

facit, de quo superius sufficienter actum. Aliena gingivarum culpa consistit in eo, quod fibrosa illarum caro vel mollis, sive flaccida, vel simul tumida, vel etiam nonnihil exulcerata, adeoque omnibus his casibus plus minus cruenta simul evadat. Rarum est, quod in Schenckii collectis observat. libro primo capite de dentibus pag. 200. refertur, ex defluxione in dentium alveolos, hos gypsea pituita interdum impleri, ut dentes extrudantur. Suspicio tamen non tam ex defluxione, quam lapidis sive tophi dentalis uberiori incremento, potius vitium hoc ortum traxisse. Ita verò mala gingivarum oriuntur frequentissima salivæ, vel in genere acrioris, vel in specie scorbutico sapore, sive vitioso acri sale inquinatæ culpa, à qua tenuis fibrarum gingivarum resolvi & emolliri, penetrari eadem, & plus minus successivè, non raro sensili admodum cum pruritu erodi assolent, vasculis sanguinis una per diæresin vitiatæ, sanguinem paulatim fundentibus.

Postea & mercurii usus, tam in salivatione excitanda, & hinc acrioris & præternaturalis cujusque copiosioris salivæ profluvium, quam faciei pro usu cosmetico applicatus, ordinario gingivam valdopere laxare, & omnes dentes hinc mobiles quasi reddere solent.

Quod si ulterius procedat negotium vitari magis gingivæ, exulcerari profundius, absumi eadem, vel corrumpi etiam, & ad gangrænam disponi assolent. Malum, quod in genere scorbutus appellatur.

Quod si firmior paululum gingivarum fuerit textura relaxata, eadem nihilominus sanguinem uberius in se recipit, & spuria intumescit & excrefcit carne laxa, flaccida, & sordida, & facile ad tactum cruorem stillante in gingivarum hinc dicta excrefcencia sive dentium superincarnatione.

Ut igitur moveantur hæc mala, præmissâ debitâ radicis morbosæ internæ curatione, gingivæ flaccidæ, tumidæ, cruentæ adstringendæ, exulceratæ absorbentibus, & mundificantibus ac adstringentibus consolidandæ, corruptæ & plus minus gangrænatæ, ab ulteriori mali progressu præservandæ. Conveniunt igitur Flor. ros. rubr. flor. aquileg. &c. ex his paratum unguentum de aquil. ad scorbut. oris præsertim proficuum Descriptio profertur in Tilemanni materia Medicin. C.C. & ebur. ust. Lacca & Myrrha alumin. tam crudum quamustum lap. canceror. fol. quercus. ligustri, radix ireos, flor. bistort. tormentill. flor. malvæ arborefcens. nasturt. aqua ruta, salvia, Rosmarin. Ex his vel sunt Pulver. dentifrici, cujus exemplum vide in Barthol. Centur. 6. histor. 54. vel ex iisdem fit decoctum verbi gratia, Ruta in vino decoctâ, quo calidissimo os eluatur, egregia est contra hos affectus scorbuticos. Salvia. item Rosmarin. decoctâ in aqua cum paucis additis aluminis, egregius est Gargarismus ad dicta dentium vitia vel

℞. Herb. salv. Man. ijss. flor. malv. hortens. rubr. Man. j. rad. polypod. unciam sem. Fiat decoctio in lib. j. aqua fontana colatur. adde



adde mellis rosat. ʒi β. alum. ust. ʒj. lapid. prunell. ʒiij. terr. sigillat. ʒj. M. l. Dentilivium.

Pertinet huc *Gargarismus de Tormentilla Myrsini* pag. 403. *Decoctum ad gingivas roborandas Poteri in pharmac.* pag. 313. Si quoque aliud quid, certe Myrrha & lacca in istis gingivarum vitiis sunt præstantissima. Huic Tinctura lacca associari solet. Nam sola Myrrha crebrius Matticata præservat egregie contra scorbutum oris. Tinctura lacca proliat, pag. 46. *Arnament. Myrsi.* & Conf. M. C. Ann. 6. App. 26. B. D. *Michaelis* tincturam lacca ita parabat.

R. Phlegm. vitrioli q. v. in quo dissolve alum. q. s. soluta & mista infunde lacca pulverisatæ donec tingatur M. Porro ulterius mel rosaceum cum spiritu salis tantillo usque ad gratum acorem imprægnatum, omnia ulcera & putredinem partium in ore sanat, si præsertim ex scorbuto originem ducant. In specie si simul cum decocto salvia subinde abluantur gingivæ. Egregium quoque est *linimentum Hartmanni* ad hos gingivarum affectus, quod describit in *prax. chymiatr.* pag. 123. Sed cui non incommode Myrrha addenda venit, ad imitationem *Senn. in prax. lib. 3. p. 5. f. 2. cap. 7. pag. 63.* Cui simile est elegans linimentum contra oris & gingivarum scorbutum, quod habet *Deckerus in comm. in prax. Barbett.* pag. 156. Cujus loco possit etiam recipi.

℞. Alum. crud. ʒβ. flor. aquileg. sol. salv. an. ʒij. Rad. ireos R. ʒiij. Myrrh. elect. ʒij. c. s. q. mell. ros. F. linimentum egregium ad vacillationem dentium scorbuticam. Vel.

℞. Rad. bitort. ʒβ. flor. ros. rubr. ʒβ. Balauit. ʒj. Aluminis ulsi ʒij.

Imprægnetur largiter spirit. cochlear. qui ad oris scorbutum est egregius. Hinc in excrecentia gingivarum scorbutica, succus cochlear. cum alumine usto mistus per quam egregius est. Sicuti ad hæc ipsa gingivarum vitia ex scorbuto nullo cedit vermicularis; cuius decoctum cum alumine & melle nobile experimentum est, gargarizando usurpatum. Vid. M. C. Ann. 6. pag. 50. In *Digbt Medic. Experiment.* part. 2. pag. 78. Item egregia est mistura pro his gingivarum malis ex aq. calc. viv. cum alumine crud. & uls. ac rad. ireos flor. quod in mentem revocat aliam non inconvenientem misturam, efficacissimam in scorbuto oris, nempe cremorem aquæ calcis vivæ supernatantem saliformem.

℞. Hujus cremor. ʒiij. Gum. lac. ʒij. Vitriol. Cypr. gr. vi. aq. rosat. salv. an. ʒiβ.

Solve calore leni, ut probe imprægnetur à lacca, eo laventur gingivæ, probatum est. Ac merito extollitur ulus, lacca: Nam B. D. *Michaelis* aliquando putredinem gingivarum scorbuticam, tantam ut gangranam minaretur, & propter insensissimum fetorem, nemo juxta ægum commorari posset, per solam tincturam lacca præmissis internis universalibus, feliciter reituit. Juxta laccam hanc nobilissima est Myrrha, verbi gratia.

℞. Fol. salv. alumin. ust. maxill. lucii piscis calcinat. Myrrh. rubr. an. ʒi β. Mell. q. s. pro linim. ad fricandos dentes.

Quod si efficacius postuletur, aliquot gutt. spir. salis imprægnetur.

In graviore malo ulterius procedendum est,

atque sic, præter *linimentum Hartmanni*, supra laudatum, ad unguentum Ægyptiacum melle rosato probe permixtum, deveniendum, pro graviore exulceratione, aut inde metuendis malis gingivarum curandis.

℞. Alum. ulsi, salis ammoniaci, an. ʒj. Mastic. thur. an. ʒβ. M. l. Pulvis.

Frictandus gingivis, postea quam ante & post decocto saliva, tormentill. ac ros. rubr. os elorum fuerit. Imo interdum aqua forti gravior gingivarum luxuries sedanda. Confert item *Linim. Sennert. l. 2. prax. part. 1. cap. 16. pag. 52.* Aut denique aqua viridis ex viridi æris, pau. o auripigm. alumine & quibusdam vulnerariis, addito melle in aquam mistis & decoctis, hic commode adhiberi possunt, quo affricte gingivæ à luxurie, flacciditate & putredine defendantur, e. g. lit vel aqu. virid. *Hartm. Pr. pag. 110.* Vel aq. virid. *Plateri* cujus descriptio proliat in hinc observationum ejus.

Stupore, tandem sive *Hæmodia* affici dicuntur dentes, siquem masticationem impedire, quando speciali doloris genere afficiuntur, post acida vel assumpta, vel vomitu rejecta.

Cui affine malum est *Algor Dentium*, dum frigoris tactu notabiliter alterantur dentes, nempe acidum & frigus inimicissima existunt dentibus, unde illorum nimia impressione afficiuntur fibrae, illorum interiores, & quasi irritantur, ut à cujusvis objecti actione specialis quidam dolor in dentibus percipiatur, masticationis negotium insigniter impediens.

Curat stuporem dentium portulaca recens masticata, calens tam recens quam Vetusius, adeoque alcali manifestiori dives. Si quæ caracea masticata, item calidum ovi vitellum, ad duritiem coctum applicatum. Omnium optimum calida urina applicata; Algorem quod atinet spir. vini dentibus affricus, vel panis calens masticatus, vel vitellum ovi assatum, calidè masticatum; item theriaca dentibus affricata huic malo medetur. *Michaelis Etmullerus collegii. Præf. Part. 1.*

In stupore dentium fricentur dentes stupidi sale, vel masticetur pannus laneus vel pilosus pileus.

In nigredine dentium evitanda, præsertim evitetur acetum & cibi admodum calidi.

Removeatur item sæpius adnatus Tartarus & impuritates dentium, colluendo os à sumpto cibo, vel cum vino.

Deinde nigredo & colores dentium sordidi hoc modo commodè auferuntur.

℞. Aq. fontanæ, dilue in eadem spiritum Vitriol. vel aquam seu spiritum aluminis q. s. ne scilicet nimium acefcat. Cum hoc lavamento quotidie manè & vespri cum Lacinia lanea frica dentes diligenter, deinde eisdem frica cum magisterio Corallorum vel cū hoc pulvere.

℞. Mandibularum Lucii piscis, Corall. albi. CC. ubi, aluminis ust. radices ireos ʒβ. sal. gemmæ ʒj. M. l. pulvis.

Nigredo dentium & linguæ, ex esu ceraforum vel myrcillorum extemplo tollitur suffitu candelarum sulphurearum, *Schweffelstecken*, faucibus tamen propter fumos nocivos oclusis.

(Nota, sordes & nigredinem dentium statim ac facillè quidem spiritibus acidis detergi, sed, si sæpius iis utamur, facillè dentes ut alcali os-

ffff seum



seum erodi fragileque factos postea tanto majori nigredine & squalore intici propterea in his affectionibus dentium commendatum habeas saccharum aluminis, de quo paulò infra, aut per se aut cum pumice corallive rubris præp. commixtum ut dentifricium adhibitum.)

Mobilitatem dentium auferit peculiare & specificum remedium seq.

℞. Gland. ʒj, gallar. ʒss, aluminis usti, succi acacix an. ʒss, fol. rosarum rubrarum M ʒ. Coque cum vini rubri ʒij, ad casum unius pollicis, postea cola. Cum hoc decocto sæpius quotidie eluantur dentes, rursus figuntur & immobiles redduntur.

Odontalgiam ex quacunque causa ortam ex quadam specifica proprietate tollit radix lapathi acuti (ante germinationem vere collecta præstat, mihi familiaris) exsiccata & denti dolenti applicata.

Idem præstat, sed remissius rad. lappæ quæ dolores subito aufert, humoremque superfluum extrahit magis.

Si sunt dolores ex destillationibus, decocto rad. urticæ majoris, alii decocto cum pauxillo nucis moschatæ rasæ & croci in vino adusto & acet. ana parato & calidè in ore, locove dolente retento humores illapsos mirabiliter extrahunt: ab initio quidem videtur dolor augeri, sed paulò post mitigatur & desinit.

Idem præstat decoctum Guajaci cum vino & aqua paratum. In eodem casu præstat decoctum serpilli (in primis si ex destillatione) vel ejusdem aqua gargarizando nempe cum iisdem.

(Dolores dentium propediem sedat aspersum sequens. *Saccharum Aluminis.*)

Rec. Aluminis crudi ʒij. vel iij. & per retortam in arena læto igne phlegma abstrahere, quo facto cessa, & refrigeratâ retortâ phlegma redde exsiccato alumini, cumque per 24. horas in digestionem B.V. steterint, phlegma iterum abstrahere, qui labor cohobandi, digerendi & phlegma abstrahendi septies repetatur. Tum post ultimum phlegmatis egressum, illud quod in fundo retortæ remansit, in cella humidove & frigido aëri expositum in liquorem abeat, qui filtratus & per 12. dies in cineribus igne lento digestus demum per cucurbitam in cineribus ad siccitatem usque omni humiditate exuatur. Remanet in fundo saccharum Aluminis.)

Si dentes sunt cavi & dolent, vel etiam citra cavitatem in dentibus dolentibus præstans est ol. Caryophyllorum, in cuius scil. ʒj. Camphoræ ʒss. solutus fuerit. Hujus compositi gut. j. vel altera in gossypio (præsertim quod cum mosco fuit) cavo denti immissa vel etiam dolenti aliquin applicata, omnem dolorem aufert.

Externum est laudanum opiatum in forma pilularum dentibus illitum vel inditum, vel externe (in genis) cum unguento alabastrino (gr. j. laudani ad ʒj. uiguenti) dissolutum. It. cum Emplastro de mastice & cera.

(Subitaneum est remedium persicariæ contrita & denti dolenti applicata vel ut pñula efformata cavo dentis imposita.)

Dentes corrofos juvat suffumigium ex semine Hyoscyami per tubulum vel tritorium ad dentem dolentem factum.

Dentes cariosi evelluntur promptius, si duobus digitis madefactis, ac inspersis pulvere ex

lacertis aquaticis exenteratis & in clibano calcinatis aliquandiu prehendantur. Lacertæ colliguntur Aprili & Majo.

Sic etiam dens ex maxilla mortui evulsus, & cum radice sua dentem cariosum sæpius tangens, tandem post aliquot dies frustulatum dentem cadere facit.

• Laxitati, putredini & exesioni gingivarum à proprietate quadam Aquilegiæ mederi videtur. Potest autem inde tale compositum fieri.)

℞. Pulveris fol. aquilegiæ, salviæ, menthæ crispæ, Nucis Moschatæ ana ʒss, Aluminis usti ʒj, mellis purissimi ʒiv. Mel incalescat ad ignem & leniter decoquendo despumetur, deinde pulveres prædicti cum melle adhuc calente sentim aspergendo misceantur & servantur ad usum. Hæc unguentò illinantur gingivæ bis quotidie (NB. Decoctum summatum rubi idæi etiam valet hic) quòd si cibus capiendus est, eluatur os aqua prunellæ vel infusò nasturtii aquatici in vino (in primis in scorbutico.)

Ad mundificationem autem gingivarum putrescentium maxime valet aqua illa viridis mea composita secunda, de qua supra in Narium affectibus, ozana nimirum.

Dolor dentium, quia plerumque fit à capitis defluxionibus, ideoque in curatione ipsius statim ad ea accedendum, quæ fluxionem inhibent. Unde statim temporibus applicandum Emplastrum de Gummi Elemi, vel etiam Mastiche factum, quod antequam applicetur, calefiat optime.

Inter scapulas applicetur cucurbita magna sine scarificatione.

Hunc statim ad repellentia materiam fluxumque evacuantia confugiendum, qualia sunt galla matura in acet. cocta, ita ut acet. in ore supra dentem dolentem detineatur calidè per horam ʒ vel j.

Hinc ad topica, anodyna ex proprietate occulta dolorem tollentia progrediendum.

Quod si continuus sit dolor hisce non cedens, sed ab aliqua intemperie vel capitis vel totius corporis, aut copia materiæ ad caput fluentis, & inde ad dentes, capiti simul providendum tum evacuantibus, tum alterantibus & confortantibus medicamentis, tum etiam toti corpori.

Topicorum quibus vel solis sæpius dolor omnis aufertur sequentia sunt præstantia.

Laudanum opiatum cujus gr. iij. cum gut. ij. spir. Vitrioli denti dolenti applicentur, simulque pil. j. in corpus assumatur: Dolor sopitur, applicato etiam Emplastro ad tempora, & si opus, cucurbitulis.

Similis planè effectus est oleum ex buxo destillatum.

℞. Serrati buxi q. s. & repleantur 3. partes retortæ vitreæ, retortam in cineres loca & destilla oleum & liquorem aqueum igne primùm lentò, postremùm fortiori, & tandem summo, & destillabit oleum. Idem oleum rectius per descensum aut per vesicam destillatur. Hujus olei (& buxo)

℞. Gr. iij. & cum vino, si affectus à frigida defluxio ne veniat, aut cum acet. si à calida. M. Contineat æger mixturam dictam in ore, post aliquid tempus exspuat. Si dolor nondum cessabit, repetatur, donec ad sextam vicem,



et tandem abluit os vino aut aceto, & sedabitur dolor.

Idem pulvis gallarum in succo radicis pyrethri decies vel ii. imbibitus & exsiccatum cum fermento, M. F. globulus parvus qui denti dolenti impositus dolori medetur. dentes firmiores reddit, vermiculos in ipsorum cavernis genitos necat, fluxiones omnes ad gingivas delapsas extrahit.

Tandem ultimum in omni & acerrimo dolore perfugium, applicare vesicatorium post aures & cervicem.

Exterius inungi possunt maxillæ oleo amygdalarum dulcium, & tumori applicetur emplastrum de meliloto. Si intus in ore ad apostema tendat dolor; fiat cataplasma ex sicca assata cum farina tritici. Si aperitur, dissolvatur mel rosatum in aqua plantaginis, atque eo abluitur os. *Joh. Hartm. in Prax. Chymiatr.*

Dolentissimi Dentes in radicibus, ubi membranae, & nervuli diffunduntur, à sanguine, vel lymphæ eas partes pertingente, acris, acida, salia, aut aliter præter naturam affecta; unde interdum etiam tument manibulae, & gingivæ; quin & dentes carie, ipsæ verò erosionis, ulcerationeque inficiuntur, & cum scalpuntur, vel cibus manditur, nonnihil sanguinis stillant. Tantis autem, ac talis dolor quibusdam accidit, ut impatientes mortem sibi adsciverint; quamobrem maximis tormentis annumerari potest ex Celso.

Inter dolorem sedantia, illiusque causam corrigentia omnium præstantissimum perhibetur à Roderico à Fonseca oleum buxi, si in foramen dentis una vel altera gutta injiciatur: quod etiam à Samuele Formio confirmatur, & modus illud extrahendi describitur, apud Riverium in observationibus eidem ab illo commentatus. Idem quoque præstari dicitur ab oleo caphuræ pari modo in dentis foveam instillato. At Julius Cæsar Claudinus extollit oleum Terebinthinæ chymicè paratum cum pulvere camphoræ. Camphoram ipsam in aceto modicum elixam adhibet Montagnana; itemque opium: Thonerus solam camphoram; & Rulandus oleum camphoræ gossipio exceptum; vel etiam oleum ligni heraclei, quo præterea humores ibidem stagnantes educi, vermes dentibus innatos necari, & causam quamcunque doloris adimi, ait. Alibi quoque laudat aquam solani, cum oleo vitrioli romani ad acidum saporem usque permixtam. Radices sambuci in aceto, & vino decoctas singulare experimentum inquit esse Raymundus Mindererus apud Grullingium. Decoctum Nicotianæ, & florum chamæmeli tepidum ore detentum commendatur Jo. Heurnio, & Riverio; & Cardilucio illud Sabina. Atque Foresto radix lapathi acuti concisa, & supra dentem dolentem apposita: quam etiam magnificè Hartmannus, qui præsentaneum quoque fitetur esse remedium oleum caryophyllorum cum quinta parte camphoræ. Essentiam similiter sagureæ mirificè dolores dentium sedare tradit P. Jo. Faber si aliquot guttis dens dolens & gingiva perfricetur infusâ, etiam in auribus guttula. Mirum est quod refert Helmontius se vidisse os brachii bufonis statim primo contactu odontalgiam tollere: & contactu dentis

hominis senio extincti, dolentem dentem excidere. At admirabilius, quod memoratur à Borello: allium contusum cum momento salis pollici admotum vesicas excitando, aquam educere, & dolorem dentium fugare. Bursâ pastoris pinisita, & indita auribus, sicut & naso betonica ejusmodi dolorem aliquando defuisse fertur ab eodem; itemque lapide imperiali dicto denti dolenti imposito: conficitur autem is ex sale petrae, & alumine fufis cum aliqua portione sulphuris: atque cerebro purgando, visui acuendo, & nervis opticis detergendis plurimum conferre dicitur. Sale traxini arteriæ temporum applicito curatum dolorem dentium vidit D. leleq. apud Riverium: & pice Burgundica cum pulvere nucis odorata, Borellus. Magnetem celo sereno in pulverem redigit Tacchenius, deindeque in calcem, donec viridescat; postmodum miscet cum farina, viuo, & tragacantho in formam rotularum, & denti laboranti utiliter imponit ex Grullingio.

Ad extrahendos verò dentes dolentes absque ulla Chirurgi opera, scribit Riverius efficacissimum esse helleborastrum, si eo dens affectus confricetur. Et Franciscus Joel. dissolvendum ait gummi ammoniacum, aut galbanum cum lacte esulæ, vel hyoscyami, ac decoquendum lento igne donec lac absumatur; residuum vero in globulos redactum dentium foraminibus indendum per noctem: mox sine dolore dentes eximi posse subdit. Idem & ego aliquando usu gummi hederæ arboreæ factum vidi: cujus decoctum cum rore marino in posca, tepidum ore detentum dolentibus dentibus mederi notat Heurnius.

Si verò stupeant dentes, ut ab acidis, creduntur prodesse portulaca mansa, cera, succus glycyrrhizæ, amygdalæ, avellanæ. At quicquid calet, certo hæmodiam tollere experimur; unde panis calens, vinum calidum, præcipue si in eo ebullierit salvia, rosmarinus, piper, pyrethrum, aliudve simile; aqua etiam ardens optima observatur. Fehr. Academicus curiosus sumum absinthii supra prenas injecti ore exceptum, dolorem, & stuporem dentium prohibere docet. Et Hartmannus eos sale fricari jubet.

Ad dentes insuper erosos valde prodesse suum odontalgicum scribit Crolius ad granum unum denti admotum cum gossipio. Et Fridericus Hoffmannus spiritum salis adhibet. Olea etiam & essentia onunum aromatum aliis sunt in usu, sed præsertim caryophyllorum; itemque spiritus vini cum modico camphoræ. Quod si præterea gingivæ ulcerentur, & sanguinem stillent, commendantur antiscorbutica medicamenta, infusiones, pulveres, & spiritus Nasturtii, cochleariæ, beccabungæ, salviæ, menthæ, & aquilegiæ, quam cæteris præfert Hartmannus. In usu practico sunt pulveres, & conditurae baccarum myrti, rosarum rubrarum; Coralliorum, myrobalanorum. Sed alkalia acutiora præstantiora existimantur; Et si fortasse tumeant gingivæ, ficus assus intrinsecus admotus præsentaneum remedium dicitur ab Hartmanno, & Borello.

Si dentium mobilitas accesserit sequens decoctum expertum ait Hartmannus, quod habet: glan. 3j. gallar. alum. usi, & succ. acac. singul. 3ss. sol. ros. punic. m. ss. decoq. in lib. ij. vini rubr. & servetur ad usum. Eo autem sepius dentes elucet.



tandiu fac coquere donec liquentur & aqua fiant: hanc in timo equino vel balneo inter serraturam abiegnam putrefac, & supernatantem oleosam pinguedinem, quoties apparuerit, corneo cochleari, aut ligneo aufer; nulla amplius adveniente, reliquam ut inutile abijce. Hæc allecta pinguedo dentes à suis radicibus vellit, adeo ut si frum hac illinatur bos aut equus hoc frum vorans in ipso præsepi dentes amittat. Linitur lignellum hoc unguento, & circum dentem ducitur, qui statim a tali illitu postea facillè separatur. *Theod. de Mayerne in Praxi.*

### Consultationes.

Dolor ille dentium, qui te tam immaniter exercet, a frigida destillatione originem habet, quæ a sinistra capitis parte in maxillam ejusdem lateris, & dentis nervos, interdum usque ad ophthalmos decumbit.

Ad hujus præcautionem primò cohibendus est catarrhus, caulæque ejus penitus circumcidenda. Id autem fiet his catapotiiis semel in mente devoratis, vel hac potione si ætas sit aut calida aeris constitutio. Sequenti die à prima purgatione consum caput his seminibus in duplicato linteo conclusis fricabitur, idque fiet spacio duodecim aut quindecim dierum quibus elapsis purgabitur corpus ut prius. Deinde postmodum caput maximeque pars ejus sinistra, pauxillo aquæ vitæ singulis matutinis temporibus fovebitur, asperso pilis, post forum, sequenti pulvere. Interea dentium ratio habenda: quibus deterfis ter aut quater in die longè à cibo sumpto, retineatur in ore & manducetur hoc mallicatorium, ad pituitam e toto cerebri corpore, maxime ex ejus ventriculis, per infundibulum in os & palatum attrahendam. Deinde hoc decocto sapissimè in die gingivæ abluantur.

Interim cibus boni succi vescendum, sobriè vivendum: abstinendum ab humidis; vitandum frigus capitis, dentium & pedum.

Remedia infra scripta diu ac diligenter continuanda, quia morbus est inveteratus.

℞. Mass. pilularum cochlearum & de agarico, Pilularum assaiereth. an. ʒj.

℞. Aquarum salvie & betonicæ, vini albi an. ʒj. In quibus infunde rheubarbari electi, Agarici trochiscati an. ʒj. In expressione dissolve diaphanici ʒij. Syrupi capillaris ʒss. Fiat potio purgans.

℞. Milli ʒss. Salis communis ʒss. Seminis anisi & feniculi an. ʒij. baccarum Lauri contusarum ʒj. fiat pulvis tenuissimus. Inspargatur raso capiti.

℞. Pyrethri, Staphisagris, Gingiberis, Cardamomi, Caryophyllor. Syracis calamitæ ana ʒss. Fiat pulvis subtilissimus ad usum dictum.

℞. Mastiches ʒj. Radicis Pyrethri ʒss. Cubebæ ʒij. Incorporentur in forma solida cum melle anthosato: hæc mallicatorium.

℞. Salvie minoris man. j. foliorum myrti man. f. Mastiches conquassatæ ʒss. Bulliant simul in vini albi & aquæ fontanæ an. ʒss. Coletur & reservetur in phiala pro collutione oris. *Job. Fernellius consilior. Medic. 5.*

Dn. Egidius Heidemann, Senator Colbergensis optime meritis, compater & amicus

meus honorandus dolore dentium punctorio ac profundo afficiebatur, adeo vehementi, ut aliquot noctes in omnes duceret, sapor in ore falsus, aeris & subamarus deprehendebatur cum aliquali totius corporis æstu & siti.

### Resolutio.

Causam hujus odontalgie, humorem ex bile & sero nuxtum esse, sapor indicat falsus, aeris & subamarus, non minus ac ipse dolor punctorius, qui vehementior quidem est & profundus, quatenus materia circa nervulum in radicibus dentium & membranam eorundem internam nerveam hæret.

Humores itaque serosi & biliosi addentes confluentes revellendi & repellendi, qui verò jam influxere discutiendi & evacuandi, imprimis autem dolor, tanquam symptoma urgens, mitigandus.

Præscripsi hoc nomine anodyna quædam & narcotica, scirellam scilicet parvam Mindereri, & laudatum opiatum cum spiritu vitrioli.

Revulsionis gratiâ cucurbitulas scarificatas scapulis & brachiis apposui: à phlebotomiâ enim prorsus abhorrebat.

Hinc vesicatorium Riverii post aures applicui; fronti & temporibus ad intercipiendam fluxionem emplastrum adstringens ex bolo, mastiche, & ovi albumine, induxi.

Interea & collutiones oris ex repellentibus & adstringentibus usurpatæ:

℞. Lol. myrrh. plantag. acetos. ana mss. Rad. oxylapath. tonnentil. ana ʒij. flor. rosar. rubr. balaut. ana p. j. Cort. granator. ʒij. Inels. & conquassat. coq. ex aqu. plantag. & aceto q. s. & colent pro collutione oris.

Ad evacuationem humoris serosi & biliosi præbui potiunculam:

℞. Rhabarb. opt. ʒij. Cin. m. acut. ʒss. infund. per noct. in aqu. cichor. ʒij. Endiv. ʒj. Manè colentur. add. syr. de cichor. c. Rhabarb. ʒvi. pulv. Gialapp. gr. ix. M. F. potiuncula.

Sub noctem magna ex parte remisit dolor, mane ad reliquias materiæ discutiendas & absorbendas commendavi aquam rosæmarini & salviæ cum tantillo aceti florum lavendulæ. Calorem totius & sitim rellinxi Julabio quod sic componitur.

℞. Aq. cichorii acetos. Endiv. ana ʒss. Syr. berber. ʒij. flor. pap. Rhead. ʒij. spir. vitrioli q. s. ad grat. aciditat.

His methodicè adhibitis ab immani cruciatu liberatus est vir optimus, quem ut porro salvum & superstitem divina præstet clementia devote precor. *Baldass. Timæus casuum Medicin. lib. 1.*

Adolescens 15. annorum, temperamento pituitoso præditus, cum à validiore exercitio excalescens, nudo capite se aëri frigido & ventoso diutius exposuisset, in atrocissimum maxillæ sinistri lateris plurium dentium incidit dolorem, usque ad capitis interiora & superiora se extendentem, quo diu noctuque continuò infestatur. Nullus in gingivis aut maxilla exteriori tumor, nulla rubedo aut inflammatio apparent. Sentit e dente quodam molari excavato serosum, falsum, acrem, ac instar glaciæ frigidum humorem in os exstillare.

1. Hujus ægri affectio Medicis *Odontalgia* & *Dentium dolor* appellatur.



2. Causa antecedens sunt humores pituitosi ac frigidi in toto corpore collecti, qui a majore calore exercitio conquiescent in vapores attenuati, sicque copiosiores ad caput delati, à causa procatarctica, scilicet frigore externo, non tantum ob pororum occlusionem intus detenti, verum etiam in liquorem serosum, & ob cruditatem salum atque acrem rursus condensati sunt, qui cum ad vias excrementorum cerebri evacuationi dicatas non decurreret, sed ad sinistri lateris maxillares dentes deflueret, acerrimum ibi dolorem exciavit.

3. Frigidum, serosum, ac salum esse hunc humorem ipse ager lingua satis percipit ex guttulis per excavatum dentem in os delabentibus.

4. Dolor autem inde fit, quod nervulus cavitati cujusque dentis molaris insertus una cum perioestio, quo cavitatis & radix investitur, ab acri humore eroditur, ab eoque summo frigore (quod nervis maxime inimicum) male afficitur.

5. Dolor autem sursum usque ad capitis interiora extenditur, quia nervuli dentium cavitatibus inserti, sunt propagines tertii & sexti paris; iis igitur male affectis, non est mirum totos illos nervos usque ad capitis interiora dolere: imò credibile est hunc frigidum & acrem humorem per cranii foramina, ex quibus nervi illi egrediuntur, secundum nervorum istorum longitudinem usque ad dentes defluere; sicque non tantum eas particulas, quæ radicibus dentium inseruntur, sed integros nervos secundum longitudinem à cranio usque ad dentes à dicto humore affligi.

6. Nullus autem tumor est in exteriori maxilla, quia humor ille, unde fluxio procedit, non est copiosus, sed paucus & acer. Neque etiam tumor fit in gingivis, quia humor in iis non diu subsistit aut colligitur, sed paulatim per excavati dentis foramen in os effluit.

7. Nulla etiam rubedo præter naturam aut inflammatio in gingivis aut maxilla apparet, quia licet humor defluens sit acer, est tamen actu & potentiâ frigidus, ita ut inflammatio aliave calida intempies ab eo produci nequeat.

8. Atrox hic dolor, licet in parte sit ignobili, atque hinc minoris momenti esse videatur, tamen contemnendus non est, cum propter summam crudelitatem, & continuas quas inducit vigilias, humorumque & spirituum commotionem, facile delirium, convulsionem periculosissimam, aut febrem validam inducere possit. Ac proinde illius curatio differenda non est.

9. In curatione primò imminuenda est causa attendens, mox continens, ac procatarctica statim removenda, dolor sedandus, & caput corroborandum.

10. Corpus igitur purgetur cum pulveris diatribith aut diacarthami drach. j. aut cum his pilulis:

*Rec.* Massæ pilul. cochiarum, aurearum, ana scrup. j. diagridii gr. iv. Cum pauxillo syrupi de stœchade, hant pil. vii.

11. Ad humoris in cerebri ventriculis contenti evacuationem hoc errhinum in nares attrahatur:

*Rec.* Succimercurialis, majoranæ, ana unc. f. betæ unc. j. f. Misce pro errhino. Hujus loco æger hoc pulvere sternutatorio subinde uti poterit:

*Rec.* Rad. pyrethri, hellebori albi. fol. majoranæ, ana scrup. j. piperis nigri gr. v. fiat pulvis.

12. Ad capitis corroboracionem, pororum apertionem, & frigidi humoris dissipationem, præparetur hoc capitium:

*Rec.* Fol. rosmarini, majoranæ, salviæ, ana m. f. flor. lavendulæ, meliloti, rosarum rubr. ana p. j. nucis moschatæ, gariophyllorum, ana scrup. ij. thuris, mastichis, ana drach. j. fiat pulvis grossus, è quo in tenui serico consuatur f. art. capitium.

13. Temporibus utrinque imponatur hoc emplastrum:

*Rec.* Thuris, mastichis, ana scrup. j. sagapeni, tacamaccæ, ana scrup. j. f. Misceantur, & extendantur in serico nigro: fiantque duo emplastra rotunda.

Interea etiam exhibeantur condita & apoze-mata cephalica, ex majoranæ, rosmarino, salviæ, betonica, conserva anthos, salviæ, aliisve similibus confecta. Tabaci etiam fumus per nistulam communi modo sumptus non erit inconvenientis.

14. Æger os sæpe colluat hoc decocto calido:

*Rec.* Radic. oxylapathi unc. j. pzoniz maris unc. f. Herb. majoranæ, salviæ, hyssopi, thymi, betonicæ, rosmarini, ana m. j. Sem. fœnic. anisi, ana drach. ij. vini q. f. coquantur f. art. ad lib. j. pro collutione.

15. Post collutionem denti excavato cum petiæ ex gossypio immittatur guttula una olei origani, aut gariophyllorum. In summo dolore interdum etiam pauxillum spiritus vini in ore ad dentes affectos detineatur, quod tamen non est sæpe faciendum, ne gingivæ inde lædantur.

16. Interea etiam ad humorum diversionem summa cum utilitate vesicatorium post aurem, atque in cervice applicabitur, & locus diu apertus servabitur.

17. His omnibus non juvantibus, in summa doloris atrocitate exhibeatur sub vesperam pilula ex laudani opiat gr. iij. aut tres pilulæ ex massæ pilularum de cynoglossa gr. xij. aut dentur philonii romani scrup. ij. vel iij.

18. In victu sit aer calidus & siccus, viteturque turbulentus, pluviosus, imprimis aquilonius. Cibi condiantur cum cephalicis calefacientibus; fugiantur autem omnia salsa, acrida, acida, & ea quæ caput vaporibus replent, ut allium, porrum, raphanus, &c. Potus sit cerevisia mediocris notæ, & vinum tenue. Somnus longior. Exercitium mediocre, & alvus facilis sit.

### Observationes.

Vir quidam literatus gingivarum laxitate & dentium carie affectus, scripta quædam medica evolvens, fortè incidit in Consilium Cratonis 72. ubi hæc habentur: Ad dentium putredinem & cariem vix ulla res melior est, quam spiritus vitrioli: paulo post & Horstii tractatum de Scorbuto relegit, ubi sectione. 2. Thesi 15. hæc existunt. Dentibus vacillantibus optimum est remedium spiritus vitrioli cum melle rosato mixtus, quantum ad intensam aciditatem sufficit: Inungantur gingivæ & aliz oris partes affectæ, singulis diebus ter. Remedio itaque huic à Medicis celeberrimis tantoperè laudato confusus, singulis diebus spiritum vitrioli cum melle rosato gingivis



givis & dentibus illinivit. Sed penitendo admodum eventu: Brevi enim consumptis gingivarum carnibus & laxatis alveolis, dentes, quos primores appellamus, tam superiores quam inferiores exciderunt, reliqui molares subsistere quidem, sed à medicamento acrimonia adeo corrosi, ut ciborum masticationi parum sufficerent.

Rectius olim hæc dere judicasse videtur Joël, cujus tomo sexto sect. 2. p. 157. hæc sunt verba: Parum bene consulunt, qui spiritum vitrioli crebrius dentibus illinire docent. Etsi enim eos candidissimos efficiat, tamen crebrior ejusdem usus eos calcinat & friabiles reddit: *Baldass. Timaus casuum Medicin. lib. 1.*

#### *Dentium dolor ploratus solutus.*

Nobilissimus Dn. Richardus Froreich, Hereditarius in Czarny Damerovv, amicus meus specialis, ultra semelstre dentium dolore interpolato & per intervalla recurrente miris modis vexabatur, tentata varia remediorum genera tam interna quam externa, sed frustra, subinde enim recrudit dolor, tandem inter acerbissimos cruciatus plorare cepit, adeo effuse ut ultra horam à fletu sibi temperare non posset. Exinde dolor penitus remisit, absque ullâ in hunc usque diem recidiva.

#### *Resolutio.*

Dentium hunc dolorem ab humore tenui & seroso excitatum, nullum est dubium, is fletu solutus & per lachrymas tam copiose promanantes, effusus, doloris immunitatem, sublata scilicet causa, dentibus attulit, secundum illud Poëtæ (ut inter lacrymas etiam joculari liceat.) Expletur lachrymis, egeriturque dolor. *Idem ibidem.*

Filia N. de intolerabili dentium dolore conquerebatur, qui per aliquot menses continuos duraverat, nec ullis topicis aliisque assumptis medicamentis dispelli potuerat. Consului ut per aliquot dies cubitum itura deglutiret duas pilulas, pisi magnitudinis, ex sola Aloë lucida confectas, nec quicquam superbiberet. Hoc cum ter quaterve fecisset, dolor cessavit, neque deinceps rediit. *Librand. de Diemerbr. in Observ. & Curation. Medic.*

Cornelia Jacobi mulier robusta dentium dolore vehementissimo cum dimidii capitis dolore laborabat: Huic tale vomitorium exhibui.

℞. Vitri. antimon. pulver. gr. xii. vin. alb. ℥v. Fiat maceratio per noctem. Manè coletur vinum per chartam emporeticam & detur pro haustu. Hinc plurima biliosa, pituitosa, ac tenacia evomuit, aliquot etiam secessus habuit. Nocte sequenti bene dormivit, & cessavit dentium dolor, neque rediit. *Idem ibidem.*

#### *Dens cancro affectus.*

In Sacris Ægyptiorum literis si quid auditum, aut arcanum luci proditum ac revelatum ostendere quis vellet, inquit Pier. Hieroglyph. l. 28. de Cancro, Pagurum & ejus generis pisces, vel testacea; quæ latebris gaudent, facie apposita figurabat. Ego hodie ubi obscurum infantis Hebræi casum, cancro non absimilem, ad illius causæ indaginem Naturæ curiosis propono, ab eorundem ingeniorum splendore, & toto orbi

cognita eruditione illi faciem adponi exopto. Erat hic puerulus unius anni, corporis emaciatus, coloris ad lividum inclinantis, in quo anteriores aliquot dentes naturaliter albicantes erupere, mox prodeunte alio retuso in mandibula sinistra, qui totus quantus niger conspectui sese osterebat: hoc etiam si intuentes parentes, ut manditum, & nunquam visum, admirati essent, cum tamen nullam molestiam puero inferret, per integrum fere annum nullo adhibito consilio tolerarunt. Sed ubi alios proximos mandibulæ sinistræ dentes pari atro colore inficere, tumor dolorosus parti accedere cepisset, ad malum debellandum Chirurgum sollicitarunt: Is non cognito affectu varia adhibuit, etiam tumorem scarificavit, infelici sane successu, non tantum gingivam sed & totam genam sinistram exulcerando. Anxio Chirurgus, parentes me in consilium vocare coacti sunt, Examinatis examinandis Cancrum primo occultum, nunc per intempestive, & immoderate adhibita exulceratum, ulcus certe malignum, sordidum, livens, & cæcæthicum aspectu horrendum esse deprehendi: Facto prognostico de gravi & periculoso morbo, in quo est repugnantia in via Naturæ, & quod Cancrum confirmati & exulcerati nulla fere curatio (maxime ubi commode excindi vel exuri non valet) meliusque fuisse eum occultum non curasse, curati enim citius intereunt, non curati vero longiori tempore vivunt, teste Hippocr. 6. Aphor. 30. nam cancer non exulcerati medicamentis resolutivibus facile exulcerari possunt, quæ ulcera, ut ab atrabilario humore provenientia incurabilia esse dixit idem Hippocr. Nihilominus ne misellus infans omni auxilio destitueretur, præter Diatam modice humectantem & refrigerantem, (aderat enim socia lenta febricula) palliativa ordinavi, quæ ipsi cancro blandiri, eumque lenire possent, ut ita minori cum molestia vitam transigeret, ceu est Aqua ad Cancrum *Chalmetæ*. Henrici 111. Gall. Regis Chirurgi peritiss. quo ulcus soveretur & ablueretur, appposito deinde Emplastro Saturnino *Mansueti*; Sed ulcus pertinax & rebelle, imò de sua natura insuperabile, superari non potuit, quod sensum serpendo musculum temporalem affectit, & convulsionem inducendo mortem acceleravit; Mirabilis certe hæc fuit observatio, & forte invidita, Cancrum radices suas tanto temporis spatio in hoc solo dente sparsisse, nec alios statim dentes affectisse: quod factum puto ob nutrimentum dentis depravatum, quod provida natura, quamdiu potuit, retractum servavit, abhorrens sui interitum.

Cancer hic à Dente oriundus, non fuit caries, nulla enim caries solido denti aderat, nec ista tumorem excitat, ut musculosas partes occupat: Neque fuit Gangræna, ea enim est imperfecta mortificatio ad necrosin, seu principium & via ad corruptionem, quæ ad plures menses absque vicinarum partium sphacelo & corruptione perdurare non potuisset. *Galenus* l. 2. de Arte curat. ad *Glaucanem* cap. 5. *Celsus* l. 5. suæ Medic. c. 38. & alii. *Matth. Franc. Hertoli.*

#### *Odontalgia à Verme excitata.*

Quidam Odontalgia inhumani ac periodica vexatus sensit in dente quid saliens per tempus



rum intervalla, cui remedia plura incassum adhibita: Abrafâ demum carie dentis in vasculum subjectum vermem expuit, qui capite ad caudam reflexo saltus varios iteravit, foramine inligui, per quod exierat vermis in dente conspicuo: Qui vermes suffitu hyosciami, seu cervino gingivis imposito, aliisque e dente elictos pro fibrillis habent, ab experimento hoc sæpius laudati *Tyson* aliter erudiantur. *Oligeri Jacobi*.

*De Mirabili quadam Odontalgia, & Innocia Opiatorum continuatione.*

Nobilis & honesta fœmina, à longo tempore valetudinaria, ob suppressos menses & regurgitationem sanguinis ad superiora, hæmorrhagia narium, quandoque satis enormi, sæpius afflicta, cum duritie laterum, inflatione ventriculi, pedumque tumore, ante duos annos convenientibus tractata remedijs, & imprimis ex *Acidularum Egrariorum* usu, penitus convaluit, & per integrum annum optime se habuit. Præterita autem ætate ex mœstitia & fletu largiori, dentium acquisivit dolorem, quem uno vel altero medicamento adhibito suppressit. Non multo post tamen recrudit malum, miris stipatum symptomatibus. Nam quotidie circa vespæram rediere dolores, quorum prodromus fuit materia quædam crassa, viscida, sanguinolenta inter dentem caninum primunque molarem in maxilla sinistra superiori effluens: hanc excipit limpidissima pituita, continuo stillans, adeo copiosa ut vasculum satis magnum impleverit, cum cruciatibus tota nocte durantibus. Observavi, quo sputum limpidius eò acriores fuisse dolores; illo cessante, remissè etiam istos. Adhibui quæ concipere poteram, revelentia, repercutientia, appropriata, sed omnia frustra. Nihil magis conduxit quam *Laudanum Opiatum*, quo dolores & fluxus istius pituitæ suppressi, somnusque procuratus optimus. Dum hæc ita sunt, in oculo sinistro extrinsecus naturaliter constituto, omnia apparere duplicata, sine quidem dolore, sed cum magna molestia: applicatis velicatorijs restitutus visus in integrum, quem tamen elapsis aliquot septimanis penitus in eodem oculo amisit, itidemque exiguo temporis spatio elapso recuperavit, perseverantibus in eodem statu doloribus. Dentes quos inter hæc materia effluxit sine labe erant, alterum tamen eorum, quia vacillare videbatur, evelli curavi, absque ullo emolumento. Tandem omnium pertæsa, solis, me licet, quàm maxime dissuadente, inhaesit opiatjs, sumendo illa quotidie. Sic allevata Mense Decembri *Viennam* concessit, unde mihi ante sex vel septem septimanas scripsit, quod in illum usque diem quotidie, antequam cubitum eat, bolo ex granis tribus *Laudani cum Confect. Alkerm.* parato utatur, quo vel una vice omisso, statim percipiat dolores majores. *Caroli Raygeri*.

*De Vermibus Dentium.*

Quemadmodum nulla ferè corporis humani pars, quàm nobilis etiam illa sit, existit, quam non aliquando à vernibus infestatam observarint Scriptores Medici; ita neque dentes ab iis immunes sunt, quippe qui, carie excelsi excava-

tique, huic ex putredine enatz soboli nidum sat commodum præbent.

Quales eos observaverit *Excell. Dn. D. Joh. Nicolaum Pechlinum, P.P. Kiloniensis, & Collega curiosus honoratissimus. Observatio 24.* superius exhibitâ ostendit. Nobis, ut paulò post dicemus, alia prorsus species sese obtulit, nosque dubios fecit, utra eorum *Sinonum* nomine, quo vermes dentium, *Battus Syria monacho* olim ob nimiam inedia enatos, vocari docet *Jenstonus; Hist. Nat. de Insectis l. 3. c. 1. art. 3. p. 184.* appellanda sit.

Acutissimorum verò dolorum vermes hi omnes causa exsunt, adeò ut de necandis & tollendis iis meritò solliciti sint Practici: & præ reliquis varia commendat *Sennertum Med. Pract. lib. 1. cap. 10. pag. 26.* Quibus jure meritò annuerandum cenleo mucum, seu chyli reliquias interiori tunica ventriculi suilli adherentes, qui licet sordidum quadantenus, & delicatioribus tortassis abominabile sit remedium, vulgo tamen nostratibus crebris experimentis est commendatissimum.

His ipsis diebus Fœmina, intra lares meos habitans, doloribus acutis lancinantibus dentis maxillatis excavati vexabatur, qui, licet medicamentis sopirentur, subinde recrudescabant. Tandem suasu alterius fœminæ, ut est illud hominum genus in talibus consilij promptissimi, rorellæ loliolâ conglobata denti cavo, remissè tunc dolenti, indit. Malum! subito dolores in immensum exacerbantur adeò, ut ob eorum vehementiam saltim non ad insaniam redigeretur. Commodum autem accidit, ut in vicinia porcum culinæ destinatum eviscerari audiret: Auxilij ergo, quod alia vice in simili dolore senserat, adhuc memor, lanionem adit, & mucum, pyloro ventriculi adherentem, calentem adhuc petit, eumque linteolo exceptum, formula noduli, dolenti denti imponit. Post breve tempus titillationem gingivæ percipiens, nodulum ex ore eximit, atque vermes plurimos linteolo adherentes invenit, pluresque alios cum phlegmate viscido expuit: dolore paulò post sopito.

Vermes hos aqua ablutos mihi ostendebat, qui, lumbricorum more variè se contorquentes, aliquandiu adhuc vivebant. Latum pollicem longitudine ferè omnes æquabant, tenuissimum netricum filum crassitie vix superantes; coloris, dum vivebant, incarnati, mortui verò & arefcentes magis rufescebant. Per microscopium inspecti egregiè intellinorum lumbricos referebant, utrinque in acutum rostrum desinentes, corpore ex annulis innumeris coagmentato pellucido, rubello intestinulo per cutim transparente.

Cæterim ut muco isto vermes dentium infestatos & ex cavernis suis elictos vidimus; ita olim *D. Rasternus*, vermem crus perforantem interna ventriculi suilli pellicula evocatum observavit *Observ. 312. anni 3. Eph. Germ.* dubio procul ob congenerem quendam putredinis odorem, quem tunica ista, multoque magis mucor ex dapibus, quibus præprimis gaudet amica luto sus imbibit. *Gottfredi Schulzii*.

*Vermis Odontalgicus.*

Horrida olim morborum exempla nunc tandem suffragante experientia credibilia fieri com-



comperitum est. Vermes in solido durissimoque corpore generari res visa supra fidem: at postquam Lapidum quoque corruptelas & detrimenta à vermibus excitari innotuit, etiam de verminosà Dentium carie observata narrantibus fides negari non poterit. Mirari autem usque subit, qui molliculum & penè invisibile vermiculi rostrum tam solidi durique corporis perforare substantiam possit: perforat tamen, & à basi ad radicem usque cylindrico foramine pertusum dentem solo doloris indicio comonstrat: neque enim ante demolitione animalculi contabit, quam transiit corpore sensiles nervorum fibras attigerit. Enimvero tum inmanissimos cruciatus parere mobilis rostri petulantia solet, & in abdito latenti impune grassandi libertas est, non facile aliò quam Dentis jacturà coercenda. Sed quod & quale illud rostrum? Sanè plusquam Corneum & annulati corporis impulsu vibratum vel ferro par; neque enim aliter tanta ossis duricies superati posse videtur. Major autem de origine & natalibus hujus animalculi difficultas. In Dentium cavernis, ubi ciborum reliquiæ hospitari solent, putredinem esse, quæ spiritu animata in vesiculas sese induat, idea aliqua operante, articulatas vermemque referat, mobile animal, tralaticium est. Sed unde prima vermiculi exordia, quando nulla adhuc caries in Dentibus conspicienda, aut quis ille in integro solidoque Dente foraminis cylindrici auctor? Nimirum obita sunt plerumque Dentium bases, quæ alvearibus infiguntur, mucò quodam albo, quem qui oris amant nitorem, aliquoties de die, imprimis autem manè, detergere solent, aptatis in hunc usum Radicis Altheæ fibris. Hic ipse mucus nuperis Leevvenhœkii, mirifici in explorandis minimis Mystagogi, Observationibus totus quantus verminosus deprehensus, & fortè ex hac classe aut tribu est, qui deinde oberrans rostri aliqua prærogativâ impulsus Dentem corripit, erodit, tandemque miserum os notis doloribus crudellissimè exercet. Cùm autem mihi quoque exemplum vermium ejusmodi objectum sit, operæ pretium me facturum esse existimo, si, quid mihi obtigerit, recenseam. Vetula erat tabenco & propemodum corrolivo Scorbutò affecta, quæ tandem inter alia Symptomata præter meam expectationem in deploratam incidit Odontalgiam nullis planè remediis, neque optimis, cedentem. Solet nempe ludibrium Artis esse Dentium dolor, & magis sæpe anilibus, superstitiosis vulgaribusque subigi remediis, quam exquilitis, delectis, &, ut alibi vocant, Canonis. Adeo nihil hic conceptæ formulæ aut excoctatissima remedia juvare videbantur. Anicula autem, sive asperitate doloris seu casu adacta, Mel, quod fortè in propinquo erat, cujusque alias usum suspectum habebat, delibare audacius cœpit, & ne consilium temeritati deesse videretur, ruinosis dentium cavitatibus petulanti lingua inferere. Hic ubi medicaminis inconsulto assumpti poenam expectabat, augmentum doloris, præter opinionem alia accidunt; nam vix horæ momentum, cùm dolore se remittente notat intolerandam in summâ linguâ pruriginem, quam ut à fluore acri salso oriri credidit, tentata manu medela, reperit tandem volubiles passim vermiculos numero quinque.

Accessi me protinus jubet tam exilium monstrorum fortuita domitrix, vixque intratveram ænes, cum illa gaudio perfusa atque à doloribus libera tum lulum fortunæ hurbilem, tum vilis remediis successum operosè explicat. Postquam autem nudati oculorum aciem, tandem & armatam admovere cœpi, inveni eos pediculis planioribus, si seriem pedum annulatamque corporis formam exceperis, sanè quàm similes multo saltem concinniores, quam quos in Ovium Hepate comperit experientia vulgusque Lanionum in Italia *biscisli* vocat, à Francisco Redi, Nobili Aretino, illo de Insectis libro, depictos. Illi autem Vermiculi unde nati, quod ovo, semine aut putredine educti? Figuratum ibi rotundulumque & oviforme corpus hâsisse, quod sese deinde accessu Archæi alicujus in Vermiculum refluxerit, nequidquam credas, jam verò etiam superstitis elæx ramenta seminio ante aliquo aut ovulo animata in planum tandem figuratumque animal excrevisse est cui dubitemus. An potius ex Scorbutico dentium lattaro Spiritus, vel Idæx seminalis unde raptæ commercio vivaces & ampullatæ vermium vesiculæ, tandem etiam rostratæ pedatæque emerferint, penes alios judicium esto. Quomodo deinde tantum creaverint dolorem? Utrum sugendo trahendoque Hirudinum instar, nam dolorificæ suctionis speciem persensisse se agra significabat? An verò mordendo & vellendo nibrillarum nervearum extrema, quæ exesa cavitatis fornici impendent, si modò ulla denticulorum vis in tantâ exilitate frangi possit? Id verò constat, Vermes, qui in vultu sæpe nidum ponunt pustularum specie, ipsis sese cutis & glandulosi contextus poris intulisse, subinde etiam fusco aut nigro capitulo emicare doloremque si quæ exaltant, aut pruriginem, ad feri lassioris affluxum inquieto articulorum motu efficere. Sed quod de Verme Odontalgico monui, utrum ad alios quoque dolores & Auris illos quos immanes sæpe notavimus, & Dentium istis vel pares aut majores, transferri possit, non antè dixerim, quam in Ceruminibus quoque, non aliter ac in Dentium illo mucò, Vermes enasci experientia comperitum sit. Memini tamen in corrupto utriusque auris Cerumine analogi quid vidisse; corpuscula certè erant ampullata & figurata alia aliis incumbia; sed quod vitali motu, attrita forte & refrigerata, destituerentur, non statim temerario sensui accedere opinio debuit. At cùm in Pipere, in Calcè, & acerrimis quibusque rebus, nasci vermiculi possint, ceruminum illa materia, mitis sæpe & purulenta, verninationem non abnuit, & sic etiam novis durissimisque doloribus scenam parare poterit. *Nicolaus Pechlin. in Observat. Physico-Medicin.*

#### *A Dentium dolore Maxilla Caries.*

Neque ideo omnis dentium dolor à Verme repetendus, aut patticulate contingens universaltenuciato æquiparandum, quando tot iterum alia causæ tragediæ huic ineundæ materiam præbere possint. Est Sanguis, Serum, Pus, sunt alia, plerumque tamen corrosiva, quæ eundem illum dolorem creare queunt, quid quod necessestium ex hac parte sit immunitas. Atque hinc



hinc adeo est, quod in nullo admodum morbo tanta sit medicamentorum varietas, tanta farrago, atque in ipso hoc, si partem attimes, exilis sane morbo. In hominis saepe sanguis sive ab Utero seu aliunde in caput inque dentem redundat sola sanguinis missione revocandus. Aliis serum copiose destillat, uervisque dentium filamentis acrimonia, eaque salsa aut acida, infusat; aliquando & frigore Ammoniacali, nunc & estuoso calore aut vicina aut deflua lymphainfestat. Aliquando etiam a sordibus & dentium mucilagine, cui ipsi vermes innasci non improbabile est & jam vidimus, orta aciditas atrocissimis doloribus ansam præbet. Hac ego mucilagine universos interm atque encruti dentes vidi, nec ante dolorum requiem fuisse, quam acri adstringenteque Decocto comminuta vici lamellati aut membrane instar recederet. Hic certe acor est ex putredine natus, & ut Ossium texturæ nihil est acido hostilius, ita Caries quoque ab uno illo nasci plerunque solet; atque ita feralis ille dolor ab impuritate oris, ab ascendentibus ciborum reliquiis originem saepe trahit. Sit Vermis, qui denti allapsus foramen figat penetratque, sed in hoc deinde foramen abdite ciborum reliquie putredinem & ex illa acrimoniâ concipient adeo Nervorum filamentis Dentiumque radicibus infestam. Posse verò etiam lympham, illam glandulosâ Gingivarum carnis sobolem, tam interneccina subinde acrimonia inbui, ut omnem à Medicamentis temperiem recuset, & tandem cum tempore carniū texturam ipsorumque imprimis ossium terebret perimolatque, nec ante desinat, quam rodendo suam ipsius infregerit acrimoniā. Observationibus puto consilare. Ostendit mihi Pharmacopœus & doctus & Artis suæ peritissimus Spongiosas tubulatasque maxillæ inferioris lūminas complures, quas acrimonia lymphæ sæpius per aliquot hebdomadas sevientis sedibus suis extruserat exulcerata carne, mox iterum sedata ferocia coeunte. Notus mihi aliàs, qui Fistulam aluerit in Gingiva inferiore prope dentem primum molarem; fundebat illa semper aliquid putide saniei, quâ sufflaminata dici non potest, quantis doloribus excrucietur; adeo nunquam de consolidando hoc vulnere fuit sollicitus. Sed quæ illa lymphæ ferocia, aut, si mavis, *idonea*, non carnes tantum sed & ossa, spongiosa illa & tubulata maxillarum, narium vicinæque depasci illæsis dentibus, quod in atrocissima illa Scorbuti, Stomacacæ; specie & in Lue Venerea non sine horrore vidimus. *Idem ibidem.*

*Alveoli dentium ob varias causas penitus consumiti, unde dentium vacillatio & casus.*

Affectui in Observatione 76. descripto, puta ossium diminutioni, jure merito annumeranda est talis alveorum dentium in nihilum redactio, in qua ne vestigium quidem eorum relinquitur, unusquisque tanquam ex tripode dictum, pro certo habet alveolos seu præsepiola dentium evulsionem aut casum spontaneum neutiquam manere aperta. Cui opinioni calculum quoque oppono: Alit verò quid proprie in illa commutatione eveniat, non satis unanimiter

eloquuntur Anatomicorum Coryphæi. Curiosus partium & structuræ corporis indagator Thomas Bartholinus hæc nobis reliquit in sua anatomia cap. 9. fol. 720. Aliquando *obliterantur & constringuntur* (de dentium dissenit alveolis) *dentibus cadentibus vel evulsis*. In senio non raro *amissis dentibus alveoli oblitterantur, & circumiacentes acutiores facti, durigunt, ut in senibus ad manducandum dentium vires subeant*. Adrianus Spigelius super hac re ita inquit: *Tot sunt cava, quot dentes, cum quilibet primum erumpens sub propriam ac peculiare condas præseptolum, concident etiam secum una alveolum suum perdat, imò ne vestigium quidem maneat*. Joannes Riolanus in sua Anthropographia hæc habet: *Dente evulso, nisi novus succedat, ita constringitur & occidatur alveolus, ut ipsius nullum remaneat vestigium*.

Horum neminem refutare animus est, sed potius eorum observationibus illustrandis hæc addere; nempe non solum alveolos in senio oblitterari, & circumiacentes acutiores & duriores fieri ad manducandum, aut alveolos occideri, aut concidere; sed præterea in multis ita in nihilum redigi, ut, mirum visum! maxilla tam superior quam inferior tantum spatii in profunditate amittat, quantum occupavere alveoli: ita ut ne quidem minimum digitum lata maneat inferior, superiorque ad nasum ferè usque deficiat. Hinc foramina pertransienti ramo nervi quarti paris, (ut cum antiquis loquar destinata, non in antica & laterali maxillæ inferioris parte, sicuti in maxillis quæ dentibus alveolisque omnibus instructæ sunt, inveniuntur; verum in summo maxillæ inferioris. Hinc etiam maxilla superior tantum amittit de sua altitudine, ut inter os & nasum latitudo calami scriptorii vix intercedat. Causam illius destructionis aut potius totalis annihilationis alveolorum, soli attritioni in masticandis cibis non possumus adscribere, sæpe enim videmus dente uno evulso alveolum ipsius ita aboleri, dentibus proximè aditis alveoli attritionem cohibentibus. Imò non raro in nihilum rediguntur alveoli ante dentium casum aut evulsionem, unde vacillantes dedites maxillis solummodo coherent gingivarum & membranarum beneficio; & gingivæ quoque deficientibus eos soli membranæ adhaerentes deprehendi. Frustra itaque in tali constitutione dentium remedia: hemiorem cohesionem queritant homines totum malum scorbutico attribuentes, & nil minus quam defectum alveolorum suspicantes: Noli interim credere, Lector benevole, hoc malum nemini contingere, nisi ætate provectioribus; memini me hoc in triginta solum annos nato vidisse, qui aliquot ex anterioribus dentibus ita vacillantes aliquamdiu gestarat, donec nullis proficientibus remediis antiscorbuticis facillimè eos solis digitis evelleret. In aliquibus (ut dixi) etiam observavi, simul cum alveolis gingivæ perire, & per solas tunc membranas dentes maxillis adherere, idque tum laxè, ut ne quidem liberè comedere possint afflicti, imò a linguae motu in locutione tanquam fluctuantes sese moveant dentes. Dixi superius, eorum alveolos in masticando cibo ab attritione sola non aboleri, neque etiam puto eos semper pellicula ossea claudi, aut concidere, vel occideri, verum in nonnullis senibus in totum aboleri & in nihilum



nihilum redigi, quemadmodum arteriæ umbilicales, sætu in lucem edito, sæpe in tenuem degenerant membranam, ac si nunquam arteriæ exstiterent; sic & mammae in senectute sæpenumero in totum exarescunt. Itaque si perquam tenues sint à natura facti alveoli, evulsis aut elapsis dentibus non habent unde repleant cavitatem, & propterea maxillæ ita diminuntur. Si vero aboleantur alveoli antequam dentes exciderint, nullam aliam agnosco causam, quam scorbuticam affectionem, & tartaream materiam dentes obsidentem; unde non solum gingivæ, verum etiam alveoli sentim sentimque consumuntur. *Frideric. Ruysch. Observat. Anatomic. Chirurgic. Centur.*

## DEPILATIO.

Vid.

## PILORVM DEFLUVIUM.

DERBIA

Vid.

## IMPETIGO.

## DESIPIENTIA

Vid.

## DELIRIUM.

## DIABETES.

**D**iabetes apud antiquos morbus adeo rarus fuit, ut multi celebres medici nullam ejus mentionem fecerint, & Galenus tantum binos ab eo laborantes noverit; in nostro autem seculo computationibus, & imprimis vini meracioris ingurgitationibus dedito, affectus hujus exempli, & instantiæ satis crebræ, ne dicam quotidianæ occurrunt: verum ut ut familiaris, & quoad Typum satis sit notus; quæ tamen sint ejus causæ, & ratio formalis fere in totum nescitur. Super his philosophari seu potius conjectare ausim, imprimis morbi hujus descriptionem quoad omnia, aut præcipua ejus phaenomena trademus; dein, cujus partis aut humoris vitio ea singula oriuntur, perquirere nitemur.

Diabetes à *αἰσίνη* transco dicitur materiæ potulentæ nimis celer transitus, item urinae profusum. Hoc affectu laborantes multo plus mingunt quam bibunt, aut alimenti liquidi assumunt; insuper sitim continuam, atque febrem lentam, & quasi hæticam semper adjunctas habent. Quod autem plerique Authores potum aut parum aut nihil immutatum reddi asserunt, à vero longissime distat: quoniam urina in omnibus (quos unquam me novisse contigit, & credo ita in universis habere) tum à potu ingesto, tum à quovis humore in corpore nostro signi solito, plurimum differens, quasi melle aut saccharo imbuta, mire dulcescebat. Prædicti erroris occasio, (ut opinor) fuit urinae color, qui semper crudus, aquosus, velut Pica, aut hydropes laborantium, apparet. Ut symptomatum tum horum rationes indagemus, primo inquiratur unde urinae excretio tam copiosa, & celer est, dein ad reliquam affectus hujus ætiologiam procedamus.

tiologiam procedamus.

Quod nonnulli pro Diabetis causa, renum vim attractricem assignant, nobis minime aridet: quippe sanguis ad renes non attrahitur, sed motu cordis pellitur. Porro nec serum è sanguine eos perlucens hauriri, aut emulgeri, sed partim percolatione, & partim fusione quadam sive præcipitatione (prout superius clare ostendimus) secerim videtur: quapropter Diabetem sanguinis potius & immediatius, quam renum affectionem esse, & originem suam inde sumere credimus, quatenus cruoris massa velut deliquescit, & in serositatem copiose nimis funditur: quod equidem ex urinae quantitate ita in immensum aucta, quæ non nisi à sanguinis deliquio, & consumptione procedat, facile constat: Propterea item cruor relidus, sero ejus ita ubertim abscedente multo crassior, & ad coagulandum aptior evadit: uti ex pulsu celeri, & laborioso arguere licebit: nam idcirco vor rapidius movetur, ut sanguinem, plus solito dum exagitat, à coagulatione præservet. Porro ut hujus fluiditas, ob nimiam serosi laticis impendia periclitari apta, continuari possit, materies potulenta siti inmani urgente copiosissime ingeritur, ac insuper humores solidis partibus impacti à sanguine resorbentur, quinimo ipsarum sarcinenta in hujus reparationem deliquescunt, hinc ut morbo isto laborantes, plurimum sitiant, & brevi emacescant.

Itaque, ut Diabetis causam conjunctam, & rationem formalem designare ausim, opinari ducor sanguinis crasin sive missionem ita laxari, & quadantenus dissolvi, ut particulæ aquosæ à crassioribus contineri nequeant, quin illæ harum amplexibus cito elapsæ, & salinis imbutæ, per vias renum maxime patentes excurrant. Interim vero ad sanguinem disuendum, & à coagulatione vindicandum, humores alii, tum ab extra, tum intus in eum corripuntur; atque præcordia magno usque molimine in motum rapidiorem urgentur.

Præterea tamen in causæ conjunctæ partem aliquam renes quandoque accedere putamus, utpote quorum fermentum ita nonnunquam vitiari solet, ut sanguinem non salis lixivialis influxu in debita mixtione atque fluiditate continet, proinde ut serum mera percolatione ab eo separaretur; sed interdum accidit à sale acido in renibus deposito cruorem, dum eos pertransit, velut à coagulo quodam in serositatem copiosam, quæ mox per ureteres amandatur, præcipitari. Hinc observare est, in plevisque Nephritidi obnoxiiis paroxysmos ingruente urinam limpidam, & copiosam reddi. Cujus causa est, quod humor acidus per ductus nervicos illuc delatus, & dolorem (prout alibi ostendimus) excitant, imprimis sanguinem renibus illabentem fundit serique uberioris ab eo decellum producit.

Cæterum non improbabile est *superius* copiosam, aliquatenus à renum mala conformatione procedere, in quantum scilicet horum tubuli lymphatici nimis ampli, & patentes, seorsum laticem nimis prompte excipiunt, & sine remora quavis celeriter transmittunt, propterea ut major eius quantitas in urinam excurrat. Verum enim vero ut tubulos hos quandoque, & præ-



sertim in calculosis, nimis patere concedamus; at tamen proinde lotium cruentum potius, quam copiosum excerneretur. Et revera mictionem sanguineam à tali potissimum causa exoriri putamus. Porro cum urina copiosa, & cruenta simul existit, sanguinis dyscrasiam cum mala Renum conformatione concurrere censemus, prout in causa cujusdam ægrotantis notabili mox declarabitur.

Interea non est ut dubitemus, præcipuam & maxime crebram Diabetis causam, in sanguinis multione dissoluta nimis, & laxa consistere, quin etiam pari ratione minutam, & debito paucio rem, sæpenumero à sanguinis compage nimis stricta, & velut obserata pendere. Porro hic opportunum erit inquirere an non totalis urinæ suppressio interdum à tali causa procedat? Quanquam enim satis vulgo notum est, Iscuriæ fortioris & pertinacis causam, sæpissime infra renes consistam, omnino à ductibus urinariis penitus obstrictis pendere, cumque egomet plures ab urina totaliter suppressa defunctos aperui, in omnibus reperi mortis causam invincibilem, ureteris unici paulo antea patentis (altero dudum occluso) à calculo recens impacto, obstructionem fuisse. Attamen Doctiss. Dr. Riverius duos refert Ægrotantium casus, in quibus Lichuria totalis & plurium dierum sola phlebotomia curabatur, & propterea morbi causam ascribit Venis Emulgentibus supra modum distentis, adeo, ut propter feri expulsionem se contrahere nequirent, quemadmodum observatur passim in vesica urinaria, quæ valde impleta non facile ad mictionem componitur. Verum enimvero, ut Historiis istis (uti par est) fidem præstemus, isti tamen Ætiologiæ assensus minime debetur. Quippe vasorum emulgentium non illud munus est, quod vir Clarissimus assignavit; non venæ enim, sed Arteriæ serum una cum sanguine, absque ullo urinæ plenitudinis aut rigiditatis periculo, constanter deferunt; cum autem serum in vias patentes non cito excurrat, ratio videtur esse, quod cruoris, massa stricta nimis, & compacta, laticem aquosum, intime permixtam e sinu suo ægre dimittit.

Huc facit observatio Anatomica super cadavere Reverendissimi Episcopi Cestrensis nuper facta. Cum Illustrissimus ille Dominus, diu calculosus, demum à suppressione urinæ diuturna fatum obierat; mox præsumebant omnes lethi causam fuisse, ureteres à lapide aut materia sabulosa penitus obturatos; attamen disquisitione per Anatomiam accuratissimam adhibita, nulla omnino in ductibus istis obstructio, aut lotii impedimenta deprehendi poterant. Similem huic observationem anatomicam haud pridem à se factam retulit mihi vir Doctiss. D. D. Lover, ubi mirum Ischuria lethalis, nulla prorsus circa vias urinarias sui vestigia reliquerat: Hinc ut conjicere obvium sit, liquidem renes insuper facti tecti erant, morbi causam omnino in sanguinis concretionem, & compactionem nimiam consistisse.

At vero à diverticulo hoc regressi, post Diabetis causam conjunctam, & rationem formalem explicatas, ad causas ejus procatareticas eruendas procedamus. Itaque si inquiretur, unde sanguinis compages ita laxa, & dissoluta, inque serositates deliquescere apta evadat; dici-

mus, hujus sicuti & lactis, fusionem ex eo procedere quod cum in massa ejus sales, diversa indolis conveniunt, & associantur, reliquæ particule salinis (quæ eas ab invicem sejungunt, & in mixtione continent) liberatæ statim in partes secedunt. Quod si amplius inquiratur, vadenam sales illi, quorum privata combinatione, sanguinis multionem solvi, ejusque fusionem introduci supponimus, adveniunt; non est pro illis deligendis ut longe disquiramus; etenim plane conitat, massæ sanguineæ particulas salinoas, & volatiles, naturaliter semper inesse, quibus si quando sal acidus, seu fluore potius, satis uberitum accedat, prædictam affectionem facile excitabit. Hinc est, quod vinum Rhenanum, Pomaceum, & liquores acidi epoti diu copiosiorum provocant, propterea item in quibusdam valerdinariis, quorum sanguis sale acido abundat, medicamenta sale fixo aut volatili prædita urinam movere solent. Nec tantum ab aliutis, sed ab humoribus intus productis, affectus ille passim evenit. Observare est plurimos pathematis spasmoticis obnoxios, ante, vel post paroxysmos, urinæ limpidæ copiam ingentem reddere; cujus certe causa est, quod sanguinis, & succi nervi recrementa, in partibus solidis aggregata, si quando in acorem degenera turgescant, & in sanguinem retineant, fusionem ejus, & proinde urinæ profluvium inducunt. Quapropter cum talis urinæ profusio constans, & habitualis existit, nihil verisimilius dici potest, quam, quod humores excrementitii, in partes solidas ablegati, indeque, postquam acorem illic contraxerint, in sanguinem reversi, hujus liquorem in serositatem nimiam fundunt, proindeque perennem adeo, & immensam excretionem cient.

In præcipuam vero hujus noxæ partem, succum nerveum merito referimus; quippe hunc, si quando à recta crasi deciscat, admodum malignum, aliisque tum humoribus, tum partibus solidis infestum evadere, alibi ostendimus; Quapropter ab eo depravato, etiam sanguinis multio perverti maxime periclitatur. Ipsum vero succum nerveum depravari arguere licebit, quoniam in Diabete spiritus animales plurimum oblanguescunt, & nutritio statim omnis frustratur.

Porro quod sententiam hanc egregie confirmat, observavi in pluribus huic morbo per intervalla obnoxiiis, quod paulo antequam in urinæ profluvium inciderint, in toto corpore partium nervearum dolores vagos, & corrugationes, modo cum stupore, aut fornicationis sensu, modo cum crebris spasmodis, ac tendinum subultibus, aliisque spirituum perturbationibus, & inquietudinibus paterentur; indicio sane manifesto liquorem fibras nerveas irrigantem, à crasi degenerem, & faculentis refertum, spiritus irritare, inque *æstus* cogere. Dein postea cum succi nervi recrementa, & superfluitates, fluore oborto in massam sanguineam exundantia, Diabetem inferrent, prædicta symptomata cessabant, succedente vero spirituum languore, & virium concidentia.

Diabetes dicitur vulgo hydrops ad matulam, & nonnulli contendunt utrumque morbum revera eundem esse, easdemque causas & rationem formalem habere, & symptomata tantum quoad serosæ excretionis modum variari; nempe quod sanguis in utroque pariter affectu



seri incontinens, & arteriis exspuere coactus, in uno, ipsi in corporis habitum, & viscerum cavitates profundat: inque altero, idem in renibus antea per ureteres amandandum deponat. Verum enim vero, si res accuratius perpendatur, inter hos morbos notabilis differentia occurret. Nam Anasarca plerumque originem suam inde primo desumit, quia sanguis imbecillis, & nimis frigidus, non satis accenditur, & effervesceit, ut chylum continenter advectum coquit, & assimilet, adeoque volatilis, quo inter circulandum cum in sinu suo contineat; quin necesse habeat hunc una cum lactice seroso ubique locorum exspuere, & juxta vasorum interstitia relinquere: dein postea morbo ingravescente sanguis non modo debilis cruditatibus, verum in crasi degener fluxionibus, & coagulationibus obnoxius fiat, prout deinde humores serosos, & copiosius progignat, ac in partes indebitas impetuosius sustineat. Verum contra in Diabete cruor fatris, immo ut plurimum nimis effervesceit & accenditur, ac chylum advectum celeriter & supra modum coquit: quinimo partes solidas colliquat, easque liquamina absorbet, secum per vasa circumfert, & super quam satis est coquit; attamen cum ob salium concursus, sanguinis compages penitus dissolvitur, ac in serositates funditur, portiones, quæcunque abscedere possint, intra renes secretæ, per ureteres excurrunt. Si morbus Diabeti similis sed inversus (sc. in quo sanguis in serositates, exsolutus liquamina sua in totum corpus profuderit) uspiam ulius occurrit, proculdubio erat febris olim epidemica (Sudor Anglicus) dicta; ubi sanguis in aquosiores deliquescentes humores omnes, tum utiles, tum inutiles, usque ad pabuli vitalis impendium, in poros corporis per sudorem amandandos profunderet.

Hæc de morbi Diabetis ratione formali, & causis, sc. Coniunctis, & Procatareticis, quod ad Evidentes spectat, propter quos nimirum occasiones, succi acidi, sanguinis fusionem siue coagulationem excitaturi, in corpore nostro gignuntur; hæc varii generis, ac originis existunt. Mala victus ratio, ac imprimis assiduus, & immoderatus pomacei, cervisæ, aut vinorum acidorum potus; interdum mæror, & tristitia diuturna, item affectus convulsivi, aliaque spirituum animalium depressiones, ac inordinationes, diathesin hanc morbidam parere aut fovere solent. Novi quendam, viro Rhemano pro potu ordinario per 20. dies usum, Diabetem incurabilem contraxisse, ex qua, non obstantibus medicorum plurium insignium consiliis, & remediis quibuscunque intra mensem interibat. Memini duas mulieres, pathematis spasmodicis & hypochondriacis obnoxias, quibus subinde magna urinx profluvia cum languore, & carniū intabescencia accidebant.

Explicata jam nunc morbi huius Theoria, adhuc restat symptomatum notabilium rationes exponere. Harum nonnullas ex præmissis satis constare arbitror, sc. quamobrem in Diabete urinx excretio ita celer, & copiosa existit: quod autem laborantes febricitant, & valde sitiunt, ratio partim est, quoniam humores, & succi quibuscum sanguis, tum solidæ par-

tes & humectantur & refrigerantur, continuo per diuresin impendio plus nimis exhauriuntur; quare fauces arent, & præcordia insigniter æstuant: & partim, quoniam urgente natura instinctu cor, & pulmones in motus rapidiores urgentur, ut sanguis, sero diluente privatus, à coagulatione siue concretionem vindicari, ac in circulatione debita continuari possit.

Attamen explicatu magis arduum videtur, quare ægrotantium urinx adeo mire dulcescunt, siue laporem mellitum referunt; cum potius e contra si juxta hypotesin nostram sanguinis fusio, & (quæ propterea succedit) urinx profusio ob salium combinationes accidat, certe liquor his imprægnatus potius salius esset quam dulcis. Verum huic referre obvium est, dicendo imprimis urinam sapore salso privari, in quantum plures sales, qui diversæ sunt indolis, in ea combinantur. Nam hoc multiplici in chymicis experimento constat, quod cum sales, qui diversæ sunt indolis; uti fixus, aut volatilis, cum acido misceantur, utriusque acrimonia obtunditur, aut amittitur; quare quod urina Diabete laborantium minime salia sit, non est quod miremur. Cur autem instat sacchari, aut mellis ea mire dulcescat, nodus vindice dignus est.

Hunc effectum ex eo quilibet omni putaret, quod una cum sanguinis sero, per renes excurrente, tum liquor recens nutritius, tum solidarum partium liquamina amandarentur; quare non improbabile videtur dulcedinem istam ex succis hisce optimis lotio permixtis conciliari. Verum enim vero ex mixtione ista sapor tantum lenis ac instar lactis aut jusculi carniū blande demulcens, sed non mellitus, excitabitur: quinimo ad hunc, qui non solum gratus, sed quodammodo pungens est, spicula salina, una ac mulcimina sulphurea (prout alibi ostendimus) concurrere debent. Quare prout saccharum, & mel merito ad concretiones salino-sulphureas referimus; ita suspicari fas sit, urinam in Diabete adeo dulcescere, eo quod salibus in sero combinatis particula quædam sulphureæ ex colligatione solidarum partium delibata accrescant.

Quoad prognosin hic morbus incipiens sæpe ac facile curatur, confirmatus autem raro admodum & difficillime; quatenus nempe sæpe sanguinis crasis paululum laxata, sine magno negotio reducitur; illa vero multum soluta ita, ut plurimæ partes aliæ ab aliis secedant, vix aut ne vix restitui potest.

Quod vero ad Therapiam spectat, difficillimum videtur in hoc morbo veras medendi intentiones designare; in quantum causa ejus ita profunde latet, altasque adeo & valde remotas origines ducit. Nam quod vulgo putatur Renes, aliasque partes solidas, serum, & sanguinem continentes aut transmittentes peccare, quatenus contenta sua propere nimis dimittunt, prout deinde Astringentibus potissimum, ac fere tantum insistendum esse: dico huic tum hypothese tum Praxi, & rationem, experientiam refragari: in quantum pauci, aut nulli hac methodo curantur: & summe improbabile (ut non dicam impossibile) est, *duplex* istam à tali causa procedere.

Itaque in hoc affectu, sicut in plerisque aliis tres erunt Primariæ Indicationes Therapeuticae,



viz. Curatoria, Præservatoria, & Vitalis. Hæc Prima morbum respiciens & diuresin nimiam cohibere nitens, absque Secunda quæ in morbi causam collinans, sanguinis mixtionem, sive crasin debitam præservare, ac restituere conatur, peragi nequit. Quapropter circa morbi hujus Thèrapiam præcipue niedendi intentiones erunt, sanguinis fusionem ne fiat præcavere, atque ullatenus factam tollere. Primo sanguinis fusio inhibetur, dummodo partes ejus crassiores, & Aquosiores se invicem contineant & contineantur, neque aliæ ab aliis ita continuo & præpropere abscedant: quod quidem efficitur per Remedia Incrassantia vulgo dicta, quorum scilicet corpuscula viscosa admodum & glutinosa, in massam sanguineam admitta, particulis ejus activis pertinaciter coherant, adeoque eas ab invicem separant, & ne fluori- bus obortis mutuo inter se; aut cum salinis aliunde suffusis combinentur, impediunt. Propter hunc finem Oryza, Amylum, vegetabilia mucilaginosa, necnon Gummi, & resinosa quædam in hoc morbo juvare solent. Secundo ut Sanguinis fusio aliquatenus facta tollatur, ejusmodi remedia indicantur, quæ salium concretiones dissolvunt, ita, ut particula quæque elementares insitæ, denuo sui juris factæ, situs priores recuperent, adeoque sanguinis crasin primævam redintegrent. Hujusmodi effectum in Lacte Coagulato, salis fixi, volatilis, aut nitrosi additione, necnon spiritus C. C. salis Armoniaci & similium infusione produci supra ostendimus. Cujus ratio (prout ibidem innuimus) procul dubio hæc est, ut dum particula salinæ fixæ, volatiles, aut nitrosæ, in uberi satis copia lacti inditæ, particulis acidis sive præcipitatoriis occurrunt, cumque iis combinatur, reliquæ salinæ quæ prius ligabantur, jam liberatæ, perque liquoris massam diffusæ, sulphureas & terrestres inter se combinatas dissolvent, & quaquaversus dispergant, proinde ut particula rursus omnes æqualiter permixtæ, se mutuo contineant, & contineantur. Quantum hæc *ἀναμειγνύμενος* Sanguis propter stigmata saliva ipsi calenti affusa alteratur, per experimenta ibidem citata declaravimus. At vero pro curanda Diabete, medicamenta salina quoniam à plerisque sere semper Diuretica altimantur, non facile, aut temere exhibemus; quamquam interea huic methodo, uti non ratio, ita nec dum experientia refragatur. Nam sæpius in hoc morbo tincturam Antimonii cum bono successu præscripsi, atque Aqua solutionis calci vivæ, cum rasura Salsaphras seminibus Anisi, passulis, & liquiritia, juxta receptum vulgare à nonnullis eximie commendatur.

5. Indicatio Vitalis, per dietam incrassantem, & modice refrigerantem, perque cardiacam temperatam ac imprimis per Hypnotica idonea, & tempestiva perficitur, quorum species præcipue ac formulæ quædam selectæ, in capite sequente subjiciuntur. inque hujus calce coronidis loco cujusdam Nobilis ab hoc morbo, interea dum hæc primo meditarer, ac postea scriberem, Egrotantis Historiam proponere visum est.

Comes quidam Insignissimus, tum natalium splendore, tum propter insignes Animi dotes

prænobilis, temperamenti sanguinei, vultus floridi, atque an ipso ætatis suæ vigore, incertum ob quas *αἰσθητικὰς*, ad diuresin nimiam proclivis evasit; cumque adeo per plures menses, urinæ profluvium subinde pati solitus esset, tandem in Diabetem (uti videbatur) confirmatam, ac pæne deploratam incidit. Præterquam enim quod nycthemeri spatio, urinæ limpidæ, mire dulcescentis, & quasi mellis sere sesquicongium excerneret, insuper siti humana, ac febre velut hæctica, cum insigni spirituum languore, virium coincidentia, totius corporis intabescencia afficiebatur. Cum hoc tempore ad consulendum cum Medicis celeberrimis D. D. Michlethvwait & D. D. Witherly accerferet, remedia sequentia (quorum usu brevi convalescere visus erat) præscripta fuerant.

℞. Summitatum Arboris Cupressi M. viii. Albuminum ovotum conquassat. ℞. ij. Cinnamomi ℞. β. minutim incisil affunde lactis recentis ℞. viii. destill. organis communibus, cavendo empyreuma. Capiat unciam vj. ter in die.

℞. Gum. Arabici, Tragacant. ana 3vj. sacchari pened. ℞. j. f. pulvis. Sumat. circa 3j. vel 3iβ. bis in die cum aqua destil. ℞. iij. vel ℞. iv.

℞. Rhæbarb. pul. gran. ij. Cinnamomi gran. vj. f. pul. sumat mane, repetendo intra 6. vel 7. dies.

℞. Aq. Paralyseos ℞. iij. Cinnamomi hord. 3ij. Syrupi de Morconio ℞. β. f. haustus sumend. omni vespere.

Dietæ sere tantum ex lacte, quod modo crudum, & vel aqua destillata vel aqua hordei dilutum, modo coctum cum pane albo, vel hordeo aliquoties in die sumebat. Horum usu cum in dies melius habuerit, intra mensem pæne sanatus videbatur: quando modice convalescere cœpit, urina insipida liquidi assumti quantitatem haud multum superabat, & demceps nonnihil salsa, potulentis ingestis copia minor fuit; dein paulatim solito spirituum tenore & viribus pollens, ad pristinam Dietam redibat.

At vero Diathesis in hunc morbum haud ita penitus cessabat, quin postea crebra vice, propter inordinationes in victu, & forsan ob mutationes circa Anni tempora, in recidivam aptus, urinam primo copiosiore, & deinde limpidam, & dulcescentem, cum siti & febricitatione, & spirituum languore reddebat. Eorundem vero medicamentorum usu, brevi rursus evadere solebat. Non ita pridem, post longius rectæ valetudinis intervallum, paulo antequam urinæ profluvium pati cœperat, magnas in nervoso genere enormitates, & deliquia passus est: viz. in cerebro torporem, & vertiginem, in membris subitos spasmos, tendinum subsultus, & quasi venti huc illuc repentis varios transcurfus persensit. Deinde cum remediorum idoneorum usu, prædicta symptomata sanari videbantur, Diabete more solito (scilicet materia è fibris, & partibus solidis in sanguinem, & inde ad renes, & viz. urinarias exundante) recrudescerebat.

Sub hoc tempore, prædicti Medici in consilium vocati methodo, ac remediis pæne iisdem



ac prius utendum præcipiunt, quorum usu cum intra paucos dies melius habere coeperat, Aquam calcis vivæ ter in die ad 3 v. vel vi. sumendam præscribere visum erat; quo remedio per quadriiduum usus urinam in quantitate modica, bene tinctam; & nonnihil salisam reddebat, & quoad reliqua fere sanus, uti olim fuerat videbatur. *Thom. Wallis. Pharmacut. ration. part.*

*Curationes, Consultationes, Observationes  
& Anatomica Inspectiones  
ex variis.*

*Curationes.*

Diabetis specificum positum est in Martis Essentia Croci Martis à Crollio descripta multum hic prodest: Ilicius operatur Tinctura Smaragdi, de qua in Dysenteria.

Cæterum Mars non tantum intrinsecus, sed etiam foris prodest (purgantia hic non commoda, neque diaphoretica) Itaque Balneum ex aqua ferratorum præparatum & tomentatio ex aqua plantaginis cum aqua chalybeata decocta & regionibus renum ac vesicæ à singulis balneis quotidie bis vel ter adhibita protuvium urinæ Diabeticum multum juvat.

Dixta porro ex cibis siccantibus & semper cum aqua chalybeata coctis, unice laudatur.

Potus ne nimium ingeratur, providendum est: ad sitim tantum explendam sufficit aqua Chalybeata vel decoctum C.C. usti (vehementius, sic mirum calide adstringit, nec sudores nisi forte paucissimi erumpunt) aqua plantaginis, tamen nec sola, nec semper, sed cum aliis miscenda fuerit.

Tinctura Corallorum. It. Sal Corallorum mirabiles in Diabete habent potestates. *Joan. Marthm. in Pract. Chymiar.*

Diabetis curatio consistit in calida renum, aliorumque viscerum intemperie corrigenda, eorundem imbecillitate ac laxitate reparanda, humorum ad eos confluentium tenuitate incrassanda, & maligna qualitate oppugnanda. Quæ omnia sequentibus auxiliis præstari poterunt.

Vena-sectio in principio morbi, viribus adhuc satis validis existentibus, revulsionis, & refrigerationis causa convenire potest, parva quantitate, & partis vicibus celebrata. Sitamen vires jam dejectæ fuerint, aut hic affectus alteri succedat, non erit locus huic remedio.

Evacuatio excrementorum per mollientes, & lenientes clysteres molienda est, in hunc modum compositos.

℞. Fol. lactucæ, portulacæ, malvæ & plantag. an. M. j. hordei mundati & ros. rubr. ana. P. j. Fiat decoctio ad lb j. sem. In colat. dissolve Diaprun. simpl. drachm. vi. mellis rosac. & ol. omphacini, an. 3j. Fiat clyster, frequenter injiciendus.

Tum etiam purgatio blanda instituenda est cum medulla Cassiæ, & pulpa tamari Indorum; vel decocto plantag. portul. lactuc. tama-

rynd. & myrobal. cum syrupo rosaceo.

Vomitus etiam a nonnullis commendatur ex decocto seminis raphani & ebuli, cum oxymelite, qui vacuat, & revellit a partibus urinaris.

Ad intemperiem autem dictarum partium corrigendam & humores incrassandos, conveniunt julepi ex aquis, vel decoctis lactucæ, portulacæ, plantag. cum syrupo myrtilino, cydon. & similibus, atque etiam de papavere in modica quantitate; addendo pulverem diatragacanthi frig. trochiscos tertæ sigillatæ, & similia.

Vel ad magis astringendum in hunc modum componi poterunt.

℞. Rad. consolid. major. & plantag. an. 3j. fol. plantag. M. j. balautior. & myrobal. citrin. an. drach. j. sem. plantaginis & portulacæ, an. 3. sem. rosar. rubr. P. j. coquantur ad lb j. In colatura dissolve syrapi cydonior. 3ij. Fiat julep. pro 3. dosibus.

In eundem finem pulvis, vel opiata confici poterit in hunc modum.

℞. Sem. plantag. portulac. coryandri præp. & rosarum rubr. ana 3j. coralli præp. boli armen. margaritarum præp. & radice tormentillæ, an. 3j. nucis moschatae drach. sem. Misce, fiat pulvis.

℞. Conservæ ros. antiquæ 3iv. boli armeni, coralli præpar. & cornu cervi usti, an. 3j. cum miva cydonior. fiat opiata.

Erastus valde commendat syrupum, ex radice symphyti majoris, & prunis sylvestribus confectum, quem se summa cum felicitate in affectibus hunc malo similibus usurpasse testatur.

Narcotica etiam, ut theriaca recens, syrupus de papavere, & laudanum opiatum, prudenter usurpata, in hoc affectu plurimum prodesse poterunt.

Perseverante affectu lac ovillum, aut bubulum, aut asinum erit convenientissimum: modo prius serum absumatur, injectis frequenter lilicibus candentibus. Eoque æger uti poterit mane, prout in aliis affectibus dictum est.

Sudorifica etiam ab authoribus commendantur, quibus serosus humor ad corporis superficiem evocatur. Ea tamen suspecta merito esse debent, quandoquidem summam cum diureticis cognationem habent, viscerumque intemperiem augent. Sitamen iis locus aliquis unquam esse videatur, ex temperatioribus, utpote rad. chinæ, aut falsæ parillæ, cum foliis endiviæ, borrag. acetosæ, decoctum parari poterit, imò in consumptis fieri poterit ex decocto pulli, aut gallinæ junioris, ut simul re nutritioni corporis consulatur. At vero tutius esse censemus externis remediis sudores elicere, puta vapore decocti convenientis in ligneo instrumento (ut vulgo fieri solet) nudo corpore suscepto.

Prædictorum sudorificorum loco maxime conveniunt diaphoretica, quæ simul malignam qualitatem oppugnare possunt: qualia in febribus malignis proposita sunt, ex quibus ol. vitrioli præcipuum est, quia ad sitim extinguendam, fluxum cohibendum, & malignitatem infringendam præstantissimum est.

Pro potu utatur æger aqua ferrata, cum syrupis acidis & astringentibus; vel decocto prunorum sylvestrium & corticis interioris



quercus. Quo remedio fere solo se hunc morbum in puero curasse testatur Erastus.

Exterius vero admoveatur totus regioni lumborum, ex decocto rad. acetosæ, sol. plantag. cortic. granat. sem. sumach. & similibus, quibus aceti parum addatur. Vel quod utilius erit, paretur infellus ex eodem decocto.

Eademque pars inungatur unguento rosaceo, santalino & comitisæ simul mixtis vel sequenti linimento.

℞. Olei rosæ. & myrtin. an. ʒj. santali rubri, rosar. rubr. & corall. rubr. an. ʒj. succi plantag. ʒj. ceræ, q. s. Fiat unguentum.

Denique symptomata hunc affectum comitantia, ut sitis, vigilæ, consumptio, aliaque remediis in propriis capitibus descriptis mitigantur. *Lazarus River. Prax. Medic. lib. 14.*

In Diabete, ℞. Conserv. flor. consolidæ, Rosarum an. ʒj. Tinctur. sulph. vitrioli, solutionis corallor. an. ʒʒ. sangu. Draconis, Pulveris mastichis ana ʒj. Syrup. cydonior. q. s. Misc. fiat Bolus. Dosis ʒj. manè & vesperi. Vel.

℞. Conserv. Rosar. ʒj. Hord. mundat. ʒʒ. coq. in aq. sol. quercus q. s. colatur. ʒviii. adde lixivii calcis vivæ ʒj. Misc. Dosis cochleare bis in die, seu.

℞. Tinctur. tartari, Corallior. ana ʒʒ. Martis ʒj. Misc. Dosis gut. xii. in Decocto hordei & rosar.

℞. Tinctur. tartari antimoniati ʒj. Dosis gut. xii. manè & vesperi. *Hermann. Nicol. Grimm. compend. Medic. Chymic. lib. 3.*

In Diabete conveniunt tinctur. corall. tinct. sulphur. vitrioli, crocus mart. adstring. species diaplantag. Myns.

℞. Spec. diaplantag. Myns. ʒiij. croci mart. adstring. ʒiʒ. M. dos. ʒʒ. vel ʒj.

℞. Tinct. mart. adstring. Croll. ʒʒ. dos. gut. 40.

℞. Tinct. corall. ʒiij. Dos. gut. 20. vel 25. Profunt quoque balnea & unguenta ubi de incontinentia urinx describenda. *Joan. Michael. Prax. Chym. gener. part. 1. lib. 4.*

Diabetis cura præcipue consistit in tollendo ac resolvendo tartaro in renibus producto, qui siccitate & caliditate sua humidum potenter attrahit, quod potissimum obtinebis à spiritu sal. tart. rectificato & acido vitrioli, cum primis verò aqua mercuriali, quæ sola omnes materias tartareas resolvere potens est. *Joan. Petrus Faber in Pathologia Animarum super quo hæc est Christiani Langii animadversio.*

Media curandi quæ ab Autore hic proponuntur, potius renum impuritates, unde illi intemperium contrahunt, abstergerendi vim habent, & saponaria existunt, quibus remotis renes ad pristinum vigorem redire possunt, & retentrix robur suum vel sponte recipit. Spiritum sal. tart. & aq. mercur. à virtutibus suis abundè jam cognovimus, quæ tamen non immediate, sed mediatè hoc beneficium præstant, non secus ac vomitoria frequentes vomitus sistunt. Quid verò per acidum vitrioli intelligat, ariolandum nobis erit, putamus igitur vel spir. vitrioli rectificat. vel tart. vitriol. vel spir. vitriol. etiam coagulatum hoc termino

Autorem innuere, quæ omnia contractas in renibus cruditates & vitia effectissime corrigere, atque horum substantiam corroborare, adeoque per accidens adstringere valent. Adstringentium usus utitur Autor, cum hic neglexerit, tunc quàm maxime subjiciendus, inter quæ præter jam nominata, tanquam nobiliora laudamus insuper terram vitriol. dulcem, essentiam mart. tinctur. corall. veram, & tinctur. sulph. vitriol. Illa enim quæ ex vitriolo & tart. facta sunt, potius aperiendi & abstergerendi vim habent, adeoque in Ischuria rectius commodiusque assumentur.

### Consultationes.

#### De Diabete in Puero Septenni, Lucensi, Ad Præclarissimum Virum Franciscum Mariam Florentinum.

Quamquam nihil in Arte medica sit adeò reconditum, quod Viro Præclarissimo non pateat, cujus propterea doctrina, & experientia alieno non eget consilio; meam tamen sententiam in medium quoque proferam in casu hoc perdifficili Nobilissimi pueri septennis, urinx profluvio novem abhinc mensibus laborantis, cum ut me consulentibus morem geram, tum ut optime discussis à Viro doctissimo subscribam. Duo autem nobis incumbunt potissimum. Primum expendendum numquid hoc urinx profluvium sit verus diabetes, necne; secundò, generosiora remedia illis, quæ hucusque ritè, & ex arte fuerunt in usum revocata, & administranda proponuntur, addemus.

Primum itaque quod spectat, licet multa pro vero diabete faciant, mictio scilicet copiosa, cujus ratione hydrops ad maturam nuncupatur, sitis immodica, cujus causa diabetes  $\alpha\psi\alpha\sigma$  dicitur Græcis; non tamen propterea præsentem affectum verumdiabeten pronuntiandum censeo, quinimò ab ipso differre non solum in essentia, verum etiam in causa morbifica. In essentia quidem, quoniam verus diabetes est copiosa potulentorum non mutatorum mictio, ex electione facta; quam propterea Galenus hienteriz similem facit L. de Loc. Affect. cum hæc excretio in principio fuerit involuntaria, noctu saltem, atque potius urinx incontinentia tunc nuncupanda. Accedit, quod hæc excretio non statim à potu succedit, sed sex, octo, decem, & duodecim horis ab illo, neque assumptorum non mutatorum, cum excreta urina enzorema aliquod habeat, sitque coloris subflavi, ut habemus ex historia. Adde, quod hic caret siti illa adeò immani, quæ in legitimo diabete se prodit; ut propterea differat in essentia, & annexis symptomatibus à vero diabete, ut & longo quoque intervallo in causa morbifica, & parte primò affecta. Verus namque diabetes est essentialis renum affectus, ipsis primario, & per se affectis intemperie calida modo cum materia, modo sine ipsa, succedens aliquando febribus ardentibus, vel malignis, vel immodico diureticorum usui, vel ipsorum phlogosi, & æstui: estque affectio adeo



adeo rara, ut profiteatur Galenus se duos tantum vidisse legitimo diabete laborantes. Hoc autem urinx profluvium non proveiut ex vitio renum impense caletactorum: alioquin subortus esset potius ætate, & post morbos calidos, cum tamen coeperit cum urinx incontinentia, & diarrhœa serosa in puero septenni, temperamenti calidi & humidum. Autumno, cum sopore, Bulimo, & frequenti vermium teretum albicantium excretionem. Ex quibus luce clarius patet, profluvium hoc non esse verum diabetem, sed potius affectum illum, quem Avicenna cum Arabibus vocat urinx multitudinem, ab inæquali viscerum intemperie, humida scilicet cerebri, unde sopor, frigida, & humida ventriculi, à qua Bulimos; & calida jecoris, sanguinem utcumque incrassante, unde major serositatis proventus. Quis ob causas adfuit etiam diarrhœa serosa, quæ certe à renum vitio fieri non potuit. Accessit quinetiam cutis consipatio, insensibilem prohibens distentionem, imò eam juvans, densando aëream substantiam per arterias attractam. Quæ omnes humiditates partim à renibus attractæ, ob aliquam ipsorum caliditatem, partim ab aliis partibus, & toto corpore ad illos transmissæ, tanquam partes imbecilliores, producunt hoc urinx profluvium, cum suppressione, & adstrictione ventris; juxta dictum Hippocratis, *Mellio noctu plurima paucam singulis dejectionem*. Atque hic casus memoriam retrahit similis à Cardano propositi 8. de Varietate, & ante ipsum à Marco Gatinaris, suis ad 9. Rhazis ad Almanforem, Comment. Capite de cura involuntarii exitus urinx. Referunt enim, puellam quandam annorum 18. Mediolani urinam tanta copia duos menses continuos minuisse, ut singulis diebus ad libras circiter triginta sex effunderetur, cum cibo, & potus non excederent septem libras: unde subducta ratione spatio duorum mensium excrevit præter cibi, & potus mensuram, libras 1740. quod excedebat longè ipsius puellæ pondus, licet tota in urinam fuisset soluta. Propterea addit Cardanus, quævisse Joannem Marlianum, tunc temporis primatem Virum hujus rei causam: cui responsum, aërem, in omnibus arteriis contentum, in substantiam aqueam facessere: quæ excreta, alium jugiter similiter in aquam cogi, atque ita ejus fieri uberrimum proventum. Itaque me iudice, sunt præsentis affectus causæ, quem necessario sequitur macies, deficiente in venoso genere serositate, sanguinis vehiculo ad singulas partes nutriendas, hincque aliqua sitis, absumpta humiditate in ore ventriculi. Nec aliam ob causam credo invaluisse hanc affectionem sub hyemis adventum, quàm ob majorem cujus constipationem, & humidorum halituum copiam.

Quæ si ita se habent sperandum quoque erit fore, ut Nobiliss. puer convalescat, non secus ac levibus remediis adolescentulam illam sanitatè restitutam retulit Cardanus.

Quod ut fiat, divertenda est fluxio, & prohibendus tantæ serositatis proventus, iis quæ caput exsiccent, ventriculum calefaciant & exsiccent, absque insigni jecoris incalescentia, renesque subattringant, & moderatè refrigèrent.

Prædictis intensioribus satisfaciendum censeferem alvum subducentibus; puta usu prunorum Damascenorum, præparatorum cum manna; conservæ ex fl. perlicorum, & potissimum frequenti usu clysterum emollientium, & laxantium. Revocandæ quinetiam sunt serositates ad corporis habitum, blandis frictionibus primò pannis asperis, mox & manibus inunctis oleo chamæm. & amygdalino: quinimò & per sudorem excitatum, non ope balnei, ne internarum partium augeatur humiditas, sed appolito pane ex minutis turfuribus parato, recenti à furno: vel laconico sicco. Vomitus quoque aliquando statim à cibo cieatur unctuosus, & pinguis præmisso copiosiore cibo. Exsicceetur caput frictionibus, & pulveribus exsiccantibus, capillis inspersis: roboretur ventriculus, abique calefactione jecoris, primò modico usu vini abstint. jejuno ventriculo, mox & decocto ex lentisco, cortice ligni guajaci, & santalis, cum carne vitulina, alterato absinthio, mentha, & betonica; in quo dissolvantur nuclei pinei & pistacia contusa. Roborentur & subattringantur venæ emulgentes succo granatorum & absinthii; abstinendo à cydoniis urinam cientibus, observatione Paschalii Meth. curandorum morborum cap. 50. qui refert historiam Sereniss. Regis Neapolitanorum Alfonso, diabete laborantis ex frequenti ipsorum usu. Quare horum loco laudat Rhazis loco supra citato drach. i. olibani, cum aqua absinthii. Ex usu sunt etiam trochisci de terra sigillata, cum semine acetosæ, & aqua menthæ. Aqua item ranarum & Astacorum, cum oxalide, & absinthio à Viro sapientissimo proposita, erunt accommodatissima; Lactis usum quàm maximè commendamus, dummodo non sit serosum. Quæ fuit causa, quod eo Asinini usus diarrhœam induxerit, cum urina excreto ejusdem saporis odoris, & coloris, quo fuerat hauritum. Propterea ovillum, ultimo loco præscriptum optimum erit, si præsertim leviter decoquatur, vel etiam vaccinum. Nec minus profuturum speramus decoctum ex radice symphyti majoris, antehac præscriptum, omisis omnibus diureticis, cum calorificis, tum refrigerantibus; & applicitis extrinsecus subattringentibus regioni lumborum. In quem usum ad rem erit unguentum santalinum, infrigidans Galeni, cum mastich. vel paretur ceratum ex acacia, hypocistide, mastiche, thure, bolo armena, & resina.

Accurata verò victus ratio est instituenda alimentis incrassantibus, coctis caribus cum limacibus, caudis astacorum, & carne testudinum, cum absinthio, vel mentha. Vinum sit mediocris substantiæ, & subattringens, parca tamen manu: exercitium non sit validum: fugiatque omnes animi perturbationes, aërem frigidum, & ventosum, borealem. Sic enim spero fore, ut hoc tempore calido pristinae sanitati restitatur. Quod à Deo Optim. M. x. enixè contendo. *Bened. Sylvat. Consil. & Respons. Medic. Cent. 3.*

*De Mellione Potenterum non mutatorum.  
Pro Nobili Virgine Lucensi.*

Rarus sanè est affectus propositus, nec à me antehac unquam observatus, quod scilicet Nobilis Virgo viginquique annorum circiter,



potissimum vero interdum frequentissime bibit & mingit, ut plurimum tamen aquam, quam celeriter fere immutatam per urinam excernit, quous, postremis diebus, accellerunt immutata appetentia, æstus in præcordiis, & virium aliqua insueta imbecillitas. De agendis itaque pro salute consult.

Effluxus celer potus fere immutari, cum siti inextinguibili, nullo alio nomine quam Diabetis appellari potest, qui affectus & Hydrops ad matulam, a copia urinæ, & Dipsacus, & siti immani nonnunquam nuncupari solet. Hinc male Aretæus illius causam in colliquationem retulit, cum tamen in veloci effluxu potus immutari sita sit, quem rarum affectum esse testatur Galenus ipse, qui toto vitæ curriculo bis tantum eundem legitimum vidit. Quoniam verò potus, vini potissimum, non omnino immutatus egeritur, dubitatur, num spurius ac illegitimus diabetes, an potius incipiens, & nondum perfectus dicendus sit. Nos autem potius non omnino legitimum hunc nuncupabimus, cum legitimum tum principium, tum augmentum, ne dicam & status nos lateat; etenim, tum renum, tum vasorum denderium naturale tantummodo est, non animale, hoc est, nobis perceptibile, nisi tandem cum ad os ventriculi pervenerit, atque adeo in cæteris convenit hic affectus cum henteria, & fame canina in hoc solum diversus, quod in canina fame principium ex eo patet, quod statim ac initio movetur facultas animalis, in diabete vero tantummodo in fine, coque jam perfecto.

De causa verò non conveniunt Auctores, forsitan quia Gal. eam absolute non expressit. Sic à frigiditate heri credidit Aræteus, à caliditate Paulus & Tral. à calidis & acerbis humoribus Aetius. Ex recentioribus, Fernellius aliud quid certe accedere existimavit. Trineavella intemperiem frigidam, Platerus colliquativam, Rudius jecoris calorem, & ventriculi imbecillitatem, Joh. Baptista Sylvaticus insignem calidam intemperiem, tum jecoris, tum Renum, & totius massæ sanguineæ, quæ postrema, licet verisimilior nobis videatur, potissimum in hoc Patientem, ex salitorum & vini generosi usu, necnon impensioribus studiis, vel contracta, vel saltem adaucta, non tamen immediatam, sicut minus cæterarum nullam admittimus, de qua quoniam Gal. anceps, vel saltem non adeo ad rem locutus fuit, cum renum imbecillitatem primo accusaverit, quam tamen necessario præcedit attractricis robur, & vires immodicæ, ideo nos, cum Avicenna potius censemus primario lædæ renum, postmodum vasorum & jecoris attractricem tæditatem, ab intenso renum, jecoris & vasorum calore, tum attrahente, tum colliquantem (unde præcordiorum æstus & virium defectus) quæ vehemens continua attractio, ut renum propria actio, semper exhauriens per partem post partem, ad os ventriculi pertinens, inextinguibilem sitim excitat, atque fovet, famemque extinguit. Sitim autem Patientis copiosissimo & continuo potu explere cogitur, qui statim & assatim ad renes attractus necessarii copia, & pondere, renum retentricis facultatis naturalem imbecillitatem adaugere, & secundario lædit. Quibus omnibus si quis addat læsionem concoctricis, dicamus, potum non

concoqui, neque permutari, potius ob illius celerem effluxum, quam ob facultatis concoquentis imbecillitatem. Ex quibus patet, Renes esse partem primario affectam, ne quis falso credat esse ventriculum, quia ibi sitis accendatur immodica, tunc enim potus in eodem diutius hareret.

Affectus hic, sicut in ardente febre & colliquatione, insanabilis est, ita in cæteris difficilis, nisi statim ab initio curetur, namque processu temporis ad tabem, & ad colliquationem Patientem ducit, ex Avic. indeque ad interitum, ut eleganter notat Aretæus. Ideo statim illi succurrendum, torquetur enim Patientis ab indolenti & perenni siti, quæ Aretæi testimonio, omnium dolorum maximus est.

Quare primo totum, quod succis redundat, evacuandum. Secundo renes acerbis humoribus emundandi. Tertio potus ad vomitum alvum, & sudorem convertendus. Quarto calor renum, jecoris & totius contemperandus. Et tandem eorundem renum laxitas roboranda.

Atque in Chirurgico fonte convenit, casu præsentem, sanguinis missio, quia morbus recens, quæ, eo inveterato, inspecta, ob virium defectum, quod si primus sanguis aditus appareat, repetenda parca ejusdem missio ex utraque basilica.

In Pharmaceutico fonte primo cieri potest vomitus, si Patientis ad eum proclivis fuerit, aqua hodei tepida, cum julap. acet. & ol. amygd. prima vice, morbi vero progressu, post copiosum frigidæ potum. Citato vomitu, evacuentur humores per alvum, ita

℞. Flor. Cass. rec. extr. ℥vii. pulpæ tamarind. ʒiij. m. f. b. & exacta hora bibat serum capr. aut alin. depur. ad ℥ij. atque tribus horis ab eo, prandeat. Vel potu.

℞. Syr. ros. solut. ℥vi. decoct. pulpæ tamarind. q. s. m. f. p. cui tribus post horis, superbibat serum. Instituat deinde præpar. tio, jure pul. alterato sonco, violis, plantag. portulacæ, rosis, myrto, & synphyto, cum succo depur. plantag. & intybi. Et quia hoc tempore virides herbæ defunt, substituamus hujusmodi præparans.

℞. Aq. plantag. portulacæ an. ℥ss. ros. ʒiij. succi mororum immatur, aut cydon. ʒij. m. pro syr. & sic pro aliis. Bilioni vero humores sunt deinde expurgandi.

℞. Flor. Cass. rec. extr. ℥vi. Rhab. immaturi ʒj. cortic. myrob. citrin. ʒj. pulp. tamarind. ʒij. m. f. b. à quibus bibat serum, ut supra. Vel potu. ℞. Rhab. immaturi, cortic. myrob. citrin. an. ʒj. spicæ gr. iij. pulpæ tamarind. ʒij. seri q. s. m. f. inf. per horas 12. & facta forti express. colat. adde syr. ros. sol. ℥v. m. f. p. b. epoto ab ea sero, ut supra.

His peractis repetantur alterantia hujusmodi. ℞. Aquæ cucurbitæ, plantag. lactuc. an. ʒv. syr. de nenuph. de portul. de papav. an. ʒss. m. pro syrup. & sic pro aliis, decem aut duodecim diebus. Atque interim, nisi alvus bene respondeat, clysteres blandiores & humectantes convenient, quinimò si urina cum aliquo sensu caloris & ardoris procedat, ad astringendos acres à renibus humores, allumat bolos hac formula.

℞. Flor. Cass. rec. extr. ʒss. crem. tart. ʒij. Rhab. immat. ʒj. m. f. bol. allumendi, in medio syruporum usu. Tandem repetatur præscriptum



medicamentum, aut bolo, aut potu, cum sero.

Hoc verò tempore, sudores prolevari solent à quibusdam in balneo tepentis aquæ, licet hoc tempore melius in lecto, cucurbitis aqua plenis id succedat. Aliqui vero præbent decoctum pentapnylii, & chinæ. Verum consultius duco, ut assumpta 3j. cornu C. Philosoph. præparati, bibat. copiosam gelidam aquam, & statim in lecto caindo cooperiatur, cucurbitis ad latera aqua calidissima repletis.

Quod si sudor facile non procedat, & Patiens ab æstu, tum sitati, tum cucurbitularum divexetur, ad incrassantia, contemperantia & adstringentia deveniendum, atque adeo in usum revocetur lac coctum, de quo Zacutus affirmat, se deploratos, ab aliis medicis derelictos sanitati restituisse spatio unius mensis, potu lactis asinini chalybeati, & Philonio Romano, vel Persico, per intervalla assumptis.

Tandem ad refrigerantia & adstringentia, tum interna, tum externa progrediendum. Intrinsicus parari poterit hoc elect. à Gal. præscriptum.

℞. Pulv. pellicular. ventris gallinæ 3j. thuris, glandis, liccz, balauft. gallar. an. 3ij. conservæ ros. antiquæ 3vi. m. & ad ignem ref. elect. cujus dosis ad 3f. à quo mox præbet aquam frigidam, nos vero aquam foliorum quercus. Ego vero hoc usus sum.

℞. Conservæ ros. antiquæ 3vi. pulv. vesicæ vitulinæ exsiccatæ 3f. pulv. sanguinariæ 3ij. Croci Mart. constricti 3j. succi cydon. q. s. m. ad ignem ref. elect. cujus dosis ad 3ij. mane & vesperti, hora una ante cibum. Vel.

℞. Liatragacanthi frigidi cum bolo 3ij. comedat, bibat vero quod sequitur.

℞. Aquar. plantag. fol. quercus an. lb. f. tincturæ corall. gutt. v. m. & assumatur quotidie matutinis horis.

Cæteris autem non juvantibus, ad narcotica quoque devenire licet, tum interna, tum externa. Interna erunt. Philon. Persic. & Rom. recens, Theriaca recens, Emuls. sem. pap. extracta cum aqua lactucæ. Externa, mandragoræ succus & iola, & succus papav. Sic à Chymicis habemus essentiam croci Martis, à Crollio descriptam. Tinctura quoque liatragadina optima est, sic & tinctura corallorum, & sal eorundem.

A proprietate verò juvare dicitur, aqua ranar. & astacorum cum oxalide & plantagine destillata. Extrinsecus illinantur renes hoc linim.

℞. Ung. ros. Mes. infrig. Gal. santalini, populi. an. 3j. ol. de papav. 3f. m. ref. Vel.

℞. Ol. sem. julsquiami, ros. omphac. nenuph. an. 3f. pulv. balauft. acaciæ, bol. arm. an. 3j. opii gr. v. ceræ par. m. ref. limin. pro renibus.

Victus rationem quod spectat, cibi sint boni succi, non mordaces, acrimoniam potius obtundentes, refrigerantes & adstringentes, nec qui adeo facile conficiantur. Sic conveniunt ova sorbilia, lactaria, potissimum caseus recens, carnes porcine bene coctæ, & extrema animalium. Otia condiantur amylo, diacodio, emuls. sem. pap. & amygd. dulc. Convenit ptisana, lactuca, intybus, portulaca, oxalis. Inter pisces, saxatiles. Inter fructus, poma, pyra, melpila, cydonia tamen suspecta. Potus sit aqua Chalybeata, cum pomis decocta, vel cum succo

aurantiorum, aut granatorum. Atque deicientibus viribus, vinum adstringens Chalybeatum. Declinante autem affectione, parce vibat, & omnia semper Chalybeata. Exercitium interdicit Rhais, & somnum commendat. Venus diabeticis inimica. Alvum lubricam servet Clysteribus refrigerantibus & humectantibus, atque constanti animo vivat, pusillanimes enim, ex Aretæo, Diabetici. *Kaym. Joh. Forst. Consult. & Respons. Medic. Tom. 1. Cent. 3.*

*Diabetica affectio cum Mesenterii obstructionibus & Gallicæ suppuratione.*

A variis in omnibus sex rebus nonnaturalibus committis erroribus, in usu Veneris, à qua etiam in Gallicas Gonorrhæas contraxerat, in cibus libullis, calidi & sicci temperamenti, et ipsi jam Decembris initio molestari capit augend. uti quovis potu inextinguibili, nimia appetentia, vigiliis, urinarum profluvio, colore, ut sit utraque aqua similium. Morbo neglecto, constrictum servavit regimen usque ad Januarii mensem, quo ingravescentibus malis auxilium medicum petiit. Inter sitim, nimiam appetentiam, vigiliis, urinas albas & copiosas, sen per ab initio continuatas & adauctas, adnotavi in Nob. Pat. febrem lentam continuam, ipsi ignotam, durities in hypochondriis, ad medium abdomen extensas, cum aliquali totius macie. Pro remediis Medici Excel. ent. advocati sunt, stabilitumque per ipsos, affectionem Nob. Pat. esse passionem Diabeticam, seu incipientem Diabetem, sed dissidium erat in causa & Curatione. Quidam exiccantibus & astringentibus, ad absumendum saltem circa viscera habitantem, sitis causam, & supprimendas urinas, utendum decreverunt. Alii incumbendum esse aperientibus, incidentibus, evacuantibus, pro minorandis & tollendis materietibus ex hypochondriis, atque extinguentibus viscerum calorem, sitis vehementis causam ex Gal. de Sympt. cau. & 1. de simpl. Medic. facult. ex Aetio Ietrab. 4. cap. 119 ex Paulo Aegineta lib. 1. cap. 31. crediderunt. Hinc ad ius Gallicæ reliquias, tanquam minus urgentis, transeundum; Gonorrhæas enim quoties contractas, toties curatas, cessasse refert Illustrissimus. Huic postrema sententiæ ego quoque adscribens, manu medicamentis impolui. Per octiduum remedium vi febris quievit, sitis multum diminuta est, urina: tanquam sumiles fluebant: nec enim Nob. Pat. à largo potu poterat se continere. Verum enim vero cum in hac macia lenientia (uno primo excepto, quod bene movit alvum) tam in bolo, quam in portione profus non evacuantur, sed anxietatem, inquietudinem, ad lipothyniam usque perducerent, Nob. Patiens à Cura se revocavit, iterumque consuetæ vivendi licentia se tradidit, quam adhuc prosequitur. Duobus abhinc mensibus Jarvisii quædam remedia & Balneum aquæ dulcis cum juvamento achivuit. Sed cujusdam Spagirici promissis allectus, Extracta quædam assumpsit, & bis pulverem Aig. rotæ, ex quibus deterius habuit. Ecce nunc Pat. Illustr. morbo & symptomatis vexatus, Patavium ad Sapientia fontes, sanitatem sitiens, accurrit. Vestra, Patres Doctissimi, sacrosancta consulit Collegia, è quibus, ut salutem expectat, ita mandatis polli-



pollicetur obedientiam. Meam hanc brevem præfectorum Epitomen, partim autopsia, partim relatione compositam exposulavit, ut una secum vestris repræsentet judiciis. Lubenter exaravi, & tanquam ad sacrum Apollinis Tripodem responsa fida laturum, Virum Nob. stimulavi, quo cum servitutis meæ obsequia magnæ vestræ transuicto Virtuti, meque devote consecro.

Ex morbis & symptomatibus multis abhinc mentibus Nob. Adolescentem divexantibus, alia manifesta atque certa inveni, alia non adeo. Manifesta sunt, Diabetica affectio, & mesenterii atque lactearum obstructions; non adeo manifesta & certa, sunt Gallica lues & febricula: certiora, ut urgentiora, Curationem exigunt: non adeo certa, considerationem & observationem exposulant. Et primo certam Diabeticam affectionem nobis repræsentat urina crudæ & aquosæ profluvium, cum inextinguibili siti & totius corporis macie. Obstructions vero tactus ipse discernit, quæ in mesenterio percipiuntur, & in pancreate, ut profunda sub ventriculo conjunguntur. Diabeticæ affectionis causa immediata est vehemens vasorum attractio, in jecore ut venarum radice incipiens, ab intensissimo calore, tum naturali, tum acquisito contracta, & eo mediante, renibus, & usque ad ventriculum, ceterisque corporis partibus communicata: dum uno, eodemque tempore, ab eodem calore liquatis non solum alimentis, sed humoribus quoque, imò tandem solidis corporis partibus, totius macies secut fuit, & ad horum colliquationem serosæ humiditates multiplicatæ fuerunt & multiplicantur, quæ partim attractæ, partim ab irritata spultrice ab earum copia ad renes transmissæ, cedente tandem tanto ponderi retentrice facultate, urinæ profluvium, Diabeterem, sive Hyropem matulæ excitant: eoque facilius cum juges quotidianæ cruditates à debilitato ventriculo producantur, quæ à calore liquatæ, facile in serositates convertuntur. Huic atem suctioni, sive attractioni à jecore & renibus incipienti, & ad ventriculum pervenienti, humiditatis exinanitio, imò & siccitas necessari succedit, unde sitis: cui quoniam line modo / mensura copioso nimirum aquæ gelidæ poti satisfactum fuit: ideo ventriculi nativus calor abefactatus, obrotus, & etiam positive vale imminutus fuit: ut propterea cruditatum, & inde obstructionum auctor fuerit: & eo magis, cum uberius & liberalius comedat Nob. / ariens: proprium enim ventriculi frigidi est plurimum appetere, & parum concoquere.

De lue Gallica dubitatur: quamvis enim bis Gonorrhœam à muliere contraxerit, Gallica lues frequenter ad hep. non pervenit, sed in vasis spermaticis firmatur, & sine humorum infectione solvitur; diu, sive potius spem ipsam augeat, quia nunc symptomata Gallicum suppressæ Gonorrhœe comparant; verum si quoque adesset, neque urget, neque status corporis in præsens ejr Curationem admitteret, sine perditione Patientis; & ita, ut dicebat Gal. adversus quidam incautos Medicos, Morbus quidem catus esset, sed Ager mortuus. Febriculam vero, si adsit, ab hypochondriorum obstructionibus & cruditatibus pen-

dere posse arbitror: quia evacuationibus, Lenientibus & Præparantibus procuratis, jam cessaverat, & multis diebus sine febre Nob. Pat. fuit observatus.

Jam diu ita se habentibus, mirandum non est, si in hoc ancipiti & pleno periculi statu ad Tabem tendente, a. bigant Viri Excellent. in ejus Curatione proponenda: siquidem qui à Gallica virulentia calorem in visceribus intensiorem fuisse redditum putant, Gallicam luem tanquam causam primam, extirpandam esse necessarium judicant: præsertim cum & febriculam Gallicam esse existiment: cui intentioni non nisi exiccantibus medicamentis satisfieri potest. Qui vero febriculam hypochondriacam esse, & progressu habitualement, & hecticam evadere posse arbitrati fuerunt, obstructions primò referendas esse volunt, utpote nutritioni incommodas; Qui tandem omnium maxime affectionem Diabeticam, tanquam urgentiorem magni faciunt, colliquant calori & universæ maciei incumbendum esse intendunt: cum Aretæus dicat, quod *Disturna est hujus morbi creatio, brevis autem hominis vita, in quo affectum perfectum fuerit, velox namque colliquatio, & sessina mors advenit.*

Ego idcirco, præmissa primarum viarum expiatione, levioribus aperientibus mesentericas obstructions esse aperiendas, mox totam Curationem adversus Diabeticam affectionem dirigendam esse refrigerantibus, substantiæ humectantibus, & non nihil, sed parum roborantibus, sentio; perperam enim faciunt Medici illi, qui ad roborantia, imò ad attringentia properant: cum tamen quousque humiditates in corpore à colliquatione multiplicantur, evacuari, non detineri debeant, quamvis à renibus ad alvum non inutiliter diverti possint: sed caute & sine purgantibus medicamentis, quæ calefaciendi & maxime exiccandi facultatem obtinent; neque in calidis & siccis temperamentis, à corporibus emaciatis quicquam educunt, egregue tolerantur, ut docuit ipsa experientia, cum gravissimo Nob. Pat. detrimento.

Itaque omnium primo præbeatur flos cassiæ cum crem. tartari, cui post horam superbibat feri asin. depur. ℥ij. & duabus horis ab assumpto sero prandeat. Sequenti die assumat Julapium acet. ad ℥ij. aqua stillat. agrim. & aceto paratum, cum macerat. radic. cich. petrosel. & graminis: jam dicto vero Julapio superbibat jus pullæ aut vituli, cichorio & endiu. alteratum. Tercio die assumat rhabarb. ad semi-drachm. drachmis duabus floris cassiæ immistum: cui post horam superbibat jus, ut supra, cich. & endiu. alteratum. Quarta die repetat Julapium, quinta rhabarbarum, ita alternatim perseverando ad duodecimum usque diem: tuncque repetendum erit primum medicamentum, ex flore cassiæ & crem. tart. paratum cum sero, ut supra.

Pro secunda & tertia intentione explenda, nil lacte præstantius excoitari potest, quod primis xv. aut xx. diebus asininum de more cum saccharo statim multum summo mane præbeatur: viginti vero sequentibus aliis diebus caprinum; atque tandem vaccinum, cujus serum Medicinæ Principes silice excandefacta absorbere solent. Quo tempore pro Balneo incongruo existente substituantur toti & renibus in-



unctiones, necnon Epithemata jecori. Pro toto sufficiens erit oleum amygdal. rec. sine igne extractum copiose assusum. Pro renibus pareretur linimentum ex ung. ros. Mes. infreg. Gal. & populeo; quibus, progressu, addatur quoque ol. hyoscyami atque Saturni. Pro hepate pareretur Epithema ex succo cich. aceto ros. & speciebus triumfantalorum.

Dum lac asininum atque caprinum summo mane assumet Nob. Pat. præbeatur vesperi, duabus horis ante coenam, & octo ab assumpto prandio cyathus aquarum stillat. sempervivi, endiviæ & anguriæ, quibus immisceatur syrupi papav. alb. 3j. Tempore vero vaccini lactis, eadem hora vespertina offeratur cyathus aqu. stillat. plantag. sempervivi & polygoni, addita tinctura coral. chym. & quandoque essentia Martis. Toto autem tempore usus cujuscunque lactis, bis in hebdomada cassia cum pulpa tamarind. ad an. 3 iij. sub prandio erit præbenda, & quandoque ventriculo robur aliquod addendum parum ante prandium, præscribendo duo aut tria grana mastiches integra devoranda: aut pilula ex 3j. succo absinth. condensati.

Quibus omnibus congrua vivendi ratio erit addenda, ita ut alimenta sint boni, sed crassioris succi, refrigerantia potius, quam calefacientia: astringentia potius, quam aperientia, nec ullo modo diuretica. Sic inter carnes Gallinæ, Capri, caro Vituli, imò & extremitates ejusdem: quandoque etiam caro suilla elixa, optime decocta: hæc namque non ita facile a calore colliquantur, nec in serositates convertuntur; elixentur autem semper in aqua chalybeata, & sine sale. Inter pisces, conceduntur saxatiles non solum, verum etiam quandoque glutinosi, ut Tinca & Anguilla. Conceduntur lactaria, & quandoque etiam caseus recens sine sale. Inter legumina, hordeum, alica, oriza. Conceduntur quoque edulia ex pasta delicatiori parata, & præsertim vermiculi Apulenses. Ex oleribus, cichorium, endivia, lactuca. Ex fructibus, pyra, poma, mala cotonea, mespila & castanæ. Prohibentur condimenta aromatum, exiguo cinnamomo & pipere ruditer contuso exceptis. Prohibentur pariter condimenta alii, caprarum, limonum, citri: probantur autem arantiorum, granatorum & agrestæ. Potus sit vinum, potius crassæ substantiæ, multa aqua chalybeata, aut aurata dilutum: quod fantalo rubro & exiguo lentisco in doliolo medicatum non inutiliter reddi poterit. Sed quoniam copiosior potus iis qui multum mingunt, non est denegandus: idcirco non semper vino, sed quandoque aqua præsertim extra mensam, erit utendum, quæ una cum pomis decoquatur, ut placuit Aëtio, aut eorundem succus immisceatur: sicut quandoque succum granatorum: & semper chalybeata, aut aurata; Quantitas autem ab Excell. Adstanti præscribatur, habita copiosæ urinæ ratione. Somnus sit diuturnus. A Venere prorsus ablineat: parum corpus exerceat, & alacri animo vivat. Quæ omnia Nob. Adolescenti a Deo salutaria precor. *Idem Tom. 1. Cent. 3.*

Vir Illustriss. hic Romæ degens, annum supra quadragesimum agens, temperamentis sanguinei subbiliosi, proceræ staturæ, mediocris habitus, cum rubra facie flavisque capillis, post validos corporis motus & vehementes animi pertur-

bationes, in varias corporis affectiones incidit. Decem abhinc annis sitim immodicam pati coepit, cui potibus satisfacere coactus fuit. Interim sanguinis in toto accensionem frequenter percepit, cum maculis per universum corpus rubris: necnon cum ejusdem sanguinis ex gingivis eruptione, quæ omnia phlebotomia & refrigerantibus medicamentis evanescebant: perseverante tamen semper bibendi desiderio, & magis hyeme, flante Borea, quod nunquam cessit, nec potibus Nocerianis, nec Balneo aquæ dulcis: imò duobus abhinc annis post Erysipelatis eruptionem in facie, sitis intensior facta fuit. Et quamvis cibum appetat, satis comedat, commode dormiat, nihilominus cum lassitudine totius & renum gracilior semper redditus est, dum & potulenta, & solida assumpta a ventriculo statim attrahi se percipere asserit; semper autem urinæ crudæ & aquosæ quantitas quancitatem potus superavit. Tandem anno elapso Patiens Illustr. Medico rursus seipsum commisit, & congrua instituta vivendi ratione alimentis refrigerantibus & incrassantibus purgatus fuit, serositates biliosas evacuando, non sine parca sanguinis missione. Jura carnium herbis refrigerantibus & incrassantibus aterata, mox lac vaccinum exhibitum, necnon fœcula eodem lacte parata in usum ducta fuerunt. Quibus symptomata remissa visa sunt: namque & sitis minus infestabat, & urinæ crassiores, atque cum nubecula apparebant, nec adeo copiosæ. Verum quoniam hujusmodi declinationi videndum non esse censuimus, idcirco ad usum tactis cocti & chalybeati, & ad medicamenta astringentia, roborantia & divertentia devenimus, additis infussionibus, necnon illitionibus refrigerantibus & roborantibus. Sed quia a actis usu ventriculum sibi gravatum observavit Illustr. ideo illud omisimus, fœculis ex lacte paratis contenti: mane verò jura herbis refrigerantibus alterata, additis succis, instituta fuerunt. Hæc a nobis administrata, Archiatri Romæ aures subjicimus, quorum Oracula expectamus.

Falso nonnulli Diabetes causam in renum imbecillitatem reulerunt, cum omnium primò in eorundem attractricis facultatis robur, secundo in colliquationem, atque tandem in recentericis imbecillitatem sit referenda; ut propterea Viro Illustr. & Reverend. calida intemperie jecoris, cordis, vasorum omnium & renum a natura prædicta, diabetica facile decem abhinc annis incepit affectio, cum & ætatis ratione, & ob error, præsertim in animi motibus & ad gravissima negotia applicationibus commissos, calor in toto fuerit magnopere adauctus, ut significavit Erysipelas in facie, pustulæ, seu maculæ rubeæ in toto erumpentes, sanguinis e gingivis effusiones; quæ omnia symptomata augmentum suscipiebant. hyberno tempore, flante Borea, quæ per Antiperistasin internus calor intensior addebatur, qui calor quotidie semper incrementum suscepit, & adeo increvit, ut in renibus rostriorem attractricem reddiderit, & in visceribus atque vasibus omnibus humorum colliquationem adauxerit, sicque serositates redundante, in universo genitas, ad sese renes per partem post partem violenter attraxerunt; quantæ vero retentrice



trice facultate cedere coacta, copiosa midio præter naturam, Diabetes dicta, tandem necessario succedit, quæ legitima non est, quoniam superiorum partium retentrix facultas in suo vigore servata est. Ad hoc enim ut potius profus impermutatus mitigatur, tres causas supradictas simul uniri necessarium existimo, renum attractricis facultatis robur, retentricis omnium partium imbecillitatem, & jecoris, cordis atque vasorum exuberantem calorem colliquantem; quibus præsentibus, facultati concoctrici tempus non datur, ut proprio munere fungi possit; & ideo concoctricis imbecillitas non per se, ut aliqui asseruerunt, sed tantum per accidens, ad hunc affectum producendum concurrat.

Hujus affectus sevitiâ compescere, ac prius evincere non potuerunt medicamenta & alimenta, rite & recte postremo administrata, quoniam ægre Curationem admittit, nisi ita ab initio præstita fuerint, cum tamen principium non adeo facile innotescat, quia facultates læsæ, naturales sunt, non autem animales, ut in fame canina contingit. Et præterea cum decem annorum spatio opportuna Curatione neglecta fuerit, certam salutis spem nobis admittit.

Ideò ad aliud transeundum non est, sed intentionibus à Doctissimo Viro propositis, satisfieri curandum, reſtiterando & incrassando: ita enim robur attractricis facultatis remitti poterit; nec de retentricis imbecillitate magna cura est habenda. In hunc finem plura medicamenta & alimenta administrata fuisse audio; inter quæ principem locum tenet lactis usus, ut quod humores incrassare, immodicum calorem remittere, robur attractricis facultatis laxare, & totum corpus nutrire valeat, ita ut nullum medicamentum, aut alimentum præstantius, pro casu nostro administrari possit. Et quamvis plerique Medicorum, etiam antiquorum, ut Aëcius & Hippoc. lac coctum, sive silice excaudfactum, præbendum proponant ad majorem humorum incrassationem, attamen ego cocturam non admitto, nisi asinini & caprii: at quando vaccinum adeit præbendum, coctura opus non habet, ut per corpus distribui, & ejus facultas ad renes pervenire possit: coctum enim facile in ventre coagulatur, & difficilius per corpus digeritur. Quoties igitur a Viro Illustr. toerari possit, adeo ut à calore non corruptum, lac vaccinum nuper mulctum cum modico saccharo erit offerendum. Et quia audio ob hanc causam in præsens omisum fuisse, ideo prudentissime se gessit Excellent. Aditans, præbendo jura refrigerantibus alterata: quibus per aliquot dies exhibitis, rursus lactis usus erit tentandus. Interim vesperi in prima mensa nonnunquam syrupus de papav. alb. ad ʒj. in jure lactuca alterato poterit exhiberi: sicuti summo mane in jusculo refrigerante infundere poterit syrupus coral. Quercet. à Viro Excellent. propositus. Mirabilis quoque solet esse tinctura Martis, & frequenter tinctura Smaragdina, in jure portulacæ & plantagine alterato. Extrinsecus vero aliquod obstupefaciens linimentis addendum, ut vis attrahendi torpescat; quare unguento Comitissæ populeum substitui poterit.

Alimenta pariter incrassantia & refrigerantia

conveniunt, ex lacte & pasta parata: oriza cum lacte: psilana cum emulsione amygdalarum dulcium: capita & pedes Vituli: gelatina ex pedibus cum succo agrellæ parata: Vinum verò rubrum, & potius subdulce, ut facultatis attractricis robur laxetur. Alvus medicamento à Præstantissi. Viro proposito ex Cassia & Tamarindis sollicitetur; Clysteribus quoque ex lacte & butyro paratis. Motus autem tum animi, tum corporis, quanti fieri potest, arceantur, & alacri ac confidenti animo vivat. Quæ scripsisse volui, ut Illustr. Viro imperanti morem geram, non autem ut Sapientissimo Adstanti quid novi suggerem. *Idem ibidem.*

Fœmina, sexaginta annos nata, temperamento biliosa, calidis alimentis frequenter uti solita, jam ab aliquot diebus urinam magnâ copia ita excernit, ut omnem potum ingestum protinus per urinas emittat, eumque crudum, ac à natura vix concoctum. Adest magna sitis, item calor, dolor & punctio circa lumbos, corporisque totius macilentia.

Afficiuntur in hac ægra renes; quod ex copiosa illa urinæ excretionem, item ex calore, dolore, & punctione circa lumbos percepta, est manifestum. Afficitur item cor, quod ex magno illo calore; nec non totum corpus, quod ex totius corporis macilentia patet.

Morbis, quo ægra affligitur, est intemperies renum calida & nimis rara & laxa, quæ serum sanguinis, nimis copiose separatam, per poros eorum nimis apertos perpetuo magnâ copiam transmittens, urinæque evacuationem nimis copiosam efficiens, Diabetes appellatur.

Causa præternaturalis hujus morbi est diutinus ille calidorum alimentorum usus: unde multi humores calidi & acres ac serosi, in corpore geniti, antecedentem huic morbo præbuerunt causam. Illi verò in corde existentes & deinde ad renes delati, ibique intemperiem eorum calidam & nimis raram inducentes, continens hujus morbi & symptomatum sunt causa.

Hinc enim cor nimis incaluit, & pori renum nimis sunt aperti, sanguisque partes crassiores artius vi caloris unitæ, ac serosæ à reliquo sanguine nimium separate, & aciores factæ, jam à fervido corde vehementius in omnes corporis partes, ac proinde in renum poros nimis hic raros & laxatos, perpetuo propelluntur: eaque ipsos dolore circa lumbos afficiunt, immoderatamque hanc produciunt urinæ crudæ, utpote, ob celerem suum transitum, satis concoqui nequeuntis, evacuationem; ex eaque ingens corporis exsiccatio, & inde sitis, calor, & totius corporis macilentia, originem ducunt.

Morbis hic periculosissimus est, primo propter ægræ nostræ senectutem, & deinde propter macilentiam jam inductam: & præterea quod hæc sit tam vehemens non tantum excrementitiarum, sed etiam utilium partium, perpetua evacuatio; unde metus est, ne vires brevi penitus prosternantur, ægraque citò extinguatur.

Cursus itaque seriò est auspicanda: eaque in causæ antecedentis & continentis, ac intemperiei per contraria ablatione, & symptomatum mitigatione & sufflamine, consistet.

Primò itaque præscribatur medicamentum tale purgans.



℥. Pulpæ cassiæ recent. extractæ 3v. Tamarindor. 3ij. Rhabarbari pulveris 3ß. cum syr. rosar. q. s. f. bolus, manè deglutendus, vel cum juseulo exhibendus.

Et porro frequenter utatur de sequenti apozemate:

℥. Rad. borrag. buglossæ an. 3iß. plantag. 3j. fol. portulacæ, plantaginis, violariæ an. m. j. sem. plantag. portul. cæ an. 3ij. flor. borrag. violarum, nymphææ, buglossæ an. p. j. myrobalanor. citrin. 3vi. Coq. in aq. comm. qu. suff. ad lib. jß. colaturæ adde syr. ros. ex infus. multipl. 3ij. M. F. Apozema.

Atque etiam subinde sumat de sequenti electuario quantitatem castaneæ majoris.

℥. Conserv. flor. buglossæ, mixtæ cydonior. an. 3j. Gummi tragacanthi, in aq. ros. dissol. 3ij. Sanguinis draconis, boli armeni an. 3ijß. cum syr. de papavere q. s. F. Electuarium.

Lumbi & spinæ, ab ultimis costis, manè & vespere inungantur sequenti unguento.

℥. Unguenti rosacei, populei an. 3vi. camphoræ 3j. ol. rosar. cydoniorum an. 3vi. Cera & aceti parum, F. unguentum.

In viâ ratione, Aer ad frigidam & humidum declinet. Cibus sit euechymus, & qui cra. lum succum gignat, ac acrimoniam humorum temperet, ex lacte amygdalato, oris sorbilibus, piscibus saxatilibus, carne bubula, pomis, pyris, oryza, caleo recenti, intybo, lactuca, portulaca. Abstineat à diureticis & acris. Potus sit vinum adstringens. Abstineat ab exercitiis: contineat se inquiete. Somnus sit consueto longior. Alui excrementa arte vel naturâ respondeant. Fugât vehementiores affectus. *Hewic. Regim. apud Theod. Craanen. medicat. lib. 3.*

### Observationes.

Honestus quidam civis urinæ detinebatur profluvio: subinde uno die amplius quam urinam 40. librarum reddebat, bibebat non minus, ut qui propter assiduum urinæ profusionem, assidua quoque siti premeretur. Cum autem huic nulla prodesse remedia, & vix ulla sibi adhiberi pateretur, paucis diebus deficiens, à vita commigravit. Morbum hunc diabete fuisse apparet, quem *Galenus* comparat lævati intestinorum seu hentericæ: quemadmodum enim per hanc cibum assumptus citò deficitur: ita & in diabete potus velocissimè per vias urinarias descendit. *Rembertus Dodozeus lib. observ. cap. 12.*

Puer quidam 7. annorum usu acidularum *Griesbacho* sum in tantum urinæ profluvium incidit, ut in unquam simile visum sit, valde dubitem. Hinc sitis talis supervenit, ut singulis noctibus plus quam libras x. aquæ (quantitatem vini, quod admiscebatur, non observant adstantes) ebiberet, & eodem modo protinus, nihil alterat. m. iterum emingeret. Ego cum alio Clarissimo Medico in consilium adhibitus, victus rationem refrigerantem & insigniter nutrientem præscripsimus. Loco vini & aquæ, quibus antea, copiosè usus fuerat lac amygdal. & jusecula castratorum, caponum & pullorum, in quibus vitella ovorum dissolvebantur, propinavimus, carnem assatam castratorum, perdicum, caponum, turdorum, alaudarum, & similia avicularum dedimus. Hæc cum per dies

aliquot usus fuisset victus ratione, & vires non nihil recollegisset, Syrupo rosato solutivo composito cum rh. b. & myrobal. citrin. corpus leniter expurgavimus, & per intervalla potunculam sequentem exhibuimus.

℥. Rad. tormentill. bitort. symphyt. mai. plantag. an. 3ij. fol. agrimon. veronic. rot. rub. an. Mß. coq. in aq. ad tertiæ partis consumptionem in colat. 3ij. dissolv. Syr. de ros. siccis 3ij. C. C. usti & præpar. corall. præpar. trochisc. de spodio an. 3j. M. F. potio. De præscriptis pulveribus quoque non raro cum lacte amygdalino dedimus, renes unguentis & oleis refrigerantibus & adstringentibus, veluti oleo rosac. myrtillorum, matthes, unguento rosac. & conitiis inunxit. His cum per aliquot dies usus fuisset remediis, & victus ratione, plenissimeque restitutus esse nobis videretur puer, domum incontuli. Post meum abitum, cum victus rationem non observasset, & loco lactis amygdal. vinum aqua dilutum iterum bibisset, denovo in eundem morbum incidit, & quidem tam graviter, ut naturæ debitum persolverit. *Guil. Fabricii Hildanus observ. 33. cent. 5.*

Duo diabete laborantes qui ita squalidos habebant renes, ut folia nymphææ illis imposita, momento temporis chartæ pergamentæ instar durissima redderentur, post quamplurima frustra usurpata præsidia tandem lactis atinisi chalybeati potu unius mensis spatio nutriti & philono persico ex intervallis alii usque à tanto malo, me jubente, fuere innunes. *Zacutus Lusitanus observ. 80. lib. 2. Prax. admirand.*

Mulierem quandam diabete laborantem istis paucis & facilibus remediis liberavi.

Manè & vespere agra residebat in Balneo aquæ dulcis, in qua ferrum vel ignitus chalybs aliquoties extinctus erat. Post egressum Balnei, regionibus renum ac vesicæ applicabat plantaginem aqua chalybeata decoctam. Cibum præscribebam siccantem & ex Chalybeata aqua vel lacte coctum. *Martino Kulandus curat. 98. cent. 2.*

Diabete curatum vidi hoc medicamento.

℥. Cancror. fluviat. in clibano siccatur. & pulv. 3j. Thuris masculi 3ß. sacch. modicam, detur in potu. *Achilles Gagerus observ. 36.*

Juvenis Patritius, ob calculum, in pueritia sibi excisum, perhorruit usque adeo, crudelem, hujus tormenti recidivam: ut nulla non admitteret remedia, dummodo cicerent lotium. Quo tamen impensius fluente, ob continuum usum, vini malvatici, cum semine urticæ, præparati: contraxere inde incalescentes renes, tantam imbecillitatem: ut dissoluto ipsorum tono, inciderint in diabete: sive tam vehementem, currentis urinæ tran. tum: ut quotidie emingerentur circiter sex liquoris libræ.

Quo perenni profluvio, ultra tertiam mensem continuante, emarcuit summo opere corpus, cum lenta febricula, si in exhansta, vigilia in defatigabili, & tandem totius compægis, ac omnium viscerum dissolutione tam evidenti: ut Verè fuerit in ipso videre: quid argutus Arctæus intelligat, per colliquationem illam, in quam dicit resolvi, carnes, & membra eorum, qui diabete laborant. lib. 2. diut. aff. cap. 2.

Est autem *Asinus* (ut cum Paulo Aeginetâ loquar) velox transitus eorum quæ bibuntur. Affectus certe ad primæ rarus. Quem *Galenus* dicit



duntaxat bis : & Victor Trincavellius , spatîo quadraginta annorum , ter solummodo vidit : Et nos annis viginti quinque , in frequentibus ægris , bis improspere , & semel feliciter , in annu sexagenaria , ante diem quartum decimum , sanata.

Causa ipsius est , imbecillitas renum . Sive eam induxerit trigus , post potum refrigeratum : uti in Abbatisa Veneta , & Cardinis Pisani fratre , animadvertit Victor Trincavellius . Sive calor , excitans non modò licum , sed irritans præterea , vim attractricem renum , velut decreverit . Paulus Aegineta , Alexander Trallianus , Avicenna , & Aretæus lib. 1. de sig. diut. morb. cap. 2.

Ubi expressè statuitur , morbum hunc excitari , a diplace , vipera venenata . Quam Dioscorides , & Aetius Causum appellant . Sive , quod commorli ab illa , in festentur febre ardente , sicut loquitur Galenus , libro de Theriaca , ad Pisonem . Sive , quod producat ( ut vult Dioscorides ) situm adeo inexhaustam , ut nulla compescatur aqua . Quæ omnia maximum , cum arguant incendium , mirum certe non est , & fluentem calorem , poni a Medicis , inter causas , diabetes , uti hic a nobis quoque facitatum . Nicol. Tulp. observat. medicar. lib. 3.

Mense Septembre anni præteriti rarissimum casum practicum , haud ita sæpe occurrentem in rustico quodam quinquagenario observavi , quem ipse Gal. 6. de loc. aff. cap. 3. se totius vitæ suæ tractu bis tantum vidisse scribit , Diabetem humum l. mictionem frequentem ac copiosissimam cum oris siccitate , siti continua atque inextinguibili , ( linguam enim , statim etiam a potu , semper habebat aridissimam , ) ac intensa totius colliquatione sequente , ab hepatis ac imprimis renum intemperie calida , sicca ; non solum omnia potulenta & liquida , sed etiam omnes alias humiditates corporis ad se attrahente corpulque exliccante . Singulis ferè diebus ægrotus duodecim mensuras urinæ tenuis ac limpidissimæ reddebat , cum tamen toto die vix quatuor mensuras tam cerevisiæ quàm Julebi , ordinati sumebat , atque ita potus quantitatem urinæ quantitas multo superavit . Hinc Hæctica febris subsecuta , cui equidem variis humectantibus & cum modica adstrictione refrigerantibus tam internis quàm externis , à me occurrebatur , alit sine penitiori effectu . Prognostico itaque facto æger , labascentibus de die in diem viribus , è vivis tandem sublatus est . Job. Matthæi Nosteri .

Triennium est , ex quo urbs nostra cum febribus malignis conficiatur , exactis propemodum in exilium intermittentibus . Certe totis mensibus vix tertianam observamus . His cum se varia nisceant symptomata , ante biennium miscuit se quoque spurius diabetes , quem pluribus lethalem fuisse notavi , salutarem paucissimis ; sero enim illo copiosè fluente , interpellati sudores , impeditus somnus , vires collapsæ . Sed quod mirum , in religioso quodam viro junxeremutuas operas , durante febre , dysenteria , spurius diabetes , & oblitio , licet ex præceptis artis sperare fas esset , profluente ultra debitum urina , cessaturum alvi fluxum , hic perseveravit utrumque . Mirius quod Elisabetha Bornholmica eadem febre , & profusione urinæ tentata plu-

ribus ante mortem diebus non tantum diem obitus sui , sed & horam præcise dehneret , cumque a me amice noneretur , ut ab ejusmodi præcognis temperaret , & in imaginationum vitia coniceret , si quid tristius animo obversaretur , illa læta fronte ad eventum provocavit , non falsa auguri ; quippe incidit mors in eandem horam quam præuixerat , sive imaginationis pertinacia id velis adscribere , sive Monitori angelo , quod illa constanter asseveravit . Quod & in aliis nobis observatum . D. Olai Borrichii .

Vir magni nominis anni 1669 . à Scabie antea medicamentis ordinariis liberatus , verè ineunte 1670 . pro præervatione , infcio Medico bibi per vices ultra 15 . mensuras succi Betulæ , etiam tandem fere corrupti . Inde in corpore cacoehymico ( quod in non levi gradu habebat ) & scorbutico turbati humores a natura irritata omnes ad renes & vesicam affectabant viam . Sitis urgebat maxima , calor aucto morbo accedebat fortis , & quotidie triplo sextuploque ferè demum majorem potu excernere cogebatur urinam ; On nibus specificis internis & externis mart. ipsilque opiatil incassum adhibitis , convulsivis accedentibus motibus moriebatur . Ut Diabetes vulgò Siphonem notat , per quem aqua cito descendit , transcendit : ita affectus hic nominis sui originem reipsa satis superque comprobat , nec minus siti immensa , nullaque potatione sedanda , molestus est , unde Dipfacus audit , ut aliorum nominum , quod v. g. hydrops ad matulam , lienteria urinalis , &c. audit , taceamus . Viscerum ætus maximus illi conjungitur , & incendium tale Pathognomonicum signum Diabetes idcirco rectè dicitur à Rioloano l. contr. Chim. Ratiior quidem habetur affectus , si tamen observata authorum colligamus exempla plura videre licet , præter Galenum , apud Eras. consil. med. 5 . pag. 187 . Lomm. Observ. Med. lib. 2 . pag. 190 . Cardan. Curat. ad mir. 27 . Roland. Cur. Empir. 98 . cent. 2 . Dodon. observ. cap. 42 . Item apud Tulpium , Bartholinum , Rosin- kium , Hollerium , &c. Sed causa ipsa indagatu est longe difficilior , neque enim vel solus calor viscerum , vel aer ambiens attractus , ut quibusdam visum fuit , & in corpore in aquam resolutus , aliæque vulgares sufficiunt ; Verùm dubio procul adest colliquatio humorum & partium in corpore , sive ab acescente sanguine ( vid. Willis. Tr. de urin. pag. 346 . ) sive ab aliis causis inducta . Viam videntur propinquiores concedere ipsæ lumbares lacteæ , per quas ad renes , p. n. ipsorum attractione aucta , statim sunt materia , & quidem ob alterationem ibi nullam factam , sine substantiæ mutatione .

Succum itaque Betulæ addidisse humoribus stimulum , extra controversiam est , ipseque æger confessione sua id dolebat . Est enim Diureticum improprie dictum , quod Helmontii iussu ad calculum curandum facit , quo nomine serenissimi quidam Principes nuperis annis ex eo loco aquæ simplicis , cerevisiam parari mandarunt , utile Nephriticis alimentum medicamentosum . D. Georg. Wolfgang. Wedelii .

Rarissimum affectum esse Diabetem Galenus noster ait de loc. affect. At in hac ipsa raritate ejus singulare hoc est , absque incommodo notatu digno per totam vitam eum perferre ; Sicut apud nos uxor molitoris in proximo pago , quæ



ab incunabulis fere enormiter & quantitate vix credibili bibendo, tantundemque statim per urinam emittendo adhuc vivit per viginti & quod excedit annos, optimè colorata, satique valida, quamvis parumper macilentia. In puellari ætate aliquot mensuras aquæ, multumque vini singulis diebus hausit, & adhuc cum minimùm sex mensuris majoribus quotidianis sitim sopire vix potest, cum tamen nunc pro proportionem tam non bibat, quam antea. Causam dicunt, quod pater illius ex stulto amore infanti adhuc vinum non permisit tantum, sed etiam ultro imperando obtulit: inde incendium renum natum esse putant, quæ tamen sufficiens causa esse non videtur, nisi accedat viarum laxitas, & aliæ causæ forsitan adhuc incognitæ. Ad remittendum calorem & placandam sitim ante paucos annos me connivente (non consulente, cum noverim diuretica magis nocere, quam prodesse) usa est acidulis Tainacensibus, sed earum, quæ aliis præscribitur, quantitate dupla vel tripla fauces aridas proluere vix potuit, omnium cum admiratione. Par exemplum vix legi, nisi quod *Dodonæus cap. 32. observ.* recenset; & *Fernelius* se novisse quendam, qui quotidie horæ spatio tepentis aquæ medicatæ libras sexdecim exsorbebat, ac qualem sumserat, talem protinus emiciebat, scribit *D. Johannis Wolfgangi Magling.*

Diabetem hic voco non ex *æreâ* Medentum, sed insuetam & copiosissimam urinæ per aliquot dies profusionem, sine ulla manifesta causa ægro supervenientem: Hanc raro exemplo passus est jam ante biennium facundissimus quidam Ecclesiastes simul cum infelici dysenteria, & levibus deliriis, nullo alioquin vel caloris insoliti, vel pulsus febrilis indicio. Mira *Zusammenhang*, cum ratio sponderet, fore, ut translata ad vias urinæ, quæ intestina divexabat, materia, cessaret alui profluvium, vel è contrario, nihil horum contigit. Duravit cœpta violentia utrumque malum in decimum quartum usque diem, advenientibus identidem deliriis, sed miribus & tandem longiori vita dignum fatali metæ adstituit. Nec omissa, quæ omnibus scopis servirent pharmaca, sed plusquam genina hic adfuit hydra, cui consiciendæ vix ullus Hercules par fuisset. Scilicet acrimonia humorum in hoc corpore tanta erat, & tam pertinax, ut simul & pungendis cerebri membranis, & renum pelvi, & denique intestinorum ductibus plus quam sufficeret. *Olai Borrichii.*

Vir triginta annorum post largiorem vini potum corripitur diabete cum calore totius corporis intensissimo, siti vehementi, profluvioque urinæ tanto, ut potum ultra triplum per urinam redderet, nec hoc solum de die, sed & noctu insensibiliter. Cæterum post, venæ sectionem & ex frequenti usu Tincturæ Corallorum, decocto plantaginis, imprimisque mistura illa quam Excellentissimus Dominus *Sylvius Prætor sua lib. 1. cap. 30. §. 183.* pro temperanda, succi pancreatici volatilitate habet, intra quindecim dies malum remittebat. *Alardi Hermannii Cumeni.*

Vir amplissimus Civitatis nostræ hoc anno id est, ætatis suæ 66. sensim in *Diabeticum* prolapsus est affectum, non quidem illum exquisitum (neque enim haustum potum vel subito red-

dit, vel nihil plane immutatum) sed, si ita appellare fas est, spurium. Enimvero, cum vivat sobriè & temperanter, quovis tamen mense, plerumque bis, raro semel tantum hoc malo affligitur: Oritur autem malum frequentius Luna plena, & tribus quidem primis diebus cum doloribus intolerandis stillicidium urinæ perdurat, sed exigua admodum copia profluente: reliquo triduo resolvitur vesicæ sphincter, continuaturque involuntarium & copiosissimum aquosi plane & decoloris liquoris profluvium, multis hinc inde ramentis albis urinæ immixtis: & hoc quidem triduo utcumque gravissimi adsint in urethra, vesica, renibus dolores, tolerabilis tamen malum est primo triduo, quod urina interea continuo destillando secedat, & multum secum acrimoniæ salinæ avehat. His tribus diebus septuaginta duæ circiter libræ urinæ evacuantur, cum interea vix unam libram ebiberit: & ne toto quidem antecedente mense 40. libras liquoris hauserit. Septimo morbi die, urina sensim ad colorem suum redit, clauditur Sphincter, & decimo die Nobilissimus æger ad negotia publica, paulatim revertitur. Has jam diu leges sibi finxit difficillimum malum, nunc paulò mitius agit, & paulò inconstantius, adhuc tamen crudeliter. In hac historia duo mihi admiranda occurrunt, acerrimo iudicio tuo expedienda: unum, unde immensa illa urinæ copia, in exactissima ægri dieta, & potu parvissimo? alterum, cur ægri corpus interea nullo modo flaccescat; durat vividus faciei color, muscoli omnes pleni, lacerti robusti, venæ tensæ. Scio tentare nodos hos solvere tum opt. *Semertium*, tum *Servium* in Moniali Romana, sed, ne quid dissimulem, evidentiorum adhuc rationem ardentè desidero. *Olai Borrichii.*

*Dom. Petrus Bullichius*, olim Serenissimi Regis nostri, Divi Friderici Tertiæ Archiater, nunc Regis Urbis Præses & Consiliarius Regis, *Diabete* patitur cum dolore post Nephriticos cruciatus singulis mensibus recurrentem, quodque mireris, instante Plenilunio XII. mensuras aquæ mingit, quanquam vix tertiam partem unius mensuræ bibat, neque tamen ulla sequitur colliquatio aut corporis emaciatio, quod vegetum & plenum permanet. In urinæ destillatione expertus est dolorem sibi augeri, quando calor fornacis est intensior. Suasi lac chalybeatum, vel decoctum hordei chalybeatum, consilio *Augenii*. Ille aurum extinctum maluit. Per alvum quoque facibus permixtæ arenulæ exeunt, & ex lotio copioso arenulæ in pannis resudant, ut massam sanguineam Tartaro abundare credere cogar. Tentavit curam transplantatoriam exiguo cum emolumento. Exlubuit cani sal urinæ propriæ, unde canis mortuus pilis cadentibus. Quid de casu hoc & symptomate raro iudices, non gravaberis perscribere. Dignus æger est senio & mentis æstimandus, meliore sanitate & Doctiorum cura. *Thoma Bartholini.*

#### Anatomica inspectiones.

*Diabete extincti Renes flaccidi & decolores inveni.*

Anno 1590. Filia Præsidis Hollandiæ 18. annorum



tum aliquot ante obitum annis Diabete laborarat, adeoque sitibunda extiterat, ut unico die non raro ptinas duas tresve potus assumeret, nec minore quantitate urinam in dies reddebat.

Renes huic non absumpti, rerum flaccidiores solito, figura cineritia non impense rubra. *Petrus Pauvius observat. Anatom. 2.*

*Diabetes à vitio Renis sinistri magna molis, lapide obsessi exiguo: Dextri minimi & ferè consumpti.*

Vidua Barnabæ Panthon sæpè nephritica erat: aliquando e vesica detractus lapis: Tandem post multos dolores nephriticos doluit inguen sinistrum, febricitavit, mox in imò ventre dolor erat intolerabilis, jactatio, vomitiones assidue, imò dolor ad pectus, variae admodum erant species doloris: In sinistro hypochondrio tumor apparebat magnus & durus, Quidam verè splenem intumuisse dicebant: Alii Renem, Febris marasmodies, convulsuunculae, frequentes leipothymiae, involuntariè profuebat urina: Species quædam erat Diabete, urinae tenuissimæ, aliquando cruentæ, post multos dolores mors.

Aperto cadavere Ren sinister inventus est lapide obsessus exiguo: Ren in magnam molem undique increverat, Adæquabat Renem bubulum magnitudine Paulum fœnei in eo erat: Dexter adeo parvus erat ut ferè reperiri non potuerit; Macuerat multum: Nunquid verum illud à Renibus febres Marasmodies contingere? *Ballonius Ephem. & Epid. lib. 2. pag. 152.*

*Diabetes à vitio vesicae tumore σφαλερώδη affecta excitatus.*

Multis ementitus Diabetes: causam ad Renem affectionem referebant: Mortui contracta planè vesica reperta est, cum gangraena & tumore σφαλερώδη in capacitate ipsius vesicae: Quod notandum nè quis decipiatur. *Ballonius Epid. lib. 2. pag. 152.*

*Diabetes à rene uno lapide obsesso, & in ureteris initium implantato: altero minore reddito & collapsio.*

*Joh. Chalumeau* annos natus circiter 50. corpores qualido & visceribus pari modo affectis, nephriticis symptomatis confectus est: dolor fixus, excretio nonnullorum lapidum ex intervallis: Ren sinister lapide angulos obtusos habente obsessus est, In ureteris principium implantatus deprehensus est post anatonem: febris conclusa, plus in recessu quam in fronte habens, adultio & squalor; Extimus habitus aliosus: lingua squalida & horridula, æstus & sitis, merebat pluri usto, urina aquea planè, sensim extabuit, Diabete interiit.

Ren alter lapide non obsessus, iusto minor erat & penè collapsus: In altero lapis prædictus deprehensus est, Nullum aliud commemorabile vitium quod sub oblutum caderet. *Ballonius Epid. & Eph. lib. 2. pag. 153.*

*Diabetes à renibus male affectis.*

Vir quidam in ætatis flore, diu atrocibus ne-

phriticis doloribus vexatus, renisque abscessum passus, in diabetem incidit. Singulis septimanis dolium dimidium cerevisiæ ingurgitare difficile illi non fuit. Post mortem cadaver aperiendi copiam mihi fecere consanguinei. Viscera satis bene constituta, exceptis renibus & ureteribus, conspexi, interque enim ren ex parte consumptus erat, præsertim dexter, cujus substantia planè consumpta, ejus membranas summopere incrassatas & contractas, pelvisque capacitatem adæquantes vidi. *Frederic. Ruyschium in observat. Anatomico Chirurgico.*

## DIARRHOEA.

**D**E hoc morbo non est sanè quid specialius dicamus, siquidem tum supra capite de Cholera, tum infra capite de Dysenteria abundè satis explicatur. Hic itaque tantum de illius speciebus quæ vel Diarrhœa simplicis, vel Cæliaci fluxus, vel Lienteria, &c. nomine audiunt, per *Curationes, Consultationes, Observationes & Anatomicas inspectiones ex variis.*

### Curationes.

Omnes fluxus Intestinorum primariò à ventriculo pendent. Hujus ergo, ut partis mandantis, primò habenda ratio fuerit, nisi fluxus nimis urgeat. Ideoque ventriculo corroborato ipsi quoque iluxus cessant, sed tamen præmissis intluxibus incipientibus vomitibus, adhibitisque Epithematibus (de quibus supra in affectibus ventriculi) tandem Enematibus abstergendum & consolidandum.

Triplex autem non sine causa statuitur alui profuvium: Diarrhœa, Lienteria, & Dysenteria. Ad fluxus ventris omnes deturter in die de croco Martis, singulis vicibus grana x. cum succo prunorum sylvestrium, Item sequens.

℞. Hepatis lupi Michridatii ana ℥j. Magisterii corallorum, boli armeni C. C. utriusque, Mastichis ana ℥ss. aquæ tormentillæ ℥iv. Cichorii ℥ij. Mivæ cydoniorum ℥j. Misce.

In Diarrhœa & Dysenteria Epidemica præmissis vomitu ad Antidota fugiendum.

Diarrhœa, quia à variis causis pendet, & semper alterius morbi effectus, diligenter videndum à quam causa hæc ipsa dependeat, & an critica hæc sit, naturæ consuetæ, vel symptomatice. Si ob errorem aliquem externum accadat, an à partis aliqua intemperie, aut humorum copia fiat: quæ omnia si quis rite observet, non difficile erit huic morbo resistere.

In genere notandum, nullam talem subito reprimendam & retinendam esse nisi fortè in phthisicis & peripneumonicis. Etsi quid molendum, à medicamentis lemoribus & imbecillioribus semper incipiendum est, dato solo diacydonio, aut mivæ cydoniorum composita. Ventre exterius inuncto oleo cydoniorum, mastichino, nardino, de mentha; prodest etiam lac ebullitione unica coctum & chalybeatum mane & vespere hor. 4. ante cibum, ad poculum unum addito terræ sigill. ℥j.

Si vero vires deiciantur, ad fortiora accedendum, deinde ad clysteres & medicamenta primum abstergentia, hinc ad adstringentia



tam externa quàm interna, de quibus in Dysenteria: ita tamen semper habeatur respectus ad membrum primò affectum: in externis tamen notandum, ne exterius muscoli constriquantur, sic nimirum augebitur malum. Constrictio autem à musculis augeat excretionem: quare optimum, ut tenuium sint partium, ut penetrent ad intestina. Quod optimè consequeris, si addideris acet. fomentis & cataplasmatibus.

Maximè in omni alvi fluxu prodest, si regioni ventris calidè imponatur Emplastrum de Theriaca antiqua & terra sigillata ana. Multum quoque in omni alvi profluxione prodest syrupus de rosis siccis, myrtillorum & in primis de ribibus, de berberis, de Corallis Quercetani, C. C. ustum & intestina gallinæ in clibano exsiccata & in pulverem redacta, lota prius aqua aliquà adstringente. Iisdem ferè remediis occurritur Lienterix, seu intestinorum laxitati, in qua tamen magis calefaciendus & roborandus ventriculus & intestina. Et nonnunquam si à pituita aquea eas partes lubricante fiat, causa expurgantibus tollenda. Conveniet hic super ventriculum cucurbitam parvam ponere, ut diutius cibum retineat.

Si ob affluxum bilis ad intestina, aut ob errorem aliquem externum, iis ablatis & mutatis, morbus faciliè tollitur.

Si fluxus fiat propter obstructions venarum mesaraicarum aut imbecillitatem hepatis attractricis, causa suis medicamentis tollenda: imprimis in fluxu hepatico prodest sal Corallorum in aqua plantaginis dissolutum à ℥j. ad 3℥. sæpius per vices exhibitum, cæteris necessariis non omisis.

Diarrhœa correpti creberrimè utantur oryza cum jure carnium seu lacte cocta.

Potus sit aqua Chalibeata, in qua Corallia, C. C. ustum, spodium tormentilla, bistorta, nux moschata, citri, granat. punica mala cocta sint. *Job. Hartm. in prax. Chimiatri.*

Cum Diarrhœa symptomatica plerumque oriatur ex pravis corruptisque humoribus biliosis, pituitosis, melancholicis, aut serosis, & præcipuè biliosis, acrimonia sua facultatem intestinorum expultricem irritantibus; illius curatio ab humoris peccantis evacuatione auspicianda est, quod fiet medicamento, quod purgando astringit, ne humoribus commotis alvi iluxus nimium irriteretur, quod in similem modum concinnari poterit.

℞. Rhab. elect. 3j. Myrobal. citrin. 3℥. Santal. citrin. 3℥. Infundantur in aqua plantag. In expressione dissolve rhab. pulverati 3℥. Syrupi rosac. 3j. Fiat potio. Poterit addi catholicum, vel aliud medicamentum purgans, pro conditione humoris expurgandi.

Vomitus etiam interdum convenire poterit, quia revellit & evacuat materiam morbosam.

Si sanguinis redundantis indicia fuerint, & robur virium, phlebotomia initio celebranda est. At si febris adfuerit, sanguis detrahendus est, etiam si nulla plethora appareat.

Ante & post purgationem clysteres detergentes injiciendi sunt, quorum descriptio talis esse poterit.

℞. Hordei integri P. ij. sulfuris macri & rosar. rubr. ana P. j. liquirit. rasæ & passul. integr.

ana 3j. Coquantur ad 8℥j. In colatura dissolve sacchari albi 3j. vitellos ovor. n. i. Fiat clyster.

Corpore sufficienter evacuato, tum medicamentis purgantibus, tum ipso alvi fluxu, astringentia & roborantia usurpanda erunt, tum per os assumenda, tum per clysterem injicienda, tum ventri admovenda quorum formulæ à curatione dysenterix erunt repetenda.

Præterea verò sequentia utiliter usurpari poterunt.

℞. Aceti chalybeati partem unam, aquæ chalybeatæ partes duas, fol. & fructuum Myrti, cydonior. mespilor. sorborum. ana M. ij. nucum cupressi par. vi. Coquantur ad medias. Colatura foveatur totus venter, tepidè frequenter.

℞. Ol. mastiches, cydonior. & myrtin. ana unc. j. Sang. drac. thuris & gummi tragacanth. ana 5j. Cera quantum satis. Fiat unguentum, illinendum post fotum. Vel

℞. Mica panis assata, & in aceto chalybeato infusa, & carnis cydonior. sub cineribus coctorum, vel cydoniati, ana unc. iij. thuris, Mastiches, Sang. drac. ana Drach. ij. cum syrupo de absinthio & cydoniorum. Fiat cataplasma.

℞. Mastiches 3ij. bulliant in 8℥ iij. Aquæ fontis pro poti ordinario. Præstat aqua ferrata, quia alvum turbat, sed in affectu calido non valet: in cuius curatione convenienter poteris uti tinctura rosarum; vel conserva rosar. cum aqua fontis permixta, cum aqua extinctionis auri, cum syrupo cydoniorum agitata.

Amatus Lusitanus refert quendam curatum diarrhœa biliosa largo frigida potu in ætate. Nos verò cuidam viro sanguineo, diarrhœa biliosa ætate mediâ laboranti, cum siti intensâ, præscriptimus salem prunellæ in potu ordinario, tum etiam julepis, cum aqua lactucæ & portulacæ, ter in die sumendis & intra viginti quatuor horas curatus est.

Si humor fuerit valdè acer & adustus, parcius & mitioribus medicamentis purgandus est æger, alioqui affectus ingravescit, sed refrigerantibus & humectantibus temperandus est; tum etiam sanguine parca manû detracto.

In eodem casu plurimum confert semicupium tepidum, cujus exemplum habetur in observationibus nostris.

Folia plantaginis in jusculis decocta, ad hunc affectum utilissima sunt.

Ne verò diarrhœa in dysenteriam transeat, ad demulcendam humoris acrimoniam, clysteres ex lacte chalybeato usurpandi sunt, tum etiam emulsiones ex seminibus frig. mai. & sem. papav. albi.

Ad eandem diarrhœam biliosam syrupus sequens erit convenientissimus.

℞. Succu cydonior. unc. vi. Succu endiviæ, & acetosæ ana unc. iij. sem. acetosæ, & plantag. ana 3ij. coral. rubr. 3j. Aquæ plantag. 3iv. coquantur ad mediæ partis consumptionem. Colentur & fortiter exprimantur. Adde sacchari parem colaturæ quantitatem, & fiat syrupus, de quo capiat drach. ij. manè & serò.

In omni autem diarrhœa, præmissis universalibus bolus sequens usurpari poterit.

℞. Conservæ rosar. antiquæ 3℥. Cydonior. condit. 3j. pulveris tormentillæ 3j. boli armeni 3℥. cum saccharo. Fiat bolus frequenter iterandus, vel si affectus sit diuturnior, ex iisdem



aut similibus majori quantitate præscriptis, opiata concinnari poterit, ad plures doses sumenda.

Vel ad potentius astringendum utatur æger pulvere sequenti.

℞. Sang. drac. thuris, mastich. mumix, ter-  
rx ligill. lapidis hamatic. trochisc. de carabe,  
ana drach. j. boli arm. veri drach. iij. Fiat pul-  
vis, de quo capiat ʒij. cum liquore idoneo.

Rhab. bis infusum, & postea aqua rosar. lo-  
tum bis aut ter, & exsiccatum, utile.

Tabellæ triasantali quadrupl. cat. rheo. bis  
in die exhibitz, pondere drach. ij. alui fluxus  
materiam auferunt, viscera corroborant.

Conyza folia super prunas injecta, ut fumus  
in cathedra perforata recipiatur specifica vi alvi  
fluxui medentur. Tum si eadem herba cum ace-  
to trita, regioni stomachi admoveatur.

Suffitus etiam rapsi barbati in cathedra per-  
forata receptus, insignis est efficacia, cujus  
exemplum habetur in observationibus nostris.

Syrupus corallorum ad idem est efficax, &  
multo magis illius tinctura, vel magisterium.

Conserva cynorrhodi per se ad diarrhœam  
biliosam utilissima est, tum etiam, si opiatis  
altringentibus permisceatur.

Ubi vero ex fluxu frequentiori, & acriori,  
periculum est ne vires deficiant, laudanum  
opiatum cum mastiche, & terra sigillata utiliter  
exhibetur.

In contumaci alui fluxu, clyster ex jussulo &  
theriaca recenti utilis.

Pilula de Bdello bis aut ter in septimana,  
vel alternis diebus usurpatz: ad diurnos &  
contumaces alui fluxus sistendos utilissimæ sunt.

Ad idem valet mespilorum usus frequens, ut  
se experientia comprobasse testatur Forestus  
*observ. 1. lib. 2.* his verbis. (qui diuturno alui  
fluxu laborabat, & omnem suam substantiam  
frustrâ in Medicorum ope consumpserat, consi-  
lii causâ, ut ab hoc malo liberari posset, ad me  
accessit. Cui consilium dedi, ut mespila etiam  
immatura in maxima copia devoraret. Quibus  
comestis alui profluvium paucis diebus cessavit.  
Uti & cuidam evenit mercatori Zelando, ad  
Johannem Spirinchium quondam Medicum Lo-  
vanientem celebriorem profectio, ut ab eo cu-  
raretur. Qui cum multis mensibus laborasset  
profluvio, & tandem etiam dysenteria, neque  
ab ullis Medicis curari posset tandem mespilis  
comestis, ex ejusdem Medici consilio, sanitatem  
consequutus est, & Medico trecentes aureos,  
pro sola mespilorum præscriptione numeravit,  
quibus solis in pristinum sanitatem fuerat resti-  
tutus. Hæc Forestus.

Verum advertendum est, ut ante mespilorum  
usum corpus ab excrementis, & oneri cacochy-  
mia liberum præstetur.

In diarrhœa inveterata sequentia utilissima  
sunt.

℞. Ras. eboris ʒij. Confect. alkerm. ʒj.  
sacchari in aqua ros. dissoluti unc. iv. Fiant ta-  
bellæ.

℞. Croci martis reverberati gr. vi. bezoard.  
minor. ʒij. Conser. ros. ʒij. spir. vitr. gut. iij.  
Misce, fiat bolus qui detur bis in die, longe a  
passu.

℞. Succu persicarum maculatz, & semper-  
vivi mai. an. ʒij. bulliant. ad tertiam partem

consumpt. & dentur mane. Certò curant quem-  
libet fluxum quantumvis inveteratum.

Mercurius diaphoreticus per aliquot dies ad  
gr. xii. exhibitus, omnes corporis impuritates  
auferit, quæ contumaces interdum alui fluxus  
parere consueverunt.

Decoctum granorum juniperi in vino para-  
tum, per triduum exhibitum multum confert.  
Tum pulvis cicadatum cum vino albo exhibi-  
tus ad drach. j. Hæc duo conferunt, materiam  
alui fluxum committentem derivando ad urinæ  
vias. Paratur autem decoctum juniperi in se-  
quentem modum.

℞. Granor. Juniperi M. j. vini rubri lb. i. si.  
Bulliant ad duarum tertiarum consumptionem;  
colaturam capiat mane per triduum.

Potus aquarum sulphurearum, totum corpus  
expurgando & ventriculum roborando, inveteratam diarrhœam curat. Cujus rei exemplum  
habetur in observationibus nostris.

Si diarrhœa fiat a catarrho, cerebro prospici-  
endum est velut parti mandanti, his remediis,  
quæ in catarrhi curatione propolita sunt. Si ve-  
ro pendeat ab hepatis, aut lienis obstructione,  
vel imbecillitate; illis affectibus mederi oportet,  
prout in peculiaribus eorum curationibus docebitur:  
tumque altringentium medicamentorum usus nullus, aut paucissimus esse  
debet. Platerus in cura hæmorrhoidum, dicit  
sanguinem calentem injectum mirabiliter alvum  
fluentem cohibere. *Leazar. Rivet. Prax. M. d. lib. 10.*

In Diarrhœa medenda cautiones fere ex dif-  
ferentis Diarrhœarum patent.

In genere enim, quando est sistenda Diar-  
rhœa; sanguinis effervescencia compescenda;  
per præcipitantia blandè adstringentia seu in-  
crassantia & anodyna.

1. His si adjungatur Sudor; curatio erit  
magis fida seu cura.

2. Evacuanda sunt excrementa occasionem  
subministrantia.

3. Roborandus est stomachus: cum in om-  
ni Diarrhœa stomachus sit labefactatus, unde  
semper attendendum est ad stomachum.

4. In Diarrhœa maligna aut Epidemicè  
grassante, sudorifera alexipharmaca blandè  
adstringentia utramque paginam facere debent.

Ea ergo quæ conveniunt in diarrhœis sunt  
imprimis tormentilla, cujus extractum, præ-  
missa, si opus est, levi purgatione absterforia,  
a ʒss ad ʒj. propinatum in conveniente venicu-  
lo, a quibusdam aliis omnibus præfertur reme-  
diis in Diarrhœa etiam Epidemicæ. Post Tor-  
mentillam convenit radix Plantaginis, it. herba  
Plantaginis & Portulacæ, uti etiam folia Myr-  
ti, flor. Balsamiorum, Lysimachiz flor. luteo &  
purpureo: fructus Myrtillorum, Mespilorum,  
Sorborum, Cydoniorum. Est species Mespili,  
quam vacant sorbum, cujus succus e succibus  
non dum perfecte maturis expressus & inspissatus,  
superio. l. anno egregie profuit. Forestus  
*lib. 2. observat. 1.* aliquoties expertus est usum  
Mespilorum in quibusdam diarrhœa continua  
laborantibus, qui aliis irritis his mespilis fue-  
runt curati. Lignum lentiscinum, s. lignum ex  
quo transudat Mastiche, ubi potest haberi mi-  
nori pretio, est admodum elegans; postmodum  
semen Portulacæ, & lil specie sophiæ Chirur-  
gotum valde commendatur. Spongia salicis ex-



siccata ad 36. data à quibuldam singulariter commendatur, hæc ipsa spongia alias commendatur ab Harthm. ad Cholera, paucorum granorum doli, si in aq. styptica propinatur. Nux Moschata & Macis communia sunt & omnibus nota contra Diarrhoeam remedia. Inter aq. appropriatas sunt imprimis, aq. Tormentill. Impatiellæ, Plantaginis & Portulacæ: Ex succis, sunt succus Cydoniorum & granatorum. Rob. & muscus prunorum sylvestrium, quod Rob. commodissime loco hypocyttidis potest substitui. Gelatina C. C. in potu ordinario dissoluta est admodum specifica in Diarrhoea in specie Epidemica grassante, Decoctum Mastichis, seu gummati ex Lentisco secretum fuit D. Osvaldi contra Diarrhoeam in aq. appropriata vel potu ordinario. Loco huius decocti quidam imprægnant aq. fumo Mastichis, scilicet accendunt Mastichen supra primas calentes, fumum excipiunt olla nova, & mox ollam fumo bene repletam implent aqua appropriatâ hoc subinde repetunt, donec subtilem Mastichis saporem acidulum aq. contraxerit, quæ est potus conveniens in Diarrhoea & Dysenteria. Ovi vitella dura aceto rosaceo irrorata & acidulata sunt experimentum Helmontii p. m. 184. §. 22. Anas aqu. Chalybeatæ. Item serum lactis chalybeatum uti & aceti n chalybeati n convenit. Decoctum granorum Juniperi laudatur à Riverio, urinam enim promovendo necessariò alvum exsiccet. Mulum Cydonium cera impletum & assatum comestumque egregiè convenit. Bolus Armena, terra sigillata, terra solar. vitriolata seu spir. vitr. irrorata insigniter convenit, cum effervescentiam Mast. long. potenter compefcet & præcipitet: Residuum ab extracto Rhabbarbari, aut etiam rhabbarbarum tollum, scopis multis satisfaciit, adstringit, acrimoniam humorum temperat, & tum temporis potenter sudorem movet. Sacchar. Saturn. a multis non incommode commendatur, ubi imprimis excrementa sunt nimis acia. Hoc multum cum croco Martis adstringente valde convenit in Diarrhoea & Dysenteria. Vel ex vitriol. Martis & Saccharo Saturn. fit Hamatites artificialis, cuius gr. x. vel xv. in aq. appropriata insigniter conducunt: Nam & ipse Hamatites naturalis ex Mart. & Saturn. vim suam habet in sistendo sanguinis fluxu & compefcendis etiam diarrhoeis. Sal prunellæ non est inconveniens ubi imprimis in febribus cum siti & ardore affligit diarrhoea. Exemplum habet Riverius de diarrhoea per urum salis prunellæ curata. *Cent. observ. 3.* Lenique præter liquorem stypticum, de quo suo loco dictum, confert opium, & utramque faciunt paginam opiata: Nam opium quoscunque motus & evacuationes corporis præter sudorem compefcit, hæmorrhagias sistit, paroxysmos febriles inhibet, vomitus sedat &c. in genere omnes humorum motus, si sint effervescentiæ, siue alii potenter compefcit, unde semper cum præcipitantibus & disphoreticis miscetur opium: propter hoc opium Theriaca tales meretur laudes contra quoscunque alvi fluxus, imprimis cholicos ita ut veteres non satis illam potuerint laudare, & ab opio vim suam habet sudoriferam. Theriaca in hoc casu siue externe applicetur umbilico, illita & regioni stomachi, siue interne à 3j. ad 3ij.

assumatur, egregiè confert. Et quidem quomagis est recens, eo potius operabitur, quoniam minus infraactæ sunt opii vires.

Myva Cydoniorum aromatica cum Theriaca mista: vel myva Cydonior. arom. ad 3j. vel 3ij. cum aliquot guttulis olei destillati Cinnamon & Macis, experimentum est sæpius probatum Lorichii in observat. quibus si addantur aliquot grana Laudani opiatum erit bolus eo magis emeas.

Quidam ℞. Bol. armen. nuc. mosch. ana miscent cum vitello ovi ad mollitiem cocto & ita absque sale sumunt quod experimentum est Stockeri in sua praxi. Quibuldam etiam cui probatissimum commendatur serum hircinum (multa sane latent in hircis) quod liquefactum cum tantillo farinæ triticeæ miscetur, ut accinitur pulmenti, quod pulmentum subinde assumptum: Laudatur insigniter contra diarrhoeam. Pro potu ordinario sit decoctum Mastiches supra dictum.

Stockerus decoquit Mastich. in aq. pluviali, quod decoctum tepide sumptum, cum certum experimentum commendat. Ellenbergius quondam Medicus Hildensis Saxo pro potu ordinario inter c. j. Cerevisiæ in qua decoxit Sacchar. alb. 5ij. & gum. Arabici 3ß. propinat.

Quando grassatur Diarrhoea Epidemica maligna, Alexipharmaca sudorifera, præprimis conveniunt quæ etiam conducunt in quacunque diarrhoea.

Sudorifera usitata satis cognita, miscenda tamen temper appropriata, cum spiritu Theriacali conjugatur spiritus Mastichis, cum terra sigillata, sal volat. viperarum & similia.

Superiori anno cum grassaretur hic Diarrhoea Epidemica non absque applausu medicorum aliquoties urum vidi egregium huius pulver. etiam ubi jam adesset Delirium.

℞. Antim. diaphor. terr. sigill. An. gr. xv. sal. volat. viper. gr. vi. pulver. nuc. moschat. gr. x. misc.

Ist pulvis pro dos. j. blandum sudorem expectando, cui interdum etiam unum alterumve gran. l. ud. opiatum additum egregiè convenit. Item mixtura hæc aliquoties feliciter successit.

A. Aqu. tormentill. 3ij. Diacord. Fracast. 3ij. extr. torment. 3j. antim. diaphor. 3ß. syrup. cydonior. 3j. misc.

Pro duabus dosibus expectetur sudor, post quamquamque dosin.

In eadem Diarrhoea maligna Gelatina C. C. semper egregium habuit effectum.

Externe contra diarrhoeam insigniter commendatur Theriaca umbilico imposita & illita, aut etiam regioni stomachi simul, siue sola, siue cum ana Ballami Peruviani miscetur, & irrosetur aliquot guttis ol. destillat. Macis, emplastrum de crusta panis malaxatum cum ol. Mastichis, similiter convenit crusta panis tosta vino austero adpersa similiter convenit quando inspergitur pulv. nucis moschatæ & applicatur stomacho. Balsamus seu linimentum factum ex ol. Macis destillato & ol. Menthe & carui destillatis & s. q. Ol. nucis moschatæ expressi, quantum sufficit scilicet pro corpore. Fiat bals. stomacho & umbilico illinendus.

Quando opus est abstersione intestinali tunc notum est, quod usitatum sit Rhabbarbarum, id-



que nunc in substantia ad 3 j. cum conserva rosarum, nunc vero totum ad 3 ij. cum pulver. nucis mosch. gr. v. vel vii. vel Syrupus rosarum solutivus propinatur in decocto hordei, cui additur 3 j. præter propter terr. sigillata.

Fit nonnunquam ut diarrhoea sint admodum diuturna, itant etiam ad aliquot annos sese extendant: in tali casu conveniant Theriaz. Sic Riverius cent. 2. obs. 47. facit mentionem alvi fluxus per octo annos durantis, qui tandem usu Thermarum fuit curatus. Quibus ipsis Theriaz etiam curatus fuit alius alvi fluxus diuturnus cum ulcere conjunctus. *Michael Etkmull. Consil. leg. pract. lib. 1.*

### Consultationes.

*De Diarrhoea, Tenesmo, & Febre absque manifestis annotationibus. Pro Illustrissimis Octavio Tridento, Nobil. Vicentino. Ad Præclariss. Viros Alexandrum Massariam, & Jacobum Torsanum.*

Agitur nunc trigessimus quartus dies, cum patiens Illustriss. post varios commissos errores in Victu, Venetiis in carnis privio cibis utis variis, piscibus, & oistreis magna copia, & liberalius bibens vina generosa, atque Veneti indulgens, redux Vicentiam, conqueri coepit de frequenti dejectione per alvum materię prædominio bilioz, cum subdominio atræ bilis, & pituitæ salis, torminibus ventris, frequenti depiciendi cupiditate, excretionem aliquando sanguinis nigricantis, & lenta febricula, cum siti, & vigiliis. Cum autem duos fere menses continuos affectum neglexisset, tandem Medicorum Præclarissimorum auxilio implorato, plures clysteres epice-rallici fuerunt illi præscripti, ex lacte caprino, saccharo rubro, ovi vitello, & sene hircino; addita refrigerantia, & humectantia, atque lenientia semel saltem fuerunt assumpta, nempe syr. ros. sol. cum decoct. pulpæ tamarindorum, superbibito sero lactis caprilli destillato. Ratione vigiliarum exhibitum Ludanum Nepenthes Quercetani, & ad extinguendam sitim, serum caprillum majori copia, non omittis epithematibus refrigerantibus jecoris fervorem. Quibus tamen frustra administratis, queritur utrum sanguis per venam sectam sit educendus, ut cessent, cum diarrhoea non excedat, adsitque dysenterię principium; & quid potro præscribendum sit pro debellando affectu præsentis.

Quibus satisfacturi, statuendum censemus adesse congeriem humorum vitiosorum in mesenterio, & intestinis, ex præterita incompositissima victus ratione, omnesque prædictos humores acrimoniam, & mordacitatem majorem ex putredine contraxisse, à qua provenit lenta febricula, vix ab Illustriss. patiente observata; & proinde non tam copia, quam mala qualitate irritari intestinorum expultricem ad eorum expulsionem unde facta aliqua ipsorum abrasione, subsecuta est dejectio sanguinis nigricantis, cum continuo egerendi conatu, ob laxiorem intestini coli, & recti, vel etiam musculi sphincteris podicis.

Quibus sic statutis, respondemus, à quacum-

que sanguinis missione desistendum esse variis ob causas. Quarum prima, quia habemus corpus cacochymum ob succos vitiosos genitos; secundo, quoniam materię peccantes sunt in primis viis, intestinis nempe, & mesenterio; quæ propterea per venæ sectionem trahi possunt in venas: tertio, quia vires non possunt non languere ob diuturnas dejectiones: quarto, quoniam præterita Venus immodica ipsas magis labefactare potuit, accedente innata Illustriss. patientis imbecillitate.

Omissa itaque sanguinis evacuatione, consului pergendum esse in refrigerantibus, divertentibus, evacuantibus, & epice-rallicis, ac somnum conciliantibus. In quem usum commendo serum lactis caprini, modò dejectorium, modò diureticum. Quod propterea exhibendum quarta quaque die depuratum ad 3 ij. cum 3 ij. syr. ros. solut. addita decoct. pulpæ tamarindorum: atque intermediis diebus præscribatur destillatum, diureticum redditum, cum emulsione 3 ij. seminum quatuor majorum frigidorum, ad 3 j. macerata in eo coma abinthii. Sic progrediendum aliquot dies, non omissis interim clysteribus, non solum epice-rallicis supra propositis, & hactenus administratis, sed etiam aliquando deterforis, cum mell. ros. simplici, & aqua hordei, succo p. n. taginis. Hisque peractis, & sublata febre, præscribi poterit aqua B Virginis aliquot dies, ad tres vel quatuor libras quolibet die, cum emulsione seminum diureticorum propositorum. Clysteres vero fiant ex lactis cocto cum terra sigillata, & bolo annena. Theriaca recens exhibeatur ad conciliandum somnum, & fluxionem sistendam.

Præscripta congrua victus ratione Viris Præclarissimis perquam notissima. *Bened. Silvati. Consil. & Responsi. Medic. Cent. 1.*

### De Alvi Fluxu. Pro Generoso Patientis.

Alvi fluxus, quo multis abhinc mensibus, & annis conflictatur generosus patiens, est fluxus materię biliosæ, viridis, nigricantis, & humoris melancholici ab hepate provehens calida intemperie donato, cum obstructionibus valde confirmatis, quarum ratione calor asciticus intensior redditus adurit humores, & fluxum rebellem efficit. Huic conjungitur excretio materię cruentæ quam ab hæmorrhoidibus potius provenire censeo, quam à superioribus partibus, cum quia sanguis est ab aliis excretis separatus, tum quia excernitur cum aliquo tenesmo, & aliquando sincerus neque est limilis loturæ carniū, prout ex hepate effundi solet.

Est quidem affectus pertingens, qui nullis hactenus remediis cedere potuit; non tamen incurabilis, si tollantur obstructiones, jecur refrigeretur, & partes affectæ corroborentur, cum præsertim facile toleretur à generoso juvene. Et quanquam annexam habeat febriculam quandam, spero tamen fore, ut sublatis obstructionibus cesset & febris.

Materię præsidiorum erunt potius Pharmaceutica, & Dietetica, quam Chirurgica, cum jam nullus fuerit ipsi sanguis semel, atq; iterum.

Inter Pharmaceutica autem tria remedio-



rum genera ex usu futura censeo. Primò quidem aliqua blanda dejectoria substringentia. In quem usum commendo syr. ros. sol. cum tamarindis, & myrobalanis chebulis. Secundo refrigerantia diuretica, & moderate aperientia. In quibus erunt serum lactis caprini destillatum, cum agrimonia, gramine, capillo veneris seminibus trigidis diureticis, & portulacula absinthii; quo utetur plures dies, præmisso bolo ex succo agrimonie concreto, ammoniaco, & succo cichorii; cui tertio, aut quarto quoque die infundetur drach. j. rhubarb. Tertium erit usus chalybis; primò quidem potabilis, cum prædicto sero caprino: deinde etiam electuarii forma, cum conserva ex capillo veneris, & nilipendula, addita portione sacchari ros. antiqui, & trochiscorum cytheos. His accedant fomenta, inunctionesque aperientes, sed temperate: ac tandem applicetur cæcatum oxycroceum Galeni.

Quibus jungetur congrua victus ratio, quæ diureticis sit permixta. Vino utatur oligophoro, & tenuis substantiæ. Et hæc agenda censeo in casu præsentis, pro salute hujus patientis. *Idem ibidem.*

*De Purulenta materia excreta per alvum, & vomitum, & ad crus decumbente. Pro Nobili Matrona Angla.*

Ex enarratis constat, Mulierem viduam, seniper infecundam, ætatis consistentis, à decennio passam esse tumorem in dextro hypochondrio, progressu temporis suppuratum, cum excretionem materiæ saniosæ, fetidæ, copiosæ fere semper per alvum quandoque etiam vomitum, & aliquando per decubitus in tibiæ. Qui tumor sæpius recruduit usque ad annum præteritum: quo tempore, loco tumoris, inanem prædictam partem percipiebat, ac deinde mensibus non liberè fluentibus, materiæ nigra, fetida, cum per os, tum per alvum cum frequenti lipothymia excreta fuit cum convulsione tandem internarum partium, seu potius motibus convulsivis, quos nunc quoque aliquando patitur, licet leviores; ut propterea de agendis consulat, potius præservationis causâ, quam curationis. Quare ut constet quid sit agendum, statuendum est, qualesnam fuerint affectus præteriti, & quæ fuerint eorum causa.

Tumorem itaque præteritum quod spectat, sicuti co-npertissimum est, fuisse apostema productum à materiâ heterogenea, pituitosa scilicet & melancholico sanguine; alioquin longè citius ad suppurationem devenisset: ita censeo, non potuisse esse apostema hepatis. Non enim mihi persuadere possum viscus illud princeps, sanguificationi dicatum tandem tumorem illum absque insigni labefactione calidi innati tolerare potuisse. Addo, quod febrem habuisset comitem, cum macie totius, & menstruorum suppressione. Neque obstat, quod hydropem ascitem passâ sit. Fieri enim potest etiam affecto jecore per congestionem partium: prout non rarò ex scirrho lienis accidit, qui non adeò facili negotio discussus esset, denique recurrisset, cum tumore partis affectæ. Propterea censeo tumorem hunc in mesenterio genitum fuisse, quod sæpius sit sentina multorum excrementorum, atque obtusi sensus

cum sit, diuturnas tolerat affectiones, & in quo non rarò suboriuntur apostemata suppurantia: qualia frequentissimè fuerunt à me observata, quæ tandem subsidebant per dejectiones purulentas, iterumque statutis temporibus recurrebant, & oblitescabant denuò per similes dejectiones, non rarò cruentas, ita ut imposuerunt quibusdam, illas pro dysentericis habentibus. Nec præter rem est hujusmodi materiam partim fuisse per vomitum excretam, facta ipsius transmissione ad ventriculum per venas lacteas, sive mesaraicas: neque quod ad crus ipsum decubuerit, cum partes omnes sibi invicem consentiant, ita, ut ego observaverim aliquando puerum Nobil. ulcere brachii laborantem, pus per alvum excrevisse, suppressa expurgatione per alvum; nec semel, sed sæpius hanc metastasin factam fuisse. Quod autem novissimè supervenerint convulsiones, non bene fluentibus mensibus, cum dejectione materiæ nigra, fetida, seculentæ, nemini mirum esse debet, cum materia illa vitiosa transmissa fuerit à natura ad intestina. Quæ propterea sicuti exhalans in cor lipothymiam induxit, ita vellicando nervosam substantiam spinalis medullæ, motus convulsivos inferre potuit, non rarò invadentes in hysterice passionibus; quemadmodum nec rarò doloribus colicis succedit paralyticis, facta metastasi materiæ peccantis. Et hæc de affectibus propositis, & ipsorum causis.

À quibus ut præservetur, insistendum est frequenti alvi subductioni, mensium revocationi, etiam per connubium, diversioni per venarum sedalium familiarem resecutionem, & emissarium aliquod infernis partibus inustum. Materias remediorum Viris doctissimis perquam notissimas data opera prætermittendas duxi, ne Minervam, quod aiunt, Athenas ducere videar. *Idem ibidem.*

*De Fluxu Hepatico. Pro Illustrissimo Barone Germano. Ad Perillustrem, & Excellentissimum Ioan. Jacobum Hartigum, Medicum.*

Illustrissimus Baro, ætatis annorum 35. temperamenti calidi, & humidi, densi habitus, à juventute in locis montosis, & asperis Germaniæ degens, quindecim abhinc annis peregrinationibus susceptis per Galliam, Hispaniam, & Italianam, promiscua victus ratione usus, sub celo modo æstuoso, modò frigidiori, & ventis opportuno, quatuordecim abhinc annis in alvi profluvium incidit, cujus causa ex Chymici consilio libiatam potionem sumpsit, à qua turbatus valde in gravia incidit symptomata, à dogmatico quidem Medico sedata, non tamen sublata omnino: quinimò sensim, & sensim adaucto fluxu, à potu gelidæ in Hispania, fructibusque nive refrigeratis, & in Germania, in Aula Cæsarea, præsertim à somno meridiano sæpius hausta aqua gelidissima ad libras duodecim Medicas, cum cinnamomo, acido citri, & saccharo, nulla succedente cæna, spatio annorum aliquot, tribus abhinc annis ita invaluit alvi fluxus, ut die, nocteque modò 7. 9. 10. modò frequentius alvum desicere cogatur. Frequentiores tamen sunt nocturnæ, quam diurnæ dejectiones.



ctiones, plurimum inconcoctæ, frequenter bili-  
tæ, & pituitæ viscosæ immixtæ, cum sanguine  
nonnunquam cum crasso, & splendido, tum a-  
quoso, loturæ carniū nuper mactatarum non  
dissimili, quas præcedit semper statum copia,  
inima ventris regione, umbilico, ac pubis osse  
circumscrip-ta, dolore acutissimo subsequente,  
qui non raro irriti deijciendi conatu tenesmus  
æmulatur. Propterea de agendis consulit.

Nos itaque illi opem allaturi determinandum  
censemus, affectum præsentem esse cum di-  
rheam, tum dysenteriam, cum aliquo tenesmi  
principio. Diarrheam quidem, ratione mate-  
riæ heterogeneæ excretæ, pituitosæ, & biliosæ,  
cujus causa est symptoma in excretis, conse-  
quens irritatam expultricem intestinorum, à  
materia cum acrimonia, tum copia peccantei  
dysenteriam quinetiam, ratione sanguinis ex-  
creti, nomine tamen dysentericæ latius usurpa-  
to, pro quacunque cruenta excretionem; non se-  
cus ac ea voce uisus est Hippoc. 4. de Articulis  
dicens: *In ossium præcisione progressu temporis expe-  
ctandas esse dysenterias.* Ubi Latinus interpres  
cruentas dejectiones reddit: & 1. de Nat. Hum.  
33. 2. in Pr. Epid. 7. & 36. 3. in 3. Epid. 7. & alibi,  
cum Gal. in com. Præsens namque affectus vera  
dysenteria dici non potest, quoniam non prove-  
nit ab intestinorum ulcere, sed potius à vitio  
cū ventriculi, tum & magis ipsius hepatis. Ven-  
triculi quidem, ubi labefactato calido innato,  
inducta est intemperies frigida & humida ab  
immodico refrigerantium ulu; ut hoc nomine  
congerantur cruditates, & concervetur copia  
pituitosæ materiæ, à qua debilitata etiam est  
retentrix intestinorum, frequentis dejectionis  
causa. In Hepate verò adest vitium duplex, u-  
trumque magni momenti, intemperies scilicet in  
excessu calida, ob quam congeritur bilis copia;  
& morbus in mala compositione, obstructio  
nempe cum in ipso, tum & in mesenterio, cujus  
causa excernitur sanguis crassus, splendor, &  
exustus, intercepta caloris ventilatione: atque  
dejectiones nocturnæ sunt frequentiores, ob  
eiusdem caloris refluxum ad interiora. His ta-  
men de causis fluxus hic propriè hepaticus non  
est dicendus, licet à morbosa jecoris affectione  
proveniat, nisi propter aquosum illum sangui-  
nem non absimilem loturæ carniū nuper ma-  
ctatarum, hoc nomine censeri debeat, cum ab  
Alex. Tralliano lib. 8. c. 3. dysenteria hepaticæ  
vocetur, à Gal. item, & aliis Medicinæ scripto-  
ribus fluxus hepaticus. De quo tamen duo quæ-  
ri possunt. Primum est, quænam pars jecoris  
potissimum afficiatur; alterum, quænam sit cau-  
sa princeps hujus dejectionis. Nec immeritò  
quæritur de parte affecta. Hepar enim constat  
ex parenchymate, & magna venarum propa-  
gine cum ex cava, tum ex porta emanantium, cum  
præsertim Gal. ipse 6. de Placitis Hipp. & Pl.  
tex. com. 14. prodiderit, dubitatum olim fuisse  
à Medicinæ scriptoribus, utrum facultatis san-  
guificatricis sedes sit in parenchymate, vel in  
venoso genere. Quod dubium adhuc viget,  
siquidem Vesalius, & tum eo Laurentius Joubertus in Paradoxis, existimant sanguificatio-  
nem fieri à venis, non à parenchymate; quod  
pluribus rationibus confirmant: duabus potis-  
simum. Quarum prima est, quoniam actio fit  
per contactum; chylus autem tangit venas, non

parenchyma, Secunda, quia omnis actio fit à  
calido innato validiori: sed validius est cali-  
dum innatum in venis, quæ sunt spermaticæ,  
quam in parenchymate, quod est substantiæ  
sanguineæ. Cui venoso generi sanguificatricem  
facultatem adscripsit etiam Gal. 1. de Nat. Fa-  
cult. 5. dum eandem facultatem tribuit venis in  
sanguificatione, quam cordi in generatione spi-  
ritus vitalis, & cerebro in spiritu animali. Ar-  
genterius contrario tueretur parenchyma esse  
partem principem sanguificatricis facultatis.  
Cujus opinioni ego quoque subscribendum cen-  
seo, his argumentis adductus. Quælibet partis  
actio fieri debet à proprietate substantiæ ejus,  
cujus est actio. Sed nulla est pars in toto cor-  
pore, quæ habeat substantiam similem magis  
sanguini, parenchymate. Ergo sanguificatio fit  
à parenchymate. Addamus, quod sanguificatio  
est chyli concoctio. Sed concoctio est muta-  
tio ejus quod concoquitur in naturam eoquen-  
tis: sed sic est, quod chylus, dum in jecore  
concoquitur, convertitur in substantiam simi-  
lem parenchymati, temperie, colore, & modo  
substantiæ. Ergo sanguificatio fit à parenchy-  
mate. Accedit, quod eadem ratio arteriarum  
ac nervorum, quæ est venarum. Sed arteriæ non  
generant spiritus vitales, neque nervi animales,  
sed devehunt tantummodo. Ergo & venæ non  
generabunt sanguinem ex Gal. de Plac. Hipp. &  
Platon. lib. 6. c. 14. Præterea sanguificatio fit à  
calore temperato. Sed venæ sunt frigidi tem-  
peramenti, languet enim in ipsis candum in-  
natum. Ergo non possunt sanguinem produ-  
cere. Non tamen neganda est aliqua præparatio  
in venis, non secus ac in ore fit ciborum. Quod  
innuit Gal. cum asserit in venis fieri sanguifi-  
cationem. Quod autem fiat actio per contactum,  
id fit immediatè, vel mediatè. Propterea  
concludendum est, parenchyma jecoris esse  
partem principem, cui demandata est sanguifi-  
catio: ac propterea cum in casu præsentis hæc  
læsa sit, pars potissimum affecta est jecur, & pa-  
renchyma ipsius.

Causa effectrix ratione statuum, & pituitosæ  
materiæ, est intemperies frigida & humida  
ventriculi, contracta ex potulentis, fructibus  
frigidis, & nive refrigeratis; ratione vero ma-  
teriæ biliosæ, est intemperies calida jecoris,  
cum materia obstructionum causa, unde sanguis  
ille crassus, & splendor: ratione autem san-  
guinis aquosi, est imbecillitas calidi innati ip-  
tius, cujus ratione Aëtius Tetrab. 3. Derm. 2. c. 1.  
egit de fluxu hepatico in Capite de Imbecillita-  
te hepatis. Alex. Trallianus ubi de imbecillita-  
te hepatis l. 8. c. 3. inscripsit Caput illud de Dy-  
senteria Hepatica; & Gal. passim patientes istos  
hepaticos vocavit 5. de Loc. Aff. 7. 8. de Comp.  
per Loca. 3. de Causis sympr. & alibi. Imbe-  
cillitas autem hæc potest esse cum qualibet ex-  
cedente intemperie. Propterea mirum non est,  
quod intemperiei calidæ bilem generanti acce-  
dat imbecillitas calidi innati non perfectè con-  
coquentis, aquosumque sanguinem genera-  
tis: cui tandem jungitur dolor in imo ventre, &  
conatus irritus deijciendi, sive tenesmus. Hu-  
mores namque acres cum biliosi, tum pituitosi  
falsi dum deijciuntur, in effluxu expultricem ir-  
ritant. Et hæc de essentia, & causis præsentis  
affectus.



Qui quidem est maximi momenti: quoniam facillere potest in hienteriam, ratione continuæ dejectionis; & in hydropem, ratione imbecillitatis calidi innati.

Attamen cum vires consent in Illustriss. patiente, insillendum est Medicis præsidis divergentibus, præparantibus, purgantibus, & corroborantibus.

Pro diversione probantur frictions totius corporis, cucurbitulæ non scarificatæ pluribus partibus appositæ, & cauteria in utroque brachio; non ommissa parca sanguinis detractio ex salvatella dextra pro revulsionem, & ratione caloris excedentis.

Præparentur humores cum cichoraceis, capillo veneris, pentaphyllo, absinthio, & mentha. Purgentur deinde rhap. immaturo, & saccharo ros. solutivo, parato scilicet ex ros. Persicis, & decoct. corticum myrobalanorum chebulorum. Mox repetantur præparantia magis aperientia, & diuretica, cujusmodi erant radices toriculi, petroselini, agrimonie, cortices radicis cappari, cum seminibus anisi, feniculis, & coriandri præparati, mentha, & absinthio, bolo præmisso ex succo absinthii concreto, trochisci de rhabarbaro, & hepate lupi præparato. Repetita purgatione cum eodem rhabarbaro torrefacto, mixto cum saccharo ros. antiquo ex ros. Damascenis. Hisque peractis, præscribendum erit decoctum ex cassiafras, ligno rhodio, & lentisco, cum seminibus anisi, clauis, & radicibus diureticis feniculi, asparagi: addito semper absinthio, & succo cichorii depurato, parato in iure galli junioris, præmisso bolo ex terebinthina cypria, mastiche, & trochiscis cypheos: atque blando sudore excitato cum pane nuper ex furno extracto, & linteo involuto, diversis corporis partibus admoto, vel cum doholis aqua sudorifica repletis. Horis vespertinis exhiberi potest tinctura rosarum extracta cum spiritu vitrioli in aqua cichorii, & mentha. Aquæ quinetiam Thermales moderatè calidæ potui datæ conferent: non ommissis aliquando clysteribus ex lacte chalybeato, cum sacch. rubro sevo hircino, ratione tenesmi, Extrinsecus usui erit stillicidium ventriculo, ex oleo mastichino, absinthite, de mentha, & communi, cum schoenantho, calamenthio, & vino Cretico. Inunctio totius corporis oleo chamæmelino, amygdalino, Jecori ceratum oxycroceum; non omisso usu sacchari ros. antiqui, cum terra sigillata; & si patientis ad vomitum proclivis fuerit, blanda vomitoria: non tamen laxantia conferent.

Victus præscribatur facilis coctionis, & boni nutrimenti, sumpto in prima mensa diacydonio, parum & sæpè nutriendo, & vinum rubrum subastringens potui exhibendo, cum mediocri exercitio, & somno. *Idem ibidem.*

*De Puris excretionep per Alvum ex ulcere brachii, cum perforatione intestini cicatrice obducta. Pro Illustr. Pucro septenni Superantio.*

Rarus affectus, nec minus cognitu, quàm curatu difficilis nobis occurrit expendendus, & profligandus, cujus hæc est historia. Illustriss. & Nobiliss. pucro Superantio, annos nato septem circiter, temperamenti calidi, ad siccum vergentis, ex confluxu materiz, ob contusionem

forfitan, accrevit abscessus in sinistro brachio propè cubicum, cui suppurato, & disrupto, succellit in dicta parte ulcus altum, sinuosum, cacothæ, cum affluxu materiz, ex quo mensis spatio circiter magna saniei copia emanavit: mox cessante fere omnino fluxione, observatum fuit quod per alvum excernebatur cum fecibus aliqua puris copia; ac deinde palam factum, quod quamdiu pure, & sanie manabat ulcus, illis non inquinabantur alvi feces, & vicissim, dum per alvum excernebatur, brachii ulcus illis vacabat: & quod mirum, patuit nobis parvum apostema in umbilico, ex quo disrupto non solum pus effluxit, sed & cum eo granum passularum, & medius nucleus piceus, quæ assumpserat, indicio manifestissimo intestini perforati, cum alioquin assumpta per umbilicum erumpere non potuerint. Atque adeo duos observavimus affectus maximi momenti, metastasin scilicet puris à brachio ad intestina, & ab intestinis ad brachium; inter quas tamen partes consensus non ita patet. Quinimo sæpius a Gal. proditum, quæ sunt in thorace, & partibus supra septum transversum, expurgari per urinam; quæ vero infra septum transversum, per alvum: ut propterea longè minus per alvum expurgari possint humores, qui sunt in brachiis. Alter affectus est intestinorum perforatio, quem statuit Hipp. esse non solum incurabilem, sed lethalem 6. Aphor. 18. his verbis: *Pertusa, perfectave vesica, cerebro, corde, septo transverso, tenui quopiam intestino, ventriculo, jecore, lethale est.* Effluxus autem assumptorum per umbilicum prodit intestini tenuis perforationem, ac promove affectum lethalem. Convaluit nihilominus Illustrissimus patient, & sanus degit, excepta brachii contractione, seu convulsione ad interiora etiamnum perdurante: cum inculpatissima alioquin corporis valetudine utatur triginta quatuor, & quod excedit annis ab affectu proposito.

Cum itaque de transmissione prædicta à brachio ad alvum, & ab alvo ad brachium nulla sit difficultas. Oculata enim fide id testari possum, quam confirmare possem testimonio Præclarissimi, & celeberrimi Anatomici, Hieronymi Fabricii ab Aquapendente, Equitis, si esset in vivis; cum præsertim in promptu sint historiae hujusmodi transmissionis apud Ambrosium Pareum 10. lib. suæ magnæ Chirurgiæ c. 11. & lib. 16. ejusdem operis c. 49. ubi refert se vidisse expurgatam saniem cum ex dextro, tum ex sinistro brachio, non solum per alvum, sed etiam per urinam. Difficultatis caput situm est in assignando ductu, per quem à brachio ad intestina transmitti, & confluere possit materia purulenta. Qua tamen in re, missa ex aliorum sententia generica illa via, quod sc. totum corpus sit transpirabile, & sit consensus unus, conspiratio una, & convenientia omnia, ex Hippoc. ceniteo ego, quod per venam axillarem à brachiis transmitti possit materia ad venas thoracicas ejusdem litteris, & ab iis per ramos venæ cum quibus conjunguntur, ad hepat, à quo per anastomosis venæ portæ cum cavæ ramis, facilis via postmodum ad intestina confluat. Et sanè, si à surditate diarrhoea superveniens eam tollit, ex Hip. dummodo sit recens, addit Gal. in com. Aph. 19. 4. particulæ per evacuationem scilicet biliosæ



biliosæ materię surditatem inducentis; quid prohibet, quominus transmittatur ab expultrice brachii ad venas prædictas, & expurgetur per alvum. Quinimo Patzûs l.c. refert historiam cujusdam, qui per evacuationem purulentæ materię à brachio per alvum, & urinam, sanatus fuit absque localibus parti affectæ applicitis. Alterius enim loci loca recipientia, aut pondere, aut alio aliquo liberant; ex divini Hipp. oraculo 3. in 6. Epid. 3. his verbis: Cum intestinum in dextra parte, arthriticus fiebat, & quietior, postquam autem curabatur, dolentior. Vena autem azygos duplicem consensum habet cum venis thoracis, ut observat Fallopius, & confirmat Andreas Laurentius celebres Anatomici; prior est cum thoracis vena; quæ ab axillari propagantur, unde inquirunt, in pleuritide venæ ejusdem lateris sectio maxime confert: altera est cum emulgente, per ramulum, à quo puris in thorace collecti sit expurgatio per urinam. His sic suppositis, statuimus, a venis brachii, quæ sunt propagines venæ axillaris, ad thoracicas, indeque ad  $\alpha\alpha$ , ab illa ad hepaticam, ab hoc postmodum ad venam portæ, & intestina confluisse materiam, quæ per alvum postmodum expurgabatur. Quod autem cicatrice obductum, & sanatum ulcus intestini, mirum non est, cum quia puerilis ætas, in qua plurimum est calidi innati, superat gravissimos affectus, tum etiam, quia morbus erat in principio, nec adeo gravis. Hippocratis enim sententia tunc tantum obtinet, cum insignis est perforatio, ut notat Gal. in comm.

Quare præmissa blanda corporis purgatione, solo decocto ex radice chinæ, verbenæ, serpentariæ, consolidæ, & cichorio, cum carne pulli; & extrinsecus cum aquis thermalibus Montis Ægrotorum, injectis per siphonem in sinum ulceris, modo cum melle rosæ, modo cum pulveribus sarcoticis, & immersione cum brachii, tum inferioris ventris in iisdem aquis, præscripta congrua victus ratione, patientem illustri pristinae sanitati restituiamus: quam eidem nunc Senatori Excellent. à præpotente Deo longævam enixè precamur. *Idem ibidem.*

*De Diarrhœa, & mensium suppressione, cum corporis Macie. Pro Nobili & lectissima Juvene.*

De duobus potissimum affectibus conqueri video lectissimam juvenem, de alvi fluxu videlicet, & mensium suppressione, ut optime observatum est à Viro Excellent. Alvi autem fluxum provenire ab intemperie frigida, & humida ventriculi compertissimum esse censeo, cum ex affectu simili præterito ante aliquot annos, tum ex diuturnitate ipsius, tempore excretionis, hora scilicet concoctionis, qualitate excretorum, necnon & ex flatuum copia. De mensium autem suppressione non ita constat utrum dependeat ab obstructionibus venarum uteri, vel ex defectu sanguinis ad eum non confluentis. Quoties enim cumque non sit bona concoctio, nec fieri potest copiosa sanguinis generatio, prout forsitan accidit in casu præsentis, in quo affligit diarrhœa decem abhinc mensibus, ac propterea sanguis copiosus adeo congeri non potest, ut & putriat, & statutis mensibus expurgetur, hinc-

que sit quod patiens ipsa in dies macrescat. Neque obstat quod intumescant venæ sedales. Frequens etenim dejectio causa est renescendi, venarumque illarum turgentiæ; cum aliqua sanguinis excretionem. Propterea exilimarem ego mensium suppressionem provenire potius à defectu sanguinis & à derivatione humorum ad alvum, quam ab obstructionibus. Rarò namque accidit, ut natura consuetæ obeat munia alio distracta.

Utcunque sit; spero menses liberè fluxuros curata diarrhœa. Quod fiet contemperata ventriculi intemperie calidioris, & exsiccantibus; necnon & humores alio divertentibus; & præsertim ad vias urinæ.

Quod ut obtineatur, summa cùm ratione præmissa fuit diligens corporis purgatio, exhibita; item aqua Teturtiana necnon & præscriptum decoctum ex radice chinæ, & cassiæ, addito lentisco, ratione ventriculi, & diureticis præscriptis paratum, cum columba turricola; cui præmitti poterit drachm. 1. Terebinthinæ Cypriæ: in cuius usu persistet viginti dies, semel in die matutinis horis: vespertinis verò; hora ante cenam assumet unc. 1. Conservæ ex ablinthio umbellifero: cum drachm. 1. Boracis mineralis: non omisis externis topicis. Ratione ventriculi duo remedia erunt valde accommodata, stillicidium scilicet ex oleis mastichino, ablinthite, cydoniorum, rutæ, & nardino, decoctis cum vino Cretico ad consumptionem vini, addita infusione Ischenanthi, spicæ, & ligni Aloës, cuius usum continuabit 15. dies quotidie, horam circiter, superposito deinde cerato ex mastiche, caragna, & tacamahaca. Aliud erit punctiones ventriculo singulis diebus admittistratæ manè & vespere hora semis ante cibum, applicando picem navalem obductam corio, quæ vi removebitur, totiesque applicabitur, dum rubor excitetur in cute: tunc enim statim superiedendum erit illius usu; quò calor ad ventriculum attractus cum sanguine, retentricem, & concoctricem facultatem corroboraret. Cum primum autem remiserit diarrhœa, revocandæ erunt menstruæ purgationes infusu in aquis thermalibus sulphureis, quibus deficientibus, lixivium ex usu erit, paratum ex cinere ficus, & sabiæ, alteratum scordio, dictamino, matricaria, artemisia, pulegio, & sabina, immissa cannula pertusa in sinum muliebrem: factaque deinde inunctione oleo liliorum, laurino, & rutaceo, cum modico moscho, & ambra.

Cibus sit facilis coctionis, parum & sæpè exhibitus, præmissis semper diacydonio cum pipere, non liquidus; & potus sit vini modicè generosi, rubri, subaltringentis. Atque hæc in præsentia præscribenda erunt, abstinendo ab omnibus fructibus, præter mala cydonia. Quod si his non cesserit affectus, autumno parandum erit vinum medicatum, ex ligno Indico, lentisco, ablinthio, & roremarino, quò tota hyeme utetur in prandio, & cœna. *Idem ibidem.*

*Lienteria cum Atrophia, & Cachexia principio.*

Puella morigera, æque supra ætatem modesta, ac prudens, animique fortitudine in ærumnosa sua valetudine prædita, annorum octo cum dimidio, ab exortu delicatula, mollis habitus,



gracillimi, atque raræ texturæ, coloris albicantis, rubentis in genis, Jecoris prædidi, frigidi vero ventriculi, anno elapso, a quo exordium sumplere ejus morbi, post piscium usum à prægreisa quadragesimali observantia, a domesticis male se habere observata fuit, sæpiusque quam par foret, alvum deponere. Cum tandem circa medietatem Veris, variolis, quas alias imminue passa fuerat, leviter iterum tentata est, ac insuper post ipsas Ophthalmia laboravit; quibus cum ab aditu Medico prospiceretur, assumpto Magisterio mechoac. successit contumax alvi fluor, etiam nunc perdurans, tribus quandoque horis, & plus distans à cibo, quandoque ab eo statim juxta esculentorum crasim, dejectionesq; sæpius noctu, quam diu affligunt, absque tamen intestinorum dolore, licet quandoque tormina adfuerint. Rugitus in intestinis & murmura tunc maxime adsunt, cum alvi fluor excitatur. Depositiones modo rariores, modo frequentiores nunt, ad quatuor vel quinque ut plurimum vices, quandoque verò ad octo vel decem. Excreta ab eo tempore, à quo Curationem suscepi, albicantia, maxime foetida, quoquo facto spumosa, semper liquida atque serosa conspexi, licet quatuor tantum vel quinque vicibus compactioris consistentiæ extiterint per totum morbi decursum. Quibus tandem commisceri inceperunt alimenta nihil prorsus mutata; macie interim ac totius corporis pallore insuper additis, una cum pedum intumescencia. Venter inferior tumidus, tensus est, ad instar tympani resonans. Dolores vagi puellam quandoque torserunt, modo in hypochondriis, modo in artubus inferioribus, modo in mandibulis. Quibus ærumnis inseparabilis febricula juncta est, cum pullu celeri, duriusculo, caloreque arteriarum post cibum tribus circiter horis magis se exerente: Uique adhuc attamen aliquam duplicis tertianæ ideam servasse conjeci, cum magis una die, quam altera febre videatur, incipiente quinetiam febre, vel cum rigore, vel cum levi refrigeratione, quod à principio usque adhuc rimatus sum. Quæ cuncta comitatur omnimoda ciborum abominatio, cum appetitus penitus exoleverit, succedente ab assumpto cibo frequenter vomitu. Non sitit. Ægrotæ, satis dormit. Pro quibus varia præsidia tentata sunt, sed incassum omnia. Quare abs Tripode petimus meliora ac selectiora pro singulari vestra humanitate in Puellæ salutem, dum interim ego Virtutis vestræ immortalis æternum memor, obsequentissimus mandata expectabo.

Quamvis deploratos attingendos non esse, sed hunc morbi tantummodo prænunciandum, consuluerit Gal. nihilominus humanitas & Christiana pietas monet & præcipit, miseros Ægros à nobis nunquam deferendos esse, nec implorantibus deneganda remedia; quod idem iuvare voluit Divinus Senex, dum dicebat, se observasse quod multi præter spem sanati fuerint. Nobilis igitur Puella quæ in infantia pravo lacte nutrita fuit, & ideo non adeo bonum habitum comparavit, mox ex alimentis pravi succi anno elapso, quadragesimali tempore obstructions contraxit, in præsens multis torquetur malis, unumquodque quorum difficilem Curationem admitteret, quæ difficultatem quo-

que adaugent, quia ultro nimis progressa sunt: fluxus enim alvi, qui Diarrhœæ intestinalis nomine ab initio appellari poterat propter obstructions à cruditatibus in vasis tum mesentericis, tum lacteis acervatis contractas, aucta intemperie frigida & humida, & ut dicebat Avic. refrigerato calido. tractoque in consensum ventriculo, Cœliaci affectus nomen acquisivit, qui progressu ad hentericum fluxum pervenit, dum ab innati caloris paupertate, laxatis etiam antea ab humiditatibus ventriculi & intestinorum fibris, ut contigit Thasiis, retentrix facultas in eo imbecillis reddita fuit, ut cibum sustinere tanto tempore nequirit, quo concoctrix (& ipsa debilis) eosdem conficere, imò vel permutare posset: & ideo sicut olim alimenta corrupta, in cruditates aliosque humores conversa, excreta conspiciebantur, tum propter improporcionata objecta, ita subinde adauctis obstructionibus, validiori reddita intemperie frigida & humida intestinorum, ventriculi de pauperato nativo calore, non solum ab ipsa intemperie, sed etiam ab humidi defectu, facultates inservientes imbeciliores semper factæ fuerunt, & ideo subversa naturali œconomia, nec retineri, nec concoqui, nec permeare potuerunt alimenta ad jecur ipsum pro hamatosi, ad totum corpus nutriendum: unde necessario accessit Atrophia, Tabi proxima, non sine Cachexiæ principio, ob alimenti defectum atque depravationem. Quos affectus acceleravit & fovit quoque febris, non solum à fermentatis cruditatibus, verum & à quotidiana alimentorum corruptione proveniens. Nec mirum ex cruditatibus flatuositates elevari, & ex imperfecta hamatosi serositates generari, quæ huc & illuc divagantes, dolores in variis corporis partibus excitaverint & excitent.

His ita habentibus, spes in angusto posita est, evidens autem interitus periculum: Tabida namque febris & Hydrops præforibus sunt. Minuunt insuper salutis spem auxilia medica selectiora, congruo ordine & propriis intentionibus hucusque administrata ut propterea ad aliud transeundum non esse videretur; nihilominus quid, meo judicio, in hujusmodi status angustia faciendum sit, paucis exponam: rectum usum Præclariss. Viro Abstanti committens.

Ordo medendi legitimus exposulat, ut expeditis primis viis, referentur obstructions, mox ventriculi & intestinorum humida intemperies corrigatur. Tertiò Calor nativus ventriculi & aliarum infernarum partium refocilletur, & febrilis remittatur. Quartò ut fibrarum laxitas exiccetur & roboretur; atque tandem totum corpus emaciatum renutriatur.

Quibus intentionibus satisfaciendis, Chirurgica remedia locum non habent; & prima paucis valde Pharmaceuticis eget, siquidem lubrica nimis sunt redditæ viæ, & ad evacuationem paratæ; nihilominus decoctio pulpæ Tamarindorum cum tribus uncis syrup. ros. solut. sufficiens esse poterit ad primas vias expediendas.

Secunda intentio esse deberet obstructionum referatio; verum quia jam confirmatæ sunt, & urget nativi caloris defectus: ideo ne dum Romæ consulitur, Saguntum expugnetur, ordine regulari relicto, urgentiori incumbendum venit,



venit, umirum ventriculi & Intestinatorum nativo calori, fovendo, & laxatas fibras exiccando atque roborando, ut poltea, si dabit Deus, reliquis intentionibus satisfieri possit. Itaque pro fovendo ventriculi & intestinatorum nativo calore, necnon ut laxatæ fibræ roborentur, multa, & varia à Medicinæ scriptoribus proponuntur; sed mihi magnopere arridet hujusmodi compositio.

℞. Conservæ rosarum antiq. pulpæ Cydoniorum elixæ, an. ʒij. Conservæ ablinth. Pon. ʒj. Mithridati opt. ʒj. pulv. membranæ internæ ventriculorum gallinarum ʒij. Specierum Diarrhod. Abb. aromatici ros. an. ʒss. tincturæ coral. chym. gutt. xii. m. reformetur electuarium, ad ʒss. quotidie summo mane assumendum; Vesperti vero hora una ante cenam præbeatur bolus ex pulveribus ita paratus

℞. Pulv. Margaritarum præparat. mastiches electi, Specierum Diarrhod. Abb. an. ʒj. m. & cum vino malvatico reform. boli ii. v. quorum unus singula vice offeratur. Extrinsecus verò emplastrum ex fermento, ab Amato Lusitano descriptum, ventriculo apponatur; & interim reliquis intentionibus quoque satisfaciendum decoctione exigui Rhapontici in jure carniū, quo edulia præparantur: non enim ad majora Aperientia deveniri posse censeo, cui china opt. incisæ taleolæ tres aut quatuor addi poterunt. In his per aliquot dies pergendum erit, & observandum num lactis usus locum habere possit, quod sit, aut muliebre è mammis multum, aut caprinum chalybeatum, sine saccharo & guttulis aquæ cinnam. aspersum. Sicut interim chalybeatum quoque serum destill. pro febrili calore remittendo idoneum Alterans esse poterit.

His omnibus congrua erit addenda victus ratio, ab Excellent. Viro præscribenda, ita ut parum & sæpe nutriatur, ut in imbecillo calore cum Hippoc. notat Galenus, & alimenta sint optimi succi, facili coctionis atque distributionis; sic nonnunquam parentur panatellæ cum emulsionem pistaciorum & nucleorum, nec vinum, paucum, tenue & oligophorum denegetur, china opt. medicatum, sed nullo modo aqua dilutum; interdum etiam ossa panis vino aliquo aromatico, non dulci, imbuta permittatur. Quæ in hoc præcipiti casu contraindicationibus referto, à me proposita, faxit Deus, ut proficiant & salutaria evadant. *Raym. Job. Foru Consult. & Respons. Medicin. Tom. 1. Cens. 3.*

#### Celiaca Passio.

Reverendiss. Pater sexagesimum secundum annum agens, temperamenti totius calidi & humidum, calidioris pectoris, habitus naturaliter carnosum, ingenio ac doctrina clarus, ac inter rariores suæ societatis mentes ad efformandum sereniss. Ducis animum maximo jure delectus; mense Julio præteriti anni, post vini nive refrigerati, & fortasse etiam fructuum usum, incidit in alvi fluxum, copiosum adeo, ut decies aut duodecies quotidie dejiceret materiam subalbidam ut plurimum, & veluti cinerei coloris, aliquando vero subrubeam, sed ad pallidam magis vergentem, & loturis carniū non abstermitem, viscidisque mucositatibus permixtam, cæterum nulla acrimonia, nullo calore, nullo

unquam dolore molestam, quamvis etiam flatu non exigua copia producerentur. Quare Pat. Reverendissimus malum hujusmodi nihili faciens, reliquum ætatis, integrum Autumnum, & fere totam hyemem faciei colore ac viribus immutatis, sollicitaque vigente appetentia, ac propterea nullis tentatis remediis, hoc statu transegit. At tandem Februario mense appetentia ac vires dejici cœperunt, nocturnus somnus imminui, adeoque Patiens qui parcissimo interim utebatur cibo, gracilescere, ut Aprilis initio ingens macies totum corpus, & ventrem potissimum occupaverit. Quamobrem cum fluxus adhuc perdurans, sexies aut septies quotidie repeteret, coactus denique ad medicæ præsidia confugit, atque adeo evacuatione per alvum, iteratis medicamentis, & sanguinis missione, salvatella soluta, totius corporis expulso procurata fuit. Aqua etiam Tettuciana, nisi semel exhibita ingentes cruciatus attulisset, iterum ac tertia repetita esset. Decoctum ex china & carne viperina, cum stomachi fomentis & illitionibus, vinum absinthio medicatum, pulvisque viperinus, qui in præsentiarum etiam in usu est parum profuere: namque alvus materiam ejusdem naturæ quinquies quotidie adhuc deponit: nec unquam naturales egerit fæces, nisi ope pilularum ex Aloë, quæ octavo quoque die assumptæ, consistentium excrementorum non mediocrem copiam extrudunt. In hypochondriis non semel exploratis, nulla tensio, nullæ unquam obstructions deprehensæ. Modo Pat. Reverendissimus ruri degit, ubi si apparentia ac somnus considerentur, melius nonnihil habere videtur; cæterum fluxui supra omnium medicamentorum hæcenus exhibitorum vim contumaci auxilium quaerit.

Quoniam quandoque contingit ut homines à quam plurimis malis præserventur, supervenientibus Diarrhœis, quarum ope natura ab excrementis exoneratur, hinc fit ut sæpe sæpius eisdem permittant, non incipientes solum, verum & diutius perseverantes, licet decipiantur, cum quandoque Dysenterix succedere soleant à Diarrhœis biliolis & excrementis, quandoque virium defectus & totius corporis macies ab iisdem chylosis & alimentalibus existentibus, in quo postremo casu est quoque deceptus Reverendissimus Patiens, qui ab annua Diarrhœa detentus, nec ab initio, nec in progressu ullam noxam, sive dolorem percepit, utpote à chylosa & benigna materia excitata, non quidem per Dyspepsiam, sed potius per Bradypepsiam producta, & ideo nullus morsus, sed tantum chylosæ materiæ crudæ, subalbida & cinerici coloris, non autem flavæ, licet tandem quandoque etiam rubescentis coloris, mucosæ quandoque, nonnunquam aquosæ, & aliquando masticatæ carnis formam representantis fluxus, ex quibus Celiacam passionem adfuisse & adesse credo, hepate quoque tandem nonnihil ad imbecillitatem deducto.

Quoniam veto hæc fieri potest, vel frustrata coctione, vel distributione impedita, ideo de causa dubitari poterat; ego tamen utramque conspirasse existimo, & primò cruditates ex concoctione imminuta, cum in hac senili



estate potibus nive refrigeratis fuerit usus, & facile fructibus aliisque hujuscemodi alimentis impropriis: a cruditatibus autem non lactreas tantum venas, verum & magnæ ex parte mesentericas obstruatas fuisse censeo, unde paucis post diebus chylosæ materiæ in ventriculo satis elaboratæ, editus & transitus fuerit interceptus, quæ in intestinis inutiliter commorans, ad alvum deponeretur, tum naturaliter venas jam dictas pervadere debuerat, & perfectiorem acquirere, quousque ad hepatis, ut in sanguinem verteretur, pervenisset pro totius corporis nutritione, exigua excepta tenuiori & puriori earundem portione, quæ per lactreas ad ductum thoracicum ferri, & inde per venas jugulares ad cor deferri solet; cujus veritatis testimonium præbent fæces consistentes, quæ à medicamento exhibitæ, ab Aloë scilicet figuratæ excretæ videntur, primæ concoctionis sat bene celebratæ signum: etenim si fluxus iste à soluta imminuta concoctione procederet, fæces consistentes à chylosa materia non adeo bene segregarentur, sed confusa cum eadem, liquidæ per alvum educerentur, & ideo Chylo licet sat bene concocto, ab obstructionibus transitum interceptum fuisse certo credendum. Verum cum causa hujusmodi medicamentis nunquam ablata, sed imminuta coctioni tantum provisum fuerit, hinc factum est ut non solum fluxus iste ob impeditam distributionem perseveravit, verum & imbecillitatem, tum ventriculi, tum intestinorum pro altera causa acquisiverit, quæ licet ab initio Diarrhœæ prima causa fuerit, cessasset tamen, & cito, si aperientibus auxiliis viæ referata fuissent; licet non sit negandum quod tanto tempore affectus iste perdurans, non intra solius cohiæ passionis limites sese continuisset, sed ad Lienariam quoque pervenisset, sique non solum cruditas, sed celeritas quoque excretionis addita esset, nisi medicamenta corroborantia, & calorem nativum foventia administrata fuissent; sicut in posterum de hepatis imbecillitate & fluxu hepatico superventuro jure merito dubitari posset.

Quare ut & imminens intestinorum laxitas & hepaticus fluxus præcaveantur, & Atrophia potius, quam Hydrops arceatur, omni industria hujus affectus confirmati Curatio, licet difficilis, est aggredienda. Primò, primas vias caute mundando. Secundò Aperientibus venas expediendo. Tertiò Ventriculo & intestinis robur aliquod addendo; atque tandem, si fuerit opus, jecur quoque corroborando.

Pro quibus explendis intentionibus, non est quod de remediis Chirurgicis loquamur.

Ad Pharmaceutica itaque deveniendum, & exiguo flore cassiæ & lenitivo cum Aloë primæ viæ sunt expiandæ. Inde per quinque dies earundem deterfio procuranda, exhibita multa, exiguo aceto, ad incisionem; acetosa reddita, & corticibus citri rec. atque frustulo cinnam. aromatizata, & ad cyathum summo mane propinata. Inde idem superscriptum medicamentum repetendum, ut ad Deobstruentia deveniatur, quæ potius liquida, ut facilius confirmatas obstructions pervadere possint, quam solida sunt præbenda. Sic præstantissima erit rhabarbari infusio ad ʒj. per noctem, in cyatho,

ex aqua stillat. de succo cichor. & agrim. parato, summo mane exhibendo. Die vero sequenti tandem aquam assumat Reverend. Pat. in qua gr. xii. salistart. volatiliz. sint dissoluta. Tercio vero die repetatur rhab. infusio, & ita alternatim perseveret, infusionem & tartari saleem assumendo ad xx. dies, & amplius, si res pro voto succedat, ita ut egerendi vices diminuuntur, & si ateria quoque exeuntis qualitas in meliorem mutetur; sin minus, aperiendi provincia deferenda non est, sed deobstruente erit utendum, ita concinnato

℞. Fol. cichor. iutybi, borag. agrim. pentaph. sonchi, cuscutz. an. manip. ij. radic. petroselin. asparag. gram. sceniculi, sem. melon. an. ʒij. rad. liquiritia ʒj. sem. apij, dauci an. ʒij. Aq. Noct. lib. xx. incid. contund. & m. macerentur B. M. ad duos dies, deinde fiat torcularis expressio. Expressioni vero adde secunda vice jam dicta nova ingredientia, & iterum macerentur ad duos alios dies, deinde fiat rursus torcularis expressio: mox calementur fæces omnes, & cineres reponantur in lato colatorio, quibus ter vel quater superaffundatur tota jam dicta expressio fervens, ut à cineribus extrahatur sol, & fiat lixivium. Tandem reponatur idem lixivium in vase vitreo, & B. M. destilletur, ut aqua ad usum servetur. Infundo vero colligatur butyrum live Extractum, quod pariter ad usum servandum.

℥. Igitur jam dictæ aquæ ʒvii. spirit. tart. ter rectit. gutt. xii. m. pro una vice, & sic quotidie pro anni; cui potioni præmittatur bolus ex semidrachma jam dicti Extracti paratus, & auretur. In horum autem usu insistendum vel usque ad n.ensem, si opus fuerit, singula hebdomada fæces educendo pilula, ex ʒj. vel ʒss. de tribus cum rhabarb. parata.

Expeditis viis, difficile non erit ventriculo & intestinis aliquam roborationem addere, si prima mensa tria grana malliches integra devorentur, si in cœna sal absinthij ad ʒj. pariter prima mensa in exiguo generoso vino assumatur, si vinum pro mensa consuetum lentisco & exiguo ligno sassafras alteretur, adeo ut unamquamque situlam vini lentisci & Chio incisi unc. ij. & sassafras unc. ʒ. ingredientur, quæ omnino ad hepatis roborationem conducere quoque poterunt; sed ut aliquid quoque peculiare eidem tribuamus, poterit parari bolus ita

℥. Confectionis Alchermes ʒj. pulv. hepatis lupi ʒss. salis absinth. ʒj. m. reform. boli iij. & aur. tribus vicibus assumendi, quibus superbibat haustum vini absinthij; addi quoque poterit bolis jam dictis semidrachma theriacæ, ambientis fervore remisso.

Quibus omnibus congrua atque diligens victus ratio est omnino addenda, sine qua nihil reliqua profuerint, adeo ut alimenta sint omnia probi succi, facili coctionis & facilimæ distributionis. Somnus, quia concoquit, si opus fuerit, conciliandus unico grano Nepenth. Quercerani. Animi passionibus meditationes & applicationes prorsus ablegandæ, & in reliquis omnibus erit accurate à Viro Excellentiss. instituenda: cui & reliqua omnia opportune administranda relinquo. *Idem ibidem.*



*Diarrhoea duorum annorum.*

Illustrissima Virgo annorum viginti quinque, temperamenti totius calidi & humidi, calidioris jecoris & humidi capitis; jam dudum falsis catarrhalibus fluxionibus ad nares & labia obnoxia, duobus abhinc annis excruciatu fluxu ventris, materię heterogeneę, bilioſę ſcil. pituitoſę ac crudoę. Dejectiones frequentes ſunt, quę ideo vires valde proſtravit, & maciem univerſalem induxerunt, cum febricula ſerę continua. His addatur catarrhalis fluxio ad pectus cum tuſſi. Menſtrua quę antehac imminuta ſuerunt, modo nulla apparent, dexterumque hypochondrium obſtructionibus eſt impeditum.

Dum dixit Hipp. quod quibus nares natura humidiores, ij integra ſanitate frui non poſſunt, reſpexit pravorum effectus à capitis deſtillationibus provenientes: prout enim ad varias corporis partes catarrhalis materia à capite decumbit, varios quoque atque multiplices affectus producit: unde idem Hipp. conſiderabat, alvi proſuvia ex pituita à capite deſluente, quandoque contingere, quinimò & lenterias inde quandoque exoriri affirmavit, à falſa nempe facilius Diarrhœis, ab inſipida Lenterias. In Illuſtriſſ. vero Virgine iſta, ſicut catarrhalis deſtillatio in capite olim detenta, utpote falſa, & nares, & labia excoriavit atque corroſit, ita per laryngem ad pulmones deſluens, tuſſim excitavit & excitat, & copioſior reddita, majori ex parte in ventriculum delabens, non quidem immediate, ut ſuperius conſiderabat Hipp. Diarrhœam, modo duobus abhinc annis affligentem excitavit, verum eidem occaſionem præbuit, chyliſicationem impediendo, ſicque cruditates multiplicando, quę ad meſenterium & hepar delatę, & in venis tum lacteis, tum meſentericis, imò & ejuſdem hepatis firmatę, obſtructiones produxerunt, à jecoris & partium circumſtantium calore craſſefactę, & quodammodo induratę, quę præterquam quod ventilationem naturali calori inhiſcentes, eundem p. n. & concoctionibus obeundis ineptum reddunt, chylo quoque imperſecte concocto, & forſan frequenter corrupto, tranſitum interceptiunt: unde duo neceſſario ſymptomata conſequuntur, alterum eſt corruptio ejuſdem chyli, à calore p. n. corruptionibus potius, quam concoctionibus apto, ad cuius corruptionem varię ſequuntur excrementorum colores, à quibus primò excitatur febricula, quę ſymptomatica dici poſteſt, & ab iſdem tanquam a re inutili irritata facultas expulſrix, eorundem excretionem Diarrhœam excitat. Alterum ſymptoma eſt, in toto nutritionis defectus, deficiente nimirum chylo pro ſanguine generando, dum ab obſtructionibus jam dictis interceptitur ejuſdem progreſſus ad hepar, quę ſi non adeſſent, nec ſequeretur ejuſdem chyli corruptio, nec ad alvum tranſmiſſio, ſed ejuſdem pars purior & magis ſpirituoſa; per aliquas lacteas, & ductum thoracicum ad venas jugulares, indeque ad cor. pro celeriori ſpiritus nutritione: craſſior vero per alios lactearum ductus, magiſque per meſentericas ad hepar duceretur, ſanguis generaretur, & caro in toto augetur, aut ſaltem conſervaretur: & ſanguine tunc re-

dundante, facile quoque menſtruales expurgationes prodirent. Quare deſtillationem præſenti Diarrhœę ab initio occaſionem præbuine puto, ſicuti cauſam præcipuam, ne dicam unicam, obſtructiones eſſe exiſtimo.

Ex quibus facile patere poſſunt Medicę intentiones pro hac inveterata Diarrhœa curanda, primo primas vias ab excrementis mundando. Secundo Obſtructiones, primo meſenterij, mox ipſius hepatis aperiendo. Tertio Hypochondriorum & jecoris terrorem contempe-rando. Quarto Ventriculum & inteſtina quodammodo corroborendo, & quoniam occaſio quoque morborum reſpicienda, dicebat Hippocrates, deſtillatio quoque à ventriculo quoque pacto divertenda: atq; tandem humectantibus ſubſtantiis totius reſtitutio procuranda, non omnino febrili calore neglecto.

Et licet jam dictis indicationibus ſatiſfacere non adeo facile fuerit, cum obſtructiones conſirmatę, totumque corpus valde emaciatum, viresque ideo non adeo validę ſint, attamen quoniam generoſiora & maxime propria remedia non adhuc experta ſuere, ideo deſperanda ſalus non eſt: eſt enim juvenis, & gratioſa Juventus, dicebat Hipp. & quod magis ſpem adaugere valet, eſt quod Viro Doctiſſimo directio pro curatione vera & propria ſit committenda.

Sic ex fonte Chirurgico quaecumque ſanguinis evacuationem omitto, tum quia miſſio ſanguinis obſtructiones non curat, tum quia ſi ad-eſſet indicans, non adeſt permittens. Cauterium autem in laevo brachio laudo, ad divertendam à ventriculo fluxionem.

Primarum viarum expulſio utique neceſſaria cenſetur, exigua caſſia cum crem. tartari bis repetita, Præparante quinque diebus interpoſito, ex Julapiacet. ſyr. de pom. & aquę tor. citri an. ꝑj. parato. Ablutionem autem primarum viarum, quę aqua Tettucijneri non poſteſt, ſupplebit aqua hordeac. velierum alium depur. ad libras, cum vehiculo ſyr. roſ. ſolut. ad ꝑij. ſemel vel bis procurandam, ut inde ad Aperientia deveniri poſſit; in quem finem ſucci depurati & per arenam trajecti, cichor. & agrim. ad ꝑij. opportuniſſimi erunt, in quibus diſſolvantur gr. x. tart. vitriol. & exhibeantur in decoc. cich. endiv. ſonchi, cuſcutę; & ſeptem tranſactis diebus, repetatur ſlos caſſ. cum pil. de tribus, cui ſuperbibat ſeri deſtill. libram. Inde ad efficaciſſima Aperientia aſcendendum, hoc ordine adminiſtranda.

℞. Aqu. ſtillat. de ſucco cichor. agrim. an. ꝑij. ſalis tart. volatiliz. gr. x. m. pro potu ſummo mane aſſumendo.

Sequenti vero die ℞. Aquę de ſucco cich. de ſucco agrim. an. unc. iij. Rhapontici optimi drach. ꝑß. m. f. infuſ. per noctem, & factę colaturę addatur parum ſucci limonum, & præbeat ſummo mane. Tertio die repetatur ſal tart. volatilix. in dictis aquis, & quarto infuſio Rhapontici; quod ſi præſto non fuerit, eidem ſubſtituatur rhabarbarum maturum ad ꝑj. ſicque in horum alternato uſu diutius erit perſiſtendum, viginti nimirum, imò & triginta diebus; in quorum progreſſu ſi litis & calor urgeant, ſal tartari quoque diſſolvi poſſet in ſero aluino deſtillat. ad libram: hoc enim ordine



ue fluxus huiusmodi diurnos non semel curatos vidi.

Obstructionibus autem reſeratis, aquas thermales S. Martini, ſive Maſini ſummopere commendando, ut quæ reliquias obſtructionum auferre, & fervorem hypochondriorum, jecoris & renum commodere valeant, & à gracilibus quoque corporibus facile tolerentur. Quibus aſumptis, omnino ſuccedat lactis aſinini uſus per quadraginta ſaltem dies, quod nullo modo obſtructiones adauget, & totum corpus ſubſtantitice humectare, ac renutrire valet. Et ſi tunc temporis omnino ceſſaverit Diarrhœa, Balneum quoque aquæ dulcis conveniet.

Interim ſi ventriculus aliqua roboratione indigeat, parum ante cibum deglutiat pilulam ex 3j. ſucci aſinini. condens. vel duo integra grana maſtiches devoret: in hoc enim licet morbi occaſio inceperit, cauſa tamen ejusdem in illo non reperitur.

Quibus omnibus conveniens victus ratio eſt addenda, ab Excellentiffimo Viro Adſtanti diligenter præſcribenda, habita caloris febrilis & gracilitatis corporis ratione: cujus ſummæ prudentiæ reliqua quoque, & dijudicanda, & melius dirigenda libenter relinquo. *Idem ibidem.*

#### *Alvi fluxus antiquus.*

Vir Illuſtriſſimus ætatis quadraginta quinque annorum, temperamentum totius calidi & humidum, evexia præditus, ſtatim à nativitate in adeo enormem & vaſtam carnis totius corporis molem excreverat, ut Parentibus & adſtantibus admirationem excitaverit, veluti rei inſuetæ; quam cum ſuſpectam haberent, & poſtiſſimum tenella ætate gravioribus morbis opportuna, Medicum conſulere Lugdunenſem, magna nominis celebritate illo ævo florentem, Jo. ſcilicet Antonium Sacracenum, qui & ipſe metu Epilepſiæ terrefactus, Matri comaturalis, vel alterius gravioris affectus ingentem illam molem carnis extenuandi conſilium cœpit; in quem ſinem variis uſus remediis, tandem ſyrupum ex floribus perſicorum infanti exhibuit, cujus uſu ſoluta adeo eſt alvus, ut paucis poſt diebus detumuerit corpus, & extenuari cœperit immodica illa carnis moles. Ab illo vero tempore paſſus eſt fluxum alvi immodicum, quo plures dejectiones per diem fuerunt obſervatæ, quæ ani tandem procidentiam induxerunt, à qua tamen non difficili negotio opportuno remediorum uſu convaluit, ſuperſtite tamen eodem alvi fluxu frequentiori quandoque, quandoque vero remiſſiori, adeo ut qualibet die vegeſies, trigefies, necnon & quadageſies dejecerit alvus; prout nuper in Creta, ob æſtuoſum fortalle ærem & aquæ marinæ uſum. Excrementa ſunt quandoque biliſa, quandoque pituitoſa, quæ nullo dolore deſciuntur, perſeſerante aliqua ani laxatione; citra tamen extramiſſionem & procidentiam. Egerit autem alvus quinquies minimum per diem, tum ſi lautius, tum ſi moderatius cibo utatur, quanquam & aliquando parcius eo aſumpto, copioſius ſeratur alvus; pluries egerit, ſi ſtatim ab aſumpto cibo ſe ſomno tradiderit, parcius, ſi longa itinera peregerit. Copioſior evadit & frequentior alvi fluxus dum alimenta

facilis concoctionis aſumpſit, ut ova ſorbilia, juſ carniū; parcius ubi eadem concoctu diſticia comederit; & quandoque poſt copioſiorem ſecutam diarrhœam, moleſta remanet, adinttar Tenefini, deſiciendi cupiditas. Cæterum nulla de alio quopiam affectu extat querela; omnibus etenim vitæ exercitiis integre fungitur, niſi quod quandoque ventriculum ſibi gravari percipit, & intumefcere cum acidis eructationibus, cui malo quandoque uſu roſis ſolis & uſu ſpiritus vini aromatibus conditi præſentaneam attulit medelam. Jam dictis acceſſit novem abhinc menſibus dolor in extremitate brachij ſiniſtri prope humerum, ex motu ejusdem brachij moleſtior evadens, qui tamen a Viro Illuſtr. parvi ſit. Sed ut prior moleſta affectio remittatur, neve adventante ſenectute in deterius labatur, medicam opem implorat.

Eximia illa corporis moles, in quam excreverat a primo ortu ad tertium uſque menſem ætatis ſux Illuſtr. P. Obefitatem, non autem Plethoriam fuiſſe ex eo conjicio, quod a quodam ſyrup. ſol. floribus perſicorum parato, adeo copioſa viſcida, crudæ & pituitoſæ materiæ excretio viſa fuit, ut inde enata frequenti non ſolum dejectione, verum & deſiciendi conatu, ſuſpenſior muſculus inteſtini recti laxatus fuerit, & inde ani procidentia ſequuta. Hæc quidem congruis remediis mox ſanata fuit, ſed ab illo tempore uſque in præſentem quadageſimum quintum ſux ætatis annum perpetuo alvi proſtuvia laboravit Vir iſte Illuſtr. quod ſicut in genere Diarrhœa eſt appellandum, ita in ſpecie excrementorum proluvia, & communiter Diarrhœa inteſtinalis dici poſſet, ad diſtinctionem Lienteriæ & Cœliacæ paſſionis, in quibus vel omnimoda, vel ſaltem aliqua ciborum permutatio perpetuo obſervatur; ſicut ab hepatica & univerſali Diarrhœa diſert, quia neque cruenta, neque proſus biliſa cernitur. Quod autem nobis non leve facceſſit negotium, eſt indagare adeo diurni & copioſi proſtuvij cauſam, quod eo difficilius evadit, cum totum corpus carnoſum, optime nutritum & perfectæ evexia præditum, ſervatum ſemper fuerit; hanc vero in intemperiem quidem reſerri poſſe video, eamque inæqualem, calidam nempe, licet non excellentem, hypochondriorum & jecoris, frigidiorem vero ventriculi, à quibus non infrequens ſequitur ciborum in ventriculo acida corruptio, quandoque à ventriculi frigidityte in caſu noſtro procedit, tuncque roſis ſolis & ſpiritu vini emendatur, quandoque vero à calore quoque excitatur aciditas, ut à calido ambiente acidum reddi vinum obſervamus, tuncque ab actu calidis aſumptis, ut jure carniū, vel ovo ſorbili adaugetur corruptio, & alvi fluxus moveretur; hinc acidi ructus, hinc ventriculi frequens afflictio, quæ partim ab aſumpto ſpiritu vini, partim ab excretionem corrupti cibi ſedatur.

Verum ſi res ita ſe habet, quomodo Diarrhœa huiusmodi inteſtinabilis, ut dixi, & non potius ſtomachalis erit dicenda? cui quaſito neceſſario reſpondendum, ut cauſa tam diurni affectus, quæ ineffabilis fere videtur, aſſignari, explicari, & ut ita dicam, oſtendi poſſit. Dixi igitur, & recte, inæqualem intemperiem ad effectum huiusmodi quandoque concurrere, ac



nec solam, nec præcipuam esse affirmit; siquidem cum non quotidie, nec ex cibis quibuslibet contingat jam dicta corruptio, ideo neque ex illa quotidianus procedere posset alvi fluxus. Quare in intestinis quoque latere tanti mali causam, non in intemperie, sed in mala conformatione positam opinor; dum enim olim infantulo existenti syrupus ex floribus persicorum frequenter exhibitus fuit in adeo tenella ætate, tenerimis existentibus partibus naturæ, fibras intestinorum non solum obliquas expulsionem paratioribus fuisse redditas, verum (quod est) transversas quoque lubricas & laxatas fuisse arbitror, adeo ut chylum à ventriculo non perfecte elaboratum, & ad ipsa intestina transmissum, ut iisdem morando majorem perfectionem semper acquirat, intestina ipsa ob prædictam laxationem retinere non possunt, sicque elabatur, & fluxus adeo contumax & diuturnus constituitur.

Provida autem Natura nostræ conservationis sollicita, attractrice, retentrice, concoctrice, secretrice & expultrice facultatibus, tanquam ancillis utens, à chylosa materia continuo, quod melius est, ad lacteas atque mesentericas venas attrahit, imò rapit, sicque totum corpus satis nutrit, dum non multo in vasis sanguine relicto, partes carnosas atque adiposas auget atque conservat; sicut e contra venosi graciles esse solent. Et ita conclusum restat, potissimam causam adeo diuturni fluxus alvi pendere à morbo in mala conformatione in tenerima ætate contracta à syrupo è floribus persicorum, solvente, atque fibras laxante, sæpe sæpius exhibitio. Nec mirum, cum infantibus non solum in carnosis & membranosis partibus, verum & in ossibus ipsis mala conformatio inducatur, progressu prorsus immutabilis atque incurabilis: hanc vero comitatur, ut dixi, causa alia, quandoque, non semper agens, ciborum nimirum quorundam ad acidum corruptio, qui cum in alienam & peregrinam qualitatem per corruptionem abierint, ulteriorem coctionem non admittentes, ut nutritioni inepti, tanquam pondus inutile, ab expultrice facultate deorsum pelluntur, & tunc ambabus concurrentibus causis augetur Diarrhœa, & pluribus vicibus egerere cogitur Vir Illustrissimus, sicut paucioribus, concurrente tantum unica causa, videlicet mala fibrarum conformatione. Quoniam verò suspensor musculus ani jam dudum laxatus in integrum nunquam fuit restitutus, ideo & ipse acquisita mala conformatione affectus, ipsius ani semiprociditiam adhucnum conservat, eamque majorem, vel minorem prout major, vel minor extiterit crudæ & mucosæ materiæ quantitas, majorem, vel minorem deiciendi conatum excitans.

Ex quibus jam dictis & consideratis, solutio elici potest quæ sitis speculatione non indignis, cum nimirum augeatur fluxus, si statim à cibo somno se tradat Illustrissimus Vir, & minuat idem in itineribus peragendis? Hæc enim contingunt, non quia alteretur causa principalis, nimirum mala fibrarum conformatio, quæ immutabilis est, sed quoniam alteratur causa secunda & coadjuvans, quæ pendet à ciborum corruptione, cum enim in somno calor ad interiora uniatur & concentretur, ideo si statim

à cibo Vir Illustrissimus somnum capiat, adaucto calore facilius sequitur ciborum corruptio & alvi fluxus adauctio; sicut in itineribus, quoniam calor idem ad externas corporis partes expanditur, ciborum corruptio evitatur, alvi-que fluxus minuitur.

Dolorem autem novem aut decem abhinc mensibus in summitate brachii sinistri quodammodo molestantem, in motu præsertim, à diarrhœa prorsus distare, neque causam cum eadem communem habere omnino censeo, sed à fluxione exiguae portiones catarrhalis materiæ à capite ad illam partem, facile ob externarum injurias transmissæ, provenire credo, qui non adeo facile cessit, cum materia illa inclusa reperiatur in spatiis musculorum Deltoïdes, infra scapularis, & utriusque rotundi, nec tamen ultimum fuerit attenuans atque resolvens remedium appositum.

Ab hac Diarrhœa omnino vindicari se posse Vir Illustrissimus prudenter minime sperat, cum connaturalis hæc reddita sibi videatur; Ego verò idem sentio ob causam in mala conformatione positam (malæ vero conformationes inveteratæ incurabiles sunt.) Quoniam autem causam coadjuvans, à ventriculo pendens, corrigi potest, ideo Diarrhœam posse remitti puto, nec aliquod fibrarum quoque ipsis robur addi posse prorsus despero.

Quare ventriculus nonnihil calefaciendus & roborandus; hypochondriorum & jecoris calor contemperandus, atque tandem fibrarum robur aliquod addendum. Quibus intentionibus summario & militari modo erit satisfaciendum, tum quia Vir Illustrissimus non solum medicamenta, sed eorum nomina abhorret, tum quia à morbi natura non desiderantur. Omnia igitur qualibet sanguinis missione, dimissisque tum præparantibus, tum verò maxime medicamentis purgantibus, Curationem ita instituendam esse arbitror; ut primò statim assumat aquas Tettucianas cum vehiculo dejectorio mellis ros. sol. aut mannæ clarif. cum tartaro, tribus vicibus, prima ad libras quinque: etenim cum necessario crudæ atque viscidæ materiæ portio in ventriculo & intestinis reperiatur, ut Tenesmus quandoque Viro Illustrissimo contingens facile nobis significat, ideo pro harum abstersione jam dicta aqua mirabilis est; sicut non minus pro ventriculi exiccatione & corroboracione. His autem assumptis, ad aquas vitriolatas diureticas assumendas in Valle Solis agri Tridentini ut se conferat consulo, quæ hypochondriorum & jecoris calorem contemperandi, aliquas obstructions, si latèrent, relevari, & fibras quoque ipsorum intestinorum roborandi facultatem obtinent, & ideo præstantius in arte nullum remedium excogitari posse pro casu præfenti existimo; & licet ab ipsis assumptis ventriculum nihil lædi observatum fuerit, nihilominus ex abundanti aliquot diebus prandium elaudat sal absinth. ad scrupulum unum: quinimò toto quoque anno (per intervalla) ipsius usus familiaris esse poterit; siquidem statim à cibo sumptus, exiguo vino dilutus, circa hypochondriorum præjudicialem calorem, ventriculum roborare valebit.

Aliqua tertio loco fibrarum roborantia, &  
Iiii 3 amica



amica ventriculo in usum duci poterunt; & primo Conserva rosarum cum speciebus Diarrhod. Abb. reformata, additis guttulis tincturae Coral. chymicæ, parum ante prandium assumenda. Quandoque unica hora ante prandium deglutiat duo aut tria integra grana mastich. electi. Quandoque si ventriculo frigiditas percipiat, prandio præmittatur succus densacus absinthij ad scrupulum unum, pilulam efformando.

Valde conferre poterit vinum pro mensa, quod neque dulce, neque valde austerum sit, nec aquosum, nec valde generosum, ligno cydoniorum, aut lentiscino e Chio medicatum, ita ut singulam titulam ingrediantur 3ij. jam dictorum lignorum incisorum. Ab eximio quodam Viro propositus fuit pulvis viperinus, ut qui exiccandi & roborandi facultate polleat, quem tamen ego suspectum habeo: etenim Galenus de eo profert hujusmodi verba: *Cars viperina extenuantia est facultatis, valde enim exiccat & digerit, & ad eum properat.* Quare cum ad eum properando, & per diaphoresin digerendo totum corpus exiccare & emaciare valeat, in hac alimenti penuria & perenni diarrhoea majus inde nocumentum, quam juvamen secuturum dubito.

Externa quoque nonnulla Topica præsto sint, statim ab alvi dejectione podici apponenda, ut aliqua musculo roboratio afferatur spongiola itaque aqua rosacea madefacta, infra descripto pulvere intingatur, & podici bis aut ter post debitam abstersionem apponatur, idque pluries in die, ut paulatim musculus ipse robur acquirat; pulvis autem erit hujusmodi.

℞. Boli Armen. Orient. Sang. Drach. an. 3ss. Gypsi 3ij. Croci Martis constrict. 3j. m. fiat pul. subtilissimus: cuius effectus efficacior reddi poterit, si in aqua rosacea ovi albumen dissolvatur, coque spongiola intingatur, qua pulvis assumetur.

Neque brachii dolor sine modico auxilio relinquendus, molestus enim in motu evadit. Quare valida inunctio attenuans atque digerens a conditione loci admitti potest, ut partes illas musculosas pervadere, & ad spatia in quibus materia continetur, pervenire possit. Illiniatur itaque pars dolens summo digito oleo succini intincto; & quoniam graviter olet, eidem addatur guttulæ olei de spica, hoc enim & olla ipsa penetrare valet.

Nonnulla quoque circa vivendirationem adnotari possent, quamvis à juvantibus lædentibus Vir Prudent. jam fuerit edoctus. Et primo circa aërem, sicut quemlibet excessum noxium esse puto, ita frigidus ambiens facile fluxum augere posse credo, necnon aërem paludosum atque impurum.

Secundo alimenta facilioris concoctionis, corruptioni quoque magis idonea existimo, sed neque duriora: adeo facile à ventriculo confici poterunt, unde sicut à prioribus Dyspepsia, ita à posterioribus Bradypepsia sequeretur. Sic inter carnes, ab annolis & pinguibus abstinendum, à sordidis, ab agnitis. Inter pisces, à lutosiss & cœnosis, ab ostreaceis, conchyliis, & ab omnibus vulgo armatis dictis. Inter legumina ab omnibus, oriza & lenticula exceptis. A fructibus omnibus, admitti tamen pos-

sunt pruna longa, verdacia apud nos dicta, persica quoque, & melopepones, cum observatione tamen, ut potius urinam, quam ventrem moveant. Edulia ex palta parata conceduntur, sicut ex lacte contexta. Inter Bellaria, conceduntur amygdalæ, præsertim recentes, nucleæ pinci, pistacia. Salutorum omnium usus suspectus est, sicut omnia acida condimenta. Moderatus quoque debet esse usus aromatum, & nonnisi cinnamomi & piperis raditer contusi.

Tertiò somnus diurnus nonnisi conferre potest, nocturnus tamen, & una saltem vel altera hora ab assumpto cibo: deficiente nocturno, suppleat diurnus.

Quartò exercitium conferre jam Vir Illustrissimus expertus fuit; Verum tamen est quod jejuno ventriculo salubrius fuerit, juxta legem Hippocratis: Labores ante cibum, quod dictat quoque ratio.

Quintò de evacuatione inutilium excrementorum non est, quod aliud dicatur, cum de eadem cohibenda, non sollicitanda sit cogitandum. Si verò utilis excrementi evacuationem consideremus, coitum in hoc casu potius cum Epicuro nullum, quam cum Galeno moderatum convenire decerno.

Ultimò animi applicationes intensæ ventriculo proprium calorem adimunt, sicque coctionibus obsunt. Studiis itaque magnisque negotiis nonnisi jejuno ventriculo incumbendum, & alacri animo vivendum. *Idem ibidem.*

#### Dysenteria cum Diarrhoea.

Cum inter partes Medici curantis præcipua sit, præsidia medica tuto administrare, jure nobis visum est, cum de missione sanguinis deliberandum sit in casu Illustrissimi Comitis, quem tu nuper vidisti, Vir Illustr. & Præstantissime, ad te iterum confugere, præsentem tum morbi conditionem, tum accidentium, & Excellentiss. Egri vires describendo, ut tuo consilio rem perarduam facilius & securius peragamus.

Vidimus nos evacuationem à medicamento quod jam præscriperas, quæ satis copiosa fuit, parum immutatis materiis, quas pridie spontaneus alvi fluxus ejecerat, hoc solum discrimine, quod dysenteria ipsa (si sanguinis copiam consideremus) satis imminuta sit, remanente tamen Diarrhoea, quæ usque adhuc perseverat, non tamen bilis sic adusta (ut prius conspeximus) sed potius pituitæ copiosioris.

Accidentia quæ Excellentiss. Egri auxie vexabant, majora forsitan pericula minantia post tuum discessum nulla amplius apparent. Remanet solum totius corporis languor, de quo etiam valde conqueritur, licet pulsus parum à naturali statu distent, sicut etiam urina.

Tali rerum statu, in quo ipsius dysenteriae finem & Diarrhoeæ progressum possumus suspicari, cum etiam facultas ipsa vitalis satis afflicta sit, queritur, cum jam præscripta medicamenta repetita sint, an modo conveniat sanguinis missio, circa quam, Vir Præstantissime, ut felicius succedat, tuum consilium iterum peroptamus.



## RESPONSVM.

Mirari desino, quod Vos, Præstantissimi Viri, in Curatione Excellent. istius Senatoris me iterum consulatis: quandoquidem & Agamemnon Vir Prudentissimus atque Sapientissimus in rebus non arduis solum, sed charis sibi que dilectis, proferre solebat: *Utinam semper mihi decem Consultores adessent.*

Non igitur abutor honore, quod me ipsum condecorare voluistis, & respondendo dico: a præterita copiosa, biliosa cum prædominio, sed etiam heterogenea longaue Diarrhœa jam totam massam sanguineam, sat depuratam fuisse, censendum esse, quæ utpote biliosa, acris, valde mordax jam ab initio dysenteriam excitaverat: Hæc adhuc si perieveret, aliquam partem reproducentem atque foventem habere necessario credendum, nec alia in Excellent. Viro esse potest, quam jecur ipsum incensum, cuius causa sicut prius dysenteria fuit excitata, ita imposterum aut eadem foveri, aut multiplicatis cruditatibus a ventriculo, ob hypochondriorum æstum, acida, ignis falsa pituita generari poterit, & Tenesmus tandem fieri. Quare præcipua medica intentio versari debet in auferenda causa fovente, nimirum in contemperando jecoris, lienis & hypochondriorum fervore; in quem finem nil præstantius esse posse novimus omnes ipsa sanguinis educatione: & hæc quoad indicans; quoad prohibens, vero, quid asseram non habeo, siquidem Diarrhœa præiens nec critica est, quæ præsentis sanguis non sit detrahendus, neque ad totius depurationem amplius inferuit: sed juges sequuntur evacuationes, prout jugiter ab intemperato jecore & hypochondriorum æstu excrementa reproducentur: sicque tantum abest, ut evacuationes perseverantes prohibendi vim habeant, quinimò potius & ipsæ sanguinis missionem indicent: & hæc de prohibente quoque satis: Si vero tandem permittens considero, supponere posse mihi videor, tribus abhinc diebus vires non defecisse adeo, ut operationem hujusmodi prohibere valeant, sicut considerandum propono Præclarissimis dominationibus vestris, quod sicut antehac Diarrhœa Excellentiss. Patienti levamen attulit, ita eadem in futurum vires labefactare atque prosternere possit, ita ut intentio nostra dirigi debeat ad ejusdem suppressionem procurandam, causam auferendo, divertendo, refrigerando, nonnihil corroborando, non autem absolute altringendo: Et idcirco serum destillatum & chalybeatum ex usu esse poterit, cum guttulis quoque tincturæ coralliorum; præmittendo quoque bolum ex succo cichorii densato, addito coralliorum magisterio: Interim dysenteriam non negligendo. Hæcque raptim, ut Vobis, Viris Præclarissimis morem geram, & Excellent. Viri Patientis animo satisfaciam. *Idem ibidem.*

*Fluxus Hepaticus legitimus.*

Illustrissimus & Excellentissimus Marchio annum agens trigessimum quartum, temperamenti totius, & potissimum jecoris calidi & sicci, gracilis habitus, & submelancholicus, post multos errores in vivendi ratione com-

missos, & præsertim in animi applicationibus, sed præterea & in Venationibus nocturnis hyemali tempore, necnon in vinorum dulcium consueto usu, atque tandem etiam aquæ nive refrigeratæ, jam multis annis colicis doloribus obnoxius, necnon duplici tertiana febre per menses perdurante, & reperita Gallica Gonorrhœa correptus, anno elapso incidit in Diarrhœam, quam stomachalem existimavit Excell. Aditans, cum alimenta ruditer permutata observata fuerint; nec unquam hujusmodi fluxus omnino cessit, sed potius in deterius lapsus, siquidem præter varietatem excrementorum à doctissimis observatam, viginti circiter abhinc diebus invaluit fluxus, adeo ut & ratione quantitatis, & ratione qualitatis adhuc deterior sit redditus: observantur enim serosæ & saniosæ materię, imò & aquosæ cruentæ; veluti loturæ carniū, citra tormina Dysentericæ propria. Et quoniam doloribus hæmorrhoidalibus jam fuit obnoxius, & modo ab iisdem aliqua observata fuit exigui sanguinis fluxio cum aliqua excoriatione, ideo & egerendi conatus, & dolores ad os sacrum pervenientes, nonnunquam accedunt. Hisce jam dictis accessere quoque capitis dolores cum fluxione ad manus articulos dolores inferente, qui horis vespertinis exacerbantur cum aliqua effervescencia totius corporis. Modo de agendis consulit.

Excrementis abundare Marchionis Illustr. & Excellent. corpus, quinimò & olim abundasse, satis nobis significare possunt febriles præteritæ affectiones; ad venas sedales depositiones, frequentes & diuturnæ Diarrhœæ, integro præterito anno insistentes, & adhuc perseverantes; sicuti ad articulos arthriticæ fluxiones, quorum excrementorum proventus, tum in viscerum intemperies atque imbecillitates, tum in pravum vivendi genus est referendus: capitis enim ejus calidi & humidi, & ideo destillationibus obnoxii, & applicationes, & aeris nocturni inclementia, intemperiem, indeque catarrhalis materię productionem adauxerunt, quæ ad manus articulos per spatia decumbens, arthricos dolores excitat; sicut errores alii in vivendi ratione, & præsertim in vini dulcis consueto potu viscerum naturalium imbecillitatem inducere potuerunt, præsertim addita Cælicæ luis suspicione. Hinc a jecore biliosæ febres frequentes, a ventriculo colici dolores atque immodica alvi proluvia, quæ stomachalis ab initio esse potuit, cum ciborum ruditer permutatorum substantia in excretionibus observata fuerit; quare Cæliacam passionem fuisse existimandum, quæ temporis progressu in aliam affectionem migravit, nimirum in hepaticam Dysenteriam, eamque legitimam: non enim sola hepatis facultas attractrix debilitata conspicitur ut antea, dum excrementa diversis variegata coloribus alimentorum corruptiones quotidianas ostendebant, dum in via remorantia, tum forsan propter aliquod impedimentum, tum propter ipsius hepatis, attracticem imbecillam, ad hepar ipsum non perveniebant, unde corrupta per alvum deiciebantur; sed tandem & portio quæ ad hepar perveniebat & pervenit, ob imbecillitatem alteratricis facultatis in probum sanguinem



non convertitur, sed labefactato calore nativo ejusdem, sanguinis rudimentum per alvum excretum apparet, loturæ carniū similis, ut nobis innuebat ipse Gal. & Trall. atque Paul. cum ipso. Quare sicut antehac Celiacus erat fluxus, ob nativi caloris imbecillitatem ventriculi & intestinorum, ita modo ob eandem causam in hepate fluxus hepaticus legitimus factus est, qui quoniam latitudinis gradus continet, ita in primis gradibus & in principio hunc esse decerno, quem mirum non est si nutritio totius & immunita & depravata sequatur.

Verum & de vespertina quotidiana febricula, si adest, aliquid decernendum, quandoquidem credendum non est illum esse quæ tractu temporis in fluxu hepatico contingere solet, dum sanguis in viscere ipso corrumpitur, quæ ab imperitis negligi solet, ut notabat Galenus, verum credendum potius à corruptela ciborum extra viscus existentium, & in itinere moram facientium, febrem ipsam suboriri posse, quæ primis evacuationibus facile cedere observabitur, nisi à catarrhali destillatione & articularibus doloribus fortasse foveatur.

Viri Illustr. status celeri, diligenti atque exacta ope medica eget, ne gradibus imbecillitatis in visceribus ejus adactis, ad Tabem, sive potius ad Cachexiam tandem ducatur.

Quare primò mundatis primis viis, secundò, si quæ adsint in mesenterio obstructions, referandæ, ut facilius reddatur transitus Chyli ad hepar. Tertio ventriculus roborandus. Quarto jecori robur addendum, tum ejusdem intemperiem corrigendo, tum à proprietate juventia exhibendo; quibus omnibus executivo ordine satisfacimus.

Et primò ventriculi & primarum viarum evacuatio erit caute procuranda, flore cass. cum crem. tart. omiſſa pulpa tamarind. cui superbibat jus hordeo alteratum. Mox ut à cædis viscositatibus vindicentur, quinque aut sex diebus Præparans erit exhibendum, quod parabitur Julapio acer. cortic. citri, & cinnamomo aromatiz. ad ℥ ij. vel iij. & si cruditates observatæ fuerint in evacuatione, poterit ita parati Præparans.

℞. Julap. acer. mell. ros. aq. florum citri an. ℥ j. Aquæ cinnam. ℥ ss. m. pro syr. & sic pro aliis. Deinde repetatur leve medicamentum leniens ex Cassia, aut lenit. cum tartaro paratum.

Inde ad Deobstruentia erit deveniendum; & inter hæc principem locum tenet rhabarbarum, quod ideo Pater viscerum fuit appellatum, cum non solum tenuiori sui parte aperiendi, verum & crassiori roborandi facultatem habeat; hoc autem in substantia, & potius masticatum erit assumendum ad ℥ ss. cui superbibat, hora transacta, cyathum aquæ de succo cichor. & agrimoniz: hoc enim modo mesentericæ obstructions referari poterunt, & jecur quoque quodammodo roborari, dum interim & humores corrupti ejicientur per alvum.

Inde de visceribus roborandis cogitandum erit, eorundem intemperies corrigendo, quæ in ventriculo frigida & humida, sicut in jecore calida & sicca jure merito supponenda est. Sic pro ventriculo aqua Tettuciana consideratur, at danda absolute non proponitur, nisi copiosæ

& valde tenaces ab Excellent. Adstante fuerint observatæ cruditates, alioquin omittenda: & si danda, exhibeatur ante propositi rhabarb. usum, ne cruditates à rhabarb. per venas mesaraicas deducantur, quod si omittatur, alia substituenda proponam. Ad hepar itaque transitus est faciendus, pro cuius intemperie remittendæ, succus cichor. depur. prærogativam obtinet, ut qui jecori quam maxime proſit, nec ventriculo officiat, ad cuius penetrationem tres aut quatuor spir. vitriol. guttulæ addi possunt; præbeatur autem ad ℥ iij. per arenam trajectus, in jure cichoraceis alterato, addita quoque absinthij Pont. coma; in hujus usu pluribus diebus insistendum, nec ad validiora refrigerantia deveniendum, ne jecoris nativus calor imbecillis obruatur. Hoc tempore tamen observandus erit calidæ intemperiei excessus, quo præſente, vena jecoraria dextera aperienda erit, & sanguis modice ad ℥ iv. vel v. educendus. Decem verò aut duodecim transactis diebus, offerri poterit cassia cum pilulis de tribus cum rhabarb. & pulvere myrobal. citrin. cui medicamento superbibat serum capr. destill. ad lib. j. vel ij.

Inde ad aliqua roborantia deveniri poterit, ne npe ad usum tincturæ corall. chymicæ ad gurt. vi. vel salis coral. ad ℥ j. in aqua de succo cichorii. Quam maxime prodest quoque infusio, & postea decoctio ligni cydoniorum, præmissa Conserva rosarum antiqua. Spiritus vitrioli in cyatho aquæ sol. quereus destill. Tinctura rosarum extracta cum spir. vitrioli, & in aqua plantag. facta, efficax erit remedium: sed efficacissimum reddetur, si superaffundatur tinctura Martis restrictiva, cujus dosis est ab uno scrupulo ad ℥ ss. quæ jam dicta per plures dies sunt in usum ducenda.

Nec à proprietate juventia sunt omittenda, quæ ante coenam exhiberi poterunt; & inter hæc principem locum obtinet hepar lupi, cui addatur flos squinanthi, & cum vino albo reformatur bolus ante cibum exhibendus, vel eidem addatur sal absinthij.

Interim ventriculus sine roboratione non erit relinquendus; quare hora ante prandium in usum ducat pilulam ex uno scrupulo succi absinth. condensati: sicuti ante coenam sal. absinth. ad ℥ j. in exiguo vino dissolutum hauriat. Quandoque à cibo rotulam ex legitimo oleo cinnam. paratam, saccharo dissoluto cum aq. cinnam. comedat: Ventriculus enim aromatizatione gaudet. Duo aut tria grana mastic. hora una ante cibum integra devorata, optima. Extrinsecus quoque aliqua proficere possunt; sic hepatis regioni unguentum rosac. cum ol. de absinth. reformatum; sicut ventriculo oleum Magni Ducis Hetruriz, masticchino immistum.

His omnibus congrua victus ratio erit addenda, tenuior quidem præſentibus doloribus arthriticis, at non tenuis in hoc affectu diuturno, in quo deficit toti corpori nutrimentum. Debet esse optimi succi, facilis coctionis & distributionis, non negligendo quod hepata animalium à proprietate substantiæ conferre solent, sicuti passinæ pro condimento ciborum hepati valde sunt conferentes. Vinum quoque album, sed modicum, ratione arthriticidis est permittendum. Nec in eligendis peculiariter ali-



alimentis diutius immoror, sed Præstantissimi Viri Adstantis iudicio hæc & reliqua omnia dirigenda committo. *Idem ibidem.*

*Fluxus hepaticus spurius.*

Illustrissimus Comes quadragesimum annum agens, temperamentum secundum totum & jecur calidi & sicci, mediocris habitus ad gracilitatem tendentis, rebus domesticis valde additus, & præterea negotiis alienis, maxime vero publicis deditus, ad actiones obeundas promptissimus, mense Octobri proxime præterito febre correptus fuit cum insigni calore in hypochondrio dextero, à qua Medicis præsidis, & præsertim sanguinis missione valde adutus, ac tandem liberatus fuit; attamen sub finem mensis Decembris rursus recidivam passus fuit, aliisque medicis auxiliis demum immunis evasit. Interim ante mensis Februarii dimidium tertia vice ab eadem febre cum dolore in hypochondrio dextero captus fuit, qui dolor ad scapulam modo, modo ad jugulum usque porrigebatur, cum aliqua respirandi difficultate. Quibus omnibus post nonnulla administrata remedia alvi fluxus successit, ut plurimum materię biliosæ & quandoque crudæ, sed nonnunquam processu temporis cum aliqua stilla sanguinis quæ modo facibus aspersa, modo immista, modo diluta & tenuis fuit, modo crassa atque grumosa, semper tamen perseverante febre, licet quandoque matutinis horis exigua valde & fere imperceptibilis observata fuerit. Multa ab Excellentiss. Assistentibus præscripta & administrata fuere remedia, tum refrigerantia, tum modice astringentia & corroborantia, sed incassum omnia: febris enim quandoque magis intendebatur, perseverante fluxu, divexantibusque doloribus in latere dextero, modo vigente, modo dejecta ciborum appetentia. Tandem ego accersitus circa quadragesimum recidivæ postremæ diem, inveni Comitem Illustrissimum magna febre correptum, cum dolore in eodem hypochondrio dextero, imò cum insigni tensione in hepatis regione, gibbam ejusdem partem occupante, alvo quoque fluente quatuor, quinque & sex vicibus in die, & magis tempore digestionis, quam concoctionis. Materia autem quæ excernitur, est nullius consistentiæ, sed diluta, ut plurimum biliosa, non sine aliqua colliquationis nota, quandoque guttulis prohi sanguinis & aspersa, & immista. Quibus observatis, alterantia & aperientia à Viris Excellentiss. præscripta, & à me approbata Comes Illustrissimus assumere perseveravit, nimirum ex sero asinino destillato, addito succo cichorii, quibus antea addebatur spiritus vitrioli, cujus vice spiritus tartari ad gutt. vi. vel vii. additus fuit: & pro altero præparante jus cichoraceis alteratum, addito sale prunellæ assumere incepit, ad obstructions in ramis venæ portæ existentes aperiendas. Et quoniam rami venæ cavæ tactu ipso turgentes & sanguine repleti observati fuere, febrisque quotidie intensior evaderebat, jecorariam aperire, & sanguinem ad 3 vi. educere consultum fuit, qui non quidem valde exustus, sed crassus cum sero satis flavo fuit observatus; eodem & sequenti die ab educito sanguine melius habere visus est Illustrissi-

mus Patiens: nonnihil enim sedati fuerunt dolores, & jecoris tensio & febris parum per remissa videbatur, & alvi fluxus non parum immixtus, dum interim levissimi dolores in dorso toto, necnon in pectore suborti sunt cum febris augmento, cumque pulsus præcipiti prostratione, adeo ut unus dies naturalis spatium ad asphyxiam cum doloribus intolerabilibus jam dictarum partium fuerit redactus, ut propterea ad Narcotica, leviora tamen, devenire coacti fuimus, nempe ad Nephthes Quercetani, quo parumper sedati fuerunt dolores ipsi; & interim subsequenti mane, parum restituto pulsus, cassam cum exiguo thab. præbere non dubitavimus, quo levi medicamento revocata fluxione ad alvum, remissi quoque, licet non omnino ablati fuere dolores; qui quoniam horis vespertinis recrudescere incipiebant, ideo inectus fuit clyster ex philonio Romano lacte vaccino dissoluto: præscriptæ quoque inunctiones, oleo amygdalino & lilaceo immixtis, quibus dolor sedatus, & somnus jucundus conciliatus fuit, adeo ut die subsequenti fere à doloribus immunis inventus sit Illustrissimus Vir; & dum de clystere alvum movente cogitabamus, sponte alvus quoque excrementa reddere incepit, ac postea perseveravit, nonnihil a superius enarratis dissimilia, dum plurima mucosa, aliqua parumper compacta & fecalia, aliqua quoque diluta, non tamen adeo colliquata observantur. Interim ab aperientibus omnibus desistimus, & solum malvarum jus obtulimus. Urinæ copiosæ cum copioso sedimento, eoque exalto & farinaceo, modo albo, modo rubedinem præferente observantur, sed fere ejusdem tenoris in toto morbi decursu observata fuerunt. Interim pulsus ad pristinum statum redierunt, dolores dorsi atque pectoris evanuerunt, hepatis tensio valde remissa, & citra dolorem tactu percipitur; febris vero ut antea, non exigua conservatur, & vires Pat. Illustriss. constantes observantur: è lecto namque absque ullo auxilio surgit & ambulat, quamvis valde emaciatus. De agendis pro salute consultitur.

Hepar in Illustriss. Viro esse partem præcipue affectam & omnium affectionum causam, non est quod dubitemus, siquidem & situs doloris ad scapulam & jugulum sese extendentis, & qualitas ejusdem cum tensione manifesta, præterea excreta per alvum frequenter biliosa, nonnunquam guttulis sanguinis comitata, quoniam & febris tamdiu symptomatice perdurans, hepatis affectionem confirmant. Etenim si diarrhoea consideretur, stomachica non est, quia Lientericus non est fluxus: neque intestinalis, quia Cæliacus non est; & quoniam ut plurimum biliosus appareret, guttulis sanguinis aspersus, sive immixtus, Hepatica dubio procul censenda est, non tamen legitima, quoniam loturæ carniū sanguis similis non desicitur, neque copiosus, sed exiguus atque probus. Spuria igitur omnino est statuenda, quatenus chylus a ramis venæ portæ in hepate quidem recipitur, at propter obstructions in iisdem stabulantes, ulterius, ut necesse esset, ad ramos venæ cavæ sese insinuare nequit, & ideo ab intemperie calida ejusdem jecoris tum naturali, tum à clausuris, adacta, corrumpitur chylus ipse, dum aliquod sanguinis rudimen-



tum acquirere incipit, & flavo colore infectus, ut inutilis, imo naturæ molestus, ab expultrice facultate, tenuissima sui portione ad gibbam, indeque per emulgentes ad renes per urinam transmittitur, crassior vero ejusdem portio per alvum depicitur. Quod vero nonnunquam guttula aliqua probi sanguinis vel à parenchymate jecoris, vel ab aliquo ramo venæ cavæ excidat, & eidem commisceatur, mirum non est, nec id propterea hepaticum legitimum ullo modo constituiere valet. Dolorem autem qui modo major, modo minor hunc affectum perpetuo comitatus fuit, ab obstructionibus in cava jecoris existentibus, necnon à sanguine ramos venæ cavæ distendente & phlogosin constituyente, provenisse non sine ratione creditum fuit. De febre autem hæsitantes fuimus, dum à bile quotidie in jecore genita provenire potuisse à probabilitate alienum non esset, si semper eadem & ejusdem tenoris fuisset; verum quoniam adeo acuta & magna antea à Viris Excellentissimis observata non fuit, imo valde mitis, talis autem solum x. aut xii. abhinc diebus apparet, sine ulla urinarum mutatione & alicujus alieni symptomatis accessione; idcirco causam aliquam à præterita diversam habere & habuisse suspicandum videtur, hæcque forsitan esse posset materia aliqua chylosa corrupta, extra vasa ad hepatis parenchyma introducta, quæ non sub forma abscessus febrem ipsam adauxerit, nisi dixerimus bilis tandem reproductionem à calida jecoris intemperie adauctam fuisse, quod utique desiderabile magis esset.

Verum negotium non leve facessit mihi postrema extemporanea doloris exacerbatio, & non in hepate, sed in dorso & pectore, cum præcipiti pulsuum lapsu magnoque febris incremento, post aperientia medicamenta administrata, quod speculandi ansam præbuit, nec aliunde provenire potuisse mihi compertum fuit, nisi ab eadem materia corrupta & per alvum antea excerni solita; dum enim ramos venæ portæ ingressa oclusas antea inveniebat vias, ut propterea corrupta, & quodammodo in bilem conversa retrocedere ad intestina, & ad alvum cogeretur, dum à medicamentis aperientibus adhibitis obstructiones referari, & viæ ipsæ aperiri inceperant, sanguinisque missione rami venæ cavæ superiores non parum à sanguine reclusi & exinaniti fuerant, materia ipsa corrupta ad superiora per ramos venæ cavæ & ad truncum impetum fecit, quæ cum ipso sanguine circulante ad cor delata, & à dextro ventriculo in sinistrum, si non per septum, per pulmones, mediante vena arteriosa deducta, indeque per arteriam magnam per corpus distributa, & præsertim per arteriolas laterales ad pleuram undequaque transfusa, dolores illos intolerabiles, acriter totam thoracis regionem constringentes & fere lacerantes excitavit; ut propterea mirum non fuerit, si cor ipsum adeo infestaverit, ut propria ejusdem pulsifica facultas & depravata fuisset, unde febris acutior & intensior; & imminuta, imo fere abolita, unde pulsus asphyxia, quæ paulatim recessit, quia materia jam dicta, qua sanguis, & inde cor infestabatur, jam ad spatia detrusa & deposita fuerat: hæcque eadem paulatim à natura insensibiliter, coadjuvantibus inunctionibus, reso-

luta fuit, unde afflictivi doloris remissio. Hujusmodi metastasin nobis commonstrare valent primò venarum turgentia, atque dolorosa tensio in hepate manifeste remissa; nullam enim querelam ab Illustrissimo Comite de hepate audiui, dum vehementissimis thoracis doloribus confictaretur; nec dici potest cum Hipp. quod major dolor minorem obfuscet, quoniam remissis quoque & ex toto ablatis thoracis doloribus, hepar nihilominus sine dolore conservatur etiam si manu comprimatur; præterea vidi, post enarratos dolores copiosas visciditates crassas excretas, à quibus obstructiones in ramis venæ portæ sobolescere solent, quarum depositione hepar ipsum levius & expeditum magis redditum est, & præsertim post exhibitum medicamentum purgans.

Cum igitur pars princeps magnopere læsa conjiciatur, nempe jecur ipsum sanguinis officina, necnon cor ipsum perfectio, læsiones vero consistant in fervida intemperie, læsiones vero naturalis in Illustrissimo Comite fuit, sed multo magis adaucta ab animi continuis & intensis applicationibus, & forsitan etiam quandoque ab aliqua vini dulcis potione, quæ in plerisque aliis error non esset; intemperies autem confirmata non nisi diuturno tempore tolli possint, idcirco difficilem præbent Curationem, cujus difficultas adhuc magis augetur ab obstructionibus, necnon à febre haud exigua vires prosterrente, & totum corpus extenuante: difficillimam præterea minatur Diarrhœa hepatica à Viris Excellentissimis non sine colliquatione observata, magnam visceris læsionem demonstrans, & vires quotidie imminuens atque prosterrens. Non tamen impossibilis à me censetur salutis restitutio, dummodo jecoris substantia ab abscessu præterito tempore immunis servata fuerit, de quo dubitari quidem, at nihil certi pronunciari potest. Restat autem ut spes in præsens obscura (remissione febris) magis elucescat.

Dirigenda interim Curatio contra affectus quos certos habemus, quorumque si succedat remissio, abscessus & impossibilis Curationis sequetur exclusio. Verum caute valde in Curatione procedendum, refrigerantibus, ventriculi naturalem calorem non infringentibus; aperientibus, obstructiones quidem in ramis venæ portæ auferentibus, ac materias corruptas ad superiora non deferentibus; & roborantibus, tonumque hepatis conservantibus, obstructiones tamen non augmentibus, & si opus fuerit, dolores sedantibus.

Quæ paucis, & ordine executivo mihi proponere liceat, ut in externa consultatione unanimiter conclusum fuit.

Pro jecoris fervore contemperando, & præsertim in hujusmodi casibus, passim uti solet Gal. succo cichorii, ut qui hepati prodesse, neque ventriculo obesse possit: parce tamen in nostro casu eodem utendum, ad unicam unciam in jure pulli junioris cæteris cichoraceis alterato, additis quoque foliis eupatorii, & ut succus facilius jecur pervadere possit, per arenam trajicietur.

Aperientia nullo modo sunt deferenda, sed moderata, ne materia corrupta rursus ad penitiores partes deferatur; in quem finem præ-



stantius nec inveniri, neque excogitari potest rhabarbaro remedium, sed in substantia, ut quod cavam partem jecoris, ramos scilicet, venæ portæ deobstruere, nec ad partem gibbam & ramos venæ cavæ pervenire soleat; præterquam quod quodammodo roboret, & jecori valde amicum sit, ut propterea Pater hepatis muncupari soleat. Præbeatur igitur ad ℥j. tertio quoque die multucandum cum passulis, cui post horam superbibat jus tenue pullæ cichorii aut intybo alteratum. Aperiendi quoque ramos venæ portæ facultatem obtinebit sal tartari fixum, sed tantummodo ad gr. v. exhibendum. Ad validiora aperiencia in præsens progredi tutum non erit.

Roborantia tandem locum habebunt; qualesse poterunt sal coralliorum in aqua plantaginis, iunctura coralliorum; pariter syrupus coralliorum Quercetani, à Viris excellentissimis propositus, in aqua destillata è tenerimis quercus foliis. Nec spernendum hepar lupi pulverizatum, tanquam a proprietate juvenis.

Tandem doloribus quoque occurrendum, si opus fuerit, clysterem injciendo ex lacte vaccino, addita drachma Philonii Romani rec. quod remedium genus alias utiliter fuit expertum, aut per os præbeatur syrupus defeminibus papaveris albi ad ℥j. qui causæ morbiæ quoque adversabitur.

Hæc pauca, utpote tutiora descripsi: pluram namque & majora non requirit, nec tolerat statum P. Illustrissimi, quibus congrua victus ratio jam à Viris Excellentissimis adstantibus instituta addenda est. Faxit Deus, ut omnia ex voto succedant. *Idem Ibidem.*

Fœmina triginta annorum, biliosa, multo alio, porro, aliisque biliosis alimentis, aliquandiu usâ, incidit in copiosum & frequentem alvi secessum; quo multa liquida, biliosa, crocea & rufa, jam per multos dies, cum dolore satis magno, exercebat; unde jam non tantum corporis lassitudo, sed magna etiam extenuatio ægræ nostræ est orta.

Atticiuntur in hac fœmina intestina; ut frequens ille alvi secessus cum dolore conjunctus, evidenter docet: nec non totius corporis habitus; bene defœcata. Corpus quiescat, somnus sit longior, fugiat vehementiores animi affectus. *Henricus Regius apud Theod. Craanen. Medicat. lib. 3.*

### Observationes.

Qui diuturno alvi fluxu laborabat, & omni suam substantiam suutra in Medicorum ope consumserat, consilii causa, ut ab hoc malo liberari posset, me accessit: cui consilium dedi, ut mespila etiam immatura in maxima copia devoraret, quibus commestis alvi profluvium paucis diebus cessavit. Idem evenit mercatori Zelando, qui cum multis mensibus laborasset profluvio, & tandem etiam dysenteria, neque ab ullis Medicis curari posset, tandem mespilis commestis ex Joannis Spirinchii Medici Lovaniensis consilio, sanitatem consecutus est: & Medico trecentos aureos pro sola mespilorum præscriptione numeravit, quibus solis in pristinam sanitatem fuerat restitutus. *Petrus Forestus Obs. lib. 22. De diversis generibus profluviorum alvi.*

Medicus quidam Hibernus celeberrimus in Diarrhœa præ omnibus aliis quibuscunque sequens commendat remedium.

℥i. Butyri insulsi, q. v. bulliat lento igne ad tertiam vel mediam partis consumptionem subinde despumando, exhibeatur de eo ægrotanti satis magna quantitas. Mitigat plurimum acrimoniæ humorum, & ab eorundem corrosione intestina detendit. *D. Robertus Boyle, lib. de Utilitate Philosophiæ experimentalis. Part. 2. Sect. 5a cap. 18.*

Vir quidam robustus, ætate media correptus est diarrhœa biliosa valde urgente, cum siti intensissima. Vocatus ad eum, præscripsi sal prunellæ in potu ordinario, tum etiam in julepis ex aq. lactucæ & postulacæ paratis, ter in die sumendis; & intra 14. horas convaleuit. *Lazarus Kiverius, Obs. 33. cent. 1.*

Correptus tum diarrhœa biliosa tanta acrimonia prædita, ut anum eroderet, ardoremque urinx concitaret, translata materix portione ad urinas. Dysenteria erat in procinctu. Ingressus semicupium tepidum illico liberatus sum. *Laz. Kiverius. Obs. 59. cent. 2.*

Vidi nobilem pleuriticam: huic ad statum fere humanis fluxus alvi supervenit. Præscripsi illi usum syrupi myrtillor. ac summi Dei beneficio servata fuit. *Joan. Heurnius ad Aphor. Hippocr. 16. Sect. 6.*

Evocatus è Galliis ab Illustrissimo meo Principe, Lugduno media ætate discessi, idque in magno ætate: hinc tactum est, quod in itinere labore fatigatus, æstuque confectus inciderim in diarrhœam biliosam, quæ statim in dysenteriam commutata est, non subveniente consilio, cum Clysterum pertæsus essem, captans ex tempore consilium, sumebam fere singulis noctibus statim à dejectione, cum dolor acerbius lancinaret, ℥ij. & amplius theriacæ non admodum veteris (quam tum forte Lugduno mecum in viam attuleram) dissolvendæ in vino rubello, quo assumpto, qualibet vice, statim sedato sopitoque dolore, occupabat me somnus, corporeque in sudorem resoluto, videbar plane persanatus, eoque paucis vicibus reterato, penitus restitutus, persanato ulcere, nihil amplius incommodi senti. Satis jam constat quid theriaca possit, quam illa fluxus inhibeat, quantum dolores sedet.

Utile est hoc emplastrum ad hepar, quod sæpe in omni fluxu tum hepatico quam dysenterico excoarctivo, in antiqua diarrhœa, & similibus mirum in modum comperi juvisse.

℥i. Eupator Schœnanth. an. Mj. spic. ind. p. s. mastich. macis, an. ℥ss. lign. aloës odori, ℥iij. myrobal. cheb. emblic. torrefact. an. ℥j. bol. armen. terr. sigill. hamatid. an. ℥vj. coriandr. præpar. ℥j. s. spod. ℥ij. ros. ℥j. spec. trionfental. sine canphora. ℥ss. scoriz ferri præp. ℥j. farin. hord. ℥ij. ol. mastich. myrtill. an. q. l. ad impinguandum F. emplastrum cum modico aceti in bona forma, & superpone ab osse Xyphocidæ supra totum ventrem, usque ad os pectinis, removeatur quandoque ne pondere nimis gravet.

In hoc quidem stringentia atque ligantia sunt; quia tamen multis hepaticis & roborantibus temperata non formidanda in actu ipso compen.

Addam



Addam hoc paratu facile & verè in-  
quod in fluxu pernici vidi profuisse. Incoquun-  
tur flores rosamarin. leviter acri aceto, expressi  
ventri calentes imponuntur. Addam & alia  
comperta.

Omne fluxum observavi à Matronis Nea-  
politani, tam diarrhœam & lienteriam, quàm  
dysenteriam, fluxumque hepaticum curari.

Destillabant poma granata acida, necdum  
satis matura. aquæ extillatæ propinabant 3ij.  
vel 3iij. quibus ad manus non fuit extillata  
aqua, decoquebant poma, decoctumque exhi-  
bebant, haud dissimili effectui. Memini fuisse  
mulierem, quæ cum sex menses fluxu hepato-  
co colluctata esset, nec posset curari, quodam  
consulente, ut mane 3j. pulveris medii corticis  
fraxini cum tantillo malvatici sumeret; quod  
cum tertium fecisset fluxum restitisse. Addam &  
hoc quod sæpenumero plebeis præscribo, qui  
fere ut hic homines sunt, ab iis medicamentis  
quæ à pharmacopola porriguntur abhorrent  
solent; quod compertum est contra fluxum ven-  
tris diuturnum.

Accipio turturam pinguem deplomatam,  
ablavo leviter, exenteratam infarcio ceræ novæ  
3j. percoquo in aquæ q. s. eam edendam por-  
tingo, jusque bibendum: atque ex ossis eden-  
dum, comperi istud verum & salutare in quo-  
dam Lucense Peraccino qui diu gravissimâ  
diarthoræ laborabat, atque ab eo tempore sub-  
inde utor. Ego delector id genus Euporistis  
atque diligenter ea observata adnotare soleo.  
*Reinert Solenander Consil. 9. sect. 4.*

Generosus juvenis Joan. Franciscus Zelski,  
Nobilis Polonus, in S. R. M. castris hucusque  
militans, in novissimo contra Turcæ bello ex  
victu pravo incidit in imbecillitatem quandam  
ventriculi & Agendum: hinc quotidianam ven-  
tris & hypochondriorum inflationem percepit.  
Sed cum post assumptum unum atque alterum  
medicamentum purgans per aliquot septima-  
nas jam melius valere existimaret; ex inspe-  
rato alio malo correptus est, scilicet Diarthoræ,  
sive fluxu chyloso ex mala chyli distributione  
orto: qui (quod notandum) post cujuslibet  
generis carniū tam quadrupedum quam vola-  
tilium, etiam teneriorum & facili coucoctioni-  
nis, esum, semper magis exacerbabatur; ab  
usu autem piscium etiam duriorum, tam recen-  
tiorum quàm salitorum & fumo induratorum ac  
omnium ciborum tempore jejunii vesci solito-  
rum, compescebatur, quod generosus patiens  
jam per aliquot septimanas verissime observa-  
vit. Verum adhibito ipsi à me Consilio Medi-  
co, nempe ventriculo binis vicibus leviter ex-  
purgato, dein medicamentis idoneis & mode-  
ratis, visceribus coucoctionis corroboratis, ab  
insolito isto symptomate (quale me nunquam  
in Medicis libris legisse fateor) Deo benedi-  
cente, in totum liberatus est. *Simonis Schult-  
zei.*

Cum Thorunii anno 1667. 8. Julii à Meridie  
Commissarii Regii, ita jubente Serenissimo Re-  
ge Joan. Casimiro. Templum S. Jacobo conse-  
cratum, atque in novo oppido constitutum  
Monialibus truderent uxor m. W. Fabri auri-  
arii, observatura quid circa illud Templum fa-  
cturi sint illi, supremam ædium suarum conti-  
gnationem conscendit, unicumque filiolum

sum, cum trimulum, secum eò deduxit. Ubi  
dum intentis oculis negotium illud intuentur,  
ecce pueruli servula suspensio accedit gradui, il-  
lumque ex improvviso ita per terrefacit, ut vix  
placari potuerit. Subsecuta est sequenti nocte  
Diarthoræ gravis. Hanc licet variis mediis re-  
mediisque domesticis tollere conaretur Mater,  
nil tamen profecit. Imo crevit potius in dies  
malum, ac tandem sexta post septimana in dy-  
senteriam degeneravit. Hic mater anxiosa me  
denum in auxilium vocavit. Ego prima vice  
visitans ægrum, præter frequentes dejectiones  
cruentas, vires quoque prostratas, habitusque  
musculosi totalem deprehendi consumptionem.  
Debito igitur prognostico famæ meæ tum con-  
sulens, variis remediis tum externis quàm in-  
ternis (licet istis ob ægri nauseabundi pertina-  
ciam nimis parè) aggressus sum affectum, at-  
que imprimis & enemata in subsidium mox vo-  
cavi. Ubi cum post detergentium sufficientem  
usum aliud ex lacte chalyb. flor. ros. verbasci at-  
que similibus paratum injicere jussissem, miti-  
gando mali ferociam optatos præstitit effectus.  
Suas! igitur ut sequenti die simile enema ex lac-  
te applicaretur, & quia præcedens adeò benè  
succeederat facile persuasi. Injicitur igitur de-  
mo clyster, non tamen eo quo præcedens suc-  
cessu. Nam horæ quadrante vix elapso, eun-  
dem clysterem per os rejecit æger. Eam verò  
excretionem tanta subsecuta est debilitas, per  
aliquot horas durans, ut in carpo arteriæ mo-  
tum vix percipere potuerim, atque extremam  
adesse horam ipse crediderim. Ne tamen planè  
pro derelicto haberetur æger, corroborantibus  
refecimus illum: Deo curam ita postmodum be-  
nedicente, ut tandem adhibitis variis remediis,  
iteratis quoque sic urgente necessitate enemati-  
bus, pristinam recuperavit sanitatem æger, quâ  
adhuc per Dei gratiam fruitur.

Superiori ætate plurimæ nobis Diarthoræ oc-  
currerunt, sed adeò pertinaces ut pleraque re-  
media eluserint: Plerisque tamen profuit tan-  
dem Helmontii remedium, ex ovis ad duritiem  
coctis cum aceto rosaceo exhibitum, præsentia-  
neum & facile, & nemini injucundum, laude  
dignissimum, nemini non opem certissimam at-  
tulit. V. F. m. tamen Philonio est curata cum  
bolo Armena & conserva papav. errat. cui ova  
illa oxyrhodina non contulerunt. *G. Hieronimi  
Velschi.*

Petrus Nicolai Zythopeptes, nuptias illicita  
Venere auteverterat, atque ex uxore ante  
quintum ab inito matrimonio mensem, sustule-  
rat filium; cujus ut nihilominus amore teneretur,  
tanquam legitimi, vanissima obstetrix per-  
suasit anxie matri, ut excisa foetus vasa, quæ ad  
umbilicum protenduntur, assuret, & chartæ in-  
voluta naribus admooveret mariti, fore enim, ut  
pater nidore illo inescatus in desiderium infan-  
tis effusè raperetur. Interea dum puer sacro  
baptismatis lavacro in templo à primitiva labe  
abluitur, obstetrix assum hoc officiosè præpa-  
rat, & circa vesperam convivanti cum amicis  
marito ludibunda obtrudit, naribusque ejus  
propemodum ingerit. Ille averfari sædum odo-  
rem, & vinum in usum letitiæ poscere. Obste-  
trix contra, inculcare, non recedendum à con-  
suetudine, ita solenniter novos maritos suffiri,  
ut fecundiores evadant. Quid plura? vorat ha-  
mum



num Zythopeptes, & nidore illo ad vertiginem ulque se satiat. Dictum, factum; notat aggravari sibi præcordia, & in status ac tormina ventrem distendi. Ex eo perpetua jam sextum mensem colica & simul Diarrhoea laborat, omnibus viribus exhaustus, & satio, ut apparet, vicinus. Ego nuper rogatus openi, cum ex ore cum mariti, tum uxoris rem gestam audissem, execratus superstitionem foeminae, dignum hoc vanissimo inuento præmium esse respondi. Quæ cum illa fletu exciperet, signavi quidem pharmacæ, quæ usui fore ratio suadet, nisi jam tum, quod oppido credibile, hepar putridum extrema minetur. *Olai Boerhavi.*

Egregius ac virtuosus Dominus Georgius Heide Civis & Aurifaber Viennensis, rerum artificiosorum deaurationi sedulo intentus, Realgaris sulphureo ac Mercuriali per inspirationem attractio fumio, reiteratis vicibus, lassitudine ulcerosa totius corporis, tremore, & palpitatione cordis prehensus est, à me curatus, pluribus tandem septimanis apparatus equestribus deaurandis incubuisset, ac quatuor hebdomadis omnino deaurationi supersedit, præter lassitudinem totius nil sentiendo, ordinaria lenitiva ex securissimis parata, sumpta purgatione, venenatis qualitatibus à tempore deaurationis in corpore latentibus agitatis, prætatis symptomatibus, sudoribus frigidis, Lipothymia ac convulsionibus totus corripitur, nullisve proficientibus remediis, Regia cordis occupata, robustissimo corporis habitu expirare cogitur.

*Scholion*) Ut Metallarii qui in fodinis operantur, peculiaribus obnoxii sunt morbis, de quibus singularem tractatum edidit. Theophrastus Paracels. illosque erudita disputatione Lipsiæ 1652. enucleavit Coliega Curiosus præpropere demortuus Zephyrus, Leonhard. Urbinus Prof. Botanicæ: sic non minus Auri fabri, alique qui nimis crebro Mercur. tractant, aut ejus fumum quovis modo, sive per os, sive per aliam viam ad se trahunt, maximo suo damno experiuntur morbos nervos insellantes. Ut etenim si in loco clauso exponatur aureum vas, & dein Mercurius supposito igne avolsare permittatur, totus Mercur. qui sublimis in auras evanuisse putabatur, simulata fuga in aurei vasis amplexibus hære inveniatur, experientia Kircher. de Arte Magn. l. 3. p. 3. c. 2. sic non minus in ipsis evaporationibus, quæ ab istis Artificibus peraguntur, attrahitur in nares Mercur. indeque in cerebrum genusque nervosum. Unde concludit Kircher. de Arte Magn. l. 3. p. 3. c. 3. p. 635. cum Mercur. non raro in craniis in sepulchris inveniatur, esse crania talium Artificum, dum etenim in extrahendo aut præcipitando Mercur. multum sint occupati, non exiguum vaporis partem per nares excipiant, qui in frigidas cerebri cellulas receptus, ibi denuò congelascit, ut etiam post mortem tanquam in vasculis perennet, non ut Philosophastri nungentur, quod intra hominem & ubi vis Mercurius, ut materiam Lapidis sui hoc prodigio jactent inveniatur. Docet hoc Aurificis Anatomia Romæ facta; quicum summos capitis dolores passus obussit, in aperti capitis cerebro plusquam lib. 1. Mercurii reperta fuerit ex vapore ejus haurito ibique congelato. In foemina

calvaria quæ fucis ex Mercur. quotidie usa, & per biennium enormi capitis dolore fatigata, in osse calvaria 3 ij. Mercurii inventi fuerunt. Zuvinger. in Thef. vit. Hum. 1. l. f. 320. ex cardano de subtil. Quin & exterius admotus Mercur. per poros corpori se insinuat, & divisæ illius particulae rursus se uniunt, unde ex mamma cancroso Mercur. extillavit, quod laminæ ungu. mercuriale adhibita fuisset. Bartholin. c. 1. hist. 7. & Mercur. in faucibus emplastro adhærere visus est, qui antea inunctionem passus fuerat. Rhodius Cent. 3. Obs. 87. Sane post imperfectam inunctionem in Lue Gallica Mercur. in caput interdum se insinuat, ibique relictus intensissimas cephalalgias excitat, qui tandem Mercurius aureo globulo naribus, & aureo nummo ori indito (quia Mercur. auro ob sympathiam se associat, & illud dealbat) per vices extrahendus Jacoz. Obs. 13. commun. River. & ipse Laz. River. Cent. 1. Obs. 91. ex articulis vero extractionem Mercurii per applicatum aurum foliatum tentat Zacht. l. 2. Prax. adm. Obs. 128. Nic. Guil. Beckers.

Similis casus mihi contigit illi ab Excellentissimo Dn. D. Beckers præcedenti anno (vid. Ann. 1. Misc. cur. Obs. 181.) observato, in viro quodam temperamenti sanguineo-phlegmatici, 34. annorum, bonæ aliâs constitutionis & corporis habitus, qui cum suorum negotiorum perficiendorum causa per tempus aliquod ruri vitam degeret varios committens excessus in crudelitatem humorum, indigestionem, inappetentiam, pruritum ad frequentem vomitum, tumorem & inflationem stomachi incidit, sputum erat continuum maxime matutino tempore, idque album, tenax & valde viscosum, me ad se vocatum pro remedio rogavit, cujus petitioni lubens satisfaciens ordinavi illi pro digestivo vesperti sumendo 3ß. Tartari vitriolati fuscule sumendam, absoluta post unam aut alteram horam pauca & liquida cœna, ut altero die sumendum vomitorium in ejusmodi viscosis humoribus jam parumper præparatis tanto felicius succederet, nam totam materiam in stomacho hære adverti, assumpsit ille suum Tart. Vitr. quem alias assumere solebat, nam semper eum domi pro ordinaria & domestica Medicina habebat; hora ab assumpto isto digestivo in talem purgationem incidit, ut intra 24. horas ultra centies secesserit, ita per noctem corrui carnosam simul expurgasset, adeoque ob urgentiam continua animi deliquia, & virium prostrationem, adhibita omni diligentia fluxum coercere debui, qui utique stetit, ita tamen ut per tres dies sequentes bis tantum singulis diebus excreverit, vires interea se modicum valde recolligebant, 4. die circa vespertinam accessit calor ingens, & virium dejectio adeò increvit, ut venæ sectionem prohibuerim, sed videbam etiam penes aliqualem efflorescentiam, eam autem definire nondum poteram, adsuit difficultas respirandi circa præcordia, eorumque ardor & cellus manum ufferunt & tensio tactui potenter renituit, absque tamen dolore: in his circumstantiis ita constitutus ad alexipharmaca confugi, & ordinatum tale Diaphoreticum, intermixtis aliis variis Cardialibus vesperti assumpsit, & expulso sudore fetidissimo melius respirare,



maculaeque se potentiùs monstrare inceperunt, & urina turbidissima non adeo accensa minge-  
batur, cum autem idem altero mane ante or-  
tum solis resumendum ordinassent, assumpsit  
quoque, & circa Meridiem tam copiosæ macu-  
la illæ petechiales conspiciebantur, ut totum  
corpus virgis cæsum quis putasset, symptomata  
etiam omnia de hora in horam minuebantur,  
non neglectis interea tamen diaphoreticis con-  
tinuis, sed non tam potentibus, ita ut 7. die  
adhuc insuper per copiosam diarrhœam sati-  
dissimam, & variis coloribus intermixtam per-  
fecte & saluberrimè judicatus fuerit. Mulier  
quædam phthisica raræ texturæ 26. annorum,  
temperamenti cholericæ ad me venit, & consi-  
lium rogavit, satis adhuc robusta & vegeta,  
quia scalas ascendere potuit, sua etiam domi  
& extra absque adeo magna difficultate ritè  
perfecta, ordinavi illi duas uncias mannæ in  
jusculo dissolvendas cum uncia una olei amyg-  
dalorum dulcium, & assumpto hoc laxativo pec-  
torali venæ sectionem, & post venæ sectionem  
jacula ex herbis pectoralibus, & ut ulterius  
quereret illi dixi, atque ita eam dimisi: vadit  
domum & parat sibi hoc medicamentum, & illo  
assumpto ita purgavit, ut altera die etiam ex-  
purgata anima in lecto mortua inventa fuerit,  
ego hac de re nec minimum somnians inveni 3.  
die post in scheda mortuorum talem, & talem  
esse mortuam, vado ad illum locum, & quero  
causam mortis, sic nihil aliud adstantes dicere  
potuerunt, quàm hoc, quod assumpserit man-  
nam cum oleo amygdalorum dulcium in juscu-  
lo carminum dissolutam, & inde per diem poten-  
tissimè excreverit, sine tamen magna virium  
amissione, & quod altera die cum summa copia  
excrementorum in lecto mortua inventa fuerit,  
cum omnium stupore. *Joh. Gorgii Grefselii.*

Nuper ad Agrotum quendam vocatus, in-  
venio ipsum admodum debilem & morti vici-  
num. Hic ab agryta aliquo pulverem acceperat  
à quo sexagies secessit, & decies vomuit,  
tandem etiam cruenta excrevit, molestissimè  
que tenebimus secutus est, ex quibus & febre  
superveniente, insigni virium dejectione, an-  
xietate cordis, salivatione nimia, torminibus  
ventris, & dosi parva, pulverem istum Mercu-  
rialem fuisse conjeci. Hunc Agrotum, Deo  
(cui sit laus) auxiliante, exhibitis remediis  
convenientibus, præprimis verò Tinctura The-  
riacali, intra quinque dies ex orci faucibus  
eripui. Similem hypercatharsin non sine vitæ  
periculo perpessæ sunt, hic mulieres duz hone-  
stæ ex usu azot notissimi Empirici Heslingii, &  
ante paucos menses Secretarius quidam alias  
degenus hoc medicamentum plurimis admodum  
commendans, qui eo assumpto maximos cru-  
ciatus & brevi mortem sibi conscivit, nihil pro-  
ficentibus à Medico ordinario efficacibus  
etiam remediis exhibitis. De hoc azot brevi-  
bus quidem in tract. meo de varis sive Arthriti-  
de vaga scorbutica aliquid monui, sed in altera  
ejus Editione (quam quia prior multis mendis  
& crassis vitiis Typographicis scatet, atque ex-  
ceptis paucis exemplaribus distracta plurimum  
variis rarissimis medicamentis & observationi-  
bus auxi) fusiùs de eo *cum* *est* acturus sum. *Va-*  
*lenini Andrea Moellenbrocci.*

Dominus Theodorus à Barut his usus est Pi-

lulis ex Extracto solutivo, quibus alias sæpè felici-  
ter usus erat, die Lunæ dejecit ante prandium  
septies, à prandio nihil amplius, sed optimè se  
habuit; Vesperis canavit largiter, dormivit us-  
que ad mediam noctem. Tunc subito tormina  
in ventre maxima cum vomitu & sedibus mul-  
tis oborta, quæ die Martis duraverunt, & quo-  
que sequenti nocte. Die Mercurii domum re-  
diens ipsum invisi, & dedi Theriac. *Div. Croc.*  
Mart. gr. j. in jusculo; Imposui Theriac. *5j.* re-  
misit dolor, vomitus & sedes. Vesperis omnia  
rediere, & quicquid assumpsit, evomuit. Præ-  
scripsi sequens.

*℞.* Rad. tormentill. symph. mai. ana *3ij.*  
Herb. agrimon. plantag. ana m. *ss.* Fl. chamom.  
m. *ss.* verbasc. P. *ijj.* hord. m. *ss.* coq. in f. q. aquæ  
ad *3x.* col. adde Mell. ros. col. *3ij.* M. t. Ene-  
ma. Quamprimum assumpsit, omnia remiserunt,  
repetitum sequenti nocte bis feliciter. Postea  
corroborantia ventriculum dedi. Excrementa  
fuere prasina.

Hypercatharsis provenit vel culpa assumpti,  
vel allumentis. Assumpti, cum medicamentum  
sit violentum, vel non ritè præparatum. Allu-  
mentis, cum vel ille errorem committit exter-  
num, cum sc. aëri frigidiori se exponit, frigida  
nimis bibit, &c. vel propter naturæ ipsius er-  
rorem internum, cum scil. commota camerina  
viam monstratam sequitur, & ab acrimonia &  
copia humorum nimis stimolata insurgens,  
plus educit, quàm requiritur, vel vires per-  
mittunt. Et hæc ultima causa hic locum habet.  
Astringentia cum narcoticis à principio mox  
adhibuit, ideo quod vires propter largam eva-  
cuationem abstergentia non admitterent, &  
morbus in centro conservaretur. Malo vero re-  
cidivante, recollectis viribus, abstergentia ano-  
dynam & astringentibus miscuit, & ita feliciter  
malum sublatum est. Sequenti aliquando hy-  
percatharsi laborantem à medicamento violento  
à l'onsore exhibito, cum jam prodromi con-  
vulsionum adessent, liberavi.

*℞.* Aq. tormentill. *3i ss.* fol. querc. plantag.  
ana *3j.* pulv. pumic. *3j.* Syr. Cydon. *3j.* rib. co-  
rall. ana *3ss.* M. Quantum enim lapis pumex  
valeat in hoc malo sæpiùs feliciter expertus sum.  
*Dan. i. Winkleri.*

Nobilis Bataviensis, cum vespertino tempo-  
re mustum liberaliùs bibisset, nocte intensissimis  
ventris doloribus torquebatur. Postridie diar-  
rhœa accessit, quæ primò aliquod levamen in-  
ducere videbatur, sed postea accrescens, intra  
biduum in dysenteriam mutata fuit. Tunc Ager  
sibi metuens, meum consilium petiit. Exhibui  
statim hoc purgans.

*℞.* Rhabarbari opt. drachm. *ij.* fol. Sennæ  
mundat. drach. *ijj.* myrobolan. cheb. drach. *ij.*  
sem. anisi, scrup. *ij.* decocti hordei, q. s. fiat in-  
fusio f. art. adde colaturæ syrupi de cichoreo  
cum rheo nunc. *j.* Misce, fiat hauritus.

Hinc multa biliosa dejecit, & ventris tormina  
valde imminuta sunt. Vesperis dedi sequens su-  
doriferum, à quo illa nocte multum sudavit,  
quietè dormivit, & postridie ab omni dolore ac  
fluxu immunis fuit, atque exinde optimè valuit.

*℞.* Theriacæ androm. drach. *j.* philomj ro-  
mani, scrup. *j.* aquæ nostræ theriacalis, petroseli-  
ni, ana unc. *j.* Misce, fiat potio. *Isbrand. de*  
*Diemerbroëck. observ. & curat. Medic. 64.*

Quem



Quem peregrinationes Orientales, doctrina & aeris Medicæ experientia maxime nobilitant, Doctorem Leonhardum Rauvvolf Auguttanum, eadem nobis Ungaria eodem anno subtraxit: Agebat tunc copiarum superioris Aulicæ Physicum, spartam sibi commissam dubio procul satis exornaturus; nisi grandior ætas sub oneribus Medicis jam consenscentem Tyrocinium castrense subire noluisse. De hoc laudibus Julii postquam sermones miscuissimus, & ego canos venerandos pulvere castrensi deturpandos non esse confirmassem, maxime cum durius vitæ genus præsertim in castris & apud Ungaros præsens periculum minari demonstrarem, confirmabat quidem, se non modo diuturnis peregrinationibus ad quasvis externas injurias occalluisse, & idcirco in stadio feliciter hactenus decurrenti juxta metam subsistendum non esse, sed tamen paulo post Hadvvanensis aquæ, quæ summe insalubris, unico haultu intoxicatus evadere nequivit. Adscripseram hoc excrementicorum humorum sentinæ: quæ in corpore senili ut plurimum coacervata, stomacho & hepate refrigeratis, superinducta diarrhœa, cum semel enormiter profluere cœpisset, sisti deinde non potuit: cum semper fere in castris apud paulo provedioris ætatis lethales fuisset, lim expertus. Accedebat quod jam decumbens fido famulatio destitutus, partim secundum castrense proverbium: *Wer ligt, der ligt*, neglectum haberetur (quod tamen paulo serius subolsfeceram) partim ab iniquis rerum censoribus parum digne tractaretur: partim etiam curis domesticis, quæ vel ipsa morte graviore, sensim conficeretur: quarum trium catapultarum vel unicum hominem jam satis ætate gravem in castris prosternere potuisset. Vicit igitur conspirantium calamitatum violentia, sic, ut mense Septembri doloribus & continuo fluxu ad extremam maciem deductus, vix sesquipalma telluris Pannonicæ contumuleretur vix ille, qui totum ferè orbem pedibus conculcaverat, ægre de tanta mole ad contegendas corporis prædelsati exuvias unum & alterum cespitem nactus. Erat alias corporis habitu ad labores quosvis perferendos satis commodo, rerum plurimarum cognitione deslagrans, imprimis simplicium, præsertim exoticarum, indagazione, cujus causa non sine gravi & vitæ & fortunarum periculo magnam orbis terræ partem audacter obierat. Fretus igitur, ut jam dictum, peregrinationum exantlatum molestiis, quibus ad extrema quæque perferenda obduruerat, Pannoniam quoque, quam prius non calcaverat, tentandam esse, & in castris æstivandum, satis honesto salario evocatus, statuerat; quod quomodo viro optimo ut & multis aliis, qui parum se viresque suas, antequam tantis procellis vela committerent, suo pede fuerant metiti, cesserit, jam liquet. Nec tamen de salute decumbentis mox desperassem, ægro præsertim sanitati, quantum fieri poterat manus porrigenti: nisi mediis, si uspiam, certe in castris, summe requisitis, prorsus destituti fuissimus. Est enim hoc peculiare quasi Physicorum castrensium fatum, ut vel ad momentum decumbentes, fannis, imò sarcasmis, à crassi cerebri milite excipiantur, tanquam res risu digna sit, si quis inter tot decumbentium my-

riadas, ægris inserviando, sanitatem propriam insuaserit. Nam & de hoc patiens noiter p. m. conquerebatur: quod dum juxta Hattvvanum obsessis strenue tormentis detonantibus caltra longius metanda & mutanda essent: ob agros hinc inde dispersos conquirendo defatigatus, viribus vix non deficiens, aquam degullasset, ex qua lethales tandem profluviorum cataclysmi dimanarant. Ægre tamen, nec nisi multis adductis rationibus persuaderi poterat, ex aquæ unico haultu Hydram tam portentosam repululare potuisse. Ecce enim, dicebat ille, ego qui per biennium ferè inter barbaros, nil nisi sola aqua, eaque indies ferè alia atque alia sitim restinxi nunc haultulo lymphæ Pannonicæ, si Diis placet mactabor? Hos gryphos a. postquam diuturnioris desuetudinis ac ætatis jam gravioris objectu discussissem, & tamen ob pervicaciam coqui (quod genus hominum, præsertim in castris egregie protervum) indigne, ut dicam impie tractaretur, juxta Danubium tandem occubuit ille, quem Tigris & Euphrates sal. um & incolumem Europæ reddiderant.

*Scholia.*] Nemo, quicumque tandem sit, & quoscunque tandem labores & molestias perituerit, tantum sibi suadeat, ut ex Oceano sortium Pannonicarum se salvum enaturum speret. Tot n. ut sæpius jam inculcatum est, tamque variis incommodatum castrensiu cata-pultis quivis oppugnatur, ut etiam magnates, nedum Physici castrenses, servorum nempe ministri, tantis procellis sæpius manus dare cogantur. Si quis tamen rectius salutis suæ consulere voluerit, Medicus præsertim maturè sibi de mensa, vel apud pharmacopos castrenses, vel quod consultius esse, apud primores prospiciet: quod alias nunquam morbos mortemque sit evasurus. Ego quidem serio mihi gratulor, nunquam vero intermoriturus gratias ago & acturus sum Illustri & verè generoso Domino; Domino Sigfrido à Kolonitich, &c. quod heroica prorsus munificentia toto quinquennio ne latum quidem unguem à suæ Magnificentie mensa me discedere sit passus: cui quidem rei & beneficiis magnopere desideratis acceptum fero, quod inter tot molestias, diurnas nocturnasque ob ægros innumeros sanus sospesque perdurare potuerim. Erant autem & reliqui S. Magn. Aulici tam illi, qui ab officiis Aulicis, quam qui à servitiis, ad mores suæ Magnificæ conformati, ut quinquaginta ferè domestici jucunda semper pace, miraque concordia convixerimus, aliis ferè diversarum Nationum commilitonibus & Oeconomis castrensisbus sæpius interim rixis & odiis intestinis sensim se conficientibus. Confirmat ergo poeta rectè, quod veluti lituos, sic mores tota sequantur castra Ducum. Hoc enim ipsemet, tunc temporis non minore jucunditate, quam hic noiter Rauvvolfius p. m. acerbitate, & mentis ægitudine sum expertus. Quibus autem ejusmodi, & apud Pannonas corvo candido rariores vivendi occasiones defuerint, his auctor essem, ut symbolis collatis fraterna, vereque Germana familiaritate conviverent: quod etiam decurias Turcicas, quarum singulæ sub suo Duce vivunt, faciunt jam supra dictum. Dum enim hic tentorio figendo rehigendoque, ille penu instruendo, tertius focum excitando, quartus aquas



apportando, quintus coquum agendo, sextus mensam instruendo, septimus strata (quæ saepe tantum vilique apparatu constant) parando, intentus est, reliqui vigiliis, arinis & imperiis præsumunt: non mirandum est, si disciplinae iuxta rigore fraternaque conversatione reliquis gentibus hætenus palmam præripuerint. Talis enim Sympolii vel contubernij commoditate si noster hic frui potuisset, etiam ex his forsitan Syrtibus enavigasset: in quibus post tot exantillatos labores, quoad exuvias corporis quidem misere, quoad ætatem, famam & partem palmam satis mature & feliciter naufragium passus est. Arbitror tamen, si rationes secum subduxisset, utrum etiam oneri ferendo par esset, semet ad tantas molestias precipitem daturum non fuisse. Exhaustus enim jam viribus erat: peregrinationes Orientales vegetum corporis & animi calorem depallæ erant: incrotes diuturni intinas ossium medullas eliquaverant: nihil denique ad injurias castrenses perferendas reliqui erat: & tamen satis confiderent, se facilius, utpote qui jam ad labores profus occalluisset, quam quemvis alium, saxum hoc Sisyphium n. provoluturum, sibi persuaserat. Idem parvulus quidam paucarumque virium Medicus, solertis alias doctrinæ & ingenij, sibi persuaserat: sed cum fracto ponte vix undis extractus esset, & Borea fiante præter vires inhorruisset: cum frigus illud suspectum terroremque funestum aliquot meracioris vini maximis haustibus dispellere conatus esset, c. veltigio febre maligna correptus est, phrenesi, licet non nimium effera, superveniente paulo post exstinguendus: licet eundem Viennæ, ne quid durius in se statueret, sedulo præmonuisset. Inter plures autem, quibus hoc officij genus plerumque inofficiosum præstiteram, erat quoque Gabriel Pharmacopæus, ex Chersoneso Cimbriæ oriundus: cui cum statura satis procera esset, & facies pervenusta, natura ad calidum & humidum tendente, probis, licet, auræ Pannonicæ parum commodis, succis turgeret, ut sibi a castris caveret, multis rationibus adductus persuadere conabatur. Sed cum totam fere plagam septentrionalem ab extrema Livonia Caletum usque terra marique perlustrasset: cum peregrinationes Arcticas media sæpe hyeme durumque vitæ genus ut plurimum duxisset: cum laborum patientissimum se esse & fore confideret, descendit quidem, me serio dehortante, ad castra, nunquam reversurus: vix una & altera hebdomade elapsa e regione Strigonij contumelatus. Nec enim secum, quantum in aëris mutatione, distarent æra lupinis, rectè perpenderat: aëre Septentrionali frigido & sicco naturæ scilicet calidæ & humidæ convenientissimo, existente, Austrino autem tempore, & humiditate, summè scilicet ob putredinem suspensæ, præpollente. Eodem, sed nonnunquam acerbioris fato, citius quam putarant, confecti sunt plurimi: qui vel naturæ robore confisi, vel variarum peregrinationum molestiis superatis nitentes, Ungariam facile se toleraturos somniant. Et si enim sextum vel septimum insultum natura robustior interdum devicerit: tamen decimo tandem cedere, decimo quinto sæpius occumbere cogetur, cum telis diversissimis sanitas etiam adamantina passim sit expo-

sita. Et sanè documento summè evidenti possent esse reduces ex castris, qui in decensu floridis plerumque, succique plenis frontibus descendentes, cadaveroso, lurido, subgilosoque pallore ut plurimum revertuntur, turnis, aut cohortibus, non tam per hostes, quam morbos ad miram raritatem redactis. *Tobias Cæsar. Observat. Castrens. Decad. 3.*

Verò languore Pannico correptus per plurimos dies lecto affixus decubuerat Nobilissimus vir, Egenolph Stebenhaber literis & armis egregiè cultus, quem per plures annos, sex fere sub peditatu Suevico, vexillo semper summa cum laude præfuisse, memini. Ad hunc Gomorthis commorantem cum Anno 97. eodem die, quo Theodosia vix magno totius exercitus Turcici conatu, summisque viribus, post octiduanam obsidionem expugnanda cingebatur, evocatus fuisset: viribus extreme prostratis lethaliter decumbentem inveni. Iugurionum autem in quo detentus vel incarceratus potius decumbebat terræ affixum usque adeo in angustis positum erat, ut propter liberam eventilationem prorsus inclusam, & teporem viro castrensi penitus insuetum, sudorem, quem lethalem putabant, hætenus erupisse conuincere. Mutandum igitur confestim stationem edico, casula non quidem nimis ampla, sed tamen in editiore loco posita, conducta: quo, dictu mirum, cum vix deductus fuisset, eo ipso statim momento spiritibus refociliatis multo melius habere, ab eoque tempore dextris remediis adhibitis paulatim reconvalescere cœpit, integram tandem sanitatem feliciter recuperando. Cum autem tam repentinæ mutationis in melius causas altius persequeretur (nam præter pomum ambræ ex camphora paratum, & intinctum ex malvatico primo nihil ordinatum) ex aëris intercepti privatione malum incanduisse, viresque prostratas fuisse, ratiocinabar. Aere enim salubri per aliquot hebdomadas, dum Jaurinum non humanis viribus, sed nutu Jehovæ recipiendum, obsidione cinxissemus, trucebamur: cum quod alveo suo Danubius se semper contineret, tum quod jam mensibus Autumnalibus & primo frigore tellure constricta per liberam planiciem, auras, pro ratione loci, salubres imbiberemus. Qui igitur sub dio, puroque Jove & papillione persalabili quatuor ad minimum menses vitam duxerat, ad cordis animoli vegetique vigorem rescindendum liberissimo aëris attractu opus habuerat, postquam parum caute arctiori ergastulo inclusus fuisset, ob vicissitudinem tam molestam non poterat non pejor habere, & tandem vix non de salute desperare. Accesserat & alius error, quod ob morum elegantiam plurimis gratis acceptisque raro absque turba altantium fuisset: quorum alii moras diu neciendo naturæ, alij multum colloquendo viribus sæpe vim facientes, malum exacerbant: cum præsertim ob angustiam loci aer per se corruptus, facile conquari posset. Fatebatur autem, postquam jam languore devicto, pharmacis exhibitis, vires malo superiores essent, se primo mense Augusti ob esum cancri ex ripis uliginosis Arrhabonis canosi, extracti, & in olla cocti, nauseam contraxisse: cui opinioni eo promptius astipulabar, quod idem flumen in reditu ab expugnata Papa tran-



transiens, stupendæ magnitudinis cancri male cocias carnes degustans ob fœdum mephitim, quam eructabant, eundem fere languorem incurrissem, nisi mox generosioris vini cyathum superbibissem, & reliquos, ut de tam suspectis cupediis abstinere, deterruissem. Et est quidem Arrhabonis alveus eo loci incredibilis lenitatis ut illud, quod Cæsar de Arari, quod utram in partem fluat, oculis distingui non possit, fere de hoc nostro dici possit: profunditatis vero tantæ, ut equum cum fessore, prima ripa penitus absorperit, pisces vero licet multos, putre tamen cœnum spirantes, & ulvam semper olentes producat. Hismiles quidam retia positurus cum hamum altius depressisset, fortuna favente ~~extraxit~~ Turcæ, in aquis suffocati, extraxerit, quod in oculis ex crate dependentibus ad centum coronatos piscatori obtulit. Hunc aureum tripodæ casu fortuito oblatum cum simioli quidam æque quæsituri essent, unus & alter submersi, plures morbis maxime spasmodicis correpti sunt. Erat inter hos noster Georgius Martius Augustanus, qui natatu dumen, cujus naturam & latitudinem nondum cognorat, transiens, vix salvus nobis redditus, cum recalesceret nullo modo posset, in gravem spasmus incidit: quemadmodum & hujus Sympatriota Domini nostri Signiferi Locum teneus, vir egregie macilentus, qui vix crebræ olei vulpini inunctione, ab intempestivo natatu relarciri potuit. Ut autem ad hunc nostrum Dn. Signiferum Egenolphum revertamur: cum foeliciter, Christo medicante, ex hac Charybdi enataisset, Anno 99. mense Augusto in Scyllam magis periculofam incidit: partim ob mororem ex obitu cognati Nobilis de Freiburgk: ut in seq. observat: partim ob contagium, postquam in eodem tentorio prædictus juvenis p. m. diutius decubisset tandem vero fatis quoque concessisset. Corripiebatur, n. diarrhœa ex succis Melancholicis, quibus à natura scatebat: quos cum omnium primo evacuandos esse dixissem, nostro vero Dn. Signifero res parum tuta videretur, non prius acquievit, quam rationibus convictus, pedibus in nostram sententiam ivisset. Exhibebamur, sæpius de die brodium pisorum saccharo edulcoratum, in quo epithymus, cujus magnam vim Augusta ex consilio elegantium Medicorum laudatiss. illius Reipublicæ secum sumperat, decoctus erat, quod tam ad absterfionem feculentæ materiæ, quam ad dolores mitigandos non parum faciebat. Conservæ autem rosar. antiq. quæ lib. 1. decumbenti ad manus erat, ut sæpius quantitatem nucis juglandis assumeret, suadebam: cumque diutius fluxus instaret, ut cibus amygdalatis & oryza in aq. chalybeata coctæ, tetræ sigillatæ nostratis parum inspergeret, concedebam, splene tamen, ad extremum, ob crebram puto refrigerationem in secessibus, cum prius nihil malisensisset, Ol. capparum calide sæpius inundo. His enim ab omni molestia liberatus pancreaticæ deinde vixit, singulari me benevolentia non sine honesta laboris nostri remuneratione semper amplectens.

*Scholia.*) Repentinam omnem mutationem summopere suspectam, naturæque invisam esse, per se liquet. Constat & illud, primas in his

aëris vicissitudines, præsertim in qualitatibus activis obtinere. Actum igitur fuisse, cum hoc nostro vexillifero, qualibuscunque remediis morbum aggressi fuisset: nisi repentina mutatione remora, aëris liberioris & conducti attractu eundem, quasi in integrum restituissemus. Ad causas igitur protæarcticas Medicus castrensis plus fere semper, quam ad ~~peripneumoniam~~ respiciat: quod apud imperitos rerum plurimum ex illis, perparum ex his exillationis sit conquisiturus. Quin vel ipsemet postquam senis fere mensibus annuatim in aëre, libertino licet, circa Calend. Novemb. acerrimo, sub tentoriis & dio, duriss. visque stratis, vitam, ut uno verbo dicam, castrensem duxissem, Vienne, vel Strigonium p. scam Romanorum legionum Coloniam & Itativa rediens, ægerrime capistratum, conclavibusque incarcerationum aerem primo periebam; somnum vero ne quidem ad breve momentum, nisi fenestris undiquaque patentibus capere poteram: pluvias & delicatioribus stragulis non sine sudore & angustia reassuescendo. Quid vero in arcibus & oppidis limitaneis eventurum putes? ubi plerumque profundioribus fossis & restagnantibus lacunis, vallisque contra barbarorum insultus munitis casula: mantionibus prædiorum destinatæ in summas angustias sunt redactæ, sic ut plures Gomorrhii, Nova domo, Jaurini, Strigoni, Facia, & alibi in ejusmodi cancellis pectus se habuisse, imo plurimos occubuisse viderim: qui forsitan aeris consueti, licet inclementioris assuati servari potuissent. Videbis quoque plerosque talibus ergastulis circumseptos, etiamli prospera valetudine, militari tamen fruantur, lurido pallore deturpato: quod mapalia plerumque summe angusta liberioris aëris usum penitus excludunt: cisi per se quod milites inculcatum, aër Pannonicus sit suspectissimus. Sanctius igitur veterani, qui diutius in excubiis stando limites superiorum annorum parum tutis induciis defenderunt, tractari deberent: quod homini vere Germano plurimi constet, tam contrariis è diametro rebus, exsulta fere tota natura assuescere. Rectius quoque Ungari facerent, si non tam sarcasmice debilitatem exterarum Nationum famis exciperent (ut sæpius non sine stomacho audiivi) quod omnibus exteris plus semper cum Morte undiquaque imminente, quam cum Marte negotii esse soleat. Nec enim dubitaverim, sancta fide & experientia oculari suffulta, confirmare unicam Legionem Suevicam, quatuor semper millibus, ut supra dictum, constantem, secure quadraginta Turcarum millibus, Jehova non repugante, in acie opponi posse: si eodem corporum vigore, quo sæpius Viennam transisse vidi, recta ad manus cum hoste conferendas deduceretur. Magna est, quod asserui: cuius tamen cordato rationibus evidentissimis facile demonstrandum: si præsertim res in pagna stataria ad triarios rediret. Sed de his alibi fusiore colo: ad funestam lethalis Diarrhœæ Tragœdiam perveniamus.

Cognatus hujus Domini vexilliferi Nobilis Juvenis à Freiburgk, &c. ætate, forma & opibus florens vix 18. annorum, experientia conquirendæ causæ sese ad servitia Generosi Domini Marakisch Junioris, tunc Signiferi eque-



Itis sponte sua volensque contulerat, parum tamen secundis auspiciis. Cum enim etiā contra mentem & edicta Domini, satis alias munifici in suos & perbenigni à conservis parum humaniter tractaretur: primo in linguam Pannonicam, verum nimis funestum incidit: ex quo postquam jam ad extremam maciem deductus fuisset, vix & ægre ad primum declinationis limen pervenerat, multum olei & operæ frustra perditis. Nam stomacho adhuc ob reliquis morbi vacillanti cum male coctas carnes hœdinas insarisset, gravi mox diarrhœa correptus est, quæ paucis diebus viribus jam satis prostratis, juvenem egregium consumpsit: postquam ex tentorio, splendido quidem, sed decumbenti parum commodo, ad cognati Domini vexilliferi nostri mansionem certas ob causas delatus fuisset. Commigrabat autem ad superos mente & summe integra, & sensibus apprimè constantibus: quod in omnibus ejusmodi profluvii succumbentibus semper fere evenisse reminiscor. Hoc unico diuturnorum dolorum sævitiam rabies Pannonica mitigare velle videtur: sanam scilicet rationem in corporibus lethaliter agris vel in ipso agone conservant. Potuisset tamen nobilis hic juvenis ex his Syrtibus enatare languore jam ad declinationem magno molimine deducto: nisi externo errore denuo prostratus, recidivam, semper fere apud Ungaros, ut in Scholio dicitur, lethalem incurrisset: talem præsertim recidivam quæ corporibus convalescentibus præsentissimum periculum intendere solet. Quid enim citius titubantem valetudinem prosternere posset, quam alvi profluvium, fundamentum scilicet summopere requisitæ nutritionis primo ictu evertens? Diu tamen hic noster de Freiburg. p. m. cum morbo de summa rerum depugnabat: partim quod ætas florens naturæ colluctanti gnaviter suppetias ferret: partim quod in tentorio Domini cognati Signiferi dicta, & omnibus requisitis pro ratione loci egregie tractaretur. Panatellis enim ex oryza contusa, amygdalatis, jecusculis tostis trisque pro cibo, lacte amygdalato, chalybeato & similibus pro potu, Conserv. rosar. antiq. pro refectioe cum alternatim, & quidem sine intermissione usi essemus, fatum præsens magis protraximus, quam devitavimus. Et sane nisi altantium crebris interpellationibus ad omnia extreme molienda compulsus fuisset: à jam desperato facile abstinuissem: cum præsertim castrensis cujusdam pietatis sit, lethaliter decumbentem non diutius sub infestis doloribus demorari. Hoc tamen boni apud hunc nostrum ægrum ex admotis & assumtis consequeremur, ut sapius à doloribus respirare posset, & viribus una simul collabentibus agon satis atrox futurus, multum mitigaretur. Decedebat enim quasi dormiturus, salutatis omnibus, & quidem, quæ alba cornice in castris rariores, inter sacras meditationes Dominicæ passionis: ad quas bonus hic juvenis non minus pie sancteque confugebat, quam easdem blasphemi plerique veterani scelerati sani valentesque nequiter conspurcant.

*Scholia.* Recidivas, si non omnes pleræque tamen in Ungaria lethales esse, nemo dubitaverit. Si enim prima statim acie morbi Pannonici mor-

tem intentam videmus, quis hæsitabit, si jam natura vix non prostrata receptui cantatium fuerit, recenti hoste superveniente de victoria plane desperandum. Quoties igitur nondum prorsus recollectis viribus ad convalescentes, revocabar, toties periculum semper exaggerando, vel præsens exitium minitabar, vel si in re lautior essent ad aeris mutationem palmarium semper in recidivis obtinentem sedulo exhortabar. Sex enim rerum non naturalium dexter usus, si uspiam, certe in recidivis Pannonicis, summe requiritur. Nam quod ægetrime imbibitum semel viri summe noxium aeris inconstueti, nisi manifesta alteratione facta revellatur, cum per se verum, tum ex superioribus satis constat. Aer igitur apud omnes, quos in memoriam revocare possum, qui recidivis succubuerint ante omnia mutandus fuit: cujus tamen mutatio non semper illud, quod volebamus consequeretur: etsi plurimis maximas morborum & symptomatum vicissitudines induxerit: neutra quidem sanitatis dispositione constitutos plures non iustæ dignitatis vires castrenses athleticè convaluisse memini, nullis prorsus pharmacis assumtis: si modo ex impurissimo castrensi, & Pannonico aëre ad longe defecatiorem Austriacum reducti fuissent. Ad idem feliciter Dominum Dn. Adolphum Schvartzbergium, cujus memoria in benedictione sit, impellebamus: eundem ex insaluberrimi aeris Hartvvanensis contagiis jam cum morbis consuetantem Anno 56, ad montana superioris Ungariæ castris educentes. Hic enim ut plures alii nullis fere nisi diutæ tantum legibus observatis paucio tempore respiravit: quem in eodem aëre subsistentem vix magno molimine fati eripuissemus. Sanitas autem neutralis cum recidiva quod *ἀνὰ πρὸς*, quid & affine sit, est in confesso: quod hæc in eisdem terminis in declinatione, quibus illa in accessu morborum sit constituta. Hanc autem plerumque apud Pannonas frustra de vita veris, illam consequeris: præsertim in externarum nationum curationibus: nisi vel ad aeris alleviationem, vel mutationem omnium primo respexeris. Cibos quoque ad recidivas castrenses plurimum, si non omnia, posse vel ex hoc nostro Freiburgio liquet: qui carnibus hœdinis (hæc tamen in delitiis castrensis, quam recte, quis non videt, esse solent) titubantis adhuc valetudinis systema prorsus evertit. De cibis enim munde, laute & salubriter præparandis, altum sit silentium, in castris: præsertim apud ægros, aut jam reconvalescentes, quod hi plerumque torvo aspectu enecti, à conservis parum pie, ut hic noster tractentur: illi vero passim supine negligantur, imo pro catharmatis habeantur.

Locuples hujus rei testis erat Nosocomium castrense consilio, majore pietate, maximis sumptibus Anno 97. sapienter, pie, munifice constitutum: si eventus, aut illorum, quibus res tanti momenti concredita fuerat, fides & diligentia, votis Reipubl. Christianæ correspondissent. Opinor tamen ingenti decumbentium multitudine, illos quibus res concredita fuerat, implicatos, munia sua dextre obire nequivisse, sic, ut Nosocomium illud, vitæ, salutis, sanitatiq. militari consecratum in Cœmeterium cunctis



cunctis vix illatis aut inspectantibus cederet, Bos enim integer prandii coenæque tempore vix non cum pelle & carnibus alieno fructatim injectus, decoquebatur: hujus jurulenta frusta promiscue cunctis in terra prostratis agris obtrudebantur, tanto successu, ut neminem, plane neminem, testor fidem, in illo Nosocomio sanitatem recuperasse, sed omnes una cum astantibus, Medicis, Pharmacopolis, Chirurgis, curatōribus, ceteris denique omnibus interuociva clade deletos certo sciam.

Idem de Potu iudicium esto: cujus vel unicus haustus intempestive, vel parum caute sumtus ad recidivas lethales reducere potest.

Sic cum Capitaneus Holtzapffel vir meliore sorte dignus, ex morbo gravissimo convalescens regione Plintenburgii multum vix pitississet, in enorme ventris profluvium incidens, ex recidiva vix restitui potuit: frustra tamen: cum paulo post à licariis in rate propria cum tota familia de nocte fuerit confossus. Vina quidem, cerevisia, Julep, nulla, aquæ coctæ & crudæ, quod tam agris, quam reconvalescentibus in Ungaria, suspectissimæ sint, sæpius jam diximus: & tamen his sanitas conservanda & resarcienda, æge vero fluctuans in æquilibrio quasi conservanda est. Motus quoque & quies non penes ægros aut morbis ereptos, sed penes rigorem castrensem, aut impotentem dominantium Ducum, vel procaciter insultantium sodalium & commilitonum importunitatem, locum merentur: quemadmodum & somnus vigiliæque modo ab hujus, modo ab illius censura & arbitrio dependentes, facillime ex Charybdi in Scyllam quosvis ne dum ex Erebi faucibus vix ereptos præcipites dare possunt. Excretionem quoque quas interdum sanitatis dæmon verecundia, interdum occasiones impediunt, plures ad recidivas impellere posse vero verius est: sic magnæ exstimationis Baro quidam cum post morbum satis gravem mentis affecisset, & paulo plus adbibisset, non tamen ob verecundiam naturæ, urinæ excretionem urgenti, manus dare veller, paucis horis extinctus est, non sine gravi tumultu. Quod vero Pathemata animi in castris tanquam Oceano cunctis totius orbis procellis liberrime velitentur, vel laxis & calonibus notum. Ubi enim major perturbationum animi sentina confluerit, quam in castris: quæ vix non ab horum nutibus & imperiis prorsus dependent: imo ex earundem Tyrannide sortis utriusque progressus semper plus, quam ex ratione assumare solent. Quam multos igitur, vel ex horum tantum Pathematum *nudis* recidivas incurrisse putabis? cum sæpe ex eorundem furis etiam sanos viribusque valentes lethalibus morbis corripit & extinguere viderim. Forfan & huic nostro liberaliter educato, candidique pectoris juveni, minus cognitis calumniis & technis mætores insueti accreverant: ex quibus primi languoris fomentum conceperat: quod luculenta flamma depastum, tandem tamen sub favillis delitescens, iisdem foliis denuo sufflatum usque ad Charontis cymbam defecit. Sed manibus sat datum: ad vivos redeamus. *Idem ibidem.*

### Anatomice inspectiones.

Homo tres septimanas afflictus complicatis morbis, Hepatici Fluxus, Lienterix & Diarrhææ biliosæ comitatis acutissima febre, curæ commisit quatuor Medicorum, quorum consilio phlebotomiam, cathartism, & clysterem sustinuit, quantum ei conlucere judicabant, sed tandem ita in pejus morbus ejus degenerabat, ut motu, sensu & sensu æger privaretur, & evomeret quæcunque ore haurerat, quare desperantes, idque declarantes coram paucis viris celebribus, consentiebant in experimentum transfusionis, a necessariis ægroti propositum, tanquam ultimum refugium omnino nolentibus refugere rem probabilem quæ à morte redimeret Virum morti proximum: Dom. Dionysius & Emmeray rogabantur ut hujus operationis curam gererent: illi vero considerantes ægri statum deploratum, omnino renuebant tentamen illud aggredi, allegantes Transfusionem non posse restaurare partes solidas, vel mædici gangrænæ, quæ verisimile erat intestina ejus esse affecta, debuisse eam adhiberi citius, eoque ipso tempore quando æger passus fuerat ingentes sanguinis evacuationes: sed his omnibus nihil obstantibus, obnixè rogabantur ut desiderio ipsorum satisfacerent & non sinerent amicis eorum mori antequam adhibita remedia quævis possibilia: Illi itaque hac instantia solliciti, honore & salute sua asserta per declarationem supra memoratam Medicorum, & consentium eorum in tentamen ejus experimenti transfundebant in venas ejus exigentem quantitatem sanguinis Vitulini, idque tempore matutino, quo facto, licet æger jam pateretur lethargiam & convulsiones, & debili depressioque admodum pulsus gauderet, ecce tamen inexpectatum eventum: Pulsus ejus in momento elevabatur, & vegetior fiebat, convulsiones ejus desinebant, vivide ipse contemplabatur adstantes, colloquebatur apposite in diversis linguis cum his qui ipsum alloquebantur, & profundo placidoque somno obruebatur. Experrectus post tres quadrantes horæ hauriebat aliquot juscula in diei illius partem reliquam, nihil evomens, nec ventrem exonerans, cum tamen per tres priores dies nihil potuerit ore assumere, neque refectus fuerit vel minima intermissione profluvii ventris sui ab initio morbi ipso: Cum hæc conditio ægri perseverasset 24. horas, robur ejus denuo diminuebatur, pulsus remittebatur, & profluvium ventris redibat: Tum amici illius Transfusionis reiterationem urgebant, quæ tandem proximo mane peracta, æger revera recuperabat nonnihil vigoris, sed haud diuturni, nam etiam si tunc optimè jusculum suum assumpserat, sine vomitu, profluvium tamen ventris persistebat, & circa meridiem magis in pejus declinabat, donec circa quintam horam vespertinam moreretur sine ulla convulsionum observatione.

Cadavere ejus dissecto, Ileon ejus compereiebatur conversum à capite ad calcem, & infra nodum illum ad Anum intestina omnia erant livida, gangræna corrupta & extremè foetida: Pancreas ejus summe durum erat, & ita obstructum, ut succo Pancreatico non fuerit



libet transitus qua se diffunderet in intestina: splen ejus admodum crassus erat, & Hepar grande, & alicubi lividum. Cor valde siccum & quasi tostum: Reperta vena, qua Transfusio fuerat facta, à sectione in brachio usque ad cor, nihil penitus sanguinis offendeatur, uti nec in aliis venis, nec in ventriculis cordis, quandoquidem exiguum illud sanguinis intuli fuerat imbibitum a carne ejus inflammata & arida.

Illustr. Baro Ferdinandus ab Henausen, cum inflammatorio Hepatis affectu, febreque continua, tertium & intra annum recrudescente tenebatur, toto morbi decursu aquea biliosa profuse reddidit.

In cadavere ejus inter alia cacopragiz viscerum indicia, Jecur immani tumore extuberans repertum: Cujus superficies quidem tota duos circiter transversos digitos victa prorsus flaccidaque, & mollis prementi manui apparuit: Interius autem corpus ligni instar durum & retorridum prorsus. *Carolus Piso de morbis & fero sect. 4. cap. 1.*

Quidam fluxu alvi laboravit, sexto post anno interiit: Multis vomitis obsessum erat Hepar, & pars mesenterij syderata erat. *Hollerius cap. de alvi fluxibus.*

Thomas Wilson, annos 30. natus, diarrhœa laboraverat. Hujus cadaver dum secamus, hepatisque separationem à diaphragmate (cui latè adnascatur) molimur nondum aperto eo Tumor amplius, Atheroma dictus, comparuit: Situs erat in gibba hepatis parte, proximè posticam diaphragmatis regionem, juxta cavam venam, figuræ erat rotundæ, & pugno propemodum æqualis, à reliquo hepatis parenchymate liberatus: Pependit uncias quinque, drachmas sex, & grana tredecim: tunica ejus cuti verè crassitie erat comparabilis, materię duo genera in se complectebatur, utrumque crassum valde & minimè fluidum: alterum gelatinæ instar translucidum: alterum vero cremori spisso aut albæ pulculæ persimile. Dicebatur homo Diarrhœa laborasse.

Quum ingens est inflammatio jecoris, manifestæ & vehementes omnes notæ apparent, quum verò exigua, obscuræ & exiles: Szpè enim Jecur animadvertimus Tuberculis & Abscessibus instar furunculorum obsideri, nullo hypochondrij dolore, nullo tumore, nullo decubitu difficili: Febris solum inerat non admodum ardens, cum siti, cibi fastidio, cumque alvi bilioso profluvio, in menses interdum multos perseverante, ut idcirco difficile id mali, quemadmodum & substantię corruptela ab intemperie calida, aut ab obstructione internoscere. *Fernelius Patholog. lib. 6. cap. 14.*

Aperto cadavere filiolæ Dom. Scaronij Consul, quæ duos menses integros diarrhœa laboraverat & febricitaverat, Inventum Hepar incanduisse præ calore, ut esset friabile: Et cum nata parente utroque sit valde bilioso; cyllisfellis amplior omni opinione erat, pro rata singularum partium portione: Pulmones aliquantulum adhærebant, cæterum erant integri, quod mirum, cum humidissimo esset cerebro & multum tussivisset: at credo tussendi inane hoc desiderium à fervore hepatis fuisse: quod notandum, alioqui vix incolumes esse potuissent: Uterque ren lapidosus erat, trianguli erant

lapides & inserti in substantiam renis: Alvus variis excrementis toto tempore fluxerat & *incuria mulierum*. Incuria mulierum, quæ accersere Medicos nolentes, in trivialibus suis remediis spem posuere, tacite & clam totum intestinum rectum sideratum erat: In cerebro, pote humidore, inventa est aqua multa. In hoc peccasse videntur Medici, quod ætacula impediti venam non secuerint: Nunc scire oportet in pueris, etiamsi assiduitas febris adsit, si de interno fervore constat, & caloris corruptentis dominatū, tuto venam aperiri. *Gualteri. Ballonius Epid. lib. 2. pag. 140.*

Uxor D. Poussépin Consiliarij Regij, hora 10. matutina conqueritur de importuno alvi fluore: suadeo ut decumbat, quia motus augeat fluorem, & dejectiones reservat. Erant autem similes aquæ albæ, chylosæ quidem, sed liquidæ: implebat magnam pelvim quoties deiciebat: Territus hoc symptomate, postulavi ut seniores in consilium vocarentur: præscripti sunt iitus adstringentes, sacculi, julepi, expressum rhei pro die sequenti: dejectione frequenti & copiosa vires paulatim collabuntur. Ante mediam noctem interiit, cum illa nihil minus quam de morte cogitaret.

Ut explorarem causam mortis tam subitæ & inopinatæ, impetravi ut corpus diffecaretur: Inveni ventriculum in suo fundo ulceratum. *J. Riolanus part. meth. med. sect. 3. tract. 1.*

*Diarrhœa à Callo intervenas mesaraicas nato.*

Petrus Aldimarius filium habuit, qui cum octayum jam ageret annum, in corruptum incidit appetitum, quo calculos ruderaque comedens, in lentam tandem febriculam incidit, indeque procedente tempore, & ventriculus non continere, & venter fluere cœpit: Adeoque duobus his malis vexatus est puer, ut paucis etiam diebus è vita excesserit:

Hujus nos cum emortuum corpus incidissemus, repertus callus inter venas mesaraicas, à quo cum venæ ipsæ obstruerentur omnes, ut ferri inde sanguis ultra non posset, necesse fuit puerum è vita migrare. *Benivenius de abditis cap. 37.*

*Diarrhœa ob Mesenterij glandulas tumidas, Hepar tabidum, &c.*

Catharina Matheligs fœmina Leodiensis 15. annos nata, post hecticam Diarrhœam vehementia sublata, ad interiorum examen ansam dedit. Viscera omnia flaccida, præcipue cor & pulmo: In dextro pulmonis lobo vomica: Intra pericardium verò, ubi membranæ mediastini cordis basi annectuntur, glandula Thymi nucis juglandis magnitudine solida densaque latebat: Reliquæ in mesenterio glandulæ majores solito, aliæ Atheromatum materia plenæ, aliæ pure concreto, tam candicante quam ad nigrorem vergente. Plurima aqua pericardio uerat, cordi paucus sanguis: Renes flaccidi, ureteris utriusque extra renem exortus amplior, nihil tamen sabulosi in renibus aut vesica deprehendebatur: Omentum omni pinguedine expoliabatur, Hepar tabidum: Uterus minimus & durus: uterque testiculus gracilis: vasa colli & fundi tenuia, quia necdum mensium fluxum passa fuerat. *Bartholinus cent. 3. observ. 99.*



*Diarrhœa à Pancreate scirrhus, Mesenterii vitio.*

Marcellus Sacchetti (*de quo lib. i. tit. de Phthisi. observ. 88.*) inter alia symptomata, Diarrhœa laboravit: quæ omnia partim invexere gracile mesenterium atque omentum, partim scirrhus, pancreas, &c. *Severinus de abscess. pag. 173.*

*In viri Diarrhœa, fluxu sanguineo, &c. affecti, ductu Pancreatico calculi reperti.*

Nobilis 30. circiter annorum, melancholicus, catarrhis admodum obnoxius, vini ac fructuum horariorum intemperanti usu, incidit in vomitum & Diarrhœam, quibus per intervalla subsequēbatur fluxus sanguineus, unde viribus ejus magis magisque deficientibus 10. die valetudinariam vitam cum morte commutavit.

Dissecto cadavere in Pancreate, circa exitum ductus pancreatici in intestina, septem vel octo calculos, majoris cicoris magnitudinem habentes reperi, Anno 1607. *Regnerus de Graf, Tract. de succo Pancreatico cap. 7. Ex communis. D. Gaien. Chirurgi Parisiensis.*

*Diarrhœa abscessum in ventre sequuta.*

Per frequentes Anatomes in Xenodochio sum assecutus, nasci interdum abscessus nobis reconditos, quorum materies diutissime velut inclusa membranulis teneretur, quos ipsa humorum copia vel edax malignitas sibi efformat, inter diploides pleuræ, peritonei, cujuscunque meningis alterius, ut evidenti exemplo patuit in cadavere D. N. cui ex percussione, dum juvenis esset, equinæ calcis in ventrem, locus tactus est imbecillior: senectutis tempore fluxio nata, in diurni abscessus speciem transit, ac suppurata demum erosio membranulis, & peritonæo in cavitatem abdominis decidit, unde paulatim putrefactis intestinis ac diarrhœa superveniente decessit. *Gemma in casu mirabili de puella Levantensi.*

*In quodam post Diarrhœam extincto obstructa à calculis cystis fellea inventa.*

Vidi in Episcopo Malleacensi, qui Diarrhœa biliosissima per tres septimanas perseverante sublatus est, intra vesiculam felleam arefactam tres lapillos durissimos: quum tamen ad ultimum vitæ spiritum frequenti dejectione biliosissima vexatus fuerit: Nec aliunde fluebat biliosum excrementum quam per canalem bilium ab hepate in intestinum directè protensum. *Riolani Antrop. lib. 2. cap. 10. pag. 215.*

*Post Diarrhœam malignam ventriculi fundus maculis obsitus repertus, & Fistula tres in intestino recto.*

Quidam cum longo tempore Diarrhœa vexatus esset, nec quicquam aliud quam aquam bibere auderet istum melius valere visus est: Si verò vel vinum vel cerevisiam biberet, statim alvus largiter solvebatur: Interim & vitro antimonij à Chirurgis exhibitio sæpè usus fuerat:

Variis tentatis remediis, præsertim syrupis, statim pejus se habuit, imò postea à levi causa, vel cibo aliquo minus salubri, vehementer affligtus fuit: Is cum me convenisset, & consilium petiisset, spiritum ex Vitr. Mart. destillatum aliquoties exhibui, qui illi non parvam opem attulisse videbatur: Interim Pharmacopœia illi non accessit, & persuasit ut duas uncias mannæ ebiberet, fore ut statim subleretur, quod & me inscio fecit: Epota ea plusquam quinquagesies alvus soluta hominem eadem die sustulit.

Cadavere aperto, viscera omnia salva reperta sunt: Pulmonum tamen lobus dexter lividior: ventriculus autem in fundo plusquam ducentas & amplius maculas rubicundas discretas, instar petechiarum macularum habuit: In intestino recto fistulæ tres, de quibus ille jam per annum ferè conquestus fuit, vanam operam Chirurgorum & Medicorum implorans. Suspicio annon maculæ illæ malignæ fuerint? nam intestina ita elota fuere, ut nec excrementi quicquam apparuerit, nec in ventriculo quicquam nisi duo vel tria cochlearia cerevisiæ cum pane, quam ante dimidiam horam quam moretur, acceperat, repertum & planè omnino naturaliter se habebant: An maculæ illæ in causa fuerint ut tam subito vel potius vel cibis contrarius ingestus in fermentationem ageretur & natura stimularetur ad exclusionem? Nam quantum memini, nec cibum, nec coctæ, nec chylum reddidit, sed acriores humores & liquida multa ejicere solitus erat. *J. Paterson Hain in Miscellan. curiosis anni 1671. observ. 115.*

*A Diarrhœa mortui anatome, cujus ventriculi fundus sideratus repertus, Colon variè affectum, &c.*

Ultra annum Nobil. Vir de Rents, aulæ Archipincernæ, male habuit, per sex tamen ultimos menses lecto affixus fuit: Initium morbus sumplit ex prolapsu in lumbos, namque ab eo tempore dolores in regione lumbari sentire cœpit, ut tandem claudicaret: Exterior nullo contusionis vestigium notari poterat, dolor tamen quotidie crescebat: Accedebant tandem horrores febriles: Verum cum à medicamentorum usu abhorreret, molestias hæc vel deambulationibus, vel compositionibus, imprimis bono haustu vini Rhenani pellebat. Olim aliquoties ischaticis nervis laborarat, hinc consuetæ & experta sibi remedia adhibebat, à quibus aliquantulum, sed parum levabatur: Tandem accedebat Diarrhœa vehementissima, absque ullis tamen torminibus: excernebat multum sanguinis grumosi: Cum morbus invalesceret *D. Hermannum Conerdingium*, Archiatrum Quelicum, consulebat, qui remediis ex arte administratis id præstitit ut sanguinis effusio minor fieret: Sed mortuo Conerdingio dolores in intestino recto accedebant, quos cum explicaret, hæmorrhoidas internas affici nemo non judicabat: Huic fini hirudines ano applicatæ, unde etiam aliquod levamen: manebat interim Diarrhœa, nec sibi se patiebatur: Recrudescens vero postmodum doloribus, cum Chirurgus speculo dilatatum anum accuratius inspiceret, cognitum est totum intestinum rectum

hinc



hunc inde carunculis instar glandularum obfideri, quæ attractæ sanguinem cum intensissimo dolore fundebant. Et licet aliquando remediis ex arte adhibitis tollerentur, nihilominus intra 24. horarum spatium regenerabantur: continua Diarrhœa non parum etiam curationem morabatur, nec tamen sisti poterat: Si sistebatur, insignes cordis angustiae accedebant, ut necesse esset enemate immissio anum iterum stimulare, quo adhibito horror per bihorium durans sequebatur, redeunte postmodum Diarrhœa consuetâ: Tandem veniebat febris lenta & continua, cum dejectione virium & appetitus: Per tussim purulenta ejiciebantur, faeces præter voluntatem prodibant: Urina cum difficultate exercebatur, ejusdemque sedimentum album erat instar cretæ: Ultimo, in dextra lumborum regione apothema generabatur, quo aperto materia prodibat inconcocta & fetidissima, ut nemo astantium illam ferendo esset: Tumor etiam crurum, & inflatio abdominis insignis, mortem præcedebant.

Sub finem anni 1669. dissectum est Nobil. viri cadaver: Cum aperiretur, ingens copia flatuum prorumpibat, cæterum quæ sequuntur observata fuerunt. 1. Omentum, sanum licet & optimum, non tegebat omnia intestina, sed inter ventriculum, & colon convolutum erat. 2. Intestina, præsertim crassa, summopere a flatibus distenta, pellucida erant instar vitri: 3. In colo paucissimæ cellulæ observabantur. 4. Ventriculus in dextro latere situs erat: In fundo ejus gangræna observabatur: Substantia ejus tenacissima, tria quoque in ipso foramina observabantur exigua, ac si acufacta fuissent: 5. In fine Coli itidem aderat gangræna, & ibi loci laterat nleus, quod paulo ante obitum ruptum, uti ex rejecta materia observari poterat. 6. Hepatis color à naturali multum differebat: vesicula tamen fellis optimè colorati copia referta erat. 7. In Liene initium scirrhi. 8. Pulmones mucro tenaci & albi coloris planè erant obditi, in sinistro latere planè purulenti: In dextro latere inflammati erant, sicut esse solent in iis qui pleuripneumonia correpti moriuntur. 9. Cor magnum erat & adiposum, fibræ tamen carnes aderant, ut nondum desinueret esse musculosum. *Alardus Hermannus Commentus in Miscellan. curiosis annis 1673. observ. 118.*

*Diarrhœa ob corruptionem Coli & Tenuium intestinorum, inflammationem sequutam eadem omento non cooperta, Tumorem huic adnatum, &c.*

Anno 1663. die 9. Julij Clar. Sylvius secuit Apolloniam Simons vetulam, quæ continuo alvi fluxu per septem hebdomadas laboraverat, in sectione sequentia notabantur: Vena umbilicalis coaluerat cum peritonæo: Linea alba cartilaginea erat: In sinistro latere sub ventriculo Tumor magnus & rotundus, ovi asserini magnitudine reperiabatur, omento adnatus, qui dissectus continebat materiam variam, maxima quidem parte viscidam instar concretæ pinguedinis, aliqua gypseam, minima autem mellis instar fluidam & luteam: Omentum sursum erat retractum, ut intestina nuda conspicerentur: In intestino Colo nigredo apparebat,

forte corruptionis signum. Intestina tenuia valdè flaccida erant & coloris obscurioris, aliquibus in partibus magis rubebant, ubi forte fuit inflammatio: Intestinum tenue, per quod sub mesenterio sinistorsum ferebatur, profunde admodum situm erat, & usque ad sinistram renem penetraverat: Folliculus fellis bile satis plenus erat, sed pallidiore: Quicquid in intestinis tenuibus continebatur, à hinc erat mictum: Ductus Pancreatici in intestinum duplex erat insertio, altera communis cum insertione ductus bilarii, altera tribus circiter digitis à priore distans: Uterus versus partem sinistram magis propendebat & dextra tuba longior erat: Minor erat uterus, nec major quam in puellis esse solet & satis mollis: Membranae quasi quibusdam intertextæ erant uteri substantia satis flaccida, per quam ductus quidam ferebantur hiantes, & stylum admittentes in ipsas tubas: Inflato vase in parte interna uteri, tota substantia tubarum attollebatur: Internum uteri orificium valdè rubundum erat & pituita viscida refertum: Lien pallidior erat, præsertim in parte postica, & satis grandis, cætera s. nus, Pulmo quoque bene se habebat, sed per fibras variis in locis dextro lateri adhærebat, in sinistro liber erat: Hepar etiam laudabile erat: Tantillum aquæ subriaræ continebatur in sinistra thoracis cavitate: Pericardium flatu distentum & turgidum erat, quod sibi nunquam observatum aiebat: In ejus cavitate liquor spumofus continebatur satis copiosus, sapore subsalfo & subacido: Inter æsophagum & arteriam magnam in sinistra parte, quærebat & inveniebat Ductum thoracicum ad latus venæ præpropè ipsas vertebrae, qui satis grandis & elegans erat, color contentorum subrutilus erat: Immissio tubulo in ductum thoracicum & inflato, dexter ventriculus cordis vehementer intumescebat, & sanguis ex vasis erumpibat, & tota auricula dextra mire inde tumescebat: Valvula in ipso Ductu reperiabatur, quæ impediebat quominus versus inferiora instari posset ductus. Ubi ad regionem lumborum deveniebat, ductus quasi contorquebatur in semicirculum. Ductus quidam minores, ex musculis venientes, inferebantur in ductum majorem, Dum persequeretur ductum, videbat plurima vasa è ductu deferri usque in hepar, & minores aliquot ramos ad intestina. *Observatio Joh. Henr. Brühlfeld. Medici Dani, in actis Medic. Bartholini anni 1673. Observat. 17.*

*Diarrhœa chylosa cum atrophia propter lætæarum mesentericarum obstructionem.*

Licet in specie & propriè Diarrhœa illum ventris fluxum designet, quo humores inferiores defluunt sine sanguine & chylo, hic tamen illam vocem cum Melchior. Sebizio in speculo suo medicinali prætic. part. 4. sect. 2. cap. 15. generaliter sumimus, ita, ut in genere denotet quod. is alvi profluvium, quaecunque id tandem sit, à quacunque materia proveniat, à quocunque loco, & quocunque etiam modo illud fiat. Diversi humores in Diarrhœa evacuari solent, unde etiam diversis nominibus salutarur. Dicitur enim Diarrhœa biliosa, melancholica, pituitosa, serosa sive aquosa, sanguinea, colliquativa, pue;



puerorum denticientium, verminantium, ut & chylosa quæ, licet ad coeliacam affectionem soleat referri, quia tamen plerumque & præprimis hoc in casu, non merus & purus chylus, sed excrementis mixtus, evacuabatur, non immerito Diarrhœæ Chylosæ titulus ipi imponi potest. Erat enim filiolus Domini Caroli a Pflug annu natus cum dimidio, febris inordinata, nimia appetentia, secretionem per alvum superflua cum materiz albæ permixtione, & subsequenti macie insigni, diu & per aliquot menses vexatus, ita ut omni diligentia licet adhibita, æger vix ossibus hæreret, vix præter animam residui quicquam haberet, vivæ mortis imago esset, & delicatam adhuc animam ob morbi vehementiam tandem efflaret. Huic celiacæ affectionis, sive potius Diarrhœæ Chylosæ, causam Fernelius aliique, venarum Mesentericarum, Lienis aut Epatis obstructioni adscribunt. Pecquetum rectius Lactearum Mesentericarum (quas insignis superioribus annis Anatomicus Aëllius à se detectas Posteritati commendavit) quibus & Thoracici illius ductus, à se primò inventi, statuit obturationem, verba ejus ita sonant in nova de Thoracis lacteis dissertat. *Anatom. Exper. pag. 109.* Chylosa Diarrhœa, quæ scilicet mixtum cum recrementis excernitur Chylus, oriri potest (sicut Riolanus Pater in peculiari sanandi methodo cap. 48. sapienter indicat) ex Obstructione Mesentericæ nam licet sanitissimum hepatis congruentissimum accendat ad optimam Chylificationem, aut Chymosum potius calorem ventriculo, si tamen vel obstructum fuerit Mesenterium, vel humoris viscosi in intestinorum tunica lubricans, obturaverit Lactearum infundibula, certum est prohibitum ingredi Chylum pariter secretum iri cum ciborum facibus, id ipsum necesse est, obstructis thoracis Lacteis, contingere. Et paulò post. Quod si multiplex fuerit Lactearum obstructio: & adversus aperientium remedium vim pertinax, Atrophiam sequi necesse est, interdicti alimenti penuria, unde nec reparantur sanguinis impensa, nec corporis tabescentis substantia refarcitur. Prædictas obstructions ob lactis potissimum impuritates & viscositatem ortas fuisse arbitror, quæ in exilibus illis canalibus lacteis ad Cascosam duritiem & quasi coagulationem tetendit, hincque ex obturatione horum vasorum Chylus ad receptaculum, & sic deinceps consequenter ad massam sanguineam interceptus fuit tam maciem quam Chyli necessariò per alvum una cum recrementis fluxum excitans. Symptomata, fames nimirum, sine dubio ob defectum nutritionis in partibus, quæ sui restorationem desiderarunt, nec propter obstructionem illam receperunt, oriebatur. Putamus enim, salvo tamen aliorum iudicio, naturalem appetitum excitari à ventriculi bono temperamento & anima; Omnium actionum nostri corporis gubernatrice, quæ defectum materiz nutritivæ percipit, & ita per appetitum illam postulat. Ab Experientia omnium rerum Magistra informati sumus, post morbos majorem plerumque percipi appetitum ob virium debilitatem, quæ Natura recreare iterum tentat. Illi, qui exercitiis gaudent, & laboribus mechanicis delectantur, majori fame & appetitum vexantur, quam qui otio & quieti dediti sunt, eandem ob causam. Vermes in intestinis itabulantes absumunt Chylum, hinc nulla vel pauca par-

tium nutritio, & per consequens major appetitus. Igitur cum *Ferdinand. Roderic. pag. 64.* exclamamus: *Fames ceruissima indigentia & absoluta coctione prius ingesti cibi certissimum signum.* Spiritus acidi & acres appetitum quidem excitant, si autem quantitate peccent, destrunt appetitum, cum ventriculi temperamentum evertant. In iusta autem dosi assumpti, vel ante, vel cum cibis, appetitum adaugent, ratio, quia ante cibos accepti reliquias in ventriculo contentas dissolvunt, ut defectus eo melius percipiatur, cum cibis autem ingesti, pars concoctionis exsunt, cibos citius dissolvunt, concoctionem, augendo fermentum, accelerant, & ita per accidens appetitus & sensus assumptionis causa evadunt. Distinguendum igitur inter causam coctionis & causam appetitus, quam naturam salutamus. Alterum symptoma, febris inordinata a viscerum & vasorum obstructione, ut & Tartari copia istas obstructions generantis, inæqualiter effumantis quasi & ebullientis, calidosque vapores in totum corpus mittentis, originem trahebat. Intermittere tandem circa hunc affectum, cum Chyli receptaculi in præcedentibus mentio facta, nequeo, quin animi sensum aperiam, & causam explicem, quæ per tot secula tot Authores decepit, nimirum ob Anatomes imperfectam adhuc cognitionem, & præcipue magnæ illius in centro Mesenterii contentæ Glandulæ, ejus usus & finis antiquam à Clariss. Pecqueto consignaretur, multos Authores latuit, dum hi receptaculum istud Chyli post mortem adhuc repletum & dissectum plerumque abscessum Mesenterii fecere: Vix enim observationes reperies, in quibus non aliquoties tales Mesenterii abscessus recensentur. Non quidem mihi mens est, Mesenterii abscessus totaliter in dubium revocare, sed solummodo mihi persuasi, multoties receptaculum Chyli pro abscessu Mesenterii ab Authoribus habitum fuisse. Nobilissimi ante dicti filiolii parentes, cum nutriticem certas ob causas mutassent, semper suspicati sunt, (licet Medici fundamentibus rationibus illis aliud persuadere conarentur) morbum infantis per fascinum introductum esse. Novitate quidem caret, Ariduram ex incantatione proveniunt, quale exemplum *Hieronymus Jordanus de eo, quod divinum est, pag. 109.* recenset. Frequentius verò Atrophiam ex fascino incurrit corpus infantile, quod oculum vocant malum, linguamve malum. Hinc usus etiam muliercularum obtinuit, ut vitio vertant illis, qui elegantioris notæ puerulos attentius vel intuentes, vel commendantes nimium, non addant: Deus te servet? persuasæ, nisi illam illis benè precandi formulam addiderint, faciliè sic futurum, ut fascino possint lædi. Quæ consuetudo apud illas adeo invaluit, ut simul ac audierint, viderintve, infantulum non ita pridem floridum, ac per omnia sanum, nunc ægrotare & contabescere, de fascino protinus cogitare amsint. Ut igitur amplius anticipari cura non distraherentur, extinctus filius anno 1665. die 15. Mensis Augusti Halis Saxonum aciei cultri anatomici subiciebatur. Dissectio cadaveris abdomine, ecce monstruosa illicò hepatis, pro ætatis ratione, apparuit magnitudo, quæ vix in adulto offenditur: Totam enim abdominis cavitatem occupabat, substantia ejus præterea



scirrhusa reperiatur. Vesicula fellea erat insignis, indicis longitudinem æquans. Lienis similis ut epatis erat constitutio; punctulis enim tartareis perduris undique erat refertus. Glandulæ per totum Mesenterium dispersæ scirrhusæ inveniuntur, causæque mortis manifeste conspiciuntur. *Casparus Theophili Bierlingi.*

Bimulus Princeps Serenissimæ cujusdam in Germania familiæ, diarrhœa, atrophica aliisque symptomatibus defunctus 26. Julii 1676. in præsentia Consiliarios, Auricularum, Medicorum, à Chirurgis ad balsamationem exenteratus, sequentia monstravit.

1. Magnum, elegans, candidumque cerebrum, sub quo inter cranium octo & plura cochlearia aquæ cruentæ inventa; cerebrum solum pendebat libras duas & duas uncias. Externa capitis ulcuscula prorsus evanuerant. Dextrum verò latus à capite ad coxas prope regionem hepatis nigricante lividoque colore intectum.

2. Cor naturale, pulmones sani, sine ulla accretione.

3. Ventriculus & intestina splendida, omnibus excrementis vacua, sed statibus nonnihil distenta, pancreas naturali facie, ut & lien, sed brevior,

4. Renes naturalem magnitudinem superabant. Vesica more consueti constituta, sed contracta.

5. Hepar valde durum, albicans, inusitata magnitudinis, pondere 17. Unciarum. Inter hoc & intestinum duodenum prope mesenterium, sanguis nigricans infarctus. Vesicula bilis quoque major jussu hepatis substantiæ ubique ita firmiter accreta, ut sine substantiæ hepatis læsione eximi non posset. In ipsa vesicula biliaria, non flavus humor, sed materia quædam ex nigro viridis observata, qualis subinde copiosius per alvum secernebatur. Præterea hepar undique angustum & arête costis spuris & diaphragmati accretum; hinc facile colligi poterat, unde difficilis respiratio orta, & quâ ratione hepar in functione sanguinis vel depurandi & distribuendi impediri potuerit.

Cum frater serenissimi defuncti Principis eodem affectu iidemque symptomatibus detineretur, ut præcaveretur tatum imminens, jussu superiorum Medici quidam Hafnienfes hoc consilium scripto consignarunt Hafniæ xiv. Septemb. 1676.

Mandato clementissimo subiectissimè obsecuti, relationem nobis missam de Serenissimi Principis morbo & aperti corporis constitutione, quâ docuit, diligentia expendimus, & exinde intelleximus, beati Principis bimuli morbum primariò dependere ex humida frigidaque temperie cerebri, hepatis; & circumjacentium viscerum nativa indispositione, unde reliqua adducta symptomata fluxerunt. Et quandoquidem Junior Princeps alter, sicut percepimus, simili modo tentatur, & vero simili suspitione similem interiorum viscerum constitutionem habeat, in hanc sententiam conspiramus, donec à Medicis ægro serenissimo presentibus uberius de morbi statu certiores reddamur, ut ante omnia curandi scopus dirigatur ad hepatis indispositionem, quæ impedit ne bilis & Lym-

pha separetur, & quidem leniter aperientibus, hincque partem roborantibus tam quæ externo corpori applicantur, quàm quæ per os assumuntur, pertinaciter insistendum, quibus ritè peractis spe non dubia animamur, symptomata sensim evanitura, quæ summa est votorum nostrorum. *Thomas Bartholini.*

Puellula quædam bono corporis habitu prædita, enormi corripitur Diarrhœa, postea nonnihil remittens, & tandem cum vomitibus recrudescens. Fuit in dextro hypochondrio durities, aderant sitis, pervigilia, dolor capitis, sterora alba, & virium prostratio. Denique Epileptica obiit.

A cervice ad dorsi finem spina erat nigra, Ventriculus aliquo modo nigricans & putrida, humorem continens viridem: Jecur scirrhusum Folliculus fellis nigricante bile turgidus. Cerebrum ingens aqua innatans.

Videtur fuisse species alicujus febris malignæ, cui cætera symptomata concommutaverunt. *Stephanus Blancard. Anat. Pract. Cent. 2.*

*Hælica post Diarrhœam, obiit.*

Post mortem, Viscera flaccida: Vomica in pulmonibus: in Mesenterii glandulis atheromata, & purulenta, Hepar exuccum. *Idem ibidem.*

## DICOPHYIA

Vid.

## PILORVM VITIA.

## DIFFICULTAS RESPIRANDI.

Vid.

## RESPIRATIO.

## DIGESTIONIS VITIA.

### Curaciones & Consultationes.

#### Curaciones.

**C**hylosis seu chylicatio, notum est quomodo fiat, nempe beneficio succi fermentativi salini seu fermenti stomachici salini, à quo inciduntur, dissolvuntur & volatilisantur simul alimenta, ita ut abeant tandem in liquorem dilutum lacteum, quem non immerito liquidiori cremori vel Psisanæ assimilant. Qui liquor chylus dictus natura sua est salsus, volatilis & temperatus. Hæc chyli productio, seu alimentorum in chylum transmutatio variis læditur modis.

Aut enim imminuitur sive aboletur quando non sufficienter digeruntur alimenta: vel insigniter depravatur, unde innumera sunt alimentorum corruptiones.

Ad depravationes alimentorum merito etiam referuntur cruditates dictæ, quæ imprimis sunt duplices acidæ & nidorosæ. Acida est, quando alimenta abeunt in succum acidum, nec sufficienter volatilifatum: Nidorosæ sunt quando eadem corrumpuntur ut abeant in liquamen horridi saporis, putrilaginosum & omnino nutritioni



tritioni ineptum: nam corruptionem uldorosam solent comparare communiter cum ovis frixis butyro & non bene postmodum concoctis.

Causam quod attinet, notum est ex lectione Veterum quod hi ipsi omnes operationes naturales soli manciparunt calori, & exinde in chylosa lationibus ut plurimum accusarint calorem debilem stomachi, seu intemperiem stomachi frigidam, nunc simplicem, nunc verò compositam, complicatam cum intemperie Hepatis calida, Lectis frequens Practicorum etiam Modernorum & imprimis Italorum & Gallorum vos docebit quod hi omnes accusent inæqualem intemperiem stomachi frigidam & Hepatis calidam.

Verum hac in parte merito laudes tribuendæ Helmontio; qui primus caliginem discussit, & calorem non effective sed dispositive tantum digerere statuit, & sufficienter confirmavit, quò potius fermenta & fermentationum lationes, causas, proximas introducit lationum digestionum.

Quod ergo attinet chylosin lalam, causa ejus proxima erit vel in fermenti stomachi vitio, vel erit in vitio assumptorum alimentorum, in fermento quidem quando non potest sufficienter digerere, aut quando non legitime digerit, sed potius depravatum alimentum corrumpit. In alimentis vero erit causa, quando eadem digestionem sunt inepta, aut quoniam peccant cum quantitate etiam qualitates dum sunt vitiosa & digestionem alias inepta.

Hæc ut pateant imprimis fermentum stomachi non satis volatile, sed acidum nimis fixum aut cum peregrino acore in stomacho corruptum, ut in Hypochondriacis, dissolvit quidem prompte alimenta, sed eadem non rite fermentando nec debite volatilifcat, sed nimia acore eadem in massam vitiose acidam transmutat unde imprimis cruditas acida provenit.

Quod si ex perverso bilis per vascula fellea in intestina trajecta motu fiat, ut regurgitet in stomachum sit ut ab hoc sale volat. oleolo bilis debilitetur ut vicietur fermentum stomachicum; adeo ut assumpta alimenta non possint convenienter digeri, quin propter talem præsentiam bilis viciantis fermentum, abeunt in cruditatem nidorofam, quod etiam fit quando alimenta pingua nimis ingeruntur aut butyro nimis frixa & condita nam & alia pingua dant cruditatem nidorofam. Verum in unoquoque Subjecto peculiaris & à priori non perferutabilis est fermenti varietas tam in specie animalium quam in unoquoque in dividuo humano: ratione cujus fit ut non tantum appetitus variet, sed etiam ut ipsa variet alimentorum digestio, ita ut ea quæ unus avide appetit & hinc facillime digerit, alius respuat, aut non sine molestia concoquat. Appetitus sane est index quid loquitur quasi & monstrat quæ sunt assumenda. Nam quæ facile assumuntur facile digeruntur, quoniam tum appetuntur ea quæ sunt amica fermento stomachico, & quæ ipsi sunt amica, facile dissolvit, & facile fermentatur.

Hinc est quod nobis in ulcet Hippocrat. in Aphorismis quod appetita facilius longe digerantur quam non appetita. Ex hoc fund mento etiam consuetudinis magna adeo est haben-

da ratio: nam idem Hippocr. in omnibus morbis consuevit licet deteriora insuetis tamen esse præferenda, dicit, licet melioribus. Ratio est hæc, quod post omnia assumpta semper remaneat nonnullum in stomacho, seu omnium assumptorum nonnulla reliquia hæreant in plicis & rugis stomachis, quæ reliquæ si non ingrediuntur materialem compositionem fermenti, uti multi volunt. Certum tamen est quod nonnihil aut certo modo fermentum modifcent seu ad sui similia alimenta magis appropriatum reddant. Hinc est quod ab assumptis minus lædantur, quando fermentum iisdem quodammodo est homogeneum & nulla est discretio inter assumpta & fermentum, sed hoc se habet ad illa ut proportionatum agens. E contra insueti sunt molesta quoniam non habent convenientiam cum illo partes alimenti.

Propterea etiam est ut ii qui certa quædam nonnunquam abhorrent, incipiendo à minima dosi ea sibi reddant familiaria nonnunquam: quoniam fermentum stomachi successive alteratum, talia olim hostilia, tanquam amica, facile utripit.

Hæc de fermento, cujus salina volatilis activitas si debilitetur, sit illustratione modo dicta.

Quod attinet Vitium chyloseos alterum ex alim. entis assumptis. Hæc est causa, quando copiose nimis ingeruntur unde non possunt digeriri: ratio, quoniam unumquodque menstruum fermentativum (quod solvit & fermentat, quale est fermentum stomachi) requirit proportionem objecti debitam in quod agere debet.

Si ergo nimia ingeratur alimentorum quantitas, obruitur in tantum fermentum ut eadem nec dissolvat sufficienter, quoniam non est sufficiens, nec convenienter fermentando volatilifcet. Non dissolvit convenienter, quoniam, uti dixi, nimia quantitas superat fermenti activitatem: hinc tardè fit concoctio & non rectè volatilifcantur digesta. Imo sapius nimia quantitas alimentorum ingestabit in cruditatem acidam, unde assumpta quidem acorem recipiunt fermentativum sed propter nimiam copiam admodum debilem; unde non possunt fieri volatilia, sed in forma pastæ crudæ acidæ remanent.

Præter quantitatem imprimis varietas ciborum etiam turbat digestionem, utut enim magna sit fermenti non achici potestas, quatenus semel varios admodum cibos potest dissolvere & fermentare, tamen certum est quod non sit universalis quin magis determinatur ad hunc vel ad illum cibum: si ergo tam varia ingeruntur pingua cum macris, acida cum dulcibus, etiam certum est quod fermentum, potentius dum agit in unum, quam in alterum, non leviter vicietur digestio, & pessimæ oriantur corruptiones & cruditates quarum comes est mucus copiosus in ventriculo residuus: nam quod non rectè digeritur vix per Pylorum transmittitur, unde copiosus mucus obruit ventriculum & ulterius vitiatur chylosis.

Quo. d. qualitatem ciborum certum est quod delectus sit habendus. De Pane tantum loquor qui ex omnibus alimentis nobis est familiarissimus. Ratio. quoniam fermento stomachi est amicissimus idque propter spiritum acidum



volatilem, qui in pane est satis copiosus & quodammodo homogeneous & symbolizans est cum natura fermenti stomachici. Unde etiam Panis ratione fermenti in panificio concepti, vel ratione spiritus illius acidi volatilis, adjuvat ut reliqua assumpta promptius colliquescant, & cum isto stomachi fermentum volatile simul adjuvat, ut promptius volatilifentur & chylifcentur. Unde panis quo magis est fermentatus & magis in eodem exaltatus spiritus acidus volatilis, eo est nobis salubrior, quod minus verò fermentatur & quo spissior & glutinosior, eo magis est nocivus, & eo promptius abicit in pastam viscidam & crudam in stomacho. Præter Ciborum varietatem etiam Potus nimius est qui insigniter turbat digestionem: ratio, quoniam 1. Potus nimius diluit nimis fermentum stomachi & istud diluendo nonnihil hebes reddit: 2. quoniam facit fluctuationem alimentorum in stomacho quæ nonnihil impedit legitimam fermentationem: 3. quoniam Tonus stomachi lædit, eundem distendit & fibras ejus laxat ac flaccidas reddit ut digesta licet, non possint adeo commodè per pylorum expelli. Hinc eadem præter tempus in stomacho detenta, corrumpuntur & in vitia varia abeunt. Ex his facile patet quid habendum sit de veterum intemperie inæquali: Nam eandem non habere fundamentum in re, patet ex eo, quod sanguis qui calorem & sic dictam Temperiem Vitiat, omnibus partibus distribuitur æqualiter & proportionaliter movetur ad hepar & ventriculum. Quamdiu ergo sanguis debito calore vegetus, & quamdiu æquali proportionem circulat tam ad hepar quam ad ventriculum, tamdiu sanè his ipsis etiam debitam conciliabit temperiem & eodem modo debite calebit Epar atque Calet ventriculus.

In ista ergo quam dixi veterum inæquali intemperie experientia nos docebit, quod semper subit vitium stomachici fermenti, quod sit nimis & vitiosè acidum. Nec satis volatilifatum quin simul obrutum copioso mucro crasso & viscido: propterea instituitur in talibus Cura non cum iis quæ calefaciunt stomachum & refrigerant hepar, sed quæ vim habent attenuandi & dissolvendi, imò etiam volatilifandi & temperandi nimium fermenti acorem.

Præter has causas primarias chyloseos læsæ, Secundariæ nonnullæ adsunt, quæ, quatenus retentionem aut expulsionem turbant, etiam Chylosin vitiant, quam sæpius causam fuisse chyloseos læsæ & similium stomachi symptomatum, Testis est expertus *Zacut. Lusitanus in lib. Medic. Princip. hist. 56. quæst. 36.* It. Verrucæ ventriculo adnatæ Chylosin turbare valent. Quale exemplum habet *Forest. in lib. 18. obs. 18. & observ. 30.* Notum etiam est quod renes afflicti calculo propter consensum nervorum qui intercedit ventriculum & renes, similiter solent turbare digestionem.

Quod attinet Signa Diagnostica. Ea sunt facillima. Nam in Chylosi imminuta conqueruntur ægri de dolore stomachi post pastum. Item conqueruntur ægri de ructibus etiam post 5. vel 6. horas ab alimentorum assumptione molestis, isque genuinum assumptorum saporem representantibus. Porro conqueruntur tales ægri de appetitû dejecto, de inflatione stomachi & quæ sunt similia signa hinc inde obvia.

Præterea sæpius adest post pastum in talibus subjectis Phlogosis seu rubor faciei, in qua phlogosi semper observetur quod fiat a stomacho, hocque mucro copioso nimis acido ab alimentis non ritè digestis residuo, onerato.

Item conqueruntur ægri tales de difficili respiratione, quando incumbunt dorso, Item matutino tempore sæpius conqueruntur, quod habeant os mucro plenum, qui revera ascendit ex stomacho, dum per incubationem regurgitat & ad fauces tendit & sic matutino tempore excernitur. Cæterum quando vitiata est digestio illam testantur ructus. In cruditate acida habent ructus acidos, habent copiosiores præ cæteris status, & quæ rejiciuntur, aut naturæ, aut arte per vomitum deprehenduntur crassa viscida & pituitosa, simulque saporis acidi.

Cruditatis nidorosa cognoscitur ex eo, quod ructus sunt fatidi aut saltem horridi quales solent elevari post ova frigida assumpta: It. quod subinde nauseant. Matutino tempore saporem percipiunt, quem non possunt sufficienter explicare: quæ rejiciunt aut arte aut naturæ per vomitum sunt liquida lubrifica, & aut omnino insipida, aut quodammodo amaricantia. Præterea habent alvum sæpius plus solito apertam. Tales cruditate nidorosa laborant.

Quod attinet signa prognostica. Certum est in chyloseos læsione consistere fundamentum quam plurimorum morborum Chronicorum, in specie certi sitis quod ex cruditate acida & ejus variis differentiis oriuntur quam plurimæ si non omnes febres intermittentes: quod hæc cruditas acida certo modo corrupta sit origo mali hypochondriaci, sit origo Scorbuti, nisi hic oriatur per contagium massæ sanguineæ communicatum: sit origo Passionis Colicæ & similium. Item quod similis acor in stomacho vitians alimenta sit origo morborum Cutaneorum, Scabiei, Serpiginum, Herpetum, forsan & Erysipelatum.

In genere omne acidum seu acor vitiosus subinde in corpore errans, quod ab Helmontio dicitur inimicum toti corpori, fundamentum habet in vitiosa digestionem ex corruptione acidi. Arthritis ipsa dum vinum acelsit in ventriculo, aut potulenta vitioso acore tincta prouunt in corpus ex hac acida stomachi aciditate habet suum ortum. Imò (de quo impostum plura) omnes morbi Chronici qui veniunt aut oriri putantur à viscerum obstructione Mesenterii, Hepatis & Lienis: Tamen sitis certi quod oriuntur ex vitio chyloseos & in specie quando fermentum stomachi est nimis acidum nec ritè volatilifatum.

#### METHODVS MEDENDI.

Corrigendum. Itaque fermentum ventriculi quando fieri potest & collocandum in naturalem statum.

Conferunt hic 1. Ea quæ mucum & succos in stomacho hærentes ut plurimum crassos & viscidos acidos remouent. 2. Ea quæ sale volat. oleoso subtili acido temperato constant: hæc namque nonnihil alterant fermentum stomachi, volatilem subtilemque acorem ei attribuant.

Quod ergo attinet: Purgantia: Vomitoria primum obtinent locum, inter hos superius dictum



Quam Antimonialia esse præferenda, non ea quæ non infusa, sed quæ infusa: & in infuso non tam esse ponderandum pulverem quam liquorem in quem fit infusio. Post hæc sunt Asarina & in specie Extract. Asari Emeric. Hartm. Aqu. Nicot. destill. similiter elegans præbet vomitorium. Mass. Pilul. de Hier. cum Agarico superius commendavi & dedi formulam. Præter hæc Pilulæ Mastichinæ sunt elegantes: Nam Mastiche est singularis stomachicum ratione spiritus acidii volatilis. Pilulæ Aloephanginæ ex aromatibus factæ, & uno alterove grano Scammonii aculeatæ conveniunt ad detergendas sordes mucilaginosas stomacho sæpe adherentes. Dabo exemplum hoc modo egregium.

℞. Pilul. Aloephang. gr. xv. l. 3j. (sunt enim ex aromaticis) Scammon. sulphur. gr. ij. Extr. troch. alhand. gr. jß. (est egregium ad puitant viscida detergendam.) c. f. q. Tinct. tart. (quæ stimulat. & est salina abstergens) F. l. 2. Pilulæ purg. Stomach.

Potest etiam beneficio remediorum salinorum imprimis ex tartaro fieri pulvis laxativus & stomachum egregie evacuans.

℞. Tartari vitriol. crem. tart. an. 3ß. Scammon. sulphur. gr. iij. l. iv. Trochisc. alhand. gr. j. l. ij. (Hi enim præscribuntur in pulveribus) Olei destill. Anis. gr. ij. F. pulvis purg. stomach. Nam ultra ij. l. iij. sedes vix operabitur pro constitutione tamen subiecti.

Post hæc dixi convenire in Chylosi læsa ea quæ constant sal. volat. aromatico blando, quæ si maritentur cum subtilibus acidis sunt egregia remedia. Ex his imprimis commendantur semina quæ vocantur minora calida: Anisi, Carui, Petrosei. Cumini, & post hæc aromata, præ cæteris Galanga & Zingiber simul.

Platerus in observat. egregia aliquot habet exempla Chyloseos & cruditatis vitiorum stomachi curatorum per usum Zingiberis, Nux Moschata etiam est egregia, sed quia est nimis oleosa, & ob id obtundere solet fermentum Stomachi, aliis subinde est temperanda, imprimis simplicibus stomachicis dictis quæ sunt satis nota.

Præ cæteris palmam obtinebit Absinthium & Mentha; Item Acorus verus: Rosmarinum & lignum Sassafras uti etiam reliqua aromata. Item Elixir quod vulgò vocatur Proprietatis in specie si misceatur cum spir. cochleari aut cum spir. sal. Ammoniaci volat. Conveniunt etiam egregie Elixir stomachale. D. Michael. cujus superius facta fuit mentio, Essent. Melissæ, Mentha, Pulegii, Rosmarini, Ligni Sassafr. Omnes conveniunt, si acidulentur cum parva quantitate spir. salis vel spir. vitr. sic enim concipiunt subtilem volatilem acorem.

Aut fiat Vinum Medicatum, nam sic acidum vini imbuitur cum salibus volatilibus vegetabilium. h. m.

℞. Radic. Enul. camp. 3vi. (quam superius commendavi c. Rad. armoraciz) Rad. Galang. 3ij. Herb. Menth. crisp. calaminth. mont. Absinth. an. m. 3. Sem. Anisi. Cinam. acut. an. 3ij. Macis 3j. (quia nimis oleosa) Concisa & contusa includantur cum nodulo in vini Rhemani mens. j. stent per hor. ii. in loco calido. Hinc subinde assumatur haustus ante cenam & prandium, singulis haustibus addendo spir. salis

dulcis (acid. volatile) gutt. x. l. loco hujus Elix. Propriet. imprimis cum spir. cochlear. facti & parati gutt. v.

Salia ea quæ mucum subtili aciditate potenter absterguunt & deterguunt stomachum, similiter egregia sunt: inter quæ excellit sal. Ammon. imprimis si assumatur in vino abstinthe s. vino infusionis ligni Sassafras. Post hoc non minus etiam terra soliat. tartari seu sal. tart. essentielle & reliqua ex Tart. parata: Item spir. Carnationis secretus vid. cap. 6. de quo faciam mentionem paulo post, egregie conveniunt: Tart. vitriolat. aut etiam Hepaticum rubrum imprimis si cum aromaticis speciebus Diatrion Piperis, aut cum speciebus Dialangæ, aut stomachicis Myntichti misceatur. Sal. vitr. seu Arcanum duplicatum Myntichti similiter est egregium in affectibus stomachicis, similibus pulveribus stomachicis mistum: Nec mixtura simplex est inelegans cum ex acido volatili temperato conlect.

Ambra est conveniens senibus, & in cruditate senum imprimis est convenientissima sive cruda cum saccharo in forma pulver. assumatur sive cum Essentia Mentha l. Melissæ in essentiam stomachicam redigatur. Noti alias sunt Pulveres stomachici Birckmanni & Quercet. in quibus basis est radix Ari præparata: Propterea quia radix Ari imprægnata est sal. volat. acris & penetrante: Cæterum utut hæc radix præparetur cum aceto vel vino, in arida tamen maxima pars salis volatilis avocatur, & ob id inanis nonnihil evadit: Melius ergo est si infusio fiat cum radic. Helenii in vino, vel si succus expressus ex radice & foliis asservetur ut tempore usus cum aliis assumatur.

Sed est questio quomodo asservari possint citra corruptionem succi. R. Observetur quomodo vinum conservetur beneficio sulphuris, & ij qui legunt Helmont. callebunt artificium asservandi succos ad aliquot annos incorruptos.

Præterea pertinet huc pulvis stomachicus D. Michael. composit. est.

℞. Rad. Ari præpar. 1b ij. Pauac. Holsteini. 1b j. Sal. ablinth. 1b 3. Rad. calam. arom. 3ij. (loco hujus acor. ver.) Cinamom. Caryophyll. an. 3j 3. Macis. Piper. long. Zingiber. Cubebar. Cardam. Granor. Paradis. sem. Zedoar. Coriand. an. 3j. F. l. 2. Pulvis.

Illi qui legunt. Poterium sæpius memoratum in scriptis inveniunt specificum stomachicum, sed quid hoc sit: Nemo scit præter filium Poterij Bononiæ degentem: Interim in aurem vobis dico quod basis sit Regulus Antim. Martialis, sapienti sat dictum.

Ad specifica stomachica etiam pertinet succolata: succus inspissatus factus ab Indis ex fructibus Cacaum conditus cum Cinnamomo & pipere, quæ succolata in vino cocta & pota est egregium stomachicum & simul antiscorbuticum. Non minoris est pretii herba Thez, planta apud Chineses & Japonenses singularis virtutis: ad nos tantum sicca adfertur: quæ herba Chinesibus & Japonensibus elegantissima est medicina non tantum stomachum roborans, sed præterea liberat tam à Calculo, quam Arthritide (morbis Chinesibus & Japonensibus propter hujus plantæ usum incognitis) item in Cephalalgia potenter, Præservans



ebrietatem & somnum arcens, stomachum confortans, & vigilias citra debilitatem etiam ad tres dies protrahens. Usus est si folia pulverisata quantum 1. vel 3. capiunt cochlearia ebulliant in aqu. simplic. adjecto pauxillo sacchari, & istud decoctum postmodum subinde hauritur.

Hæc in genere de Chyloleos læsione. In specie quod attinet cruditatem nidorofam. Conveniunt Rhabarbarum quod evacuat & Tamarindi: Præterea succus Citri, succus & syrupus Portulacæ, item spir. salis dulcis, Epaticum rubrum. Omnia enim temperant pinguedinem & bilem præcipitant. Item Conservæ Rosarum, aut Menthæ vitriolatæ, aut spir. vitr. aliquot guttulis irroratæ. Cruditas vero acida corrigitur per vinum absinthites, per radicem Helenii & Armoracæ: per spir. vegetabiles volat. Menthæ, salviæ & similes. per spir. Piperitidis quæ est planta paucis cognita, acerrimi saporis & potentissima in corrigendo stomacho. Spir. salis Ammon. volat. imprimis spiritum vegetabili commistus ut fiat sal. volat. oleosum. Denique sal. ablinth. ocul. cancr. corallia & similia quæ acidum absorbent.

Inter externa coctionem juvant olea nonnulla destillata suaveolentia quoniam hæc sunt stomacho grata. Hæc inter excellens est ol. Angelic. destillatum. Menthæ, Caryophyll. Macis, Juniperi, Item ol. stomachale compositum Cratonis, Balsamus Peruvianus stidem est egregius.

Præterea Tacamahaca, Galbanum, Mastiche, in forma Emplastri s. scuti stomachici: si regioni stomachi applicentur. Item spongia vino generoso cui simplicia stomachica fuerunt infusa, in prægnata, stomachi regioni applicata. *Mich. Erismüller. Colleg. Medic. Pract. lib. 1.*

Chylæsis, seu ciborum in chylum dissolutio, multipliciter lædi solet. Cum aboletur dicitur *Ανψα*; cum diminuitur, *βραδυψία*; cum depravatur, ut in alios humores cibum quam in chylum, commutetur, appellatur *δυσψία*. His tribus vitiis addit Franciscus Leboë Sylvius quartum, cum scilicet citius, quam decet, chylæsis perficitur, licet id tunc nocuum homini existimet, cum diutius perseverat, indeque Plethora, & habitus athleticus consequitur ex Hippocrate valde periculosus: quod sanè rarissimū.

In abolita autem chylæsi, cibi, quo prorsus modo ingesti fuere, crudi, vel sursū, vel deorsum, egeruntur. In diminuta parumper immutantur, & solum in indigestam phlegmaticamque materiam convertuntur, quæ ventriculo gravamen, cæteris verò visceribus, obstructionem affert: quin & aliquando ita sensim cruda hæc, & tenax materia interiori ventriculi tunice inhaeret, ut crustam limosam imitetur, impediaturque illius coarctationem, amplificationemque; unde appetitus infringitur, & alia plura symptomata insequuntur, præsertim inflatio, tumor, & hebetudo ventriculi. In depravata commutantur in acidos, nidore graves, corruptosque succos; unde cruditates illæ emergunt, à quibus acidum eructatur, & nidoris species refertur, qualis ovorum corruptorum, vel similium.

Veteres ciborum coctionem arbitrati ope caloris fieri, cruditates & chyloysis vitia, in ventriculi imbecillitatem, & caloris languorem re-

tulere; quamvis cruditatem cum nidore, calori exuperanti, præsertim jecoris attribuant. Ob externos etiam errores coctionem lædi citra ullum ventriculi vitium docet Galenus 3. de sympt. *Causæ* 1. videlicet ob excrementa ventriculi cavum occupantia, cibos substantia vitiosos, quantitate inmodicos, qualitate excedentes, potissimū calore, aut frigore, tempore importunos, & sine debito ordine assumptos; ac denique ob somnū, cujus defectu coctio graviter interturbatur.

Recentiores vero a Fermento Ventriculi dissolvente vitiato ejusmodi Chylæsis læsiones deducunt. Unde Sylvius Leboë abolitam, & diminutam fermentationem seu chylæsim fieri ait nunc ipsorum alimentorum quantitate, vel qualitate excedentium culpā; nunc fermenti defectu, aut inertia; nunc etiam à confluxu vitiosorum humorum in ventriculum. Auctam contra fermentationem promoveri a Fermento acidiori, à cibis facile fermentescentibus, & ab humoribus acido volatili præditis aliunde in ventriculum perveniētibz. Depravari vero fermentationem, & in nidorem abire à bile acriori, nimisque volatili ad ventriculum delata; atque in acorem, ab acidis humoribus, ac potissimū pancreatico acidiori, & abundantiori.

Non aliter alii causas læsæ chylæsis à succis dissolventibus, excedentibus, aut deficientibus, infractis, inertibus, commistis, similiterve affectis deducunt; sive illi è glandulis, tunicisque Ventriculi, sive ex arteriis, aliisque ductibus, ac visceribus deferantur.

Anatome autem compertum est ventriculos ejusmodi languentium repertos fuisse plurimū distentos, atque in suis tunicis, plicisque relaxatos, aut villosā crustā, crassiori, densiorique obritos; vel etiam omento malè affectos: ut est exemplum apud Galenum cujusdam gladiatori, qui ob relectum omentum de ventriculo, & chylæsi conquerebatur, coactus illam juvare laneis integumentis.

Non raro lætam chylæsim comitatur vomitus, vel alvi dejectio; aliquando mox à pastu, aliquando post aliquot horas. Adjungitur quoque ventriculi gravamen, ructus, inflatio, languor, inappetentia, fluctuatio, præter alia, quæ intestinis aliisque visceribus contingere solent incommoda: quamobrem origo plurimorum morborum cruditas esse continet, cum ex Hippocrate Ventris torpor, omnium confusio, vasorum immunditia, cerebri consumptio.

Auctam citamque ciborum coctionem, & contra diminutam, ac depravatam chylæsim à causis externis, atque ex errore in victus genere commisso, nemo unquam medicamentis prudenter subjiciet: siquidem illa firmam salutem, roburque ventriculi designat; hæc verò, præscripta solum convenienti diætā, vitatq; iis, è quibus venter læditur, facillimè corriguntur; imò etiam sponte sua in consentaneum Naturæ usum reducuntur. Igitur tribus reliquis duntaxat vitiis occurrendum, ne alias graviore aggritudines arcessant. Perutile autem fuerit causam primum malæ chylæleos internoscere, & tollere; mox verò languentem ventriculum fovere ac roborare, dissolventesque ipsius succos, si deficient, recreare, si inertes sint, acueri, & si ab aliis pravis humoribus inficiantur, commodis remediis repurgare.



In usum medicamentorum fermentationem promoventium proponit Sylvius Acida, & sale lixivii prædita ac per spiritum volatilem alterata: spiritum salis cohobatum, & cum spiritu vini dulcem redditum; itemque sal tartari, succini, urinæ, & C. C. sal Ammoniacum crudum, ejusque spiritum, seu sal volatile, vitæ interea cibis, potibusque fermentum ventriculi figentibus, vel obtundentibus. Speciatim verò cruditas nidorem præferens curari dicitur per bilem corrigentia, & præsertim spiritum salis dulcem: celi opus sit etiam per eandem evacuantia sive per os, sive per alvum, modica tamen dosi, ne inde cholera Morbus, vel diarrhœa insequatur. At cruditas acida acorem temperantia, tum quoque educentia exposculabit: in quem finem describit suum electuarium Hydragogum, & vinum quoddam medicatum, quo fermentum iners acuitur, & humores pituitosi simul emendantur.

Roborant præterea ventriculum, & coctioni opitulatur zinziber, & nux myrtica, piper, & caryophylli ante cibum, vel etiam cum ipso cibo assumpti ex Platero. Hinc diatrion piperis inique remedium à Galena celebratur 8. meth. licet reprobetur à Tralliano. Mastiche etiam summo per se prodest ad 3j. in ovo forbili, vel vino tribus horis ante cibum. Vinum absinthii, elixir proprietatis, aromaticum rosatum, diambra, diarrhodon, & similia salutaria observata sunt; quamobrem licet acida fermentum ventriculi mirifice acuant, cum tamen is crudis succis gravatur, atque acore incititur, proderunt potius aromata, & amarorem præferentia. Extractum Aloës, & Myrrhæ simul corrigit; & sensim abradet tunicis ventriculi impactos ejuscemodi succos. Commendatur quoque ab Hartmanno sal Ammoniacum purificatum, aqua, seu balsamum ventriculi, aqua cinnamomi, essentia melissæ, pulegii, menthæ, absinthii, & spiritus mastiches: sal absinthii & cinnamomi. Theriaca quoque & Mithridatum suum hic locum habent, præter alia plura passim à Medicis indigitata.

Acidis succis dissolventibus acuendis usui esse possunt spiritus vitrioli philosophicus, acetum esurinum, spiritus sulphuris per campanam elicitus, elixir vitrioli Minsicht. Verum hæc moderatè exhibenda, vel cum aliis stomacho utilibus, commista. Parantur etiam ad hoc diversi generis condimenta ex rebus salitis, & acidis una cum aromatibus, ut nimirum ab his adjunctus ventriculus arctius cibos complectatur, & suavius illos conficiat: quæ sanè in cæteris hujus visceris affectibus opportuna erunt, & maxime conducibilia: unde Hippocrates 1. Aphor. 8. docet, parum deteriore cibum, aut potum, at suaviorem, melioribus, sed minus suavis esse præferendum. Cæterum quamvis somnus maximo juvamento languenti ventriculo esse soleat, non tamen exercitium omnino interdendum erit, imò summo per se commendandum matutinis, præsertim horis, & ante prandium.

Denique si cruditati solis corrigentibus videatur satisfieri minime posse, evacuantibus quoque incumbendum per superiora, vel inferiora, prout æger uni vel alteri evacuationi fuerit proclivior. In his autem modus servandus est, ne nimia dosi, incongruenti medicamine, &

immodica ventris turbatione is gravius afficiatur, & magis elanguat. Quod si de ejus laxitate dubitetur, roborandus ille omnino erit, iis præsertim medicamentorum generibus, quæ corrugandi, adstringendique vim habere dicuntur; cydoniis scilicet, myrtorum baccis, sorbis, melsilis, conditurâ ribium, pulvere Coralliorum rubrorum, terrâ armeniâ, cholcotare vitrioli, aliisque. Narcotica verò vitanda, vel parçè admodum, & cum aliis permiscenda, ob ventriculi languorem; vel solum usurpentur opiata leviora, theriaca recens, dialcordium, philonium.

Inflatio, & ructus non dissimiliter curantur, præterea quæ dicuntur ubi de Hypochondriaca affectione. *Lucas Tozzi Medic. Pract. Part. 2.*

### Consultationes.

#### Dyspepsia.

Nobiliss. Vir annum agens quinquagesimum octavum, temperamenti totius ad calidum & humidum vergentis, jecoris calidioris, viginti duobus abhinc annis immanibus stomachi & lateris doloribus corripì cœpit, pro quibus sedandis, statim consilio Medici Purgationem inivit, necnon aquam Tettucianam potavit; cui non sufficienti, substitutum fuit Decoctum galli junioris, quo assumpto, nihil juvaminis percepit. Transactis autem quinque circiter annis denovo Medicum consuluit, qui novam Purgationem cum tenui victus ratione percepit. Purgatione peracta, at vivendi norma minime servata, post aliquod tempus, cum dolores nec remissi, quinimò Autumno præcipue & Vere magis exacerbati fuerint, duobus integris menibus perdurantes, coactus fuit rursus ad Medicos recurrere, qui præter Purgationem, usum stillicidii per 24. dies instituerunt; quorum ultimo die, urgente à prandio siti magna, hausit cyathum aquæ cichorii, cui immediate supervenit vomitus materiz valde copiosæ, pravo colore infectæ, & duabus post horis animi deliquium cum principum actionum abolitione, & lapsu in terram. Paulo post verò in se reversus Patiens, iterum ter brevi temporis spatio ejecit materiam ejusdem qualitatis una cum frutulis sanguinis, cui præterea successit per horam integram memoriæ privatio cum novo casu in terram, subsequuto quoque copioso sanguinis vomitu, pro quo cohibendo adhibitus fuit pulvis constrictivus. Perdurantibus itaque nihilominus tunc doloribus ipsis, Medicus anno proxime elapso novam Purgationem præscripsit, qua peracta, dolores iidem adhuc magis adaudivere, undecim continuis mensibus affligentes, in hunc usque diem perseverantes, quibus quotidie succedit ejectio vini in prandio epoti, additis etiam ventris intumescencia & alvi stypticitate. Quare ad eximiam Virtutem tuam, Vir Præclarissime, Patiens confugit, opem Medicam pro integra sanitate recuperanda implorans.

Ventris dolores quibus multis abhinc annis Nobil. Vir divexatus fuit, & modo torquetur, hypochondriaci fuerunt, à causa calida orti, qui tamen ut colici, provenientes à causa frigida, à Medicis ab initio, & forsan etiam progressu calidis medicamentis adhibitis non cu-



rati, sed adaucti fuere, & propterea non solum hypochondriacus affectus fuit confirmatus, verum & jecoris calore servidissimo reddito, sanguis quoque fervidior necessario fuit genitus, a natura tanquam nutritioni inutilis, & per superiora & per inferiora ejectus. Nec mirum si a calidis, & tetricis vaporibus ab hypochondriis ad caput elevatis spiritus animales densi & opaci redditi fuerint, neque principes functiones brevi temporis spatio perierint. Insistentibus autem Medicis in curanda frigida ventriculi intemperie, tanquam politica, licet privativa fuerit, calidis praesidiis tum internis, tum stitidicis externis, hypochondriorum calor in suo vigore p. n. persistens, & cruditates ceterosque humores, uno & alin entia colligens, aqueas humiditates adeo copiosas concervavit, ut ad multas libras assatim vomitu, saturato colore rejecta fuerint; nec tamen dolores intermissi aut remissi fuerunt: imò a postrema Purgatione anno superiori peracta adeo increverunt, ut undecim mensium spatio nunquam intermiserint. Quibus additur quoque vomitus post aliquot horas ab assumpto cibo, praesertim vini in prandio epoti, cum ventriculi anxietate ventrisque doloribus, corrupto nempe a nimio calore vino ipso in aciditatem converso, dum ab eodem exiccante sequuta est alvi stypticitas, doloribus ipsis perseverantibus: & a vini ac ciborum corruptione, ventriculi anxietates: a vaporibus autem ab eodem calore elevatis, mesenterii vasa & glandulae distenduntur, secuta continui solutione, dolores excitantur, eoque facilius, cum obstructions in cava jecoris praesertim, & mesenterio reperiri non sit dubitandum.

Hæc autem mala ut remittantur, exactissima Curatione & diligentissima Medici assistentia indigent, cum numeram jam a tot annis firmam & stabilem habeant, & ideo Vere venturo Purgatio regularis ineunda erit, primas vias mundando. Secundo Obstructions aperiendo. Tertio Jecoris & hypochondriorum fervorem contemperando. Quarto Humores & sanguinem ipsum edulcorando; atque tandem ventriculum, quamvis privative laesum, quodammodo roborando. Quibus intentionibus satisfaciendum erit ren edis tunc temporis a me statuentis atque praescribendis, dum de statu Nob. Pat. certior factus fuero.

Interim aliqua leviora ad usum ducenda erunt, quæ si propter affectus magnitudinem non satis juvare, certe nec nocere poterunt. Assumat igitur Nobil. Patiens omnium primo Leniens, ex cassia & lenitivo paratum, cui post horam superbibat jus hordeaceum ad lib. i. & duabus horis ab assumpto jure prandeat. Sequenti summo mane bibat Emulsionem amygdarum dulcium cum jure malva alterato extractam, ad unc. vii. Tertia vero die assumat floris cassia 3 ij. & hora transacta superbibat jus tenue malva alteratum, tribus autem horis ab assumpto jure prandeat, & ita perseveret quindecim aut viginti diebus; alternatim assumendo Emulsionem & Cassiam. Sed hoc tempore non parum prodesse poterit eductio sanguinis ad unc. vi. & hæmorrhoidibus, hirudinibus applicitis, nisi impedimentum aliquod in illis partibus adsit.

Si ab his peractis aliquod levamen sequutum fuerit, praescribenda erit alia Emulsio summo mane assumenda, ut

24. Sem. melon. mundat. unc. β. amygdalarum dulc. mundat. n. 20. aq. stillat. borag. aut malva unc. vii. m. f. Emulsio, cui addatur Syrupi de pomis unc. j. m. pro una vice, & sic pro aliis: in cujus usu pergat ad viginti dies, imò & ad integrum mensem, sed quinto quoque die prarum ante prandium assumat floris cassia aut electuarii lenis unc. β. & frequenter injiciatur Clysteres, ex oleo feminis lini parati, addito saccharo, tum pro facibus excernendis, tum pro doloribus sedandis.

His autem praescriptis addendæ erunt cautiones in vivendi ratione observandæ, & praesertim in cibo & potu; & primò quam maxime conducere poterit a vino abstinencia, saltem primis diebus, cujus vicem supplebit jus tenue aut stillatum ex jure pullæ paratum, in quo ebullierint folia boraginis, & poma dulcia in frustula incisa, cujus cyathum haurire poterit etiam prima mensa, si sitis infestet. Abstineat autem ab acidis, a dulcibus, a fassamentis, a carne suilla, a bubula, ab extremitatibus Animalium & a carnibus annosis ac pinguibus. A piscibus lutosiss, a caseo, a leguminibus, hordeo & oriza exceptis, a fungis, terræ tuberibus, & inter fructus, a nucibus & castaneis. A condimentis alli, caprarum & plurium aromatum: Vinum autem in progressu bibendum, nec dulce, nec austerrum esse debet, sed tenue, maturum & album. Semper autem cœna sit parca. Somnus nocturnus sit diuturnus; & corpus jejuno ventriculo exerceatur. Atque tandem alacri & confidenti animo vivat, spe pristinae sanitatis recuperandæ. *Raym. Joh. Foris Consultat. & Respons. Medicin. Tom. 2. Cent. 2.*

#### Dyspepsia in Hypochondriaco.

Benignissimus Princeps 34. ætatis annum percurrentis, temperamenti biliosi, cum melancholia subdominio, Jecoris calidioris, Ventriculi frigidi, Capitis vero humidioris, in dies neglecta salute, & fatigata natura, cepit septem abhinc annis aliquando Ventriculi gravitates sentire, & inde flatibus acidis & iudorosis secutis (quibus nunc etiam abundat) in hypochondriis dolores experiri, qui vagantes undequaque, septum transversum, Mesenterium & vicinas simul partes invadunt, necnon dorsum, renes & lumbos adoriuntur, ubi usplurimum, aliquam debilitatem observamus, & nonnunquam cum mictione cruenta; interdum capitis gravitatem atque languorem inducunt, aliquando vigilias & somnos turbatos efficiunt. Alius nonnunquam arida est, quæque dejicit excrementa, sicca, rotunda, atro quodam & bilioso circumfusa colore; cum flatibus erumpentibus apparent. Urinæ in impetu morbi variae sunt, nunc tenues, nunc crassæ, modo albæ, modo tartareæ, ac in matula fundo sedimenta instar plumarum gossipique colliguntur, quandoque veluti arenula rubra parietibus matulae adherent, quæ facile dissolvuntur; & alias exeunt, stimulant natura, paucæ, frequentes, & nonnunquam cum eis in majori languore renem aliquot sanguinis tinctura distillant. Verum enim vero, in hujusmodi affe-



affectibus non semper simul Accidentium illa præscripta series dominatur; alias sanè mitiores illi sunt, periodice redeuntēs; ac alias fere per longa intervalla eveniunt. Remanet quidem in statu salubri (quod præ cæteris observatione dignum est) quædam debilitas & languor circa regionem renum & os sacrum, quibus cogitur P. tiens non stare diu; status etiam nidorosus sæpe, ut diximus, præsentit, circa fauces sæpissime aliquid à capite cadens fœcatum promovet, sed tamen pauca exeunt, non falsa, sed aquosa. Proinde aulito etiam hic in Urbe doctissimi Viri consilio, jam elapso anno, Veris tempore fuerunt blande primò viæ primæ expiata, saburra ex Ventriculo & vicinioribus partibus eliminata, Jecoris fervor & hypochondriorum calor attemperatus, correctus; obstructions reserata; quoniam enim aliquantulum siccam & terream naturam inducebant, Humectantibus præparata & Lenientibus evacuare curavimus, non omisissis roborantibus, necnon etiam dictarum partium B. l. m. in instaurantibus & reficientibus. Quæ certe omnia fuerunt valde conferentia, nec dolores ulterius, nisi Autumno sequenti: licet pauci, redierunt: Hæc tamen hyberno tempore denuo leviter renovati, haud difficulter blandis remediis recesserunt. Hæc sunt incommoda quæ Patienti contingunt, currenti calamo tacta.

Malorum & Symptomatum illadem Eminentiſſimum Principem septem abhinc annis semper magis magisque divexantem, naturalium viscerum æconomiam indiquè labefactatam pro causa habere non est quod dubitemus: Dyspepsia namque ventriculum laborare, hypochondria statibus abundare, jecur & renes magno incendio flagrare, attestabantur stomachi dolores, eructationes quandoque acidæ, quandoque nidorosz, hypochondriorum dolores huc & illuc divagantes, fœcalium excrementorum siccitas, urinarum subsidentiz albæ & crassæ bombycinæ, à calore nimirum visciditate resoluta, sicut nonnunquam arenosz; potius tamen circumstantes, quam subsidentes. Verum hæc omnia ab intus & exuberante jecoris, renum & hypochondriorum fervore sololeſcunt, cui tanquam principaliori causæ, ut accessoriz, adduntur obstructions, quas præsertim in mesenterio, Lacteis & cava viscerum parte non solum latere, sed facile quoque tactu percipi posse puto, adeo ut hypochondriacum affectum constituent, & forsitan legitimum, phlogosi nimirum in pyloro, & parum infra existente, cujus actione cibi in ventriculo corrumpantur, quandoque ad nidorem, quandoque ad acidum, pro esculentorum varietate. Siquidem ab eodem calore & nidorulentiam & aciditatem provenire posse non est qui nesciat illi Arte versatus; hinc status ejusdem naturæ hypochondria distendentes, & dolores hinc inde excitantes, quicquid petentes gravitatem, ut crassi & tetri pavores in somnos turbatos, & facile quoque cor & cerebrum attingentes, mæiores inducere solent. Quoniam vero cruditas est terminus non solum Bradypepsiz & imminutz concoctionis, sed & Dyspepsiz, nimirum concoctionis depravata; idcirco genitæ cruditates in ventriculo, in venis mesaraicis & lacteis firmatæ, & à calore viscerum circū-

stantium exiccataz atque confirmataz, obstructions terreas atque melancholicas efformarunt: hinc continuo exhalationes emergunt per varias corporis partes divagantes, easdemque divexantes; à quibus obstructionibus, impedita calori hypochondriorum eventatione, calor idem intenor semper redditus est, à quo non solum portio sanguinis fœculentior consucto, crassior facta, stagnans circularem motum amittit, & ita hypochondriacus affectus, melancholicus quoque redditus est; sed præterea ventriculum etiam adeo molestat, ut cibos cito corrumpens, concoctionem inhibeat: sicque non essentialiter & positive, at per consensum & privative ventriculus ipse ab immodico & importuno calore afficiatur. Verum quoniam cruditatum portio ad jecur etiam, indeque ad renes defertur, hinc sedimenta crassa & veluti bombycina in urinis observantur, sicut arenulæ, non subsidentes, sed parietibus adherentes, humorum potius in venis, quam in renibus exulsionem demonstrant: quamvis omnino sit asserendum ardorem in renibus reperiri, à quo non solum laxatur tota renum substantia, unde insignis sequitur imbecillitas, sed præterea aliquod etiam exigui valis orificium aperitur, & per anastom. in portiuncula sanguinis effluit, quia nonnunquam cruenta urina observata fuit.

Quamvis affectus hujusmodi principalis de se lethalis non sit, attamen tot alia incommoda secum ducit, ut non solum molestam vitam inducat, verum & alia mala cum vitæ discrimine asserere possit; arenosa namque dispositio in casu nostro calculosa elici, & vasorum in renibus laxitas, sanguinis effusionem & mictionem parere posset; præterea progressu macies quoque & totius corporis atrophia subsequeretur, atque tandem neglecta hypochondriaca affectio in morbum exiccatorium, & nigrum facile migrare posset. Quare ut jam dicta omnia imminuantur, atque tandem ex toto tollantur, sicque præiens vivendi modus molestus, jucundus evadat, modo Purgatio est incunda. Nec formidare oportet anni tempus calidum, siquidem Purgatio refrigerantibus peragenda est & absolvenda, primo primas vias mundando. Secundò Obstructions aperiendo. Tertiò Massam sanguineam ab humoribus biliosis, & forsitan etiam melancholicis vindicando; atque tandem jecur, hypochondria, renes totumque venosum genus refrigerando, nec de ventriculo valde solliciti esse debemus: ad viscerum enim contemperationem & obstructionem ablationem ipse robur acquirat.

Itaque pro prima explenda intentione, primum & secundum Leniens erit syr. ros. solut. vel Cassia cum elect. lenit. quibus superbibat Eminentiss. Patientis serum depuratum. Quinque vero intermediis diebus Præparans erit.

℞. Julap. acet. ℥ ij. aq. flor. citri ℥ j. aq. cinnam. ℥ j. m. pro syrupo, & sic pro aliis.

Pro secunda intentione Aperientia debent esse humectantia, ob materiæ obstructions facientis siccitatem, imò primis diebus solis humectantibus utendum, addendo postea in progressu ipsa Aperientia: paretur itaque hujusmodi Præparans.



℥℥. Succī depur. & per arenam trajecti cich. borag. pomorum dulc. an. ℥ j. decoct. in jure pullæ malvarum, violarum, eudiv. sonchi ℥ iv. m. pro syr. & sic pro aliis x. in quorum intermedio præscribatur.

℥℥. Flor. cass. rec. extr. ℥ vi. extracti rhab. senz an. ℥ ℥. m. f. boli, quibus post horam superbibat seri capr. depur. ℥ ij. & tribus horis ab assumpto sero prandeat; quod idem medicamentum repetat decem jam dictis transactis diebus. At secunda die dictorum succorum aperiat Jecoraria dextera, sed parce sanguis educatur, portio nimirum magis atra atque crassa, ut facilius massa sanguinea purificetur & ventiletur, jecorisque fervor contemperetur.

His peractis, succorum ulus repetendus erit ita.

℥℥. Succī depur. & per arenam trajecti cich. borag. agrim. an. ℥ ij. decoct. in jure pullæ, malvarum, viol. sonchi, hepaticæ ℥ iv. m. pro syr. & sic pro aliis: succi autem sacchari portione edulcorari possunt, si ita Eminentissimo placeat. Sequenti die summo mane præbeantur boli ita parandi.

℥℥. Flor. cass. rec. extr. ℥ iij. salis prunellæ ℥ ℥. m. f. b. quibus post horam superbibat seri caprini. depur. ℥ ij. & tribus horis ab assumpto sero prandeat. Tertia die repetantur succi, ut supra; quarta boli, & ita alternatim perseverare non tædeat Eminentiss. Patientem ad decimum quintum aut vigesimum usque diem.

Dum postremæ intentioni satisfacere curabimus, tertia non erit omnino deferenda: in quem finem parabitur vinum pro mensa consuetum rhabarbarum, adeo ut in uno vini cyathothota nocte infusum fuerit rhabarbarum ad ℥ j. & mane colatum bibat Eminentiss. Pat. in prima mensa, prægressa debita consueta commestione: reliquum vero vini bibendum in tota mensa sit consuetum & sine rhabarb. In cuius vini medicati usu duodecim aut quindecim diebus perseveret. Interim quartæ intentioni satisfaciendum aquis, & præsertim *Acetossella* Romæ dicta, quæ ut vitriolata, aptissima erit: etenim primò obstructions aperiendi, jecur & renes refrigerandi, renes ipsos mundandi, & viscera omnia roborandi facultatem obtinet, dummodo rectus sit ejus usus, ita ut primis tribus diebus cum vehiculo dejectorio syr. ros. solut. præbeatur: reliquis vero diebus xv. cum vehiculo diuretico, quale esse poterit spiritus tart. ter rectificatus ad ℥ ℥. in primis cyathis, addendo quoque syrupi de sacro limon. portionem: quantitas autem diebus esse copiosa, incipiendo à septem, & ascendendo supra xii. libras paulatim, postea declinando. Terminato aquæ usu, usus lactis Asinini ad quadraginta dies de more instituendus erit, ut quod reliquias obstructionum exiccatas emollire, jecur refrigerare, massam sanguineam edulcorare, & totum corpus renutrire valeat. Quo eodem tempore xx. saltem diebus balneum aquæ dulcis ingredi poterit, alteratæ sol. malv. viol. nenuph. lactucæ & salicis, sitque tepidum, ad frigidum inclinans, nullo modo calidum. Et si fortasse ventriculo robur aliquod addere capiat Eminentiss. Pat. caute agendum, ne rursus hypochondria cum jecore caleant: sat igitur erit,

quod statim ab assumpto cibo duo aut tria grana Mastiches, integra devoret.

Jam dictis vero omnibus congrua vivendi ratio addenda erit, præsertim in cibo & potu, animique pathematibus; abstineat igitur inter carnes à suilla, bubula, leporina, à volatilibus aqueis. Inter pisces, à paludosis, lutosis, & glutinosis, ostreaceis omnibus. Inter lacticia à caseo, maxime veteri. Inter edulia ex pasta parata, eligantur tenuiora, ut vermiculi Apulicenses, & alia hujusmodi. Vitentur condimenta aromatum, excepto exiguo cinnamomo & pipere ruditer confuso: pariter condimenta alii, caparum, succorum acidorum Citri, Limonum, Arantiorum. Inter olera damnantur fœniculum, apium, carduus, fungi & tubera terræ. Inter fructus eligantur fraga, pepones, persica matura: damnantur autem acerba, nimis dulcia & statuosa. Vinum non sit dulce, non austerum, non generosum, nec minus aquosum, sed sit subdulce & substypticum, quod nos vocamus *racente*, *overo pirante*, cum aqua ab initio ebullitum, non autem quotidie, ut moris est, nuper symphatum. Animi passiones & perturbationes, imo & vehementes applicationes ablegandæ, & alacri atque confidenti animo vivat Eminentiss. Princeps, de sanitate recuperanda securus, dummodo jam dicta omnia executioni mandari permittat: etenim qui vult salvus esse, servet mandata. *dem ibidem.*

## DIGITORUM COALITUS

### Contractio & Digitus sextus.

#### Curationes.

Nostro consilio digitorum coalitus cura à Nostro tantum, eoque à prudenti Artifice administrato, sequenti modo expectari potest. Cum unionis hujus inconvenientis vinculum sit tenue, nec multis vasis sanguineis majoribus aut tendinibus intermixtum, sed solâ cute contextum sit, facillè cura succedit. Hoc enim in casu uno ictu, acuta forfice incidi potest cutis carnosæ paries integerrimus, excisis utrobique superfluis digitorum novorum quasi fundamentis. Non opus hic est ligno, triangulari, ad imitationem Plateri *Mamiff. Observation. 41.* Nec scalpello quò uti solet. *Hyrionimus ab Aquapendente Parte secunda Chirurg. cap. 101.* Hic ramentum asterisco notandum venit monitum *Celeberrim. Ruyss. Observ. 10. p. 41.* quòd deligentur digiti in novam cohesionem proni, quod optimè, institutis ligaturis, ac medicamentis idoneis, præcaveri potest. Sic quoque cura coalitus digitorum feliciter cessit, testantibus *Ephem. nostr. Ann. 6. Obser. 53. Joan. Dolæus Encyclop. Chirurg. ration. lib. 7.*

Sexti digiti cura, me arbitro, in ejus ablatione consistit, & optimè perficitur abscissione cum ferro, novacula scilicet, ligaturâ prius institutâ, & hoc potest fieri in infantibus. Legimus enim in *Ephem. German. Ann. 6. 7. Obser. 118.* Cum infans tertiam septimanam tantum complevisset, ligaturâ prius institutâ, digitum firmius adhaerentem novacula absciderunt Chirurgi



rurgi, mox alterâ die absque ligatura alium adhuc digitum amputarunt, quod sine magno dolore & sanguinis profusione factum, & vulnera facile sanata sunt, ita ut vix vestigium relictum fuerit. Confer *Clar. Riedlini Observ. p. m. 187.* Sunt qui exemplo *Plateri* test. *Obs. 42. Manrissi.* a resectione abstinere, usque infantes adultiores facti sunt, sed non videmus ob quam rationem id omitti debeat, cum digitus tantum quali petiolo pendeat, & exiguus sit, is instituto anabrochismo facile curari potest, hoc est ligaturâ cum filo sericeo instituta; hinc enim digitus superfluus marcescit & decidit, postmodum facili negotio medicamentis congruis penitus sanari potest. In adultioribus verò digitus sextus commodè cum ferro quod Germani *ein Meißel* dicunt, extirpari potest. *Idem ibidem.*

### Observationes.

#### De Digitorum Contractione.

Anno 1596. Isaacus Gotterau de Perroy, adduxit ad me Lausannam filium suum Michaëlem, 14. menses natum. Is autem sexto mense ætatis manû dextrâ in prunas ceciderat. Hinc index, medius, annularis, & auricularis unâ cum externa metacarpi parte, adeo combusti fuerunt, ut apices horum digitorum usque ad primam articulationem deciderint. At quia pater curationem imperitis commiserat, digiti omnes, (excepto pollice) cum cute metacarpi quasi in globum conglutinati fuerant. Septimo mense post absolutam curationem, adducunt ad me puerum parentes Lausannam, auxiliumque meum implorant. Purgatò itaque corpore, manna ex iusculo exhibitâ, topica & Chirurgica sic institui. Primò sequenti decoctò emollienti, & unguento, per dies aliquot usus sum.

℞. Rad. alth. cum toto, rad. bryoniz, li. lior. alb. an. ʒj. flor. chamom. meliloti, hyperici, chamæpit. chamædr. an. m. j. sem. fœnug. lini an. ʒj. coquant. in iusculo pedum & capitis vervecis, aut vituli pro lotu. Postea iunxi totam manum & brachium sequenti unguento.

℞. Unguenti dialth. ʒj. axung. human. gal. linar. arser. ursi an. ʒij. succi lumbricor. ʒß. M. F. unguentum. Tandem manum involvi emplastro de mucilaginis. His nervi & callositates ex corrugata cute metacarpi & digitorum, in externâ manus parte concreta, satis emollita. Hinc callum inter digitos & metacarpum novacula excidi. digitos item separavi. Deinde inpersi pulverem nostrum ad sanguinem sistendum, & albumina ovorum mista cum aqua rosacea, & plantaginea oleoque rosaceo, applicui. Defensivum quoque ad carpum adhibui, & totum brachium oleo rosaceo, myrtillorum, & lumbricorum iunxi. Postero die sequens digestivum filamentis suavis supra incisiones posui, & brachium, ut antea, supra dictis oleis iunxi.

℞. Terebinth. lotz in aq. rosac. & plantag. ʒj. olei rosac. & de vitell. ovor. an. ʒij. croci ʒß. vitellum unius ovi. M. Quinto die apposui sequens instrumentum, ex ligno fabricatum, & incæpi paulatim attrahere digitos ad naturalem situm. Hoc instrumentum componitur ex

ferulâ, latâ tribus digitis in latitudine positâ, ejus longitudinis ut a carpo ad cubitum tere usque pertingat. Secundo ex baculo rotundo pollicis crassitie, qui ferulâ firmiter affixus est: mediò autem hujus bacul. exsurgunt 4. clavi rotundi ex ligno fabricati. Habet item ferula sibilas duas, & lora duo. quorum beneficio instrumentum brachio alligatur. Alligato itaque instrumentò, & undique linteis, illupis, aut gossypio bene munito, habui in promptu digitalia ex pelle fabricata, quæ extremitatibus digitorum apposui; deinde filò ipsis appensò, digitos deorsum attraxi, & clavis baculo descripto affixis alligavi, atque singulis diebus magis magisque incurvavi. Id autem ut eò melius fieret, brachium & manum superiori unguento, quotiescunque vulnera tractabam iunxi. Ne autem digiti denuò conglutinentur, laminas plumbeas digitis interponebam. His paulatim digiti ad naturalem situm reduci fuerunt. Interim vulnere quoque consolidavi & cicatrizaui, non quidem iis quæ valde exsiccant, sed iis quæ simul emolliendi vim habent medicamentis. Atque sic Divinò favore manus in integrum restituta fuit. *Guilielm. Fabric. Hildanus Observat. Chirurg. Cent. 1.*

Post diuturnum colicum morbum, & resolutiones contractionesque secutas in manibus & pedibus in Nobili quodam Sene remanserunt in utraque manu contracti digiti, internodiis duobus exterioribus adeo astrictis, ut incurvati in volam manus digiti nulla vi extendi amplius possent. Multis ulus remediis, & thermis, nihil profecit; durante & jam per biennium perseverante malo, meo tandem utens consilio hoc pacto curationem inchoavi, purgato prius decenter corpore per triduum vino cathartico nervis simul accommodato; dextræ manui sequens Emplastrum applicui.

℞. Gummi ammoniac. ʒij. galban. opoponac. bdell. an. ʒj. dissolv. in aq. vitæ adde Syrac. calamit. ʒß. axung. anser. medull. cruris vituli an. ʒj. thuris ʒij. rad. Ireos. ʒj. hermodact. ʒj. latic. & resinæ communis an. q. s. f. Emplastrum super alutam extendi & manus interiori sedi universæ applicetur, & in plicaturam astrictorum digitorum imprimatur. Fuit Emplastrum scissum in partes tot, quot digiti erant, chirothecæ instar, singulis digitis petiis obvolutis, ut exactè illis jungeretur. Postea pittacium ex panno duplicato formatum, firmiter impressum, & asserculum panno involutum transversim collocatum, & omnia fascia probe coercita sic ut Emplastrum undique se digitis incurvatis accommodaret, eosque nonnihil extrorsum premeret; totam noctem sic collocatam retinuit, aliquotque noctibus continuavit. manè verò hisce impedimentis, singulis digitis plumbeam massulam chorda plana appensam, quæ illos sensim extenderet, gestavit, suffitu insuper manè usus est ex trochiscis sequentibus carbonibus ignitis impositis, parato,

℞. Marcaf. ʒij. myrrh. mastich. an. ʒij. Storac. benjoin. an. ʒj. rad. Ireos ʒß. cum latic. F. trochisc. hisce vix dum octiduo usus est, cum digitos, premeando tamen eos, extendere posset. Emplastrum rursus sinistræ quoque manui. tribus noctibus tantum apponens, eos etiam digitos jam cedere nonnihil sensit, quibus ad



ad me scriptis, jussi ut articulorum roboris causa, bis aut ter manum decocto Salviz in lixivio, in quo chalybs extinctus esset, foveret, usque horum pergeret: & ut utramque manum digitosque ante Emplastri appositionem hoc unguento illumineret.

℞. Ol. Lumbric. Lilior. an. ℥ ij β. ol. chirin. irin. an. ℥ β. Lithargyr. ℥ j. coq. parum adde gummi ammoniac. in aq. vitæ solut. ℥ j. Styrac. ℥ ij. latic. ℥ β. cerz q. s. F. unguentum, Interea licet omnia in melius tenderent spesque esset integre restitutionis, nolens amplius apud nos subsistere, thermas adiit Piperinas, Sed irritato conatu, nam earum usu, digiti amplius astringi potius quam relaxari ceperunt. *Felix Platerus, Observ. lib. 1. pag. 147.*

## DOLOR IN GENERE.

*Vbi in specie de*

## DOLORE CAPITIS

*Sub quo scilicet*

### CEPHALALGIA, CEPHALEA

*Et*

### HEMICRANIA.

**S**ensus quilibet necessario conjunctus est cum tremore aliquo nervorum, nempe alterna contractione & distractione eorundem: hi autem motus cum fieri non possint absque mutuo excursu ad contactum partium ex quibus nervus componitur, neque hic excursus sine successiva contactuum mutatione, hoc est sine solutione quadam, manifestum est sensum quemlibet esse cum solutione continui aliqua. Quia verò dolor est tremor momenti majoris, hinc fit, ut quæ solutio sit in dolore, sit multò major, ac vehementior, quam quæ in cæteris sensationibus, & cum hæc sit tristis, reliquæ non item, hæc etiam sola appellari poterit solutio continui, quatenus solutio cōtinui in genere inferre necessario creditur molestum aliquid, cum revera id necessario non inferat, nisi quando est certi gradus, ac dici poterit dolor, ut communiter dicitur, sensio molesta, vel tristis à solutione continui proveniens. His igitur ulterius non immoramur, cum ab Animalium operationibus alibi expositis pendeant, & gradum facimus ad divisiones, & species doloris, quæ à Medicis communiter recensentur. Illæ sunt tendens, seu tensivus: gravans, vel gravativus: pungens, aut punctorius, vel pungitivus, ad quem referuntur acer, mordax, pruriens, lancinans, & hujusmodi: pulsans, seu pulsativus, frangens, vel frangitivus, qui proprius est ossium, & etiam ossium dolor appellatur. Patet autem ex ipsius nominibus, quid sit ejusmodi dolorum unusquisque; premens enim est, in quo sentit Animal se ipsum totum, vel ad aliquam partem premi, ac si pondus esset impositum: tendens, in quo se diltrahi sentit cum rigiditate quadam, & duritie partis, aut totius,

ut cum chordæ musicæ, aut arcus tenduntur: pungens, cum se affici sentit non secus, ac cum acu, acicula, stylo ferreo, vel similibus cuspede feritur: pulsans, cum ad aliquam partem dolor percipitur cum pulsu non naturali: frangens denique, cum ossa ita urgeri sentiuntur, ut veluti in fracturam veniant. Facilia hæc quidem dictu, nec etiam satis obscura præsertim, cum per exempla proponantur, sed si modus, quo ejusmodi dolores excitantur, exponendus est, nec ita obvia, nec à Medicis explicata. Id igitur nostræ curæ erit, quod ut fiat planius primò ostendamus oportet, in unoquoque ex enarratis doloribus tensionem, seu causam doloris tensivi debere contingere excepta una specie doloris gravativi, quæ est per summam partium resolutionem. Quoniam enim ossa seorsim à membranis non sentiunt; omnis igitur fractio-nis aut verus sensus, aut imaginatio fiet per affectionem membranarum, fractio autem est divulsio; igitur frangitivus dolor est sensus divulsionis in membranarum interioribus, atque exterioribus ossium cavitates, & superficies quolibet succingentibus, divulsio autem non habet sine tensione, ut patet; in frangitivo igitur dolore datur tensio. Quoniam verò in nostris corporibus nullus canalis præter arterias, imò nulla pars præter ipsas naturaliter pulsatur; igitur in dolore pulsativo aliquid non naturale continget arteriis, cujus vi debeat pulsus earum, qui in naturali statu ab animali non sentitur, ab eodem animali sentiri, & sentiri cum dolore. Fiet igitur primò major; neque etenim pulsus prius insensibilis fieri sensibilis, & sentiri quatenus pulsus potest, nisi ex parvo, vel minori major fiat: major autem pulsus motum arteriæ per majus spatium majorem extensionem, & major extensio tensionem secum necessario ferunt; igitur pulsativus dolor etiam cum tensione. Quia vero major pulsus fieri non potest reliquis omnibus bene se habentibus, nisi ad partem, ad quam fit ille pulsus, obstat aliquid sanguinis fluxum impediens, cujus occursum fiat, ut sanguis ulterius procedere prohibitus nitatur quaquaversum, & validius urgeat arterias, atque ita majorem pulsus pariat, ut in huminibus profluens ad transversos obices intumescit, neque illud impedimentum esse potest, nisi quid aut obstruens interius, adeoque membranas extrorsum urgens, & propterea extendens, ac tendens, vel exterius comprimens, unde eadem extensio, & tensio; igitur etiam hæc de necessitate tensio in pulsativo, & propterea in hoc dolore, quoties per impedimentum fit, dabitur tensio duplici de nomine, & ratione pulsus, quatenus pulsus est, & ratione impediendi. Quoniam insuper punctio dicitur vulnusculum ab acuto quolibet minimo inflitum; minimum igitur illud ad hoc, ut pungat, cum vulnerare debeat, debet inter duas minimas particulas componentes sese agere, easque totas simul à contactu remove-re absque eo, quod transversè supra eundem contactum excurrant; incidet igitur pungens, antequam eas sejungat, in earundem corpus easque simul cum annexa reliqua longitudine per lineam sui motus ducet, unde fiet tensio vel aucta longitudine, si corpus illud supponatur rectum, aut curvum, sed pungens, incidat in

con-



concauum, vel imminuta, si sit curuum, & pungens, incidat in devexum, sed partibus per impulsu coeuntibus, hoc est, in minorem longitudinem abeuntibus: quare etiam punctorius dolor erit cum partium, quæ punguntur, tensione. Similiter quoniam dolor gravativus est affectio, qualis cum à superimposito pondere premimur; igitur in ejusmodi dolore eodem modo afficientur partes, at cum pondus in corpore nititur: per pondus autem membranae, nervi, musculi ita comprimuntur, & ossa ad articulos urgentur, ut neque hæc ad eosdem sili absque majore musculorum nisu possint, neque compressi musculi contrahi nisi per copiosorem spirituum compressionem superantium influxum, neque hi per nervos compressos fluere, nisi violentius agantur, atque ex hoc majori nisu dignoscitur id, quod dicimus premi, & hæc motiones à pressionibus provenientes non sunt sine tensione; igitur nec dolor gravativus, qui fiet, quoties per vitium aliquod nervi musculi, membranae, articuli similiter urgebuntur, erit sine tensione. Esto jam vel nimio humido concepto, vel qualibet alia de causa ita flaccida pars aliqua, vel totum corpus, ut suis vix ulterius cohaereat partibus, ut paginae bene madidae, vel partes etiam corporis aquis diu maceratae, uno verbo, ad putrefactionem, vel siccitatem nimiam, qualis eorum, quæ ex se in pulverem abeunt, nec poterunt illæ ad mutuum contactum excurrere, cum ne cohaereant quidem: quare in iis fieri neque per contractionem, neque per distractionem tensio poterit: collabi autem supponuntur; igitur nervos, musculos &c. proxima prement, & majori nisu, & copia spirituum opus erit ad motus, ex quo cum dijudicetur pressio, dicetur tum animal dolore gravativo affligi. Cum igitur solum in summa dissolutione partium detur quædam species, eaque unica doloris gravativi, qui sit unicus à tensione sejunctus, hoc est, à causa doloris tensivi, manifestum est, distinctius esse procedendum in enumeratione dolorum, cum tensivus, qui ab ipsis Medicis tanquam quidam separatus, & suam speciem constituens ponitur, sit quid conjunctum necessarîo cum doloribus omnibus excepto unico gravativo in summa partium resolutione. Quoniam igitur ex dictis patet, in unoquoque dolore contineri pressionem, & aliquam aliam affectionem saltem animo à tensione distinguendam, & ipsi saltem ordine, si non tempore præcedentem, dolorum singulorum species denominandæ à conjuncto illo cum tensione, quæ communis est omnibus, & constituenda etiam alia species, quæ sit, cum afficiuntur sola tensione partium, quod accidet, cum partes à naturali rigiditate recedent in majorem duritiem, vel per contractionem, vel per distractionem. Reliquorum autem dolorum affectio primaria saltem ordine præcedens tensionem est manifestissima: in pungitivo enim præcedit nisus in utramque particulam divellendam, & earum divisio, unde hujus solius respectu suam sibi vindicat speciem in gravativo pressivo, in fractivo extensio vel divisio, in pulsativo, impulsus: in sola autem tensione nihil particulare; contractio enim, vel distractio, quæ ordine præcedit tensionem, est commune illud, quod præcedit etiam in reliquis. Secundo jam expo-

nantur oportet causæ, quibus dolores hujusmodi generantur. Et primo patet ex superioribus, pulsativum fieri debere, quoties aliquid prohibet, ne sanguis naturali tenore, ac fluxu fluat per arterias, sed aliquantum, vel ex toto ad partem aliquam cohibeatur, inibi enim interceptus cumulatur, & majus spatium exigit, atque pertingens ad impedimentum, & retrorsum tendere coactus occurrit sanguini continuo affluenti, unde velut inter duas oppositas facultates pressus utroque, cum impetu quaquaversum dissilit, & arteriam ad majus spatium extendit, seu dolorem pulsativum procreat. Id autem contingere debere patet vel per nimis auctam molem sanguinis, vel per naturalem molem ejus, sed rarefactam, & veluti effervescentem, vel aucto impetu à corde, vel occlusionem per quodlibet impedimentum arteriæ; per hæc enim singula vitabitur naturalis fluxus sanguinis, ac fiet, ut in dato tempore per datam arteriæ amplitudinem fluere debeat quantitas sanguinis major, quam quæ ab eadem trajici in eo dato temporis spatio possit, unde pars, vel sanguis universus eo deductus refluere cogetur, & occurrens affluenti dissilire quaquaversum majori cum impetu, & pulsum majorem producere. Sic in valis angustioris colli liquida subsistunt ad eas angustias deductæ, eoque facilius subsistunt, si majori cum velocitate exhaurire vasa illa tentemus. Ex his autem patet, quid portendant ejusmodi pulsativi dolores, & quid causarum debeat præcessisse, quid conjunctum esse, quid succedere, quæ singula diversa esse poterunt pro diversitate partium, in quibus dolor pulsativus contingit, & cujusque rationis sint nullo negotio percipiuntur. Quia verò punctorius est affectio, qualis cum pungimur minimis, & acutis instrumentis, quicquid igitur humorum est tam tenue, ac tanti impetus, ut inter utramque illorum particulam se subito possit trudere, easque ferè totas simul absque eo quod supra se invicem ad mutuum contactum excurrant, sejungere, atque divellere, dolorem pungentem non secus, ac illa instrumenta, pariet: hujusmodi autem sunt quicunque humores tenues, calidi, biliosi, cujusmodi ichores &c; igitur ab horum allapsu ad partes sensiles fiet punctorius dolor. Et si quidem in unicam particulam incurrat, & nihil adjunctum habeat, unde punctio illa ad certum aliquem pungendi modum redigatur, dicetur simpliciter punctorius: si verò ita pungat, ut quiddam acre sentiamus, dicetur acer: si tanta vi, ac diversis in partibus proximis, quas insuper quasi lacerat, dicetur mordax, vel lancinans: si in diversas partes frequentissimè, easque similiter proximæ, vel etiam distantes recurrat, ita ut continuam quandam quasi scalpturam repetat, dicetur pruriens, & si quæ his similia nomina excogitare velis mille. Ex his autem patet, dolorem hunc punctorium facile conjungi cum inflammationibus; hæc etenim cum sint tumores maximè calidi, expirant maximè calidum, adustum, ac purum, nempe ab humiditate liberum ratione ejusdem tumoris maximè calidi humidum vel retinentis, vel absumentis, unde in membranas incidens inter utramque ipsarum particulam se se adiget tam ratione tenuitatis quam ratione motus, easque divellet &c., seu punctorium dolorem excitabit. Tertio quoniam tenduntur villi per



contractionem, & distractionem; tendi igitur poterunt per quilibet contentum in corpore contrahendis, vel distrahendis villis accommodatum; contrahunt autem humida, & quæcunque liquida humidum aqueum participant trahendo suas particulas inter utramque partem villorum, ut patet in chordis Mulicis: distrahunt autem tendendo frigida per densationem (suppositis villorum terminis immotis,) sicca, & calida abripiendo humidum; frigida igitur, humida, calida, sicca tendere villos poterunt. Vides hic similiter, quæ antecedere &c. debeant, eaque pariter esse facillima. Similiter subito patet etiam, dolorem tensivum: facile, ac necessario conjungi posse cum inflammationibus, & præcipue ad p. rtes nervosas; calor enim ille abripiet humidum, unde exticcabit, & per longitudinem distractis villis eosdem tendet, hinc dolor punctorius in pleuritide &c. cum tensione, quæ insuper erit communis omnibus arteriis, si calor inflammationis tam aduulerit universum sanguinem, ut hic omne humidum arteriarum absumpserit, hinc pulsus duri in inflammationibus internis, &c. Quoniam verò solam pressionem arguit gravativus: igitur decubitus cujusunque humoris tenacioris, tardi motus, crassi, frigidi, pituitosi ad aliquam partem, ita ut illam premat modo superius exposito, gravativum dolorem producat. Quin & hunc producat summa resolutio partium flaccescentium, & concidentium supra se ipsas, musculos, aut nervos, ut ex superioribus. Sed etiam à tensione per intrusionem humidi poterit hic dolor procreari, si intrusio sit tanta, ut villus eo usque crassescat, quousque perducatur ad contactum alicujus musculi, vel nervi, vel utriusque cum nisu in eundem; tunc etenim statim pressio, ut patet. Postremo frangitivus cum nihil aliud sit, quam divulsio, vel distractio membranarum ossa succingentium, manifestum est, oriri ipsum debere à quacunque causa, vel ab extrinseca superficie periostii intra ipsum se adigat, vel nitatur inter externam superficiem ossis, & internam periostii, vel uterque intra minimas cavernulas per os dispersas, vel demum nitatur in ipsum os ad mediam, & intimam cavitatem, eamque causam esse posse cujusunque generis, calidam nempe, frigidam, siccam, humidam, tenuem, crassam, magni, parvi momenti, &c.; cum etenim periostium valide undecunque adhæreat ossi, manifestum est, quæcunque causa supponatur, distractionem ejus moliens non nisi per minima ipsam moliri posse, cum nempe ad minimas quasque partes periostium hæreat ossi, quod cum à quacunque causa fieri possit, patet quod proposuimus. Unde deduces insuper, acerrimum esse debere ejusmodi sensum, cum nulla detur libera longitudo membranz, quæ cedat, ac proinde retundat impetum facultatis distrahentis, ex quo deduces insuper, ad eas membranas esse debere dolorem maximi sensus, quæ per densiores sui partes affiguntur ossibus, ut pleura, ut pericranium, dura mater &c., unde in his dolores acerbissimi, & cum inflammatione pungitivi. Deduces tertio, dolorem pariter magis acerbum sentiendum in membranis natura magis tensis, cujusmodi sunt expositæ, eadem de causa, tensio enim facit, ut membra-

næ minus cedant, unde impetus facultatis dolorem excitantis vividior, & magis per minima nitens, & magis divellens, hinc dolor intensus punctorius in pleuritide &c. Postremo ex his omnibus intelligis, dolores omnes, vel eorum aliquot eandem partem eodem tempore posse vexare, prout omnes, vel aliquot eos producentes causa ad eandem partem simul colliguntur, & operantur, & in frangitivis ab hac, aut illa causa eos produci facile agnoscendum, prout cum sensu fractionis conjungitur tensivus, pulsativus &c. Sed & illud animadvertendum est, dolores in vulneribus, & hujusmodi divulsionibus cum insigni præcisione nervorum post factum vulnus non perdurare ejus intensiois, quæ corripunt in ipso actu, quo vulnus excipitur; præciso enim nervo tremor tantum non cessat: quia tamen nervus semper innuit spiritus ad usque locum præcisionis, idem ad ipsum perducti nitantur in nervi superficiem abscissam oportet, & dolorem continuum excitent, sicut etiam humores à partibus proximis exudantes, & hic affluxus eo erit copiosior, & quasi continuus, si pars vulnerata sit maculosa, vel musculo proximatione contractionis hinc ulcera, vulnera &c. vix dolent, nisi cum aut ad ipsa affluit materies, aut in pus abeunt, aut munda non conservantur, aut lintea, & alia ejusmodi, quibus absterguntur, & fricantur, his admoventur, aut cum inflammantur ob affluxum sanguinis, & caloris, quorum vehementia dolor intensus, ac denum spasmus per refluxus continuos à vehementia doloris. Sed & illud ulterius notabis, verum esse posse, quod ajuvit communiter, dolorem tensivum à flatu heri; quicquid enim quaquaversum nititur in membranas circumpositas, eas tendat oportet distrahendo, unde dolor tensivus, cujusmodi verè sunt flatus, & cum hi plerunque proveniant à materiis fermentescentibus, facile dolor ille oritur, cum materiz intra aliquam partem fermentescunt, præcipue si illa pars sit maxime membranacea: hinc tensio intestinorum in affectione colica, quin etiam in cholera morbo &c., cum humores fermentescunt intra viscera abdominis, eaque quaquaversum nitendo instant. Hinc patet, simili modo etiam in aliis partibus oriri posse dolorem tensivum à flatu; materia enim potest in parte qualibet fermentescere, & in flatum abire, atque ita quaquaversum niti. Demum notabis, quemlibet dolorem etiam excitari per imaginationem posse, excitata nempe ipsius specie, ut passim exempla occurrunt in incubo, in insomniis, in deliriis, & ex harum affectionum doctrina manifestum est.

#### *Dolor Capitis.*

Quoniam, ut patet ex præmissis, unaquæque doloris species potest singulis partibus corporis accidere, manifestum est, quæ ratione, ac necessitate caput etiam possit dolere dolore pungitivo, tensivo, gravativo, pulsativo, immò etiam cum compingatur ex ossibus non secus, ac ossa cætera, membranis undecunque per intima succinctis, poterit, ac debet, cum res tulerit, dolore ossum proprio, seu fractivo affici. Ex his itaque, ac præmissis manifestum etiam est, quid sit dolor capitis, nempe solutionem



tionem continui in aliqua ex partibus intra ipsum contentis factam ab hac, vel illa causa, & ejusmodi solutio hunc, vel illum dolorem pariet, prout ea erit, ut hoc, vel illo modo solvere possit. Insuper cum dolor sit quid maxime obvium, & quid singulos dolores præcedere possit, ac debeat, quid conjungi, quid succedere, ex præmissis de dolore in genere facile pateat, ab eorundem enumeratione, atque expositione abstinemus tantummodò ad finem recensentes majoris momenti quædam ex Hippocrate ad succedentia, & præfagia in hac affectione pertinentia. Cum igitur unaquæque affectio sit idiopathica, & sympathica, erit etiam hujusmodi quicunque dolor capitis, & idiopathicus quidem erit, cum causa vigeat in capite non aliunde ex aliqua parte corporis derivata, sympathicus autem, cum ab aliqua parte corporis provenit. Idiopathicus aliquando à saxis præternaturam in capite genitis, vermibus, ossibus, tumoribus, carie crani, ulcere cerebri, & hujusmodi generatur, quin à crassiori sanguine, vel tenuiori, quorum ille tendat, fluxum prohibeat &c., hic pullet, ac pungat, ut patet per ea, quæ de dolore in genere exposita sunt. Sympathicus verò, cum pars aliqua trajicit in sanguinem humores non naturales, qui perducti ad cerebrum, seu cranium, partem nempe minimæ pressionis præternature ex vasis nequeant, unde subsistentes pariunt dolorem illum, qui ab iis humoribus necessario pendere debet, vel mollitiem cerebri afficiant suo liberiore motu divellendo, puniendo. Vel cum in parte aliqua sit talis sensus, ut nervi concutiantur æquo plus, quam naturalis cerebri itatus fert, unde dolor: vel cum absque concussionem solum trahuntur, & secum rapiunt appensum cerebrum, quod vix fieri posse crediderim, cum nervi, antequam cerebrum subeant, mille appensionibus hic illic sistantur, ita ut cerebrum ab ipsorum tractione vix quicquam pati posse videatur. Major autem videbitur cum iis partibus consensus, ad quas vel majores nervi abeunt, & magis rectè tendentes ad cerebrum, ut septum, & Ventriculus, vel ex quibus derivantur humores maxime fermentantes, cujusmodi sunt qui ab utero, unde uteri cum capite consensus non tam ratione nervorum plurimum, quam ratione humorum ab eo progenientium, qui ad cerebrum partem minimæ pressionis, & maxime delicatam perducti ad ejus membranulas vim suam magis exerent, quàm ad membranas reliquarum partium, unde videbitur consensus major, & peculiaris, quanquam re ipsa id continget non ratione veri consensus cum utero, sed ratione peculiaris naturæ cerebri, quæ injurias minus, quam reliquæ partes, ferre potest: dolor autem proveniet ratione partis dolentis, & humoris dolorem excitantis, qui humor ab utero derivatur. Qua de re illud est singulare, quod asserit Langius, mulieres uteri passionibus afflictas solo vertice capitis prope futuram coronalem dolere, ubi glaciei frigus, & pondus se sentire asserunt (quod, inquit Langius, si observaveris, ad discernendum, quando caput per matricis consensum doleat, tibi plurimum proderit.) Quod sane an verum sit in omnibus, equidem dubito, & fides sit penes Authorem. Nec quicquam aliud peculiare oc-

currit in idiopathicis, & sympathicis doloribus capitis accuratius examinandu. Dolor quilibet capitis externus est, aut internus: externi nomine intelligitur qui est extra cranium: internus qui intra. Quanta hic controversiarum series apud Medicos, ut locus doloris intra cranium inveniat, atque ut distinguatur externus ab interno. Aut enim Gal. externum ab interno dignosci, quod internus ad usque radices oculorum pertingit, eo quod oculorum tunicæ à Meningibus proveniunt, in quibus dolor internus producit: externus verò in pericranio situs non ad usque radices oculorum excurrit, cum pericranium eò usque non pertingat. Alii verò dubitant, num internus occupet Meninges solas, an etiam medullam cerebri, sed hanc alii asserunt affici dolore non posse, cum non sentiat. Ex Anatomicis autem, & experientia Chirurgorum patet, cerebri medullam, & corticem, seu totum corpus ejus, etiam si concedatur non sentiens, quatenus nullis vasis intextum concipi potest, quemadmodum & ossa, si concipiantur destituta membranis omnibus, non sentiunt; tamen quia re ipsa cum intra cranium naturaliter se habet, vasis innumeris implicatur etiam per intimam, quæ sunt ex membranarum, seu villis sentientibus, manifestum est, corpus cerebri totum posse, ac debere in dolorem cogi non solum, ac ossa possunt, ac debent, atque ita dolent, ut suum sibi dolorem proprium vindicarent, & doloris speciem se junctam ab aliis constituerint. Itaque dolor internus esse poterit & in Meningibus, & in corpore cerebri, nec necessarium erit, ut pertingat ad radices oculorum, immò de facto non omnis dolor internus capitis ad radices oculorum pertingit, ut qui sit ad occiput, & partes circa ipsum, cujusmodi datos plurimos novimus in iis, qui per longum tempus dolore capitis vexati mortui sunt, in quorum craniis ad partes posteriores inventi sunt tumores scyrthosi, caries ossis, lapilli &c. quæ monstra eo loci inventa certò arguunt dolorem illum, quem ægri in ea parte sentiebant, dum viverent fuisse internum, licet oculorum radices non affigeret sed & externus & radices oculorum potest pertingere; etiam si enim concedatur, pericranium ad eam usque partem non extendi, an non eò perducitur periosmium, membrana nempe pericranio coherens, immò ipsius pars, quæ proinde ipso dolente doleat oportet? Externum igitur ab interno facilius, & tutius distinguet Medicus à conjunctis cum dolore præcipue, si vitentur, aut non vitentur operationes cerebri, nempe motus, & sensus quilibet, sicut etiam perpendendo, num dolor ille possit esse sympathicus, quod ut intelligat, excurrat per partes omnes, ut videat, num ipsarum aliqua vitio laboret, quod cerebro communicari possit: per consensum enim vix fieri potest externus solus dolor capitis tum ratione exiguæ quantitatis, & molis nervorum, cum etiam quia externum caput majoris est motus, quam internum: ac demum tactus, premendo scilicet cutem, agitando &c. indicabit, an dolor externus sit, an internus; tactu enim si internus fuerit, nihil mutabitur dolor, si verò externus, augeri per pressionem, vel minui poterit. Quicunque dolores capitis specialibus singulorum dolorum nominibus nuncupantur,



tempe punitivi, tensivi &c. præter gravativum, qui in capite specialem Græcam appellationem adhuc retinet, & dicitur *πρὸς τὴν κεφαλὴν*. Distinguitur rursus dolor capitis in veterem, & recentem, totius capitis, aut dimidii: qui totum caput occupat nullum sortitus est peculiare nomen, & est vetus, vel recens, & in genere quicumque vetus est, & confirmatus per diuturnum temporis spatium dicitur *καρφύλλω*, qui vehemens est, & levis qualibet de causa exacerbatur, nec æger quicquam strepitus ferre potest, non loqui, non lucem videre. Recens autem est multo mitior, & dicitur *καρφύλλω*, cuiusmodi nomen, ut ex vi ipsius patet, dolorem capitis simpliciter, & nullum determinatum significat, Qui autem dolor dimidiam crani partem occupat, *ἡμικεφαλή* nuncupatur, dolor quandoque eximie intensus, & ægrum maxime affligens, & quassans; neque enim in ipso patiens solum terre non potest aut minimum rumusculum, aut dubiam luculam, aut loqui tantillam, quin neque tangi absque dolore in qualibet parte corporis, concutitur aliquando, sudat frigidum, pulsus sit inæqualis, vomit aquam lymphidam, viridem, insipidam, amaram, salinam, & cum his affectionibus perdurat solidis 24. horas, & ulterius identidem, & frequentissime, & copiosissime vomendo, sæpe cum conatibus irritis in vomitum, quibus horis transactis, & vomitu suppresso dolor evanescit: æger impense fit, artubus vix constat omnino viribus fractus. Huiusmodi emicrania laborantem per plures annos vidimus quendam, qui tali affectione laborare inciperat septennis ex casu in caput ad solum ex altiori arbore, & paroxysmus recurrebat per vices inæctas semel, his, quater singulis mensibus, aliquando per solidos menses nunquam, æstate rarior, hyeme acriori sæpius, & in mutationibus temporum præcipue, cum vergebant ad Austrinas, pluvias, & uno verbo humiditas. Forte autem hæc omnia prius à ventriculo, & intestinis proveniebant minus apte coquentibus, & humores crudos partim transmittentibus in sanguinem, partim intra se retinentibus, unde humores cum sanguine crassiores difficile per vasa cerebri compressa præter naturam ex casu ab arbore fluebant, unde dolor, hinc eorum copia subsistens infarciebat, & extendebat vasa, & premebat cerebrum, ex quo convulsionibus musculorum contrahente carentium, cuiusmodi ventriculus, unde vomitus, & nixus in eundem, & inæqualitas pulsus, & cum interim ventriculus ratione humorum contentorum pariter ab ipsis stimuletur ad vomitum, multo facilius ille succedebat. Interim per vim vomendi, & fluxus, ac refluxus vividus, & frequentes, qui in dolore contingunt, maximus, partium omnium nixus, & expressio cuiuscunque humidi & derivatio eius in partes cavas, nempe ventriculum, & intestina, unde materies largior vomitibus suppeditatur, & corpus exiucum redditur, ex quo oritur sitis absoluto paroxysmo, & debilitas totius corporis assumptis per eiusmodi motus violentos spiritibus. Quod si vomendi stimulus sit tam validus intra ventriculum, ut ex se sufficiat ad ipsum producendum, eadem contingent abs-

que eo, quod cerebrum prematur, ut patet. Quia vero repetito frequentissime, & per 24. horas protracto vomitu materia in vasis capitis contenta, & dolorem pariens sensim e vasis exprimitur, sensim minuetur copia illa materiei dolorem parientis, & conservantis in cranio per sui intrusionem intra vasa, unde demum fluit tota, & cessabit dolor. Rursus quia tremor ille doloris intensus est veluti delirium quoddam, facile species omnis in eundem tremorem incidet, eumque propterea vividior faciet, seu dolor augebitur, & æger non luculam, non rumusculum &c. ferre poterit, eo quod quæcumque species in speciem doloris incidens, ejusque tremore tremens dolorem intensiorem producat: quin assererat ille, se, cum dolore ille detineretur, ne cogitare quidem quicquam potuisse eadem de causa, ut patet. Quia vero constitutiones humida tempestativa &c. magis prohibent perspirationem, & crassiores reddere possunt humores, hinc tunc temporis frequentior paroxysmus, sicut acriori hyeme propter frigus constringens cutim: secus autem ætate, cum calor tenuet, moveat, & expirare faciat humores: hinc etiam est, quod idem melius habebat, ac diutius à paroxysmo præservabatur, si alvum subduceret, & facilis esset egestionis, seu alui humida, secus vero, cum alvus siccabatur. Quæ de hac emicrania notare volumus, cum sit a nobis diligenter observata, & sit rara constitutionis. Hæc autem sunt quæ de dolore capitis novisse oportet. Age jam selecta illa ex Hippoc. de dolore capitis explicemus. *Quibus per febres urina turbata quales juveniorum, is dolor Capitis vel adest, vel aderit.* Quoniam enim urina turbata provenire possunt à solutione partium solidarum, quæ cum sanguine feruntur per corpus, h. e. partium difficilis motus; hæ igitur perductæ ad cerebrum, in quo minima viget vis pressionis facile subsistent, & dolorem excitabunt. *Qui valentes doloribus capitis repente corripiuntur, & protinus mori fiunt, & sterunt, intra septem dies intereunt, nisi febris eos prehenderit.* Subitus enim ille insultus doloris cum vocis suppressione, & stercore indicat copiam ingentem materiei comprimentis cerebrum, quæ nisi trajiciatur in vasa sanguinis, ita ipsum premet, ut spirituum influxus impediat, unde Mors: traducta autem in vasa sanguinis febrem excitat, & per eam absumitur, vel tenuatur, & per excrementa redditur, quare patet pronuntiati ratio. Vide autem universum lib. 2. Coacatum Dureti, cuius hic primus locus. *Capitis dolor prægrandis cum acuta febre, aliove quopiam difficili signo conjunctus mori fertur: si autem omni alio malo signo procul dies 20. excesserit, sanguinis profluvium, aut suppuratum è naribus, aut partium intarum abscessus denunciant maxime vero 35. annis minoribus profluvia sanguinis, proventioribus autem abscessus expellere oportet. Ac certe profluvia omnino sperabilia sunt in frontis, & temporum dolore prægrandi.* Quoniam enim dolor capitis supponitur prægrandis, & acuta febris; vel igitur dolor ille est à decubitu materiei crassioris, quæ à febre licet acuta solui, ac moveri, seu concoqui nequeat, vel provenit à calore totius sanguinis febrem acutam producentis, & utrumque lethale, ut patet, sicut etiam cum alio quolibet signo difficili; dolor enim ex se absumit spiritus,



& in capite naturalem eorum productionem, & distributionem aut impedit, aut vitiat, atque insuper datur aliud illud difficile. Quod si mala signa desint omnia, & per tantum temporis spatium productus sit dolor, ut materies cum producens fluere incipiat (quod fieri per experientiam didicit Hippocrates transactis viginti diebus) expurgabitur, quā poterit, & per partes quidem capiti proximas, & vasa sanguinis per eas distributa, cum hac magis urgeantur, si tamen nondum tantum duruerunt, ut divelli à fluxu illius materię per vasa sanguinis fluentis non possint in junioribus autem cujusmodi sunt trigesimo quinto anno minores, vasa illa minus duruerunt; in his igitur profluvia sanguinis maxime contingent. Si verò materies sit tenacior, colligetur ad partes excrementa ejusmodi naturaliter separantes, ut ad glandulas narium, vel suppurabitur, & in aliquam ex inferioribus partibus derivabitur, & casu hic illic in abscessum abibit. Si verò vehemens, seu prægrandis ille dolor sit ad frontem, vel tempora, facile succedere poterunt profluvia sanguinis propter proxima vasa capillaria, quæ à proximis, & ingentis doloris vi plurimum per distractionem tensa nullo negotio demum divellentur, & sanguinem mittent. *Quibus cephalalgia, & echna variæ sunt febre, & simul vertigo tenebrosa incidit, & tarditas vocis, & manuum stupor, hoc vel apoplecticos, vel epilepticos, vel etiam lethargicos fore expellat.* Admirabilis pronuntiati necessitas patet ex superioribus luculentissime: hæ enim omnes affectiones indicant, copiam materię ad cerebrum colligi, à qua ipsum prematur deest autem febris, quæ eam abripiat, aut absumat; igitur in ejusmodi dolore sine febre, & cum reliquis conjunctis facile apoplexia cum cæteris. Vide autem textus singulos admirabiles, & facile ex nostris meditationibus patentes. *Laurentius bellini de Morbis Capitis.*

Inter affectus capitis, Dolor imprimis recenseretur, aliorumque istius partis pathematum, quasi agmen ducere solet; utpote qui symptoma communissimum, & maxime frequens existit, cui quidem ferè nullus non aliquando obnoxius reperitur, usque adeo ut in proverbii consuetudinem venerit, *capitis rarioris*, & admirandæ signum esse, si alicui caput nunquam doluerit.

Cephalalgia, etsi creberrimus affectus, originem tam variam, incertam, & non raro contrariam habet, ut difficillimum videatur exactam ejus Theoriam phenomenon tam multiplicium, & sæpe oppositorum solutiones continentem tradere. Morbus hic nulli temperamento, constitutioni, victus rationi, nulli causarum evidentium, aut continentium generi constans, frigidus, & calidus, sobrios, & intemperatos, jejunos, & ventre plenos, pingues, & macilentos, juvenes, & senes, immo quoslibet cujusque ætatis, sortis, & conditionis homines passim incescit. Hinc siquidem ægroti cuiuspiam affectus hujus rationes sciscitanti alias satisfieri nequeat, sæpissime dici solet, omnia ex vaporibus procedere. Porro hujus morbi Therapeia non tam per certas indicationes, quam varia tentanda, & demum methodum medendi extemporaneam ex juvantibus, & lædendibus colligendo, feliciter instituitur. Qua-

propter si nodum hunc difficillimum aggressus, rem altius, & paulo accuratius deducendo, per varias causarum series, & complicationes, longis ambagibus feror, veniam promerebor: si demum ullo modo post morbi hujus Ætiologiam plenius detectam, certior ad curationem ejus aperietur via.

Itaque ut pathologiam hanc plenius instituere pergamus, imprimis explicare oportebit, morbi subjectum, rationem formalem, unā cum causis, & differentiis; dein methodum Therapeuticam subjungere, eamque per casus, & observationes quasdam rariores illustrare.

Quoad prius, cum dolor omnis sit actio læsa, live sensio molesta, à fibrarum nervearum spasmō, live corrugatione dependens, cephalalgia subjectum erunt capitis partes maxime nervosæ, hoc est, ipsi nervi, nec non fibræ, & membranz, quales illud plures, & maxime sensibiles, tum supra, tum infra cranium dispositas obtinet. Sunt autem ejusmodi partes quæ dolore afficiuntur, imprimis duæ meninges, earumque varii processus, nervorum tunicz, pericranium, aliæque periostia, musculi panniculus carnosus, ac ipsa demum cutis. Quoad cerebrum vero, & cerebellum, eorumque appendices medullares, statuimus hæc corpora: si quidem fibris sensibilibus corrugari, & distendi aptis carent, dolorum immunitas perstare: idemque pariter etiam dicendum erit de cranio.

1. Quandoquunque autem dolor ubi vis circa partes capitis nerveas excitatur, ejus ratio formalis, in eo consistit, quod spiritus animales ab invicem distracti, & fugati corpora continentia, unā convelli, & corrugari faciunt, adeoque sensationem molestant crient: Quod verò spiritus ita diltrahit, ut unde sensio molesta oriatur, est aliquid improporcionatum, in ipsos spiritus, aut in corpora eos continentia irruens, quod fibrarum poros, & interstitia subiens, eas ab invicem divellit, simulque spiritus ibidem hospitantes in *æstus* adigit.

2. Quod spectat ad cephalalgia differentias, vulgaris distinctio est, quod dolor capitis sit vel extra cranium, vel intra cavitatem ejus: prior ille & rarior, & mitior affectus est, quia scilicet partes supra cranium, nec tam sensibiles, quam meninges interiores existunt; nec tam uberi sanguinis affluxu irrigantur, ut à subito ac vehementi incursu ejus, supra modum distendi, aut inflammari facile possint. Secundo altera cephalalgia species nempe intra cranium, & crebrior, & multo immanior existit, qui scilicet membranz cerebrum investientes sunt admodum sensibiles, atque sanguis aditu multiplici, & per plures & longe majores arterias suffunditur. Porro in quantum sanguis, aut serum ejus, & modo per omnes simul arterias, scilicet tum carotidas, tum vertebrales, modo seorsim per has, aut illas, aut symbolas, aut oppositas noxam in meningas transferunt, hinc ut quod dolor iste interior, aut universalis sit, caput totum, aut maximam ejus partem infestans, aut particularis, qui regioni cuidam privatæ limitatus, hemicranium modo in latere, modo syncipite, aut in occipite producit.

Plures sunt aliæ hujus morbi differentia, nempe



quod dolor sit levis; aut vehemens, acutus, vel hebes, brevis, aut diuturnus, continuus, vel intermittens; ejusque accessiones modo periodicæ & exactæ, modo vagæ & incertæ. Etiam pro ratione causæ conjunctæ quæ (uti mox declarabitur) modo est sanguis, modo exuviz quædam ejus, nempe aut serum, aut succus nutritius, aut vapores live status, modo est liquor nervosus, modo hujus cum humore sanguineo congressus, & lucta, cephalalgia dicatur aut sanguinea, & ea vel simplex, vel insuper serosa, vaporosa, aliasve excrementitia; aut spasmodes, ab humore fibras nerveas irrigante, easque in corrugationes dolorificas irritante.

Super his ut methodice procedentes, varias hujus morbi species cum illarum causis, ordine quodam recenscamus, distinguere visum est. Dolorem capitis in Accidentalem, sive occasionaliorem, & habitualement: prior iste sine procatarxi, aut dispositione prævia à causa evidenti solitaria excitari solet, uti cum à vini potu, crapula, insolatione, aut exercitio vehementi, item in febrium paroxysmis, cephalalgia, quibusvis fere hominibus contingit; quatenus nempe sanguis plus solito incitatus, ac immodice ebulliens membranas quas pertransit, valde inflat, ac distendit, quinimo serum & vapores ab eo tunc effervente copiosius emissi, & in membranas irrudentia, fibras nerveas vellicant ac irritant.

2. Dolor capitis habitualis procatarxin aliquam alicubi affixam habet, propter quam, vel constanter, vel crebro molestus est; ita ut quandoque licet intermittat, sæpe tamen sponte redeat, ac insuper à levi quavis occasione excitetur; huic autem sive continuus sive intermittens fuerit, neque semper, neque tantum, pro causa conjuncta, sanguinis aut seri suffusiones, aut evaporationes nimias habet, [quamvis hæc sæpe adsunt, ubi tamen causæ evidenter potius quam conjunctæ loco sunt] verum insuper parti affectæ, aut affici solitæ, semper mala procatarxis, seu prædispositio quædam affigitur, propter, quam, & causæ prædictæ, item præterea liquoris nervosi inordinationes, ejusque cum sero sanguineo vel succo nutritio congressus, & effervescunt, dolorum paroxysmos cient.

Procatarxis cephalalgica licet multiplex & diversimoda fuerit, ita ut singulæ ejus species vix enumerari possint attamen ad eam constituendam, hæc duo nempe aut alterum, aut simul utrumque, præcipue, ac fere semper conduunt; nempe 1. partis affectæ mala aut debilis constitutio, 2. dein propterea faciliior, & promptior materiæ morbificæ in illâ congestio.

Quoad prius, capitis partes doloribus obnoxiz, sunt fibræ nervæ ad membranas, tendines carnes musculosas, aliæque corpora sensilia pertinentes, quarum apparatus morbidus in earum mala conformatione, aut debilitate consistit.

Ex his priorem quandoque innatam, & hæreditariam esse inde constat, quia morbus à parentibus sæpe ad liberos traducitur: idque ea potissimum ratione fieri videtur, quod integumenta capitis debito crassiora, aut constrictiora facile trajiciunt, quare ab his cohibitis, illisque in motu præpeditis, & aggestis, meningibus, pericranium, aliæque partes sensiles, aut infractæ nimis, aut inflatæ, aut vellicatæ, dolores acci-

piunt: cui accedit, quod interdum propter cerebri intemperiem originalem humores, aut vapores circa partes ipsum concamerantes variè congeriuntur.

2. At vero longe sæpius accedit, malæ conformationis vitia, quibus hæc, vel illæ partes capitis ad cephalalgiam, disponuntur, de novo contrahi, idque vario productionis genere: quippe nonnunquam à frigore, propter statum borealem, nives, aut pluvias suscepto, in aliqua capitis regione cutis pori, quin & ipsæ fibræ nervæ ita constipantur, aut alias pervertuntur, debilitanturve, ut nec aeris externi occursum, nec sanguinis vel humorum agitationes qualvis patiantur, quin cephalalgia statim oriatur.

Nec minus raro propter inordinationes in sex non naturalibus prædispositio cephalalgica induci solet. Enimvero sanguis ob quamlibet causam, supra modum citatus, aut ebullitione suæ nimia, aut seri, vel vaporum insinuatione, partibus quibusdam nerveis, continui solutionem aut alijsmodi noxam imprimit; propterea ut cephalalgia mox præfens, ac in posterum diathesis eam à levi quavis occasione susceptura, excitantur. Cæterum à passione vehementi, à crapula, ebrietate, insuper à capitis ictu, vulnere aut contusione, dispositio cephalalgica non facile debilis, crebro inducitur; proinde ut humores aut proprii, aut excrementitii in iis congesti, & stagnantes, postea aut per se commoti, aut cum alijs succis influi effervescentes, inflationes, aut vellicationes dolorificas cieant. Quinimo phlegmonas, abscessus tuberculas schirrosas, meningis cum cranio adnascencias, aliosque malæ conformationis morbos in cerebri membranis excitatos novi, à quibus imprimis per longum tempus cephalalgia frequentes, ac immanes, ac demum affectus soporosi, ac lethales inducebantur; morbi causa, non nisi post mortem, per Anatomiam detecta, & quidem suspicari fas sit, capitis dolores inveteratos, & pertinaces, cum invitis omnibus remedijs frequentibus redeunt, & indies sæviores evadunt, à tali causa invincibili pendere.

2. Nec tantum mala conformatio, & unitas soluta, sed etiam mera interdum debilitas, sive enervatio, quasdam capitis partes cephalalgiz obnoxias reddit; cum enim fibræ alicubi ita infirmantur, ut nec proprium humorem ipsæ regere, nec alienis incursibus resistere valeant, pars sic disposita, propter levem quamvis occasionem, in corrugationes dolorificas agitur: hujusmodi fibrarum debilitates nonnunquam externa accidentia, uti frigoris, & caloris excessus, quandoque item errata in victu, prout crapula ebrietas, & imprimis somni meridi ni, insuper ingentes catarrhi, & seri aeris decubitus longiores inferre solent.

Hæc de cephalalgiz procatarxi primaria, quæ & fixa, & radicata est; altera ejus ratio secundaria, & mobilis consistit, in materiæ morbificæ circa partem prædispositam prompta ac facili congestione, à qua dolorum paroxysmi, ac insultus dependent: materies autem cum multiplex fuerit, multifariam congeri, & dolores diversis afficiendi modis excitare solet: Illa prout supra innuimus, vel est sanguis, vel serum ejus, vel succus nutritius, vel liquor nervosus. Unusquisque horum variè dispositus, aut facili-

lentiis



lentiis imbutus, circa loca capitis prædisposita, modo ante paroxysmum, sensim aggeritur, modo hoc ingruente assatim deponitur. Cæterum modo humor unicus plenitudine, ac acrimonia sua, fibras sensiles distendit, aut irritat, modo plures simul congressi mutua effervescencia fibras divellunt, adeoque spasmos dolorificos cient. Singulas harum species cum signis, & liendi modis, breviter notabimus. Cum itaque pars capitis, uti imprimis meningis, aut pericranii regio quædam propter malam conformationem, aut debilitatem, ad cephalalgiam prædisponitur, morbi insultus, sive paroxysmi propter varios humorum sequentium scilicet modo hujus, modo istius, modo plurium simul incursus, & congressus excitari solent.

1. Interdum ipse sanguis, in motum rapidiorem incitatus, ac in caput ebulliens, circa loca prædisposita, inter transeundum angultatur, aut silitur; proindeque uberius mox ibidem aggestus, vasa distendit, membranas valde inflat, fibrasque nerveas ab invicem divellit, illisque adeo corrugationes dolorificas inducit. Propter hunc rationem cephalalgia obnoxia occasionem omnes, à quibus sanguis supra modum effervescit, uti vini potum, exercitium balneum evitare coguntur.

2. Serum, in massa sanguinea copiosius aggestum, sæpe aut sponte sua ob meram plenitudinem, aut à causa evidenti commotum, subito fluorem concipit, & proinde itatim è cruore exundans, non semper aut tantum in pulmones, at sæpenumero in caput irruit, inque membranas aut musculos ejus suffulsum, circa partes ad cephalalgiam prædispositas copiosius aggeritur, ibidemque inflationes & corrugationes dolorificas inducit. Porro serum, prout recrementa sulphurea, aut salina, acrida, acida, biliosa, aut melancholica, aut alius generis infecta secum vehit, eaque fibris nerveis affigit, dolorem acutum, aut hebetem, brevem, aut longiorem infert: Cephalalgia propter hujusmodi procataxin oriunda, tempore hyberno, celo humido, & vento austrino, gravius infestant: insuper hunc affectum aliarum faciei, oris, aut laryngis, partium catarrhi sæpe comitantur.

3. Succus nutritius, sive recens chymus, è sanguine ad partes solidas delatus, usque adponendus, siquidem ille quibusdam capitis partibus malè dispositis improporcionatus fuerit, cephalalgia paroxysmos periodicos excitare solet. Nanique hujus penus, juxta fibras quasdam nerveas depositus, siquidem assimilari nequit, post aliquantam moram, eas aggravare incipit, & demum in corrugationes, propter molesti expulsiõnem irritat. Cephalalgia à tali causa procedens, potest totidem à partu horas quotidie repetere, & pari temporis spatio perdurare, quinimò prout victus ratio quoad quantitatem, qualitatem, & assumendi tempora alteratur, etiam dolorum paroxysmi variari solent, sicut in multis observavi.

4. Liquor nervosus, inordinatione sua, cum sæpe in aliis partibus, ita non raro in capite, dolorum causa, existit; nam ista, aut à crassi degener, aut sacculentiis imbutus, fibras nerveas non ita libere trajicit, quin stagnare, in usque ad plenitudinem irritativam congeri

aptus est: idque præsertim intra fibras prius debiles, aut male contornatas, (quales interdum sunt capitis membrane:) quippe in his prædispositis, liquor irriguus in motu præpeditus, ad plenitudinem aggravativam, aut irritativam facile auargit, proinde ut fibrae adeo impletæ, instar stomachi nimis saginati, propter contenta sua excernenda, spasmos, & corrugationes dolorificas ineant, nec ab his cessent, donec sarcina liberantur, quæ tanen postea rursus, non odò citius, modò tardius coacervata, alios subinde, ac alios dolorum paroxysmos infert. Cephalalgia talem ob causam oriunda, sine notabili sanguinis turgescencia, & sæpenumero absque erroribus in victu, lente, ac sua velut sponte oritur; quandoque tamen propter inordinationes in non naturalibus, aliaque accidentia citius acceriscitur; sæpius horis matutinis, & post largiores somnos, cum fibrae nerveæ humorem istum copiosius inhibent, obtingere solet.

5. In prædictis cephalalgia, materies morbifica humore ut plurimum unico sive singulari constat, proindeque dolorum paroxysmi paulo mitiores sunt, & non raro citius pertranseunt. Subest vero altera hujus morbi causa, cum duo humores (instar salinorum diversi generis) si non congressi, in utro effervescunt, adeoque à particularum dissimilium lucta, fibrae plurimum vellicantur, inque dolores valde acutos & lancinantes aguntur, usque non raro diutius infestantur: in hoc casu pugil unus semper erit liquor nervosus, alter vero, aut latex serosus, aut succus nutritius. Sanguinem, quia fibrarum ductus tantum alluit, ac non intima sulcit, eximimus; liquor autem nervosus, ob vicia modo citata, interdum per se fibras continentes vellicat, inque spasmos dolorificos cient. Quod si huic ita prædisposito, ac intra fibras plenius aggesto, humor alter, sive nutritius, sive serosus (nam uterque reus esse solet) minus congenere existens, copiosè suffunditur; particularum itatim omnes exulscitatur inter se colluctantur, adeoque in utraque effervescencia fibras insigniter distendunt, & vellicant, hinc ut ab istidem diu & valde corrugatis, dolores acerrimi, & diu permanentes inducantur. Utrum hic, aut iste humor liquori nerveo occurrens, in cephalalgia accersenda potior fuerit, ex propriis utriusque per se peccantis anomalis supra descriptis facile innotescat.

Quo ritu & quas ob causas remotiores, humores, nempe aut serosus aut nutritius delinquant, quoties nerveo intra fibras contento occurrentes, dolorum paroxysmos cient, infra declarabitur: interim præcipua liquoris nervei culpa, cephalalgias crebriores, & habituales produci, satis constare arbitror, quoniam hic & fibris ipsis quæ corrugantur, & spiritibus qui in distractiones dolorificas aguntur, maxime intimus est, tum etiam quia dolores capitis, nonnunquam sine ulla sanguinis, feri, aut succi nutritii inordinatione, aut tumultu oriuntur, atque his quantumvis depletis, aut sedatis, cephalalgia pertinaciter sæpe durant.

De liquore autem nerveo, cū cephalalgia causa est, observamus culpam ejus, modo universalem, & modo privatam esse: nam interdum iste labæ suam, à parte affecta acquirere potest; quatenus



nempe intra fibras conformatione lasas subsistere aut stagnare coactus, adeo pervertitur, ut demum infestus illas; vel per se, vel cum alio humore fermentescens, in corrugationes dolorificas irritet: quandoque tamen, ac præsertim in cephalalgis gravioribus existimare fas est, totam liquoris nervi massam in vicio esse nervosas autem capitis partes, præ aliis quibusvis in toto corpore noxam ejus luere; quia nimirum hæc primæ liquoris nervi scaturigini propiores existunt, atque etiam sunt maxime sensiles: quapropter liquor nervus si quando vitiosus fuerit, intra meningas, aliasque capitis membranas, plusquam alibi in cæteris partibus corporis, vel sponte turgescens, vel ab altero humore ei suffuso effervescens, dolorificus evadit. Rem ita habere constat, quoniam cephalæa diuturna, ac gravis non tam remediis capiti adhibitis, aut appropriatis, quam iis quæ succi nervi, atque massæ sanguinæ crases restitunt, quælia sunt chalybeata, antiscorbutica, curari solet. Quod certe arguit, quicquid liquor nervus in toto corpore peccat, id capiti partes potissimum plecti.

Hæc de cephalalgæ causis & procatasticis & conjunctis: restant aliæ remotiores, evidentes dictæ, quæ priores exuscitant, inque actus, seu efficiendi rationes dolorificas cient. Sunt autem varii generis, & diversimodæ operationis. Quæcunque nimirum res, 1. aut materiam morbilicam, aliunde in partem affectam transferre, aut 2. illam in ea prius hospitantem commovere apta sunt, 3. aut denique libris ipsis, in spasmos dolorificos prædispositis affectionem illam à longinquo, & aliarum partium consensu imprimunt, ad hunc sensum pertinent.

Quoad prius sanguis ejusque inquilini humores, nempe serosus nutritius, nec non recrementa biliosa, acida, ac alias vitiosa, variis de causis commoveri, inque capitis membranas transferri apta sunt, multa quæ exterius accidunt viz. aeris ac anni mutationes magnæ aut subitæ, æstus, frigoris, aut madoris excessus, lautus victus, vini potus, balneum, venus immorica, passiones violentæ, quin & plures aliæ causas satis notæ, & quibusque cephalalgicis evitandæ, illud passim efficiunt. Porro humores isti interdum, sponte turgescunt, & si causa externa, aut evidenti, commoti, se in caput proripiunt: quo ubi advenerint, fibrisque prius indispositis jam infederint, licet causæ conjunctæ partem constituunt, ipsi tamen cum primum in motu sive fluore sunt, causæ evidentis rationem subeunt. Quare cum prius explicavimus quoritu sanguis, quæque in eo hospitantur, ad membranas affectas delata, cephalalgias concitant; modo ostendemus quibus modis, & ob quas occasiones, iidem humores commoveri, inque membranas corripri solent.

Et primo sanguis sua sponte, & propter intensos particularum ejus motus, & collutationes subiinde effervescens, capiti molestias impertit; nec tantum in febrium paroxysmis, aut insuper sine causa evidenti, aut morbi suspitione, turgescentiæ ejus crebræ ac vagæ obtingunt, quas in aliis vix perceptibiles cephalalgia obnoxii satis advertunt, ac luunt; nec solum à proprio penu sanguis capiti noxam immittit, sed eam aliunde suscipiens illuc defert. Sæpe-

numerò cruor à stomacho, liene, mesenterio, hepate, utero, aliisque partibus, aut visceribus materiam incongruam, aut sibi, aut nervoso generi infestam luscipit, quam brevi potest ut extrudat effervescens, membranis capitis suffundit, adeoque cephalalgiam vulgò sympathicam dictam, sc. per consensum ab aliis partibus excitatam producit; cujusmodi affectus ab aliis partibus ad caput transmissio, etiam alio interdum modo contingit, uti mox declarabitur.

Cum massa sanguinea sero alundat, nonnquam mera plenitudine ad illud excernendum excitatur, quare fluorem seu velut deliquium quoddam, quo nempe tenuis, & aquosum, a spissiori & cruento secernatur, concipit. Dein si quidem cruor dilutior factus, inter turgescendum celerius, & copiosius trajicitur per arterias, quam reduci possit per venas, serè quicquid seorsum est, juxta vasorum intercapedines amandatur, inque partes, modo has, modos illas suffundit, prout in quibusdam locis tumores, aut catarrhum ita in capitis membranis decumbens, dolorum paroxysmos ciet.

Cæterum ob plures alias causas, à sanguine fluorem paulo serosa colluvies exundans in meningas, & pericranium irruit, inque ipsis cephalalgias valde molestas parit. Subita pororum à frigore aut madore constipatio, talem affectum in plerisque huic morbo obnoxii terè constantes producit. Vini acidi ac tenuis, pomacei, quini & cerevisiæ propter acorem fermentescere aptæ potus, quatenus sanguinem fundunt, & serositates ejus præcipitant, cephalalgicis tanquam venena prohibentur: denique quicquid fere podagricis idem etiam & his ob similem in utriusque feri turgentis ad partem affectam, ubi cum humore nervo sæpe effervescit, fluxioni, obesse solet.

Porro non tantum merum, simplexque sanguinis serum in capitis membranas exundans, dolorum paroxysmos ciet, aut interdum humores alii se adjungunt, hujusque ductu ad partem affectam admissi, morbi tragediam adaugent; sæpe accidit humorem tenuem & aquosum à vasis lymphicis, glandulis, forsan & partium solidarum meatibus & poris (in quibus aggregabatur) subito effluere, inque sanguinem venosum suffundi; unde statim cordis sinus trajiciens, & sanguini arterioso confusus, ab eo denuo statim secernitur, & qua data via rejicitur; idcirco partim per renes amandatus, urinæ limpidæ & copiosissimæ profluvium facit, quandoque etiam partim in cerebrum, aut nervorum origines redundans, affectus soporosos aut convulsivos (prout alibi docuimus) producit. Quinimò interdum pars quædam ejusdem humoris limpidi in capitis membranas cum sero correpta cephalalgia atrocioris paroxysmum ciet: enimvero in pluribus observavi, urinam limpidam & valde copiosam, morbi hujus paroxysmum aut præcedere, aut comitari.

Cæterum opinari fas sit, aliusmodi aliarum partium recrementa, scilicet bilem ab hepate, saculentias atrabilarias à liene, & forsan huiusmodi incongruos à stomacho, pancreate, renibus, &c. à sanguinis sero obsorberi, eique penitus incoqui, quibus dum inficitur, effervescencias multo promptius concipit, proindeque in vasa cephalica impetuosius irrumpens, cumque

liquore



liquore nervo, ibidem fermentescens, spasmos, & vellicationes dolorificas valde molestat parit.

Serosa colluvies, sive hæc simplex, seu ut ostensum est, complicata fuerit, adhuc amplius capiti infesta est, si quando solennis ejus evacuatio, per debitas, & assuetas vias præpeditur, : (vix) si vel poris constrictis transpiratio inhibetur, vel propter renes male affectos *diuresis* haud satis copiose peragitur, utrumque defectum cephalalgici graviter sentiunt. Porro ob sanguinis transitum in aliis locis præcluium capitis membranæ plectuntur : quibus enim viscera imi, aut mediæ ventris, præsertim, si hepar, & pulmones obstructione laborant, ita ut sanguis ibidem vix trajici possit, plenior ejus torrens, in alias partes, ac præcipue versus *trigeminum* dirigitur ; ita ut propter hanc causam non tantum cephalalgias : sed affectiones soporosas, & interdum lethales successisse noverim.

3. In cruoris sinu prout serum, ita & succus nutritivus, hoc est recens chymus, ex alimentis confectus hospitatur, ac una circulator, ejusdem quasi fluminis decursu, illorum exorbitantibus obsequi cogitur. Quare cum sanguis mox à paltu impetuosè aut inordinate ad caput proripitur, succus etiam nutritivus semicoccus, aut depravatus, fibræ illæ membranaceis affigitur, vellicationes dolorificas succedunt ; hinc enim est quod à pleno ventre exercitium, balneum, passionem violentam, lætio, aut seria animi intentio cephalalgicis officiant.

Interdum succus nutritivus, sanguini non statim, aut facile miscetur, quin huic recens illatus mox turgescientiam concitat, adeo ut multi constantè a paltu intenso vultus rubore ; non raro item cephalalgia afficiantur. Hoc vulgo, sed perperam obstructioni hepatis imputatur, cum revera à dyscrasia sanguinis, chymi recentis mixturam ægrè ferentis procedat. Quare talis affectio plerumque febribus periculosis, ac imprimis variolis succedit, nonnunquam crapula immani supervenit.

4. Restat adhuc aliud causarum evidentium (à quibus nempe cephalalgia provocatur seu prædispositiones accipiuntur) genus, à prioribus nempe sanguinis, feri, & succi nutritii anomalis, plane diversam ; nempe cum propter spasmos in partibus aliis inceptos, ab usque ad *trigeminum* continuatos, cephalalgia non raro atroces succedunt. Usitatum est ab hypochondriis nec non e regione stomachi, mesenterii, uteri, imò interdum à membris aut partibus externis, quendam quasi fornicationis sensum in caput proripere (ibidemque mos dolorem aliquandiu postea duraturum excitare. Hujusmodi affectio, quæ non raro vertiginis, etiam Epileptæ, aut Apoplexiæ proximum esse solet, vaporum ascensus vulgo creditur ; cum revera sit tantum spasmus in nervi cujusdam extremitate inceptus, qui versus originem ejus sursum proripitans, & dein cranio superato, quatenus, ut ipsi *trigeminum* aut etiam meningibus, scilicet aut alteri, utrique communicatur, convulsionem, aut dolorem eret. Quæ tamen pathemata fornicationem istam aliunde traditam, modò velut ignem, & quandoque velut causam sequuntur. Prioris rationem alibi satis

fusè explicavimus, ostenso nimirum, quod cum materies morbifica nervorum origines, aut partes eis proximas, in capite occupavit, spasmus sæpenumero ab eorundem nervorum extremitatibus incipiens, illinc lursum traditus versus loca primario affecta, quasi perrepando ascenderet : quare non tantum vertiginis, sed & cephalæ vomitio crebriò supervenit.

Attamen præterea irritatio in viscere quodam aut membro disito cephalalgia interdum occasio, & quædamtenus causa est, nempe cum materies morbifica, usque ad turgescientiam plenitudinem jam jam in capitis parte affecta aggeritur, fibrarum continentium vellicatione levitantum opus est, ut materies ista concita morbi paroxysmum inferat ; ad quam accendendam non raro sufficit, quod visceris cujusdam disiti, puta, ventriculi, lienis, aut uteri, cui scilicet, cum capite intus intercedit consensus, fibræ nervæ vellicentur ; nam proinde statim molestia per nervos communicata, fibræ capitis quædam membranaceæ malè dispositæ, & materia morbifica onusta, stringi & corrugari incipiunt, cumque adeo morbi minera commovetur, à particulis ejus commotis, fibræ in corrugationes graves ac diuturnas urgeantur.

Cephalalgia ad hunc modum à visceribus exoriri visa, & vulgo sympathica dicta, vaporibus ascribi solent : vix. supponendo humoris noxii mineram in viscere quodam delitescere, e qua commotâ, dum effluvia in caput ascendant, ibidemque fibras nerveas acriter percellunt, vellicantque, dolores excitantur. Doctrinam hanc olim ita plane redarguimus, ut non opus fuerit rationes hic alias opponere. Interim vero disquirimus, annon aliis etiam modis præter communicationem per nervos spasmodicam, capitis dolores, propter causam morificam in stomacho, liene, aliisque locis hospitantem oriantur.

Super his opinari fas sit, materiem sæpe degenerem in partibus remotis congeri, quæ sanguinis commeatu, sive trajectu, capiti noxam inferat. Usitatum est humores corruptos, scilicet modo acres, modo acidos, aut asperos in ventriculo, bilem in hepate, faculentias atrabiliaras circa lienem, quin & aliusmodi degenerem materiam circa mesenterium, uterum, aut alias partes congeri, à quibus demum ad turgescientiam plenitudinem aggestis, miasma fermentativum sanguini infigitur, à quo isto velut œstro imbutus impetuosè effervescit, & partim turgescientia sua, partimque in membranas capitis quod incongruum est transferendo, dolorum paroxysmos atroces ciet.

Quoad ventriculum rem ita nonnunquam habere, quidam morbo isti obnoxii plane experiantur. Quippe horum nonnulli post bilem in stomacho fluctuantem, alique post insignem illi acorem, & famem caninam, cephalalgia paroxysmum certissime expectant. Cuius ratio ex parte videtur esse, quod ista ventriculi contenta, a sanguine absorpta ipsum effervescent, & turgescientiam cephalalgicam in eodem concitant ; insuper ab ejusmodi materia acri, vitriolica, aut alias infesta, intra stomachum aggesta & commota, spasmus, sive corruga-



tio molesta fibris, nervorumque extremitatibus illic insertis imprimatur, qui mox eorundem nervorum paris octavi, & intercostalis ductu in caput continuatus, membranis, fibrisque nerveis in corrugationes dolorificas prædispositis communicatur.

Propter eandem inter stomachum & caput communicationem reciprocam nausæ & vomitus, prout modo innuimus cephalalgia non raro superveniunt, membranis a materia morbifica, (non secus ac a plaga aut vulnere illato aslolet) in corrugationes dolorificas incitatis, noxamque nervorum ductu, ad ventriculum, ex se insontem transferentibus, vomendi nixus interdum inanis oritur, nihilo quod rejiciatur intra ventriculum supersit: quandoque tamen ab innani viscerum inter vomendum successione, humor felleus aut pancreaticus, nempe alter tantum, aut utriusque simul in duodenum explosi, & vomitu rejecti, pro materia cephalalgica perperam sumuntur.

2. Dolores capitis lieni, haud minus quam ventriculo imputari solent: & quidem passim observare est in hypochondriacis, isti etiam morbo obnoxii, cum in sinistro latere dolor, inflatio, borborygmus, aut alia quævis, velut lienis affecti perturbatio, contingit, cephalalgiam quasi exinde suscitaram mox crebro succedere: hinc statim vox populi est vapores à liene perturbato emissos, capitis dolorem ciet: verum enimvero ut concedamus cephalalgiam lienis culpa interdum oriri, rejecta tamen ista per vapores *ainakoyia* hujus causa imputari debet, aut malo fermento à liene in sanguinem transmissio, aut spasmus illinc capiti per nervos communicato: quippe in liene male affecto, humor atrabilarius, inque naturam modo vitriolicam, modo acrem, aut acidam, vel alias infestam degener sæpenumero aggeritur, qui sponte ob plenitudinem, aut occasionaliter ob perturbationem quandam excussus, & sanguinis confusus, effermentationem imprimit, quæ liquor ejus capitis membranis irruens per se, aut cum liquore nervoso effervescens, vellicationes dolorificas ciet. Porro haud nunus probabile est, quod interdum spasmus in fibris nerveis, quæ circa lienem quam plurimæ disponuntur, excitatus, illinc per nervorum paris vagi ac intercostalis ductus, ad *sympathia* continuatus parem membranis ad in prædispositis affectionem imprimat.

3. Iuxta eandem pathologiam nempe aut mali fermenti transmissione, aut spasmi continuatione, reddi potest ratio de cephalalgiis, quæ per consensum ab hepate, mesenterio, utero, aliisque partibus suscitari perhibentur.

Cephalalgia Habitualis, cuius *Ætiologia* hætenus satis fuscè tractavimus, adhuc in species quasdam dirimitur ea nimirum aut continua est, aut intermittens; cæterum huius periodi modo ad certum tempus determinantur, modo vagæ ac incertæ existunt: super his singulis breviter dicemus.

1. Igitur interdum accidit quempiam dolore capitis continuo, per plures sc. dies, aut menses prorogato atque parum aut nihil, nisi cum somnus urget, intermittente affligi, quo in casu supponimus non modo causam procataxi-

cam, sed & coniunctam, alicubi fixam, & constantem adesse. Præterquam enim quod partes affectæ, aut quæ subinde affici solent, sunt debiles, & liquor earum irriguus, utpote depravatus, stagnare, aut cum aliis humoribus effervescere aptus fuerit, insuper in illis quædam solutio continui, nempe inflammatio, erysipelas, abscessus, tumor scirrholus, aut alias cuiusdam generis non raro excitatur: circa quem dum humores diversimodi concurrunt, & aggeruntur, propter fibras nerveas continuo vellicationes, dolores fere perpetui oriuntur. Huiusmodi cephalalgia non raro in affectus soporosos & tandem lethales terminantur; nam cum plurimum ab hisce affectibus defunctorum capita aperverim, signa sive vestigia, prædictas eiusmodi causas morbosas declarantia, apparebant; horum exempla quædam infra subduntur.

2. Cephalalgia habitualis plerumque intermittens est, cuius accessiones, cum certæ, ac periodice fuerint, sæpissime intra nycthemeri spatium redire solent. Casus quorundam rariores audiui, & novi, & qui diebus alternis, immo qui semel in hebdomada, aut mense, affectus istius paroxysmos exacte repentes pertulerunt. Vitatum est cephalalgia proligari vitæ, circa æquinoccia, aut solstitia, accessiones recrudescere: quia sc. his temporibus sanguis ac humores turgescencias solito majores concipiunt, & proinde cum liquore partium capitis nervearum irriguo effervescere magis apti, solitos dolorum insultus redintegrandi. Veruntamen cum circa has anni *æpomis* cephalalgia repetunt, haud unica longiore accessione diu prorogantur, sed plerumque periodos subordinatas nactæ, nycthemeri cuiusque spatii statim quibusdani horis infestare solent.

Cum itaque cephalalgia periodica accessiones quotidianas plerumque habet, harum uti febrium intermittentium, rationes à materia morbifica, statim tempore ad plenitudinem assurgentis, & tunc effervescens vitio peti debet. Enimvero supponere, licet, alicubi circa capitis membranas fibras nerveas male dispositas, liquorem proprium pervertere, aut non bene traicere, quare cum succus nutritius, iidem etiam partibus è sanguine appositus, non statim assimilatur, nec cum altero humore bene convenit, demum ac utriusque simul aggelitis, & discrepantibus, mutua effervescencia, prouindeque librarum vellicatio dolorifica exoritur: quod autem dolorum paroxysmi non eadem semper à paltu distantia, sed in aliquibus citius, inque aliis tardius, atque modo ante somnum, modo post eum oriuntur, in causa est partum quod alimentorum costionis & distributionis munera, modo citius, modo tardius obeuntur, & partim quoniam in his liquor nerveus, inque aliis succus nutritius plus peccat, quare prout huius plenitudo citius, ac illius tardius contingit, ita paroxysmi tempora variantur: hæc inferius observationibus circa casus ægrotantium factis illustrabimus.

3. Cum Cephalalgia intermittens paroxysmi sunt vagi ac incerti, nec morbi procataxis magna est aut constans, nec causa evidens assidua existit, quare cum utraque causa sæpè deest,



deest; & non raro altera defidetur; morbi insultus, non ad certa alligantur tempora; quin isti in quibusdam sunt velut fortuiti, & accidentales; in aliis; quibus prædispositio ad hunc affectum paulo firmitus radicitur; dolores capitis frequentius molestant; & propter varias occasiones passim excitantur; immo & ob quasdam certissime expectari solent: Paroxysmorum ita variè obtingentium rationes ex morbi hujus Ætiologica superius tradita liquido patent; insuper exemplis infra traditis res tota illustrabitur.

Hæc de cephalalgia causis, quæ siquidem ita variæ ac diversæ, earumque series tam perplexæ ac intricatæ fuerint; non facile videtur circa omnes ægrotantium casus; methodi solum arripere, quod statim ad morbi hujus labyrinthi veram diagnosis, aut thesapiam ducamus; nec minor circa prognosin ejus difficultas habetur: veruntamen experientia vulgaris observationes quasdam suggerit; e quibus colligi solet, ægritudinis istius, curationem modo facilem, modo difficilem; aut vix possibilem esse; ita ut inde morbi eventum aut tutum, aut valde periculosum, aut prorsus incertum declarare liceat.

Enimvero si quispiam integræ prius valetudine tretus, ob causam evidentem fortisorem, uti vini potum, crapulam, venerem, exercitia immoderata, aut similia; in cephalalgiam nonnihil atrocem, & aliquamdiu protractam incidit; in quantum præcatæris morbidæ nondum firma jacitur, pronunciamus talem affectum satis tutum, ac minime periculosum fore.

Sin vero dispositio *invenit* inveterata fuerit, ita ut à multis annis, paroxysmi sæpe sponte sua, ac insuper à levi quavis occasione repetant, hunc etsi non periculose admodum ægrotare, attamen non facile curatum iri prædicamus. Porro *invenit* adhuc difficiliorem fore; si affectiones hypocondriacæ aut hysteriæ sæpius molestant cephalalgiam crebra vice excitare solent, vel si luis veneræ inveteratæ miasma, in parte affecta radicitum fuerit.

Quod si dolor capitis non solum inveteratus sed fere continuus fuerit, ut jure suspicemur, eum à tumore phlegmonodei ascirrhoso, erysipelate, abscessu, aut vermibus oriri curationis spes exigua, aut nulla superest; præsertim; quia laborantes magna remedia, ut salivationem aut cranii apertionem recusant; quæ si forsan omnino uspiam aliquo cum fructu usurpata sint, prius tamen hæc ut plurimum ægris tardio esse solent, quam molestiâ aut expectatione aliquid dignum efficiunt.

Dolor capitis sive continuus, sive periodicus, si immanis fuerit, atque vertiginem, vomitionem, aliosque affectus aut convulsivos, aut soporosos adjunctos habuerit, periculi magni suspicionem præbet: utpote qui sæpe in Apoplexiam lethalem & non raro in Epilepsiam, Paralytim, cæcitatem, surditatem, aliosque morbos aut funestos aut intractabiles transit.

Cephalalgia methodus Therapeutica, plures indicationes easque varii generis; juxta multiplices morbi hujus species, causas, & differentias comprehendit; quas non facile erit omnes exacto ordine hic digerere & recensere.

Dolor capitis accidentalis, remota causa evidenti, & consequentiis ejus ut plurimum sponte cessat, vel saltem phlebotomia, quiete & sudore tollitur.

Dolor habitualis pro diversitate causarum; sc. tum præcatæricæ, tum conjunctæ; etiam diversimodas medendi intentiones suggerit, præcipuas harum; ac ad quas cæteræ omnes revocari possunt, hic breviter perstringam.

In omni cephalalgia habituali, sive continua, sive intermittens ea fuerit; duo præcipui curationis scopi occurrunt; ad quos cæteræ quæque intentiones therapeutica collimare debent, & quibus contra utramque præcatæricæ morbi dæ providetur.

1. Imprimis nempe; ut morbi fomes omnino præscindatur, operam dare oportet, tum ut materies ad capitis loca affecta, aut male disposita affluens, vel subinde affluere apta, vel supprimatur, vel illinc alio avocetur; tum insuper ut spasmi aliis in locis excitati; indeque in caput propagari soliti præcaveantur.

2. Dein 2. quod morbus ipse, sive causa ejus conjuncta (si fieri possit) eradiceatur; existendum erit, ut capitis loca in cephalalgias prædisposita (sive debilia tantum, sive in conformatione laesa) dum à crebris materiæ infestæ incurtibus muniantur, statum suum pristinum, & vigorem recuperent: Cujusmodi indicatio licet raro unquam subito, aut integrè perficitur, quandoque tamen cura diligenti, & longa; labes morbidæ, ut ut fixa, & radicata, sensim atteritur.

Quod spectat ad priorem medendi scopum, cuius & prior, & potior ratio haberi debet, diximus materiem, sive humores, qui circa partes capitis, ad cephalalgiam prædispositas congeri, morbique insultus excitare solent, esse aut sanguinem, aut serum ejus, aut succum nutritium, vel nervosum. Insuper cum his singulis vapores, & effluvia; nec non recrementa; modo biliosa; modo atrabilaria, modo acida, salsa, sulphurea, aliaque varii generis, è visceribus modo his, modo illis, in sanguinem suscepta, commeatu ejus in caput transferri ostendimus: contra horum omnium impetus, & incursus munimenta *integram* instituantur.

1. Et primò, si jam circa membranas capitis ad dolores præcatæricæ, sive diathesi; sanguis utpote calidior, & turgescere aptus; in capitis membranas subinde confertim irruet, cumque non facile pertranseat, vasa supra modum distendens, fibrasque nerveas distellens, morbi hujus paroxysmos excitabit, (cujus indicium sunt, temperamentum sanguineum, æstus, & ruboris in capite circa faciem suffusio, item pulsus altus, & vibrans; cum venis à cruore distentis) protinus danda erit opera, tum ut sanguis sedatior factus; non adeo prompte in turgescencias agatur; tum etiam ne incitatus, ac ebulliens, majori *impetu* in caput quam in alias partes feratur; nec itidem propter meningum sinus nimis impletos stagnare cogatur. Quapropter si paroxysmus diutius infestabit, phlebotomia in brachio, aut venâ jugulari, celebretur: extra paroxysmos interdum expedit sanguinem è venis sedalibus per hirudines detrahi; nempe hac ratione ut sanguis



sanguis forte ebulliens; deorsum versus locum istum, quo sæpe sponte tendit, sollicitetur. Oxyrhodina, aut alia, Epithemata capiti adhibeantur: insuper lulapia, Emulsiones, aut Decocta, quæ sanguinis fervorem, aut æstrum compescant, præpinentur, Alvus enematum usæ refrigeretur, & lubrica servetur. Porro in prophylaxin, serum lactis, aut acidularum usus est tempestivus; hydropisia etiam, victus tenuis, & refrigerans juvant; vini, aromatum, balnei, motus animi aut corporis violenti quoniam calidiorum omnium fuga constituitur. Dein ad sanguinem ligendum, ejusque effervescantias præcavendas, aquæ destillatæ, herbarum expressiones, aut Decocta, Electuaria, Pulveres, ac præcipue Crystallum minerale, crebro sint in usu. Non opus erit hic methodum aut medicamentorum formulas particulares jungere, cum in hoc casu unusquisque fere laborans, crebra à juvantibus & lædendis experientia edoctus, sibi metipsum medicus esse solet.

2. Ratio est, quod sanguis solus, aut per se tantum peccat; sæpius alii humores, commixtu ejus ad caput delati, ibidemque dispositi, noxam inferunt: si quando igitur colluvies serosa è cruore exundans, cephalalgias (prout modo ostensum erat) crebras inducit (cujus indicia sunt catharrus circa alias partes, sc. nares, os, aut trachea), simul infestis tunc abstinentiæ, & quiete imperatis, alvoque per clysterem inanita, serifluxio sedari, & materies capitis membranæ suffusa evaporare sinantur, quæ si non sponte, & brevi succedant, in constitutione calidiori, phlebotomia sæpe convenit; quatenus nempe vasa sanguine depleta, serum extravasatum resorbent: in frigidis vero, vesicatoria cervici, aut juxta aures applicata, egregii sunt usus. Dein post ventrem ab enemate subductum, fluxio Anodynæ aut opiæ mitioris usus sedetur illaque sedata, lenis catharticum, dein medicamenta, quæ per urinas, vel sudores, vel simul per utrosque movent, adeoque serositates superfluas blande evacuant, exhiberi convenit.

Medicamenta in hos fines idonea passim in libris describuntur, quæ tamen haud temere, & indiscriminatim ab Empericis usurpentur; sed juxta medicæ prudentis judicium, & ætatis, respectu semper habito ad patientis constitutionem, temperamentum, idiocrasiam, aliasque accidentia, & circumstantias designari, & pro re nata componi, aut alterari, immo novumquam extempore præscribi debent. Quare cum prorsus supervacuum fuerit plurima hic recepta, & ingentem pharmacie sylvam congerere, satius duxi medicamentorum cujusque generis, intentiones nempe præcipuas respicientium, unam aut alteram solummodo hic formulam proponere.

℞. Pilul. de succino ℥ss. resin. Jalapiz gr. iv. Balsami Peruviani q. s. f. pilul. xv. sumat. iij. hora somni, & mane sequenti, si priores non satis operabuntur.

Vel ℞. Scammonii sulphurati ℥ss. cerusæ Antimonii gr. xv. cremoris tartari gr. viii. f. pulvis, sumat in cochleari panatellæ mane primo.

℞. Sulphuris Antimonii gr. iv. resinæ Jala-

piz gr. v. cremoris tartari gr. vi. simul terantur & cum q. s. conservæ violarum f. bolus sumendus primo mane cum regimine.

℞. Radic. Rusci, Bardanz, Cherefolii, Caryophyllatæ, an. ℥i. Eryngii conditi ℥i. Jridis florentinæ ℥iij. Galangæ minoris ℥i. sem. Bardanz ℥iij. foliorum siccat. Betonicæ, Salviz, Verbenz, Veronicæ, an. m. β. passularum exacuat. ℥iij. coq. in aq. font. lib. iv. ad tertiz partis consumpt. dein adde vini albi lib. β. f. colatura, edulcoretur (si opus fuerit) cum syrupi è radicibus ℥iij. capiat. ℥vi. calide bis vel ter in die procul à pastu.

Pro constitutione frigidiori, & phlegmatica præditis, paretur decoctum ex ligni Gaiaçi, Salsaphras, Sarsap. cum additione ingredientium prædictorum, f. Apozema cujus sumat ℥vj. vel viii. bis, vel ter in die calide.

Egenis, & sæpe bono cum fructu ditioribus præscribere soleo, Decoctum foliorum siccat. modò Salviz, modò Betonicæ, Verbenz aut Rosmarini in aq. font. factum, & dein tinctura pulveris baccarum Coffee imprægnatum, bis in die ad ℥vi. vel viii. calide sumendum.

3. Quod si cum sero exundante, particula insuper salinæ, acidæ, biliosæ, aut alias infestæ, aut omnino è massa sanguinea, aut hac mediante è visceribus susceptæ, in capitis membranæ corripiantur, ibidemque delixæ dolores magis acutos, & diuturnos pariant tunc sanguinis missionem parcam, quin & blandam cathartin aliquoties iterari, epithemata onodyna, & demulcentia locis affectis applicari, non raro item hypnotica mitiora crebra vice exhiberi conveniet; item Apozemata, nec non herbarum succi & expressiones, quæ bilis fervorem compescant, ipsamque per sedem, urinas blande educant, egregii sunt usus; interim vero medicamenta aciora, aut fortiora, sive catharsin, sive diuresin, aut diaphoresin ea moliantur, quatenus sanguinem, & humores fundunt nimis, & exagitant, sedulo vitentur. Frequenter observavi in capitis dolore acuto, & pertinaci laborantibus, serum sanguine emisso innatans, flavedine seu recementis biliosis eidem incoctis tinctum fuisse; etiam in hoc casu phlebotomiam parcam, & crebram, deinde serum lactis, aut acidulas copiose epotas, insigniter, & præ aliis remediis juvasse.

4. Porro si visceris alicujus, prout stomachi, Hepatis, Lienis, Vteri, aut cujuspiam alterius vitio (propter mali fermenti transmissionem) capitis partes luunt, tunc in curatione morbi, una cum remediis cephalalgicis splanchnica adhibeantur; hinc cephalalgicis quibusdam stomacho etiam peccante, Elixir proprietatis, Elixir vitrioli Myrsichti, tinctura sacra, vitriolum Martis, pul. Ari. compositus, aliaque pro stomachicis vulgo habita, non raro prosunt; aliis, quorum capita Lienis mala participant, chalybeata sæpe juvamen præstant. Mulieres quædam cephalalgia interdum à remediis hystericis levamen sentiunt. Parieter cum aliarum partium vitia cephalalgia contriunt, indicatis primariis coindicata ab illis partibus desumpta adiungantur.

Quintò, Interdum succus nutritius (prout supra ostendimus) cephalalgia periodicæ causæ existit;



existit; in quantum scilicet iste sanguini suffusus, & non rite assimilatus, ob particulas discordes, et turgescientiam infert proinde ut cruor in caput ebulliens, exumas suas in meningas, aut illarum partes quasdam prædispositas ingerat, fibratque adeo in spasmos dolorificos erit. Propter hanc causam nonnullos, post variolas, morbillos, aliisque febras, aut ægritudines, quibus sanguinis massa vitari solet, cephalalgia quotidiana obnoxios, fuisse: viz. totidem a pallu horis, modo citius, modo tardius, primo ruboris in facie suffusio, dein capitis plenitudo, & dolor eos infestabant, insuper à vini potu aut alimentis turgidis comestis, gravius plectebantur. Morbi accessio ab assumptis magis aut minus distare solet, prout clymaus, aut paulo post primum in cruorem ingressum, aut post aliquantulum in eo moram, turgescere incipit.

Hic affectus periculo vacat, & plerumque facile satis curatur. Post totius provisionem, leni cathartici, & interdum phlebotomia institutis, remedia, quæ sanguinis crasin restituant, cujusmodi imprimis sunt Antiscorbutica, & chalybeata, maxime proficiunt.

℞. Conservæ fumariz, Tanacet, lululæ an. ʒii. pul. Ari compos. ʒiii. Eboris, & oculorum Cancr, coralli præparati an. ʒi. pul. sant. Citrini, ligni Aloes, an. ʒss. vitrioli Martis ʒi. salis Ablynthii ʒss. Syrupi de ʒ radicibus q. s. f. Elect. capiat mane & hora 5. pomer. q. nucis callanæ suprabibendo liquoris sequentis ʒiii.

℞. Aq. foliorum Ari, Verbenæ, florum Sambuci, an. ʒvi. aq. Limacum, Lunbricorum magist. an. ʒii. sacchari ʒi. misc.

Huc medicamenta varia, contra sanguinis dyscrasiam scorbuticam usurpari solita accenseri, & bono cum successu exhiberi possunt: nam cephalalgia quæ in scorbutico ita familiares existunt, sæpenumero à sanguinis humorem nutritium pervertentis, & recrementa sua capitis membranæ ingerentis vitio, procedunt: quapropter remedia contra affectum illum alibi à me citata, etiam hic locum vindicant.

6. Restat adhuc humor alius, nempe liquor nerveus, qui intra meningum aliarumque capitis partium fibras aggregatus, modo incongruitate propria, quatenus acris, aut alias degenerat fibris inproportionatus evadit, modo quatenus, cum alio humore, scilicet nutritio aut seroso illuc affluente effervescit, partes continentes vellicat, inque spasmos aut distentiones dolorificas irritat.

Humor nerveus, quando ita est morbificus, vel in tota massa peccans, capiti prædisposito maximam affligit noxam, vel ipse ex se insors, intra fibras affectas pervertitur, ac ita secundario morbificus evadit; cujus tunc curatio, à partium continentium restitutione dependet; nempe si fibrarum debilitates, aut conformationes læsæ emendentur, humor eas irrigans, statim culpa vacabit. Quibus remediis partium ad cephalalgias prædispositarum vitia tolluntur, mox dicemus.

Interea si humor nerveus, in tota massa degener, majorem capiti ad dolorem præparato noxam impertit, ejusmodi medicamenta, & methodus adhibeantur, quibus iste ad debi-

ratam crasin redactus, fibras istas blandè trajiciens, parum aut minime irritet. In quem finem, nec purgantia fortiora, nec phlebotomia læga aut crebra conveniunt, utpote quæ sanguinem & humores exagitant, viresque attenuant, proindeque nerveo peccanti majorem actionem, cæstrumque imprimunt. Attamen blanda solutiva, & parca sanguinis detractio, interdum ex usu erunt, quo viscera detergantur, & massa sanguinea nonnihil expurgetur, & medicamentis aliis melius successurus via struatur.

Pharmaca autem, quæ liquorem nerveum capitis membranæ ab eo molestanti solitis, magis amicum, & benignum reddunt, ejusmodi sunt, quæ cephalica vulgo perhibentur: quorum scilicet particule satis acutæ simulque tenues, & subtiles, sanguinem absque turgescencia, aut tumultu trajiciunt; dein liquori nerveo se inunquant, eum blande actuant, ductusque nerveos adeo explicari faciunt, proinde ut spiritus animales corpora quæque tum sensilia tum motiva liberius irradiant, eaque sine detrahiis, spasmis, aut distentionibus anomalis inpirent.

Hujusmodi remedia etsi non semper efficacia existant, attamen cephalalgias quasdam haud multum inveteratas sæpe tollunt, inque aliis, ut ut pertinacibus, non raro juvant. Porro eadem quæ ad capitis dolores, etiam ad cerebri & nervosi generis pathemata, & vice versa, quæ in his etiam contra illos bono cum fructu præscribuntur; eorundem scil. virtus intra ʒi. explicata contra Apoplexiam, Paralytin, Lethargum, aliosque morbos affines, etiam intra fibras motrices contra spasmos, & motus convulsivos juvant; insuper intra fibras sensiles vires suas exercentia sæpe doloribus succurrunt.

Horum medicamentorum campi amplissimi, vulgo in libris medicis pauduntur, ita tamen ut illorum copia, aut inopiam, aut medendi methodo confusionem pepererit; cum inter varia & tot diversimoda remedia simul congesta, sæpe latent aut occultantur quæ maxime ex usu forent; non secus ac triticum, à multa palea difficilius sececinetur, quam illud ab arillis primos sincere excutitur.

Itaque in hoc casu facta totius provisione, & subinde adhibitis, tum per dictam, tum medicinam; quæ sanguinis turgescencias inhibeant, aut mox sedent, medicamenta dicta cephalica, sive quæ succi nervei inordinationes tollunt, sedulo assumenda præscribantur; horum formulas quasdam paucas subijciam.

℞. Conservæ florum Betonicæ, Caryophyllorum an. ʒiij. pul. rad. Pæoniæ maris ʒss. Dictamni cretici ʒi. ligni Aloës, Santali citrini an. ʒi. coralli rub. præp. Margaritarum Eboris an. ʒss. salis Verbenæ ʒi. Syrupi de floribus Pæoniæ q. s. f. opiata, capiat q. nucis callanæ suprabibendo Julapii sequentis ʒiii.

℞. Aq. Cerasor. nigror. Jugland. simplicis, Verbenæ an. ʒiv. florum paralyseos. ʒiii. Pæoniæ compos. ʒii. sacch. ʒvi.

Vel ℞. foliorum Verbenæ Visci pomor. an. M. x. rad. Pæoniæ maris lib. ij. Maceris, nucis Moschatæ an. ʒss. sem Coriandri ʒi. incisis & contusis affunde lactis recentis lib. viii. (vel lactis



lactis lib. vii. & vini Malagani lib. i.) destil. organis communibus, liquor totus misc. Capiat ʒiii. pro vice.

ʒ. Pul. rad. Peconiz maris ʒß. corallii rubri præp. ʒii. Eboris Margarit. præp. an. ʒi. f. omnium pul. subtilis, adde sacchari solut. & ad tabulat. coct. inf. q. Aq. Cerasor. nigr. ʒvi. Tinct. è corallii ʒi. f. a. f. Tabul. ponderis ʒß. ʒß. co. nedat iii. vel iv. mane, & hora quinta pomerid. superbibendo haustulum Teæ.

Vel ʒ. Tincturæ coralliorum ʒi. sumantur gut. 15. ad 20. bis in die in haustulo Julapii, vel aq. destillatæ.

Qui temperamentisunt frigidioris, aut phlegmatici, sumant bis in die dosin, aut Tincturæ Antimonii, aut spiritus Armoniaci cum fucino vel coralliis imprægnati, vel sp. C. C. aut fuliginis in vehiculo appropriato.

Millepedum usus hic omitti, aut postponi non debet; utpote quorum succus, expressus, aqua destillata, etiam pulvis ex iis paratus, pro curandis antiquis & pertinacibus cephalalgicis opem sæpe egregiam præstant. Possim hic multa alia varij generis medicamenta proponere; quinimo illorum fere omnium, quæ contra affectiones spasmodicas olim congesti, formulas huc transferre. At vero curationis cephalalgicæ nodus adhuc extricatu difficillimus restat; quomodo nimirum causa morbi hujus conjuncta, & fixa in fibrarum debilitate aut conformatione læsa consistens, sanari aut tolli poterit.

Hæc autem licet interdum incurabilis fuerit, uti cum tumor schirrosus aut callosus, aliæve antiquus & fixus, meningas occupavit; attamen cum hujus diagnosi sit incerta, & morbi procatarxis, ut ut immanis visa non nunquam therapia diuturna superatur, idcirco in omni cephalalgia, donec patiens remedia admittet, ne tædeat Medicum, quæ maxime idonea videntur, præscribere.

Itaque imprimis, quod modo innuimus, sedulo entendum erit, ut morbi fomite præcisso, & intercepto, paroxysmorum accessiones crebre inhibeantur, ita namque fibræ dispositæ, quamdiu non male afficiuntur interdum sola natura medente sanitatem recuperant.

Artis medicæ auxilia, in hoc casu indicata, chirurgia potius quam pharmacia petuntur, Nam quicquid ore assumitur, per longas ambages circumiens, virtutem omnem impendit, priusquam ad capitis membranas pervenitur.

Inter Chirurgica primo remedia topica occurrunt, & ex iis emplastra commodissimi sunt usus, & maximum sæpe commodum exhibent: hæc non impense calida sint, quæ humores ad locum affectum plus attrahant, sed modice discutientia & corroborantia. Præscribere soleo emplastrum de minio, vel diasaponis cum subdupla proportionem Emplastri Paracelsi, parti dolenti rati applicandum, & aliquandiu gestandum. Quod autem Antiqui plænimus & sinapismos frequenter adhibuerint, & hodierna in praxi est, contra atrociores cephalalgias vesicatoria, toti modo occipiti, modo sincipiti applicare: si quando à calidioribus hisce Topicis levamen successit, propterea fuit, quoniam per administrationes istas, feri acrioris copia ingens à parte affecta excerneretur.

Linimenta ex oleis, & unguentis, crebro licet usurpata, minus efficiunt; in quantum (ut opinor) ea fibrarum tonos, si altius penetrarint, magis laxant, proinde ut materiæ morbificæ incurfibus facilius pateant: insuper cutis poros inferciunt, quo minus effluvia evaporent. Propter eandem fere rationem est, quod locus calidi è decoctis Aromaticis, aliisve cephalicis paratis, officiant sæpius quam proficiat; in quantum humores versus partes affectas attrahunt, simulque poros, & meatus aperiant, quo promptius admittantur. Propterea item est, quod capitis balneatio, siue embrocatio per antliam intra Thermas calidas, cephalalgicis non meliori cum successu adhibentur: cum è contrà multis utile fuit, tempora, frontem, & sinciput, quovis mane & vespere frigida perfundere: immo totum caput omni aurora per antliam aqua frigida embrocare, aut saltem intra vas profundum, aut puteum immergere.

Auxilium aliud chirurgicum, pro cephalalgia præsertim immani ac inveterata, decantatum solet esse fontanellarum in variis corporis partibus inustio aut incisio. Extra dubium est has in brachiis aut cruribus excitas, & minus inconmodas esse, & nonnihil emolumenti asferre: in quantum sc. morbi fomitem ex parte subtrahunt, longè à loco affecto avocant. Porro fontanellæ in nucha, atque setaccum in cervice, etiam in auricula, vel prope eam, item clavus ex radicibus Helleborastri auriculæ perforatæ infixus, in quatum serositates multas evacuant, aliasque verius emunctoria, sc. glandulas invitant, sæpe cum emolumento adhibentur. At vero plurimus sermo & major expectio est de cauteriis loco dolenti aut prope eum affixis, ita ut fontanellæ amplæ supra capitis verticem, aut juxta suturarum commissuras excitentur. Si præceos hujus fructum a successu metimur, parum, & raro commodus, sæpius vero iusultus apparebit. Quippe nullum ego per ejusmodi cauteria sanatum, atque multos cephalalgicos inde deterius habuisse novi. Et quidem ratio hoc plane dicitur; nam ubicumquæ fontanella inuritur, illuc humor serosus, è tota massa sanguinea, & per consequens è toto corpore affluit, ac uberius sæpius aggeritur; quam per emissarium illud constanter exeat: quapropter circa fontanellas phlegmones, pustulæ, varique humores passim oriuntur. Quid igitur minus suspicari possumus, quam quod cauteria juxta capitis locum dolentem applicata, ibi materiam morbificam plus congeri faciant?

Altera adhuc restat operatio Chirurgica, à multis pro cephalalgia pertinaci prædicata, sed à nemine (quod sciam) adhuc tentata, nempe calvariz juxta locum dolentem cum modiono siue trypano apertio. Hoc insignissimus Harveus noster semina prænobili cephalalgia gravissima & inveterata laboranti suadere satagebat, inde curationem promittens; sed nec illa, nec alius quispiam administrationem istam admittere voluit. Profecto mihi non constat quid certi ex calvaria ubi dolet aperta expectare licebit; si abscessus ibi latet, hæc unica esset curationis via; verum iste affectus soporosos, aut convulsivos lethales, potiusquam cephalalgiam inferre solet. Si phlegmon, aut pustulæ, vel



vel Erysipelas diploen occuparit, nescio an tumores illi nudo aëri expositi, facilius evaporent. vel utrum remedia iisdem nudis applicata, aliquid efficiant necne; quod si dolores propter meningis tuberculis, aut tumore scirrhoso, vel calloso obsessas oriuntur, apertionem cranij parant aut nihil profuturam sentio.

Verum hoc donec in praxi assumetur misso; ad alia transeamus, & jam proxime utrum salivatio ad curandas veteres, & obfirmatas cephalalgias adhibenda sit, perpendemus. Revera si dolores capitis à lue venerea oriuntur, nullus dubitat, quin malo huic nodo malus ille cuneus adhiberi debeat. Verum illud remedij genus in cephalalgis propter alias causas omnibus experti, mensem sementis laborioso parum minueretulerunt: me fateor à methodo ista in ejusmodi casibus tentanda quorundam exempla tenuisse. Illustrissima quædam Dominica (cujus agitudo infra describetur) pro sananda atroci ac diuturna cephalalgia ter salivationem copiosam, sc. primo per unctionem mercurialem ex consiliis Domini Doctoris Theodori Mayern, & postea his ab assumpto pulvere nuper famoso Caroli Huis, sine quovis juvamine (urinum & non cum aliquo detrimento) subivit: nam deinceps, per plures annos usque in hunc diem morbi sentim adaucti gravissima tyrannidis succubunt. Paulò hoc deterius cessit eximio viro D. G. D. cui cum ad curandam antiquam cephalæam unctionio mercurialis capiti dolenti adhiberetur, salivatio inde concitata, morbo non sanato excitatem intulit. Profecto huic usinodi effectus, ab hydrargyro temere exhibitio, unusquisque operationem ejus in corpus humanum rite perpendens vereri debet. Nam ut Mercurium non dicamus malignum, aut prorsus venenosum, in quantum scilicet à particulis ejus vultis noxæ parum, aut nihil inferatur, adeo ut argenti vivi sæpe magna copia satis tuto assumatur; attamen corpuscula mercurialia divisa, & ab invicem separata) sive à salibus chymicis, prout in mercurio sublimatis, & præcipitatis, sive percolatione per entis poros, quando inunguntur, id fiat) mox effera, & indomita evadunt, atque præpharmacis quibuscumque aliis, maximas in corpore humano perturbationes cient: illa interdum partibus primò nerveis molestiam afferunt, quamobrem ob ventriculi, intestinorum, aliorumque viscerum libras mox vellicatas, tormina, vomitiones horrendæ, dejectiones acerrimæ, & sæpe cruenta; cardialgia, deliquia, aliique terribiles affectus brevi post medicamentum exhibitum sæpe contingunt. Quandoque tamen mercurij particulae, cum non statim dissolvuntur, sine magna viscerum noxa, vires suas vix prius quam in massam sanguineam deducuntur, exerunt. Itaque hanc summè agiles, & se quaquaversus explicantes, facile subeunt, & mox totam inficientes, exagitant, & non raro (cum plenius dissolvuntur) in magnam effervescenciam concitant. Dein sanguis, ut corpuscula incongrua à se a noliatur, fermentescens, eadem, qua licet, humoribus intra sinum suum, nempe sero & succo nutritio, contentis tradit, ac penitus incoquit; simulque ipsos mixtura ita præternaturali imbutos exuere satagit. Hoc autem per urinam vel sudores non facile, nec satis ubertim

succedit; in quantum scilicet sanguinis liquamina à particulis mercurii incoctis, instar smegmatis, magis viscida & crassiora exsunt, quam ut exilia renum aut cutis colatoria pertranseant; illa nonnunquam arteriis Celiacis (ni inhibentur) erumpentia; diarrhoea, aut dysenteria excitatis, foras exeunt salivationis voto perinde impedito aut frustrato: sæpius vero latex mercurii imbutus intra sanguinem etiam quoad antenus intactum manens; cum eo huc, illuc, per arterias, & venas impetuose correptus, in varias partes arietat, & qua data via, ut foras erumpit, aut visceribus, membranis, aliisque partibus magna sæpe cum noxa impingitur. Præterea item particulae quædam mercuriales cerebrum penetrare, sequæ istum succum nerveum insinuant; non modò per totum *enkephalon*, sed sed partes omnes nerveas diffundi, adeoque liquorem nerveum aliquatenus fermentare videntur.

Interim vero serositates mercuriales in sanguine resides, maxima ex parte in glandulas, quæ sunt proxima arteriarum enunctoria, deponuntur: Quapropter cum circa partes oris, glandulae (quibus pro saliva seri copia ingens destinatur) tum plurimæ, tum maximæ collocantur, ab istis per vasa excretoria ductus aperti in oris cavitatem dehiscunt, certe hac potissimum via, etioris latex venenatus, cum alibi non facile possit, exitum inveniet. Quamobrem sputo oris concitato, sanguis diu fermentescens, quicquid extranei, & non congeneris, aut in sinu suo foret, aut aliunde visceribus, aut partibus solidis, vel ab aliis humoribus absorbere, & excipere potest, instar vini aut cervisiæ despumantis, per ductus salivales, & meatus innumeros ubique in os dehiscentes ejicit. Porro verisimile est uti sanguinis, ita & liquoris *enkephali*, & appendicem nervosum irrigantis, purgamenta à Mercurio subingresso excitata, hac etiam via nempe per ductus salivales foras excerni.

Itaque salivatio per mercurium induta, si forsitan recte succedat, morbo os nonnunquam difficiles, & plane Herculeos, aliisque remediis omnino surdos tollit, quatenus nempe operatio hæc sanguinem & succum nerveum, aliosque humores, longa *enkephali* penitus expurgat, fermenta quævis exotica destruit, salium, ac sulphurum enormitates subigit; quin & materiam morbificam ubi vis impactam, aut stagnantem exagitat, ac sæpe foras educit.

Attamen hæc medicina periculo non vacat, in quantum scilicet mercurius enormis factus, & secum seri acerrimi, & quasi venenati copiam ingentem ducens, in partes nobiles, ac imprimis *enkephalon*, cum appendicibus medullari ac nerveo, aut pulmones, & præcordia impetuose irruens, his noxam indelebilem, & quandoque lethalem infert. Quapropter in cephalalgia veteri ac graviore discrimen subest, ne fibræ indispotæ à mercurio, cum sero multo & corrosivo eas pervadente, plus irritentur, inque majores spasmos, & contugationes dolorificas agantur; porro ne ab ingenti humorum in caput raptu, cerebrum invadatur, & proinde, quod nimis crebro accidit, affectus soporosi aut convulsivi accerescantur. Super his plura, quoniam magni interest, edisseruisse vellem, nisi quod exactam salivationis methodum, ejusque plenam quoad



modos, & effectus, commoda, aut incommo-  
dationem à Medico Doct. D. D. Needham  
propediem in lucem exactam expectamus.

E Chirurgicis restat adhuc aliud quoddam  
celebre pro curandis cephalæis remedium, scili-  
cet Arteriotomia. Hinc à veteribus in magno  
pretio habitam, e modernis nonnulli adhibent,  
ejusque usum valde prædicant. Attamen quo-  
ad nostræ observationi consistit, *eximius*  
illi successus ita decantatus sæpius defuit.  
Nec mirum hoc, quoniam ratio ista, cui vete-  
res innixi sanguinem arteriosum à venoso di-  
versum, & magis effertum culpabant, proinde-  
que emittendum consulebant, non omnino ten-  
net. Nec quidem alia subest ratio, quam obrem  
sanguis ab arteria potius quam e vena juxta lo-  
cum dolentem detractus, levamen conferat,  
sed potius e contra majus auxilium à venæ se-  
ctione expectare liceat; quoniam arteria inani-  
ta nihil à parte affecta excipit, detrahique,  
vena autem secta, loco sanguinis effusi, e tota  
vicinia haurit, & sæpe cruorem, aliosque humo-  
res prope morbi nidum congestos & stagnan-  
tes resorbet, & circulationi reddit. Utrumque  
ne ab Antiquorum praxi nimis recedamus, Ar-  
teriotomia nihil tribuentes eam aliquando for-  
san, licet non immediate & causaliter, sed tamen  
consequentia, & per accidens juvare con-  
cedimus: in quantum scilicet arteriæ discissæ fines  
coalescunt, ita ut sanguini transitus hæc viâ in  
posterum præcludatur, hinc cum paulo minor  
sanguinis penus versus locum per arterias pro-  
vehatur, & par usque per venas auferatur, pro-  
inde interdum accidat, materiæ morbificæ so-  
nite nimirum, ejusque munera paulatim absumi.  
Propter hanc rationem, administratio ista  
in ophthalmicis non raro feliciter succedit. Por-  
ro pari non huic absimili veterinarii ad curan-  
dos in equorum *angitis* utuntur; nempe arte-  
riam quâ materies ad partem affectam consistit  
excipiunt, & ligant, interim quæ impacta fuit,  
partim evaporat, partimque a vena resorbetur.  
Eandem fere methodum ab Harveo nostro  
pro curandis etiam in corpore humano tumoribus  
strumosis ac scirrhosis non sine successu ten-  
tatum audiui. Poteram hic multa alia reme-  
diorum genera, quæ etiam præscripta, & me-  
dicamentorum (quæ ad cephalalgias sanan-  
das, tum à Medicis, tum ab empiricis adhiberi  
solent) formulas subungere: verum his libri  
Medici plus nimis abundant. Quod superest  
post morbi hujus Ætiologiam, ita fuscè tradi-  
tam, ejusque Therapeuticen satis adumbratam,  
ex re fore videtur, quo hæc clarius illustren-  
tur, Agrotantium casus rariores, & imprimis  
cephalalgia continuæ gravissimæ, quæ item ob  
causam invincibilem non raro funesta erat,  
exempla quædam subungere.

Mulier quinquagenaria postquam per sex cir-  
citer menses gravissimo capitis dolore, sub su-  
tura sagittali eam perpetuo fere molestante,  
nullisque medicamentis, aut methodo cedente,  
laborasset, tandem, in lethargum cum mem-  
brorum resolutione partiali incidit, à quibus  
tamen, per remedia tempestive adhibita brevi  
recuperata in cephalalgiam uti prius atrocem  
expergiscitur; porro deinde intra duas, vel  
tres septimanas in affectione soporosa relapsa  
e vita discessit. Cranio aperto e latere sinus ter-

tii, tumor scirrhosus tres digitos latus membra-  
nis accreverat, ejus interventu & dura meningis  
aliquanto spatio præ accreverat, & vasa sangui-  
fera, quæ illic in sinus cavitatē dehiscere debue-  
runt contipabuntur. Porro cerebri anfractus tū  
exteriore, tum cavitatis interna fuit aqua limpi-  
da repleta. Ex his observatis morbis nitius invin-  
cibilis & demum lethalis causa liquido patebat.  
Scilicet meningum fibræ maxime sensiles, par-  
tim ob solutionem continui, partimque ab hu-  
more nervoso ibidem aggesto, & stagnante, si-  
mulque ab aliis affluis, cumque eo extorvelcen-  
tibus, continuo vellicatæ, & laceratæ, in spas-  
mos, aut distentiones dolorificas perpetuo  
ciebantur: postea cum sanguis, propter tumo-  
rem istum circuitu suo diu præpeditus, ut quo-  
quo scilicet modo pertransiret, laticem serosum  
(uti mos ejus est ubicunque obidem offendit) à  
se copiose amandaret, tandem hydrops cerebri  
qui lethargi funesti causa erat, excitabatur.  
Casum in alio quodam huic similem me quon-  
dam per Anatomiam observasse memini. Por-  
ro cum in multis cephalalgicis morbum à tali  
causa invincibili dependere ratus sim, libet hic  
unum ejusmodi sectionis exemplar adhuc vi-  
vens spiransque describere.

Ante aliquot annos, ad invisendam nobilissimam  
Dominam, supra Vicennium cephalalgia  
primo intermittente ac nuper fere continuo la-  
borantem accersiebat. Illa corporis forma ele-  
gantis, & eximia mentis indole, ita ut artes li-  
berales, & litteraturam quamvis, supra sexus  
sui conditionem egregie calleat, instructa,  
(quasi tantis donis sine aliquo detrimento im-  
pune frui nimirum à natura crederetur) gravissi-  
mas ab hoc morbo plagas tulit. Ante secundum  
ætatē huiusmodi, à febre periculosa convalescens  
capitis doloribus interdum sponte ac sæpius à  
levi quavis occasione oriri solitis, obnoxia  
evasis. Aegritudo non uni loco aut parti: pituitis  
limitata, modo dextrum latus, modo sinistrum,  
& non raro totum ejus ambitum infestabat. Du-  
rante accessione (quæ raro intra nycthemeri  
spatium terminata, sæpe per duos, tres, aut  
quatuor dies urgebat) illa lucis, loquelæ aut  
soni, aut motus cujusvis impatiens, intra came-  
ram attritam, in lecto crebra sedens cum nullo  
colloqui, nil somni, aut victus capessere potuit.  
Tandem circa paroxysmi declinationem, som-  
no gravi, & perturbato succumbere, e quo evi-  
gilans melius habere, & dein sensim convales-  
cere, ac intermissionis tempore mediocriter va-  
lere solebat. Olim paroxysmi non nisi occasio-  
naliter accersiti, raro intra viginti dies, aut  
mensem, postea dein multo crebrius repetebant;  
nuper autem raro iis immunis degit. In-  
super ob plures occasiones, seu causas eviden-  
tes (cujusmodi sunt anni, ac aeris mutationes  
solis, ac Luna aspectus magni, passionis vio-  
lentæ, ac errata in victu istæ immmanis ple-  
ditur. Quanquam autem hic affectus Dom. Il-  
lustriss. (quando eam invasebat) supra viginti  
annos gravissime affligens, castris prope cerebri  
confinia positæ regalem ejus arcem tamdiu ob-  
federat, nondum tamen expugnaret: quin Æ-  
grotans vertigine, scotomia affectionibus con-  
vulsivis, & symptomate quovis soporoso immu-  
nis, principes animæ facultates usque lartas te-  
ctas habebat.

Propter



Propter curationem assequendam, seu potius conandam, per totum morbi progressum remedia quam plurima, a Medicis potissimis, tum nostratibus, tum exteris præscripta sine quovis successu, aut levamine adhibita fuere: remedia etiam magna cujusque generis, & formæ, at semper incassum tentavit. Ante plures annos ab inunctione hydrargyri salubritatem diuturnam, & noleatissimam, proinde ut ipsa magnam vitæ periculum subierit, tolerabat. Postea bis a pulvere Mercuriali (quem insignis Empiricus Carolus Hues passim exhibuit) curatio peroris sputum (frustra licet) instituebatur: Thermas & acidulas cujusque fere regionis, & naturæ, pari, ac cetera, cum successu probavit: phlebotomias crebras, semel etiam Arteriotomiam admisit, fontanellas plures, modo in suprapite, modo in occipite, aliisque partibus inustas gessit. Regionum diversarum, sc. præter nativi soli, Hybernici, & Gallici aerem hausit: medicata nullius non generis, nempe cephalica, antiscorbutica, hysterica, specifica quævis famosa, immo & empirica, tum a doctis, tum ab indoctis, ab Agyrtis, & mulierculis exhibita sumebat: se tamen a nullo usquam aut remedio, aut medendi methodo quidpiam aut medelæ, aut levaminis recepisse prætebatur, quin rebellis, & contumax ille morbus, ad quævis medicinarum incantamenta surdus, domari recusavit. Porro iste *πῶς ἰσχυρὰ* pomæria tam diu occupans, etsi cerebri claustra invadere nequiret, attamen quando eam invisi, in quasdam alias nervosi generis partes fines suos explicans, in membris etiam in lumbis & abdomine dolores atroces, prout in Rheumatismo, ac in Colica scorbutica assolet, concitare cœperat.

In morbi hujus inveterati Ætiologiam si inquiritur, nihil minus suspicari possumus, quam cerebri meningas ab initio levius tactas, postea vitium habituale & indelebile contraxisse. Ab affectus historia liquet primam ejus diathesin à materia morbifica, post febrem male indicatam in caput translata, ortam fuisse. Tunc forsan ob noxam membranz illatam, fibrarum tonus intantum laderetur, postea, ut in iis humores, scilicet tum nervus irriguus, tum alii subinde afflui, ad plenitudinem aggressi, aut mera aggravatione, aut mutua effervescentia, cephalalgiz paroxysmos excitarent. Tandem vero causa morbifica ob crebros paroxysmos invalescentes videtur quod fibrarum istarum unitas intantum solveretur, proinde ut tubercula & nodi scirrhosi in tota meningi exteriori, aut in magna ejus parte accrescentes, dolores fere continuos, eosque à levi quavis occasione exacerbari aptos, producerent: talsi certe causa invincibilis, & permanens, scilicet duræ meningis scirrosa affectio, pia interim incolumi, cephalalgiz, tam diuturnæ, & nondum lethali par esse videatur. Quæcumque enim aliâ de causâ, si naturæ, & medicinz cum morbo confictus fuisset, longe citius aut citâ mors venisset, aut victoria læta.

Vir egregius 4. circiter annos natus, robustus, & sanus cum per diem integrum pluvia perpetim stillante iter faciens, propter continuum occipitis madorem, frigus contraxerat, propediem in ista parte dolorem pati cœpit; qui brevi tempore plurimum exacerbatus, ægrotan-

tem dies & noctes miserrime afflixit, & fere semper insomnem detinuit. Ad curandum hunc affectum phlebotomia, purgatio, enemata, vesicatoria, hyponctica, quin & plurima nullius non generis remedia, junctis item plurimorum medicorum consiliis, diligentissime licet adhibita, parum aut nihil præstiterunt. Cum morbus, his non obstantibus, indies ingravesceret, post sesquimenssem glandulæ præternaturales tumidæ, ac dolentes in tota cervice excitabantur, hemicrania interim nihil remittente: insuper colli tendines plurimum distenti, ac rigidi, ei plurimum molestiæ fecerunt; quibus brevemotus convulsivi, & tendinum subsultus variis in partibus, cum delirio succedebant, tandemque Ægrotans doloribus, & vigiliis attritus, morti succubuit.

Et si cadaveris dissecandi copia non daretur, suspicari tamen suberat, & pericranium & meningas in occipite, cerebellum investientes, ubi crassiores illæ, ac plurimum villosæ existunt, primario affectas fuisse; indeque noxam postea *τῶν ἰσχυρὰ* communicatam, in totum genus nervosum migrasse: in membranis istis, cum à frigore & madore transpiratio inhiberetur, simulque fibrarum tonus plurimum laderetur, probabile est, quod liquor nervus eas irrigans, tum motu præpeditus, & stagnans, corpora continentia aggravaret, tum iste in crassi depravatus, cum aliis humoribus affluis efferverceret, cumque iis demum coagulatus, in tumores quasi scirrhosos & strumolos concreveret adeoque cephalalgiz gravissimæ seminum copiosum jaceretur: demum postea, cum à vigiliis & doloribus perpetuis, & magna spirituum mordinatio, & succi *τῶν ἰσχυρὰ* irrigantis dyscrasia ingens producerentur, propterea in cervice, concretiones nodosæ, tendinum rigiditas, ac demum in cerebro totoque genere nervoso spasmus & motus convulsivi succedebant: cumque adeo æconomia animali plurimum labefactata, præcordiorum motus perennari nequiret, flamma vitalis expirabat.

Nec minus a phlegmone, & abscessu, quam ab hujusmodi meningum nodis, & tuberculis nonnunquam cephalalgiz lethales, aut incurabiles oriuntur. Olim juvenis Academicus cum per duas septimanas de gravissimo capitis dolore ipsum incessanter affligente conquestus, erat tandem febre aucta, mox vigiliz, motus convulsivi, ac confabulatio delira succedebant; quo tempore medicus accersitus, phlebotomia, enematis, emplastris, revulsivis, vesicatoriis, item remediis internis, quæ fluxionem sanguinis, ac humorem à capite devocent, sedulo adhibitis, nihil proficere potuit, quin mors brevi succederet. Calvaria aperta, vasa meningas obducentia erant sanguine repleta, & plurimum distenta, quasi cruoris massa illuc tota confluerat, ita ut sinibus dissectis, & apertis, cruor affatim erumpens, ad plures uncias, supra lb. s. pondus efluxerit: porro ipsæ membranz tumore phlegmonoide per totum affectæ; discoloræ apparebant: integumentis hisce sublatis, cerebri anfractus omnes, ejusque ventriculi, aqua limpida erant pleni, ejusque substantia, utpote nimis irrigata, madida erat, & minus firma. Proculdubio in hoc casu sanguinis effervescentis in meningas incurfus, ejusque ibidem aggestio,



phlegmonem excitans, cephalalgia, & subsequens delirii causa fuit: dein sanguis ibidem accumulatus, cum circulare nequiret, feri copiam a se rejecit, à quo totus cito mundabatur; proinde ut morbus fortan ab initio per phlebotomiam curabilis, postea lethalis evaderet.

Menniini alium Academicum, qui post diuturnam hemiplegiam, sub sutura temporali, per tres septimanas eum perpetuo, & gravissime affligentem, in Apoplexiam brevi funestam incidit. Capite aperto phlegmon juxta locum dolentem in meningibus accreverat, à qua denuum suppurata, & disrupta, sanies in cerebrum decidens, substantiam ejus livore & putredine affecerat. Præter hujusmodi causas invincibiles, per Anatomiam detectas, plures observavi casus, aliorum similiter decumbentium, in quibus, cum morbi signa, & symptomata, pari ritu, ac modo describuntur habuerunt, proinde Ætiologiam ejus aut eandem, aut valde affinem concludere licebit.

Quamquam autem, cephalalgia continua, [præsertim si in plures septimanas sine intermissione producat] periculo non vacat: attamen de curatione ejus non illico desperandum erit, quoniam hujus causa, ut ut fixa, & immobilis visa, sæpe longo remedium usu, immo interdum sine illis natura & tempore sanatur: utcumque in casu fere deplorato, Medicina quadam opus erit, ne præsens affectus in deteriorem, nempe soporofum, aut convulsivum transeat. Hæc de cephalalgia continua: modo restat intermittens exempla, & instantius rariores quasdam proponere.

Itaque ut mittam hic cephalalgia, cujus paroxysmi vagi ac incerti à sanguine aut sero loca affecta irrucitibus procedunt, casus utpote valde crebros, & vulgo notos describere: libet hic observationes quasdam selectas hujus morbi aut periodici, aut per consensum à viscere quodam excitari visi, in medium proferre; quoad prius, dolorum capitis insultus periodicos, vel ab humore nutritio vel à succo nerveo produci ostendimus; utriusque exempla modo subdemus.

Venerabilis matrona anno ætatis 45. gracili corporis habitu, ac temperamento bilioso prædita, cum a longo tempore cephalalgia occasionaliter excitari solitis obnoxia degisset, circa initium Autumni dolore capitis periodico molestari coepit: hic affectus circa quartam à meridie horam invadens, ad mediam fere noctem, donec ægrotans præ cruciatu & vigiliis defatigata in somnum coeretur, protendi solebat; dein post somnum satis profundum illa mane evigilans recte habebat. Ad hunc modum Ægrotans per tres septimanas morbi hujus insultus quotidianos passa, Medicinæ quam maxime horrebat, usum distulit; tandem vero appetitu dejecto, & viribus attritis, ad therapiam expetendam coacta, post lenem catharsin & phlebotomiam, cepit bis in die, per unam, aut alteram septimanam, Electuarii sequentis quantitatem castanæ, & integre convaleuit.

℞. Conservæ florum Cichorii, fumarie, an. ʒiij. pul. rad. Ari compof. ʒijß. Eboris ʒijß. sant. citæ. ligni Aloës an. ʒß. salis Absynthii ʒijß. vitriol. Martis ʒj. syrupi e quinque radicibus q. s. fiat Elect.

In hoc casu, quod post diathe sin cephalalgiam morbi accessiones, febrium intermittentium ritu, denuum periodice extiterunt: proculdubio in causa fuit, chymi live humoris nutritio in sanguinem assimilatio impedita: quippe cum penus ejus in massam sanguineam receptus vincinequere, post aliquantulam moram discrepare, & inque partientis ejus effervescente solebat: propterea statim sanguis ut mixturam incongruam excuteret turgescens, recrementa sua, prout in alias partes, ita præcipue, & cum majoris molestiæ sensu, in meningum fibras prius debiles, aut in conformatione lasas, deponebat: materies ea capiti suffusa, aut per se fibras sensiles irritans, aut cum succo earum irriguo effervescens, doloris paroxysmum modo descriptum ciebat: qui nempe perdurabat donec particulæ heterogeneæ vel nutuo congressu effervescentes, aut subigerentur, aut exhalarent.

Mulier venusta, procera, & gracilis, affectibus cephalicis, diu, & graviter obnoxia, interdum per plures dies, immo septimanas, quotidie primo mane somno experfecta, cephalalgia atroci, eam exinde per tres, aut quatuor horas affligente infestari solebat: interim & totius capitis gravitate, sensuum torpore, & mentis hebetudine afficiebatur: cujusmodi affectus, una cum dolore, velut nubes discussæ ante meridiem evanescentes, sudum, & serenum relinquebant; donec postero mane iterum velut nebulæ & caligo occuparent: pro his sanandis pilulas purgantes, phlebotomiam parcam, vesicatoria insuper; sp. C.C. aut fuliginis, cum julapiis aut aquis cephalalgicis usum præscripsi.

Quod in hac D. secus ac in altera Ægrotante, dolores capitis somno succederent potius, quam ab eo sanaretur, ratio esse videtur, quoniam in cephalalgia hac matutina materies morbifica in succo nerveo resideret, cujus insignior cruditas, & plenior circa caput aggestio, mox è somnis contingunt, prout alibi satis hinc ostendimus: alter autem hujus morbi paroxysmus vespertinus, cum à liquoris nutritii intra massam sanguineam plenitudine, & turgescencia penderet, idcirco totidem à prandio horis contingens, non nisi à somno, qui sanguinis inordinationes sedat, compescebatur.

Cephalalgia paroxysmos quandoque per consensum ab aliis partibus, sc. utero, liene, stomacho, &c. oriri, illicet Ægrotantium experientia, & querela manifesto prædicant; attamen hoc alia ratione quam per vapores à viscere affecto, ad caput elevatos fieri, ex illorum historiis & phænomenis rite perpendis non minus luculenter patescit. Et primo quod spectat ad dolores capitis ab utero excitari visos, nihil frequentius occurrit, quam à mensibus aut lochiis suppressis; cephalalgias immanes succedere. Porro catamenia licet rite fluunt, tamen aliæ fluxu instante, aliæque eodem desinente, atroci capitis dolore affligi solent. Verum enimvero quavis eodem tempore, ac caput etiam uterus afficiatur, non tamen sequitur noxam hinc inde immediate transferri; sed ipse sanguis est, qui materiem morbificam capiti affigit, eam sc. modo in proprio sinu genitam, & utero destinatam, perperam in cerebri meningas defert; & modo eam ab uteri partibus surripens, cum majori



majori malitia capiti tradit. Hujusmodi Ætiologia etiam cephalalgia & stomacho, hien, aliisque partibus vulgo attributa convenit.

Mulier formosa; & juvenis, gracili corporis habitu, & sanguine calido prædita; cum cephalalgia hereditaria obnoxia fuisset, paroxysmos ejus crebros, & vagos, alios nempe de levi occasione, aliosq; sponte, hoc est absq; causa evidenti oriundos, pati solebat. Pridie morbi accessione spontaneam, vesperi valde esuriens, cœnam uberiorem cum appetitu famelico, ne dicam canino devorabat; hoc signo dolorem capitis mane sequenti invasurum certissime præfagiens cui augurio eventus nunquam defuit. Quam primum enim evigilabat, cruciatu per totum incipit acerrimo afflicta insuper vomitu humoris modo acidi, & quasi vitriolici, modo biliosi, & summe amaricantis afficiebatur; hinc in indicium daretur cephalalgiam istam stomachi vitio exortam fuisse.

Hujus rationem ut reddere suscipiam, imprimis constat vomitionem capiti lassæ, nempe post plagam, vulnus, aut casum ab alto succedere; at tamen vomitui, cardialgiæ, aut stomacho alias laboranti, dolor capitis, nisi intercedat sanguinis effervescencia, raro aut minime supervenit. Quamobrem in prædicto laborantis casu, cum plane liqueret, cerebri meningas ad cephalalgias prædispositas fuisse, ejusque paroxysmos sanguinis agitationem quamvis excitasse; hinc obvium erit conspici, quando particula heterogenea propter chylosoos vitium, in massa sanguinea ad plenitudinē congereretur, statim ob molesti expulsionem fluore ejus oborto, eas utpote male congeneres à cruore secretas, partim ex arteriis in ventriculum suffusas, fermentum ejus exuscitasse; adeoq; famem produxisse, partimque in capitis meningas prædispositas irruisse, ibidemque cephalalgia mox sequitur fomitem, seu potius incentivum deposuisse. Hæc Ægrotans pharmaciam quamvis averfata, cum nullam Medicinæ methodum subire vellet, tandem affectibus etiam paralyticis & convulsivis obnoxia evasit. Ex his facile erit cephalalgia cujusvis alterius sc. hypochondriacæ, hepaticæ, aut alias sympathicæ Ætiologiam designare, ut non opus fuerit hic plures historias aut observationes addere. *Thom. Willis in Pathologia Cerebri.*

1. In Cephalæa seu doloribus capitis quibuscunque in primis usus Aq. Benedictæ Ventriculo jejuno statâ dosi exhibitæ multum prodest. Vide notas in Crollium.

2. Ejusdem effectus quoque est Syr. ex aq. Benedict.

3. Purgatio fit:

1. Per diasenam Laxativam,
2. Per Panchymagognum vegetabile.
3. Radices Ellebori præparat.
4. Scamm. præparatum,
5. Mercur. dulcem,
6. Mercur. vita.
7. Flores antim. Correll.

8. Specificum purgans Paracelsi, quod maxime commendatur. Vide notas ad Crollium.

Inter Interna referuntur pilulæ Capitales non purgantes, sed confortantes ex Ladano, sunt tales:

℞. Ol. Camphor. gr. vi. (ol. Camph. fictis Camphora solvitur in oleo spicæ ana.)

Extr. Gumm. Ladan. cum sp. V. facti ʒj. Mosch. opt. gr. iij.

M. F. cum aq. Major. & mucilag. Tragac. pilulæ ponderantes singulæ gr. iv. Dos. pil. 1. vel 3. ad summum reiteratis vicibus, si opus est. Dentur longe a paltu circa vesperam. His rectè accensetur spiritus vitrioli Philosophicus in vino exhibitus.

Cum dolor omnistriplex auferatur. 1. Iis quæ causam doloris tollunt, eique hoc modo contraria. 2. Anodynis, quæ paregorica causam doloris mitigant, consopiant & æquabilem reddunt, leniterque rarefaciunt. 3. Narcoticis, quæ dolorem non percipi faciunt: Hæc propriè doloris causam non tollunt, nisi per somnum fortè, quem interius assumpta causant, mitigetur & concoquatur. Dolor vehementissimus Narcoticum, notior Anodynum indicat.

Si igitur dolor ab intemperie aliqua calida Cerebri vel vaporibus calidis exhalantibus fiat, ut in febris, cui occurrere poterit præmuta evacuatione per clysterem, statim vena secetur, si adsit præsertim Plethora aut totius corporis intemperies, aut quod magis tantum affectum spectat, applicentur Homoplati cucurbitulæ cum scarificatione: imo ex lapsis reiteratæ in magnis doloribus eodem die sine scarificatione applicentur. Hinc Frontale aliquod anodynum applicetur, quod tale:

℞. Laud. opiat. ʒss. aq. solani. rosar. an. ʒ iij. acet. rosar. ʒ i ss.

M. & panni linei iis madefacti applicentur fronti. Olfaciat quoque æger sæpe aq. ros. in qua Camphora soluta sit, & faciem eadem lavet. Interius dentur, quæ intemperiem alterant, humores noxios educunt, quæque vim habent anodynam, qualia sunt Laudana supra dicta.

Quod si hoc modo non cedat dolor, ad Vesicatoria accedendum, quæ applicentur sincipiti, vel collo prope nucham.

Quod si verò à frigida intemperie Cerebri vel cum vel sine materia oriatur dolor, à dictis medicamentis abstinendum, & ad ea, quæ à Practicis vulgò præscribuntur, accurrendum. Inter maxime sibi accommodata habeat Medicus acet. & oxymel scilicet aq. flor. sambuc. ol. & aq. pulg. rorismar. aneth. & petrosel. quæ extra applicata duo posteriora vel soli sæpius præmissis tam præmittendis, dolorem ejusmodi sedant, materiam digerunt & dissipant, vel ita disponunt, ut postea ab Errhinis & Apophlegmatismis facile educi & dissipari queat.

Ad tempora & frontem nec non ad Coronalem suturam summopere prodest eorum inunctio. Profunt etiam ol. nuc. mosch. expr. & Balsamus apoplecticus naribus illitus, it. Cinamomi, succini balsamus. Profunt etiam vel maxime faculi in modum pileoli ex serico confecti, in quibus insuntur aromata cum herbis capitalibus, & illi, qui ex Milii part. iv. & sal. tolli part. i. sunt, capiti quotidie ter aut quater applicandi, prius tamen calefaciendi.

Et si hic affectus non cedit remediis ordinariis, post aures in parte inferiore excitare vesicas licet, quæ ubi excitatæ rumpuntur, illisque superimponuntur folia brassicæ, vesicæ apertæ detinentur, & si eas consolidare animus, inunguntur unguento albo Rhatis. Possunt etiam, si morbus sit diuturnus & rebellis, applicari scza-



ceum aut cauterium potentiale aut actuale.

Quod si ob ventriculi vitium & consensum oriatur capitis dolor, isque continuus aut per intervalla affligat, sæpius detur infusio Croci Metall. vel flor. Antim. in aq. beton. aut menthæ facta. Prodest ut & in dolore à frigidis humoribus causato, Mercur. vitæ & panacea. Profunt in talibus etiam vel maximè pulveres grossi ex aromatibus Coriandri præparati, anisi confect. rotularum diarrhodon. Abbatis. diamosch. & similib. facti, post paltum assumpti, habita semper cura ventriculi ut & capitis, quod confortandum odoratis Balsamis & aliis, tam intra quam extrâ assumptis & applicatis.

In omni dolore Capitis tanquam arcanum appropriatum aq. Verbenæ destillata commendatur, quâ sæpè assumptâ pondere ʒiv. cum spir. vitrioli gut. iv. juvat, & Verbena tota contusa & capiti imposita, vel particula ejus vel tota cum radice collo è filo suspensa, ut radix sursùm vergat amuletum est.

NB. Verbena primum cum terra, cui adhæret radix, eruenda, postea radix præhensa ipsa per terram ordine inverso ducatur.

(In doloribus capitis ex Tartaro, qui sunt atrocissimi & acutissimi, revelabo tibi, Lector B. remedium arcanum, cujus vires experientia sæpè comprobavi & præstantius hactenus non vidi.

Rec. Nitri optimè purificati & ChrySTALLISATI q. v. conjice in crucibulum paulatim subjecto igne candefactum, & benè coopertum, ubi nunc autrum instar limpida aquæ fluxerit, prunam injice parvam & continuo exorietur flamma cum sibilo & strepitu, quod iteratò & successivè fac, quoad nitrum flagrare & strepere desierit, ad hæc ignem vehementissimum ad quadrantem horæ continua, post nitrum fixum fracto crucibulo exime & loco frigido humidoque in cellâ expone; transibit primò ad aëris saltem contactum in butyraceam substantiam, postmodum in deliquium, fietque humor ex albo flavescens spissius instar olei Tartari per deliquium. Hòc factò, Recipe Herbam Betonicæ & ex eâ aquam destilla, quam recenti herbæ betonicæ iucisæ & in mortario lapideo contusæ superaffunde, addendo ad singulas aquæ libras nitri istius liquati præter propter ʒij. vel ʒiij. stet in loco temperate calido, in vitro, & intra 14. horas Aqua intense erit tincta, quam filtra & bis de die ad ʒiij. agroto exhibe, quo stupendam operationem comperies.

Nota. Sic ex omnibus vegetabilibus specificis tincturam extrahere poteris, quòd si autem vires medicamenti exaltare volueris, eò labora, ut menstruum separes, quod affuso, sed NB. copioso spiritu vini perficies, qui tincturam menstruo ad tundum propulso, excipiet.

NB. Hoc modò & optimam antimonii tincturam perficies.)

#### Externa in dolore Capitis.

1. Epithema ex Gammaris.

2. Spir. V. opt. qui valet (quàm maximè) in dolore capitis ex Crapula, præsertim in testiculi cum spongia in aceto vini vel aq. communi macerata & expressa somententur.

3. Epithema ex Zedoaria: Pulvis Zedoariæ

irrigetur com. aq. flor. sambuci, (vel aq. communi) rosarum, betonicæ & applicetur ad nucham debite.

4. In hemicrania, præsertim in clavo à proprietate juvat radix cucumeris assumpta cum verbena & absinthio pontico ana p. j. in Vino cum aq. ros. coca F. Epithema.

5. Aqua composita talis.

ʒi. Aq. ros. sambuci an. ʒiv. Camph. ʒij. Mosch. opt. gr. iij. vel vi. Extr. Carlinæ ʒss. ol. spicæ ʒij.

Dissolve Camphor. in ol. spicæ, postea omnia M. & applicentur in petiis dolenti capiti in magnis & ingentibus caloribus: in febribus verò ab æstu solis applicentur, ut ad tempora & Caput.

6. Est specificum in doloribus capitis frigidis, quales sæpè vexare solent mulierculas, præsertim si credant sibi in occipitio frigida cum fluctuatione quadam hætere.

ʒi. Piper. long. ʒiij. contunde in mortario in pulverem crassum, postea extrahe cum sp. V. & serva. Ufus talis est: Fiat sacculus ex succino albo, pulverisato crassiusculè, interpassetur sacculus, & in hac essentia piper. l. madefactus applicetur calidè suturæ coronali (maximè prodelt) si opus est, præmittatur Evacuatio universalis per alvum.

7. In gravissimis doloribus capitis (cum vigiliis, urgentibus in primis destillationibus) recurrendum est ad Laudanum opiatum cæteris nimirum nihil proficientibus.

8. Cancris aliquot fluviatiles acet. rosaceo irrigentur & contundantur, ac Emplastri locò circumplacentur.

9. Radix Plantaginis collo suspensa dolori capitis à proprietate medetur.

10. Hederæ folia mollia cum Oxyrhodino torreantur & fronti temporibusq; apponantur. Optimum est in Cephalalgia biliola.

11. Verbena, ut supra dictum, est insignis specificum intus, & extra usurpata.

12. Nuclei persicorum cum aq. beton. vel Verbenæ contusi & applicati juvant mirabiliter in capitis dolore à causa frigida.

13. Unguentum de Alabastro.

ʒi. Cinarum Rubi M ij. Fol. Rutæ P j. Flor. chamom. recent. ʒiv. lapid. alabast. subtilissimè pulverisati lbj. olei rosarum lbj. ceræ ʒss. Vini albi lbj.

Pone in olla vitreata nova per triduum, postea ebulliant ad consumptionem vini, refrigerant, addantur albumina ovorum num. iv. M. Joann. Hartmann. in Practica Chymiatrica.

Cum cerebri meninges, & pericranium affliguntur, Nos caput dolere dicimus, ipsumque morbum Cephalalgiam, mutuato a Græcis nomine, appellamus. Non semper tamen patientes eodem modo hic dolor afficit: quando enim internas partes capitis molestat, interdum externas tantum, quæ etiam modò pungi, modò gravari, & cum distensione pulsari sentiuntur; nec rarò dimidia solum capitis pars dolet, quæ affectio Græcis dicitur Hemicrania.

Huic morbo causas attribunt Galenici quæcumque vehementer alterare caput valent, ut frigus, & æstus aëris, venti aquilonares, & austrini, cibi acres & status mofcentes, nimius vi-



ni potus, quæ acutè nimis olent, ictus, casus, affluxus humorum, atque intemperies sive calidæ, sive frigidæ, ceteraque hujusmodi: putantque pungentem dolorem esse ab acribus, & biliosis humoribus, gravantem à phlegmaticis, à flatibus vero instantem cum distensione.

His addidere Recentiores alias plures: veluti sanguinem detentum in plexibus, vel in vasis meningium, qui gravando, aut distendendo dolorem intert: liquorem nervis contentum, qui illorum fibras non repurgatus trahit, unde fortasse periodicæ Cephalalgia: ut advertit Willisius: Serum, seu Lympham in ventriculis, vel inter utramque meningem oclusam, ut pluribus cadaverum dissectionibus innotuit, & testatur Riverius observat. 37. cent. 1. rursus ex abscessu, aut vomica eadem partes oblidens: Tumores, & tubercula dolorem capitis, præsertim diuturnum asserre adnotat idem Willisius de anima Brutorum. A vermibus ibidem genitis, ex Foresto, & Schenchio: Itemque à calculis, inflammatione, aliisque, ut ex pluribus deducit Bonetus. Similiter à mala capitis conformatione, meningum crassitie, & suturarum constrictione, ac relaxatione non raro etiam diuturnos dolores induci, docemur ab Hippocrate, & Celso; quod pariter in his, qui caput acutum habent, notavit Gal. 6. epid. comm. 1. t. 3.

Per sympathiam, seu consensum aliorum viscerum Cephalalgia non raro etiam exoritur. Præsertim verò compatitur caput, & dolet, ex male affectis, ventriculo, utero, liene, mesenterio, varicibus, cæcisque hæmorrhoidibus. Observat autem Joubertus dolores capitis ab affecto ventriculo dependentes magis anteriorem partem vexare; posteriorem verò, & verticem, qui ab utero: quod etiam confirmat Langius lib. 1. epistolarum.

At Helmontius pluribus contendit hos dolores procedere solum à Duumviratu per nudam actionem regiminis constituti in splene, & stomacho, citra vapores caput, & meninges pertingentes; si nimirum prædictæ partes male affectæ suis muneribus non fungantur.

Verum quæcumque sentientes partes corporis, male afficiunt, ut aliàs de sensu tactus ostensum est, hujus doloris causæ esse possunt. Eò autem dolor erit vehementior, quo pars affecta magis nervis referta fuerit, & afficientia violentiora. Quæ verò sensim poros partium subeunt, licet dissidentia sint, tractu temporis consentanea evadunt, & vel nihil, vel levissime molestant; secus autem, quæ sensim applicata voluptatem asserunt, si repente adhibeantur, plurimum excruciant; ut experimur cum gelidas manus ad ignem subito calefaciendas admoveamus.

Scribit Galenus 3. de loc. aff. c. 9. solum interiores capitis dolores ad radices usque oculorum pertingere. At verum non est: succingit enim pericranium oculorum orbitas, efformatque primam eorundem tunicam adnatam, seu conjunctivam dictam. Cæterum Hemisrania, & aliz doloris species ex conquestu patientis notæ fiunt.

Causæ pariter Cephalalgia conjici poterunt ab his, quæ ab adstantibus & ægro referuntur,

ex assumptis cibis, ac potibus, vigiliis, & exercitiis immoderatis, egestionibus, aut retentionibus excrementorum, animi pathematis, aliisque. Conjectamus autem dolorem à sanguine procedere, si præcessere ejusdem suppressiones, qui aut ex hæmorrhoidibus, aut ex utero, aut ex naribus periodicè fluere consueverat. Erit à liquoris nervorum vitio, si cephalalgia ita utis quibusdam horis invadat, & repetat, præsertim mane, & à somno, vel tempore distributionis alimenti; vel quando chylus cum remeante sanguine permiscetur, & in arterias carotidas traducitur. A sero, seu lymphæ: si cum catarrho, urinis copiosis, & turbatis, humore narium, & sudoris consueti suppressione hatis præsertim si vigeat in constitutione pluviosa, aut immoderatos potus, & aquosos cibos sequatur.

A tuberculis, tumoribus, abscessibus, aliisque Cephalalgiam suspicabimur, cum præter graves & diuturnos dolores, cerebrum sopore gravatur: neque tam facile, etiam efficacissimis remediis morbus cedit. Pari modo conjectandum de calculis ibidem genitis, aut de vermibus; nisi quod in his dolores erunt erodentes cum frequenti vertigine, præsertim in motu capitis, fœtor per os, & nares exhalabit, quæ pruritum etiam patientur cum sterminatione, ut observat Dennertus. Quod si puris egestio compareat, vel per aures, vel per nares, aut palatum, certum indicium erit maturati, & jam disrupti apostematis.

A mala suturarum, aut meningum conformatione dolor erit diuturnus, nullis remediis cedens, & à crapula gravior evadet: fortè etiam apparebunt notæ malè conformati capitis.

At verò idiopathicus à sympathico distinguetur, quandoquidem ille continuus est, & in capite vitium arguit, cum aliqua animalium operationum læsione; hic verò erit interruptus, atque aderunt reliquorum viscerum, præcipue naturalium, affectiones. Porro solet potissimum consentiens iste dolor à ventriculo, liene, mesenterio pancreate, & utero pendere; unde nausea, inermia, vel tardæ digestionēs, inflationes, ruentis alvi durities, & alia in hypochondriis symptomata percipientur.

Quamvis autem ex his prudens Medicus plerumque probabiliter conjiciat de variis, diversisque causis cephalalgia, non raro tamen eundem falli contingit; siquidem dolor creditus ab una causa, esse, detectus est habuisse ortum ab alia omnino diversa, facta nimirum sectione cadaverum ejusmodi morbi genere interemptorum. Quamquam & in hoc etiam non levis error atcidere possit.

A causis externis illatus, solutu facilius esse solet difficilior verò ab internis. Aphlegmone, abscessu, pure, tuberculis, calculis, & vermibus inferre solet deliria, coma vigil, vel somnolentum, motus epilepticos, apoplexiam, paralysem, surditatem. Novi quendam diuturno capitis dolore vexatum, tandem surdum evasisse, facta scilicet post longum tempus purulenti humoris depositione ad aures, unde diu, & abundanter ille effluxerat. Qui à mala capitis, & meningum conformatione ortum ducit, insanabilis censendus est. Si præterea cum acuto capitis dolore exteriora frigescent,



urinæ pellucidæ excrenantur, atque accedat vomitus varius, & multorum colorum: sonitus aurium, vertigo, aut manuum torpor, malum ex Hippocrate. Quandoque etiam dolor capitis, qui citra causam, vel evacuationem repente delit, lethum prænunciavit, resolutio nimirum sensu, & mente abalienatâ; At si gravem cephalalgiam consequatur narium hæmorrhagia, salutare: sicut pariter eruptio puris, aquæ, vel sanguinis per os, aut nares 6. Aphor. 10. Verumtamen semper timendum à gravi & vehementi capitis dolore.

Curant quoque illum diversis modis, prout diversas ejus causas suspicati sunt. Galenici post institutam refrigeratorii victus rationem phlebotomiam præcipiunt, ex pede primum, si dolor sympathicus putetur, deinde ex brachio; mox etiam ex mariscis usu hirudinum, ducti documento Galeni 1. Aph. comm. 23. dicentis: *In maximis doloribus nullum majus inveni remedium, quam usque ad animi defectionem evacuare.* Postmodum dolore adhuc perseverante cathartica exhibent, ac interjectis quibusdam diebus, decocta capitalia dicta cum radice chinæ, & jura alterata; adjiciunt suturæ coronali emplastra, etiam quæ vesicas excitant, ac tibia, & brachia cantheriis inunt. Quæ satis nedum in hoc, verum etiam in aliis diuturnis capitis affectionibus in frequenti usu habent.

Alii distinctius procedere se putantes, atque singulis causis, congruentibus medicamentis occurrere; si à restagnante sanguine in meningibus, vel plexibus, dolor oriatur, quæ aliquando evenit, ut spontè sua dilatatis narium vasis, hæmorrhagia morbum judicet, cum naturam deficientem vident, arte conantur ejusmodi evacuationem promovere, fortiter emunctis, vel perfricatis naribus, ut inde sanguinem eliciant. Si verò hac industria uti minime liceat, venam secant, præsertim, in adolescentibus, atque assuetis, sicut etiam auctoritate Hippocratis, qui dolente parte posteriore capitis, rectam venam in fronte sectam prodesse scribit 5. Aph. 68. At prudentiores victum tenuem commendant, & ceras, carnes, & vina meraca prohibent. Si his non desinat, utuntur alchalicis; & si sanguis acritudinem sapiat, etiam acidis temperatioribus, & narcoticis.

Si phlegmones, aut abscessus timeantur, prodesse aiunt dissolventia, & sudorifica; ut sanguis hircinus, sperma ceti, mumia, cornu cervi philosophicè præparatum, decoctum ejusdem, oculi Cancris, pulvis castorei veri, extractum hyperici, bezoardicum quodcumque, Antimonium diaphoreticum, Mercur. diaphoreticus, Cinnabaris, Antim. suffitus ex Mercur. & alia hujus generis plura: quæ etiam locum habere dicunt, si vitium sit in principio nervorum, & in liquore eorundem; Interim verò spinam universam convenientibus oleis aut cerotis foveant, putâ essentia apthos, lavendulæ, nucis myristicæ, unguento nervino, spiritu vini, aliisque.

Cum lymphæ vel serum doloris causa sunt, unde oculi etiam, palatum, & guttur infestantur, ut in catarrhis; optimum remedium arbitrantur uriam, & sudorem promovere, cum & Natu-

ra sponte sua soleat per ejusmodi vias superabundantem lympham salubriter deponere, febre præsertim comite. In iis verò, qui frequenter huic incommodo subjiciuntur, & distillationibus veluti per periodos affecti, sæpius de cephalæa conqueruntur, hydroticis medicamentis occurrere satagunt, & antequam serosi humores in prædictas partes irruant, aliò avertere, & foras extubare: Quare provocantur expuitiones, nares ad sternutamenta irritantur, fortiterque emunguntur; vomitus, si præcipue ventriculus consentiat, concitatur, & alia peraguntur, quæ si humorem non omnino tollunt, magna saltem ex parte minuant. Ad hanc rem exhiberi solent cum fructu sequentes pilulæ pluries iteratæ; quæ ex his constant: Resinæ, vel extracti jalapæ gr. 15. Ceruss. antim. & crystall. tart. singulorum gr. 12. pilul. de succino 3j. cum oleo maccis, vel simili redig. in formam pilul. & manè assum. superdorm.

Pro corporibus humidiori constitutione præditis magnopere commendant pilulas Ruh, & aloëticas, aromaticum rotatum: diarhodon, elixir proprietatis simplici infusione paratum. Invaluit nunc etiam usus decocti Coffeæ, & quidem cum juvamento eorum, qui languore stomachi, & cerebri tenentur. Cæterum ratio victus attenuans semper confert, vitatis iis quæ tum intrinsecus, tum extrinsecus humefacere valent.

Quod si dolor capitis symptoma sit scorbuticæ, vel hypochondriacæ affectionis, tunc conducibilia erunt antiscorbutica medicamenta, & ex chalybe parata, de quibus alibi. Ab infarctu vero vitiosorum succorum in Pancreate, Mesenterio, Ventriculo, aliisque adjacentibus partibus, conferent leviter purgantia, & simul corrigentia, ex Aloë, & Rhabbarbaro composita, pilulæ tartareæ, Tartarum vitriolatum; quoniam Hartmannus commendat infusum croci metallorum sæpius exhibendum in aqua betonica, aut menthæ. Insuper sal absinthii, & centaury: electuarium, extractum, & spiritus baccarum Juniperi: pulvis stomachicus & cachecticus Quercetani, elixir proprietatis Helmontii, spiritus cochleariæ. Quæ pariter prodeunt in cephalæa ab utero dependente, ac præterea tinctura succini, essentia croci, extractum castorei, & granorum actes, facula bryoniæ, & alia plura suo loco latius dicenda. Si denique à venerea contagione ducat originem, antiveneris curanda erit, de quibus alibi.

Cæterum à Vermibus, Calculis, aliisque in cerebro genitis, sicut rard accidit, ita rarenter medicabilis. Testatur tamen Forestus plerisque cephalalgia à vermibus sanatos decocto raphani in frusta concisi in vino Cretico. Et Sennertus in hanc rem laudat suffitum ex centaury minore, marrubio, absinthio, betonica, antimonio, succino: atque cerorum loco dolenti applicatum ex aloë, pulvere lumbricorum, selæ taurino, & oleo absinthii cum cera, ut apud eundem legere est. At verò à mala futurarum, & meningum conformatione, nullam curationem admitter.

Quæ hæcenus proposita sunt causas cephalalgicæ potissimum respiciunt. Jam nonnulla specialiora recenscamus, quæ experientis probata



bata sunt dolorem quicumque sedare, vel saltem capite dolentibus succurrere. Et quidem dolorem leniunt omnia narcotica, præsertim, verò laudanum opiatum, seu Nepenthes, Quercetani dictum, pilula de cynoglossa, & de styrace, requies magna Nicolai, Philonium utrumque, theriaca recens, & similia intrinsecus assumpta. Extrinsecus vero adhibita unguenta, & decocta ex mandragora, hyocyano, solano, papavere, lactuca, nympha, quibus caput, & tempora, vel etiam plantæ pedum abluuntur, liniunturque, ut præsertim fieri solet unguento populeo, & somnifero Schroderi in sua *Pharmacopœa*.

Speciatim quoque reteruntur cephalalgiam tollere verbera viridis collo suspensa, quousque exaruerit, ex Foresto, vel etiam contusa & capiti imposita ex Hartmanno, qui eandem opem præstare, ait, radice plantaginis similiter collo suspensam, & aquam verberæ destillatam, ac sæpius epotam ad uncias iv. cum gutt. iv. spiritus vitrioli. Latetur Bartholinus liquorem ex radicibus nucis juglandis primo vere per incisionem elicatum, & epotum esse singulare experimentum nuper in Anglia detectum; sicut etiam in doloribus articularum mirabiliter prodesse alii testantur. Describit Forestus unguentum Alabastrinum, quod solum in docti differt ab illo Hartmanni in *Practica chym.* hoc eod. cap. ) illudque mirabile prædicat, in omnibus doloribus capitis, præcipue à contusione. Nonnullis sunt in usu folia hederæ teneriora fronti, & temporibus apposita. Nicolaus Chesnau extollit Ranunculi folia virentia, quæ ad miraculum capitis dolorem fugare ait, si in modum emplastri dolenti parti applicentur. Fernelius componit pilulas quoddam ex aloë, speciebus electuarii de gemmis, tribus santalis, & rosis puniceis cum syr. ablinthii, & violarum. Paracelsus succum cancerum fluvialium expressum temporibus applicat, præsertim in febribus malignis. Et Rulandus caneros vivos cum aceto rosaceo in mortario punit, & pro epithemate adhibet. Hartmannus verò aceto ros. primum irrigat, deinde contundit, atque malagmatis loco dolenti parti admovert. Referuntur ab eodem Hartmanno plura alia medicamenta, tam interna, quam externa, & sive dolor à causis calefacientibus, sive refrigerantibus credatur inductus, quæ apud ipsum legi poterunt, *Lucas Tozzi Medic. Practicæ lib. i.*

Dolor capitis dicitur vel *Cephalalgia* & *Cephalæa*, cum totum caput; vel *Hemicrania*, cum dimidiam tantum capitis partem occupat.

Uterque dolor est vel *sympathicus*, ab aliarum partium affectibus dependens; vel *idiopathicus*, cum caput ipsum primario afficitur.

Medico diligentissime perpendendum est an caput ab affectu proprio doleat an per consensum, in his enim curationis cardo maxime vertitur. Frustrâ enim caput medicinâ vel Chirurgiâ curabis, si morbi fomes in ventriculo (v.g.) lateat.

Varie sunt doloris capitis idiopathici causæ, quæ singulæ diversam opem postulant.

Aliquando dolor capitis gravissimus siphylidæ laborantes cruciat, qui remediis nullis

nisi antisiphyliticis cedit. (N. B.) Cùm cephalæa irritis omnibus vulgaribus medicamentis ægrum lancinare usque perstiterit, aliquid venerei eidem inesse suspicetur Medicus. Si quis dolorem hunc ideo sympathicum nuncupandum esse censeat quia a generali affectu dependeat; sciat me partes tantum particulares respicere cum quibus consentiat caput in ejusdem doloribus distinguendis.

Interdum *Mercurius* inter cr. nii laminas colligitur, vel à succis mercurialibus vel ab unguentis ad pryalismum movendum adhibitis, vel ab hydrargyri præparatis intra sumptis: Undecunque *Mercurius* sanguini immisceatur, si sufficienti & tempestiva purgatione è corpore non eliminetur, quandoque ut dixi, inter tabulas deponitur, unde dolores crudelissimi, qui raro sine trypano perfecte curantur. Immo vix sine hoc evacuatur vitiosissimi & corrosivi humores, qui in diploe aliquando sedem capiunt, & diuturnæ cephalææ aurores sunt.

Hicæ causis omissis, ad alias transeamus, quæ in genere, vel calide vel frigide sunt.

In causa calida vel secetur vena frontis vel hirudines applicentur arteriis temporalibus, vel hic fiat etiam arteriotomia. Sin æger sit plethoricus, primò extrahatur sanguis e brachio; postea autem ex locis prædictis.

Ante omnia alvi æstus cavenda est, eandem (si torpidior sit) vel clysteribus emollientibus & refrigerantibus, vel lenitivis per os exhibitis movendo.

Victus sit refrigerans & humectans. Jusculum sequens optime convenit. Farciatur pullus galinaceus hordeo mundato, uvis cornutiæ, cappariibus à sale liberatis, mox coctus elixetur cum frustulo carnis vitulinæ & add. cum tempus fuerit, agrimon. pimpinell. borrag. bugloss. acetosell. sylvestr. cichor. an. m. j. post sufficientem coctionem f. colatura, in qua dissolve cremoris tartar. ʒ j. infusioni ʒ iij. sem. in aq. endiv. fact. per horas 24. cum ʒ ss. caryophyllor. sum. lb ss. vel lb j. mane. Viter salsa, acra, piperata, vaporosa, legumina; vinum generosum, omnesque spirituosos liquores.

Vigiliæ & somnus ne modum excedant sineque horis convenientibus: ne dormiat paulò post cibum, quia somnus iste gravat. caput. *Animi pathemata* violentiora fugiat, iram, moerorem, amorem &c.

Capitis perspiratio libera procuranda, capillos detondendo.

Arteriis temporalibus inducatur unguentum de bolo, vel *anacollemæ* ex bolo, spodio, succino, mastiche, sanguine draconis exceptis oleo rosar. nenuphari, & aceto rosar. vel unguento popul. cum paucis aceto.

In cephalæa toto capiti, in hemicrania parti dolenti applicetur cataplasma seq.

ʒ. Betonic. virid. m. ij. flor. herb. paralyf. m. j. flor. papav. errat. p. ij. flor. Keyri m. ʒ. rosar. rubr. p. iij. sem. coriandr. ʒ iij. nuc. moschat. ʒ ij. simul contundantur humectando cum oxycrati tantillo; f. cataplasma applicand. velperi.

Vesicatorium nuchæ applicatum sæpè insigniter prodest.

Si cephalalgia à causa frigida pendeat, remediis



mediis calidioribus externis & internis, fortioribusque purgantibus ei occurrendum est.

Purgetur æger pil. seq.

℞. Mail. pilular. coch. minor. 3ß. calomel. 3j. ol. rorissimar. gutt. ij. m. f. dons. Exhibe manè horis tribus ante iusculum cum debita custodia. Repetantur bis aut ter, interpolito uno vel altero die. Vel si per epierasin purgare malueris, *cerevisie medicata* sequentis ope voti composeris.

℞. Ralur. lign. sancti. interioris ingerrimi 3xii. sacraparill. 1ß. lign. cassia. 3iv. rad. pæon. Ireos florent. ana 3ij. fol. veronicæ utriusque, fanicul. brunell. suc. an. m. ij. chamæpit. m. iv. flor. primul. veris siccator. m. v. baccarum juniper. 3iv. fol. fenn. mundat. 3vj. turbit. hermodact. an. 3ij. mechoacana. rad. helleb. nigr. cum aceto præp. an. 3ij. nuc. moschat. per frusta sect. num. vi. Cerevisiæ non lupulata galon. vj. Post fermentationem bibat quotidie bis cyathum, *viz.* manè jejunos, & hora quinta p. m.

Vel ℞. Aloës in succ. depurat. caulium & betonic. liquat & coagulat. 3j. pulver. majoran. 3ij. mastich. 3iv. cum succo caulium s. massa, de qua cap. 3j. alternis diebus hor. 2. à cœna levi. Vel sum. eandem dosim pil. macri quæ eadem ferè cum his sunt.

Ex cerevisiæ medicatæ ingredientibus, exceptis purgantibus, præparari etiam potest *potus ordinarius*. *Victus* autem sit moderatè calefaciens & siccans.

Diebus à purgatione vacuis sumat instar majoris avellana. Opiatæ seq. mane & vesperti.

℞. Conserv. flor. calendul. 3j. conserv. fl. anthos, betonic. ana 3iß. confect. alkerin. & de hyacinth. an. 3vj. rasur. cranii humani non sepulti, vini quercini an. 3ij. succin. alb. præparat. 3ij. cinam. interioris 3iij. ligni aloës, macis ana 3iv. m. f. & cum syrup. de itœcade sive pæon. compos. f. electuar. instar opiatæ.

Vel ℞. Confect. alkerin. & de hyacinth. an. 3ß. rasur. cranii human. 3ij. rasur. corn. C. primarii 3iß. lapid. bezahar, 3ß. succin. alb. præp. 3iv. rosar. rubr. subtilissime trit. 3iß. cinam. interioris 3iij. sacchar. albisum 3x. m. f. Excipiantur mucagine gummi tragacanth. extract. extract. in aq. cinam. f. tabellæ ponderis 3ij. ad eundem usum.

Quo ad remedia *externa*, fricetur caput rasum diu multumque singulis matutinis, *sacculis* in cap. de frigid. cerebri Intemperie descriptis, vel capillis inspergatur *pulvis* ibidem laudatus, ac *sumus* ibi præscriptus hauriatur.

*Masticatoriis* ad educendam pituitam è cerebro utatur, *viz.*

℞. Rad. malv. siccatur quantum volueris: habeatur aqua vitæ optimè rectificat. in qua macerat. fuerint v.g. pro 1ß. pyrethri 3ij. zinziber. 3ij. caryophyll. 3iß. sumatur aliquantulum de hac aqua, & in ea macer. per horam unam ante usum frustulum radice malvæ prædictæ, volutetur in ore, & subinde madesiat iterum in dicto liquore, sitque usus singulis matutinis sedulo expuendo quod dissolvetur.

Vel ℞. Pulv. pyrethr. & staphisagr. an. 3ij. piper. long. 3j. zinzib. cubeb. an. 3ß. mastich. 3ß. f. omnium pulvis subtil. excipiendo f. q. ceræ virgin. liquat. & formentur globuli ad eundem usum: aut

syndone exceptus pulvis crassiusculus redigatur in globulos.

Post evacuationes generales utatur *Errhinis* ex succ. majoran. betæ, anagalled. vin. alb. in quibus infunde pulvis tabaci, Iris Florent. æs ultum &c. Vel.

℞. Rad. helleb. alb. 3ij. tabaci 3j. euphorbii 3ß. flor. benzoin. 3iij. m. f. pulvis naribus insufflatus ex calamo. Post motam sternutationem abluantur nares vino albo.

Foveatur caput manè *foin* sequenti spongiis mollibus in eadem calefacta tinctis & expressis.

℞. Ralur. lign. sancti. 3iv. rad. cyper. pæon. enul. Ireos Florent. aristoloch. rotund. an. 3ij. fol. salv. laur. majoran. betonic. Veronic. mar. an. m. ij. flor. chamæmel. melilot. summit. absynth. an. p. iv. rosar. rubr. p. vi. baccar. laur. & juniper. an. 3iß. sem. anis. fœnicul. coriandr. an. 3j. nigell. Rom. 3x. f. omnium decoct. in aq. fontan. addendo sub finem dinud. partem vini Hispan. Vel æger ingredietur thermas & f. capitis embrocatio.

Cephalalgia causam dissipabunt sacculi cinere sarmentorum & pulvere salv. majoran. betonic. &c. fæcti, vini spiritu irrorati & dolenti parti appositi. Inunctio item ex balsamis majoranæ, caryophylla. succini circa futuras.

℞. Cortic. pomor. curlipendul. & cydonior. an. 3j. cortic. citr. & aurant. an. 3iß. lign. Rhodii santal. citr. rasur. rad. juniper. an. 3vj. flor. rosar. rubr. lavendul. an. 3ß. styrac. calanuit. benzoin. an. 3x. caryophyll. cinam. an. 3iij. aq. rosar. & naphæ an. 1ß. j. aq. ocymi 1ß. aceti ros. 3ij. (ambræ 3ij. mosch. 3j.) m. f. pro *sumo* excitando ex instrument. idoneo Castoletta dicto.

Adhiberi etiam possunt *vesicatoria, cucurbitula, feta, fontanella* in locis aptis.

Hæc de dolore capitis idiopathico: Quod ad sympathicum attinet, diligenter inquirendum est cujus partis consensu pœnas luat caput, & parti primario affectæ curatio maximè dirigenda est v. g.

Si ex *ventriculi* affectu frigido doleat caput: post clysterem injectum & rejectum, die sequenti detur vomitorium seq.

℞. Vitriol. alb. 3j. dissolve in 3iv. vel vi. prisan. vulgaris: capiat manè & post singulos conatus bibat haultum posset; parati cum flor. chamæmeli. N.B. Vitriolum inter omnia vomitoria stomachum optimè evacuat, & post evacuationem corroborat. Vel si æger ad vomendum minus pronus sit, fortioribus emeticis utatur. Post vomitum (vel aliàs à flatibus) si adsit stomachi dolor, f. sôtus ex corroborantibus, *viz.* decocto absynth. menth. rosar. rubr. flor. chamæmel. summit. aneth. semin. anis. fœnicul. cortic. aurant. & citri. lign. Rhodii, macis & caryophyll. in aqua parte vini albi generos. & aq. parato; vel si singultus aut motus convulsivus oriantur, detur theriaca, dialecordium, &c.

Propinetur aliquando manè vel initio pastus vinum absynthites. Horâ dimidiâ post singulos pastus sum. cochl. j. pulveris hujus digestivi.

℞. Sem. anis. & fœnicul. dule. an. 3vi. sem. coriandr. præp. 3iij. corall. rubr. margar. præp. ana 3iß. cinam. interior. 3ij. ossis de corde Cervi 3j. ambr. gris. 3ß. sacchar. albis. quadruplum pondus omnium m. f. f. pulvis ut alkool ad usum.

Summatim, sumantur quæ ventriculum siccant & calefaciant, pituitosos & viscidos humores.



mores attenuent, & exterminent: contrariaque vel remedia vel diæta vitentur.

N. B. Hæmicrania per consensum ventriculi omnis, uti spiritu vitrioli vel in jusculis vel cum syr. curatur.

Si ab Uteri affectu Cephalæa oriatur, v. g. à mentibus suppressis, curationem menagogis aggreddiatur Medicus; si à passione hysterica &c. Ut in paucis conferam; Quæcunque pars sit mali hujusmodi, eandem medicamenta potissimum respiciant.

Episcopus Cestrichis longo & rebelli capitis dolore vexatus, à quodam qui diutissime eodem affectu conflictatus fuerat irritis omnibus aliis præsidis, sequens accepit remedium, à quo ipse convaluit, & deinceps plurimos alios curavit. *Lintum imbutum aquâ frigidissimâ* toti calvaria, applicetur aliquoties renovando applicationem; postea caput optimè sicetur. Credo oportere caute eo uti, inermi nimis refrigerationis cerebri, à qua Coma, Letargus, Paralysis, Apoplexia impendere possunt. Capiti (inquit Celsus lib. 1. cap. 4.) nihil aquæ prodest atque aqua frigida: itaque is cui hoc infirmum est, per ætatem id bene largo canali quotidie debet aliquandiu subijcere.

*Hedera Serpentis* supra terram virentis suffitu importuno D. Ashovort bis in die administrato remedio, curavit intra 9. vel 10. dies Equitem Ser. Fralsveinnian ex dolore capitis posteriorem partem obsidente jam ab annis quinque. Idem successit Doctori Bate in nonnullis aliis. Fumus autem iste, debet excipi hiante ore, per nares saltem attrahendo spiritum, herba in prunas coniectâ, quæ videtur habere aliquid resinosi. Tegumentis undique injectis ad lumen continendum totum caput velandum est.

Filia D. Relinger Genevæ magnis capitis doloribus obnoxia utebatur felicissime aq. seq. ad lotionem frontis & temporum tepide, cum spongia vel linteo.

℞: Flor. lilior. convall. m. j. Flor. violæ tricoloris s. herb. trinitatis (jaceæ) m. j. vini albi generosi lb. ij. Mient in infusione per horas 24. in vase vitreo, mox s. distillatio in balneo. Quotannis mense M. io vigentibus istis plantis bonam aquæ quantitatem pro ipsa præparabat Pharmacopæus. *Theodor. de Mayerne prænot. Medic. lib. 11.*

### Consultationes.

#### De Dolor capitis, palpitatione, & dolore ventris. Pro Nobili Matrona.

Dum attentius expendo morbosas affectiones Illustrissimæ Matronæ, ab Illustrissimo D. Christoforo ejus marito mihi relatas, in eam sententiam necessario concedendum censeo dolorem illum capitis sæpe recurrentem in sinapite, palpitationem cordis, animi deliquium & dolores vagos in lateribus, lumbis, & ventre non raro supervenientes: esse symptomata prædictarum partium consentientium cum utero male affecto. Mensibus enim non

fluentibus, morbi sunt ex utero, ut inquit Hippocrat. Menses autem in nobilissima patiente si non sunt prorsus suppressi inordinate saltem, imperfecte & præter periodum fluunt: ideoque mirum non est, partes omnes circumpositas dolore affici propter uteri ligamenta, cordis palpitationem & hypothyriam fieri propter vapores retros ex impuro illo sanguine elevatos per arterias cor petentes; prout iidem exhalantes in caput, & præsertim incipit multis venis repletum, ejus doloris non raro sunt causa.

Causa autem propter quam menses non libere fluunt, ut suspicor, est obstructio venarum uteri facta ab humoribus crudis, & pituitosis, in ventriculo frigido genitis, & ex erroribus in vitiu commissis magna copia congestis: cum præsertim acceperim, Illustrissimam Matronam habere in familiari usu lac caicum, & alia ex lacte confecta; quantum autem possit frequens lactis usus ad flatulentas & vaporosas collectiones, prodidit Hippocrat. s. Aphor. 64. *Lac dure caput dolentibus malum & hypochondria elata, & murmurantia habentibus;* non sanè aliam ob causam, nisi quia lac est vaporosum & flatulentum, & facile corruptibile. Audio dubitatum fuisse de contorsione uteri, cujus tamen nulla signa video proposita; si enim ad latus esset conversus nobilis matrona dolorem perciperet in imo tantum latere, eumque acutissimum, & continuum, non autem in variis partibus, nec rectè incedere posset; de quibus tamen affectibus non sunt querelæ.

Quid sit prædicendum difficulter assequi possum, cum mihi non innotuerit naturale hujus matronæ temperamentum, corporisque habitus, & affectuum diuturnitas; hoc saltem asserendum, affectus hosce ægrè superatum iri, cum a viris doctissimis nondum fuerint debellati, variis remediis adhibitis.

Utrumque tamen sit, necessaria proculdubio est diligentissima corporis expiatio; *Mulier enim menses decolores, nec non eodem semper modo, & tempore prodeuntes, purgationem indicant esse necessariam,* divini Hippocrat. testimonio s. aphor. 36. quæ eo dirigenda est, ut referentur obstructions uteri, calefiat ventriculus, divertantur vapores cor, & caput petentes, & cardiacis roboretur cor ipsum gravissimè affectum, præmissa uni. ersali totius providentiæ. His intentionibus satisfiet per remedia Chirurgica, pharmaceutica, & diætetica.

Inter Chirurgicæ principum locum obtinebit venæ sectio, quæ fieri debet ex saphe-na, dummodo tunc non intumescant pedes; quod si tumidi essent, prout aliquando accidit, ut audio, ex quo conjicere possemus habitum hunc esse cachecticum; in hoc casu vena sub poplite secari posset, aut aponeurosis cucurbitulæ internæ pari coarum cum scarificatione profunda; scarificationes namque substituit Gal. venæ sectioni in illis mulieribus, quæ carnes habent molles Lib. cu. ativo per sanguinis missionem. Quod si nobilissima patientis renuat prædictas operationes, applicentur saltem hirudines venis sedalibus, & moderata sanguinis copia inde extrahatur, nec obstat, quod hac



hac ratione ab utero fiat derivatio, quo nomine, videtur suspecta operatio, ne scilicet avocentur menses; dum enim evacuetur inde sanguis crassus & isculentus, facile fiet ut qui superest fluxilior redditus confluat ad loca consueta, si præsertim ab hoc remedio fovebitur uterus, & cucurbitulæ non scarificatæ coxis applicabuntur, observandum tamen est ne fiat operatio hæc præsentibus, vel imminetibus mensibus. Quod si remediis præscribendis non cederet affectus, sed perseveraret dolor incipitis, & cordis palpitatio, & hoc casu etiam vesicantia apponenda essent internis femoribus, eaque aliquandiu aperta servanda; quibus conferentibus, posset postea inuri fonsiculus interno sinistro femori, in hunc finem, ut fieret continua revulsio a partibus principalibus, corde scilicet, & capite. Et hæc de chirurgicis, omisis frictionibus, & ligaturis tanquam notissimis.

Quoad Pharmaceutica, lenienda est alvus electuario lenitivo, & speciebus hieræ simplicis, lubricæq; conservanda frequenti usu pilularum ex aloë lota cum succo rosatum, quarum scrupulum sumere poterit semel in hebdomada statim ante coenam. Præparabuntur humores syr. de corticibus citri, oxymel. simpl. syr. de hyssopo, cum emulsione sem. citr. per triduum exhibitis sine diluto, mox repetito leniente præscripto, vel pil. mali-hinis & elephanginis. Præscribentur tylypi cum diluto, qui parabuntur ex syr. bizantino cum aceto oxymel. compos. & syr. capil. vener. Fernelij, cum syr. de artemisia, & decoctione capil. veneris, borrag. melissæ, betonice, origani, agrim. & pulegii: qui exhibebuntur per quinque dies præmisso bolo ex trochiscis de eupatorio, de myrrha, & capparibus; deinde repetenda purgatio cum pilulis de hiera cum agarico, & aggregativis. Hisque peractis, duo genera remedium erunt opportuna, decoctum scil. salsafras, visci quercini, & chinæ, cum herbis aperientibus, & scrupulo semis chalybis potabilis, præmisso bolo ex trochiscis cypheos, hedichrois, triphera sine opio, & mithridatica confectione: paratur decoctum cum columba turricola. Aliud remedium erit jus galli antiqui saliti, eidem cocti cum aperientibus validioribus, ut puta rusco, asaro, apio, agrimonia, artemisia, capillo veneris, & radice capparum, in quo alternis diebus infundatur agaricus trochiscatus, & fenne: nec prætermittatur aliquando usus boracis mineralis cum trochiscis de myrrha. Extrinsecus non usurpentur suffitus aromatum, ob dolorem capitis: sed fiant fomenta, inunctiones utero ex vino albo modice generoso, in quo ebullierint pulegium, origanum, matricaria, artemisia, malva, & flores chamameli; inungaturq; venter inferior oleo liliorum alborum, cheirino, chamamel. cum myrrha, & croco.

Victus sit ciborum boni succi, facilisque digestionis: vinum sit tenue, subdulce: à cibo semper aliquid assumat adstrictoria facultate præditum, quale erit eliacydonium, saccharum rosatum, & conserva de mentha, de absinthio, exercendo corpus curru, si pedibus fieri non poterit. Quæ omnia proposita sint in salutem hujus nobilissimæ matronæ quæ ad vota Illustr. Comit. cedant. *Bened. Silvæ. Consil. & Respons. Medic. Cens. 1.*

*De Dolor capitis viginti annorum. Pro Adm. Rev. F. Angelino Capucino.*

Duo sunt affectus patientis Adm. Rev. dolor scilicet capitis antiquissimus, & melancholia hypochondriaca. Dolor capitis est cum essentialis, factus a materia pituitosa in cerebro humido, & ad triduum vergente genita, ex qua eleventur etiam flatus, tum per consensum a ventriculo crudos vapores suggerente, & a calido jecore, & mesenterio, aliisque naturalibus visceribus vapores melancholicos, & biliosos capiti suppeditantibus; quæ de causa plures dolorum differentis in capite sentit. Alter affectus Melancholia scilicet hypochondriaca, dependet à copia humoris crassi partim melancholici, partim pituitosi: hujus quidem in ventriculo, alterius vero in jecore geniti, & in mesenterio ac liene contenti ibique propter prohibitam ventilationem fervidi reddit, & in flatus crassos conversi; unde ventris rugitus, cordis angustia, & insucta molestia, ac diuturnior quam conveniat.

Ex quo fit ut affectus propositi sint ferè insuperabiles, cum ob ipsorum diuturnitatem, ob quam partium intemperies ferè contraxerunt habitum, tum ob inæqualem viscerum intemperiem, calidam scilicet jecoris, & frigidam ventriculi: quæ de causa læditur hæc pars, ubi alteri opem ferre studemus. Non tamen ob id à quocunque remedii genere desistendum est; cum enim hæcenus remedium beneficio melius habuerit patiens Adm. Rev. si perseverabit in medicamentorum usu, sperandum est fore ut in meliorem statum evadat; quemadmodum e contrario, si cessaverit a quocunque remedii genere, in dies labetur in deterius.

Agendum igitur: & materia illa crassa cum viscida, tum terrestris naturalibus visceribus impacta, ab ipsis est deturbanda, præmissa ipsius evacuatione, incisione, & emolitione: materia quæ etiam in capite contenta sensibilibet, & insensibiliter est evacuanda, partiumque intemperies corrigendæ, ac prohibenda novæ materiæ regeneratio, vel saltem denuo genita divertenda est ad partes ignobiliores: & viscera jam dicta roboranda, habita tamen prius totius corporis universali providentia. Quod fiet medicis præsidis ex Chirurgia, & pharmacia desumptis, una cum recta victus ratione.

Et quia Chirurgica præsidia plura fuerunt hæcenus usurpata, sufficere in posterum habere in familiari usu hirudines venis sedalibus appositæ, semel saltem in mense: quæ etiam applicandæ hirudines venis post aures, aut vena frontis incidi poterit; cogitandumque erit de scarificationibus factis diversis capitis partibus, nisi aliis præsidis cessaverit affectus, nam quantum ad fonsiculos, aliaque hujuscemodi præsidia, nihil amplius innovandum est.

Quoad Pharmacia, probatur frequens alvi lenitio, potius quam valida purgatio, eaque syrupo de polypodio compos. electuario lenitivo, diacatholico; aliquando vero permiscebitur portiuncula electuarii de succo rosatum, fietque levis humorum præparatio cum corpus satis purgatum sit. Non omittantur erluna, & masticatoria: utatur lavacro capitis lixivio parato cum agarico, beton. salsafras, melissæ, lupulis, baccara,



baccara, roremarino, salvia, & portione pul-  
pæ colocynthidis : inferiori vero ventri heri  
posunt frictiones & inunctiones remediis at-  
tenuantibus, emollientibus, & incidentibus.  
Quod si pedum lotionem familiarem habue-  
rit, summopere prodesse poterit. Non ne-  
gligantur conservæ anthos, boraginis, beto-  
nicæ, rosarum, imò tempore frigidiori deve-  
niendum erit ad magno antidotos semel in  
hebdomada.

Quibus omnibus proportionem respondeat  
victus ratio, gestetque aliquod cardiacum epi-  
thema, nec omittantur clysteres carminativi.  
*Idem ibidem.*

*De gravitate capitis; dolore Dentium, ac  
genu dextri : & hypochondriaca affectione.  
Pro Illustriss. & Excellentiss. Principe Cognos-  
kofski Polono.*

De quatuor affectibus conqueritur Illustriss.  
& Excellentiss. Princeps, videlicet de gravitate  
capitis, dolore dentium, incipiente hypochon-  
driaca, & de dolore genu dextri ex levi quo-  
cumque motu, à quinquennio molesto.

Capitis quidem gravitas non aliunde pro-  
venit, quam à congerie materiæ pituitosæ in  
capite collectæ; cum per modum generatio-  
nis, ob excedentem humiditatem cerebri,  
eamque naturalem, & forsitan hæreditariam,  
tum per modum attractionis à subjectis par-  
tibus, propter intemperiem calidam cum ce-  
rebri trahentis, tum jecoris suppeditantis, ad-  
juvante ventriculo frigidiori quam conveniat,  
quam ob causam non raro diarrhœa ex crudi-  
tibus divexari solet. Pituitosa autem mate-  
ria non solum gravitatem capitis inducit, ve-  
rum etiam aliquando dolores scapularum, &  
lumborum, dum occasione validi exercitii, &  
equitationum fluit ad prædictas partes; imò  
& salsedinem aliquam contrahens, & ad sini-  
stram mandibulam superiorem confluens cor-  
rosionem, & dolorem dentis in eadem parte  
infert, cui forsitan & abscessus aliquis jungitur,  
cum non raro sanguis inde profluat, nec levis  
quidam fœtor observetur.

Hypochondriacæ principium adesse, vel ex  
eo facile colligi potest, quod rugitus aliquos  
quandoque percipit in ventre, & mœrore ali-  
quo, solitudinisque desiderio tenetur, huiusque  
affectus causa est obstructio quædam lienis, non  
tamen insignis, eaque genita à copia sangui-  
nis crassi, cum melancholici à jecore; tum pi-  
tuitosi à ventriculo transmissi, & multo magis  
ab inordinata victus ratione, cum Princeps  
Excellentiss. habeat in familiari usu carnes sa-  
litas, olera, aliosque cibos crassi succi, &  
quibus facili negotio sanguis sæculentus in je-  
core præcalido generatur, & à liene recipitur  
& retinetur.

Quartus & ultimus affectus est dolor à quo-  
cumque levi motu in dextro genu subortus.  
Affectus hic ante quinquennium ortum duxit  
à luxatione ipsius genu, nescio an imperfe-  
cta, vel perfecta, eaque contracta ex violento  
motu; hinc pars illa imbecillior est reddita, li-  
gamentaque laxata, ac propterea patella mobi-  
lior redditur quam conveniat: unde fit quod ex  
levi quocumque motu contorquetur genu, jugi-

terque fluit materia à capite ad prædictam par-  
tem; ac propterea intumescere conspicitur,  
exacerbatur dolor statim infra patellam.

Hæ igitur sunt affectiones Illustriss. & Ex-  
cellentiss. Principem divexantes, hæque ipsa-  
rum causæ, quæ licet in præsentia leviores  
videantur, quam ut curatione indigeant, ni-  
hilominus tamen facile suboriri possunt do-  
lores articulares ex hæreditaria dispositione,  
hypochondriacæ incrementum, ex sui natura  
valde molestæ, necnon & incessus impedimen-  
tum: prout etiam in mandibula ab ulcere fi-  
lluloso metus est, si præsentis affectus insuper  
habeantur.

Pro quorum curatione evacuandum est to-  
tum corpus, & caput, divertendaque fluxio à  
dentibus, & à genu: resolvenda est materia in  
ipsum conflua, dentis caries sistenda, tollendæ  
sunt obstructions lienis, caput exsiccandum, &  
omnes partes affectæ corroborandæ: hæcque  
præstanda sunt verno tempore, tanquam magis  
opportuno, remediis Chirurgicis, Pharmaceuti-  
cis, & congrua victus ratione.

Inter Chirurgica pro universali totius eva-  
cuatione, sanguis educendus erit ex jecoraria  
dextri brachii ad unc. 7. circiter; & pro diver-  
sione catarrhi, fonticulus sinistro brachio mu-  
tendus erit, cujus radium si renuerit Illustr. &  
Excellent. Dominus, ipsius loco familiariter uti  
debebit pilulis mastichinis bis in hebdomada:  
non omittis capitis pectinationibus, & ejusdem  
frictionibus cum pannis asperis, sæpius repeti-  
tis; abstinendo à frictionibus partium cum su-  
periorum, tum inferiorum, ob imminens pericu-  
lum dolorum articularum; & hæc usque ad æta-  
tem consistentem sunt administranda, quo sal-  
tem tempore fonticulus non erit omittendus.

Universalis interim præparatio, & purgatio  
iis perficienda erit, quæ quoslibet humores  
excrementitios spectant, & præsertim pituitam,  
& melancholiam prædominantes; idque præstan-  
dum simplici, & composita eorundem præpara-  
tione & purgatione, deveniendo ad extractum  
hellebori nigri, & usum pilularum de hermoda-  
ctylis. Caput deinde purgandum per nares, ob  
dentium affectum, non omisso quinetiam modi-  
co tabaco pulverizato per nares attracto. Hisq;  
peractis, accommodatissimum erit decoctum  
paratum ex radice Chinæ, ligno visci quercini, &  
ligno indico raspato, cum gallo juniore optime  
flagellato, additis herbis aperientibus betonica,  
& iva arthetica, exhibitum triginta dies circiter,  
singulis diebus ad unc. 8. matutinis horis, instil-  
latis sex vel septem guttulis spiritus vitrioli sin-  
gulis vicibus prædicto decocto, præmissoque bolo  
ex terebinthina laticina, lota aqua betonicæ, &  
redacta in boliformam cum pulvere ossium cre-  
matorum, & iva arthetica. Dumque hæc sunt  
internis remediis, localia quinetiam partibus  
affectis sunt præscribenda, lotiones scilicet capi-  
tis lixivio parato ex residuo prædicti decocti, cū  
sale, & cinere ficus; pulveresque capitales non  
calefacientes noctu inspergendi capillis, qui pa-  
ram poterunt ex ossibus crematis, ostræis ustis,  
cornu cervi, rosis, & betonica. Pars dentis cor-  
rota ferro candenti sæpius tangenda, insufflandi-  
que pulveres matrisylæ, olivarum, & tuthiæ  
præparatz, & replendum foramen pilula ex au-  
ro confecta. Lienî fiant inunctiones ex oleo



phlegmonem excitans, cephalalgia, & subsequens delirii causa fuit: dein sanguis ibidem accumulatus, cum circulare nequirit, sericopiam a se reiecit, à quo totus cito mundabatur; proinde ut morbus forsan ab initio per phlebotomiam curabilis, postea lethalis evaderet.

Memini alium Academicum, qui post diuturnam hemicraniam, sub sutura temporalis, per tres septimanas eum perpetuo, & gravissime affligentem, in Apoplexiam brevi functam incidit. Capite aperto phlegmon juxta locum dolentem in meningibus accreverat, à qua demum suppurata, & disrupta, sanies in cerebrum decidens, substantiam ejus livore & putredine affecerat. Præter hujusmodi causas invincibiles, per Anatomiam detectas, plures observavi casus, aliorum similiter decumbentium, in quibus, cum morbi signa, & symptomata, pari ritu, ac modo describuntur habuerunt, proinde Ætiologiam ejus aut eandem, aut valde affinem concludere licebit.

Quamquam autem, cephalalgia continua, [præsertim si in plures septimanas sine intermissione producat] periculo non vacat: attamen de curatione ejus non illico desperandum erit, quoniam hujus causa, ut ut fixa, & immobilis visa, sæpe longo remediorum usu, immo interdum sine illis natura & tempore sanatur: utcumque in casu fere deplorato, Medicina quadam opus erit, ne præsens affectus in deteriorem, nempe soporofum, aut convulsivum transeat. Hæc de cephalalgia continua: modo restat intermittens exempla, & instantias rariores quasdam proponere.

Itaque ut mittam hic cephalalgia, cujus paroxysmi vagi ac incerti a sanguine aut sero loca affecta irrudentibus procedunt, casus utpote valde crebros, & vulgo notos describere: libet hic observationes quasdam selectas hujus morbi aut periodici, aut per consensum à viscere quodam excitari visi, in medium proferre; quoad prius, dolorum capitis insultus periodicos, vel ab humore nutritio vel à succo nerveo produci ostendimus; utriusque exempla modo subdemus.

Venerabilis matrona anno ætatis 45. gracili corporis habitu, ac temperamento bilioso prædita, cum à longo tempore cephalalgia occasionaliter excitari solitis obnoxia degisset, circa initium Autumnii dolore capitis periodico molestari coepit: hic affectus circa quartam à meridie horam invadens, ad mediam fere noctem, donec ægrotans præ cruciatu & vigiliis defatigata in somnum cogerebatur, protendi solebat; dein post somnum satis profundum illa mane evigilans recte habebat. Ad hunc modum Ægrotans per tres septimanas morbi hujus insultus quotidianos passa, Medicinæ quam maxime horrebat, usum distulit; tandem vero appetitu dejecto, & viribus attritis, ad therapiam experendam coacta, post lenem catharsin & phlebotomiam, cepit bis in die, per unam, aut alteram septimanam, Electuarii sequentis quantitatem castaneæ, & integre convaleuit.

℞. Conservæ florum Cichorii, fumariz, an. ʒiij. pul. rad. Ari compof. ʒijss. Eboris ʒjss. sant. citr. ligni Aloës an. ʒß. salis Absynthii ʒjss. vitriol. Martis ʒj. syrupi è quinque radicibus q. s. fiat Elect.

In hoc casu, quod post diathe sin cephalalgiam morbi accessiones, febrium intermittentium ritu, demum periodicæ extiterunt: proculdubio in causa fuit, chymi sive humoris nutritio in sanguinem assimilatio impedita: quippe cum penus ejus in massam sanguineam receptus vinci nequirit, post aliquantulam moram discrepare, & inque particulis ejus effervescente solebat: præterea statim sanguis ut mixturam incongruam exenteret turgescens, recrementa sua, prout in alias partes, ita præcipue, & cum majoris molestiæ sensu, in meningum fibras prius debiles, aut in conformatione lasas, deponebat: materies ea capiti suffusa, aut per se fibras sensiles irritans, aut cum succo earum irriguo effervescens, doloris paroxysmum modo descriptum ciebat; qui nempe perdurabat donec particulæ heterogeneæ vel mutuo congressu effervescentes, aut subigerentur, aut exhalarent.

Mulier venusta, procera, & gracilis, affectibus cephalicis, diu, & graviter obnoxia, interdum per plures dies, immo septimanas, quotidie primo mane somno expectata, cephalalgia atroci, eam exinde per tres, aut quatuor horas affligente infestari solebat: interim & totius capitis gravitate, sensuum torpore, & mentis hebetudine afficiebatur: cujusmodi affectus, una cum dolore, velut nubes discussæ ante meridiem evanescentes, sudum, & serenum relinquebant; donec postero mane iterum velut nebulæ & caligo occuparent: pro his sanandis pilulas purgantes, phlebotomiam parcam, vesicatoria insuper; sp. C.C. aut fuliginis, cum julapiis aut aquis cephalalgicis usum præscripsi.

Quod in hac D. secus ac in altera Ægrotante, dolores capitis somno succederent potius, quam ab eo sanaretur, ratio esse, videtur, quoniam in cephalalgia hac matutina materies morbifica in succo nerveo resideret, cujus insignior cruditas, & plenior circa caput aggestio, mox è somnis contingunt, prout alibi satis hinc ostendimus: alter autem hujus morbi paroxysmus vespertinus, cum à liquoris nutritii intra massam sanguineam plenitudine, & turgescencia penderet, idcirco totidem à prandio horis contingens, non nisi à somno, qui sanguinis inordinationes sedat, compecebatur.

Cephalalgia paroxysmos quandoque per consensum ab aliis partibus, sc. utero, liene, stomacho, &c. oriri, illicet Ægrotantium experientia, & querela manifesto prædicant; attamen hoc alia ratione quam per vapores à viscere affecto, ad caput elevatos fieri, ex illorum historiis & phænomenis rite perpensis non minus luculenter patescit. Et primo quod spectat ad dolores capitis ab utero excitari visos, nihil frequentius occurrit, quam a mensibus aut lochiis suppressis; cephalalgias immanes succedere. Porro cataménia licet rite fluunt, tamen aliæ fluxu instante, aliæque eodem desinente, atroci capitis dolore affligi solent. Verum enimvero quanvis eodem tempore, ac caput etiam uterius afficiatur, non tamen sequitur noxam hinc inde immediate transferri; sed ipse sanguis est, qui materiem morificam capiti affigit, eam sc. modo in proprio sinu genitam, & utero destinatam, perperam in cerebri meningas defert; & modo eam ab uteri partibus surripens, cum majori



majori malitia capiti tradit. Hujusmodi Ætiologia etiam cephalalgia & stomacho, licet, aliisque partibus vulgo attributa convenit.

Mulier formosa; & juvenis, gracili corporis habitu, & sanguine calido prædita; cum cephalalgia hæreditaria obnoxia fuisset, paroxysmos ejus crebros, & vagos, alios nempe de levi occasione, aliosque sponte, hoc est absque causa evidenti oriundos, pati solebat. Pridie morbi accessionem spontaneam, vesperi valde esuriens, cœnam uberiorem cum appetitu famelico, ne dicam canino devorabat; hoc signo dolorem capitis mane sequenti invasurum certissime præfagiens cui augurio eventus nunquam defuit. Quam primum enim evigilabat, cruciatu per totum incipit acerrimo afflicta insuper vomitu humoris modo acidi, & quasi vitriolici, modo biliosi, & summe amaricantis afficiebatur; hinc in indicium daretur cephalalgiam istam stomachi vitio exortam fuisse.

Hujus rationem ut reddere suscipiam, imprimis constat vomitionem capiti læsa, nempe post plagam, vulnus, aut casum ab alto succedere; at tamen vomitui, cardiæ, aut stomacho alias laboranti, dolor capitis, nisi intercedat sanguinis effervescencia, raro aut minime supervenit. Quamobrem in prædicto laborantis casu, cum plane liqueret, cerebri meningas ad cephalalgias prædispositas fuisse, ejusque paroxysmos sanguinis agitationem quamvis excitasse; hinc obvium erit concipere, quando particula heterogenea propter chylosecos vitium, in massa sanguinea ad plenitudinem congereretur, statim ob molesti expulsiōnem fluore ejus oborto, eas utpote male congenere a cruore secretas, partim ex arteriis in ventriculum suffusas, fermentum ejus exsuscitasse; adeoque famem produxisse, partimque in capitis meningas prædispositas irruisse, ibidemque cephalalgia mox sequenturæ formitem, seu potius incentivum deposuisse. Hæc Ægrotans pharmaciam quamvis averfata, cum nullam Medicinæ methodum subire vellet, tandem affectibus etiam paralyticis & convulsivis obnoxia evasit. Ex his facile erit cephalalgia cujusvis alterius sc. hypochondriacæ, hepaticæ, aut alias sympathicæ Ætiologiam designare, ut non opus fuerit hic plures historias aut observationes addere. *Thom. Willis in Pathologia Cerebri.*

1. In Cephalæa seu doloribus capitis quibuscunque in primis usus Aq. Benedictæ Ventriculo jejuno statâ dosi exhibitæ multum prodest. Vide notas in Crollium.

2. Ejusdem effectus quoque est Syr. ex aq. Benedictæ.

3. Purgatio fit:

1. *Per diasenam Laxativam,*
2. *Per Panchymagogum vegetabile.*
3. *Radices Ellebori preparat.*
4. *Scamm. preparatum,*
5. *Mercur. dulcem,*
6. *Mercur. vita.*
7. *Flores antim. Correll.*
8. *Specificum purgans Paracelsi, quod maximè commendatur. Vide notas ad Crollium.*

Inter Interna referuntur pilulæ Capitales non purgantes, sed confortantes ex Ladano, sunt tales:

℞. Ol. Camphor. gr. vi. (ol. Camph. siccit; Camphora solvitur in oleo spicæ anæ.)

Extr. Gummi. Ladan. cum sp. V. facti ʒj, Mosch. opt. gr. iij.

M. f. cum aq. Major. & mucilag. Tragac. pilulæ ponderantes singulæ gr. iv. Dos. pil. 1. vel 3. ad summum reiteratis vicibus, si opus est. Dentur longe a pascu circa vespertam. His rectè accensetur spiritus vitrioli Philosophicus in vino exhibitus.

Cum dolor omnistripliciter auferatur. 1. Iis quæ causam doloris tollunt, eique hoc modo contraria. 1. Anodynis, quæ pægorica causam doloris mitigant, consopiant & æquabilem reddunt, leniterque rarefaciunt. 3. Narcoticis, quæ dolorem non percipi faciunt: Hæc proprie doloris causam non tollunt, nisi per hominem fortè, quem interius assumpta causant, mitigetur & concoquatur. Dolor vehementissimus Narcoticum, natiur Anodynum indicat.

Si igitur dolor ab intemperie aliqua calidâ Cerebri vel vaporibus calidis exhalantibus fiat, ut in febris, cui occurrere poterit prænitia evacuatione per clysterem, statim vena secetur, si adsit præsertim Plethora aut totius corporis intemperies, aut quod magis tantum affectum spectat, applicentur Homoplati cucurbitulæ cum scarificatione: imo ex læpius reiteratæ in magnis doloribus eodem die sine scarificatione applicentur. Hinc Frontale aliquod anodynum applicetur, quod tale:

℞. Laud. opiat. ʒss. aq. solani. rosar. an. ʒiij. acet. rosar. ʒi ss.

M. & panni lini iis madefacti applicentur fronti. Olfaciat quoque æger sæpe aq. ros. in qua Camphora soluta sit, & faciem eadem lavet. Interius dentur, quæ intemperiem alterant, humores noxios educunt, quæque vim habent anodynam, qualia sunt Laudana supra dicta.

Quod si hoc modo non cedat dolor, ad Vesicatoria accedendum, quæ applicentur sincipiti, vel collo prope nucham.

Quod si vero à frigida intemperie Cerebri vel cum vel sine materia oriatur dolor, à dictis medicamentis abstinendum, & ad ea, quæ à Practicis vulgò præscribuntur, accurrendum. Inter maxime libi accommodata habeat Medicus acet. & oxymel scilicet aq. flor. sambuc. ol. & aq. puleg. rosimar. aneth. & petrosel. quæ extra applicata duo posteriora vel sola sæpius præmissis tamen præmittendis, dolorem ejusmodi sedant, materiam digerunt & dissipant, vel ita disponunt, ut postea ab Errhinis & Apophlegmatismis facile educi & dissipari queat.

Ad tempora & frontem nec non ad Coronalem futuram summo opere prodest eorum inunctio. Profunt etiam ol. nuc. mosch. expr. & Balsamus apoplecticus naribus illitus, it. Cinamomi, succini balsamus. Profunt etiam vel maxime sacculi in modum pileoli ex serico confecti, in quibus insuntur aromata cum herbis capitalibus, & illi, qui ex Milii part. iv. & sal. tolli part. i. sunt, capiti quotidie ter aut quater applicandi, prius tamen calefaciendi.

Et si hic affectus non cedit remediis ordinariis, post aures in parte inferiore excitare vesicas licet, quæ ubi excitatæ rumpuntur, illisque superimponuntur folia brassicæ, vesicæ apertæ detinentur, & si eas consolidare animus, inunguntur unguento albo Rhafis. Possunt etiam, si morbus sit diuturnus & rebellis, applicari scra-



ceum aut cauterium potentiale aut actuale.

Quod si ob ventriculi vitium & consensum oriatur capitis dolor, isque continuus aut per intervalla affligat, sæpius detur infusio Croci Metall. vel flor. Antim. in aq. beton. aut menthæ facta. Prodest ut & in dolore à frigidis humoribus causato, Mercur. vitæ & panacea. Profunt in talibus etiam vel maximè pulveres grossi ex aromatibus Coriandri præparati, anisi confect. rotularum diarrhodon. Abbatis. diamosch. & similib. facti, post patium assumpti, habita semper cura ventriculi ut & capitis, quod confortandum odoratis Balsamis & aliis, tam intra quam extrâ assumptis & applicatis.

In omni dolore Capitis tanquam arcanum appropriatum aq. Verbenæ destillata commendatur, quâ sæpè assumptâ pondere ʒiv. cum spir. vitrioli gut. iv. juvat, & Verbena tota contusa & capiti imposita, vel particula ejus vel tota cum radice collo e filo suspensa, ut radix fursum vergat amuletum est.

NB. Verbena primum cum terra, cui adhæret radix, eruenda, postea radix præhensa ipsa per terram ordiue inverso ducatur.

(In doloribus capitis ex Tartaro, qui sunt atrocissimi & acutissimi, revelabo tibi, Lector B. remedium arcanum, cujus vires experientia sæpè comprobavi & præstantius hactenus non vidi.

Rec. Nitrî optimè purificati & ChrySTALLISATI q. v. conjice in crucibulum paulatim subjecto igne candefactum, & benè coopertum, ubi nunc nitrum instar limpida aquæ fluxerit, prunam injice parvam & continuo exorietur flamma cum sibilo & strepitu, quod iteratò & successivè fac, quoad nitrum flagrare & strepere desierit, ad hæc ignem vehementissimum ad quadrantem horæ continua, post nitrum fixum fracto crucibulo exime & loco frigido humidoque in cellâ expone; transibit primò ad aeris saltem contactum in butyraceam substantiam, postmodum in deliquium, fietque humor ex albo flavescens spissus instar olei Tartari per deliquium. Hòc factò, Recipe Herbam Betonicæ & ex eâ aquam destilla, quam recenti herbæ betonicæ incisæ & in mortario lapideo contusæ superaffunde, addendo ad singulas aquæ libras nitrî istius liquati præter propter ʒ ij. vel ʒ iij. stet in loco temperate calido, in vitro, & intra 24. horas Aqua intense erit tincta, quam filtra & bis de die ad ʒ iij. ægroto exhibe, quo stupendam operationem comperies.

Nota. Sic ex omnibus vegetabilibus specificis tincturam extrahere potetis, quòd si autem vires medicamenti exaltare volueris, eò labora, ut menstruum separes, quod affuso, sed NB. copioso spiritu vini perficies, qui tincturam menstruo ad fundum propulso, excipiet.

NB. Hòc modò & optimam antimonii tincturam perficies.)

#### Externa in dolore Capitis.

1. Epithema ex Gammaris.

2. Spir. V. opt. qui valet (quàm maximè) in dolore capitis ex Crapula, præsertim si testiculi cum spongia in aceto vini vel aq. communi macerata & expressa fomententur.

3. Epithema ex Zedoaria: Pulvis Zedoariæ

irrigetur com. aq. flor. sambuci, (vel aq. commun) rosarum, betonicæ & applicetur ad nucham debite.

4. In hemicrania, præsertim in clavo à proprietate juvat radix cucumeris assumpta cum verbena & absinthio pontico ana p. j. in Vino cum aq. ros. coca F. Epithema.

5. Aqua compolita talis.

ʒl. Aq. ros. sambuci an. ʒ iv. Camph. ʒ ij. Mosch. opr. gr. iij. vel vi. Extr. Carlinæ ʒ ss. ol. spicz ʒ ij.

Dissolve Camphor. in ol. spicz, postea omnia M. & applicentur in petiis dolenti capiti in magnis & ingentibus caloribus: in febribus verò ab æstu solis applicentur, ut ad tempora & Carpum.

6. Est specificum in doloribus capitis frigidis, quales sæpè vexare solent mulierculas, præsertim si credant sibi in occipitio frigida cum fluctuatione quadam hæere.

ʒl. Piper. long. ʒ iij. contunde in mortario in pulverem crassum, postea extrahere cum sp. V. & serva. Usus talis est: fiat sacculus ex succino albo, pulverisato crassiusculè, interpassetur sacculus, & in hac essentia piper. l. niadefactus applicetur calidè futuræ coronali (maximè prodest) si opus est, præmittatur Evacuatio universalis per alvum.

7. In gravissimis doloribus capitis (cum vigiliis, urgentibus in primis destillationibus) recurrendum est ad Laudanum opiatum ceteris nimirum nihil proficientibus.

8. Cancris aliquot fluxatiles acet. rosaceo irrigentur & contundantur, ac Emplastri locò circumplacentur.

9. Radix Plantaginis collo suspensa dolori capitis à proprietate medetur.

10. Hederæ folia mollia cum Oxyrhodino torceantur & fronti temporibusq; apponantur. Optimum est in Cephalalgia biliosa.

11. Verbena, ut supra dictum, est insigne specificum intus, & extrâ usurpata.

12. Nuclei persicorum cum aq. beton. vel Verbenæ contusi & applicati juvant mirabiliter in capitis dolore à causa frigida.

13. Unguentum de Alabastro.

ʒl. Cumarum Rubi M ij. Fol. Rutæ P j. Flor. chamom. recent. ʒ iv. lapid. alabast. subtilissimè pulverisati lb ss. olei rosarum lb j. ceræ ʒ ss. Vini albi lb ij.

Pone in olla vitreata nova per triduum, postea ebulliant ad consumptionem vini, refrigerant, addantur albumina ovorum num. iv. M. Joann. Hartmann. in Præctica Chymiatrica.

Cum cerebri meninges, & pericranium affliguntur, Nos caput dolere dicimus, ipsumque morbum Cephalalgiam, mutuato à Græcis nomine, appellamus. Non semper tamen patientes eodem modo hic dolor afficit: quandoque enim internas partes capitis molestat, interdum externas tantum, quæ etiam modò pungi, modò gravari, & cum distensione pulsari sentiuntur; nec rarò dimidia solum capitis pars dolet, quæ affectio Græcis dicitur Hemicrania.

Huc morbo causas attribunt Galenici quæcumque vehementer alterare caput valent, ut frigus, & æstus aeris, venti aquilonares, & austrini, cibi acres & status mofcentes, nimius vi-



ni potus, quæ acutè nimis olent, ictus, casus, affluxus humorum, atque intemperies sive calidæ, sive frigidæ, cæteraque hujusmodi: putantque pungentem dolorem esse ab acribus, & biliosis humoribus, gravatè a phlegmaticis, a flatibus vero iustantem cum distensione.

His addidere Recentiores alias plures: veluti sanguinem detentum in plexibus, vel in vasis meningium, qui gravando, aut distendendo dolorem inter: liquorem nervis contentum, qui illorum fibras non repurgatus trahit, unde fortasse periodicæ Cephalalgix: ut advertit Willisius: Serum, seu Lympham in ventriculis, vel inter utramque meningem oclusam, ut pluribus cadaverum dissectionibus innotuit, & testatur Riverius observat. 37. cent. 1. Ius ex abscessu, aut vomica easdem partes oblidens: Tumores, & tubercula dolorem capitis, præsertim diuturnum asserre adnotat idem Willisius de anima Brutorum. A vermibus ibidem genitis, ex Foresto, & Schenchio: Itemque à calculis, inflammatione, aliisque, ut ex pluribus deducit Bonetus. Similiter à mala capitis conformatione, meningum crassitie, & suturarum constrictione, ac relaxatione non raro etiam diuturnos dolores induci, docemur ab Hippocrate, & Celso; quod pariter in his, qui caput acutum habent, notavit Gal. 6. epid. comm. 1. c. 3.

Per sympathiam, seu consensum aliorum viscerum Cephalalgia non raro etiam exoritur. Præsertim vero compatitur caput, & dolet, ex male affectis, ventriculo, utero, liene, mesenterio, varicibus, cæcisque hæmorrhoidibus. Observat autem Joubertus dolores capitis ab affecto ventriculo dependentes magis anteriorem partem vexare; posteriorem verò, & verticem, qui ab utero: quod etiam confirmat Langius lib. 1. epistolarum.

At Helmontius pluribus contendit hos dolores procedere solum à Duumviratu per nudam actionem regiminis constituti in splene, & stomacho, citra vapores caput, & meningis pertingentes; si nimirum prædictæ partes malè affectæ suis muneribus non fungantur.

Verum quæcumque sentientes partes corporis, malè afficiunt, ut aliæ de sensu tactus ostensum est, hujus doloris causæ esse possunt. Eò autem dolor erit vehementior, quo pars affecta magis nervis referta fuerit, & afficiencia violentiora. Quæ verò sensim poros partium subeunt, licet dissidentia sint, tractu temporis consentanea evadunt, & vel nihil, vel levissime molestant; secus autem, quæ sensim applicita voluptatem asserunt, si repentè adhibeantur, plurimum excruciant; ut experimur cum gelidas manus ad ignem subito calefaciendas admoveamus.

Scribit Galenus 3. de loc. aff. c. 9. solum interiores capitis dolores ad radices usque oculorum pertingere. At verum non est: succingit enim pericranium oculorum orbitas, efformatque primam eorundem tunicam adnatam, seu conjunctivam dictam. Cæterum Hemisrania, & aliæ doloris species ex conquestu patientis notæ fiunt.

Causæ pariter Cephalalgix conjici poterunt ab his, quæ ab adstantibus & ægro referuntur,

ex assumptis cibis, ac potibus, vigiliis, & exercitiis immoderatis, egestionibus, aut retentionibus excrementorum, animi pathematis, aliisque. Conjectamus autem dolorem à sanguine procedere, si præcessere ejusdem suppressiones, qui aut ex hæmorrhoidibus, aut ex utero, aut ex naribus periodicè fluere consueverat. Erit a liquoris nervorum vitio, si cephalalgia statutis quibusdam horis invadat, & repetat, præsertim mane, & a somno, vel tempore distributionis alimenti; vel quando chylus cum remeante sanguine permiscetur, & in arterias carotidas traducitur. A sero, seu lymphæ: si cum catarrho, urinis copiosis, & turbatis, humore narium, & sudoris consueti suppressione fiat præsertim si vigeat in constitutione pluviosa, aut immoderatos potus, & aquosos cibos sequatur.

A tuberculis, tumoribus, abscessibus, aliisque Cephalalgiam suspicabimur, cum præter graves & diuturnos dolores, cerebrum sopore gravatur: neque tam facili, etiam efficacissimis remediis morbus cedit. Pari modo conjectandum de calculis ibidem genitis, aut de vermibus; nisi quod in his dolores erunt erodentes cum frequenti vertigine, præsertim in motu capitis, sætor per os, & nares exhalabit, quæ pruritum etiam patientur cum sternutatione, ut observat Sennertus. Quod si puris egestio compareat, vel per aures, vel per nares, aut palatum, certum indicium erit maturari, & jam disrupti apostematis.

A mala suturarum, aut meningum conformatione dolor erit diuturnus, nullis remediis cedens, & à crapula gravior evadet: fortè etiam apparebunt notæ malè conformati capitis.

At verò idiopathicus à sympathico distinguetur, quandoquidem ille continuus est, & in capite vitium arguit, cum aliqua animalium operationum læsione; hic verò erit interruptus, atque aderunt reliquorum viscerum, præcipue naturalium, affectiones. Porro solet potissimum consentiens iste dolor à ventriculo, liene, mesenterio pancreate, & utero pendere, unde nausæ, intus, vel tardæ digestionis, inflationes, ructus, alvi durities, & alia in hypochondriis symptomata percipiuntur.

Quamvis autem ex his prudens Medicus plerumque probabiliter conjiciat de variis, diversisque causis cephalalgix, non raro tamen eundem falli contingit; siquidem dolor creditus ab una causâ esse, detectus est habuisse ortum ab alia omnino diversa, factâ nimirum sectione cadaverum ejusmodi morbigenere interemptorum. Quamquam & in hoc etiam non levis error accidere possit.

A causis externis illatus, solutu facilius esse solet difficilior verò ab internis. Aphlegmone, abscessu, pure, tuberculis, calculis, & vermibus inferre solet deliria, coma vigil, vel somnolentum, motus epilepticos, apoplexiam, paralysem, surditatem. Novi quendam diuturno capitis dolore vexatum, tandem surdum evasisse, factâ scilicet post longum tempus purulenti humoris depositione ad aures, unde diu, & abundanter ille effluxerat. Qui à mala capitis, & meningum conformatione ortum ducit, insanabilis censendus est. Si præterea cum acuto capitis dolore exteriora frigescent,



urina pellucidæ excernantur, atque accedat vomitus varius, & multorum colorum: sonitus aurium, vertigo, aut manuum torpor, malum ex Hippocrate. Quandoque etiam dolor capitis, qui citra causam, vel evacuationem repente denit, lethum prænuñciavit, resolutio nimirum sensu, & mente abalienatâ; At si gravem cephalalgiam consequatur narium hæmorrhagia, salutare: sicut pariter eruptio puris, aquæ, vel sanguinis per os, aut nares 6. Aphor. 10. Veruntamen semper timendum à gravi & vehementi capitis dolore.

Curant quoque illum diversis modis, prout diversas ejus causas suspicati sunt. Galenici post institutam refrigeratorii victus rationem phlebotomiam præcipiunt, ex pede primum, si dolor sympathicus putetur, deinde ex brachio; mox etiam ex mariscis usu hirudinum, ducti documento Galeni 1. Aph. comm. 23. dicentis: *In maximis doloribus nullum majus inveni remedium, quam usque ad animi defectionem evacuare.* Postmodum dolore adhuc perseverante cathartica exhibent, ac interjectis quibusdam diebus, decocta capitalia dicta cum radice chinæ, & jura alterata; adjiciunt suturæ coronali emplastra, etiam quæ vesicas excitant, ac tibias, & brachia cauteriis inurunt. Quæ sane nedum in hoc, verum etiam in aliis diuturnis capitis affectionibus in frequenti usu habent.

Alii distinctius procedere se putantes, atque singulis causis, congruentibus medicamentis occurrere; si à restagnante sanguine in meningibus, vel plexibus, dolor oriatur, quia aliquando evenit, ut spontè sua dilatatis narium venis, hæmorrhagia morbum judicet, cum naturam deficientem vident, arte conantur ejusmodi evacuationem promovere, fortiter emunctis, vel perfrictis naribus, ut inde sanguinem eliciant. Si verò hac industria uti minime liceat, venam secant, præsertim, in adolescentibus, atque assuetis, sulti etiam auctoritate Hippocratis, qui dolente parte posteriore capitis, rectam venam in fronte sectam prodesse scribit 5. Aph. 68. At prudentiores victum tenuem commendant, & ceras, carnes, & vina meraca prohibent. Si his non desinat, utuntur alchalicis; & si sanguis acritudinem sapiat, etiam acidis temperatioribus, & narcoticis.

Si phlegmones, aut abscessus timeantur, prodesse aiunt dissolventia, & sudorifica; ut sanguis hircinus, sperma ceti, mumia, cornu cervi philosophicè præparatum, decoctum ejusdem, oculi Cancris, pulvis castorei veri, extractum hyperici, bezoardicum quodcumque, Antinonium diaphoreticum, Mercur. diaphoreticus, Cinnabaris, Antim. suffitus ex Mercur. & alia hujus generis plura: quæ etiam locum habere dicunt, si vitium sit in principio nervorum, & in liquore eorundem; Interim verò spinam universam convenientibus oleis aut cerotis foveant, putâ essentia anthos, lavendulæ, nucis myristicæ, unguento nervino, spiritu vini, aliisque.

Cum lymphæ vel serum doloris causa sunt, unde oculi etiam, palatum, & guttur infestantur, ut in catarrhis; optimum remedium arbitrantur urinam, & sudorem promovere, cum & Natu-

ra sponte sua soleat per ejusmodi vias superabundantem lympham salubriter deponere, febre præsertim comite. In iis verò, qui frequenter huic incommodo subjiciuntur, & distillationibus veluti per periodos affecti, sæpius de cephalæa conqueruntur, hydroticis medicamentis occurrere satagunt, & antequam serosi humores in prædictas partes irruant, aliò avertere, & foras extubare: Quare provocantur expunctiones, nares ad sternutamenta irritantur, tortiterque emunguntur; vomitus, si præcipue ventriculus consentiat, concitatur, & alia peraguntur, quæ si humorem non omnino tollunt, magna saltem ex parte minuunt. Ad hanc rem exhiberi solent cum fructu sequentes pilulæ pluries iteratæ; quæ ex his constant: Resinæ, vel extracti jalapæ gr. 15. Ceruss. antim. & crystall. tart. singulorum gr. 12. pilul. de succino 3 j. cum oleo macis, vel simili redig. in formam pilul. & manè assum. superdorm.

Pro corporibus humidiori constitutione præditis magnopere commendant pilulas Ruh, & aloëticas, aromaticum rosatum: diarthodon, elixir proprietatis simplici infusione paratum. Invaluit nunc etiam usus decocti Coffeæ, & quidem cum juvamento eorum, qui languore stomachi, & cerebri tenentur. Cæterum ratio victus attenuans semper confert, vitatis iis quæ tum intrinsecus, tum extrinsecus humefacere valent.

Quod si dolor capitis symptoma sit scorbuticæ, vel hypochondriacæ affectionis, tunc conducibilia erunt antiscorbutica medicamenta, & ex chalybe parata, de quibus alibi. Ab infarctu vero vitiosorum succorum in Pancreate, Mesenterio, Ventriculo, aliisque adjacentibus partibus, conferent leviter purgantia, & simul corrigentia, ex Aloë, & Rhabarbaro composita, pilulæ tartareæ, Tartarum vitriolatum; quinimo Hartmannus commendat infusum croci metallorum sæpius exhibendum in aqua betonica, aut menthæ. Insuper sal absinthii, & centaurei: electuarium, extractum, & spiritus baccarum Juniperi: pulvis stomachicus & cachecticus Quercetani, elixir proprietatis Helmontii, spiritus cochleariæ. Quæ pariter proderunt in cephalæa ab utero dependente, ac præterea tinctura succini, essentia croci, extractum castorei, & granorum actes, facula bryoniæ, & alia plura suo loco latius dicenda. Si denique à venerea contagione ducat originem, antiveneris curanda erit, de quibus alibi.

Cæterum à Vermibus, Calculis, aliisque in cerebro genitis, sicut raro accidit, ita rareriter medicabilis. Testatur tamen Forestus plerisque cephalalgia à vermibus sanatos decocto raphani infrusta concili in vino Cretico. Et denertus in hanc rem laudat suffitum ex centaury minore, marrubio, absinthio, betonica, antimonio, succino: atque cerotum loco dolenti applicatum ex aloë, pulvere lumbricorum, sellectaurino, & oleo absinthii cum cera, ut apud eundem legere est. At verò à mala suturarum, & meningum conformatione, nullam curationem admittet.

Quæ hæcenus proposita sunt causas cephalalgicæ potissimum respiciunt. Jam nonnulla specialiora recensamus, quæ experimentis probata



bata sunt dolorem quemcumque sedare, vel saltem capite dolentibus succurrere. Et quidem dolorem leniunt omnia narcotica, præsertim, verò laudanum opiatum, seu Nephenthes; Quercetani dictum, pilula de cynoglossa, & de styrace, requies magna Nicolai, Philonium utrumque, theriaca recens, & similia intrinsecis assumpta. Extrinsecus vero adhibita unguenta, & decocta ex mandragora, hyocyano, solano, papavere, lactuca, nymphaea, quibus caput, & tempora, vel etiam planta pedum abluuntur, liniunturque, ut præsertim fieri solet unguento populeo, & tomulero Schroderi in sua *Pharmacopœa*.

Speciatim quoque referuntur cephalalgiam tollere verbera viridis collo suspensa, quousque exaruerit, ex Foresto, vel etiam contusa & capiti imposita ex Hartmanno, qui eandem opem præstare, ait, radice plantaginis similiter collo suspensam, & aquam verberæ destillatam, ac sæpius epotam ad uncias iv. cum gutt. iv. spiritus vitrioli. Facet Bartheolinus liquorem ex radicibus nucis juglandis primo vere per incisionem elicatum, & epotum esse singulare experimentum nuper in Anglia detectum; sicut etiam in doloribus articulariis mirabiliter prodesse alii testantur. Describit Forestus unguentum Alabastrinum, quod solum in doli differt ab illo Hartmanni in *Practica chym.* hoc eod. cap. ) illudque mirabile prædicat, in omnibus doloribus capitis, præcipuè à contusione. Nonnullis sunt in usu folia hederæ teneriora fronti, & temporibus appositæ. Nicolaus Chesnau extollit Ranunculi folia virentia, quæ ad miraculum capitis dolorem sugere ait, si in modum emplastri dolenti parti applicentur. Fernelius componit pilulas quoddam ex aloë, speciebus electuarii de gemmis, tribus santalis, & rolis puniceis cum syr. ablinthii, & violarum. Paracelsus succum cancrorum fluvialium expressum temporibus applicat, præsertim in febribus malignis. Et Rulandus cancrum vivos cum aceto rosaceo in mortario punit, & pro epithemate adhibet. Hartmannus verò aceto ros. primum irrigat, deinde contundit, atque malagmatis loco dolenti parti admovent. Referuntur ab eodem Hartmanno plura alia medicamenta, tam interna, quam externa, & sive dolor à causis calefacientibus, sive refrigerantibus credatur inductus, quæ apud ipsum legi poterunt, *Lucas Tozzi Medic. Practicæ lib. i.*

Dolor capitis dicitur vel *Cephalalgia* & *Cephalæa*, cum totum caput; vel *Hemicrania*, cum dimidiam tantum capitis partem occupat.

Uterque dolor est vel *sympathicus*, ab aliarum partium affectibus dependens; vel *idiopathicus*, cum caput ipsum primariò afficitur.

Medico diligentissimè perpendendum est an caput ab affectu proprio doleat an per consensum, in his enim curationis cardo maximè vertitur. Frustrà enim caput medicinâ vel Chirurgiâ curabis, si morbi fomes in ventriculo (v.g.) lateat.

Varie sunt doloris capitis idiopathici causæ, quæ singulæ diversam opem postulant.

Aliquando dolor capitis gravissimus siphylidæ laborantes cruciat, qui remediis nullis

nisi antisiphyliticis cedit. (N. B.) Cùm cephalæa irritis omnibus vulgaribus medicamentis argum lancinare usque persisterit, aliquid venerei eidem inesse suspiceretur Medicus.) Si quis dolorem hunc ideo sympathicum nuncupandum esse censeat quia a generali affectu dependeat; sciat ne partes tantum particulares respicere cum quibus consentiat caput in ejusdem doloribus distinguendis.

Interdum *Mercurius* inter cranii laminas colligitur, vel a succis mercurialibus vel ab unguentis ad pruriginem movendum adhibitis, vel ab hydrargyri præparatis intra sumptis: Undecunque Mercurius sanguini immisceatur, si sufficienti & tempestivâ purgatione à corpore non eliminetur, quandoque ut dixi, inter tabulas deponitur, unde dolores crudelissimi, qui raro sine trypano perfectè curantur. Innò vix sine hoc evacuantur vitiosi & corrosivi humores, qui in diploë aliquando sedem capiunt, & diuturnæ cephalææ aurores sunt.

Hicæ causis omissis, ad alias transeamus, quæ in genere, vel calide vel frigide sunt.

In causa calida vel seceur vena frontis vel hiruines applicentur arteriis temporalibus, vel hic fiat etiam *arteriotomia*. Sin æger sit plethoricus, primò extrahatur sanguis e brachio; postea autem ex locis prædictis.

Ante omnia *alvi æstus* cavenda est, eandem (si torpidior sit) vel clysteribus emollientibus & refrigerantibus, vel lenitivis per os exhibitis movendo.

Victus sit refrigerans & humectans. Jusculum sequens optime convenit. Farciatur pullus galinæ hordeo mundato, uvis corinthiacis, capparibus à sale liberatis, mox confusus elixetur cum trullulo carnis vitulinæ & add. cum tempus fuerit, agrimon. pimpinell. borrag. bugloss. acetosell. sylvestr. cichor. an. m. j. post sufficientem coctionem f. colatura, in qua dissolve cremoris tartar. 3 j. infusionis 3 iij. sem. in aq. endiv. fact. per horas 24. cum 3 j. caryophyllor. sum. lb. ss. vel lb. j. mane. Viter salsa, acra, piperata, vaporosa, legumina; vinum generosum, omnesque spirituosos liquores.

Vigiliæ & somnus ne modum excedant sineque horis convenientibus: ne dormiat paulò post cibum, quia somnus iste gravat caput. *Animi pathemata* violentiora fugiat, iram, moerorem, amorem &c.

Capitis perspiratio libera procuranda, capillos detondendo.

Arteriis temporalibus inducatur unguentum de bolo, vel *anacollemæ* ex bolo, spodio, succino, mastiche, sanguine draconis exceptis oleo rosar. nenuphari, & aceto rosar. vel unguento popul. cum paucis aceto.

In cephalæa toto capiti, in hemicrania parti dolenti applicetur cataplasma seq.

℞. Betonic. virid. m. ij. flor. herb. paralyf. m. j. flor. papav. errat. p. ij. flor. Keyri m. ss. rosar. rubr. p. iij. sem. coriandr. 3 iij. nuc. moschat. 3 ij. simul contendantur humectando cum oxycrati tantillo; f. cataplasma applicand. velperi.

Vesicatorium nuchæ applicatum sæpè insigniter prodest.

Si cephalalgia à causa frigida pendeat, remediis



mediis calidioribus externis & internis, fortioribusque purgantibus ei occurrendum est.

Purgetur æger pil. seq.

℞. Mail. pilular. coch. minor. 3ß. calomel. 3j. ol. rorismar. gutt. ij. m. f. dons. Exhibe manè horis tribus ante iusculum cum debita custodia. Repetantur bis aut ter, interposito uno vel altero die. Vel si per epicrasin purgare malueris, *cerevisia medicata* sequentis ope voti composesis.

℞. Rasur. lign. sanct. interioris ingerrimi 3xii. casparill. lb iß. lign. sassaf. 3iv. rad. pæon. Ireos florent. ana 3ij. fol. veronicæ utriusque, fanicul. brunell. luc. an. m. ij. chamæpit. m. iv. flor. primul. veris siccator. m. v. baccharum juniper. 3iv. fol. fenn. mundat. 3vj. turbit. hermodact. an. 3ij. mechoacani. rad. helleb. nigr. cum aceto præp. an. 3ij. nuc. moschat. per frusta sect. num. vi. Cerevisiæ non lupulatae galon. vj. Post fermentationem bibat quotidie bis cyathum, *viz.* manè jejunos, & hora quinta p. m.

Vel ℞. Aloës in succ. depurat. caulium & betonic. liquat & coagulat. 3j. pulver. majoran. 3ij. mastich. 3iv. cum succo caulium f. massa, de qua cap. 3j. alternis diebus hor. 2. à cœna levi. Vel sum. eandem dosim pil. macri quæ eadem ferè cum his sunt.

Ex cerevisiæ medicatæ ingredientibus, exceptis purgantibus, præparari etiam potest *potus ordinarius*. *Victus* autem sit moderatè calefaciens & siccans.

Diebus à purgatione vacuis sumat instar majoris avellanæ. Opiatæ seq. manè & vespere.

℞. Conserv. flor. calendul. 3j. conserv. fl. anthos, betonic. ana 3iß. confect. alkerm. & de hyacinth. an. 3vj. rasur. cranii humani non sepulti, vini quercini an. 3ij. succin. alb. præparat. 3ijß. cinam. interioris 3ij. ligni aloës, macis ana 3iv. m. f. & cum syrup. de itæcade sive pæon. compos. f. electuar. instar opiatæ.

Vel ℞. Confect. alkerm. & de hyacinth. an. 3ß. rasur. cranii human. 3ij. rasur. corn. C. primarii 3iß. lapid. bezahar, 3ß. succin. alb. præp. 3iv. rosar. rubr. subtilissime trit. 3iß. cinam. interioris 3ij. sacchar. albissim 3x. m. f. Excipiantur mucagine gummi tragacanth. extract. extract. in aq. cinam. f. tabellæ ponderis 3ij. ad eundem usum.

Quo ad remedia *externa*, fricetur caput rasum diu multumque singulis matutinis, *sacculis* in cap. de frigid. cerebri Intemperie descriptis, vel capillis inspergatur *pulvis* ibidem laudatus, ac *sumus* ibi præscriptus hauriatur.

*Masticatoriis* ad educendam pituitam è cerebro utatur, *viz.*

℞. Rad. malv. sicc. quantum volueris: habeatur aqua vitæ optimè rectificat. in qua macerat. fuerint v. g. pro 3ßß. pyrethri 3ij. zinziber. 3ij. caryophyll. 3iß. sumatur aliquantulum de hac aqua, & in ea macer. per horam unam ante usum frustulum radice malvæ prædict. volutetur in ore, & subinde madescat iterum in dicto liquore, sitque usus singulis matutinis sedulo expuendo quod dissolvetur.

Vel ℞. Pulv. pyrethr. & staphisagr. an. 3ij. piper. long. 3j. zinzib. cubeb. an. 3ß. mastich. 3ß. f. omnium pulvis subtil. excipiendo. f. q. ceræ virgin. liquat. & formentur globuli ad eundem usum: aut

syndone exceptus pulvis crassiusculus redigatur in globulos.

Post evacuationes generales utatur *Errhinis* ex succ. majoran. betæ, anagall. vin. alb. in quibus infunde pulvis tabaci, Iris Florent. æs utum &c. Vel.

℞. Rad. helleb. alb. 3ij. tabaci 3j. euphorbii 3ß. flor. benzoin. 3ij. m. f. pulvis naribus insufflatus ex calamo. Post moram sternutationem abluantur nares vino albo.

Foveatur caput manè *form* sequenti spongiis mollioribus in eadem calefacta tinctis & expressis.

℞. Rasur. lign. sanct. 3iv. rad. cyper. pron. enul. Ireos Florent. aristoloch. rotund. an. 3ij. fol. saliv. laur. majoran. betonic. Veronic. mar. an. m. ij. flor. chamæmel. melilot. summit. absynth. an. p. iv. rosar. rubr. p. vi. bacchar. laur. & juniper. an. 3ijß. sem. anis. fœnicul. coriandr. an. 3j. nigell. Rom. 3x. f. omnium decoct. in aq. fontan. addendo sub finem dimid. partem vini Hispan. Vel æger ingreditur thermas & f. capitis embrocatio.

Cephalalgia: causam dissipabunt sacculi cinere sarmentorum & pulvere salv. majoran. betonic. &c. faret. vini spiritu irrorati & dolenti parti appositi. Inunctio item ex balsamis majoranæ, caryophylla. succini circa suturas.

℞. Cortic. pomor. curlipendul. & cydonior. an. 3j. cortic. citr. & aurant. an. 3iß. lign. Rhodii santal. citr. rasur. rad. juniper. an. 3vj. flor. rosar. rubr. lavendul. an. 3ß. styrac. calanit. benzoin. an. 3x. caryophyll. cinam. an. 3ij. aq. rosar. & naphæ an. 3ß. aq. ocymi 3ß. aceti ros. 3ij. (ambra 3ij. mosch. 3j.) m. f. pro *sumo* excitando ex instrument. idoneo Castoletta dicto.

Adhiberi etiam possunt *vesicatoria*, *cucurbitula*, *seta*, *fontanella* in locis aptis.

Hæc de dolore capitis idiopathico: Quod ad sympathicum attinet, diligenter inquirendum est cujus partis consensu pœnas luat caput, & parti primario affectæ curatio maximè dirigenda est v. g.

Si ex *ventriculi* affectu frigidus doleat caput: post clysterem injectum & rejectum, die sequenti detur vomitorium seq.

℞. Vitriol. alb. 3j. dissolve in 3iv. vel vi. ptisan. vulgaris: capiat manè & post singulos conatus bibat hauritum posset; parati cum flor. chamæmeli. N. B. Vitriolum inter omnia vomitoria stomachum optimè evacuat, & post evacuationem corroborat. Vel si æger ad vomendum minus pronus sit, fortioribus emeticis utatur. Post vomitum (vel aliàs à statibus) si adsit stomachi dolor, f. fotus ex corroborantibus, *viz.* decocto absynth. menth. rosar. rubr. flor. chamæmel. summit. aneth. semin. anis. fœnicul. cortic. aurant. & citri. lign. Rhodii, macis & caryophyll. in æqua parte vini albi generos. & aq. parato: vel si singultus aut motus convulsivus oriantur, detur theriaca, diascordium, &c.

Propinetur aliquando manè vel initio passus vinum absynthites. Horâ dimidiâ post singulos passus sum. cochl. j. pulveris hujus digestivi.

℞. Sem. anis. & fœnicul. dulc. an. 3vi. sem. coriandr. præp. 3ij. corall. rubr. margar. præp. ana 3iß. cinam. interior. 3ij. ossis de corde Cervi 3j. ambr. grif. 3ß. sacchar. albiss. quadruplum pondus omnium m. f. f. pulvis ut alkool ad usum.

Summatim, sumantur quæ ventriculum siccant & calefaciant, pituitosos & viscidos humores.



miores attenuent, & exterminent: contrariaque vel remedia vel diata videntur.

N. B. Hemicrania per consensum ventriculi omnis, usu spiritus vitrioli vel in iusculis vel cum syr. curatur.

Si ab Uteri affectu Cephalæa oriatur, v. g. à mensibus suppressis, curationem menagogis aggreduatur Medicus; si à passione hysterica &c. Ut in pauca conferam: Quæcunque pars sit mali hujusmodi, eandem medicamenta potissimum respiciant.

Episcopus Cestrænsis longò & rebelli capitis dolore vexatus, à quodam qui diutissime eodem affectu conflictatus fuerat irritis omnibus aliis præsidis, sequens accepit remedium, à quo ipse convaluit, & deinceps plurimos alios curavit. *Linum imbuium aquâ frigidissimâ* toti calvaria, applicetur aliquoties renovando applicationem; postea caput optimè siccetur. Gredo oportere caute eouti, metu nimis refrigerationis cerebri, à qua Coma, Letargus, Paralysis, Apoplexia impendere possunt. Capiti (inquit Celsus lib. 1. cap. 4.) nihil æque prodest atque aqua frigida: itaque is cui hoc infirmum est, per ætatem id bene largo canali quotidie debet aliquandiu subijcere.

*Hedera Serpentis* supra terram virentis suffitu importuno D. Ashovort bis in die administrato remedio, curavit intra 9. vel 10. dies Equitem Ser. Fralsveinnian ex dolore capitis posteriorem partem obsidente jam ab annis quinque. Idem successit Doctori Bate in nonnullis aliis. Fumus autem iste, debet excipi hiante ore, per nares saltem attrahendo spiritum, herba in prunas injectâ, quæ videtur habere aliquid resinosi. Tegumentis undique injectis ad tumum continendum totum caput velandum est.

Filia D. Relinger Genevæ magnis capitis doloribus obnoxia utebatur felicissime aq. seq. ad lotionem frontis & temporum tepide, cum spongia vel linceo.

℞: Flor. lilior. convall. m. j. Flor. violæ tricoloris s. herb. trinitatis (jaceæ) m. j. vini albi generosi lb. ij. Mlent in infusione per horas 24. in vase vitreo, mox s. distillatio in balneo. Quotannis mense Maio vigentibus istis plantis bonam aquæ quantitatem pro ipsa præparabat Pharmacopæus. Theodori de Mayerne *Præcos Medic. lib. 11.*

### Consultationes.

#### De Doloris capitis, palpitatione, & dolore ventris. Pro Nobili Matrona.

Dum attentius expendo morbosas affectiones Illustrissimæ Matronæ, ab Illustrissimo D. Christoforo ejus marito mihi relatas, in eam sententiam necessario concedendum cenico dolorem illum capitis sæpe recurrentem in sinapite, palpitationem cordis, animi deliquium & dolores vagos in lateribus, lumbis, & ventre non raro supervenientes: esse symptomata prædictarum partium consentientium cum utero male affecto. Mensibus enim non

fluentibus, morbi sunt ex utero, ut inquit Hippocrat. Menses autem in nobilissima patiente si non sunt prorsus suppressi inordinate saltem, imperfecte & præter periodum fluunt: ideoque mirum non est, partes omnes circumpositas dolore affici propter uteri ligamenta, cordis palpitationem & hypothyriam fieri propter vapores tetros ex impuro illo sanguine elevatos per arterias cor petentes; prout iidem exhalantes in caput, & præsertim incipiunt multis venis repletum, ejus doloris non raro sunt causa.

Causa autem propter quam menses non libere fluunt, ut suspicor, est obstructio venarum uteri facta ab humoribus crudis, & pituitosis, in ventriculo frigido genitis, & ex erroribus in victu commissis magna copia congestis: cum præsertim acceperim, Illustrissimam Matronam habere in familiari usu lac castrum, & alia ex lacte confecta; quantum autem possit frequens lactis usus ad flatulentas & vaporosas collectiones, prodidit Hippocrat. s. Aphor. 64. *Lac dare caput dolentibus malum & hypochondria elata, & marmurantia habentibus;* non sanè aliam ob causam, nisi quia lac est vaporosum & flatulentum, & facile corruptibile. Audio dubitatum fuisse de contorsione uteri, cujus tamen nulla signa video proposita; si enim ad latus esset conversus nobilis matrona dolorem perciperet in imo tantum latere, eumque acutissimum, & continuum, non autem in variis partibus, nec rectè incedere posset; de quibus tamen affectibus non sunt querelæ.

Quid sit prædicendum difficulter assequi possum, cum mihi non innoverit naturale hujus matronæ temperamentum, corporisque habitus, & affectuum diuturnitas; hoc saltem asserendum, affectus hosce ægrè superatum iri, cum a viris doctissimis nondum fuerint debellati, variis remediis adhibitis.

Ut cumque tamen sit, necessaria proculdubio est diligentissima corporis expiatio; *Mulier enim menses decolores, nec non eodem semper modo, & tempore prodeuntes, purgationem indicant esse necessariam,* divini Hippocræ. testimonio s. aphor. 36. quæ eo dirigenda est, ut referantur obstructions uteri, calefiat ventriculus, divertantur vapores cor, & caput petentes, & cardiacis roboretur cor ipsum gravissimè affectum, præmissa uni. ersali totius providenti. His intentionibus satisfiet per remedia Chirurgica, pharmaceutica, & dietetica.

Inter Chirurgica principem locum obtinebit venæ sectio, quæ fieri debebit ex saphena, dummodo tunc non intumescant pedes; quod si tumidi essent, prout aliquando accidit, ne audio, ex quo conicere possemus habitum hunc esse cachecticum; in hoc casu vena sub poplite secari posset, aut apponenda cucurbitula internæ pari coarum cum scarificatione profunda; scarificationes namque substituit Gal. venæ sectioni in illis mulieribus, quæ carnes habent molles Lib. cu. ativo per sanguinis missionem. Quod si nobilissima patientis renuat prædictas operationes, applicentur saltem hirudines venis sedalibus, & moderata sanguinis copia inde extrahatur, nec obstat, quod hac



baccara, roremarino, salvia, & portione pul-  
pæ colocynthidis: inferiori vero ventri neci-  
po sunt frictiones & inunctiones remediis at-  
tenuantibus, emollientibus, & incidentibus.  
Quod si pedum lotionem familiarem habue-  
rit, summiopere prodesse poterit. Non ne-  
gligantur conservæ anthos, boraginis, beto-  
nica, rosarum, imò tempore frigidiore deve-  
niendum erit ad magno antidotos semel in  
hebdomada.

Quibus omnibus proportionem respondeat  
victus ratio, gæstetque aliquod cardiacum epi-  
thema, nec omittantur clysteres carminativi.  
*Idem ibidem.*

*De gravitate capitis; dolore Dentium, ac  
genu dextri: & hypochondriaca affectione.  
Pro Illustriss. & Excellentiss. Principe Cognos-  
kofski Polono.*

De quatuor affectibus conqueritur Illustriss.  
& Excellentiss. Princeps, videlicet de gravitate  
capitis, dolore dentium, incipiente hypochon-  
driaca, & de dolore genu dextri ex levi quo-  
cumque motu, à quinquennio molesto.

Capitis quidem gravitas non aliunde pro-  
venit, quam à congerie materię pituitosa in  
capite collectæ; cum per modum generatio-  
nis, ob excedentem humiditatem cerebri,  
eamque naturalem, & forsitan hereditariam,  
tum per modum attractionis à subjectis par-  
tibus, propter intemperiem calidam cum ce-  
rebri trahentis, tum jecoris suppeditantis, ad-  
juvante ventriculo frigidiore quam conveniat,  
quam ob causam non rarò diarrhœa ex crudi-  
tatibus divexari solet. Pituitosa autem mate-  
ria non solum gravitatem capitis inducit, ve-  
rum etiam aliquando dolores scapularum, &  
lumborum, dum occasione validi exercitii, &  
equitationum fluit ad prædictas partes; imò  
& faldedinem aliquam contrahens, & ad sini-  
stram mandibulam superiorem confluens cor-  
rosionem, & dolorem dentis in eadem parte  
infert, cui forsitan & abscessus aliquis jungitur,  
cum non rarò sanguis inde profluat, nec levis  
quidam fœtor observetur.

Hypochondriacæ principium adesse, vel ex  
eo facile colligi potest, quod rugitus aliquos  
quandoque percipit in ventre, & mœrore ali-  
quo, solitudinisque desiderio tenetur, huiusque  
affectus causa est obstructio quædam lienis, non  
tamen insignis, eaque genita à copia sangui-  
nis crassi, cum melancholici à jecore; tum pi-  
tuitosi à ventriculo transmissi, & multo magis  
ab inordinata victus ratione, cum Princeps  
Excellentiss. habeat in familiari usu carnes sa-  
litas, olera, aliosque cibos crassi succi, &  
quibus facili negotio sanguis sæculentus in je-  
core præcalido generatur, & à liene recipitur  
& retinetur.

Quartus & ultimus affectus est dolor à quo-  
cumque levi motu in dextro genu subortus.  
Affectus hic ante quinquennium ortum duxit  
à luxatione ipsius genu, nescio an imperfe-  
cta, vel perfecta, eaque contracta ex violento  
motu; hinc pars illa imbecillior est reddita, li-  
gamentaque laxata, ac propterea patella mobi-  
lior redditæ quam conveniat: unde fit quod ex  
levi quocumque motu contorquetur genu, jugi-

terque fluit materia à capite ad prædictam par-  
tem; ac propterea intumescere conspicitur,  
exacerbatur dolor statim infra patellam.

Hæ igitur sunt affectiones Illustriss. & Ex-  
cellentiss. Principem divexantes, hæque ipsa-  
rum causæ, quæ licet in præsentia leviores  
videantur, quam ut curatione indigeant, ni-  
hilominus tamen facili suboriri possunt do-  
lores articulares ex hæreditaria dispositione,  
hypochondriacæ incrementum, ex sui natura  
valde molestæ, necnon & incessus impedimen-  
tum: prout etiam in mandibula ab ulcere si-  
luloso metus est, si præsentis affectus insuper  
habeantur.

Pro quorum curatione evacuandum est to-  
tum corpus, & caput, divertendaque fluxio à  
dentibus, & à genu: resolvenda est materia in  
ipsum conflua, dentis caries sistenda, tollendæ  
sunt obstructions lienis, caput exsiccandum, &  
omnes partes affectæ corroborandæ: hæcque  
præstanda sunt verno tempore, tanquam magis  
opportuno, remediis Chirurgicis, Pharmaceuti-  
cis, & congrua victus ratione.

Inter Chirurgica pro universali totius eva-  
cuatione, sanguis educendus erit ex jecoraria  
dextri brachii ad unc. 7. circiter; & pro diver-  
sione catarrhi, fonticulus sinistro brachio inu-  
rendus erit, cujus rædium si renuerit Illustr. &  
Excellent. Dominus, ipsius loco familiariter uti  
debebit pilulis mastichinis bis in hebdomada:  
non omittis capitis pectinationibus, & ejusdem  
frictionibus cum pannis asperis, sæpius repeti-  
tis; abstinendo à frictionibus partium cum su-  
periorum, tum inferiorum, ob imminens pericu-  
lum dolorum articularium; & hæc usque ad æta-  
tem consistentem sunt administranda, quo sal-  
tem tempore fonticulus non erit omittendus.

Universalis interim præparatio, & purgatio  
iis perficienda erit, quæ quoslibet humores  
excrementitios spectant, & præsertim pituitam,  
& melancholiam prædominantes; idque præstan-  
dum simplici, & composita eorundem præpara-  
tione & purgatione, deveniendo ad extractum  
hellebori nigri, & usum pilularum de hermoda-  
ctylis. Caput deinde purgandum per nares, ob  
dentium affectum, non omisso quinetiam modico  
tabaco pulverizato per nares attracto. Hisq;  
peractis, accommodatissimum erit decoctum  
paratum ex radice Chinæ, ligno visci quercini, &  
ligno indico raspatum, cum gallo juniore optime  
flagellato, additis herbis aperientibus betonica,  
& iva arthetica, exhibitum trigintadies circiter,  
singulis diebus ad unc. 8. maturinis horis, instil-  
latis sex vel septem guttulis spiritus vitrioli sin-  
gulis vicibus prædicto decocto, præmissoque bolo  
ex terebinthina laricina, lota aqua betonica, &  
redacta in boliformam cum pulvere ossium cre-  
matorum, & iva arthetica. Dumque hæc sunt  
internis remediis, localia quinetiam partibus  
affectis sunt præscribenda, lotiones scilicet capi-  
tis lixivio parato ex residuo prædicti decocti, cum  
sale, & cinere necus; pulvresque capitales non  
calefacientes modo inspergendi capillis, qui pa-  
ram poterunt ex ossibus crematis, ostreis usis,  
cornu cervi, rosis, & betonica. Pars dentis cor-  
rosa ferro candenti sæpius tangenda, insufflandi-  
que pulvres matrisylvæ, olivarum, & tuthiæ  
præparatæ, & replendum foramen pilula ex au-  
ro confecta. Lienem fiant inunctiones ex oleo

Q o o o

amyg



antygdalanum amarum, de capparibus; modico aceto, & cera: Ceratumque apponendum ex ammoniaco dissoluto cum aceto, addito succo herbarum reginarum. Pro genu corroboratione in vino rubro generoso decoquenda sunt rosmarinus, salvia, stæchas, iva arthetica, & calendula, addito modico aceto, & sale, & in eo calido spongiæ magnæ madefiant, atque fortius expressæ circumligentur genu, saltem nocturnis horis, quominus sint molestæ. Nec solum hæc peragenda, sed tempore decocti sudor provocandus semel in die in hypocausto, habita ratione naturalis gracilitatis corporis.

Victus sit boni succi, & ad siccum vergens; omittat carnes bubulas, fuillas salitas, & non salitas, avium palustrium, legumina, lacticia, acetaria, nimis aromatica, & fructus omnes, bibendo cerevisiam, atque etiam vinum tenue, album in mediocri quantitate. Cibus, potus, somnus, venus omnia moderata. *Idem ibidem.*

*De dolore Capitis in supercilio dextro,  
Pro Nobili patiente.*

Dolor ille capitis acutissimus, quem per intervalla patitur Nobilis patiens in supercilio dextro, aliquot jam dies divexans, quique aliis remediis non cedit, sola excepta sanguinis missione ex jecoraria dextri brachii, provenit, ut cenleo, & ex sanatione colligi facile potest, à sanguine bilioso per jugularem externam ad prædictam partem contuxo. Talem enim sanguinem abundare conjicitur ex ætate, & temperamento: jugularis enim externa ab axillari originem trahens, per cervicis latera inter cutem, & membranam carnosam excurrens, ubi fauces attingit, in duas dirimitur partes, quarum altera subcutanea in labrum utrumque, pinas narium, frontem, & majorem oculi angulum ramos diffundit, per quos sanguinem illum vitiosum ad oculum, tanquam partem imbecilliorē transfundere potest; ex quo fit, quod sanguine per venam sectam educto, cessat affectus, quem nullis aliis remediis Chirurgicis, aut Pharmaceuticis debellari potuerunt viri præclarissimi; imò neque canterio dextro brachio inulto. Huic affectui accedit & hernia in dextro testiculo suborta, cujusnam autem speciei sit ambigō, cum ipsam non viderim, propterea quoad ipsius curationem virorum præclarissimorum iudicio meum subicio, & de prædicto dolore supercilii acturus, existimo ipsum à jecoris fervore provenire.

Ac propterea pro ipsius extirpatione tria præstanda esse cenleo. Primò enim divertenda erit materia fluens; deinde jecur refrigerandum, & demum curandum erit ut adstringatur furculus illius venæ ad oculum perseptantis.

Pro diversione placet sanguinis educatio ex saphena pedis dextri, ter aut quater in annò, frequensque crurum lotio cum lixivio dulci. Ad compescendum jecoris fervorem probatur aqua Noceriana, vel succus cichorii depuratus in jussculo parvæ pullæ per plures dies assumptus; & pro constrictione, linimentum paratum ex succo mori, omphacii, bolo armena, & gypso, sæpius repetitum.

Horum enim beneficio spero fore, ut junctâ congrua victus ratione, abstinendo ab aromaticis, & vinis generosis, siquæ alvus lubrica ser-

vetur, à prædicto dolore liberetur. Faxit D. G. M. ut ex voto contingat. *Idem ibidem.*

*De dolore oculo annorum in dextro supercilio.  
Pro Adm. Rev. Patre Capucino.*

Antiquus ille dolor, quem octo abhinc annis patitur Adm. Rev. Patiens in dextro supercilio, propagatus ad futuram coronalem, mox & ad musculum temporalem, ex compressionē partis affectæ valde molestus, vocari potest cephalæa, ratione durationis; ratione verò situs partis dextræ dolentis, hemicrania, seu potius clavus dicendus est, terebrationem referens dum ex compressionē invalescit.

Originem autem habuit à causis externis, ære scilicet frigido, & humido, cui se exposuit P. Adm. Rev. dum moram duxit Manerbi, incrementumque suscepit ab iisdem causis externis, dum ante triennium Roma rediens, à radiis solaribus insigne nocumentum passus fuit. Atqui solæ hæc causæ externæ non sunt aptæ tam diuturnum, & refractarium affectum fovere; propterea me iudice conservatur ab heterogenea materia in parte affecta contenta, à prædominio crassa cum pituitosa, sed salsa, & aeris, & loci inclementia congesta; tum melancholica exiusta, à vociferationibus dum concionaretur, & ex insolatu in itinere, ad partem affectam imbecilliorē redditam confluxa; quam in hoc corpore redundare testantur hæmorroides valde molestæ: imò fovere etiam potest ab inæquali intemperie partis affectæ: humoresque prædicti sunt quidem in partibus subcutaneis, ac propterea ad compressionem dolor incrementum suscipit, non tamen in spatiis inanibus, sed potius in arteriis ibi disseminatis; hincque fit quod dolor sit in supercilio, ubi pulsant arteriæ, diffundaturque ad futuram coronalem, & ad musculum temporalem, in quibus itidem partibus eadem evidentissime micant. Quod si multiplicatio impeditur, hoc fit tracto in consensum musculo masseteri dicto: hancque forte ob causam exacerbatur dolor ad compressionem, impedita scilicet libera pulsatione; sicuti etiam ex sanguinis missione juvamentum suscepit, facta revulsione, ventilatione, & evacuatione sanguinis melancholici; non tamen liber evasit; quoniam adhuc hæret in parte affecta materia morbifica; persistitque inæqualis intemperies ab heterogenea materia inducta.

Ex his compertissimum redditur præsentem affectum summa cum difficultate, nec nisi generosioribus remediis extirpatum iri.

Quod ut fiat, divertenda est fluxio, evacuanda materia fluxa, & intemperies à prædominio frigida moderatè calidis corrigenda. Materiarum remedium variaz fuerunt hæcenus ritè & rectè præscriptæ, non tamen desunt præscribendæ.

Inter Chirurgicas placet repetita sanguinis detractio primò ex saphena pedis dextri, ut faciebat Galen. secundo ad Glauco. ubi in inflammatione oculorum secabat venas pedum, pro majore revulsione. Quod libentius faciendum est, si in venis sedalibus perseverat aliquis dolor. Facta hæc evacuatione, præscriptisque frictionibus, & lotionibus infernarum partium, secunda est venia frontis: non tamen sanguis in multa copia detrahendus, ne cerebrum refrigeretur magis quam conveniat; mox applicentur



hirudines musculo temporali partis affectæ; imò deveniendum censeo, ad arteriotomiam, quando prædictis remediis non cederet affectus, quæ tamen operatio ab experto Chirurgo tentanda est; quo solo remedio sanavit Ambrosius Paræus nobilem Gallum hemicrania quasi deplorata detentum, ut retulit in lib. 16. suæ magnæ Chirurgiæ cap. 4.

Non omittantur deinde localia digerentia materiam morbosam. In quem usum prodesse poterit succus cardui sancti, cum oleo rosato, in quo ebullierint millepedes sub hydnis delitescens, addito modico aceto: non omittis interim tum universalibus purgationibus, etiam validioribus, videlicet extracto hellebori nigri, & colocynthidis, præmissa humorum præparatione, necnon & peculiaribus caput purgans per os, & per nares; ac tandem parato emillario in sinistro brachio, & in dextro femore. His enim, & similibus remediis à Viris Doctissimis præscribendis, spero fore ut Pater Adm. Rev. ab adeo gravi affectu liberetur. Quod ipsi à præpotente Deo emixe precor. *Idem ibidem.*

*De Hemicrania. Pro Eminentiss. Cardinali Fachinello.*

Eminentiss. Cardinalis ab aliquot annis conqueritur de dolore capitis in dextro latere, Hemicrania dicto, mox frequenter, modo per longiora intervalla recurrente, graviusque instanti circa tempus dextrum, & retro aurem dextram diem, & plus eo, tanta molestia, ut quascunque consuetas operationes impediat; quod si levior sit, ruborem, & calorem excitat in naribus, & in aure dextra.

Ex his facile est colligere, partem affectam in hoc morbo esse caput ipsum, non quidem essentialiter, quia non permanet, neque est continuus, sed per consensum, consensumque hunc fieri à jecore fervido vapores calidos ad caput transmittente, quos facile recipit propter imbecillitatem contractam ex continuis, usque gravissimis negotiis, quibus diu incubuit, & in variis regionibus, ac proinde fieri facile potuit, ut cum in jecore fervido generetur copia sanguinis biliosi, una cum portione melancholici, cumque alius naturaliter sit adstricta, quod inquam, non levis, vaporum acrimia copia per venas, & arterias externas exhalet in dextram partem capitis, servata rectitudine cum parte affecta, atque ita exciterur dolor hemieranicus.

Affectus curatu difficillimus, cum ob durationem ipsius, tum ob innatum jecoris fervorem ex habitu corporis, venarumque latitudine manifestum, summa qui cum difficultate contemperari potest; cum præsertim refrigerantia perquam necessaria ventriculo frigido, & humido noxam aliquam sint allatura. Non ob id tamen est prorsus incurabilis; est enim de genere illorum affectuum, de quibus locutus Hippocrates quinto in 6. epid. 5. dixit: morbos commutatos in senectâ delinere per concoctionem, solutionem, & rarefactionem; ideoque temporis progressu remittente jecoris fervore, cessare facile poterit, quod quidem Eminentiss. Princeps experitur referens, se nunc minus conflictari quam annis elapsis.

Ideo pro curatione validioribus omnibus medicamentis missis, leviora tantum in præ-

sentia sunt præscribenda, quæ facilitatem habeant revellendi, repellendi, intercipientique vapores caput petentes, necnon & divertendi, ac evacuandi humores, à quibus elevantur, jecorisque fervorem contemperandi, desumpta ex Chirurgia, Pharmacia, & Dieta.

Inter Chirurgicæ tria valde accommodata cum levi molestia esse poterunt. Primum erit balneum, aquæ dulcis calidæ pedibus, & cruribus administratum, cum frictione infernarum partium, appositis tunc temporis adstringentibus externis venis temporum, retro aures, & venis jugularibus, lintecolis scilicet madefactis in aceto granatorum, mori immaturi, agreitæ, vel hypocistide una cum albumine ovi, eidem parti dextræ tunc temporis appositis, quando observatur præludium doloris imminens. Idque fiat mane & vespere, detentis pedibus in aqua calida jam proposita. Secundum remedium erit apertio venarum sedalium semel in mense repetita prope plenilunium, vel eo tempore quo magis afficitur, quale forsitan est tempus prædictum: quo assuehat natura huic evacuationi, cujus beneficio non solum præservabitur Eminentissimus ab hemicrania, sed etiam ab aliis gravioribus malis. Tertium remedium erit Arteriotomia, sectio scilicet arteriæ temporalis, tunc præsertim tentanda, quando dolor est pulsatilis, ex quo suspicio subesse possit vapores caput petere per arterias ipsas: cujus remedii rectum usum proponit Ambrosius Paræus lib. 15. suæ magnæ Chirurgiæ cap. 4. Prodesse quinetiam poterit multio toniculi dextro interno femori, pro continua & majori revulsionem.

Pharmaceutica sint evacuantia sine molestia humorum agitatione, & jecoris fervorem contemperantia. In hunc usum familiare medicamentum sit unc. sem. fl. cass. recens extractæ, cum drach. sem. pil. ex Aloe lota cum succo rosarum, semel in hebdomada sumptum. Blandè namque purgabit, & hæmorrhoides forsitan referabit. Ad jecoris fervorem contemperandum proderit aqua Villensis in agro Lucensi, aqua Ficocellæ in agro Senensi, vel nostra Patavina B. Virginis Montis Ortonis: nec minus proderit aqua Noceriana; quarum aquarum loco ex usu esset serum lactis caprini, nisi evaporaret in caput, sumiq; debebunt cum seminibus melonum, & syr. capil. veneris, quoad urina vias permeent: præmissa tamen blanda corporis exilatione, ne crudi humores comportentur in venas, sumanturque prima vice ad libras quinque, & singulis diebus addatur libra usq; ad duodecim: postea singulis diebus subtrahatur libra usq; ad primam quantitatem; & si liberè non permeant, permisceatur aliquando manna el. Quod si vel Eminentiss. Cardinalis respueret ipsarum potum, vel tempus non erit congruum, vel liberè permeare non poterunt, in hoc casu denuò uti poterit jusculo alterato cichorio, præmissa in eo inaccertatione comæ absinthii Romani, vel umbeliferi, ratione ventriculi, & cum ipso sumat unciam semis sacchari rosati ex rosis Persicis, pergatq; in usu ipsius viginti & plures dies applicato jecori epithemate ex succ. cich. depurato cum paucis aceto.

Victus ratione recte instituta cum cibis facilis digestionis, abstinendo ab aromatibus, à cibis vaporosis, selino scil. hipposelino, vinis generosis, & continuis negotiis, præsertim post



cibum, semperque ultima mensa sumendo quidpiam adstringens, nempe diacydonite sine aromatis, gelu cydoniorum, pyra, sorba, grata, vel quid simile. *Idem ibidem.*

*De Dolor Capitis, imbecillitate Ventriculi, & Pustulis. Pro Nobilissima Virgine.*

Ex illis quæ à Viro Præclarissimo relata legimus, compertissimum redditur, Illustrissimam Virginem non raro conqueri de dolore capitis, ventriculi imbecillitate, & de pustulis Autumno præterito circa tibias subortis, pruriginosis, ex levi confricatione in dolorosa ulcuscula desinentibus, cum ichorosa materie transfusione. Quæ omnia cum supervenerint mensium suppressioni, mense Julio elapso subortæ, summa cum ratione referri possunt in uteri vitium: cum præsertim scriptum reliquerit Hippocrates quod mensibus deficientibus, morbi fiunt ab utero; quibus non intelligit in utero ipso generari morbos, ut videtur innuere Galenus, sed morbos in aliis partibus genitos ab utero provenire; ideoque non dixit in utero, sed ab utero.

Vitium autem præcipuum in casu præsentis, me quoque iudice, est obstructio venarum uteri, facta ab ipsiusmet sanguinis crassitie, & visciditate, propter imbecilem ventriculi calorem, crudum chylum jecori suppeditantem, in quo forte calidiori crassior redditus, difficulter fluere potest. Negari sane non potest ex descripta corporis constitutione, & gracilitate, defectus aliquis ipsius sanguinis, qui tamen non tantus est, ut suppressionem efficiat, cum præteritis mensibus fluxerit, licet imminutè: minus referendam censeo causam in virginale claustrum, quod cæteris omnibus virginibus nullam mensium suppressionem infert.

Quare consultissimum censeo cum Viro doctissimo, curare ut menstrua purgationes revocentur. Ita enim spero fore, ut omnia supra enarrata symptomata recedant. Hoc autem fiet per attenuantia, incidentia, & vias referantia, præmissa universali corporis expiatione, nec omissa ventriculi corroboracione, per moderatè calefacientia. Quæ præstabuntur remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis, & Dieteticis.

Inter Chirurgica, placet aliqua levis sanguinis missio; quoniam me quoque iudice, non adest insignis sanguinis copia: aliqua tamen, alioquin ex mensium suppressione nullus affectus subortus esset: & cum sanguis sit crassus, & patiens gracilis, ex vena poplitis, si apparuerit, tanquam è loco utero viciniore; ipsa vero non apparente, ex vena tali educendum censerem, veritus ne per hirudines, seu cucurbitulas non effluat sanguis crassus peccans. Parca tamen & repetita sit evacuatio, non omissa tamen cucurbitularum non scarificatarum applicatione, inferarum partium frictione, pedumque lotionem cum lixivio alterato matricaria, artemisia, pulegio, malva, floribus chamæmeli, & modico fabina. Neque præter rem fore censeo uterum ipsum fovere vino albo calido, in quo effervuerint herbe prædictæ. De cauteriis cogitandum non censeo in hac ætate, & hac corporis gracilitate, quod video improbatum à Viro Præclarissimo.

Lenientia præparantia, & purgantia optimo

consilio præscripta à Viro Doctissimo summo pere laudo: omittis tamen uterinis medicamentis, & menses moventibus in prima humorum præparatione, qui sunt in primis viis, ne devehantur ad uterum. Post primam autem præparationem, & purgationem ea peropportuna erunt cum syr. capill. ven. byzantino, & de quinque radicibus. Sentimentum, & sensim præparandi, & purgandi sunt humores, & levioribus purgantibus, ut puta Ag. Rhabarb. & similibus, additis semper speciebus hieræ. Nec omitrendos censeo menses imminentes, trochiscos de myrrha una cum borace minerali; valde proficuo ad ciendos menses. Hisque omnibus peractis, decoctum præscriptum ex radice chinæ, cum modico cassiafras, & lentisco, summopere laudo, una cum herbis stomachicis, & uterinis temperatis, paratum in jure vel galli junioris, vel columbæ, præmixto bolo ex trochiscis de myrrha, de capparibus, & succo agrimonie concretæ, subactæ cum syr. capill. veneris.

Quibus omnibus jungatur congrua victus ratio, quæ sit ciborum boni succi, faciliq; coctionis; abstinendo à cibis glutinosis cujuscumque generis; bibendo vinum tenuis substantiæ, album, subdulce; alvum semper lubricam servando familiari usu pil. ex Aloë lota cum succo ros. parum ante cœnam sumptarum, præcipue mensibus imminentes: quo tempore proderit motus corporis, & cessatio à curis quibuslibet, omniumque maxime connubium, si fieri possit. *Idem ibidem.*

*De Capitis dolore, ulceroſa lassitudine, lapsu memoria, aurium tinnitu, aliisque symptomatibus. Pro Nobili Germano.*

Ulcerosa totius corporis lassitudo, capitisque dolor gravativus, nunc potissimum incipit infestans Nobilissimi Adolescentis, cum lapsu memoria, aurium tinnitu, insigni totius sinistræ partis corporis imbecillitate, & impedita penis erectione; imò aliquando etiam cum impedito motu capitis, vel totius corporis, præsertim à somno circa matutinas horas in aere frigidiore, cum sint affectiones diurnæ, confirmatæ, & quibuscumque medicis præsidis hactenus præscriptis refractariæ, certo certius indicant habitualementem intemperiem frigidam capitis, cum præsentia materie pituitosæ & fluxione humoris cum biliosi, tum melancholici a calido jecore geniti, & per venosum genus ad caput transmissi, quorum ratione sit ulcerosa lassitudo, dolorque aliquando magis acutus: Antiquos enim dolores frigidos esse dixit Hippocr. in Epidem. novos calidos. Præsentem autem sunt valde inveterati, cum sint duorum annorum, nec hactenus debellari potuerint: & licet æstivo tempore, & usu remedium calidiorum cedere videantur, recurrunt nihilominus, & adventante frigido ambiente magis sæviunt. Utrum verò sint Gallici, non immerito dubitari potest. Tales enim statuendos esse, vel inde colligi potest, quod gonorrhœam passus fuerit cum ardore ingenti mense Januario 1616. post æquitationem quidem longam, & comotationem vini generosissimi, non sine venereo congestu mense Octobri proximè præterito; accedit quod prædictæ gonorrhœæ curatione refrigerantibus,

non



non alexipharmacis usus fuerit : quod eadem redierit autumnō subsequenti , ac deinde ipsa sine alexipharmaco sanata , supervenerint prædicta symptomata ; quod tinniant aures , ac tandem quod nullis calorificis remediis cessent affectus prædicti. His tamen non obstantibus , existimo dolores istos non esse Gallicos : Primum , quia post multos menses à gonorrhœa supervenerunt : Secundò , quia non invadunt , vel exacerbantur circa vespertinas horas dolorum Gallicorum more : Tertiò , quia remittunt æstate , hyeme invalescunt : Quartò , quia supervenisse videntur post cohibitam copiosam capitis expurgationem per os , & nares Nobiliss. huic patienti familiarissimam : Quintò , quia detestatum locum non occupant , quod observari solet in Gallicis antiquis & confirmatis. Quod si nondum cessent tot & tanti remediis hucusque cum ratione usurpatis , hoc provenit à crassitie materiz jam genitæ , ab intemperie partium principalium continuò eam generante , & ab imbecillitate nervosæ substantiæ contracta ex iunctione aliàs facta cum hydrargyro.

Non ob id tamen desperet æger , quia tandè divina ope , & beneficio validissimorū remediōrū extirpabuntur , & perfectā sanitatē recuperabit.

Quod ut fiat , incumbendum quidem est indicationibus , & scopis à nobis alias propositis : quamquam enim remedia ex methòdo præscripta juvare non videantur , ad alia nihilominus deveniendum non est , itante eo quòd à principio visum est , divini Hippocratis sententia. Materiz tamen remediōrum longè validiores esse debent ; quoniam extremis morbis extrema remedia sunt opportuna præsertim in hac ætate juvenili ; in qua vires sunt robustissimæ , & morbus longè recedit à statu naturali.

Quare post levem humorum præparationem , validis purgantib⁹ manum admoveere debemus , cujusmodi sunt pil. de nitro Alexandri , diacolocynthidos , extractum hellebori nigri , pil. lazuli , & aliz ex alto trahentes , aliquoties præscriptæ. Caput quinetiam validioribus errhinis , & masticatoriis , ac gargarismatibus est expurgandum ex radice hellebori nigri , antimonio præparato , sabina , euphorbio , & similibus : non omisso oxymelite scyllitico , cum dec. serpylli , majoranæ , sabina , centaurii , & minima portione colocynthidis. Hæc pro diligentiori , & sensibili capitis expurgatione. Quibus peractis , ad insensibilem deveniendum , & ad generosiora topica capiti canda , & toti corpori. Quare si de internis seraplimo sit , repetendum censéo decoctum ligni Indici , salsaparillæ , & ligni visci quercini ; quod paretur cum vino albo , addito absinthio , hyssopo , semin. urticæ , apii vel menthastrò montano , quæ facultate specifica pollicere dicuntur adversus veneficam hydrargyri qualitatem , præmisso bolo ex terebinthina cypria cum myrrha , costo , vel radice cyperi , & sale theriacali. Utatur hoc decocto quadraginta dies , cum sudore semel , aut bis in die pro virium tolerantia : sitque ita generosum , ut pro singulis syrupis sumatur uncia una ligni Indici , & salsæ parillæ , cum uncia semis ligni visci quercini , & drach. ij. sassafraz , & quarta quaque die utatur drachma semis Mithridaticæ confectiois , singulis octo diebus , ad purgans validum progrediendo , imò quandoq; ad antimonium præparatum. Interim

dum hæc fient intrinsecus , etiam externis remediis curanda sunt partes affectæ. Quare pro capite placent frictiones faciz cum sale , nitro , euphorbio , nigelli , & agarico. Laudo emplastra parata ex caricis liccis , pyrethro , abrotano , sabina , cum aceto scyllitico , aqua ardenti , & farina fenugræci. Placent inunctiones cum capitis , tum universi corporis , oleo rutaceo , laurino , cum castoreo , sale , nitro , & aqua ardenti. Devenirem quinetiam ad inunctiones capitis cum caustico non dolorifico , quæ fiant tribus aut quatuor locis. Quicumque enim morbi non sanantur vi medicamentorum , vel ferri , igne sanantur , ex Hipp. Applicarem vesicantia post aures , & nisi abhorreat à fonticulo in occipite , mihi summo opere etiam arridet. Hæc sunt quidem validissima remedia , quæ rite administrata , & prudenter erunt apprimè utilia.

Victus sit boni succi , mediocris , attenuans , calefaciens , non interdicto vino , non omittà alvi lenitione cum familiaribus pilulis : quales esse possunt pilul. de tribus cum rhabbarbaro , vel de hiera cum agarico. Quod si earum usu jecur magis incallescet , quod non metuo , exhiberi posset aqua stillatitia paulò antè prandium , vel jusculum cum cichoraceis. Et hæc sunt potiora remedia , quæ ex usu futura censéo. *Idem ibidem.*

*Dolor Capitis hemi cranicus cum palpebra superioris læsione.*

Nob. Virgo Vestalis in primo senio constituta , temperamenti totius & jecoris calidi & siccī , calidi quoque capitis , à quo tamen exigua catarrhi calidi portio emanat , gracilis habitus , proceræ staturæ. Superioribus annis gravibus occupationibus implicata , nec non animi perturbationes passa , ventriculi primo molestinus , non tamen dolorificis , obnoxia fuit , quas prænunciare solebat urina multa , cruda & aquosa ; quæ deinde ventriculi affectiones recedebat , secuto vomitu materiz , modò pituitosæ , frequenter tamen biliosæ atque porraceæ , imò etiam in præsens de copiosis flatibus in hypochondriis conqueritur , ventriculum ipsum calefacientibus ac infestantibus. Quinque autem ab hinc annis conqueri cœpit de quodam dolore , non quidem acuto , sed obtuso , in parte sinistra capitis supra aures ; qui tamèn potius vagus , quam fixus ab ipsa Patiente observabatur , cum etiam usque ad futuram coronalem , imò & ad dexteram partem ejusdem capitis extenderetur ; Progressu autem gravem , atq; difficilem reddere cœpit palpebræ dexteræ elevationem , cum tremore , sive potius palpitatione ejusdem : Quandoque enim contingebant motus isti tremuli sive palpitantes , vel nullà quin etiam tentatā palpebræ elevatione , semper tamen sine dolore , & sine visus læsione ; manu autem accurrente , & ad locum affectum admotā cum aliqua frictione , tedium hoc levabatur. Difficultas hujusmodi in dies semper gravior reddita est , adeò ut oculum clausum tenere fere semper cogatur Nob. Patientis , & potissimum quando elevationem palpebræ tentare conatur ; facilius verò , imò & sæpe sine difficultate , palpebram attollit , non advertens juxta , & dum ad aliquam operationem intensius mentem convertit , difficultatis oblita : prout & in remissentia difficultas eadem recurrit. Olim verò Patientis curata fuit hujus affectionis causā ; sed



si ultra, cum morbus respuerit omnem medelam, & præsidia varia adhibita, Purgationes nimirum, & ab ipsis setaceum occipiti multum, quod plures menses nulla ope, imo potius cum affectionis augmento, gellavit. Ex pede venæsectionem, cucurbitulas, & huiusmodi alia experta est. Modò iterum ad Medicos confugit, ut si heri possit, ab hoc affectu molesto vincatur.

Rara equidem & speculatione digna est affectio, quæ quinque ab hinc annis divexatur Nob. admodum & Rever. Veltalis, eoque majori indiget acumine Medici, cum varia, multiplicia, & magna remedia, non solum in cassum huc usque administrata fuerint, quinimò potius cum ejusdem affectus incremento, adeo ut à juvantibus, & lædentibus si desumatur iudicium, non adeo idonea, & oportuna hæc fuisse, censendum sit. At quoniam morborum diuturnitatis, ac pervicacitæ causam refert Galenus ad partis affectæ conditionem, humoris peccantis renixum, & errores in vivendi ratione; idcirco, cum causa hujus affectionis mediata, sit humor pertinax, atque rebellis, nec pars affecta, mineram continens, adeo curatu facilis, ab his, propterea duabus causis, ejusdem affectionis perseverantia desumenda fuerit. Pars igitur, si non primario, & essentialiter, secundo saltem, & per consensum in præsens affecta, est caput ipsum, quod tamen aliquam labem essentialem progressu temporis contraxisse, non est negandum. Læditur autem potius secundum partem externam, quam internam: Quamvis enim primus læsionis impetus, in sinistra internâ parte inceperit, expansus tamen & ad dexteram partem itatim diffusus, extra Calvariam, nempe circa musculos, & præsertim sub palpebræ elevatore, in progressu vera causa innouit, molesta potius, quam dolens, quæ vaporis potius, quam humoris specie se prodit; tū quia non semper eadem perdurat difficultas attollendi palpebram; tum quia, manibus contrectatâ parte, scilicet omnino evanescit, itaut palpebra ipsa mox attollatur; & tandem quia palpitantes, quas frequenter patitur ipsa pars, non ab aliâ causâ, quam à materia flatuosa provenire, pro certo habendum. In dubium verò revocatur, num minera humida, à qua elevatur huiusmodi flatulenta materia, in capite, an potius, in aliqua alia parte reperiatur, vapores inde ad caput transmittens. Et quamvis non negaverim caput, tot ab hinc annis sympathice læsum, idiopathicam quoque imbecillitatem, atque læsionem aliquam necessariò acquisivisse, mineram tamen ab initio in hypochondriis extitisse, minime dubito, hancque melancholicam; cum hypochondriacam olim fuisse, & esse Nob. Patientem, facile conjici possit ex ventriculi anxietatibus ante capitis læsionem perpeffis, cedentibus à vomitu materiæ, modò pituitosæ, & crudæ, modò flavæ, modò porraceæ, à ciborum corruptione provenientis; sicut & corruptio ab hypochondriorum intenso calore, Hypochondriacorum proprio. Præterea eandem confirmant flatus copiosi, in hanc usque diem, in hypochondriis perseverantes, & molestum calorem ventriculo communicantes. Hypochondriaca autem melancholica huiusmodi affectio, sic ut antea à gravioribus occupationibus, & animi perturbacionibus inducta fuit; ita & crassas, ac fuliginosas exhalationes ad caput, inapte naturâ calidum,

& ab externis injuriis imbecille redditum, transmittendo, plura, & varia prava symptomata produxit; imaginationem cum quodammodo corruptit, ut propterea dum imaginatio, & mens ipsa ad aliquod aliud negotium convertitur, non animadvertens, palpebram attollat; non autem dum imaginationem ad elevationem applicat. Non tamen ideò censendum, à sola depravata imaginatione difficilem provenire palpebræ elevationem; cum dubio procul adsit etiam materia ipsa flatulenta, crassa & fuliginosa, ut potè melancholica, non quidem in nervis secundæ conjugationis, palpebras moventibus; sed quæ musculum pervadens, spatia replendo, in eodem liberum motum elevationis intercipit, qui motus facilius redditur post frictionem, & contrectationem, manibus factam, quæ flatulenta, & fuliginosa materia resolvitur. Hinc factum fuit, quod topica medicamenta, & calida præsertim, nullum levamen, imò potius nocumentum attulerint, sicut neque proxima derivantia, setaceum nempe, sed potius ab infernis partibus humores, & vapores magis attrahere, quam præsentis evacuare contigerit. Nec ideo mira videri debet affectionis hujus pervicacia, cum quotidie ab humoribus, & vaporibus melancholicis mirabiles, & ineffabiles effectus à nobis observentur, sæpe Medicos in admirationem trahentes; imo & nonnunquam decipientes, alios nimirum, atque diversos affectus repræsentantes, ac simulantes, ut ab Hippoc. docemur, exempli gratiâ, dum ait, quod si lingua repente incontinens har, aut aliqua pars corporis stupore elanguet, tale est melancholicum signum; effectus nimirum flatulentæ melancholicæ materiæ, quæ huc, & illuc per corpus delata, stupores, imò & torpores in hac, vel illa parte inducere potest.

Itaque pro hoc affectu curando, fontem mali, ut dicebat Celsus, tollere oportet, & diversa à præteritis curativa indicatio est desumenda, conceptâ spe, fore, ut affectus ipse, quamvis confirmatus, propriis remediis adhibitis, auferri possit.

In quem finem primæ viæ sunt expiandæ. Secundo Obstructiones referandæ. Tertiò Massa sanguinea ab impuritatibus vindicanda. Quarto Topica parti adhibenda. Quinto Jecoris, & capitis calor contemperandus; atque Tandem caput idem roborandum.

Pro primo scopo explendo, primum leniens erit potio ex manna clarif. aut Elecuarium lenit. cum tartaro. Præparans autem, quinque diebus præbendum,

℞. Julap. acet. corticibus citri alterati ℥ij. Aqu. flor. citri ℥j. m. pro syrup. & sic pro aliis. Deinde repetatur alterum ex superscriptis lenientibus.

Pro secunda intentione, sequenti die, succi depurati hunc in modum exlubendi

℞. Succi depur. & per arenam trajecti, cicchor. borag. pom. dulc. an. ℥j. decoct. endiv. melissæ, malvarum, violarum, lupulorum ℥iv. salis tart. fixi gr. x. m. pro syr. summo mane assumendo. Sequenti verò die præbeat rhabarbarum ita

℞. Rhabarb. maturi ℥j. floris cass. rec. extr. ℥ij. M. f. boli, summo mane exhibendi, quibus horâ post, superbibat aquæ stillat. malvarum,



varum, borag. an.  $\text{ḡiv}$ . m. & tribus horis ab assumpta aqua prandeat. Tertia vero die iterum assumat succos, ut supra; deinde die sequenti bolos; atque ita peneveret viginti dies, alternatim assumendo succos, & bolos; in quorum intermedio usu assumat bolos, ita parandos.

℥. Flor. cass. rec. extr.  $\text{ḡvii}$ . Extracti senz, pilul. de tribus cum rhabarb. an.  $\text{ḡf}$ . M. f. boli, quibus, post horam, superbibat ser. capr. aut alin. depur. lib.  $\text{j}$ . f. tribus vero horis ab assumpto sero prandeat. Interim venæ sedales hirudinibus aperiendæ, & sanguis ad  $\text{ḡv}$ . aut ad summum vi. extrahendus.

Terminatis viginti diebus, secundo, & tertio scopo satisfactum fuerit, si addatur Purgans, quod totum, & caput spectet: dicebat enim Gal. quod Licet caput per alterius partis consensum laboret, affectio nihilominus ipsi capiti tribuenda sit. Ideo parentur pilulæ, totum, & caput purgantes, hunc in modum.

℥. Pilul. aurearum, aggregat. cochiarum an.  $\text{ḡf}$ . m. reform. pilulæ, & inaurantur, circa mediam noctem, post primum somnum, assumendæ; summo vero mane superbibat feri capr. aut alin. depur. lib.  $\text{ij}$ . cui superdormiat, si potuerit. Et quoniam partem affectam, affectionis diuturnitate aliquam labem necessario contraxisse dixi, ideo aliquam quoque, licet exiguam, excrementi portionem, per congectionem producere posse suspicandum, quæ sensibilis, & insensibilem evacuationem exigat. Quare topica remedia, tum interna, tum externa sunt paranda. Intrinsecus prodelle poterit Erthrinum, quotidie mane ante cibum in usum ducendum, hoc modo.

℥. Pulv. majoranæ, Ireos an.  $\text{ḡij}$ . M. f. pulvis, more tabaci per nares attrahendus. Extrinsecus verò paretur tomentum, spongia eodem madefacta, & expressa parti affectæ, mane, & vespere, tepidum admovendum.

℥. Fol. malvarum, chamæmeli, meliloti an. manip.  $\text{j}$ . radic. althææ  $\text{ḡj}$ . liquiritiæ  $\text{ḡf}$ . sem. fenugr. hordei an.  $\text{ḡij}$ . aqu. comm. lib. vi. m. bulliant ad consumpt. tertiz, pro tomento; quo amoto, detergatur pars, & illinatur oleo lil. alborum.

Quintæ intentioni satisfacere poterit lac asininum, quadraginta, aut quinquaginta diebus, summo mane, cum saccharo pro more assumendum: Etenim non solum jecoris, & capitis, totiusque sanguinis calorem contemperare, sed contumaciores quoque obstructions exiccatas emollire, & auferre, necnon totum corpus, jam emaciatum instaurare poterit, præsertim si addatur, oleo amygdalino recenti, universo corpori quotidiana unctio. Neque obstabit Hippocratis documentum, quod Lac dare caput dolentibus sit malum; cum per caput dolentes, frigiditatem, catarrhique copiam intelligat; in nostro verò casu catarrhus exiguus, isque calidus valdè, à Nob. Patiente observetur. Quod si Excellentissimo Medico Assistenti fortasse suspexit habebatur, substituitur lac arte factum, in hunc modum parandum.

℥. Sem. melon. mundat.  $\text{ḡj}$ . Sem. anguriz, cucurbitæ mundat. an.  $\text{ḡf}$ . m. contundantur, & cum jure pullæ extrahatur emulsio; cui adde sacchari albisissimi cochlear unum, m. pro potu matutino.

Tandem pro aliqua capitis corroboratione opportunissimus erit usus, statim à prandio, & à cæna, Conservæ rosarum, ita paratæ.

℥. Conservæ rosarum,  $\text{ḡv}$ . Tincturæ corall. chymicæ  $\text{ḡj}$ . m. reform. cujus donis erit ad cochlear unum.

His autem omnibus congrua erit addenda vivendi ratio, à Viro Excellentiss. præscribenda, ita ut caveat à fumosis omnibus, præsertim calidis, sed & à flatulentis; à diuturna mora tum prope ignem; tum sub r. diis solariibus: sed omnium maxime à nimis quibuscunque studiis & animi perturbationibus, ut medicamenta jam proposita scopum salutis attingere possint. Raym. Joh. Forus Consult. & Respons. Medic. Tom 2. Cent. 1.

### *Hemicranicus dolor, in lateris dolorem degenerans.*

Pater Admodum Reverend. Concionator celeberrimus, annum agens quadragesimum nonum, temperamenti secundum totum, magisque secundum jecur & cor, calidi & sicci, capitis calidioris, non valdè humidi, destillationibus tamen obnoxii, mediocris habitus, ingenii perspicacis, & ad operationes promptissimus, anno elapso, dum Quadragesimali tempore Veronæ pro Prædicatione morabatur, correptus fuit dolore vehementissimo in sinistra capitis parte, qui musculum temporalem, aurem & maxillam occupabat, & progressu in latus sinistrum circa renis regionem descendit tanto impetu, ut lecto non sine aliqua febricula Adm. Reverend. Patrem affligeret. Dum vero hoc anno Patavii, eodem tempore Quadragesimali, summo cum universali applausu atque Christicolarum fructu verbum Dei prædicaret, dolor non in capite, sed in latere sinistro circa eandem renis regionem ipsum invadere coeperat, noctu præsertim invalefcens, verum non adeo sævus & vehemens, ut ideo nullâ die ipsi Concionem impedierit. Modò pro præservatione prudens Admod. Rev. Pater nos de agendis consultit.

Quod Admodum Reverend. Pater caput habeat destillationibus obnoxium, cum tamen ejus temperies valde humida non sit, nec excrementis pituitosis scateat, primâ fronte mirum videbitur: at si medullitus totius & partium principalium temperies, necnon intensa & diuturna studia considerentur, admiratio cessabit: Jecur enim fervidum, non nisi ejusdem conditionis sanguinem producere potest, qui per venam cavam ad cor calidissimum perveniens ut purificetur & perficiatur, propriæ caliditatis quicquam amittere nequit, imò potius caloris plures gradus acquirit. Illius autem portio, dum per Carotidas ad caput ascendit ob cerebri frigiditatem, ut sui moris est, propriæ caliditatis multos gradus deponere deberet, nisi cerebrum ipsum continuo à studiis & applicationibus agitatum consueto calidius inveniret: quò fit ut etiam spiritus animales calidiores ex ipso fervido sanguine generentur: qui principes operationes exercendo cerebrum ipsum semper calidius reddunt. Hinc portio sanguinis pro nutritione eidem destinata ob exuberantem calorem, non in alimentum, sed



in humidum excrementum cedit: cui dum associatur biliosi atque serosi sanguinis portio major inutilis, à venis jugularibus non exhauritur, sicque mistura huiusmodi in spatiis remanens & huxibilior reddita, partim ab imbecillitate facultatis retentricis, partim ab irritamento expultricis, in subjectas partes delabatur atque detruditur: quæ ut acris & mordax continuum solvendo, immanes dolores concitat: quos cum in maxilla, aure & temporali musculo, ob earundem partium exquisitum sensum natura diu tolerare nequirit, materiam ipsam molestantem, ad ignobiliores partes, ad musculos nimirum dorsales atque lumbales tandem Veronæ detrusit, & sensibiliter medicamentis, atque præsertim sanguinis missione, necnon per insensibilem transpirationem spatium dierum materia resoluta fuit, & dolore vanuit: qui hoc anno rursus rediit, dum Pater admodum Reu. caput eodem modo exercendo & excalescendo, eodemque tempore viscera omnia, genita fuit catarrhalis materiei portio, & multo copiosior à venoso genere, serosa atque biliosa transmissa, ne dicam, violenter attracta, ut propterea ab eadem excrementosa missione natura irritata, eandem ad partes infernas deposuerit; neque enim in capite firmata est, sed statim ad renis regionem transmissa fuit, forsan ob materiei maiorem tenuitatem & fluxibilitatem, aut quia caput non adeò ab aëre Patavino, ut à Veronensi laesum atque debilitatum fuerit, & idcirco in minori copia excrementum produxerit, quod facilius natura statim ad inferiores & ignobiliores partes deponere potuerit.

Ut igitur Pater admodum Reu. præservari possit non est qui non videat partium mandantium primò curam habendam esse, secundo loco, suscipientium. Quoniam verò partes mandantes, sunt venæ totius, vitioso sanguine fervido, seroso atque bilioso refertæ, ideo sanguis ipse à serositatibus calidis vindicandus, & ejusdem qualitas, tum prima, nimirum calida, tum secunda, nimirum acris & mordax temperanda & demulcenda. Quoniam verò sanguis huius prævæ conditionis à fervore jecoris & cordis continuo reproducitur; idcirco horum calida intemperies refrigerantibus corrigenda; & tandem pars recipiens, caput scilicet corroborationem potiùs, quàm correctionem expostulat, cum aliquem tantum excessum in calore retineat.

Quæ jam dicta omnia obtineri posse, omnino considerem, nisi de continentia Admod. Reu. Patris à nimis studiis & applicationibus dubitarem. Cura itaque præservativa, sed levis atque suavis, hoc anni tempore congruo, est ineunda; & primò primæ viæ ab excrementis sunt expediendæ. Secundò Biliosæ serositates à sanguine segregandæ & educendæ. Tertiò Jecoris & cordis fervor est temperandus. Quartò sanguinis acrimonia & mordacitas mitiganda, simulque caput refrigerandum, ac postea idem corroborandum.

Pro prima explenda intentione, convenientissima erit potio ex syr. ros. solut. rec. cui post duas aut tres horas, superbibat seri capr. depur. aut aquæ Nocærianæ lib. ij. & duabus horis ab assumpto sero prandeat. Dein-

de quinque sequentibus diebus summo mane assumat Julap. acet. & violati, aquæ florum citri an. ℥j. pro syrup. matutino. Transactis autem hisce quinque diebus succedat potio superscripta.

Secunda intentio modo facili ita fuerit implenda, ut nimirum sequenti die assumat.

℥. Seri capr. destillat. ℥ vii. syrup. de succo limon. aut de acido citri ℥j. m. pro potu matutino, quatuor horis ante cibum. Subsequenti verò die

℥. Rhabarb. opt. ℥j. aq. stillat. de succo cich. ℥vj. m. f. inf. per noctem, deinde fiat colatura, cui pro gustu Patientis addi potest succo limon. cochlear, & summo mane assumatur frigida. Tertia die repetatur serum destill. ut supra: quarta, infusio rhabarb. jam dicta; & ita alternatim perseveret ad xv. dies. Sed tertio ex præscriptis diebus, valde proficua erit venarum sedalium, hirudinibus, apertio quam si tortè renuat Adm. Rever. Pater, suppleat secta vena sinistri pedis, sanguinem educendo ad ℥vi. vel vii. ad summum.

Tertiæ & quartæ intentioni satisfacere posset lac asinum; sed omni suspitione carebit emulsio, ita parata.

℥. Semin. melon. mundat. ℥i. semin. cucurb. & angur. mundat. an. ℥ss. aq. stillat. acetosæ ℥iv. violarum ℥iii. m. & seminibus contubis, extrahatur emulsio, cui adde julapii violati ℥i. m. pro potu summo mane quatuor horis ante cibum assumendo; in cujus usu xv. aliis diebus perseverandum.

Ut tandem capiti aliquod robur addatur, per xv. alios dies, tribus aut quatuor horis ante cibum, bibendus cyathus aquæ stillat. de succo cich. in qua dissolutæ sint gutt. v. tincturæ corallorum chym. & totidem quintæ essentia rosarum; sicut sub ingressum lecti rosarum Conserva comedenda. Extrinsicus quoque nares & sutura coronalis inungi poterunt summo digito, intincto eadem rosarum quinta essentia; aut exiguum vasculum vitreum eadem repletum, de more ad olfaciendum, secum portet.

Quibus omnibus congrua vivendi ratio erit addenda; quam in omnibus facilem Admod. Reu. Patri futuram existimo, præterquam in studiis & applicationibus quibus debilitatur caput, calet, & cum impetu, non modo vapores sed calidi quoque humores sursum trahuntur. Interim caput ipsum ab aeris inclementiis, tum calidis, tum frigidis custodiat. Abstineat ab alimentis vaporiferis, calidis & sanguinem fundentibus, ut ab aromatibus; à condimentis aliis, & cæparum; ab esu fœniculi, apii, cardui & aspatagorum longo usu. Ab usu quoque aceti in ferculis, & à salitis carnibus, ac piscibus. A vinis valde generosis & aromatibus, præsertim dulcibus. Somnus nocturnus sit diuturnus, brevis verò diurnus, & capite elato. Corpus exerceatur, sed jejuno ventriculo; & alvus officiosa servetur prunis & passulis decoctis (si opus fuerit) prima mensa assumendis.

Et præter jam dicta omnia, duo documenta à me accipere sit contentus Admod. Rev. Pater; primum, quòd singulo anno diebus Canicularibus duabus aut tribus horis ante prandium



dium de more bibat cyathum aquæ stillat. de succo cich. ad 3. vi. vel vii. in qua dissolvat, sacchari albi aut Conservæ de acido citri, cochlear vnum. Alterum documentum observatione dignum est quod toto anno assuecat in prima mensa, saltem prandii bibere ius carnis quatuor foliis herbarum alteratum, scil. Vere cichorii: Æstate, acetosæ: Autumno boraginis: Hieme endivix; & hoc remedium magnum ab Antiquioribus appellabatur, quod æquat omnes humores. Quæ si servaverit, Purgationes impofterum evitare, & seipsum non solum ab Hemicanico dolore iam dicto, verum & ab hypochondriaca affectione, quæ studiosis familiaris esse solet, præservare poterit, Ita Deus mea vota secundet. *Idem ibidem.*

*Cephalæa cum hypochondriaca affectione.*

Serenissima Dux annum agens 27. temperamenti totius, & jecoris ad calidum & siccum vergentis, mediocris habitus, & capitis humidioris, quæ tenella ætate subtilissimo aëri e proximis montibus spiranti caput incaute diu exponere solita erat, decimo suæ ætatis anno capitis dolore corripit, qui usque in hunc diem eandem per intervalla divexare nunquam cessavit; & licet tempora primò inuadere ac lancinare soieat, per totum tamen caput seie diffundit, & clavi adinstita tunc temporis affligit cum frigiditatis sensu. Dolor autem nulla certa periodo inuadit, adeò ut quandoque parum ante purgationes menstruas, quandoque post. imò & iisdem fluentibus, aliquando quineriam inceperit cum expuitione aquosæ & insipidæ materiæ, aliquando cum eadem cessaverit. Dolor autem vigente tenduntur oculorum partes nervosæ atque tendinosæ, quæ tensio ad occiput usque pervenit, tuncque veluti attonita permanet, intelligens quidem quæ adstantes loquuntur, ad responsum tamen impotens per horæ dimidium; totaque accessio, ad summum, integrum diem naturalem durat; licet postmodum tribus quatuorve secutis diebus caput imbecille remaneat, & præteritæ accessionis vestigia seruet, præsertim si frigido ambienti exponatur.

Vere proximè præteriti anni adversus hunc immanem affectum medica præsidia administrata fuere, & post universalem purgationem; sanguinis nigri & adulti repetitam evacuationem, Villenses aquas, balneum aquæ dulcis extrinsecus non sine fructu experta est; siquidem invasiones non adeò frequentes, imò bis tantum usque in hodiernum diem repetierunt; verum tamen est quod cum paulò post conceperit, toto gestationis tempore nunquam prorsus ab aliquo dolore immunis vixerit.

Præter affectionem jam dictam, quinque abhinc annis post sereniss. atque dilectiss. Sororis obitum, affectum quoque hypochondriacum melancholicum fovere cepit. Siquidem status copiosus in hypochondriis semper percepit, à quibus & rugitus, & quandoque spirandi difficultas motum quoque progressivum impediens; quinimò & in uteri gestatione cordis palpitationes se prodiderunt; quæ omnia

flatibus erumpentibus minuuntur. Primis autem annis dum una cum vaporibus humores quoque caput petebant, narium frequentes & leves hæmorrhagias excitabant, ab quas sanguis ex pede, revulsionis gratia, missus fuit: licet postea sanguis ipse ad venas sedales converitus cæcas hæmorrhoidas, & ideo dolores hæmorrhoidales induxerit.

Invaluit hoc tempore alui stypticitas, adeò ut nonnisi aliqua confectione solutiva in anum immisa, tertio aut quarto quoque die feces reddat, easque adultas, quo eodem tempore quatuor aut quinque continuas horas urina quoque supprimitur, & postea absque ulla materiæ permissione libere erumpit. Interim totum corpus quodammodo parumper emaciari visum est.

Nulla vero unquam febris jam dictos affectus comitata est; bene appetit, & bene coque-re videtur assumpta; commode quoque dormit: & sicut menstruarum purgationes nunc bene procedunt; ita optime a partu puerperia cum lactis abundantia, & semper sine febre. Restat igitur, ut sereniss. Matrona à jam dictis malis, ope medica, pro virili omnino vindicetur; aut saltem, quoad fieri potest, levetur.

Ex his quæ jam nos præsentis voce petere imus, circa sereniss. Ducis statum, & quæ præterea in præsens ab accuratissima historia transmissa accepimus, sereniss. Matronam sævissima Cephalæa, in diu torqueri, & molesta hypochondriaca affectione tandem divexari, clarissime videmus, Priorem, sodam, sive ovum, Avicennas cum cæteris Arabibus nuncupavit, & Tralianus, gravem affectum, & vehementer dolentem; imò morbum pestiferum Celsus appellavit. Est autem periodica inordinata, sed antiqua, cum decimo suæ ætatis anno affligere cœperit: & sicut pars affecta dubio procul est caput, & quidem essentialiter affectum, & sectandum partes internas, membranas scil. cerebrum invellientes, quod ex dolore ad oculorum radices pertingente, facile conjici potest; ita non idiopathice tantum, sed sympathice quoque læsum esse arbitramur, non solum à toto venoso genere, sed multo magis ab hypochondriis, non modo calida intemperie, verum & obstructionibus affectis; vnde tandem quinque abhinc annis, mæoris maxima occasione suborta, sereniss. hypochondriacam affectionem contraxit. Ad Cephalæam caput ipsum disposuit olim ambientis aëris acuta frigiditas; cui pro more incaute illud exponente sereniss. ipsa, potuit ille frigidam & humidam intemperiem inducere aut augere; quæ tamen sola affectum hunc neque continuo neque frequenter excitasset sine infernarum partium consentientium auxillio: siquidem à toto venoso genere admodum fervido, primis ætatis annis; postremis vero, & ab æstuantibus hypochondriis obstructionibus infarctis, tum calidi vapores, tum seroli atque acres humores in caput per intervalla delati, paratis, atque jam congestis in eodem capite humiditatibus permixti, prava qualitate potius, quam quantitate peccantes, soluto partium exquisitè sentientium continuo, immanes dolores excitant, & excitant, qui licet in una capitis parte incipiant, ad totum tamen paulo post se-



se diffundunt, diffusa nempe materia per ipsa vasa, eaque quodammodo, non tamen prorsus stagnante, nec libere institutum a natura circumum obeunte. Hinc tensionis sunt, & stupida, sive attonita, licet non omnino intelligendifacultate destituta, per horæ dimidium serenul. observatur: superstitite tamen eodem dolore ad integrum usque diem; quo tempore, si non ab initio, sub finem saltem accessionis materia pituitosa sensibilibiter per sputum ab ipsa natura expellitur prout calidior atque serosa insensibiliter resolvitur, necessario superstitibus postmodum, tres aut quatuor sequentes dies, afflicti capitis & præteritæ insignis noxæ vestigiis moxque sana atque immunis huiusmodi lævo dolore degit, usque ad novum vaporum & excrementorum apparatus. Interim tamen hypochondriacus affectus molestinus esse non desinit, qui flatulentus a Galeno dictus fuit; quoniam in eo quam maxime flatus abundant, a quibus ex sicca minera elevatis & in hypochondriis hærentibus, rugitus; ab iisdem vero septum comprim. entibus, spirandi difficultas; & ob insignem tensionem, motus quoque progressivi segnitie excitari solent, & in uteri gestatione, ad cor pervenientes; atque ob eorum crassitiem resolutioni minus idonei, cordis quoque palpitationem excitabant. Ad caput vero una cum sanguine fervidiori pertingentes, ad facultatem expultricem irritantes, frequenter narium vasa aperiebant.

Ambo verò hi affectus curationis certè difficilis sunt; prior quidem, quoniam antiquus, contumax, ac præterea quoniam affectiones, quæ pueris in pubertate, & foeminis erumpentibus menstruis non terminantur, consensescere consueverunt, dicebat Hipp. posterior vero, quoniam in melancholia materia fixa est, quæ rebellis semper & medicis præsidii contumax fuit atque reluctans. Nihilominus quoniam Matrona sereniss. salutem expetit, necdum generosiora & validiora remedia expetere fuit, ac proinde & eandem præceptis medicis obtemperaturam sperare licet, nec adhuc morbum omnino auxiliis Medicis reluctantem accusare possumus; ideo jure merito spem concipere debemus, fore nimirum, ut hoc autumnali tempore hypochondriaca affectione se remittente, ac proinde consensu imminuto, capitis quoque dolor mitescat; Vere autem proxime futuro, ejusdem capitis idiopathica affectioni si incumbatur, ejusdem dolor prorsus etiam expugnetur; neque enim uno eodemque tempore utrique affectioni incumbere possumus, cum diversas, imo contrarias Medicas intentiones postulent. Hypochondriaca itaque affectio venit hoc tempore curanda; Primo, quoniam materiam capiti, doloris causam suppeditat; quod optime cognoverunt quoque Archiatri illi Præclarissimi, qui refrigerantibus & humectantibus remediis adhibitis, eidem capiti non levè iuvamentum attulerunt; sicque morbum ostendit sanatio. Secundo quoniam est quid impediens, & veram atque perfectam doloris sanationem prohibens; cui perficiendæ Vernal potius, quam autumnale tempus, opportunum est. Quare in hunc finem primæ viæ sunt expiandæ. Secundo obstructions humectantibus &

aperientibus referandæ. Tertiò flatus caute discutiendi. Quarto hypochondriorum & vicerum fervor temperandus; nec interim contra dolorem capitis aliqua a proprietate iuvantia negligenda. Quibus explendis scopis, a fonte Chirurgico saltem unica est petenda sanguinis nussio ex vena brachii, tempore, pari intervallo medio inter præteritam & futuram menstruam purgationem; sed interim toto anni curriculo familiares esse debent mane ante quam sereniss. e lecto surgat frictiones a dorso usque ad pedes; vespere vero ante cœnam pedum lotiones aqua calente.

Reliqua a Pharmaceutico fonte desumenda. Itaque primum leniens esse poterit potio clariss. tum ex manna, tum ex syr. ros. sol. Sicut prima præparatio commode perfici poterit julap. acet. ex aqua verbenæ parato, & frutulo cinnam. aut citri aromat. & exigua aqua totius citri diluto; vel cremore tartari in eadem aqua dissoluto, hac lege ut quinque transactis diebus, eadem potio repetatur; inde ad succor. depur. & per arenam transmiss. usum deveniri poterit cich. scil. & borag. in jure pullæ cichorac. alterato. Quod si serenissima succos respuat. aquæ stillat. succorum eorum vicem præstabunt, in quibus tart. vitriol. gr. dissoluta fuerint; sequenti vero die hos cass. ejusque usus ingentis profectus esse poterit ad 5. n. trib. aut quatuor horis ante cibum usurpandus; cui post horam superibbat jus pullæ endivia alteratum, tertia vero die rursus succos aut aquam repetat, & quarta cass. ut supra, ita alternatim perseverando ad xx. usque diem: sic enim exiccati humores emolliantur, obstructions referantur, & alvus sicca leniri poterit, omisso interim usu confect. solut. alvo ciendæ: irritando enim, molestias hæmorrhoidas excitant, sicque cohibetur urina.

Hoc eodem tempore, ita admittente ambientis calore, & non inhibente frigiditate, balneum quoque aquæ dulcis, refrigerantibus & humectantibus herbis alteratum, sive infusiones ad renes usque, saluberrimæ forent, ad emolliendas & removendas exiccatas obstructions; tunc enim facilius rhab. usu auferri & extirpari poterunt; præbeatur autem insusum in aqua de succo cichor. addito succo lim. vel sale prunellæ ad xii. vel xv. dies.

Quibus peractis, ut jecoris calida intemperies quodammodo corrigatur, quoniam aquæ aciculæ assumendæ tempus opportunum non fuerit, ideo stillatitia de succo cichor. sat erit, ad cyathum integrum, cum syr. de succo lim. summo mane xv. aut xx. diebus potanda. Flatibus insistentibus præstantissimum & suavissimum discutiens est oleum cinnam. si aut rotulæ ex eo, cum saccharo & aqua cinnam. parentur, aut guttulæ aq. totius, aut florum citri insilluntur. Hæcque sufficiant hoc autumnali tempore, congrua addita victus ratione remediis propositis proportionata a Viris Præclariss. præscribenda.

Vere autem proxime futuro nova erit incunda purgatio: quos enim purgare oportet, Vere purgandos, dicebat Hipp. Oportebit enim primas vias mandare; reliquias obstructionum aperire; massam sanguineam purificare; caput purgare; atque tandem ejusdem frigidam



frigidam & humidam intemperiem corrigere; quæ omnia præstabuntur repetita sanguinis missione, & forsân venæ frontis apertione, atque congrua medicamentorum administratione; quæ a nobis tunc temporis, jubentibus Sereniss. præscribenda erunt, ut absoluta totius & capitis expurgatione, ad decoctum sudorificum necessestium accedamus; ex salsa scil. viscō quercinō; santalo albo & radice verbenæ in aq. stillat. cich. & beton. parandum. Post cuius administrationem rursus aquæ Villenses erunt exhibendæ; & balneum aquæ dulcis administrandum, ut post capitis exiccationem; jecoris; hypochondriorum & venarum fervori prospiciatur, de quibus pariter peculiari tunc erit deliberatio.

Sed interim aliqua à proprietate juventutis in usum frequentem continuo duci poterunt: Intrinsecus scil. aq. stillat. Verbenæ ad ʒi. vel iij. cum guttulis spiritus vitrioli tanquam mirabilis à Foresto extollitur; sicuti extrinsecus ab Aëtio gagates nactu capiti alligatus commendatur, atque ipso doloris paroxysmo vigente, a Sexto Platónico matrix Vulpis exiccata, & capiti circumposita; dolorem auferre scribitur.

Hæc sunt quæ Præclariss. Viris expendendæ proponere mihi permittit anni temporis conditio, ab iisdem perficienda ac dirigenda, & si opus fuerit; etiam corrigenda, dum ad Sereniss. Ducis salutem vltimè conspiramus. Ita D. O. M. vota nostra secundet. *Idem ibidem.*

*Medicatio Fœmina, Cephalalgia, Ex causâ calidâ, Laborantis.*

Fœmina quadraginta annos nata sanguineâ; calidiore diætâ diu usâ, incidit in ingentem dolorem punctorium verticis & occipitis, ad cervicem usque desinentem; qui non externo contactu sed capitis motu exacerbatur; atque ideo immota in lecto jacet. Punctiones, quas in capite sentit; subinde remittuntur; subinde ita ingravescent; ut ægra animo linquatur. Adest citra sitim; magnus totius corporis calor; pulsus celer; urina rubicunda. Interdum post somnium quædam præter rationem loquitur.

Jacto hoc historiz morbi, ex diligenti ægrota; hujus examine collectæ, fundamento; medicatio jam porro instituenda per cognitionem; tum diagnosticam, tum prognosticam; quâ peractâ; progrediendum erit ad Curationem:

Et quantum ad diagnosis, quæ in partis affectu; ipsius morbi; & causæ morbificæ investigatione consistit: afficitur in hac ægra caput, secundum verticem; occiput, & cervicem, quod ex dolore illas partes occupante est manifestum; afficitur etiam cerebrum secundum substantiam & spiritus; item secundum meninges; quod ex sermonibus præter rationem interdum prolatis; & ex dolore, non externo contactu; sed motu capitis exacerbato; innotesceat: item cor & totum corpus, quod ex pulsû celeri; urina rubicunda; & totius corporis calore patet.

Morbus, qui cam affligit, est intemperies

capitis, secundum verticem; occiput, & cervicem; calida & acris, sive biliola; quæ in illis partibus ingentem dolorem punctorium excitans; dolor capitis ex causis calidis ortus; vulgo appellari solet:

Causa præcatartica hujus morbi est diætâ calida, quæ hæc ægra iur usâ. Inde enim, adjuvante temperamento ipsius sanguineo, humores calidi & acres, in ipsius corpore geniti; antecedentem huic morbo præbuerunt causam: pars vero ejus in caput, circa meninges in vertice & occipite; ac ad cerebrum; item foris ad cervicem usque delata, ac ad cor & in totius corporis habitum distributa, ibique calorem præter naturam concipiens, partesque illas vehementius alterans & vellens; continens hujus morbi; & symptomatum jam commemoratorum; est causa.

Humores enim calidi & acres, ad meninges circa verticem & occiput; ac ad interiora cervicis subinde delati, vehementiorem illis partibus; quæ acutissimi sunt sensus, intulerunt motum & punctiones, & hinc punctorium dolorem, subinde remittentem & deinde rursus ingravescentem; ac motus corporis, quo etiam interiora agitantur; non vero externo contactu, qui tantum exteriora premit, exacerbationes inferentem; & interdum etiam in animi deliquium ægram nostram, per spiritus animales, in fibras cordis & vasorum ejus contridorias ex dolore nimis copiose determinatos, præcipitantem.

Adest autem calor totius corporis, citra sitim; ac urina rubicunda; quia humores illi in corde vehementius; citra febrem incalescunt; & inde in totum corpus atque in renes impulsî totum corpus valde calefaciunt, urinamque biliosis suis partibus adustus rubore tingunt:

Et quia sanguis & spiritus ille calidus, per somnum non satis discussus ex cerebro, ipsum cerebrum, in eoque sensorium commune vehementius & inordinatius agit; hinc fit; ut ægra nostra interdum, post somnum deliros habeat sermones.

Morbus hic satis est periculosus ob cerebrum affectum, doloris gravitatem, & delirium hic subinde conjunctum post somnum: nam in maniam, vel phrenitidem, vel apoplexiam posset degenerare: Quia tamen nostra ægra est valida; bene sperandum; & ad curationem accedendum censeo:

Quæ in causâ præcatartica, antecedentis; & continentis, ac intemperiei per contraria, ablatione & doloris sedatione consistet.

Mox itaque venâ in brachio pertundatur; sanguisque educatur ad ʒviii.

Sequenti die purgetur tali haustu:

℞. Mannæ calabræ ʒj. syr. ros. cum rheo ʒß. Aq. hordei. q. s. M. F. haustus; mane exhibendus.

Postridie, adhibeantur, si dolor etiamnum urgeat, cucurbitulæ quatuor vel sex scâpulis; cum scarificatione.

Et sub vespere utatur lotionem pedum, in decocto camomillæ & sol. salviæ factâ, per horas duas; quæ lotio sequentibus diebus bis quotidie, mane ac vespere sc. reiterabitur.

Atque ad somnum conciliandum & doloris sedationem



sedationem, sub tempus somni, tale n sumat  
potiunculam somniferam & anodynā:

℞. Aq. lactucæ ℥j. betonicæ ℥ss. Syr. de papav. ℥iij. de acetositate citri ℥ss. Misce. F. potio.  
Et collo talis facculus applicetur.

℞. Furfur. triticeæ p. ij. sem papav. albi ℥i. β. Rosar. rub. ℥j. mastiches ℥iij. rad. galangæ ℥j. conquassata & inclusa sacculo vino irrorentur, & calide applicentur collo. circa nucham.

Ad corroborationem debiliū viriū utatur tali conservā:

℞. Conserva rosar. majoranz an. ℥j. Spec. diarrhod. abbatis ℥iij. Cum syr. de limonibus q. s. Misce ad formam electuarii, De quo sumat ægra subinde magnitudinem castaneæ majoris.

Tandem si gravitas capitis, uti hic sæpe fit, post punctiones ablatis ægra sit molesta, talis capiti in ponatur cucupha:

℞. Furfuris tritici p. ij. sem. papav. alb. ℥i. β. Rosar. rubr. ℥j. mastiches ℥iij. Rad. galangæ ℥j. ireos ℥ij. Sem. coriandr. ℥iij. Contundantur & cum linteo & cotone F. Cucupha.

Corpusque iterum purgetur blande, tali purgante medicamento:

℞. Mannæ calabriæ, Syr. ros. sol. cum theo an. ℥j. Aq. hordei q. s. m. l. Haustus.

In dicta ær, in quo ægra degit, sit frigidus, humidus Victu utatur parco, refrigerante & humectante, ex lactuca, acetosa, portulaca, endivia, cichorio, citriis, aurantiis, cerasis, hordeatis. Abstineat a vino; potus sit cerevisia tenuis. Somnus sit longior. Perturbationes animi vehementiores, ut & inedia, vitentur.  
*Henric. Regius apud Theod. Craanen Medicat. lib. 1.*

#### *Medicatio Famina. Dolor Capitis, ex causa frigida, laborantis.*

Matrona triginta annorum, pituitosa, otiosa, alimentis frigidioribus uti solita, postquam incunte hyeme, sese æri nubeloso, frigido, & humido, ac vento, exposuisset, magno dolore correpta est, qui totum caput occupat, illudque gravat. Facies multo pallore est perfusa; in ore pituita abundat; pulsus est parvus, rarus, languidus; urina pallida, crassa.

Afficitur in hac ægra caput; idque potissimum secundum meninges & ipsam cerebri substantiam, ut patet ex dolore totum caput occupante & gravante.

Morbus, qui ægram affligit, est intemperies meningum & substantiæ cerebri pituitosa & acris, quæ in illis partibus dolorem gravativum excitans, dolor capitis ex causa frigida appellari solet.

Causa procataretica huius morbi est usus diutinus alimentorum frigidorum, quo, adjuvante vitâ otiosa & temperamento ægra pituitoso, multi frigidi & acres humores in ipsius corpore geniti antecedentem huic morbo præbuerunt causam. Illi verò ad cerebrum & meninges delati ibique vi æris frigidi humidi & ventosi retenti, à reliquo sanguine separati, & in substantiam istarum partium effusi, illasque partes suâ copiâ gravantes & distendentes, & acrimoniâ vellicantes, continens huius morbi, symptomatumque eius, sunt causa.

Dum enim illas partes vellicando, & distendendo, ac pungendo, vehementius movent,

dolorem in iis excitant Dum, ad cor feruntur, sua frigiditate faciunt pulsum tardum, rarum, languidum. Dum crassa & cruda excrementa ad renes pelluntur, urina evadit pallida & crassa. Dum multi pituitosi humores ad faciem deferuntur, oritur in ea pallor. Dum illi ad palatum propelluntur, os pituitâ abundat.

Morbus hic in corpore, ex pituita debili, est periculosus, minaturque paralyfin, apoplexiam, catarrhum, epilepsiam, vel alium gravem affectum.

Ideoque diligenti curatione est aggrediendus; quæ in causâ procatareticâ, antecedentis, continentis, & intemperiei, ac doloris, per contraria correptione, consistet.

Primo itaque purgetur talibus pilulis:

℞. Pil. cochiarum gr. xv. Scammonii gr. x. Cum syr. ros. q. s. F. pil. No. iv. Mane exhibendæ. Et utatur tali apozemate:

℞. Rad. feniculi, petroselinii an. ℥j. liquirit. ras. ℥iij. Herb. betonicæ, hyssopi, calamint. capill. ven. melissæ, majoranz an. m. j. Flor. stachados p. j. Sem. anisi, feniculi an. ℥j. β. Decoq. ex aq. comm. ad lib. j. Colaturæ: Adde syr. de hyssopo, oxymell. simpl. an. ℥j. Misce F. Apozema, de quo sumat bis in die ℥iij. pro dosi.

Biduo post primam purgationem iterum purgetur talibus pilulis:

℞. Pilular. de hiera simpl. alephangin. an. xv. Scammonii gr. viii. Misce F. pilulæ No. vi. mane exhibendæ.

Postridie in scapulis adhibeantur cucurbitæ sex cum scarificatione, & mediocris sanguinis quantitas educatur.

Et deinde reiteretur apozema prius præscriptum, addendo sub tinnem decoctionis sol. semnæ ℥j. & decoquendo ad lib. j. de quo sumat ℥iij. semel in die.

Postquam ita aliquoties purgata fuerit universaliter, ad particulares evacuationes erit veniendum; itaque tali utatur apoplegmatismo, longe à pastu:

℞. Uvar. pass. ℥iij. Hyssopi. sampsuchi an. ℥ss. Mastiches ℥ij. Cum paucis melle & cera F. globuli masticatorii.

Succo etiam rutæ, majoranz, betæ, loco erithini, utatur: uti etiam hoc gargarismo.

℞. Herb. melissæ, betonicæ, salviæ an. m. β. Sem. sinapi ℥ij. ficus n. v. f. decoctio pro lib. j. Colaturæ adde mellis ros. oxymell. squill. an. ℥ij. M. l. Gargarismus, quo tepide utatur longe à pastu. Frons & tempora tali inungantur linimento:

℞. Unguenti alabastrini. ℥j. Ol. irini, rutacei an. ℥j. misce.

Si dolor perseveret, pilulis ante præscriptis subinde iterum purganda erit.

Interea, ubi ita corpus erit evacuatum, cerebrum etiam erit roborandum tali electuario:

℞. Conserv. flor. anthos ℥i. β. Theriacæ ℥iij. Rad. acori conditæ ℥iij. Spec. diamusci dulc. ℥iv. Cum syr. de betonica q. s. F. electuarium. De quo sumat castaneæ magnitudinem, Post singulos pastus.

Ad roborandum caput F. cucupha ex flor. stachad. salviæ, majoranz, lavendulæ, origani, absinthii an. M. β. nucis muscatæ, macis an. ℥i. cum panno serico & cotone q. s.

In victus ratione ær sit calidus sicut, Cibus ex carnibus vervecinis, gallinaceis ovibus sorbilibus.

Assa



Assa hic elixis præferenda. Alimenta condiantur serpillio, majorana, hyssopo. Lotus sit parvus, ex vino tenui. Motus sit mediocris: uti & somnus. Alvus debet esse lubrica; vomitus vitandus, Trillitia quoque vitanda. *Idem ibidem.*

### Observationes.

#### Pro Capitis dolore.

Infantulus quidam capite supra modum dolebat, cum nulla remedia juvarent, tandem ad collum, verbenam viridem aliquo modo tritam, ut ab adstantibus non cognosceretur, appendebam, idque nocte, dormiente & inscio, antequam malum invaderet, & adstantibus mandabam, ne æger à somno solutus herbam collo suspensionem dimoveret: qua hujus herbe solius suspensione, miraculi instar, hic æger curatus est. Verbenam à collo suspensam amoveri non debet, nisi exsiccata tandem per se cadat. *Petrus Forrestus, observ. 32. & Schol. lib. 9.*

Illustrissimus princeps *Janeshinus Doria* Classis *Hispanice* præfectus afflictus est, in arce *Nonipoliensi*, ubi bello captus detinebatur, febre hæmitritæ, quæ inter cetera symptomata, capitis dolorem gravissimum intexebat, cumque continuum, & extra accessionem æque molestum, qui tamen post 4. phlebotomias in brachiis celebratis, eodem vigore perseverans, intra horam sudatus est sanguinis missione ex malleolo dextro, tam promptus effectus observatione dignus fuit; ut tyrones videant, quam bona fiat revulsio à capite per Saphenam apertionem. *Lazarus Riverius, observ. 40. cent. 3.*

Mulier quædam *Fontinianensis* atrabilario temperamento donata, annorum 40. post abortum non amplius passa est purgationes menstruas, inde gravissimus capitis dolor per 4. menses eam afflixit, nihil conferentibus venæ sectionibus, hirudinibus fronti & temporibus admotis, aliisque remediis, vocatus ego præscribo apertionem arteriæ temporalis, quæ optime celebrata fuit, neque sanguis salu egrediebatur ob exilitatem arteriæ, & sanguinis crassitiem, sed guttatim: extractus fuit ad 5v. ruber & floridus: tum vulnus oclusum fuit emplastro ex sola mallie, cum Ligatura simplici; postquam alia ligatura, quæ in vulneribus capitis solet fieri, per 5. horas adhæsisset; liberata est à dolore capitis sine recidiva. *Lazarus Riverius, observ. 56. cent. 2.*

Patronus quidam celeberrimus cum circa meridiem sese soli nimium exposuisset, correptus est paroxysmis febris tertianæ duplicis satis levibus, & circa vesperam recurrentibus, hoc tamen Symptoma in paroxismo urgebat, nempe capitis dolor intensus, qui tribus primis diebus cum febre cellabat, matutinis horis. Interim facta fuit vena bis, & purgans medicamentum semel exhibitum, quibus non obstantibus dolor capitis & æstus plurimum increvit, & continuus factus est post quartam accessionem, ut autem grave hoc Symptoma tolleretur, venam frontis aperiendam consului: ex eaque sanguinis 5 vii. educæ sunt, à qua venæ sectione dolor capitis statim valde remissus est, & sequens paroxysmus multo levior rediit, cum exiguo capitis dolore, at postero die mane doloris omnino expers fuit. *Lazarus Riverius, observ. 21. cent. 2.*

Conferunt hic plurimum pilulæ *Enflachii Kadii*, quæ in Italia olim magno in pretio habitæ sunt, doi. 3j. *Lazarus Riverius, cap. 16. lib. 1. Praxis Medicæ.*

Cum essem *Lodovici* inviti filiam Mercatoris 7. annos natam, quæ à duobus mensibus affligebatur gravissimo capitis dolore circa frontem & supercilia, qui singulis propemodum horis recurrebat, ita acutus, ut illa ubi culro caput aperiri frequenter postularet. Jam vero à duobus diebus inciderat ter aut quater in paroxysmos Epilepticos cum spuma in ore, à Medico ordinario, præscripta fuere multa remedia, præsertim purgationes per apozemata, cucurbitulæ, & vesicatorium cervici, sed omnia frustra.

Cum essemus de hoc casu consilium mituri, relatum nobis fuit, eam novoparoxismo fuisse e vivis ereptam, & post mortem puris aliquid per nares effluxisse. Inde conjiciendum fuit in cerebro abscessum latitare, sed eo aperto nihil inventum fuit, præter serosum humorem in cerebri substantiam & ventriculos effusum.

Hic casus mihi in memoriam revocavit historiam cujusdam virginis, quæ cum simili dolore per multos menses cruciata fuisset, & multa remedia frustra tentasset, à quodam Chirurgo totum caput derafo capillitio, vesicatorio contextum est, instar Cucuphæ, & humilis excitatis, magna serosi humoris effluxit, & ita liberata est, quod remedium huic etiam prodesse potuisset. *Lazarus Riverius, observ. 31. cent. 1.*

Vir quidam *Coloniensis* dolore capitis tam acerbo tamque inhumani laboraverat, ut domesticorum suorum per cubiculum gressus & passus (quantumvis exutis calceis, & substrata arena per pavimentum cubiculi incessissent) sustinere non potuerit, videbantur enim sibi, quotiescunque ingredientium in cubiculum gressus perciperet, cultelli cerebro intigi. Post multa frustra adhibita remedia, tandem ego in consilium adhibitus, ei seraceum suavi quod & applicui: hoc adeo foeliciter successit, ut indices manifestam doloris mitigationem perciperent. *Gual. Fabricius Hildanus, observ. 7. cent. 4.*

Chirurgus quidam *Ultrajectinus* implacabili dolore particulæ capitis laborabat, à nullis remediis juvabatur: tandem jussi cauterium potentiale admoventi, curatus fuit citra aspectabilis malæ aliquam effusionem, indicibili quadam qualitate vel aura sine dubio fatigatus is fuerat, in ea parte. *Johannes Henricus, ad Aphor. Hipp. 39. Sect. 4.*

Ego per terebrationem in plerisque cephalæam curavi.

Cum vir quidam nobilis annum egisset in summa doloris capitis acerbitate, me tandem ad se vocavit, ut sibi operam ferrem, ibi cum diffusio per totum caput dolore, certo dignoscere non possem, in quonam loco stabularetur humor morbosus, ut conjectura id investigarem, derafo capillitio, toti capiti cataplasma curavi admoventum: hinc post aliquod tempus amotum Cataplasma, in una parte magis desiccatum apparuit, unde facile deprehendi, in ea capitis parte latitare causam dolorificam, quam pars Cataplasmatæ magis exsiccata conregerat, tum terebra caput perforari præcepi.



Sed postquam ad diploem usque, excisa scilicet superiore cranii lamina, perventum est, magna statim humoris, colore atque consistencia, mellei copia foras erupit, indeque dolor quievit, & per Dei Misericordiam sanatus homo, ad hunc usque diem aura & luce vitali fruitur. Erat autem abscessus ille intra utrumque os calvaria consistens, vera *phlegmon*, quæ à melle nomen habet. *Ludovicus Duretus in Annotat. ad cap. 2. lib. 1. Jac. Hollerii de Morbis internis.*

Nobilis juvenula Patavii ultra annum dolore capitis veluti perforante ac fixo mirè cruciatur. Medicus, quod erat suspicatus aliquid membranarum incumbere, bono eventu cranium terebra tentandum censuit, ipso enim aperto, puris foetidi guttula vix æquans milii granum excidit, neque ex eo dolor unquam molestus fuit. *Jo. Rhodus. observ. 69. cent. 1.*

Illustres quædam domina implacabilibus capitis doloribus tenebatur: suspicabantur humorem esse frigidum, rebellem, efferatum tamen, & jam in stultentiam naturam versum. Sectæ sunt venæ brachiorum, purgatum corpus, vesicæ suillæ admotæ lacte plenæ, nil proficitur; tandem interbastantur sacculi semine lini pleni, vino & aqua incoquantur, applicantur, dolores cessant, non longe post repetunt, eadem usurpantur: tandem cum nil proficeretur, sæpe adhibentur galli exenterati miraculo convalescent. *Guil. Ballonius. lib. 1. Epidem. & Ephemer.*

#### *Dolor Capitis à Naturâ devictus.*

Cornelius Testor, vir pleni habitus, excarnificatus aliquandiu ab intolerabili capitis dolore; contorquebatur tandem tam vehementer à contractione nervorum, ut nihil proficiente arte medicâ, necesse fuerit implorare naturæ opem; quæ etiam tam sedulas tulit suppetias: ut pulso, per nares, plurimò pure, brevi liberaverit hominem, non tantum à dolore, verum etiam à pertinaci, horribili convulsionis illius, causâ. Juxta illud Hippocratis: *Capite dolenti, & vehementer laboranti, pus, vel aqua, vel sanguis, per nares, aut aures effluens, morbum solvit.* lib. 6. Aphor. 10.

Quod ipsum, benignæ naturæ auxilium, etiam aliis vidimus allatum: cum per porriginem, tum per vermes, à naribus, excretos: Quos hic licet silentio præterierim, non possum tamen non meminisse salutaris illius porriginis, quæ affinem Casparis Barlæi, summi, nostri sæculi, cum Oratoris, tum Poëtæ, liberavit officiosè, ab inveteratâ Cephalæâ expulsa, per insensibilia cutis foramina, viscidâ pituitâ adhærescente, instar glutinis, capillorum radicibus & producente paulatim, veram porriginem, defædantem quidem caput: sed vindicantem interim ipsum à dolore alias invincibili.

Discant hinc Medici naturam imitari, & observare cum judicio: quantopere in capitis dolore ex usu sint, cum iternutamenta in tempore mota: tum ulcera capiti maturè inusta: Natura quippe dux optima: nec facile errat, ipsius qui insistit vestigiis. Illâ stante, prosperè navigat æger; & interdum, ipsa duce, incredibilia peragit medicus. Uti scitè Seneca. *Naturam sequentibus omnia facilia, & expedita*

*sunt: contra illam viventibus, non alia vita est, quam contra aquam navigantibus.* Nicol. Tulp. *observat. Medic. lib. 1.*

*Dolor Capitis gravissimus ex lue venerea sine gummate in septuagenario, repetita terebratione ejusdem, sapinus sedatus, & recurrens per longa intervalla, cum gravibus quandoque symptomatibus; tandem eodem presidio omnino sanatus.*

Læditur caput à multis affectionibus, potissimum verò à gummatibus gallicis, vel dolore intensissimo ipsius: ut propterea meminerim me vidisse sutorem septuagenarium laborante dolore atrocissimò capitis ex lue venerea sine gummate, cujus causa, habita consultatione multorum Medicorum, unanimes statuerunt, periculum faciendum fonticuli supra suturam coronalem; cujus ope, aliquo temporis spatio, liberatus à dolore, tribus aut quatuor post annis, in eundem incidit, cum stupore & mentis alienatione; quæ tamen symptomata solebant recurrere per intervalla, dolore in parte anteriore ipsius bregmatis, prope frontem potissimum, cum divexante. Quamobrem, secui primò cruciatim cutim, & inveni os totum corruptum; quo propterea terebratò, effluxit maxima copia puris, unde aliquot post dies fuit liberatus æger à prædictis symptomatibus, habuit tamen foramen patetactum multos menses, cum os esset corruptum, nec proinde caro ex medullis posset succrescere, atque ipsum obstruere. Tandem anno post circiter, dolor gravissimus caput denuo ipsum divexare, cujus causa non longè à primâ perforatione aliam molitus sum, quæ os nonnihil moveri sensi, atque multâ denuò materiâ purulentâ expurgatâ, ab eo fuit liberatus. Post duos vero, aut tres menses, idem prolapsus est in somnum profundum, Lethargi instar, ad quem proinde vocatus, dum specillo ipsum os explorarem, atque vacillare perciperem, illud eduxi ad magnitudinem scutati argentei, omnino cariosum, & ita corruptum, velut si decem annos sub terra sepultum fuisset; sub ipso autem cranio membrana non apparuit, sed caro aliqua duriuscula, rubra, & lavis, ut de ipsius vita metuerem, nudatis multâ durâ matre, & cerebro; expergefactò tandem à somno illo profundo, sequenti nempe die, cum effluxu multæ materiæ purulentæ, apposui supra membranam illam testam carnosa quadam substantia à natura producta, ad ipsius cerebri tutelam, pannum sericum rubrum, absque ullo medicamento, quod omnino neque pus, neque alia materia supra illam carnem appareret, superiniecção postmodum cerato barbaro; quorum usu æger decem, & plures annos superstes fuit, hoc ordine servatò, sine ullo capitis dolore. *Petrus de Marchettis Observat. Medico Chirurgicat. Sylloge.*

Villico cuidam ex familia Marinorum, dolore immani capitis correpto ex lue venerea, exhibui decoctum quadraginta dies cum sudore, nullò tamen ab his remediis opportunis, & validis iuvamento; ut propterea consultatione habita cum præclariss. Joh. Dominico Sala



Sala, unanimis decreverimus eundem terebrare, ubi gravior dolor, altera scilicet parte. Facta itaque terebratione, tribus, aut quatuor post diebus cœpit dolor mitescere, qui progressu viginti dierum fuit omnino sanatus, superstitere adhuc nunc & incolumi ægro. *Idem ibidem.*

Hebræam etiam quandam laborantem Hemierania sævillimâ terebravi, quæ convaleuit, dum foramen patefactum fuit, quo paucos post dies, omnino obstructo, in eundem delapsa est affectum; cuius causâ, multis licet antea, & post quin etiam, à Præclariss. Joh. Domin. Sala remediis ex methodi lege adhibitis, nunquam tamen patiens convalescere potuit. *Idem ibidem.*

#### *Cephalalgia à verme lato.*

Fœmina quædam diu de capitis dolore con-  
quella, exhibitis aliquando granis decem pul-  
veris gummi guttæ, vermem latum evomuit &  
melius habuit. *Paulus Spindlerus apud Carol.  
Kaiserum.*

#### *Dolor Capiti.*

Petronella de Kuick, rustica sexagenaria, mense Februario conquerebatur se magnis capitis doloribus, nec non catarrhis ad oculos, dentes, humeros, aliasque partes adiacentibus, tota fere hyeme infestatam fuisse, atque in capitis summitate magnum frigus sentire, haud secus ac si inciperet aquâ frigida perfusum foret. Præscripta prius dicta calidiora & cephalicâ, corpus pilulis coctis & aureis expurgavi. Deinde antea quadrupl. cata spiritu vini calefacto imbuta ac rursus leviter expressa, toti superiori capiti imponere, idque sequentibus diebus aliquoties reiterare iussi: hoc factò, diuturnus ille dolor, unâ cum catarrhis intra paucos dies profusus evanuit. Tunc ad præservationem iussi sequentem cucupham capiti impositam gestare.

℞. Herb. majoranæ p. ij. rosmarini, salvia, florum meliloti, lavendulæ, ana p. j. Nucis moschatæ, gariophyllorum, ana scrup. ij. fiat pulvis pro cucupha.

In huiusmodi frigidis cerebri affectibus, præter generalia & interna medicamenta, sæpe topica convenientia multum quoque prosunt, ita ut his solis, si in ipso capite primaria doloris causa consistat, curatio multoties peragatur. Quo in casu nos spiritu vini feliciter usi sumus, cuius totum etiam sumum opere commendat Arculanus. Alij aliis utuntur. Platerus anethum, Forestus chamomillam, quocunque modo adhibeantur, dolores à causa frigida potenter sedare scribunt. Aëtius stercus caprinum tritum, & vesperti ac mane impositum; Item nasturtium torrefactum cum aceto rosaceo tritum & impositum, plurimum ac citissime prodesse tradit. Sunt qui frigidos ac superfluos humores hoc modo exsiccant.

℞. Sem. milii lib. j. salis communis lib. s. fol. majoranæ, rosmarini, salvia, florum meliloti, ana p. j. sem. anisi, feniculi, anethi, cumini, ana drachm. ij. bacc. lauri drachm. iij. His in sartagine torrefactis, & post in sacculos coniectis, liccet & confricetur calidissime caput per sesqui-horam. Aëtius verbenam cum radicibus & serpillo oleo incoctam, omni capitis dolori ex frigidis & crassis humoribus me-

deri scribit, atque etiam prodesse tradit asellos seu millepedes sub aquarum valis nascentes, si oleo incoquantur. P. Aegineta lib. 3. cap. 5. scribit mulierem quandam valde inclamasse, quod sequenti remedio capitis dolores, vel cum, vel sine febre, mirabiliter sanaret: radicem cucumeris asini viridem minutim concisam, & ablinthium, in aqua & oleo, donec staccescerent, coquebat, & hydroleo illo caput rigabat, ac radicem cum ablinthio contusam ungebant. Quod medicamentum efficacissimum esse etiam testatur Avicenna, qui illud sequenti forma describit.

℞. Olei communis, aquæ communis, ana lib. j. fol. ablinthii m. j. Radic. cucumeris asini unc. ij. bulliant simul. *Isbrand. de Diemerbr. in observat. & Curation. Medic.*

#### *Dolor immanis sub osse sterni.*

Vice-Capitanus Mour, vir florentis ætatis, mense Januario subito incidit in acerrimum quendam dolorem, qui rectâ lineâ ab asperâ arteriæ summitate usque ad superius ventriculi orificium, secundum ossis sterni longitudinem, se extendebat, hominemque tam atrociter excruciebat, ut se hinc illic commovere nullo modo posset, atque hinc immanissimi doloris impatiens ab altantibus omnixè peteret ut pignore vel gladio ipsi vitam haurirent. Non tuliebat neque difficulter spirabat æger, pulmones cum aspera arteria plane liberi erant, etiam œsophagus in deglutiendo non dolebat: ad hæc foris nec visu malum percipiebatur. Sub ipso osse sterni, ea parte qua mediastinum ipsi annectitur, vel in membrana ipsi interiùs annexa, doloris causa latebat, quæ hoc modo inducta fuerat. Vespera præcedente æger in convivio quodam vinum Gallicum generosum ac fortè liberalius ingurgitaverat, eoque ante luculentissimum ignem se valde calefecerat. Cum verò tandem media nocte sudans foras exiret ac domum properaret, subito in via maximo frigore (nam asperissimum tunc temporis erat gelu) correptus est, hinc protinus occlusis poris vapores calidi & acres condensati & congelati interiori ossis sterni membrana adhæserunt, atque hinc pars illa cum acri dolore quasi obriguit, qui dolor motu thoracis exacerbabatur. Ut huic intolerabili malo citissime occurrerem, statim alvò enemate subductâ, hoc sudoriferum calide exhibui.

℞. Theriaca scrup. iv. extracti cardui bened. Angelicæ, ana scrup. j. croci Britannici gr. vi. Aquæ theriacalis nostræ unc. ij. olei anisi gut. iv. Misce, fiat haustus.

Hinc optimè quidem sudavit, sed dolor in eodem statu permansit. Post sudorem ceratum sequens loco dolenti applicavi.

℞. Pulv. castorei, gariophyllorum, benzoini, croci, ana scrup. j. gummi galbani vino dissoluti unc. s. emplastri de meliloti, oxycrocei, ana drach. iij. Misceantur & fiat s. art. ceratum, quod extendatur in corio longitudinis partis affectæ, & latitudinis quatuor digitorum, & inungatur oleo nucis moschatæ distillato.

Cum hoc ceratum per sex septemve horas parti adhæsisset, plurimum cessare cœpit dolor, multoque tolerabilior evasit, ita ut æger se mo-



lius movere posset. Sequenti die medicamentum purgante assumpto quinquies alvum deposuit. Predicto autem cerato adhuc per triduum inhiere, dolor totus evanuit, & æger rursus bene sanus foras prodiit. Postea vero, mense Februario, cum vinò hispanicò largius haustò rursus nimium incaluisse, idem malum eodem planè modo rediit, atque tunc eodem illo & solo cerato rursus intra triduum curatum fuit. *Idem ibidem.*

#### *Dolor Capitis.*

Petrus Joannis, famulus cerevisiarius, homo robustus, mense Januario, cum accerrimè gelaret, crudelissimo capitis dolore correptus fuit (reliquo corpore se bene habente) ob cuius immanitatem aliquot dies noctesque continuas insonnis traduxerat, unde non tantum appetitus languescerebat: verum etiam delirium jam aliudve gravius malum inminerebat. Attamen æger adeo pertinax erat (ut plerumque solent hujusmodi rudes homines) ut ad mali sanationem nihil medicamentorum assumere vellet: tandem vero meis & amicorum bonis verbis eo inductus fuit, ut topica admitteret. Proinde, cum præsentem egeret levamine, sequens fomentum præscripti, quo caput calide foveri, & lintea quadruplicata ei intincta toti capiti calidè circumponi, ac refrigerata rursus eidem fomento calefactò intingi, idque tota nocte (nam circa vespèram vocabar) continuare jussi.

*℞.* Rosmarini, verbenæ, betonicæ, thymi, ana m. j. majoranæ, m. j. s. salviæ, m. s. florum chamomillæ, meliloti, an m. j. anethi, storachados, an m. s. sem. cumini, anethi baccarum lauri, ana unc. s. vini albi q. s. coquantur s. art. ad lib. iij. adde colaturæ spiritus vini unc. iv. misce, pro fomento.

Sequenti die dolor longè mitior fuit, cumque adhuc omnia alia medicamenta repudiaret æger, in ejusdem fomenti usu continuatum fuit biduum, quo intervallo somnus rediit, & dolor fere totus evanuit, exceptò quòd in fronte supra nasum adhuc aliquantum remaneret, cum narium etiam obstruptione. Hoc cum fieret à tenaci quadam pituita, sicut totus morbus à frigido ac crudo humore in cerebro propter externum frigus coacervato, atque ibidem obstrueto inductus fuerat ossi ethmoides firmiter impacta, errhinum ex succo radicis betæ præscripti, de quo cum bis terve aliquantum cum penna utrinque pertusa in nares attraxisset, magnam tenacis pituitæ copiam per palatum & nares excrevit. atque ita ab intolerabili hoc malo prorsus liberatus fuit. *Idem ibidem.*

Vir annos natus quadraginta & duos dolore capitis vexabatur acerbissimo, & quidem tantum circa tempus unius lateris, ubi fixus permanebat, quem si quis hac de causa clavi nomine insignire vellet, per me liceret.

Causam hujus doloris esse judicavi humorem acido corrosivum ibidem satis profunde delitescentem & stagnantem propter obstruptionem valde pertinacem.

Aderat medicinx studiosus, qui sibi persuadebat hujus affectus curam optimè perfici posse sudoriferis, quod ego tamen propter pertina-

ciam obstruptionis in hoc morbo æque impossibile censebam, quam in panaritio, quod tamen nunquam audivi per sudorifera fuisse sanatum, quamvis itidem ortum suum debeat humori acido corrosivo, nam valde parva sudoriferi pars est, quæ ad partem dolentem pervenit.

Ego igitur parti affectæ potius imposui pulverem Cantharidum cum propria saliva efformatum in velicarium circa vespèram, & per noctem reliqui.

Clarissimus Sylvius Cantharidibus addit acetum, putans exinde oriri fermentationem quandam, & sic velicarium melius operari, imò doctissimus Willsius plerisque velicatoriorum formulis etiam adjungit acida, quod & ego sæpius secutus sum, sed toties, etiam post integrum totius diei intervallum, nullam vesiculam à Cantharidibus excitatam fuisse observavi, quoties illas miscueram cum aceto, hac scilicet de causa, quod ab aceto sal volatile Cantharidum enervetur, in quo tamen præcipua earundem virtus consistit.

Sequenti die adveniens vesicam ingentem à Cantharidibus productam conspexi, & ex agro dolorem prorsus abiisse, intellexi.

Dolorem autem illum ob vesicam, & propter aquam ex eadem aperta promanantem, sublatum fuisse, minime mihi persuadeo, nam aqua profluens nec acris gustabatur, nec talis esse poterat, quandoquidem alias ante vesicæ apertionem subjectæ cuti aliquem intulisset dolorem, quod tamen non fecit, licet cutis epidermide hoc modo sublata, satis sensibilis sit ut patet ex eo, quod ab aëre ambiente non raro lædatur & dolorem sentiat.

Sed quidnam ergo fuit, quod dolorem illum sustulit? sal volatile Cantharidum, quod à vaporibus ex cute egredientibus in motum satis celerem concitatum, pervenit usque ad humorem acidocorrosivum, eumque temperavit & incidit, ac obstruptionem sustulit.

Verum unde tunc vesica suam traxit originem dicam; interea temporis, dum particule Cantharidum volatiliores satis alte penetrabant ad humorem peccantem corrigendum, alie crassiores & aciores circa cutim subsistebant, in qua fibrillas quasdam diffringebant, quæ in cincinnos resilientes tubulos ita obstruebant, ut humores, in circulatione aliqua ex parte impediti, colligerentur in superficie cutis ac cuticulam elevarent in formam vesicæ, quod facile contingere potuit, quia fibrillæ quæ cutim cum cuticula jungebant, jam disruptæ erant à particulis crassioribus & acioribus Cantharidum citatis.

Atqui aliquis dicet hic fortasse, quod aqua illa ibidem congregari non debuisset, sed potius foras egredi per poros cuticulæ, per quos sudorem tam sæpe promanare videmus, cui respondeo, particulas crassissimas Cantharidum mansisse & hæsisse circa cuticulam, ejusque poros valde contrinxisse, quod nemini mirum videbitur, qui vel semel in vita vidit, quam facile ignis calore membranæ possint corrugari, & quod ignis communis, qui membranas ita corrugat, etiam aliquando excitet vesiculas, prorsus similes illis, qui à Cantharibus producuntur; quia autem pori cuticulæ ita con-



contracti sunt, ideo vapores alias libere exhalantes accumulantur, augentque copiam humoris in vesica contenti.

Siquis tandem, ratiocinio nostro nondum plane convictus, credat tam diu Cantharides ob vesiculas excitatas juvare, donec probati alicujus scriptoris auctoritate flectatur, illum adire jubeo Lazarum Riverium, qui centuria 3. Observ. 14. refert, quod vesicatorium dolorem à punctura apis relictum intra quadrantem horæ abegerit omnino, vesicis non excitatis ob moram exiguam.

Franciscus Redi in tractatu de insectis affirmat, se vidisse humorem albicantem & absque dubio acido-corrosivum, ex aculeis scorpionum profluentem, & talem humorem in puncturis apum ex earum aculeis itidem promanare valde verosimile videtur, qui doloris causa existat, unde jam manifestum redditur, quod dolor, de quo Riverius loquitur, evanuit, quia humor acidus, qui ex apis aculeo profluxerat & dolorem excitabat, temperabatur à sale volatili Cantharidum.

Apum autem aculeos cavos esse nemo mirabitur, qui unquam vidit tubulos vitreos arte confectos, quibus utuntur ad sanguinem, aliosque liquores per microscopium examinandos & conspiciendos, quandoquidem illi, licet pilo tenuiores sint, cavitate tamen aliqua donantur. *Joh. Meys in Prax. Chirurg. ration.*

#### *Cephalalgia rara.*

In naturalibus oppido rarum, qualem nec ulla Autorum lectio, nec ægrotorum antea mihi obtulit querela, observavi cephalalgiam, quam non inconvenienter salutavero *Hemicraniam Asiaticam*. Civis quidam Othinienfis honestioris sortis, ante paucos dies consilium meum petiit & auxilium, querulus de capitis dolore atrocissimo, per vices recrudescente sæpius, hyemali tempore, quoties bruma venit, canis-que albent juga lumina capillis; imò & quovis anni tempore, verum non nisi spirantibus gelidis Trionibus, quoties.

#### *Rhipais implet Boreas Aquilonibus orbem.*

Quoties & quamdiu ventus fiat à Septentrionali mundi plagâ, toties & tamdiu torquet ipsum immanis Hemicrania. Fronti potissimum & superciliorum infesta regioni, quæ mox una corripit superiorem utriusque Auriculæ Helicem. Trago auricularum & Lobo triumphantibus, tectis lateribus. Ego puto lympham acido-salam (quam prodit dolor lancinans & rodens) à Bilis miscela non planè liberam, musciculum frontis expugnare; expugnatum per sibi vicinum musciculum utrumque temporalem, utriusque auris musculo superiori, sive secundo & proprio, temporalibus incumbenti, suum commodare virus, quâ datâ portâ ruit. Hunc autem hostem solito atrocius sævire existimo, laudatò spirante vento, quatenus ab hoc ipso concitatus aer, & aliis atque aliis imprægnatus effluviis, poros cutis, dictos tegentis musculos, ita obstruit, ut *µίασμα* hæc, per insensibilem cætera se subducentia transpirationem, ne vel minimam elabendi invenire possint rimam. *M. Georgii Hannai in Miscell. Curios.*

#### *Dolor capitis periodicus & varius.*

Novi virum quendam è præcipuis civitatis nostræ, annorum 53. qui ante plures annos patiebatur dolorem capitis periodicum gravissimum, singulis diebus recurrentem, & per tres horas durantem; initia febris reciprocantis semper postponentem: qui tandem post quintum paroxysmum brevissimum delit; nihil, neque purgante medicamento, neque venæsectione profluentibus. Symptoma hoc post aliquot annos revertebatur, sed tantum tertiâ die, vetum longiore paroxysmo, eademque horâ, scilicet septimâ matutinâ, sæviriâ suam excrebat, sexque mensium fere spatio, frustra tam internis, quam externis medicamentis adhibitis, durabat. Tertiâ denique vice, idem malum postliminîo, quatuor annorum circulo exacto, quolibet octiduo, sed anticipando, recurrebat; atque tum per Del gratiam, præmissâ purgatione venali, ac venæsectione instituta, fonticuloque in sinistro cubito adhibito, planè cessavit, & hucusque, post aliquot annorum decursum, nondum rediit. De capitis dolore in Autumno sæpe recurrente, vid. *Forellum lib. 6. Observ. & Curat. Medic. cent. 3. cap. 3. & 4. Tulpium lib. 1. cap. 13. D. Simon. Schultzii in Miscell. Curios.*

#### *Hemicrania periodica quotidiana statis horis invadens & desinens.*

Hemicraniam periodicam nuperrimis diebus in Viro Illustrissimo observavi planè singularem! Recurrit ea quotidie certâ horâ: septimâ nempe matutinâ, paulatim increcendo & decrecendo ad horam duodecimam, tum nullo prorsus sensu ejus relicto: occupat verò tantum externam frontis partem supra oculi dextri orbis tam. Venæsectio juvit, & compressio illius partis. Causa hujus periculi esset divinandâ; forsitan vel sanguis, vel lymphâ; per circulationem eâ horâ recurrens ad locum hunc, quocunque vicio debilem, velheat acrimoniâ sua pericranium. *Thom. Bartholini in Act. Hassniens.*

#### *Dolor Superciliaris acerbissimus periodicus.*

Sæpius oblatus est mihi ejusmodi dolor, supra alterutrum supercilij convexitatem (ubi communiter nervi tertij paris ramulus præter propter dispergi ostenditur) intensissimus, ut plurimum à septimâ matutinâ ad duodecimam, vel à nona ad secundam pomeridianam, interdum cum aliquâ phlegmonodi & molliculo tumore, (seu circa Arthriticorum articulos observamus) extensus. Et sanè omnes ita afflictis, aut tuere, aut brevi post, facti sunt Arthritici. Verumtamen nec spiritus volatiles urinosi, (ex Ammoniaco, Calce viva, Fuligine, Tartaro &c.) Essentia camphoræ (similibus, aut spiritibus nervinis) diluta, &c. nec ab altera parte Emplastrum de ranis cum Mercurio, lamellæ plumbeæ, amalgama plumbi cum Mercurio, albumen cum alumine, &c. nec frontalis venæsectio huc quicquam contulere. Senex quidam medicus doloris acerbitate victus, tandem non solum arteriotomiam in vicino ramulo bis, & (quod forsitan notabile) primâ quidem vice, sanguine pacatissime, secunda vero, (ob quandam quasi



mucilaginositatem) ægerrimè exeunte; verum etiam sectionem supra ipsum locum affectum, (secundum requisitum librarum ductum) haut superficialiter instituit: at in cassum, redireque sæpius dolores, donec senio confectus vita pausam faceret. His proin dimissis, præsens semper circa eos, qui prædictis illicitis naturam (æque ac Arthritici nostri primitus solent) non seduxerant, juvamentum percepi, è vesicatorio retrò aurem; ita tamen ut materia per dies aliquot in fluore servaretur, applicato (ni fallimur) Fioravantiæ emplastro resolutivò ad tophos (& cantharidum particula, &c.) vel quod facilius ejus loco confit, ex emplastro de spermate ranarum, cum parte quarta vel quinta emplastri vesicatorij simplicissimi permixto. *Danielis Ludovici in Miscell. Curios.*

### *Cephalalgia à vermibus capitis.*

Puella quædam in districtu Olomacensi, cum longo tempore diris capitis doloribus vexaretur, qui ad aurem dextram, maxillam totam, & dentes ejusdem lateris sese extenderent, ac insomnis per plures dies & noctes ad insaniam usque maneret, faciem totam inunxit oleo chamomillæ, & aliquot guttas ejusdem olei in aurem immisit, quâ inunctione dolor aliquò modofuit confopitus, ut somnum utcumque caperet. Mane dum os aquâ frigidâ elueret, superveniente sternutatione, per nares vermem in pelvim rejecit, bombyci non absimilem, multipedem, dimidii digiti longum, moxque ab omni dolore liberata est. Vixit vermis aliquot horis, à pluribus visus & consideratus. *Joh. Ferdinandi Herodi.*

### *Hemicrania Arteriotomia spontanea curata.*

Temperaturæ calidioris, ac rarioris corporis habitus, annorum septemdecim mulierculæ, Hemicrania circa menstruum tempus biliosa affectæ, & per eorundem effluviū curatæ, secundo gestationis uteri mense recurrente Hemicrania, in crotaphita lateris dextri, crustula super arteria exorta, Arteria sponte adapertha est, & sanguinis primo tenuioris subflavi uccias quinque, dein totidem circiter atrii evomuit: coaluit arteria & pateriens convaleuit. Ex quibus non tantum Hippocratis variis in locis Naturam morborum medicatricem esse docentis, sententia, quam 2. de morb. de superevomitu venarum tulit; sed & Galeni Lib. de cur. per sangu. miss. Andree Laurentii, Parai, Vesalii & aliorum, qui in hemicraniis contumacioribus arteriotomiam, ratione non minus quàm experientia edocti consulunt, doctrina confirmatur. *Nic. Gul. Beckers.*

### *Cephalalgia spontanea vena sublingualis apertione sanata.*

Matronam novi affinitate mihi junctam, quæ Cephalalgia urgente aliquoties venarum sublingualium sectione quæsitum lenimen: Hæc aliquando sub furente Sirio faciens iter, dolore capitis ob æstum correpta est recidivo, Domum reversa sub cibi masticatione sublingualem sensit apertam, quæ more fluens, feliciter mitigavit dolorem. *Sigismundus Grassius.*

### *Magnus Hirudinum usus in Cephalalgia.*

Hirudinum usum, hisce in oris minimè frequentem, adeò salutarem reperi, ut sævissimas quasque cephalalgias non alio remedio promptius curaverim. Ex multis, quas novi, historiis unam deligam, eamque accuratius observatam. Anicula integro serè mense dies noctesque gravissima conflictabatur cephalalgia: dumque omnia adhiberentur remedia, adeò & spe & successu sum frustratus, ut tandem ad infrequentem, sed perspectum mihi hirudinum usum, confugere necesse habuerim: quibus ipsis tantum ægræ solatii, mihi que voluptatis accessit, ut semel iterumque indomitam cæteroquin cephalalgiam sanguifugarum applicatione sanaverim: & in remedii quidem usu hoc se expertam jactabat anicula, quod quamdiu sanguis traheretur ab hirudinibus floridus, nullam tenerit morbi remissionem, sed cum continuato tractu sanguinem emungerent nigricantem viscosum, à doloribus, cæu fascino quodam, liberata fuerit. Quid ergo hic decernendum? Anne hærebat in sinibus cerebri sanguis crassus & lentus, qui intus concepto fervore orgasmum, & tandem distensione membranarum contumacissimum dolorem intulit? sed nolo me immiscere cautis exaggerandis, quas vestræ crisi reservasse satius est.

Eundem illum hirudinum usum mihi quoque confirmavit Illustris Heros: Dn. Johan. von der Wick, Serenissimi Principis nostri generalis militis Præfectus, qui cum aliquando Holmiæ Suecorum dies noctesque sævissima excrucietur cephalalgia, adeò ut, quæ vis esse dolorum solet, mentis quoque alienationem pateretur, frustra adnitentibus archiatri, ut Regi suo fidissimum ministrum præsentem periculo eriperent. Tandem verò inter dolorum concertationes ipsi, de salute sua sollicito, incidit remedium, nimirum compertus ille hirudinum usus: itaque ultro applicationem illarum ad arterias temporales vehementius efflagitat, nec mora, applicatis illis, sanguinemque trahentibus melancholicum, dolor omnis est confopitus & suavissimi somni successu tot dierum vigiliæ pensatæ. Sed novo quodam exemplo idem ille heros hirudinum singularem effectum in contumacissimo linguæ tumore est expertus: induruerat lingua ad partem sui dimidiam, idque ex bilis atræ defluxione, ita ut aridi instar ligni immobilis in ore hæreret, vixque ulli usui sufficeret. Huic malo profligando tribus insudatum septimanis, venæsectio cum in brachio tum sub lingua incassum instituta; itaque præstantissima remedia infeliciter usurpata; verum solis hirudinibus, quas Medici dissuaserant, linguæ admotis humor ille crassus viscosusque fuit educus, & æger opportunè liberatus. *Joh. Langelotii.*

### *Usus Fonticulorum in Capite, ubi sutura coronalis cum sagittali committitur, in Cephalalgia inveterata.*

Autores quando loca, in quibus Fonticuli parari solent, determinant, primo loco capitis faciunt mentionem, in quo in ea regione, ubi futura



laturæ coronalis & sagittalis concurrunt fonticulos inuri iubent, eoque in multis magnis & chronicis morbis plurimum commodi præstitisse sæpiissime observarunt. In Holsatia vero nostra, licet alias in brachiis, femoribus & tibiis frequenter fonticuli excaventur, illi tamen, qui in capite sunt, in usu non sunt, imo ægri ab iis adeo abhorrent, ut difficillime ad ulcuscula talia paranda se adduci patiantur: cum tamen in plurimis morbis & Symptomaticis auxilium nobis ab iis polliceri possemus. Præsertim in Cephalæa inveterata Scorbatica certum levamen eos afferre, in illustri virgine observavi. Quæ cum per multos annos cum vehementissimis capitis doloribus conflictata esset, qui de die quidem tolerari quodammodo poterant, de nocte vero ita ingravescebant, ut omnia tam interna quam externa remedia eluderent, & ægra iis non amplius esset perferendis; multitudine rationibus ei, acerrime alias reluctanti persuasi, ut in fonticulum in capite excitandum consentiret. Loco itaque, ubi daturarum Coronalis & Sagittalis est concursus, abradis capillis, prævia masticatione & digiti longissimi, carpo ad nasiradicem posito, extensione, investigato, cauterium potentiale admotum est; cuius virtus adeo alte penetrarat, ut cum eschara excideret, ablato pericranio nudum os app. reret: ad eam enim profunditatem, ad quam Antiquos quoque ussisse legitimus, fonticulos descendere necesse est, siquidem affluentes humores evacuari ritè debent, & doloris (quem alias pericranium remanens, dum globulus vel pisum semper ad id alliditur, excitat) expertes esse. Vix 4. septimanas fonticulus fluxerat cum dolores jam inciperent mitigari, qui progressu temporis ita evanescebant ut Nobilit. ægra bene haberet, & per quatuor annos superviveret; quibus exactis cachexia scorbatica correpta obiit, de capite vel ad ultimum usque vitæ articulum nunquam conquesta. *Casen. Grammi.*

*Acerrimi dolores Capitis enporislo sanati.*

Vixit non ita pridem apud nos Vir Illustris, sed vixit is Cephalalgia doloribus obnoxius, ut jam diu mortem sibi vita optabiliorem æstimaret. Incipiebant dolores ab utrisque temporibus, & paulatim altius in cerebrum evecti utrinque tanquam malleo fabriliter latera tundebant; Et quidem visum tolerabile malum quamdiu in imaginarii mallei scorsum tragedias suas exercebant, sed quando miscebantur ictus, ita ut in unam simul in medio cerebro incudem ferociter incumbere, præ cruciatu non amplius apud se erat, sed deliro similis cubicula oberrabat, imò aliquando animi tentabatur deliquiis. Suaserant Medici ut, tentatis incassum variis, arteriam temporalem pateretur sibi incidi, solenne aliàs in hoc casu remedium, ad quod nescio quomodo inductus descendere recusabat. Tandem cum constaret dolores illos proficisci à nimio sanguinis arteriarum temporalium fervore & impetu, ex consilio cuiusdam in medio dolorum cursu strophilo aqua frigida madido collum circumdedit, & cum à nativo calore incallescere linteam, novo permutavit. Unde dolor quasi exantatus fuisse eo tempore desit, & quoties redibat (id quod singulis serè a ensibus solenne) eodem stratagemate elusus est, admi-

rante ægro tam efficax remedium è puteo suo levi opera hauriri. Medicis autem ea medicandi ratio suspectior, non quod nesciant contraria curari contrariis, aut, ut prudenter Hippocrates, subcontraria subcontrariis, sed quia tum vident symptoma tantum hoc modo tolli, non primam mali causam, tum quia ab illo remedio sæpius usurpato vel paralytin timent, vel apoplexiam, clausis subito frigore nervosis partibus. Aliquando tamen, non inhiocor, usus vincit rationem, & nihil eo periculo, in quo æger versatur, periculosius est. Parisius nihil in hoc malo frequentius sectione arteriæ temporalis; atque notavi in Nosocomio (*L'Hôtel Dieu*) quoties Chirurgus ob profunditatem arteriæ nonnihil tricarî necesse habebat, ut scalpellum iuste adigeret, nonnunquam cum Alexandro violentius usum fuisse oraculo, hoc est, arteriam ipsam transverso ictu resecuisse, unde resecit quidem dolor, & divisa arteriæ partes facilius coierunt quam post incisionem punctum inflicti; metus tamen est ne partes capitis ab illo arteriæ funiculo, qui avulsus, nutriendæ, fovendæque, eclipsin aliquam in posterum patiantur. Quod *Forelius* refert à suspensa e collo verbera sedari dolores capitis, id licet sæpe experiri placuerit, tum in planta viridi, tum sicca, nunquam tamen evidenter successisse animadverti. *Olaus Borrichius.*

*Singularis Hemisrania solutio.*

Femina querebatur de Hemisrania dextrilateris frontem potissimum infestante, adeo ut oculos aperire vix valeret. Administrata V. S.<sup>na</sup> adhibentur itidem Pilule cephalicæ à Domino Licentiato *Julio Georgio Behrens*, Archiatro Guelferbytensi, qui nuni hunc casum communicavit, ordinatæ, sed nullo cum levamine. Aiebat enim ægra vertigine se corripî ad quemvis motum capitis, & quocunque inclinaret caput, eò impendere velicam aqua plenam, idque constanter asseverabat. Jubentur itaque ad aures applicari vesicatoria, item formari turunda, eaque immergi in spiritum salis armoniaci volatilem, Spiritusque per nares in cerebrum attrahi. Non diu his remediis usa, cum noctu stolididium ipsi narium accideret, non sanguinis, sed aquæ ad t. stum frigidissimæ, in tanta copia ut fere mensuram Guelferbytensem, (*ein Quartier*) repleverit, & ex eo tempore omnes dolores capitis cessare, sanaque fui. *D. Alard Hermannii Cummerni.*

*Succini efficacia in dolore Capitis.*

Præterire hoc loco non possum insignem vim succini in catarrhis & doloribus capitis. Inter- num usum in similibus affectibus nemo ignorat, quia calida attrahendi vi humores exsiccat. Externe verò eundem eventum præstare, non ita est frequens. *Mizaldus* tamen scribit, cervici alligatum frustum, oculorum lacrymas, fluxus, & ophthalmias miraculi instar sanare. Alia experimenta huius asseram. Mulier quædam Christiano Hamnensis perpetuo molestoque dolore capitis querula, postquam globulos ex succino collo gestasset, sine dolore vixit. Quocirca semper serè corollam hanc collo suspensam gestat, quam tamen nonnunquam deponere



cogitur, quia nimium trahere observat humores in corpore. Id quod etiam suo exemplo confirmat Consul urbis laudatæ Vir Amplissimus Casparus Schöllerus, succini æstimator insignis, quo succino magnam experientiam habet. *Th. Bartholinus in Actis Danicis.*

*Mulieri post diuturnum Capitis dolorem, tandem excisato in Gena dextra tumore & perrupto prodit ossiculum.*

Mirabilis est relatio D. Frider. Lachmund, Physici Hildesensis, de femina quinquagenaria, anno 1666. Saritedæ in Saxonia Inter. quæ de dolore capitis conquesta tandem tumorem in gena dextra passa est, qui tumor 1667. apertus primum sanguinem & pus fudit, post materiam duram, lapideam, cineream, tuberculosam, quæ aperta exhibuit cerasi ossiculum cortice lapideo & tuberculo obductum. Mirumque quomodo eo a Natura protrusum fuerit cerasi ossiculum.

*Cephalalgia Sole Oriente se prodens, Inclinate declinans, In virgine, Cucurbitulis ad motis sedata, in Viro, hircidibus.*

Ex astris solem præcipue & lunam conspiciare cum corpore nostro cumque humorum fluxu, vetus est vera sententia. Sed eundem illum consensum propter irregulares atmosphaeræ motus & tempestatum mutationes sæpiissime variari, unumque præ alio magis affici, id sanè oppido manifestum, referreque nunc libet, quid circa hunc solis sive effectum sive consensum in duobus præcipue agris observare licuerit, Nobili nempe virgine Galla, & archimagiro Sereniss. Principis nostri, Utrique sole oriente intra ipsum ferè temporis momentum dolor capitis succedebat, & cum solis ad meridianum adscensu augebatur, donec in summò cæli vertice consistens doloris quoque ea esset acerbitas, illa exaltatio, ut archimagirus ferè ad desperationem adigeretur. Sed sole à meridiano sensim declinante doloris remissio fiebat, nec tamen antè cessabat quàm Sol horizonte elapsus in noctem vergeret. Duravit hic affectus per dies aliquot, donec ventosæ cum profunda scarificatione universalibus præmissis virgini applicatæ levamentum doloris præstarent. In archimagiro obstinatio fuit affectus, solæque sanguisugæ ab immani isto dolore hominem liberarunt. *Joëlis Langelotti.*

*Cephalalgia stans affligens hora, Pediluvio sanata.*

Annus est, & quod excurrit, cum vidua quædam conquereretur de Cephalalgia, singulis auroris circa quartam matutinam tanta cum atrocitate incedente ut futura capitis, facta etiam à me attractu, quasi hiarent; universalibus, anodynis, & illis omnibus; Hinc maturo consilio suasi pediluvium, unde factum est ut aura frigidissima cum totius horrore à capite ad pedes descenderet, ægræque bis vel ter eidem administrando plane convalesceret. *D. Ehrenf. Hagendorff.*

*Ad Hemicraniam Topicum remedium.*

In Franconia Hemicraniam, congeneresque topicos capitis dolores, vulgus passim, sed in causa frigida, sine haud infrequenti successu, tollere satagit imposita parti dolenti patina stannea, aquæ quid continente, istique plumbi liquefacti particulam, ut patiens calorem emittenter fere sentiat infundendo. *Daniel. Ludovici.*

*Foliorum Palma Christi vis in uredine capitis.*

Folia Palma Christi applicata capiti multum allevant uredinem capitis, prout in me ipso expertus sum, Estque unicum remedium Indis & Nigris. *Dottor Stubbs in Actis Philosoph. Anglic. mens. Junii 1668.*

*Os Frontis Virginis aduleæ mobile, cum insigni Capitis dolore.*

Virgo prænobilis & generosa, annorum xxvj. conquerebatur quod maximis & continuis capitis doloribus à teneris unguiculis infestaretur, causam esse dicens quod Cranium nondum esset concretum. Ego inquirebam an forte ossa facta fontanella nondum esset? illa respondebat quod non, sed in risu vel tristitia & metu, aut forti loquela, fere pollicis latitudine Cranium dehisceret. Ego rei certitudinem percipiendi cupidus, caput tangens inveni os frontis esse mobile, & à sincipite se divelli pateretur, ita ut digitis quasi cerebrum posset attingi. *Friderici Lachmund.*

*Cephalæa à setaceo applicito cessans, eodemque remoto recurrens, idque aliquoties.*

Filia cujusdam mercatoris Amstelodamensis octodecim circiter annos nata temperamenti sanguinei; diu laboraverat capitis dolore, assiduò & intolerabili. Varia à me & magistro Petro Adriani filio ad arcendum malum istud incassum adhibita sunt remedia, ut sunt purgantia cephalica, alterantia, venæsectiones, tam in pede, quàm aliis partibus, vesicatoria, sternutatoria, cucurbitulæ, &c. Tandem quoque a nobis propositam admisit crucialem incisionem in bregmate, quam notabilis sequerebatur hæmorrhagia, sine ulla tamen euphoria. Consultationes diversas instituimus cura celeberrimo Practico Matthæo Slado. Tandem nullis remediis proficientibus animis nobis erat cranium terebra perforare, antequam verò hæc extrema institueretur operatio, setaceum in nucha proposui, cui remedio dicti Viri Celeberrimi calculum apposui, Remedio hoc celebrato, statim evanescere dolores, & quod notatu dignum est, post aliquod tempus ægra hujus remedii pertæsa, extraxit setaceum; quo facto illico recruduit malum, ita ut coacta fuerit ad novi setacei usum confugere, quo instituto exemplo rursus cessarunt dolores ægram vexantes: tum igitur prudentior facta gestavit hoc setaceum renovatum, donec sua sponte natura illud expelleret. Quid sit? tertia vice setaceo abdicato, recidivam patiebatur, & coacta denuò tandem encheiresin iterari iussimus, quæ sic repetita iterum libera-



ta fuit ab hoc malo, & posthac pancreaticè vivere cœpit, quemadmodum in hunc usque diem incolumis degit. *Frideric. Ruisch. observ. Anatomic. Chirurgic. Centur.*

*Dolor, inter caput, ac pedem, reciprocus.*

Vapores à pede, ad cerebrum ascendere, ibidemque morbum comitalem producere, novum non est. Sed eundem dolorem, à pede, in caput, & à capite, identidem in pedem reciproco cursu, revolvit: id certe, nonnulli paucissimis observatum.

Uxorem fabri lignarii, excruciauit aliquandiu acerbissimus dolor: proserpens, cum manifesto caloris sensu, modò à pede, in caput; modò vero, à capite, in pedis pollicem: in quem ubi descendisset, iussimus illic, cucurbitulam illic imponi: ad eliciendum volaticum illum spiritum: qui tam pernici cursu, permeaverat quotidie corpus universum: coque extracto, vidimus illic cessare reciprocos illos circuitus: & agram multò convenientius liberatam, quam quaticos illos quos Gal. lib. 3. de loc. aff. cap. 7. testatur evasisse mortem: amputato illo, quem vipera momorderat, digito. *Nicol. Tulp. observat. Medic. lib. 1.*

*Dolor ventriculi, cum sanguinis vomitu recurrens, in abscessum fundi ejusdem mutatus, frustra curatus, tandem omnino sanatus.*

Sanavi mulierem duos menses ventriculi dolore laborantem primò, postmodum verò sanguinis vomitu, ad libram unam, qui sponte sedatus aliquot dies, nec ullo dolore molestus; quo tandem denuo recurrente, à peritissimis Venetis Medicis eadem curata medicamentis per os exhibitis, in casum tamen, Patavium se contulit, cujus ego in Nosocomio Divi Francisci curationem ita sum aggressus. Primò sanguis educus ex brachio, tum ex pede; atque exhibitum mel rosaceum solutivum; tribus verò aut quatuor post diebus à medicamento assumpto, cum vomisset libras duas circiter puris, cum sanguine mixti, indicium præbuit abscessus in fundo ventriculi, præter continuam quærelam de dolore ipsius partis, nulla licet materia excreta per alvum illi proximam; eidem exhibui postmodum aquam hordei quindecim dies, mixtam cum melle rosato colato, cujus usu vomuit tria frustula tunice internæ ipsius ventriculi, longa, & lata quatuor digitos transversos, non sine multorum admiratione; necnon aliquot dies postea portiunculam aliquam puris sanguine mixti; quibus abstergendis, exhibui aquam Tetturianam quatuor dies, cum melle rosato solutivo; postmodum bolos ex saccharo rosato antiquo, pulvere boli armenæ orientalis & hæmatite, ac dimidia post hora, uncias quinque decoctionis Plantaginis, Polygoni, Balauftiorum, & Hypocistidis; quibus, spatio duorum mensium ægra omnino convaleuit, in hunc usque diem incolumis. *Petrus de Marchau. observat. Chirurgic. sylloge.*

*Dolor ventriculi cum vomitu.*

Petronella Beckman, juvenula circiter 27.

aut 28. annorum, 19. Junij intolerabili cruciatur dolore in alvo superiore, nempe in tota ventriculi regione, qui se modò aliquantum ad dextrum, modò ad sinisterum latus, ut plurimum autem ad lumbos ferè extendebat, atque adeo crudelis erat, ut quilibet adstantes commiseratione ægræ commoverentur. Vomitus aderat, interdum nitior, interdum vehemens, quo omnem cibum & potum evomebat. Subinde etiam vehementiori vomitu aquam quandam nigricantem ad lib. j. vel lib. j. f. ejiciebat, cui aliquantum tenacis pituitæ admixtum erat: huic aquæ, (quæ magna cum violentia evomebatur) ordinariè corpuscula quædam (quatuor vel quinque, interdum plura) innatabant, magnitudinis parvæ avellane, colore & consistentia butyrum recens adeò exactè referentia, ut etiam ipsos butyri mercatores fefellisset. His vomitu ejectis, dabatur aliquod doloris levamen ad duas tresve horas, post quas dolor iterum recrudescebat. Nulla aderat febris, nullus in liene tumor, neque etiam dolor eo usque se extendebat; antea quoque nulla lienis affectus signa animadverta fuerant. Nulla quoque in renibus erat obstructio, nec dolor in ureteribus, urina absque molestia, & satis crassa fluebat; nec calculos, nec sabulum unquam antea, nec postea, nec durante morbo excrevit. Menstrua ordinario modo bene fluxerant, nec ullum in utero vitium percipi poterat. Neque etiam dixit vitio inductus fuerat morbus, neque bilem huc quicquam fecisse docebat vomitus, quo rarò & tantum paucillum flavæ bilis evomebatur. Hæc omnia mihi de loco affecto & causâ mali non parvam dubitationem iniecerunt: judicavi tamen causam morificam vel in ventriculo residere, vel potius e parte aliqua vicina ipsi suggeri, & propter vomitus violentiam ligamentorum comm. unionem etiam lumbis & vicinis partibus dolores communicari. Sed unde igitur iste vomitus aquæ nigricantis, & illud butyrum? non a ventriculo, cum ibi tanta aquæ nigre copia occultari, & talis butyracea substantia in ejus parenchymate inveniri non possit: non à liene nec hepate, cum hæc viscera nullo modo assicrentur: non à renibus, cum dolor in lumbis parvus ac levis esset, nec ullum in urina vitium. Fortassis igitur illa aqua nigricans in mesenterio vel pancreate collecta, atque inde ad ventriculum expulsa fuit; & butyracea illa materia forte fuit bilis aliquomodo corrupta, ac in talem substantiam præter naturam mutata. Atqui tunc talia etiam per alvum excreta fuissent; verum in hac ægra rara erant alvi dejectiones, eaque naturalis coloris & consistentiæ. Ita ut vere fatear, hunc morbum mihi admodum obscurum visum fuisse, de quo nihil certi judicare potui, de quo etiam alij Medici, quibus casum hunc notum feci, non minus quam ego dubitârunt. Curationem aggressurus, cum nihil retineret, primò topicis vomitum sistere, ac ventriculum corroborare visum fuit: in quem finem ventriculum oleo nucis moschata inunximus, eique calide imposuimus cataplasma, ex mentha, rosæ rubris, nuce moschata, gariophyllis, mastiche, olibano, fermento acido & aceto rosaceo concinnatum, quod tota nocte inhaesit, sed nihil profuit. Postquidie à violento vomitu & continuis ac truculentissimis dolo-



doloribus valde debilis erat ægra, ita ut ad spirituum refectionem corroborans medicamentum præscripserim, ex aqua vitæ Matthioli, aqua theriacali, aqua cinnamomi, & syrupo de limonibus, æqualibus partibus mixtis; de quo subinde cochleare sumpsit, & retinuit, cum tamen omnem alium potum evomeret. 21. Junij emplastrum corroborans ex tacamacca, galbano, gariophyllis, benzoino, & similibus concinnatum ventriculi regioni imposui. 22. Junij haustum leviter purgantem exhibui, quem statim evomuit. Tunc clyma injici curavi, a quo bis terve alvum defecit. Horribilis dolor in eodem statu permanit, cui per intervalla vomitus adjungebatur. Præter corroborans ante præscriptum, nihil retinebat ventriculus. 24. Junij, cum alvus iterum non responderet, exhibui pilularum Russi scrup. j. quas retinuit, atque ab his circa vesperam tres sedes habuit. Quia emplastrum ægræ molestum erat, neque levamen adferebat, illud detraxit, ejus loco sacculum lineum imposuimus his intersutum, nempe mentha, absinthio, salvia, floribus chamomillæ, meliloti, anethi, nuce moschata, semine cumini, fœniculi, anethi, qui sacculus in vino forti semel bulliebat, atque tunc expressus candidissime applicabatur. 28. Junij reiteratum fuit enema. 29. Junij circa noctem exhibui philonij Romani cum euphorbio parati scrup. ij. cum pauxillo vini, a quo ista nocte quatuor horis dormivit, cum hæcenus à principio morbi omnes dies noctesque in omnes duxisset. Postridie dolor ad antiquum statum rediit: videbatur tamen calidissimum illud philonium aliquam coctionem moluisse, nam ventriculus subinde ructus aliquos difficiles cum levamine edebat, qui ut facilius promoverentur apozema gratum ex status discutientibus aliisque similibus, præscripsi, sed non potuit retinere. Quapropter circa vesperam iterum exhibui philonij scrup. ij. 1. Julij, ructus faciliores prodibant, illa vespera rursus philonium dedi ut ante. Sequenti die dolores erant mitiores, & vomitus nullus: tunc meridie sorbsit jusculum pulli, idque fuit primum nutrimentum quod toto morbi decursu retinuit. 3. Julij alvus contumax pilulis Russi rursus emota fuit. 4. Julij dolores rursus exacerbati sunt: præscripsi amygdalatum, sed nullam dosim retinere potuit, etiam omnia alia assumpta evomuit, præter corroborans ante præscriptum. Varia topica ventriculi regioni dolenti applicui, sed nihil profuerunt. 6. Julij, rursus ad philonium confugere coactus fui, ejus scrup. ij. s. exlubui, a quo mediocriter dormivit. Postridie dolores erant mitiores, tunc circa noctem eadem dosi philonij rursus data fuit, ut & sequenti die circa vesperam. 9. Julij matutino tempore pilulis Russi purgata est, & vesperi rursus philonium sumpsit, quod etiam sequenti triduo singulis vespertinis temporibus datum est: atque sic hujus usu dolores & vomitus prorsus cessarunt, rediit appetitus, & ægra pristinae sanitati restituta fuit.

23. Novembris iisdem truculentissimis doloribus cum vomitu violento, ut ante, infestata fuit. Exhibitis pilulis corpus expurgavi, & vesperi rursus dedi philonium, cum levamine, in cujus solius usu libenter per aliquot dies continuassem, sed fuit illud medicamentum nimis

suspectum D. Breulio, Medico docto, qui tunc temporis etiam advocatus, maluit topicis, amygdalatis, apozematibus, conditis, aliisve convenientibus medicamentis curat. onem peragere, quæ omnia ad illius beneplacitum, frustra tentata fuerunt. Denique illo non redeunte, ego rursus philonium duodecim diebus continuis circa noctem exhibui, singulis quatuor diebus alvum pilulis citando, atque ita tandem pertinacissimum morbum philonij narcosi & candidissima qualitate evici, a quo sic liberata fuit ægra ut postea toto sexennio ab eodem immunis fuerit, &, ut spero, semper futura est. *Isbrand. de Diemerbr. in observ. & Cur. Medic.*

#### *Dolor ani, quartâ horâ, à solutâ alvo.*

Quantum homini prodest moderata; tantum nocet invicem immodica sanguinis protusio; præcipue ex ani venis. Quæ ditentæ acri ac fervido sanguine, nisi maturè sese exonerent, excitant sæpenumero, vel perniciosa ulcera: vel dolorem sive continuum sive periodicum; Sed raro ita ordinatum, ut invadat delineta aliquâ horâ. Quas tamen interpolatas vices, uti contigit nobis videre, in morbis aliis: sic etiam observavimus easdem, in reciproco harum venarum dolore.

Jacobus Scipio, Vir procerus, sed ventriculi imbecillioris, & lienis summè obstructi, doluit insigniter circa anum, qualibet quartâ horâ, post exsolutam alvum. Quum alios idem dolor soleat invadere protinus, à defectione. Cujus moræ causa, proculdubio, rejicienda est, in lentam illam pituitam, quam frigidus ventriculus continenter immiscuit atrabili, venis hæmorrhoidalibus inharenti.

Sed cur accessit hic dolor præcisè horâ quartâ, à defectione? annon ex natura bilis atræ? quæ uti movetur die quarto: ita fortassis & horâ quartâ? nisi lubeat fortè recurrere; & reciprocum hunc ordinem referre ad abstrusam aliquam causam. Quam equidem in tantis tenebris lubeus discutiendam relinquam sagacioribus ingeniis.

Erat autem hic dolor, aded æcerbus, ut vix fuerit ferendo æger: quocirca nihil non tentatum, quo opitularer homini. Sed præcipuum auxilium tulere sanguifugæ ano adpositæ. Quæ exsurgendo sanguinem, venas distendentem, absorplere simul malignum virus, anum summè excrucians. *Nicol. Tulp. observat. Medicar. lib. 3.*

#### *Dolor ventris quinque annorum atrocissimus curatur per ejectionem substantiæ glandulosa pendenti uncias septem infernè factam.*

Medici hæc potiora putant, quàm certâ morte perire: agens de iis ægroribus, qui ad desperationem laborant, & inter propemodum certos mortis timores, dubiam aliquam spei lucem ostentant, inquit Latinus Hippocrates: & verè ita esse expertus sum in scemina quadam habitante *Heemladii*; pagus is est, juxta arte suâ texendi nobilitatum Harlemense oppidum, non ignobilis. Laborabat jam quinque annis cum hæctica febre dolore ventris intolerabili, quibus, quod alterum accederet malum, paupertas, desertâ est à Medicis, crescentibus autem



tem quotidie, & augeſcentibus doloribus, ipſa ita evaneſcebat & minuebatur, ut tandem umbram ſepulchralem potius referret, quàm hominem.

Degebam id temporis circa ea loca, fugitans urbis frequentiam propter contagioſis periculum; accedentem ergo ad me hanc mulierem, uſus aggreſſus medicari potionibus, quæ bilem, unde ſuſpicabar inter cetera mali originem, corrigerent & depellerent: at illa inter purgandum intolerabilibus cruciabatur doloribus, augeſcebatque medendo indies magis, & macie conſumenda, doloribusque enecanda videbatur: ſuſpicans igitur altius latere morbi cauſam, omnia tentanda ratus priuſquam eam deſererem recordatusque ſuperius allatorum verborum Celiſi, vegetiore quodam emetico, quo ſape in deſperatis felici cum ſucceſſu uſus ſum, morbum aggredior, cum apoze-matibus cholagogis, aliſque medicamentis me jam vel ſatis præparaviſſe materiam, viſque, qua pertinax malum educerem, diſpoſuiſſe, vel pluſ, quàm ſatis operam, ſi nihil effectum eſſet, fuiſſe exiſtimarem. Sumit illa potionem, nihil evomit, ſed poſt copioſas doloriſque plenas dejectiones, tandem prodit inferne corpus quoddam glanduloſum tres palmas longitudine, latitudine binos adæquans digitos, quod ſeptem pendebat uncias; ſequitur id ingens copia ſanguinis, & mirum dictu, femina ſe recreatam ſenſit, & poſtmodum convenientibus ſecundum rei exigentiam medicamentis curata, proriſus convaluit. Tanti eſt ægros altero jam pede cymbam Charontis prementes, aliquando generoſa manu revocare, & vitæ aſſerere. *Theod. Kerckringius in Specilegio Anatomico.*

### Anatomica inſpectiones.

*Gravis Cap. dolor à Sero in ventriculis cerebri, Vaſis meningum ſanguine ſæcumento turgidis, & ab ulcerato ventriculi oriſicio.*

Juvenis robuſtus cum lauto convivio interfuſiſſet, eadem nocte dolore ſtomachi correptus fuit, qui ab initio mitis, ſed poſt auctus & vagus factus eſt: nunc de dolore acutiſſimo Capitis, mox, & in ipſo momento, de maximo cruciatu oris ventriculi, ventris & artuum conquerebatur, cum vomitu omnium ingelto-rum, quandoque febris adfuit continua, anorexia, vigilia, à prædictis doloribus vagis ejulare cogentibus: multa à D. Roſcio. fruſtra præſcripta, nam poſt tormenta 18. menſium, tandem anno 1599. obiit.

Inſpecto Cerebro, in ejus ventriculis ad duas libras aqua limpida inventa; arteriæ item & venæ membranarum cerebri ſanguine craſſo & ſæcumento turgebant: In ventriculi oriſicio ſuperiori, parte anteriore, ubi ramus ſextæ conjugationis inferitur, ulcus erat magnum ac foetidum, in vacuum uſque ventriculi penetrans: cetera in ventre inferiore rectè ſe habebant: Ventriculus præterea humoribus corruptis, foetidis & atrabilariis reſertus erat: *Fabricius Hildanus Centur. 3. Obſervat. 20.*

*Capitis dolor à ſero ventriculos replente & ſpatia intra meninges &c.*

Iſperlinus Victor 70. annor. anno 1657. phthiſi obiit, ſere ad ultimum uſque halitum loqui poterat, ac ingentem dolorem in utraque temoris interna parte pertulit, quin etiam aſſidue Caput doluit.

Remoto cranio, plurimum ſeri ſubpallidi in omnibus ventriculis & ſpatio intra meninges reperi, ita tamen ut cerebrum nondum compri-meret: Quin etiam univerſa anfractuſum ſuperficiæ humore ſuperfluo lentoque, ceu gelatina, oblita erat: Si ſuperficiem illam ſan-ciavi, extillavit ichor ſeroſus. *Joan. Jacob. Weſperus Exercitat. de Apopl. pag. 300.*

*Capitis dolor à colluvie ſeroſa in cerebro, & corruptione omnium principum viſcerum.*

Inter alia ex cadaveribus notata, hanc in Jurisprudentiæ ſtudioſo obſervationem ante aliquot anno notavi Caſſellis Cattorum, Excel. D. Weſpero Med. D. & Practico Schaphuſiano Celeberr. Medico ſane in Anatomicis curioſiſſimo, communicavi; quam & Tibi Excell. Vir, tanquam amico integerrimo negare nolui: Hic juvenis xxx. circiter annorum, ab amico amice exceptus, & domum redux, poſt exacerbatum Capitis Dolorem multa evomit, Palpitationes cordis, Tremores artuum, Con-vulſiones ſubſequentur, & ſequenti die delu-bito moritur.

Judicis juſſu apertum cadaver: omnia penitus viſcera principaliora corrupta fuerunt inventa: Ventriculus intus coloris viridis, in quo materia quadam cineritia erat contenta: Intestina gangrenosa, flatibus turgida & vermibus dimidi cubiti ſcatentia: Hepar corruptum: Pulmones flaccidi, coloris albi, hinc & inde exulcerati: Cor lividum, contractum & cruore quodam nigro repletum: Cerebrum ſeroſa colluvie uſque ad principium nervorum repletum; Cutis exterior maculis rubris inferius punctata, ſuperius inſtar apoplecticorum coloris nigri & ſubviridis, foetidiffimo odori, licet ſtatim poſt mortem cultro anatomico ſub-jiceretur corpus, adſtantium nares inplebantur.

Ita ut non exigua veneni exhibitæ quæ igno-tuerint, cujus tamen nemo reus inventus, utur etiam curioſe inqueſitum fuerit: Agrotans ipſe mente adhuc conſtans aliquid extra prandium aſſumpſiſſe negabat, Ita ut Judicis & Medici judicium ſuſpenſum, & inſignis cujuſdam malignitatis venenatæ, in ipſis corporis penetralibus progenitæ, ſuſpicio ſalteni relicta fuerit, quæ quomodo tam brevi temporis ſpatio omnia viſcera corruerit, & ad vitæ continua-tionem inepta reddiderit mirum eſt, cum antea ſemper agrotans firmiſſimæ & robuſtiſſimæ fuerit conſtitutionis. Ex communicatione. *Excellentiſſ. & Clariſſimi Dom. D. Ludov. Her-manni Combach. aule Haſſiæ Medici.*

*Capitis dolor à pure inter piam matrem: & ce-rebrum contento, illuc ab inflammatis pleura & pulmonibus delato.*

Domina de Chalange, Brito-Galli, Lute-tiam



tiam venit Medicorum consilium contra fluorem muliebrem expectitura, Paucis ab adventu diebus magnus eam lateris dolorprehendit, comite febre: Dom. D. *Magnum, Durem, & Reboursius* convocati fuere, qui pleuritide & peripneumonia simul eam affectam judicarunt: Quamvis eodem tempore fuere mensis, præscriptus tamen clyster, nec non sanguinis missio, quam ægra omnino tenuit: Postridie, morbi septima, quod ingravescerent symptomata, phlebotomiam admisit: Dom. *Durem* his singulis diebus illam visitabat, prædixitque si superveniret capitis dolor cum pruritu, mortem sequenturam, translata scilicet materia peripneumoniam efficiente ad cerebrum: Postridie dolor capitis cum prurigne successit, paucisque post horis interit:

Quarta aut quinta ab ejus obitu die, Ego, Domini Reboursius & Viardus, Sacrificuli cadaver aperuimus, pleuritide & peripneumonia complicatis interempti, cui quoque accessit Capitis dolor, exploraturi num præmissum prognosticum veritati esset consonum, ac num humoris iacta esset a pleura ad caput metastasis? Dempto cranio, omnia pure resecta comperta sunt, intra piam matrem & cerebrum, ut in prædicta matrona, concluso: *Ambr. Paræus Oper. lib. 14. cap. 68.*

*Capitis dolor ab abscessu seroso, natibus cerebri & infundibulo adherente.*

Puella 12. annos nata, temperamento pituitoso & pingui habitu prædita, maximo dolore huxo verticis laboravit per quatuor menses: Vocatus ad ejus curam, eam ferè inveni sine febre sed omnia alimentarejcientem, aqua autem sola cum saccharo per multos dies vitam traduxit: solum de dolore futuræ coronalis conquerebatur: Frustra fuere omnia remedia: nullus aderat tumor vel rubor: Tandem mors tuem miseris & doloribus imposuit:

Aperto capite, omnia optimè conformata & sine corruptione (præter spem tamen) reperiuntur: extirpaveram enim pus copiosum latere, præcipue quoniam paulo ante obitum per oculus dextrum aliquid purulentum amisisset: Sed cum de causa agnoscenda desperaremus, dum curiositatis gratia Rete mirabile & alias partes Chirurgus discipulis suis demonstrare voluit, digitis abscessum rupit, natibus & infundibulo cerebri inhaerentem, ex quo statim aqua clarissima cum impetu & ad libras duas exivit, quasi e fonte scaturiens & in altum protiliens. *Petr. Borell. Cent. 1. Observ. 37.*

*Capitis dolor ab inflammatis cerebri membranis, Abscessu in parte cerebri sinistra, cum suturarum in cranio defectu.*

Ornatissima Matrona Elizabetha Erot, Uxor Johannis Norry Horologiopæ Lugdunensis, annos nata 23. Eufarca, bonæ formæ, staturæ commoda, cline sublavato densissimo, leni animo, &c. Nonum tertiarum suarum graviditatis mensem paucis abhinc diebus ingressa, immani capitis dolore, eoque ejulabundo premi cœpit, circa ultimos mensis Novembris dies, hujuscæ anni 1673. Quo nomine ad ipsam accersitus fui

postrid. Kl. Decembr. St. N. Accedens mirè inquietam ac plangentem mulierculam ostendo quanqu in *scripso*. Dumque in causam & sedem tantorum dolorum inquiri, tum ex ipsa, tum ex adstantibus accipio, a multo tempore cephalalgia vexari solitam, nunquam tamen tam gravi quam impresentiarum, imo patios hujusmodi *curiosus* ipsi fuisse, a septimo vel octavo ætatis anno, quo Variolis fuerat confictata: a quo etiam tempore auris sinistra ipsi purulentam materiam perpetuo hæcenus eructarat, quæ nunc longe parcius quam solet, effluebat. Percontatus qua parte præcipue doleret caput, medium sincipitis verticem manu designabat, quam partem atlantium palmis vehementer conprimi aiebat in doloris solatium. Infuso enemate, cum alvus esset attracta, missoque ex brachio sinistro sanguine longe corruptissimo, nec non sotu lactis tepentis supra caput instituto, detonso prius capillitio, injectione item in aurem sinistram detergente præscripta, tentavi dolorem placare. Die septima mensis iterum vocor, video dolores non modo non remissos, sed increvisse, & mulierem tremulo brachiorum motu *anxiosè* aliquid pati: denuò itaque & enema repeto, & e brachio missionem cruoris, qui corruptissimus apparuit, æque ac præcedens. Postridie partus dolores invadunt, & circa sextam matutinam puellum sanum ac vegetum feliciter enititur. Tunc verò spes affulgebat plerisque omnibus, dolores capitis per lochiorum effluxum conquieturos, ideoque totum negotium Naturæ magisterio relinquendum. Veruntamen die Decembr. 16. & 18. accedens, pessime solitis doloribus capitis confectam video, cum motibus illis utriusque brachij convulsivorum æmulis. Infuso enemate, Catapl. de mica panis impero capiti super imponi, deinde Catapl. Vigonis ad commotionem cerebri. Sed artem atque naturam vincente dolorum acerbitate, occuluit tandem repente optima femina, die 19. ejusdem mensis circa septimam matutinam.

Funesta hujusmodi catastrophe ad investigandam mali causam nos excitavit, quam Cerebri abscessum conjectabamur. Quapropter sub vesperam cadaver apertum fuit, & primo quidem Caput. Crani ergo fornice remoto, quem *propheta* totum deprehendimus, ambo Cerebri orientia inflammata conspicati sumus, quibus incisis, abscessum statim deteximus, in parte sinistra Cerebri stabulantem, peculiari quidem folliculo involutum, sed quem paulo ante sponte ruptum subita necis causam fuisse judicavimus. Processum auricularem ossis petrosi, intra crani cavitatem conspicuum, dura meninge adhuc tectum, ea remota observavimus sublividum ac cariosum, ita ut specilli cuspidem tactum in pulverem nullo negotio comminueretur: Quod ad truncum corporis, nihil in ipso desideratum: Hepar amplissimum erat, Lien parvus, Pulmones ac Renes inculpatis, Cor maximum, quale nunquam hæcenus nobis visum: Uterus crassius tres pollices transversos circa fundum, & sanguine adhuc turgidulus, dum incideretur apparuit: qua vero parte versus orineium internum tendebat dissectus, candidiorem & *albidam* substantiam exhibuit. Ex *communicatione benevola Clarissimi & Excellentiss.*



*D. D. Car. Sponii, Regis consularii, Vice Decani  
Facultatis Medicae Lugdunensis &c.*

*Capitis dolor à sero flavo represso Tineam prius  
excitante, unde cerebri & membrana-  
rum corruptio.*

Capitis doloris causæ sunt (quamvis hi casus sint rariores) abscessus & tophi Gallici, & caries ossium: Habui proximo anno Monachum ex S. Justina, qui laborabat per decem annos capitis dolore, & singulis annis ultra tres libras usus est Philonio ad dolorem leniendum: Erat autem dolor ex tali causa, nam per terebrationem inveniebatur caput pluri-  
ma pituita refertum, & os corruptum, tandem obiit: Quod ipsum etiam, dum essem junior, vidi in quadam muliere, cui substantia cerebri plane erat corrupta ex multis lotionibus, cum laboraret tinea.

Aperiui illam cum D. Tiberio, & invenimus in parte sinistra materiam cum aqua flava, & membrana erat corrupta. *Herc. Saxoniae Panthei lib. 1. cap. 2.*

Observarunt primarii Medici post diuturnos capitis dolores Syderationem meningum ipsius cerebri evenisse *Ballonius Hist. 4. lib. 2. consil.*

Continuis & gravibus capitis doloribus affligebatur vir triginta annorum per annum dimidium: Post obitum meningis tenuis nigricans, tum in superficie, tum inter anfractus corticis apparebat. *Rolsinkius Trallac. de Dol. cap.*

*Capitis dolor ad occiput & spinam protensus,  
à meningum inflammatione, quam  
sequuta sideratio.*

Quidam natus annos 30. sapius in dies ebrius, cum à forensi tabula alapa vapulasset, pacem cum illo initurus in noctem vino Hispano saburratus, sævissima cephalalgia, cujus dolor etiam occiput spinamque occupabat, cum omnium sensuum dejectione corripitur: ab amico, in cujus domum pro semi mortuo delatus erat, sub medinocium vocatus, cum viderem assidue exiliantem, corpus corybantis instar, & pedes maxime manusque jactantem, nec verbum, etsi aciculis à me premeretur titillareturque, proferre valentem, dico videri mihi cerebri sphaelo correptum: nam aliquot ante diebus nunquam sobrius, convitiis verberibusque combibones plerosque male mulcavit: Acutissime febricitabat, & tamen potum omnem respuebat, validisque manibus, dum vires tulerunt, à labiis admota cymbia amovebatur: rubebat facies cum tumore: rubebant & oculi, quorum fixo obtutu conspectos phanatici instar terrebat; Prescripto quando aliud non licebat, clystere validissimo, ad lectum rediit, mane quietissimum inveni, movendi scilicet vi per languorem abolita: Silentium tantum ut vultu barba, punctaque acu aure, vocem nullam ederet, abolito nimirum omni sensu: Cum venæ sectionem vires non permitterent, cucurbitulæ applicatæ, admota quæ ratio dictabat, sed invita Hygieia omnia, die enim tertio ebriam efflavit aulam.

Amicis cum qui alapam dederat in jus vocantibus, à Magistratu caput (cum cerebrum sphaelo correptum assererem) aperire jussi: Invenimus meningas valde lividas omninoque syderatas; quas cum Judices mortis causam dedisse, huncque sphaelum non alapæ, sed jugi ebrietati, quæ inflammationem cerebri conciverit, tribuendum Medici crederent, ulterius stum non est: scetore maximo nasos omnium in alia omnia trahente. *H. ab Heert Observat. Med. 17.*

*Capitis dolor à phlegmone cerebri partem posteriorem obsidente, subsequente sphaelo.*

Nobiliss. juvenis annos natus 17. sub cane in gravissimum & acutissimum dolorem capitis incidit, qui ad posteriora & latus sinistrum magis porrigebatur; aderat obscura & levissima febris, sensuum vigor, gustus præcipuus cum his nihilominus sitis & vigilæ perpetuæ: frons nihil incaluit, caput parum, ex tactu licet duro, non dolebat: appositis ad frontem manuum una, ad sinistram altera, cerebrum intus concuti ac convelli sentiebatur: ac caput universum involuntariè sublecebatur: urina in principio crassa & alba: Quibus animadversis, phlegmonem in cerebro metuentes, vel erysipelas, sanguinem mitti &c. jussimus Quarto morbi die in lingua latere dextro erupit tuberculum, quod durum & cavum & sine sensu ulcerosum deprehensum est, carcinoma scilicet. Septimo sub vespere paululum deliravit, mox sudor in facie primum, deinde per totum corpus copiosus obortus est, ita ut veram & perfectam crisin adfore speraremus: Dum amovenitur stragula & sudor abstergitur, illum ferme resolutum invenimus & continuo delirantem: Vires quæ ante sudorem fuerant prævalidæ, omnino fractæ percipiuntur, atque in eo statu nocte tota usque ad horam 8. diei 9. matutinam persistit, garrulus supra modum & insipiens, & immemor omnium quæ sibi in morbo contigerant vel facta fuerant: Circa 10. respiscere visus est, quorundam reminisci, & sic spes animis addita fuisset, ni pulsus convulsivus, artuumque tremor cerebrum pessimè affici indicassent: In procinctu urinae excretio copiosissima, quæ rubra & igneo splendore coruscabat: Simili hora, quæ pridie sub vespere, rursus ægotantem invasit delirium, in eo pejus, quod cum rursus vires constarent factus phreneticus, adstantes summo terrore prostrigabat: Nona matutina iterum respicit usque ad vespere, sub quam tumor exortus est in cervice, pomi mediocri magnitudine, non dolorosus neque à cute diversi coloris, nec minus delirium juvenem occupavit cum manuum motu convulsivo: die 10. omnia similiter se habuerunt: Sub finem 11. convulsus moritur.

Cadavere dissecto, cætera corporis partes inculpatæ repertæ sunt præter cerebrum: aperta quippe calvaria magna copia sanguinis nigerrimi, etsi diluti, illico affluxit, intravit adhuc meningibus, imo ossibus vix diductis ad serræ capedinem; qui quidem sanguis inter calvam & membranas effusus ponderis lib. 11. vel pluris æstimabatur: Ubi detectæ



sunt cerebri tunice, mox universum venulis nigro torridoque sanguine turgentibus conspersa apparuerunt: Pars autem posterior duorum digitorum latitudine, longitudine quatuor, ubi torcularis sedes definitur, non solum nigricans, sed præterea membrana puniceo colore & gangrana correpta visa sunt: In qua parte dum scalpellum adigi iussimus, protinus inde materia purulenta ad unc. vi. cum fœtore emanavit: Novacula altius adacta, tota fere basis cerebri, imprimis cerebellum, & ea pars spinalis medullæ quæ primis vertebri excipitur, & super qua tumor apparuerat, sphacelo similiter correpta sunt inventa: meninges verò partis sinistræ ulcusculis exesæ, per quæ sanguinem sub calvæ effluxisse verisimile est: *Henric. Rufus ad Lazar. River. Observ. 21.*

*Capitis dolor à totius cerebri Phlegmone quum sequuta ejus necrosis.*

Multos vidimus qui cerebrum sphacelatum (hoc est principium ad sphacelum, ut Galen. statuit) habebant: tamen nonnulli (contra Hippocrat. sententiam qui intra triduum perire asserit) pervenire ad 14. diem; Alii ad 7. alii ad 10. & non sunt sanitati restituti, & horum calvarias aperientes, totum cerebrum penitus sphacelatum, id est, corruptum invenimus: Hoc mihi videre contigit in Illustriss. Comite N. qui 6. die à sphacelismo obiit: Cum Galen. igitur in genere dicimus, cerebrum corruptum habentes nullo modo posse supervivere; imo brevi moriuntur, non tamen in 3. diebus: Nam virum quendam robustum vidimus qui usque ad 14. diem pervenit: Etsi petas, quonam modo cognosci potuit jam cepisse corruptionem, Respondemus ex vehementissimo dolore quem patiebatur zger, tum putamus sphacelum & corruptionem cepisse, 4. die effectus est attonitus, 8. die omnes sensus amisit, 14. die obiit: Huic ablata calvaria totum cerebrum corruptum invenimus: *Brassavolus comm. ad aphor. 51. lib. 7.*

*Intolerabili capitis dolore in quodam affecto à diuturna lue, Cerebrum pene consumptum repertum est: Cerebri ἀνάλωσις.*

In Xenodochio S. Petri & Pauli, Andreas Lippeneus, scortorum amantissimus & perditissimus, post diuturnum morbum Gallicum, variaque symptomata, tandem in crudelissimum capitis affectum incidit, cui nullæ auxiliatrices manus profuere, dixit quater repetita, bis suffumigiis factis, & quinquies inunctionibus administratis: Nihilominus noctu diuque, sed tamen magis noctu cruciabatur, ut frequenter manus sibi violenter inferre tentaret: Demum empiricus quidam doloribus quasi enecato zgro & veluti desperato, nobis nescientibus, pisces, tenchas vulgò dictas, plantis pedum alligavit, & fere per totum diem ac sequentem noctem detinuit: At paulatim viribus animalibus & vitalibus in tanto cruciatu deficientibus, hanc miserrimam in meliorem commutavit vitam.

Quo defuncto, facia est disseccandi pote-

tas: factis ergo necessariis sectionibus, cranium ferra orbiculatim aperto, & à suis membranis, dura & pia matre liberato, Nihil cerebri in toto cranio reperi, præter quandam mucositatem & phlegma valde indigestum, quod vix quartam cranii cavitatis opplebat partem: Interim tantus fœtor ex pedum plantis, quibus admoti fuerant pisces, emanabat, ut nulli assistentium ibi adesse licuerit: Unde raptim aperto abdomine, festinanter visis intestinis & naturalibus visceribus, cadaver sepulturæ tradendum reliqui. *Ex Observation. Dom. Dom. Garneri.*

*Atrox capitis dolor ab arteriis carotidibus induratis: Aqua collectione sub pia matre, & Arenulis in Glandula Pineali.*

Elizabetha Joppen per 25. annos intolerabili capitis dolore cruciabatur, qui dum primo alimenta masticare inciperet, vel aura tempestuosa adveniret, ita exacerbabatur, præsertim in latere dextro, ut lacrymæ fontium ad instar ex oculis erumperent, ac ejulatu domesticos & vicinos defatigaret: Ad inauditi hujus capitis doloris ablationem plurimum Medicorum auxilia frustra imploravit, & tandem 9. Martii anni 1669. ex hac lacrymarum valle ad superos migravit.

Aperto ejus cranium invenimus 1. sub pia meningē magnam quantitatem aquæ limpidæ. 2. Ventrículos cerebri simili liquore repletos. 3. In glandula Pineali plurimas arenulas asperas, quarum aliquæ calculi nomen propter magnitudinem merebantur. 4. Arterias carotidas, curiosissimo spectaculo, ita induratas offendimus, ut externa facie calculosas, sive in lapideam substantiam mutatas eas judicaremus: sed illis apertis, observavimus earum lateribus materiam callo-lapideam accrevisse: Per harum arteriarum medium sanguini adhuc quodammodo concedebatur via. *Ex Observation. Regneri de Graaf. Med. Delphensis, in Miscell. curios. ann. 1670.*

*Capitis dolor à nimis arcta Sutarum compage.*

Provida natura perforatam esse voluit Calvariam, variisque futuris distinctam, ut purgando à recrementis cerebro nusquam occasio deesset: Quod autem Sutarum hunc usum inter cætera præstent, præter Galeni & aliorum testimonium, nos etiam ipsa experientia docuit: Patavii juvenem quendam secui, qui diutino capitis dolore vexatus nullis remediis sanari potuerat, In cujus calvaria vix suturarum vestigia apparebant, adeo erant compacta, ut in unum coacta capitis ossa viderentur: Quamobrem pro comperto omnes habuerunt, non aliunde ingentem, ac fere continuum capitis dolorem, profectum esse quam ex arctissima illa ossium compositione, ex qua nullus exitus patebat fumidis illis crassisque vaporibus, qui & perpetui doloris causa fuerant, & tandem mortem intulerant.

§. 2. Sed neque semel id mihi contigit experiri: complures enim secui qui dum viverent in frequentem capitis dolorem incidere solebant, in quorum calvariis exiguas futu-



ras, & eas coagmentatas invenimus, neque in vicis modo, sed etiam in muliere, quod mirum fuit, ut vix credibile: nudatum enim ac decedenti illius caput fere sine futuris offendimus, & hæc pariter multo magnoque capitis dolore quam diutissime affecta atque afflicta, postremo Phrenesi laboravit & mortua est. *Columbus Anat. lib. 1. cap. 5.*

*Dolor capitis à Sutarum Dissectione.*

Solutio continui contingit aliquando in cerebro a causis internis, ab humoribus nempe biliosis aut salis & rodentibus: aut ab humorum & vaporum copia, qui distendendo dissolvunt continuum. Vera autem tanta est aliquando ut junctura solvantur magno spatio, auctore Agneta, Quod vidimus anno 1593. in filio Domini Merindoli Aquensis, & ejus capite dissecto effluxit ingens copia serosi humoris, qui in ventriculis & tota cerebri substantia inclusus manebat: Distabant autem suturae quatuor fere digitis à se invicem. *Jacobus Fontanus practica lib. 1. cap. 3.*

§. 2. Anno 1622. quo ingens pestis in Polonia grassabatur, tanta fuit ejus savitia, ut in demortuis rumperentur & suturae divisae apparent.

*Ingens capitis dolor ab ossis sincipitis dextri carie & Sutarum obliteratione.*

Hæmicæ ulcus caput hominis invaserat in parte ejus dextra, quod malignitate sua ad cranium usque, sine tamen huius suspitione, serpsit, ut incredibilibus doloribus capitis mors lenta succelleret.

Cranium defuncti accuratius consideravi, os sincipitis dextrum, à sagittali futura ad temporalem, profunde caries corruptit, excavata prima lamina, & secunda transparente: Ex serpente carie reliquæ partes externæ utriusque bregmatis, asperæ & inæquales sensibus occurrunt, foraminula multa sunt pervia, præsertim ubi venæ transire solent: Prope lambdoideam caries bregmata separavit & manifestiora foramina hiant, Secundum crani longitudinem diffunditur caries, salvis, ossibus temporum, quod in crani cavitae clarius apparet: nam os infinitis porulis ab ossis sincipitis ad cristam, quasi acu diligenter pictum cernitur; Obliteratione fere sunt suturae sagittalis & coronalis, quanquam in homine, necdum senium prospiciente, ut mirum non sit quod internis injuriis expositus fuerit, ob impeditum vaporum exitum. *Thom. Bartholinus histor. 8. Centur. 6.*

*Capitis dolor à carie cranii parte interna juxta cerebellum.*

Juvenis diu capitis dolore vexatus, tandem ab Epilepsia vehementissima extinguitur. Diligenter calvaria ossis, in posteriori parte externa, perspecto, nullum ibi morbi signum fuit: quo perpetuo dolebat, at capite adaperito, ossis posterioris interiorum partem, juxta cerebellum cariem satis notabilem contraxerat. *Zacchius consulti. 9.*

*Capitis dolor à Carie cranii & adhesionem cum membrana.*

Quidam diuturna cephalalgia mirè torquebatur. Omnibus incallum tentatis, quatuor vesicantia cervici & scapulis affixa primum profuere: pilulis deinde Cocciis irritata alvo, quum tamen dejecisset, dolor aliquantulum remisit, qui tandem hypocausto cessasse visus: Graviorem autem fuisse mali causam paucis post annis docuit eventus.

Inopinato enim bidui dolore quum succubisset ille, aperto cranium, cerebri membrana glutinosa huius ore obfusa, quibusdam locis vix avelli potuit, osse passim carie corrupto, qualem in aliis cadaveribus deprehendi: unde huc infestati Venerea, sævis admodum capitis doloribus ab acri & venenoso humore nunquam excarnificantur. *Rhodius Centur. 1. Observ. 74.*

*Capitis dolor ab adhesionem crassa meningis cum cranio.*

Philosophus quidam intolerabili capitis dolore tenebatur: pars dolens in sincipite magnitudine digitum non superabat.

Aperto capite, crassior membrana ea parte in qua dolor excitabatur calvaria adhærebat, pauculo humore putri interjecto. *Fernelius lib. de Abditis. cap. 15.*

*Capitis dolor ab humore maligno cranium, Subdites membranas ipsumque cerebrum exedente.*

Rem in hydrargyro admiratione dignam, à nullo quod sciam animadversam contemplerur: hic enim si quis rerum eventus bene observet, non modo pituitosis morbis obnoxia nostra reddit corpora, partesque omnes, imprimis carnosas suo frigore & humore lædit, verum ita labefactat, & sua qualitate imbuat, vix ut corpus febre corripi possit, etiam si multa scateat cacochymia. Anno à Christo 1556. Coriarius quendam Tonsor ut inviserem rogavit, rarum affectum & observatione dignum me visurum dicentis. Is tamen si annos amplius decem post curationem, per hydrargyrum, ita salubriter exegerat ut videretur percuratus: repente tamen exorto in sincipite dolore diutius perseverante, non modo ejus partis os totum paulatim computruit exesumque est, ut frustulatim excideret, sed & cerebri utraque meninx eadem putredine absumpta, subiectaque cerebri substantia in abscessum conversa est, unde magna puris copia (miserabile visu) per multos menses, non ex ea tantum parte, sed ex utriusque oculi angulis etiam stillavit, dentes exciderunt omnes: Hic tamen neque febre corripi visus est, neque cibi fastidio multum premi, neque extenuari, dum ad ventriculos cerebri ventum est, quo tempore mors repente hominem diu misere afflictum à medio sustulit. *Fernelius lib. de Lue Ven. cap. 7.*



*Capitis dolor à Cranio sphacelato, Ichore putrido supra meninges corruptas, & Corrupto cerebro nervisque optici.*

Taurini Quæstor quidam jam menses aliquot in omnes peregerat ex gravi capitis dolore circa *incipit ac tempora*, ob Venereum morbum: Ab omnibus oppidi Medicis opem acciverat, verum morosus præfidiis non insiltebat, Hic quoque ut illum inviserem rogat: consului ut capiti caustica aliquot apponerentur juxta proximas commissuras & super partes dolore infestatas, quod statim consilium difficilis æger recusavit: Ego vero Taurino secedens hunc non vidi unius mensis intervallo: Tandem iterum rogatus illum adivi, quem penitus lumine orbatum offendi, oculi tamen nil extranei pati videbantur, &c. Ego illi tunc persuadere nitebar ut pateretur cranium perfodi, renuit: Tandem ut causticum sincipiti adhiberetur ubi magis premebat dolor, fuit contentus, noluit tamen ferre ut apertum servaretur: sic statim decisa crusta sponte cicatricem obduxit, quare illum invisere destitit: Hic demum 60. dies post ad superos migravit.

Eum secuit L. Montanus, ubi cranium ad coronalis & sagittalis commissuræ regionem sphacelatum putridumque invenimus, coronati regionis latitudine: statimque cranium serra aperto, abundans ichor putrilaginosus; instar aquæ, fuligine fumarii & croco aspersæ profluxit, tum per ossis aperturam, tum per aures & nares, membranaeque putidæ recta ad os affectum, verum adhuc integræ erant. quæ solo tactu facile rumpebantur: corruptum & cerebrum & nervi optici, cætera verò viscera omnia integre habebant: Censendum est huic potuisse conferre à doloris principio caustica, vel postea ossis effossionem, rationi si obtemperasset dum præbebat occasio. *Leonardus Botallus de Lueveræa cap. 16. §. 17.*

*Capitis dolor ab interiore cranii tabula carie affecta.*

Vir 30. annorum, non sine Venereæ luis suspicione, continuo capitis dolore laborans, post obitum aperiebatur, interior tabula cranii semicariosa apparebat. *Rolfinkius Tract. de dolore capitis p. 106.*

Juvenis quidam, cum per aliquot annos gravi ac perpetuo capitis dolore laborasset, tandem moritur, quem Medici tam diuturnæ cephalææ investigandæ causa dissectantes, interiorē cranii tabulam semicariosam, tanti doloris causam extitisse invenerunt. *Ex Petri Sphererii Medici Florentini Observationibus.*

*Capitis dolor à styli frustulo in cerebro relicto, ingruente tantum pluvia molestus.*

Joannes Vestingius ante suum iter in Ægyptum, ubi quinquennium Cæri Consuli Venetorum valetudini adfuit, corporis humani dissectionem Venetiis publice instituens, in cerebro mulierculæ styli, seu pugnunculi sub-

tilioris frustulum reperit, quod ipsa quinquennium gestaverat sine omni molestia, nisi quod ingruente pluvia caput doleret. *Joannes Rhodius Cent. 1. Observ. 32.*

*Dolor capitis acutissimus, ex materia quadam lapidea dura meningi adnata, aculeis tenuem perfodiente.*

Nobilissima N. dolore capitis acutissimo diu confictata fuit, coque pungente admodum, instar acuum vel telorum parti intinctorum, interdum vehementius interdum minus ipsam divexante: doloris vehementia pressa ejulabat, & ambabus manibus caput prehendebat: ad quem dolorem sedandum sæpe detractus sanguis: parti dolenti, cui instar verrucæ cujusdam callus inerat, adnotum fuit pyroticum, & ad cranii perforationem deveniendum instabat Don. Pimperuelle: Hæc deinde in hydropem incidit, tandemque interit.

Aperto cranio, inventus sub crassa meninge, juxta canalem anteriorem, seu torcular utrinque, indurata quædam materia & lapidea, instar cujusdam rupis inæqualis & aspera, aculeis multis, & veluti cati unguibus, conchyliis, varisque figuris distincta & variegata, ipsique crassa meningi firmiter adhærescens, inter cujus inæqualitates venulæ ferebantur ad ligularum ferramentorum magnitudinem accedentes, quæ hanc materiam rigabant: supra tenuem meningem humor quidam mucosus repertus est. *Catherinus Observ. Medic. 15.*

*A lapide in posteriore parte capitis, inter duram & piam matrem.*

Intra Calvariam. hoc est in cerebro, si generetur lapis non solum cephalalgia simplex, verum etiam longè severiora symptomata sequuntur: Vidi id in puero decenni, qui quum per gradus decidisset, & posteriorem partem capitis gradibus alluisset, cerebrumque inde concussum fuisset, non solum sequutus est dolor capitis continuus, sed & plurimi & graviora accidentia, quorum omnium causam in dissectione reperi.

Aperto enim capite, lapidem ex gypseâ materia concretum & membrana inclusum, in posteriore parte capitis, sub sutura lambdoideâ, inter duram & piam matrem, inveni, adeo adhærentem duræ matri ut non nisi violenter avelli posset. *Fabricius Hildanus Cent. 1. Observ. 11. & Cent. 5. Observ. 1. ex Kentmanno.*

*Cephalalgia à calculo in cerebro nato.*

Quidam diuturno atque intolerabili capitis dolore adeo fuit excruciatuſ ut dies noctesque nullam quietem caperet: Eum autem sibi mori usi contractum assererat: Medicus curæ adhibitus nihil intentatum reliquit, sed tandem æger perpetuis doloribus, usque acerbissimis superatus, esse desit.

Prædictus Medicus, (*Pfist*) dissecto ægri capite, in cerebro lapidem reperit magnitudine &



& forma mori, colore quasi pullo aut cinereo.  
*Konimannus libello de Calculis.*

dolore fatigata, in osse calvariz unciarum duarum Mercurii inventa fuerunt. *Zwingerus Theatrum f. 520. Ex Cardano de subtil.*

*Globulus plumbens menses sex, nullo sympto-  
mate superveniente, in cerebro delitescit.*

*Capitis dolor pruriginosus à pediculorum cater-  
va sub pericranio & intra crani  
diploma latitante.*

Globulum plumbeum Vir Reverendissime, &c. In vacuo ventris, aut inter musculos, ad multos annos interdum delitescere posse experientia testatur: In cerebro vero id fieri nusquam visum esse arbitror: Attamen retulit mihi Joannes Griffonius, apud vos olim Chirurgus, casum tam admiratione quam annotatione dignissimum: nimirum tempore belli inter Ducem Sabaudia & Geneveses, in expugnatione Castri, *La Cluse* dicti, quendam ex Genevensibus, Clerget nomine; ictum sclopeti in fronte cum insigni fractura crani accepisse: Egro semimortuo Genevam adducto, se methodicam instituisse curandi rationem, imo ossa non pauca extraxisse, globulum tamen nullum se offendisse affirmavit: Nihilominus miserum hunc pristinae sanitati restitutum fuisse, & semestre post curationem incolumem vixisse: Cum vero morbo acuto tandem obiisset, cranium ejus aperuit, & globulum è regione verticis, inter cranium & duram matrem, ad latus Suturae rectae invenit, membrana tamen plane à globulo illaesa: Natura enim ea in parte materiam quandam callosam procreaverat, quae duræ matri ad instar culcitrae subiacebat: *Fabritius Hild. Cent. 1. Observat. 2.*

*Capitis dolor lethalis ab ossiculis circa  
falce adnatis.*

Dissecui corpus sexagenariae, in cujus capite, parte interna duræ matris, Falce dicta, reperi sex ossicula lata, quorum quædam quatuor, alia quinque aut sex eminentis, cuspidum acicularum instar acutissimis, donata erant, piam meningem quoque pungentia, hinc continuo capitis dolore vexata fuit; *Neander in Tabacologia.*

*Capitis gravitas ab hydrargyro post inunctionem in capite relicto.*

In Xenodochio incurabilium Romæ, in illis qui post mercuriales inunctiones obierunt, capitis tibiæque ossium cavitates argento vivo scatere deprehendi: Atque in uxore J. C. cujusdam (quæ frequenter inunctione ex hydrargyro usa erat, & in eam capitis gravitatem devenerat, ut eo parum in latus aliquod inclinato, statim illuc magnum pondus deferri perciperet, nec caput, nisi adhibita manu, attollere poterat) binas ejus uncias inveni: *Petrus Castellus Dissert. 1. Dodecap. chalcant. p. 7.*

Docet hoc Aurificis Anatomia Romæ facta, qui cum summos capitis dolores passus obiisset, in aperti capitis cerebro plusquam libra una Mercurii reperta fuit, ex vapore ejus hausto ibique congelato. Ex observ. *Ph. Jac. Sachs Medic. Uratislaviensis.*

In feminæ calvaria quæ fucis ex Mercurio quotidie usa, & per biennium enormi capitis

Matronam in Auvernier (oppidulum est Principatus Neocomensis in Helvetia, quod lacus aluit) pluribus mensibus ~~capitis~~ Capitis dolor adeo immanis divexavit, ut nullas inducias concedens ab omni consortio, imo etiam sacris cœtibus eam segregaret, perpetuoque scalptu caput dilacerare impelleret, non secus ac eos qui id pedibus obitum habent, ut cum Titinnio loquar, quamvis nulli decuterentur pediculi: Interim nubentis sororis cærimonius interesse coacta, doloris insaniam toto bilorio in Sacris ædibus sustinet, semihorâ in convivio nuptiali, unde se subtrahit lecta ultimo se traditura, in quo paulo post, ferociente dolore spiritusque exhaustiente, extinguitur, a denegato solito solatio & anodyno quod concedebant unguens.

Mortuæ divisis capitis integumentis, sub pericranio Pediculorum myriades deprehensa: dissecto vero cranio, ejus medullium isdem scatens animadvertum, qui vi. m. vi, procul dubio per futuras sibi fecerunt.

*Cephalalgia à verme in anfractibus cerebri  
latitante.*

Anno 1571. in Mercæ Anconitana, in oppido Albargo Sancte Sepulcro, grassabatur morbus atrocissimus quidam velut Epidemicus, claudescente homines invadens, paulatim Vertigine affligens, verum in secunda, tertia, aut quarta, à decubitu die statim jugulans, & caput solum tentans, Cujus causas & essentiam omnes illius loci Philosophi & Medici plane ignorabant, nec proinde ei occurrere poterant, &c. Longo post tempore Nobilis quidam xxii. natus annos, hujus mali primo suspicione, nox & teipsa affectus, multis in patria frustra tentatis, Venetias tandem navigavit, mox ad se vocari curavit Medicos, quibus firmiter multisque rationibus comprobavit aliquid esse in cerebro vivens, fieri enim haud poterat ut atrocissimis hujusmodi doloribus periodice ita afficeretur quemadmodum afficiebatur: Nam illæsa ratiocinatione, intellectu, memoria & omnibus interioris sensibus, ita pro tempore cruciabatur, ut sibi cranium totumque cerebrum terebello perforari videretur, mox per universum cerebrum extensiones, contractiones multasque commotiones, cum maximis concussionibus & tremoribus frequenter & in omni paroxysmo percipiebat: Ob id multa admota & interne exhibita fuere remedia sed frustra, nam tertio ab adventu & ejus Venetias ingressu die, hac misera functus est vita.

Secandi data venia, novacula in capite ad os usque, orbicularem per frontis medium molitus sum sectionem, & cute aliquomodo remota, calvariam orbiculatim serra divisi,



atque sectione per calvariam facta, ac superiore calvaria parte à dura matre liberata, ad piam matrem deveni, cerebrumque membranis denudavi suis, quibus extractis, illico concidit & quodammodo diffluit, moxque ex dextro anfractu prorupit atque apparuit caput cuiusdam lumbrici, qui statim aere percepto frigidior, sese in cerebri anfractus recipit, unde utrinque magnam cerebri portionem, quo cautius potui, abstuli, ne id quod suspicabamur fore detrimentum pateretur: tandem apertis dextro & sinistro cerebri ventriculis, maxime confusis, dilatatis & ad capitis basin conspicuis, repertus est lumbricus totus rubeus, indice digito longior, acutum os, oblongum & nigrum atque pilosum collum habens, multis modis sese in illis anfractibus convolvens, & ad capitis basin ferè pertingens, qui obtuliori fornicula exceptus, & munda papyro appositus, paulo post obiit, qui nostro patienti etiam mortem intulit. *Ex Observ. Georgii Garnerii Medici Austriaci.*

*Capitis dolor à vermibus inter meninges & putredine circa cerebrum ortus.*

Quandam fuisse matronam memorant, cui post capitis vehementissimos cruciatus pestilentis Hemitritæ, dissecta calvaria magnam putredinis vim ostenderit circa substantiam cerebri, Et inter meninges tum vermiculorum tum cunicum copiam incredibilem *C. Gemma in appendice. Oper. Cosmocr. de Hemitritæ pestilentia.*

*Capitis dolor à verme inter calvariam & piam matrem latente,*

Cuidam dolor capitis implacabilis circa futuram coronariam: irrita medicamenta; qua parte dolor designabatur, eadem facta scalpello sectio, non profuit.

Aperto capite, repertus est vermis inter calvariam & piam matrem situs: Si terebrata calvaria fuisset, spes vitæ aliqua fuisset. *G. Balloisius, Parad. 19.*

*Capitis dolor à verme nigra tunica involuto, qua cerebelli substantiam à dextro latere sejungebas à reliquo corpore.*

Luterianæ puellæ annorum duodecim curatæ variolis tantus capitis dolor supervenit, ut trium mensium curriculo nec dormire quiverit, nec quiescere, nullas dolore inducias concedente.

Tandem cum Tabida obisset, statim aperto cranio deprehensa fuit universa cerebelli substantia in dextro à reliquo corpore sejuncta, nigraque tunica involuta: Rupta tunica nigra, vermem nigrum pilosum, duobus punctis splendidis loco oculorum, prodidit latentem, ejusdem fere molis quæ reliqua cerebelli portio, qui duarum horarum spatio supervixit. *Thomas Bartholinus Centur. 1. histor. 64.*

*Capitis dolor à Scorpionibus in cerebro natis.*

Cuidam Italo ex frequenti odoratu Basilicæ

herbæ natus Scorpio in cerebro, vehementes dolores & longos, mortem denique attulit. *Holterius l. 1. de morbis int. cap. 1.*

Puellam quandam in Gallia ajunt cum sæpe & multum odorata esset Basilicam herbam (minorem puto Gesneri) incidisse tandem in capitis dolorem incurabilem.

Et cum à morte disseccaretur ejus caput inventos fuisse Scorpiones in cerebro ejus: *Gesnerus lib. 5. de Scorpione.*

*Dolor Capitis singularis, sine ulla Febri subito ortus &, spatio & IV. dierum interficiens.*

Litteratissimus Vir, S. Cæs. Maj. Secretarius quadragesima sex annorum, natione Misivius, Patria Annabergensis, temperamento supra temperatum calidior nonnihil & gracilis aliquo modo, ultimo complexionis melancholicæ propter permutationem temperamenti (juxta Sanctorum in variis locis) multis annis antehac phthisicus & asthmaticus, quatuor diebus ante æstivum Solstitium anno 1670. incidit in dolorem gravativum, tensivum & lacerativum sincipitis totius & frontis, quem insequuntur continuæ vigilæ; elapso octiduo deliria interpolata, post continua, suavia tamen, non irata aut furiosa; tandem uno ante mortem die motus totius corporis convulsivi leviores, ac omnium terribilium terribilissimi, Mors. Toto tempore nec vel exiguum signum alicujus febris aut caloris sive vehementis sive lentæ, sive essentialis, sive symptomaticæ, præter ultimum diem, ubi ad præsentiam convulsivorum motuum exigua aliqua & lenta caloris exuperantia apparebat in pulsu, qui per duodecim dierum cursum erat tardissimus, instar pulsuum melancholicorum. Urina primo die usque ad undecimum prodibat tincta instar Ictericorum. Concluseram dolorem hunc oriri ab evaporatione bilis per arteriosum genus, lege circulationis in caput, unde adhibitis cholagogis lenioribus, & emulsionem laxativa Mynsichti per epicrasin, urina tandem reddebatur coloris & consistentiæ naturalis: ne hilum quidem remittente dolore & dictis symptomatibus. Revulsionis, derivationis, ventilationis, evacuationis causa quantum in corpore phthisico vires vitales permittebant, extraxi sanguinem ex pede, manu, hæmorrhoidibus; applicari curabam cucurbitulas ad homoplatas, hirudines post aurículas, vesicatoria ad venarum jugularium latera: gallinæ disruptæ capiti applicatæ, laudanum Cæsareum exhibitum, pulveres deopipilativi, & juscula alterantia propinata, sed frustra omnia: Ut igitur cognosceretur causa tam pertinacis doloris mortuo aperto caput, & ecce reperio, primo venas arteriasque duræ & piz meningis turgentes plenæque nigro sanguine, ac ita particularem capitis repletionem, uti sæpius in convulsis & iratis observavi. Secundo sub medio ossis sincipitis dextri, à processu falcato usque ad os temporis extensum, video ulcus oblongum cum sanie crassa & multum flava, quod ego habui pro maligno, quia sciebam,



huius ante aliquot annos ab aliquo Pharmacopæo sciolo in curatione gonorrhœæ fuisse exhibita mercurialia forte non bene præparata, quæ uti more empiricorum exhibentur, ita etiam eorum effectus post se relinquunt. Interiora cerebri rimando, in ventriculis anterioribus Unc. xii. feri limpidissimi occurrerant, quod in scutellam effundendo monstravi præsentibus D. D. & Chirurgis. Plexus Choroideus nonnihil etiam erat atrosus & putrefactus. Inquisivi quoque in vasa lymphatica cerebri, sed ut ea viderem, tam lynceus non fui. In pectore aperto pulmones dextri lateris duplo erant majores more solito, unde forsitan causa, quod æger semper in dextrum latus etiam invitus decubuerit, sinistri verò à iterio usque ad spinam dorsii ita pleuræ & costis accreverunt, ut judicarem eos mille clavis affixos, quorum interiora plena erant sanie, pure & scirrhus; cor autem optime constitutum. Breviter ut mentem declarem, salvo aliorum prudentiorum iudicio, dico huic ægro, immortalis nominis fama digno, ob ferream tussim, qua ultimo anno vexabatur, in cerebro fuisse ruptam aliquam arteriolam, vel venulam, vel vas lymphaticum, præcipue in plexu choroideo, unde exsudavit serum, quod paulatim augmentum sumendo, massam cerebralem distendit, in maiorem molam elevavit, ipsas meninges earumque vasa compressit, & capacitatem cranii ita occupavit, ut non fuerit sufficiens ad continendum capessendumque cerebrum, quemadmodum in ipsa apertura apparuit: exinde & forissecus & intrinsecus meningum compressio, ac pericranii per sympathiam tensio sensum illum molestum, seu dolorem ad tactum etiam externum inducens, simulque ostendens in cerebro & meningibus diminutam sanguinis circulationem. Mirabar non fuisse phrenitidem excitatam: verum dubium præsentibus solvi, Phrenitidem fieri à sanguine in cerebro vel meningibus extravasato, stagnante, & cum sit extra locum suum naturalem p. n. effervescente & putrescente: hic vero sanguinem nihil ejusmodi fuisse passum, & ita usque ad undecimum diem ac ulterius absque inflammatione cerebrum potuisse persistere; donec tandem ultimò longa mora ipsis in vasis in putredinem præcipitaretur, juxta illud: & vitium capiunt ni moveantur aquæ. Uti in tua, Vir scientissime, analogia microcosmi cum Macrocosmi Oceano perbellè demonstras. Hæc an rectè judicaverim vestro Curiosiss. simul ac sapientissimo iudicio submitto, & si quædam obscurius aut non rectè in hac historia enucleata, ut à felicitate vestrorum ingeniorum magis illustrentur non ægrè fero: licet & ego conquisitis variorum Authorum observationibus historiam hanc forsitan analogis exemplis possem confirmare, atamen negotia tam scholastica quàm practica gravia ac permolesta me ad hæc studia alias avidissimum ab iisdem abstrahunt. Mira res! æger hic laudatus consecerat sibi Thema genechliacum multos ante annos, in quo ita erat legere: In hac genitura Mars mihi minatur turbationem capitis, Jupiter & Venus mor-

bum in genitalibus &c. & ecce omnia deprehensa sunt veritati consentanea, omneque altorum revolutiones coincidebant cum tempore morborum & mortis, ipseque pie defunctus hæc libimet coram me sæpius præstiterat. Unde volens ipsum à concepta opinione convertere, respondi, Vir doctus es, his quod sapiens possit dominari astris, quod astra meliorent, & non necessitent, quod Medicina altorum impressiones etiam radiativas possit corrigere & emendare. His consolatus & acquiescens nihilominus prævisum sibi expertus est ætate immatura nimis durum fatum. *D. Frid. rici Ferdinandi Illmeri à Wartenberg.*

#### *Cephalalgia Historia rara.*

Sartor quidam, Vir annorum vigintiquinque temperamento calidius, complexionem biliosius (nam ego cum Lieno in semiotica fol. 34. inter temperamentum & complexionem distinguo) facilis ad iram, in eaque sæpius excedens, ut nunque temperanter vivens, circa finem Maii anni eurrentis 1670. incidit in odis frontis dolorem gravativum, compressivum & lacerativum, ita ut incipit vix aut parum doleret, eratque dolor sine omni febris, pulsum habebat tardum similem melancholicis: ceterum sanus toto corpore. Exinde vigilie, deliria per intervalla, subinde etiam somnus ad horas tertia vel quarta extensus, adeo profundus ut si ipsi totum corpus dilaniasset vix excitaret: tandem sponte evigilans nullam doloris remissionem sentiebat, diem quatuordecim spatio elapso sine convulsione satis cessit. Prædicti adstantibus apothema frigidum adesse, utens vocabulo ad captum vulgi. Mortuo aperio caput assistente mihi in utroque casu olim discipulo meo, nunc Viro & Collega omnium calculo perinsigniter docto ac perito D. D. Georgio Sebastiano Jungio. Ecce vasa turgent in meningibus, cranium nimiam cerebri molam non poterat capere, interiora rimando occurrunt in ventriculis anterioribus 3 viii. feri flavi & plexus choroideus subalbicans, præterea nihil. Judico hinc vel vas lymphaticum (quale tamen nullum, forsitan ob meam inhabilitatem deprehendi) vel vasa capillaria sanguifera aliqua rupta fuisse ob excessum iræ, in qua ebullientes humores nimia quantitate propulsi vasa minima distendunt, & minorem locum affectando eadem dirumpunt: unde paulatim transudationes feri cerebri vasa particularia & cavitates replendo, distendendo & comprimendo hæc symptomata causantes. Curationis gratia extraxi sanguinem ex pede, brachio, manu, applicui vesicatoria, hirudines, cucurbitulas ad lateralia capitis, dedi purgantia, ordinavi epithemata anodyna, roborantia, discutientia, contemperantia: Dedi soporifera, verum omnia in casum. Curiosius aliquis si legat quatuor libr. Hippocratis de morbis, varia ibi de dolore capitis deprehendet, sed textum qui huc ex integro accommodari posset nullum inveniet: vel enim intra quatuor aut ii dies mortui sunt, vel accessit febris, quæ in nostris casibus non observabatur. Quod si tamen quis vellet analogia quadam uti, cum ipso non pugnabo.



Interim has meas observationes de dolore hoc admirabili iudico Medicis servituras pro prognosticis faciendis: vix enim possibile videtur quod Medicus, quocunque etiam cathartico munitus ex cavitate ventriculorum cerebri hoc serum extrahere possit, aliis tamen in suis experimentis nil præjudicando. Ne tamen charitatis opus Medicus videatur omittere, curam palliativam suscipere, & prognostico se munire poterit: Hæc & similia quanquam per circularem sanguinis motum, aliaque recentiorum inventa videantur posse clarius explicari, quam veterum hypothesebus insillendo: attamen si quis veterum de motu sanguinis dogmatibus mordicus velit adherere, æque ac sat perceptibiliter eadem symptomata & morborum complicationes ex iisdem congruè deducere poterit. *D. Friderici Ferdinandi Illmeri à Wartenberg.*

*Pungitivus Capitis dolor ab Aqua perspicua in posterioribus cerebri ventriculis contenta.*

Cerebrum facultatum animalium principum sedem esse jam dudum contra Aristotelem Galenus disputavit, ipsasque functiones eo præstantiores reddere quo purius, temperatius ac magis pervium extiterit: quanquam antopsia contrarium demonstrat, nam filiola cujusdam Comitissæ annorum quatuor, habitus corporis gracilis, biliosi temperamenti, correpta febre ardente, sine notabili operationum principum læsione, crescente morbo, decima quarta die succubuit; In posterioribus cerebri ventriculis inventa fuit libra aquæ, ipsa puteali magis perspicua, sine operationum principum læsione, nisi quod aliquando de pungitivo capitis dolore exclamaret: Foran id ideo quia paucæ urinæ prodibant, & ad calefactum caput fecerunt metallasin. *Auton. de Pozzi.*

*Cephalalgia à Lapillo intra Duram piamque Matrem in Capite reperto.*

Pastor quidam, ætatis consistentis, eximius hypochondriacus, atrocissimos Capitis dolores, & quidem continuos, inq; sinistro potissimum latere, ultra biennium patiebatur, quos plerorumque nostratum medicorum cura vel saltem quadantenus placare frustra planeque irritato conatu tentavit. Aperto post obitum ejus capite, inter duram piamque matrem, & regione sinistri cerebri ventriculi, durissimum scrupulum grani hordeaci magnitudine reperimus, ipsamque calvariam ibidem loci enormiter extenuatam deprehendimus, hincque causam hujus immanis capitis doloris non vana, uti puto, suspitione deduximus. Rarum exemplum, & cui simile non ubivis obvium. Inter enim hoc nostrum, apud vicum Panarolum, quantum ego quidem scio, simile quid legere est, triplicem scilicet spinam lapideam intra duram piamque matrem repertam annotavit *Pent. 5. Observat. 14.* utut cætera *Marcell. Donatus lib. med. admirab. lib. 4. & Gregorius Horstius oper. med. tom. 2. lib. 4. observat. 47.* aliique recentiores in singulis partibus humani corporis lapides gigni posse, ratione & expe-

rientia probarint. *Georgii Abrahami Merklini.*

*Dolor ventris lethalis.*

Puella quinque annos nata, jam à longo tempore conquerebatur de torminibus ventris. Quæ dolores leniendi, status discutiendi, vermesque necandi vim obtinent, aliquoties adhibebantur, at incassum omnia: unde perseverantibus doloribus tandem ex hac vita migrabat. Aperto cadaverculo, præter eam intestini coli partem, quæ rectum nominari incipit, vix ullum (mirum dictum!) abdominis viscus conspiceretur, idque propter enormem extensionem in dicta intestini coli parte, sub quâ cætera latitabant viscera. *Frideric. Ruysch. Observat. Anatomico-Chirurgicar. Centur.*

Vir quadragenario major jam per decem annos conquerebatur de doloribus circa regionem ventris, qui quotidie magis magisque ingravescerent, tandem hominem emaciatum, & quasi tabe confectum anno 1668. una cum vita deseruerunt. Ego ad inquirendum incogniti morbi originem admissus, inveni binas mesenterij glandulas (jam glandes dici poterant, in tantam enim excreverant magnitudinem, ut quindecim penderent uncias) decussatim sibi mutuo incumbentes, quæ renem sinistram ita compresserant, ut pene totus in pus esset conversus: glandulæ autem nullum in substantia contraxerant vitium, solâ magnitudine peccantes; asservantur illæ curiosis oculis spectandæ inter Anatomiz nostræ raritates. *Theod. Kerckring. in Spicilegio Anatomico.*

## DRACUNCULI.

**D**racunculi Vena Medinensis nomine ab Avicenna donati propterea quod Medinæ urbis Arabiz incolæ familiaris afficiant, à Clariss. Georg. Hieronim. Welschio sic describuntur. Dracunculus seu Vena Medinensis lumbricus quidam est, qui proprio suo semine generatus, sive cum sanguine, sive lactice & humore, ut vocant, secundario, ad partem quandam subcutaneam delato, ejusque calore naturali, aut si quis ita velit, etiam putredinis socio, formam sive animam in ipso latentem excitante. unde primò exiguus, sensim in longitudinem illam insignem, quamdiu licet, auctus, atque iccirco in sinus variè flexus, nihil aut parum molestiæ adfert, sed tandem seu alimenti copiosioris defectu, seu loci angustia, seu aliâ quâcumque de causa, egressum ineditatus cutem lacescit, in qua adfluxu ichoris melancholici seroso sanguini permixti, pustula exoritur, quæ deinde intumescens vesicam, seu phlyctenam contrahit, atque mox perforatâ, sive exulceratâ, dracunculo viam aperit, qui tunc exerto capite paulatim prolabitur, neque cessat continuo protendi. Hæc ille; quibus sane nihil adjicimus in morbo nobis prorsus ignoto, ac de quo magnum ipsum non puduit Galenum sic scribere: *In quodam Arabiz loco (ut aiunt) in tibis hominum dracunculi vocati nascuntur, nera voss natura, colore crassitudineque lumbricis similes.* *Muller*



*Adultos sane audivi qui se vidisse eos dicerent, ipse vero cum nunquam viderim, neque de ortu, neque de essentia ipsorum quicquam exakte coniecere possum.*

*Pars affecta* ab istis lumbricis, secundum Welshium mentem Avicennæ explicantem, est musculosa caro, tum crurum, tum brachiorum, tum laterum, idque non tantum in hominibus, sed etiam in equis &c.

Differunt à *Crinonibus* de quibus suo loco, quod illi crassitudinis sint tantum capillaris, atque breviores, hi vero crassiores ac aliquando plus quam ulnæ integræ longitudinis. A verme de quo in *affectione livina* quod ille varias corporis partes pererret ac obambulet, hi vero in ea in qua enati sunt parte consistant, donec suo tempore caput exerendo è mudo suo, retrahantur. Quomodo præterea ab aliis discriminantur vermibus, sive umbilicalib. quales ex Camerario supra cap. de Crinonibus, descripsimus, sive intestinalibus &c. per se patet.

De *Causis* Dracunculorum hic quædam è præfato Welshio adducimus, scilicet è pituita viscosa & tenaci enaci, eo prope modo quo pili in viis generantur urinariis, unde morbus, enascitur qui *Trichiasis* vocatur quæ pituita ab alimentis congeneribus, qualibus Arabia incolæ utuntur, crassis nimirum ac viscidis, suscitatur. De modo autem quo animetur in vermes viventes, ejusmodi materia, jam mentem suam aperuit in morbi descriptione idem Clar. Welshius.

*Signa morbi Diagnostica* ex eadem satis patent descriptione, si addamus ex Avicenna ab ipso Welshio explicatò. Si materia ex qua generantur ac aluntur Dracunculi mitior, & præcipue pituitosa fuerit, nullum ferè, aut valde obtusum dolorem faciunt; si vero acrior sit illa materia, calidior, ichorosa & melancholica; exquisitum illi dolorem excitant. De *Prognosi* hæc habet Avicenna. *Etiamsi uno in corpore quadraginta ferè, aut quinquaginta locis obtingat Dracunculus, curatione tamen evadit.* Unde, ut concludit Welshius, apparet affectum nequaquam lethalem esse: Imò nec valde periculosum, si modò dextre & decenter tractetur. Nimirum nisi aut violenta extensione in parte cui adhæret Dracunculus, dolor atque inflammatio excitetur, aut ipse etiam abrumpatur, nihil magni mali minari solet, tum enim relicta in corpore particula, repente, magnoque cum dolore atque periculo lumbrici in morem, contorquebitur: mox etiam putrescens, ichotesque aut humores acres in partes nervosas exstillans, gravissima symptomata, atque imprimis convulsionem excitabit, quam ipsa tandem mors excipere consuevit.

*Curatio* Dracunculorum seu Venæ Medinensis ex Avicenna ejusque Commentatore Doctissimo Welshio duplex est, *Præservativa* una *Curativa* altera. Pro præservatione viranda est regio in qua generatur; cum enim morbi endemii ea sit conditio, ut toto illius terræ tractu, quam occupat, causam suam omnibus communem faciat, non fore ullam certiore præsertionem quam locum fugere clarum est. Sin autem id commodè fieri non possit, saltem à cibis abstinendum ex quibus gigni creditur. Quinam tamen illi sint non explicat Avicenna, Alzaravius omnia olera, omnesque fructus illic vitare jubet, ubi vena exiens sive proserpens generetur; hæc enim esse ait, è quibus produci soleat.

Ebn Jezla autem pisces sigillatim enumerat, & lenticulas cum aceto, dactylis, aliisque limilibus in direct. morb. tabul. partic. 7. §. 1. Nihil enim dactylis crudis, coctisque, recentibus pariter, passisque toto Oriente & Africæ Asiæque tractu universo frequentius in cibo. Joan. Colle Comm. in Avicennam, omnia cibaria potiusque calidiores omnes commemorat, adultos, viciosos, salsos, ut aquam salinam, carnem salinam, pisces, brassicam, betam, spinaciam, aliaque quæcunque chylum acrem, acidum, acutum & melancholicum gignunt. Vina item nimis potentia, vapida, crassa, & excrementitios humores generantia. Præterea vult Avicenna ut oppugnanda causæ morbi antecedentæ evacuetur vitiosus sanguis, secta vena basilica, aut saphena. Item intus ad expurgationem humoris adhibet syrupum myrobalarum, decoctum epithymi, pilulas coctias, ac trypharam cum sena & fumaria paratam quibus omnibus addit humectationem corporis cibis humectantibus, balneis &c. Hæc de præservativa; Morbi præsentis expugnationem quod spectat illa sic instituetur. Cum vestigium lumbrici, seu Dracunculi apparuerit, membri refrigeratione uti conveniet, per cataplasmata refrigerantia, qualia fieri possunt adhibitis succis frigidis expressis cum sandalis & caphora, imò post corporis purgationem, per hirudines quoque loco applicitas. Succos expressos frigidos sigillatim seu vulgò notos non enumerat Avicenna nec quisquam alius recenser præter unum Berta paleam, qui succum sempervivi, vermicularis, & herbæ apostematum, quæ faba crassa, seu crassula ac telephium est, nominat. Addi possunt, commentante Welshio, quoque alii, ut lactuca, nympha, parietaria, alines, portulaca, lenticula, polygoni, oxalidis, umbilici veneris, capreolorum vitis, & maxime tussilaginis, cujus virtutes omnibus inflammationibus planè singulares & eximie compertæ sunt. Cataplasma quoque Matthæ Naldii ex farin. lupin. orob. lentium, myrrh. aloë, croco, & ol. absinth. nec non oleo ex sol. absinth. abroton. matric. sem. acetos. santon. & ol. laurin. compositum, satis commodum contineri non debet, & si ipsum adfectum nunquam vidisse aut curasse ex scriptis illius satis appareat. Nimirum quæcunque vermibus inimica sunt etiam dracunculis adversantur. Sin autem istæ eludat, jamque prodierit, tunc convenit ei præparare aliquid, cui adligetur, & supra quod blandè & paulatim convolvatur, ita ut sic usque ad finem sui sine disruptione exeat. Ad hoc autem optimum est plumbi bacillum quod præterquam quod dracunculo convolvendo aptum sit, ejus ponderis fiat necesse est quod ei trahendo non abrumpendo sit satis. De pondere bacilli nihil amplius Avicenna, sed illud explicat Alzaravius dum ex barbaro interprete sic habet. Si de dracunculo jam aliquid exierit, non valet ingeniatio, nisi ut attrahatur, si est parvus, quousque egrediatur totus, & si est longus ligetur in extremitate ipsius arundo plumbea cum pondere 3j. & deducatur in ipsum quicquid exierit de eo, & caveat ne vena detruncetur. Alii pondus illius faciunt à 3j. ad 3ij. imò etiam alii ad 3j. veniunt. Verum pro diversa Venæ Medinensis crassitie aut robore, pondus illud



illud ex Medici solertiâ & ingenio variandū est. Figura debet esse cylindrica. Summa vero cura sit in exitu Dracunculi facili reddendo, quod fit fulciendo membri cui insidet imbecillitatem & rarefaciendo illud irrigationib. ex aqua calida, & mucilaginis, refrigerantib. oleisq. emollientibus, frigiditate aut subtili calore præditis, & quæcunque ad egressum illis simili ratione faciliem reddendum idonea sunt. Ac tandem si videatur apertione opus esse, ut integra prodeat Vena Medinensis, nihilque sit quod prohibeat, aperiatur, & extrahatur. Sin verò exitus ejus commemorata extractione non reddatur facilis, & apertio non sit possibilis, butyro putrefaciens, tota enim putrescet, atque egredietur. In hoc negotio Aetius Cornario interprete ait. Quod si Dracunculus sponte progrediens facile extrahi poterit, nihil amplius faciendum est. Sin ad suppurationem vertetur, à cataplasmatis & aquæ mulsæ ac olei irrigatione non est discedendum. Nos verò & emplastrum e baccis lauri post cataplasmatum e farinis, mulsâ & oleo ablationem imponere solemus. Facta verò suppuratione, cutis per longitudinem secetur, & dracunculus denudatus auferatur, & cutis ligamenti inditis disparetur, & reliqua curatio suppuratoria adhibetur, ita ut animali suppurato & extracto ulcus incarnetur, & ad cicatricem perducatur. Incisio, quæ aliquando necessaria, duplex est, una dracunculo integro extrahendo, altera quæ abrupto tantum conveniat. De illa sic Avicenna: Maxime verò si secetur locus à Vena Medinensi longinquior, ibique immisso subtus specillo depellatur, & frictio dum egreditur cum sale paulatim & blandè continuetur. Ubi enim cum ipsa ita actum fuerit, tota egredietur. Posteriores incisionem idem Avicenna his exponit verbis: Quod si rumpatur, seseque occultet, nullum dubium esto quin aperiiri debeat, ita ut denuò capiatur, deinde leniter extrahatur, & locus ut vulnera solent, percuretur.

Atque hæc de Dracunculo seu Vena Medinensi dicta sunt, in cujus ulteriorem explicationem *Observationes* demum aliquot à Clariss. Welschio in suo de Vena Medinensi tractatu à variis adductas, adjungemus.

### *Observationes.*

*Æthyops* maris præfecti servus, juvenis 18. annorum, cum primum ex Memphi *Ægypti* celebri civitate Thellalonicen advectus esset, illicode cruris dolore conquestus est, isti quo juxta talum primò ulcus excitatum est, in quo venæ modo caput conspiciebatur, quod advertentes Turcæ morbum cognoverunt, periculosum esse in *Ægypto* & *India*, ac reliquis regionibus quibus innascitur, significarunt, quæ Arabes præcipue Avicenna, Venam Medenam, sen. 1. lib. 4. appellari tradit, veluti Avenzoar & ceteri hujus doctrinæ homines, quibus morbus hic satis cognitus & familiaris erat: Pro cujus curatione accersitus Medicus Parahyas linguæ Arabicæ doctus, ita orsus est. Primò debita victus ratione proposita, partem extremam venæ, aut verius nervosæ cujusdam substantiæ subtili ligno alligavit, quam paulatim ligno trahabat rotabatur, adeo ut ad ejus ultimam par-

tem, h. e. ad trium cubitorum longitudinem posset multos dies pervenerit. Unde *Æthyops* à doloribus & angustis, morbo ipso liberatus est, nullo supraposito cataplasmate concoquendi vim habente, aut calida perfusione aliqua, quæ ex Sorano & Leonide ultimis verbis lib. 4. *sux Medicinæ* huic morbo auxiliari tradit. *Amatus Lusu. Cent. 7. Curat. 64.*

Hollandus quidam è penuria Rupellam delatus, de dolore, inflammatione, & tumore in utroque malleolo conquerebatur, rem Chirurgus defert, monetque ut de vermibus cogitaret. Id factum. Inflammationi succurrebat cerato Galen. 14. Meth. med. 3. descripto, cui parum basilici miscebatur. En duos quasi vermes aut nervos ex utroque malleolo unum, prorumpentes. Hos Chirurgus sensim protraxit, usque dum æger de dolore conquereretur, tum in nodum, quod extractum erat, replicando concinnavit, de die in diem opus idem repetendo, usque dum planè exciderit. Illud quicquid fuerit nervi, aut ligamenti, aut vermis, nunquam vitæ alicujus specimen exhibuit. Longum erat pedes quinque: convaluit. *Antonius Guenotius Parisiensem Medicum & Chirurgum, referente Welschio è suis adversariis à schedis Versungianis petiit.*

Montalbanum è Rupellæ penuria homo allatus jam descripto morbo laborans, sed non ita feliciter curatus: Dum enim rei illius p. n. extractioni magna violentia operam dedit Chirurgus, eam dirupit, unde inflammatio, dolor, convulsio, & 24. horarum spatio ipsa mors sequuta. Aperto cadavere, periosteum inflammatum deprehensum est, cui planè adhærebat istud, quicquid fuerit, funiculi instar juxta malleolum in gyros quinque vel sex contorquebatur, inde recta ad genu porrigebatur, quo in loco iterum in circulos reflexum, tandem ad os *Coccygis* ferè, aut saltem *Ischii* protendebatur. *Idem eodem referente Welschio.*

Ad litus cui nomen Capocors, sive promontorium Corsicum, quidam correptus tanquam febris, primò horrore concussus est, calore succedente, totoque corpore pustulis erumpentibus, valde exiguis, quæ tamen omnes, probe aperto mox iterum discussæ evanuerunt. Delatus igitur in proximum pagum, cui nomen Agrara, haut procul à Castello Sancti Georgii, seu arce Nigritis Mina dicta, circa malleolum in tibia dextra duas pustulas erupisse advertit, quæ veliculas contrahentes mox rumperebantur, & vermis sive dracunculus ibidem latitans caput suum exereret, non majus quam aciculæ, est, quod ideo à Chirurgo Batavo captum, pennæque medio parumper fissæ insertum, deinceps quotidie circumvolvendo eò usque extrahebatur, donec dolorem aliquem percepisset. Ita unus bidui spatio integer paulatim eductus, prodit, alter verò abruptus tumorem cruris doloresque maximos excitavit. Qui integer prodierat longitudinem ulnæ nostratis superabat, tenuis erat ad instar chordæ testudinariæ, coloris dum recens erat albi, exsiccatæ autem nonnihil flavescens, qui tensus etiam ad instar fidium sonabat. Chirurgus morbi illius nondum satis peritus erat, ideoque unguentum basilicon & emplastrum palmeum applicuit, quibus tamen solis curationem feliciter absolvit. Nigri illius regni incolæ aliàs ligno utuntur exiguo ad extrahen-



trahendum, & reliquum curant solo oleo palmarum, sive coccorum, quod habent copiosissimum. Triennium illic transegit, antequam morbum hunc contraxisset, qui toti regioni familiarissimus ex aquis præcipue in cibos potumque adsumtis oriri creditur. *Georg. Hieron. Welshius ex communicatione Joann. Abrab. Heinzelii Patricii Augustani qui ultra decennium in Guinea regna vitam duxit.*

Qui in Guineam navigant, & in Castello S. Georgii de Mina habitant, cujus districtus ad aliquot milliaria extenditur, toto corpore vermibus affligi solent, magis tamen Æthiopes incolæ, quam Germani advenæ. Notatu autem dignum est, si quis tantummodo præternaviget pruritum in cute sentire, maxime in brachiis & cruribus, frequentissime verò in femore. Tunc oritur vesicula, unius, in quibusdam tamen trium pisorum magnitudine. Hæc autem nisi à verme ipso pertundatur, ubi Chirurgi satis maturam judicant, (sunt autem ejusrei peritissimi) aperiri debet. Mox prodeunt pili gemini, albi, & capite adnati, qui ideo barba vermis dicuntur. Vesica ipsa aqua distenta est: tum vermis quotidie mane & vespere extrahitur. In partibus corporis musculosis, si articuli ferè longitudine promineat sæpe accidit ut unico tractu educatur. Longitudine ulnam, aut etiam sesqui cubitum exæquant, nivei coloris & frigidissimi, quamvis ex carne calidâ exeant. Tenuis ad instar fili, alii tamen ut funiculi. Crassiores venenosissimi & pessimi exsunt, valde que difficulter extrahuntur. Inferiori crurum parte sæpius nervis & venis circumvolvuntur, atque tum quidem educi nequeunt: sed abruptuntur. Abruptis autem tumor ingens in pedibus, suppuratus, & copiosam materiam concludens, donec tandem fonticulus excutitur, aut scalpello foramen fiat, quo plures quandoque *diutius* redduntur, magnisque doloribus afficiuntur. Ipse ego, cum illic degerem, tribus ejusmodi laboravi, duobus scilicet in dextro & uno in sinistro crure. Præter dextri pedis in ipsa planta enatus erat; quò 14. dies decubui, neque ambulare potui, donec tandem disruptus exaresceret. Alter infra malleolum ad digitos usque protensus, ideoque magnis cruciatibus & ulcerationibus curatus est. Tertius itidem sub talo sinistro, cum ad dimidii cubiti longitudinem prodisset, disruptus retrocessit in tibiam, quæ ideo insigniter intumuerat, ut 4. menses integros ægrotarem. Nec enim nisi sectione curari potuit, quò tempore nec stare, nec ambulare poteram, sed necesse habebam ab Æthiopibus perpetuò gestari. Stolarchæ nostri coquus 30. ejusmodi vermibus diutius excruciatu est, per semestre integrum decumbens, ut plerique de vita ejus desperarent, tribus enim aut quatuor curatis, mox alii exoriebantur. Quamquam verò pauci reperiantur, qui absque hoc morbo ex illis locis redeant, vicissim tamen pauci occurrent, qui tam multis, ac coquus ille affligantur. Sanatus autem & ipse est, ut me discedente, etiam ulterius restiterit. Æthiopes se ipsos sic curant: Ubi vermem digiti longitudine extraxerint, abscindunt & oleo palmæ illinunt, foliumque recens ejusdem arboris emplastri loco superimponunt: tumorem quoque, postquam aper-

tione facta, materiam purulentam & ichthorem effluere permiserint, ita persanate solent. Postquam aqua ex pipere aliisque herbis satis acriter reddita eluerint, imponunt deinde oleum palmeum cum folio ad mitigationem. Atque hoc remedio ad omnia ulcera utuntur. *Michael Hemmerhamius Norici Itinerarii Guineensis vernaculâ linguâ conscripti cap. 13.*

Lara urbs magna est bene structa, murisque fortissimis cincta summo montis apice sita. In illa mercatus est, quo varia mercium genera venum comportantur, magnaque illic fructuum copia reperitur. Sed aqua prava, insalubris, putredinum & morborum graviorum ac letalium causa existit. Ex hac aqua, ad Gomeron usque se extendente, ut scribunt, vermes quidam longissimi generantur, qui cruribus humerisque excresecunt, rotundi, congyrati, & in carne occulti. Quamprimum animadverti concipiunt, aperitur locus, ut caput vermis capi possit. Tum ligneolo disticho capus circumplicatur sive convolvitur, sex sæpe pedes longitudine excedens: parum tamen quotidie sic extrahitur, donec totus sensim prodierit. Cautè tractandus est, si enim abrupteretur, portio in carne residua, ulcus periculosum efficeret. Medicina contra hanc aquam vitiosam est vini providentia, vel saltem abstinencia à potu aquæ illius, antequam cum cura per pannum transcolata fuerit. *D. de Bourges in descriptione Gallicæ itineris ab Episcopo Berytensi in Sinas suscepti.*

Peregrini imprimis qui Guineam appellant, corripiuntur vermibus in corpore genitis, imò & Æthiopes non tantum albi, sed etiam nigri prope Mainam, locisque vicinis, cum tamen ii qui 25. milliariis orientem versus habitant, huic malo non sint obnoxii. Vermes isti, quos linguâ vernaculâ *terton* vocant, non omnibus, qui eo tendunt sed quibusdam tantum manifestantur. Sunt enim qui his laborant, dum in litore aurifero degunt, alii in reditu demum, & iterum alii post iter peractum, etiam 4. 5. 6. imò & 12. mensibus, infestantur. Sunt vicissim, qui ter litus illud adierunt, & tamen nunquam de his verminibus quidquam audiverunt. Nonnulli congressui causam assignant, alii singularis cuiusdam piscis esui, vermibus scatentis. Alii natationibus & balneationibus in aqua frigida adscribunt. Quidam à nimio vini palmei potu, vel esu panis miliacei, *Candrarum*, originem trahere dicunt. sed omnes istæ rationes parum vero consonæ videntur: quia, qui nec cum mulieribus rem habuerunt, nec pisces panesve illorum degustarunt, nec vinum palmeum biberunt, nec frigidam marinam aquam ingressi sunt, vermium tamen hoc morbo aditæ si fuerunt, cum è contrario plures in terra illa, etiam cum meretricibus viventes, vinoque palmeo sæpius inebriati, nihil hujus mali pertulerint. Verosimilius idcirco fuerit, ex singulari quadam aëris malignitate, aut aquæ potu, nasci, quam Nigri illic ex quodam fonte petunt, Albisque vendunt. Verum quidem est peregrinos multos in litore aurifero aquæ plus nimis bibisse, qui nunquam morbo correpti: sed hi navibus suis infra Mouream appulerunt, non Acara, aut aliis locis. Qui enim Mourea



appellunt, vel aquam multam bibunt, citius vermibus laborant, quam qui Acaræ, aut superioribus locis. Variis modis invadit hic affectus: Alios scilicet cum febris, vel horrore febrili, alios cum imbecillitate, lipothymia aut anxietate magna, quosdam etiam cum delirio. Primò se manifestat vesicula exigua, sive pustula, morfus pulcis similis, vel tumor, in quo vermis inter cutem & carnem sæpe etiam videri potest, vel efflorescentia quædam sanguinea cum symptomatibus similibus. In carnosâ maxime parte crurum, brachiorum, genuum & nati, imò præcipue in omnibus partibus carnosâ, quandoque etiam in scroto, quo maximos dolores creat, quanquam etiam interdum hic loci non doleat. Sunt qui trimestri integro iis molestantur, alii è contrario, vix tribus septimanis. Alii etiam aliis plures. Quidam unum tantum, nonnulli una vice etiam 10. habent. Variæ sunt longitudinis & magnitudinis. Alii duas ulnas exæquant, alii unam tantum, alii denique unâ etiam breviores sunt. Quidam crassi, ad instar tidiæ crassiorum, alii tenues, ut filum sericum. Multi non credunt vivere, sed pro nervis corruptis habent, nec vermes esse putant. Sed motu, quem exitu ostendunt, diversum comperitur. Curatio rarò instituitur, antequam vermis ipse exitum pareat; aut caput exserat. Tunc enim capitur, & tenetur, ne retrocedat. Sensim postea extrahitur tandem, donec ulterius prodire cesset. Ita parumper quiescere sinunt, donec denuò prodire incipiat. Quidquid extractum est, ligno cuidam exiguo circumvolvitur, ne in corpus retrò meet. Sic verò trahendo ex intervallis pergitur, donec totus omnino egressus fuerit. Si iustò fortius trahatur, haut rarò abrumpi solet, & tum plerumque vulneris inflammatio subsequitur. Excundo etiam plerumque multum sanguinei secum defert. Nigri manum non admovent, sed cicurari sinunt, vulnusque aquâ falsâ eluunt. Optima curatio est, corpus à putrida sanie, mundare, & vulnus butyro recenti insulso inungere. Locus quò vermis se manifestat, ante omnia, semper caleat, necesse est, custodiendo illum diligentissimè ab omni frigoris sensu. Nisi enim id probe observetur, intumescit plaga, & inflammatur. *O. Dapperus in Africa descriptione ex Isaaci Vossii Manuscriptis.*

## DYSENTERIA.

**A**D Dysenteriz absolutam explicationem nihil defuturum spero, si jam produxero; tum quæ in Thesibus Discipulorum Viri Amplissimi Domini Caroli Drelincurtii Regii olim in Gallis Consilarii ac Medici, nunc verò in Universitate Lugduno Batavo. Professorum omnium antiquissimi (cujus ductu nihil sanè quàm accuratissimum ac solidissimum conscribi potest.) Tum etiam quæ in Clariss. Thomæ Willis Dissertationibus, super hac materia reperire est. Veniant itaque primò Theses memoratæ.

## THESIS I.

Ab officii difficultate passio nomen habet Dysenteria, quæ *Aureliano Intestinorum rheumatismus est cum exulceratione.* Hic enim cum Venteribus causam immediatam uti *τὸν ἔσπερον τὸν πύλον* agnosco, ita mediatam omnem profiteor *τὸν ἔσπερον, ὃν δαυαῖδε, ὃν ἀλμυρὸν, ὃν ὑπερδία;* vel ut brevius, sed plenius dicam, *τὸν τῶν ἀλμυρῶν & ὃν ὑπερδία.*

Intestina quippe *ἐνδοτὰ τὰ ἐν ἰσχυρῷ*, illorumque vasa corroditi atque recludi liquet, i. quidem ex torminibus, vel tormentis ut cum Celsò loquar, quæ hic sæviunt, unde meritò Tullius torminolos vocat, quos Plinius Dysentericos vocitat, quique Aphrodisiæo *δυσεντερικοί*, uti Nicandro *δυσεντερικοί* dicuntur.

Excreta deinde, mucus, bilis, serum, sanguis fluidus, grumofusve, pus, partiumque strigmenta aliud nihil loquuntur quam intestinorum *ἐνδοτὰ τὰ ἐν ἰσχυρῷ*. Jure igitur ab Hippocrate. *ἰσχυρῶν, καὶ τῶν ἰσχυρῶν* illa habetur, quæ tot *ἀδυσῶντα*, totque *ἐσπερῶντα*, imò, quæ tot *ἰσχυρῶντα*, totque *ἐσπερῶντα*, seu ramentosas dejectiones, vertente Gorrzo, profundit.

3. Insuper id ipsum Anatome clamat, Dysentericorum enim interanea, vel perlucent membranacea, carnei interimenti causâ hoc fortiori velut smeigmate detergi, subduci; vel carnosâ sui parte vasis irriguâ tumentis, atque plagulis moribusve cruentata, uti fert carniū indoles; fauciatos enim, simulque sanguinantes tumidosque videre est lacertos.

4. Demum serpit ulcus tam altè ut intestina perforet, sæcæque profundat vel in ventris alveum, vel in abdominis ulcus è directo ulcerosi intestini, ex oculatâ fide Avicennæ. Matth. de Gradib. atque Sennerti, qui Germanorum decus est grande.

## I I.

Sit igitur Dysenteria dejectio mucosa, sanguinolenta, purulenta, frequens, torminalis, intestinorum interiorum vel fauciatorum, vel erosorum ergo.

Hæc definitione secludo fluorem diarrhoicum, hentericum, coeliacum & cholericum, omnem insuper *τὸν δὲ γαστρὸς καὶ τῶν ἐν αὐτῇ καὶ τῶν ἐν τῇ σπλῆνι*. Dysenteriz siquidem fundatur *καὶ τῇ δαυαῖδι*, illud sive sit primitus inquilinum humorale, vel animale; sive recens assumptum & advena, vel Dieteticum, vel Pharmaceuticum.

1. Internorum vulgatiore est Pituita vel acida, vel salsa, quæ bombycinum intestinorum subtegmen ad vasorum usque deterget ora, eò primum loci, ubi adhæsit, sed mox latius atque latius gliscit, suisque spiculis intestina fodicat, convulneratque.

Noscitur excretis quasi mucosis, aliàs aded largiter profusis, sed cruore modico perfusis, ut sui copiâ atque glutinamentò Practicos in admirationem traducat, talem Promotor meus Cl. Drelincurtius in altitudinem stupendam ab imò ad summum coherentem sustulit. Pueros hæc, senes, leuioremque sexum, unâ verbo



verbis, desides & cochleæ vitæ agentes, etiam, fructus & pisces si præsertim vorant, attripit.

2. Bilis mordacior & plurimis aculeis hirta, quæ cholericis more flexuosos intestinorum orbes non permeat, sed quæ lentorem nata, intestinorum flexuras lentè perreptet, illasque sensim arrodât atque desquamet, sicque post mucum atque cruorem, tot quæ excernuntur detritarum partium intersticia undique corrodat. Hanc Plato celebrat propter intestinorum tumultum, ex alvò, ceu seditiosa civitate fugientem, & fugâ suâ tot & tantas obviis quibuslibet intestinis, ceu hominibus, plagulas inferentem.

Hippocrates Platone major, pituitam, bilemque multas inculcat. Illarum enim amalgamatio, (si præsertim salis bilis, salis pituita jungitur), bilis glutinum majus, pituita verò plures ensiculos, quibus intestina dilaviet, nanciscitur, atque sic juratò veluti, & ex conducto ruunt in nefas.

Sicarios istos, fuga detegit. Alter siquidem atque alter alvò secedunt cadibus cruentati. Hæc species æstate vulgatio, & in homines cadit temperie biliosa victu utentes sibi analogo.

3. Serum, suas & tragédias movet, si diatæ vitio austerum, acerbum, acidumve fuit. Hinc Dullum ex heluellis in Augurali apud Lentulum cœnâ, graviter ex intestinis laboravit. Hinc milites atque lxx horarii austerioribus dum sese ingurgitant, tota castra dysentericis implent. Hinc Imperatores ipsi Theophilus, Fredericus III. & Albert. II. algidâ & peponibus torminosi. Hinc & ab uvis atque multo apud Forest. tormenta. Hinc & intestinorum difficultates apud Hildanum, tum vinò cupreis vasis refrigeratò, tum aceto urceoli plumbei. Acidum enim Cæveris, Najadum, Veneris & Saturni (si præsertim humore Barchi in ventriculò non retunditur) usque adeò corrosivum est, Helmontio teste, ut excrementum lintea rodât. Sic meus Pr. in Dys. lethali dejectiones vidit, & terribilissimam acorem exhalantes, & in tantum effervescentes, ut horulæ spatiò, mustelæ cerevisiæ citius, scaphium pede altum, ab unctis ternis conscenderunt. Notitia hujus ex dictis clara distinctaque.

Serum salitudine voratorum & Salsum & Syngium fit, acutiusque suâ & cuspidibus, ceu tot ligonibus intestina fodiat, cuniculos agit, murumque Vasis extractum suffodit, quò suffosò cruorem saniosum, torminalemque profundè necessum est, uti B. Sylvatici fide, puero lixiviam haustâ contigit.

Sic Pr. mei calculò, Parisiis haud insolens advenis obtingit Dysenteria, ob aquam Sequanæ, alias sanissimam; huiusmodi pigritiâ, non è profluente limpidò, sed juxta navigia linteis saponè tergendis dicata, quò Civitatis purgamina conflunt, muriaticam haustam. Noscitur assumptis.

Illius porro feri vitiosi fontes, non unus duntaxat & ex præputi glandulis, serum illud Wirsungianò siphunculò in Herophilianam eructantes aquæ, è quâ in ventris Dædala deturbatur, sed & gracilium intestinorum acinos agnosco. Illos enim reputo unâ cum reliquis & præputi glandulis serò vitiato perpluere.

4. Pus demum humorales inter causas numerandum venit. Humoribus enim natales debet acceptos, & adhuc dum fluere natum aptum. Id profectò nostros apud Majores injuriosè non in-

famatur duntaxat auctor. Fidem quippe mihi fecit Pr. meus, lele variolis laborantes, Phthiricos, & Empyicos sedibus dysentericis purgatos vidisse.

Quaternis istis, Animalem causam, sed brutam, quidni accensebo. Meus enim Pr. cladis illius animantium copiam, dicit exanguem, cruentos reos in flagranti delictò deprehendit. Quadrigenario quippe Medicinam fecit, ejus dysenteriam diarrhœæ triduanæ succedaneam, nullis Phœbi potentibus herbis sanare valuit. Ac proin, alvò toties profusâ, exhaustoque vitæ thesauro sanguine, & doloribus lentidem ingravescens, omnemque somnò requiem, depellens, fatò cecidit.

Incisis a pyloro ad anum interaneis, insolens nihil tenui & titula venit in conspectum. At universi coli decursus, tantus quantus est, vel suis in secretioribus cryptis atque cellulis vermium latibula passim prodidit. Illorum autem alii adhuc dum locorum palantes huc & illuc grassabantur. Alios vero angineò flexu contortos, implicatos, conglomeratosque cernere fuit. Tota insuper colon atque rectum, exteriora quidem livida, interiora verò flammea, tumefacta & tumulis densis exasperata. Interior enim illorum tunica ubivis crassior erat, & frequenti, ac supra modum gibberâ papillâ sanguinariâ protuberabat. Tot loca meus Pr. nuncupat nuperæ cruentæque cladis: eò quippe loci vasa cernere fuit oppidò tumidiora, atque Lumbri-corum morsiculis, & fossionibus reclusa, cruoremque manantia.

Istos porro homicidas, eò loci foricarum putore feroces, agnoscere est suis è nazvis, quos accessisse à capite, nunc alienum est.

Defunctum quod attinet, totos dies quindenos perdiis & pertox abdomen manibus comprimens sellæ insedit foricariæ, nullis enim argumentis adducebatur lectum ut pateret, ne confestim alvi deponendæ causâ lectò exilire cogretur, jugibus enim egerendi stimulis agitabatur. Podice deprehensus est ita hiulcò atque patulò, ut nonnulli indere & apparere lecti enematibus ergò, studuerint frustra.

Cæterum tremulus erat universè, adeò ut explorando pulsui locus denegaretur: appetitu vigeat, nausea sitisve nescius: Verum, sub extrema fata, abdominis ambitum ad rabiem usque torminosum ululabat. Alsit universim, manibus atque serotò lividis. Fæces totæ diarrhœicæ, consistentes nusquam, & primum quidem griseæ, sanguinolentæ demum atque lethales. Brevibus istis fidam præcipio, ceu cynosuram habes. Quocirca in dysentericis sedibus crassis, tenuibulve, distinctius internoscendis nullus ero. Imò brevitatis gratiâ, quæ hic discutienda venirent de torminosi intestinis non semper laceris & extenuatis, de illorum sinu, mucò, adipe, sanguine fluidò, grumoso, paucò, multo, sæcibus mistò, impermixto, lamiis, fibrâ, carunculis & ulceribus cavis, (quæ sæcum abdomine mediò sunt emissaria) atque singulatim de tenesmo, deque tenesmi atque dysenteria gradibus, & de præputi & præputi, de illorum effluviis atque contagio, de therapeuticiis controversis, deque specificis in specie, lubens sileo, ne diatribam margine plenâ, non autem Inaugurale lemma præcipuum oculis subijciam.



Strictim igitur causas & Externas attingam. *Diæticæ* Theſeus ſecundæ refricuiſſe nolim, *Pharmacenticas* inſolentiores quidem de annulo voratæ, *Euphorbiæ*, *Ephemeræ Colchicæ*, *adamanthæ*, *viuræ*, &c. repeti velim ex *Luſitano*, *Cluſio*, &c. Vulgatiores *menſ* Pr. in *Adverſaria*, quorum eſt mihi copia, retulit de *Mercurio cum viro vel unctiōe* vel ſuffitu; tum *ſublimatō*, atque etiam *præcipitatō* vel rubrō, vel albō, deque *minerali Turbit*, temerariis *Barbitonſorum auſis*, perperam uſurpatis, de *Theophraſti Gilla*, de *pæne dulciariō bis coctō diagrydiatō*, de *trochiſcis albandal*, de *cataputia minore*, de *granis Indici*, de *Stribilis Indici*, de *purgatrice tandem*, aliàs innocuā, *Mannā*.

5. Dysenteria univerſe *χαλπὴ τοῦ ἐν πνεύματι*, dum quippe torſionibus excruciat, humores frugi conſumit, ſpiritus exhaurit, partesque depopulatur, ſi potiſſimum ægrotantis in perniciem collatitias ſibi commodant operas ſymptomata. Tunc quippe *πολύπνοος* quidem, at non *πολύχρῆς* exiſtit. Ominofa ſiquidem eſt, citoque non inteſtinorum duntaxat, *graciliſimum imprimis*, ſtamina diſſectit, ſed & vitæ totius abrupit ſila, ſi cauſis interniſ eſt orta, ſi febris adeſt, ſi ſatiſdium cibi, ſi nauſea, ſi ſingultus, ſi convuſſio, ætas ſi infantilis, ſeniliſve, conſiſtens item uterum ſi gerit; lumbrici ſi ferociunt, ſi tergora dant; lipothymia ſi arripit & repetit, ſudor ſi frigidus, extrema ſi algent, ſi livent; torſiones ſi nullis aut brevibus ſunt inducens intercitiæ; vel ſi derepentē altum ſilent, nec repungunt; malaciam enim tantam inſidam me docuit *Pr. menſ*, quadragenario quippe Medicinam fecit rabidē torminoſo, ſed cujus rabioſa tormenta continuo ſiluerē. Sciebat quidem *menſ* Pr. *οὐδὲν γὰρ ἰατρικὸν ἀντιὸν τῷ ὄντι ἐστὶν ἐν τῇ φύσει*, ſed hanc de *Dysenteria* ſingularem prognoſin, nec à mutis nec à vocalibus doctus erat Præceptoribus, atq; adeo triumphū cecinit, ſed ante victoriam. Effluſo enim triduo *der triumphavit*, ut cum *Tertulliano* dicam, æger quippe doloribus ſolutus beatas in ſedes evolavit.

Apertō cadavere, *exta* *Omaſo* exceptō, nuſquam *extantia*, ſed contracta depreſſaque, nec non liventia & uſque adeo ſiderata, ut contrectatione vel leviori, tota in lamellas abierint, ſuæque graveolentiæ cunctos abegerint.

Haud ita pridem Comitum Germanorum alterum, poſt torminoſas decumanasque procelas, dies ejuſmodi illuſerunt halcyonei. Omnem lapidem *menſ* Pr. *exuſpiciū* gratiā movit, ſed quia de præteritis *exuſpiciū* non datur, noluit *Py-lades*, *Oreitis* cadaver apertum.

Sinistri inſuper ominis eſt, dejectio vel glutinoſiſſima, inque placentas ductilis, *qualis è veſicâ grandiori auritiâ calculō*, vel ſaniſſa, purulenta, foetens, ſpumans acore fugienda, vel præſina, æruginoſa, ſtatodes, atrabilariave grumis ſtillantibus ſi radiat ebullitque; meconizata item, omniſque vel ſincera, vel multifariam variegata, ſi demum vel putridis carunculis, grumiſve, vel ſanguine fluxō, & omni ſatore olidiori ſcatet.

Felicem nihilofecius conclamant exitum. *Galenus* quidem, *Avic. M. de Gradib.* atque *Senn. inteſtiniſ* altum exeiſis; *Brassavolus* verò carunculis excretis; *Schenckius* ramentis ſpithamam longis; *Hellerius* dejectionibus piceis; *Solenander* demum, atrā bile largius profuſā.

Dysenteriam abortione partuque ſolutam ternis exemplis notant *Hipp.* atque *Senn.* Lienem, variolas, & *Empyemata* fluore dysenterico purgari, *Hippocratei* codices, *meique Pr. Adverſaria* teſtantur. At fugacem illam decet eſſe, altas quippe ſi radices agit, ſymptomatum myriadibus pullulat. En vulgatioſa germina, ſtoloneſque præcipui, *πικρὸς δὲ τὸ πικρὸν, καὶ ἐν τῇ ἀλατρίᾳ*, cibi ſatiſdium, diarrhœa perennis, *alium alias impenſe ſtricta*, henteria, tabes, hydroſis, coxarum dolores, nervorum debilitas, meſenterij, coli atque recti abſceſſus, ulcera *Telephia*, *Chironia*, ſcabies foeda, lepræ contermina & puſtulis ſaniſoſis & pruriginofiſ excreta, *Epif. inſania*, *ophthalmicæ* demum, laterales & arthriticæ querelæ ex luculentâ *Hipp. Gal. Avicen. Benivenii, Hollerii, Saxonia, Hildani, Bartholini*, aliorumque benè multorum *avertit*. Sed verborum parvus, tot hiftoriarum famam ſupprimo.

6. Curationem nec miraculoſam, uti *Paulina* eſt apud *Melitzos*; nec ſilam, ut *Amphireti*, dysenteriam (quò *Lemnius Pyratia ſeſe ſubduceret*) epotâ rubricâ ſimulantis, ſed Medicam atque Germanam adhibemus.

Ulcus ergo tergemum atque ſolidamus: Cauſam retundimus: Symptomata demulcemus, atque etiam depellimus.

Rem totam brevibus conſecturi, erectum in *Pharmacenticos*, *Chirurgicos*, *Diæticos*que fontes digitum intendimus.

Pituitam, bilem, ſerum atque pus reſuſa exterminamus. Feras ipſas, quæ viſcera noſtra depaſcuntur, vel vaſtrè & ſubdolè vinō oleoſo atque lacte, inſcamus, cicuramus, ſoporamus, ne noſtra ſæviant in præcordia; vel apertō Marte, ceu tot hoſtiles copias, amaris, catharticis que fundimus atque fugamus.

Aſſumptis auſteris dysenteriam ortam aronaticis compeſcimus, Vinō v. g. aromatitè, *The-triac. Mithridat. Opiat. Salom. Diaſc. Frac. Sal. Volat. ol. Salv. Rorifm. Cort. arantior. & citr. caryoph.* Item gingib. nucif. myrob. &c. conditis. Aſt iſthæc bilioſum v. g. febrilem focum luculentiorē incendunt. Aliundè etiam quæ inter illa pulveres admittunt malè levigatos, ſuis ſpiculis ulcus refricant, & doloribus acunt. *Dysenteriam* verò, mochlicis genitam, ab iſtis, ut ita loquar, incunabulis extinguiſmus; oleoſis quippe atque mucilaginoſis, *lacte præſertim*, cūm inteſtina loricamus, tum inprimis, cathartici mordacitatem inſtramus.

Febris ſi deurit ſiſifera, inflammatio ſi vel ſuborta, vel in prociſtu eſt, dolor atrox ſi vigiliis atterit, viresque ſi conſtant, calida, purgantiaque exulenti. Refrigerantia verò atque lenientia veniant in uſus, tundaturque baſilica, *Praxim* noſtram ne traducant *Aëtius, Traſſianus, Altomari, Hollerius, Valerius, Botallus, Duretus, Schenckius, Hildanus, Hautimius, Claudinus, Septalius, Rhodius* atque *Riverius*, alios numeroſos ne adducamus venæſectione feliciter uſos. Abſit ergo *τοῖς κὶ μερόβου* *Ἐγχεῖσθαι* palpum ut obtrudamus; Abſit ruriſum *ἀνταφύου* ut aſſurgamus; profuſas enim execramur *ἀνταφύου*; purpureas enim ægrotantium animas evocant. *Mediſiſſimus ibis*.

Præcticis emunctæ nariſ deridendos ſeſe propinant Cathedrales Doctores, dum *Rhab. &*



Tamarindos apud. *Rondeletium, Hallerium, Du-*  
*vetum, Forestum, Hildanum, Septalium,* atque *Sen-*  
*nerii*, culpata legunt, atque idcirco omnes om-  
nino purgantium decurias rejiciunt: Felix enim  
ad *Chronicam Dysenteriam* iterata atq; decies  
repetita purgationis exitus, secus sentientes  
arguit. Lactentes ipsos atque prægnantes, *meus*  
*Pr.* tuto purgat syr. vel violac. vel de cichor.  
comp. cum rti. vel ros. solut. veter. vel Cathol.  
Fern. simpl. quadruplicato rheo, vel extract.  
rhab. vel ejusdem aut insiso aut decoct. cum Cor-  
tic. myrob. citrin. sant. citr. & croco ex aq.  
plantag. *Cane pejus & angue, hic, ut & alias in*  
*terminis*, diagrydiata, mercuriata, uno ver-  
bo, omnia *moelica* refugimus. Usus si præscrip-  
tis exposcit fortiora, sambucinaam ebulinamque  
sapam, unâ cum illarum tragemate Querceta-  
nico nulli secundas habemus.

Sed ne fuliores simus, Dietetica medicamen-  
tosa electè digeramus. peritiorum erit morbi-  
ficæ causæ culibet palmaria tribuisse.

Alterentur gallinacea, vervecinaque juscu-  
la oxyapat. agrim. piant. burs. past. vincâ perv.

Decoquantur aut petioli, aut omasa vitulina,  
aut vervecinum caput suâ obductum alutâ, ad-  
ditis subsidente fervore santal. rubr. mace, cin-  
namomo, pareturque gelatina frequentis usus.

Palmam habent lacti incotâ summitates hy-  
periconis & taphi barbat. cum incisis capit. pa-  
pav. alb. & cydoniorum sem. crocique momen-  
to, non omisis ovor. vitellis ad frequentes re-  
pidoisque hâsutus.

Ptisanam paramus vel ex rad. Symphyt. maj.  
filipend. mor. vel ex ras. ebor. C. C. subere,  
haud neglectis usus tempore Syr. vel de cyd.  
vel de ros. rubr. sicc. vel de corall. vel de gra-  
nat. acid vel de oxyacanth. vel guttulis demum  
è lap. hæmat. tinct. secretiori modo parat.

Bubulum coctum & calculis ignitis sapius  
servidum aut per se, aut in pultem redact. sive  
amylô, sive far. fabar. vel oryza, vel len-  
tium, vel milli, cum tragac. g. momentô, mi-  
ras virtutes exerit:

Sorbiles insuper ovor. vitelli cum olivô vel  
amygdalinô optimis, saccharatâ vel plantag.  
vel rosar. aq. superhaustâ, non infimas tenent.  
Imò primas tenebunt, si modicum admiserint  
vel laud. vel mast. vel terr. sig. vel bol. Arm. vel  
bals. Egypt. aut Peruvian. vel etiam sulphuris  
Terebinthinat. vel ætherei demum terebinth.  
spir. tota etiam terebinth. cedat in usus, vel  
ex ovi vitellô, vel cum pulv. Arm. boli, vel  
ex ovi testâ, additô, vitelli vice, syr. cydo-  
nior. momentô; vel in Enematis demum, ex  
vaccinô coctô cum hypericon. taph. barbat. ros.  
rubr. atque cytinis additis ovor. vitell. vel ol.  
hyperici, cydonior. aut lentisc.

Vilibus & incultis, nota melioris Practici  
nec alb. Græc. nec Arcadici pecoris, nec  
Bæotica suis recrementa dare despiciunt. *Haller-*  
*ius Theses memorata. jam videamus qua Thomas*  
*Willis in sua habet dissertatione.*

Quamvis Dysenterix vocabulum, communi  
acceptione Alvi fluxum cruentum, sicut Diar-  
rhæa humoralem denotet; attamen salva Ety-  
mologia, libet nomen istud morbo huic Lon-  
dinenfi, etiam quando minimè sanguinolentus  
est, applicare. Etenim sæpe, & jam dudum

observavi, fluxus istius, qui ferè quottannis  
hic circa Autumnum increbrescere solitus, vul-  
go ventris tormina (sive nostro Idiomate)  
*Gripping of the Guts*) appellatur, duas, & lon-  
gè diversas esse Species; in una sedes Aquosæ  
& quasi limpida cum subita virium prolitatio-  
ne, in altera cruentæ attamen tolerabiles exi-  
stunt; dejectiones interim biliosæ, aut phleg-  
maticæ (dum alteruter morbus grassatur) ra-  
rius eveniunt, & morbum non ita mali moris  
esse denotant. Quo utrique isti morbi Dysen-  
terici, quoad rationes formales, causas, & ab  
invicem differentias, clarè innotescant, ex re  
fore videtur utriusque Typos, quibusdam an-  
nis quando endemii fuerunt, à me observatos,  
& tunc graphice descriptos, hic subicere.

Anno 1670. circa Equinoctium Autumnale  
quamplurimi Dysenteria incruenta, verum a-  
trocè admodum & valde periculosa laborabant  
Affectus, & subito, & frequenter absque ma-  
nifesta occasione invadens, laborantes cum  
vomitu immani & sedibus crebris, & aquosis  
cito in maximam debilitatem inque spirituum  
horrenda deliquia, & virium omnium prostra-  
tiones redigebat. Novi plures pridie latis sa-  
nos, & valde robustos intra 12. horas morbi  
hujus Tyrannidi adeo miserrime dejectos, ut  
cum pulsu debili, & exili, sudore frigido, at-  
que respiratione anhela & elata, jam jam mo-  
ribundi viderentur: & quidem non pauci, qui-  
bus remedia idonea aut medendi oportunitas  
desuerunt, ab eo cito interibant. Egritudo hæc  
per mensem integrum desævians circa Idus  
Octobris decrescere cepit, & ante calendas  
Novembris fere in totum evanuit. Pauci eo  
tempore sedes cruentas, & non multi biliosas,  
plurimi vero & vomitus & alvi dejectiones a-  
quosas & fere ilimpidas, & copiosas, habuerunt.  
Dumque intra hanc Urbem Dysenteria ista po-  
pularis adeo immaniter grassata est, ruri aut  
saltem ultra tria milliaria fere nullus decubuit.  
Porro hic loci quamvis plurimi ægrotabant,  
morbus haud per contagium propagari, sed  
tantum prædispositos afficere videbatur. Nam  
in eadem familia cum affectis conversati, haud  
magis quam eorum contubernia vitantes, cor-  
ripiebantur.

Pro curatione hujus morbi, nulla evacuatio  
juvabat; quinimo phlebotomia, vomitus, &  
catharsis nunquam non nocebant; verum re-  
media fere tantum cardiaca, eaque calidissi-  
ma, sc. spiritu, ac sulphure aut sale volatili  
abundantia, commoda fuerunt; in tantum, ut  
spiritus vini cum saccharo parum delagratus  
remedium popolare, & quasi epidemicum fue-  
rit; atque in tali dysenteria fere semper pro-  
ficuum; etsi in altera cruenta indifferenter usur-  
patum sæpe noxium deprehenderetur. Meden-  
di methodus, quam in plurimis satis feliciter  
tunc adhibui, & simili casu etiamnum soleo,  
juxta modum sequentem fuit.

℞. Theriacæ Andromachi ℥j. vel ℥iiss.umat.  
in lecto superbibendo Julapii sequentis cochl.  
vii. vel viii. & repetat tertia vel quarta vel  
quinta quaque hora.

℞. Aq. Mentha, Cinnam. hord. ana ℥iii. Aq.  
Cinnam tort. Epidem. Theriacal. ana ℥ii. Mar-  
gar. pul. ℥i. sacchari crystal. ℥iiss. misce f. Julap.



Eodem tempore placenta, ex pane tosto Theriaca illinito, & vino generoso aut rubro calfacto intincta, ventriculo calidissime applicetur, & subinde mutetur.

Vesperis si pulsus, & respiratio satis robusta fuerint, propinetur Laudani liquidi Cydoniati gr. xx. in haustu. Ap. Epidem.

℞. Dialcordii ℥i. Laudani liquid. ℥ss. pul. ē chelis compos. ℥j. Aq. Cinnam. q. s. f. Bolus sumend. hora sonni.

Quibus Theriaca, & Mithridatium nauseæ sunt nimis congruunt, exhibeatur dosis pulveris sequentis, aut spiritus Theriacalis, tertia quaque hora cum Julapio.

℞. Pul. ē chelis compos. rad. contrayer. serpentariæ, Virgin. ana ℥j. Cinnamom. rad. Tormentillæ, ana ℥ss. croci, coccinellæ, ana ℥j. f. pul. Dos. ℥ss. ad ℥j.

℞. Sp. Theriacalis Armoniaci ℥iii. Dos. ℥j. cum Julapio quarta quaque hora, vel intermediis temporibus inter doses pulveris. Eodem modo sp. C. C. vel fuliginis exhiberi possint. Potus sit cervisia cum crusta panis, macere, & Cinnam. coctis, edulcorata, aut vinum ultum, & aqua Menthæ dilutum. Victus sit jusculum pulli, aut avenaceum, aut panatella cum rasure C. C. eboris rad. Scorzon. &c. incoctis.

Circa morbi hujus endemii Ætiologiam, imprimis quæ causa ejus conjuncta fuerit, disquiramus: cujusmodi nempe humor peccans, & excernendus viscera adeo infestavit, inque spasmos excretorios cum torminibus, totius corporis perturbatione, & virium omnium subita prostratione irritaverit. Certè nullus huic bilem, vel succum pancreaticum, aliumve quemvis intra ductus intestinales genitum putabit: nec quidem à mero sanguine (prout aliquando in febrium crisis accidit) eum in viscera suffusum credimus. Quin potius (uti ex subito languore, & cita spirituum animalium concidentia, & partium omnium enervatione conjicere licebit) suspicamur in hoc affectu succos corporis præstantiores, scilicet nervosum, & nutritium solidis partibus adpositum, à crasi sua penitus viciari, & quasi fluorem passos deliquari, inque massam sanguineam redundare; dein statim ex ea (siquidem incongrui, & immiscibiles, atque per urinam aut diapnoen amandari inhabiles fuerint) versus stomachum, & intestina per vasa cœliaca transferri, ididemque arteriarum osculis confusissimis exundantes, horrenda isthæc symptomata dysenterica excitare. Porro videtur quod insimul ipse sanguis aliorum humorum gurgite perfusus una colliquescat, inque crasi solutus liquamina sua, cum alteris recrementis in viscerum cavitates profundant.

Certè ex nulla alia causa fibræ omnes motrices, cum totius Animæ concidentia ē vestigio resolvi possint, nisi quod humor eosa fluans, & in quo spiritus Animales hospitantur, eas prorsus destruens, efflueret & quidem effluere censemus, quatenus in crasi viciatus, & quasi lac coalescens Partes continentes molestat, inque corrugationes, quibus excutitur iste irritet. Fraterca morbum hunc fere semper cum rigore cepisse advertimus, cui tamen calor & æstus febrilis minime succedebant, quia sanguis, licet per se parum in vitio, nihilominus succi al-

terius invadentis diluvio pene obrutus, haud emergere aut se recolligere potuit, ut febriliter ac in crisin efferveret. Hinc cardiaca non nisi fortiora, & calidissima, uti aquæ ac spiritus ardentes, Theriaca, Mithridatium, & similia juvabant; quorum viz. particulæ summe activæ, dum vasorum splanchnicorum oscula facile subierint, humores exundaturos repellerent; porro sensim in massam sanguineam se insinuantes ipsam vigorarent, inque fermentationem & diaphoreticos motum cicerent; quo & crasin pristinam recuperare, & quicquid ei incongruum ingeritur, in habitum corporis retorquere queat.

Hæc de morbi hujus causa conjuncta, sive proxima, remotiores sunt *προϋπαρξουσα*, sive antecedentes, manifestæ, sive evidentes; illæ denotant à qua *προϋπαρξουσα*, live apparatu diathesis hujusmodi morbida & epidemica procedit; atque hæc propter quas occasiones, in Affectum Dysentericum citius prorumpit. Quoad priorem, morbus hic siquidem frequentius in Autumno grassatur, immoderate fructuum æstivorum, seu potius *νεραν* comestioni, à pluribus ascribitur; quod equidem pro dysenteria cruenta in causæ partem facile admittimus; quin etiam in aliquibus, morbum prædictum inde seminum quoddam habuisse merito suspicamur, At vero hanc causam istius morbi haud integram & adequatam esse, vel hinc constat, quia multi hujus urbis incolæ, fructibus abstinentes, aut parcius utentes Dysenteria incruenta, dum epidemica fuit, passim laborabant; atq; alii fructivori in pagis vicinis ab ea prorsus immunes, febribus aliis sine alvi torminibus, aut fluxu affiebantur. Enimvero sæpius observavi (quod etiam hoc Anno contigit) post æstatem impensè calidam & siccam, in Autumno febrem Epidemicam, & Anomalam, in pluribus Angliæ locis increbuisse, atque tunc temporis Londinenses pauciores quidem ab ista febre, quam plurimos vero à morbo dysenterico decubuisse: cujus ratio videtur esse, quod cum corpora nostra propter ætatis prægressam intemperiem, in febres Autumnales disponantur, in fumoso & spississimo hoc aëre, illæ potius in hanc morbi speciem determinantur. Quippe transpiratione impedita, humorum degenerum corruptelæ, per cutis poros efferrî inhabiles, intus restagnant; ibidemque, ex arteriis simul omnibus erumpentes, horrenda isthæc viscerum pathemata inducunt.

Porro tempestas æstiva, juxta quod magis aut minus calida aut frigida insimulque humida, vel sicca fuerit, magnam in corporum nostrorum humoribus, prout etiam in succis quibusque fermentativis, alterationem facit; eosque à crasi sæpe genuina, in naturam acrem, aut acetosam, aut adustam pervertit. Insuper in quibusdam Annis mutatio isthæc potissimum Sanguini, inque aliis magis Liquori Nervoso imprimatur. Ratione prioris, plerumque febres Autumnales, vel synochæ acutæ, vel intermittentes, atroces insequuntur; respectu alterius, febres anomalæ, & mali moris oriuntur; in quibus sine magna sanguinis incalescentia, aut morbi crisi, cerebri & nervosi generis affectiones periculose increbrescunt. Porro in hujusmodi pathematis, aut liquoris nervosi sensim dege-



degeneris recrementa, pigri motus sine turgescencia critica lente ac paulatim aggesta, ac intra partes continentes diu permanentia, febres *adipem* cum torpore, & stupore (quales in spasmiologia nostra olim descripsimus) pariunt: aut succi illius in crasi sua multum ac subito mutari corruptelæ, magis effera & activa cum fluore quodam turgescunt, atque è fibris, partibusque nerveis, & solidis ubique in massam sanguineam redundant, & exinde statim in viscerum cavitates exudantes, dysenteriam huiusmodi incruentam, qualis modo describitur, produciunt; & quidem huic ventris fluxum aquosum a succi nervei, & nutritii potius, quam ipsius sanguinis depravatione, & colliquatione exoriri, propter subitas & magnas spirituum dejectiones (quas tanta meri sanguinis effusio non pareret) hinc insuper constat, quoniam hoc morbo laborantes, non zstu ac faucium ardore, aut linguæ scabritie molestantur, quin medicamenta calidissima bene tolerant; & quamprimum ab iis exhibitis humoris peccantis inversio, inque habitum corporis reformatio procuratur, illi sine febre, vigilia, a liisque sanguinis corrupti consequentiis facile convalescunt.

Circum morbi huius causas evidentes non est ut multum differamus, quando talis Anni constitutio est, ut propter iniquam aeris aut cœli influentiam succi a sanguine procreati scilicet nerveus, & nutritius à debita crasi, in alienam naturam infestum, ac uti videtur acetosum, & proinde dysentericam degenerent. Errores in victu aliisque non naturalibus tunc temporis admissi pravam ejusmodi diathesin sovent, adaugent, citiusque in turgescentiæ eccathartice plenitudinem perducunt: singulas, à quibus fiunt, causas manifestas, & occasiones, non operæ pretium erit hic particulatim explicare, quin potius ad dysentericæ alterius, nempe cruentæ, Theoriam exponendam transeamus.

#### De Dysenteria Cruenta.

Autumnus Anni 1670. dysenteria incruenta modo descripta insignem, Hyems impense frigida, qualem vix quisquam tunc vivens cognoverat; insequuta est: nec minus alterius extremi particeps erat Æstus succedens, calidissima nempe & siccissima, ingruente posthæc Æquinoctio autumnali Febris epidemica exorta, per totam fere Angliam grassabatur. Hæc febris intermittens typum servans, paroxysmos modo quotidianos, modo tertianos habuit, cum nullo tamen aut perexiguo tantum frigore, sed calore valde intenso, qui per plures horas, & non raro ultra nycthemeri spatium protractus, vix in sudorem, eumque non nisi partialem, & sæpe interruptum transibat, *autumna* minimè succedente. Laborantes statim languore insolito, vigiliis, vertigine, & frequenter cephalalgia immani afficiebantur; atque morbus raro aut nunquam crisi perfecta judicatus, diutissimè protelabatur, & non raro capiti, aut pectori noxam incurabilem affigens, in affectionem Soporosam aut Phœsicam, & sæpe lethalem desinebat. Febrem huic similem in Poretologia nostra, una cum Theoria & Therapeusi, olim descripsimus; quam & sin-

lis Anni constitutio præcessit.

Dum vero hæc febris ruri per vicos, & oppida ubique fere palabatur, Londini Dysenteria vere cruenta, utpote cum sanguinolenta cum crudelis valde deserviens, complures in sepulchrum subito præcipitabat. A prima huius morbi invasione, plerumque cum ventris dolore, & torminibus, cruor copiosè & crebro deiciebatur; vigilis pertinaces, cum febre & siti ingenti urgere solebant; usque tamen vires mediocriter constabant, ita ut affecti, postquam circiter hebdomadam ægrotantes, fere vigessies quotidie dejecerint, lecto exsurgere potuerint. Dejectiones cruentæ licet terribiles viderentur, attamen laborantes haud cito interibant, quin plures septimanas, immo interdum menses sanguinem quotidie in magna copia excernentes perirebant; & denum, siquando morbus usque in pejus vergens in exitum tenderet, ante letum symptomata alia, ac imprimis vigilia, linguæ ac oris scabrities, sitis, & nonnunquam Aph. hæc exitiales apparebant; quinimo iluxu iure appellivè, & debito citius cohibito symptomata illa citius erumpentia, magnam vitæ periculum indicabant. Pauperes mala victus ratione, à longo tempore prius usi, etiam quorum cura ab initio prætermissa, aut perperâ administrata fuit, frequenter interibant, aut ægrius convalescebant; e contra meliori corporis habitu præditi, atque medicina tempestiva ac idonea freti sæpissimè evaserunt. Porro ipse morbus, licet Epidemicus, haud tamen pariter in omnibus malignus, sed in quibusdam mitior, inque aliis atrocior videbatur; viz. Alvi fluxus ab initio modo lenis, & diarrhææ non ab similis fuit, in qua dejectiones licet crebræ; sine dolore tamen, aut multo sanguine facile, ac interdum cito curabantur. Modo affectus iste valde teter, ac horrendus apparebat, in quo nempe sanguis in copia ingenti cum torminibus, & cruciatu acerrimo profundebatur. Cæterum dejectiones in his liquidæ, & sanguine diluto tinctæ, instar loturæ carniæ, in aliis crassiore cruore saturatæ, ac insuper mucos albicante, & non raro membranarum frustis repletæ fuerunt. Doloris sedes modo superior, modo inferior, in his intestina tenuia, in illis crassa magis affici indicabat.

Medendi methodus, cum remediis quæ in plurimis juvamen contulisse deprehendi, juxta modum sequentem fuit. Imprimis ad fluxum paulo sistendum, aut moderandum.

℞. Theriac. Andromachi ʒj. laudani liquidi Cydoniati gr. xx f. Bolus hora somni sumend.

℞. Conser. rosar. rub. vitriol. ʒii. Theriac. And. ʒj. pul. rad. Tormentillæ, Contrayer. Margarit. Corallii præpar. ana ʒj. Syrup. e rosis siccis q. s. f. confect. sum. at. quarta vel quinta quæque hora q. nucis castan. superbibendo Iulapii sequentis ʒiii.

℞. Aq. Menthæ, Meliss. Cinnam. hord. ana ʒiv. Theriacalis, Epidem. ana ʒii. Marg. ʒi. sacchari ʒi. misce, f. Iulap.

Post diem unum aut alterum exhibeatur portio purgans & altricoria.

℞. Rhabarb. incis. ʒii. myrobalan. citrin. incis. ʒi. s. n. rub. Cinnam. ana ʒi. f. infusio per noctem in aq. plantag. & Cinnam. hord.

Rrrr i



ana ʒiſſ. f. expreſſ. fortis, cui add. Aq. Cin-  
namomi fort. ʒiſſ. f. haultus.

Unoquoque vespere, ac insuper in quibusdam  
casibus interdum Laudani Dosis satis magnam  
exhibere solebam; nec unquam dysenterico  
cuiquam medicamentum hoc obſuiſſe novi; ſive  
quod medicamenti vis narcotica à ventriculi  
ſucco acidiori perdometur & quaſi cicuretur,  
ſeu potius, quod particulæ ejus ad ſanguinem  
transmiſſæ, exinde ruſus, quo minus cerebrum  
afficiunt, cum ſedibus cruentis citro elimi-  
nentur.

Quibus Confectio ſuperior, aut nauſææ, aut  
minus commoda fuerit, loco ejus pulvis ſe-  
quens exhibeatur.

ʒ. Pul. pannonicæ rub. ʒi. rad. Contrayer.  
ʒiſſ. f. pul. divide in tres partes, ſumatur pars  
j. in quolibet liquore.

Vel ʒ. Boli Armen. Alexit. (hoc eſt ſuccis  
ſol. Torment. Biſſort. roſ. rub. &c. imprægnat.  
& ſole exſiccatur.) rad. Contrayer. ana ʒj. Mar-  
garit. Corallii rub. ſuccini albiſ. ana ʒiſſ. f. pul-  
vis. Dosis ʒii. ad ʒj.

ʒ. Rad. Caryophyll. Scorzonæ, ana ʒj.  
Torment. Biſſort. Contrayer. ana ʒiſſ. C. C.  
uſti ʒiii. raſuræ eboris, C. C. ana ʒii. Cocci-  
nel. ʒiſſ. flor. roſ. rub. ʒii. coquantur in ſ. q. aq.  
font. ad ʒb. ii. circa finem adde conſer. roſ. rub.  
ʒiii. colaturæ clarificatur adde Aq. Epidem.  
ʒiv. Dosis iii.

Ad ſedanda inteſtinorum tormina, & ero-  
ſiones ſanandas enemata crebro ex uſu eſſe  
ſolent.

ʒ. Decoct. ſummitatum hyperici, cum pe-  
dibus vervecinis, aut meſenterio ovino ʒviii.  
vel xii. Theriacæ Andr. ʒii. olei hyperici ʒiſſ. f.  
enema.

Omitto hic plures alias medicamentorum  
formulas, quæ in libris practiſis paſſim extant,  
& quas unusquiſque pro re nata præſcribere poſ-  
ſit, ac debeat. Quod ſuper eſt in morbi hujus  
Epidemici, ſeu potius Endemii Œtiologiam  
paulum inquiramus.

Dysenteriam, uti non incruentam, ita nec  
cruentam à meris inteſtinorum contentis acro-  
ribus procedere ex prædictis ſatis conſtat. Por-  
ro ſicut alter iſte morbus, à Liquoris Nervei,  
& Succu Nutritii degeneris fluore; ita hic po-  
tiſſimum à Sanguinis corruptela & vitio origi-  
nem habuiſſe videtur; ac ideo quemadmodum  
iſtius hic loci Endemii alibi ægritudo  
contemporanea fuit, ita cum Dysenteria cruen-  
ta Londinenſis afflixit, febris intermittens ter-  
tianiæ hæmitritæ (prout à Medicis deſcribitur)  
ſimilis reliquam Angliam infeſtabat. Et quidem  
ſatis obvium erit concipere, cum ſanguis æli-  
vis caloribus aſſatus, proindeque circa Au-  
tumnum in efferveſcentias febriles, & tanquam  
vina excaleſcunt in fermentationes, quibus ex-  
purgentur, immodicas aptus fuerit, ſi parti-  
culas degeneres & excernendas propter Diap-  
noen, in aurâ ſpiſſiori impeditam, ordina-  
ria per diaphoreſin viâ amandare nequeat;  
quod iſte efferveſcens adhuc, eas verſus inteſti-  
na transferat, perque arteriarum ibi conſtiſſi-  
marum oſcula magis patentia eliminare ſata-  
gat. At vero ſiquidem cruoris degeneris recre-  
menta incongrua, ſive *muſciſſima* ei penitus  
incocta: & intime conſuſa non facile extricari,

aut ſecerni poſſunt, propterea iſte ſaburra hæc  
gravidus, ac onuſtus, inter circulandum, va-  
ta exilia dum pertranſit, plurimum coarctatur;  
proindeque circa inteſtinorum ſuperfi-  
cies internas, ubi arteriarum tunice ſunt te-  
neriores, & oſcula laxiora, ſanguis ibi tur-  
geſcens, ſimulque ob particulas heterogeneas,  
quibus ſatur eſt, in craſſatus, & ad coagulan-  
dum aptus, facile erumpit; cumque recre-  
menta ſua ſecernere & exuere nequeat, ſui  
ipſius portiones iis maxime infeſtas effundit.

Itaque ad Dysenteriam Popularem excitau-  
dam tria hæc concurrere oportebit viz. impri-  
mis adlit maſſæ ſanguineæ dyſcracia, propter  
Anni intemperiem exorta, quæ in efferveſcen-  
tias febriles, aut ſponte, aut occaſionaliter  
ineundas, valde proclivis ſit. Quapropter dum  
hic morbus Londini, febris Anomala in ple-  
riſque aliis locis graſſari ſolet. ſecundo ſanguis  
ita efferveſcens, & craſi degeneris recre-  
menta, & corruptelæ ipſi intime adeo conſun-  
duntur, & incoquantur, ut neque facile ſecerni,  
nec Diaphoreſi, aut Diureſi cito elimina-  
ri poſſint. Quare obſervavimus Febrem Dy-  
ſenteria huic contemporaneam uſque diutur-  
nam, & judicatu difficillimam fuiſſe, ejuſque  
paroxyſmos vix unquam in *anipſia* deſiſſe. Ter-  
tio his accedat (quæ diatheſes prædictas in  
Dysenteriam cruentam determinat) pororum  
contuſio, propter ſuſam & craſſiorem  
aëris conſtitutionem inducta: Hæc etenim ſan-  
guinis efferveſcentiam *reſiſſa* verſus inteſtina  
dirigit; ubi cum purgamenta ejus ſecerni,  
ac à reliqua liquoris maſſa facile abſcedere  
nequeant, ipſe per portiones maxime in-  
ſeſtas, & proinde extravari aptas, ſponte  
effluit.

Propter huiusmodi apparatus Dysenteria  
Londinenſis ordinaria, & non admodum ma-  
ligna exoriri ſolet; quæ licet præ ſedibus cruen-  
tis, horrenda ſtatim, & plerumque diuturna  
eſt, haud tamen valde contagioſa, aut ſæpius  
lethalis exiſtit. Verum inſuper hic morbus in-  
terdum virulentus & quaſi peſtilentialis plures  
interficiat, & miaſma ſuum per contagium la-  
te explicat. Porro in tali ſtatu ſanguinis por-  
tiones malignitate quadam tactæ, velut in peſte  
corrupti incipiunt, & ſtatim à reliqua maſſa,  
ne tota mox peſſundet, ſecerni, & eliminari  
debent; quæ tamen ſiquidem craſſiores, proin-  
deque per alvum potius, quam per habitum  
corporis aut urinam, expurgari apræ, Arteriarum  
Coriacæ, & meſentericæ ductu inteſtinorum  
tunicis inferuntur; ubi cum à reliquo ſanguine  
non facile abſcedunt, partim in vaſis erumpen-  
tes, ſedes cruentas inducunt, partimque in-  
teſtinorum membranis infixæ, diatheſin in iis  
aut phlegmonoeiden aut ulcerofam, quando-  
que item ſphaceloſam, & cito exitialem pariunt.

Hæc de Dysenteria cruenta, quatenus circa  
Autumnum huius loci morbus endemius eſſe  
ſolet, cauſis, tum Conjuncta tum Antecedenti:  
quod ſpectat ad cauſas manifeſtas, ſive oc-  
caſiones quæ diatheſin *reſiſſa* citius in actum  
deducunt, huc imprimis reſerri debent mala  
victus ratio, atque aëris inſpirati pravitas;  
quapropter in quacumpue regione, ob ſæcto-  
rem, & vitioſa alimenta militum caſtris, &  
captivorum carceribus familiaris exiſtit; por-  
ro



ro ad hunc censum pleraque alia in non naturalibus errata pertinent, de quibus nec otium, nec operæ pretium erit hic particularius disserere.

Indicationes Therapeuticæ, in quas medendi ratio, sive praxis superius adumbrata resolvi potest, præcipue, sive primariæ sunt quatuor, scilicet duæ respectu sanguinis, ac totidem respectu Viscerum. Primo quoad sanguinem, tumcrementa & corruptelas ejus intus vergentia exterius versus habitum corporis, quo per alimen-<sup>ta</sup> exhalant, propellere, tum coagulationes ejus dissolvere, & crasim, quantum, & quamprimum fieri potest, restituere oportebit: Prius horum Diaphoreticis, & alterum Alexipharmacis idoneis pericitur. Secundo quod spectat ad viscera, fibrarum nervearum sensilio molesta, & carnearum ad spasmos excretorios irritatio sedari, atque vasorum oscula, ne sanguinem, & humores in ductus intestinales profundant, occludi debent. Prius horum Opiata, & alterum remedia styptica, sive astringentia efficere solent: Insuper his, symptomata maxime urgentia, & malos affectus huic morbo supervenire solitos, cujusmodi imprimis sunt Febris cum Siti ac Vigiliis, intestinorum tormina, ac interdum erisio, inflammatio, ac ulcera, sanare oportet.

Indicationibus istis primariis non singulatis & successive insillendum erit, verum eas simul omnes complicare, eodem ænipo-<sup>re</sup> prosequi incumbit. Quapropter medicamentorum formula, remedia diverſi generis, sc. Alexiteria, Styptica, Diaphoretica, & Opiata comprehendere debent. Quoniam non facile erit hæc in methodum certam, & præcepta, quæ plurimis convenient, redigere; ideo satius duxi curationum dysentericarum Autumno Anni 1673. quando hic morbus atrociter defævit, factarum, exempla quædam nunc in medium proferre.

Juvenis illustris æ. circiter annos natus, temperamenti sanguinei, & constitutionis prius sanæ, circa calendas Octobris, sine causa manifesta in dysenteriam incidit; & quamvis à primo statim die, sedes copiosæ & cruentæ cum torminibus erant; attamen robustus, & viribus adhuc constans medicinam, ad tertiam usque diem distulit, quo tempore, sera nocte accersitus præscripti bolum sequentem.

℞. Theriacæ Androm. ʒj. laud. liquid. Cydoniar. ʒj. misce, superbibat Julapij sequentis haustulum.

℞. Aq. Tormentillæ, Menthæ, Cinnam. hord. ana ʒiv. Theriacalis Epidem. ana ʒij. Margarit. ʒj. sacchari ʒj. f. Julap. porro tertia quaque hora cepit electuarij sequent. circiter ʒjss. cum eodem Julapio.

℞. Conserv. Ros. Rub. ʒij. Ther. Androm. ʒj. pulv. rad. Torment. contrayer. margarit. corall. præ ana ʒss. syr. papav. Rhead. q. f.

His remediis morbi ferocia cito minuebatur, ut nichemeri spatio vix supra 6. aut 7. sedes habuerit, quæ item non valde cruentæ ut prius, sed carunculis, & quasi membranarum frustis refertæ apparebant; quod ita proculdubio fiebat propter tunicæ villosæ portiunculas quasdam erosas: unoquoque vespere opiata laudano sumebatur.

Die morbi quinta cepit haustum sequentem  
℞. Rhabarb. incis. ʒij. myrobalanor. citrin. ʒjss. sant. citrin. ʒss. Cinnam. pul. ʒj. salis absinth. ʒss. f. infus. per noctem in aq. plantag. & Cinnam. hordeat. ana ʒijss. colaturæ adde aq. Cinnam. fort. ʒij.

Ter vel quater purgabatur cum levamine, & die postero, febre imminuta melius habuit, adeo ut convalescere vilis carnes comederit; inde tamen mox recidivam passus est, ut dysenteria cum febre rediens statim atrocior quam ab initio fuerit, eo tempore, cum medicamenta priora nausæ esse cœperint, juxta modum sequentem præscripti.

℞. Pul. rad. Tormentillæ, Contrayer. boli alexiterij ana ʒj. Margarit. corall. rub. pr. succini albi ana ʒss. f. pulv. dosis ʒss. in aqu. destillat. ʒij.

℞. Summit. Cupressi, Myrti, ana M. iv. solior. Ulmariz, Pimpinell. Hyperici, Caryophyllat. ana M. iij. rad. torment. Bistort. ana ʒvi. florum ros. rub. M. iv. Baccar. Chermes ʒiv. Cinnam. maceris, ana ʒj. concis. omnibus, & simul contusis affunde vini rub. Florentini, Aq. rosar. rub. ʒb. iv. destillentur organis communibus, liquor totus misceatur & eaulecoretur inter sumendum, cum syr. è coralliis. Item ter, vel quater in die cepit decocti sequentis ʒiii. vel iv.

℞. Rad. Caryophyllatæ, Scorzoneræ, ana ʒi. Torment. ʒii. C. C. usti, & pul. ʒvi. ras. Eboris C. C. ana ʒii. summat. Hyper. M. j. florum ros. rub. balauſt. ana p. i. coquantur in aq. font. lib. ij. ad ʒij. addendo circa finem vini rub. Lisbon. ʒiv. confer. ros. rub. ʒiv. effervescant clausæ per horam i. dein coletur per Manicam Hippocratis.

Singulis noctibus cepit Laudani liquid. ʒj. in aq. dysentericæ modo descriptæ cum syrupo caryophyl. ʒiii.

Pro potu ordinario decoctum C. C. usti, cum hordeo, crusta panis, macere, & Cinnam. cujus lib. iij. lactis recentis lib. i. addebatur.

Infusio purgans iterum sumebatur, cujus, & priorum usu, intra 10. dies febre evanescente dysenteria longe mitior evasit, quæ licet sine torminibus aut multo sanguine, usque tamen cum carunculis, membranarum frustis, & phlegmate sive gelatina cruenta quotidie excretis, persistit.

Itaque ad intestina corroboranda, & sananda sequentia exhibebantur.

℞. Summitatum Cyperici, solior. vincæpervincæ, pilosellæ ana M. j. florum rosar. rub. pug. ii. coquantur in jure intestinorum vervecin. colaturæ lib. j. adde olei Hyperici ʒii. mellis ros. ʒss. misce pro duobus clysteribus, quorum unus mane, & alter hora quinta pomeridian. injiciebatur. Emplastrum de Minio & Paracelsi sup. abdomen gestabatur, porro bis in die cepit succi plantaginis cum Aq. Scordii & epidemica expressi ʒiii. item quotidie comedebat pomum Cydonium excavatum, atque pulverem olibani, Mastichis, & balsami Tolutani impletum ac sub cineribus coctum.

His remediis constanter usus, intra mensem perfecte convalescebat.

Circa idem tempus Juvenis alter robustus in Dysenteriam terribilem incidit: à primo statim



die sedes crebra, & valde cruenta cum dolore & torminibus erumpebant; insuper febris intensa, cum vomitu atroci, siti, & vigiliis intestabant: cum ab opiatīs assumptis symptomata hæc paulo mitigarentur, mox delirio, & vertigine, cum pulsu intermittente, & rigoribus horrendis afficiebatur; in quantum sc. materies maligna intus cohibita, illico in cerebrum, & nervos redundaret; qui tamen affectus quoties alvi fluxus, & vomitus redirent, illico sedabantur. Die quinta materiam cruentam evomens, de insigni stomachi cruciatu, & dolore velut ulceroso conquestus erat; revera ut suspicio esset illic phlegmonem, aut ulcus, prout circa intestina assolet, incepisse; verum à iusculis emollientibus, & lacteatis adhibitīs, vomitio, & stomachi tormina brevi cessabant, aucto interim alvi fluxu. Cepit ista nocte Diacodii ꝑi. cum aq. Paralyseos, & Cinnamonī aquosa ana ꝑi. à quo remedio in tantum alleviabatur, ut nycthemeri spatio, sine vomitu, aut doloribus, & paucis tantum sedibus cumque pulsu laudabili, & crebro somno mediocriter habuerit, verum nocte insequente repetita licet eadem opiata alvi fluxus valde frequens, & cruentus redibat. Postridie cepit infusionem Rhabarb. cum myrobalan. sant. rub. & Cinnam. crebro deiecit biliosa, summe acris, & prorsus incruenta; dein vesperi isto sumsit laudani liquidi cydoniati gr. xxv. in cochl. aq. Cinnamonī hordeat. somnos modicos, & magis placidos habuit. Postea medicamentorum plurimum abhorrens, cepit tantum opiata unoquoque vespere, modo hanc modo istam, & brevi convalescit.

*Curationes, Consultationes, Observationes  
& Anatomica Inspectiones  
ex variis.*

In Dysenteria proprietate (cæteris omnino observatis, quæ in cruenta dejectione necessaria sunt) specifica unice juvant.

1. Essentia seu tinctura smaragdi, quæ sit hoc modo.

℞. Particulas seu recrementa smaragdi (3j. venit 4. vel 5. basis) tere. (non in mortario nisi ferreo) pulverem tenuissimum super porphyrio, superfunde urinam puerorum simplici destillatione paratam, & in loco calido tincturam extrahe, quam toties affuso menstruo recenti collige, quoties illa in idem mittitur. Tincturas omnes collectas & filtratas, ablato per destillationem menstruo, reduc in pulverem griseum, quem de novo cum sp. Vini extrahe in summam viriditatem spiritus Vini denuò ablato ad aliqualem consistentiam, relinquatur Essentia vel tinctura Smaragdi in fundo: cuius gr. 2. 3. 4. ad 8. vel 10. in aqua plantaginis, tormentillæ, exhibita, omnes dysenterias miraculosè sistit & ventriculū roborat.

NB. Spir. vitrioli non datur, præcipuè si exulceratio adsit.

2. Essentia Croci Martis à Crollio descripta.

3. Aluminis crudi 3j. in aqua plantaginis ad potandum data, dysenteriam solvit.

4. Tinctura corallorum ad gr. 4. 5. 6.

(Præsertim quæ cum spiritu ligni quercini est parata vel

*Tinctura de Catechu.*

℞. Terra Japonicæ sive Catechu q. v. affunde spir. vin. tartarizat. & s. a. Extrahe in digestionem Tincturam, quæ datur ad gr. 10. ad 20.)

5. Laudanum opiatum cæteris paribus.

(Hoc præ omnibus ut sacram anchoram commendo, modò sit ritè præparatum.)

6. Aurum potabile Anglicanum (It. pulvis spongiæ salicis, de quo supra.)

In Dysenteria, causa, quæ est humor biliosus & fervens, infusione ex Rhabbarbaro & Myrobalanis tollenda, facta infusione in aqua hordei, ipsoque Rhabbarbaro fortiter expresso, semel atque iterum facta repetitione purgantis, ad leviter adstringentia, tam extrâ quam intrâ applicanda, accedendum. Quale in primis est seq.

℞. Succī baccarum sambuci q. v. in eum injice micam panis ex furno extracti calidam, ut succum imbibat. Hinc iterum in fumum, ut exsicceetur, inde, quo facto iterum in dictum succum immerge, exsiccaque, idque tertio & quintò repete. Tandem sicceetur, ut in pulverem, redigi possit, dos. 3j. singulis matutinis. Prodest etiam hic nux moscata & Myrobalani conditi in quantitate aliqua assumpta, syrupus ribium, berberorum &c. Crollius emplastrum ex Theriaca & terra sigillata tepidè applicat.

Injiciatur quoque Clyster ex decocto anodyno Chamomillæ, anethi & rosarum, in quo dissolve sebum hircinum ab ʒss. ad 3j. cum ovi vitello dissolvendum, ne cohzescat.

Quòd si malum ad statum & incrementum pervenerit, convenientissimum remedium est, in principio miscere clysterem sequentem, quem sæpius reiterare convenit. Nam, si materia pauca sit, solis interdum id genus Enematis, adhibita jam dicta purgatione curatur morbus.

℞. Lactis usulati seu chalybeati lbjss. mellis rosati ʒiii. ovor. vitell. Num. ii. F. Clyster. Quod si cares lacte.

℞. Aquæ hordei, in qua folia Chamomillæ & rosarum an. p. ij. decocta sint, aut loco decocti hordei capiat vervecum, capitum in primis, si dolor magnus adsit: pottea ad ea quæ vim habent constringendi & simul refrigerandi, Enemata properandum, quale in primis est seq.

℞. Herb. Centinodij. burs. pastoris, plantaginis an. Mj. summit. taphi barbati. equiseti an. Mss. & si fortius delideras, adde balauft. Mss. Myrtillorum ʒii. seni. plantaginis. portulacæ an. ʒii. flor. rosar. p. ii. Coq. in f. q. hordei. ad lbj. aut lbjss. in decocto dissolve mellis rosar. colati ʒii. sacch. rub. aut rosacei ʒj. F. Clyster, qui sæpius injiciendus & nonnunquam cum præscripto adstringente permutandus.

Interiùs per os exhibeantur Syrupi adstringentes, opiata, condita & conservæ. Præstat conserva radicis symphiti cum terra sigillata & Sale corallorum. Præstat etiam post abstersionem sæpiùs exhibere dosim Laudani opiatī mei. Hoc nimirum ad omnem alvi fluxum, evacuatā priùs materiā tuto exhibetur magnoque cum fructu. Aut exhibeatur potio Cardiaca, quæ:

℞. Theriacæ recentis aut mediæ ætatis confect. alkermes, ana ʒss. trochisc. de Carabe. de terr. sigill. an. ʒss. ad ʒj. syr. rib. aut violar. ʒj. de rosis siccis ʒss.



M. Capiat horâ somni, aut post meridiem.  
 ℞. Confect. Alkermes. de hyacintho an. ℥i.  
 trochisc. de carabe ℥i. aq. plantaginis ℥i. syr.  
 rosarum ℥i℥. F. Potio Aut Bolus ex confectio-  
 ne de hyacintho ℥i℥. terra sigillata aut bolo  
 armeno aut trochiscis de carabe ℥i℥. cum sac-  
 charo. F. Bolus.

Exterius inungatur oleo myrtillorum & cy-  
 don. ana aut fiat ex herbis seq. decoctio, quâ  
 fomentetur venter & renum regio.

℞. Plantaginis. Centinodii an. Miv. fol.  
 symphiti. equiseti an. Mii. gallarum. nuc. cu-  
 pressi. gland. quercuum an. ℥ii. flor. rosarum.  
 verbasci an. p.iii.

Decoque in aqua pluviali & vino adstringen-  
 te, addito sub finem coctionis pauco acet. aut  
 inungatur venter inferior Unguentô comitissæ  
 aut unguentô stypticô Fernelii: applicetur Em-  
 plastrum de Maltiche, ol. cydon. an. ℥j. pul-  
 veris myrtillorum ℥iii. Prostant etiam hic lapi-  
 dum pretiosorum solutiones & perlarum.

Crura laventur decoctio sequente.

℞. Gallarum immaturarum, nucum cu-  
 pressi an. ℥i℥. rad. filicis. Calcitrapæ an. ℥ii.  
 tol. plantaginis rapsi barbati an. M.

Coque in Vino adstringente, cum decoctio  
 laventur crura manè & vespri.

Cum corpus satis purgatum clysteribus di-  
 ctis, offeratur infusio Rhæados cum theo tosto.

℞. Rhabbarbari parum tosti ℥i. Infunde cum  
 Myrobalanorum Citrin. ℥ss. santali Citrin. ℥ss.  
 Cum sero lactis aut aq. Endivæ, exprimantur,  
 expresso adde. Rhabbarbari torrefacti ℥i℥. syr.  
 capill. Veneris ℥i. Capiat manè.

Hinc ad ea, quæ fluxum planè sedant, ac-  
 cedendum, in quibus sequentia medicamen-  
 ta primas tenent:

℞. Gummi Arabici & Cera alba ana ℥ss.  
 includantur in pyro aut malo cydon. alicujus  
 magnitudinis, quod in cineribus vel ad ignem  
 assetur, ut optime mollescat, exhibe manè &  
 vespri, quoties visum fuerit. Non incommo-  
 dum quoque fuerit sæpius cum vino rubro ad-  
 stringente aut cum vino granatorum exhibere  
 supra dictos panes cum succo baccarum sambu-  
 ci.

Experimentum certum, si iustô tempore  
 præcipue, ubi exulceratio mundata, & jam  
 consolidanda.

℞. Pomum Cydonium vel aliud acidiuscu-  
 lum, excavetur superiori parte & expleatur  
 cerâ albâ rasâ & gr. iii. mastichis, iterumque  
 claudatur & involvatur stupâ & assetur in ci-  
 neribus, pomum assatum detur hora j. ante ci-  
 bum & mira operabitur,

℞. Carnis Cydoniorum q. s. cum rosis ru-  
 bris & vino rubro Chalybeato, & applica ven-  
 tri inferiori, summum arcanum est in hoc affectu.

Crocus Martis, Limatura Martis seu Chaly-  
 bis primò urinâ pueri, seu aquâ dulci aspersa  
 exedatur tota nonnullis infusionibus aceti tar-  
 tarisati, acetum evaporet, ejus substantia re-  
 sidet, forti calcinatione in pulverem rubicun-  
 dum impalpabilem convertatur, quem aquâ  
 pluvîâ & rosar. ablues & exsiccabis.

Huius. ℞. ℥ss. Seu ℥i. in dysenteria & san-  
 guinis profluviis & obstructionibus ab extra in  
 hæmorrhagia desperata.

Ejusdem usus est Oleum Croci Martis, cujus

processus sequens. Crocum Martis cum urina  
 pueri forma in massam, quam per retortam de-  
 stilla more spiritus vitrioli, & proveniet oleum  
 rubrum & aliquantum spissum, quod si per  
 dies aliquot vel sub fimo digeres, vel in cin-  
 ribus circulas ad intrinsecos morbos egre-  
 giam operam præstiteris, usus idem, qui Croci.  
 Dosi. minor croco gutt. 4. vel 5.

Sulph. Solis, Hoc a proprietate sua fixa sul-  
 phuri microcosmico dissoluto maxime confert.

℞. Sal. nitri & Sal. comm. unis q. v. ( v. gr.  
 lbss. ) boli communis lbvi. destilla. a. oleum,  
 veluti destillas oleum Sal. communis. Hoc oleo  
 solve solem prius amalgamate & admixtione  
 flor. Sulph. calcinatam ( ut infra dicitur ) in  
 cineribus positum in matraccio pulverisatum,  
 affusô oleo destillato ad eminentiam digito-  
 rum aut ad ℥j. Solis additur ℥ss. sp. Sal. dicti. In-  
 ceturam separa & spiritum utique ad siccitatem  
 sæpius inde evoca per distillationem ipsam, so-  
 lis solutio remanebit in fundo rubra. Huic su-  
 persunde spiritum ( oleum ) vini & tincturam  
 destilla ad oleositatem. Hujus guttæ v. vel vj.  
 in vehiculis convenientibus data fluxum ven-  
 tris sistunt & ventriculum corroborant.

Amalgama & Calcinatio Solis. ℞. part. j.  
 Solis part. vi. argentivivi. F. s. a. amalgama,  
 quod in crucibulum ponatur, & evaporetur  
 omnis Mercurius. Pulvis reliquus cum novo  
 Mercurio, ejusdem dosi amalgamatur, idem  
 Mercurius exhalet. Eadem amalgamatio re-  
 petatur. Hinc adde part. ii. flor. Sulphuris,  
 in crucibulo detineatur in igne, donec Sulph.  
 omne exhalet & deslagret. Idem labor sextâ  
 vice repetatur.

Non sine fructu quoque in hoc malo sudor  
 provocetur cum terra sigillata & lapide Bezoar.

Afferunt quoque non levem opem cucurbi-  
 tula umbilico & illis affixæ.

Potus sic aqua hordei, in qua CC. coctum sit.

Dysenteria in superioribus intestinis si suc-  
 rit, plerumque lethalis est simul, ob consen-  
 sum evomente aut singultum patiente ventri-  
 culô. Potest tamen us remedii curatio tentari,  
 exceptis Enematibus, quæ aut nulla ut  
 pauca esse debent, assumptô per os lacte cum  
 melle aut saccharo rosaceo ratione absterfio-  
 nis & cæteris necessarius supra dictis exhibitis.

Quod si ab intemperie calida acres humo-  
 res generentur ab hepate, & dysenteria hoc  
 modo foveatur, unguatur hepar Cerati fanta-  
 lini ℥iv. ol. Nymphææ, rosarum an. ℥i. Cam-  
 phoræ ℥ss. allumanturque, quæ intemperiem  
 alterant.

#### Experimentum in Dysenteria.

℞. Cupular. glandium q. v. affunde aquam  
 fabrorum ferrariorum, vulgò das Löschvasser  
 auss. der Schmitte Coque donec intense satu-  
 ratam rubedinem contraxerit, Aquam tinctam  
 filtra & singulis duabus vel tribus horis Hau-  
 stulum ad ℥ii. propina. Joh. Harimann. in Pract.  
 Chymiatr.

Ut ad Curativas Dysenteriz Indicationes  
 tandem procedamus; cum varia, quæ huic  
 morbo accidunt symptomata, diligenter ac-  
 mature mecum pensitasset, Febrem cum esse  
 ( sui



(sui sc. generis) in intestina introversam deprehendi, cuius ope humores calidi atque acres in massa sanguinea contenti atque eandem exagitant, per Arterias Mesaraicas in dictas partes deponuntur, unde à vehementiori sanguinis atque humorum eo contendendum impetu patetactis vasorum orificiis, sanguis per sedem effunditur. Interea temporis importuno intestinorum nisu, quæ omnem adhibent operam ut humores acres continuo uiscitantes expellant, mucus iste, quo naturaliter obducuntur, singulis sedibus, nunc parcius, nunc copiosius unâ egeritur. Proinde ultro se Indicationes offerre videbantur, neque mihi aliud quippiam incumbere existimaui, quàm ut primum acres illos humores secta vena immediate reuellerem, quo facto inuper reliquam massam contemperarem, tum etiam dictos humores per Cathartica subducerem. Hæc itaque Methodo sum usus; Quo primum accerserem die, venam cubiti tundendam suasi, eadem nocte & Paregoricum propinavi; & sequenti Aurorâ Potionem hanc Cathartica Lenitivam mihi familiarem.

℞. Tamarind. ʒss. fol. Bennæ ʒii. Rhei. ʒiſs. Coq. s. q. Aquæ Colaturæ ʒiii. dissolve Mann. & Syr. Ros. solut. an. ʒi. m. f. Potio sumenda summo mane. Hanc ego Potionem Electuario cuiuslibet cum Rhei pauca quantitate parato, soleo præponere; licet enim Rhabarbarum Cholæræ atque acrioribus quibusque humoribus evacuandis sit dicatum; attamen nili Maniæ aliquid, aut Syrupi Rosacei, vel aliud ejusmodi, eâ quantitate admisceatur ut ad pleniorum Catharsin assurgat, non admodum conducit. Quandoquidem verò satis est obvium, Medicamenta Cathartica etiam lenissima, & tantum *Ergastriæ*, ventris tormina intendere, spirituum etiam dejectionem, atque *Relaxationem* universalem ægro inferre, adventitio nempe illo tumultu quo sanguinem ac humores commovent inter operandum; ea propter solenne mihi est Paregoricum temporis aliquanto subicere quàm post Cathartica consuevimus, horâ sc. pomeridianâ quacunque, modò Catharticum suo defunctum munere videatur; quo sc. quem concitavi motum denuò sufflaminare valeam. Deinceps adduas ad huc vices dictum Catharticum præscribo, alternis sc. diebus hauriendum; Paregoricum etiam post singulas Purgationes, quo supra monuimus tempore. Hoc insuper diebus à Purgatione vacuis tam mane quàm sero exhibendum curo, quo sc. symptomatum ferociam debellem, atque inducias impetrem, dum cum humore peccante exterminando mihi res est: Anodyno autem utebar, maxime Laudano liquido, guttis nempe 14. vel 15. in Aqua, qualibet Cardiacâ, pro dosi una: Post Venæ-sectionem & Catharsin semel celebratam, Aquam Cardiacam è temperatioribus subinde degustandam concessi: Aquam sc. Epidemicam, Aquam Scordii compositam, aut similem, (idque imprimis in senioribus ac Phlegmaticis,) quò nempe spiritus magnâ Dejectionum vi, quod in hoc morbo usu venit, prostratos erigerem quadantenus, & refarcirem; Potus erat Lac coctum cum Aquæ triplo, aliquando etiam Lac Cerevisiatum, vel Cerevisia cum panis cortice & Maci inco-

ctis; Panatellâ item nonnunquam vescabatur, nonnunquam jusculo e carnibus ovinis macilentioribus. Grandæviores lectulo magis addixi; Aquam item Cardiacam illis familiarem liberalius indulsi, quàm infantibus aut junioribus par erat. Laudata Methodus omnibus, quæ nûhi hæcenus innotuere, in hoc morbo vincendo facillè palmam præripuit; qui per raro ultra tertiam Purgationem duravit.

Quòd si morbus prætractior his non cederet, dictum Paregoricum ægro inhibui singulis diebus mane & horâ somni, donec omnino convalesceret, nec vel minimum quidem incommodi à tam frequenti Medicamenti Narcotici repetitione mihi adhuc videre contigit, (quantamlibet noxam inde sequituram commiscantur inexpectati,) licet plures noverim qui in morbo contumaciori idem ad septimanas aliquot continuas quotidie usurpaverint.

Ut unica instantiò (neque enim pluribus Convalescentium exemplis, nullâ cogente necessitate, Lectori tadium creabo) Methodum jam à me propositam commendatam faciam; Vir Pietate atque Eruditione insignis *Joh. Belke* S. T. P. & Comiti Sancti Albani à Sacris Domesticis, durante hac Constitutione, Dysenteria Acutissimâ laborans, me in subsidium accito, ipsissimâ hac Methodo restitutus est.

Infantes hoc morbo correpti eodem planè modo erant tractandi, sanguinis tamen extrahendi quantitate, tum etiam Medicamentorum, tam cathartici quàm Anodini, viribus pro annorum ratione immutatis; ita ut v. gr. Narcotici guttæ duæ infanti unius anni sufficerent.

Laudanum Liquidum, quod in quotidiano, ut dictum, usu mihi erat, hanc ad normam simpliciorum præparavi.

℞. Vini Hispanici lbj. Opii ʒii. croci ʒj. pulv. Cinamomi & Caryophyllorum an. ʒj. infundantur simul in B. M. per duos vel tres dies, donec liquor debitam consistentiam acquirat, Colatura servetur pro usu. Hanc nostram præparationem Laudano Officinarum solido anteferebam virtutibus quidem non censeo, sed ad formam saltem commodiorem & majorem Dosis certitudinem, eidem antepono; cum sc. Vino, Aquæ Distillatæ, aut liquori alii cuicunque instillari possit. Et profectò non hic mihi tempero, quin gratulandus animadvertam, Deum Omnipotentem *miris dumtaxat modis*, non aliud remedium, quod vel pluribus ma is debellandis par sit, vel eadem efficacius extirpet, humano generi, in miseriarum solamen, concessisse, quàm sunt Opiata, Medicamenta sc. ab aliqua Papaverum specie desumpta. Et quamlibet sine nonnulli, qui credulis persuadere velint, omnem ferè Narcoticorum, Opii præsertim ipsius, virtutem ab artificiosa ac debita, quam soli adhibent, præparatione pendere; qui tamen experientia judice certaverit, & tam simplicem succum à naturâ oblatum, quàm ejus præparata cum diligenti observatione in usum frequenter revocaverit, nullum ferè discrimen intercedere comperiet, & mirandos illos effectus, quos edit, nativæ ipsius plantæ bonitati atque excellentiæ, non verò artificis polydædali solertiæ deberi, certò sciet.

Qua-



Quinimò ita necessarium est in hominis periti manu organum jam laudatum Medicamentum, ut sine illo manca sit ac claudicat Medicina; qui vero eodem instructus fuerit, maiora præstabit quam quis ab uno Remedio facile speraverit; rursus enim sit oportet & parùm compertam habeat huius medicamenti vim, qui idem sopori conciliando, demulcendis coloribus, & Diarrhœæ sistendæ applicare tantum novit, cum ad alia plurima, gladii instar Delphici, accommodari possit, & præstantissimum sit Remedium Cardiacum, unicum pene dixerim, quod in rerum natura hactenus est repertum.

Hac Methodo erant tractandæ Dysenterix in genere. Observandum est autem, quod cum primo quæ ingrediebantur anno, indolis magis subtilis, uti dictum, ac spirituosæ essent, quàm quæ sequentibus annis infestabant, idcirco non ita promptè Cathartici parebant Medicamentis atque illis quæ tam sanguinem diluebant contemperabantque, quam acres istos humores qui ex eodem in titulum intestinalem excernebantur. Quamobrem primo autumnio quo Tormina sicca & Dysenterix invadebant, Methodum sequentem constanter ad utrumque morbum abigendum adhibui, eventu ubique astipulante; donec appetente frigore eandem etiam anno eodem minis efficacem esse sentirem, atque annis sequentibus cum jam magis à subtilitate recederet morbus, prorsus inutilem.

Ita vero processit: si æger ætate florens febricitaret, cubiti venam tundendam præcepi, atque elapsâ horâ unâ aut alterâ, eundem ingesto affatim liquore diluendum, ut in Cholera morbo, facitaram, non verò, ut illic, iuscule à carnibus pullorum, aut Lacte Cerevisiato, at Lactis ipsius sero, quod eadem quâ illic copiâ, frigide propinandum, tepide verò inferius injiciendum curavi, nec Saccharo adjecto, nec aliâ re quâcunque. Tormina, & Dejectiones sanguine permissas, rejecto jam quarto Enemate semper evanescere animadvertebam: Hoc labore exantlato, & transmissio sero lactis omni, quod duarum triumve horarum spatio fiet, si diligenter operam navaverit æger, lectulo protinus eum commisi, ubi brevi sponte suâ in madorem solvebatur (à sero lactis sanguini immixto,) quem ad horas 24. continuari jubebam, nihil interim concedens præter Lac crudum paulò tepesactum, quo etiam utebatur solo ad dies tres vel quatuor postquam è lecto surrexerat. Si vel ob lectuli, vel lactis usum nimis præmaturè intermissum, recidivam pateretur æger, eadem vestigia denuò repetenda erant. Hæc Methodus, si certa atque expedita fuerit, non ideo à viro quolibet prudente repudiabitur, quod fastoso Remediorum apparatu non se venditet.

Hujusmodi Febrem symptomatis, qualia supra descripsi, stipatam iis in locis & temporibus reperiri quibus Dysenteria Epidemicè regnat, & Methodum hanc quam delineavimus, eidem omnino deberi, testimonio viri probi atque eruditi Doctoris *Butler* amplius confirmabitur, qui Nobilissimum D. D. *Henricum Howard* à S. Maj. Regia Britannica ad Moroccansem in Africa Legatum comitabatur;

quibus in regionibus, ut mihi ipse retulit, observavit Dysenteriam per ea tempora, uti semper, Epidemicè grassari, & Febrem, quæ cum illa Jungebatur, omnino illi similem quam depluximus; quibus ille medebatur, tam in urbe Tingitana quàm aliis in locis, sive Nostrates essent ægi, sive *Mauri*, dictâ Methodo, felici semper exitu. Quam quidem neuter alteri debemus, sed pari fortuna in eandem dissilissimè incidimus. Prohibebatur autem, optimè istic sibi cessisse in illius morbi Curatione Methodum illam, quâ liquoris diluvio submerguntur Dysenterix. Atque existimo ego, omnino par esse ut in calidiori isto Climate longè rariùs successu careat hæc Methodus quam in nostrâ Britannia.

Primo illo Autumnio quo vigeat hæc *Consultatio*, *Daniel. Cox* M. D. vir ingenio & omnifariâ eruditione ornatissimus, Dysenteria acutissimâ laborans, me, quem consuluit, suadente, opè Methodi jam laudatæ, Cito, Tuto, & Jucundè sanatus est; post tertium scilicet quartumve Enema, dum lecto assiderem & Tormina & Dejectiones sanguine evanescere; nec qualibet re aliâ, præter lecti ad dictum spatium patientiam, & Lacteam Dietam, ad sanitatem reintegrandam opus habuit. Eodem planè modo & idem postea allos quàm plurimos hoc malo affectos restituit exeunte eo Autumnio. Anno autem proximo, illum etiam idem molientem spes fecellit.

Jam olim diximus, quod sæpenumero hic morbus, si diutius excurrat, intestina seriatiim omnia deorsum versùs afficiat, donec tandem omnis ejus vis in Rectum decumbat cum assiduâ desidendi cupiditate, quâ nihil præter Mucosum quiddam & subcruentum excernitur. Hoc si fiat, frustra erit, me iudice, qui medicari sataget vel quâvis Methodo prædictâ, vel Clysteribus Abstergentibus, Glutinantibus atque Astringentibus, pro variis ulceris, quod supponitur, temporibus, injectis; vel etiam Foru. Incessu, suffumigiis ac Suppositoriis dictos scopos respicientibus. Liqueat enim, hoc ab ulcere Recti non procedere, sed ex illo potius quod Intestina quibus gradibus vires resumpserint, iisdem etiam materiz morbificæ reliquias in Rectum deturbaverint; quod quidem indefinenter prorisatum singulis sedibus mucosam illam materiam, quæ ex naturæ providentia Intestina duplicatur, elidit. Corroboranda est itaque pars affecta, quod possit, aliorum intestinorum exemplo, jam fatiscientes mali reliquias funditus eliminare. Hoc autem ea sola præstabunt, quæ corpori in genere vires adjicere apta nata sunt. Topicum enim, qualecunque id demum fuerit, parti dolenti applicatum, cum Alienum quid sit, contactu molesto debilitatem magis adferet, quàm robur subministrabit. Tolerandum itaque est ægro, donec Dieta Analepticâ & liquore aliquo Cardiaco, qui palato arridet maxime, pro libitu ingesto, revocari possint vires; quibus redeuntibus, pari passu suâque sponte proripiet se hoc Tenesmi symptoma.

Accidit etiam nonnunquam, licet raro admodum, ut Dysenteria, sub initio non ritè curata, particulare subjectum ad annos aliquot discruciet, integrâ sanguinis massâ Crasin quasi Dy-



Dysentericam jam indeptā, unde acres calidique humores intestinis continuo suppeditantur, ægro interim singula vitæ munia mediocriter bene obcunt. Hujus specimen se mihi obtulit non ita pridem in muliere quadam meis adibus vicina, quæ per tres annos hujus Constitutionis postremos hoc malo continenter exercebatur. Cum remedia quamplurima esset experta antequam ad me accederet, Venæsectionem tantum, missis cæteris prælidis quibusque, celebrandam censui; quam ut sæpius repeterem, longioribus tamen intervallis, tum sanguinis color, Pleuriticorum sanguinis zmulus, tum insigne illud quod post singulas vices magis ac magis auctum sentiebat levamen, mihi addebant animos: cujus ope tandem pristinam sanitatem consequuta est. *Thom. Sydenham de morbis acutis.*

In Diarrhœa, Dysenteria & Tenesmo affinis morbis & curationis magna ex parte similis Indicationes sunt, ut humorum acrimonia obtundatur, dolores tollantur, & fluxus sistatur.

Victus sit tenuis, ex hordeatis, gelatinis, panatellis, &c. abstineat a carnibus nisi sint viscida, ut animalium extremitates, & viscera; ut quoque à fructibus, eduliis omnibus salsis, piperatis, acidis. Utatur vino rubello, aut oligophoro diluto decocto sequente.

℞. Aq. chalybeat. ℥v. rad. chin. ʒij. Coq. ad ℥iv. injiciendo sub finem mastich. pellucid. gr. x. Cola ad usum. Aqua chalybeata sic præparatur. In aqua fontana ebulliat magna quantitas battituræ ferri bene prius mundat, & contrit. ad tertie partis aquæ consumptionem.

Purgetur cum rhabarb. myrobalan. tamarind. &c. & repetatur octavo quoque die aut sæpius si opus sit. Aut fiat cum rhabarb. in subit. & dialcord. cum laud. Lond. gr. ʒ.

Aut ℞. Rhabarb. pulv. ʒβ. conserv. ros. rub. cydon. condit. ana ʒij. Ml. sumat mane per triduum superbibendo haustum jusculi.

Si Febris sit magna (in Dysenteria) instituat venæsectio in brachio.

Post Universalia conveniunt Pilulæ sequentes.

℞. Rad. torment. bistort. ana ʒij. symph. ʒj. sem. plantag. sophiæ Chirurg. anther. rosar. rub. ana ʒβ. santal. citrin. rub. lign. Brasil. ana ʒiij. sumach. balauſt. ana ʒiij. acac. hypocist. ana ʒij. Concisa bulliant in aq. plantag. ros. ana q. f. exprime fortiter & reducatur ad extractum mellag. unde sume ʒj. oss. human. calcinat. C. C. calcinat. ana ʒiβ. terr. sigillat. bol. Armen. ana ʒj. Magister. perlar. corall. ana ʒivβ. laudan. specihc. vin. rub. solut. ʒij. F. Massa pilularis. Dos. ʒj. mane & vespere longè à cibo. Huic massæ addo aliquando animam hepatis & crocum martis corallin. (de quo postea) ana ʒiβ. aut ʒij. Cum syrupo aliquo astringenti potest fieri Electuarium.

Opii præparatio hæc est. Post sulphuris impuri exhalationem in clibano, dissolvatur in duabus partibus aceti rosacei fortissimi & una vini Canarini, limpidum exprimatur, & à facibus separatim coaguletur.

Crocus Martis corallinus talis est.

℞. Limatur martis q. v. dissolve in aqua cum sp. vitrioli acidissimo; cum opt. spiritu vini præcipitetur, vitriolum uratur ad summam rubedinem.

Sæpius Electuarium sequens præscribo.

℞. Conserv. ros. rub. ver. cydoniat. ver. ana ʒvj. conserv. cornor. fruct. cynosbat. ana ʒiij. ecchylomatis prunellor. ʒiv. pulv. subtil. rad. torment. bistort. symphy. rhabarb. torrefact. myrobalan citrin. ana ʒjβ. sem. plantag. sophiæ chirurg. pulv. gland. cupul. eorundem, anther. ros. rub. ana ʒvj. terr. Lemn. oss. human. calcinat. cornu cerv. calcinat. spod. ana ʒx. gum. arab. tragacanth. mucilag. sem. cydon. inspissat. sang. drac. ana ʒvj. magister. perlar. corall. cum alum. præcipitat. ana ʒvj. coagul. lepor. ʒβ. croc. mart. corallin. ʒij. sap. cydon. aut syr. myrtin. q. f. F. Electuarium, ad cujus singulas uncias adde opii nostr. gr. iv. Dos. à ʒij. ad ʒβ. Huic addo aliquando alum. rup. ʒij.

Injiciantur Clysteres emollientes, lenientes, & anodynæ ex lacte cum theriaca & opio. Aut ex ol. communi aut cremore hordei. Si adsit ulcus, lithargyr. integrum candefac; extingue in aceto, teratur in alkool, & cum ol. lin. aut lacte capril. aq. fabror. aut hord. & ol. ros. f. Clyster. Addi possunt solutiones gummi tragacant. & arabic. in succo plantag. Ad detergendum adde terebinth. ovi vitello solut.

℞. Fol. plantag. tapſi barbat. ana m. j. ros. rub. p. iv. flor. hyperic. p. iij. sem. coriand. sophiæ chirurg. ana ʒiβ. Coq. in lacte. Colaturæ ʒx. adde vitell. ovor. num. ij. gum. Arab. in aq. plantag. solut. ʒβ. Ml. f. Clyster. Addi potest aliquid balsami Lucatelli. Fieri quoque possunt ex jure capitis ovis cum summitat. hyperic. rad. tormentill. &c. incoct. Si Dysenteria multum urgeat.

℞. Rad. cynogloss. ʒiv. hyoscyam. ʒiij. tapſi barbat. totius m. ij. malv. totius m. iv. ol. com. rec. ℥iij. Coq. addend. aq. sperm. ranar. ℥i. ros. & plantag. ana ℥ss. coq. ad aquarum consumpt. & herbarum putrilaginem. Exprime fortiter, & partis hujus olei composit. purioris ℥ij. adde mucilag. liquid. sem. psyll. & cydon. aquis prædictis extract. ʒiv. vitell. ovor. num. ij. Ml. f. Clyster. Huic addi possunt fol. bugul. sanicul. prunell. vine. pervinc. &c. Unguentum Comitissæ dissolvi potest in Clysteribus, vel Juscula communia, vel medicata injici, facta cum herbis vulnerariis & astringentibus cum lacte perlar. & corall.

Possent fieri potest ex vin. rub. ℥iij. bulliant, & adde lact. rec. ℥ij. alum. ʒij. sacch. ʒiv. cinamom. bacillum integrum, post aliquot ebullitiones pars caseosa separetur à limpida. Ml. pro duabus dosibus mane & vespere exhibend.

Horæ somni Bolum hujusmodi præscribo, præcipue post purgans.

℞. Conserv. ros. rub. antiq. ʒij. confect. alkerm ʒi. laudan. Lond. gr. ij. Ml. f. Bolum. post Bolum sumatur haustus alæ maciatæ. Huic sæpius addo dialcord. margarit. corall. &c.

Specificæ sunt sequentia. Mucilag. gum. tragacant. & arabic. succo plantag. solut.

Extractum prunellarum cum omphacio ad consistent. pilul. Dos. à ʒj. ad ʒβ. ante pastus.

Clysteres ex lact. ℥i. & vitrioli albi ʒβ.

Pulvis concharum furno exsiccat. cum cinamom. & nuc. moscat. ad ʒi. in vin. rub.

Malum cydonium cerâ aut cum gummi Arabico



bico repletum, clibano coctum, & exhibitum. Bolus ex sacch. saturn. gr. x. croc. mart. ℥j. conserv. ros. parum.

Sem. plantag. ā ℥j. ad ℥ii. in vin. rub.

Pulvis saturni crudus cum nuc. mosch. & caryophyll. in vin. rub.

℞. Croc. mart. ℥j. nuc. mosch. ℥j. aut ℥ss.

M℥. sum. ex ovo sorbili aliquoties.

Vinum granatorum cum pulv. panis alb. clibano exsiccat.

Sutius ex cortice lignoso pomorum pinez.

Pulv. cran. human. calcinat. ad ℥i. in vin. rub.

Amaranthi flos pulv. vino sumpt. Ut quoque pulv. rad. palm. Christi majoris, & pulv. flor. palm. Christi minoris in aq. ferrata exhibitus.

Vitell. ovorum cum pulv. nuc. moschat.

Cydonia exsiccat. & concis. aqua communis decoct. pro potu ordinario.

Pulv. fol. vinc. pervinc. cum rhabarb. & conserv. ros.

Taleolæ carnis bubulæ, pulv. cumin. cinamon. & cret. consperitæ, intense calefactæ & umbilico applicatæ successive deploratum restaurant.

Ol. commune & vin. Claretum coquantur simul ad vini consumpt. Sumatur cochl. i. sæpius in die.

Malum cydonium cochineellâ repletum & torrefactum & cum saccharo comestum.

Aqua quæ lignum petrificat ad ℥bii. hausta dysenteriam pessimi moris sanavit irritis aliis remediis.

Alvi depositio in ignem luculentum.

℞. Sacch. ros. ℥bi. ocul. cancr. præp. ℥ss. corall. rub. præp. margarit. præp. ana ℥ii. M℥. Dos. cochl. j. in haustu lact. recentis sexta quaque hora.

Os sepiæ tostum & pulverizat. cum vini sumpt.

Gelatina cornu cerv. cum succo vinc. pervinc.

Ex Creta alba lacte soluta & cum farina fabar. sacch. & cinamom. f. Pulticula.

Ovum recens vacuetur ab albumine, impleatur sp. vini, & per se coquatur: Vitellum sic coctum remedium est certissimum.

Aqua optima alstringens in Diarrhœa hæc est, viz.

℞. Moror. rub. Idæi succi vinos. ℥iv. cornor. ℥bii. fol. querc. tenell. plantag. concis. ana fascicul. j. Distilla in Balneo: hujus liquoris distillati.

℞. ℥bii. phlegmat. alum. & vitrioli ana ℥bj. aq. sperm. ranar. ℥ss. succi cydon. & ribes ana ℥x. M℥. In liquoris ℥xvi. dissolve alum. ℥ii. sacch. ℥iv. & infund. cinam. ℥ss. Cola ad usum. Dos. ℥iv. bis terve in die.

Aquæ medicatæ multum hic faciunt, viz. ferruminatæ, aluminosæ & nitrosæ, ut Tunbrigenles, &c. Aut facitiz fieri possunt ex aq. stillat. cichor. taraxac. plantag. &c. cum granis aliquot animæ hepatis, & aromatizetur cum cinamom. aut coriand. & edulcoretur cum syr. corall. viz.

℞. Aquæ ℥bi. animæ hepat. gr. vi. syr. corall. ℥i. M℥. pro duabus dosibus.

Indi fumum zinziberis carbonibus vivis inject. recipiunt per sellam perforatam, donec

sudore perfundantur, & animo liquefcere incipiant: dein lecto calido committuntur, ut sudores promoveantur, exhibitio brodio calido ad vires refocillandas.

In Hibernia laminam ferri candentem magdaleoni sulphuris inungunt supposito marmore, vel alio lapide lævi, ferrum liqu. tum instar ceræ fluet in lapidem una cum sulphure accenso, cujus flammam solle extinguunt. Ferrum una cum sulphure terunt in polumen, hujus exhibent ℥i. cum conserv. ros. rub. vet. vel diascord. bis in die ad sex vices, superbibendo aliquid aquæ vitæ. Exhibent quoque cran. human. furno exsiccat. non calcinat. sed pulverizat. ad ℥i. in vehiculo idoneo.

Postquam morbi violentia infringitur, convenit pulvis digestivus sequens post singulos passus ad coch. j.

℞. Lamin. panis alb. vini. malvat. niacerat. & siccat. ℥ii. sem. anis. scenic. dulc. ana ℥ss. cortic. exter. citr. condit. sic. ℥i. corall. rub. præparat. margarit. præparat. ana ℥ii. scin. alb. præparat. ℥ss. ambr. gris. ℥i. cinamom. ℥ss. sacch. alb. tripulum pondus. f. Pulvis ad usum dictum.

In Tenesmo, præter ea quæ supra præscribuntur in Diarrhœa & Dysenteria, conveniunt. Topica, ut Clysteres minima quantitate, Injections &c.

℞. Mucilag. sem. psyll. cydon. & alth. in aq. tapsi barbat. solan. & chelidon. maj. extract. ℥iv. lact. vaccin. rec. ℥ss. vitell. ovorum numero ii. croc. pulv. ℥i. diacod. ℥ii. M℥. & injiciantur ℥iii. aut iv. pro vice, & continueatur quâmdiu potest, & sæpius repetatur.

Aut Vitellus ovi crudi cum pulv. bol. armen. subtil. ut ceruss. injectatur. per siphonem, & sæpius repetatur.

Vel ℞. unguent. popul. ℥ss. ol. cer. stillat. ℥ss. ol. amygd. dulc. hyperic. ana ℥ss. vitell. ovi unius. M℥. pro duabus injectionibus.

Convenit quoque suffitus ex gagate in sella perforata.

Item lotus ex ch. maimel. melilot. tapt. barbat. flor. sambuc. hyperic. sem. lin. & tenuigræc. aquâ & lacte coct. quo imbuantur spongiæ molles, & foveatur anus.

Aut ℞. aq. plantag. ros. sperm. ranar. ana ℥ii. tapt. barbat. ℥v. sacch. saturni ℥i. M℥. f. Lotus cum spongiis mollibus usurpandus.

Litus fiat ex ol. mastichin. cydon. ana ℥vi. aurant. ℥ss. ol. nuc. moschat. per express. ℥i. M℥.

Unguentum fieri potest ex unguent. popul. ℥vi. butyr. rec. ℥ii. ol. lin. rec. ℥ss. opii gr. iv. M℥. f. Unguentum quo inungatur pars affecta.

Cataplasma hujusmodi applicetur è bombaçe, & renovetur antequam exaruerit.

℞. Bulb. lilior. alb. sub ciner. coct. mic. pan. alb. lacte infus. ana ℥li. cass. rec. extract. ℥i. unguent. popul. & de stramonio ana ℥iii. alb. græc. ℥ss. M℥. f. Cataplasma.

Inrus exhibeatur cochlear. i. pulv. seq. sexta quaque hora in pinta lact. rec. multæ.

℞. Sacch. ros. ℥i. oculor. cancri ℥ss. Corall. rubr. præparat. margarit. præparat. ana ℥ii. M℥. pulvis subtilis ad usum dictum. Theodor. de Mayerne in Prax. Medic.



In India Orientali ex Diarrhoea, Dysenteria & Lienteria multa millia Europæorum velut peste exitiali percunt. Majorem tamen expirantium numerum constituunt milites gregarii, & remiges. Hi enim inordinatam coniecti transigere vitam, fragile suum corpus vino palmatico, cerevisia saccharina, spiritu ardenti, fructibus insalubribus, &c. semper ad nauseam usque implent. Et sic proprio experiuntur periculo, etiam in vino palmatico, quod Schola Salernitana olim scripsit de multo, nempe.

*Impedit urinam mustum, solvit citò ventrem  
Hepatis emphraxin, splenis, generat, lapidemq.*

Nec in vino hoc quiescit plebs nostra, sed uti narravimus, nunc acrem ardentissimumque Chinesium spiritum, *Arach* dictum, nunc decoctum illud saccharinum immodicè hauriunt, & propterea raro uno morborum enumeratorum afficiuntur, quin simul febris ardens, & magna viscerum inflammatio sit admixta. Omnem igitur Medicum, cui horum salus, propriæque sanæ integritas cordi est, ad solas, acidorum, biliosorum, acrium, & in ventriculo ac visceribus fermentantium humorum correctiones, præcipationes, & absterisiones, suam sanandi methodum dirigere oportet; quod optimè peraget medicamentis postpositis, si illorum usum tamdiu continuat, donec vellicantes humores exspirant, ac pituitosa, chylosa, biliosa, fatida, purulenta, & sanguinem admixtum habentia excrementa, ritè deficiunt. Nam gravioribus hisce malis convictis, per alia remedia, morbo finis facile additur. Sit itaque cura hujusmodi.

℞. Rad. rhabarb. ʒij. cortic. myrobalan. citrin. ʒj. santal. citr. ʒss. cinnamoni ʒj. sal. absinth. ʒss. infunde per noctem in aq. fol. quercus ʒij. in loco calido, exprime, & adde syr. chalyb. ʒss. C.C. ulsi præparat. ʒss. matr. perlar. præpar. ʒj. M. F. potio.

Vel ℞. Rad. rhabarb. cortic. myrobalan. citrin. & Emblic. ana ʒss. sant. rubr. gr. xv. nucis moscat. ʒj. sal. tart. gr. xij. infunde per noctem in aq. persicar. ʒij. exprime, & adde C.C. ulsi & præpar. corall. rubr. præpar. ana ʒj. Syrup. ros. corall. ana ʒij. M. F. potio.

Seu. ℞. Rad. rhabarb. ʒij. nucis moscat. ʒss. solut. corall. ʒj. infunde per noctem in aq. ros. ʒij. exprime, atque adde syr. chalyb. ʒss. M. F. potio.

Vel ℞. Rad. rhabarb. ʒij. cortic. myrobal. ʒss. flor. ros. rubr. p.ij. sant. citrin. ʒss. tinctur. tart. ʒj. infunde per noctem in decocti hordei & C.C. ʒij. exprime, & adde syr. corall. ʒss. C.C. ulsi & præparat. ʒss. oculor. cancr. præparat. ʒj. M. F. potio.

Vel adhibeantur sequentes pulveres.

℞. Rhabarb. tolli ʒss. nucis mosc. ʒj. C.C. ulsi & præparat. ʒss. sal. perlar. ʒss. olei macer. gutt. ij. M. F. pulvis pro una dosi.

Vel ℞. Rhabarb. tolli ʒj. sant. citr. ʒss. nucis mosc. ʒj. C.C. ulsi & præpar. ʒss. nutri antimon. ʒj. M. F. pulvis pro una dosi.

Abundante sero. ℞. Rhabarb. tolli ʒj. Jalapp. ʒss. sal. absinth. corallior. ana ʒss. olei nucis mosc. gutt. ij. M. F. pulvis.

In India. ℞. Rad. rhabarb. ʒij. cortic. myrobal. citr. ʒj. sant. citr. cinnam. ana ʒj. sal.

cinnam. ʒss. infunde per noctem in aq. fol. marmell. & bolangor. ʒij. exprime, & adde C.C. ulsi, matr. perlar. ana ʒss. syrup. de bolang. ʒss. M. F. potio

Gregariis militibus hunc pulverem, qui optatum dedit effectum exhibui.

℞. Rad. rhabarb. ʒj. cortic. myrobal. ʒss. C.C. ulsi ʒij. matr. perlar. ʒj. Sal. cinnam. ʒss. Olei macer. gutt. ij. M. F. pulvis.

Vel ℞. Pulver. dysenter. ʒj. ad ʒij.

Vel ℞. Specier. diamentis ʒj. ad ʒij.

Robustis ac fermentantium humorum plenis hominibus, primò maxime profuit vomitoria; quorum optima esse sapam vomitoriam, tartarum emeticum, & sulphur antimon. ad hunc morbum judico.

Clysterum usus est necessarius, quia humores detrahunt. His etenim immanentibus, ab acrimonia eorum Tenasmus, venarum hæmorrhoidalium & intestini recti corrosio, cum maximis doloribus generatur. Abstergit igitur sequens.

℞. Decocti hord. ʒss. mell. ros. ʒj. olei ros. ʒss. M. F. Enema.

Vel ℞. Lact. chalyb. decoct. hord. ana ʒiv. mell. ros. ʒj. M. F. Enema.

Seu. ℞. Lact. chalyb. ʒviii. vitell. ovor. num. i. olei ros. mell. ros. ana ʒj. F. Enema.

Intestino recto, venisque hæmorrhoidalibus, aut ulceratis, aut perforatis.

℞. Lact. chalyb. decoct. hord. ana ʒiv. vitell. ovor. n. i. terebinth. venet. ʒss. M. F. Enema.

Consolidat & dolores sedat sequens.

℞. Lact. chalyb. decoct. hord. ana ʒiv. terebinth. venet. ʒss. Sacch. Saturn. ʒss. mucilag. sem. cydonior. ʒss. M. F. Enema.

Vel ℞. Rad. consolid. ʒij. flor. balaustr. p.ij. unicum cupress. ʒj. hord. mundat. ʒij. coquant. in aq. chalyb. colaturæ ʒviii. adde sacch. Saturn. ʒss. mucilag. tragacanth. bals. sulph. terebinth. ana ʒij. M. F. Enema.

In India pro Clystere. ℞. Herb. conyza M. j. fol. bolang. marmell. ana p.ij. coq. in aq. chalyb. colat. ʒviii. adde mell. ros. ʒj. Olei coct. baccar. cinnam. ʒss. M. F. Enema.

Cum humores satis sunt correcti, vel jameducti, unum ex sequentibus medicamentis exhibeatur.

℞. Conserv. ros. ʒj. cam. cydon. ʒss. C.C. ulsi & præpar. ʒj. corall. rub. præpar. croci mart. ana ʒss. sanguin. dracon. ʒij. syr. corall. q. s. M. F. conditum. Dos. mane & vesp. à ʒj. ad ʒij.

Vel ℞. Conf. ros. ʒij. syr. corall. cydon. chalyb. ana ʒss. C.C. ulsi & præpar. ʒj. matr. perlar. præpar. terr. vitriol. dulcis ana ʒj. M. F. conditum. Dos. anteriori similis.

Seu. ℞. Conserv. flor. consolid. rob. acacie ana ʒj. syr. cydon. corall. ana ʒss. C.C. ulsi & præpar. ʒj. sang. dracon. ʒss. tinctur. mart. ʒj. succini ʒss. M. F. conditum. Dos. à ʒj. ad ʒij.

Vel ℞. Conf. ros. ʒij. Consol. maj. ʒj. extr. torment. ʒij. sal. corall. ʒss. lap. hæmatit. philos. ʒij. syrup. stipt. q. s. M. F. conditum. Dos. à ʒj. ad ʒij. mane & vesp.

In Dysenteria. ℞. Conserv. ros. consol. ana ʒj. flor. hyper. ʒss. extract. tormentill. ʒj. tinct. m. rt. ʒj. tinct. succin. & corall. ana ʒss. terræ vitr. dulc. ʒij. sal. Saturn. ʒss. bals. peruvian. ʒj. M. F. bolus. Dos. à ʒj. ad ʒii. mane & vesp.

Vel



Vel ℥. Conserv. ros. carn. cydon. ana ʒiʒ. Syrup. stipt. ʒj. tinctur. lapid. hæmat. ʒʒ. bull. sulph. anil. gutt. xxv. Peruviani ʒj. terr. solaris, vitriol. dulcis ana ʒʒ. C. C. usti præpar. corall. rubr. præp. ana ʒj. ling. dracon. ʒʒ. M. F. conditum. Dosis anteriori similis.

In India. ℥. Conf. ros. ʒij. flor. granat. ʒj. carn. cydon. nucis moscat. ana ʒʒ tinct. sulph. vitriol. ʒʒ. olei nucis moscat. exprell. ʒiʒ. tinct. vitriol. dulc. ʒij. ossis elephant. calcin. ʒij. M. F. conditum. Dos. ʒj. mane & vesperti.

Vel ℥. Conf. flor. granat. marmell. ana ʒj. rob. bolangor. ʒʒ. Olei nucis moscat. expr. ʒj. oss. elephant. calcin. ʒij. terr. martial. Ceylonic. ʒj. terr. mart. ʒj. M. F. conditum. Dos. anteriori similis.

Vel ℥. pulver. dysenter. secundi ʒj. detur mane & vesperti.

Cum ingentes simul dolores adfunt, mixturis adde aliquid laudan. cydoniati, tartarifati, vel laudani Bontii; & pro flatibus extracti laud. nostri aromat.

Potus ordinarius sit, ex decoctis & emulsionibus annexis, quia præter id, quod sitim extinguunt, symptomata quoque imminuunt.

℥. Hord. mund. vel orizæ ʒ ii. C. C. rasi ʒj. lign. sassafras ʒj. sant. rubr. ʒʒ. cortic. myrobalan. ʒii. coque in aq. chalyb. & colatur. clariss. ʒʒ. adde amygdal. dulc. ʒii. sem. melon. papaver. alb. ana ʒiiij. M. F. l. a. emulsio. Huic adde aq. plantag. portul. rosar. ana ʒii. cinnam. ʒi. syr. corall. ʒ ii. C. C. usti & præp. ʒii. Philosophicè præparati ʒj. M.

Vel ℥. Hord. mund. ʒ ii. C. C. rasi ʒj. cortic. myrobalan. Emblic. ʒii. Conserv. rosar. ʒj. coq. in aq. chalyb. & colaturæ ʒʒ. adde syrup. papaver. cydonior. perlar. ana ʒʒ. M. F. potio. Ad ulcera intestinorum consolidanda, addantur rad. consolid. tormentill. summit. hyper. sol. sanic. alchim. &c.

In India. ℥. Herb. conyzæ ʒ ii. myrobal. ʒ ii. conserv. ros. ʒj. cortic. lign. santal. citrin. ʒj. rasuræ cornu Rhinocer. ʒʒ. coq. in aq. chalyb. & colat. ʒʒ. adde aq. flor. marmellæ ʒiiij. Aq. cinnam. ʒj. syr. cydon. corall. ana ʒj. M. F. Decoctum.

In principio morbi, viriumque ægroti robore, sudoriferis sequentibus malignitas, tam per sudorem, quam per urinam educi potest.

℥. Bezoartici C. C. ʒj. decoct. lign. sassafr. ʒii. M. F. Sudoriferum.

Vel ℥. Bezoart. viperini ʒj. decoct. C. C. ʒj. Aq. Zedoar. ʒiʒ. M. F. Sudoriferum.

Seu. ℥. Antimon. diaphor. ʒj. C. C. Philosophicè præparati ʒʒ. lapid. Bezoard. Orient. ʒj. spir. terr. sigill. ʒii. Aqu. alexipharm. ʒii. M. F. Sudoriferum.

In India. ℥. Bezoart. C. Rhinocer. ʒj. sal. volat. Zerumbeth. gr. v. aq. Zedoar. ʒ ii. M. F. Sudoriferum.

Vel ℥. Lap. Bezoar. Orient. ʒj. C. C. Philosophicè præparati, usti & præparati ana ʒʒ. Sal. C. C. volat. ʒʒ. Aq. rad. cinnam. sylvestr. ʒ ii. M. F. Sudoriferum. *Hermann. Nicol. Grinn. Compend. Medico-Chymici, lib. 3.*

## Consultationes.

*Pro Reverendo admodum Monacho Augustiniano Dysenteria laborante.*

In Reverend. admodum Monacho affici intestina inferiora, non solum ex positu doloris infra umbilicum agnosco, verum etiam & ex sanguine separato ab aliis excrementis excreto. Affici verò intestinum rectum, atque colon secundum extremitatem, qua recto continuatur, non est difficile intelligere; si namque animum ipse converto ad inspectionem factam ab Excell. Chirurgo, necnon etiam ad experientiam factam ab ipsomet patiente, qui narrat per digitum immisum in anum cum maxima sui molestia ulcus perferre, atque etiam digitum sanguinolentum extrahere, omnino cogor affirmare intestinum rectum affici: si autem respicio ad conformationem intestini coli in parte proposita, in qua sit veluti angulus quidam, qui facile excrementa discurrunt recipere potest, atque etiam animadverto dolorem paulo supra regionem intestini recti pervenire, non possum non affirmare intestinum Colon in parte jam dicta coaffici. Sed quamquam locus affectus sit cognitus, idea tamen, & species morbi apud me adeo difficilis est cognitu, ut opus interim sit maxima diligentia. Dicam ego quid sentiam paulo altius petito exordio.

Certum est, quemcumque per anum fluxum sanguinolentum (excepto illo qui ab hæmorrhoidibus pender, de quo interea sermo non est) ab Hipp. & Gal. vocari Dysenteriam, cujus quatuor species constituuntur. Prima vocatur Hepatica, in qua materia similis loturæ carnis animalium nuper maciatorum excernitur. Secunda est periodica, sub qua sanguis vividus, & floridus, copiosusque secundum periodos quosdam redditur. Tertia est, in qua sanguis nigricans, & splendens evacuatur, occasione febris alicujus exurentis. Quarta, & postrema est, in qua sanguis exit impurus cum torminibus tamen imi ventris, & hæc Dysenteria verè, & propriè nuncupatur, quam puto in casu nostro locum habere, excernitur enim per anum sanguis cum maximis cruciatibus.

Verum tamen aliqua ob stare videntur, nam sub hac Dysenteria sanguis ita nigricans (quem admodum in Reverendo admodum Monacho contingit) excerni non solet, amplius in Dysenteria septem mensium vix fieri unquam potuit, quin in excretis si non carunculae, saltem remaneta intestinorum aliqua apparuerint, quæ tamen nunquam ullus in excretis patientis nostri potuit observare. Accedit & illud, quod in dysenteris, quæ ad menses durant, sordescere ulcus consuevit, & valde purulentum evadere, quæ in casu nostro non contingunt, vix n. aliquid puris unquam (ut referunt) visum fuit, ut propterea ex his, aut affectus propositus minime dysentericus constituendus existat, aut si dysentericus, profecto necesse sit, ut aliquid conjunctum habeat, quod faciat ipsum à characterismo dysentericæ vulgatæ quoquo pacto deviare, sicuti ego existimo. Puto etenim ulcus cancerosum adungi, & puto etiam præter ulcus adesse tumorem.

Quod quidem adsit ulcus ab omnibus conceditur, quoniam dysenteria verà, de qua agitur,



ulcere definitur, quod verò cancerosum, præter ætatem inclinantem, temperamentum melancholicum, & parvum, atque caco-chymum corporis habitum, dolor insignis, excrementum nigricans, atque portiones quædam carnez, spongiosæ (ut audio) excretæ suadent, quibus accedit mali contumacia, propter quam multa hucusque præsidia sine fructu tentata fuere, sed quod me magis, ac magis in hanc sententiam adducit est evidentia ipsa. Cum etenim annis superioribus nobilem quendam Lucensem eadem prorsus Symptomata patientem curandum præ manibus haberem, factum est ut nunquam ex aliquo præsidio Medico juvamentum aliquod sibi comparare potuerit, tandemq; obiit, & dissecto cadavere in loco superius commemorato ulcus cancerosum cum insigni tumore fuit adinventum, ut propter hanc etiam evidentiam in patiente nostro ulcus prædictum reperiri ad credendum adducar; cui tumore adjungi adhuc, pondus ibidem percepti non obscure declarat.

Quibus ita constitutis, jam de generatione agendum occurrit. Dysenteria itaque ut omnes norunt est excretio sanguinolenta, quæ necessario in retentionem læsam intestinorum tanquam in propriam causam refertur, quæ retentio læditur, non ob morbum in mala compositione, sed ob solutam unitatem, Diaurosim, seu erosionem vocatam, hæc enim est illa, quæ potissimum sibi dolorem adjungit, qui in casu nostro insignis admodum observatur, & quoniam ulcus, ut dictum fuit, redolet naturam carcinomatis, idcirco erosionem per quam illud fit ab atra bile fervidiori pendere itatuendum est; Ad hæc quoniam atra bilis ex Galen. à bile flava, & succo melancholico exustis, agente jecore fervidiori generatur, puto in patiente nostro à succo melancholico ortum duxisse, nam patiens est temperamenti melancholici, & morbus in hoc Autumno est exacerbatus. Nec obstat, quod incoepit affectus æstate præcedenti, quoniam tempestas illa solum causam exurentem præstitit, calorem nimirum scilicet, non autem materiam, succum melancholicum inquam, qui modo jam dicto genitus, in partem nunc affectam olim tanquam imbecilliam transmissus fuit, nunc autem ob dolorem continuo quoque attrahitur.

Quapropter Medici erunt, habita totius providentia, cum his quæ atrum humorem respiciunt, ad deterfionem devenire, cum his quæ citra morfum detergunt, ac exiccando absumunt quidquid excrementitium, & superfluum superest, partemque denique sanare, atque roborare, at præsertim ne denuo humor melancholicus generetur per alterationem jecoris ad frigidum prohibere, aliàs aliò erit avertendus.

Sed quoniam cum maximo recessu à statu naturali patiens laborat eo genere morbi, qui sui contumacia, & perversa Medicis præsidia quæ maxime reluctatur (ut propterea hujusmodi affectus pro irremediabilibus ab omnibus habeantur, apud me erit impossibile fines illos propositos attingere, & eo magis, quoniam Divinus Hippocrates hac data occasione dicere solebat, difficultatem intestinorum ab atra bile lethalem esse; quibus omnibus accedit pravus totius patientis habitus, accedit & anni tempus Autumnale, quæ solent esse morborum consimilium causæ maxime feraces, Quoniam tamen ex

Arete desperatis etiam non est deneganda medicina, tum consolationis, & productionis vitæ gratia, tum quia Deus & natura solent ab imminente morte quandoque vindicare, idcirco de materiis Medicis in gratiam nostri Reverendi admodum Monachi aliquid proponendum.

Quantum igitur attinet ad Chirurgicalia, quoniâ jecur incensum valde observatur, putarem idcirco aliquam venæ sectionem in cubito dextro eventativam tamen, illi posse plurimum conducere; fonticulum etiam duplicem, unum in brachio sinistro, & alium in crure dextro summopere laudarem, sicuti & juges partium superiorum frictiones, deligationes, & lotiones non improbarem.

Medicamenta alia respiciunt fluxionem, alia verò terminum ad quem ipsius fluxionis. Quocirca primum occurrunt medicamenta, quæ copiam, & qualitatem materiæ fluentis respiciunt, vel ejusdem originem. Priora itaque sunt lenientia, præparantia, & purgantia. In genere lenientium convenit, quod paratur ex syrupo de polypodio Magistri Augustini, & syr. ros. sol.

In genere autem præparantium decoctum boraginis, buglossi, fumariz, cichorii, plantaginis cum syrupis appropriatis; tandem in genere purgantium maxime arridet syrupus de polypodio prædictus, cum Rhab. & decocto myrobalanorum Indorum, citrinorum, & chebulorum. A qua purgatione cogitandum erit de aliis medicamentis evacuantibus tum sensibiliter, uti per vias urinæ, tum insensibiliter per poros cutis.

Per vias urinæ evacuant thermæ frigidæ, quæ etiam plurimum ad acris materiæ temperationem faciunt, huc pertinet serum destillatum. In genere autem evacuantium insensibiliter, est decoctum chinæ, sed medicamentum, quod partim per vias urinæ, partim insensibiliter evacuabit, erit jus gallinæ antiquæ cum china, capillo ven. citrach. agrimonio, seminibus melonum, boragine, buglossi, radice liquiritiz, ac verbasco paratum.

Medicamenta verò, quæ originem materiæ morbi respiciunt, sunt alterantia jecur, idcirco præter aquas medicatas frigidæ, & serum cum succo cichorii dicta, lac asinæ opportunum existimo.

Exterius laudo balneum aquæ dulcis, laudo & perfusionem jecoris factam cum succo cichorii, hepaticæ, & speciebus cerati sandalini.

Pharmaca, quæ respiciunt locum affectum, vel respiciunt ulcus, vel dolorem, quæ ulcus, leviter, & citra morfum detergentia sint oportet, idcirco inter alia propono injectionem factam ex decocto hordei, parato in aliqua aqua Thermalis frigida cum syrupo de rosis siccis, aut melle rosato simplici. A qua ad siccantiam deveniendum, in quorum serie seligo medicamentum factum ex succo plantaginis, solani, sempervivi, turia præparata, cerula abluta, plumboque uiso, & loto, quod medicamentum in sero chalybeato dissolutum in anum injici poterit.

Pro dolore sedando convenit Antidotus magna per se, vel cum saccharo rosaceo exhibita, laudo & injectionem factam ex lacte asinino, quibus addenda sunt, quæ à proprietate agunt, idcirco omne genus coaguli arridet, item & jecur Arietis exiccatum, pulveratumque necnon decoctum foliorum populi albæ laudantur.

Vicius



Vidus autem sit temperatus, ideo omnis aeris inclementia est lugienda, cibus boni succi, & facili coctionis offerri debet, uti sunt ova, aves parvæ montanæ, carnes pulli, hædi, vituli lactantis, vervecis, & huiusmodi. Et quoniam visciditate aliqua cibus hic debet esse donatus, hinc carnes prædictæ in aqua chalybeata coctæ cum extremitatibus animalium dictorum ex usu erunt utiliori: Potus sit vini rubri, & subadstringentis aqua chalybeata diluti, atque tandem reliquæ secundum proportionem respondeant; faxit autem Deus, ut demum Reverendus admodum Monachus his, & aliis præsidiorum materis Medicis consimilibus bene se habeat. *Jul. Cas. Claudin. in Consultat. Medicin.*

*De Diarrhæa, & Dysenteria. Pro Nobili Patienti.*

Nob. Patiens ætatis annorum 52. temperamenti calidi, & sicci, cum frigidity ventriculi, vertigines antehac perpeclus per vices valde molestas, quibus non semel accessit virium lapsus, cum ætentione omnium functionum, & sudore copioso; quibus medicis præsidius (ut scribunt) sublati, ad tempus saltem, dum ætivo tempore sub radius solaribus diu commoratus esset, corpusque non mediocriter exercuisset, suppressa expurgatione per nares, fructibusque copiosis usus, de dolore gravativo capitis conquestus fuit: quo remisso, in alvi fluxum incidit, primo quidem materiæ liquidæ, & cineritiæ; cum levibus torminibus, mox & pituitosæ, viscidæ, & spumosæ, necnon flavæ, ac biliosæ, mixtæ aliquando: semper tamen cum mucosanguineo; modo aliis excretis permixto, modo sincero. Pro cuius affectus curatione multa medica præsidia ex præclarissimorum medicorum consilio adhibuit, necnon & sponte hausit frigidam ad satietatem, à cuius usu visus fuit melius habere: in deterius tamen lapsus est, quandoquidem excreta in præsentia sunt plurimum pituitosa, cineritia, vel mixta, cum graviore ventris inferioris dolore, cui paulò post succedunt dejectiones, supervenit lenta febricula, rugitus, fluctuationes, sitis, inappetentia. Propterea de agendis consulto.

Quare ego expensis erroribus, & accidentibus præteritis, excretis enarratis, atque affectibus nunc assigentibus, licet supponam sanguinem illum excrementum indicium esse alicujus intestinorum abrasionis ab acri illa materia, quæ excernitur, & propterea iuxta cum Viro Excellentiss. dysenteriam adesse censeam: affectum tamen præcipuum diarrhœam constituendum esse reor, cum in præsentia mucus ille cruentus à prandio tantum appareat semel atque iterum, marutini autem, nocturnæque dejectiones sint materiæ excrementitiæ, à prædominio pituitosæ, & cineræ, ut scribunt: quam non aliunde provenisse mihi persuadeo, quàm à venis mesaraicis obstructis ab humoribus crudis, & pituitosis mesenterio infarctis, hisque plurimum in ventriculo genitis, licet & à capite non sit negandus eorum aliquis confluxus. Ab his etenim vertiginosam quoque passionem præteritam, dum exhalant in caput, atque animi deliquium quolaboravit, os ventriculi coarctando, corde in

consensum adducto provenisse mihi verisimile est. Hi verò in præsentia dum congeruntur in mesenterio, non ventilati, ac proinde putredinem aliquam concipientes, febrem, atque irritata expultrice ad intestina transmissi, diarrhœam cum torminibus, vigiliis, siti & inappetentia producere facili negotio possunt; necnon & aliquam intestinorum abrasionem inducere, unde dysenteria principium.

Quæ cùm ita sint, non præter rem dubitaverit quispiam, præsentem affectum non adeo leve futurum, cum heri possit facile, ut putredo in venas majores propagata febrem interat graviorem. Nec minor impendet metus gravioris intestinorum abrasionis. Si etenim dysenteria in longius protrahetur, non solum vires prosterneat, verum etiam levitatem intestinorum, seu lienteriam, aut aquam inter cutem, & hydropem invehere poterit, teste Hipp. 6. Aph. 43. *Quæ lientiosi difficultate intestinorum corripuntur, iis supervenientem longam dysenteriam aqua inter cutem, aut intestinorum levitas excipit, & moriuntur.* Addit Galen. in comm. rationem assignans Hippocraticæ sententiæ: *Male affligit enim, & labefactatis intestinis à pravorum humorum effluxu, cum vires ipsorum laborant, tumpevit caloris nativi symmetria, propterea & aqua inter cutem, & levitas intestinorum supervenit.* Verum enim verò cum dysenteria sit tantum incipiens, & abrasio in intestinis crassis, ut ex dejectione statim subsequente tormina colligere possumus, bene sperandum de patientis hujus rebus.

Materia itaque peccans attenuanda, incidenda, sensibilibusque, & insensibilibus est evacuanda; fluxio a capite divertenda, obstructions meserei referendæ, ventriculus caletaciendus, & intestina sunt munienda, viribus interim conservatis, cum alimentis congruis, tum bezoardicis, & calidum innatum toventibus.

Atque ideo lenienda est alvus melle ros. sol. & manna electa, cum decoctione cordiali, & sem. citri. Præparandi sunt humores mell. ros. simpl. de corticibus citri, oxymel. simplici. & emuls. sem. citri; purgandi verò agarico trochiscato, & melle ros. solutivo, cum infusione, & decoctione myrobalanorum emblicorum, & pulpæ tamarindorum. Mox & aqua Tettutiana, bis saltem, ad lib. tres qualibet vice, cum unc. iv. mellis ros. solut. est exhibenda: vomitu interim excitato succo raphani, & oxym. scyllitico, si patiens Nobil. ad eum sit pronus. Proderit enim quam maximè ad diversionem materiæ peccantis. Perseverante autem febre si vires non erunt adeo dejectæ, sanguis educi poterit ex salvatella dextra, ratione febris, & dysenteria incipientis; pauca tamen copia, quò vires solvendo morbo sint pares. Fonticulusque paretur in sinistro brachio, pro diversione materiæ à capite fluentis, præmissa ejus expurgatione per nares. Quibus enim dejectiones in diarrhœa sunt spumosæ, his à capite fit fluxio. ex Hipp. Hisque prædictis præscribendum erit decoctum aperiens cum columba turricola, & radicibus feniculi, asparagi, rusci. seminibus anisi, danci, seseleos, & cymini, cum agrimonia, cetrach, filice, & scolopendrio; quo quindecim



dies utatur, exhibita alternis diebus drachm. i. rhabarb. immaturi, cum passulis attriti, & deglutiti, superbibito deinde iusculo proposito. Quod si febris remiserit, & pertiterint obstructions, electuarium de chalybe Saxo-  
mannum, cum trochiscis de eupatorio, & de rhabarbato præmitti poterit iusculo præscripto: calefacto interim ventriculo stillicidio ex oleis mallichino, nardino, rutaceo, & laurino oleo communi, spica, zingibere, & schœnanno tho additis. Roboretur cor Theriaca antiqua, horam ante cœnam assumpta ad drachmam sem. quando febris jam recesserit, vel fuerit parum molesta: munitis intestinis clystere injecto, parato ex lacte chalybeato; in quo macerata fuerint rosa Damascena, cum sevo hircino, & tuthia pulverizata.

Victu præscripto, qui sit facilis digestionis, & proportionem respondeat propositis medicamentis. *Bened. Sylvatic. Consil. & Respons. Medic. cent. 2.*

### *De Diarrhœa, Dysenteria, & Tenesmo.*

#### *Pro generoso Viro.*

Vir generosus ætatis annorum 46. sanguineus, boni habitus, noridoque vultu, ventriculo satis tirmo, hepate fervido, promiscua usus vivendi ratione, ac peregrinationibus fatigatus hæmorrhoidum fluxum dies aliquot patius est, a quo gravius nihil accidit. Tribus abhinc mensibus diarrhœa satis profusa dies aliquot, sine dolore corripitur, a quo tempore postea ante septem hebdomadas observavit sanguinis quidpiam sine dolore in dejectione naturali, cujus causa inclusum rhabarbari, & clysteres ex lacte fuerunt præscripti, nihil tamen remittente malo: verum paulo post sanguini immixta effluxit materia alba, & glutinosa, cum nigro interdum, adulto, & coagulato sanguine, a fœcibus sejuncta sine dolore inigni, pauca semper copia: quinimò quandoque a prima desidendi cupiditate, guttatim, quandoque ad medium cochlearis, vel ad summum, unius mensuram. Alvus interim suppressa dum injectionibus plurimum sollicitatur, dolor nullus percipitur, sed fervor solum quidam in excretis, æqualibus plerumque. Interdum tamen materia hæc sæpius ejicitur sola, sine molestia, adeo ut conueta munia obire valeat, toleretque etiam nunc vectari curru, & equitare. Sub mediam vero noctem quandoque prius dolor dorsum, seu potius ossis sacri, & surarum ingravescit: atque ossis quidem sacri profundus, qui tactu neutiquam exacerbatur, nec rubore, aut tumore se prodit, licet patiens corpus exerceat. Vigesimo primo Martii, præ illo rhabarbato, e mediana missus fuit sanguis: a quo in suris dolor nullus, qui nunc ante triduum noctem invaluit. Clyster quoque anodynus, & sanguinem sistens, sine dolore injectus, medietate spatii si contineatur, dolor solitus tota nocte, in auroram usque affigit, atque vicies, & sæpius etiam nullo clystere admisso, sine aliorum excrementorum, aut serosæ illuviei permixtione, materia cruenta, tenaxque alvo excreta, quæ duo, tria quatuorve cochlearia non excedit: cæteris excrementis interim omnibus suppressis. Fluxus quandoque unum, alterumve diem remittit, sed mox recurrit. Venter

initio quidem visus est intumescere, nunc recte se habet.

Hæc est affectus præsentis historia, fusè sanè & accurate a Viro præclarissimo enarrata, cognitu tamen perquam difficilis, cum quoad partem affectam, tum quoad causam. Si enim loquimur de parte affecta cum ibi sit morbus, ubi dolor, dicere possumus, præteritis ventribus viscera naturalia fuisse partem affectam, cum venter intumuerit: nunc vero esse partes ad os sacrum spectantes. Dolor namque nocturnis horis circa os sacrum, & suras molestus est. Quod si item de causa effectrice sermo sit, dicendum est, causam hujus affectus esse copiam humorum, cum quantitate, tum qualitate peccantium. Quare brevibus statuendum cenleo, Generosum hunc patientem congregere magnam copiam cum sanguinis melancholici, tum pituitosi: melancholici quidem, ob naturale temperamentum, ætatem, & vitam excitiis addictam, cujus evidentissimum signum est sanguis hæmorrhoidalis aliàs sponte fluens; pituitosi quinetiam, ob promiscuam vivendi rationem in ventriculo geniti, & a fervore jejoræ attracti, atque utriusque in mesenterio, tanquam in sentina veluti omnium excrementorum hærentis, unde ventris intumescencia initio apparuit, cui, natura sarcinam hanc deponere tentante, diarrhœa successit: prout contingit non raro mulieribus, mensuris deficientibus. Reclusis autem mesenterij venis ad intestina hiantibus, ad illas, & venas hæmorrhoidales, quæ a ramis venæ portæ propagantur, suborta est dysenteria, non quidem vera, cujus essentia, & forma consistit in ulcere intestinorum, atque ideò definitur a Gal. per ulcus intestinorum, sed amplo modo usurpata, prout complectitur quamlibet cruentam dejectionem: quo sensu, dysenteria nomine Hippocrates usus est passim quarto de Articulis. Primo de Natura Humana 33. & in Epidemias; atque Galenus 5. de Loc. Aff. 7. eam modò sinceram, modò pituitosæ materiæ permixtam, modò sanguinis tenuioris, modò nigricantis, adusti, & coagulati, qui extravenas stagnans aut grumescit, aut putrescit, modò majori, modo minori copia, prout redundat, & ad effluxum proclivior fuerit. Tandem & tenesmus accedit, irritata expultrice musculi sphincteris a mucosa materia falsedinem aliquam sortita, cujus causa, cum hujusmodi excretio facta sit a natura rectè operante, humorisque peccantis, semper successit absque torminibus, & molestia.

Quod si quis querat, cur fiat dolor ad os sacrum, & suras: & cur noctu tantum, non vero interdum infestet. Respondendum censerem, dolorem hunc provenire ab humorum fluxione a venoso genere ad partem illam imbecilliore in redditam, atque ad suras diffundi per easdem venas, ramos in primis venæ iliacæ descendentes cum ad os sacrum, tum ad suras, & crura; ut propterea non sit continuus, sed accedat & recedat, exciteturque in utraque sura, & ex venæ medianæ sectione XXI. Mensis Martii cessaverit, denuò tamen recurrens. Affigit autem noctu magis, quàm interdum, quoniam tunc ob corporis quietem, Et prædictarum partium calorem fit major humorum confluxus. Et hæc de essentia, & causis hujus affectus sa-



ris abstrusi, cuius accuratam magis historiam habere non potuimus, ob loci distantiam. Ex quibus facile colligi potest, quid prædicendum sit, & quid agendum.

Prognosticum quod atinet, licet duratio affectus, trium scilicet mensium, difficilem reddere possit curationem, nihilominus cum patiens sit boni habitus nullamque labem essentialem patiatur vicerum principum, viribusque valeat, sperandum ipsum pristinam sanitatem adepturum esse.

Hoc autem fiet tribus potissimum prædiis, quorum primum, & palmarium est congrua victus ratio in omnibus sex rebus non naturalibus. Secundum, usus medicamentorum attenuantium, incidentium, detergentium, & evacuantium, quo liberetur ab illa humorum sarcina, quibus scatent primæ viæ, & potissimum mesenterium, & intestina: quod clysteribus deterforis consequetur ex aqua marina, muria & huiusmodi, cum mell. rosâ quibus deinde subaltringentibus erit locus. Tertium, ut sanguis divertatur, & per epicrasin imminuatur, primò per venas superiores ex utroque brachio, deinde per venas sedales, ad revocandam evacuationem illam, quam habet innatam. Materias remedium Viro præclarissimo notissimas brevitati consulens omittendas duxi. Faxit D. O. M. ut ad vota succedant. *Idem ibidem.*

Illustrissimus Comes, 30. annum agens, temperamenti totius & jecoris, calidi & sicci, gracilis habitus, ad iram pronus, deliciis deditus, & hac ætate potissimum sicca, fructibus, siccibus scilicet, melonibusque nive perfrigeratis usus, quorum frigiditatem vino meraciori nivato contemperari, ventriculumque alimentis copiosis aromatibus cõditis præmuniri sibi persuadebat, præterito mense, autumno scilicet incunte, incidit in alvi fluxum quo tribus aut quatuor primis diebus cruditates excretae sunt, flavo tamen colore ut plurimum tinctæ, mox & biliosæ serositates, non sine intimi ventris doloribus, copiosius quidem primis diebus; mox parcius, sed frequentius soluta alvus pinguis, flavi & crocei coloris deiecit; quindecim verò post diebus pellicula quædam, epidermis nimirum pinguedine mista fuit à nobis statim ab initio accersitis observata. Et quoniam in dysenteriam prolabi Illustrissimum Com. conjiciebamus, de agendis consultum fuit; quæ tamen respuit, quod fluxum hunc sibi salutarem fore persuasum haberet; nec tamen nos dimisit, imò quotidie cum invisere jussit; ut propterea Dysenteria progressum nobis exacte observare datum fuerit, qui excrementa sincere biliosa vidimus, cum doloribus vehementioribus, quibus accessit absque evidenti commotione non solum ephelcidis, sed & interioris intestini tunicæ aliqua portio, siti insuper aucta, & appetitu dejecto. Et quamvis invalescentis dysenteria, ob tormina, à nobis admonitus fuerit; nullum tamen medicamentum, præter clysteres epicrasticos admittere voluit; unde sanguinem quoque, & subinde pus, & saniem non exiguam excretam Pat. Illustrissimo ostendimus, vitæ quinetiam periculo prænunciato; febricula namque quatuor aut quinque abhinc diebus eundem correptum, una-

nimes observavimus. Quare casus historiam tibi Sapientiss. Viro à nobis referri jussit, agenda pro curatione expetens, atque expectans.

Quoniam docet experientia, diarrhœam sæpius nos ab imminentibus morbis præservare, unde Gal. dicebat, sæpè fieri ex virtutis robore cum salubri providentia; quoniam est commune auxilium pravos succos habentibus, ideo Comes Illustrissimus salutarem sibi futuram credidit incipientem diarrhœam; adstantibus Medicis fide non adhibita, qui ventris fluxum huiusmodi, & quartum & septimum diem excessisse observantes, morbosum fore censuerunt, cum Celso dicente, Uno die fluere alvum sæpè pro valetudine est, & etiam pluribus, si sine febre, & intra septimum diem id conquiescat; purgatur enim corpus, & quod intus læsum erat, utiliter effunditur, verum spatium est periculosum; interdum enim tormina, interdum febricula excitat, viresque consumit. Ita evenit Com. Illustrissimo, neglecta namque diarrhœa tormina & dysenteriam excitavit, à parte affecta ita dictam, quam Paracelsus morbum dissolutum appellabat. In cuius affectus cognitione non est, quod hæsitemus; siquidem dysenteria, & pleuritidi quoddam veluti privilegium hisce verbis concessit Gal. Ne requiras, inquit, in omni affectu huiusmodi notas, quales in pleuritide vel dysenteria apparent, scientifica enim est eorum cognitio, sicuti aliorum conjecturalis agnitio. Sat igitur est adesse alvi fluxum torminosum, ut incipiens dysenteria statui possit; cui si addantur excretiones mucosæ, pingues, membranosæ, cruentæ, absolutam atque perfectam dysenteriam factam esse produunt. Ita casu nostro, fluxus quatuor dierum diarrhœa fuit ex cruditatibus, à gelidis tum fructibus tum potionibus facile congelitis; at quoniam Pat. ætas, temperamentum totius & jecoris, anni tempus, constitutio sicca; præterea fructuum copiosus usus, & vini meracioris potus consuetus, ad biliosos humores gignendos, & in venoso genere coacervandos conspirarunt; hinc contigit, ut primo cruditatibus in primis, & circa primas vias hærentibus natura exonerata (neque enim motus ille fuit præter naturam dicendus, cum id quod contristat, excerneretur) deinde hoc idem tentaverit, adversus biliosorum humorum apparatus, in venis latitantium, quod forsitan cum Illustrissimi Viri levamine contingere potuisset, si natura medicum adnunciantem habuisset, qui intestina adversus bilis transeuntis acrimoniam præmunisset; verum quoniam ab ipso Pat. diarrhœa omnino neglecta fuit; ideo biliosa excrementa, Colon intestinum corrodentia (ut doloris situs, pinguis potius quam mucosa produntia, nec exacta cum excrementis permixtio sat nobis ostendunt) dolores primò, secundò pinguedines, tertio ephelcidis portionem abraferunt, quæ tria tres gradus dysenteria sentis adhuc constituerunt: prout ramentum internæ tunicæ, & sanguis cum pure, primum & secundum gradum ulceroz jam factæ demonstrant. Quare modò superest, ut ulcus ad secunda & exteriorem tunicam pervadat, ut tertius & ultimus gradus statuatur, quo dysenteria depascentes, malignæ, sordi-



dz atque callosæ evadunt: à quarum ulcere elevati putridi vapores ad ventriculum & cor ipsum, inappetentiam atque febriculam inducunt; quæ cum in secundo quoque gradu supervenerint, non exigui ulceris, & copiosi puris indicium præbent.

Dysenteria ex se morbus magnus, & periculi plenus est, longus, laboriosus & lethalis ab Hipp. dictus, si tertium gradum attigerit, ita ut carunculæ prodeant. Et quamvis Hollerius & Brasavolus observarint dysenterias sanatas, excretis licet carunculis ipsis; fuit tamen interior tunica tantum exesa; non autem exterior. Ita & Gal. maximam vidit intestinorum partem putrefactam, superstitibus tamen ægris; quia tunica exterior illæsa remanserat.

Status igitur Illustris. Pat. adeo gravis est ut parum à deplorato absit, qui Curationis difficilis fuerit, non modò quia ulterius progressa; verum etiam quia à sincera dejectione facta est; unde concludebat Gal. quod, Ut ab atra bile intestino exulcerato auxilium negatur; ita à flava ægrè impetratur. Gravius insuper periculum imminet addita inappetentia, atque febricula, inflammationis, aut magni ulceris putridi indicio, ex Gal. in Com. Non est tamen desperanda salus; quia juvenis est Illustr. Pat. & nunc obtemperans, viresque satis constant, quantum ex relatis conjicimus; cum de atrocibus doloribus mentio non fiat, & tandem cum nondum generosiora, imò nec ullum remedium expertum & administratum fuerit; licet ad gradum insanabilem nondum devenit.

Statim itaque aggredienda curatio; quæ duplex esse solet, Canonica altera, altera Coacta. Prima spectans morbum, & causam morbi. Secunda symptomata, vehementissimos nimirum dolores, & profluvium sanguinis, quæ cum casu præsentis non adsint, vera & canonica statim tentanda, ut nos quoque monet Galenus, & repetit Hippocrates ipse.

Quare primò acres & vitiosi humores evacuandi. Secundò eorum acrimonia contemperanda, & si adsit malignitas alexipharmacis expugnanda. Tertiò ab intestinis pravi humores divertendi. Quartò fluxus sistendus. Quintò ulcus mundandum & consolidandum. Et tandem contra symptomata pugnandum.

Quibus ut satisfaciamus intentionibus, in fonte Chirurgico consideranda primò venit sanguinis missio; quæ à plerisque in dubium revocatur, imò prohibetur. Primò quia neque ab Arabibus, neque à Gal. in dysenteria curatione de ipsa fit mentio. Secundò quia fluente alvo sanguis non est detrahendus. Tertiò, ne bilis effrænis fiat. Nihilominus & Æt. & Trall. sanguinem mittunt, quos sequuti fuerunt Alumnus, Claudius, Amatus & alii, & merito quidem, quia dum adest indicans & permittens, sanguis omnino mittendus est: nimirum sanguis, substantia indicans, quantitate, & motu peccans; permittens virium nempe robur. Argumentum vero pro parte negativa nihil concludit. Gal. verò auctoritate, fluente alvo sanguinem mittendum non esse. plures ægros occidunt quam servant, ut exclamabat Valesius; dum enim evacuatio est alterius evacuationis curatio, omnino permittenda est;

non autem, quando critica fuerit. Acres autem & biliosi humores prohibere quidem solent quantitatem sanguinis, at non educationem omnino. Quare casu nostro educatur sanguis ad inflammationem inhibendam, jecoris terrorem remittendum, & motum humorum ab intestinis revocandum, ut ulcus citius & facilius sanari possit: præterquam quod & febriculæ proderit: parce tamen enutritur, ut monet Æt. & P. ul. præsertim cum non adit principium, sed progressus morbi.

In Pharmaceutico fonte, omnium primò consideranda evacuantia & purgantia medicamenta: non autem adstringentia cum Medicorum vulgo. Ideo irridet Gal. Herodotum, & Diocl. qui quovis tempore dysenteria adstringentia convenire crediderunt: quinimò proficetur, dysenteria intempestivè suppressæ melancholiam, insaniam, plenitudinem, nephritidem, sanguinis vomitum, epilepsiam & hydropem succedere posse. Opus est igitur humorum expurgatione & diminutione, ut statim & assatim evacuentur humores vitiosi, qui longo & lento lapsu intestina exulcerare solent. Nec nos deterreat Avic. monitum, quod solvere ventrem supra ventris solutionem, timorofum sit. Id enim solum locum habet si ventris fluxus criticus fuerit, tunc enim, Quæ judicantur & judicata sunt integrè, neque movere, &c. at in dysenteria fluxum fluxu sanari jubet etiam Hipp. ipse. Et quoniam à toto, casu nostro, detruditur materia biliosa; ideo non solum de lenientibus, verum & de purgantibus exhibendis est cogitandum, à Valesio, Fuchsio, & Massaria damnatis; sed forsitan in principio, quo & ab ipso Gal. prohibentur; sicut probantur ab eodem, & exhibentur sedato fluxionis impetu ad intestina; caco-chymiam enim valido medicamento assatim expurgat.

Verum in præsens, cum valde progressa sit dysenteria, & febricula adsit, cautissimè procedendum. Et primò quidem statim castiæ ʒvi. cum ʒiij. pulp. tamarind. præbendæ erunt, quibus superbibat seri capr. præpar. ℥iij. Neque verenda cum Foresto tamarind. aciditas, tanquam ulcus irritans; quoniam tum à flore casti. tum à sero refringitur, ut consideravit Heurnius, atque interim adstringit & exsiccat ulcus. Inde à salvatella dextra sanguis ad ʒv. educatur, ut jecoris & venarum fervor contemperetur, humores ab intestinis divertantur, & inflammatio in parte inhibeatur.

Secuta evacuatione, mox alteratio, & biliosorum humorum contemperatio procuranda, quæ tantæ est efficacis in dysenteria curatione, ut in admirationem traxerit Amatum, quod Juvenis quidam dysentericus, sine medici consilio, solo gelidæ potu sanatus sit. At nobis cessat admiratio, observantibus Celsum, aquam frigidam dysenteria curandæ, ut remedium optimum proposuisse. Sed hic locum habent decoct. herbarum & succi, serum, Thermæles Aquæ, Lac, hoc ordine, casu nostro administranda.

Primo quidem per quinque aut sex dies hujusmodi exhibeatur syr.

℥. Decoct. end. lactuc. violar. plantagin. portulacæ ʒv. succi depur. plantagin. portulac.



ana ʒ iij. pro syr. & sic pro alus. Vel huius loco.

ʒ. Aq. stillat. lactucæ, nymphetæ, plantag. an. a ʒ ii. sem. papaver. albi ʒ ii. m. f. emuls. cui adde iucci cydon. ʒ i. diamargariti frigidi ʒ i. m. pro syr. & sic p. o alus. A sacch. namque abstinendum omnino, prout & à melle.

Vomitus interim p. o esse solet, qui nisi spontaneus, arte sollicitetur, biliosi humoris copia immixta, & acrimonia contemperata; atque adeo, ait Hipp. quod, A diuturno alvi pronivio, spontaneus vomitus superveniens, solvit morbum. Levioribus tamen excitandus.

Præmissa jam dicta præparatione, aliqua humorum tentanda expurgatio, ut imminutis humoribus, citius & facilius ulcus exsiccare & olduci possit. Cassiæ itaque, & pulpæ tamarind. addatur rhab. portio, ad ʒ i. a quibus bibat ser. depur. ʒ ii. Rhabarb. autem sit rostum, quicquid dicat Hollerius, Amatus, Salvus Sclanius: Hippoc. enim ad alvi pronivium cohendum assata & tosta optima esse asseruit; quem sequuti fuere & Paul. & Æt. hosque Matthiol. Meue, Torellus, Trincavella: ita enim minus purgat, & ulcus magis exsiccat.

Dum vero humores biliosi diminuuntur, eorundem contemperatio nunquam omittenda, & ulceris ratio semper habenda. Utrumque vero præstare possunt casu nostro Aqua Thermales acidulæ terratæ; inter quas nos sæpius Villensis usi sumus feliciter, primis diebus, cum vehiculo dejectorio syr. ros. sol. cum decoct. pulpæ tamarind. ad ulceris detersionem, & exsiccationem, mox cum diuretico, nimirum spir. vitrioli, quarum usus insillendum decem, vel duodecim diebus. Animadvertendum tamen, quod sicut lætis intestinis tenuioribus medicamenta conveniunt assumpta; ita lætis crassioribus magis injecta, cujus causa clysteribus frequenter utendum.

Tertio alterantis loco, ad usum lactis perducendus est Illusterrimus Com. quod ulceri quoque sarcoticis curando, magnopere proderit. Ulcus quoque detergendum & exsiccandum, injectis potius quam assumptis, ut nos docet ipse Gal. crassis laborantibus intestinis: atque adeo clysteres interim injiciendi, dum lac assumet, infra describendi. Lac præbeatur itaque, non obstantibus biliosis dejectionibus, aut febricula: bilis enim potiori parte expurgata fuit, præterquam quod tollitur incommodum, si decoquatur, vel cum aqua plantaginis cum Aret. vel, ut Hipp. lapidibus, aut Cylindris candentibus in eodem extinctis: facultate enim imbuitur exsiccante & corruptioni resistente. Febricula autem, quia non vehemens, lactis exhibitionem non prohibet: hoc enim conceditur ab eodem Hipp. iis, qui non valde multum febricitant. Sic idem Hipp. lac præbuit *Crisotai filio. qui circa æquinoctium autumnale dysentericis fiebat, & cum febris tenebat: alvi egestiones biliosæ, tenues, multæ, & moderate subcruentæ, dolor ventris vehementis, & ubi serum, & lac bibisset, sicut candefacto immisso, dolores, & subcruenta egestiones moderatiores fiebant: sed biliosa comitabantur, & sæpè ad exonerandam alvum surgebat, sed minori dolore. Tandem lacte asinino cocto propinato, sanatus est.* Exhibeatur igitur ad ʒx. quatuor horis ante cibum.

Et licet non tenuia, sed crassa intestina casu nostro læsa sint; attamen assumpta per eo exsiccantia non sunt omittenda. Ita Crytallus optimè levigatus, ut magnum remedium proponitur a Concilatore & Guarimonio, & ante eos à Dioscor. Cera item usus in ventre pullorum, vel in cavo cydoniorum, à Dioscor. & Galen. A Chymicis verò crocus martis contrict. à Paracelso sal lithargyri, & alumen Saturni. Nos verò frequenter & secliter utimur huiusmodi pulv.

ʒ. Ossis sepiar. ust. & pulveriz. ʒ ii. spongiæ pice imbutæ, & in ollula ultæ, in cinerem redactæ, cortic. ovor. iudurat pulveriz. an. ʒ i. margar. præpar. bol. arm. an. ʒ i. ni. cujus dosi ʒ i. in aqua polygoni, aut ex foliis quercus destill. pluribus diebus assumenda. Ucin. ur quoque syr. corallor. Quere. ad cochlear unum, procul à cibo. Commodius tamen curatur ulcus clysteribus, primo detergentibus, secundo exsiccantibus, & tertio, si opus fuerit, epicrasticis.

Detergentium verò tres sunt gradus. Primus est eorum qui parantur ex mulla, cum aqua hordei, addito melle ros. Secundi ordinis sunt parati ex aqua salita, Tertuciana, vel Montis Falconis, quæ salgemmea est; addito pariter melle rosac. Terti ordinis parantur ex muria, addito etiam ægyptiaco, ut nostro casu, quia ulcus est sordidum atque depascens.

Et licet de Murie usi dubitatum sit, exemplo illius Medici, qui cæparum esu, & clysteribus ex muria, omnes dysentericos curabat, & convulsionibus intericiebat, amethodus enim fuit; attamen in hoc depascente & putrido ulcere, non solum muria; sed caustica quoque conveniunt, ita consulente Gal. si callosum quoque fuerit, & Cero, quibus subscripserunt Avic. cum Æt. Cautè tamen & muria & caustica sunt injicienda, tribus nimirum observatis conditionibus. Primo in viribus valentibus. Secundo non nisi narcoticis commixtis, more Gal. Tertio ut clysteres non detineantur ultra horam, ut monet Ætius.

Absterfo ulcere, clysteribus exsiccantibus utendum, in tres pariter gradus distinctis. Primi gradus sunt ex decoct. hordei torrefacti, plantaginis, rubi, rosar. myrti, polygoni, cum ol. ros. bolo armena & ovi vitellis. Secundi gradus ex decoctione plantag. consolidæ, millefolii, verbenæ, cynoglossi, portulacæ cum bolo arm. terra sigillatæ, lithargyro, & sebo hircino. Vel ex aqua Villensi, & aqua Montis Ægrotorum cum succo plantag. Terti ordinis, ex aqua fabrorum, vel vino nigro cum troch. de Charabe ad ʒii. & troch. Gal. ad ʒi. quorum descriptio est huiusmodi.

ʒ. Chartæ combustæ, arseniciusti, squamar. zris, croci, opii, calcis vivæ extinctæ an. ʒ iij. m. & cum succo plantag. f. troch. Quibus utebatur Gal. ad omnia prava ulcera sananda.

Sed circa omnium jam dictorum clysterum usum, nos observare solemus materiæ redundantiam in detergentibus, & abluentibus, paucitatem in exsiccantibus, mediocritatem in epicrasticis, & temporis brevitate in causticis; atque tandem successivum eorundem usum, adeo



aded ut detergentem sequatur statim exsicans, indeque anodynus, si dolores urgeant.

His vero Com. Illustrissimum sanitatem consequuturum speramus; ita ut ad victum humectantem atque Balneum confugere atrophix causa, & tabis vitandæ minimè cogamur, ut in intemperie jecoris & totius calida & sicca, habitu gracili, & facile resolubili, dejectis viribus, nec acris medicamenta tolerantibus consulit Tral. ab Hipp. forsan edoctus, dicente. In curatione dysenterix, multa calida paries sub umbilico lavato, maximè si dolor aduerit. Et licet alvo fluente Balneum ab eodem prohibeatur; id tamen ab initio fit, quando corpus excrementis abundat.

Circa victus rationem nonnulla selectiora adnotamus. Et primò quidem, quod excrementa Illustrissimi Pat. sint qualibet vice exportanda, ne ab eorum halitibus foveatur morbus.

Ciborum verò parsimoniam commendat Gal. cui subscripserunt Tral. & Serapio, dicens, quod sic membra avida humores retinent, & ab exiguo stercore minus intestina molestantur.

Qualitas verò sit subadstringens, nec acida, nec acris. Sit itaque cibus epicrasticus, emplasticus, euchymus & coctu facilis. Sic Ætius, & Paul. laudant pultes, & oryzam cum lacte. Gal. ova in sartagine cocta, aceto aspersa; ita & Orib. addit tamen Gal. omphacium, vel granatorum succum. Carnes Volucrum & sylvestrium animalium in progressu concedit Æt. Lentem Gal. Portulacam Diosc. Conceduntur Mespila, cydonia, sorba, pyra.

Potus cum Paulo & Ætio sit aqua pluvialis Chalybeata, vel aqua plantaginis, & ex tenerimis quercus foliis; cui addatur, in virium defectu vinum austerum & subadstringens.

Somnus sistit omnes fluxiones præter sudorem. Concilietur itaque emuls. amygd. dulc. & sem. papav. albi.

Quietem imperat Celsus; omnis enim exagitatio exulcerat; & ideo non surgat, sed in lecto egerat.

Et tandem arceat omnes animi affectus atque commotiones. Quibus omnibus Deus Omnipotens aspirare dignetur. *Raym. Job. Fortig Consult. & Respons. Medic. T. 1. Cem. 2.*

Juvenis 15. annorum biliosus, diarrhoeam biliosam per tres dies tempore dysenterix epidemicæ, cum virium jacturâ, ex frequentioribus dejectionibus ortâ, passus, sanguinolenta spermaticque ranarum simillima jam frequenter excernit excrementa. Adhuc dolorosa ventris tormina, tempore excretionis potissimum molesta. Pulsus habet iusto celeriores, caloremque totius corporis acrem ac febrilem. Siti, anxietate, & vigiliis magnopere inquietatur.

Afficiuntur in hoc ægro intestina, ut ex sanguinolenta per anum copiosa excretionem, torminibus dolorosis conjunctâ, est manifestum. Afficitur etiam cor & totus corporis habitus; ut ex pulsu celeri, & acris ac febrili, totius corporis calore, ac siti, patet.

Morbus, qui eum affligit, est intemperies intestinorum acris, biliosa, & putrida; quæ eorum tunicam abradens & erodens, sanguinemque & materiam spermaticam ranarum similem in capacitatem eorum effundens, ipsaque ad eorum excretionem frequentem & dolorosam ir-

ritans, febremque inducens, Dysenteria, febri comitata, appellatur.

Causa procatartica hujus morbi est æris intemperies acris & maligna à qua, in pulmones per inspirationem delata, sanguis in eis existens simili qualitate & intemperie fuit infectus, qui deinde cor ingressus, & inde per totum corpus dispersus, Antecedentem huic morbo præbuit causam. Pars verò illius infecti sanguinis in intestinis à reliquo sanguine separata, ibique putrescens, & acrimoniam sufficientem adipiscens, intestinaque erodens & abradens. Continens hujus morbi & symptomatum est causa.

Putredine enim, perpetuò ad cor veniente, accendit febrem, anxietatem, totius corporis ardorem acrem, pulsus celerem, sitim, & vigiliis molestas inducentem. Acrimonia verò abradens & corrodens intestina, eaque ad excretionem, per spirituum animalium in fibras oblique descendentes influxum perficiendum, vellicans, excitat excrementorum, spermaticarum visciditatem & colore similiam, nec non sanguinolentorum excretionem, dolore & torminibus, excretionis tempore, ob humores tum eo maximè fluentes, potissimum infestantibus, comitam.

Metus est, ne hic intestina ab acrimonia materix peccantis ita exedantur, ut vasis mesaraicis, corrosis, sanguis tantâ copiâ effundatur, quæ ægro nostro vitam adimat.

Curatio itaque sedulo instituenda; eaque in materix acris deterfione, evacuatione, & attemperatione, intemperieque reliquæ correctione, ac intestinorum erosorum consolidatione consistet.

Primò itaque præscribatur talis haustus purgans:

℞. Rhabbari tostii & pulverisati ℥iij. syr. ros. solut. ℥j. f. aquæ hordei tostii ℥ij. Misce. F. Haustus, mane exhibendus.

Evacuatione peractâ, sub vesperam, ad acres humores, febrilemque calorem temperandum, utatur sequenti potione.

℞. Aquæ acetosæ, itagarix, folior. quercus ana ℥iij. Pulv. nucis moschatæ. cinnamomi, sautal. citr. an. ℥℥. Coquantur levi ebullitione Colaturæ adde syr. de acetositæ citri ℥j. myræ cydon. ℥ij. Misce. F. Potio, qua utatur ad libitum.

Sequenti die, pro ulteriore deterfione utatur decocto hordei tostii chalybeato; & simul pro corroboratione & refrigeratione præscribatur sequens conditum:

℞. Conservæ rosar. antiquæ ℥ss. Diacydonii simpl. ℥ij. Nucis moschatæ condit. ℥j. Spec. diarrhod. abbat. ℥ss.

Cum syr. de acetos. citri F. Conditum, de quo sumat frequenter magnitudinem castaneæ.

Circa quintum aut sextum morbi diem injiciatur Clyster talis abstergens, refrigerans, & adstringens:

℞. Rad. tormentillæ ℥ss. Herbar. plantaginis, endivix, lactucæ an. m. j. Flor. rosar. rubr. m. ij. Coque in f. q. aquæ hordei tostii ad ℥xv. quibus colatis adde sacchari rubri ℥j. mel. rosar. colati ℥ss. Vitell. ovi. No. j. Misce. F. Clyster.

Hic ubi per bidduum singulis diebus semel injectus



jectus fuerit, & intestinorum exulceratio satis deterfa, majoris adstrictionis & consolidationis causâ, talis clyster vicissim per biduum, singulis diebus semel, erit injiciendus:

℞. Rad. tormentillæ ʒi. Herbar. plantag. saniculæ, burfæ pastoris an. m. i. f. Portulacæ ni. ij. Folior. rubi, quercus an. m. i. Sem. plantag. sumach. oryza an. ʒi. Coq. inf. q. lactis chalybeati ad ʒxv. Colaturæ adde sevi Hircini ʒi. succi acaciz, hypocystidis an. ʒi. Vitell. ovor. N. ij. Misce F. Clyster.

Ubi per biduum eo usus fuerit, assumenda erunt per os varia adstringentia, quale est hoc electuarium.

℞. Conservæ rosar. antiq. ʒi. Croci martis, corallor. rubr. boli armeni, terræ sigill. an. ʒi. Sem. plantag. tolli ʒi. f. Cum syr. de rosis siccis q. f. F. Electuarium, de quo aliquoties in die sumat castaneæ quantitatem.

Venter foris inungatur unguentis adstringentibus & corroborantibus.

In dixta Aër sit temperatus. Cibus sit ex jure carniū, acetosâ, endiviâ, & portulacâ alterato, cum pauco panis candidi benè fermentati; item puls ex oryza. Potus sit cerevisia tenuis, & vinum rubellum adstringendi vim habens. Quies imperetur. Somnus concilietur: & Animi affectiones tristes, alizque vehementes, ablegentur. *Henric. Regius apud Theodor. Craanen Medicationum lib. 3.*

### Observationes.

Mercator quidam Delphis habitans temperatura biliosa triginta annos natus, per longam peregrinationem, multosque perperstos labores, ex Gallia reversus, & nunc paulò tranquillior, cum uxorem duxisset, & delicate magis viveret in fluxum diuturnum ventris incidit, mox in dysenteriam lapsus; per sex integros menses, cum misere vitam duxisset, doloribus ac torminibus sub umbilico pene extinctus est, verum cum hic experimenta multorum, ac muliercularum frustra, ac diu, multumque tentasset, tandem nostram opem expostulavit, omni spe destitutus, qui equidem cum hæc subsequenteria remedia eidem per me fuissent præscripta, præter omnium opinionem sanitatem consecutus est. Omnium primò injectum est hoc Enema.

℞. Decoct. hord. parum torrefact. fbi. ol. rosac. ʒiij. sacch. rub. ʒiij. vitellum unius ovi. M. Materia eo clystere utcumque deterfa, dolor quoque nonnihil mitigatus est. mox altero die sequens Enema infusum, recipiens lactis bubuli chalybeat. fbi. sacch. rub. ʒiij. 2. vitella ovorum. Deinde & tertium, ita.

℞. Decoct. hord. torrefact. fbi. ol. ros. cotoneor. an. ʒiij. ovorum vitellos numero ij. sacch. rub. ʒiij. M. jis tormina cessarunt, & facta est excrementorum mutatio in meliorem statum: injectis demum clysmis his acres materias eluentibus, per superiora hæc propinavimus; & primò absterforium hoc medicamentum.

℞. Decoct. hord. communis, ʒvi. syr. ex infus. rosar. ʒiij. M. conficiebatur ex rosis omphacinis non valde apertis, affusis septies vel pluries, atque abjectis, ut ego parare soleo;

in eo enim inest vis doloris sedandi mira, & etiam oblinendi.

Purgavimus autem hoc modo.

℞. Fol. plantag. Mj. fl. ros. rub. ʒi. mirobal. citrin. ʒiij. mirobal. chebul. indor. an. ʒi. schænanth. ʒi. bulliant in aqua in colat. ʒiij. adde rhab. el. ʒiij. syr. infus. ros. & cotoneor. an. ʒiij. M. F. potio. quinquies eduxit Deinde & hoc præscriptum est.

℞. Hord. commun. p. j. sem. plantag. fl. ros. rub. an. ʒi. bulliant in aqua in colat. ʒiij. dissolv. syr. cotoneor. & infus. ros. an. ʒiij. M. Postea de ʒiij. rhab. parum rosti cum decoct. plantag. & fl. ros. Deinde & ea quæ magis constringerent.

℞. Sem. plantag. exsicc. & pulv. ʒi. trochisc. de carabe, de spodio. an. ʒiij. C. C. utri ʒiij. corall. rubr. ʒiij. pulveriscentur subtilissime & dividantur in tres partes, & detur una dosis, cum vino rubro, altera cum decoct. sem. plantag. fl. ros. & centinod. tertia cum decocto vini rubei in quo bullierint rosæ, sem. plantag. & centinodum. Hoc etiam condito usus est.

℞. Conserv. ros. vet. ʒvi. diacydon. sine speciebus ʒiij. troch. de spodio, ʒiij. syr. cotoneor. rob. de ribes, syr. myrtin. an. ʒiij. M. Insuper victu convenienti utens probe convalescit a Dysenteria deplorata. Unicè etiam prædestinum decoctionis Gnaphali, tam potum quam loco fomenti adhibuit, & nihil præstantius quam ʒi. coaguli leporis pota ex sapâ & ltercus canum sola ossa vorantium, cum lacte chalybeato, ut sæpius expertum est *Petrus Forestus. obs. 35. lib. 22.*

Nobilis quidam mulier gravida in Dysenteriam incidit, consilium sequens dedit.

Lac amygdalinum cum aqua cocta chalybeata paratum, loco vini bibat. oriz am coctam cum jure gallinæ frequententer comedat. & pultem (Cade) cum vino rubro in quo aurum extinctum sit, ovis & saccharo coctam.

Electuarium hoc manè & vespèri sumat, quantitate nucis mosch.

℞. Pulv. rad. tormentill. ʒiij. sem. lapath. ʒi. corall. ʒiij. conserv. ros. & carn. cydon. an. ʒiij. cum syr. cydon. F. Electuarium.

Julepi hujus coch. 2. superbibat; atque circa meridiem totidem sumat.

℞. Syr. cydon ʒi. syr. fragor. cer. al. ʒiij. de papav. (ad sensum intestinorum nonnihil obtrudendum) an. ʒiij. aq. ros. & plantag. an. ʒiij. M. F. Julep.

Inungat ventris regionem oleo absynth. mastichino & cydon. pedes abluit vino rubro stiptico, sic restituta fuit. *Felix Platerus. obs. lib. 3. pag. 861.*

Prægnans mulier quum gestationis nonum mensem ingrederetur, dysenteria lethali corripit, quæ nullis præsidis domabatur, at cum pareret, illicò dysenteria restricta est, & illa paulatim sanitatem consecuta fuit: Dysenteria ante partum salubris ab Hippocrate judicatur, quod verum esse hystoria nostra testatur: ita enim Hippocrates lib. De morb. popular. quanto memoriæ commendavit. Epicharmi uxori ante partum dysenteria, dolor, alvi egestionibus subruentæ mucosæ aderant; ubi peperisset, statim sana erat, diversionis sortè ratione. *Amatus Lusitanus Centur. 2. Curat. 31.*



Mulier medica quædam annosa (sunt enim auctore Galeno, lib. 6. De locis aff. cap. 5. & mulieres medicæ quædam) mirabile consuluit remedium in Dysenteria.

Iussit pomum integrum (cotocœum magis laudarem ob vim adstrictoriam) excavari, impleri que cavitatem cera alba vel citrina selectissima, & indito operculo prunis admoventi pomum donec omnitiam liquefceret cera & pomi substantiæ intermischeretur, tumque pomum sic paratum elitare ægrum jubebat ante omnem cibum, & profecto optime contulit, nam cum clam me dies aliquot hoc esset usus remedio, mihi que postea rem omnem detexisset, & æquidnam mihi de tali adhibito remedio videretur rogasset, ingenuè quidem respondi, non malum mihi omnino auxilium videri, cum virtutem habeat emplasticam, qua agglutinare ulcera intestinorum posset; quin & dysentericis opitulari ex Dioscoride affirmavi; nec me propterea remedium improbare velle, quod esset a muliercula excogitatum, cum & Gal. ipse veritus minime sit, nec dedecori sibi fore putavit à plebeio homine inventam fumariz herbæ vim, ad itomachum roborandum & ventrem lubricandum in monumenta sua referte, & tanquam exploratum probare, ut lib. 1. De simpl. facultat. cap. De Fumaria, Franciscus Valeriolus. Observ. 4. lib. 3.

Illico præscribe Julapia ex aq. cichor. cum emulsione sem. cichor. & endiv. misce syrup. de ribes, & alternis diebus propina rheï & myrobalan. ana ʒss. cum syrup. de ribes. Job. Heurnius, ad Aphor. Hipp. 23. sect. 7.

Principem vidi quæ querula fuerat ante de splene: in febre deiecit alvo cruentam atram materiam copiosè bis aut ter; trepidabat illa ad conspectum excrementi; verum in bonam spem eam erigebam, evasit, non erat hæc dysenteria ab atra bile, nec diuturna, nec illa quæ est cum ulcere intestinorum, sed cruenta, quæ illico placatur, nam splenem evacuat. Job. Heurnius, ad Aphor. 48. sect. 6.

Optimum remedium est infusum rhabarbarum in decocto ros. sicc. rad. plantag. & mirobalan. ex aqua endiv. cum paucis cinnamomo, expressio fiat valida, præbeat cum syrup. de ribes vel de ros. siccis. Sumatur bis in septimana. Intermediis diebus lac à vacca calens datur ter in die cum saccharo rosato. Dolor si urget, lac clysmo infundatur cum butyro rec. & vitello ovi. Coquatur in lacte taphus barbatus & rosæ, tandem ut stringas lactis dimidium excoque. Bibat ter in die. Johan. Heurnius, ad Aphor. 3. sect. 6.

Quendam vidi, quem dysenteria longissima adt. tam tantam deduxerat, ut ei lac sugendum muliebri Medici præscripserint. sed miraculo quasi curatus optime & breviter fuit, usu aquæ pro potu ordinario, in qua suber bullierat: usus est etiam utiliter syrupo Corallorum & conserva Cynorrhod. sed aqua suberata præcipuum ejus curæ fuit instrumentum. Petrus Borellus. Observ. 57. cent. 1.

Nobilis quidam Lusitanus devoratis tribus pyris ab amasia porrectis, in fluxum incidit ventris diuturnum, cum diris symptomatis. Plurima ex abstergentium primò, deinde adstringentium sylvæ medicamina parantur, ex-

tra admota, intus assumpta, & per sedem infusa, sed frustra: cum tandem de veneno suspicio esset, propinantur cardiaca & alexipharmaca, ac malum solum smaragdo trita, & conserva cydon. obvoluta conquievit. Hanc alternis diebus jejuno ventriculo assumebat, superbibita aqua, in qua tragacanthum prius erat incoctum, smaragdi, quantitas erat pondus duodecim granorum, quam cum quinque devorasset a fluxu immunis evasit. Zacharius Lusitanus. Observ. 91. lib. 3. Præx. admirand.

Puerulus quidam bimulus dysenteria contumaci laborabat: post multa alia remedia frustra usurpata, exhibui extract. Corallorum ʒss. cum aq. plantag. & eodem die fluxus cohibitus est. Lazarus Riverius. Observ. 66. cent. 1.

Adolescens quidam 20. annorum laboravit dysenteria per 12. dies, quam nullo remedio oppugnare conatus est, donec ad Xenodochium deductus, sumpsit ex præscripto medicæ Xenodochii salis vitrioli ʒi. in aqua dissolutam, multa evomuit biliosa & pituitosa; sicque facta est revulsio humoris ad intestina deluentis, & hoc solo remedio curatus est. Lazarus Riverius. Observ. 9. cent. 3.

Alvum coactum vomitio solvit, & plus æquo fluidam sistit: illam quidem humectando, hanc verò siccando. Hippocr. Libro de diæta.

Uxor mea mente Augusti incidit in gravem dysenteriam, ab assumpto pridie pharmaco leviori. Circa horam somni exhibeo laudani gr. 2. cum Conserv. ros. Postridie hora secunda pomeridiana, cum perseveraret affectus, exhibeo ejusdem laudani gr. 2. continuavit alvi fluxus sine sanguinea dejectione, qui per 5. vel 6. dies perseveravit, ac tandem medicamento ex infus. Rhabarb. & myrobalan. cum rheo pulv. & Syr. rosac. omnino sublatus est. Lazarus Riverius. Observ. 84. cent. 2.

Puer quidam 8. annos natus dysenteria tenebatur, cum multo sanguine, dejectionibus viridibus & porraceis admixto, & febre continua, tertio morbi die sumpsit infusum rheï ad ʒi. in aqu. plantag. cum Santalo citrino, dissolvendo rheï pulv. ʒi. Syr. rosac. ʒi. optime purgatus est, multa excrementa reiecit sine sanguine, & febris serè expers fuit toto illo die. Postridie sanguinem purum rejiciebat, frequens erat dejectio, cum dolore ventris & febre, quæ perseveravit usque ad diem octavum, licet omnia remedia ordinaria, interna & externa adhiberentur, tum etiam Clysteres varii. Septimo die extractum Corall. ter exhibitum fuerat ad ʒi. cum aq. plantag. & Syr. Cydon. sed frustra. Octavo die cum & febris & fluxus ingravescerent, ac merus sanguis excerneretur, circa meridiem secta fuit vena, & sanguis ad ʒv. detractus, nocte omnia eadem, postridie manè exhibui laudan. gr. 1. cum extract. Corall. aq. plantag. & ros. & syrup. Cydon. alvus omnino suppressa est per quatuor horas; & placide dormivit. sensim tandem convaleuit. Lazarus Riverius. Observ. 17. cent. 2.

Quidam dysentericus omnia remedia respiciens, solo usus est Pimpinellæ decocto cum aqua & butyro confecto, cujus scutellam sumebat manè & serò & intra triduum curatus est.

Plori-



Plurimum valet Pimpinella ad depurandum sanguinem, & levem habet altringendi vim, ideo non est mirum, si dysentericis conferat. *Lazarus Riverius. Observ. 84. Cent. 3.*

Domina quædam dysenteria gravi correpta est, n.ense julio, æstu maxime ferviente, ad eam vocatus tertio die morbi præscribo clysterem detergentem, & venæ sectionem, quarto purgata est medicamento ex rhab. 3 iß. myrobal. 3 iß. infus. in aq. plantag. dissolvendo rhab. pulv. 3 j. syr. ros. 3 j. bis deiecit humores excrementitios, sed in reliquis dejectionibus, quæ frequentes erant, mucosum quid sanguine perfusum. Vesperti exhibui laudani gran. 2. quibus tormina parum remiserunt, & dejectiones paulò rariiores fuere. Quinto tormina eadem, dejectio frequens eaque sanguinea: Clysteres ex lacte, & vitell. ovor. frequenter injiciebantur. Vesperti iterum sumpsit laudan. ad gran. 3. cum conserva ros. & ilico dolores sedati sunt, ac semel tantum in hora deiecit. Dormivit per intervalla. Sexto die dejectiones iterum frequentiores cum doloribus intensis, rursus secatur vena: & post 3. horas sumpsit decoctum intestinorum vervecis, cum pulveris granorum actes. 3 j. dolores omnino sublatis sunt, & dejectionum intervalla multò longiora reddita: statim etiam a venæ sectione totus venter inungebatur oxyrhodo ex ol. rosac. aceto & aq. ros. parato, quod admovebatur singulis horis ad sedandam intestinorum inflammationem; & hoc remedio multum levabatur. Vesperti injectus fuit Clyster ex lacte cum 3 iv. succi plantag. ad eandem intestinorum inflammationem demulcendam, noctu etiam exhibitus fuit julep. ex aq. plantag. cum 3 j. pulv. gran. actes. Postmodum per triduum sumpsit mane decoctum myrobal. quo integrè curata est, illud decoctum ita compositum fuit.

℞. Cort. myrobal. chebul. 3 j. citrin. 3 iß. passul. corinth. 3 ij. coq. in aq. lb ij. ad tertiam partis consumptionem in colat. dissolv. Sacchar. 3 j. clarificentur & aromaticentur cinam. 3 ij. capiat in iv. doses mane & sero. *Laz. Riverius. Observat. 2. Cent. 3.*

℞. Juris intestinorum aut capitis castrati 3 viii. Sacchar. rub. 3 ij. M. F. Clyster.

℞. Ossis sepiæ ust. pulv. 3 ij. spongiz picæ imbutæ & in ollula usta & in cinerem redactæ cortic. ovor. indurat. pellicula ab ea interiore an. 3 iß. margarit. præp. boli armen. an. 3 j. M. F. pulvis dosis 3 j. in lacte vel chalybeato vel cocto, aut in aqua polygoni, certo vobis polliceor, hunc pulverem recentes omnes dysenterias nisi fluxio admodum urgeat, licet valde cruentas, statim sanare. *Hercules Saxonia. Pract. part. 2. cap. 19.*

Civis Hassienfis honestus secreto suo aliquot mille dysentericos servasse se gloriabatur, ad præservationem vinum vel cerevisiam absinthites commendabat, ad curationem præsentis fluxus seu albi seu sanguinei, libram senis calidæ cerevisiæ propinavit adultis ægris, cui summitates absinthii & sal album incoxerant, & nucem moschatam tritam cochleari ultimo superbendam dabat. Infantibus verò pro ratione aratis cochlearia hujus potus tria 4. vel 6. miscuit. applausum à multis meruit hoc secreto. *Thomas Bartholinus. Hist. 65. Cent. 2.*

Sæpe contulit pulvisculus stercoris canini per

triduum cum ossibus nutriti, cum lacte caprillo haultus. Nos sapissime glande ex opio lacto & intestinis inserto tormina abstinuimus, & dysentericum proauum colubum us, & somnum ægroto conciliavimus. Crebro autem gans ex opio podici inseratur, sed ultra quadrantem horæ in intestinis non est dimittendus, sed rursus appenso hlo eximendus. *Francisc. loc. Pr. H. sect. 3. lib. 4.*

Memini frixis equorum ungulis in butyro, iisdem dein pulveratis, sedatum fuisse frequenter pylori furorē, iterum dysenterias, atque medeæ benignitatem sentisse, olido illo remedio adhuc intra stomachum detento. Sin autem ungula sit jumenti lascivientis, dysentericis certam perniciem allatura dicitur. *Io. Helmontius. Tract. cui titulus. Pylorus rector.*

Linteum in leporis (venando per canum morsum interempti) sanguine tinctum, siccatumque & in vino carptim exhibitum curat dysenteriam: & siccum Erysipelati appositum illud sanat. Milites Germani leporem fumo siccatum præbent in potu, & curatur dysenteria non fallaci eventu. *Io. Helmontius. Tract. cui Tit. Potestas Medicaminum.*

An in liquoribus dysentericis assiduus Clysterium anodynorum usus tutus? nequaquam, & in hoc valde Medici decipiuntur. cum intestina abluendi lacte finem non faciunt; dum enim sic intestina proluuntur & diluantur, eliminatio & mollitudo adfertur ipsis intestinis, unde ne diutius quam Galenus *de puritat. vocat. Gnil. Bal. lonius lib. 1. Ephemerid. & Epid.*

Quidam dysentericos certo curabat sumo gingiberis per anum in sella perforata recepto, alius vero prætulit linteum C. Cervi. Nobilis Robertus Boyle. lib. De utilitate naturalis Philosophiæ part. 2. sect. 5. cap. 14.

Crytallus in tenuissimum pollinem redactus, ac cum vino propinatus dysenteriam curat, ac albos uteri fluxus sistit, nuxum præterea cholericam, vel coeliacam citissime & a proprietate tanquam Bezoar aliquod compescit. *Anselmus Boerius. lib. 2. De lapid. & gemis, c. 74.*

Dysentericum quendam ita curavi. Glandes quercinas in aceto forti concoquendas jubeo, quarum nidorem & fumum ano per sedem perforatam excepit. Hinc sedabatur dolor, fluxio sistebatur, & paucis diebus integras vires redintegrabat. *Martini. Ruland. obs. 40. cent. 7.*

Studiosus quidam in Dysenteriam incidit cui opitulatus sum his paucis præliis; cibis, quomodo non ita vesceretur, aut siccatum erat, aut tostus, aut assatus, aut in aqua vel lacte chalybeato decoctus. Potui dabatur à me lac amygd. dulc. ex aq. chalybeata confectum. præter hæc sacculos calidiss. ex sulfuribus in forti aceto coctis factos crebro ano applicari jussi, & sic bidui spatio convaluit. *Martini Rulandus, curat. 18. cent. 5.*

Dysenteriam sæpius à se curatam notavit. Jo. Præparatus in advertariis suis exhibitio 3 j. pondere, ex vino aut ovi vitello, pulvere rad. filipendulæ, quem ante ipsum secreti loco commendaverat. *Ludovicus Mercator. lib. 1. de rell. præsidiorum usu c. 14.* est sanè huic plantæ insignis vis adstringendi. *Georg. Hieron. Velschius, obs. 44.*

Pro arcano habeo à Viro Illustrissimo, argentinæ folium plantis pedum admotum, omnes dy-



ſenterias intra 14. horas ſiſtere, notavi aëris mutationem mire ad dysenteria curam conferre.

Vicini enim D. Solerium Mercatorem Nemaufenſem dysenteria fere morientem, qui curari nunquam potuit, niſi aëris Caſſienſis, cum ſuo in mutatione poſtquam ſtatim curatus fuit pinguique evaſit, licet antea tæbe conſectus eſſet. *Petrus Borellus, obſ. 13. cont. 1.*

Formina ſedabuntur hauſta aquæ verbalſci cui parum aq. juniperi admixtum. Fiant ſacculi etiam e verbalſco aqua incocti, & ventri dolenti inponantur. *Philippus Michael. conſil. 94. lib. 7. co. ſi. Cratonis &c.*

Gerardus Voſſius, vicinus noſter, dysenteria per aliquot dies laboraverat. Maximis inteſtinorum doloribus miſere cruciabatur, ſæpe multa deſiciebat, quæ cruenta & muco tenaci permixta erant omnia: niſi dormiebat: appetitus planè deſectus erat, velie venter ſitiebat, febris aderat non admodum vehemens, ſed continua. Licet æger juvenis eſſet triginta annorum, & valde robuſtus, attamen his malis exagitatus adeo proſtratus fuit, ut paucis diebus ad ſummam debilitatem pervenerit. Sexto Februarii, morbum curaturus, tale purgans exhibui, a quo multa biſoſa deſecit.

℞. Rh. barbari optati quantum uſtulati drach. ij. myrobalanorum Indorum, citrinorum, ana drach. j. folior. ſenæ mundat. drach. ij. ſem. anifi drach. j. papaveris albi drach. ij. aquæ plantaginis q. ſ. ebulliant per ſemihoram, adde colaturæ elect. diaphænici drach. j. ſ. miſce, fiat hauſtus.

Veſperi poſt purgationem hunc bolum exhibui, à quo illa nocte per horam unam aut alteram quievit.

℞. Terræ ſigillatæ, requiei Nicolai, ana ſcrup. j. mithridati Damoc. ſcrup. ij. miſce, fiat bolus.

Poſt ridie ſequens apozema coctum fuit, de quo ter de die & ſemel nocte mediâ hauſtum bibit.

℞. Hordei mundat. ʒj. radicem biſſortæ, tormentil. x. corticum granatorum, an. ʒj. foliorum quercus, plantaginis, ſaniculæ, pimpinellæ, alchimid. x. biſſortæ, an. m. j. ſeminis roſarum minimarum drach. vj. capitum papaveris albi num. iij. paſſularum cum acinis ʒv. aquæ communis lb. iv. coquantur ſ. art. ad medias: ſit apozema.

Intermediis horis etiam ſæpe de die particulam hujus conditi comedit.

℞. Nucis moſcate, trochiſcorum de terra ſigillata, an. drach. ʒ. cornu cervi uſti, coralli rubri præparati, lapidis hæmatitis, maſtiches, an. ſcrup. j. pulveriſatis adde, conſervæ roſarum rubrarum ʒi. ʒ. myræ cydoniorum, rob. acaciæ, an. drag. iij. requiei Nicolai drach. j. ʒ. ſyrupi granatorum acid. q. ſ. miſce, fiat conditum.

Sitim, quantum poſſibile erat, ſerre juſſi, cui legi eò facilius obtemperavit, quod poſt potum, imprimis cerviſiæ, ſemper maxima tormina ſentiret atque hinc etiam loco cerviſiæ, tale amygdalatum pro potu ordinario præſcripſi.

℞. Hordei mundati ʒi. ʒ. ſeminis roſarum minimarum ʒj. papav. albi, plantaginis, laſtucæ, an. ʒj. ʒ. aquæ communis lb. iij. coquantur ad medias.

℞. Dictam colaturam, amygdalarum dulc.

deſulat. ʒv. ſem. papaveris albi drach. iij. 4. frigid. major. an. drach. j. ʒ. fiat ſ. art. amygdalatum, cui admisce ſyrupi de papavere ʒj. roſarum rubr. ʒi. ʒ.

9. Februarii manè exhibui rhabarbari parum uſtulati & pulveriſati ſcrup. iv. cum pauxillo cerviſiæ. 10. ut & 13. Februarii apozema, 12. autem conditum reiteratum fuit. Atque his medicamentis fluxu ceſſante, æger paulatim convaluit, & vires deperditas convenienti diæta recuperavit, verum adhuc diu poſt ſanationem a quolibet potu malè afficiebatur & magna inteſtinorum tormina ſentiebat, quod malum etiam paulatim evanuit, nempe inteſtinis ab uſu ciborum novo mucò (priorè humorum acrimoniâ abraſo) ruſus oblitis & inveſtitis. Hoc ægrò ſanato, in iſdem ædibus paulo poſt idem morbus tres quatuorve alios invaſit, qui omnes ſimili lere modo curati fuerunt.

Eodem illo tempore Montforti per totum oppidum dysenteria inter vulgus paſſim graſſabantur, multoque necabant, integre quoque familiæ hoc morbo corripiebantur, quem propterea multi malignum & contagioſum eſſe judicaverunt, ſed male, quia non contagioſus, ſed temporis anni & diæta ratione communicis erat: cauſa enim nã hinc procedebat. Autumnus anni præteriti fuerat calidus & humidus, multoque in corporibus humores accumulaverat: hunc ſubſequabatur hyems admodum ſicca & intenſiſſime frigida, quod frigus cum aſperſſimo gelu longo tempore duravit, humoresque valde condenſavit. Initio Iebuarii aſperſſima illa frigida tempeſtas ſubito in tepidam mutata eſt, qua humores à frigore condenſati ad fluxum diſſoluti fuerunt. Durante autem gelu, cum nihil neque carniū, neque piſcium, aliorumque eduliorum recentium adveheretur, vulgares (ut iſto in loco conſueverunt) toto illo tempore veſcebantur carniſus & piſcibus antiquis ſaliſis & ſumo induratis, etiam multis capſis, & aromatibus calidis, aliſque ſimilibus, quæ huiusmodi non parvam acrimoniā induxerunt, quibus tandem repentinò calore ad fluxum diſſolutis, tot paſſim dysenteria excitata ſunt; non tamen alibi quàm apud vulgares, qui tali diæta uſi fuerant, divites enim qui liberalius vixerant, ab hoc malo ut minus erant. Hinc etiam evenit, quod ratione unius ejuſdemque diæta, tres quatuorve in iſdem ædibus ſæpe hoc morbo inacerentur, non autem ratione contagii, quod æque alios qui ipſos adibant, quàm hoſi invaſiſſet: *Librand. De Diemerbræck in Obſerv. & Curat. Medic.*

Pancras Collert, juvenis robuſtus annorum circiter 12. eodem tempore dysenteria quoque correptus fuit, cumque à Medicinis eſſet averſus, fortè quia v. j. de erat avarus, noluit Medicorum conſilia petere, ſed ſibi ipſi Medicus eſſe voluit. Viderat aliquoties me dysentericis in principio curationis medicamentum purgans exhibuiſſe, quapropter hoc meum conſilium in ſuo ipſius morbo etiam ſequi, & interim ſumptibus parcere volens, ipſemet ſibi tale purgans præparavit: ſumpſit tabaci minutim incuſi ſeminiæ, idque per noctem maceravit in cerviſiæ tenui, manè parum coxit & colavit cum expreſſione, ac totam colaturam unico hauſtu ebibit. Paulò poſt ſumma anxietate uſque ad animi deli-



deliquium correptus fuit, ita ut ipsum jam jam morituum crederent domestici. Eandem enormis vomitus & ingens per inferiora purgatio supervenit, magnaue variorum humorum, maxime bilis flavæ ac viridis, copia sursum deorsumque ejecta est, atque eo modo causa morbi violenter & simul evacuata, hoc unico haultu à dysenteria in totum liberatus fuit.

*Sæpe* (inquit Celsus) *quos ratio non restituit, temeritas adjuvat.* Liqueat illud in prædicto juvene, cujus temeritatem si qui fortè debiliores sequi vellent, facile per effluxum ipsius animæ dysentericum alvi fluxum sanarent. Nam tabacum tali modo sumptum, est medicamentum turbatorium vehementissimum, cujus violentiæ non est cujuslibet resistere. Ac proinde ego non omnibus auctor esse velim ut hujus experimenti periculum faciant. Si nonnullis robustissimis hominibus hujus violentissimi medicamenti temeraria assumptio casu feliciter cesserit, non in omnibus ille eventus sperandus est. Quòd tamen tabacum in robustissimo juvene dysenteriam sanaverit, non est à ratione alienum; nam maximâ suâ violentia mali causam simul evacuavit. Audiui etiam tunc temporis, adhuc alios duos rusticos dysenteria laborantes, eodem experimento fuisse sanatos. *Idem ibidem.*

Eodem tempore quo prædicta febris tam crudeliter grassabatur, etiam dysenteria maligna, multisque lethales, plurimos invadebant. Post nuncium intellinorum statim ægri sanguinem excernebant, non quidem solum & purum, sed humori cuidam albo, viscoso & tenacissimo permixtum, qui instat picis aut visci rebus omnibus firmissimè adhærebat, & in longissima filamenta extendi poterat. Aëris aderant ventris tormina intolerabilia, febris continua, cordis summa anxietas, vires maxime debiles, sitis ingens, totalis appetitus dejectio, vigilis continua, & nonnullis urina ardore. Quibus limus iste viscosus & albus, & sanguinolentis dejectionibus permixtus, valde tenax erat, plurimi moriebantur, at quò nimis tenacitatis adesset, cònielii evadebant. Qui in dejectiōe status simul excernebant, de his magna recuperandæ valetudinis spes erat. Illi qui ægris diu aderant iisque intersuebant, à communi contagioso fœtore sæpe ejusdem mali participes fiebant. Difficillimæ curationis erant hi fluxus, in quorum curatione venæsectio parum aut nihil proderat: sæpe quoque nec purgantibus, nec astringentibus, nec sudoriferis, aliisque remediis, in hujusmodi morbis adhiberi solitis, quicquam proficiebatur.

Eadem illa lues hoc ipso tempore in castris nostris ante Schenckianum munimentum innumeros infect, & plurimos occidit; cumque Medici castrenses omnes in curatione hujus mali omnia tentarent, sed pauca prodesse, tandem à Medicis quibusdam Italis (qui cum Gallorum exercitu huc venerant) auxilium inventum est, quò postea innumeri curati fuerunt. Primo purgabant ægros cum rhabarbato: deinde sumebant ceræ drach. 16. vel drach. 12. hancque minutim incisam in lactis dulcis 3 iv. vel v. aliquantisper coquebant usque dum perfectè liquefacta foret, atque tunc illud lac

quàm calidissimè bibendum dabant; (calidissime sumi necesse est propter ceram quæ in lacte tepido coagulatur, ita ut bibi non possit) si prima vice non sublitteret fluxus, etiam secunda & tertiâ repetebant. Cum autem plurimi in castris hoc morbo laborarent, tantum ceræ albæ brevi tempore consumptum fuit, ut Pharmacopœi Emericenses in tota civitate nihil amplius haberent, sed illam bonâ quantitate aliunde coemere coacti fuerint. Etsi autem cera rariùs exhibeatur per os, tamen novum remedium non est, nam Dioscorides lib. 2. cap. 105. scribit eam ulcera implendi vim habere, & dysentericis in sorbitionibus dari. Sic Valleriola lib. 3. Observ. 4. refert dysentericum desperatum tali remedio fuisse restitutum: pomum integrum excavatum cera citrina mundissima implevit, & indito operculo prunis assandum admovit, donec cera liqueceret & pomi substantiæ admisceretur, idque pomum ante omnem cibum ægro edendum aliquot diebus dedit. Idem Valleriola adhuc præstabilius fore putat si cera tali modo liquecat & assetur in malo cydonio, ut medicamentum simul alstringentiam & glutinatoriam vim habeat. Quercetanus idem remedium parat ex pomo curtispiculo excavato, & ceræ albæ ac gummi Arabici, ana drach. j. repleto: quo remedio feliciter usus fuit Greg. Hortius lib. 4. observat. 18. Solenander lib. 4. consil. 9. turturem ceræ 3 j. infarcit, & in aqua coquit, postea carnem edendam & jusculum cum pane sumendum porrigit. Alii pullum columbinum cerâ infarctum & assum, comedere jubent. *Idem ibidem.*

Marcellus Bor, vir robustus, annorum circiter quadraginta, prædicta dysenteria etiam correptus fuit. 9. Octobris ipsum purgavi cum rhabarbato. Deinde julebos, condita, pulveres, & apozemata refrigerantia, inerasiantia & astringentia, sudorifera quoque, aliaque convenientia medicamenta convenienti modo & tempore exhibui: verùm hæc omnia nihil profuerunt, ita ut tandem viribus ægri ad extremum dejectis ipsum pro desperato haberem, neque per biduum in tali statu vivere posse crederem. Cum autem vehementer sitiret, & aquam frigidam appeteret, jussi in desperato casu illam magna quantitate & frigidam ægro offerri, ut hoc copiosiore aquæ potu causa morbitica (si fortè fieri posset) ab intestinis ablueretur, ejusque acrimonia vi frigoris retunderetur. Æger itaque totâ illâ nocte aquam putealem frigidam magna copia (nam maxime sitiebat) ad libitum bibit, quæ in principio raptim intestina transibat, & magna tormina inducens per inferiora defluebat; postea minora tormina faciebat; circa matutinum tempus intestinorum dolores ferè nulli erant, & dejectiones multò rariores: circa meridiem æger in solum prolapsus per aliquot horas quietè dormivit: ante vespertam fluxus omnino subsistit, atque ita hic æger, qui jam cum Charonte de naulo pacifici putabatur, convenienti postmodum diata refectus, convalescit, insperato hoc remedio à morbo desperatissimo liberatus.

De aqua frigida potu in dysenteria vix loquuntur Medici recentiores: est tamen remedium in cholericâ dysenteria non alienum,



nam humiditate suâ abluit intestina, eaque ab omni humorum acrimia saburra liberat, & interna ulcera emundat; præterea frigiditate suâ obtundit bilis calorem & acrimoniam, atque intestinorum ulcera astringit. Frigidæ potum etiam Veteribus in hoc morbo ignotum non fuisse liquet. Aëtius tetrab. 3. sermon. 1. cap. 45. sic inquit: *In potu à principio quidem pluvia aqua utendum est; quod si pluvia optima non adfu, fontana utentur.* Cornelius Celsus lib. 4. cap. 15. hæc scribit: *Si pluribus diebus remedia alia non juverunt, vetusque jam vitium est, aqua bene frigida potio assumpta ulcera astringit, & initium secunda valetudinis facit.* Similiter etiam Paulus alique Veteres frigidæ potionis in dysenteria gravi meminerunt. Inter recentiores Amatus Lusitanus cent. 2. curat. 56. etiam dysenteriam biliosam frigidæ copioso potu curatam vidit.

Aliàs quoque sæpe evenit, ut optimis remediis nihil proficientibus, interdum simplex aliquod desperatas dysenterias curaverit. Sic ex relatu plurium Capitaneorum intellexi, cum anno 1624. Breda ab Hispano milite obsessa esset, & dysenteria in urbe graviter dominarentur, nec ullum huic malo remedium excogitari posset, cum omnia Medicis nota auxilia nihil prodesse, tandem casu novum aliquod inventum fuisse, quo plerique sanati sunt, nempe sericum duplici rubro carmosino colore tinctum in tenuissima filamenta pexum, & in vino maceratum: hoc vino cum scrup. j. vel semi drach. pulveris ejusdem serici aliquoties assumpto, innumeri restituti sunt. Novi quendam dysentericum pro desperato jam habitum, qui cum mespila cruda majore copia devorasset, præter spem convaleuit. Alius quidam pulvere ossium humanorum aliquoties cum vino rubro assumpto ab incurabili fluxu liberatus est. Solum oleum olivarum assumptum, vel cum pane albo tosto ei intincto comestum multoties egregia præstitit. Testatur Hollerius hederæ terrestris succum propinatum plurimos à morte liberasse. Forestus lib. 22. observ. 35. scribit se aliquando expertum fuisse, in hoc casu nihil præstantius contulisse quàm stercus canum sola ossa voratium cum lacte chalybeato exhibitum. Hoc remedio refert Fuchsius se uno anno plùs quàm centum dysentericos curasse. Riverius centuria 3. observat. 84. scribit dysentericum quendam usum fuisse solo decocto pimpinellæ, cum aqua & butyro confecto, atque intra triduum curatum fuisse. Bruyerinus lib. 11. de re cibaria cap. 22. de se ipso dysenteria laborante ita scribit: *Nos gravissimè tentati penè à Medicis deplorati jacebamus; exitium enim superabat opem, nullaque auxilia videbantur morbum lenire, nedum juvare. Tandem consilio anus cujusdam, sorba cruda largissimè vorans, postridie vim propemodum omnem torminentalem sensi depulsam: indeque firmata alvo, ab Orco (ut ita dixerim) revocatus, & pristina valetudini restitutus, verissimè expertus sum* Cornelii Celsi dictum, videlicet, temeritatem plerumque efficere in morbis, quod prudentia nequivit. Idem ibidem.

*De Dysenteria lethali ex usu brassica capitata noxio rore infecta.*

Exulceratio intestinorum, Dysenteria nomine veniens, quam Celsus lib. 4. c. 11. intestinorum tormina appellat, est plerumque morbus Epidemicus; interdum tamen etiam tantum certæ temperatæ ac constitutionis homines invadit: inter cujus causas remotas, Præctici non solum fructus, præsertim autumnales, aliosque cibos pravos & insolitos, sed etiam aquas, aerem & influxus astrorum recensent. De quibus inter reliquos videatur Forestus Obser. Medic. lib. 22. Obs. 1. Amat. Lusitan. Cent. 3. Curat. 35. in Schol. Aëtius tetrab. 3. Serm. 1. c. 45. Baccius lib. 12. cap. 9 Hippocr. lib. 3 Aph. 11. Sennertus Med. Pract. lib. 3. part. 2. Sect. 2. cap. 7. Nos quicquid hac in materia ipsi observavimus, annotatione dignum fore judicamus. Anno 1654. die 7. Augusti profecti sunt nonnulli Patresfamilias cum conjugibus & liberis, recreationis gratia, villam Greimboczin milliari Germanico à Thorunio distantem, ibique pernociantes, in prandio sequentis diei comederunt de brassica capitata adhuc novella & tenera cum butyro recenti & pipere fixa paulo largius: post cujus esum prima statim nocte omnes fere de gravissimis torminibus conquelliti sunt, quæ deinceps Dysenteria periculosa comitabatur. Qui itaque lani Thorunio egressi, postea omnes terminè ægri paucis exceptis domum reversi sunt: plerique tamen adhibitis opportunis remediis post aliquot dies per Dei gratiam evaserunt, sed duæ Matronæ, una Catharina Puschia Joanni Hübneri, Consulis Thorunens. jam piè defuncti conjux cum duobus filiis, altera Dorothea Stenveeria, Martini Lochmanni etiam piè demortui, civis & Mercatoris hujus loci consors, vehementia morbi extinctæ sunt. Cujus quidem causam non tam ipsi brassicæ, quàm ei adhærenti viscido & fœtido cuidam rori adscribimus, quo illa planè imbuta, alias natura statulenta, ventriculo & intestinis adeò nocivam vim impressit, quæ inquinamenta, si coqua aqua limpida bene abluisset, cibus ille proculdubio innoxius fuisset, ceu postea compertum, ipsaque coqua confessæ est. Adstupulatur hisce Aristoteles, qui Sect. 1. Problem. in fine, morborum alios ab igne, alios à rore creari statuit. Plutarchus Quæst. Natur. qu. 6. ita scribit: *Habet ros vim quandam rodendi: hinc roris potus graciliores reddit potantes, & pingues mulieres tenuibus vestimentis, aut lanis rorem excipientes; videntur eo nimias carnes consumere.* Huc pertinet illud Theocriti in Thyrside, vetula macra Rorenè vivit more cicadæ. Similiter rorem terræ noxium proponit Plinius lib. 21. cap. 17. dicens: *palastribus desertis nocturnos rores nocete.* Idem lib. 18. cap. 29. ne ros satis noceat, inquit, sarmenta aut palearum acervos & evulsas herbas, fruticesque per vineas camposque, cum timebis, incendio, sumus medebitur. Sed omnium optimè Albertus cap. 14. rorem dicit aliquando herbas siccare, Quia, inquit, quicquid est ex vapore habente multum humidi ærei & subtilis terrestris siccæ, tùm frigore temperato pinguescit humidum æreum, unde fit ros viscosus ad modum mellis. Ipso autem



tem delapso super herbas, actione Solis evaporat humidum, & terreste siccum comburitur, & ita sua siccitate exsiccat herbas & folia, & inducit sterilitatem. Ex eodem rore aliud addit nocumentum: oves, inquit, avidè depascunt herbas dicto rore affectas ob mellis saporem, unde fluxu ventris moriuntur. Ex aliis, si post copiosum rorem sol ferventior fuerit, plantis ad marem adducit, exhausto spiritu, quo tenebantur, nisi pluvia succedat. Si importune, inquit, cadat, plurimum obest. Nam Melles solet corrumpere, præsertim si pluribus diebus cadat. Est enim ros calidus & humidus, quæ qualitates sunt principia putrefactionis; aqua autem frigida est, & a putrefactione præservat. Suellanus de signis Serenit. cap. 5. ita scribit, Pannus lineus lotus noctu capitur à rore, redditur lacerabilis, quia ros illum putrefacit. *Simon. Schulzii.*

*Dysenteria raris symptomatibus infesta.*

Ut singuli homines suos patiantur manes, ita singulæ propemodum morborum species, quoties populariter affligunt, novi generis irritamento agros adoriuntur. Hoc anno dysentericis passim se adiungere dolores acerrimi circa regionem cordis oppressiones pectoris, interceptiones anhelitus, adeo ut ægris nonnullis a suffocatione metus esset; accessit ea in faucibus sentæ pituitæ copia, per aliquot dies recurrentis, ut gang. nismo. um opem frequentem non secus requireret, ac febres malignæ in fauces humorem noxium effundentes. Quibus non raro se aggregavit lumbricorum copia, atque pertinax ægrotum à pharmacis abstinencia, & solius cerevisiæ frigida amor, quod utrumque ultimum non paucis tunc tum fuit. Tandem trahente se in longum morbo, circa vigesimum primum diem obortæ quædam vomitiones sanguinis, & illæ modicæ quidem, sed plerisque ægrotum lethales, utcumque jamper plures dies non sanguis an plus, sed cum excrementis ichor tantum su inde per posticium excluderetur. In cura, post rhabbariolum, etiam frequentiore aliquando, protuit maxime tinctura Martis adstringens, sed curiose elaborata. Pulveres adstringentes, decocta adstringentia, quæ solenniter huic malo destinata sunt, parum, immò propemodum nihil hoc anno adstringere visa sunt. Sed & malo tandem evicto, tenesmi solito pertinaciores aliquandiu cruciavere. Cuidam Equitum Magistro dysenterico, meæ curæ subjecto, hoc peculiare, quod indubitanter prædicere, quoties excrementa sua proditura essent cruenta, quoties sanis similia: quoties enim sentiebat in urethra & testiculis dolores lancinantes, certum erat exituri sanguinis indicium, quoties in ventre & intestinis vagabantur dolores, nil tale observatum. *Ol. Borrichii.*

*Dysenteria lethalis, ex esu fructuum & olerum recentium.*

Serenissima Elisabetha Danica, Dux Brunsv. & Lun. cum jam annum 53. ætatis ageret, & 5. Jul. in cœna & ante cœnam cerasa alba, uvas

crispas, faba & pisa recentia liberalius elisasset, nocte sequenti dysenteria correpta est, quæ eam vehementer itum afflixit, & vires deiecit.

Die 8. Jul. data purgatio lenis ex infuso rhabarb. deinde alternis diebus pilulæ ex rhabarb. & mali. he, quibus quoties usata sunt, & rarius excrevit. & probioris coloris saburram egessit. Alioquin non modo cruenta, mucosa, multa itidem tincta, sed & viridia, livida, & nigricantia excrevit, præsertim cum condimentis, sive leniter adstringentibus uteretur. Crocus Martis propinatus non tantum nihil profuit, sed & vires deiecit, & excretionem multiplicavit, ut eo nisi ista vice, & semel tantum deinceps uti voluerit. Clysteres saepius sunt injecti ex decocto hordei, & nonnullis illi mucosis roborantibus & lenientibus, interdum ex lacte admixto succo plantag. & melle rosato; hinc semper melius habuit, & lenimentum sensit. Tandem, ob bilis & humorum corruptorum acrimoniam, intestinum rectum cum sphinctere exulceratum est, quod propter clysteribus locus non fuit per aliquot dies, præsertim cum interstamineum etiam ita intumuisse perhiberet, ut urina retentionem quoque metueret.

Die 18. Julii tametsi magno cruciata, remedium clyster ex decocto hordei, succo plantag. & melle rosato, viscosa pituita & mucipituum eduxit, & reliqua excrementa post id magis ad naturalem statum redierunt, vires tamen magis magis tractæ sunt, & pulvis adeo debilis, vix ut leniri posset, somnus interruptus semelantis oculis temper laborem, molestiam & animi angustiam post se reliquit, & in gis visus est in potentia vigilandi, quam verus & naturalis somnus; suborti etiam ructus & singultus quam molestissimi, qui tum intrinsecus assumpsis, tum toris adhiitis nihil aut perquam parum remiserunt. Vultus etiam diebus motus convulsi in digitis & labiis observati sunt, iussibus delicatioribus minima quantitate alia sunt. Post cerevisiam, quæcumque tandem esset, & ructus & singultus increbuerunt, post potum vini Petri Simonis rariores prodierunt, verum ex eo calorem se perentiscere conquiescit fuit, cum tamen nemo adstantium ullum calorem neque in pulsu, neque in contactu totius corporis, sed perpetuum frigus animadvertere potuerit.

Die 19. Jul. 1616. vespere inter 7. & 8. horam constantemente ex hac miseria valle emigravit. Serenissima Domina macilenta, calidæ & sicce fuit complexionis, quo circa humores consimilis naturæ in corpore coacervati & constitutione aeris calidiore, quæ ea ast te plurimis dysenteriam attulit, non paucos etiam sustulit, prout corpus magis minusve dispositum fuit, facile in atram bilem converti poterunt, à qua quæ nascitur dysenteria, omnibus secus à doctis Medicis lethalis habita fuit. Hæc tantæ interdum est sævitæ & malignitatis, ut non tantum subito vires deiciat, verum etiam vicinas partes, ventriculum, ejusque utrumque oritium, epiploon œsophagum & vicinas thoracis partes propter contiguitatem & contiguitatem facile iuherit & inquinat, cujus exempla adducit Hollerius Schol.



ad caput de Dysenteria, Quibus ego moveor ut credam consimili contagio superiores quoque corporis partes fuisse contaminatas, præsertim cum perpetuis ructibus & singultibus Celsitudo ejus sit divexata, & sæpius, effiebat per vomitum materiam mucosam rubore tinctam non multum absimilem illi quæ ab alvo injecta est: Libenter assumpsit omnia præter Khabarbarum, quod semper abominata fuit. *Thom. Bartholini.*

#### *Dysenteria indolens.*

Lubet meminisse Dysenteriz indolentis. quo ipso locus Hippocraticus lib. 2. Epidem. comm. vi. videtur illustrari posse, Anno 1669. in plusquam quadringentis Dysentericis multa ab aliis non annotata observavi. Et hoc peculiariter, quod multi de nullo unquam dolore ulque ad extremum halitum fuerint conquesti, Omnes vero hi mortui, nullus evasit, seu malignitatis majoris, seu intestinorum gangranosa constitutione sensum omnem excludente abrepti. *Thom. Bartholini.*

#### *Dysenteria ænoma sive indolens.*

Difficilis extat locus apud Com. 2. Epid. Com. 6. 1. 15. ubi volvulum scribit, etiam febris solvit, & *dysenteria ænoma idem.* & dysenteria indolorifica. Res mira visa est interpretibus, unde alii cum Valesio vitium in codice causantes, delendum voces illas, sine dolore, esse statuunt: alii cum Lindenio in select. dysenteriz vocem latè accipiendam jubent, ut per eam h. l. intelligatur diarrhœa, aliudve alvi profuvium, doloris expertis, Nihilominus dari dysenterias indolentes in pluribus ægris spectandum exhibuit dysenteria epidemica anno 1669. viciniam nostram exercens. Ægri aliquot, pueri, viri, mulieres, ab ipso inualionis momento ne de minimo quidem dolore conquerebantur, sanguinolenta tamen confestim egerentes, mirati sumus cum adstantibus novitatem rei, ægris aliis torminibus maximis afflictis, hos ne micam doloris præ se ferre. Et licet viderentur hi mitius agrotare, citiusque evasuri, omnes tamen moriebantur, utut generosis juvati Bezoardicis & Specificis. Hinc inquirentes causam, illam adscribendam visum fuit 1. malignitati majori, quæ in Dysenteria non sinit dolorem semper obtinere primas, ut quæ pleno passu ad corruptionem inclinat. 2. Gangranosæ intestinorum constitutioni. Fingatur enim quis, si illud dari non statuit, cauterium indolens, quod ob agenda energiam sensu omni partem, cui applicatur, exuit; pari ratione corrosivi humores in tantum quandoque pollere possunt, ut omnem sensum tristem excludant, intestinis statim quasi sphacelatis. 3. Mentem simul laborare interdum, & doloris lancinantis faces non sentiri in Phrenitide alibique conspicuum est. Jungi hæc potest causa, sed quæ non omne exhaurit punctum. *G. W. Wedels.*

#### *Dysenteria cum vomitu cruento.*

Quidam Dysentericus, anno suprâ citato,

adeo affligebatur, ut præter solita communia Symptomata aliquoties sanguinem non solum *sed etiam* excerneret, nihilominus tamen evasit, utroque fluxu subsistente. De vomitu aliàs sanguinis, vid. Dodon. Observ. cap. 26. ubi ex tribus locis potissimum ejici posse sanguinem scribit. 1. licet rarò, à Jecore. 2. à Liene frequentius, qui sunt pallentes & tumidum habent splenem autem vomitionem. 3. ab Utero, à suppressis mensibus. Medios Absinthii quoquo modo usurpati virtute aliquos servavit, citatque Histor. stirp. c. de Absinth. De vomitibus Hypochondriacorum nigricantibus aliàs plura, qui non per acida, sed aromatica curandi veniunt. *Georgii Wolfgangi Wedels.*

#### *De Quibusdam in dysenteria observatis.*

Præterita æstate, cælo maximè æstuoso, per integrum Julium, Augustum, mediumque Septembrem dysenteria apud nos epidemialiter grassata, promiscuè Senes cum Pueris corripiebat, nec paucos jugulabat. In qua sequentia observare licuit. 1. More morborum epidemiorum multo simul æqualiter sine data causa invasit. Nam licet alias flagrantè Siro apud nos dysenteriz aut alvi fluxus non adeo infrequentes sint, sed ab uno vel altero ex esu Peponum aliorumque fructuum horarum contrahantur: hac tamen vice omnes indiscriminatim, sive fructus comederint sive non, quin imò parvulos recens natos, aut demum ablactatos invasit; multos ex haultu aquæ frigidæ; quàm plurimos absque ulla prævia causa acquisivisse recorder. 2. Infantibus quàm adultis perniciosior fuit: Ex his quippe paucissimi interiere, illi autem statim in primordio vel circa nonum diem interempti sunt. 3. Paucissimi, dixerim prope nulli, qui nonum diem superarunt mortui sive parvuli sive adulti. 4. Nulla tamen adfuit malignitas; Alexiteria namque & sudorifera nec profuere nec nocuere. 5. Quin potius qui ab initio statim Manna in decocto cort. Myrob. cit. soluta aut Rhabbaro tolsto cum isdem corticibus pulverisatis exhibito purgati, servati fuere omnes, quæ purgatio locum non invenisset in malignitate. 6. Quos cum vomitu bilioso invasit, ægrè evasere, juxta Hippoc. in Coac. dysentericis vomitus biliosus in principio malus. Indicium siquidem, tonum ventriculi esse læsum, illumque compati intestinis, vid. Sennert. l. 3. p. 2. §. 2. c. 7. Contra hunc tamen vomitum quandoque cum fructu dedi Balsamum Peruvianum cum Saccharo vel Magisterio Corallorum mixtum. 7. In quibusdam moribundis, inprimis adultis observavi quandoque viginti quatuor horis ante mortem, totalem tùm pulsus tùm caloris extinctionem, salvis sensibus, motuque membrorum illæso: refrigerationem autem istam non percipiebant, sed potius de calore interno & siti inexplebili conquerebantur, ut manibus glaciei instar rigidissimis subinde loca petierint frigidiora; ob inflammationem forte, & exinde contractum sphacelum intestinorum. Hanc dysenteriam Mense Octobri excepit febrium quoddam genus singulis diebus instar tertianæ duplicis cum omnibus symptomatibus, sed paribus horis invadens: Præter tamen mo-



rem autumnalium nec longæ nec lethales erant, intra xiv. quippe dies evadere omnes. *Carolus Rogeri.*

*In Dysenteria quibusdam circa mortem quasi aura ex auribus exire visa est.*

Nonnullis Dysentericis circa mortem quasi aura ex auribus exire visa est. *Thom. Bartholini.*

*In Dysenteria cum Vomitu cruento, Singultus non lethalis.*

Vidi in eodem morbo singultus non lethales, vomitum cruentum conjunctum, evadente ægro, cum convulsionibus non mortuos, cum Petechiis frequentissime maritatum; Gravidas, licet mediis & ultimis mensibus nullas eo mortuas: laceo Ructus supervenientes bonos &c. *Thom. Bartholini.*

*Hepar Vipera Antidysentericum & partum facilitans.*

Summè illud & pro specifico laudat Dn. D. Michaelis p. m. in dysenteria epidemia, in Mss. Pract. Feci periculum aliquoties, & ob vim morbi quidem frustra id in aliquibus adhibui, ubi scilicet urgentia affectus & copiosissimæ sedes aliud postulerent; virgo tamen quædam dysenterica, ut postliminio Ephemerides meæ suggerunt, cum nullis aliis juvaretur, adhibito hepate hoc, cum aliis permixto, manifestum sensit levamen, Debet verò tunc esse à fellea vesicula separatum, cum fella stimulent. Sed si pro partu difficili allevando propinare idem sit animus, consultius est, ut cum felle conjunctum exticcetur, & in usum trahatur. Cum enim fel angullæ, Helmontiano experimento, tam secundis partum promoveat successibus, idem ab hepate hoc experiri cum manifesto juvamento licebit, *Georg. Wolfgang. Wedeli.*

*Curatio Dysenteria per lotionem in aqua frigida.*

Lavatio in aqua frigida ab Indis in omni sermè commendatur morbo, in dysenteria præsertim, & febribus extra paroxysmum, ægrisque maxime prodest. Cum Anno 1677. Mensibus Novembris & Decembris periculosissima laborarem dysenteria, & optimis quanquam medicamentis usurpatis, quotidie morti magis appropinquarem, ad lavationem in aqua frigida me (viribus adeò eram fractus, ut à servis portatus ex superiori camera in inferiorem domus locum lavationi magis aptum venire) contuli. A prima melius habui, ac cæterz, benedicente Deo, prorsus sanum me effecerunt. Anno 1678. Mense Majo, miserabilis (cum vulgo loquor) effervescencia & febris angebat. Dolor capitis, vigilæ, vomitus, fluxus alvi, ventrisque dolor me tregerant penitens. Atque per eandem lavationem, cum debito medicamentorum usu eundem valetudinis finem acquisivi. *Joan. Oulbonus Helvigi.*

*Dysenteria periculosa acidulis Schvvalbacensibus curata.*

Grassante æstate præterita Dysenteria Epidemica, honesta quadam matrona fluxu illo cruento corripiebatur, adeo periculoso, ut adhibitis etiam expertissimis medicamentis non minimum quidem cohiberi posset, petebat instanter ad tallendam sitim & retinendas vires Acidulas Schvvalbacenses, quas volebam concedere ob rationes satis notas, tum etiam alterius cujusdam ægri exemplo edoctus, qui me refragante clam illas biberat, & fluxu irrito intra paucos dies moriebatur; ne tamen crudelis viderer in ægros, in consilium vocavi Medicinæ illud decus & Practicum celeberrimum D. Geisulium, virum ut in omnibus, sic in præscribendis acidulis expertissimum, is Schvvalbachio retinebat, in Dysenteria serosa cum cautela concedi posse, subsequente nimirum mictione frequenti. Itaque unum vel alterum vitrum concessi tanto cum successu, ut largiori orta mictione fluxus sisteretur, & ægra neglectis omnibus aliis medicamentis. solis his aquis per Dei gratiam restitueretur. *Joan. Jac. Waldschmid.*

*Dysenteria ob ulcus pedis Curatum.*

Vir quidam quadragenarius die domi detentus fuerat ulcere pedis dextri, mali pertæsus illud consolidare curavit, quo facto statim incidit in Dysenteriam lethalem, tanto cum egestorum fœtore, ut vix illum invisere potui. Paulo ante obitum excernebat sanguinem putridum, coagulatum, parenchyma disruptum representantem. Vidi & in septuagenario ex ulceribus pedibus intempestivè sanatis epilepsiam, ex scabie sicca retropulsa asthma, & hydropem in Judæo, ex scabie humida pruriginosa malas deformitante, & à matre Ungu. exsiccativo curata subitaneam dyspnæam & paulo post suffocationem in infante 15. mensium. *Joan. Jac. Waldschmid.*

*De Balsami Peruviani usu in Dysenteria.*

Non minorem meruit laudem odoris suavissimi efficax hæc, in sanandis tam internis, quam externis ulceribus Medicina, apud Reverendissimam quandam Illustris Cænobii Sacerdotem maximam. Ad quam hinc peregrè evocatus, lecto affixam inveni, correptam febre tertiana notha, cum doloribus dorum, hypochondria, tibiasque ferè continuo instantibus; conjungebantur capitis infirmitas, linguæ siccitas, respirationis difficultas, nausea & ventriculi imbecillitas; nonnunquam palpitabat cor, somnus erat interruptus & perturbatus; urinæ apparebant nunc crudæ, nunc rubræ, mox turbidæ, sæpius subsidentia sabulosa refertæ; alvi dejectiones ut plurimum cruentæ & purulentæ, haud rarò ventriculis, Ascariidum forma, scatentes. Ex qua malorum caterva etsi corporis vires, in animo ad quævis perpetienda tranquillissimo, vigoris sui aliquid remitterent, nihilominus natura, opportunis auxiliis adjuta, tot suos hostes superavit, de iisque gloriose triumphavit. Quod autem à tam sævis ac periculosis Symptoma-



tibus immunis evaserit Nobilissima huc Matrona Religiosa, virtutum ornamentis cumulatissima, non quidem defraudabo plane debitis suis præconiis varia usurpata auxiliorum genera, primas tamen tribuere debeo partes Balsam o proximè ad verum Opobalsamum suis dotibus & notis accedenti, quod e nostris Pharmacopœis quidam possidet, hujus su pserat. Illa per aliquos dies, pro qualibet dosi ʒ ss. c. vitello Ovileniter cocto solut. inbrodii, sive jurtis gallinæ, dempta pinguedine, tepidi haultu, ex quo evidens juvamen sentiebat & percipiebat. Nec mirum, Opobalsamum enim cunctis fere malis, quæ perpetiebatur. Illa, medendo prodeisse, experimenta Celeberrimorum Practicorum dudum comprobant. Hinc apud Aegyptios nullum esse Medicamentum, quo magis ac frequentius Gens illa medendo utatur, quam Opobalsamum, quod quidem illi fere ad omnes morbos ac Symptomata adhibere Prosp. Alpinus lib. de Plant. Agypt. cap. 14. pag. 56. recenset. In particularibus autem morbis, in febrib. a crudis frigidisque humoribus, obstruccionibusque viscerum obortis Idem commendat pag. seq. & cum eo Joan. Schroderus Pharm. Med. Chym. lib. 4. class. 2. cap. 373 p. m. 181. Visceribus putredinem & corruptionis labem emaculare, adeoque Jecore, ac potissimum renibus factis abscessu laborantibus, inter præstantiora auxilia præcipuam operam conferre, testatur magnus Struicorum meorum olim Promotor, Jo. Veslingius in Comment. super citatum Alpini de Pl. Agypt. cap. 14. pag. 20. & in Vindiciis Opobalsami pag. 37. illius usu interno vaporum ad caput ascensum minui, redintegrata tibi digestionem, tradit. Hinc ad Stomachi dolorem, læsam concoctionem, & appetitum abolitum commendat Paulus Zacchias lib. 2. de Affect. Hypochondriaca cap. 15. Schroder. J. c. Necnon Asthmaticos ac Phthisicos juvare, mulieribusque singulare præsidium in Uteri affectibus esse, Idem ibid. ut & Alpinus, ejusque Scholiales accuratissimus, perseveranter allegerunt. Imò Juventam conservare Clusius Comment. in Monardum cap. 9. commemorat; usurpanda autem, in hunc finem, illius modum proxime docet Alpinus l. c. pag. 58. Cum præpotentis Dei auxilio, præsidis his secundum methodum legitimam adhibitis, à tot atrocibus malis liberata esset Optima Antistita, virum autem aliqua adhuc imbecillitas remineret, juxta convenientem a me præscriptam Dexam, corpus Aqua Magistrali confortante ex voto refeci, in seq. forma præscripta.

℞. Caponem evasceratum, atque minutim incisum, lava vino Neccarino, deinde coque in s. q. aq. font. ad horam unam.

℞. Postea Brodii colati ℥ iv. Vini Malvat. ℥ ss. Spir. Frigor. ʒ j. Aq. Bugloss. Meliss. Lilior. Convall. an. ʒvj. add. Cort. Citri rec. extimor. ʒ iij. Cinam. acuti. ʒ vj. Macis. ʒ i ss. Flor. Rosar. rubr. Tunic. Chamæm. Rom. Melissophyll. an. P. j. Sem. Fœnic. ʒ ij. Misc. omnia simul, & per 24. horas digere, post in alemb. destilla. Destillatum edulcora cum Sirup. è Cort. Aurantior. ʒ j. Jul. Violar. ʒ iv. Misc. & d. ad V.

De Aqua hac Analeptica sumpsit singulis diebus mane ʒ iij. cum tanto successu, ut secunda

ac tertia vice eam renovari curam, nec in posterum de recidiva quicquam conquesta fuerit. Luca Schroeckii.

*De Dysenteria Castrensi ejusque causa Verminosa & curatione.*

Exercitus Danici in Scania non ita pridem militantis cum Medicum agerem, inter alias contagiones Castra nostra infestantes, grassabatur præcipue crudelissimus & lævissimus ille dysenteria dictus affectus. Cujus originem & causam paullo accuratius investigans observavi in scybalis non solum mærs purulentis & cruentis, (nam & ipse hoc affectu lethali ter ægrotabam,) sed & in suis militum plurimi observavere necum cruentæ cladis cruentos reos, scilicet, animalcula quædam, anguineo flexu gregatim perreptantia variz magnitudinis & formæ, quorum delineationem accuratam Curiosorum oculis in præsentiarum sistere nequeo, ob defectum microscopiorum, quibus illo ipso tempore quod doleo, destituebat. Accedit, quod valetudo infirma cada-veris sectionem negaverit. Quam autem atrocissimorum dolorum Lernam excitant hospites illi ingratisimi, intestina fodientes, mordentes, lancinantes, imò, an ipsa præcordia lævientes, quilibet facile cogitatione assequi potest. Ideoque ne malum ipso in limine hærens ulterius serperet, exitiumque sibi metipsis cacarent ægrotantes milites ab expeditione Christiano politana reduces, maturo consilio opportunum remedium datum fuit ab Archiatro Regio Celebratissimo Dn. D. Christiano Fossio tunc temporis præsentem, scilicet absinthium non procul à Castris nostris ubique in agris luxurians, cujus summitatum in cerevisia cum Sale communi vel nitro coctarum largo ac tepido haultu bis terve in die factis, anguem, quem juxta proverbium in sinu suo fovebant, sensim necarunt ægrotantium plurimi. Quo & ipso consilio Wilhelmus Trelund ante hos 24. annos Hælnæ percuravit dysentericos aquam plurimos, quæ de re extat adhuc scriptum ejus in luce publica, vid. Tho. Bartholin. histor. 65. Cent. 1. Nec minori virtute pollebat aqua antidotalis Marthioli cum essentia absinthii composita ad præservationem propinata, ut nihil dicam de aliis remediis vermes sive vivos, sive etiam ante occisos è sedibus suis eliminantibus.

Hujus commatis observationes pathologiam animatam optimè illustrantes, cum altiori mentis indagine opus habeant, altioribus merito mentibus relinquo, haud quaquam operosè disquirens, utrum hæc vermiculorum generatio æritam aquæ sive horum elementorum bigæ quod suspicor, imputanda, cum notissimum sit ærem sive atmosphæram effluvis sæpe putridis & verminosis, sub forma rubiginis interdum segetes & fructus horarios corrumpentis, arborumque foliis arefactis auripigmenti ad instar adhærentis, scatere; variaque in sinu suo occulta vehere semina, in corpus quæ facile trahi possunt; Aquam autem æstare præprimis, propter tunc frequentius silentes ventos itagnantem & quiescentem putrescere, juxta illud Poætæ.



*Ut capiam vitium, ni moveatur aqua.*

Unde verminosum seminium in ea hospitis propullulat & aburente siccio excluditur: Quid mirum, ejusmodi prole verminosa prægnantem aquam largiter navitam in ventriculo insignes excitare turbas; quinimo, sæpius lactos & bulones ex ea produci, cum illud quam plurimæ testantur observationes ab Esculapio nostro Boreali Thom. Bartholino annotata. Et Delphis Batavorum triennio abhinc mense Augusti a famæ celebritate Cl. Viro Dn. Levvenhoeck admiratione pleno mihi per microscopium singularis artificio unica in aquæ guttula innumeram vermiculorum oberrantium numerum monstratum fuisse memini. Quamvis & huc suam quoque symbolam addere soleant copiosæ in castris circumvolantes muscæ, præcipuè majores illæ *Spy-Fluer* nostratibus dictæ, jam oleis ægrotorum, modo alimentis live crudis live coctis insidentes, fermentumque hocce malignum in cibos transportantes, vel ovis ubique suis, ex quibus vermes excluduntur, alimenta conspurcantes; quinimo eadem & ipsæ cibariis immerse assumptæque cathartici excitantes. Ut nihil dicam de cerevisia novella, nec debita fermentatione à fecibus depurata, aut vetustate acedente, vel ex frumento ad putredinem vergente, & curculionibus (*Mals Wurmer*) scatente, conlecta, copioseque epota, hanc malorum Lernam pariente & fovente. Et hæc est symbola illa, forsitan alibi obvia, quam hac vice hisce doctis doctorum virorum observationibus, ex voluntate eorum, quibus relinquiri maxima mihi religio est, annexere volui, Hatinæ posttridie calendarum Decembris 1679. *Pauli Brandii.*

*Dysenteria Acidulæ curata.*

Nobilis quædam Domina, Illustrissimi Domini Baronis de Chaos, pie defuncti soror, Dysenteria nullis cedente remediis hoc anno 1672. in Autumno diutissime torquebatur, quam Dysenteriam cum viderem à bile flavâ ardentissima foveri: Acidulas propinavi, & illico pristinae sanitati eam restitui. *Pauli de Sorbati.*

Illustrissima quædam Anno 1680. Mense Julio, postquam per dies aliquot ventris torminibus, capitis dolore, febricula, &c. afflicta fuisset, tandem Dejectiones alvi & frequentissimas & dolorosissimas cum totâ virium depreditione, & appetentiæ absoluta prostratione, patiebatur; Ego advocatus Dysenteriam incurantem esse judico de qua sic Excellentissimus Willsius, in altera Dysenteria specie sedes aquosæ & quasi limpidæ cum subita virium prostratione existunt; dejectiones interim biliosæ & phlegmaticæ rariùs eveniunt, & morbum non ita mali moris esse denotant: addit in sequentibus ulteriorem hujus morbi descriptionem ut & curationem idem Author. Clariss. Sidenham etiam de eo his verbis. Quandoque ne minimum quidem sanguinis per omnem morbi dysenterici decursum dejectionibus admiscetur; quo

non obstante, (modò frequentes sint dejectiones, cum ventris torminibus & colluvie mucosa,) morbus h. ad minus recte dysenteria vocabitur, quam si una maneret sanguis; sic Clar. Barbette in Dysent. definitione dicit fluxum in illa esse vel cruentum vel purulentum tantum. Adde quòd tunc temporis ibidem loci alios viderim Dysenteria Cruenta afflictos. Primò cum advocaret, fluctabant menstrua a dictis duabus, propterea a venæsectione pro revellenda materia acri in intestina deposita abstinerebam, & Julapiis quibusdam anodynis atque paululum cardiacis, ut & Enematis appropriatis insisterem. Elapsa die una atque altera cessabant menstrua, fluxus interim alvi urgebatur & quoad frequentiam, & quoad tormina, affliciebantur præterea aures difficili auditu, oculi obnubilatione, fauces inflammatione & tumore, totum cerebrum effusione humoris acris vigilias perpetuas & delirium procreantis. Unde patebat materiam morbosam & abundantissimam & pessimam sortis in partes omnes impetum facere. Venæsectionem, quam primo non ausus fueram celebrare, propter rationem enarratam, tunc tandem celebravi, haustulumque anodynum & confortans propinavi; Die subsequenti remedium purgans ex rhabbaro, p. uicissim a fenna, manna, & Symp. de cichorio cum rheo exhibeo, vespert. Julapium anodynum continuo repeto; sic ex parte rejecta materia peccante, remittebat quidem aliquatenus malum, sed brevi recrudescerebat, & quasi vires acquireret eundo, magis ac magis Illustrissimam vexabat. Enemata injici curo & decoctione flor. Chamæmeli, Nymphaeæ, Papaveris, Rhabbaros, herbæ Paralyseos, Lapsi Barbati, Rosar. Rubr. &c. in jussulo tenui, & post alterum à prima purgatione diem, eandem repeto, ut & die subsequenti Rhabbarum pulveratum Symp. Absinthii admixtum exhibeo, continuatis itidem singulis diebus Julapiis Anodynis; varia præterea fronti, temporibus, plantis pedum sunt applicita, pro profligandis vigiliis; sed in cassum omnia, nam sic hoc symptoma, non minus quam alia, semper infestabat; propterea ad Laudanum Opiatum confugio illiusque grana duo exhibeo, unde somnus ex parte accendebatur, & Dejectiones fiebant minus frequentes, & minus molestæ, sed interim major accendebatur febris, cerebrumque magis affliciebatur, quæ rursus omnia per injectum clysterium, purgantibus admixtis, minuebantur, revocato in integrum fluxu, sed minus doloroso. Morbi pertinaciam, malumque morem miratus, alium Medicum accersiri curo, unaque consilium inimus de tundenda salvatella, pro revulsione iteranda, sic sanè febris omniaque alia symptomata, momento quasi minuebantur; sed dum die subsequenti in colloquiis versaretur longioribus Illustriss. omnia rursus invadunt. Rhabbarum, Julapia anodyna atque Enemata descripta, addita tantum vel Theriaca Andr. vel Dialcordio Fracastor. ut prius repeto, sed cum parum inde accederet emolumenti, mor-



morbusque his omnibus surdus foret; Lac Asinum propono: sperans humorum acrimoniam acidam quæ prioribus remediis minime auscultarat præsidio illi forsitan obtemperaturam, meoque in proposito confirmior dum video Illustriss. Sidenham non reformidare lac etiam vaccinum aquæ admistum pro potu ordinario Dysentericis propinare, & in Dysenteria apud ipsum sicca dicta, non alio quam lacte crudo tepesfacto per quatuor dies ægros nutrire; Observoque præterea celeberrimos praticos Lactē prædicto tanquam remedio in Dysenteria uti: Interim alterius Medici consilium pro hujusmodi usu exquiro, cumque ille in meam sententiam descenderet, eo confidentius, illud hauriendum cum Saccharo perlato & succinato præbeo. Ventris tormina sic prorsus evanescebant: humorumque acrimonia temperabatur; attamen vigilæ aliæque multa semper vexabant, itaque post quartum à primo lactis asinum usu diem, consilio cum tribus Medicis inito, Enema injici curo ex Decocto supra memorato addita Philonii Romani largiori dosi; Lini-mento è Cerato Santalino, unguento Comitissæ, Oleo cydoniorum, niacis stillatio & pulveribus quibusdam aromaticis confectototum Abdomen calidè inungo. Quibus peractis dormiebat Illustrissima per duodecim circiter horas nullo per totum id tempus urgente fluxu, expergetacta omnia bene procedebant quandoquidem præcipua ex parte evanuerant symptomata, Delirium scilicet, Alvi fluxus, Oculorum obnubilatio & difficilis Auditus; unde patebat acrimonia humorum, lacte adhibito, temperata, sicque ut & aliis mediis evacuata non impossibile jam esse, aut saltem non tam ut prius periculosum ejus ulteriorem cursum inhibere, itaque in Enematum exhibitione pergo, ut & postea Pilulas Cathecu Anodynas à Clar. Hagendhornio descriptas singulis diebus serò devorandas trado. Superveniente etiam tussi sicca, à sola faucium irritatione per salium peccantium nondum in totum correctorum illuc depositione: adjicio Tabellas terræ Catechu anodynas & corroborantes è Terra Catechu, Confectione Alkermes, Pulvere Anodyno Daniel. Ludovici in pauca quantitate, & Saccharo in aqua fœniculi dissoluto. Sic in totum brevi convalescebat Illustrissima à morbo desperatissimo omnibusque remediis prope majori. Per totum morbi decursum potus fuit primum aqua pullorum additis sem. frigidis major. postea tinctura rosarum rubr. & flor. papaveris rhæados, admistis Syrupis idoneis. Cibus erat, vel jusculum avenaceum, vel simplex è carnibus, vel panatella tenuis, aliquando condita quæpiam, & gelatinæ. Hic non addo pulverem Pannonicum & alios, gelatinam cornu cervi compositam aliæque multa per usum medicamentorum memoratorum exhibita; sufficiat præcipua & indicationibus morbi maxime accommodata attigisse.

*Anatomicae inspectiones.*

*Dysenteria à bile viridi è Cysti manante, unde ilei & Coli corruptio.*

Erat fœmina 40. annorum, pinguis & optimi corporis habitus; quæ anno 20. Augusti Dysenterica obiit Amstelodami: Hæc ante tres septimanas incidit in fluxum dysentericum, qui cum temporis epidemius erat; quæ rejiciebat in principio morbi erant nigra, subsequente tempore rubescere incipiebant, aliqua tamen intermissa albedine: dolebat ventrem, diverso tamen modo, nam vel dolor ad umbilicum hærebat, tuncque deprimebatur venter: vel si hic attolleretur, cinguli instar circa umbilicum movebatur: Sitis ipsam urgebat intolerabilis, quam quocunque volebat potu sedabat, spiritus vini & aquæ vitæ usu nunquam intermisso: Medicamentorum nihil sumere volebat præter decoctum aliquod alterans, & pilulas de Landano Amstelodamensium, ex quorum assumptione dolor sedabatur, & somnus, qui alias aberat, obrepebat: Cum dejiceret sentiebat dolorem circa anum insignem: Purgata fuit aliquoties tempore morbi, partim pulvere Rhabbarbari solo, à quo nihil aut parum, sine levamine movebatur: partim cum rad. Jalappæ misto, à quo multum cum euphoria dejiciebat: Clyster etiam injectus est, à quo pessime habuit, neque etiam ferre poterat inunctiones, unde postmodum horum usus intermissus est: Tempore morbi ter sedatus fuit fluxus cum optima spe, sed cum pessimo uteretur victus regimine, recidivam passa tandem fatis concessit.

Cadaver apertum hæc dabat observanda 1. Omentum justæ quidem erat magnitudinis, sed sphacelatum, colore atrolividum. 2. Intestinum Duodenum & Jejunum repletissima erant bile, unde Sitis intolerabilis causa derivari poterat. 3. Ileum, quo ad Cæcum tendit, cubiti unius longitudine corruptum & sphacelatum erat: 4. Colon quatuor transversos digitos à Cæco sanum erat, post ad 8. digitos corruptum. 5. Folliculus felleus maximus erat & bile repletissimus: Bilis quæ in eo reperiiebatur, viridis erat sicut gramen: Cætera optime erant constituta: In Intestino Recto nihil notari poterat, nec in aliis visceribus: Hepar, Lien, Pancreas sanissima erant. *Alardus Hermannus Cummernus in Miscellaneis curiosis ap. 1673. Observ. 116.*

*Anatome Dysenterici, cujus intestina, ab initio coli ad finem recti, ulceribus & apostematibus obsessa erant.*

Potest Dysenteria emanare à tumoribus p. n. in intestinis procreatis: Perit Filius meus Honoratus, novem annos natus, Dysenteria ab ulceribus orta, ex tumoribus intestinorum: Cum ejus locus nobis esset ambiguus, & symptomatum causæ penitus ignotæ, demortui corpus secundum curavimus.

Chirurgus invenit à principio coli ad finem usque recti, plusquam ducenta ulcera rotunda, mixta cum apostematibus: quorum ulcerum aliqua corroderant totum intestinum: Illis ulceri-



ulceribus interjacebant partes aliquæ intesti-  
norum sanæ & integræ. *Jacobus Fontanus practi-  
ca lib. 3. cap. 23.*

*Dysenterici intestina sphacelata, erosa &  
perforata reperta.*

Filius viduæ N. assuetus bibere spiritum vini,  
patiebatur Dysenteriam summo cum dolore: re-  
puebat sanguinem coarctum pulcherrimi co-  
loris, i. e. arteriosum, eumque sæpe ad libra-  
rum duarum pondus.

Aperto cadavere reperi intestina tenuia hac  
illac sphacelata, tunicas erosas & quatuor in lo-  
cis perforatas. *P. Barbette prax. lib. 4. cap. 5.*

Dysenteria per plures annos grassata, impri-  
mis post ætates in pensæ calidas, immensum æ-  
grotorum numerum nobis obtulit, inter alios Fi-  
liam, septem aut octo annos natam, Illustr.  
Marchionis de Lucinge, ex dysenteria mor-  
tuam, in oppido sex aut septem leucas Geneva  
distanti, *Ronilli* dicto, quo cum accessissem,  
solusque prognostico locus esset, duobus post  
diebus mortuam aperiri visum fuit: Intestina ni-  
griora apparebant, cum quibusdam ulcusculis,  
& interior tunica lacera villosum sericum ni-  
grum representabat, qua cruciatim velut disse-  
cta, in pilos surgens horrebat: *D. Puerarius in  
Observ. ad Thomæ Burnet Thesaurum lib. 4.*

*Anatome Dysenterici, cujus intestina purulentis  
tuberculis scatentia deprehensa sunt.*

Purulentis his tuberculis scatebant Intestina  
mulieris Hafniensis primariæ, Dysenteria ex-  
tincta: cui ne clyster quidem ob puris con-  
trahentis copiam intrudi poterat. *Bartholinus  
Cent. 6. hist. 2.*

*Dysenterici corpus intestinorum vitiatum  
reperitum est.*

Hieremias N. febre assidua laboravit; xi. die  
dysenteria a prava bile, xxiv. interit. Huic in-  
testinorum corpus erat vitiatum: *Ballonius Epi-  
dem. lib. 2. pag. 245.*

*Dysenterici intestina inflata, cum interioris tu-  
nicæ abrasione reperta sunt &c.*

Anno 1624. aperui aliquot cadavera ex Dy-  
senteria mortuorum; inter quæ corpus militis  
cujusdam e diuturna dysenteria vita functi: Et  
invenimus intestina vehementer inflata, ac eo-  
rum interiorem tunicam plane abrasam: Tum  
folliculus fellis, quod maxime in eo erat mirum,  
repletus ac distensus erat humore lento ac vis-  
cido albo, instar pultis ex amylo, Bilis autem  
ne vestigium relictum erat. *Hortius Medic. In-  
dorum lib. 3. Observ. 3.*

*Pus in involucriis intestinorum Dysenterici coer-  
citum reperitum est.*

Si sursum & deorsum obsecratur intestinum, in  
involucriis eorum acervatur magna puris quan-  
titas, quæ tandem interficit: Quod nos cujus-  
dam corpore dissecto observavimus.

Libram unam vel alteram materię pu-

rulenta in recto intestino cadaveris puellæ Lug-  
dunensis juveni. *Joan. de Lamoniere de fluxu Dy-  
senterico cap. 7.*

*Dysenterici pueri intestina crassa tumida, in-  
flammata animadvertuntur.*

Puellus annorum 4. dysenteria correptus,  
quæ tunc popularis erat, excrementa excerne-  
bat per sedem cruenta, flava, tandem etiam ni-  
gra, quibus mucus pellucidus, copiosus adhe-  
rebat: ultimo die, 7. morbi, deficientibus viri-  
bus, quæcunque assumebat removebat magno  
conatu & clamore, idque interpolatis vicibus  
circa medium noctis, cum in agone esset, simi-  
lia excrementa flava & nigra, qualia per alvum  
dejecerat, evomens mox expiravit.

Corpusculum aperuimus, crassa intestina tu-  
mebant, atque, ac si inflammata fuissent, live-  
bant, uti loca inflammata in viventibus rubra  
post mortem livere solent: Ea intrinsecus ob  
sumum fœtorem non licuit inspicere. *Platerus  
observat. lib. 3. pag. 875.*

*Dysenterici intestina gangrena affecta fuisse.*

Nobilis quidam sexagenarius dysentericus,  
cum quinta die morbi obisset, & venter ipsius a  
D. Claudio Chapuis Chirurgus aperiretur, inte-  
stina undique gangranosa reperta fuisse, pro-  
culdubio propter ingentem inflammationem.  
*Fabritius Hildanus lib. de Gangrana cap. 4.*

*Dysenteria & variolis affecti intestina  
pustulosa erant.*

Ill. quidam Comes juvenis, Variolis correp-  
tus, ob febris & Dysenterię vehementiam, sep-  
timo die morbi mortuus est: Dissecto Jecur,  
Lien, Pulmones & Intestina, haud secus atque  
ipsa cutis, papulis manantibus scatebant. *Joan.  
Daniel Hossius Observat. Anat. 9.*

*Dysentericorum non intestina solum, sed alia  
partes quandoque exulcerantur.*

Vidimus quendam qui cum torminibus diu-  
tius vexatus fuisset, ex iisdem denique in ero-  
dentia ipsorum intestinorum ulcera tum in ta-  
bem, post in mortem incidens, erosa intus vis-  
cera ostendebat: e quibus dum ita affectus su-  
pervixit, ut triennium non excesserit, conti-  
nuo sanies effundebatur. *Bentuenius cap. 96. de  
Abdiss.*

Sæpe latius quam ad intestina pervagatur af-  
fectio: adolescens annos natus 12. bilioso pro-  
fluvio cum febre correptus, deciebat frequen-  
ter similia dysentericis: nigrum sanguinem, mitem,  
manus frigida, vigilia, vini magna appetentia:  
nihil adjutus remediis, obiit die 9.

Apertus, Oesophago interiore ad os ventri-  
culi superius & ad medium thoracem, nigro  
corrupto: Epiplois similiter corrupto, Pulmo-  
nibus alteratis, Recto intestino exulcerato: Do-  
lor fuerat in sinistro latere, imo ventre & stoma-  
cho. *Hallerius ad cap. 1. de morbis.*

*Dysenteria ab intestinis apostematibus obsessis,  
ut & mesenterio.*

Accuratissimus Falcoburgius Leidæ homi-  
nem



nem evisceravit, quem Dysenteris abstulerat: In intestinis, colo præsertim & recto, apostemata hinc inde conspiciebantur, quorum quædam rupta erant, & eo loci lacera intestina patebant: In mesenterio glandulæ quamplures tumidæ maturo pomio similes, quibus apertis tale pus foetidum expuebatur, quale in Dysenteria adhuc superflite effluerat. *Barth. cent. 6. hist. 2.*

*Dysentericorum quorundam intestina tantum crassa sanguinem continere observata sunt.*

In sectione quamplurimorum Dysentericorum, sanguis in intestinis tantum crassis observatus fuit, non in tenuibus. Ratio est quod humor corrodens in superioribus intestinis facillime fluit, unde non potest fieri excoarctatio & corrosio, ut accidit in crassis, præcipueque in Colo, ubi ob antractus & concamerationes maximopere stagnans, morbosus humor supra modum corrodit tunicas, unde mucus & sanguis effluit: Ideo clysteres abstergentes, aquasque thermales optimas existimarem, sicut optimas inveni, habitam tamen causæ morbosæ ratione. *Dom. Panatolus Pentecostæ 1. Observat. 9.*

*Gravem dysenteriam, absterfa crusta intestinorum carnea, sequitur cicatrix chyli distributionem impediens.*

Chylus à fecibus alvinis secretus, percolatur per crustam intestinorum carneam & spongiosam in lacteas venas. Læditur hæc percolatio quando abrasa est hinc inde ea crusta, & illi subjecta intestini pars cicatrice obducta, occlusis simul ad lacteas venas tendentibus poris, quemadmodum id nonnunquam evenit post alvi fluxus dysentericos graves, sicuti non semel post mortem in cadaverum sectione observavi. *Sylvius de le Boë Prælex lib. 1. cap. 16.*

*Dysentericus ulceratum habuit ventriculum.*

Alteri febris, vomitio, ventris dolor, Dejectiones pici & nigro sanguini similes: xx. die mors. Secto corpore inventum ulcus ustulatum, in ambitu exesit tunicis omnibus ventriculi, qua parte declivis est ad pylorum. Huic procidit anus toto fere morbo. *Hollerius ad cap. 43. lib. 1. de morbis int.*

*In Dysenterico Hepar sphacelatum inventum & Epiploon, pylorus & tenuia intestina inflammata.*

Duorum cadavera curiosius inspicere placuit, eorumque apertio: subiecit oculis quod mens antea conceperat, & Doctores actuosæ Medicinæ non contemnendi nobis reliquerant. In uno repertum est Hepar sphacelatum, pariter & Epiploon cum inflammatione insigni pylori & tenuium intestinorum, propagata ad rectum usque gangrena correptum. 7. die hic æger triginta annorum, gracilis, & acrim humorum incineratione melancholicus, interijt Augusti fini: Ipsum visitavimus. 4. morbi die, reperimus cum febre continua, singulis diebus post meridiem ferociente, dejectiones sinceræ, mox nigre cum summo dolore & calore flue-

bant, Sanguis paucus, modo permixtus modo impermixtus aderat, qui duobus diebus ante mortem omnino suppressus est: lingua scabra, glaciale extremorum frigus, & alia graviora symptomata biduo fere eandem præcesserunt. *Joan. de Lamoniére de Fluxu Dysenterico cap. 1.*

*In Dysenterico Hepar siccum pallidumve fuit, cum abscessu prope cystin fellis, alio in mesenterio.*

Rusticus Delphinus 40. annorum, post dysenteriam imprudenter ruri suppressam, doloribus ventris per septem hebdomadas continuus, & per breviora intervalla continue intensius exacerbatis, interijt mensis Decembris initio: Plurimum cadavera iustis rationibus moti nolimus aperire.

In illo Hepar siccum pallidumve conspicuum fuit, simul & abscessus cyllidis fellis pugni magnitudinem & quantis, prope jecinoris cava pus eructans. Alius vilus est etiam in mesenterio. *De Lamoniére de Fluxu Dysenterico cap. 1.*

*Dysenteria à vermibus excitata.*

Anno 1608. mense Augusto, nata est Dysenteria in puero Dom. Consilarii du Perier, quæ per intervalla excitabatur, quam suspicabar à punctura vermium nasci, quorum quantitas admiranda fuit inventa in intestinis post dissectum ejus cadaver: Nec mirum cum viderim intestina reduplicata à vermibus. *Jacobus Fontanus præctica lib. 3. cap. 21.*

*Dysentericorum ulcera ab usu Opiatorum magis putrida & sordidiora evadunt.*

Thomas Minadous, Medicus Italus & Professor, se observasse asserit omnes Dysentericos, quibus ex consilio Medicorum Laudanum Opiatum oblatum, defunctos; post eorum usum ulcera magis putrida & sordidiora reddita, ex longiori mora materiæ purulentæ & noxiorum humorum: Istud admonitum maneat alta mente repostum pro cautela. *August. Thonerns lib. 3. Observat. 10.*

*Viri à Dysenteria in decem diebus extincti, Pericardium aqua expers repertum.*

Cor motu continuo, & propria natura calidissimum, aquam obtinuit ut in ea assidue, veluti balneo temperatum maderet, quo floridum & vegetum conservaretur: Unde quibus per ardentes febres, vel inedias, vigilias, & ingentes morores exhausta est, Tabidi pereunt. Vidit *Jessenium à Jessen*, in febre ardenti aquam Pericardii consumptam. Vidi in cadavere illustr. Cancellarii *Dom. de Sillery*, post obitum ad pollincturam exenterato, pericardium siccum, aqua illa per morbum dysenteria cum decem dierum exhausta, nec tamen cor torrefactum exaruerat, sed erat mollius & flaccidius quam par erat. *Riolanus Anropog. lib. 3. cap. 7.*

*Anatome Fluore hepatico laborantis in quo hepatis apostema, ejusque dissolutio reperta est.*

Miles Anglus cum inflammationem Hepatis primum



primum passus esset, & frustra tentassemus ea quibus opus erat, dolor se remisit quidem, sed defuit malum in Fluxum hepaticum, tumore qui ante erat in hypochondrio, planè evanescente. Cum hoc modo per sex termes menses languisset, tandem ad extremam maciem ita perductus est, ut ipsissimam, qualis pingitur, mortem dixisset & sic miserrimam vitam cum morte permutavit.

Aperto corpore, invenimus loco Hepatis solam membranam ipsam investientem, satis crassam intar succi, cui adhuc portio saniei, loturæ carniū similis inerat, qualem tam longo tempore excreverat. *Bontius Medic. Indorum lib. 3. Observ. 9.*

Consul Parisiensis Hepatico profluvio bilioso sex annos vexatus est, & nullis remediis allevatus est. Eo mortuo inventus est tantum Hepatis loculus & membranæ, illius parenchymate consumpto & colliquificato. *Ballonius lib. 1. Consil. 53.*

Cuidam ex dysenteria febris tertio die oborta, accessit fluxus hepaticus: cum absque intermissione purum inpermixtumque sanguinem, interdum loturæ carniū non abstimilem excerneret, febrisque intenderetur septimo morbi die interiit.

Secundo ostendit secur universum prope dissolutum. *Jordanus cap. 17. de Pestis phanomenis.*

### Inspectio Anatomica.

*Fluxu Cœliaco extimulorum hic extra ordinem.*

Diarrhœæ diuturnæ Fluxum cœliacum successisse observavit *Magnum Reipublicæ Medicæ Lumen Excellentissimus Dn. Drelincurius Præceptor atque patronus meus in æternum venerandus*; ubi in his cadaveribus dissectis Intestinatorum histulam statibus multum distentam, attenuatam & tunicam villosam consumptam deprehendit; oscula Lactearum, Lympha, qua humectari deberent, magna ex parte exhausta corrugantur, atque collabuntur ita ut sese, ad chylum advenientem excipiendum, elevare nequeant, chylo, introitu per oscula denegato ulterius meare cogitur scil. ad Colon & Rectum, ubi cum tæcibus extra eliminatur. & *Theobaldus Discipulorum Clariss. Caroli Drelincurii.*

### DYSPEPSIA.

Vid.

### DIGESTIONIS VITIA. DYSVRIA & ISCHVRIA.

Vid.

### VRINÆ VITIA. DYSPOŒIA.

Vid.

### RESPIRATIONIS VITIA.

### Finis Libri Quarti.

## BIBLIOTHECÆ

# MEDICO-PRACTICÆ LIBER QUINTUS.

### De Morbis à Litera E incipientibus.

### EBRIETAS.



**P**LATO in Timæo ad decimum octavum vino abstinuisse penitus juvenes, ad quadragesimum dilutum bibisse, ab hoc verò largius & meracius, non tamen ad ebrietatem hausisse refert. Carthagenensium quoque legibus sancitum erat, ne Princeps eo anno, quo imperaret, vinum biberet. Persæ utebantur tantum vino pro incitabulo ingenii & virtutis, & eo tantum uis, quo soli sacra faciebant ad ebrie-

tatem bibere Rex concedebat, *Athen. lib. 10*. Penes Romanos sub mortis pœna interdictam fuisse Temulentiam M. Mevaci Uxor proprio corpore experta est, a Viro virgis ad mortem casta, quod e dolio vinum bibisset, *Valer. Max.* sed ceciderunt Majorum instituta, quo sobrietati patrocinebantur, & primum in scelera humanum genus proprio astu non pauca invenit venena, quibus vino minimè contentum spontaneam inferre posset insaniam. Verum enim verò, Ebrietatem pœna comes premit & phalans morborum ipsam insequitur, caput fœdis exhalationibus dirumpitur, Cerebrum vertigine tentatur, oculi torquentur, aures undoso spiritu crepant, lingua vacillat, sermo futilis, oris halitus rater, stomachus subvertitur, cordis palpitatio, manuum inepta & insana gesticulatio.

Vuuu



culatio, pedum incertus lubricusque gressus, iniquies nocturna, turpes ronchi, furiales somni, alvi & velicæ spurcissima solutio, ut in hac eluvie, (quemadmodum in cœno lulentæ fues) peritæpe volutantur. Vide *Jafon. Pratenf. Tr. de curandis cerebri morbis c. 20.* Miror interim paucos inveniri praticos, qui prolixè satis alios morbos enarrantes aliquid de Ebrietate immiscuerint, fortè quod Medici rarò ad eandem curandam vocentur, uti putat, *Forestus lib. 9. Observ. 18. Schol.* frequentius vero ad morbos, qui hanc sequuntur. Cum itaque Ebrietas in specie ex vino frequens causa morborum existat, ita ut *Kondelatus M. M. cap. 13.* scribat in Britannia Medicos divitias sibi colligere ex foris affectibus à Temulentia ortis, à paucissimis verò Medicorum attendatur, placuit de hac ipsa materia disputando in ejus tam causam, quam medelam inquirere, annuat Deus!

Temulentia, cum à prisca voce temetum, quod vinum est, derivetur, vi nominis eam tantum Ebrietatem designat, quæ à copiosa vini ingestione ortum traxit. Inde à tractatione nostra omnes Ebrietatis species ratione Etymologiæ excluduntur, quæ ex aliis, quam vino, spontaneam hanc insaniam inducendi vi prædictis, contrahuntur.

Excluditur ita Ebrietas, (1.) ex aqua, qualem ex potu amnis Lyncestii contrahebant.

Hunc quicumque parum moderato gutture traxit,  
Haut aliter tumbat ac si mera vina bibisset.

*Ovid. lib. 15. Metamorph.* Lyncestii aqua acidula vini modo Temulentos facit, *Plin. Histor. natural. lib. 1. cap. 103. Senec. quæst. natural. lib. 3. c. 20.* sic pisces ex ponto Euxino, si in aquam dulcem projiciantur, inebriari tradit *Baco de Vernulam. Hist. naturæ & artis.*

Excluditur (2.) Ebrietas ex Cerevisia, quod veteris vinum ex hordeo vocat *Theophrastus de plantis, lib. 6. cap. 15. in v. 1. & 2.* Vid. *Dioscorid.* quò refero omnia ferè potuum genera ex fructibus per fermentat. p. rata. *Vulg. Georg.*

----- pochla lati  
fermentato atque acidis imbutur vitia sorbis.

Hinc, *Plin. Histor. natural. lib. 14. cap. 1.* Est Occidentis populus sui Ebrietas fruge nudida. Mira vitiolorum solertia inventum est, quemadmodum aqua inebriaret, conf. *Placot. Schoob. Meibomius, &c. de Cerevisia.*

Ebrietas (3.) ex lacte, Tartaris & Scythiis non infrequens, paratur autem ut inebriandi vim acquirat duplici modo, vel (a) per fermentationem, quod Chynium & pozam nominant, (hunc potum *Prosp. Alpini de Medicin. Egypt.* ex farina loliaca, seminibus cannabis & aqua componi asserit) quem modum ex *Job. Luca* relatione de Tartaria gallicè conscripta citat *Dn. D. Eschmullerus dispus. de Med. Hippocr. chym. cap. 3. §. 7. v. (A)* per distillationem. Et probabile hoc videtur (inquit *Sennertus pr. 1. 4. part. 2. de inf. morb. cap. 7. de siriasi*) cum lac butyrum multum quod pingue & oleosum est, in se contineat. dixi verò alibi (sunt verba *Sennerti*) pinguis & oleosa omnia, spiritus chymicis dictos, suppeditare & olea à spiritibus vix aliter quam substantiæ modo differre.

Ebrietas (4.) ex Opio Turcis ita familiaris, ut in proverbio dicant: Opium comedisti *Bellon. observ. lib. 4. cap. 15.* quod an idem sit cum

Maslach Turcarum, uti *Sennertus, pr. 1. 1. part. 1. cap. 6.* contra *Tarbeiferum* disputat, an vero compositum sit, uti credit *P. Andr. Matthiolus, lib. 3. Epist. pag. 180.* in medio relinquo.

(5.) Ex rebus narcoticis. Horum enim vis atquequam eò progressa est, ut stuporem excitet, prius Temulentiam, & Delirii quoddam genus producit, v.g. sol. cannab. ex quibus bolos parant *Aegyptii*, quibus utuntur sub nomine *Assis. loliisemeni* hujus farinam cum sol. cannab. miscent & plusquam assis præstare dicunt, *Prosp. Alp. de Med. Egypt. lib. 4. cap. 2.* Huc pertinent nuclees insanæ, de quibus *Celsus Exot. lib. 2. cap. 16.* *Nux myristica* vid. *Lobelius observat. stiry. Cornices Mandragora* vid. *Schröd. pharmacop. Regd. Tuberis Theophrast. lib. 9. hist. plantar. Nicotianæ* funus, & plures aliz herbæ, semina, radices, quorum catalogum hic scribere esset extra limites vagari.

Intelligimus ergo per Temulentiam Ebrietatem ex solo mero contractam alio nomine *negmida* Græcis dictam, Latinis *Crapulam*. Vox hæc licet variè à variis accipiat, uti *Fosius* docet *Nat. ad Hippocr. lib. 1. de morb. vulg.* (a) Pro quavis ingurgitatione hesternæ. (b) Pro apepsia ex vino; magis tamen audiendus *Galenus*, qui ad *Aph. 5. sect. 5. Capitis offensionem ex vino* entia *negmida* vocat, conf. *Consider. Med.*

Temulentia itaque hoc sensu erit productum morbosum lædens spirituum animalium actiones, à sulphure vini copiosius hausti ortum trahens.

Tria esse, quæ valetudini nostræ negotium faciunt, Morbum scil. Morbi causam, & symptomata, *Galenus* putat *Lib. de Consist. Artic. 15.* quæ opinionem per traditionem ad nostra sæcula propagatam ex plurimis libris legimus. Verum quia ipsimet symptoma cum morbo confuderunt, ternarium hunc rerum p. n. numerum ad binarium redegerunt moderni; Causam nimirum morificam & productum ejus vid. *Tur. Dn. D. Ammanni paren. ad studios.* sufficit enim Medico pratico causas, ad quas solas attendere debet, à productis seu effectis distinguere, quorum etiam impræsentiarum respexi, dum Temulentiam rem homini p. u. per productum morbosum, loco generis definivi.

Differentia sumitur (1) à forma, læsa scilicet actione, quam communem habet productum hoc cum reliquis. Cum enim vita sana consistat in actuacione partium corporis secundum leges à natura præscriptas, vi contrariorum hujus labefactio Morbus erit seu productum Morbosum, ejusdem abolitio Morf.

Sumitur (2) differentia à parte affecta seu spiritu, ab usu animalis dicto: spiritus enim nostri corporis licet diversas actiones edat, diversisque organis gaudeat, nonnisi unus est, si substantiam aspicias; *Aristoteles lib. de animal. motu, Hoffmann. lib. 2. institut. Argent. lib. de somno, & vigil. Denfug. libr. de spiritibus: Helm. Tr. Blas. human. §. 58. Tr. spir. vita §. 29.* ratione verò usus ab arte dispescitur in vitalem & animale, quorum ille actionum vitalium, hic animalium sensuum scilicet & hos consequentium motuum animalium autor existit. Itaque Temulentia ratione partis affectæ distinguitur non modò à morbis sanguinis & partium solidarum, verum etiam à morbis spirituum vitalium.

Spiri-



Spiritus quidem hos partem corporis & consequenter morborum subjectum esse negant Veteres. Negandirationes collegerunt. *Comment. ad Aristot. l. 2. de gen. & corrupt. quest. 24.* sed ipsi definitione partium viventium recepta quam ex Galeno petiit Fernelius, refutari possunt, quæ talis est: pars est corpus toti coherens communique vita junctum ad usum comparatum.

Paradoxon videri posset spiritibus hanc partem applicare definitionem, dum per corpora denuntiantur, sed homonymia est in vocabulo spiritus, quod hic non proprie sumitur, quatenus substantiæ corporeæ contradistinguitur, sed improprie & comparate, perinde ut Chymici liquores volatiles ob mobilitatem & substantiæ raritatem spiritus dicunt: ita quoque subtilior hæc corporis nostri pars ob subtilitatem & generationis modum, quem cum spiritibus chymicorum eundem hære obtinet; fermentationem scilicet & circulationem, spiritus dicitur, h. est, corpus subtilissimum quod (1) toti coheret, cum sit de essentia corporis viventis & sine interitu ejus seu abolitione actionum, quam mors sequitur, separari non potest: (2) communi vitæ fruitur, quia proximum animæ instrumentum, quod vitam h. a. vivendi actum legitur; per quod vero unumquodque tale est, illud magis est tale: (3) ad usum comparatum, qui est æquatio partium organicarum. Ipsi enim aut imminutis, aut abolitis, aut depravatis, aboletur, aut imminuitur, aut depravatur motus animalis, salva licet organicarum partium structura. Inde Hippocrates quoque corpus nostrum instar machinæ hydraulico pneumaticæ dividit in partes continentis, contentas, & impetum facientes seu moventes h. e. spiritus.

His itaque notatis, concludimus spiritibus corporis nostri non modo definitionem partis competere, sed ex usu quoque, quem præstant ipsos (non excluso sanguine) esse partem primariam activè moventem, adeoque primarium uti vitæ & sanitatis, sic quoque morborum subjectum. Uti enim vitæ & sanitas & actiones exercendi vis effectivè & radicaliter à spiritibus his unice dependet, ita his ipsis lætis spiritibus laborare credimus, & quidem in Temulentis (qui nostræ jam sunt considerationis) animales, quia motus spontanei & sensus imminuuntur ac depravantur, uti testantur Ebriorum exempla non tantum non quotidiana.

Scilicet spiritus hi, qui sub seminis tegmine in uterum excernuntur, & postmodum sese ex sanguine in corde multiplicanti, in cerebro perficiuntur aut separantur cum materiales sint, uti supra dixi, materiales quoque habent conditiones, ratione quarum in statu naturali appropriati sunt systemati fibrarum organico; præcipue sunt salsedo & volatilitas.

Salsedo probatur à vi Balsamica, Balsamici sunt (inquit *Helm. Tr. sp. ult.*) & custodes à corruptione, Unde & his enervatis aciditatum morbosarum in corpore observatur Dominium quarum acrimoniam, illi ante temperabant. *Tit. Dn. D. Bohn. Disp. phys. 15. §. 18.* hanc salsedinem per fermentationem acquirunt, quæ ex duobus salibus sibi invicem contrariantibus in liquido solutis oritur, ex quorum con-

nubio nascitur tertium enixum seu salum, volatile, vel fixum, prout pugnantia salia nunc sunt volatilia vel fixa, utraque autem alterum alteri prædominatur.

Generantur enim spiritus ex sanguine per fermentationem, sive ea fiat ad modum Sylvii propter bilem per Epas, (*vid. Sylv. diss. 6. ii. de febr. disp. 2. §. 21.*) lixiviosam volatilem (*Tackius chrysog. animal. & mineral. p. 37.*) ascendentem & acidulam lympham per venam axillarem (*conf. Schyrl. Tr. pro Vet. Med. Barthol. in Ep. Diemerbroeck, anat. lib. 1. Svalvæ lib. de pancreat. p. 67.*) iidem volatilem descendentem, sive beneficio fermenti propriædem accedat, sive alio modo fiat.

Utraque suas patitur difficultates, Sylviana duplici modo impugnatur, primò ab iis qui bilem per porum biliarium versus Epas scandere, secundo ab iis, qui lympham acidulam esse negant. Illis satisfacere videtur Experientia (violenta tamen) (1.) *Fracassuti* quod atramentum vesiculæ injectum hepar denigrare monstrat, (2.) *Sylv. 1. Diss. 6.* qui flatum in felle vesiculam immisum versus hepar non intumescat; inde est, quod subligatione compressa vesicula copiose non modo versus hepar (unde etiam est, quod post factam ligaturam abscissa vesicula aliquid refluat, quod contra *Malpighium* nota) sed etiam versus intestina patente ductu communi bilem effundat, unde copiosæ agonizantium dejectiones. His præter autoritates allegatas oppono, quod saliva humor lymphaticus, non modo cum saccharatis effervescat, sed etiam lac coagulet, & martialia præcipitet, inde si vel tantulum salivæ liquori Mart. solat. admiscetur, ita turbatur. Altera de fermento cordis proprio ab iis negatur, qui cor muscolum esse & cavitatem accidentaliter saltem formare credunt. Sed recte *Helmont.* omnibus partibus & sic musculis quoque peculiare fermentum assignat, quod tamen de munere digestionis & coctionis, privativè potius quam publicè, interpretandum venit.

Volatilitas inde constat, quod potosam minus cavam nervorum substantiam penetrare & citissime ad partes fluere ac resluere possunt. Hanc agnoscens *Willisus lib. 1. de anima brutor.* naluit eosdem cum lucis radiis, quam subtilissimo liquore chymico comparare, quod hic de vase in vas effundi & destillari queat, spiritus verò animales illic evanescentes nullum sui vestigiū relinquant. Hinc *Grass. 1. de succo pancreat. cap. 2. edit. ult.* discisso nervo notabili ad crura tendente, ipsi phialam applicans angustioris colli nec guttulam decedentem vidit, nec spiritus vitri lateribus per condensationem adhærere notavit.

Obtinent hanc (1.) ab aëre ad generationem ipsorum concurrente, cujus in volatilizando sanguine efficaciam probat *Helm. Tr. Blas. hum. §. 45.* confirmant experimenta, *Louveri & Hookij* quæ refert *Tit. D. D. Bohn. disp. physiol. de pulmon. (2.)* à generationis modo, qui est per fermentationem & circulationem, quæ res in naturam spirituosam elevat, confertur Ep. *Beckij de volatilibus* sal. Tart. p. 30. quod vel solus odor sub fermentatione & destillatione nares seriens testatur.



His spirituum conditionibus ritè & naturaliter sese habentibus, vegeta succedit corporis actuatio, sicut iisdem spiritibus fixioribus ac aquosioribus redditis eadem frangitur ac debilitatur. Huic debilitati uti medentur indistinctè ferè omnia medicamenta, quæ ratione viridis aris volatilis, spiritus volatilifare & in debita falsedine conservare potis sunt, ita tandem ex contratio producunt, quæ spiritus figunt, ut pingua, resinosa, sulphurea, particulis ramosis salino volatiles maximè activas remorantia. Talis vis à vino quoque inest, cum in Temulentis similes videamus affectus, dubitari equidem non potest, quicquid dicat *Angellus Tr. 3. Ep. Med. 5. cap. 4.* quænam vero pars, cum vinum unà pluribus constet, ita vi polleat, sequentibus patebit, ubi de causa proxima. Non enim secundum totam substantiam inebriare probat *Schoock. de Cerevis. cap. 17. pag. 142.*

Differentia sumitur (3) a causa efficiente, quam sulphur nominavi. Qua in parte non contradico veteribus, qui passim videri possunt, nec *Helmontio Tr. spir. vite*, qui vinum, cum nihil aliud sit, quàm liquor uvarum expressus & fermentatus ratione partis spirituolæ ex fermentatione natæ (experientia edocti paratos per fermentationem spiritus inebriare) Temulentiam causare credunt, modò hanc virtutem non secundum totam substantiam spiritibus tribuant proximè; duplici namque particularum genere constant hi spiritus sulphureis scilicet & salinis, *Beccherus phys. subterr. lib. 1. sect. 5. cap. 2. Helm. T. spir. vite* quæ enim hactenus de mercur. vini fabulati sunt, ea de partibus salinis intelligenda esse suadet *Beccherus l. c.*

Partem sulphuream esse in spir. vini. h. e. corpus insipidum seu dulce (*Dn. D. Bohn. Ep. de insufficiet. princip. acid. & alcal.*) substantiæ ratione resinolum quod *Barnerus (Ep. de spir. vin. sine acido)* ex Magneno Ceram pinguiam nominat, probat, (2) genesis dum sunt hi spiritus ex succo uvarum subiecto sc. sulphureo mediante fermentatione, quæ causa est, ut unà cum partibus salinis in phlegmate solutum sulphur spiritus ardentis naturam induat, aded ut spiritus hi nihil aliud sint quàm oleum seu sulphur per fermentationem in suo phlegmate solutum, hinc etiam perinde ut ipsum flammam concipiunt, & ardentium nomen obtinent, (2) analysis dum ex iisdem oleum seu sulphur vel nuda aquæ infusione separatur, quod ulterius beneficio liquoris prorsus salini in resinam abire docet *Barnerus l. c.* saporis & odoris expertem, ardentem tamen & æquiponderantem ferè corpori suo.

Liquor hic oleum vitrioli est, & succedit experimentum in pluribus oleis destillatis, nunc facilius, nunc difficilius, unde cum oleo destillato anisi felicissimè procedit, difficilius cum oleo Terebinth. uti prolixè hæc deducit *Dn. D. Emmell. in litteris nuperrimè ad me datis*, ad alia verò olea destillata, quæ liquor hic non præcipitat, forsan alius salino acidus adhiberi potest, unde modo memoratus *Dn. D. Emmell.* ex oleo destillato pinguedinis humanæ cum spir. sal. similem resinam paravit, perinde ut idem cum eodem spiritu ex oleo olivarum communi produxit concretum pinguedinem animalium exactè representans, ad imitationem scil. experi-

mentorum à *Grevv. tr. of. Mixture: pag. 28. & Symson. Zymolog. pag. 145. relatorum.*

Salinam partem quod attinet, probat (1) genesis cum (1) ex multo copiosè sale abundante, uti monstrat *Tart. (A)* per fermentationem resultet, quæ absque salibus arti & naturæ impossibilis & (2) substantiam pinguem intime admixtam habeant, quæ non miscetur nisi per salia, quæ ob id, *Barnerus l. c. ex Helmontio* pingula vocat. (2) analysis dum (1) humiditate abstracta in Crystallos abeunt, vid. *Libav. l. 2. Chym. Tr. 2. cap. 38. & (A)* olea, quæ ex ipsis separantur nunquam sint absque sale, unde & in salia resolvi possunt. Sic *Helmont. oleo Cinnamomi* addito alcali proprio absque omni aqua trium mensium artificiosa occultaque circulatione in salem volatilem commutavit. *Tr. Chym. princ. §. 83. quin (2)* ipsum phlegma putredinis expers salum innuit præsentiam.

Cum itaque spiritus in duabus partibus constent, quænam illarum proximè sensus & motum liget, investigandum est. Atque hic dicimus esse sulphur vini & quidem cum addito copiosius, quia semper certa proportio, inter agens & patiens requiritur, haultum seu ore assumptum, nam quod ex clystere injecto, Ebrietatem observaverit *Borellus cap. 1. observ. 56.* id rarissimum est. Nostrium erit itaque hanc opinionem de sulphuris vinosi inebriativa virtute ulterius tum rationibus, tum experientiis a juvantibus & nocentibus desumptis probare.

Ratio, qua sulphur vini spiritus ligare & ita Temulentiam causare posse confirmatur, à substantia ejus desumpta est, quam resinosam & viscidam appellavimus adeoque capacem, qui spiritus salino volatiles ratione viscositatis in actionibus remorari possit. Inde omnia sulphurea narcosim possident & omnia narcotica sunt sulphurea, quamvis sulphura mineralia & metallica fixa quæ etiam ligendi spiritus potentia pollent, in quo tertio cum vegetabilium sulphureis conveniunt, alio paululum modo agere videantur, ob exiguam, quæ sumuntur dosin, unde & *Helmontio Tr. in herb. verb. &c.* Irradiantia vocantur, sicuti etiam materialiter ultra paucas vias vix pergere videntur.

Hanc rationem confirmat experientia à juvantibus & nocentibus seu Ebrietatem inducentibus & præcaventibus desumpta. (1) inducunt Ebrietatem citius vina, quæ copioso sulphure gaudent, ut sunt (1) vina suppressa, *verhaltens betne*, quia egressus sulphuris crassioris, in omni fermentatione aliàs exhalantis (monstrat hoc *Langelott. Ep. ad Curios. de fermentation. Opij.* & probat exhalans sub fermentatione Gas adstantes inebrians) impeditur (2) vina sulphurata &c. (2) Hispanica, quæ plus spiritus sulphurei quam acidi continent. conf. *Henric. ab Heer. obs. p. 215. (2)* Vina ambrata huc numerari possunt etiam ebrietatem accelerantia. *Mathiol. ad Dioscor. lib. 1. cap. 30. (II.)* præcavent omnia quæ sale volatili acri spiritus acciunt, quo minus resinosis sulphur. vinculis vinciri aut vinci possunt, in specie spir. sal. armoniaci, quem *Beckius den Gauß.* spiritum nominat. (III.) *Curans.* (1) acida. Nimirum in omni Narcosi æquè ac Temulentia felici successu adhibentur, quatenus scil. hæc solum à ventriculi fermento sulphur ex primis viis præ-



præcipitant (A) aquosa qt. dilatando poros mentrui solventis sulphur, hoc ipsum separant, perinde ut sp. viui larescere & oleum suum ex poris dimittere animadvertimus affusione aquæ.

Sed respondendum jam quoque erit *Tacckenio*, *Beckio* aliisque tantum non omnes morbos & sic quoque Temulentiam a sale acido deductibus; Hi in eo feliciores sunt cæteris Medicis, quod faciliorem viam consequendi medicamentum quoddam universale invenerint, cujus vicem penes ipsos imprimis sustinet, spir. sal. armoniaci, acidum, universalem fere secundum ipsos morborum causam potentissime infringens. Negari equidem non potest, acidum corpori extra ventriculum inimicum esse, ut loquitur *Helm.* & plurimum ita morborum causam existeri. An tamen idem acidum, quod & sulphur a similitudine vocat *Tacckenius* *clav. Hipp. chym. p. 8.* (Hinc *Barnerus* sulphur intra salia acida ponit. *chym. præcep.* a *Beckio* editis) in vino vero exacerans, licet à sulphure distinctissimum (conf. *Major. Tr. de sal. c. 4. de liq. acid. ortu*) sensum & motum in ebris liget, inquirendum est, quod ut commodius fiat, prius ad singulorum argumenta respondebimus, tum quæ porro obitare videantur, subiiciemus.

*Tacckenium* quod attinet, ipse *Hipp. chym. c. 19. p. m. 14.* a juvantibus seu potius præcaventibus herbis scil. alcali occulto gaudentibus, ut sunt herbe vulnerariæ & olera omnia in specie brassica, concludit in acido vini inebriativam vim consistere. Aberrare tamen in eo videtur, quod ipsas has dictas herbas non operari credat, nisi temperando & absorbendo acidum spiritus alias figens, cum Temulentia medeantur, non tam acidum infringendo, quam vi nitrosa stimulando uriam & sic vinum totum eliminando. Hinc eadem quoque conducunt in Ebrietate, ex spiritu vini Tart. contracta, quem tamen haud acidum esse omnes norunt.

Quod *Tacckenius* obiter unico argumento, id *Beckius* in *exper. circa natural. rer. princip.* prolixè per aliquot paginas variis rationibus, tum ab actionibus Ebriorum, tum ab experimentis particularibus desumptis, probat. 1. ab actionibus Ebriorum, hilaritate sc. & hunc insequente sopore, quas non commodius explicari posse scribit, quam per effervescentiam acidi ex ventriculo ad cerebrum emissam, cum spiritibus animalium alcalicis, quos tandem ex largissimo potu copiosius accedens acidum somnium & torporem causet, Exemplo suo hoc testari non modo potestas, sed Magnates quoque, quos consiliis dandis aptiores credit, cum pluscum bibissent.

Verum enim verò, si experientiam consulimus (1) non præcisè has actiones ab effervescentia spirituum alcalicorum cum acido derivandas esse videmus, cum natura pariter ac arte constet, non modo acida cum alcalibus, sed & alcalia cum alcalibus, sulphurea cum alcalibus &c. effervesce, &c. Clarum hoc est in spiritu vini cum sale Tart. per deliquium soluto aut bile oleosa cum lacte, magis clarum hoc est in corpore humano, ubi sulphurea in specie Opiata, omni acido destituta (quod summus amaror, juratus acidi hostis testatur)

sulphure abundantia (hinc inflammabilis) antequam somnum inducant, mentem hilariorem reddunt, conf. *Jenn. pr. Tr. i. part. 1. cap. 6.*

Li. et acida volatilia ut plurimum hanc vim possideant, non tamen vice versa omnia, quæ hunc effectum præstant, sunt acida volatilia, adeoque ab illo principio dependere crederem, & quidem sulphureo, cum hoc non modo in vino copiosius contineatur, sed etiam, quia omnia sulphurea, hanc virtutem possident, & vice versa omnia, quæ vi ac potentia hac pollent, sint sulphurea.

Nec obstat hic quod *Vigenarius Tr. de aq. & sale* (vid. *Theatr. chym. T. 6. c. 9.*) spiritum vini, quem minus acidum esse §. 19. diximus, minus inebriare scribat, quam vinum ipsum sale acido adhuc pertusum tali quantitate assumptum, quantum illud ante Aq. vitæ extractionem constituebat, seu 3j. sp. vini minus inebriare, quam ea vini quantitas, ex qua 3j. est parata. Nam ex ipso Autore respondeo (1.) procedere hoc experimentum in his locis, ubi sp. vini in usu frequens est, Germaniæ sc. oppidis, & locis frigidioribus, & proculdubio etiam in his subjectis, qui raro meracius bibunt, i. e. in his valet illud *Hipp.* assueti licet deteriora nonus alterare corpus, quam inassueti licet meliora. Hinc Turcæ opio, quod nos hinc vitæ periculo vix ad gr. ij. &c. exhibemus, ad 3ß. utuntur, (conf. *Bell. i. in observ.*) (2.) sulphur subtilius & volatilius penetrans sub forma Gas in destillatione exhal. re, testante hoc odore, a quo destillatores sæpè magis inebriantur, quam à spir. destillato, nec dubitarem (3.) quoniam in residuo aliquid sulphuris rem. neat.

Alterum argumentum *Beckii* desumptum est à juvantibus (1.) alcalicis (2.) in genere tan volatilibus quam fixis, quorum vini in labefactandis spiritibus acidis consistere, quatenus cum his coagulantur ex chymicis notum esse dicit, e. g. dum sp. sal. armoniac. cum sp. vini non modo ratione acidi salis in spiritu vini latentis coagulatur, sed & sal. Tart. fixum ex spiritu vini rectificatissimo acidas partes (quod ex aucto sal. Tart. pondere concludit) attrahit, (A) in specie brassica quam specifice in Temulentia exhiberi unanimiter scribunt.

Sed Resp. alcalium vim non pure consistere in oppressione acidi, ut potius præcipue in corporibus nostris ob cognationem, quæ habent cum spiritibus, in eorundem confortatione, unde labascentes in agonizantibus vires non seniel his ipsis restituntur. Coagulationem vero sp. sal. armoniaci cum spiritu vini ab ejusdem acido dependere, aut sal. Tartari ejusdem acidum imbibere, atque adeo suo pondere crescere eademque ratione acidum imbibendo ebrietatem præcavere dubium videtur. sal enim Tart. a quo spir. vini abstrahitur quantitate non augeri, sed minui docet *Dn. D. Bohn. Ep. c. ut & Barnerus cap. 1.* spiritum vini vero non ratione acidi coagulari, inde constat, (A) quia de aciditate adhuc dubitatur, vid. *Barnerus l. c.* (A) quia non modo alcalia cum acidis sed & alcalia cum alcalibus coagulantur, unde & sp. vini Tart. eodem modo cum spiritu salis armoniaci coagulatur, vid. *Dn. D. Bohn. c. 1. p. 27. Barnerus p. 16.* perinde ut hic ipse cum sale Tart. per deliq. soluto in offam coit. Nec spiritus vini in-



briare ratione acidi nec alcalia absorbendo acidum ebrietatem præcavere ex eo constat, quod spiritus vini Tartarificatus vim inebriativam æque obtineat, ac si ficto illo acido adhuc gauderet. Tandem brassicam quod attinet sal alcali ratione ( quod ipsi ex sapore & effectu, quem in vulneribus præstat ineile credo ) ebriis conducere negare nolo, an autem absorbendo acidum operetur, inde dubito, quod uti §. 30. dixi, conterat etiam in ebrietate a spiritu vini Tartarificato contracta.

Juvantibus oleosis, amygdalis scil. amaris & emulsionibus ex seminibus frigidis, quas operari credit ratione olei, quatenus scil. pinguedine sua acidum obtundant, atque sic ebrietatem præcaveant. Oleosa autem acidum obtundere probat per spiritum vini, qui licet ipse acido volatili gaudeat ( ex ejus supposito ) olei tamen ratione aquæ fortis aciditatem temperet. Miror sanè hic spiritum vini oleositate sua externum & peregrinum acidum satisque potens infringere, & proprium ( si quod est ) minus potens negligere.

Verum licet adductorum oleosorum effectum non planè nego, an tamen obtundendo acidum ebrietatem tollant, inde dubito quia ( 1. ) solummodo amygdalis amaris hanc vim tribuit non dulcibus, cum tamen hæc æque oleosa sint ac amara: ( 2. ) Emulsionibus ex seminibus frigidis pauco oleo gaudeant, cum copiosiori substantia aquæa consent, & semina quoque aquosiora sint. ( 3. ) quia non omnia oleosa, quæ acidum obtundunt, etiam ebrietatem præcaveant, ut oleum hyosciami, papaveris, ambræ, &c.

Ut itaque Tacchemius & Beck ex juvantibus concludunt, Ebrietatem à vini parte acida oriri, ita refutatis ipsorum argumentis ex eodem fundamento contrarium inferri posse sequentia probant ( 1. ) quia non omnia, quæ acidum tollunt Ebrietatem etiam præcavent, hinc amara sal acidum potentissime infringentia, lupulus, Crocus, &c. minime Temulentiam curant. De Absinthio quidem ex *Arculario* refert *Senn. c. 1.* Ebrietatem ex vino curare, sed experientia id refellit, quæ vinum absinthites maximè ad somnolentiam & Temulentiam disponere quotidie monstrat. sic de croco scribit *Dioscorid. lib. 1. cap. 25.* ex passo sumtum crapulam arcere, sed falsum esse experientia eorum monstrat, qui etiam ex croco leviter odorato capitis repletionem & somnolentiam patiuntur, unde rectè *Nic. Piso lib. 1. de cognosc. & arcend. morb. in specie crocum ebriis vetat.* ( 2. ) Quia etiam ea quæ acida non sunt inebriant, v. g. spir. vin. tart. amara plura, in specie amarulentissimum opium, quod similem effectum producere Turcæ sciunt. ( 3. ) Quia vina austera, ut sunt rubella, minus inebriant, cum tamen austeritas ex acido in subiecto terræ gignatur. ( unde concretum oleosum maximè austerum ex terra sigillata cum spir. sulphur. artificialiter confici potest ) ( 4. ) Quia acida ebrietatem tollunt; unde potatoribus *Sennert. T. 1. prax. part. 2. cap. 6.* commendat acida, acetum simplex, vel aq. font. dilutum. poma acida, pruna, cydonia, lac acidum, acidulas, &c.

Signa diagnostica per quæ præsentem ebrietatem dignoscere queamus, recenset *Donni-*

cus *Leoni-lucensis*; sed ignoratâ causâ occasionali certi aliquid pronunciare non possumus, alii enim ut apoplectici cadunt, adeo ut quendam 4. dies male pro apoplectico curatum *Henric. ab Heers observ. 19.* annotaverit, Alij delirantium instar varia sibi imaginantur, sic refert *Later. observ. lib. 2.* quendam in pl. tea luxu splendorem in terra intuentem exitum a se se videre fluvium profundum, & quo nare posset, vestimenta deposuisse: Sic alij, pro phreneticis habiti, unde observavit *Borell. cap. 1. Observ. 56.* mulierem abstemiam clytere ex vino injecto inebriatam, quod ignoranter proximi adstantes errorem quendam à Pharmacopola & Medico commissum opinabantur.

Quia autem fiat, quod ex ebrietate nondum consummata, alij irascantur, alij tristantur, alij loquaces sint, alij somnolenti; An. sc. quod humores affectibus convenientes in corpore nostro commoveantur, uti putat *Plater. Prax. lib. 1. cap. de Temulent. an alio modo accidat,* nondum liquet. Conjecterem animum sensus alias mediantibus spiritibus dirigentem, ipsis spiritibus per fumosas sulphuris vinosi partes obscuratis, quiescere à muniis propter ineptitudinem instrumentorum; unde hi liberiores ( primo antequam à sulphure planè supprimuntur ) pro diversitate conceptuum idearum potissimum exequuntur suas actiones. Inde fortè quod *Denguerdus de Tarantismo* scribit, animalcula, hæc easdem imaginativæ impressiones imprimere fortius, quibus intentos quos mordent, inveniunt; hic quoque applicari certò modò posset, dicendo: Temulentos secundum ideas agere, quas archæus animæ superioris dominia jamjam liber, paulò ante ebrietatem, conceperat.

Non negandum interim, temperamenta ( non primarum qualitatum elementalium ) particularum sanguinis aliquid conferre; inde sanguinei, quorum sanguis ex debita particularum mixtura constat, læti sunt, quia in his spiritus celerius & agilius paulò moventur. Cholericici h. e. in quibus particulæ urinosæ oleosæ dominantur, mobiles sunt & inconstantes, quia spiritus volatiliores & faciliè disperguntur, unde superficialia saltem sic idearum impressio, & propter hanc actionum facilis immutatio. Melancholici, quorum sanguis particulis salino-acidis scatet, propter spiritus ex sanguine hoc generatos paulò fixiores, impressiones tardius quidem, fortius tamen recipiunt, unde constanter vel rident, vel tristantur &c. Phlegmatici tandem, & quibus lymphæ obruit sanguinis salia fermentativa, paucos gignunt spiritus, unde citissime succumbentes, somniantur.

Cum itaque non ex sale acido vini, sed sulphure, quod ab effectu narcoticum appellamus, temulentia oriatur, eadem quoque extimescenda sunt mala, quæ narcoticorum usum insequuntur, licet vini sulphur ipsis paulò mitius sit, sensuum nimirum stupor, & sensuum debilitatio, ut & ex fixatione & oppressione spirituum omnium digestionum labelactatio, si frequentior sit; Alias citò discutitur per somnum, scilicet vis illa narcotica à natura jamjam est subacta, spiritusque à vinculis, quibus ligabantur, sese expedierunt, pro vini tamen conditione, ægri peculiari naturâ, locò & tempore sol-



solvitur ebrietas quibusdam 2. vel 3. die, vel se-  
rius, prout crasso vel tenui vino incaluerunt.

Optimum igitur & sanitati maxime pro-  
ficuum est ebrietatem, quantum in nobis est vi-  
tare, quod sit vel abstinendo à vini potu; (un-  
de abstemi dicuntur) suadet hoc prolixè Deo-  
datus, Panth. Hygæst. lib. 1. cap. de ebriet. vel  
corpus certis remediis disponendo, quo vel per  
alvum aut urinam evacuetur assumptum vinum,  
antequam vires suas expandat; vel contor-  
tando spiritus, quo se ipsos à vinculis quibus  
detinentur, liberent. Distinguat tamen sem-  
per ebrietas ipsa h. e. sensuum & motus cessatio  
à sulphure vini orta, ab aliis morbis ebrie-  
tatem vel concomitantibus, vel consequenti-  
bus; cum hi plerumque ab acido vini, hæc ab  
eiusdem sulphure dependeat.

Tutissima præservatio est per abstinentiam  
quam certis remediis procurari posse (si aliàs  
obtinere non possumus) nonnulli medicorum  
credunt. Collegit hæc ex aliis Sachsius in Am-  
pelograph. sect. 6. membr. 1. cap. 2. de vini abusu.  
Sunt autem rana viridis, anguilla in vino suffo-  
cata, lachryma vitis, ova nocturæ, aqua fontis  
Clitorii, uva marina, rad. arbor. amabil. &c.  
quibus ex Franc. Schæchio de salubri potu,  
cap. 10. addo mullum in vino necatum. Albert.  
Magn. lib. 22. de animal. laudat sterces leonis  
in vino. Confert etiam lactera viva, vel tellu-  
do lacultris, vel semina caulium patiente inscio  
in vinum immissa, si de ipso hauriat. Capivacc.  
lib. 3. de Affectib. ventriculi, c. 8. de Siri. Omnia  
frequentioribus experimentis confirmanda.

Quod si verò medicamenta dicta horreat  
æger, vinòque liberaliùs uti cogatur, de quo  
aulici ut plurimum conqueruntur, non inutile  
est corpus ita disponere, ut citissime per alvum  
aut urinam reddat, quod per os involuntariè,  
ingestum est vinum. Per alvum imprimis eva-  
cuat oleum olivarum, quod lentore suo vias lu-  
bricat, non tamen cum Nic. Pisone lib. 1. de Cu-  
rat. morb. cap. 6. statuamus integrum vini do-  
lum hoc præmissò posse sine ebrietatis peri-  
culo hauriri. Domuncus Leoni-lucensis com-  
mendat olivas sale conditas sect. 1. lib. 1. cap. 20.  
Brassica cocta (alii crudam eligunt ad nutum  
Craconis) principio mensæ appositæ, quam vani  
etiam raphano tribuunt, qui brassicam Græcè  
*καρπούρι* & raphanum dici, nostram verò radicu-  
lam *ραφανίδα* nominari ignorant. Lang. Epist. 301.  
Notetur hic interim, vitem etiam vivam bras-  
sicæ odorem fugere. Huc pertinet etiam lac, &  
omnia quæ primas vias lubricantes reddunt,  
item pil. Glassii, quas frequenti in usu biboni  
fuisse compertum habeo, unde etiam pilul. ad  
ebrietatem ipse nominabat. Similem refert  
Kirckemann. disput. de ebriet. Jenæ edita.

Per urinam movent, vel quæ sale salso stimu-  
lant, aut sale volatili amaro abundant, amygdal.  
amar. lupulus, ruta, &c. quatenus hæc cum  
sale vini acido in salsum diureticum abeunt, sul-  
phurque vini narcoticum unâ secum educunt.  
Eadem hæc medicamenta, si paulò fortiora  
sint, quatenus spiritus volatiles. Salfos in cor-  
pore acciunt, quò viscositate sulphuris vincien-  
tis commodius resistere possint, confortando  
eosdem ab ebrietate præservant. Plateri consi-  
lium, qui Observ. lib. 1. se in convivis ebrietatis  
præcavendæ causâ per bihorium abstinuissè vi-

nò prodixit, usque dum ad satietatem com-  
derit, hisce temporibus vix incitandum, ubi ab  
ovo pocula hauriuntur.

Sin autem sulphur vini spiritus jamjam vin-  
ctos in triumpho ducat, necesse est ut vinum, si  
adhuc in stomacho hæret, per vomitum rejicia-  
tur, qui vel irritatione faucium mediante digi-  
to, vel etiam medicamentis, si opus, excitetur.  
Accensum enim in ventriculo vinum, ob sup-  
pressos, aut exhalatos spiritus sulphureos per  
alvum ducere, ob metum colicæ passionis, &c.  
nimis periculosum est. Medicamenta vomitoria  
sint v. g. Mercurius vitæ cum melle mistus, vel  
oleum nucum faucibus cum penna illitum, vel  
sapa vomitoria. Monstrat hanc viam ipsa natu-  
ra sponte sæpius vomitum excitans; unde Lan-  
gius Epist. 30. lib. 1. suadet, ne dormiat æger,  
priusquam evomuerit.

Tum adhibeantur quæ vel sulphur narcoti-  
cum mitigent, ut sunt acida, quorum vis in  
infringenda narcosi, uti ex præparatione opii  
nota est, ita vini eam proprietatem quâ in-  
ebriat, & stupidos attonitoque reddit, retun-  
dit. Unde ebriosos, hac arte sibi prospiciendo,  
ad multos annos perseverare posse notavit Pla-  
ter. Observ. lib. 1. &c. Vel quæ illud à spiritibus  
dilutando, eorundem poros separant, ut sunt  
aquea, vel quod melius acida his juncta. Non  
incommodè ergo adhibetur aqua fontana succo  
citri aut aceto diluta, quam Plater. lib. 1. anti-  
dotorum ebrietatis voc. 1. si quantitate majori  
sumatur, eoque insignem potatorem, jam longò  
tempore in dies ebrium, se ne inde labem con-  
trahat, prænuissè scribit loco citatò. Vel  
acetum ipsum abunde potum, de quo ibidem.  
Vel hoc acidum eburatum. Item decocta al-  
terantia spiritibus mineralium acidulata, & va-  
rii generis iulapia ex citro, cydon. granat. &c.  
parata, non sine fructu adhibentur.

Illa verò quæ confortando spiritus conduce-  
re diximus, cum ex genere volatilium sint,  
adeoque cum acido vini simul ingesta nimium  
effervescendo febres excitare possunt, commo-  
dius temulentis externè pro discutienda som-  
nolentia naribus saltem applicantur, aut lin-  
guæ. Hippocr. lib. 2. de Morbis, aqua copiosè  
calidâ spongiâ imbutâ caput lavat, & naribus  
cepam purgatam admover. Huc pertinet quo-  
que castoreum, & castoreina cum spir. sal. armo-  
niaci juncta, quod licet pingue & oleosum vi-  
deatur, quatenus tamen externè saltem appli-  
catur cum spir. sal. armon. præpollet sal volatile  
cum sale armoniaco exhalans, spiritusque no-  
stros confortans, interne verò ratione sulphu-  
ris caput replet, unde hysterica sæpius de hoc  
conqueruntur; quod ipse in Persona Illustri  
non semel observavi. Vel etiam excussò sopo-  
re, morbis temulentiam concomitantibus, in-  
terne adhibentur v. g. spir. sal. armon. spir. C.  
C. fuligin. &c.

Ad spiritus excitandos non parum quoque  
conferunt frictions extremorum, & partium  
maximè sensibilibus, quales in viris testes, &  
mamillæ in feminis. Huc pertinet observatio  
Henric. ab Heer. qui ebrium per 4. dies pro  
apoplectico curatum, & jamjam trepanò tra-  
ctandum, vellicando mysticis pilos ab ebrieta-  
te excitavit.

Annectenda jam ultimò venit diæta, ubi con-  
venit



veniunt ex cibo & potu acida, v. g. cydonia, citrus, serum lactis acidul. acidulæ naturales & artificiales, tinctur. mart. solar. ut & aquosa, emulsiones. Somnus convenit, modo rite ponatur, ne supinus jaceat. Si tamen nondum consummata ebrietas, spiritus moderatò motu excitentur, v. g. per saltationem, pilæ lusum. Inde etiam affectus animi læti, quatenus spiritus in motum cient, sensim temulentiam tollunt. Quoad excreta attendatur, si vomitus imminuet, aut urinæ excretionem impediatur; ut enim illud cardialgias excitat, ita & subito putrescens urina renibus ac velicæ nocet. *Michael Eschmullerus Dissertation. Academicar. quinta.*

### Observationes.

Interrogatus sæpenumero, cum tot annos ab ægris plurimis frequenter accersitus Principibus, Nobilibus, & aliis Magnatibus, apud quos splendide vivitur, quomodo mihi cavere potuerim, quo minus ab illis ad potandum invitatus, uti moris est, inde noxam nullam contraxerim, & ad hanc grandem & vegetam ætatem salvus pervenire potuerim. Respondi id quod & verum erat, me in convivio, quæ in multas horas protrahuntur, ab initio ad horam unam vel etiam duas à potu abstinere posse, idque eo facilius, quod sitis me non urgeat, donec ad satietatem ferè comederim; tuncque ventriculo cibis referto, etsi quandoq; liberalius bibens, nullam offensam inde me hæcenus sensit, quod cum & alii quidam me suadente, fecissent, se quoque contra ebrietatem egregie fuisse præmunos, mihi sunt falsi. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 41.*

### Ebrietas subito discussa.

Cum Anno 1655. Ottenvillæ degerem, civis quidam ibidem habitans, ebrius noctu domum rediturus in finetum ad genua usque incidit, postmodum in frigidam salientis fontis descendit absterfus tibia & caligas, ne hisce sordibus offenderet uxorem. Hujus aquæ frigore perfulsus statim sensit evanuisse vini narcotium ut planè sobrius domum redierit. Hoc pariter amico meo Argentinæ contigit, qui ebrius in fluvium Breusch. descendens, periculum & frigus sentiens crapulam subito sensit discussam. Hi frigoris sensu ab ebrietate liberati, sic alius terrore, Nam ebrius quidam L. H. per jocum gladio vulneraverat amicum, hic cum ob abortam gravem hæmorrhagiam, & vitæ periculum terretur, planè sobrius factus est. *Salomonis Reislii.*

### Sutura discessio ab Ebrietate præservans.

Anno circiter 1648. exauthorato Græcii Cæsareo milite, quidam magnæ familiæ Colonelus, non solum militandi arte eximius, sed potandi exercitio celeberrimus, postquam Lutenbergici vini sese ingurgitasset copia, calidissimis ejusdem fumis ad caput impetum facientibus, divulsa magno cum cruciatu dura meninge, nunquam quievit, nisi cum cranii contigua extremitates circa suturam coronalem ad pollicis latitudinem dehiscerent, atque

à se invicem separarentur. Verùm omne malum propter aliquod bonum; in posterum poterat bitere sine mentis perturbatione plures mensuras, multosque inebriare, antequam à potu sentiret minimam lesionem. A vaporibus hypochondriacis & hylleris divelli futuras non solum constat ex historia cujusdam montalis ad me missa, verùm etiam ex relatione *Arnaldi Boet. cap. 4.* confirmatum legimus. *D. Antoni de Pozzis.*

### Ebrius secta vena evadit sobrius.

Potabant in caupona militares aliquot homines, & jam iis præ vertigine tectum ambulare videbatur, ita se vino & cerevisiâ generosiori invitaverant, cum Magister equitum, cujus imperio parere necellum erat, ingreditur exanaculum, adjectisque minis cogit equos inscendere, ut mandatum iter persequantur. Illi ebrii, & vix sui compotes, nec inscendere se posse, nec etiam hætere in equis nutanti corpore satis declarant. Tum ille stomachabundus ad Chirurgum suum vertitur, & seca, inquit, temulentis venam, ut subito comitari queant, res enim moram non patitur. Dictum, factum; nullo liberaliter sanguine equites ad sanam mentem redeunt, & Magistrum suum non segnes sequuntur. Hic necesse est, spumantes illos Bacchi & Cereris spiritus, qui cerebrum inquietaverant, magnam partem e secta vena exhalasse, adeoque partes vellicatas rediisse ad officium. Non tamen interposuerim fidei meam succellurum illud quoties vel mensuram omnem excessit temulentia, vel spiritibus excitatissimis secta vena, item stillatitii vinorum, aromatumque liquores solidam invexere ebrietatem, cum tum omnis sanguis in corpore operosius ab ingestis tumultuetur, ideoque una subito janua exire nequeat. Sed cur ij, qui ebrii vulnerantur, non statim ad sobrium mentis statum redeunt; redeunt haud dubie non pauci, quibus largius emanavit cruor, eoque, ut molestiam inde pœne nullam sentiant; qui verò ebrii simul & stomachabundi sauciantur, levamen non ita prompte experiuntur, revocatis in cerebrum stimulis spirituum acrioribus. Sic quibus ebriis caput sesqui plaga vel contunditur, vel aperitur, aliquando expurgiscuntur nunquam, sæpe in lethargum incidunt, adeoque à secta vena ebrietatem nequeunt excutere. Memini inter plures, Ostervaldum, cubicularium cum ebrius ex edita fenestra in saxum areæ precipitatus caput gravissimè læsisset, adeoque in lectum deportaretur, neque ex cruore per vulnus profuso, neque ex sanguinis e vena brachii missione, quam statim imperaveram, ad sanam mentem rediisse toto biduo, turbatis nimirum ratiocinandi instrumentis, quanquam postea plenè convaluerit. Et Magister textorum in paedotrophio Christiano-Harnienfi, postquam ebrius e scalis in caput provolutus esset, & simul in somnum funestum prolapsus, nunquam evigilavit, licet ad triduum pulsu & anhelitu sic satis constantis vitæ adhuc proderet argumentum, & plusquam necesse esset ex aperto capitis vulnere excluderetur. *Ol. Berri-chii.*



*Lolii perniciosi effectus.*

Tiguri domestici præclari cujusdam viri, pro jentaculo pulterem avenaceam, (alias ipsis insolitam) comedentes, quam Plinius *H. N. l. 18. cap. 17.* Germanorum cibum esse ait, variis symptomatibus mox afflicti fuere, omnes enim ex his cardialgia, vertigine & capitis dolore correpti, quidam insuper temulenti & somnolenti redditi, convulsionibus etiam passi sunt, imprimis ancilla, quæ se nimium eadem ingurgitarat; alius denique vomitus supervenit, qui hinc à prædictis symptomatibus statim liberati sunt. Postquam autem suspicio inter ipsos oborta fuisset, pulterem eam intoxicatam fuisse, nec ad se accessit jubent; cum vero ex eis percepissem quid pro jentaculo assumpserint, facile ex visis symptomatibus colligere licuit, farinam seminis lolii, live *Ärz*, Germ. *Trunnet*, pulvi huic admixtam fuisse, quandoquidem rustici nostri semen lolii haud pari studio ab avena separent, atque circa frumentum facere solent, cum tamen & juxta Ovidium *Fastorum l. 1.* summa diligentia eradicandum esset.

*Ut careant lolia oculos vitiantibus agri,*

*Nec sterilis culta surgas avena solo:*

& eodem tempore Textoris cujusdam nostratis familia, ex esu talis pulvis, in similia symptomata incurrisse, notum mihi fuerit: proin vomitu apud illos moto, qui nondum vomuerant, adhibitisque mixturis alexipharmacis, brevi tempore sibi redditi, & in integrum restituti sunt. In mentem hoc mihi tunc revocarat lepidam historiam, quam prope Tigurum Ann. 1342. contigisse, apud *F. Joannem, Vioduvarum*, Minoritam, & *Agnes* legi, cujus ævo *1342* *Ms. C.* in Bibliotheca Tigurinorum Civica alteratur, quam hunc in modum in sua *Historia* receniet: *In villa quadam apud Thuregum, equus quidam tantum de lolio comedit, quod à Domino suo putatus mortuus, extra villam veclus fuit, & excoctus, qui tandem post somni consummationem evigilans, domum rediit, & domino & aliis hominibus cum cernentibus stuporem iniecit.*

*Scholion.* In Lolio vim inebriandi, somnum movendi & mentem tentandi cum habeant cognitam, ab avaris Zythopæis cervisis illud aliaque similia incoqui solent, observante id etiam Martino Schorchio *cap. 19. de cervis.* qui à Græcis quoddam *αἶμα* vocetur, *αἶμα* *αἶμα*, sursum extolli, *cap. 9.* adnotat, cum noxia lolii aura cerebrum petat, non temulentiam modo, sed & vertigines inducens. Hinc pistorum cum in publica annonæ penuria lolium tritico commiscuissent, multos qui eo vescabantur, statim capite dolere incepisse &c. *Galeus lib. 1. de aliment. facult. cap. 37.* refert, & panem ex eo confectum villico suo, una cum ipsius familia, talem temulentiam ac veloci amentiam, qualem in vita nunquam sentisset, concitasse testatur Camerarius in *Hor. succis cent. 3. cap. 93.* inde etiam Zizaniam hanc in Italia Inbriacam i. e. herbam inebriantem vocari. Jenz ex loliacei panis esu in nyctalopiam homines incidisse, qui solo hepatis bubuli esu restituti, monet in *histor. humor. gener. cap. 1.* *Joh. Theod. Schenckius*; quam nyctalopix curam etiam *Dec. 1. Ephem. nostr. 3. observ. 133.* confirmatam dedit, jamque olim *Hippocrates lib. de visu*, morbum hunc patienti

jetinoris bubuli crudi, melle imbuti, frallum quasi maximum poterit, unum aut duo devoranda exhibere præcipit. Qua ratione id præstare queat sagacioribus discutiendum relinquo, in Lolio vero sulphur aliquod narcoticum, spiritibus animalibus infellum; latere, cum symptomata usum ejus insequentia, tum & remedium, quod præsentaneum esse in *J. C. Baricelli* hortulo geniali legitur, ostendunt. *D. J. Jacob. Wagneri.*

*Stupor mortali ab exhalatione musti recentis in cella vinaria effervescentia.*

Vinitor quidam, Anno 1613. tempore vindemiarum, cum in cella vinaria dolia musto implevisset, illudque efferveret, vaporeque uti solet, æcri & vehementi cavam implevisset, volens inspicere sua dolia, cum in cellam veniret, vaporem hunc hauriens, attonitus concidit & statim expiravit.

Hoc idem anno præcedenti in eadem cava, ex simili vini effervescentia, prædicti filio accidit, ut cum aliis eum sequentibus in cellam descenderet, omnes corruerent stupidi penitus, è quibus, cum e cava exportarentur, quo statim expirarunt, tertius agre evalit. *Platenus lib. 1. Observationum.* recensente *Joh. Rudolpho Camerario Memorabil. Medic. Cent. 24.*

*Quomodo musti exhalationibus penè suffocati, in vitam revocari debeant.*

Si musti vaporibus penè suffocati, Medico curandi offerantur, danda opera ut quamprimum vapores illi discutiantur. Itaque agri statim in aerem liberum deducendi vel deportandi sunt, & aqua vitæ aliqua præstans, vel populetica, quæ vapores illos discutere potest, intillanda, cui aliquid theriacæ addi potest. Hinc vomitorium cum oxymelte exhibendum, & sternutatorium naribus intillandum, atque oleum destillatum, vel balsamus rutæ, salviæ, vel simile quid naribus inungendum. Palatum fricetur theriacæ & mithridatio, quibus non inutiliter extractum castorei liquidum permisceri potest. Neque omittendæ revulsiones per clysteres, frictions & similia. *Sennert. Præcl. lib. 1. parte 1.* recensente ibidem eodem Camerario.

*Historia de inducto vini fastidio.*

Filio ebrioso & sæpius ex ebrietate variis periculis exposito, dum consulere cogito, ab honestis viris hoc remedium accepi; ranam viridem, ex his quæ in fontibus salientibus reperiuntur, vivam in vini mensura, (duarum librarum fortè) suffocatam, cum in vino vim relinquare, ut qui vel haustum unum inde bibisset, per omnem deinceps vitam abstemius degeret. Ego sollicitus, & metuens ne quid aliud etiam inde detrimenti sequeretur, cum filio (recens etiam ex ebrietate periclitato) institutum meum consero, acquiescenti propinquo vinum (in quo tamen palustris rana, cum circa fontium scaturigines nulla reperiretur, suffocata fuerat) duobus haustibus, uno vesperti, altero mane. Volui autem ipse prægustare vinum, & experiri saporem, os tantum colluendo, ita ut nihil inde deglutirem: qui licet non displiceret, postea tamen



tamen ad duos ferme menses vinum fastidivi. Uxor ejus quæ odorem tantum vasis vinarii illius ollecerat, ab eo tempore hæcenus (nescio quantum temporis) vinum non bibit, etiam enim interim, experiundi gratia, non semel gustaverit, inde tamen stomachi dolore non mediocri percepto abstinet. Uterum quidem non fert, ne quis eam ob causam vinum ei fastidio esse suspicetur. At in hilio non ultra 14. dies fastidium hoc duravit, citius tamen a vini potu, caput ei nunc tentatur. Experiemur alias idem remedium cum rana viridi e fonte saliente, & rei eventum ad te scribemus. *Amicus quidam ad Gesnerum de quo Aquatil. p. 933.*

Ebriosi si sibi temperare nequeant, ut vinum penitus fastidiant, suffocata in vigo anguilla, vel rana, vel mullo pisce, vel etiam putrefacto in eo rubellione pisce, vel uva marina; eoque vino postea propinato, effici id posse, aliqui prodiderunt. *Platerus in Praxi Medica, recensente eodem Camerario.*

Juvenis latice Lyxò plenè perfusus, nicotianæ fistulam sub camino sedens ore gerit. Is inter stertendum caput inclinat, & fistulæ crassius extremum ad parietem allidit; gracilius verò (totius auricularis digiti longitudine) confractum sibi in fauces adigit. Mox anhelosa atque sonora arctius urget dyspnæa suffocans.

Chirurgus ore deducto fistulæ supremum intruere nequit, ut pote jam contectum tumefactis uvula & amygdalis. Juvenem idcirco citissimè morti confestim adjudicat. Accitus ego fistulæ transversum apicem intrusum sensi musculos inter finitros, styloglossum atque stylo ceratohyoideum, & acie scalpelli ad fistulam adactâ, sicut ad calculum adigitur à *αυτὸς*, nullo negotio fistulam eduxi, & ab imminente suffocatione miserum ebrium liberavi. Nostris enim *ἐξαιμῶν*, & V. S. atque dixtâ, citò, *Dei nutu*, convaluit; sed periculi tanti nescius omnino, nisi ebrietate post V. S. disculsâ. *E Clarissimi Viri Caroli Drelincourtii Dictata, communicante Excellentiss. Domino Guyot M. D.*

#### ECCHYMONA.

Vid.

#### CORNEÆ MORBI.

#### ECSTASIS

Vid.

#### CATALEPSIS.

#### ECTROPIVM

Vid.

#### PALPEBRARVM VITIA.

### ELEPHANTIASIS.

**E**lephantia totius substantiæ morbus est, contagiosus, occultus, venenatus, serè elephantis corio ac tergori cutem haud absimilem reddens, unde & nomen accepit. Habet igitur corporis elephantici forma fere elephantis naturæ similia multa. Ut elephas nulli animali similis est, sic neque hic morbus, alii cuiquam. Ille omnia animalia magnitudine & crassitie superat: hic morbus non solum genere maximus est, sed laborantes etiam efficit seipsum

maiores & crassiores, totumque corpus in tumorem attollit. Qua ratione nonnulli hunc definiunt tumorem præter naturam, qui totum corpus in speciem elephantis immutat: non quod tumor unus in corpore sit, sed multiplex & inæqualis, & per universum corpus huc illuc dispersus, intus à visceribus factio initio, & progressionem usque ad extimam cutem continuata. Summa corporis elephantici pars crebras maculas, crebrosque tumores, & tubercula, verrucis persimilia habet, quorum rubor in lividum aut atrum colorem paulatim convertitur. Et omnes quidem elephantis maculis multis leviter extuberantibus aspersi notatique sunt, & livido cinereoque colore toto corpore obicurantur, nocti & morti pene similes. Ad hæc summa elephantici cutis inæqualiter crassa & dura, quasi squamis quibusdam exasperatur, ac interdum finditur, rimisque dehiscit: & elephas quidem corium habet asperum, crassissimum, duris extuberantibus inæquale, & scissuris multis, semitis ac sulcis prælongis intersecum atque maratum. Elephantis capilli & supercilia & barbae pili vel excidunt, vel in lanuginem extenuantur rarissimam. Et elephas rarissimam lanuginem, non pilos, aut setas toto corpore gerit, præter animalium morem. Denique frigoris impatientissimus est elephantia consuetus, & elephantis quidem hyeme, aut regione frigida contremiscunt, horrent, & intermoriuntur, nisi tota hyeme calido in loco contineantur, & vino generoso reficiantur. Quæ causa est, ut in frigidis regionibus, nec nascantur, nec aliunde advecti diu vivere possint. Tument digiti in pedibus, ac pedes pene similes evadunt elephantum pedibus: unde nonnulli vitium elephantiasim appellatum volunt. Archigenes tamen a magnitudine morbi, sicut ante proposui.

Sunt & qui morbum hunc leonem aut leontiasim appellent, à buccis & superciliis, in his non minus quam in leone protuberantibus, ac flexili mole præditis, seu ob tumidæ frontis dilatationem ad similitudinem rugosæ pellis superciliorum leonis. Aut denique quoddam non minus horrendum & formidabilem, quam leonis aspectum præ se ferant elephantiasim laborantes.

Satyriasis etiam nonnullis appellatur, quod iisdem malæ cum rubore attollantur, & musculis maxillaribus veluti convulsionem patientibus, mentum ipsum efficta quadam ad satyrorum formam similitudine dilatetur, aut ob inexplabilem impudentemque coeundi, quæ hi continenter jactantur libidinem. Hac enim fabulosa Poetæ satyros exardescere memoriæ prodiderunt. Habent igitur faciem satyris persimilem, & concubitu vehementer appetunt atque concupiscunt. Dicitur & herculeus, quoniam eo nullus major est, neque contumacior: & magnus quidem est potestate morbus, quod ad mortem inferendam potentissimus sit atque omnium longe efficacissimus. Nempe à mortis causa ducit originem, quæ primigenij est humidi ab alieno calore depopulatio præpropera, quam terrena omnium partium siccitas consequitur.

Contagiosus vero morbus existit elephas, idque magis quam lues venerea. Non enim, ut illa solo impuro vel concubitu, vel attactu, sed



sed etiam inquinati aeris inspiratione contrahi vulgo fertur. Inquinatur autem aer quem inspirando trahimus, ulcerum virulentorum fetore, & corrupta spiritus exhalatione. Quod si aliquando neque ex parentu in semine, neque ex alterius inquinati contagione, sed ex proprio intimoque vitio generatur, non idcirco contagiorum morborum numero expungenda est elephantiasis, non enim contagiosus morbus, ex solo ortu primo, sed ex invadendi serpendique modo & ratione spectatur.

Occultus autem morbus dicitur, quod diu intus delitescat, priusquam se prodatur, nec ullam insignem sui conjecturam notumve ipsius principium exhibeat, ut qui à manifesta humorum intemperie, aut putredine oriuntur, & quod neque dolor, neque febris, ullave alia aperta atque inusitata affectio ante hominem incessat: neque in corporis summis partibus repræsentetur per initia, ut protinus eum videre quis possit, & venienti occurrere ac resistere. In visceribus namque obditi fomes succenditur, ibique sævit, dum interiorum victor, in superficie tandem exardeat. Non igitur ut rectè scripsit Archigenes tum gigni morbum hunc existimandum est, quum ad cutem tumores prorumpunt, sed potius perici. Prima enim mali labes in jecore & liene residet, atque inde vitium serpit, pares in internis visceribus tumores excitans, qui in externis postea apparent.

Venenatus quoque censetur elephas. Non enim terrenus & melancholicus humor, toto etiam corpore exuperans, vel bilis flava, vel ex iis genita atra, prius hunc infligit, quam venenatam quandam malignitatem ac perniciem asceverit, quæ tum universi corporis humores, tum partium solidarum substantiam polluat & labefactet. Hujus rei argumenta sunt, melancholia morbus & mania, in quibus atra bilis toto corpore diu redundare potest sine elephantiasi, & febris quartana, tum intermittens, tum continua, in qua melancholicum humorem putrescere fatemur nullo elephantia periculo.

Elephantia causa alia externæ & evidentes, alia antecedentes, alia proximæ continentæque dicuntur. In externis numerantur, diuturni & exurentes solis ardores, longa & perperam suscepta inedia, victus tenuis siccans & exalfaciens, decocti guajacini usus diuturnus & intempestivus, vini generosioris & meracioris potus: esculenta ac poculenta, quæcunque vel bilem flavam exurunt & extorquent, aut crassum & melancholicum succum procreant, ut bubula, cervina, asininave caro, & reliqua ejus classis omnia, quæ alibi particulatim enumerata sunt. Deinde salsamenta omnia & pipere aut alio aromate condita. Postremo legumina plurima, ut lentes, fabæ. Hæc enim omnia crassi pravi que sunt succi.

Secundum locum tenet alterius inquinati contagio, quæ sive concubitu, sive accubitu, sive assidua vitæ consuetudine comparetur, idcirco elephantiam infligit, quod ex elephantico corpore pernicioia quædam qualitas pariter cum humore, vapore aut spiritu transferatur in integrum corpus, cujus non solum humores, sed partes etiam omnes sensim pervadat atque contaminet. In evidentibus primum ac præcipuum locum sibi vendicat vitiosa alterius aut utriusque

parentis elephantia laborantis constitutio. Nam si forte parentum alter quum genuit elephantia tenebatur, foetus profecto ei nascetur elephanticus, tanta est divinæ procreatricis facultatis energia, ut in semine intemperato ac profluo impuro consistens, corporis partes vel ex impura materia tingat & efformet. Si nondum elephantia parens quum genuit, tenebatur, sed in eam duntaxat propensus erat atque proclivis, filius eadem ætate qua parens, elephantia præhenderetur, eritque elephantia hæreditarius morbus elephantico parentum semine genitus. Fieri tamen posse arbitror, ut quemadmodum Aetius scriptum reliquit, non omnino contagiosæ sint successiones hujus affectionis in omnibus, quum videlicet alterius parentis integra valetudine præditi semen in conceptione vincit.

Mulierem quæ instantibus aut profluentibus mensibus conceperit, foetum edere in elephantiam proclivem Avicennas literis prodidit, non admodum verisimili opinione. Multis namque orbis tractibus nunquam grassari deprehensa est elephantia, in quibus tamen sæpe profluentibus mensibus mulieres concipere verisimile est. Et in hac nostra Gallia, quæ parum mensibus repurgantur, vix alio quam ipsius purgationis tempore concipiunt, citra ullam in elephantiam propensionem. Secundo loco sunt mensium & hæmorrhoidum diuturnarum suppressio, aut varicum, in quas natura sese exonerare consueverat, sectio, vel ustio. Deinde jecoris calida & sicca intemperies bilem flavam cumulans, quæ diu cohibita in atram facile degenerat, & venenatam perniciem indispiscitur, quam toti impartitur, ac communicat. Animi moerores, & perturbationes, quæ melancholicum & terrenum humorem adaugere possunt. Frequens iracundia, quæ bilem flavam in atram ustione commutat.

Antecedentes causa putantur bilis flava, sanguis, melancholicus humor, & pituita salsa. Hi enim humores quum supra modum torrentur, in atram bilem degenerant, quæ diu coercita sensim ac tempore venenata labe inticitur. Nam venenum in nobis sponte gigni posse, Pelopis auctoritate confirmat Galenus, & experientia docet in epilepsia, suffocatione uterina, aliisque ejus classis affectibus.

Proxima continensque elephantia causa terrenus & melancholicus est humor, virus perniciemque adeptus, quod pustula maxime demonstrant, duræ, siccae, lividae, purpureæ, inæqualis cutis durities ex rubro ingrescens. Hic autem humor malignam ac venenatam qualitatem ustione indispiscitur, quam tum visceribus, tum alijs partibus omnibus sensim impertitur, ac communicat. Illa vero semel inquinata, non nisi terrenum quendam & melancholicum succum, vel ex purissimis alimentis postea profuerunt, ejusdem veneni participem: quo partes deinceps imbutæ ac enutritæ, tempore similem nanciscuntur naturam, sitque elephantia totius substantia morbus, & universi corporis velut cancer quidam. Totum igitur corpus in elephantia ita afficitur, ut ipsa quoque ossa vitari dicantur, quod ipsa etiam impuro fruuntur succo. Verum prima ac præcipua mali labes in jecore residet, è quo postea cum sanguine in totum spargi propagarique solet.



Quæ sponte proprioque vitio nulla alterius inquinati contagione invadit elephantia viros, quam feminas lapius & crudelius exercet, atque inter illos, tutum frequentius, qui crassum, tenuem & melancholicum sanguinem, aut salubrem pituitam congeriunt. Ac promde qui victu ad nihilmodi procreandos humores idoneo utuntur, læpius, quam qui contrario.

Quamplurimos enim in Alexandria elephantia comparari propter victus rationem, & regionis terrorem, ex veterum monumentis accepimus. Illic enim elixata farina, & lentibus, & cochleis, & multis aliamentis, & nonnulli ex ipsis, aluminis carnibus & aliis quibusdam cibis, qui crassum & melancholicum succum generant, vescuntur. At in Germania & Misia rarissima hæc affectio videtur. Et apud Scythas lætis poratores nunquam fere apparuit. Deinde qui vel otio torpescunt, vel cibo & potu nimio sese ingurgitant, vel media, vel violenta exercitatione, quæ sæpe humores adurit, vel cibos in ventriculo corrumpit, præsertim in calida & sicca regione, uruntur, non raro in elephantiasim incidunt.

Nationum igitur alix familiarem agnoscunt morbum hunc, ut Egyptus & Judæa. Alix vix novere, ut Germania & Scythia & olim Italia. Alix inter utrasque medix. In universum ætiosus regionibus, quam temperatis, & frigidis, frequentior. Quinquam sunt qui extreme frigidis ac gelidis familiarem esse contendunt, quod prohibita transpiratione, coercitoque calore humores exurantur.

Quod ad ætates pertinet, quum nec pueri, nec adolescentes, humorum quæ dixi vitis pateant, elephantia vix eos, sponte sine seminis labe invadit, sed ætate florentes, vel etiam proveciores. Vix etiam ullus eunuchus hoc morbo tentatur. Quæ ratione nonnullos legimus sibi testes, executisse, neca ignominie labe aspergerentur. Sed & qui elephantico parente progeniti sunt, raro in elephantiasim ante pubertatem incurrunt, si prudenter se gerant atque contineant. Eadem de mulieribus, quæ singulis mensibus naturæ lege purgantur: deque viris, quibus illatis temporibus hæmorrhoides fluunt, vel insignes varices, in cubus sanguinem profundunt, sententia ferenda.

Antequam in externis corporis partibus certæ elephantix notæ se prodant, ingens corporis segnitie, & ignavia motusque difficultas, exercet, spiratio tarda & difficilis evadit, alvus sicca & adstricta est, urina jumentorum lotis similis, albæ, crassæ & turbidæ sunt. Expiratio gravis & foetida, ructus continui, ipsi etiam agroti non parum molesti, assidua cruditas. Appetitus nec integer est, nec omnino prostratus, digestio facilis, tanquam in suum ipsius alimentum morbo raptim attrahente, propterea inferioris ventris siccitate laborant. Impetus in venerem intensus, in somnum propensio. Insomnia metus & mœstitie plena, velut & animi mores, qui subdoli quoque & vasti existunt. Virij causa foras emigrante, maloque ad cutem progrediente, malæ crassiores fiunt, & pro florido ac vivido colore, livido rubore tinguntur, & tumores in facie extuberant. Plerumque enim in facie hæc lues erumpens, tanquam ignis de specula procul conspicuus effulget.

Hinc humore multo perfusa cutis lentim crassior, durior, asperior, decoloratiorque redoluit, & crebras maculas, crebrosque tumores habet: & alius quidem nigrescit aut livescit, quibus melancholicus succus, alius flavescit, quibus bilis flava, alius albicat, quibus pituita falsa, vel in atram bilem degeneravit, vel atræ bili permixta est, alius ex rubro livescit, quibus crassus sanguis ulatione nigrescit, atque in atram bilem depravatur: unde quatuor elephantix differentie constitui possunt. Alia enim subrubicunda dicitur, quæ a sanguine melancholico & limoso profecta est, & mitior esse solet. Alia alba a melancholico humore pituita falsa admixta, vel potius a pituita falsa nitida & acra, & hæc minus deturpari ac dehonellari ægri solent.

Alia nigra ex vera atra bile, quæ omnium pessima & foetissima exilit: in hac enim corpus universum tandem ulceribus scædet, & extrema putredine consumpta plerumque nullo sensu decidunt. Alia subflava, quæ a bile flava præstata, & in atram degenerante fit. Hæc per initia quidem mitis, tandem fervida & pessima evadit. Primum autem in facie, aut in manibus, aut in pedibus elephantix signa comparent, natura quoad licet vitia longissime a corde, & hepate propellente in corporis extrema, minime tamen expurgante, ob humioris crassitiem & cutis densitatem: deinde vero & in reliquo corpore pullulant. Eadem de causa in extremis corporis partibus sensus paulatim hebescent, tandem plane torpescit, inestque frigus perpetuum, maxime verò in pedibus, & tibiis calore in præcordiis coercito, ubi noxæ materix scaturigo & focus latitat. Motus verò semper per initia integer, in quibusdam etiam ad obitum usque servatur: in aliis tandem depravatur vel prorsus aboletur: maxime verò in pedibus & tibiis. At frigoris & stuporis sensus toto morbi decursu fatigat, sed magis eo ingravescent. Tum temporis depravatur in omnibus partibus concoctiones & assimilationes fiunt, quæ ratione tubercula plurima verrucarum instar, alia juxta alia succrescunt, & tumores alij juxta alios exurgunt, melancholici humoris exuperantiam naturæ foras extrudente, quæ in cute concrevit. Primum quidem, ut supra positum est, in fronte & reliqua facie, quoniam exhalatio omnis sursum facillime fertur, præsertim ad faciem, in qua venulæ multæ obliterantur. Deinde etiam in manibus, & reliquo corpore. Pedes, suræ, manus & facies, elephantice facile intumescunt, interdum quoque & reliquum corpus, quod intolerabilis gravitatis sensu semper premitur & torpescit. Labra lentim adeo crassescunt ac prominent, ut invertantur, eorum parte inferiore livescente. Nares resimæ evadunt, & extrinsecus atris tuberculis scæbræ: intus verò alarum crassitie obstruuntur, & rimis disceptæ, atque ferè intus ulceratæ crustulas nigras atque cruentas excutunt. Quibus ex causis olfactus ferè concidit. Venæ temporum distentæ sunt, & quæ sub lingua conspicuæ apparent, livido, nigro, & sæculento sanguine turgent. Lingua vero ipsa grandinosis varis extuberat, velut & palatū verrucosis tuberculis. Aures extenuantur rubentque admixto nigrore, ulcera in earum basi sunt, e quibus sanies defluit, ac prurunt, aut obstructæ sunt & elephantice, ut solito grandiores esse videantur. Oculi caliginosi, in orbem coguntur,



tur, alio atque alio colore notantur, ple-  
runque tamen candidum ex rubro flavescit,  
miraque crassitie quasi ungue obtegitur. Su-  
percilia pilis nudantur, prominent, crassa,  
prædura, ac fere callola evadunt, deorsum  
versus pondere vergunt. Color lividus aut  
ater est. Episcenium vehementer contrahitur,  
dum tandem oculos contegat, ut irascentibus  
leonibus accidit, unde & leonina hæc affectio  
forte vocitata est. Pili in toto corpore præmo-  
runtur, dein sensim desuunt: sed primum super-  
cilia, & palpebræ, & mentum & pubes glabres-  
cunt. Dein rara in capite evadit casaries, in-  
tempestivi cani, & calvitium subito ingruunt.  
Horrenda denique evadit partium omnium de-  
formitas. Nam si qui pauci pili remanent, hi ma-  
gis dedecent, quam qui desluxerunt. Torus  
corporis habitus sic commutatur, ut multi ala-  
rum iustar, prominentes scapulas habeant, &  
mutato faciei colore, characteri & mole auribus  
reotitis satyros referant. Pedum plantæ & cal-  
canea rimis profundis & asperis intersecta sunt,  
manuum pedumque digiti siccitate dehiscunt,  
unguesque funduntur ac dilacerantur. Totius  
corporis cutis exarescit, atque fœda eaque  
sicca scabie exasperatur: sapius cum pruritu,  
nonnunquam sine hoc. Malo ingravescente, ali-  
mento quidem privatur corpus, ipsaque mus-  
culorum caro absorbetur, sentinque liquefit,  
sed crassescens tamen cutis rugis asperis magis  
ac magis exaratur. Ad hæc quæ primum stupi-  
da cutis erat, sensu omnino destituitur, ma-  
nente motu, ut ne infixa quidem acicula dolo-  
rem moveat, neque asperia fervens aqua exu-  
rat. Observavi tamen in quibusdam pedum  
motum cum sensu perisse, & in quodam alte-  
rius brachii: qui tamen restitui sunt. In om-  
nibus spontaneæ insunt lassitudines, & singula  
membra quantumvis exigua, multata & inco-  
lerabili gravitate premuntur. Quinetiam corpus  
omnia gravatum fert, non illuvie delectatur, non  
cibo, non jejuniis, non motu, non quiete. Ab om-  
nibus enim morbus alienus est. Somnus exiguus  
& brevis est: vigilia peior, mala sua cogitans,  
vox raucescit, crassifecta, exasperataque gran-  
dinosis variis arteria & gutture. Neque enim,  
ut recte scripsit Areteus, inopinabile est omne  
corpus talibus scatere tuberculis, quandoqui-  
dem & suillæ carnes, elephantiaæ grandinis plē-  
næ sunt. Spiratio difficilior multo quam dudum  
evadit, & nonnulli circa somnum sic afficiuntur,  
ut præfocari, strangulatique videantur. Spiritus  
totiusque corporis exhalatio fœtore molesta  
est. Pulsus exiguus, imbecillus, creber, tardus.  
Tumores malarum, menti, digitorum, aliarum-  
que partium, in sordida & virulenta, eaque fœ-  
da ulcera degenerant, gravisque putredo om-  
nia contaminat, dum aliis nasus, aliis manuum  
aut pedum digiti: nonnullis etiam pedes ac to-  
tæ manus de corpore excitant. Neque enim  
elephantia prius perimit a turpi vita, sævisque  
cruciatibus liberans, quam membratim dila-  
ceratus homo sit, sed longæva est, quemadmo-  
dum & elephas animal. Alter atque aliter in hisco  
habet appetentia, non obtusa, sed gustatus atque  
qualitatis expers est, nullaque edendi aut bi-  
bendi delectatio. Angusto pusilloque animo  
fiunt, neque præ vitæ amore vitam relinquere &  
contemnere possunt, neque calamitatem gene-

roso altoque animo perferre, verum seiplos con-  
demnantes sese occultant, & hominum notorum  
confortia, conspectusque lugiunt. Non tamen  
omnia in omnibus, sed alia in aliis symptomata  
deprehenduntur, ut est peculiaris cuiusque cor-  
poris natura, vitæ lex, & grassantis veneni per-  
niciies. Et quo graviora insunt, eo sævior elephas  
judicandus est. De elephantia signis plus satis,  
nam quæ ex urinis ac sanguine petuntur, incer-  
ta sunt omnia atque fallacia.

Quum morbis quo dissolvantur, vel paria, vel  
majora esse remedia oporteat (quod enim super  
infirmiusque morbo est, hunc quidem minuere,  
eaque ratione juvare, sed nec prorsus tollere,  
nec profligare potest) nemini mirum videri de-  
bet, si nulla remedia a veteribus excogitari po-  
tuerunt, quæ elephantem ingens malum expu-  
gnare, ac funditus excindere queant. Neque  
enim in parte una, aut viscere uno inhaerescit,  
neque aut intus duntaxat labes occultitur, aut  
extra tantum prorumpit. neque humores solum,  
mollesque corporis partes leviter afficit, sed &  
in penetralibus totum hominem occupat, &  
extrinsecus totum amplectitur, in solidas quas-  
que partes, atque in ossa ipsa ita sese intinuans ac  
penetrans, ut propriam illarum substantiam  
prorsus immutet. Triste profecto & visu terribi-  
le spectaculum. Quod ubi ad summum maligni-  
tatis suæ fastigium conscendit, tum stabilem ac  
firmam in ipsis visceribus & solidis partibus se-  
dem collocat, ut omnino dimoveri, divelli-  
que non possit. Hic igitur perniciem differre non  
auterit, vitam in longius tempus protrahere,  
& morbi sordiditatem emendare, non funditus  
ejus causam excindere licet.

At si ad novam & adhuc orientem elephan-  
tiam curandam, idonea victus ratio, & medi-  
camenta quæ mox referam, conferantur, salutis  
spes tandem affulgebit, præsertim si ex improba  
victus ratione, vel ex alterius inquinati conta-  
gione, non ex parentum semine malum origi-  
nem habet. Nam quum ex elephantico semine  
vitium contractum est, etiam si adhuc oriatur,  
de ægri tamen salute spes omnis abjicienda, no-  
stris tamen remediis morbus coerceri reprimi-  
que potest. Sunt autem ex iis, qui vitium ex pra-  
va victus ratione, vel inquinati alterius conta-  
gione, non ita pridem contraxerunt curatu fa-  
ciliores, quibus à bile flava, aut à pituita falsa,  
aut à crasso sanguine superaffatis, proxima ma-  
li causa orta est. Quæ à bile originem trahit, sæ-  
vioribus quidem symptomatis urget, & neglecta  
citius premit, quam quæ à melancholico succo  
in atram bilem converso proficiscitur: ideoque  
majorem curandi rationem postulat, sed faci-  
lius remediis cedit & obsequitur. Quibus testes  
vel natura defunt, vel execti sunt, ij vix unquam  
elephantia tentantur, si Archigeni credamus. Sed  
nec jam prehensis aliunde præsentius remedium,  
quam ex testium excisione affulget. Quotquot  
enim execti sunt, tanti mali discrimen effu-  
giunt, si modo temperatam eamque frigidam &  
humidam victus rationem in posterum tenuerint:  
hancque veterum complures, ut omnium  
tutissimam curandi rationem sequutos esse com-  
perio. Legibus cautum est ne cum sauis versen-  
tur elephantiaci: nec injuria, mea quidem senten-  
tia. Licet enim ex iis, qui elephantia laboran-  
tibus perpetuo assiderent, neminem hæcenus so-



la inspiratione eodem vitio contaminatum videre potuerim: observavi tamen halitus graveolentia, ulcerum fœtore, & terra totius corporis expiratione illorum bonam constitutionem tandem labefactari.

Quamquam igitur elephantia perinde atque luis veneret virus humore quodam non spiritu, pro vehiculo utitur, sine quo vix consistere, aut in alios commigrare, & parem affectum parere queat: ideoque vel concubitu, vel accubitu, vel osculo, vel alio impuro attrectatu opus est, ut contagionis seminaria celeriter in alios commigrent: quoniam tamen inspiratione sic aerem inficiunt elephantici, ut assidentibus omnibus gravis & morbidus sit, recte eos à reliquorum societate leges sejunxerunt.

Qui elephantiam curare aggreditur, humores præter naturam in corpore collectos primum educere debet, deinde contractam intemperiem & terrenam siccitatem veneni participem emendare. Quæ dum sunt & in corpore jam genita tubera ferro excindenda, aut caustico medicamento exedenda, & ulcera illinc relictæ, vel sponte nata, tergendæ, implendæ, atque cicatrice obducendæ, & alia symptomata corrigendæ sunt.

Remedia ergo in genere sunt, initio quidem, incremento, & quando humor effervescent, refrigerans & humectans vitæ lex: ubi vero desebuerit, & calor elanguescere cœperit, temperata, vel paulo calidior. Purgatio frequens, venæ sectio ex intervallis repetita. Balneum aquæ dulcis, litus ex hydrargyro, aut certe catapotia ex eo ipso & auro, alia alexipharmaca varia. Cornu seu cucurbitæ. Caustica & cutem detergentia, atque faciem illustrantia: quorum omnium usum particulatim expediam a victus ratione orsus.

Incipiente morbo victus ratio imperanda, quæ refrigerandi & humectandi facultatem habeat. Calida enim & sicca est morbi causa, quæ per contraria profligari postulat: plus tamen aut minus, pro humoris morbum committentis, & corporum differentia. Convenient igitur frequentes sorbitiones ex pullis gallinaceis, & vitulina carne, quibus sub finem coctionis, acida & refrigerantia olera adjiciantur, oxalis, atriplex, portulaca, viola, buglossum, borrago, lactuca, scariola, plantago, uva acerba, oxyacantha, aliaque ejusdem classis, quæ atræ bilis calorem & siccitatem temperant, malignitatemque infirmitatis. Ebur, & cornu cervinum siccitate quidem aliquantum obesse videri possunt, sed veneni perniciem oppugnant & infringunt: maxime vero cervinum cornu, ideoque & sorbitionibus incoquitur, & cibis utiliter permiscetur, qui illius siccitatem corrigant. Carnes boni succi & coctæ faciles, elixæ optimæ sunt, si suprapositis herbis condiantur. Conceduntur & assæ, si cum omphacio aut alio condimento acidulo earum fervor retundatur. In id primas tenent mali punici, aut citrii, vel medici succi. Sequitur oxalidis succus, omphacium & acetum: quibus aqua rosæ aliquando commode adjicitur. Item ova sorbilia & pisces euchymini. Cremor hordei amygdalino lacte exceptus, & cum saccharo rosaceo coctus, omne alimenti genus anteit profecto, seu bonitas succi, seu coctionis facilitas, seu calida & sicca, ultæque bilis contempe-

ratio quæritur. De lacte asinino eadem fere sententia est. Vacuationibus igitur necessariis præparato corpore, invicem modo hordeatum, modo lac asinum, pro jentaculo sit, præsertim per æstatis ardores, & in elephante quem atræ bilis à flava genita procreavit, aut certe alternis mensibus usurpentur. Quinetiam qui ex hordeo panis conficitur, utilis est, terget, refrigerat, alvum liberam efficit, & alimentum corpori præstat non contemnendum.

Vitentur salsamenta omnia, & aromatis condita, aliaque omnia potulenta & esculenta, quæ bile ferventem sanguinem procreant, veluti cepe, allium, porrum, sinapi: deinde bubulæ, cervinæ, asinina, suillæ, leporinæ carnes, caseus vetus, alique cibi omnes, qui terrenum ac melancholicum succum progignunt. Item legumina omnia, & quæ difficile coquantur, & flatu, quibus elephantici maxime prementur, proferunt. Nisi forte per morbi initia quum fervidus calor omnia exurit. Tum enim & mala carpentula cruda & pira christiana cum saccharo esse licet, & lactucam ac portulacam in acetariis, ut tantum fervorem restinguant, maxime vero melones & reliquos fructus horarios ejusdem generis, vel cerasa acida. Capparum usum etiam veteres in acetariis concedunt.

Potus esto non merum, quod invalescentem partium siccitatem foveat, & humores exurat, non cerevisia, quæ crassi succi copiam aggerat, non aliud denique potulentigenus, quod ferocientem elephantia causam exasperet: sed vel pomaceum, limpidum, pellucidum, optime detratum, nec acidum, nec præ dulce, pari etiam aquæ portione dilutum, vel hordei & passiarum decoctum, vel vulgaris ptisana. Quod sequitur decoctum humorum fervorem restinguere & malignitatem occulta proprietate reprimere atque obtundere potest. Ideoque in hac curatione omnibus aliis antecellit, quando insiti caloris vires frigida nullo negotio vincere, ac concoquere possunt. His enim languiscentibus decoctio frigida detrahenda præstat.

℞. Saniculæ buglæ, plantaginis, pimpinell. calendul. ulmariz, singul. p. j. scobis eburnæ, cornu cervini, utriusque ʒ j. passiarum purgat. glycyrrhizæ rasæ, utriusque ʒ ij. hordei p. j. Coquito in aquæ lb viii. dum dux decesserint. Decoctum percolatum, & syrupo violato conditum usui reponito. Eisdem vires habet quod sequitur.

Cichorii radices tres quatuorve unciz, cum passiarum pari pondere, aquæ lb viii. coquantur, dum sex solum supersint. Tum glycyrrhizæ purgat. rasæ fescuncia, hordei pugillus, scobis eburnæ, cornu cervini & sem. tœniculi, singul. ʒ j. adjicitur. Ferveant omnia rursus dum libra una absumpta fuerit: deinde olla ab igne remota perfrigeratum decoctum colo trajiciatur, quod per se vel cum syrupo violacei momento in vicem vini usurpetur. Plantago & lactuca recte inferitur tum sorbitionibus, tum decoctio modo descripto, dum fervet humor & exurit. At inclinante ac fatisciente natura frigida omnia marcescentem insitum calorem convellunt, & flatu signunt, sæpe etiam febrem movent. Pimpinella quod venenatæ perniciæ oblectetur, neque frigore aut calore obsit, omni morbi tempore tuto usurpatur, velut & borrago, sativula, calen-



lendula & bugla, quod putredini aduersentur. Hordei solius decoctum (aqua hordei vulgo appellatur) & palato non ingratum, & retundendo incipienti morbo aptissimum existit. Commode in eo mali punici acidi aut subdulcis granula imponuntur, & in vicem sacchari glycyrrhiza ac uva passæ.

Benefaciet & potus divinus, qui pro aquæ coctæ, vel decocti hordei libris singulis succi mali citri u. l. i. i. am, & sacchari unam habeat unciam cum cinnamomi paulillo: sed tandem ventriculo officit. Si forte ingrata hæc displicebunt omnia: aqua simplex optima usurpetur, quæ tamen affecta ætate & remissione calore noxia putanda est, cuius loco aq. sacch. & modico cinnamom. condita conceditur. Inedia quum biliosas materias imprimis commoveat & accendat, atque grassantem clanculum partium siccitatem promoveat, jure inter res huic morbo intestissimas habeatur. Inualecente putredine ac calore fatigante potus diligendus, qui spiritus instillet, vires foveat, serpentem putredinem arceat, & vitam in quam longissimum heri poterit, tempus proleat: cuiusmodi est qui sic habet.

Capus & frustum vituli aquæ libris decem coquitur, dum sex superint: sub finem adduntur veronicæ utriusque, buglosi. borrag. asclepiad. pimpinell. calendul. saniculæ, symphyti majoris & minoris, plantag. scariolæ singulorum Mj. rad. pentaphylli. veronicæ coronariæ, sem. cardui, scobis eburnæ, & cornu cervi, singulorum ḡiḡ. Colatum jus in vitream ollam inditur, ut in duplici vase aqua proliciat, quæ saccharo & santal. citrini momento condita usui apta sit. Cibus igitur sit paulo plenior, sed euclymus & coctus facilis, isque bis die potius quam semel sumatur. Nova enim circa continenter corpori applicata spatio temporis antiquam vacuationibus jam minorem factam, obscurat atque intrinquit.

Vehemens omnis exercitatio, quæ sudorem elicit imprimis noxia est, ut & duræ corporis frictiones, & quæcunque vel corpus exiccant, vel humores induranciant & torrefaciunt. Adde & fermenta omnia sicca, & natationes in mari aut sulphureis & aluminosis aquis. Denique & unctiones omnes siccandi facultate præditas, & vinum absynthites (quod tamen a vomitione aliquando, & ubi cruditas urget tuto dari potest.) Hæc enim omnia aliaque ejus generis invalescentem partium solidarum siccitatem diuturno aut frequenti usu foveat, & mortem accelerant: quemadmodum & ira, & moeror, & reliqua omnia animi pathemata, quæ humores exurere, & calorem insitum labefactare, atque atterere possunt. Somnus diurnus elephantiasis perniciosus est, nocturnus autem aptissimus, post justum à cœna intervallum. Deambulatio lenta commoda, velut & frictio lenis, subductis alvi fecibus redditaque urina. Hæc quidem refrigerans & humectans victus ratio, quandiu fervet humor, vigerque calor insitus, alieno tamen æstuate tenenda: maxime vero in eo elephante, qui ab atra bile quam flava procreavit, profectus est. Nam quum ita jam exusta ac retorrída sunt omnia, ut cinis dumtaxat supersit frigidior, in calore & frigore temperata alimenta necessaria

sunt, alioqui labascente calore insito ac pene jam extincto, quæ ab eo sunt concoctiones frullantur, aggerunturque flatus & cruditates, quæ corpus mire lacellunt. Qui eo miseria jam præcipites acti sunt, sumpto potulento aut esculento refrigerante, febre tentari solent, donec nata inde cruditas evicta sit: qui tan en morbi initio calidis tum alimentis, tum medicamentis valde ostendi viderentur. Itaque pro morbi progressionem, ætatis & temperamentum differentia, aliaque medendi opportunitate prudenter immutanda victus ratio. Hoc tamen sciri velim, calidiore & sicciore victu, quam humidior & frigidior graviores noxas ab elephantiasis contrahi. Inclumante ergo natura, vini sed diluti usus concedendus, alimenta temperata, euclyma ac concoctu facillima diligenda, imperandaque sunt, quæ a languidiore calore nullo negotio contici, concoquique possunt. Fugienda etiam acida omnia, nisi saccharo aut cinnamomo condiantur. In his nulla tentari debet curatio, quæ morbi causam excindat. Illic enim symptomatum impetum retundere, ac perniciosi diffire, non morbum radicatus evelere licet. Idonea victus ratione præscripta, in humorum qui naturæ molesti sunt & graves, præparationem & vacationem incumbere oportebit. Sed quoniam tres optimo sunt corporis regiones, è quibus excrementa arte educuntur, priusquam crassus & saculentus sanguis, venis majoribus coercitus agitur, quæ in prima corporis regione coactervata sunt, eluenda, expurgandaque, primum quidem clystere, deinde cathartico blandiore: cuiusmodi sunt c. flux atramentum, rhabbarum, & senna, & quæ ex his sunt compositiones cathartice. Si quis tamen ubi plenitudo inest, ante usum cathartico: um si. n. guinem mittat, nullam gravem noxam accersiverit. Avicennas Græcorum imitatore venæ sectionem quum ex usu est, purgationi præmittit, nec ante octavum ab ea diem purgare aggreditur. Purgat autem per hieram diacolocynthidos, vel per apozemata, aut catapotia, quæ helleborum, scammonium, lapidem cyaneum, pulsam colocynthidos, & aloen habeant, à quibus in hujusce morbi initiis, ob cruditatem, lentorem & crassitiam humoris abstinendum censemus, ne magna sequatur perturbatio. Ille satis esse putat, si semel aut bis quoque anno validis hisce pharmacis purgentur elephantici: nos mitioribus sæpius repetitis, sensim cacoehymia sentinam melius, tutiusque exauriri didicimus: illorum tamen usum turgente materia haudquaquam repudiamus.

Archigenes primas purgationes molitur colocynthidis pulpa in catapotia redacta, quæ tamen serosos humores, qui atra bili, veluti frænum aliquod injiciunt, & pituitam potius detrahi comperimus melancholia retorrída intus restitantes. Itaque primo curationis hujus die, alvus clystere proluenda, post die vero, purgans medicamentum, quod nulla perturbatione ventriculum, primas venas & intestina sordibus exoneret, propinandum: tertio die vena incidenda in cubito dextro conspicua: postero die secunda & interna sinistra si vires valent: sin minus, bidui interjectio his recreandis aptior fuerit. Detrahendi autem sanguinis mo-



modum, vires & vasorum plenitudo præscribent. Oportebit & in malleolis, post aliquot dies venas tondere, deinde & in fronte. Ut semel dicam, sæpe & multum, & variis ex locis in hoc affectu sanguinem mittere operæ pretium est. Reviviscit namque elephantiorum calor detractō putri & fervente sanguine hacque quasi sarcina levatum corpus multo alacrius evadit. Exigua quippe sanguinis pars, in elephantiosis optima est, quæ naturæ in alimentum cedat, reliqua vero plurima. Hanc repetita evacuatione detrahere, illam familiari ac bono alimento adaugere oportebit. Habendus tamen modus in evacuando, dandaque erunt intervalia, quæ recreandis viribus satis sint, & quo magis progrediente morbo vires imminuantur, eo minus sanguinis detrahendum. Interea dum sanguinis detractiones fiunt, si durior alvus diutius subliterit, alternis diebus solvenda, aut etiam ducenda, vel cassia atramento, vel juscūlo purgatorio, vel clystere, aut vicissim modo hoc, modo illo. Sanguine quantum opus erit detractō, duo scopi supersunt, ad quos medici consilium omne, curaque dirigatur, purgatio & commutatio. Purgatio quidem ejus quod sic vitium fecerit, ut pristinam integritatem recipere non possit. Commutatio vero, cum humorum, tum partium nostri corporis sic venenata labe inquinatarum, ut tamen in pristinam bonitatem revocari, reduci que possint. Arte igitur sensim educenda quæcunque à naturali statu ita recefferunt, ut nullis remediis restitui queant. At vero immutandum quicquid emendari atque corrigi posse videbitur. Educetur autem secta vena, catharsis, cucurbitis, corinthis, balneis, unguentis, & emplastris digerentibus aut suppurantibus. Venæ sectio noxium quidem humorem demit & vacuat, sed una cum eo utiles spiritus & humores puros in sanis detrahit, eaque ratione vires dissolvit, & nativi caloris robur atterit: at in elephantiosis, ubi fere totus sanguis venenatam putredinem concepit, si intervallis repetatur, nihil nocuerit quandiu vires valebunt. Purgans tamen medicamentum id duntaxat detrahit, quod naturæ prorsus ineptum atque inutile est, relicto utili alendo corpori idoneo, quod immutantibus emendetur, si quod substantiæ aut qualitatis exiguum vitium contraxerit. Qui circum viscera & in venis majoribus redundat crassus ac sæculentus humor, (ejusmodi esse solet, qui hujusce morbi materia censetur) nec per sudores evacuari, nec cæca transpiratione digeri, nec vomitione facile ac tuto excludi, sed sola alvi purgatione & venæ sectione detrahi potest. Porro horum remediorum usus multiplex ac variis existit, nam modo purgantibus & immutantibus confusis atque permistis, eodem die purgatio & commutatio adhibentur, modo vicissim purgatio & immutatio tentatur. Noxios igitur humores eodem die præparare ac purgare possunt syrupi & apozemata, quæ præter sennam, agaricum & elleborum, radices, herbas, semina, ac flores habeant, quibus attenuandi, incidendi, aperienti, humectandi, refrigerandi, putredinem inhibendi, atque atræ bilis perniciem edomandi, infringendique facultas insit. Sed his alternis duntaxat diluculis, aut quarto quoque die locus erit, ne quotidiano usu ventriculo ac vis-

ceribus (quorum robur ad morbi longitudinem tueri operæ pretium est) ulla vis & noxa inferatur. Diebus verò interjectis, præparantibus, & immutantibus pugnabimus. Immutant autem quod emendari potest, & præparant quod purgatione excludi postulat, cardiaca refrigerantia, humectantia, bilem utramque & crassam pituitam attenuantia, incidentia, & vias purgationis aperientia medicamenta, zulaipi, apozematis, syrupi, sorbitionis, opiæ, tabellæ, pulverisve forma: quorum materia medico exercitato notissima est. Adde & unguenta, & balnea, & alia quæcunque in id usus comprobavit. Veteres ellebori nigri obolos tres cum scrupulo scammoni in sero lactis asinini dissolvebant, ac frequenter præbebant elephantiosis. Purgato dein sæpius corpore vomitiones præstitabant, primum quidem à cibo deinde etiam jejuniis, idque interdum per raphanos, interdum per album veratrum. Sed effrans nimis & periculosa, ac nihilominus parum efficax isthæc medendi ratio deprehensa est. Purgatio per elleborum ante balnearum usum, & exquisitam præparationem magna molestia minimum proficere comperi. Vomitiis nec materiam crassam circum viscera, & in venis inhaerentem detrahere, nec genitam intemperiem emendare, nec malignam morbi perniciem infringere potest: mucosam duntaxat ventriculi pituitam & bilem multis cruciatibus evellit. Multo igitur sit satius, si nigra & retorta bilis cassia, rhabarbar. & senna haud satis strenue detrahi videatur, ellebori nigri momentum, apozematis, & syrupis purgantibus, quæ sennam & rhabarb. habeant incoquere, hisque semel aut bis in hebdomade alvum ducere. Est autem purgantium, & præparantium quæ modo proposui, usus vicissim repetendus, dum alimenti penuria morbis fatigetur, ipsæ vero corporis vires alacriores evadant. Nec negligenda etiam in cibis medicamentosa purgatio, quibus diebus validiora cathartica non porriguntur. In prunorum damascenorum decocto colo transfuso, aut in jure pingui sennæ senecia recte incoquitur, cum buglossis, borrag. oxalide, & hyssopi ac thymi pauxillo. Excolatum dein decoctum horis duabus cibis præmittitur. Hæc dum fiunt, si vel tubercula, vel late quædam macula livido rubore cutem deturpent, siue sensus in his jam perierit, siue integer adhuc & incolumis persistit, primum foris & unguento emollienda, deinde discissa cute cornua suctoria identidem adhibenda, quæ parti tenacius impactum, & hærentem sanguinem exugant atque extrahunt. Sic illa fronti, genis, cervici, brachiis, manibus, aliisque minutioribus partibus, commode inliguntur, oreque exugitur, quicquid in parte redundat humoris alieni. Cornua suctoria quum desunt, nec cognitus est admovendi modus, cucurbitula sufficiuntur, etiam si multo imbecillius trahant. Post cornua altius rursus discindenda tubera, & cathartico medicamento, aut etiam caustico exterenda, absumendaque sunt. Late macula scalpelli cuspidis discissa, mercurio sublimate in populo unguento dissoluto radicitus exeduntur. Idem sed imbecillius ac minore molestia præstat pulvis mercurii, vel solus vel unguento rosato exceptus, neque validioribus opus esse comperio ad omnes elephantiorum verrucosas pustulas, si quis prudenter



denter ut inoverit. Maculæ emplastro e cantharidibus, fermento & sapone nigro facile abolentur. Hoc enim vesicas latas tenui sero turgidas excitat, quibus ruptis effusoque humore, mortua epidermis à vera & crassiore cute divulsa, facile nulloque negotio vel excidit, vel eximitur. Tumque si locus nimium extuberat catharticum unguentum imponitur, quod illam reliquis adquare possit. Quo quum ventum est, cicatrix inducitur. Si non extuberat, contractus ardor unguento rosato demulcetur, dein cicatrix contrahitur. Jam vero quum primum istorum presidiorum usu toti corpori provisum fuerit: balneum tepidum ex remollientium decocto apparatus, in quo bis die elephanticus insideat, mane quidem ante epulas horis duabus, & vespere ante cenam horis toridem. Hoc in biduum asservari potest integrum, & semel in hebdomade instaurari, donec remittant, aut prorsus evanescant omnia luis hujus symptomata. Ea cautione, ut neque in lecto post balnei egressum, neque in ipso balneo sudor cieatur, aut diffusetur e corpore. Hic enim calidioris balnei nota est. Sit igitur iusto tepore moderatum balneum, ne calidius morbi causam (quæ sudoribus, præ nimia crassitie tolli nequit) exasperet.

Vespere post balnei egressum corpore resiccato, illitus ex hydrargyro adhibetur: & postridie balnei, catharticum propinatur, quod fufum, liquefactumque humorem in alvum rapiat. Singulis ergo hebdomadibus balneum innovari debet ad biduum, & semel quoque die à balneo corpus unguento ex argento vivo in lecto perungi: dein sumpto cibo euchymo & euptepto, sonnus si accedat excipiendus nulla sudoris profusione. Non enim partium solidarum substantiam hydrargyri litu liquefacere, & in sudores, aut mucosum sputum depravare, sed earum siccitatem humectantibus emendare ac corrigere, & refrigerando fervorem retundere consilium est. Ideoque si bis innucto corpore sputatio aut dysenteria in minere sentiatur, semel duntaxat in hebdomade postea inungatur, & impendens sputatio propinato cathartico coerceatur, ne corpus quod humefacere consilium est, nimio exiccet opere. His quæ dixi remediis, tribus mensibus continuatis, tametsi morbus in totum nondum erit abactus, fatigata tamen naturæ duorum triumve mensium remissionem concedere operæ præstium fuerit: ea lege ut interea octavo quoque die, & syrupo, aut alio cathartico, quicquid de quotidianis alimentis corrumpitur, detrahatur, & balneum singulis mensibus biduo saltem usurpetur citra hydrargyrum. Interim asinini, aut caprini, aut si ne hoc quidem suppetit, vaccini lactis quinq; sexve uncia quoque diluculo exorbentæ adjecto saccharo rosaceo, cujus usu atræ bilis perniciēs coerceatur. Recreata natura, si nondum prorsus deleta erunt elephantica symptomata ad principium suprapositæ curationis reflectere oportebit, omniaque suo ordine facere, velut ante positum est, præterquam quod multo religiosius sanguis mittetur. Idque bis, ter, quaterve his, quæ dixi intervallis repetere operæ præstium fuerit, si ex descriptis præsidiis profectus evidens quæritur. Maligna hujus morbi natura, tenaciter adeo visceribus, aliisque

partibus solidis inhaerescit, ut in plerisque nisi sæpius repetito remediorum usu, funditus non excindatur. Aliis igitur annus unus ad curationem satis est, qui neque ex parentum semine vitium contraxerunt, neque diu tentati sunt, aliis, quibus extrinsecus acceptum vitium jam diu inhaeret, vix duo anni satisfaciunt: aliis, qui vel hæreditario hoc vitio, vel ascitio, sed inveterato tenentur, in totam vitam continuanda, quæ postea tradetur curatio.

Una elephantia præ aliis longis morbis remedium varietate ac vicissitudine gaudet. Suntque in hoc affectu, si quo in alio, ab omnibus fere remediis inducitur quædam & intermissiones sæpe ægro concedendæ, deinde & resumptio, & ad priora reditio, & novorum remedium admotio adeo necessaria, ut cum vix unquam convalesciturum credam, qui in unico remedio quamlibet generoso spem salutis collocavit.

*Alia curandi ratio superiori affinis, sed facilior.*

Præparato qua dixi ratione corpore, neglecto litu ex hydrargyro, cataportia usurpanda, quæ calidam & siccam viscerum ac solidarum partium interperiem emendare, omnium humorum ferociam & perniciem reprimere, obstructions viscerum solvere, & earum causam sensim expurgare, atque idcirco elephantiam profligare solent. Cujusmodi sunt, quæ sic habent.

℞ Argenti vivi ℥ss. cum panis adhuc calentis medulla manibus diu subige, ut in eam plumbaginem deponat, purgatum dein hydrargyrum succi limonum momento, & olei myrrha arte Chymica deprompti ℥ss. exacto nisceto, adjecta terebinthina venetæ aqua ros. elotæ ℥j. tum adde auri purissimi, eodem artificio Chymico in tenuissimum pollinem redacti, vel si desit, foliorum auri ℥j. ambaris ℥j. pulveris electuarii, diamargar. frigidi & electarii trium santaloni simplicis, utriusque ℥ij. fingito massam, cui sequentis imaginis ℥i ss. admisce.

℞ Foliorum sennæ electorum ℥ss. rhabarbari in frustula dissecti ℥iv. rad. arefactæ ellebori nigri nostratis ℥j. diem unum in ollâ stagnare macera, quod dein exime ac sepone, atque aliud affunde, idque rursus exactis duodecim horis expressum cum priore nisceto, & vitro vase exceptum in diplomate exhalare curato, atque relictum magna ad usum servato. Hujus compositionis ℥ss. dabitur quindecim alternis diluculis, tribus horis ante cibum: idque alternis mensibus, interjecto balnearum, & aliorum omnium presidiorum descriptorum usu.

Recens orta elephantia, quæ gentilitio jure comparata non sit, his remediis profligatur. Ac quæ vel hæreditario jure successit, vel inveterata est, nullo unquam remedio penitus excinditur. Hæreditaria quippe naturæ & seminis vitio, quod ars nulla emendare potest, committitur. Inveterata vero quoniam partium solidarum substantiam in sui naturam prorsus jam immutavit, nullo amplius remedio vincitur. Præstat tamen in rebus angustis, arctisque, vel etiam deploratis, aliquod experiri remedium, quam in



certam desperationem, ægrum præcipitem dare. Humanum enim est, & plenum benevolentiz signum, in summis etiam malis ad experimentum usque progredi, ut difficilem atque, si non omnino tollamus, certe leniamus & compescamus, sic tamen ne vulgo dedecore afficiantur præsidia, quæ multis fuisse salutem. Itaque in utrisque tentetur modo tradita curatio, si caloris nativi robur supererit. Elephantiaz hæreditaria aut inveterata causam, si radicitus non tollit, eam saltem intrinsecus ac debilitat, perniciem si profus non auferit, illam certe differt, vitamque prorogat, plerumque in longissimum tempus, & morbi sceleratam obscurat. Sed ut erit nativi caloris robur, & corporis natura, hydrargyri modus in unguento, quod in egressu balnei aliquando adhibebitur, veniet decernendus, veluti & in catapotis. In omnibus quidem naturis ac corporum generibus, idem remedium, sed non eodem modo usurpandum fuerit. Qui viribus valent, ac firmo corporis habitu præditi, neque ætatis illorem egressi sunt, eis non raro multa & frequens hydrargyrosis, quæ ad sputationes usque progrediretur, sed citra sudorum profusionem præstans auxilium, operique attulit: qui vero senilem jam ætatem assequuti, viribusque fracti, rheumatismis afflicti, oppressique sunt, nihil aut parum adjuncti ab hydrargyro percipiunt. Quum enim frigidus & humidus sit hydrargyri, frigidum seu corpus calore nativo qui supererat extincto, morti celeriter addicit. Incipiente igitur, increscente & vigente elephantiorum calore, non vanis titulis famigeratum ex viperis remedium, non theriaca, non ferrum, non ignis, non aliud denique ullum præsidium hydrargyro secundum deprehenditur. Quod ne temere dictum videatur, meæ opinionis longum jam usu & experientia confirmat, rationem paucis, ut mos est, expediam.

Elephantia admodum siccus & terrenus morbus est: argentum vivum summo humore præditum, quum partium tenuitate omnia permeat, indurata omnia molliat, laxat & humectat. Acris, exustus & malignus humor est, qui elephantem parit, argentum vivum tum frigore, tum alia occulta proprietate & efficientia, acrium omnium humorum fervorem retundere, & malignitatem, feritatemque infringere deprehenditur. Elephantia non externas tantum corporis partes attingit, sed solidarum etiam substantiam labe-  
factat. Argentum vivum maxima partium tenuitate præditum, non in extrema cute hæret, sed ad viscerum, & solidarum partium substantiam usque pervadit ac penetrat, omnia ex æquo se-  
re suis viribus afficiens atque efficaciter immutans. Itaque prudenter, ut jam præmonui, corporum generibus, & nativi caloris robori, aptetur hydrargyri modus, & iustis cancellis circumferibatur utendi ratio. Hic enim grassantem solidarum partium siccitatem remorari, atrabiliarii humoris incendium restinguere, feritatem cohibere, & invalescentem putredinem arcere potest.

De venæ sectione idem esto iudicium. Neque enim in deploratis, quorum languent jam vires, fatiscitque calor insitus, tam sæpe mittendus sanguis fuerit, tamque copiose, quam in recens contaminatis, qui & virum robore valent, & sanguis plenitudine tenentur. Mit-

tendus tamen iusto intervallo quum putredinum in venis invalescens, perniciem accelerabit, ut sublata putrentis sanguinis sarcina, reliquum languescens calor facilius concoquat.

Cætera omnia quæ elephantiasis convenire dixi remedia, vix unquam ulla noxa, maximo sepe profectu semper a prudenti & rerum usu perito medico usurpantur. Tenendus tamen vel in his modus, quæ semper salutaria deprehenduntur, concedendaque naturæ intervalla, & veluti quædam remedium induciæ, ferique, quo repetita illam postea magis velut nova afficiant atque immutent. Itaque non modo semel in hebdomade melanagogo medicamento alvum ducant, sed etiam clysteribus sæpe illam solvant, atque etiam interdum sorbitione purgante quæ borraginis, buglossi, oxalidis, oxylapathique folia habeat cum sennæ semina, & thymi atque hyssopi paucillo. Sæpe laxantibus atque emollientibus balneis insideant. Sanguinem quoque mense, aut si ætas jam valde inclinât, tertio aut quarto quoque mense, aut saltem vere & autumnio detrahant, pius minulve, ut feret plenitudinis, putredinis & virium ratio.

In loco habitent salubri, temperato, lucido, ætate media, solis ardoribus minime exposito, sed ad septentrionem aperto, nam hyeme meridiana solem habere præstat, frigidis hisce regionibus.

Cibis utantur boni succi & facili concoc-tionis, iisque temperatis, si jam inclinât ætas ac resiliens est bilis atræ fervor: refrigerantibus vero & humectantibus, si nondum morbi calor defervuit. Vino in omnem vitam abstineant, aut certe ad sexagesimum annum usque, tumque eo quam dilutissimo utantur. Callicientia & siccantia alimenta, & medicamenta omnia declinent, nec se inedia consticiant, iracundiam cohibeant, mororem metumque pellant, cupiditates, sollicitudinesque omnes detrahant, & perturbationes, concitatoque animi affectus coerceant, atque moderentur. Cardiaca quæ venenata labi obliquantur, frequenter usurpent, opiata, conditi, pulveris, electarii, aquæve stillatitiæ forma, idque mane, & ante epulas, vel sub horam somni, interdum & cum epulis: quorum omnium compositiones postea trademus.

Qui elephantico semine progeniti sunt, non subito concidunt, sed sensim invalescente putredine corrumpuntur, membratim dilacerantur, tandemque intereunt. Hic varias humorum mutationes ac multiplices morbi & naturæ conflictus observare licet. In his primum faciei cutis crassescens vividum colorem amittit, atque ex rubro livescere incipit, quod symptoma antevertere, atque arcere expedit, alienæ materiæ, (quam e venis ac visceribus natura sese exonerans eo pepulit) vacuatione, balneis aquæ dulcis tepescat. in qua emollientes, laxantes, ac tergentes stirpes decoctæ fuerint, victu humectante & refrigerante, foris emolliente & rarefaciente, unguento molliente, rarefaciente & tergente, ad motis cucurbitulis, aut cornu scætorio post scarificatum, unguento ex hydrargyro corpori post balnei egressum illito. Si malum nihilominus serpit, brevi tubera erant puer, pri-



primum quidem in facie, dein in tibis, manibus, aliisque partibus. Hæc scalpello discissa catheterico medicamento radicitus exeduntur, dein de cicatrix inducitur. Progrediente tempore cutis quibusdam faciei locis mire crassescens, maxima deformitate in tumorem attollitur, cui color inest ex rubro nigrescens ac pellucens. Hæc scalpello vulnerata feculentem sanguinem fundit, qui etiam cucurbita, vel cornu suctorio, majore velleitur. Emplastro dein catheterico quicquid inæqualiter intumuit ac supercrevit, exeditur, atque adæquatur, cicatrix tandem contrahitur. Neque enim verendum, vel supercilia, vel frontem, vel genæ particulam sic vulnerare, atque reliquis quæ non ita intumuerunt, æquare, quam relicta ex ulcere cicatrix, multo quam reliqua cutis venustior esse soleat. Ulcera quæ sponte vel in tibis, vel in aliis partibus nascuntur, sanguinis feculenti & corrupti eo decumbentis loboles sunt. Ideoq; purgato corpore à sanguinis missione, curatio incunda. Mittitur autem primum quidem incisa vena, quæ fluxionis fontem exhauriat, dein quæ ab ipsa parte derivet ac vacuet. Hinc pars incidenda satis altis plagis, ut multus ex ea sanguis extillet, adhibendaque cucurbitulæ: postremo ulcus aliorum more curandum.

Comune est in omnibus ulceribus, quæ in hoc morbo sponte emergunt, post vacationes universales, & derivationem, ex affecta parte, altis sectionibus, partem ipsam cadendam esse, ut adhibito cornu suctorio, aut cucurbita, sanguis ipsi impactus extrahatur, dein catheterico medicamento quicquid vel occuluit, vel supercrevit, vel nimis intumuit, vel aliud inemendabile vitium contraxit, absumatur: postremo ulcus aliorum more & carne impleatur, & cicatrice obducatur quam elegantissima.

Morbo ingravescente sæviora symptomata emergunt. Primum igitur sensus in externis partibus hebescit, inestque frigus fere perpetuum. Quæ symptomata etsi nullis auxiliis funditus tolluntur, leniri tamen solent, & periculum differri: primum quidem ea curatione quam supra retulimus: deinde topicis medicamentis, quæ frigidum & crassum humorem parti insertum digerere, crassescentem cutim emollire, laxare ac levigare. & insitum ipsius partis calorem fovere atque erigere possint. Cujusmodi est oleum quod sic habet.

Sigillum Mariæ, radix bryoniæ, & althææ, prunis vino albo & oleo sensim incoquantur, dum vinum absumptum sit, oleum dein exprimitur, quo pedes, tibiæ & manus, si stuporis & frigoris sensus inerit quoque vespere inungentur. Benefaciet & fons digerens, rarefaciens, & corroborans, ex malva, violaria, sem. lini, rad. althææ, origano, sampsocho, salvia, anagallide, ros. rub. omnibus sacculo conclusis, & aqua ac vino albo incoctis.

Quum jam eo miseræ ventum est, ut putredo hominem membratim dilaceret, interlax sed unicum solatium superest, quicquid sic vitiatum est, vel medicamentis exedere, vel ferro rescindere, vel urere. Exscinduntur, vel vicissim exurnuntur minutulæ partes, quas putredo cadaverosa tabefacit, & ulcera illinc relicta aliorum more curantur: in corporis

trunco cathetericis potius locus est.

Oculorum membranz sensim crassescentes, visus obscuritatem inducunt: remedium est, fons emolliens, rarefaciens & discutiens. Collyrium tergens, attenuans & siccans, aquæ pulveris syrupi unguentive specie. Fons fiet ex malva, violaria, euphrasia, fœniculo, semine lini, sacculo conclusis, & aqua ac vino albo decoctis. Collyrium ejus qui ægrotabit natura & vitii magnitudini aptum comparabitur ex myrrha & æruginis, ovi albuminis coctione indurato, conclusis, & loco humido reconditis, dum aqua viridis extillaverit: cui syrupus de absinthio, aquæ stillatitiæ, euphrasiæ, fœniculi & plantaginis, ea temperatione miscbuntur, ut citra vehementes membranas, & sordes omnes abstergat. Anteriori remedio opus est quum membranz ex majore oculi angulo enata pupillæ obtendantur, aciemq; perstringunt, qualia sunt quæ ad pterygium traduntur. Busto vivus olla fictili exceptus exurit: tenuissimus pulvis in oculum afflatus, pterygium concoquit, & in pus deducit. Sed quum adhibetur refrigerans remedium, extrinsecus oculo superponendum, ne ejus acrimonia, dolorem & inflammationem pariat.

Malo invalescente, sic elanguescit insitus calor, ut in omnibus corporis partibus frustrentur concoctiones, multaque serosa excrementa colligantur, maxime vero in capite, quæ sæpe in thoracem tanto impetu decumbunt, ut asthma suffocationis periculo horrendum, sæpe etiam febrem accerant. Interdum in oculos irruunt, & disruptis eorum membranis, repentina cæcitate inducunt, aut inter eas intercepra, implacabiles dolores cient, ac prorsus obeæcant, oculis protuberantibus, ac pene exertis. Præsentaneum auxilium affert sanguis celeriter missus, phlegmagogum atque hydragogum confestim datum atque repetitum, dein concoquentia & tenuis victus ratio.

Quum nares præ alarum crassitie, ac crustulis, quæ illic adnascuntur, obstruuntur, primum crustulas excutiet molliens, tergensque decoctum, dein siccitatem leniet, & crustas denuo adnasci prohibebit butyrum salis expers, aut certe oleum amygdal. dul. recens expressum rudicula & linteolo, vel calamo intromissum illitumque.

Concubitum elephantici maximopere concupiscent, nec eo interdici debent, quum & corpus refrigeret, & morientem illorum animum demulceat. Quoniam tamen nimis frequens vires solvit, pro ratione ætatis & naturæ ægrotantis in eo modus adhibendus.

Qui descriptorum remediorum efficacia integram valetudinem recuperaverit, ne recollectis in corpore noxiis excrementis, mali radix tandem aliquando revirescat, omni opera prohibeat. Itaque cibis euchymis uti conveniet, vel temperatis, vel paulo frigidioribus & humidioribus, vino omnino sibi interdici, vel eo quam dilutissimo uti, calidis & siccantibus alimentis omnibus vitatis, salis quoque & aromaticis omnibus, porris, cepis, alliis, sinapi, & reliquis omnibus, à quibus abstinendum esse in superiori curatione præcepimus. Loca incolant æstate quidem frigida & humida, hyeme vero paulo sicciora & calidiora. Ad hæc



aliis atque aliis medicamentis melanagogis, alvus intervallis ducenda. Habenda saepe & medicamentosa in cibo ratio.

Vere incunte & autumnio vena secanda est, aut etiam sæpius, si quando ulla plenitudine corpus tenebitur. Sape & cardiaca, quæ venenatæ morbi malignitati resistent & oblucentur, usurpanda venient, opiata, conditi, pulveris, electuarii solidi, syrupi, aquæve stillatitiæ forma. Biduo etiam quoque mense, balneum comparandum æstate præsertim, & in eo bis die desidendum, qua methodo supra posuimus, adhibita in exitu, corpore tamen prius reficcato hydrargyrosi, velut ante præceptum est. Alioqui catapotii ex Sole, & Mercurio supra descriptis, ex intervallis utendum.

Fama est elephanticum quandam vitæ pariter ac morbo finem imponere querentem, viperam in multi dolium irrepsisse, conspiciat, extincta in eo vipera, sese multo ad satietatem, semel atque iterum ingurgitasse. Cujus vi post virulentas vomitiones, ebrietas, profundusque sopor morti haud dissimilis obrepit. Quibus tandem discussis, imprimis pili defluerunt omnes, & ungues exciderunt, dein omnia in ambitu membra corporis contabuerunt, denique certum exitum in propinquo videbatur, quum ex reliqua quadam virum scintilla, natura hominem redintegrans, alias carnes enutrivit, ungues novos, & nitidam formam instauravit, ac vetus corium, ceu serpentis senectam exiit. Ita habet fabula non admodum verisimilis quidem, sed cujus tamen imitatione, antiqui elephantia curationem ad occultam viperarum proprietatem retulerunt, de aliis remediis desperantes. Occultam proprietatem dixi, propterea, quod qualitatibus manifestis elephantia causam augeant potius quam infringant. Nam vel Galeni testimonio, manifestæ ac generales qualitates carnum viperarum sunt, exsiccare valenter, digerere mediocriter, & excoallacere. Atra autem bilis, quæ hujus luis causa est, calida & sicca quum sit, per contraria retundi postulat. Vere potissimum elephantiorum curationem aggrediuntur, primumque corpus in aliorum fere omnium diuturnorum morborum modum identidem purgant: deinde venam secant, si vires ferunt: hinc ad vipersas se convertunt, quas alii aliter apparare solent. Omnes in hoc conveniunt, caput & caudam ut abscindant, dein interanea omnia ac cutem etiam ipsam eximant, postremo corpus ipsarum exquisite eluant. Quidam, quod casu contigit imitatione confirmantes, in vini generosi dolium illas conjiciunt, ac sinunt dum suffocentur, dein vinum agris nescientibus propinant. Alii medicinam ex viperis confectam, quam theriacam vocant, sæpius adhibent. Alii sale theriaco utuntur, quod vivis viperis cum quibusdam aliis medicamentis in fictili novo combustis comparatur. Alii vipersas ipsas comedunt in pastillos redactas. Alii illas in anguillarum modum apparatus exhibent. Atque hoc omnibus commune est, viperis tandiu utendum esse, dum elephantia vel in lepram abeat, vel in totum defluat, in tenues auras dissilante per cutem affectu. Galenus elephanticos aliquot ita se percurasse gloriatur: quin & incipientem morbum sola catharsis & phlebotomia vere & autumnio præscripta

proligasse atque propulsasse se venditat. Cujus auctoritatem tot seculis confirmatam, etsi non repudio, vix tamen quid de hoc remedii genere censuerit Fernelius, quidque partim dum is Lutetia floreret, partim post ejus obitum expertus sum, perpetuo silentio involvere possum. Elephanticos multos veterum imitatione quum viperarum usu restituere maxima methodo studisset Fernelius, nemini in tota vita, ut erat in votis successit: quod cum mihi indicasset, & a remediis omnibus siccantibus abstinendum non esse monuisset, veterum medicorum auctoritatem ejus opinioni anteponendam ratus, & illorum pollicitis nimium forte addictus: theriacam elephantibus multis, qua methodo illi præcipiunt, præbui, sed nullo prius profectu: quæ res effecit, ut vipersas ipsas aliter atque aliter apparatus, experiri aggressus sum, quas tamen nihil plus opis asserre comperi.

Paucos (fateor) post dies cutis extrema squammas & furfures remittit, tanquam elephas in lepram degeneret, videturque juvare per initia hoc remedii genus, si solus cuticulæ rationem habeas, sed neque viscerum constitutio, hocce modo melior fieri, neque verrucosa tubera intermori, neque crassescens cutis deformitas emendari solet: sed elephanticum virus, post viperarum usum, e visceribus multo majore quam unquam impetu in cutim remeans, omnia symptomata sic exasperat, ut aucta putredine membratim dilacerentur ægri teterrimo fœtore. Neque enim pastilli theriaci, neque venenatæ viperarum carnes, quovis modo præparatæ, siccæ & terrenæ partium constitutionem corrigere possunt, sed omnia depravare, atque venenata perniciæ inficere. Si quis tamen veterum auctoritati tantum tribuit, ut Fernelii & meam hanc experientiam universis medendi legibus consentaneam suspectam habeat, ei facile sit, qua ratione illi præcipiunt, viperarum usum experiri. Tutissimam utendi rationem hanc tradunt recentiores.

Vipersas præparatas in aqua cum hordeo decoquito, quo postea gallinæ alantur dum implumes evadant. His ergo gallinis elephantici alendi sunt, donec comæ ac pili defluant omnes, & crassior cutis squammas ac furfures remittat.

De proximæ elephantis causæ temperamento multi inter se non parum dissentiunt. Galenus melancholicum quidem humorem elephantiam progignere passim confirmat: sed quum ampla significatione id nominis Latini usurpent (nam & de proprie dicta atra bile, acerrimo & ardentissimo humore, qui & corpus rodit, & terram fermentat, & de melancholico succo frigidiore, qui sanguinis veluti fex & limus est, dici solet) haud facile assequi posse putant, quo in significato, melancholici humoris nomen in procreatione elephantis accipiat. Sunt qui eum comment. in Aphor. 2. lib. 4. succum melancholicum frigidum, proximam elephantia causam his verbis facere existimant. In atra, inquit, bile totius corporis color ad nigritiem tendit pustulae nigrae fiunt ex ejus colore. Et quicumque morbi ex ejus fiunt exuperantia, multitudinem melancholici humoris manifesto indicant, quemadmodum cancer, elephas, quartanus circumsus ex melancholico humore generantur. Si



Galenī sententia, inquit, quartanus circuitus & elephas ex eodem fiunt humore, quartanus autem circuitus non raro ex propria dicta atra bile perniciosissimo humore, saepe vero ex melancholico succo frigidiore & terreno originem habet, & elephantem ab eodem sapius fieri, oriri que necesse fuerit. At libro de atra bile aliter sentire videtur hac sententia. Verum alia quoque plerisque non febricitantibus in cute crassescente, siccescenteque exanthemata provenire videmus, cum melancholici humoris redundantiam natura ad extimas partes pellit, quo genere is quem elephantem nuncupant, continetur. Ubi autem tale quidpiam simul cum febre exoritur, humor melancholicus, qui in cutem abscessit, facit eum quem carbonem appellant. At si citra febrem decumbat, sitque cum sanguine conjunctus, gignere elephantem potest: si solus sit in principio quidem tumorem atrum producit, sed progressu temporis in cancerum definit, cum utique corrosa cute acrior sit magisque malignus, cum mitior sine ulcere, latentem cancerum efficit. Evidens enim est hos affectus omnes, præcipue cancerum, ex humore melancholico gigni. Cancerum, inquit, carbunculum & elephantiam, ab uno & eodem humore fieri tradit Galenus: at carbunculus à maligna atra bile fieri, contrahique alibi dicitur, quare & elephas: Contra tamen, qui calidus est humor melancholicus carbonem, qui non est ejusmodi, cancerum & elephantiam gignit ex Galeno. Eodem etiam libro eum asserunt tradunt, subrubros elephantes, ab atro humore qualitatibus mitioribus prædito, sanguinique admisto, procreari & si inveterarint, nigriores reddi. Quod ut componatur dissidium, ambilem ex humore melancholico nuper genitam, humoris melancholici nomen & appellationem idcirco veteribus etiamnum retinere crediderim, quod nondum plane incaluerit, nec pristinis qualitatibus omnino spoliata sit. Procedente vero tempore quum manifeste jam incaluit, saevioraque symptomata invexit, proprie tum atram bilem nuncupari: tamen ut eadem utriusque forma, eademque sit species: sic enim videtur sentire libro de tumoribus præter naturam. Elephas, inquit, affectus melancholicus est, cujus prima origo ex melancholico sanguine est, spatio vero temporis copiosior, quam sanguis atra bilis redditur: quo tempore corpus jam male & graviter olet, turpeque & deformatum videtur, & aspectu horrendum, atque interdum etiam exulceratur. Hunc affectum, quum incipit, satyriasmus vocant, quod satyris aspectu similes elephantici evadant.

Atra igitur bilis proxima est omnis elephantis causa, sed quum vel ex succo melancholico ac seculento sanguine, vel ex bile vitellina, vel ex nitrosa pituita exultis ac torrefactis, non ita pridem habuit originem, illorum etiamnum appellationem interdum retinet. Neque me iudice, immerito, quod lux procreationis initio pondum late ab humore à quo nuper genita est, dissideat. Frigida quidem videtur atra bilis Galeno, quia terrestris, non tamen caloris expertis, quemadmodum nec cinis, nec etiam acetum. Jam Arabum de ea iudicium ac sententiam inquiramus.

Avicennas auctor est elephantiasim partium solidarum substantiam, qualitatibus vitæ nostræ e diametro repugnantibus & insensis, continenter immutare ac pervertere. Quod si verum est, frigidam & siccam statuere oportet elephantis causam (calore namque & humore vitæ nostræ fovetur, contineturque:) Quibus perspicuum est, frigidum & siccum e diametro opposui. Elephantia, Avicennæ est bilis atræ per universum corpus profusio, qua membrorum temperamentum, forma & compositio labefactatur: unde tandem continuitatis solutio, & partium casus & foeda ulceratio sequatur. Ad hæc melancholicum humorem usum non prius elephantem parere tradit, quam refrigerit, & inveteratas, diuturnasque obstructions non aliam ob causam elephantiam inurere, quam quod minime ventilatus calor nativus præfocetur, unde & refrigeratur & crassescit sanguis, eique gignenda idoneus sit. Postremo in elephantiacis sanguinem non raro circum articulos congelari, & pulum imbecillum iis idcirco esse dicit, quod facultas sit imbecilla, & exigua necessitas, frigidum utpote morbo fatigante. Principem hunc scholæ Arabicæ sequuti recentiores fere omnes, elephantis causam frigidam & siccam esse prodiderunt, atram bilem non prius eam interre dicitur, quam absorpta omnino fluxili, liquidaque ejus substantia, calor tandem prorsus dissipetur atque divanescat, terrena duntaxat eaque siccissima ejus parte cineri haud ab simili superstitite. Idque perinde esse atque quum succensus ignis absorpto prorsus ligni humore, quo terrena ejus partes inter se junctæ cohærebant, evanescit, & extinguitur, siccissimum duntaxat cinerem pro ligno relinquens: quem accenso ligno, si conferas, frigidum exillimes. His igitur auctoribus frigidus & siccus humor elephantiam progignit.

Ego vero (si de re tam controversa meam dicere sententiam licet) facile efficiam, ut hoc composito dissidio inter veteres concordia coeat, vel si dogma eligendum est, Græcorum potius sententiæ subscribendum sit. Quanquam acerrima ac calidissima atra bilis, quæ corpus rodere, & terram fermentare creditur, à frigidum & sicco melancholico succo, temperie ac specie recedit atque dissidet: saepe tamen veteres illam melancholici humoris appellatione designant & insigniunt: sive quod illa metu & mortis, aliisque melancholicis perturbationibus animum mentemque percellat & exagitet, perinde atque melancholicus succus frigidior, sive quod lux procreationis initio, dum nondum vehementer incaluit, accensaque est, haud multum à seculento sanguine discrepet, ut nec quum siccescens de suo calore non parum deperdidit. His ergo ex causis, veteres maximeque Galen. elephantiam quæ reipsa nunquam aliunde quam ab atrabilario humore undecumque genita sit, proficiscitur, saepe à melancholico succo aut humore nasci tradunt, & Avicennas frigidum morbum esse prodidit.

Quanquam autem elephantis omnis origo, ab atra bile ducitur, ea tamen pro affectuum corporum natura, & humoris à quo orta est, affectione, non parum & invadendi, serpendique modo, & symptomatis variat. Ut enim quæ elephantemprehenduntur corpora, minime autem hæc, melancholica, ut ita loquar, erant omnia, sed



sed alia sanguinea, alia biliosa, alia melancholica, alia pituita falsa perfusa, alia ex iis mixta: sic certe neque atra illa bilis ex uno eodemque humore perpetuo nascitur, sed interdum à lucido melancholico, frigido & sicco, interdum à bile flava in vitellinam versa, interdum à nigrosa pituita originem habet. Quæ igitur ex frigido & sicco, eoque melancholico succo exusto procreatur atra bilis, quoniam ejus humoris, à quo non ita pridem unctione genita est, naturam conditionemque etiamnum redolet, diutius occultitur, nec nisi sensim lenteque tandem in externas partes erumpit: quo quum ventum est, elephantem levioribus symptomatibus conspicuum profert: quem nonnulli frigidam causam habere idcirco dixere, quod manifesta caloris symptomata nulla statim corpori intenter nec incutiat. Quæ vero ab adusta flava bile fit, causæ suæ naturam redolens, multo tenuioribus partibus quum sit, brevi contumacis visceribus, in extremitate corporis ocius exardescit, lævissimaque incendii symptomata, nisi occurritur, inducit, quæ sui causam calidam esse manifesto demonstrent. Medio quodammodo se habet, quæ à falsa pituita proficitur. Quæ vero à sanguine fervidiore exusto proxime ad eam, quæ à præassata fit flava bile accedere deprehenditur: ut quæ à feculento & crassiore, ad eam quam à melancholico humore fieri diximus. Quod autem proponunt nonnulli, quum jam eousque serpendo processit elephantia, ut exhausta humida atræ bilis substantia, cui calor insidebat, soli ejus cineres frigidiores superessint, ardoris, incendiique omnia symptomata tum remittere, morbumque frigidam causam habere, plane falsum est. Licet enim ulsi ligni cineres minime cum retinent calorem, quem vel ejus flamma, vel carbones exhibebant: sunt tamen integris rebus, à quibus demanarunt multo calidiores. Quod vini læces demonstrant, quæ usque longe calidiores, acrioresque evadunt. Tantumque abest, ut vel atra bilis, aut nonnullarum aliarum rerum cineres frigidi judicari possint, ut etiam frigidorum quorundam cineres, non parvam unctione acrimoniam, caloremque conquirant, & assequantur, sicut experientia nos docuit, quæ compertum est frigidissimi ac humidissimi argenti vivi cineres, cathetericos, acres, urentesque esse. Ad hæc si frigida & sicca est elephantia causa, cur cedo non solum elephantiorum tubercula exedantur, & in profunda ulcera serpendo degenerent, sed etiam partium ipsarum extrema, vel humoris acrimonia absumpta pereant, vel corrupta, & putredine carieque confecta excidant? Non enim frigidus & siccus humor melancholicus, vel frigida & humida pituita, illorum possint esse operum causa: nisi immutata specie in alterius humoris naturam commigrarint. Quod igitur dicunt nonnulli, atram bilem per initia elephantia calidam, absumpta tandem liquida & fluente ejus parte, frigidam evadere, minime permixta specie, absurdum plane censeri potest. Habent enim singuli humores proprium & peculiare temperamentum, quod superflua forma nunquam depereat. Calida enim semper bilis flava, calida & atra, ut pituita semper frigida, frigidusque semper melancholicus humor. Hæc tamen bilis alia calidior, frigidiorque interdum hæc, quam

illa pituita censetur. Nisi forte putrescens, per febres pituita, quoniam incalescit manente forma, istius axiomatis veritatem convellat, atque labefaciet. Sed hanc impermissam, veterum nonnulli vix unquam putredine sic incalescere censuerunt, ut febrem accersat, febres omnes biliosas arbitrati: quorum opinioni subscripsit Kernerius. Nec si putrescens incalescat, amplius pituitæ nomine insignitur, sed ejus humoris, in quem putrescens degenerat.

Elephantia itaque omnis calidam causam habet, quæ tamen caloris, siccitatisque ratione, pro corporis affectu, & humoris, e quo profecta est, natura, proque morbi tempore, non parum varia est. Quod & veterum auctoritate doceri potest, qui non alia ratione castrandos censuerunt elephanticos, quam quod testes vim maximam caloris, fervoremque in universum corpus effundant, qui elephantia causam exasperet.

Pomaceum è succo malorum dulcium maturitatem assequutorum, sati s defecatum, satissimumque maturum, tenue, sublavum, & limpidissimum, quale in Neustria copiosum ferunt agri Constantini, elephantiosis & melancholicis ab atrabilario humore adeo salubre est, ut omne potionis genus bonitate vincat. Quod me longo usu, ratione duce comperisse profiteor, & complures melancholicos hypochondriaco, quibus jecur & mesenterium morbo causam dederant, ejus ope restituisse. Nam & tetros melancholia vapores, multo quam syrupus è succo pomorum efficacius discutit, & cordi læticiam adfert, & viscerum atque humorum siccitatem, ferinamque qualitatem omnem demulcet ac contemperat, & alimentum copiosum corpori præstat, & assuetis gratissimum existit. At pyraceum omne & pomaceum, è malis acidulis expressum, vel vetustate coalescens, noxium existit, perinde atque omnia cruda & acidula vina vulgo vidia appellata. Repudiandum & pomaceum, quod ex malis dulcibus expressum dulce quidem existit, sed nondum satis concoctum: multoque magis quod fecibus prorsus non depositis turbidum & crassum pertiit, nec inclarescit donec acefcat, qualia fere sunt in pingui Algæ solo nata. Copiosius quidem alimentum corpori suppeditant, & agricolis ac fossoribus expetuntur, sed quia obstructions pariunt, crassique succi copiam aggerunt, tum sanis tum ægris noxia putanda sunt. Curent igitur Medici, ut elephantiosi & hypochondriaci, quibus jecur & mesenterium (quod fere fit) vitio causam præbent, tenue, sublavum, pellucidum, beneque maturum pomaceum, pro generosissimo remedio veteribus quidem incognito, sed nunquam satis laudando, in vicem vini usurpent quod tamen calidæ & siccæ naturæ, præsertim vero æstate, aquæ quadrante diluent.

*Aliud gratum & innoxium poculentis genus, temperatis, aut non ita calidis naturis ex usu.*

℞. Aquæ purissimæ lb̄vj. scobis cantali citrini ʒj. sacchari alb. ʒv. servefacito horam dimidiam vase argenteo, aut in olla nova. Colo postea trajicito.

*Aliud*



*Aliud fervente magis humore commodius.*

Habet aquæ purissimæ lb̄ vi. sacchari alb. ℥iv. scobis fantali citrini ʒj. hordei integri P.j. luci mali medici acidodulcis ʒij. Conserveant aliquantisper, dein percolato, & utitor. Vultus pituitam vulgarem, vel hordei decoctum semine feniculi conditum, usurpet, vel certe (modo ventriculi & præcordiorum ratio toleret) purissimam & limpidissimam aquam.

*Potus nonnullis divinus appellatus, calidis omnibus naturis, in calidis morbis omnibus miles, si valet ven. riculus.*

℥. Aquæ optimæ lb̄ vi. sacchar. ʒv. succi limonium ʒj. (plus minus pro ventriculi & caloris nativi robore, aut imbecillitate & agrotantis palato) scobis fantali citrini ʒj. Bulliant horam dimidiam, tum. d. cicto cinnamomi ʒß. colato & utitor.

Alii sacchari plus minusve inferunt, sumpta indicatione ab agrotantis natura, ætate, consuetudine, anni tempore, & partium nutritionis indicationum constitutione.

*Alium in elephante bilioso, fervente etiamnum circum viscera humore, commodior, sed insuavior.*

℥. Radicum cichorii agrestis, uvarum passarum purgatarum, glycyrrhizæ singulorum ʒij. hordei integri P.j. scobis eburnæ & corn. cervini, sem. feniculi, fantal. citrini, singul. ʒß. conserveant horam dimidiam in lb̄ viii. aquæ, dein decoctum transeoletur. In magno ardore plantago & lactuca recte inferuntur.

*Quum partium putredo invalescit, fervente etiamnum humore, profectu majore usurpatur, quod hic habet poculentum.*

℥. Radicum cichorii agrestis, uvarum passarum purgatarum, glycyrrhizæ singulorum ʒij. hordei integri P.j. niculæ, buglæ, pimpinellæ, calendulæ ulmariz, plantag. lagopi, singulorum P.j. scobis eburnæ, & cornu cervini, fantal. citrini singulorum ʒj. sacchari ʒvj. succi mali citrii ʒij. Coquito in aquæ lb̄ viii. ad lb̄vj. decoctum, percolato seposito, & utitor. Quum calornativus elanguescere incipiet, frigida detrahentur.

Destillatum instaurans magnatibus extra epulas in vini vicem ex usu affecta ætate & viribus labascentibus.

Vituli frustum & carnem capi in libris xvi. aquæ purissimæ, elixato dum viii. duntaxat libris supersint: adde sub finem veronicæ, utriusque buglossi, borraginis pimpini, faniculæ, calend. buglæ utriusque plantag. feriolæ singulorum Mj. rad. tunicis & tormentillæ, seminis cardui, scobis eburnæ, & cornu cervini singulorum ʒij. in colato jure, rursus adjicito conservæ buglossi, borraginis, violarum, nymphetæ, anæ ʒiij. conservæ ocellorum seu caryophyllorum nostratum ʒij. omnia in ollam vitream indito, ut in duplici organo aqua proliciatur, quæ saccharo vel Syrupo e limonibus, aut violaceo

& cinnamomi momento condita, usui apta sit.

Et his quidem, aliisque ejus generis potionibus, quas ex tempore & pro re nata, prudens & exercitatus medicus instituire poterit, elephantiasis occurratur. Jam purgationum formulæ describendæ.

℥. Polypodii querni, seminis cartami, radicis cichorii & oxalidis, uvarum passarum purgatarum, foliorum sennæ, singulorum ʒß. coquito igne remisso horæ quadrantem, dein adde buglossi, borrag. lupul. scolopendriæ, ceterach. adianti, fumariz, epithymi, singulorum lb̄j. conservæ buglossi, borrag. & viol. an. ʒij. seminis feniculi & melonum an. ʒß. conserveant rursus aliquantisper, dein in decocto percolato tepido, macera horis duabus rhabarb. optimi ʒijß. cinnamomi ʒß. in eodem expresso dissolve syrupi e fumariz ʒj. fiat potus mane sumendus hora quinta.

Si hoc agre movetur cathartico Elephanticus, Catholici descriptionis Fernellii ʒj. remiscebitur.

*Bolus si magis arridebit, esto hujusmodi.*

℥. Atramenti cassiæ recens extracti ʒi. sem. feniculi pulverisati gr. vi. Syrupi violati pauxillum.

*Vel sic.*

℥. Medullæ cassiæ recentis extractæ, Catholici descriptionis Fernellii, utriusque ʒi. Syrupi violati ʒj. misce, præbeto mane tribus horis ante cibum.

*Vel sic.*

℥. Cassiæ recentis purgatæ ʒjß. rhabarb. pulverisati ʒjß. sem. melonum mundatorum & contusorum ʒß. sem. feniculi, gr. iv. Syrupi violar. modicum, fiat bolus.

Si undique tenues etiam humores detrahere expedit, confectionis Hamech. ʒijß. inferentur, rhabarbaro quidem detracto, si effrenis purgatio metuitur, linnumus eo etiam relicto.

*Apozema primas corporis sedes expurgans, venarum infarctus melius expedit.*

℥. Rad. petroselini, feniculi, & apii, in aceto horis vi. maceratarum, singulorum ʒjß. rad. cichorii ʒij. rad. oxylapathi, oxalidis, asparag. & graminis, singulorum ʒß. foliorum sennæ ʒij. rad. hellebori nostratis præparatæ ʒij. Coquito in aqua ad doses tres, adde sub finem pimpinellæ, buglossi, borrag. endiviæ, scariol. lupulorum, omnium capillarium, fumariz, singulorum manipulum ʒß. florum cordi dicatorum, mentæ, epithymi, hyssopi, singulorum P.j. seminis feniculi, coriandri præparati & melonum, singulorum ʒjß. In colato decocto dissolve, syrupi e cichorio simplicis ʒiv. Clarificetur & condiatur ʒjß. cinnamomi, & ʒj. fantal. citrini.

*Alius parandorum apozematum modus, quo nihil virium coctione deperit.*

Omnia modo descripta simplicia medicamenta,



mentā, in ollam argenteam aut terrenam induntur, cum eo aquæ modo quem superesse volumus, (fere tamen apozema ad tres doses aquæ  $\mathfrak{z}\text{xx}$ . habet) olla dein luto philosophico obfignata, in caldarium ferventis aquæ collocetur, ut horas tres conserveant omnia: ubi olla à lebate summotā refrixerit, decoctum collo trajicitur: & syrupus aut saccharum additur, ut in tres aut quatuor doses alternis diluulis sumendis dividatur apozema.

Detracto helleboro, strenue quidem melancholiam detrahet, sed nec à cerebro, nec à venis majoribus satis efficaciter.

### *Syrupus solemnis.*

$\mathfrak{z}$ . Polypod. rad. oxylapathi, oxalidis, cichorii, buglossi. & borrag. uvarum passerum, glycyrrhizæ, singulorum  $\mathfrak{z}$ j. quinque capillarium, buglossi. borraginis, scariolæ, endiviz, chamædryos, singulorum M. j. Coquito in aqua ad  $\mathfrak{f}\mathfrak{b}$  j. Decoctum colo trajectum in ollam inditur, dein adjiciuntur foliorum sennæ purgatorum  $\mathfrak{z}$ vi. rad. hellebori nostratis præparati, feminis tæmculi, anisi & melonum, singulorum  $\mathfrak{z}$ ß. agnisci albi, rhabarbari selecti, contul. singulorum  $\mathfrak{z}$ ß. succorum endiviz, fumiterræ, maloru n redolentium, buglossi. borrag. aquæ rosarum,  $\mathfrak{z}$ ij. florum cordi amicorum, foliorum mentæ, hyssopi, origani, melinz, singulorum p. j. epithymi  $\mathfrak{z}$ ß.

Olla luto philosophico obfignata, in duplici organo (balneum mariæ vocant) fervere sinitur horis quatuor. Decoctum denique colatum cum duplo sacch. ri perpurgatum, in syrupum coquitur, in vase duplici, olla obfignata: dosis  $\mathfrak{z}$ ij. aut  $\mathfrak{z}$ ijß aut  $\mathfrak{z}$ ijj. cum pari portione decocti borraginis & glycyrrhizæ, bis, ter, quaterve mense.

### *Opiata.*

$\mathfrak{z}$ . Uvarum passerum purgatarum, uvarum corinthiacarum, jubarum, singulorum  $\mathfrak{z}$ jß. polypodii, querni, glycyrrhizæ, utriusque  $\mathfrak{z}$ ß. foliorum sennæ  $\mathfrak{z}$ iv. radicem buglossi. borraginis, & lupulorum, singulorum  $\mathfrak{z}$ j. coquito in aqua buglossi. igne remisso, ad  $\mathfrak{f}\mathfrak{b}$  jß. dein adde utriusque buglossi. utriusque asplenii, adianti utriusque singulorum M. ß. florum cordi amicorum & nymphetæ, singulorum p. j. sem. fœniculi, coriandri præparati, utriusque  $\mathfrak{z}$ ij. in decocti libra colo trajecta, dissolve sacchari optimi  $\mathfrak{f}\mathfrak{b}$  j. Coquito in syrupum, cui adde conservarum, buglossi. borraginis & viol. exquisite contritarum, singulorum  $\mathfrak{z}$ ijj. conservæ rosarum  $\mathfrak{z}$ jß. conservæ ocellorum, qui & caryophil.  $\mathfrak{z}$ ij. sem. frigidorum majorum mundatorum, sem. fœniculi, coriandri præparati, singulorum pulverisatorum  $\mathfrak{z}$ jß. santal. citrini, cinnamomi pul. utriusque  $\mathfrak{z}$ ß. atramenti, cassiæ  $\mathfrak{z}$ iv. fiat opiata mollis, ut ex cochleari vorari possit, cujus dosis erit  $\mathfrak{z}$ iß. aut  $\mathfrak{z}$ ij. mane, duabus horis aut cibum. Acrem ac ferinam omnium humorum qualiter frequenti usu domat ac demulcet, viscerum & humorum siccitatem temperat: quicquid ventriculum & intestina obsidet, strenue detrahit, simulque primas venas & viscera ipsa, obstructione liberat, earumque partium impuritatem sensim ac blan-

de in alvum deducit & expurgat.

Huc pertinet syrupus saporis purgatorius, à Mesue descriptus, & syrupus c cichorio compositus, cum  $\mathfrak{z}$ iv. rhabarb. pro libris singulis: hujus, aut illius, si tria cochlearia opiatæ superdantur, plenior, nec tamen molestior erit effectus. Dantur per se ab  $\mathfrak{z}$ ij. ad  $\mathfrak{z}$ ijj. idque ex cochleari, vel cum aquis cardiacis. Catholicum à Fernelio descriptum invalescentibus cruditatibus, & crascentibus humoribus commodissimum.

### *Lus pulli purgatorium.*

$\mathfrak{z}$ . Decocti pulli gallinacæ, & vitulinæ carnis  $\mathfrak{z}$ viii. in quo macera per noctem foliorum sennæ mundatæ  $\mathfrak{z}$ ß mane bulliant horam dimidiam, igne valde remisso: dein in percolato decocto, rursum fervere facito borraginis M. j. buglossi. oxalidis, an. p. j. origani, hyssopi, thymi, singulorum p. uxillum; decoctum percolatum, & præbeto tribus horis ante epulas. Si radicis nostratis hellebori præparatæ  $\mathfrak{z}$ j. inferetur, melancholicum humorem validius detrahit, nec nocuerit, modo ex longioribus intervallis repetatur. Simplex enim modo descriptum, semel aut bis quaque hebdomada tuto usurpatur, velut & opiatæ.

*Præparantia melancholicum humorem, quibus inter purgationum vices utendum erit.*

Accipe radicem apii, petroselini, & fœniculi, in acetum maceratarum horis vi. uvarum passerum purgatar. glycyrrhizæ, radicem, buglossi. borraginis, lupulorum & cichorii, polypodii querni, visci querni, corticis radicem capparis, & tamaricis, singulorum  $\mathfrak{z}$ ß. coquito horam integram in olla nova, dein inferito buglossi. borraginis, endiviz, scariolæ, fumariz, hepaticæ, utriusque asplenii, adianti utriusque, singulorum M. j. conservæ florum violarum borraginis, buglossi. nymphetæ, epithymi, singulorum  $\mathfrak{z}$ ß. quatuor sem. frigidorum majorum, sem. endiviz, lactucæ, fœniculi dulcis, singulorum  $\mathfrak{z}$ ij. in decocti libra dissolve syrupi & succis descripti  $\mathfrak{z}$ iv. Syrupi Byzantini  $\mathfrak{z}$ ij. parato apozema clarum & conditum  $\mathfrak{z}$ jß. santal. citrini, &  $\mathfrak{z}$ j. cinnamomi. Præbeto  $\mathfrak{z}$ iv. ante singulos pastus, idque in triduum ante singulas cathartes. Convenit quum pars humorum fervet & exurit, pars vero jam retorrida, contumaces obstructions invexit, quas solvere, tetros vapores discutere, cordis arcem ab eis tueri, & incendium internum restinguere, consilium est.

Aliud in elephante bilioso superiore, nisi obstructions multæ insint aptius, incipiente, augescente & vigente bilis retorridæ fervore: Eo enim represso, alia præparatione opus est, quæ postea tradetur.

$\mathfrak{z}$ . Rad. cichorii sylvestris  $\mathfrak{z}$ ij. radicem oxalidis, lupul. buglossi. borraginis, uvarum passerum, polypodii, singulorum  $\mathfrak{z}$ ß. glycyrrhizæ  $\mathfrak{z}$ ij. coquito igne remisso horam unam: dein adde utriusque asplenii, utriusque buglossi. utriusque adianti, lupul. fumariz, endiviz, scariol. plantaginis, singulorum M. j. conservæ, buglossi. borraginis, violarum, nymphetæ, epithymi, singulorum  $\mathfrak{z}$ ß. quatuor seminum frigidorum majorum, seminis fœniculi & endiviz, corian-



coriandri præparati, scobis eboris, & cornu cervi singulorum ʒ ij. in libra decocti, percolati dilue syrupi de endivia, descriptione Fernelii ʒ iv. paretur apozema conditum, santali citrini ʒ j. & cinnamomi ʒ iv.

*Syrupus è succis, melancholicum humorem & bilem atram demulcens.*

℞. Succorum depuratorum utriusque buglossi. & pomorum redolentium, singulorum lb ʒ. succorum oxalidis, lupul. & endiviæ, singulorum ʒ ij. sacchari albi lb ʒ ʒ. Perpurgato ovorum albuminibus agitatæ, atque in syrupum coquito, cinnamomi & santali citrini, utriusque ʒ j. conditum. In quem dein nodulum qui isthac contineat, diu macerari sines.

℞. Croci ʒ ʒ. granorum tinctoriorum ʒ j. ambaris emeticæ coloris gr. vj. ligni aloes ʒ j. fiat nodulus.

Ufus tempore, mito profectu inseritur tenuissimus pulvis auri præparati, pondo ʒ j. mane præsertim duabus horis ante epulas: vorandus autem ex cochleari, ne quid auri pereat, bis, terve in hebdomade.

Syrupus alius qui dum tetros melancholici humoris vapores strenue discutit, cordi etiam jucunditatem atque hilaritatem, & incensilis atque conflagentibus humoribus refrigerium præstat.

℞. Succis cerasorum rotundorum, rubicundorum, & acidulorum, bene maturorum lb ʒ ʒ. succorum buglossi. & borraginis, utriusque ʒ vj. in quibus macera noctem integram florum ocellorum, seu caryophyllorum nostratum ʒ ʒ ʒ. Mane expressis & abjectis floribus, alios rulum indito, quos exactis horis 24. exprimas & abjicias. eandemque operam tertio aut quarto repetito: in expressis, tandem succis, sacchari par pondus diluito, ligni deinde aloes & santali citrini momento adjecto. perpurgatum præsidium in Syrupum coquito.

Si succi fumaræ ʒ vij. inferatur, insuavius, sed aduersus melancholicum humorem efficacius remedium fuerit.

Syrupus de endivia à Fernelio descriptus, locum habet in elephante bilioso, quamdiu incendio conflagent viscera.

℞. Conservæ florum caryophyllorum nostratum ʒ vj. conservæ florum utriusque buglossi. liij. conservæ rosarum, & nymphææ, utriusque ʒ i ʒ. conservæ florum viol. ʒ ij. pulv. elect. diamarg. frigid. ʒ j. scobis cornu cervi, eboris, & coral. singulorum ʒ ʒ. auri præparati ʒ ʒ ʒ. ambar. gr. vj. syrupi è succis supra descriptis q. s. Confectio opiata, utitur mane, & sub horam somni, quum tetros bilis atræ vapores discutere, & cordi lætitiæ conciliare est animus.

Si propria ac peculiaris ægri natura, aut humorum exuperantium qualitas, aut anni tempus, præsidium, quod magis refrigeret, postulare videbitur, conserva florum cichorii recte inferetur: sin contra, quod magis concoquat, ac flatus discutiat, conservæ helenii, mentæ, & florum rosinarini, singulorum semuncia.

℞. Radicis siccæ helenii, uvarum passarum, Glycyrrhizæ singulorum ʒ ij. polypo. quercini, corticis radicis capparis & tamaricis, singulorum ʒ ʒ. coquito igne remisso, in aqua

purissima, ad lb j. adde sub finem coctionis asplenii, utriusque sicci p. ij. & quum ab igne summoventur, absynthii vulgaris succi p. i. conservæ viol. buglossi. borraginis, nymphææ & epithymi, singulorum ʒ ʒ. in comato, decocto, dissolve syrupi de succis suprapositi ʒ iv. Hoc apozemate ante pastus utendum fuerit ex intervallis, quum natus & cruditates invalescent. Cruda mire concoquit, crassa enim attenuans, & serosa ac tenuia coctione incrassans, flatus discutit, viscera obstructionibus liberat & corroborat, tetros melancholici humoris vapores discutit & mitificat: ut semel dicam, morbis omnibus à cruditate & frigida causa, aut viscerum imbecillitate natis, supra opinionem opitulatur, & tamen nihil calore nimio exurit: sed præparatus huius or melanagogo nedicamento ex intervallis repetito uti atheniensis.

Si forte à jecoris siccitate & fervidioris bilis æcervo metus est, ne repetito huius apozematis usu insolefcat, (quod tamen in omnibus calore insito jam effecto & frustrata coctione minime pertimescendum esse comperi) sylvestris cichorii radicis ʒ ij. commode inferentur, & opportune interjicietur purgatio. Huc pertinent Syrupus de Epithymio, Syrupus de asplenio, & Syrupus Byzantinus, & multo efficacior, qui sic natus.

℞. Rad. helenii siccæ ʒ iv. macera horis vj. in succis utriusque buglossi. dein adde omnium capil. epithymi, singulorum M. j. conservæ florum caryophyl. buglossi. borraginis, rosarum, singulorum ʒ ʒ. fervefacito igne valde remisso horam dimidiam, adjecta aqua sufficienti: tum imposito absynthii sicci vulgaris p. j. & ab igne summovento: in expressione dissolve sacchari albi lb j. Coquito in Syrupum conditum ʒ ʒ ʒ. cinnamomi, & ʒ j. santali citrini.

Ufus erit ante pastus ex cochleari ʒ ʒ ʒ. pro dosi, ad imminuentem ex utriusque visceris obstructione & imbecillitate, hydropem, cruditatem, atque ad omnem insiti caloris à frigida causa languorem. Cruda enim & crassa omnia concoquit & attenuat, frigida & serosa coctione incrassat, flatus discutit, fuliginosos atræ bilis vapores dissipat, viscerum obstructions expedit, ventriculi, jecoris, cordis, & pulmonum robur tuetur augetque.

#### *Remediorum cardiacorum & alexiteriorum forma.*

℞. Conservæ caryophil. seu ocellorum, buglossi. borraginis, violarum nymphææ, rosarum & cichorii, singulorum ʒ ij. auri in tenuissimum pollinem redacti, vel auri soliat, ʒ j. scobis eboris, & cornu cervini, coral. undonum, scobis cornu unicornis, singulorum ʒ j. ambar. optimi grana vj. Syrupi è succis q. s. fiat opiata, utenda mane ante epulas ʒ j. aut ʒ ʒ ʒ. pondere.

℞. Conservæ florum buglossi. borraginis, caryophil. nymphææ & cichorii ana ʒ j. mithridat. theriacis, utriusque ʒ j. scobis cornu cervini ʒ j. Syrupi de nymphæa q. s. fiat opiata. Præfertur in re tenui, quod minori conillet, & facile paretur, præsertim si calor jam deferbuit



nam affluente etiamnum humore, quæ sic habet, commodior erit.

℞. Conservæ florum cichorii ℥ ij. conservæ florum nymphææ, buglossi, borraginis, rosar. singulorum ℥ j. rasuræ cornu cervi ℥ j. conservæ ocellorum ℥ j. seminum quatuor frigidorum majorum purgatorum, singulorum ℥ ij. dysrupi è succis descripti q. s. fiat opiata.

℞. Scobis cornu cervini & eboris, unedonum, ossis è corde cervi singulorum ℥ j. coral. ℥ β. auri præparati aut bracteolarum ipsius ℥ j. β. ambar. ℥ β. conservæ caryophil. & borraginis anna ℥ β. sacchari rosar. sextuplum, fiat conditum.

*Aliud in re tenui.*

℞. Scobis cornu cervini ℥ i. scobis eboris coral. margaritarum splendidarum, singulorum ℥ j. conservæ buglossi, borraginis, nymphææ, ocellorum & cichorii, singulorum ℥ ij. sacchari ros. q. s. fiat conditum. Inclinate calore, in valetudinibus autem cruditatibus, mithridatii & theriaces utriusque ℥ j. inseretur: usus erit ex cochleari ante pastus, atque etiam sub horam somni.

Detrahis conservis ex utroque condito, pulvis fiet ex cochleari, ut conditum, ante pastus vorandus.

℞. Radicis tormentil. scobis cornu cervini & eboris, margarit. coral. singulorum ℥ j. scobis cornu unicornis, ℥ β. pulv. elect. di. margarit. frigidi, & de gemmis utriusque ℥ j. sacchari alb. diss. in aqua ros. ℥ vj. fiat elect. per tabellas pond. ℥ iij. quarum usus erit ante pastus.

Aquæ stillatitiæ, quæ ad frenandam luis venereæ perniciem præscriptæ sunt, hic etiam locum habere possunt: Alterutrius autem ℥ ij. cum syrapi violacei ℥ j. opiata, aut condito, aut tabellæ superdabuntur, quæ tamen sequitur peculiariter, elephanticum virus domat, ac serpentem putredinem inhibet, deploratis præcipue ad protrahendam vitam frequenti usu commodissima.

℞. Utriusque veronicæ, buglossi, borraginis, betonicæ, plantaginis, saniculæ, buglæ, lagopi, ulmaris, calendulæ, symphiti minoris, florum hyperici, & sambuci, cacuminum centaurii minoris, pimpinellæ, singulorum M ij. Contundito omnia, dein in ollam novam indito permistis, quæ sequuntur.

℞. Scobis cornu cervini ℥ β. scobis eboris ℥ ij. radicis tormentil. tunicis, dictamni, singulorum ℥ j. Conservarum nymphææ, cichorii, ros. buglossi, borraginis, singulorum ℥ iv. aquarum stillatitiarum cardui benedict. agrimonii, scabiosæ, succisæ, singulorum q. s. ut superemineant. Harum tamen loco præstantissima est aqua è sanguine humano, è plethoricis bene habentibus secta vena detracta, & à sero secreto elicitæ.

Omnia olla conclusa ac luto philosophico ob-signata in balneo Mariæ triduum macerantur, dein in alembicum vitreum conjiciuntur, ut aqua eliciatur, dosis ℥ iij. cum ℥ j. Syrupi violacei. Aqua è fecibus humanis elicitæ multis profuisse creditur, cujus tamen nullum feci periculum. Sed pane hordeaceo atque hordeatis vulgo appellatis cum vesci oportere tradunt,

è cujus stercore elicietur: saccharo, aut syrupo accommodato, & santal. momento condiri debet, & mane ægris nescientibus propinari.

*Fotus emolliens & rarefaciens.*

℞. Radicum althææ & liliorum, sem. lini, rad. helenii recentis, singulorum ℥ ij. malvæ violaris, parietariæ, acanthi, anagallisidis, meliloti, chamæmeli, singulorum M. j. hant duo sacculi, ferveant in aquis partibus aquæ & vini albi, ad fotum partis.

*Unguentum emolliens, rarefaciens ac detergens cutem.*

℞. Violaris mucaginis, sem. lini, & radicum althææ extractæ in decocto meliloti & chamæmeli ℥ iv. buryi salis expertis, ol. e sigillo Mariæ, & bryonia, quod postea tradetur, singulorum ℥ iij. ol. è myrrha elicitæ ℥ β. concinetur linimentum, quo mox a fotu pars illinatur.

*Fotus emolliens, rarefaciens, & discutiens oculis ex usu crassefcentibus membranis.*

℞. Fœniculi viridis, chelidonis, euphrasæ, chamæmeli, meliloti, malvæ, violaris, singulorum M. j. sem. fœniculi & lini, rad. althææ singulorum ℥ β. absynthii sicci p. j. Confice sacculos, quos in aqua & vino albo fervefacies ad fotus oculorum.

A fotu aqua instilletur huiusmodi.

℞. Chelidonis, euphrasæ, fœniculi, symphiti minoris, saniculæ, singulorum M. vj. sem. fœniculi cum aqua euphrasæ macerati ℥ j. Contusa omnia cum mellis libra, fimo equino in olla nova obruantur dies vj. dein aqua arte chemica eliciatur.

℞. Tutis præparatæ ℥ β. aluminis usti, vitrioli usti, utriusque grana iv. sacchari candi. ℥ β. lapidis calaminaris sexies usti & extincti aceto, & postremo in aqua fœniculi ℥ j. conficito pulverem tenuissim. tergendis & absumendis oculorum albuginibus, & attenuandis crassefcentibus membranis commodissimum.

℞. Succorum chelidonis, euphrasæ, & fœniculi, singulorum ℥ ij. sacchari candefacti ℥ iv. vitriol. usti grana vj. Coquantur in syrapi oculis instillandum ex intervallis.

℞. Unguenti de tutia ℥ β. cui adde vitrioli usti, aluminis usti, utriusque grana ij. saponis alb. ℥ j. conficito linimentum.

℞. Calcis vivæ ℥ β. fecis vini siccæ & calcinatæ ℥ iv. diluito in lixivio claro cineris filicis & corticis fraxini, dein sapius transcolato, ac tandem per feltrum lixivium elicito limpidum, denique vase æneo ad mellaginem coquito. Elephantica omnia tubercula exterit.

*Aliud dolore molestius.*

℞. Sublimati ℥ j. pul. mercurii ℥ β. unguenti rosar. descriptionis Mesues paulum, ut fiat linimentum.

Discissa tubercula in crustam indurat, qua decidua adæquatæ parti cicatrix inducitur.

*Aliud*



*Alium emplastri forma.*

℞. Vitrioli calcinati, auripigmenti usti, utriusque ℥ ij. emplastri de cerulla ℥ ss. malaxentur simul cum unguento ros. Mesue, fiat emplastrum, cujus portiuncula, discissis elephantiorum tuberibus, præmunita, refrigerant, & emplastico præsidio vicina, ne medicamenti acrimoniam & fervorem sentiat, imponetur.

*Emplastrum quod maculas Elephantiorum casem deturpantes extirpat.*

℞. Cantharidum pul. ℥ ss. saponis nigri q. s. ut unguenti fiat consilientia cum aceto modico, imposito ac finito dum vesica exuberet, superdato tamen emplastico remedio, quod vesicatorium contineat.

*Simplicia ad balneum Elephantiorum.*

℞. Malvæ violariæ, parietariæ, acanthi, singulorum M. iv. fumiterræ, morsus gal. utriusque M. iv. radicum althææ, sem. lini, utriusque lb ij.

*Unguenta Elephanticiis à balneo illinenda.*

℞. Succum fumiterræ lb ss. aqua ros. ℥ iv. rad. serpentariæ majoris ℥ ij. Coquito dum radix contabuerit, & succus pene absumptus sit terito, dein adde axungia porci, butyri recentis, axungia capreoli, singulorum ℥ iv. hydrargyri præparati ℥ ij ss. Caphuræ ℥ ij. singito limentum.

*Vel sic :*

℞. Butyri recentis salis expertis, axungia porci purgatæ, utriusque ℥ iv. eluito sæpius in succo fumiterræ, vel si hyems est, in aqua rosarum, dein addito, ac diligenter permisceto argenti vivi perpurgati ℥ ij ss.

*Catapotis ex hydrargyro qua retorrida bilis, & omnium acrim ac malignorum humorum ferociam domant & compescunt, eosque sensim expurgant, nullo ventriculi incommodo.*

℞. Argenti vivi cum panis adhuc calentis mica, manibus ut plumbaginem deponat ac expurgetur, diu subacti ℥ i ss. longa agitatione exacte misceto cum succi limonum momento, & olei e myrrha deprompti, semuncia adjecta terebinthinæ Venetæ, aqua ros. elotæ ℥ ss. his postea adde auri purissimi præparati in tenuissimum pollinem, vel si id desit foliorum auri ℥ ss. ambaris ℥ j. pulv. elect. Diamarg. frigidi & triasantaloni simpl. utriusque ℥ ij. aloës ℥ i ss. singito massam cum sequenti magmate.

℞. Foliorum fenugreci integrorum lb j. rhabarb. in frustula dissecti ℥ iv. rad. arctæ & tulfæ, hellebori nigri nostratis ℥ j. diem unum macerato in cœnostagmate, quod dein exprimito & vitreo vase exceptum, adjecta sacchari pari portione in diplomate exhalare finito, dum magna melaginem referat. Remedium hujus dosis fuerit ℥ ss. aut ℥ ij. quindecim alternis diluculis, tribus horis ante cibum catapotiæ specie.

*Calidis naturis commodius erit, quod sic habet.*

℞. Hydrargyri à plumbagine repurgati ℥ j. exacte misceto atque extinguito in aquis paritibus syrupi de limonibus & de succo salviæ adjecta terebinthinæ in aqua ros. elotæ ℥ ss. dein addé elect. Diamargaritionis frigidi & triasantaloni utriusque ℥ ij. pul. elect. tragacanthæ frigidi ℥ i ss. myrrhæ, croci, gentianæ, ana ℥ j. rhabarb. pul. ℥ ij. Aloës lotæ in aqua endivæ ℥ i ss. auri præparati ℥ j. singito massam, addendo ambaris moschi optimi, utriusque grana vj. syrupi de stœchad. q. s.

In re tenui aurum detrahatur.

Omnium remediorum Elephantiorum vires superat catharticum nostrum metallicum, acrem omnem ac ferinam humorum omnium qualitatem ac malignitatem mire obrundens, ac nihilominus blande adeo alvum solvens, ut pueris & prægnantibus tuto dari possit. Constat ex hydrargyro & auro sic permixtis atque immutatis longa maceratione, ut vim catharticam assequantur. Una autem & eadem opera & pituitam, ac crassos omnes humores expurgat, & calidam ac siccam viscetum constitutionem emendat, datur granorum sex pondere. Hoc remedium Cadomus præparat Petrus Philippus, olim nobilis Typographus. *Julius Palmarius de Morbis contagiosis lib. 4.*

*Curationes, Consultationes, Observationes  
& Anatomica inspectiones  
ex variis.*

*Curationes.*

Elephantiasis seu elephantica lues, etsi tantum involucri corporis aliqua cutemque impitum, eamque certis duntaxat in locis possideat, tamen ægeritumè, licet primum illa incipiat, præcaveri, multo minus si confirmata sit, curari poterit, præsertimque si hereditaria sit. Necdum qui eam curant, hactenus inveniuntur, quamvis ij qui psoram, falso ab imperitis pro elephantiasi habitam, curant, se elephantiasim sanasse, gloriantur. Quæ licet ita sint, tamen non negligenda hæc lues, statimque ab initio huic, omnibus artibus occurrendum, & si penitus impediri nequeat, saltem ut protrahatur quam diutissime fieri poterit, cura adhibenda. Atque ubi vitia eruperint, hisce delendis incumbendum, ne ægris si invalescant, tandem exitium pariant, cum nisi id fieret diu sæpe possent supervivere. Dein & cum deformitatem summam hæc vitia creent, ut minus suspecti, diutius in hominum consortio versari queant, cura interdum palliativa illis quoque adhibetur: Quam magnates à Medicis sæpe magnis promissis efflagitant.

Curatio elephantialis duplici modo instituitur: Primum generatim toti huic morbo accommodata, postea particulatim vitii tantum illius inde natis.

Generalis curationis scopus in eo consistit, si fieri possit, ut causam hujus luis, venenum scilicet illud evacuantibus educamus & qualitatem venenatam inde natam emendemus: Verum

Yyy cum



cum quæ peculiari quadam vi id efficiant, vel certis evacuationibus, ut in lue venerea, in hac non sint hactenus inventa, eoque modo in curatione illius procedere nequeamus; Curationis methodus plerumque vitis hisce pravis, quæ nascuntur delendis, accommodatur. Et proin cura non adeo abîmîlis huic, quæ in psora perversa, aliisque pravis maculis, pustulis ulceribusque malignis usurpari solet, in elephantiali quoque instituitur, sequentibus modis.

Purgationes prout corpus humoribus superfluis, vel excrementis scâtere cognoscimus, instituuntur, cum eas causæ venenatæ accommodare nequeamus, quam tamen ad melancholicum humorem educendum plerique dirigunt, præcipueque ea quæ illius excretionem moluntur, seligunt, permittendo, illius humoris acrimoniam sua humiditate & frigiditate contemperantia, quæ cum & aliis acribus salis & biliosis pertinacibusque humoribus expurgandis competant, uti in ceteris vitis externis inde genitis, in scabie perversa & in lue venerea, sic & in hac lue, in qua & hæc plerumque congeruntur, locum habebunt. Quibus corpora hæc præcautionis loco & ne augeatur malum, veris & Autumni tempore una vice vel pluribus purgamus: Interdum & intermediis temporibus, si impuritas cordis illud requirat.

Perficitur autem hoc rite: Primum levioribus communia excrementa eluendo: Ut injectione Clysmatis stimulantis, qualia passim describuntur, eaque quæ in melancholicæ veræ cura descripta sunt, hic quoque possunt competere.

Vel datur eo nomine Cassia, Catholicon, Tryphera persica, vel Saracenica, Diasena dissoluta cum aquis convenientibus, vel decocto cicorum, alove, vel cum Sero Caprino.

Vel ℞. Rhabarb. infus. in aqua Endiviz, vel sero lactis ʒj. vel ʒiv. Syrupi rosarum so. utivi ʒi. ʒ. Cassiæ vel Catholici, vel Tryphera persicæ ʒʒ. aquarum Buglossi, fumariz q. s. hat potio.

Horum loco vomitus aliquando, cum, ut minus excrementa coacerventur, juvet, in consuetis provocandus, tum levioribus sumptis, tum etiam fortioribus Hellebori præsertim usu concitatus.

Præparatio antè purgationem humorum præmittitur, cum Syrupis, ut violarum vel fumariz simplic. Buglossi, Endiviz; Vel etiam fumariz composito, Nymphææ, de Cucurbitis, dissolutis cum aquis fumariz, Lupulorum, Buglossi, Endiviz, Cichorii, Acetosæ, &c. Aromatis. pulvere Trionfantalon, vel Santalis.

Vel hoc decocto: ℞. Buglossi utriusque cum radicibus M. ij. rad. Graminis, Asparagi, Liquiritiæ ana ʒij. cort. Capparum, Tamaricis ana ʒj. Herb. Endiviz, Cichorii, Lactucæ, Cappill. ana M. j. florum cordial. Cicorum rubr. ana P. j. quatuor semin. frigid. Major ʒvi. Sem. anisi ʒij. Passul. mund. ʒij. nat. decoctio & in ʒij. ʒ. dissolve de Syrupis prædictis, q. s. vel adde saccharum, aromatis. Trionfantalon: Pro ʒ. vel 6. vicibus.

Vel utatur Julepo præparante in Melancholicæ cura exposito:

Qui ℞. Syrup. viol. borrag. &c.

Aut eo qui ℞. Succorum Buglossi utriusque, de Pomis redolentibus:

Vel decocto quod ℞. Rad. Buglossi utriusque. Purgamus post præparationem prægressam sequentibus:

℞. Rhabarb. infus. in aqua Endiviz ʒj. Agarici trochisc. infus. in syr. ros. sol. ʒij. Confect. Hamech vel Diasenæ sol. ʒij. Syrupi viol. ʒi. ʒ. dissolv. cum aqua fumariz, Lupulorum, &c.

Vel detur, Bolus: ℞. Catholici ʒʒ. Conf. Hamech ʒij. de succo Ros. ʒj. cum saccharo, hat bolus.

Aut hæc potio: ℞. Herbarum cum radicibus Buglossi alterutrius, vel Cichorii aut Endiviz, foliorum fumariz, summat. Lupuli ana M. ʒ. seminum Endiviz, Portulacæ, Melonum, Citri ana ʒʒ. Anisi ʒj. florum Cordial. P. j. passul. mund. ʒj. Prunorum num. v. pulp. Tamarind. ʒʒ. Radic. liquir. Polypod. ana ʒj. Foliorum Sennæ mund. ʒvi. Epithymi ʒij. adde sacchari, q. s. hat potio. Possunt infundi Myrobalanæ vel Rhab. vel electuaria in ea dissolva.

Horum loco dari possunt purgantia in Melancholicæ cura descripta:

Ut potio quæ ℞. Catholici ʒj. &c.

Vel quæ ℞. Sennæ, Polypodij, &c.

Vel Pilulæ ibidem propositæ.

Præparamus & purgamus interdum simul hoc Apozemate:

℞. Radic. Graminis, Asparagi, Rusci, cortic. Capparum, Fraxini, Tamaricis ana ʒij. Temperentur in vino acidulo, vel addito pauculo Aceto, radic. liquiritiæ ʒij. Rad. Enuiæ ʒj. Herbarum cum radicibus Buglossi utriusque Cichorii Acetosæ, Lapathij ana M. j. Herbarum fumariz, Lupuli, Mercurialis, Scabiosæ, Capitiarium ana M. ij. Herb. Endiviz, Dentis Leonis seu rostri porcini, lactucæ, Hepaticæ Lenticulæ aquat. ana M. j. Betonicæ, Thymi, summat. Rosmar. Chamæpit. Chamædr. ana M. ʒ. florum Cordialium, Genistiæ, Tamaricis, Nenuphar. ana P. j. Semin. quatuor frigid. Majorum ʒj. quatuor seminum frigid. Minorum ʒʒ. Sem. Acetosæ ʒij. Sem. anisi ʒij. Sem. fœniculi ʒj. Cicorum rubr. p. j. Passularum enucleat. ʒij. ʒ. Prunorum n. x. Jujub. Sebesten. ana par. v. Tamarind. ʒj. Polypodij quern. ʒiv. Sennæ ʒij. Seminis Carthami conquass. ʒi. ʒ. Epithymi ʒvi. Coquantur omnia in aqua cum radicibus eorumque infusione ut dictum, addendo sacchari q. s. aromatis. Santalo citrino, cinamom. vel pulvere Trionfantalon, vel Diamarg. frigid. Pro ʒ. vel 6. vicibus.

Per vices purgationes instituuntur, alias continuando per aliquot dies, alternis tenus, quaternisve semel, vel bis usurpando, prout corpus excrementis redundare videmus.

Syrupi, in hanc rem parantur, qui ad usum diutius conservari possunt: Componiturque ex apozemate prædicto purgante & præparante convenienter talis. Recipiendæ radices, herbas, flores, fructus, semina uti illic demonstratum, atque addendo Tamarind. ʒij. Polypodij ʒvi. Foliorum Sennæ quart. j. ʒ. Seminis Carthami conquass. ʒij. Epithymi ʒj. Hellebori nigri ʒʒ. factaque decoctione in l. q. colaturæ, infundendo Myrobal. citrin. indarum confricat. oleo amygdal. dulc. ana ʒij. Rhabarb. ri ʒʒ. Spicæ ʒʒ. Cinamomi ʒj. Agarici trochiscati ʒv. factaque expressione, miscendo Syrupi rosarum solutivi ʒiv. Sacchari ʒʒ. & decoquendo ad



consistentiam Syrupi: Cujus decens quantitas per se, vel cum jure Cicerum, aut sero lactis, vel decocto Mercurialis exhibeatur, vel cum aquis convenientibus.

Ex succis sic her: ℞. Rad. Polypod. liquiritiz ana ℥ iij. foliorum Sennæ ℥ iv. Seminis Carthami conquass. ℥ ij. Epithymi ℥ vi. Tamarind. ℥ ij. passul. ℥ j. Senun. Anisi ℥ ij. fiat decoctio in sero Caprino & in colatura ℥ iij. adde succorum fumariz, Lupulorum, Buglossi alterius, scabiosæ, lapathij ana ℥ iij. Iterum decoquantur & despumantur, addendo sacchari ℥ iij. coquatur ad consistentiam, aromatizetur Santalis & cinamomo ad usum. Si succus Mercurialis addatur, erit efficacior.

Hellebori dilutum seu decoctum, ut ipsius acrimonia minuiatur, aliqui sic parant. Fit decoctum in aqua ex endivia, cichorio, Buglossio, utroque, atque in ℥ vi. colatura infunditur Hellebori nigri radic. incisorum ℥ i. & post macerationem aliquam decoquitur ad consumpt. duarum partium. Et de tertia dantur ℥ iv. cum Syrupi viol. ℥ iij. continuando per aliquot vices.

Epithymi pulverem ad ℥ ij. cum sero Caprino per mensis spatium & ultra propinant. Operabitur melius si pulveris & Epithymi, & Sennæ ana ℥ j. Tartari ℥ iij. Sacchari Candi ℥ j. cum sero detur, aliquandiuque continetur, quibus & alia ut Turbith addi possunt, & quæ grata sunt, pauca aromat. Quæ rectius quam pulvis Diasenæ, quem alias commendant, propinantur.

Electuarium gratum laxans: ℞. Pulpæ Cassiz fistularis ℥ i. Pulpæ Tamarindorum ℥ i. Pulpæ passul. majorum & Prunorum dulc. rob. de Pomis redolentibus ana ℥ j. Syrupi violac. & Ros. solutivi ana ℥ i. Diagrydij ℥ ij. Subtilissime tritum Sacchari Candi ℥ iij. Turbith. ℥ iij. Pulv. rad. Liquirit. & Cinamomi ana ℥ iij. Misce in formam electuarij: Capiat ℥ ij. experiundi primum gratiâ, postea plus minusve prout operatio successerit.

Medicamentosum saporem magis habebit, si omisso Diagrydio & Turpeto, hisce pulpis Catholicon, Trypheram, Syrupum rosarum solut. cum infus. Rhabarbari addas: Item pulv. Rhabarbari, Sennæ. Vel fortiora solutiva elect. ut de succo rosarum, Hamech, Diasenam, de Citro similiaque.

Conveniunt & in eisdem usus ejusmodi per vices usurpatæ purgationes, in melancholiz cura exposita: ut apozema vel Syrupus ex succis parata: vel vinum aut electuarium: Pulvis item.

Uti & alia aliqua, quæ in cura scabiei pervertæ fuerunt, declarata ut serum lactis cum permissione aliorum; Syrupi item usuales decoctaque purgantia: Ex succis paratus Syrupus: dein & vina purgantia: In primisque Infusum vel decoctum Hellebori potionisque aliz electuaria & pilulæ, quorum illic meminimus.

Multa quoque in lue venerea exposita purgantia, maxime quæ in acrium humorum redundantia illic competere diximus hic quoque usurpari poterunt.

Finitâ purgatione visceribus robur additur, exhibitione conservarum rosarum, Buglossi utriusque Cichorij, Violarum, Capill. Ne-

nuph. vel tabul. Diarrhodon, Trionfantalon Diamargaritonis: vel Theriacæ, cum conservâ Bugloni similibusve.

Sanguinis detractio per venam sectam, Veris & Autumni temporibus, cum generales purgationes nunt, ante horum usus institui solet, ad generalem totius corporis evacuationem faciendam, cum aliquam per eam semina hujus luis, quibus sanguis in venis, uti ostendimus infectus non est, tolli nequeat, atque eo nomine minime institui debeat. In quo hæc in brachio atque in plethoricis mox quoque sequentibus diebus in manu vel pede: Vulgo si sapius phlebotomia utantur, hæc malum præcaveri posse creditur: Cum tamen per eam corpore exhausto, lues citius & amplius invalescat. Temere quoque ut vulgatæ opinionis fassit, sanguis, ut ex eo lues hæc cognoscatur, dum exanimi filantur, emittitur & censetur.

Scarificationem singulis mensibus repetitam, in scapulis, tibiis, adhibitis insuper cucurbitulis, convenire admodum credunt; vel etiam sanguisugas illic adhibitas.

Menses movere, si tardi vel omnino suppressi sint, valde utile, vena Malleoli sectâ, aliive illud præstantibus.

Hæmorrhoides provocare imprimis quoque conveniens, applicitis in podice sanguisugis, aliive admotis.

Ultio per Cauteria actualia & potentialia, si forte extremum hoc remedium aliquid efficere posset, aliquando tentatur, non solum in brachio aut tibiis, uti magis consuetum, sed & in capitis superficie quandoque facta.

Castratio in virili sexu a veteribus in desperatis interdum instituebatur: idque fortè quod per eam totius corporis temperamento immutato, in iis sic effeminatis rediitis, atque aliam planè constitutionem adeptis. mortuum hunc facilius cessurum, crederent. Quo remedii genere eo minori cum difficultate sunt uti, quod elephanticis alioquin ne alios inficiant, congestus interdictus sit, & illis sublata virilitas nullum afferat in ea functione ipsis non necessaria, incommodum, utque etiam eo nomine à coitu arcerentur, quàm ut sic curarentur.

Alteramus ipsorum corpora, ut si fieri possit in meliorem statum ducantur: Verum cum intemperies non manifesta, ratione hujus luis se patefaciat, non quæ certâ qualitate contraria illi resistant, possunt illi opponi: Sed usurpantur plerumque quæ acrium humorum proventum impediunt, eosque contemperant. Dein & cum observatur in ejusmodi corporibus siccitas, ariditasque & consumptio quædam; quæ humectando reficiendoque corpora ejusmodi, restaurent reficiantque, plerumque ipsis præscribuntur. Inter quæ multa ex illis quæ in hæctica competere diximus, hic quoque possunt convenire: uti & sequentia.

In Aëre puro, non valde fervescente, sed temperatiore versentur, sintque procul ab illis qui hac lue infecti sunt, semoti.

Cibus euchymus ex carne juniorum animalium, jusculis, ovis, lacteiniis, oleribus, fructibusque humectantibus & temperatis: Ut in hæctis & consumptis convenit.

Ranarum uti & Astacorum Anvatiilium & Testudinum aquaticarum & nemoralium carnes



comestæ, uti in hæcticis sic, & hic probantur.

Potus sit aqua vel vinum non nimium potens vel dilutum: interdum & lac caprinum bibant, aliaque decocta in hæctica exposita.

Medicamenta varia quæ refrigerant & humectant seu temperata sunt, atque acres humores contemperant, hinc inde in aliis vitis externis descripta, hic quoque possunt competere. Uti & illa quæ in febre hæctica describuntur: Julepi, Syrupi, Aquæ, Confectiones, Conditura.

Inter reliqua hoc electuarium maximè illis conveniet:

Quod ℞. Conf. florum Buglossi utriusque ʒi. β. florum Cichorii, Violarum, Nymphaeæ & Rosarum ana ʒi. Capill. Vener. Rosmar. ana ʒβ. Rad. Buglossi condit. ʒj. Specierum Triontantalon vel Diarrhodon, Diamarg. frigid. ana ʒβ. trochiscorum de Camphora ʒj. cum syrupo de Pomis redolentibus, misce.

Superbibat aquas Fumariz, Lupul. Buglossi utriusque, Endivivæ, &c.

Alia multa quæ hepati conveniunt & lieni quorum vitio sanguinem immundum genitum huius occasionem præbere putant, propinant, & foris simul hisce visceribus applicant, passim in morbis ipsorum ab intemperie calida & obstructione progressis descripta. Quæ tamen nisi hæc viscera manifestè sic affecta cognoscamus, inutiliter plerumque usurpantur.

Antidota quædam quæ peculiari vi elephantiasis contraria esse creduntur, præceteris commendantur, suntque sequentia.

Viperarum carnem quocunque modo assumptam, in primis elephantiasi resistere, plerique statuunt. Alij etiam aliorum Serpentum cujuscunque generis, etiam cæcorum usum, cutem cum vitis illi adnatis abscedere posse, ex eo colligunt, quod cum ejusmodi serpentes exuvium quotannis exuant, hoc ab innata illorum carni vi præcedere, & proin etiam in homine idem operari posse, existimant.

Exhibetur autem hæc caro ipsis, præparata variis modis: Aliàs cocta in jure aliquo convenienti cum sale, uti anguillarum caro, pelle etiam, uti in illis, prius detracta, aut alioquin per coctionem detersa, capiteque & caudâ amputatis, & exenteratis visceribus: sic enim, cum se anguillas comedere, illis persuadeatur, minus à cibo hoc abhorrebunt. Licet & aliter sic coctam & dein incisam, aliove modo conditam, ut minus eam agnoscant, præparatione possimus efficere. Cujus usum cutem squamarum instar certis in locis vitiatæ abscedere, aliqui prodiderunt.

Sufficit & jus interdum, in quo caro hæc coxerit, ut illud sorbeant, vel una cum carne comedant. In quo præter sal, semen Anisi, Anethum decoqui possunt: alij etiam Menthæ addunt vel Porrum.

Syrupus ex Jure prædicto Serpentum, addito Saccharo, Cinamomo, aliquando coquitur, ut ad usum diutius asservari possit: Eaque formâ sæpius exhibetur.

Alij, si Gallinæ carne serpentum tamdiu donec pennæ illis decidant, saginentur, & postea coctæ comedantur, idem præstare docent.

Sunt qui & Vinum in quo vipera extincta fuerit, propinatum præbent.

Exiccata quoque caro viperarum, ut diu ad usum servari, & cum non passim vipera invenian-

tur, etiam alio transmitti queat, in trochiscos redigitur. Ad quos parandos sumitur caro ipsarum tantum, abjectis uti dictum etiam extremitatibus & visceribus, atque cum Anetho & sale in aqua coquitur, postea tunditur, & cum panis triticeus micis quarta parte in pastam cum jure subigitur, indeque in Pastillos formatur atque exiccatur: Talesque Pastilli, trochisci de Therio quo nomine vipersas Græci appellant, vel de viperis nominantur. Licet & serpentibus aliis eodem modo paratos, æque efficaces esse aliqui judicent.

Hi autem trochisci rarius per se, sed cum conservis permixti usurpantur. Quales in electuario supradicto descriptæ fuerunt. Cui & si trochiscorum horum ʒj. vel plus addatur, efficacius reddetur. Dein & cum hi trochisci Theriacam subeant, eam propter ipsos, vel quia aliàs venenis resistit, huic veneno adversatur, Elephantiasis quoque exhibent.

Astacorum fluviatilium, cancrorum vulgò dictorum carnem, eadem vi qua & serpentum operari, ex eo quod uti illi exuvium sic & cancrum testam quotannis mutant, colligunt, nec solum vi resciente, quæ & prodesse diximus, sed & hac potissimum operari, putant.

Herinacei terrestres carnem exiccata seu assam in cibis quoque exhibet Dioscorides & Salamandram aliis medicamentis miscet: Quæ si quid in hac lue possunt, proprietate quædam illud moliantur.

Sanguinem humanum à recentè jugulato, bibitum, profuisse, historiæ aliquæ, si non potius fabulæ sint, testantur: Aquam inde destillatam similiter probant.

Cornu Cervi & Eboris rasuram elephantiasis, ut & aliis venenis resistere aliqui docent. Imprimisque magnatibus, unicornu, ut pretium augeatur, commendant, magnique faciunt.

Smaragdi pulvis exhibitus aliquibus magni fit.

Lepræ perfectam curam Chymici pollicentur, per legitimum usum Auri potabilis, Tincturæ Antimonij exaltatæ, Tincturæ veræ & genuinæ Coralliorum, adhibitis specificis purgantibus, inter quæ extollunt, Arcanum Corallinum, Mercurium dulcem, pilulas Antimoniales per secessum tantum purgantes: Clarissimus D. Hartmannus Viridelli, & Essentia sulphuris vitrioli dulcissimæ usum, in cura lepræ in sua praxi Chymiatrica docet & commendat.

Externa remedia, quibus in generali elephantiasi utimur, sunt Balnea, si forte illorum continuo usui, vis illa venenata & maligna cuti membranisque impressa, auferri atque extirpari posset, & si hæc lues mature præcaveri, aut etiam si jam invaluerit, curari: Vel saltem per hæc in delendis tuberculis, ulceribus & cutis scabritie, quousque hæc deformitas palliari. Suntque ejusmodi balnea vel naturalia vel artificialia.

Naturalia balnea sunt aquarum dulcium calefactorum, quæ certis temporibus corpore prius & postea quoque bene purgato, frequenter usurpata, Veris & Autumni temporibus, ante & post prandium, in iis sedendo, perseverando in usu horum per tot dies, donec cutis efflorescat, rursusque sanetur, de hac causa maligna in superficie cutis latente, multum demere possunt.



Thermæ Naturâ calidæ validius id præstant, Sulphureæ præsertim, quales sunt in Helvetia nostra, in Argovia Badenses, in Valesia Brigen-  
ses, aliæque aliis in locis, quæ uti scabiem cuius-  
cunque generis, vi singulari, uti in ea dictum,  
sanant, sic & in hac eadem vel malignam ul-  
cus vni absolvere, vel tantum vitia inde nata,  
si non penitus, saltem ex parte delere possunt;  
si diu illis, uti alias heri solet, utantur. Eoque  
nomine ad has thermas non solum, cum de hac  
lue constat, sc. ut malum celare aliquandiu pos-  
sint conferunt, sed & cum de ea adhuc dubi-  
sumus, post exanien, eò, an forte aliqua inde  
se quutura esset mutatio, illos ablegamus.

Artificialia balnea humida in quibus sedeant,  
illisque uti de naturalibus dictum, diu utantur,  
ex aqua sunt, in qua varia, quæ cutem rarefa-  
ciendo & detergendo pravos succos absument,  
decoquantur. Qualia sunt ex radicibus cum  
solus, Althæa, Lappathum, Ebulus, Enula: radi-  
ces item Ari, Serpentariæ, Cucumer. agr.  
Bryoniæ, Cyclaminis, Iridis, Raphani, Helle-  
bori utriusque, Liliorum; Item herba una cum  
radicibus, Malva, Buglossum utrumque, Cicho-  
rium, Eridivia, Sonchus, Beta; Item Absin-  
thium, folia item Senæ, fumariz, Lupuli, Sca-  
biolæ, Saponariæ, Parietariz, Violariæ, Hepati-  
cæ, Lenticulæ aquaticæ, Senecionis, Acerolæ,  
Agrimoniz, Artemisiz, Plantag. Polytrichi,  
Hederæ utriusque, Chelidonijs utriusque, Nym-  
phæ, Tamaricis, Flores Chamomill. Meliloti,  
Sambuci. Dein & fabæ aliæque legumina. Furfur  
macrum, Semina Lini, Fœnugræci, & Cucurbi-  
tacei generis.

Hæc plerumque sulphur, Alumen vel Sal ad-  
dunt, maxime ubi jam aliquoties leviori deco-  
cto uti fuerint.

Adduntur & alia, forte artuum causâ, Pri-  
mulaveris, chamæpityl. Item odoratz plantæ,  
ut Calamintha, Rosmarinus, Lavendula; sunt  
qui & quinque Aperitivas radices addant.

In scabie perversa exposita balnea humida  
non nullum ab hæc differentia, hic quoque lo-  
cum habere possunt: Imprimisque efficax illud  
quod Gypsum cum alijs recipit. Uti & decocta  
quædam, quibus maculas vitiosas abluere debere,  
in illa ostendimus, pro balneo hic usurpato po-  
terunt.

In sanguine humano si sedeant, eoque balnei  
vice utantur, profuisse quibusdam, historiz  
aliquæ testantur.

Sicca balnea in aëre calefacto, cum nimium  
corpus accendant, & violenter ad superficiem  
corporis, humores propellant, non ita proban-  
tur. Possumus tamen & illis, ex suffitu deco-  
ctionis balnei humidi, leviter calefactis & te-  
pescatis, aliquando corpus, antequam balneum  
humidum intretur, ut hoc melius operetur, sic  
disponere.

Allitiones variz quoque extrinsecus pro ge-  
nerali etiam cura hujus luis sunt, in corpore  
hinc inde, ubi præsertim cutis pustulosa, ulce-  
rosa & scabra tumidaque occurrit, ad vitia hæc  
tollenda, & si fieri possit, malignam illam im-  
pressam qualitatem aliquo pacto auferendam.  
Fiuntque ex illis quæ vi exiccante detergen-  
teque illud agant, additis insuper iis, quæ pro-  
prietate quadam id efficere posse existimantur,  
qualia à Serpentum genere desumpta exsunt

sic æruginam illorum mundam, idem quod  
carnem ipsorum assumptam, præstare posses-  
putant, nimirum ut cutis inde cum vitis illi  
adnatis abscedat. Uti & oleum in quo caro  
Serpentum coxerit, vel serpens vivus invocatus  
fuerit: Carnem ipsam coctam aliqui inunctio-  
nibus quoque miscent.

Ex prædictis itaque tale fiat Unguentum.

℞. Radic. serpentar. utriusque, Asphodeli  
vel liliorum, Enulæ campanæ, Betæ, croci sativi  
ana ℥j. pistentur optime oleo rosaceo ompha-  
cino, adde unguenti Citrii ℥ss. Axungiz ser-  
pentis ℥ij. Terebinth. ℥ss. Olei de frumento  
vel vitæ ovorum ℥ij. Olei de Tartaro ℥ij.  
Sulphuris vini, Nitri ana ℥ij. Lithargyrii vel ce-  
rutz ℥ss. Boracis ust. ℥vi. Tutiz præpar. Sar-  
cocoll. nutrit. thuris ana ℥ij. Mucilag. sem.  
lini ℥ij. Succ. Lappathi, fumariz, limoni, ana  
℥ij. Agitentur invicem in formam nutriti  
Ungantur partes scabræ, ulcerosæ & pustulosæ.

Vel fiat tale: ℞. Succorum Limontum, vel  
arant. vel citri, Lappathi, fumariz, scabiosæ,  
enulæ camp. ad ℥j. Aceti ℥ij. Aquæ vitæ ℥j.  
Olei rosac. omphac. Myrtillorum vel Maltichu-  
ni ana quart. j. β. coquantur ad succorum con-  
sumpt. addendo olei vitæ ovorum ℥ij. de  
Tartaro ℥ij. Saponis gallici ℥ij. Axungiz  
serpentis ℥iv. Pomatz ℥ij. Fellis tauri vel hir-  
ci ℥ss. Mucilag. sem. psyllij vel lini ℥ij. Mellis  
℥ss. Radic. Ari vel serpent. cucumer. agrest.  
cyclaminis, Ireos, ana ℥ij. Hellebori utriusque  
℥ij. seminis Naph. agr. Raphani ana ℥j. Bora-  
cis & Tartari usti ana ℥ss. Sulphuris vini ℥ij.  
Oliis sepiz ℥ij. Cochlearum terrestr. cineris ℥j.  
Camphoræ ℥j. Lithargy. tutiz & cerutz ana  
℥ss. Agitentur diligenter & fiat linimentum;  
Pro partibus affectis in corpore.

Hæc & alia addi possunt, veluti oleum de  
frumento, de semine raphani, oleum in quo co-  
xerit serpens, succus cyclaminis: item Nitrum.

Possit & argentum vivum hæc unguentis  
addi, quod licet venenatam illam vim in ele-  
phantiali, uti in lue venerea, minime extirpet,  
& proin non eam uti illam sanet, tamen quia  
vitia hæc externa in cute, in utrisque admodum  
emendare solet, ob eam causam illis quando-  
que misceri poterit, non tamen eâ quantitate  
aut ea ratione, præsertim si generaliores hant  
inunctiones, qua luis venerea venenum expel-  
lit, non possit hoc in elephantiali præstare, sed  
saltem ad vitiorum ablationem opitulari, &  
proin in particularibus, quæ tantum ut pustulis  
adhibentur remedijs, rectius usurpatur. Quod si  
tamen generalibus etiam inunctionibus permis-  
cere velimus, poterimus prioribus unguentis  
primò præsertim, argenti vivi ℥j. addere.

Vel tale cum eo linimentum parare:

℞. Unguenti Citrii quartarium j. Olei ovo-  
rum ℥j. Olei de Tartaro ℥ss. Argenti vivi dis-  
soluti cum pauca terebinth. & unguento præ-  
dicto. ℥ss. Succ. Limontum vel arantiorum ℥ij.  
Boracis ℥ij. Radic. serpentariæ vel ari, lapa-  
thi & asphodeli vel liliorum, parum tostorum  
& contul. & cum prædictis mistorum ana ℥ij.  
Misce.

Si prædictis linimentis & unguentis theria-  
ca Andromachi & oleum Juniperi admiscean-  
tur, valde augebitur ipsorum virtus & ope-  
ratio.



Particulares applicationes, vitis tantum adhibentur, à huc hac prodire solitis, ut licet lues hæc sanari nequeat, saltem vitia hæc minus deformant aut noceant. Usurpanturque tum in vitis externis, si forte ea delere vel aliquo pacto imminuere aut obliterare, ut minus appareant, possint, ut pustulis & ulceribus internis, in Dyspnæa, atque oculorum Pellicula.

In pustulis externis, tuberculis, aliisque tuberositatibus cutis, tum in facie ubi magis patient, tum aliis in locis, applicantur remedia: Finitque ex illis quæ exiccando detergendoque, potissimum illud agant, vel vi potentiore & caustica. Quæ ratione & cutis nigredinem in cosmeticis & maculas & pustulas rubras aliasve pravas, ut vitiliginis similesque deleri, in ejusmodi vitis ostendimus. Quæ remedia externa illic exposita, tam leviora, quam fortia, uti & interdum caustica illic enarrata, cum pustulæ delendæ sunt, hic quoque locum in ejusmodi vitis tollendis habere possunt: Quæ variis modis & formis applicantur.

Ex illis quæ nondum erodunt, aquæ destillatæ ad faciem plerumque usurpantur. Qualis hæc est.

℞. Sulphuris ℥vi. Tartari calcinati ℥ij. salis nitri, vitri crytallini calcin. ana ℥j. Thuris, Myrrhæ, ana ℥iij. Camphoræ ℥j. Succu Lappathi, ℥iv. Succu Limonum ℥ij. Aquæ rosarum, florum fabarum vel florum Nymphææ aut Plantag. ad ℥bj. destillentur.

Alia aqua: ℞. Tartari calcinati quartar. j. Boracis ℥b. Thuris vel Maltiches ℥ij. Sacchari candi ℥j. Camphoræ ℥j. pulveris, & subigantur cum mucilagin. Seminis psylli vel infus. Gummi tragacanth. factis cum aqua flor. fabarum vel nenuphar. ℥vi. albumin. ovorum agitatis num. 3. succu Limonum vel Arantiorum ℥ij. vel iij. Destillantur in Alembico.

Aliæ aquæ quoque idem præstare possunt in discoloratione, inter cosmetica expositæ efficaciores, quæ urinam, tartarum, sublimatum cum cæteris recipiunt, vel ex pluribus componuntur & in pustulosa rubra facie, descriptæ aquæ, imprimisque illæ quæ Lithargyrium & tartarum cum aliis admittunt. Dein & in maculis aliis diversorum generum ibidem declaratæ aquæ ex variis compositæ & cum tartaro effectæ.

Liquor albus, quo instar lactis vaginalis uti possunt, ad illinendam faciem aliave tubercula:

℞. Lithargyr. ℥iij. Aceti albi ℥vi. Succu Limonum vel arantiorum ℥ij. Aluminis vel salis gemmæ ℥ij. Tartari calcinati ℥b. Camphoræ ℥j. Macerentur & agitentur sæpè, ad usum, vel coquantur parùm, si statim eo uti velimus.

Vel sulphuris, salis nitri & Crystalli seu vitri Crystallini tenuissimè triti aquæ portiones, parùm coquantur, in aceto forti albo: Et cum colatura facies illinatur.

Alii liquores in facie pustulosa in discolorationibus descripti cum sulphure, vel lactei ex lithargyrio parati; horum loco usurpari poterunt. Uti & lac virgineale in maculis aliis ibidem declaratum.

Inunctiones privatis partibus adhibentur variz, quales in discoloratione copiosè sunt expositæ, ut in cosmeticis, unguentum citrinum, quo facies illinitur potissimum, paratum uti illic descriptum fuit. Dein & in pustulosa rubra

facie, propositæ ex variis concinnatæ: Uti & in aliis maculis illic descriptæ, ex succis plantarum, aliisque inde petitis, & ex oleo vitellorum ovorum & tartari, aliisque cum helleboro factæ: Item ex sanguine leporis & fellibus. Inter quæ Capræ sylvestr. fel in elephantiasi probat Dioscorides, oleum lacertæ etiam hic magni sit.

Aliud ad pustulas valde efficax unguentum.

℞. Aloes ℥iij. Radic. Asari ℥j. Hellebori utriusque ana ℥b. Seminis Staphi. Agr. ℥j. Colocynthid. ℥b. Felli stauri q. s. fiat linimentum.

Ex argento vivo, in discolorationem uti & in luis venereæ maculis & pustulis enarratæ illitiones, hisce quoque vitis appositæ; admodum opitulantur, quæ inde peti possunt.

Aliqui hoc remedium extollunt: Ova duo vel tria macerentur in Aceto forti tamdiu, donec testa consumatur, postea contundantur, addendo quartam partem illius aceti; misceaturque pulvis Thuris, Pro facie inungenda. Si Saponem nigrum vel aliud addas, efficacius erit.

Caustica quibus ad pustulas delendas utimur, in discolorationibus copiosè fuerunt in macularum cura exposita, ex sublimato plerumque præparata. Uti & cauteria, quibus in elephantiorum vitis delendis quoque uti possemus.

Vel fiat talis illitio. ℞. Unguenti Citrini, olei de Tartaro an. ℥b. succu limonum ℥j. sublimati ℥b. axung. Serpentis vel gallinæ ℥b. fiat linimentum: Pro facie.

Sunt qui vermes natos in serpente sub terra desosso colligunt, eosque siccatos cum Cantharidum æquo pondere & acri aceto subihunt, atque in unguentum redigunt.

Ablutiones faciei sunt, ut unguenta aliaque abluamus, ex decocto furfuris macri, fabis conquassatis, illarumve Corticibus ciceribus oryza, Hordeo, lupinis confractis saltem non in farinam redactis, ne passa cum decoquitur, fiat, sicuti & decoctum pro facie illustranda, in cosmeticis fieri diximus. Cui decocto & flores Fabarum, Nenupharis addi possunt, & Malum arantium in frusta dissectum prius.

Vel lavetur facies aliis aquis, ut florum fabarum, vel decoctis, in facie tuberosâ rubrâ, vel fuscâ, in cosmeticis & maculis expositis.

In vlceribus externis, serpentibus, callosis, multa ex illis remediis, quæ pustulis convenire diximus, juvare poterunt. Vel utimur illis quibus alia prava ejusmodi ulcera curari, in doloribus exposuimus:

In pilorum casu topicis præsidis in pilorum defluvio in deformationibus prolixè expositis, illud quoque vitium avertere studebimus.

In pustulis internis & ulceribus inde natis, narium, palati, faucium, non alia remedia, quam quæ in cæteris harum sedium ulceribus, in doloribus descripta sunt, quoque adhibentur. Uti & si columella exesa sit, raucedoque inde proveniat, sicuti in utroque hoc affectu quoque ostensum, procedendum.

In dyspnæa & raucedine, pulmonum affectionum causa, quæ in illis affectibus cura describitur, etiam hic adhibebitur. Et si narium obstructarum causâ difficulter aerem attrahant, illic quoque, quid agendum, declaratum fuit.

In oculis enascentis pellicula carneâ rubrâ, ne pupillam obtegat, & cæcitatem pariat, matura



tute quantum & quandiu fieri poterit, impediendum, idque non alia ratione, quam ea, quæ in panniculi oculi cura, in visus læsionibus, tum si alias ob causas, tum ob hæc eveniat, fuit copiose descripta. Quod si palpebrarum accedat rubedo, xerophthalmia vel scabrities, eodem quoque modo in illis, uti in aliis illorum ejusmodi affectibus, procedendum. *Felix Platerus Praxis Medic. T. 3.*

### Consultationes.

#### De Lepra. Pro Eleganti Muliere Cretensi.

Cum juvenis Hebraea Cretensis, annorum 20. temperamenti calidi, & sicci, menstruis parcius fluentibus, totius corporis pruritu vexata fuisset; cum tuberculis, quæ Ellere vulgo; idem prorsus subsistentibus biumo ab hunc, univertum illi corpus scordatum est; cum vlcusculis in dies magis, magisque serpentibus, atque ichores acres; & mordaces jugiter effundentibus; quibus non raro accedebant rigores, & febres; ique aliquando exsiccatis, squamosa excrementa emergunt; recrudescuntibus tamen paulo post denuo majori molestia vlcusculis eodem ichore manantibus. Quæ affectio pluribus hætenus in Patria tentata remedijs; sanguinis frequenti scil. educatione exsphenæ; duobus fonticulis utriusque interno femori multis, ac feri lactis caprini usu, cum impermixti, & copiosioris, tum addito rhabbaro. Extrinsecus quinetiam succis refrigerantibus, & aliquando detergentibus applicitis, nec præternisso balneo univertali ex aqua dulci detergentibus alterata. Quæ cum irrita fuerint, Medicam exposcit manum.

Primo itaque hujus affectus essentia, & causas inquirendæ, atque cum pruriginosarum cutis affectionum plures sint, species duplex tamen potissimum earum genus complectitur, univertali, & particulari, præsens affectus particularibus non est accensendus, ut patet ex ejus historia: proinde, nec herpes nuncupandus, quo laboravit Multis illa patiens, à Gal. memorata 14. Meth. cum eodem teste, malleolum obsederit. Univertalis autem triplex cum sit, Scabies, Lepra, & Elephantiasis, de hac postrema omnis prorsus absit suspicio; quæ cancer est univertalis, Galeno, in qua varia in cute prominent tubercula, in fronte potissimum, aures sunt acutæ, resimæ nares, labra crassa, & tumida, cutisque subrubra, & dura torpescit, ex Gal. Lib. de Morb. Causis. 2. ad Glauco. & Libro de Atra bile, quorum nullum in hac Patiente est conspicuum. Quamobrem statucendum censeo, affectum hunc vel esse scabiem lepram, & confirmatam, vel Græcorum lepram incipientem, ab Avicenna Albatamigram nuncupatam, cum squamæ se prodant, lepræ indicio luculento, Actuarius teste, inter Græcos non obscuri nominis 2. Method. Utunque tamen, cum utriusque affectus eadem sit causa, præter solum discrimen ejusdem gravioris & levioris. censendum est, præsentem ortum ducere à sanguine melancholico exusto, in jecore fervidiori genito, nec per vterum stato circuitu ex temperamento patientis, ætate, vita præterita, & potissimum ex regione

ipsa; qui sua crassitie vteri venas prorsus obstruens, atque ad partes cutaneas resipien, typhlori sui parte solum pruritum antehac induxit; crassiori vero sub illis coercita, altius carnem depascit; inusta quinetiam intemperie calida, & uicea, qua purum sanguinem, qui uicetundem partium alimentum cedit, corrumpit; atque affectum præsentem fovet, juxta Pauli, & Aristotelis sententiam, quod scil. lepra non solum cutis superficiem sed & intima consumat.

Quæ cum ita se habeant, quam difficilis curationis futurus sit hic affectus, patet luculentissime, cum sit in habitu, a quo periculum insuper imminet elephantiasis, seu lepræ Arabum. Prout enim Elephantiasis Græcorum in lepram facillere potest, contemperato humore, & expurgato sanguine illo sculento in visceribus, & venis redundante, & ab his ad partes cutaneas transmissio; ita non difficili negotio lepra in elephantiasin desciscit, exuberante vicissim atra bile, atque viscera ipsa gravante.

Curatio itaque tentanda, atque humores corrupti cuti impacti detergenti, non sine aliqua adstrictione, & partis corroboracione; fluxio derivanda membris cientes, & ad alias partes revocantibus, tum novus hujus humoris proventus prohibendus, jecur refrigerantibus, & humectantibus, atque pars affecta contemperanda. Tandem boni succi alimentis sanguis impurus reparandus, corroboratis visceribus, cum venoso genere, quod humores corruptos à se propulset, & extrudant, ac partes ipsæ idoneo alimento nutrantur, præmissa univertali corporis purgatione, quam hucusque accuratius institutam nassansacm us.

Chirurgica itaque præsidia quod spectat, prout nobis commemoratur repetita sapius sanguinis missio ex partibus inferioribus præmissa vteri totum, ex humectantibus, & modice attenuantibus quo sanguis fluidior fiat, adhibitis frequentibus pedum, & crurum frictionibus, ac lotionibus aqua altera malva, althæa, floribus chamæmeli, & meliloto: ita temporis progressu, sanguis corruptus in partibus sub cute conclusus, cucurbitulis scarificatis indidem affixis, vel hirudinibus appositis educendus fuerit, relictis quinetiam hæmorrhoidibus, derivationis causa, quanquam huic evacuationi naturam assuesciendam non esse censeam, hoc potissimum ætatis flore, ne facta hac materix metallati, in totum supprimatur menstrua purgatio, cum sterilitatis periculo: ut hanc ob causam nubere quam maxime ipsi consultum censeam, licet non sine præsentis conjugis discrimine, cum affectus sit contagiosus.

Pharmaceutica plura quidem suppetunt interna, & externa, atque in internis duo, me judice, potissima. Primo quidem viperæ in cibi usum per multos dies, in modum anguillæ, abscisso capite, & interioribus rejectis, ob venenosam harum partium naturam, atque amputata canda, velut nulli usui, per diem in aqua macerata, ademptis exuviis, mox cum oleo anethino in aqua, cum modico sale coctæ, summo opere in hoc affectu commendatæ ab Avic. & Aëtio, atque propria experientia maxime ex usu compertæ, longè quidem potiori ratione, quam solum vinum, in quo eadem



eadem extincta fuerint elephantiasin sanat, ex Gal. Lib. de Subfigur. Empir. & Iliagog. Cap. 12. ubi plures memorat huiusmodi historias; cuius propterea potum suaderem. Aliud remedium accommodatissimum erit lactis potus asinini in primis, velut magis detergentis, & tenuioris substantiæ: quotidie mane ad libras duas, cum saccharo, & cremore tartari, quo dejectorium fiat. A quibus, continuare poterit usum iusculorum ex cichorio, cum ejusdem succo, ad vnc. i. quotidie, non pratermissis alijs aperientibus, & mensis cientibus.

Externa remedia erunt primò valida detergentia; in quibus linimentum ex sulphure vivo, nitro, sale, lapatho, & lupinis exceptis oleo amigdal. in formam linimenti; quo illinendum totum corpus, immergendum primò in Aquis Thermalibus sulphureis; vel aqua marina moderate calida, tertia qualibet nocte per horam ante cenam, quintum, aut sextum; quæ excipiant refrigerantia, & humectantia; & potissimum Balneum aquæ dulcis; muncto toto corpore oleo amygdalino, contemperandæ cutis lecitati.

Quibus accedat recta victus ratio: in qua abstineat ab omnibus carnibus, & piscibus salitis; quibusvis leguminibus, carne bubula, caprina, ceruina; a quibus palustribus, atque omnibus alijs melancholiz feracibus; necnon à vinis generosis, & subastringentibus: quorum loco uti poterit piscibus petiosis, carnibus agninus, vervecinis, cucurbitis, melonibus, lactarijs, hujus generis refrigerantibus, & humectantibus, ac vino item albo, tenuis substantiæ, oligophoro, & alijs huiusmodi. Quæ in præsentî affectu poriora duxi. Quæ ut ad vota succedant, faxit Deus salutis Author. *Benedict. Silvatic. Consul. & Resp. Medic. Cent. 4.*

#### *Elephantia incipiens.*

Nobilis annos quinquaginta natus, camosus quidem, sed tamen squalidus, & ad eum accedens habitum qualis est ictericorum, facie rubicunda, seu ex rubro livescente, sanguine crasso nigroque perfusa, qua maculæ nigrae, aut livida, interdum exoriebantur, ut etiam in reliquo corpore, sensu nullo aut obtuso præditæ, sed sine siti, sine cibi fastidio, & alijs symptomatis gravioribus. Infinitas hic portiones hauserat medicas, & sudoribus corpus exsiccaverat in balneis calidioribus, non sine valetudinis iactura. Verebatur ne Elephantia corripere, cuius jam videbatur rudimentum.

#### *Rescriptu D. Fernelius hac remedia.*

℞. Radicis acetosæ, lapati acuti, & Enulæ campanæ, Polypodij quercini, seminis Carthami, Pallularum mundatarum an. ʒss. Endiviz, Cichorij, Plantaginis, Buglossi, Boraginis, lupulorum, Fumariz, Cicutæ, Ceterach. Chamædryos, chamæpityos, an. m. j. florum violarum p. ii. Fiat decoctio ad ʒxvi. In colatura infunde per noctem Epithymi ʒss. Foliorum Sennæ mundatorum ʒv. agarici albi ʒij. gingiberis ʒij. Mane bulliant parum, & fiat expressio in qua dissolue succorum depuratorum Fumicetæ & Plantaginis an. ʒ iv. Sac-

chari albi lib. jss. Fiat syrupus perfectè coctus, dosi ʒij. vel ʒ iijss. cum sero lactis, quinto aut quoque sexto die.

℞. Conservæ Buglossi, Boraginis an. ʒi. Rasuræ eboris, & cornu cervi, an. ʒj. Mithridatij veteris ʒij. Misce produabus dosibus post purgationem, horis iij. ante cibum.

Post tertiam aut quartam purgationem vena secetur interior brachij sinistri, detrahaturque sanguis ad ʒx. Deinde si qua ratione fieri potest, referentur hæmorrhoides: primum quidem foribus emollientibus & alterantibus: deinde suppositoriis ex hiera simplici, cum succo Mercurialis, vel cum: felle aut si foris conspicuæ sint, & intumescant, affixis hirudinibus: ut his rationibus sanguis ater & melancholicus emanet. Quum ita corpus diligenter præparatum evacuatumque fuerit, perutilis erit balnearum usus ex aqua dulci potabili usque ad multos dies continuatus, mane jejuno stomacho: sed eâ ratione, non admodum calida sint, verum duntaxat tepida, ut corpus tantum humectetur, non autem sudores eliciant.

Victus observandus refrigerans & humectans: Cremor hordeij jeiuno maximè conducit, cum præsertim non est opus medicamentis. Juscula quoque ex pullis gallinaceis, carne vitulina aut vervecina, cum buglossi, boragine, oxalide, lactuca, & plantagine. Si vinum æstate circumcidatur, ejus vice saluberrima erit aqua hordei, vel alius potus in laborantis gratiam comparatus.

Si quæ partes in cute existunt nigricantes aut livida, nullo vel obtuso sensu præditæ, his affigantur cornua vel cucurbitulae exiguae cum scarificati, eoque satis alto, ut sanguis pronanet, sensusque revocetur.

#### *De Elephantia.*

Quum de his, quæ in facie Ioannis Bocquirese produnt, non benè inter doctos Medicos conveniat aliq; affinentispectu illum esse horridum, & leoninos oculos, supercilia glabra, rarefcere barbam, nares humidæ, multisque tuberculis tum intus, tum foris deformes cum incipiente ulcere. Hinc respirationem difficilem, tonsillas ulcerari, cum voce rauca & obscura: alij verò istorum quiddam deprehendi negent, & tubercula, siqua, sunt rubra apparere. Necessè est signa, de quibus inter celebres Medicos certatur, omninò obscura & infida latere, neque ab his judicandum quenquam elephanticum, neque ■, quæ dicta sunt, omnia compareant judicandum propterea est elephantiz initium, cum præsertim probè corpus alatur, nullusque pedum aut manuum stupor aut refrigeratio subsit, qui elephantiam statim initio concomitari solet. Neque si elephantiz initium adsit, segregandus ideo est laborans ab hominum consortio, quum nondum corpus aut spiritus graveolens, nec putredo ea sit, cujus contagione vicinos labefactare possit. Ita igitur de re controversa & litigiosa nos subsignati doctores Medici censuimus Johannem Bocquiret etiam crasso aut melancholico sanguine suffusum, & tuberculis subrubris deformem nondum esse inter elephanticos iume-



numerandum, nec segregandum ab hominum consortio.

At si posthac malum omnem medendi vivendique rationem aspernetur, nullisque cedens remediis ingravescat, & manifestiora de se indicia proferat, tum satis opportune quid agendum fuerit æquiore iudicio decernetur. Curatio vere suscipienda. Victus refrigeret ac humectet. Purgetur singulis hebdomadis apoze-mate. Vino prorsus abstineat. Calida autem omnia, & venenata pharmaca tum purgantia, cum elexi-pharmaca declinet, cujusmodi sunt scammoniata, mithridatium, thriaca, & utquæ non modo non juvent affectum, sed etiam humores adurant, & morbum conduplicent. *Job. Fernelius Consilior. Medicor. 70.*

### Observationes.

Cuidam ad elephantiasin vergenti ita consultum est, iustus est in totum abstinere vino, aut eo dilutissimo uti, vescatur carnibus elixis, & pullis nutritis pasta ex carne coluborum facta, Theriaca bis aut ter septimana utatur ad ʒj. cum aqua melissæ, bis mense catholico cum ʒiij. confect. hamech. purgetur, aperiat vena basilica sinistra, balneis aq. dulcis utatur. *Guill. Ballonius. conf. 61. lib. 1.*

Præmissis lenitivo aperiat vena brachii sinistra, & extrahantur sanguinis circiter ʒx. plus minus. tota etiam hac ætate velim singulis mensibus circa novilunium hirudines applicari venis sedalibus, ut inde dux aut tres sanguinem exugant, quoad sponte sua cadant, etenim fere ex alio nullo remedio majus juvamentum sperare debet: quare ei Author sum, ne ullo modo hoc remedium post primam purgationem intermittatur. sed hac ætate & sequenti autumnio etiam, singulis ut dictum est mensibus reiteretur. Postquam octo diebus ex ordine usæ fuerit syrupo præparante & digestivo, assumat hoc pharmacum.

℞. Confect. hamec. ʒß. el. è succo ros. ʒiß. fol. sen. ʒi. polipod. q. ʒij. l. infusio in decocto liquir. fl. & fruct. cordal. cum paucis cinnam. q. l. syr. ros. solut. ʒi. F. potio quæ sapius prout opus fuerit reiteretur, purgato corpore; volo utatur singulis diebus mane hoc electuario ad quantitatem nucis juglandis.

℞. Conserv. fl. borrag. ros. ana ʒiß. diarrhod. abbat. theriac. opt. ana ʒj. cum syr. de pomis q. f. F. electuar. quo assumpto ingrediatur balneum aq. dulcis egelidæ in quo incoxerint rad. acetos. vel lapath. maj. fumaria, lupini contusi furfuribus mixti, & in panno lineo ligati, quo in balneo sordes abstergi velim; in balneo moretur per horæ spatium, post decumbat, post horam unam aut alteram, absterse sudore, crura & cæteras partes infectas inungat hoc linimento.

℞. Succ. solani, succ. scabios. acet. rosac. an. ʒi. succ. rad. lapath. succ. rad. enul. an. ʒvj. ol. ros. ʒiv. cortic. helleb. nigr. in petia ligat. ʒiij. coq. omnia ad succorum ferè consumptionem, deinde helleborus abjiciatur, adde butyr. rec. ʒiß. pingued. viper. si haberi possunt, si non loco ejus theriac. bonæ ʒj. plumb. ust. ʒß. lithargyr. ceruss. an. ʒij. thur. ʒiß. lityrac. calam. sal. ntri an. ʒij. omnia M. & cum succo limonum agitentur tandiu in mortario

plumbeo donec formam linimenti acceperint. Post balneum absolutum, placeret hoc remedium, quod apud quosdam pro experto secreto in hoc morbo conservatur, accipiunt milvum deplumatum, postea abscisso capite, pedibus, atque eo eviscerato, interiora omnia, caput & pedes in ollam rudem conjiciunt, quam tectam luto oblinunt, & in furnum caldum imponunt. Ubi omnia combusta sunt, extrahunt, quodque in ea inveniunt, pulverant, atque ex eo pulvere mane in aliquo liquore propinant, quod verò reliquum est avis, partiuntur in tres partes, & quomodocunque coctum, edendum præbent ægroto, eo ordine, ut tertia dies postremam partem avis absumat, quo remedio testantur quidam hunc morbum alias novem dierum spatio persanatum esse. A me verò alias in Italia hoc sequenti experimento curatus est hic affectus. Accipio duas vel tres viperas, si haberi nequeunt, toridem alios serpentes, conscindo vivos & adjecto multo hordeo decoquo in aqua quoad hordeum tumear aut crepet, hordeo eo & ipsa serpentum carne pullos gallinaceos multos continuo alo, nec aliud alimentum suppedito; solent pulli postquam aliquot dies enutriti sunt, implumes evadere, & tandem rursus plumis vestiri ubi igitur per multos dies ita aliti sunt, paulatim incipio ægrum horum carne, & c. ruium eorum iusculis alere, hoc remedium comprobatum est experientia. *Reinerus Solenander. consil. 25. sect. 1.*

Valescus de Taranta castrationem in hoc casu valde probat, nec ego eam improbandam censeo; testium enim amputatione evirantur homines in morbum proni, sicque in foemineam naturam degenerant, & hepatis sanguinem assantis ardore resincto, humidi & frigidi evadunt: quæ temperies elephantiorum intemperiei calidæ & siccæ toto est genere contraria, adde quod sublatâ elephantice gignendi facultate, tollitur ea huius mali contagio quæ per proles propagationem in humanum genus serpit & effunditur. *Paracelsus lib. 10. Chirurgicæ. cap. 13.*

Elephas, lues venerea & struma aliquid habent cognatum & c. tres has hydras unus alexicacos Hercules hydragyrosis vincit & opprimit. *Guil. Ballonius. lib. 1. epid. & ephem. pag. 15.*

Lac asininum arcet elephantiasin, caro asinina prurit & advocat, unde hoc? an quia carnes crassum succum generant; lac autem serosum & tenue? hoc autem videtur absurdum. Nam *Hippocr. lib. 2. De Dieta*, ita scripsit: quorum animalium lac tenue est, & sanguis similiter, eorum etiam carnes sunt consimiles. *Idem. lib. 2. epid. pag. 186.*

Neapoli cum subsisterem narravit mihi *Marius Schipannus* summus ibidem medicus, Principem *Neapolitanum Caraffam* pro curanda lepra vesci solitum carne asini pulli. *Thom. Bartolinus. Histor. 33. cent. 6.*

Multi, ut ait *Ætius*, castratione se ab hoc morbo vindicarunt, hac ratione juvenem hoc anno liberavimus, qui incipiebat, & ultra principium fuerat progressus. utatur carne erinacei terrestri, exsiccata in furno, hæc non elephantiacis tantum, sed & cachecticis, nephriticis, convulsionibus obnoxiiis, & iis qui aqua



aqua intercute laborant, convenit, ut testatur *Galenus* Potest in locum carnis viperarum substitui, servetur igitur caro erinacei terrestris quæ si multa haberi potest, ad formam placentæ reducatur, comedat mane ante alia omnia, vel si velit, elixet cum salvia & borrag. & de ea comedat. *Guil. Rondelenius*. consil. 33. lib. 7. consil. *Cratonis*, & aliorum medicorum à *Scholizio* editorum.

Tanquam certum remedium ulmi usus in curanda recenti elephantiasi à *Jacobo Doyuneto*. lib. 1. cap. 7. prædicatur. Vidit enim adolescentem tali affectu laborantem, & decoctionis ulmi usu (factis faciendis) convalescere, ea quidem pro onnipotenti utebatur in quolibet patitu, cum paucis vino albo, & tanti sudores movebantur graveolentes, ut vix illos custodes ferre possent, ita viscera purgabantur, & magna urinx copia excrenebatur, quibus excretionibus sanatus est. *Jul. Caesar. Baricellus*, in hortulo gemali pag. 306.

Anno 1637. tempore autumnali, *Ulmensis* lano, in medio ferme *Viennensi* itinere, a venefica quadam hospite, inque diversorio demortui cujusdam leprosi carnibus coctis mensæque apposis tractatus fuit, quarum esu tota ipsius sanguinea massa infecta brevi temporis intervallo, proradici incit, malignas pustulas cum defædatione capitis impræniis, ad superficiem corporis expulit, & percepto rumore, quod scelesti illa femina, ob plura alia & varia delicta, publice flammis combusta fuerit, vultuosus patiens de sanitatis suæ restitutione desperare cepit: Nihilominus tamen ne sibi ipsi deesse videatur, chirurgum alias exercitatum in consilium vocavit, qui re non satis ponderata, solis externis vnguentis eundem, sed manu spe, restituere attentavit, usque dum, aliquoties in nostris observationibus citatum, Clarissimum Donnum meum Collegam, Doctorem Johannem Georgium Crockelium (ex cujus communicatione & hanc curationem habeo) summis precibus exoravit, ut hac in parte sibi gratificari, & extrema tentare velit.

Hic pro sua humanitate, & ægro & chirurgo, solidis rationibus demonstrans, absque jure internorum remedium usurpatione, sanguineæ massæ per præparantia, purgantia & venæ sectionem exacta depuratione; communicatæ malignitatis mediantibus sudoriferis discussione; hepatis corroboracione, & vel tandem, externorum debita munitione, huic, etsi nondum, radicato, malo, occurri minime posse. Quare carnatio illi omnem in curando assiduitatem, & diligentiam promisit, modo patiens se in omnibus morigerum præstare velit, quod dum sanctè sponderet, curam sequenti methodo aggressus est.

1. Ordinata victus ratione, præscribendo videlicet cibos optimi nutrimenti ac omni acedine destitutos, ut in morbi gallici cura fieri debet, pro potu decoctum ligni guaiaci & sassafras cum seminibus anisi & fœniculi debite præparati curavit. *Primo*, ad sudorem movendum, reservato, altero vero tanquam debiliiori ad seipsum compescendam concessit.

2. Corpus per biduum digestivo hoc ad expurgationem præparavit.

℞. Syrup. de duab. radic. ʒj. mell. ros. col. ʒi. creta. Tart. pulveris ʒj. aq. asparag. summat. ana ʒij. M. prodoli vna.

3. Vitriolam ventriculi saburram, per sequens medicamentum, vino assumptum, removit.

℞. Mercur. opt. dulcis. ʒj. croc. metall gr. vj. Gutt. Gamand. gr. vij. M. F. Pulvis.

4. Hinc medianam dexteri brachij primum aperiri, detractis ʒv. sanguinis, iussit.

5. Per aliquot dies concessa quiete, rursus ad corporis præparationem, quater in jussulo repetitam, accessit.

℞. Pulveris Tartari vitriol. ʒβ. dentur doses quatuor & quælibet ad singularem charutam.

6. Felicitissime sanguinis mundificationem molitus est per appositas pilulas.

℞. Lanchymag. Croll. ʒij. mercur. dulcis ʒj. Gutt. Gamand. gr. vij. cum aq. ceras. nigr. Form. pilulæ communes, pro una dosi.

7. Accessit ad sudorifera, ubi æger maxime obediens quotidie in prioris decocti sassafras haustu, domi sequentis hydrotici accepit.

℞. Sulphur. aurat. diaphor. a gr. xij. usque ad grana xv. F. pulvis ad charulam.

Quare ad quatuor septimanas, tempore matutino solum, in lecto per linas horas commorando, largissimum sudorem movit, exceptos eptimo quovis die, in quo superius notata pilulas reiterando assumpsit.

8. Similiter hinc lateris vena tacta sanguis emanans prior longe purior inventus est. i. x. Sordium crementa laconico abiterfa, & caput appropriatis, alterato lixivio, mundificatum fuit.

℞. Radic. bryon. ʒj. lapat. acut. ʒβ. herb. marrub. menth. crisp. organ. bethon. ana. M β. flor. chamomill. Rad. asar. cum toto ana p ij. agaric. crud. ʒ β. Crassiuscule l.a. concisa coquantur lixivio communi.

9. Remanentes quædam pustulæ in quibusdam corporis partibus & capite, depulsi, & omnia externa inquinamenta sequenti vnguento in fine sublata fuerunt.

℞. Unguent. alb. camphor. ʒj. Mercur. dulc. ʒij. Terendo probè M. ad vasculum.

Sic divino favore, patiens mitis maxime notus, decem hebdomadibus felicissime restitutus, aliquandiu decoctum sassafras pro potu ordinario usurpavit, ita ut per dies vitæ non amplius malum hoc repullulaverit. *Joh. Scultetus in observationibus armamentario chirurgico admissis.*

#### De Elephantia lava nova.

Ante 10. circiter annos incolæ Javæ horrendo quodam morbo affligi cœperunt, qui digitos manuum pedumque consumit, duris atque horrendis tumoribus, qui postea exulcerati in putrida atque cacoëthica ulcera cum carie ossium degenerant, facies defædatur, neque ullis medicamentis vicinæ partes ab hac infectione reddi possunt immunes, nisi membrum infectum extirpetur. Pus tam acre & corrosivum est, ut quando tubercula spontè non aperiuntur, postea fuerit animadversum, illud in ossa subjecta sævisse: in initio morbi, aurium extremitates supra modum intumescunt, calcaneiue omni sensu destituuntur, adeo ut sine dolo.



dolore acus integra possit adigi, illæque partes ne plurimum exulcerantur: in initio livida apparent maculae, omnis sensus expertes, capillitium, barba, & supercilia decidunt, quamquam aliquando id non contigisse observaverunt. Inter procacitæticæ causas est contagium. Malis, putridis, fœtidis & sale conditis piscibus marinis, aliisque crassi chyli cibis & fructibus incolæ vescuntur, piperis indici, Lada Chili dicti, integros devorant manipulos, cibos calidos & aromata sine mensura adsumunt, atque ad libidinis pruritum excitandum Aro quotidie in cibis utuntur, hinc etiam integra terra jugera herba ista sunt confita: lues venerea inquinata est, adeo ut febre quotidiana sit vulgatior. Utque adeo melius morbus hic pateat, icon ex adverso posita inspicienda. Queritur jam, ad quod morbi genus pertineat, quibulve medicamentis curari debeat? *Ex Ace Ratiæ Anno 1651. 25. Novembr. ad D. D. Christian. Mentzelium.*

*Scolion.*) Præter Observationem hanc, à curiosissimo nostro *Dioscoride*, ad Nobilissimum nostrum *Apollinem* perscriptam, ejusdem etiam dilucidatio, quam magni Parentis filius clarissimus, *D. J. Ch. Ch. Mentzelius*, in Academia Francofurtensi eis Viadrum, Anno præterito, sub excellentissimi *D. D. Bernardi Albini*, cæ. per modum Disputationis publicæ, non infeliciter in lucem dederat, digna fuit iudicata, cujus præcipue partes hic recenserentur. Is itaque morbo huic Elephantiasis, quæ Arabum Lepra est, nomen competere arbitratur, cum iter adfectis digiti in manibus & pedibus, *Celsi* teste, sub tumore condantur, præterea exedantur & livida ac fœtida stillent sanie, juxta *Casulpinum præf. i. lib. 4. cap. 13.* malo etiam incremente sordida ab humorum acrimonia & malignitate plerisque locis exaventur ulcèra, notante *Ant. Valerio exerc. 64.* ipsas partes, nasum, digitos, &c. sensim decidere, ex *Aræto lib. 1. de diu. cap. 13.* ossa interdum fieri cæca, ex *Petri à Castro observ. MS. 40.* plerumque in facie huic lues erumpere, *Jal. Palmario Const. de morb. contur. lib. de elephant. cap. 3.* extuberationes fieri rotundas, & duras sub lingua palpebris, auribus, *Jac. Hollerio de morb. int. lib. 1. c. 64.* in *Schol.* aures exulcerari, *Aræto*, aures extenuari rubereque admixto nigrore, atque exulcerari, *cit. Palmario*, senium perire extremitatum, & si acu altius pangantur, non sentire, *Holerio & Francisco du Pont. de Sign. morb. 1. 4. c. 25. §. 30.* neque aqua fervente exuri, *Palmario*, pilos passim decidere, ex *Platero tom. 3. cap. 4.* constiter. Quæ omnia cum maxime pathognomonica signa, dum hoc etiam in morbo, a viginti saltem annis in Java grassante: ideoque novi morbi nomen ibi promerito, deprehenduntur, nomen quoque illud mereri, concludit. His ita statutis, fermentum illius morbi in Javam aliunde fuisse illatum inde ostendit, quod sine dubio & antehæc tempora idem in olis fuerit victus, qui tamen elephantiaci non fuere, aut certe jam ad unum omnes sub hujus mali vexillo militare debere; & ibidem licet loci, unde apportatum est, adeo non saviat, fieri id sine dubio, quod massa sanguinea fermentanda hic aliis imprægnata sit particulis, unde & alius debeat esse effectus. Contagium autem hujus morbi

in eo consistere, quod è corpore elephantiaci exspiret id, quod abundat, spirituosioribus videlicet partibus ex humoris peccantibus fermentatione sursum ascendentibus, & de fermento elephantiaco participantibus. Cujus exigua portione totum inquinari hominem, non sit mirum, dum quotidie magnam massæ farinæ ceæ molem à paucis fermento, cerevisiæ quantitatè paucis floribus fermentari, integra regna ab uno peste infecto innci videmus; intestina nempe à fermento excitata lucta paulatim mixturam humorum turbante, tandemque ut in sui generis abeat fermentum cogente, adeo ut sanguis elephantiaci postea totus fiat fermentum, fomesque sit inexhaustus & lerna innumerarum infectionum. Favere huic morbo ipsum Inulæ situm, qui totus in Zona torrida est, magis directos excipit solis radios, multumque ab illius terrore adurit; Piper ludicum, quod manipulatim adsumunt, cibos calidos cum aromatis, quos sine modo devorant, Arum, quo quotidie in cibis vescuntur, massam sanguineam omnino multis acribus salibus imprægnare, illamque valde acrem reddere; pisces marinos, putridos & fœtidos, crassi chyli cibos, & fructus suo lentore, viscidis terrestribusque particulis, illam incrassare & viscidam facere; lues veneream utrumque indicare, quæ acres volatiles atque lixas particulas tenaci pituitæ junctas esse doceat; nimiam illam venerem, cui supra modum dediti, quidquid in massa sanguinea balsamicum est & spirituosum, omne exhaustire; adeo ut sanguis illorum sit crassus, terrestris, viscidus, & simul valde acris; si misceatur jam huic sanguini aliquod fermentum, quod acre e sanguine præcipitet, tunc lentorem stimulo illo orbatum causari obstructiones, acridinem verò flamen partium lædere, sicque Elephantiascos causam adesse continentem. Lividas maculas nihil aliud docere, quam illas a reliqua cutis superficie superficies mutatas à fermenti admixtione habere & differentes, adeoque angulos incidentiæ & reflexionis utrobique non esse eosdem, unde mens id animadvertens discrimen, de utraque diversas habeat perceptiones, & sic variegata adpareat cutis. Intumesceniam extremitatis aurium & reliquorum membrorum oriri, quod fermentum elephantiacum partium sibi alias mixtarum cohesionem turbet, quæque intestinis his motibus adeo prompte non obsequuntur, eas ad peripheriam pellat, quæ ingressæ tubulos illos propter crassitiam obstruant, humores præsentis retineant, affluentium transitum impediant, partisque ita causentur tumorem, in primis in auribus, quorum substantia fibris rigidis constans, cartilaginosa, duriuscula & ita obstructionibus magis est obnoxia. Stupere & insensiles esse calcaneos, quia humores visceri, crassi, terrestres, in his corporibus abundantes, à tubulis nervorum recepti, illos tumere faciant, unde nervi comprimantur, regurgitantibus ita, à clausis hac ratione portis, spiritibus animalibus; hinc nervi illa portio fiat flaccida, & mora licet, motum non propaget, nec mens percipiat quid in illa parte rerum agatur, calcaneum vero & quidem in ipsis morbi principiis adfici, quod sanguis gravior crassiorque deorsum,



naturæ legibus, tendat, maximumque illius propter linearum recitundinem impetum sustineat calcaneus, vel ipsa cutis duritie & ligamentorum copia commendabilis. Exulcerari istas partes, quia oppellulati tubuli ab humoribus a tergo prementibus, vel clauduntur acutius, vel illas rigiditate sua perfrangat acere sal, quo sanguis abundat, perfrangant etiam propter subtilitatem & alii spirituosos humores, qui viribus fracti in ipso tumore nidulantur, unde calor totius corporis, uique & usque affluens, subtiles illas particulas agitet, sal acre commoveat, atque sic impulsu elephantici fermenti iuvet, conutiantur hinc fibræ tandemque disrumpantur, quarum pars in cuniculos reuiliat, pars utrobique rupta humoribus innatet, & turbato sic fibrarum ordine fit cavitates, in qua colliguntur humores, sale acri & corrosivo, a pipere, aro, contagio, infecti. Quod acredo puris subjecta potius corrodat ossa, nisi tumor arte fuerit apertus, quam carnem, nihil esse insoliti, prout aqua fortis ferunt, non ceram vel picem adgreditur, itamen ossum carnosum solidius multo esse & rigidius, quiescere ossæ particulas pertinaciter iuxta se, & ita excipere ictus & impetus irruentium, cedere nescias; carnosas vero, molliores utpote & flaccidiores, licet percutiantur, cessione sua ictum absorbere vix quandam, retroagere aliam, diutiusque resiliere, perinde ac pilæ immixta vinum absorbeat arena, quam efficaciter retroagit murus, & globus sclopetarius trajiciat aileres solidos, quem putre lignum cedendo & resiliendo viribus privat. Hoc modo fieri cacoethica illa ulcera, ruptos esse nervos, ossa cariosa, carnes corrosas, humorem adesse caulicum, unde pars illa non solum moriatur, sed vicina membra paulatim patiantur eademque, serpatque id malum ulterius, denegato conuatu decidant membra, & sic miserrimum hominis fiat spectaculum. Quod si materia morbifica ad glandulas subcutaneas deteratur, radicibus pilorum, quibus hi sunt inaxi, resectis, eos decidere, raramque fieri castitatem, sin minus, hæere suo loco, neut hoc inter rariora numerari debere videatur. His prælibatis, & prognosi ex *Holferio, Casalpino, Plateno, Aretæo & Aëtio* addita, ad secundæ Questionis solutionem progreditur, iteratam primo suadens venæsectionem, cum enim sanguis terrestris & viscidus sit, abundetque multis acribus, volatilibus & fixis salibus, corrigi eundem debere, innuit, quod quam arduum sit, ægrorum diuturnas testari querimonias, ut igitur felicius immutari regique possit, imminuendum esse, ita enim medicamenta hostem viribus fractum superare facilius, & sanguinem cor subire sæpius alterarique, nullo venarum habito delectu, si tamen is obviandus, electa in eum finem pedis vena, si magna satis conspiciatur, crasso utpote sanguine magis in truncis artuum inferiorum repertiundo. Hæc dum fiunt, sanguinem corrigi debere internis medicamentis, quæ incidant & attenuent, copiose adsumendis, ut omni, misceantur sanguini. Hinc Guajacide decoctum commendat, leve, nec nimis crebro, ob acredinem ejus, sumptum; cui ideo præfert *Sarsaparillam* in mucilaginem, qua acres parti-

culas temperat, resolutam, aut hordei aquæ immaceratam, aliisque etiam, ut liquiritiæ radici, vel paululis permixtam, & magis ac vesperi inter stragula calide sumptam, aut interdum urgente siti hauritam. Decoctum etiam fieri posse ex cortice tamarisci, fraxini, rad. cappar. chin. *Sarsaparill. lign. saissafr. sant. omnium*, antimonii crudi vel cinnabaris in petia ligatæ uncia una vel altera, cum tartaro crudo in aqua chalyb. vel sero lactis infusis, addito oxymelite scyllitico & succo limonum; quo per triduum quatrimumve usurpato, purgationem & mineralibus, quarum particule sunt solidiores & graviores, adeoque efficacius operantur, instituendam esse; addendo Pilulas de fumaris aut helleboro nigro, Mercurium dulcem, Arcanum corallin. &c. aut, si pituita in ventriculo mobilis suspicio foret, unum alterumve granum Mercurii vitæ, vel sulphuris aurati antimonii, vel Turbethi mineralis; quo facto, ad apozema per aliquot dies redeundum, deinde rursus purgandum, periodo illa toties reiterata donec sanguis videatur emendatus, corpusque satis præparatum, tunc enim exhibendum potens aliquod ex mineralibus sudoriferum, & Mercurio diaphoretico, Tinctura antimonii, Q. E. Antimonii Regulo antim. sine Marte, Sulphure antim. Bezoartico minerali, additis, ut mineralia hæc eo citius in actum deducantur, sale viperarum volatili, croco, tinctura opii, &c. Ut vero sanguis mollior fiat, sal acre miringatur & educatur, præterea laborandum esse; ibi Emulsionem amygdal. dulc. &c. Seminis psyllii mucilaginem, &c. hic Acidulas naturales, clystum antimonii, scobem eboris, C. C. oculos cancri, corallia exhibenda. Nec ulum, cautum tamen, millepedum vel asellorum spernendum, imò nec vermium majalium acris suo sale caustico spoliatorum atque in pilulas redactorum; vel etiam simpliciter exhibitorum, ortam hinc stranguariam lactis dulcis huiusmodi statim sedante; copiosum enim sal ita cum urina educi. Viperas ab *Aëtio, Casalpino, & Galeno* dilaudatas, ab *Aretæo & Palmario* reprobari notat, ipse vero utrisque, habito diverso respectu, adtentitur; cum enim maxima viperarum efficacia a sale volatili veniat, si illud in copia ad massam sanguineam derivetur nondum correctam, inanes non solum facere impetus iudicat, sed sali acris novum insuper addere stimulum, unde necessario exasperentur symptomata. Cum vero massa sanguinea satis præparata, eo devotum sit ut diaphoreticis uti concessum sit, maximo cum fructu mineralibus diaphoreticis, utpote in operando tardioribus, ea addi, neque tunc ullum ab eo sale metum esse posse, cum nullibi hæreat, sed libere transeat, & qua diaphoresi, qua diversi, sal copiosum secum educat. Castrationem à quibusdam, ut infallibile & præsentissimum remedium, magnopere commendatam rejicit; morbi enim causam ab ea non tolli, adsit licet, ab acrum spirituum influxu inexpugnabile coeundi desiderium, illud tamen non causam, sed morbi effectum esse, unde neque illo remoto morbum curari. Inter externa remedia, ad humorem terrestrem fluidum reddendum, obstructions deobstruendis sal acre educendum, partesque corporis emolliendas, balnea



balnea aquæ dulcis tepida reponit, quorum particula aquæ in poros sese insinuando, illos aperiant, tenacem pituitam diluant, & sal educant; quæ ipsa tamen noceant, si illud sal morbosum sub densa nimis hæreat cute, ita ut educi nequeat, sed maiorem concipiat ab aquæ spiritu motum; quo in casu satius sit aquæ salis balneum, quod aperiendo poros sal latentem viam exeundi pareat, & efficacissimum fore sal, quod antimonio, sale communi & tartari igne potentissimo sulis regulæ supernatat, vel scorias reguli antimonij cum nitro & tartaro facti. Therinas etiam sulphureas, mere adstringentibus, qualia sunt aluminosa, repudiatis, hic prodesse, quarum defectum suppleant artincialia Balnea, ex fol. & rad. alth. enulbryon. cyclam. helleb. utriusque, lii. fursure macro, cort. sambuc. sem. lini & scænuæ græci, sale ammoniaco, sulphure &c. parata, purgantia studio addendo, ut ab iis excelsis temerationibus humores incipiant moveri, poris vim faciant, atque sic egrediantur. Tumores esse emolliendos Unguentis &c. notioribus, quæ inprimis Mercurius præcipitatus albus, vel Arcanum corallinum, vel Mercurius dulcis ingreditur. Quibus non proficientibus, tumoribus vel maculis scarificatis cucurbitas vel cornua suctoria Palmarij superimponendas esse, pro crasso sanguine educendo, vel quod melius, alte discindi & medicamentis catharteticis vel causticis, crystallis scil. argenti, Mercurio sublimato corros. Oleo mercurij, Oleo antimonij. Butyro antimonij, vel quod eo fortius, Butyro arsenici. Arsenico sublimato, aliisque exedi, ulcera verò forti guajaci decocto elui, cicatricemque superinduci; & his nihil proficientibus, ferro extirpari membrum oportere. Tandem si ab ullo medicamento, certe a salivatione sperandum esse remedium, quæ omnibus indicationibus satisfaciât, glutinosamque pituitam, revera quandoque acerrimam, in copia educat. Denique brevi diæta enarratione erudito discursui finem imponit. D. Andrea Cleyeri.

*Hiscæ omnibus addamus jam quadam de Cuticula ejusdemque morbis (quamvis potius ad Cuius affectus supra descriptos pertineant) Clarissimi nec non celeberrimi Carol. Drelincurtij Collegij ab Excellentiss. D. Guyot. M. D. communicata.*

1. Matronam, vidi quæ fluorem album astringentibus internis & suffumigio thuris sibi supprellerat, sed incidit in pruritum, iugem, inque cuticulæ scabritiem tantam ut per plures menses fures largos atque numerosos interdum, nocturne decorticaverit.

Jusculorum usu & carne vitulina cum charitol. agrim. eupator. cannabin. cichor. atque fumar. nec non baln. aq. tepid. cum sol. vitis feliciter curata, intermedij V. S. & purgatione.

2. Virum autem quadragenarium frustra curavi per plurimum volatilibus, misturis & diæta tenui atque diaphor. quo cuticulam eius emendarem universe scabram instar vel leberidos vel elephantini corii, quæque per amplas & spissas squammas hunc & illinc passim decidebat,

aliâ prorsus succrescente, perinde scabra, spissa atque dura, sed pruritus omnis experte. In Italiam se contulit quo viperarum iungatur adipe, & viperinas carnes edat. Exitum ignoro.

3. Juvenem unum & alterum miratus sum quibus sub morbillorum declinationem salutarem, tota cuticula manuum & pedum abscessit chirothecarum veludonum instar. Id ipsum tertia vice in viro deprehendi sub finem curæ febris malignæ.

4. Præcipuis autem in admirationem me traduxit decembris puer, cujus mater ideâ piscium, sub initia graviditatis commota, ipsum nonnullam exclusit pedibus manibusque squamosis, cyprini more, squamis scil. latis, mobilibusque & mutuo ad digitorum motiones sese attricantibus. Imo squamis illis vel sponte, vel imprudenti quovis allisu deciduis, novæ continuè succrescunt.

Quævis autem squama pedunculo nervaceo atque sensili coheret, sicut mihi patuit earum aliquot apicibus cognitum sublati, atque commotis vel etiam leviter inversis, puer enim, præ dolore nullius evulsionem admittit.

Ab Anno autem 1681. quo ipsius squamosis artibus studui nihil de ipso mihi suboluit.

5. Largissimam porro cuticulam, suis vel unguculis vel ungibus instructam, & e cadaveribus revulsam meis oculis subspecto. Mirantur omnes quo artificio id præstem, in tota illa & illacera unaquaque portio digiti sui refert ideam, sed secretum meum singulos fugit. Extrema prius macero tepida sæpius renovata, donec putredinis initia subdorer, & tunc certè levi industria tantas portiones & taliter figuratas extraho.

6. Coronidis vice cuticulam Æthiopum producam, à me quidem invisam, sed sive Kiol. Anthropogr. lib. 2. cap. 4. atque Pechilis, in tractatu de nigred. Æthiop. mihi inscripto, nigricantem unice, cute vero subjacente candida.

Non ita pridem ad cuiusdam viri, de lepra non suspecti dimitaxat, sed tertium jam à Chirurgis lepræ ad iudicari, exameti, Magistratus iussu vocatus, cum viderem bonum virum nihil minus quàm lepræ laborare; licet octo jam annorum cuticulis leprosis cohabitare fuerit coactus; iussi, ut prædicti illi Chirurgi suam de hoc leproso prolatam sententiam signis syllogisticis, & rationibus instructam in medium proferrent. Hi vultu quodam supercilioso, & fastu, ut ferè sit, plius quam ampuloso, illum lepræ laborare instabant, cum quod nativus faciei color in lividum & fuscum desineret, tum quod visus hebetudine & vocis rauritate laboraret, tum quod maximè anhelitus fetore & mephitis obvios quosque deterreret, tum quod in crure sædum aliquod ulcus haberet; tum demum, quod ante aliquot annos ejusdem filiam lepræ adjudicarent, quæ tandem leprosa mortua fuerit. Hiscæ machinis & argutis tantum apud Magistratum effecerant, ut bonus vir communi hominum societate exclusus, & leprosis adscriptus fuerit, quibus iam octo annis convixit, citra ullam tamen veram lepræ signaturam.

Quæ cum audivissem, ipsique Chirurgi nihil alterius de lepræ naturâ, essentia, causis, dis-



ferentis, signis syllogisticis seu pathognomonicis, in medium protulerunt, itatim intellexi, illos lepræ essentiam ignorare, nec inter lepram & non lepram distinguere, nec ullam differentiam inter lepram Græcorum, quam plorant per versam vocamus, & veram lepram Arabum, seu Elephantiasin, facere posse, unde nec mirum, si incautiores, & imperitiores illi Chirurgi in cæco hoc examine decepti, eam quoque tulerint sententiam.

Faucis igitur quæ sit inter lepram Græcorum, seu psoram, & lepram Arabum, seu morbum elephanticum, quem & elephantiasin, leontiasin, seu satyriasin & tyriasin vocant differentiam illis aperui, & bonum hunc virum, nullis horum affectuum caracteristicis signis laborare, demonstravi.

Cum enim hoc subjectum nulla feræ & sicæ scabiæ species turpiter defœderet, nullisque nec tenuioribus, nec crassioribus squammis obducatur, sed univertum corpus incolume, sanum & nitidum, pilosæ tum capitis, tum superciliorum partes puræ, firmiterque hæ hæreant, conclusi, bonum virum a Græcorum lepra immunem & saluum esse.

Eundem quoque nec Arabum leprâ, seu vera elephantiasi laborare, ex absentia omnium signaturarum caracteristicarum, aut signorum pathognomonicorum convici. Cum enim hic affectus sit contagiosus, sæpè hæreditarius maligna & perniciosâ suâ qualitate, plurimumque vitiorum congerie corpus defœdans, atque membranea solum aliqua involucri, & cutem præsertim inticiens, si tali affectu laboraret bonus vir, haud dubiè octo jam evolutis annis, sese aliquod vitium in apertum dedisset, cum tamen ex sex illis signis syllogisticis nullum hactenus fuerit observatum: Nec enim unquam in cute vel facie, vel frontis, vel genarum, cubiti, femorum, manuum, pedumve tubercula facile mobilia, indolentia, & ex livore ad rubedinem tendentia, horridumque aspectum præbentia, epulliarunt.

Nunquam in eo viæ sunt oris tubercula, quæ ore hiante, Linguaque depressa in palato, & faucibus circa linguæ radicem, nunc flavescunt, nunc sublivida, vel viæ, vel reperta fuere. Nunquam item vel in pedum digitorum interstitiis, vel in plantis, in crassâ præsertim & durâ illius parte, vel in manibus, juxta cubiti articulum, præsertim in acutiore illius sede, aliisve artuum locis, ulcera effloruerunt. Cum enim ejusmodi ulcera & fissuræ veram cutem penetrent, lata sint, & rarenter ulterius serpant, labiis callosis, ac prætumidis consent, atque læsa faciliè cruentent, indolentia sint licet, si talia vel adessent, vel adfuissent, faciliè quoque videri potuissent, & ex his firmum aliquod judicium ferri. Nunquam insuper in eo viæ sunt narum ulcera, earum septum, fungos & ossa, seu cartilaginem depascuntia, naso turpiter delabente, palatum columellamque depopulantia. Nunquam præterea in eo observari tumores, non tumidæ in aurium ambitu piumæ, non crassæscientes auriculæ, non plus justo auctæ, aut dilatatæ narum alæ, non palpebræ, non labia, non pedes, manusve millatæ, aut tumidæ. Nunquam denum in oculis juxta majorem canthum na-

ta pellicula, sensim accrescens, quæ sane si prædictis jam signaturis accederet, magno argumento haberetur.

Cum igitur pathognomonica hæc sex signa nunquam in hoc subjecto apparuerint, quis illud leprâ correptum dixerit? Cætera autem signa ab illis Chirurgis allata, quemadmodum & alia quæ addi possent, uti cutis scabrities in pilosa capitis parte, cum squammis & fissuris, fissuræ item cutis pedum, manuumque & unguium; pilorum item destitutio, sanguinis quoque detracti livor, crassities, cum arenosis seu granulosis quibusdam arenulis; cachectica corporis constitutio, frons cornu instar splendescens, fornicatio ac titillatio faciei, palati, linguæ, totiusque corporis, sensuum stupor; Hæc, inquam, & similia, non moror, eò quod aliis etiam morbis consecutaria atque communia esse possint, quamvis nec & ipsa in nostro hoc subjecto reperiantur, vel si quædam adsint, tanti tamen momenti non sunt, quin durissimos labores, noctuque dieque familiæ sustentandæ causa, obire possint.

Filiam quod concernit, quam leprâ mortuam putabant Chirurgi, falsâ morbi specie decepti fuerunt. Dum enim rem ipsam diligenter investigarem, cognovi tandem, ipsam non leprâ, sed inveterato morbo gallico correptam obiisse. Et quod notatu dignum est, dum cum leprosis octo annis versaretur bonus vir, prolem ab uxore sana sanissimam accepit; Unde si infectus fuisset pater, haud dubiè jure contagij hæreditarij, vel prolem, vel matrem vel utrumque infectisset. (Caudius Decidius apud Gulielmum Fabric. Hild. Epistol. centuria.

### Anatomica Inspectio.

*Lepra infecta Matrona cadaver exhibuit viscera tum vitalia tum naturalia marcere confecta.*

Illustris Matrona, Vasconiz Proceribus proxima affinitate conjuncta, Burdegalam venit anno 1660. adiitque Dn. Dezeli seniore, Chirurgum, apud quem tunc temporis artis tyrocinia ponebam Lepræ, quæ infecta erat, curationem ab illo exposcens: Lepra fuit, eaque confirmata ex judicio Clariss. Medicorum D. D. Mingelozeau & Emery, Facultati Medicæ Burdegalensi adscriptorum: Magistrorum item Dezeli & Choveri Chirurgos peritiss. Illius quippe morbi vix ulla desiderabantur indicia: Capillitium omne deciduum tum sponte tum pectine, quod surfureas fordes fœtidas simul detussit: Torvus erat aspectus micantesque oculi, Vultum gutta rosacea fœdabat, & luridus color violaceo proximus; maxime nasum, & labia: Auribus tamen nativa servata conformatio, nec pone ullæ tumebant glandulæ: quæ in parte colli sinistra, juxta claviculas, juglandis nuci magnitudine utrinque eminebant mobiles: Lingua tumebat, extrema parte & prope venas raninas pustulis obsita: admodum fœtebat anima: Thoracem anticum adhuc candidum nullæ squammæ exasperabant sed macies illic summa ut & totius corporis habitus: Mammarum nulla velligia:



vestigia: Vox nequaquam rauca nisi sermonem protraxisset, iuxta enim illico nebat & adeo obscura ut aures vix feriret, subsequente mox potus desiderio ad inductam siccitatem leniendam: Pollicibus sua conitabat crassities, manus squammas aut furfures nullos dabant, ac sensus tactus obtusus erat, ad punctiōem tantum & fortem vellicationem sensiles: Respiratio qualis phthisicorum anhelans; Abdomen, præsertim circa præcordium dextrum durum, & asperum: Lotia effundebat pauca cruda, sæpius & crebro cum foetore turbida: Alvi fæces, quanquam crassæ & ætæ diuturnæ tantum deiceret, tetro odore nares feriebant: Cutis color ab imo pectore ad pedes usque fuscus erat, nigro proximus, ubique ea arida & scabra: Femora & tibias, non secus ac Gallorum Indicorum, squammæ vestiebant, omni sensu destituta, acus quippe citra sensum alte adigebatur: Genitalibus ob importunum pruricum manum perpetuo inferebat: Ea nudata pustulas pili magnitudine exhibuerunt, e quibus nigricans sanies exsudavit: Ictericis erat moribus, in excandescentiam prona, maxime post scalpum: Narrabat Illustris. Parentem similem morbum necasse, contagio in legatione ad Luntanos contractum, mox in matrem, (ante natam Illustris Agram) transfusum, paulo post puerperum non mortuum: Patrem xii. annos illi superstitem fuisse, sed à fœda illa lue tam male exceptum, ut non Aula solum sed & omni consortio se subducere necessum habuerit, quamquam celeberrimi *Garcia à Lopes* Medici Hebræi, opera usus fuerit toto biennio: *Affectus primordia* quatuor ab obitu Illustris. conjugis annis elucere cepisse, Ex eo duos liberos, utriusque sexus suscepisse, non diu superstites: Lius immunem fuisse ac non scabiei levis, quem phthisis anno ætatis xlii. sustulerit: Coniugem is ex æris peperisse: Curam Illustris Matronæ suscepit supra dicti D.D. Medici & Chiurgi, strenuamque operam toto trimestri navavit, quorum industria, Deum testor, pene salva & incolumis, castellum suum procul distitum petiit: pietasque enim recentia Lepre indicia destituerunt: Novo & nativo capillitio ornatum caput, desit foetor, evanescunt faciei pustulæ, nisi tamen apice suum servante li. o em & crassitiem, im. mutum tamen, deposuit & lingua sua tubercula: Sitis non amplius molesta, subsedere quæ circa clavículas glandulæ: Femoribus & tibis cutis æqualitas restituta, solus pruritus ex intervallis redivivus molestus fuit: liberior fuit Respiratio, oculi non ut ante truces: At ab axillis virosus odor manebat: Si de venereis sermo incidere, recurrebat in os saliva: detumuit quoque abdomen, cessitque hypochondriorum durities: Vegetus ubique erat sensus Tactus, punctiōes vel levissimas impatienter ferens: nec excrementorum alvi tantus foetor comes fuit, liberiusque & liberalius efferebantur: Urinæ colore & consistentiæ naturalibus erant proximæ, aculeato sale exutæ qui ad crebriorem mictionem excitabat: Sibi tandem omnino dissimilis facta est, cunctis mirantibus qui in ea tam insignem ad statum naturalem reditum, quo xiv. mensium intervallo frui

licuit, a quo in priorem, & sex intra septimanas pejorem relapsa est, cui se febris continua adiunxit, quam sitis inextinguibilis conequuta est statim lethalis: Lethum præcessit vultus detestatio horrorem omnibus incutiens: Crura, quæ in priore morbo excarnia, insigni tumore conspicua erant.

Cadaver à dicto D. Dezelis, me præsentente prænominationis Medicis & Chirurgis dissectum fuit, cuius imæ & mediæ partes solum evoluit: Pulmones scirrhosi omnino & aridi apparuerunt, obsessis illorum bronchiis mucoso, crasso & extreme viscido humore: sanguis vasis thoracis conceptus crassus erat & adustus, sero omnino destitutus: Trachæa arteria adeo exsucca & arida ac si sub dio plures dies jacuisset: Cor minimum, parvumque; serum in pericardio: Pulmonum lobi ab omni connexu liberi. Lecur scirrhosum lividumque apparuit; imo adacta in visceris interiora novacula, strepitus perceptus ab occurru corporum durorum, quali lapilli oblatis essent: admodum quoque parvum erat & aridum, cuius minor lobus vix latitudine duos digitos transversos æquabat, & longitudine tres: Major eam sequebatur proportionem: Cystis fellea magna, bile turgens: Splen summe parvus & durus: Pancreas succo quodam ad nigrum vergente turgebat, & sicco: Mesenterium duris glandulis, magnis & aridis obsitum, succo sebum unguento basilico remixtum, referente tumidis: Inania quoque & arida erant intestina quoad utramque tunicam: Renes calculis infecti, sinapi instar seminis exiguis, duris, solidis, porri semina colore referentibus: quorum plurimi ureteres occupabant: pelvis & carunculæ laceræ erant: In vesica plurimi etiam reperti calculi cum phlegmate: tres item lapilli phaseolum æquantés ad instar topi molles vel indurati gypsi: Uteri quoque membranz exsiccata erant, nec non illius substantia, coarctata etiam & vulva & rugosa, patentibus nihilominus admodum multis vasis spermaticis: Incisuris factis in h. bitis corporis musculis, præsertim artuum inferiorum, reperta pluribus in locis caro scirrhosa, præterquam in tibiis, in quibus paulo minus arida: Venam cruralem implebat sanguis niger & adustus, inanibus pene arteriis: absque vi è digitis pedum ungues abscessere, manuum pressius coherebant: *Theophilus bonetus, ex communicatione Ludovici Bailly Chirurgi, Sepulchreti Tom. 2.*

## EMPHYSEMA.

Vid.

## ATHEROMA.

## EMPROSTOTONOS.

Vid.

## CONVULSIO.

## EMPYEMA.

*Antecedentia in Empyemate sunt.*

**P**eripneumonia, pleuritis, pulmonis Vomica, derivatio sanguinis, vel cujuslibet alius

Zzzz 3



humoris, chyli, lymphæ, &c. in pus mutabilis facta in cavitate pectoris à quacunque causa per erosionem, dilatationem, fractionem &c. Sic Hippocrates. Si in ventrem sanguis præter naturam effusus fuerit, in suppurationem necesse est. Et. Distillatio est in ventrem superiorem ad suppurationem pervenit intra dies viginti. (ventris autem superioris nomine pectus intelligendum esse, Author est Galenus in Comm.)

#### Conjuncta.

Pleuritide, vel peripneumonia non expurgata febris intensior, rigor, pondus, & sensus gravitatis in parte. Ita Hippocrates in Prognosticis, & Galeno teste, fluctuatio, ait enim. Ubi quis affatus à decubitu transmutatur, idque maxime, si ab uno in alterum latus se convertens defluere aliquid sentiat, puris multitudinem ibi contineri, haud dubia conjectura est. Hactenus ille. Auditur etiam aliquando fluctuatio, cum scilicet pus est tanliquandum, & copiosum, ut fluctuare, & sonum excitare possit. Respiratio difficilior, sputum aliquando purulentum. Empyema autem jam factum, & confirmatum comitantur febris mitior, & lenta, continuè infestans, quæ partim putrida, partim hectica videtur, interdum mitior, noctu vehementior: sudores multi, sed inutiles, & noctu præsertim supervenientes: tussis frequens, & molesta. Demum maxillæ rubent, oculi sunt concavi, curvi ungues, tumidi pedes, pustulæ circa pectus, & ut plurimam in latere affecto cutis inflatio, & tumor œdematosus. Ait Hippocrates in prognosticis. Si Empyema in altera tantum parte existat, hoc convertitur, ac discurrere oportet, doleantne in altero latere, & an alterum altero calidius sit, atque exarterem supra sanum latus interrogare, an videatur sibi onus aliquod desuper suspendi; si enim ita est, in quodcumque latus pondus insit, in altero suppuratio est, quemadmodum si utrinque calor, & pondus sentiantur, in tota thoracis cavitate pus continetur. Et idem primo de Morb. Applicetur illi thoraci madescentem secundum utramque partem, dextram, & sinistram; citius enim excrescabitur illud, quod supra partem pus continentem appositum est.

#### Succedentia.

Hippocrates in Prognosticis. Suppuratorum li potissimum supersunt, quos febris eadem die dimiserit post ruptionem, ac cibum citius appetunt, & sui liberati sunt, & venter exigua, & consentientia rejicit, & pus album, leve, co:colorque est, & vacans pluita, & absque labore, & valida tussi expurgatur. Itaque optimè quidem sit, ac celerrime indicantur, si minus quibus ad hoc proximè accedunt. Morimur verò ii, quos febris non deserit, aut cum videtur deservere, de novo reculescens invalescit, & sument nec cibum appetunt, alvus humida est, pus viride, lividumve spiritum, vel purulentum, spumumque. Perunt, si hæc adfuerint omnia. At quibus alia veniunt, aliam, horum quidam intereunt, quidam in multo tempore incolumes evadunt. Hæc ille. Et idem. Qui ex pleuritide empyemati, si à ruptione intra dies quæ triginta sunt purgentur, liberantur, aliqui transiens in talem. Et. Si empyemati, cum uruntur, aut secantur, purum, & album pus effluit, eva-

dunt: si verò subruentum, faculentumque, & sordidum, perunt. Et idem in Coacis. Empyemati melius habentes, & qui sepe expurgari videntur, si spiritum sanum excernant, cum recidiva intereunt. Et similiter. Quibus specillum à pure velut ab igne coloratur, si sepe moriuntur. Et pariter. Ex suppurationibus, quæ pulmonum morbi excutunt, sepe senes moriuntur, ex cæteris verò juvenes. Et in Aphorismis. Quicumque empyemati, vel hydropicet uruntur, aut secantur, si pus, aut aqua universum effluerit, omnino moriuntur. Galenus autem 4. de Loc. Aff. 7. Quibus in magna puris copia intra thoracem, & pulmonem collecta thorax in respiratione attollitur, celerrime suffocantur.

Cum empyema sit collectio puris in cavitate pectoris, & in ejus cavitate per membranas exsudare possit etiam ex Galeno, ut ostendimus in iis, quæ ad morbos particulares plane exponendos præmittimus; suppurationis igitur pleuritide, peripneumonia &c. vel humore quolibet in pus mutabili per canales quolibet in cavitate pectoris derivato, ita ut demum in pus veniant, hæc inde empyema. Cur autem in peripneumonia etiam suppurationis, & quomodo fieri possit, ut pus non per os redcat, sed in cavitate pectoris abeat, ex qua deinde rursus per os, ac sputum reddi possit, in peripneumonia expositum. Cur autem distillationes in ventrem superiorem intra dies viginti suppurentur, nulla peculiari à causa pendet, sed per solam observationem, atque experientiam didicit Hippocrates, naturam ejusmodi distillationum talem esse, ut viginti dierum spatium exigant ad fermentescendum. Incipientis autem empyematis pathognomonicum signum non crediderim esse febrim intensiorem non repurgatis pleuritide, & peripneumonia, imò vero arguere posset pus nondum factum, cum, dum pus conficitur, dolores, & febres magis hant, quam jam collectio juxta Hippocratis aphorismum. Sed neque pondus, & sensus gravitatis in parte, cum hæc omnino esse debant conjuncta cum ipsis inflammationibus, & augeri, prout illæ augentur: augentur autem mole, dum pus conficitur. Fieri tamen potest, ut pus sibi viam aperiens ad cavitate pectoris, neque adhuc multum fluxile subeat vasa sanguinis, & per corpus derivetur, unde vel obstruendo propter crassitiem, vel agitando, & fermentando febrim intendat, atque interim ejus demum aliquid ad cavitate pectoris à pulmonibus deveniat; in quam tamen cum deductum fuerit, difficillimum erit judicare pondus, & gravitatis sensum ab eadem derivata materia pendere, nisi fluctuatio audiatur, vel æger sentiat locum ponderis, & gravitationis non esse permanentem, sed huc illuc dimoveri, & hoc esse poterit argumentum collecti puris certissimum. Rigor ab allapsu, & contactu puris, & membranarum erit vellicatio nervorum, seu motus eorum, qualis, dum obstupescunt dentes ab audito sono, ut in rigoris expositione. Quia verò intra cavitate pectoris derivatur pus; prohibet igitur, ne pulmo dilateretur, quantum opus, & ne pectus constringatur similiter, quantum requiritur; dolor igitur, aut molestia, & difficultas major respirationis. Quod si pus possit per suam tenuitatem



nitatem &c. intra pulmonem derivari, per sputum purulentum reddetur: nisi vero possit, pus non expuetur. Facto autem iam empyemate, vel suppurata prorsus inflammatione admiscetur sanguini solum pus concoctum, nempe satis huxile, & rixum, hoc est, minime obstruens, & minime fermentans: remittetur proinde febris, & cum pus continue exsudet in vasa sanguinis, erit continuus, lenta ex humoris placiditate vix intendens se, ut remittens, & ex hoc liminis hecticæ: cum autem interdiu pateant magis pori corporis, perspirare poterit aliquid ejus humoris, & hec febris mitior: noctu inde non obstruitur nec intensior. Insuper cum cavitates pectoris, & humores totius corporis infarciunt, valide autem nitatur pectus in humidum infarciens, valide exprimit tam ipsum, quam humores totius corporis, qui proinde in sudorem abire poterunt, non erit tamen ille sudor ulius levandus propter puris abundantiam semper remanentem: quia vero noctu pori contrahuntur: partes igitur ejusdem puris, que nocturnè expirare possunt propter exiguitatem, & raritatem invisibiles, noctu ad angustis pororum subsistant oportebit, quoniamque cum ante succedentibus conantur, & in molem in vulsculam collectæ resistunt, pori superent conuati in erumpentes in formam aquæ, seu sudoris. Propter humidum autem a pure intra pectus proveniente nec tussis, ut ex his, quæ de tussi scripsimus, & ex eo quidem molestior, quod pulmonem, & pleuram veniet, & liquando quolibet etiam in minima molesta mini se minuunt. Inualecente morbo pulmo a pure magis comprimetur, sanguis influere non poterit, subsistet in ramis venæ cavæ ad faciem, unde partes ejus rufescent. Quia vero ingravescente hoc morbo hic gradus ad tabem, nempe corruptionem, & absorptionem partium; igitur vel quia per corruptionem flaccescant, vel quia per absorptionem extenuentur, fiet minor ipsarum moles, & hoc decernentur in his in partibus erit magis observabile, quæ duris, & immobilibus terminis circumscripti, cum ulmi di sunt oculi dura atque immobili orbita olea circumscripti, unde oculi sunt concavi. Curvi ungues cui sciendi, ex his, quæ de peripneumonia, intelliges. Turgidi pedes, vel quia eo nevolvetur pus, humor nempe qui utpote minus mobilis facile ad eos subsistit propter minorem vimpressionis, vel quia corpore jam ad tabem vergente ex partes similiter citius corrumpuntur, in quibus minor vis pus expellendi, unde tabescunt, hinc fermentescunt, & in tumorem attoluntur. Cum autem pus membranas subeat: per empyematis igitur protractionem poterit ad cutem usque penetrare, & quidem vel in insignem molem collectum, vel hinc illuc in minores maculas cumulat: tum: producet hoc ad cutem pectoris hic illic pustulas: illud tumorem œdematosum propter contentum pus, nisi & hoc contingat propter corruptionem partis, ut in secundo casu tumefactionis pedum exposuimus. Quæ autem recensuimus ex Hippocrate inter conjuncta ad judicandum, alterutrum, an utraque pars pectoris empyemate laboret, certa esse possunt, si aliunde constare supponatur,

propositum agrum empyemate laborare: si vero non conat, pondus, & suspensionis sensus, & calor, & exiccatio interie esse poterunt quid necessariò conjunctum cum peripneumonia, aut pleuritide, ut patet ex superioribus, & eorum morborum expositione: & cum eorundem ratio, & necessitas statim ex se ipsa pateat, minime ejus explicationi immoramur. Quoniam vero febris ab admixtione puris proveniens, vel ejus minime visciditatem, vel vim feruendi, aut stimulandi arguit; si igitur in expositis pulmonum affectionibus, quorum suppuratione fit empyema, eadem die, quæ empyema fit, seu tumor, in cavitatem pectoris rumpitur, febris cesset, argumento erit, pus esse optimæ qualitatis, non fermentans, non obstruens: ducitur autem in vasa sanguinis, & etiam per sputum excernitur, æque igitur evadet ab empyemate. Cum itaque pus non sit quid summe viscidum, non ita natum resistet abstractioni ab interioribus membris pulmonis, quibus allabitur, eaque de causa sine labore, ut valida tussis per sputum reddetur. Eadem de causa pus erit alium leve, concolor, nempe æquabiliter liquidum, & ex eadem materia æque liquata, unde concolor, album, cum nec in puris perfecti color naturalis. Quia vero purita est humor crudior & qui ad empyematis conatationem in pluribus casibus concurrere potuit, hinc si pus cum purita mixtum redatur, adhuc aliquid superesse conatandum arguet: nihil, si absque eadem itaque cum hæc apparuerint omnia, evadet æger plus minus facile, aut tuto, si eorum aliquot: ex quibus fiet, ut æger in melius evadens successive magis ad naturalem statum accedat, unde sitire desinet, cibum appetet, alvi fæces demittet, ac producet non multum ab similes naturalibus, nempe, consistentes, & propter cibi paritatem, exiguas. Contrarie habebunt omnia morituris, quæ recenset Hippocrates, ut ex his patet. Spumosum utem sputum arguet lentorem humoris, & eundem nondum concoctum esse, & parvam quantitatem ejus, quæ difficile subest pulmonem, & difficile ab eius tunicis divellatur, unde magis per minimas partes permiscetur aëri, cuius eruptioni resistens lentore suo spuram producit. Quadragenarius dierum numerus est tempus, quod naturaliter requiri observavit Hippocrates ad hoc, ut per superpurgationem per sputum possit empyicus evadere, quo superato tabes fit corrupte pure pulmonem, & impediens elaborationem sanguinis. Ratio, cur si ab empye per paracentesim affluat pur bonum, evadant: moriantur si fecus, patet ex superioribus dictis. Quod si empyi melius habere, & ferè expurgati videantur, sputum verò fœtidum excernunt, venient in recidivam, & moriuntur: apparens enim ille transitus in melius arguet, expurgatam quidem esse quantitatem puris, sed sputum fœtidum ostendere poterit, genitum esse ulcus intra pectus, aut pulmones, ex quo & novum pus generabitur, unde in empyema relapsus, & mors propter partis corruptionem. Similiter specillum a pure, ut ab igne coloratum arguet pus non coctum, lividum, & fortè cum ulcere par-



tem contrumpente, unde mors. Senes vero præcipue, & juvenes ab empyemate per pulmonum morbos productio moriuntur, cum in senibus propter partium siccitatem difficile coalescere possint villi rupti a ruptione tumoris, in juvenibus autem hunc ipsum coactum impedit tenuitas, & vigor sanguinis: & ex his adhuc difficilius evadent, qui temperamento sunt aliquanto humidiores; hæc accedunt enim partes magis, & facilius à sanguinis impetu, & motu respirationis in divulsionem detineri poterunt. *Cur vero pure conferim effluente per paracentesim moriantur empyi.* vide in ejus aphorismi commento, quod seorsim morbis præmittimus. Textus autem Galeni ex se ipso patet, sicut etiam, quid sit Empyema. *Laurentii Belli Tractatus de Morbis pectoris.*

Pleuritis, & Peripneumoniam morbos non tantum affines, sed invicem commutabiles, & alterutrinque successivos esse, ex superioribus manifeste liquet, porro tum hæc, tum illa, & nonnunquam utraq; simul non bene judicatur, in Empyema transeunt. Si quando enim phlegmone circa pleuram excitata suppuratur, tandem Apostemate disrupto, pus in thoracis cavitatem decidens, hunc morbum producit. Pariter ex pulmone inflammato interdum succedit: nimirum ichor circa locum affectum aggestus, diutina coctione in humorem crassum & flavum abit, qui nisi per tussim ejicitur, aut pulmonis substantiam interiori sensim labefactans, diathesin phthisicam infert, vel unitatem pulmonis totius solvendo, tandemque membranam extimam corrodendo in pectus dilabitur, adeoque empyema parit. Unusquisque pulmonis abscessu aut ulcere laborans, etsi pus copiosum & foetidum, (uti in pulmonis vomica sæpe contingit) expuat, non ideo dicatur Empyematicus. Enimvero vocabuli hujus acceptione communi denotatur, pus intra cavitatem thoracis collectio, qua scilicet respirationis organa opprimuntur: illuc vero pus illud confluere solet vel ex Pleuritide, vel Peripneumonia (& quandoque forsan ex Angina) suppuratis, & disruptis.

Quandoquidem igitur empyema nunquam primario & ex se incipit, sed aliorum morborum haud rite judicatorum, fere semper effectus sive productum est, circa causas ejus non opus erit multum inquirere. Ratio formalis sive causa conjuncta ejus satis innotescit. Ea scilicet est materia purulenta, è picura, aut pulmone, aut larynge, in thoracis cavitatem effusa. Cause autem reliquæ affectuum præviorum propriæ, ad cuiusq; istorum Aetiologias pertinent.

Circa materiam morbificam quædam disceptatio est; quippe alii hanc merum pus, alique non hoc, sed materiam purulentam esse contendunt, in qua opinione est Joh. Heurnius, qui materiam purulentam pro Empyematis causa conjuncta statuens, inter hanc & merum purumque pus distinguit; asserens hoc fieri, ab humore nutritio sanguineo, hoc est ab ipso sanguine aliquatenus corrupto, sed per asini capaci, materiam vero purulentam humorem excrementitium, viz. serum, aut ichorem esse, qui à sanguine inter circulandum alicubi præpe-

dito & obstructo provenit. Hinc observare est de abscessu qui pus verum & laudabile exhibet, cum plerumque compactum, undique conclusum, & vel cysti, vel privatis quasi mœnibus obvolutum esse; dein postquam maturatus & disruptus humorem contentum effundit, cito ac facile sanari. Verum abscessus materiam purulentam præbens, nidum suum non ita compactum & parietibus obseptum, sed plerumque inæqualem & sinuatam obtinet, atque disruptus sanem potius quam pus effundit, dein ob perennem humoris excrementitii leatuginem ægrefanatur.

Porro advertere est, utrumque humorem, scilicet tum pus, tum materiam purulentam interdum insigniter foetere, quandoque item odore quovis tetro profusus imminem esse. Quædam apostemata maturata, & disrupta pus foetidum, alia inodorum effundunt. Pulmonum vomicas, quæ & partium aliarum phlegmonas, ita diversim habuisse sæpius notavi. Materies purulenta è plerisque ulceribus effluens grave olet; phthisicorum sputa, quæ multo magis periculosa existunt, ut plurimum inodora sunt. Usitatum est è latere propter Empyema perforato, materiem primo haud inuavem exundare, dein post duos, el tres dies aere ornicium sapius subingressio, eam horrendè putuisse: quæ tamen putiditas post injectionem spiritus cuiusvis vinosi aut aromatici rursus brevi evanuit. Sed multi tædiæ esset, singulorum hujusmodi accidentium & alterationum rationes particulares designare, in quantum perexigua tantum puris, aut materię purulentę alteratio, his foetorem inducit adimitq;. Cum particula sulphurea æqualiter coctæ, & salinis subjugatæ in mixto continentur, graveolentia abest; quamprimum verò illa solutæ avolare incipiunt, secumque salinas (è quibus aculeantur) auferunt, odorem valde tetrum quaquaversus dispergunt. Quod autem ulceri putido, aut Empyematis nido, lotio, vel injectio cum liquore vinoso aut aromatico aliquoties adhibita sæpe foetorem tollit, in causa est, quoniam ulceris haud secus ac testæ putentis latera quodam quasi fermento liquorem contentum inquinant, adeoque foetorem imprimunt: cumque adeo à liquore bene temperato & potente, illud vasis aut visceris fermentum eluitur aut subigitur, deinceps foetoris propagatio ista cessat. Hinc sequitur indicium non semper malum, nec itaque valde bonum esse, si quando phthisicorum sputa, & empyematicorum abscessus cum, vel sine graveolentia excernuntur, quoniam utriusque generis casus quosdam salubres, aliosque funestos extitisse cognovi. Ad hæc non certius indicium inde sumitur, quod phthisicorum quorundam sputa aquæ injecta superant, aliorumque submerguntur.

Quamquam autem istam puris & materię purulentę distinctionem haud multum improbamus, attamen nec solummodo hanc, nec semper istud Empyematis causam conjunctam esse statuimus. Quando hic morbus pleuritidi simplici succedens, ab apostemate in latere suppurato & disrupto oritur, sæpiissime purum merumque pus est, quod in pectoris cavitatem decidens morbum illum parit. Sin vero empy-



empyema Peripneumoniz soboles sit ( nisi pulmonis vomica intercedat ) materies ichorosa, circa phlegmones locum aggesta, & postea mera coctione crassescens, pulmonis unitatem solvit, & tandem membranam inventientem pectoris, inque thoracem exundans, Empyema producit. Ista materia purulenta potius, quam merum pus dicatur.

Empyematis signa, vel ipsum dum in fieri est prænuntiant, vel plane factum indicant. Prioris generis habentur morbi alii, quorum hoc proles esse solet, prægressi; cuiusmodi sunt Pleuritis, Peripneumonia, Angina, quandoque item pectoris plaga aut vulnus, quin & alii interdum ejus affectus, non bene judicati, aut soluti: e quibus empyematis secuturi major erit suspicio, si post unam aut alteram septimanam sine sputo copioso, rigores & febris & spirituum languores superveniant. Dein post xiv. aut xx. dies empyematis plane facti signa erunt, respiratio difficilis, pectoris gravitas, materiz fluctuatio, & molestiz sensus e corporis situ mutato, sitis & febricula fere constans, genarum rubor, totius inquietudo & vigilia.

Empyema multifariam distingui solet, scil. imprimis juxta affectionem præcedentem cujus soboles est; item quoad sedem ejus in thoracis latere modo dextro, modo sinistro, modo in tota capacitate ejus; & denique quoad materiam morbificam, quæ vel merum & laudabile pus est, vel materia purulenta, atque hæc modo mitis & benigna, modo acris & letida.

Morbi hujus Prognosis tum ante, tum post sectionem instituitur: prior determinat utrum latus aperiri debeat nec ne; item prædicat, cuiusmodi cum, vel sine apertione morbi eventus futurus sit. Si empyema tardius post primum affectum, scil. non ante 30. aut 40. diem, quando vires plurimum attrita, atque pulmones viciati sunt, eorumque conformatio læsa, succedet; ac insimul si febris velut hecticæ persistet, respiratio brevis ac laboriosa, pulsus debilis & celer, cum sudore frigido, cumque diarrhæa velut colliquativa, & crebris spirituum deliquiis tunc empyici status plane deploratus sectionem minime admittit, medicus eum sinat incruente mori, ne videatur occidere. Sin verò e contra, post manifesta empyematis maturius facti indicia, pulmonum, aut lateris molestia, nec non febris aliaque symptomata remittent, atque pulsus & spirituum robur constabunt, licebit tuto ad sectionem procedere, indeque successum felicem sperare. Sectione facta si pus album, verum bene coctum, aut alias laudabile cum euphoria exilit, & exinde pectoris gravitas, & dyspnœa remittit, & ægrotans quoad alia pathemata melius habet, de therapæia minime dubitandum erit: sin vero pus nullum aut malum, si tenue, subcruentum, aut foetidum ex latere aperto effluet, perexiguam exinde salutis spem concipere licebit.

Hippocrates inter signa empyematis funesti prænuntia recenset specillum a pure velut ab igne coloratum; sive quod sæpe advertimus & nonnunquam absque malo eventu, si spe-

cillum argenteum lateris aperti orificio inditum, statim colore tanquam aureo aut cupreo tingeretur: quod certe nihil aliud significat, nisi quod puris aut materiz purulentæ particulae sulphuræ adeo exaltantur, & a mixtionis vinculo laxantur, ut facile abcedentes, corpori cui libet alteri, & imprænis argenteo, ( cui affines sunt ) affigantur. Vidi aliquando ferream a longa & laboriosa venatione occisum statim obepulas in libano coctam, non modo tenerrimam ut cochlearibus eximi potuerit evasisse, sed etiam cochlear argenteum nitidum primo contactu deaurasse. Cujus ratio prorsus eadem ac prioris est: nempe carnes illas a nimio dum vi eret animal exercitio adeo ad putredinem dispositas fuisse, ut sulphuris particulae a concretionibus liberæ, & ad avolandum aptæ, subjecto statim alteri capaci adhererent. Verum hæc in pareργο.

Quod autem spectat ad Empyematis Therapæiam, imprimis considerare oportet, utrum morbi hujus, utpote jam facti, indicia certa sint vel dubia. In priori casu pharmacia haud multum opus erit, sed tantum corpore præparato, illico ad lateris apertionem procedatur. Itaque si a pleuritide, aut Peripneumonia non rite judicatis, aut a sanguine post plagam, casum, aut vulnus intus inauso, puris, aut materiz purulentæ, vel sanguineæ intra thoracis cavitatem fluctuatio, cum sputo nullo, aut diminuto percipitur: non opus erit ut medicamentis maturantibus, aut expectorantibus amplius innosceamus; verum alvo soluta, & sanguine ac humoribus per Julapia, Apozemata, & Anodyna rite contemperatis, aut nulla sectio instituat; aut in teneris & meticulosis cauterium imprimis inter sextam & septimam vertebra appliceatur; dein eschara excitata, scalpellus oblique posteriora ac superiora versus sensim, ac paulatim adigatur, donec in cavitatem thoracis penetret; dein canula argentea indita, materies intus contenta per vices emittatur; ita tamen ut quantum vires ferent totius humoris evacuatio acceleretur; nam portio ejus intus relicta intra paucos dies ( propter aerem prout supra dictum est sæpius intus admixtum, ) fetorem horrendum contrahet, quod malum ut præcaveatur aut cito tollatur, liquor traumaticus & abstersivus bis terve in die per syphonem injiciatur. Non opus erit reliqua ad operationem hanc, ejusque processum spectantia particulatim describere, quoniam hæc singula Chirurgis quibusque peritioribus plane innotescunt, & in praxi familiari habentur. Post sectionem ejusque administrationem appendicem rite institutam, medico haud multum præterea agendum supererit. Ratio victus idonea, crebra alvi ( quoties opus erit ) per enemata solutio, insuper & remedia vulgo dicta traumatica, quæ sanguinis dissolutionem, ejusque in serositates pectori injurias profusionem impediunt, præscribere oportebit.

Quod si morbi hujus indicia minus certa, ac ( uti a Peripneumonia ac pulmonis vomica prævis plerumque assolet ) prorsus dubia sint, ad sectionem haud cito nimis, aut temere



tenere procedatur. Novi enim in aliquibus materiam purulentam, imò pus foetidum cum insigni dyspnœa & pectoris gravitates expuentibus, thoracis paracentesin & frustra, & non prorsus innoxie celebratam fuisse. Itaque dum per signa pathognomonica de empyemate plane facto constabit, medicamentis (qualia pro Peripneumonia curanda supra præscribuntur) expectorantibus, necnon evacuationem per urinas & sudores blande moventibus, aliquandiu insistendum erit: quibus tandem nihil proficientibus, & empyemate adhuc manente, vel aucto (quia dummodo vires constabunt, præstat remedium anceps experiri, quam nullum) ad paracentesin procedatur.

Quod spectat ad medicamentorum pro empyemate curando requisitorum formulas, ante sectionem eadem remedia quæ ad Peripneumoniam præscribuntur conveniunt; paracentesi autem facta, sequentia potissimum ex usu erunt.

Contra languores, & spirituum deliquia quæ in operatione ista, vel postea contingunt, Julipium sequens præsto sit, subinde ad 4. vel 5. cochlearia sumendum.

℞. Aq. Melissæ, Cerasorum nigrorum ana ℥vi. Aq. mirabilis ℥j. Margaritarum pulv. ℥j. Syrup. caryophyllorum ℥j. Misce, s. Julapium.

Decoctum sequens propinetur ter aut quater de die.

℞. Folior. linguz cervinz, veronicæ, eupatorii, tussilaginis, pilosellæ, faniulæ, ana Mj. Radic. Rubæ tinctor. chæresolii ana ℥j. hordei ℥ss. cicerum rubr. ℥ss. passul. solis ℥j. β. coquantur in aq. fontan. ℞iv. ad medietatem, edulcoretur inter sumendum ad placitum cum melle depurato, vel cum syrupo de pilosella. Si absit febris pilulæ seq. sumantur vesperti, & primo mane ad ℞j. vel ℥ss.

℞. Pulv. oculor. cancri ℥ij. flor. sulphuris ℥j. falis prunellæ ℥ss. spec. diarrhod. abbatis ℞j. Terebinth. venet. lotæ q. s. f. massa, formetur in pilulas exiguas: vel omitta Terebinthina idem medicamentum sumatur in forma pulveris ℥ss. ad ℞ij. bis in die.

Empyematicorum exempla non ita passim & crebro prostant, atque ab eo morbo curatorum multo rarius. Novi duos, lateris sectionem à medicis omnimodo præscriptam admittente nolentes, fatum obuisse, eorumque cadavera dissecai. Item binis aliis operationem istam adhibitam vidi, quorum unus convaleuit, alter tabidus interiit; cujus tamen ratio erat, quod pulmone insigniter vitiato, & viribus prostratis, lateris apertio serius facta nullum isti juvamen contulit; sed spiritus prius imbecilles depressit valde, eorumque copias absumpsit. Ille cujus latus aperiabatur, pulmone satis firmum habuit; sed à lateris abscessu intus rupto, materies in thoracis cavitatem decidens seipsum adeò comprimebat, ut vix respirare potuerit. Chirurgus sine caustico, inter vertebam sextam & septimam scalpellum intravit, & carne penitus perforata cannulam indidit. Ichor cruentus primo effluxit, & dein per vices in modica copia exemptus per triduum sine fœtore quovis ef-

fluxit; postea verò quoties foramen aperiretur, odor teterrimus, cloacæ cujusvis maxime putentis fœtorem superans expirabat, totanque cameram graveolentia intolerabili implebat: quin etiam adeo per plures dies persistebat, donec per injectiones ex myrrha, & herbis amaricantibus aqua & vino incoctis factas, & sæpius quotidie adhibitas, tandem extingueretur, quorum usu diuturno, materia morbiha, & sorditie omni demum abluta effluxus omnis cessavit; & denique foramine clauso patiens integre convaleuit. Illorum, qui, cum lateris apertionem nullo medici aut amicorum suasu admittente vellent, interibant, cadavera dissecai. Unius alibi mentionem feci; cujus summa erat, quod pus ab Apoltemate in pleura, & musculis intercostalibus excitato, intusque disrupto emanans, loci affecti & pulmonis contigui partem sphacelo affecerat; indeque diaphragma corrodens, & foramine in dextro ejus latere facto, in viscera imi ventris descenderat: ibidemque toto ductu ventriculi, & intestinorum tunice exteriores, in quas materies purulenta deciderat, corrosæ & discoloræ apparebant; & demum materies purulenta intestinum rectum corrodens, & perforans, unâ cum excrementis per anum foras prodibat. D. Agrotans robustus & medicinz cujusque impatiens, morbi hujus Tyrannidem per duos circiter menses sustinuit; sed interim febriculâ, siti, inquietudine, ventriculi molestiâ, & crebrâ subversione & æstus ferè continuâ miserrime afflictus degabat. Cadavere post obitum aperto, odor foetissimus cloacæ omnem superans per totam cameram diffundebatur. Alterius ab Empyemate defuncti Anatome, non ita vastam materiez purulentæ diffusionem exhibebat. Illa quidem in latere nidum habuerat, unde in thoracis cavitatem decidens, ibidemque in copia ingenti aggesta, & pulmones continue immetos polluens, febrem lentam & quasi hecticam, a qua agrotans valde senex interiit, excitabat. Hac Thomas Willis Pharmaceutice rationalis parte 2. supersunt jam quedam tum ex Theobaldo Discipulorum, tum ex ipsi Collegio & Didaco Clarissimi ac Celeberrimi Viri D. Caroli Drelincurtii in ulteriorem hujusce materia illustrationem adjienda.

Empyematis, Primarii & Gennini causa est sanguinis intra capacitatem thoracis effusio, ejusdemque inibi diuturnior mora, quam vasorum vel arteriarum, vel venarum, vel pleuræ, vel diaphragmatis produxerunt, uti certè dignissimi observationum scriptores luculentam nobis quadruplicis illius causæ fidem faciunt, ac proin nullus omnino superest dubitandi locus de Divini Semis Oraculo scilicet 6. Aphor. 20. Si sanguis in ventrem effusus fuerit præter naturam necesse est ut suppurent, cui Sententiæ subscribit & Hippocrates Latinus lib. 2. cap. 7.

Speciatim autem id Empyematis Primarii post vulnera in thoracis alveum penetrantia haud insolenter in Castris se vidisse profiteretur Clariss. necnon Celeberr. Vir D. D. Carolus Drelincurtius, Galliarum Regis olim Consiliarius ac Medicus Ordinarius, nunc verò Prætor & Anatomus hæc in Aca-



demum Professor dignissimus, Præceptor ac Præses meus æternum colendus.

*Empyema, quod Secundarii nomine indigitamus, pro causa Pleuritidem agnoscere elicitur ex hoc aureo sect. 5. Aph. 8. Quicumque pleuritici facti ex pectorabilem materiam non excludunt intra dies quatuordecim, is in Empyema degenerat, quia nempe materia illa quæ inter pleuram musculosque huic incumbentes, maturefcit, vel, si magis placeat, purulenta fit, membranam pedetentim arrodit, atque sic gliscit in pectus; imò etiam aliquoties impetu facto, locum ampliorem sibi quarit & membranam illam confertum dirumpit; Utro autem illorum modò accidat per pectus, & quandam veluti putredinem, deperitionem & conmigrationem in verum & Legitimum Empyema degenerat, uti Pleuritis etiam comprobatur in viro annorum 30. qui ex pleuritico Empyem factus est, sed qui citius mortem obiit. Comm. in sect. 5. Aphor. 8.*

Quamquam autem rariores sint Empyemata à Pleuritidis rupta vomica, (Lutetia præsertim Parisiorum, ubi Medicorum Atlantes suis toties iterum venasecti, necnon & aliis bene multis vel evidenter, vel clanculum evacuantibus, Empyematis erini sese opponunt & illum occupant) nihilofecius Clariss. voster Præses Honorandus, eo loci præxin numerosissimam exercens, Militum Ducem veteranum curavit, qui Empyemate Pleuritidis succedaneo, liberali puris expectoratione atque solius pulvis & aliquot bechicorum usu integre, trimestri spatio, defunctus est. Alteram itidem, in practicis suis collegiis, conscriptam à se historiam nobis exhibuit, de Matrona consentientis ætatis, quæ propter ruptam & intro latam pleuritidis vomicam, syncopen primum perpessa est, uti fert Aph. 8. sect. 7. & tandem per alvum atque mictuales ductus largiter profuso pure, dysenteria atque dysuria laboriosissimis divexata fuit; sed ab illis, uti ab Empyemate, Artis Esculapicæ subsidio, paucos intra menses, immunis evasit.

Virgineam insuper vidi pulmone ulceroso, quæ per os & alvum unice, citra dysuriam, pus suum profudit ad obitum usque.

Aperto cadavere totum pectus pure stagnatum reperi à dextris & à sinistris, sed nusquam par sui detegendis viis à pectore in alvum purulentiam deducētibus, proximis ob festinationem rei, urgentibus defunctæ consanguineis.

#### *Empyema dextrum periculosius esse sinistro.*

Hippocr. lib. 3. de Morb. dextrum Empyema sinistro damnosius esse pronunciat, quia, de mente Præsidis mei, vena impar corrosioni magis obvia quam Aorta durior atque compactior. At Riverius contra Lib. Prax. 7. cap. 4. sinistrum Empyema pejus esse censet, quòd puris edacitate ventriculus cordis sinister periculosius arrodatur. Sed isthæc ratio apud nos siculnea atque inutilis. Cordi siquidem pericardium & ejus aqua, vice sunt propugnaculi, atque fossæ. Cor ergo nulli puris mordacitati patet. Imò etsi cor puris injuriis obvium foret undique; annon sinister ejus ventriculus tot illas facilius eluderet? nam plurimis ille atque validissimis fibris musculosis donatus est. Cor siquidem universum ex Hippocr. sententia, reclamante licet Galeno, musculus est robustissimus non

nervo sed carnis densitate atque compactione. Et profectò veritatem illam Hippocratem firmam & immotam stare adversum Galenicorum impetus, Clariss. oculatissimisque Præses meus partim libris, partim viva voce, partim ætate me docuit. Is enim nunquam satis laudandus Præceptor, in nuperis suis Collegiis frequentissimus, necnon in Amphitheatro majori, corda nobis celsit ovilla, vitulina, atque humana in fibras spirales à basi ad conum dense revoluta atque retorta. Imò fibras illas non solum in orbem reflexas, sed & musculosas esse ad oculum probavit, & illas præterea à sinistris, quam à dextris longè numerosiores atque crassiores replicuit atque retexit. Rationem porro discrepantis structuræ suis demonstrationibus attexit, densiores scilicet esse sinistri ventriculi fibras ut systole validiori sanguinem pellat ad extremos usque microcosmi fines; at ventriculo dextro parciores atque graciliores inesse, ut systole leviori in proximam & insertam sibi pulmonum arteriam sanguinem acceptum regerat.

Ex illis itaque liquet sinistrum cordis ventriculum dextrò validiorem validius etiam dextrò omnes à se puris noxas amoliturum, atque adeò non ita periculosum extare sinistrum empyema, sed casus penitus esse Riverianos in Hippocratem insultus.

#### *De latere Empyico internoscendo, ubi memorabile recitatur exemplum de Empyemate inaudita methodo exterius purgato.*

Riverius, Prax. lib. 7. cap. 4. signum proponit, tanquam luum, quo latus Empyicum à latere sano distinguatur, tumorem scilicet œdematosum in latere corrolo. Verum diagnosis illam genuinis suis observatoribus Præses meus restituit, Hippocrati nimirum, Guldorst, Pignat, atque Thevenino. Videbis præsertim Duret. Coac. lib. 1. cap. 16. Coac. 68. Sed præterea Præses meus docet latus Empyicum non modo Œdematis more tumere, verum etiam ichores quandoque emittere & sero quodam sanioso atque glutinoso, scetidoque stillare. Imò latus narrat sudorum poris tabo quodam purulento hic & illic maduisse, & cum omnia symptomata insinuascent pus esse vel ferro vel igne potentiali educendum, ac interim æger Martem & Vulcanum perinde horreret, frustillum plumbi, instar festuca, in pororum patentioremm unum, tabo crassiori fluxum, turundæ ritu soletter intrusum esse, atque sic in dies crassius illud atque longius plumbum inditum esse, donec tandem intimis adactum, pectus ipsum penetrasset, ut ex ejus penetralibus pure deinceps liberius manante & probe deteriso pristina salus redintegraretur.

#### *In Empyematis operatione falsò doceri vasis intercostalibus parcere Chirurgos.*

Lippis & consoribus notum est ad Empyici pectoris apertionem præcipi ut scalpelli dorsum obvertatur costarum crenis, ne vasa cedantur. Sed cautionem illam futilem & agyrticam esse nos in Amphitheatro docuit Clariss. Præses meus, Anatomæ magnus Antistes; No-



illis etenim oculis subiecit brevi duntaxat tractu crenari cottas, & falsissimum esse intercostalia vasa collarum crenas longe decurrere. Imò vasa isthæc pleurâ suâ ita nudavit, ut luculenter viderimus *superiorem* ubique *venam*, *neruum infimum*, *arteriam vero intermediam* esse, idque tam alta à collarum crenis distantia ut nusquam secandus veniat musculus intercostalis interior, quin isthæc intermedia vasa laucientur transversa. Quid igitur nobis obtrudunt, *suam industriam obtenturi Chirurgi*, sese vasa pleuritica longe declinatueros, si modo, inter Empyicam pectus aperiendum, scalpelli aciem in interioris costæ dorsum obverterint. Apagæ nanias agyrtis unicè dignas, à Medicis vero genuinis atque cordatis longè abhorrentes. *Aique hæc ex Clariss. D. Drelincurtio. Sequuntur jam.*

*Curationes, Consultationes, Observationes  
& Anatomica inspectiones  
ex variis.*

*Curationes.*

Quoad curam empyematis, seu quando pus factum in cavitate fluctuat, & stagnat, 1. Est evacuandum.

2. Acrimonia ejus noxia corrigenda. 3. Lælio partis inducta restituenda.

Quoad *puris evacuationem*, hæc per convenientes vias instituenda venit. *Via convenientes* sunt vel *naturales* vel *artificiales*: illæ quibus *natura* molitur evacuationes, & quæ subinde per varia loca inimitabili arte purulentis evacuat, ut dum v.g. pleuriticorum, vel alias in thorace suppuratorum purulentias, nunc per *urinas*, nunc per *alvum*, nunc frequentissime per *sputum* evacuat, imò per *purulentam*, in toto corpore *scabiem*, quo de v. M. A. N. C. Ann. 2. pag. 230. solvi observatum fuit. Sanè *pus empyici* per *urina* excretum c. dolore quasi nephritico & stranguria refert *Horsl. l. 3. observ. 10.* Simile vid. ap. *Paracelsum*, item *Borellum cent. 2. observat. 17.* Ipsemet curavi mulierem gravi pleuritide correptam, suppuratam, cui supervenit foetidissima materia purulenta urina, qua per 10. vel plures dies continuante cum sensibili alleviatione ipsa sanabatur. *Præcavebam* simul *phthisin* ac *tubem* per pulveres & antihætic. Poterij, myrrh. ocul. cancor. antimon. diaph. bals. sulphuris therebinth. &c. Elix. Prop. rat. propinabam, quia hoc semper alvi fluxum sistebat, ut necesse esset, eam denuo provocare clysmate. Sicut jam supra hujusmodi varix excretiones circa *hepatis & lienis abscessum* insinuatæ fuerunt. Facit hæc quod refert *Hildan. centur. 3. lib. 39.* Nempe ulcus diuturnum in brachio ex ictu sclopeti, quod, quia per *urina* pus exercebatur, ulcus siccabatur: Quamprimum verò ulcus recenter fluebat, cum pateriens rursus *urinas* laudabiles nullo pure permittas reddebat. *Per quas vias materia empyematis in pectore*, v. gr. *deseratur ad urinam* aut *alvum*, aut *etiam ad os* pro exspuitione, plures autores ligant. *Cons. Sem. lib. 2. prax. ubi de pleurit. quest. 3.* Willis Pharm. rat. P. 2. pag. 150. 201. M. A. N. C. Ann. 3. pag. 191. & Ann. 6. pag. 76. His in casibus si molliatur aliquid natura, semper minister ejus est

Medicus, dum, quò illam vergere videt, eo simili motum illius promoveat. Si vero *ruptio abscessu & collecto jam empyemate pectoris*, eam nil moliri observat, pro copia puris dum vires adhuc constant, evacuanda, imprimis *vomitus* convenit, cujus insignes utilitates pluribus *Pis. de collyvie serosa* declarat. Hinc *sputum* imprimis promovendum, ut hujus medio cen per proximas vias, modumque magis ordinarium, puris hæc evacuatio. Pro quo *scopo Nicotiana* est egregia cujus uinum supra ex *Ferdinando* declaravi us.

In *sputo* hoc promovendo habenda simul ratio qualit. tum *materiæ purulentæ* evacuandæ, quæ quo *acrior* fuerit, ac *tenuior*, eo magis *temperantia* simul usutpanda sunt: Quòd si vero non *acre* sed *crassius* sit pus evacuandum, *incidentia & abstergentia* magis in usum vocanda. In specie *mel*, & ex eo paratum *hydromel* seu *agu. mulsæ*, *oxymel squilliticum*, inter expectorantia primatum ducunt, in qua *mulsæ hyssopus, scabiosa, parietaria, belenium, iris, marrubium, liquiritia, jujub. passula* pro indicantium varietate simul incoqui & propinari possunt. Vel fiat *mislura* expectorans.

℞. Aq. hyssop. ℥iij. asthmar. ℥iij. oxymel. squillitic. ℥vi. iyr. Nicotian. ℥℥, emet. ℥℥. M. capiatur pro luto.

*Artificiales* *vic* pro evacuando pure sunt *paracentes*, quæ ubi *priores illæ naturales* vel non suffecerint, vel non suffecturas suspicio est, in *tempore* institui potest. In *tempore* dico, ut quando *natura empyema* non expurgat per *urina* statim instituenda *Paracentesi*, ne pus in saniem convertatur, ne vires frangantur, ac pulmo à sanie corrumpatur.

2. *Acrimonia puris & ejus noxam corrigunt*, hoc est, ut alias dicunt, *ulcus abstergunt & mundificant* optime remedia *sulphurea*, quodcumque *acre* *temperantia & balsamica*, quali vi *ulteriorem* *progressum apostematis & puris* *inhibentia*, uti sunt *sulphur & antimoniæ fixa*, &c.

3. *Ea verò, quæ lassum partem post abscessum suppuratum restitunt*, sunt *vulneraria*, præteris *hedera terrestris, scabiosa, chæresolium*, item *lignorum & radicum decoctum*, &c. Optime hæc duo junguntur, sed semper habenda est ratio *Puris* ut hoc vel prius, vel simul evacuetur. *Febra adjuncta*, ne hæc plus majus intensa augmentetur. Ad hoc ut *evacuetur pus* præter evacuationem per vomitum si est in thorace, vel in alio loco, convenientissima sunt omnia *antimonia fixa*, v. gr. *antimonium diaphoretic.* quod ipsum cum *decocto chæresolii*, vel cum *hedera terrestris*, vel quod melius cum *decocto radices china* propinetur, propinando sæpius cum *haustu istius decocti ℥j.* *Antimoni diaphoretic.* Hæc enim mirabiliter suppurationes quascunque curat sanguinem coagulatum & empyema imprimis pectoris.

Et tunc cum *radice China* simul coquenda sunt *ussilago, hyssopus, consolida major, capill. veneris & similes*: Non opus est multa addere, simplex enim sufficiat decoctum cum quo propinetur *Antimonium diaphoreticum*.

Post *Antimonium diaphoreticum* imprimis est *Balsamus sulphuris*, qui quancunque suppurationem ac internarum partium & viscerum corruptionem, cito, tutò & jucundè curat. Vel sim-



simplex vulgaris, cum spiritu terebinthinæ, vel anisatus cum oleo anisi pectoralis, vel succinatus cum oleo succini; vel juniperinus cum oleo juniperino. Loco Balsami sulphuris simplicis sumatur Balsamus sulphuris auratus antimonii ex Polemianno, erit balsamus eo magis laudatus.

Denique Arcæus tract. de capitis vulneribus, Egregium modum docet curandi empyemata beneficio decocti ligni Guajaci, cujus methodus est optima, & qua observata aliquot empyematici restituti fuerunt.

Nec incommodè ligna santala hic recipiuntur, verbi gratia.

℞. Ratur. ligni Guajaci ʒj. cassia. ʒβ. Macera per 2. horas in aqua comm. lb vii. coque ad consumptionem lb i. ss. adde heder. terrestr. comar. flor. hyperici. herb. veronic. an. m. j. ad m. ij. rad. glycyrrhiz. ʒβ. sem. fenic. ʒvi. passul. minor. conuallatur ʒij. Coqu. ad remanentiam lb iv. M. S. decoctum de quo rger ad minimum ter in die capiat, subjungendo & alia remedia.

Hedera denique terrestris omnibus præstenda est speciebus simplicium quæ suppuratos ex fundamento, ut sic dicam, curat: Ejus decoctum seu essentia si assumatur, aut quod melius cum eodem antimonium diaphoret propinatur, aut denique si ejus succus semper cum decocto Guajaci permisceatur.

Certum est quod hedera terrestris sit inextimabilis in hoc casu.

Hinc sunt qui maxime æstimaunt.

℞. Succ. hederæ terrestr. ʒiv. prassii (id est marrubii) ʒij. thuris myrrhæ an. ʒi.

Sacchari parum; redigantur ad consistentiam syrupi, & subinde usurpentur.

Denique decoctum brassicæ capitæ rubræ, cum tantillo sacchari temperatum, est egregium, quia materiam purulentam educit per urinam. Potest etiam dari cum decocto Chinæ, antimon. diaphoret. & similia.

Lac quoque caprillum cum saccharo rosato usurpatum, pro ultimo hoc scopo est egregium, vid. M. A. N. C. an. i. p. 78.

Confert. cum his Wulst. Pharm. ration. p. 2. ubi de phthisi & empyem.

Balsami sulphuris feci mentionem: si hujus igneus calor perimeatur, optime permisceatur saccharum Saturni vel Antihecticum Poterii, quæ in his casibus sunt egregia.

Item Balsamus Peruvianus non incommodè potest substitui balsamo sulphuris. Michael Ettmuller. Collegit Medica Part. 1.

Quoniam curantur Empyici difficillimè, consueverunt veteres Thoracem incidere: ut inde purulenta materia promptius educeretur. Monet autem Hippocrates ne pus universim effluat: tunc enim languentes Mors certò excipit, ut experimentis pluries innouit. Partem vero urendam, vel secandam nonnulli eligunt inter tertiam & quartam costam: alii inter quartam & quintam: & alii inter quintam, & sextam. De qua re legendi potissimum Paulus Ægineta, Fabricius ab Aquapendente, Pienus, Scultetus, Barhette, Marchetti. Hippocrates 2. de Morbis utroque latere pure affecto; sinistram potius aperiendum voluit: minus etiam lethalem di cistam ibi sectionem. Ve-

rum Epiphanius Ferdinandus ex eodem Hippocrate de internis affectionibus tutius putat perforare costam ipsam. Idipsum approbat Martianus etiam in Hydrope Pulmonis ex eodem Hipp. de Natura animalib.

At longè periculiosiore, quàm vulgò creditur, Paracentesi esse existimat Jo. Van-Horne, & Tulpus pluries infelicitè institutam ait. Quamobrem plerique ad alia remedium genera constringunt, quæ si non magni iuvaminis, saltem minoris sunt periculi: Iumo tabaci per hilitam excepto, eisdemque decocto calido cum saccharo bis tantum sumpto, pus è cavo Thoracis per tussim excretum nemorat Epiphanius Ferdinandus: debet autem illud convenienti digestionem depurari, & castigari. Alii communius diureticis insistant documento Galeni 6. de loc. affect. cap. 4. Nec denique desunt, qui etiam per alvum expurgatum empyema recentant: nam præterquam quod vnum id aliquando fertur ab eodem Galeno c. 6. de loc. aff. cap. 4. confirmatur quoque a Vesichio, qui acceptum a Matthia Baccono refert, Empyicum ex pleuritide sanatum frequenti potione, ex syr. Althææ, oxymelle, saccharo, manna, oleo amygdal. dulcium recenti, & aqua scabiosa, pure nimirum, ut ipse inquit, alvo proclivius, quam ore, expurgato. At ductus isti nondum satis perspecti sunt, quamvis illos ostendere admius sit Bauhinnus relat. ab Hortio, & à Sennerto; ac multò antea Galenus cap. 6. de loc. affect. 4. & 7. Aph. comm. 30.

Profuisse nimium vidimus Empyicis decocta ex scabiosa, pulmonaria, tunicula, russilagine, hyperico, hyssopo, carduo benedicto, betonica, iris florentina, & lappamajoris radice, glycyrrhiza, consolida, C. C. C. & majori ex parte ligno guajaco, & lentiscino composita, & exhibitæ ad plures dies cum balsamo sulphuris, anis. vel terebinth. ad guttas aliquot mane per quinque saltem horas ante cibum. Efficax quoque observatur elixir proprietatis elicitus cum aqua cinnamomi, cum quo commisceri potest syrupus de russilagine, de hedera terrestris, de hyssopo, de prassio, si libuerit. Flores Antimonii fixi, & Antimonium diaphoreticum ritè præparatum, miram opem præstiterunt, sicut pariter illius cerussa descriptione Angeli Salæ, non neglecta tamen in hanc rem observatione Friderici Hofmanni. Magna etiam vis inest Terebinthinæ albæ Cypriæ, si cum modico vitelli ovi dissolvatur, & cum aqua hederæ terrestris stillatitia guttatim infusa tentisper subigatur, quousque cremorem lacteum amuletur. Capi potest ad unciam unam vel alteram jejuno stomacho. Succus ejusdem hederæ utilissimus memoratur à nonnullis, si cum olibano diapenid. redigatur in formam Electarii, & per vices assumatur, vel in ore detineatur.

Ad Pulmonis vomitum, refert Cardilucius sibi pro secreto communicatum spiritum euplegio in spiritu vini per octiduum infuso elicitum, vel insensibiliter vel per sudorem, aut urinam illam dissolvere. At Morbus hic sicuti rarissimus, ita difficillimè curationis: quinimodò prius hominem enecat, quàm internoscatur aut opportunis remediis tractetur, cum repente



e vivis ægros tollere soleat, nisi sponte sua rumpatur vomica & purulenta materia in Thoracis cavum deponatur, vel sensim expuatur. *Lucas Tozzi de Medicin. Practic. part. 1.*

Signa Empyematis sunt gravitas cum fluctuatione (præcipue cum ab uno latere in alterum decumbant) in thoracis cavitate, si Pleuritis aut Peripneumonia præcesserunt, respiratio difficilis, spūcum purulentum & foetens, febris hectica, & aliquando sudores nocturni frigidi.

Indicationes sunt puris excretio per expectorationem, urinas, aut alio quocunque modo, ulceris deterfio & consolidatio, & febris hectica ablatio.

Primò injiciantur Clysteres lenientes, emollientes, & carminativi, & repetantur, si alvus non respondeat. Purgetur æger portione sequenti.

℞. Rad. enul. ʒj. glycyrrhiz. ʒij. sem. anis. foenicul. dulc. ana ʒj. crem. tart. ʒʒ. fol. sen. mund. vin. alb. odorif. nutrit. ʒv. Coque, & Colaturæ ʒiv. aut vi. adde diaphœnic. ʒij. syr. ros. solut. cum agaric. ʒj. M. f. Porio mane sumenda cum regimine.

Si vires ferant & febris urgeat, instituaturs venæsectio in brachio.

Victus sit tenuis & siccans, ex assatis potius quàm elixis. Sæpius comedat pincolas, avellan. amygd. dulc. ficus, passul. &c.

*Potus ordinarius sit hujusmodi.*

℞. Sarsap. ʒvi. sassafr. ʒij. lign. sanct. ʒijʒ. glycyrrhiz. ʒi ʒ. passul. ʒij. aq. hord. lbxxiv. Infund. & coq. ad tertiam partis consumptionem. Coletur & aromatizetur ʒj. pulv. coriand. ad usum servetur in lagenis lapideis.

Vel ℞. Rasur. lign. sanct. inter. nigerr. ʒiv. rad. symphyt. maj. ʒv. rad. tussilag. ʒv. scabios. veronic. caryophyllat. botry. an. m. ij. glycyrrhiz. recent. ʒij. Infund. in lb viii. aq. f. vase probè occluso, mox coq. in alembico superposito capitell. ad lb ij. consumpt. Colatura su natur bis terve in die ad ʒ vi. vel viii. quavis vice longè à pastibus.

℞. Rad. chin. ʒij. enul. ʒj. tussilag. ʒij. caryophyllat. totius, scabios. an. m. ij. tol. beton. pulmonar. pilosell. heder. terrest. erysim. an. m. j. su nat. marrub. alb. hyssop. an. m. ʒ. passul. purgat. par. xx. jujub. par. x. daetyl. ficum an. par. iv. Coq. in hydrom. dilut. lb vj. ad lb ij. consumptionem. Colatur. adde syr. capill. ven. ʒiv. ol. sacch. ʒij. M. f. Apozema. Dos. ʒ vi. bis in die longè à pastibus per octiduum.

℞. Rad. enul. rec. ʒj. urtic. urent. ʒij. glycyrrhiz. Hispan. ʒx. fol. veron. mar. cum toto, heder. terrest. botry. an. m. j. ʒ. erysim. m. ij. summit. hyssop. marrub. alb. an. m. j. Coq. in hydrom. vinos. defæcat. fiat Colatura, in qua clarificata macera passul. mundat. lbij. ficum ping. ʒviii. Bulliant, extrahe pulpam, quæ cum liquore residuo lentè coquatur in Electuario.

℞. Hujus Electuarii ʒiv. mell. despumat. cum phlegmate ex destillatione olei anis. ʒij. sacc. cand. ʒv. vin. de Malaga ʒvi. Coq. lentè ad consistentiam eclegmatis, infilla ol. sulphuris per campanam, q. f. ad gratam aciditatem.

M. ʒ. & lambatur instar lincius.

Aliquando oleum sacchari hujusmodi præcribo.

℞. Rad. enul. ʒj. ireos Flor. ʒʒ. glycyrrhiz. ʒvi. fol. sic. marrub. alb. hyssop. scabios. heder. terrest. erysim. an. ʒv. rad. caryophyl. sic. ʒx. cort. rad. sassafr. ʒij. sem. anis. foenic. dulc. an. ʒviii. contus. affund. aquæ vit. ad iv. digit. supernatationem, infunde per quadriduum: Colaturæ lb ij. adde sacchar. crystal. pulv. lbj. flor. sulph. ʒj. accende liquorem in paropside flamma, & agita donec inflammatio cessat, cola per linteum, & adde mellis passulat. quartam partem, f. Eclegma.

Si spura sint purulenta, & tussis urgeat.

℞. Pulp. rad. alth. & passul. in aq. scabios. & hyssop. simul. coct. pist. & traject. ʒij. pulv. subtiliss. fol. tussilag. glycyrrhiz. Hispan. an. ʒij. ireos Flor. ʒij. lact. sulph. ʒij. sacch. crystal. pulv. ʒviii. cum pauca aqua hyssopi f. Pasta pro trochiscis hypoglot.

Si opus sit majori deterfione, convenit Lohochide thure.

℞. Thur. mascul. ʒij. sacch. crystal. ʒij. pulv. includ. cavitate majoris pomi dulcis, quod proprio operculo rectum torreatur, & pulpa bene cocta à superfluitatibus separetur, addendo pulp. rad. enul. in hydromel. ad putrilag. coct. pist. & traject. ʒj. pulp. passul. ʒij. pulv. hyssop. & fol. tussilag. an. ʒij. ireos Flor. ʒij. succ. glycyrrhiz. ʒʒ. syr. de erysim. heder. terrest. roris solis an. ʒij. flor. vel lact. sulph. ʒʒ. M. f. Lohoch.

Potens admodum est remedium Saponæ sequens magistralis.

℞. Rad. enul. rec. ʒij. alth. ʒiv. passul. maj. ʒij. Coq. ad putrilaginem in hydrom. malvar. pistentur, trahantur per setaceum, de pulpa lumen ʒij. suc. glycyrrhiz. ʒʒ. ireos Flor. ʒij. sem. anis. foenic. dulc. an. ʒij. sem. angel. cardam. an. ʒʒ. mastich. olib. an. ʒj. cinam. inter. ʒij. croci ʒij. Terantur terenda in alcohol, adde duplum saponis Venet. alb. & cum syrupo pectorali f. Electuarium, addend. ol. anis. ʒʒ. dos. quant. nuc. moscat. bis terve in die.

Mel Passulatum de quo sæpius supra dictum est.

℞. Passul. lb iv. aq. f. lb xii. macera per hor. 24. dein coq. ad tertias. Colatura coquatur ad mellis consistentiam, & usui servetur.

Tabellæ de Althæa de quibus mentio supra facta est.

℞. Spec. diatrag. frig. pulv. glycyrrhiz. ana ʒiv ʒ. sem. papav. alb. ʒij. ireos Flor. ʒij ʒ. sacch. alb. lb i ʒ. cum pulp. alth. q. f. f. Tabellæ.

Post deterfionem, si opus sit validâ exsiccatione usurpetur suffitus talis.

℞. Auripigmi ex cineribus vitis vel cum flor. sulphur. sublimat. ʒʒ. Tabaci Indici opt. ʒij. tussilag. rad. enul. calam. aromat. ana ʒiv. lign. aloës, benzoin. gum. guajac. naturalis ana ʒi ʒ. f. pulvis subtiliss. & cum tereb. Vener. q. f. vel balsam. Peruv. f. trochisci num. ii. profussitu, cujus fumus excipiat cum infundibulo.

Sæpius Tabacum compositum sequens præcribo.

℞. Fol.



℞. Fol. tussilag. sicc. 3℔. laur. salv. mala-  
bathr. an. 3 ij. rad. enul. 3 ij ℔. cort. guajac.  
gum. ejusdem an. 3 ℔. tabac. Indic. 3 iij ℔. suc-  
cin. oliban. an. 3 vii. auripigm. flaviss. scintil-  
lant. 3 ℔. Auripigmentum, succinum, oliban.  
cort. & gum. pulverizentur, & cum cæteris cras-  
siusculè incilis misceantur; & capiat funum  
instar Tabaci vulgaris, idque paulò ante as-  
sumptionem apozematum pectoralium bis ter-  
ve in die.

Si Empyema per latus alterutrum viam mo-  
liatur, latus affectum foveatur sicut seq.

℞. Rad. alth. lil. alb. an. 3 ij. brion. ari ana  
3 i ℔. enul. 3 iij. fol. malv. parietar. senecion.  
ana m. j. scabios. heder. terrestr. marrub. alb.  
ana m. ij. sem. fœnugræc. 3 x. sem. anis. fœnic.  
ana 3 iij. Coq. in aq. f. part. xii. mell. part. ij.  
acet. scillit. part. j. Colaturæ adde ol. violar.  
th j. chamæm. rut. ana 3 ℔. Mf. & cum spongiis  
eodem madidis f. Fotus mane & vespere per  
horam integram.

Post forum, optimè detersâ parte, applicetur  
Emplastrum sequens lateri affecto.

℞. Empl. diachyl. ireat. 3 iv. pic. Burgund.  
3 iij. ladan. 3 ij. gum. caran. cacamahac. an. 3 j.  
pulv. flor. chamæm. melilot. trifol. odorat.  
ana 3 ℔. pulv. cumin. rut. flor. sulphuris ana  
3 vi. croc. 3 ij. bals. Peruv. terebinth. Venet.  
an. 3 vi. cer. flav. q. f. Emplastrum. Aut ap-  
plicari potest Emplastrum Diasulphuris Ru-  
landi.

Si adit catarrhus, conveniunt fontanellæ,  
vel in futura coronali, vel in homoplatis.

Aquæ Thermales sulphureæ hic maxime con-  
veniunt.

Paracentesis antequam vires sint nimis con-  
sumptæ semper fere feliciter succedit, aperto  
latere inter quintam & sextam costam (ab  
inferioribus numerando) eo in loco ubi sub  
infimo exortus pectoralis musculi angulo  
musculus serratus major & epigaltri obliquus  
externus dentatini junguntur, scalpello a-  
cuto panniculo obligato deorsum natante  
truncione, servatâ rectitudine fibrarum inter-  
costalis musculi, & eadem ipsam cum sub-  
jectis partibus audacter dividat Chirurgus,  
adactâ in superiorem collæ quintæ partem  
acie. N.B. Potius autorsum aliquantulum quàm  
versus spinam secandi sunt omnes Empyemat-  
ci, salvis diaphragmate & pulmonibus qui in  
ista parte vulnerari nequeunt, sumto inter se-  
candum expirationis momento. Dein fiant in-  
jectiones vulnerariz, detergentes, & postea ex-  
siccantes & consolidantes. *Theodor. de Mayerne  
Prax. Medic. lib. 2.*

*Hic in Curatione Empyematis jam adda-  
mus qua de Paracentesi thoracis, habet Tho-  
mas Fienus in suo de principis artis Chirurgica  
controversiis libello sic autem ille.*

Paracentesis est sectio, per quam fit vulnus  
penetrans in corporis cavitatem. Etsi autem  
per paracentesin intelligatur proprie tantum se-  
ctio, quæ fit ferro frigido, tamen volo ego eam  
hic latius considerare, sic ut sub paracentesin  
non tantum sectio comprehendatur, sed etiam  
ustio, qua fit ulcus penetrans. Perforatio

enim usque ad corporis cavitatem fit duobus  
modis, vel ustione, vel sectione. Quia autem u-  
traque est ad eundem finem, ideo utramque  
sub generali nomine paracenteseos hic compre-  
hendere volo. Dico, penetrans in corporis cavi-  
tatem. Corporis autem cavitates duæ sunt;  
una supra diaphragma, quæ est cavitas intra  
thoracem contenta: alia sub diaphragmate,  
quæ est cavitas in abdomine contenta. Ideo  
duplex est paracentesis; alia pectoris seu thora-  
cis, alia abdominis.

Ufus, & finis utriusque paracenteseos unus  
est, ut nimirum per foramen sic arte factum ali-  
quid, quod intra illas cavitates contra natu-  
ram continetur, & alia ratione à natura exclu-  
di non potest, educatur. Quod ibi contine-  
tur, vel est pus, vel aqua. Itaque omnis pa-  
racentesis est aut ad pus, aut aquam; & vel ex  
pectore, vel ex abdomine educendum. Pus in  
pectore colligitur, vel à præcedente anginâ,  
vel pleuritide, vel peripneumonia suppurat-  
is, & ruptis, & sic affectus vocatur empye-  
ma. Vel etiam à vulnere, vel casu ab alto  
ruptis intra venis & sanguinem multum effun-  
dentibus, qui in pus convertitur. Pus intra  
abdomen colligitur aliqua phlegmone alicujus  
partis, intra ipsum contentæ, suppuratæ aut  
ruptæ, ut renum, hepatis, mesenterii, peri-  
tonei, aliisque. Aqua colligitur supra Dia-  
phragma in cavitatem pectoris, sic ut pulmo ei  
inuatet, ex pulmonis nimia refrigeratione,  
pericardii fissura, aut feri ex osculis venarum  
diapedesi. Et is affectus vocatur hydrops pul-  
monis. Aliquando colligitur aqua in abdomi-  
ne, & ille affectus vocatur Hydrops simplex,  
seu Ascites. In his omnibus affectibus conve-  
nit paracentesis. Puto ego, adhuc aliam cau-  
sam esse, propter quam paracentesis fieri pos-  
sit; nimirum, non tantum, ut aliquid ex cavi-  
tatibus corporis evacuetur, sed ut aliquid  
etiam in eas immittatur. Sic potest fieri hæc se-  
ctio ut decocta aliqua abstergentia, cum syrin-  
gis injiciantur; interius scilicet ulceribus aliquot  
difficilibus existentibus, quæ curari non possunt,  
& ad quæ non possunt alia ratione medicamen-  
ta commode prævenire. Sic Harcerus insignis  
Chirurgus Hispanus docet, ulcera pulmonis, &  
Phtisim facile esse curatu, & sese sapius ea cu-  
rasse, & curæ modum docet hunc; ut nempe in  
pectore sectio fiat, & per foramen decocta de-  
tergentia injiciantur, quibus ulcus eluatur,  
mundetur, & consolidetur.

Quæritur autem: an unquam paracentesis pe-  
toris sit facienda? Videtur autem quod non,  
autoritate Pauli Aeginetæ l. 6. c. 44. ubi dicit; *alt-*  
*quos vii sectione, vel ustione thoracis penetrativa*  
*usque ad cavitatem. Sed isti, inquit, statim moriens*  
*interiunt, vel faciunt, ut fistula remaneat.* Hollerius  
comment. Sect. 6. Aphor. 27. dicit; *se duos vi-*  
*disse empyicos, sed unum eorum obiisse, alterum fi-*  
*stulosum ulcus reservasse.* Hisce ratio videtur suf-  
fragari. Quia si in thorace foramen fiat, per  
illud externus aer ingreditur, & calor, & spi-  
ritus interni egredientur, & cor, & pulmo,  
principes & calidissimæ partes, spirituque ple-  
næ refrigerabuntur, & debilitabuntur, & mors  
sequetur. Secundò, quia est communis opinio  
Medicorum, quod pulmo moveatur fuga vacui,  
ad motum thoracis. At si in pectore fiat fora-



men, jam cessabit ratio illa fuga vacui, quia aer, qui potest de foris ingredi per foramen, faciet, ut tunc non sit amplius tale periculum vacui, & ideo debet motus pulmonis cessare, vel saltem valde minui; pulmonis vero motu vulnere imminuto & pure interius cavitatem opplente, & respirationem impediante, sequitur, quod fieri debet suffocatio, & mors. Saltem, cum in cavitate utriusque thoracis pus continetur, non poterit sectio talis ulla ratione fieri, quia illa sectio tunc fiet, vel in uno latere, vel in utroque: si fiat in uno tantum, fiet frustra, quia per illam tantum poterit evacuari pus, quod in illo latere est, quod autem est in opposito latere non poterit, & tunc illud poterit adhuc tam bene mortem causare per se, quam antea. Si fiat sectio in utroque latere tunc omnino sequitur, quod non poterit pulmo fuga vacui moveri, ergo necesse erit pulmonem a respiratione cessare, & ægrum mori.

Contra vero quod hæc sectio in empyecis, & hydrope thoracis aliquando fieri possit, docet, Hipp. variis in locis. Nam lib. 3. de morbis docet, quomodo empyemate laborantes sunt urindi, & secandi. lib. de intern. affect. docet collas ipsas perforare in hydrope pulmonis, quo per foramen aqua valeat exire, & Aphor. 27. §. 6. dicit: quicumque empyici aut hydropici sunt, & secantur, vel uruntur si pus vel aqua confertim exeant, moriuntur. Ubi insinuat, quod illi quidem secari, & uri possint; sed hoc tantum sit cavendum ne aqua & pus confertim exeant. Porro omnes fere Practici docent in empyemate, si videamus, quod natura intra certum tempus pus ejicere non potest, paracentesin esse faciendam. Etsi enim illa absque dubio non sit periculi expers, non est tamen certo lethalis, sed sæpissime potest curari, ut experientia docet. Præstat ægro remedium adhibere, a quo fit spes sanationis, etiamsi periculi aliquid habeat, quàm certæ morti relinquere. Si enim sic relinquuntur vel mox moriuntur, multitudine puris suffocati, vel quia pulmones in eis inflammantur, & corrumpuntur: vel in phthisin abeunt, quæ omnia sunt mala lethalia. Quod autem hæc sectio non sit tam periculosa, ex eo patet, quod omnes singulis diebus experimur, plurimos homines convalescere, qui vulnere thoracis penetrativo. Ipsi fuerunt. Huic accedunt exempla eorum, qui passi talem paracentesin, tamen fuere curati. Scribit Plin lib. 7. cap. 33. quod Phalerens deploratus à medicis vomica laborabat. Et cum mortem in acie inquit, quæreret vulnerato pectore medicinam ab hoste invenit, & per vulnus erumpente pure fuit curatus. Idem scribit Val. Max. lib. 1. cap. 6. Hipp. in Coacis prænotionibus scribit, se compertum habere, ulatione aut sectione quosdam evasisse in diuturnis thoracis ulceribus. Paschalus li. 1. c. 29. commendat hanc sectionem, & dicit, quendam nomine Lupum sic ab empyemate fuisse curatum. Vesalius in consilio pro vulnere Ducis Terræ novæ, dicit, se hac sectione sæpius usum fuisse, & alios uti se vidisse, & se nunquam advertisse ex ea aliquid sinistri, aut contra præcepta artis evenisse, & licet contigerit aliquando, aliquos sic sectos mori, non fuisse tamen mortuos ratione illius sectionis, sed magnitudinis primi mali propter quod sectio erat instituta: scribit Brasagonus in suis commentariis

6. Aphor. 27. se quendam suppuratum visisse, & sanatum fuisse. Saxonia etiam se unum secuisse dicit, & adhuc vivere. Paræus, Haræus, Guinimæus aliq; Chirurghi celebres hanc sectionem commendant, & faciendam docent. Quapropter ad argumenta, in contrarium allata sic debet responderi. Ad auctoritates; dubium non esse, quin aliquando secti moriantur, sed id sæpe accidit, ut ait Vesalius, ratione empyematis, quod interna corrumpit, & non sectionis, sæpe quod sectio mala sit facta, aliquando forte etiam propter ipsam sectionem. Sed non sequitur, quod ideo remedium omnino sit omittendum, quod aliquando obviat: sufficit, quod possit sæpius prodere, & ad hoc ut in desperatis casibus adhibeatur. Ad rationes, atque ad primam: non propter foramen internas illas partes valde refrigerari, propterea quod parvum sit, & semper emplastris, & aliis linteis bene sit tectum, & clausum. Ita videmus ventrem sæpe esse apertum, cerebrum esse denudatum, thoracem a vulneribus in gnus pertulim, & nihilominus tamen adhuc ægros convalescere, nec exinde internas illas partes adeo refrigerari, ut inde mortem sequi sit necesse. Ad alteram dicitur, quod respiratio non fiat fuga vacui, etsi communis schola medicorum ita sentiat. Scribit enim Felix Platerus, & alii, sese sæpe ægros habuisse, qui ab utroque thoracis latere penetranti vulnere affecti fuere, qui tamen non desierunt, propterea commodè respirare, quod tamen omnino necessum foret, si pulmo fuga vacui, ad motum thoracis moveretur, ut asserunt. Scribunt etiam Alex. Benedictus, Nicolaus Piso, & alii, quod cum ab utroque latere pus continetur, quod ab utroque latere sectio sit faciendæ: quod non facerent, si utriusque vulnerato thorace respirationem cessaturam, aut pulmonem fuga vacui non amplius motum iri crederent. Sed posito, quod ita foret, adhuc tamen posset sectio utriusque fieri, quando pus in utraque cavitate continetur, sed non simul, verum una post aliam, scilicet pure unius lateris per sectionem ejusdem lateris evacuato, & vulnere iterum consolidato. Posset sectio denuo in altero seu opposito latere fieri.

Ut hæc paracentesis commodè fiat, ante omnia considerandum est, quis locus ei conveniens sit; Pro quo sciendum est, quod semper sectio fieri debet, in loco, in quo pus continetur, & in illa parte, per cuius foramen potest pus exire. Nam si sectio fieret in eam usque cavitatem, in qua non est pus, frustra facta esset, & frustra periculum tentatum, & Medicus ignominia affectus. In thorace autem dux sunt cavitates distinctæ; una à dextro latere, à sinistro altera: propterea quod membrana, mediastinum dicta, in medio thoracis sit constituta, & unam ejus medietatem ab altera separet: ex quo fit, quod pus, quod in una cavitate est collectum, non possit ad alteram cavitatem venire. Accidit autem, ut aliquando pus in una cavitate, aliquando in altera tantum, in utraque aliquando cavitate colligatur, quapropter multum elert, in quo latere sectio fiat. Colligitur pus in uno vel altero latere, prout phlegmone vel in uno vel in altero latere est generata.

Quæ in dexterâ parte facta est, in dexteram cavitatem pus deponit; quæ in sinistra,



in finitram. Per pleuritidem semper in unum tantum latus pus deponi potest: per anginam & peripneumoniam, aliquando in unum tantum, aliquando in utrumque. Nam in angina pus quod effluit, & delabitur in tracheam, interdum potest dilabi in unum tantum tracheæ tantum, seu dexterum seu finitram: interdum in utrumque. Trachea enim, cum ad pulmonem pertingit, in duos ramos bifurcatur, quorum unus in dextram, in finitram pulmonis partem alter fertur: & exinde in finitram aut in dextram cavitatem thoracis vel in utramque. Peripneumonia etiam est aliquando in uno latere pulmonis tantum, aliquando in utroque. Cum est in utroque, potest in utramque cavitatem pus deponere, etsi non necessario: quia etsi in utraque parte sit, non tamen necessario abscessum facit in utraque parte, aut erumpit. In quo ergo latere pus continebitur, in eo erit secandum. Si autem in utroque latere contineatur, quid erit faciendum. Dicit Alex. Bened. lib. 10. cap. 14. & Nicolaus Piso ac alii, tum in utroque latere esse secandum, sed non eodem, aiunt, dic. Et certe, si in utroque latere pus contineatur, vel non erit secandum, propter periculi magnitudinem, vel si secandum erit, secandum in utroque: nam alioqui, quod in opposita cavitate pus continetur, non poterit per oppositæ sectionem evacuari, & sic maneret idem periculum mortis a pure in uno adhuc latere contento, quod antea erat à contento in utroque.

Cognoscendum ergo imprimis exactè latus est, in quo pus continetur. Illius cognoscendi varia signa sunt, tumor, calor, dolor, pondus, & strepitus puris fluctuantis. Imprimis dico, tumor: quia tumor, & sublimius quodammodo est latus, ubi collectum pus est, cum cutis exterioris livore quodam, & calore, quem corrupta evaporatio inducit. Sed & naturæ beneficio pus aliquando extrorsum extruditur, atque in musculos externos erumpit. Calor etiam est signum, quia latus illud, in quo pus est, magis calet. Hinc Hippoc. l. 3. de morbis, ad sciendum, in quo latere pus contineatur, docet, totum thoracem creta liquida, vel terra erictica obducendum esse, & quæ pars primofuerit exliccata, in ea pus contineri. Tertium signum est pondus quia, cum æger in oppositum, ac sanum latus incumbit, illi pondus aliquod à superna parte pendere videtur, unde interdum angustia premitur, & tussis fatigatur, & majori dolore infestatur. Denique fluctuatio & strepitus manifestus puris auditur in affecto latere, cum æger convolvitur, nisi forsan puris crassities aut copia, totum spacium implens, impediatur. Hinc Hippocrat. alibi docet, ægrum manibus esse tenendum, & toto corpore concutendum, & Medicum oportere aures pectori dolenti adhibere, ut audiat, qua parte strepitus puris audiatur. Cognito latere in quo est secandum, locus præcisè est cognoscendus, illum locum aliquando monstrat natura. Itaque si aliqua parte thoracis tumor, aut calor major appareat, ibi est secandum. Extra illum casum artificio locus est inveniendus.

Aliqui dicunt, intra secundam vel tertiam

Costam sectionem fieri debere. Aliqui, inter tertiam, & quartam. Alii inter quartam, & quintam. Alii (inter quos est Vidus Vidius.) inter quintam, & sextam dicunt esse secandum. Plurique omnes, vel inter tertiam & quartam, vel inter quartam, & quintam statuunt. Ego noto familiores asserere, inter quartam & quintam. Illæ autem costæ debent computari ab infra sursum, a costis notis incipiendo: unde, cum dicitur, quod debet sectio intra quartam & quintam, non debetis tunc intelligere costas spurias, sed veras & legitimas. Verum adhuc multum retert, an versus pectus an versus spinam locus eligatur. Verius spinam periculosus est: Imo quia ibi pulmo pleuræ vicinior est. Secundo, quia ibi costæ sibi in utro sunt viciniores, ad latera autem collarum decurrunt magnæ venæ, quæ sunt venæ: zygu propagines. Itaque illæ venæ ibi sibi in utro sunt vicinissimæ, sic ut difficile sit secare inter costas, quin illæ venæ tangantur. At sursum versus pectus costæ, & venæ divaricantur, & paulatim sunt tenuiores, & ideo illic minori periculo sectio fieri potest, debet ergo locus eligi, antrosum, versus pectus, sex aut septem digitis transversis remotus a spinâ Hippoc. l. de internis affect. advertens periculum in sectione esse, ne illæ venæ tangantur. Docet alium non eodem, qui videtur esse tutior, ut nimirum supra tertiam costam secetur, & tunc ipsa costæ terebello perforetur, & inde pleura transpugatur. Illa sectio videtur minus periculi habere. Recentiores tamen Medici nunquam eam usurpant: quapropter necesse est, ut illa magnum aliquod incommodum habeat. Illud imprimis est, quod aliqui habeant costas tam parvas, & angustas, ut eas perforare impossibile foret. Secundo, quia etsi habeant costas satis magnas, tamen nemo eas tam magnas habet, ut per eas magnum foramen fieri possit, sed tantum parvum: per parvum autem foramen non possit satis commode pus & sæpe tam multum, & crassum evacuari, sed tantum aqua. Et ideo in quibus propter aquam in thorace paracentesis fit, in his hæc collarum perforatio locum habere posset: vel etiam in his, qui costas habent valde latas. At verò in his, qui angustas, vel qui Empyemate laborant, non item, ut Libantius super Aphor. & Paræus in Chirurg. etiam attestantur. Realduus Columbus insignis Anatomicus, alium locum insinuat, & dicit, commodè, & satis tuto hanc perforationem in illo fieri posse, quam alii quoque nonnulli sequuntur. Sed cum non habeant certam aliquam de illo loco doctrinam, vobis vulgarem intra costas sectionem commendando.

Quo ad modum perforationis, is duplex est: vel enim fit sectione, vel ustione. Alii sectionem, alii ustionem præferunt. Interdum fit utroque modo. Ultio autem dupliciter fieri potest, vel cauterio actuali, vel potenciali. Antiqui solebant ferro candenti urere, ut ex Hippocrate, & Paulo manifestum est: Paræus lib. 7. cap. 10. dicit, ustionem quæ enim ferro candente fit magis esse sectam. Idem ait Leonus: Ratio, propter quam id dicant est, quia ubique inter costas sunt magnæ venæ, quæ facile tangi possunt, & si sectione tangerentur, periculum adferrent magnæ, & pe-



riculosæ hæmorrhagiæ: at si ferro candente tangantur non est illud periculum, propterea quod venæ a cauterio clauduntur. Vidus Vidius, dicit debere fieri sectionem cum scalpello, postea ferro candenti locum esse inurendum absque dubio ad eandem hæmorrhagiam evitandam: Verum ego imprimis non probō, ut locus ferro candente usque ad cavitatem inuratur. Nam præterquam, quod hoc remedium sit horrendum, & crudele, non convenit etiam corporibus, jam a morbo tam debilibus; & attractu ignis febris augeri, & membrana succingens costas inflammari posset. Ideo Paulus, & Albucalis, cum de ulatione usque ad cavitatem loquuntur, dicunt esse remedium; à quo statim mors sequatur. Quod si vero sectio fiat, & tum videatur sequi hæmorrhagia, equidem ut tum insuper ultiō fiat, sicut Vidus dicit, esse necessarium. Restat ergo ut perforatio fieri debeat, vel sectione, vel cauterio potentiali; & vel alterutro solo, vel utroque simul. Cauterio potentiali solo inurere, minus longæ moræ est: sunt enim decem dies, antequam eschara excidat, & interim à pure intus partes corrumpuntur. Hodie moderni Chirurgi utuntur vel sectione sola; vel cauterio potentiali, & postmodum sectione per escharam ab ipso cauterio inductam. Uterque modus est bonus. Sed qui sola sectione fit habet interim periculum hæmorrhagiæ conjunctum. Qui vero cum prævio cauterio fit, non item: per escharam enim venæ clauduntur. Quapropter puto ego, hunc ultimum modum esse securissimum, uti etiam Guilimæus attestatur: non tantum, quod per hanc non sit periculum fluxionis sanguinis, sed etiam, quia, cum eschara excidit, magnum sit foramen, quod ultro diu apertum manet, per quod pus potest evacuari. Nam, si sola sectione perforatio fiat, debent ægri continuo cruciari impositis tentis ad foramen apertum retinendum, quod & calorem, & febrem, & inflammationem parit. Si simplex sectio fiat, illa debet fieri, cum novacula angusta, & acuta, non autem scalpello; quia instrumentum debet ab una parte esse obtusum. Scissio debet fieri superne deorsum, sic, ut obtusa pars cultri sit sursum: quia sic cavetur, ne vena quæ sub costa jacet, vulneretur. Et debet duci oblique secundum ductum fibrarum musculorum nimirum versus deorsum ut sic facilius postea iterum vulnus conglutinetur. Cum autem potentiale cauterium imponitur, tum post faciam escharam sectio fieri debet: non cum novacula, sed lancetta, ad cavitatem usque; & tunc non necessarium est ductum fibrarum observare, sed præstat rectè transversaliter secundum costas incidere. Sectio etiam facienda est, cum æger expirat, propterea quod pulmo tunc contrahatur, & a costis recedat, & sic minus tunc tangi possit.

Sectione facta pus, aut aqua per foramen educenda sunt, sed paulatim. Nam si conferunt educerentur, subitæ mortis periculum est, sicut Hippocrat. sect. 6. Aphorism. 27. & aliis libris, toties est attestatus. Tunc suppurantia, quæ crustam excidere faciant, sunt deforis adhibenda, intus verò per foramen, cum syringa, injicienda sunt medicamenta, quæ leniendi, & ad temperiem reducendi corruptas partes simul, & pus detergen-

di vires habent, ut sunt aqua hordei cum melle rosato, atque decocta detergentia. Fuit etiam alius veteribus empyicos curandi modus: scilicet ut multis crustis superficialibus, non autem in cavitatem penetrantibus, circumquaque thoracem urerent, quem docet Paulus l. 6. c. 46. Albucal. l. 1. c. 3. & meminit Gal. l. 7. Aphor. 44. cum ex Platone Comico refert, Linesium Evagere Filium ab Euriphonte Medico, multis escharis inusum, fuisse curatum. Sed de illo modo nos hic non loquimur: sed tantum de tali ulatione, quæ in capacitatem thoracis penetrat.

Quoad tempus paracenteseos faciendæ, illud vel est generale vel particulare. Quoad generale tempus, dicunt omnes eam in empyemate esse faciendam ante X. à puris eruptione diem: nam post illud tempus vires ægri minus debiles sunt, & partes thoracis corumpi inciperunt. Unde etiam si tum paracentesis fiat, partibus sic corruptis, frustranea esset, & æque bene mors sequeretur. Moneant insuper Medici ex præcepto Hipp. in Coacis prænotionibus, ut neque tum statim à puris eruptione etiam sectio fiat, sed usque ad XV. dies post illam expectetur. Rationem dicunt, ut pus illud interim concoquatur, quod perpetuo post eruptionem crassescere, ac refrigerari potest. Verum puto ego & aliam rationem esse potiore, ut interea ex propriis signis certius nobis constet, an ita pus erumpere possit, & an in thorace, & quæ ejus parte sit collectum: simulque videatur, an non illud alia aliqua via à naturâ commodius sit expellendum.

Hæc generalis regula esse debet, ut nunquam paracentesis fiat, cum suspicio jam est, partes intra thoracem à pure corruptas esse. Secundo, ut nonnunquam fiat, nisi adhuc cum mediocriter vires ægrotantis constant: nam cum illæ vehementer sunt prostratæ, non sunt tam magno remedio tolerando; sed æger succumbit, & moritur. Hactenus Thomas Fienus de Paracentesi Thoracis, sequuntur jam.

### Consultationes.

#### *Pro quodam Illustri, & Nobili Juvene Empyemate, seu suppuratione laborante.*

Quisnam sit locus affectus in casu Illustris & Nobilis Juvenis apud omnes non ita constat, thoracem tamen ego secundum cavitatem esse existimo; thoracem quidem, ut suadet spiratio valde difficilis, secundum cavitatem, ut gravitas illa, quæ in profundo ejusdem præsentitur, necnon fluctuatio ibidem percepta, demonstrant.

Et quoniam cavitatis morbus proprius est angustia, & hæc multiplex esse solet, puto ego angustiam hanc esse constipationem factam à materia purulenta, quæ ex abscessu anginoso suppurato, atque disrupto in thoracem cecidit, nam cum abscessus ille præcesserit, per os non fuerit expurgatus, & nunc pus cum tussi expuatur, satis apparet thoracis cavitatem dictam à pure constipari; Ex quibus, ni fallor, constat, quæ sit immediata causa constipationis, est enim pus illud non quidem genitum in thorace, sed in partibus ipsi superioribus occasione anginae pro-



progressu productum: Pus namque cum tussi rejectum thoracis actiones necessario sequitur, expulsiōem inquam, atque coctionem expulsiōem quidem tantum, quando pus in eodem thorace non generatur (sicuti in casu proposito contigit) coctionem vero simul, dum generatur in pectore, seu cavitate thoracis occasione materię a capite destillantıs, quod in patiente nostro minime locum habet.

Quibus ita breviter constitutis. Dico pus ut est quid a toto genere præter naturam esse eradican- dum, ut crassum, & viscidum detergendum, ut acre attemperandum, ut lædit thoracem esse educendum per tussicularia, & convenientia remedia, proportio tamen semper omnium viscerum thoracis est conservanda.

Quod autem in similibus casibus Medicus vix possit ad optatum finem pervenire, de se pater, quinimodò nisi spatio 40. dierum materia hæc expuatur, actum erit: Accedit (& hoc in casu præienti non levi timorem incutit) quod longe pejus est Empyema, ad Anginam, quam ad destillationem subsequi: Quapropter nisi cito succurratur, imminet hæctica imminetq; phthisis: Quod tamen aliquid spei pollicetur, est ægrı prudentia, & ætas juventutis, nec non & illud quod tota thoracis cavitas haud est repleta, sed tantum dextra ejusdem pars afficitur.

Accedens itaque ad curationem, vix sectionem improbo, sed aliis non conferentibus iudicio ad thoracis perforationem in parte dextra multione, vel sectione faciendam erit deveniendum.

Quoad medicamenta, quæ antequam chirurgus ad perforationem accedat, tentanda sunt, dico quod vel ad pus quiescens, vel motum diriguntur, si ad quiescens, jam oportet materiam attenuare, atque discutere emplastro ex radicibus althæz, pulvere cumini, radicis ireos, & oleo lilaceo, vel ceratis convenientibus, uti est Diachylon gummatum, Diapirites, & sacrum.

At si idem pus moveatur, prout ad partes diversas movetur, diversa quoque sibi requirit medicamenta.

Si igitur ad cutim facta perforatione utendum est mulla, & melle rosato simplici cum aqua hordei: At si ad pulmones inclinet, conveniunt oxymel simplex, scillinum, loch de pulmone Vulpis, sanum, & expertum, adjecto modico sirupi violati, vel de liquiritia, vel de farsara, propter puris mordacitatem. At si vias urinæ adest, decoctum convenit Asparagi, fœniculi cum lacte sem. melonum, si vero ad alvum tendat, licebit uti mel. ros. sol. agarico, & clysteribus communibus.

Quoad victum necesse est patientem cibis uti medicinalibus. Idè pure quiescente, convenit amygdalatum, & pineatum, si moveatur ad cutim mel cum cibariis erit opportunum, si ad renes petroselinum, Asparagus, & lac sem. melonum probantur, si demum alvum perat, jus caulium, mercurialis, & passularum mirum in modum proderit. In materia quiescente convenit vinum odoratum, in materia verò, quæ ad Carim movetur vinum cum melle potandum erit, in ea, quæ ad renes a vino medicato cum radicibus aperientibus non est recedendum, ac tandem in materia, quæ ad alvum inclinationem habet, vi-

num alteratum cum senna, cum cartamo accommodatum exiit. In reliquis autem quid sit agendum, unicuique ex medicis atiam trivialibus manifestum esse iudico, atque ideo reliqua consulto prætermitto, Deumq; quæ maxime oro, ut sanitatem huic Illustri Juveni misere laboranti concedere ne dedignetur. *Julius Caesar Claudinus in Consultationib. Medicis.*

*De Pleuritide in Empyema degenerante. Pro Reverendiss. Vestali Abbate.*

Reverendissima & Religiosissima Vestalis Abbas, ætatis annorum 54. temperamenti calidi ad humidum vergentis, destillationi obnoxia pituitosæ materię a capite ad varias corporis partes, cujus ratione antehac doiores articulares passa est, duobus abhinc mensibus febricitare cepit, febrilique singulis diebus habebat annotationes quolibet tertio die sibi respondentes, cum levi quadam extremorum refrigeratione: ac deinde incalescentia, vigiliis, & capitis gravitate: cui quarta die supervenit dolor gravis in thorace respirationi molestus, cum difficili decubitu in utrumque latus, tussi, cum excretionem materię pituitosæ & aliquando cruentæ, urinis crassis, & pulsus oppressionem adeo gravis, ut vix percipi posset motus dialtoles: quibus accesserunt animi pathemata, & palpitatio cordis. De agendis propterea consulti.

Quocirca in consultationem acciti, contræstatis visceribus naturalibus, exacerbatoq; dolore ad compressionem partium utrinq; sub collis mendosis, in eam sententiam deveni, quod laboraret inflammatione spuria septi transversii, cum ipsius Medici clinici, aliq; contrariam tuerentur, febre scil. mali moris tam detineri; quæ causa fuit, cur tunc, & antea plurimis cardiacis usi fuerint, atque vesicantia internis partibus applicaverint, lenita alvo, & præparatis humoribus, sanguineque misso ex salvatella. Ego vero obtruncatus in prima mea sententia, eclegmata præscribenda duxi ex syr. de farsara, acetofo simpl. syr. de hyssopo; atque in dies dolore utrinq; invalescente, præscriptum fuit ol. amygd. dulc. ad 3 v. cum 3 ij. syr. acet. simplicis, a cujus usu, remittente dolore, cum sensu majoris gravitatis, & difficiliore decubitu in latus dextrum, suspicatus sum inflammationem in abscessum mutari in sinistra parte pleuræ, quæ pertingit ad costas mendosas: ac propterea præscripto acri clystere, quod ob virium imbecillitatem dejectoria per os sumpta ferre non posset, moxque fomento parti affectæ ex flor. chamæm. rad. alth. seminib. lini. & meliloto, in vino albo generoso mane, & vespere, cum spongia calida applicato, dolor remisit luculentius, ita ut decumbere posset in utrumq; latus, pulsus invaluerunt, cordis palpitatio, febrisq; remisit; gravitate tamen in parte affecta persistente. Lambitivum propterea validius fuit præscriptum, ex oxymelithe scillitico, ut & cardiacum, Mithridatica non pe confectio, quam bis sumpsit; ac tandem validiori tussi excitata, abscessuque disrupto, expuere cepit materiam purulentam, cum quibusdam sanguinis notis: atque ita præsens affectus in empyema degeneravit. Quare tunc eò collimavit consilium nostrum, ut expurgaretur materia illa præiuncto Hipp. prognostico 5. Aph. 15. quod



quicumque ex morbo laterali Empyi fuerit, si 40. diebus purgantur, à qua die fit disruptio, liberantur; alioquin ad tabem transeunt.

Expurgari autem debet sensibiliter, vel per partem affectam, vel per urinam, vel per alvum, vel per os, & sputum. De evacuatione per partem affectam, thoracem, scil. locutus est Hippoc. 6. Aph. 17. cum dicit: *Quicumque empyi uruntur, aut secantur, sicutum pui conferunt effluat, omnino moriuntur.* Ex quibus patet, quod educi potest, vel per ulationem, vel per sectionem. Ad alterutrum tamen tunc tantum deveniendum esse ait Gal. in commento, quando nulla est spes materiam evacuandi per os, adestque maxima difficultas respirationis, cum periculo suffocationis. In hoc solo casu hæc operatio administranda. Verum in presenti, quum levior sit spirandi difficultas, quam ante suppurationem, viresque sint robustiores, ideo ipsa supersedendum erit, quin potius procuranda esset prædictæ materię expurgatio, vel per vias urinæ, ut non raro fit, Galeni testimonio 6. de Loc. Aff. 4. cui subscribit Paulus Ægineta, & Ætius, cum Recentioribus, facta nempe ipsius transmissione per ramum venæ sine pari insertum sub diaphragmate in venam cavam prope emulgentes, per quam pus ad urinam permeare potest, ut inquit Fallopius; non vero per venam arteriosam ad dextrum cordis ventriculum, hincque in venam cavam, jecur, & renes, ut asseruit Mesue; valvulæ namque venæ cavæ in corde admittunt quidem in ipsam materiam, non autem ejusdem ab eo effluxum ad jecur: per alvum itidem expurgari potest prædicta materia, vel per ramos venæ portæ diaphragma perreptantes à quibus per venam portæ ad intestina, & alvum patet via, ut asseruit Gal. 6. de Loc. Aff. 4. vel tandem per os, tanquam per locum omnium accommodatissimum, ut optimè observat Gal. 5. de Loc. Aff. 1. & sæpius experientia comprobatum est, prout contigit Reverendis. nostræ Patienti, quæ singulis diebus extussit 8. libras, & quod excedit, purulentæ materię; cujus rei causâ nos quoque eclegmata præscripsimus parata ex syr. de farsara, de liquiritia looch de pulmone vulpis, de caulibus, radicibus Ireos & feminibus erui pulverizatis, syr. acetoso simplici exceptis.

Præscripsimus in primis victum detergentem, & humectantem, cremorem hordei integro cortice. Potus loco mulsæ fuit diluta aqua hordeacea, cum coriandris præparatis. Atque ita Divina juvante clementia spatio 40. dierum curata fuit. Bened. Silvatic. Consil. & resp. Medic. Cent. 2.

#### *De Empyemate ex vulnere thoracis. Pro Nobili Cretensi.*

Nobilis Cretensis annorum 30. temperamenti calidi quoad jecur, & totum corpus, frigidi & humidi quoad caput, sub celo nocturno sæpius moratus, conporationibus & comestationibus deditus, atque incompotissimè se gerens in omnibus sex rebus non naturalibus, tribus abhinc annis, & quod excedit, gravi dolore correptus fuit in regione mamillæ dextræ; gravitatemque sensit in occipite, cum aliqua imbecillitate motus corporis. His suc-

cessit tussis, spirandi difficultas, & expulsiō cum tussu pituitosæ materię novem. mensium spatio: quo tempore pugione confossus fuit in lava parte thoracis, inter quintam, & sextam costas, 4 superioribus, vulnere spiritamam penetrante, interiora versus, & dorsum, cum aeris exsufflatione per foramen, sanguinisque excretionem per sputum: cui paucis post diebus obducto accessit febris, cum ingenti æstu, magnæque spirandi difficultate, & tussis, atque excretionem sanguinis grumosi, cum pure, & quidem sinceri, graveolentis, 30. menses continuos. Ioramine deinde patefacto anno post, ex eo valida exsufflatione, & tussis excernitur pauca puris copia, perseveratque ejusdem excretio singulis diebus per tussim; ad libram. Propterea patavium se contulit, & de agendis consultit.

Ita itaque in casu præsentis inquirenda veniunt, supposito, vulnus penetrasse ad cavitatem thoracis, prout patet ex præterita exsufflatione, & sputo cruento tunc apparente. Primum est, quænam partes thoracis sint affectæ. Secundum, an pulmones sint exulcerati, cujus rei suspicio est. Tertiò consulendum de agendis, pro præsentis affectus curatione. Et non immeritò quaeritur primò, quænam partes thoracis sint potissimè affectæ, cum in thorace contineantur pulmones, cor, cum pericardio, & septum transversum. De singulis harum partium dubium esse potest. Exitimo tamen pulmones affectos quidem fuisse antehac ex defluxu materię pituitosæ à capite, non solum ad musculos thoracis circa mamillam dextram, ubi dolorem: nec ad occiput tantum, & principium nervorum, ubi gravitatem, & motus imbecillitatem induxit; sed etiam ad pulmones, ubi spirandi difficultatem, & tussim excitavit, cum excretionem materię per tussim. *Morbum enim ostendit sanatio.* Verum quod ex vulnere læsi sint pulmones, verisimile non est. Tunc enim major sanguinis copia, & ipsius quidem spumosi fuisset excreta: qualis non apparuit, ex medici curantis fide. Secundò, facta fuisset inflammatio in pulmonibus, indeque febris statim se prodidisset, eaque perseverans. Tertiò successisset ulcus, ac deinde phthisis: quæ non apparent 30. mensium spatio, quo robustus permanet. Præterquam quod situs loci affecti est declivis, in quo non raro fit paracentesis in empyemate, absq; ulla pulmonum offensa. Minus suspicandum est de essentiali cordis labe. Successisset namque procul omni dubio lipothymia, palpitatio & syncope, nec tam diu superstes fuisset. *Cor namque viscus omnium princeps diu tolerare non potest graves affectus*, ut asseruit Arrittot. De septo transversum gravior incidit suspicio, cum vulnus vergat ad interiora, atque difficilior facta sit respiratio. Verum tamen neque septum transversum vulneratum fuit. Inflammatio namque, delirium, major spirandi difficultas, & motus aliqui convulsivi necessario supervenissent; quemadmodum contigit Theoni in obsidione circa Datum sagitta in pectore percussio, ab Hippoc. descripto 5. Epid. Hist. 91. cui statim successit risus tumultuosus, sive Sardonius, & tertia convulsus obiit: quorum neutrum apparuit. Quod si febris acuta, spirandi difficultas accessit, hanc habet causam: quia obducto vulnere & expurgata materia, decumbens nunc ad septum & putrescens prædicta induxit mala.

Quare



Quare statuendum conseo, vulnus penetrasse in cavitatem thoracis, ibique sanguinis copiam fuisse collectam, ob intempestivam vulneris curationem, neque inde expurgari potuisse, patfacto licet foramine, atque immixta fistula argentea perforata: quoniam foramen illud fuit altius quam par erat, adeoque neque valida exufflatione, & tussi externi potuit: Et proinde transmissa ad pulmones materia per sputum fuit excreta, jugiterque copiola excernitur, ob confluxum humorum ad partem affectam, ubi putrescunt, ideoque & patiens ipse observat eandem materiam per tussim inde expurgari, non sine continuo aliquo murmure. Cum autem triginta menses ferè continuos fluxerit hæc materia ad pulmones, non sine ratione dubitare licet, & de pulmonum erosione, & exulceratione, si enim exulcerari possunt a catarrho falso, potiori ratione à pure corrupto, & foetido id fieri potest, cum aliquando phthisis fiat ex purulenta materia, absque sputo cruento, aut catarrho falso, ut aderuit Galenus, & experientia sæpius comprobatum fuit. Existimo nihilominus in casu præsentis non esse exulceratos pulmones. Febris namque continua esset, à qua tamen mensibus elapsis erat immunis; corpus esset extenuatum magis, viresque longè imbecilliores. Quare sum in ea sententia, quod sit potius empyematicus, ex collectione puris in thorace, quam phthisicus ex ulcere pulmonum.

His sic habentibus, quoad essentiam, & causas præsentis affectus, non desperandum censo de salute patientis; quamquam affectus sit antiquus nec dum sanatus. Virium enim robur indicat calidum innatum validum esse, atque posse materiam peccantem evacuari, ac deinde ulcus sanari.

Quod ut fiat, tria occurrunt agenda: primo materia in thorace stagnans est evacuanda, cum per locum declivem magis affectæ partis, tum per vias urinæ, tum & insensibiliter per digerentia. Secundo divertenda est materia confluentis ad partem affectam: & tertio pars affecta exsiccanda, consolidanda, & roboranda.

Primæ intentioni satisfacere potissimum per foramen patefactum in loco declivi ejusdem partis; secundo per aquas nostras Thermales Apollitanas, detegentes exsiccantes, & materiam ad vias urinæ comportantes, sumptas ad Ib vi. singulis matutinis horis, cum spiritu vitrioli; & tertio portione vulneraria, à Pareo descripta in sua magna Chirurgia. Secundam implebunt cauterium dextro brachio inustum, pro majori diversione à parte affecta. Frequentes item alvi subductiones; Caputpurgia per os, & nares: & tandem decoctum paratum ex ligno Indico, salsaparilla, visco quercino, & ligno rhodio, cum radicibus consolidæ, rubiæ, plantaginibus, & betonicæ. Tertio ex usu erunt mulla injecta cum siphone, pro deterfione; pulveres exsiccantes injecti, & balsamica medicamenta. Quorum beneficio patiens Nobilissimus pristinam sanitatem recuperavit, ad laudem, & gloriam Omnipotentis Dei. Idem ibidem.

*Empyema à Pleurisiide.*

Reverendissimus Canonicus annorum trigini-

ta septem circiter, temperamenti totius calidi & sicci, fervidi jecoris, humidi capitis, gracilis habitus & proceræ staturæ, dum sanus ruri vitam agebat, mense Octobris proxime præterito, sub nona die extemporaneo lateris sinistri dolore in regione collarum legitimarum correptus fuit, prægressa tantummodo eadem die in prandio inappetentia, sequentis vero horroribus inæqualibus, cum tussi & difficili respiratione acutaque febre. Et cum dolor iste perseveraverit, tertia die in cursu decumbens ad Urbem se contulit, ubi ab Excellentissimis Medicis sanguis ex brachio lateris affecti, præmisso Clystere, detractus fuit: & congrua præscripta tenui victus ratione, pectorales unctiones & lambitiva, temperata prius & concoquentia, in usum ducta fuere: Quibus tamen non sufficiens, dolore perseverante, iterum præmisso Clystere die sexta repetita fuit ex altero brachio sanguinis missio: imò & die septima hirudinibus ex venis sedalibus fuit rursus sanguis extractus, cognita nimirum ab Excellentiss. Viris inflammatione interna; Die vero sequenti puris effusio à secuta intus in latere ruptione ab ipso metæ Patientie percepta fuit, cum successerit in eodem latere fluctuatio, & materia graveolentis ac purulentæ per tussim excretio, non sine catarrhali copioso à capite deluxu. Quibus omnibus ita perdurantibus, tenui victu à Medicis multis diebus præscripto, Expectorantia plura & varia administrata sunt: quinimo & Exiccantia atque insensibiliter digerentia, necnon per urinam ducentia: parata namque fuerunt Julapia, decoctione prius facta radicis chinæ, salsæ, visci quere. & lentisci aliorumque pectoralium ingredientium, & Terebinthina exhibitæ: sic aliæ confectiones ac lambitiva. Verum hucusque, nempe ad vigesimam secundam usque Novembris jam administrata non satis profuerunt, cum perseverent sputa purulenta & foetida, cum macie & insensibili febricula. Verum tamen est quod postquam paucis abhinc diebus paulo pleniorum victum Excell. Viri concesserunt, cum exigua quoque vini portione, Reverendissimus Patiens vires reassumpsisse visus est, ita ut & stare & per cubiculum parumper deambulare possit. Sed à foetido sputo liberari cupiens de agendis consultit.

Affectum lateralem, cumque pleuriticum fuisse primum dolorem, propter inflammationem ejusdem Pleuræ, & forsitan etiam internorum musculorum, ut à Viris Excellentiss. judicatum fuisse ex Curatione aptissime præstita conjicio, ita talem eundem & ego confirmo: Contigit tamen Reverendissimo Patienti quam citissima suppuratio, octava die scilicet, forsitan quia fervidissimus fuerit sanguis, calor uterque, naturalis scil. & præter naturam validus, nec forsitan sputa (de quibus in relatione nulla mentio facta est) inflammationis minorativa apparuerunt. Suppurata autem atque disrupta inflammationis purulenta materia inter pulmones atque thoracem contenta, affectum empyematicum produxit, dum per sputum antea expurgata non fuit: cujus qualitas sicut abunde patet, dum purulenta apparer, & foetida à Patientie percipitur, ita quantitas mihi non innotescit, cum de fluctuatione, de difficili decubitu in latus oppositum, nulla mentio fiat. Verum tamen



tamen est quod quantacumque fuerit, nisi in quadraginta diebus post eruptionem expurgata fuerit, in Tabem incidere Patientem pronuntiavit Hippocrates, cum à pure ipso pulmones inficiantur, & aut erosione aut iraciditate afficiantur. Quare cum hodie quadragesima tertia dies à ruptione transierit, de Tabem incipiente dubitandum est. Et quamvis Suppurati, sive Empyemati quandoque etiam a catarrhali materia a capite defluente fieri possint, hæc tamen causa in casu nostro locum non habet, tum quia præcessit dolor lateris inflammatorius, tum quia eo modo non nisi diuturno tempore fit, & tandem quia catarrhalis à capite destillatio octava tantum die successit. Et ideo verum atque legitimum pus quod ab inflammatione emanavit, in thorace contineri credendum, cui tamen aliquam catarrhi portionem asseclari posse non est præsumendum. Et quamvis Patientis Reverend. infebriatantem seipsum existimet, hoc tamen impossibile censeo.

Medica intentio potissima in hoc statu debet esse, puris quam celerrima evacuatio, quæ tanquam per viam regiam, per tussim & per sputa perici solet: quamvis enim Galenus asserat se vidisse pulmonis vomicas per urinam expurgatas, rejecto nempe pure a pulmone quidem per lævam arteriam ad sinistrum cordis ventriculum: à corde autem per arteriam magnam ad renes: atque illinc tandem per ureteres ad vesicam; rari tamen censendi sunt huiusmodi casus; sicut impossibiles apud Matthiolum atque Fernellum: Ille enim contra Galenum asserit, quod ex materia purulenta & foetida cor ad Syncopem duceretur. iste vero ait, quod una cum pure sanguis quoque per urinam educeretur. Verum neutra obiectio tenet: non prima, quia syncope sequeretur, si in corde materia ipsa diu hæreret: nec secunda, quoniam expultrix facultas pus expellit, & retentrix sanguinem retinet. Sed revera modicæ materiæ in thorace existentis per sputum expurgatio tentanda: sicut copiosa, sectione aut ulatione educenda, ut monet Hippocrates: eoque audentius, cum affecta pars sit sinistra, in qua sectio minus periculosa evadit. Sed pro hac operatione observandum Hippocratis monitum, dicentis quod Hydropicos citius secare oportet, Tabescentes vero statim urere. Quartus quoque modus pro materia purulenta absumenda à nonnullis tentatur, Decoctis nimirum insensibiliter digerentibus & exiccantibus, sed incassum semper, si materia copiosa: & frequenter, si etiam exigua fuerit.

Quibus intentionibus propositis & confideratis, exigua existente materia, per regiam viam, nimirum per sputum erit educenda: At si fluctuatio in latere manifesta percipiatur, & decubitus super latus oppositum difficilis Patienti evadat (copiosæ materiæ indicium) tunc satius erit anceps remedium experiri, quam Aegrum ipsum certæ Morti relinquere. Interim totis viribus materia per sputum evocanda. Lambitivis jam præscriptis: quibus addi poterit oleum sacchari & grana butyri, sive guttulæ aquæ sulphuris. Oxymel quoque parabitur, facta maceratione hyssopi, prassii, enulæ camp. & ireos. Efficacissimum quoque expertum Lambitivum huiusmodi.

℞. Hyssopi, prassii, pulegii, calamenchu au-

pug. j. liquiritiæ, iridis, scillæ, helenii, nucleorum pineorum an. ʒ. β. biduo macerentur in aqua tussilaginis & aceto, mox expressioni addatur mellis opt. q. s. ad oxymel. consistentiam. Extrinsecus quoque Discussorium optimum parabitur ex farina lolii, bitumine, addito pulvere iridis, & baccarum lauri, omnibus lixivio dulci reformatis.

Quod si placeat materiam ipsam ad vias urinarias ducere, usus Terebinthinæ aptissimus erit cum succo liquiritiæ condensato; cui potio superpræbeatur ex decoctione chinæ, salsæ, exiguo salsasfræ, radice fœniculi & apii parata: ita enim unum facere, & alterum non omittere, non inutile erit. Et si dabit Deus, ut materia purulenta tota aliquo ex jam dictis modis excernatur, & Reverendissimus à Tabem præservetur, Vere venturo pulmonum laxitas corrigi poterit potu aquæ nostræ sulphuræ Aponitanæ.

Præscriptis autem omnibus congrua erit addenda vivendi ratio: cibos acres & salitos concedendo: Vini albi tenuis & subdulcis potum in mensa permittendo: & mulsam ireatam pro frequenti oris collutione parando: ceteraque omnia præscribendo, Viris Excellentissimis perquam nota: quibus notissimam quoque huius casus angustiam esse existimo. *Raym. Jean. Foris Consult. & Respons. Medicin. T. 2. Cenu. 1.*

#### *Empyema & Phthisis.*

Admodum Rev. Pater annorum quadraginta quinque, temperamentis totius bilioli & subfanguinei, capitis calidi & humidi, destillationibus obnoxii; duobus jam mensibus ex improvise sanguinis copiam, non sine aliqua purulentia, tussi excernere coepit, prægressa multo tempore tenui & salsa à capite destillatione cum perenni faucium siccitate. Accersitus Medicus statim missionem sanguinis iussit, victusque rationem refrigerantem & humectantem instituit, pristinam scilicet hordeaceam, & Malvæ succum depur. pro syrupo alterante. Et cum sanguinea & purulenta excretio perseveraverit, quamvis minori copia, una cum febrili alteratione à Patientem non percepta, & insigni macie totius corporis, decrevit Excellent. Medicus usum lactis instituere: cuius tamen usus potius molestus erat, ut ideo lacti substitutum fuerit Decoctum in iure pulli paratum radicibus graminis, foliis malvarum, cich. borag. violarum, seminibus melonum, addito cochleari tart. albi; quibus parum aut nihil cessit affectus: quotidie namque purulenta atque cruenta materia excerni non desit. Quare in eadem victus ratione insistendo, Balneum aquæ dulcis aliquot diebus administratum fuit, sine tamen Patientis tolerantia. imo cum virium diminutione; & idcirco hoc quoque remedium genere omisso, & victus ratione refrigerante & substantifice humectante præscripta, ab eodem Excellentissimo Medico quid agendum quaeritur, & à Patientem Admodum Rev. enixè expetitur.

Empyema duorum mensium ab Excellentiss. Viro in relatione descriptum, sanationem admittere non potest, si Gal. & Hippoc. credimus: etenim sicut Pleuriticis non expurgati, suppurantur: suppurati vero, si quadraginta dierum spatium post eruptionem non expurgentur, ad Tabem



hem transeunt, cum post jam statutum tempus pulmonum substantia non amplius illata servari possit, ut propterea febricula non hectica tantum, sed phthisica quoque necessario superveniat; ita cum jam sexagesimus dies præterierit, quo sanguis una cum purulenta materia per tussim à pectore excretus fuerit, & quotidie usque in hunc diem excerni perseveraverit, idcirco Tabem sive Phthoem jam subsecutam esse credendum. Sed præterea consideranda sanguinis excretio post diuturnam tenuem, & salis à capite in pulmones destillationem, quæ non solum hæcicitatem & fraciditatem pulmonum, sed erosionem quoque, diarræsim & ulcus excitare potuit, sicque non tantum Phthisim secundam ab Hipp. descriptam, sed primam quoque Phthisim ab eodem recensitam constituit, præter Empyema quod à catarrhali destillatione in thorace paulatim collectum fuit, ab Hippocrate ipso descriptum.

Quibus ita se habentibus, cum Admodum Reverendi Patris affectiones præter naturam longè superent Artem ipsam, remedia non nisi ad vitam producendam, nullo modo ad salutem recuperandam proponi possunt. Et quoniam ex una parte purulentia, necnon catarrhalis materia medicamenta exiccantia exigunt: ex altera vero febris & totius corporis gracilitas expetunt humectantia; idcirco unum facere, & alterum non omittere oportet, ut vitam protrahamus, urgentiori semper incumbendo. Et ideo usum lactis Asellæ bene nutritæ confirmo; & præterea Emulsiones in eandem intentionem, seminum melonum mundat. amygdalarum dulc. nucleorum pineorum, in jure cum saccharo; Item carnes pullæ junioris: imo parentur Morselli ex eadem carne nucleis pineis, pistaciis, cum saccharo & exigua aqua flor. citri. Pro potu vero vinum album dulce, tenue & oligophorum non omittendo quotidianas universi corporis inunctiones oleo amygdalino recenti. Pro altera vero intentione, in usum ducenda erit radix China, ita ut quatuor aut quinque ejusdem incisæ taleolæ una cum carne semper ebulliant: imo & in vino quoque pro potu infusæ detineantur. In coena præbeatur ferculum Saxoniar, cui addatur China ipsa in pollinem redacta. Interim materia purulenta expectoratio semper adjuvanda Lambitivis paratis ex Oxymelite, æqua portione sacchari & mellis Hispanici, cum aqua farsaræ & globulo pulveris ireos composito. Apertissimum quoque erit Lambitivum ita paratum.

℞. Julap. acet. syr. de Ibisco, olei de saccharo an. ʒj. m. Nec omittendæ pectorales inunctiones.

Ut 26. Unguenti malvini, adipis Anseris, an. ʒj. ol. lil. alb. amygdalarum dulc. an. ʒss. pulv. ireos Florent. ʒij. m. reformetur. Et hæc sunt quæ in hujus status angustia adducere potui, cum efficaciora ut essent. Decocta exiccantia, Terebinthi usus, & sulphurata alia medicamenta nec admitti, nec tolerari possint: ut propterea nec à Viro Excellent. Adstanti administrata, minusque proposita fuerint. *Idem ibidem.*

Juvenis 16. annorum, post vulnus, in pectoris cavitate penetrans, consolidatum, jam ab aliquot mensibus ad summam maciem reductus, pus quotidie exspuit; magnumque dolorem in illo pectoris latere, ubi vulnus fuit inflatum, sen-

tit. Tumor etiam, quatuor digitis à vulnere cicatrice distans, ibidem inter costas observatur, liquorisque alicujus fluctuatio ibi digitis percipitur. Vigiliæ ipsum magnopere affligunt. Febris adest, quæ hecticam refert. Nisi in lecto erectus sedet, præ respirandi difficultate suffocari metuit.

Afficitur in hoc ægro totum corpus, quod ex ejus summa macie: item pulmo, quod ex puris sputo, & respirandi difficultate: necnon pleura & musculi intercostales, quod ex dolore lateris, ejusque tumore: præterea etiam cerebrum, quod ex vigiliis: ad hæc quoque cor, quod ex febre est manifestum.

*Morbis*, qui ipsum affligit, est cavitatis thoracis, à pure, in ea collecto, nimia angustatio; quæ è puris illa collectione, angustiam cavitatis thoracis faciente, Empyema vulgo appellatur.

*Causa prima* hujus morbi fuit vulnere, in pectoris cavitate usque penetrantis, inflatio: vulnere verò consolidatio, ante justam sanguinis e pectore evacuationem, & vasorum vel pororum, sanguinem in cavitate thoracis emittentium, justam conglutinationem facta, pro secunda ejus causa, est habenda; sanguis autem post intempestivam vulnere consolidationem in pectore retentus, & per vasa pectoris læsa in cavitate ejus descendens, eamque replens, ibique in pus conversus, partemque vicinas vitians, tertiam & continentem, proximamque hujus morbi, ejusque symptomatum, constituit causam.

A copiâ enim ipsius sanguinis, in pus converti, in cavitate thoracis collectione, facta fuit magna cavitatis thoracis angustia, justam pulmonum expansionem impediens; *respirationemque tam difficilem inducens, ut jam æger, nisi erectus sedent, suffocari, à magnâ copiâ puris, (jacentes pulmones magis, dum illud sursum attollitur, quam eos ex aspera arteria, in erecto corporis situ, pus deorsum pellente, recta sive perpendiculariter dependentes, prementis & gravantis,) metuat.*

Quia autem jam, ab aliquot mensibus, pus illud pulmonum sanguinisque, per eos perpetuo transeuntis, temperiem vitavit, eumque ad corpus nutriendum ineptum reddidit, & pulmonum poros, uno ipsa eorum bronchia, ingressum est, ac cordis ventriculis sese insinuavit, temperiemque malignam ipsius parenchymati impreffit, ac membranam pleuram & musculos intercostales suâ acrimoniâ pungit, & jam ab aliquo tempore corrosit, hinc, *summa agri macies, cum hectica febre & magnis vigiliis conjuncta; dolorque in pectoris latere molestus; item puris sputum; tumor etiam inter costas, circa vulnus cicatricem, cum liquoris fluctuatione perceptibilis, originem duxerunt.*

Morbis hic periculosissimus est, propter febrim, hecticam referentem, puris sputum, & summam maciem, quæ summam pulmonum & cordis arguunt corruptelam. Quia tamen experientia docet, nonnullos, ita affectos, fuisse sanatos; ideoque Curationem etiam tentandam censeo.

*Æque* in puris evacuatione, per apertum thoracem faciendâ; ulceris mundatione, & consolidatione, & intemperiei pulmonum, per contrarium, correctione, consistet.

Quoniam



Quam primum itaque pectus, circa locum tumoris, scalpello aperiatur, & pus ad quantitatem libræ vel sesquilibræ, pro ratione virium, & sequentibus diebus quotidie paulominus, educatur, donec totum pus evacuatum fuerit. Partitis autem vicibus educendum pus, ne conferta ejus evacuatio spiritus subito effundat, & ita ægrum valde debilitet, vel enecet.

Pure evacuato, & ulcere mundato, ejus consolidatio erit, more solito, procuranda: quæ ut felicius procedat, tali æger ab aperto thorace, utatur decocto vulnerario, sanguinem purgante, ulcera detergente, & putredinem inhibente.

℞. Herb. saniculæ, bugulæ, Scabiosæ, betonicæ, Hyperici, card. bened. pilosellæ, pimpinellæ, vincæ pervinæ, agrim. plantag. an. m. j. flor. cord. p. j. coq. in hydromelite ad lb. j. f. & colentur pro apozemate, de quo sumat æger ʒ vi. bis in die.

Ex hoc eodeni decocto poterunt fieri injectiones, in cavum thoracis injiciendæ, ad puris evacuationem, & deterfionem, & ulceris consolidationem, promovendam.

*Vitæ ratio* sit siccans, attenuans, & abstergens. Ideoque cibi condiendi hyssopo, sceniculo, utiles amygdalæ dulces, pinæ, &c. Abstineat æger à leguminibus. Potus conveniens est hydromel, præcipuè hyssopo conditum, item aqua hordei, vel cerevisia saccharata. Vinum oligophorum etiam concedi potest, nisi febris sit magna. *Henric. Regium apud Theodor. Craanen. Medicationum lib. 2.*

Viro quadragenario, gravi sinistri lateris pleuritide detento, remedia non ante tertium diem fuerunt adhibita, quibus postea morbus imminutus non est, sed ultra decimum quartum diem excurrit, febre aliisque magnis symptomatibus comitatus. Ab eo tempore dolor multum imminui, febris mitior fieri, & ponderosa gravitas in latere affecto ad costas sentiri cœpit. Circa vigesimum quintum diem, febre jam valde parva existente, cum exiguo dolore, molestam gravitatem, ad sinistram maximè latus diaphragmati incumbentem percepit æger, & si ab uno in alterum latus se repente devolveret, humorem aliquem desluere sentit, cujus etiam fluctuatio in motu corporis antrosum manifestè obauditur. Adjungitur tussicula sicca, quæ nihil effatu dignum expuitur. Respiratio difficilis est, imprimis si in latere dextro decubitus fiat. Æger anxius & debilis est, faciliè & sæpe sudat sine levamine: ciborum fastidio tenetur, & magis potum quàm cibum desiderat.

1. Affligitur Æger *Empyemate*, quod est puris in thoracis cavitate collectio.

2. Dignoscitur hic affectus, partim ex signis præcedentibus, partim ex præsentibus. Præcedentia signa sunt, quod pleuritis præcesserit, quæ ante decimum quartum diem non est imminuta: quod postea dolor cum febre imminui cœperit sine manifesta aliqua evacuatione per sputa, atque hinc gravitas ponderosa ad costas in latere affecto percepta fuerit. Præsentia sunt, quod molesta gravitas diaphragmati incumbat, & in devolutione corporis fluctuatio humoris in pectore sentiatur & obaudiat: quod irrita tussis adsit, cum difficili respiratione, anxietate, debilitate, & ciborum fastidio.

3. Causa collectionis hujus puris fuit, mem-

branz pleuræ & muscutorum mesopleuriorum inflammatio mutata in abscessum, e quo rupto, pus illud in thoracis capacitatem delapsum est, cumque per diaphragma nullus ei daretur transitus, nec per pulmonem commodè evacuaretur, ibi detentum & cumulatam est.

4. Quod per lputa pus non fuerit evacuatum, factum est. 1. Quia procul dubio hujus ægri pulmo lateri affecto firmiter non adhæsit, ut in multis contingit, in quibus è rupto abscessu pus facile in pulmonem annexum eructatur. 2. Quia pus in cavitate thoracis contentum, ob suam crassitiem, poros membranz pulmonem investientis subire, sicque pulmonem ingredi non potuit. 3. Quia forte pori in hujus ægri pulmone angustiores sunt, ita ut hujusmodi crassiores humores non admittant.

5. Dolor cum febre imminutus est, inflammationis acri materia jam in pus converfa, & sic mitiore reddita: cujus puris magna quantitas membranz adhuc conclusa, ad affecti lateris costas ponderosa gravitate molestiam exhibuit. Tandem circa vigesimum quintum diem, rupto apertemate in thoracis cavitatem effluens, molesto pondere diaphragmati incubuit, ejusque in corporis commotione, manifesta fluctuatio percepta est. Eiusdem etiam pondere depressum diaphragma non satis liberè movetur, hinc difficilior hic respiratio, imprimis si lateri sano incubat æger, cum quippe, præter diaphragma, etiam dexter pulmonis lobus à puris cum mediastino incumbens pondere comprimitur.

6. Tussicula procedit à vellicatione pulmonis exteriori tunicz ab acrimonia puris illata. Hæcque nihil ferè expuitur, quia materia irritans extrinsecus pulmonem attingit, nec ejus quicquam in bronchia ingreditur.

7. Æger anxius est ob impeditam respirationem. Etiam debilis, quia ab acuto præcedente morbo vires admodum sunt prostratz, unde quoque faciliè & sæpe sudat sudorem symptomaticum. Ventriculo autem eandem ob causam, unà cum hepate, valde debilitato, ejus coctio imbecillis, & appetitus dejectus evasit, hincque cibi fastidium processit: adde quod etiam pus diaphragmati incumbens, stomachum ei annexum languidum faciat. Potus tamen magis desideratur quàm cibus, ob aliquam sitim à permanente febricula excitatam.

8. Affectus hic periculosus est. 1. Quia respiratio læditur. 2. Quia subsequitur acutum morbum qui vires admodum imminuit. 3. Quia pus in thoracis cavitate conclusum sponte nusquam commodè evacuari potest, nam quæ per sputa, vel urinas nonnunquam fit excretio, illa adeò rara est, ut ex sexcentis vix uni contingat. 4. Quia si pus dicto loco diutius subsistat, putrescèt, sicque pulmonem ei innatantem corrumpet, febresque augebit. 5. Si curatio per medicamenta exhibitâ instituat, incertum erit de felici eventu, quia pus è thoracis cavitate per purgantia non potest educi, & per alterantia difficulter in pulmonem impellitur. 6. Si ad chirurgiam deveniendum sit, illa etiam non vacabit periculo. Interim tamen quia febris exigua est, vires adhuc mediocriter constant, atque conveniens adhibita medela multos hujusmodi ægros servavit, non est omnino desperandum, sed curatio quamprimum institueda, quippe quo diutius malum pro-



protrahitur, eò magis vires collabuntur, & affectus periculosior evadit, nam corrupto tandem pulmone facilis fieret in phthisin transitus, juxta 5. Aphorif. 15.

IX. Præmissa igitur clementi evacuatione alvi, mox ad expectorantia devenire suadet tussicula. Sic enim tentandum an ne pus per illam viam possit educi. ope talium medicamentorum quæ partim pulmonis poros laxant & dilatant, partim pus ad faciliorem in illos poros ingressum præparant.

X. Hunc in finem præscribendum tale apozema.

℞. Radicum helenii unc. j. iridis florent. drach. ij. glycyrrizæ rasæ, unc. f. herb. hyssopi, prassii albi, capilli Veneris, violariæ, ana m. j. brassicæ rubræ m. ij. sem. anisi drach. ij. f. q. frig. maj. ana drachm. j. f. pallularum mund. unc. ij. Aquæ q. s. nat. f. aut. apozema ad lib. j. f. cui admisce, syrupi de prassio, de hyssopo, oxymelis, ana unc. j. dentur tres quatuorve doses de die.

Per intervalla lamb. & æger hunc linctum.

℞. Syrupi de prassio, de hyssopo, de jujubis, ana unc. j. croci pulverisati scrup. j. misce, nat. linctus.

Terebinthina cum vitello ovi in aqua hordei ad cremorem redacta & saccharo dulcorata, plurimum quoque proderit. Neque horum medicamentorum aliqualis calor propter febrem valde extimescendus est, quia febris exigua est, & causæ ejus major ratio habenda est, utpote qua sublata, facili evanescet febris.

XI. Si his & similibus medicamentis æger spatio duarum septimanarum ad puris excretionem non deveniat, ab eorum usu vix quicquam sperandum est, ac proinde, antequam longiore mora vires magis concidant, & pus corruptelam contrahat, eamque etiam pulmone imprimat, citior illius evacuatio molienda est per Chirurgiam.

XII. Igitur in latere affecto, infra axillam, inter quintam & sextam costam, thorax usque ad interiorē cavitatem cultello perforandus est (cavendo læsionē pulmonis, ut & arteriæ, vena ac nervi intercostalis) foramini non valde lato, sed tali tamen quod tubulum argenteum cavum admittere potest, qui facta incisione statim immittendus est, & ita ligandus ut sponte excidere non possit; anteriore autem parte sit turunda linea obturatus, ut pus præter voluntatem Medici per illum effluere nequeat. Per hunc tubulum bis de die, extracta turunda puris lib. f. vel lib. j. (plus minus, pro puris quantitate & facili tolerantia ægri) extrahenda est, hinc ejusdem effluxus immissa turunda rursus sistendus.

XIII. Ubi tandem pus totum evacuatum videtur, & nihil amplius effluit, pulmo & interior cavitās aliquoties abluatur hac mixtura per vulnus injecta.

℞. Decocti hordei unc. v. spiritus vini unc. iv. mellis refacci, syrupi de prassio, ana unc. j. misce pro injectione, quæ per aliquot horas intus relinquenda est, & postea per dictum tubulum rursus educenda.

XIV. Si continua & diuturna puris effluxio indicet ulcus interius nondum esse perfanatum, præscribenda erunt decocta abstergentia & vulneraria, necnon injectiones modicè siccantes & abstergentes.

Tubulus verò argenteus in dicto vulnere detinendus est, quousque nihil puris amplius effluit, tunc demum eximendus, & vulnus secundum artem consolidandum.

XV. Victus ratio siccior attenuans & abstergens instituitur, cibique condiantur cum cherefolio, hyssopo, brassicæ rubra, beta, feniculo, patulis, amygdalis, &c. Potus sit ptisan. saccharo vel melle dulcorata, aut hydromiel. Somnus mediocris sit, & alvus facilis. Ira & tristitia animi pathemata fugiantur. *Isbrand. de Diemerbr. Medicationum parte 2. de morbo Thoracis.*

### Observationes.

Senem curavi qui ex pleuritide empyema est passus, febre assidua, tussi sicca, sputo saniei copioso, difficultate spirandi laborabat, & tabidus proflus factus erat. Medicis jam deploratus videbatur, & mirum erat, ex quo loco tanta puris copia emanabat, nam quotidie libras duas exercebat. Huic præter alia quamplurima auxilia, lactis asinini potus per tres menses exhibitus miro fuit auxilio, hujus enim ope, puris copia omnino est imminuta, resectum corpus, febricula evanuit, tussis nulla. *Zacutus Lusitanus, observ. 19. lib. 1. prax. admirand.*

Apud nos Juvenis quidam à me fuit liberatus, qui per annum pus in thorace collectum post pleureisin gessavit, & quasi absumptus erat, ustus fuit, & per vulnus purgatum pus. Multos hoc modo curavi, quorum nomina supprimo. *Gull. Rondelium, prax. med. cap. 15. lib. 2.*

Puer quidam quinque annorum febre continua laborabat, per duos ferè menses perseverante, cum tussi frequenti ac molestia, ita ut ad tabem vergere crederetur. Tandem vocatis in consilium Medicis, relatum fuit illum conqueri de dolore lateris sinistri, præcipue cum manu contrectaretur, tum etiam relatum fuit, illum in febris principio persensisse aliquem dolorem in illo latere, qui tamen intra paucos dies delituerat, idcirco pleuriticus non fuit judicatus à Medico ordinario. Suspicio fuit Empyema aliquod ibi latere, atque ut res clarior evaderet, decretum fuit, ad movendum esse per aliquot dies Cataplasma emolliens & attrahens, quo per triduum admoto, apparuit elevatio quidam in parte, & in ea fluctuatio subobscura percipiebatur, convocato iterum consilio, de Empyemate nemo amplius dubitavit. Apertione facta pus copiosum effluxit, ejusque vacuatio per duos menses continuata est, donec tota materia evacuatā, æger tandem pristinae sanitati restitutus fuerit. *Lazarus Riverius, obs. 75. cent. 2.*

Servus quidam ex curru decidit, læsus est thorace, præsertim dextra in parte. Dolores remediis non cesserunt, cogitabant de sectione inter quintam & sextam costam. Divisæ sunt sententiæ, tandem vicit pars minor, & periclitandi occasionem captans ex desperatis penè rebus, applicatum canterium, fluxit per dies plus minus viginti aut viginti quinque materiz saniosa ferè ad pintas 15. ut retulerunt Chirurghi, convaleuit. *Gull. Ballonius, lib. 2. Epidem.*

Cum summus Hippocrates passim hoc remedium usurpet, nunquid satius est aliquo remedio cruento & ancipiti certam mortem (si aliter



tacitas, & id remediū genus onittas) redimere? Humanum est, & officii plenum aliqua ratione miserorum ægrotum dolores levare, atque id magis si cum aliqua salutis spe. *Guil. Ballonius, consil. 6. lib. 2.*

Enatum ex pleuritide Empyema, cum alia non profuissent, frequenti potione ex syrupo altheæ, oxymelite saccharino & manna cum oleo amygd. d. rec. & aq. scabios. feliciter curatum *Roma* accepit us a *Mathia Baccone* Anglo, pure nimirum alvo proclivius quam ore, expurgato. *Georg. Hieronymus Velschius, observ. 29.*

*Empyema ex pleuritide, sectione inter quintam & sextam costam, felici successū sanatum, frustra adhibitū ex consilio Medicorum magni nominis, externis medicamentis.*

Quæ verò observavi in Empyematicis, nunc in medium producenda, Nobilis Patavinus, ex pleuritide non expurgata, incidit in Empyema, tanta puris cōpia in cavitate Thoracis conclusa, ut iterum & tertio per diem incideret in Lipothymiam, syncopi proximam: quem propterea cum decrevissem perforare, neque ejus parens hoc admitteret, vocavit Medicos hujus Civitatis primarios, & potissimum Joh. Veslingium, nemum olim in praxi discipulum, præter alios, quorum nomina non refero, quoniam Patavii res est notissima, cum quibus habita consultatione, proposui sectionem inter quintam & sextam costam, ab omnibus Auctoribus laudatam, atque propria experientia sapissimè felici successū administratam, quam cum Medicus quidam in primis improbaret, hujus loco præscripsit cataplasma, apponendum Thoraci, cujus præsidio materia purulenta discuteretur; quem secutus quinetiam Veslingius, quo tamen præsentē sepiissimè hanc operationem feliciter peregeram, eam & ipse damnavit, metu scilicet læsionis vasorum intercotalium; quorum opinionem miratus, qui hæc in medium afferre auti, sequenti die mane Thoracem secui inter quintam & sextam costam, immissa turunda crassa satis, quæ foramen patens servaret, quam sub vesperam eduxi, ac simul tres, & quod excedit, puris libras; à quibus Nobiliss. Juvenis à Lipothymia convaluit, quem postmodum curavi, prout alioqui vulnera Thoracis, educta scilicet quotidie materia purulenta, atque immissa in vulnus paucis post diebus, cannula plumbea, per quam tota sanies penitus exhausta; qua demum educta, ad cicatricem tandem vulnus spatium viginti octo dierum adduxi. *Petrus de Marchetis observat. Medico-Chirurgic. Sylloge.*

*Ex vulnere thoracis superius, magna puris copia in ejusdem cavo congesta, sectione inter quintam & sextam costam expurgata; necnon per os, & urinam, dici spatium.*

Cujusdam scribæ filius, ex Agiaciorum familia, vulneratus parte superiori thoracis, ad ejus usque cavum, ex quo cum pus ægrè expurgaretur, multā copiam in eundem congestum, decrevi ipsum secare inter quintam & sextam costam ejusdem lateris, imposita postmodum turunda, ut superius dixi, sequenti die, quā edu-

cta, duz puris libræ effluerunt. Observatione vero dignum, non solum vulneris orificio pus emanare, sed & per os quinetiam magnā copia, necnon per urinam quoque ad libram unam, & quod excedit, per diem; quæ via licet omnibus pateant, non tamen naturæ consuetæ, facta potissimum sectione, quæ materiam copiosam effudit; cum tamen patiens esset juvenis 18. annorum, ac robustus, natura propterea has vias communes sibi paravit, ægro ipatio mensis omnino sanato, & adhucnum incolumi ob rationem superius propositam.

Lubium vero nonnullis, quā ratione materia purulenta, supra diaphragma hærens, non impediatur respirationem, cum tamen hoc Galeno instrumentum sit proprium respirationis; quod scilicet experientia sit ipsis compertum, quendam Nobilem Beiluneusē fistulā laborantem Thoracis, inter sextam & septimam costam, nullā respirandi difficultate laborasse; cujus morbi causā consultatione habitā cum viris hujus urbis præclarissimis, negantibus multam adesse puris copiam in cavitate Thoracis, nullā potissimum respirationis difficultate ipsi molesta; illorum tamen opinionem mordicus oppugnavi, materiam scil. purulentam intus concludi affirmans, cujus ratione immisi turundam crassam satis & longam circa horas vespertinas, vocatis sequenti mane multis studiosis, qui consultationi interfuerant, quibus præsentibus, cum turundam educerem erupit ex Thoracis cavo libra, & quod excedit, puris fortentis adeo, ut adstantes præ odoris gravitate excedere coacti fuerint, quod pus eo confluerat ex tumore thoracis, quo sex ante mensibus laboraverat patiens, superstitē postmodum fistulā prædictā. Ex quibus patet, quod quotiescunque pulmones pus non contingunt, vel motu quinetiam ipsō diaphragmate, tunc respiratio illa est. Quod verò aliquis objicere posset, quā ratione scil. innotescere possit pus in ipsā cavitate conclusum, nullā præsentē respirandi difficultate? Respondeo observandum esse, quod quando adest minima portio puris in Thorace, id non sit sine febre, quod est signum illius pathognomicum, præter alia ab Autoribus proposita, ut propterea superius admonuerim vulnera Thoracis non esse ad cicatricem ducenda, nisi patientes immunes fuerint ab ipsa aliquot dies: quinimò ad vertendum quinetiam, quod quando purulenta materia in cavitate Thoracis supra diaphragma decumbens, non superat pulmonum alas, tunc per tussim non expurgatur; quia admittere non possunt, eandem non contingentes. Nobilis verò hic patiens non solum laboravit fistulā simplici Thoracis, sed & præterea duabus costis corruptis, quas prout abradere opus fuit, non sine quibusdam aliis remediis; qui tamen cum per negotia hic morari diutius non posset, non integra valetudine discessit, illi tantum præscriptis brevi eo temporis spatio, injectionibus ex vino mulso, & aquis thermalibus sulphuris; in quarum usu mirum occurrit, quod statim insulæ tussi exercebantur, ex vino verò injecto, medicamentis potissimum imbuto, illico nullā morā, maximò impetu rejiciebantur majori copiam; ut propterea observandum sit, non solum pulmones, rarè utpote substantiæ, sed etiam omnes partes nostri cor-



corporis suis poris pateſcere, per quos non ſolum excrementa communia, ſed etiam materia ſaniſſima extruduntur ad communia loca: ſicuti contingit in vulneribus thoracis, quibus non ſolum ex locis omnibus notis materia purulenta fluit, ſed etiam per inteſtina. *Idem ibidem.*

*De Empyemate à parotidibus, & Phthiſi à Quartana.*

Juvenis quidam 21. annorum incidit in febreſ continuum, 14. die fit translatio materiæ morbiſſimæ, & ſunt parotides ex utraque parte valde magnæ, & ceſſat febris, factis taciendis parotides copioſiſſime fluxerunt, ita ut ex una ultra ſb. pro una vice effluerit, & cum propter copiam materiæ Chirurgus illas ſæpius ligare & aperire debuiffet, neicio an ex negligentia id de die vix ſemel aut bis fecit, materia hæc ſatis copioſa & acris partem ipſam etiam glanduloſam & mollem uſque ad aſperam arteriam corroſit, & facta ibi ulcere ad pulmones & thoracis cavitatem ruit, & in momento loquelam amiſit, diſparet tumor parotidis ſiniſtræ, nullum amplius ibi pus apparet, tuſſit potenter, & propter dejectas vires à priori morbo ejicere non poteſt, & 40. die poſt moritur. Vir quidam 43. annorum incidit in quartanam, vadit ad aliquem circumforaneum, qui ſexies conſequenter illi dedit vinum antimoniatum, emanſit quidem febris, ſed ob tot vehementes vomitus ut phthiſicus, partim ex translata materia, partim ex rupto aliquo vaſe ob potentiſſimos & toties repetitos vomitus, hic ad exemplum ſui Domini, cui Phthiſico & Hectico cum optimo ſuccellu diætam lacteam præſcripſi, abſque ulteriori conſilio ea etiam uti incepit, adhuc continuat, & in tantum ſe ſuſtentat, ut tamen adhuc ſua perficere poſſit abſque magna moleſtia. *Joh. Georg. Greſſelii.*

*Puris ſputum Menſtrum ſine Phthiſi.*

Noti mihi eſt matrona quædam Nobilis, quæ ſingulis menſibus ſemel puris ſputo laborat, adeo, ut ſæpiſſime ad tres libras puris foetidiffimi rejiciat: bene interim ſe habet, & formoſa eſt neque etiam tuſſi vexatur, niſi quando periodicum hoc imminet ſanguinis ſputum; menſes tamen parte fluunt. Judicent nunc eruditi an ſemper puris ſputum ſignum phthiſeos pathognomonicon exiſtat. Ego ſanè in ea ſum ſententia, ulcus pulmonis tabem non eſſe, niſi longo temporis tractu degeneraverit, vel in vomitum vel in empyema. Inſpectio variorum hoc morbo mortuorum & diſſectorum Cadaverum aliud me docuit. *Alnardi Hermannii Cummi.*

*Lactis uſus in Empyemate.*

Si Aquilonia tempeſtas, tuſſes vigent, faucium aſperitates, alvi duræ, horrores, coſtarum dolores & pectoris, aperuit *Hippocrat. ſect. 3. §. 5.* Expertus idipſum Parochus Koſſeizenſis in Moravia, habitus craſſioris, annorum 30. pleuritide exquiſita aſcendente ſiniſtræ partis ex inflammatione pleuræ laborans, cum dolore punctorio, febre acuta, difficili reſpiratione, tuſſi ac pulſu duriuſculo, quæ inſeparabilia exquiſitiſſimæ pleuritidis ſigna propoſuit *Galen.*

*lib. 3. de Loc. Affect. cap. 3. & lib. 2. de Crif. cap. 10. & 1. de conſtit. art. med. cap. 15.* Is ſeptimo die præmiſſis Univerſalibus, partim per ſputum, partim per reſolutionem judicatus eſt.

Patitur poſt 5. dies ob cauſam externam, recidivam, & non aderat magnifica intentio ad hoc ut ſputum facile fiat, quemadmodum loquitur *Avicen. 10. 3. traſſ. 5. cap. 2.* adeoque ſpatio dierum 14. materia plurima, quæ præ virium imbecillitate reſolvi non potuit, retenta in ſup-purationem abiit, eſt enim his terminus acutorum *Hipp. ſ. 5. 9. 8.* quicunque igitur morbo laterali laborantes in 14. diebus non repurgantur, ſi ad ſup-purationem vertuntur. Rupto abſceſſu Empyicus noſter magnam puris diverſicoloris copiam expuit, quæ ſputiones ad ſeptimanas 5. perdurabant, ea quantitate, ut die noctuque pelvi ſ. & ultra libris puris imple-ret. Innuimus cum *Hippocrat. ſ. 5. §. 15.* Empyici qui ex morbo laterali ſup-purantur, ſi in 40. diebus purgentur a die, qua ut ruptio, liberantur, ſi vero non, ad tabem tranſeunt.

Sumpta itaque prima & potiſſima indicatione à ſup-puratione, & inſtituto comodo victus & 6. rerum non naturalium ordine, ea adhibuimus quæ clementer & ſecure pus educerent, & detergerent, non neglectis quæ febriculam comitantem reſpicerent, & vires huc apprimè neceſſarias roborarent.

Sed ob plurimum pus, & ſputiones copioſas patiens multum deſaſſatus, ſomnoque privatus, viribus deſtitui, & ad Tabem tranſire cœpit. De ſalute vix non deſperantes venit in mentem quod habet *Galen. 6. §. 17.* Uſione igitur indigent qui plurimum habent pus, ut qui deſperant per ſputiones poſſe expurgari, &c. meliusque eſſe nos in via ſalutis dubia aliquid agentes periclitari, quam ægrum omni ſpe adempta certo perire; Sed vires enormiter ſiactæ ab hoc præſidio generoſo avocabant.

Exacto die 40. Patienti Empyico *Lac Capitulum*, cum ſaccharo roſaceo miſtum (deerat enim aſininum) propoſuimus quod cum per alias ſex ſeptimanas mane calidum, & recens à capra, etiam in majore quantitate quam à nobis præſcripta eſſet, videlicet ad ſb. ij. hauſiſſet, expurgato ulcere, omnique putrilagine, coque glutinate perfecte convaluit, & craſſior quam ante evaſit, prout in hodiernum diem incolumis vivit. *Matthai Franciſci Herodi.*

*De Metaſtaſi humoris per vias occultas; ſem. de empyemate poſt pleuritidem notham per foramen cutaneum, à vena mediana incifa, ſalutariter ſoluto.*

Rectè ſanè *Stephanus Rodericus Caſtrenſis* in erudiſſimo tractatu, quæ ex quibus, inſcripto *lib. 3. cap. 2.* ſcribit: Metaſtaſis, ſeu humoris in morbis tranſmiſſio, non ſolum per vias manifeſtas, ſed per occultas etiam fit. Nam præter vias unicuique cognitæ, per quas quicquid fluxibile in corpore eſt, fertur, ſunt aliæ incognitæ, quarum nos contemplatio in admirationem deducit. Et libro eodem *cap. 3.* ita pergit: Cum Metaſtaſin per vias incognitas fieri audis, intelligito incognitas nobis, naturæ verdò, quæ licet cognitione non utatur, dirigatur tamen à cognoſcente, cognitæ: unde *Hippocrates 6. Epidem.*



sect. 5. text. 2. è versione Foesii. Natura, inquit, ipsa sibi per se, non ex consilio motiones ad actiones obeundas invenit, partim quidem ut mictare, partim vero etiam quibus lingua subservit, & quæcunque alia id genus. A nullo quidem edocta natura citraque disciplinam ea quæ conveniunt efficit. *Galenus* accessus exponit vias, aut impetus ad agendum, ut scilicet natura circa dicitur, sine consilio vel edocta in eas actiones teratur, quibus exequendis accommodata habet instrumenta. Hoc argumentum latissime prosequitur 1. de usu parti. cap. 3. & ejusdem operis lib. 15. cap. 7. & 6. de loc. affect. cap. 6. Ceterum *Hipp.* apud quem prius *visus quævis morborum*, natura morborum medicatrix dicitur, adungit paulo post: adinvenit natura sibi accessus, nempe vias; quapropter non solum loqui videtur de admirandis actionibus, sed de viis etiam, per quas natura ista medicatrix metallam humorum efficiens morbis medetur, constat hoc, quia utriusque rei exemplis utitur, &c. Huc usque citatus *Author*, cujus verba paulo proximus hic recensere volui, ut eo melius præsens casus singularis & contemplatione dignus intelligatur.

Virgo quædam Thorunensis, Dorothea Kriegerin, honesti Johannis Georgii Zöbners, civis & negotiatoris apud nostrates non infimæ notæ privigna, annorum septendecim, constitutionis gracilioris, complexionis phlegmatica, incidit anno 1675. hyemali tempore in pleuritidem spuriam sinistri lateris à pituitosa causa, cum paucabile permixta, originem ducentem, sed à causa procacatrica, scilicet saltatione longa, & sudore subsequente à frigore externo suppresso in actum deductam, post suppressionem sanguinis menstrui, huc usque inordinate, utpote pituita copiosa permixti, indeque orta obstructione, fluentis: cui jam à longo tempore singulis noctibus gravis fuit sudor oleaginosus, torpidus, coloris crocei, tam in capite, quam in dorso, etiam indusium tingens, & pinguedine quadam inficiens.

Huic ego perspectis signis, inter quæ urina crassa & tincta erat, dolor cum punctura sinistri lateris gravativus, pulsus celer & validus, respiratio difficilis cum quadam dyspnœa, tertia die morbi è vena mediana dextri lateris sanguinis ultra sex uncias extrahere jussi, qui merè pituitosus erat: dein remisso paulatim dolore laterali, sed calore adhuc superstite, altera die post è vena poplitea utriusque pedis ad sanguinem magis revellendum, & menstruum fluxum proritandum (qui etiam postridiè, quamvis in paucâ quantitate apparuit) aliquot uncie ejusdem educæ sunt: tum statim calor remisit, puncturæ lateris desierunt, gravativo tantum dolore residuo cum difficultate spirandi manente. Sanguis autem educus pallidus erat, tunicaque quædam secundinis similes repræsentabat, qualem ego quidem nec vidisse unquam, nec è minoribus valis extractum fuisse, me legisse recorder. Interim hæmorrhagia narium, ut antea, ita & nunc continuabat, urina concocta apparebat, dyspnœa non remittente, quam mox sputum tenue sequebatur, Aphorismum illum *Hippocraticum* lib. 5. Aphor. 8. qui pleuritide laborant, nisi intra quatuordecim dies supernè per sputum repurgentur iis in empyema he trans-

mutatio, verificans. Quanquam *Aretæus* hic interdum vigesimum diem terminum constituat: *Galenus* vero in commentario non solum empyema, sed quamlibet in pus mutationem intelligat. Sed dum nos materiæ evacuationem per sputa cocta è pectore expectabamus, Ecce novum emergens intervenit, scilicet puris cocti albi instar lactis, paululum tamen ad colorem croceum inclinantis, per foramen cutaneum à vena incisa nondum consolidatum, excretio, quæ quidem metastasis materiæ per vias occultas, nobisq; incognitas pectoris & lateris dolorem sensibilibiter sustulit, sed cubiti illius manus, ut & homoplatarum dolorem majorem excitavit, sputo liquido, salso, per aliquot septimanas continuante: quod tamen postea salubriter secum euphoria cessavit, fluxu menstruo reverso, vitæque ad hanc usque diem feliciter & pancreaticè valente. *Simonis Schulzii.*

Ab Empyici, non abducar quin 1. juvenem proteram à pleuritide Empyicum, sed cujus purulentia, costas arrosit, quas mihi conservo; & sponte sua diu manavit extrorsum, & quidem fortissimè & lethaliter.

2. Phthisicam autem curavi, annum agentem 30. cujus ulcus pulmonale dextrum tam altos egit cuniculos in pleuram, & in musculos intercostales ut ejus tabum per cutem efflueret, citra pectoris damnum. Pulmonis enim ulcus toti ambitui interno lateris ulcerosi ita accreverat, ut digito intruso, & orbiculatim ducto deprehensa sit cohesio. Bechicis & injectionibus bis de die iteratis, vitam scemina protraxit in septennium; nec interea statis mensibus caruit. Imò filium non infantem pertulit, & ita vivacem exclusit ut adhuc dum alacer vigeat, stupentibus amicis.

3. Belli ducem curo Empyicum à plumbi globulo. Is jam ab octennio fistulam gerit è dextro intra titulam pectoralem dextram; quotidieque manè & vespere, pus tam feliciter per ulcus excludit, ut nusquam decumbat, sed vitæ munis fungatur.

4. Id mihi memoriam refricat viri quadragenarii cui à dextris, circa 3. & 4. costam spuriam tumor in suppuratum abiit, & plurimum pus per tres hebdomadas fudit. Quum stupeam ad puris molem horrendam, ulceris fundo studui. Sed profectò jecur esse detexi, cujus purulentia, cuniculis actis, ipsum orbiculatim hypochondrio tam stricte agglutinauit, ut puris nihil in abdomen influxerit, sed id omne proruperit extrorsum.

Indicem sæpè sæpius in ulcus intrusi, & hepar sensi profundius excavatum, quasi digitum inderem pomo vieto partim atque sano; quæ pars enim sana est firmitudinem conservat, dum vieta diffuit nec attrectari sustinet. Diæta vulneraria & balsamis injectis & admotis cuncta symptomata eluctatus est æger & salubri nunc vescitur aurâ. Qui in renibus ulcerantur, tam levi cum labore se extricare non possunt, urinæ enim stranguisiosæ divexantur in annos & miseri pereunt, vigiles, febricitantes, sitibundi, arripentes, exsuccati, sed lumbis indolentes; & id decipit Medicos falsò jactantes ibi dolorem esse ubi morbus, & è contra. Hic enim dolor in vesica & in urethra calculum mentitur, cum urinæ glutinosissimis atque purulentis. Dolor autem in rene



rene nullus, quia consumpta illius carne, cori-  
aleus evasit & corii bubuli crassitudine Tales  
sacculos renales coriaceos sæpè sæpius habui  
præ oculis, cum ureteribus & directo pariter  
præduris & callosis. Unicum vidi & multis qui  
lacte, trochiscis Gordon. & Balsamo Lucatelli  
purulentiam renis superavit. Alii omnes extin-  
cti, inter quos exemplum mihi sine exemplo,  
renis enim dextri ulcus arroferat & sibi agglu-  
tinaverat ex ulceris directo ileon intestinum;  
Inde colica immanis & dementans cum excre-  
tione alvina dysenterica, pauca, frequenti pu-  
rulentia sanguinea cui tanquam dysentericæ Me-  
dicina n feci. Sed cadaver errorem meum de-  
texit. Non erat enim dysenteria primaria sed à  
renis tabo transitu suo excoriante & inflamma-  
te fistulam intestinalem; haud secus ac deje-  
ctiones visuntur dysentericæ in Empyemate pe-  
ctoris; sed ab empyemate renis id nusquam à  
me vel visum aliàs, vel auditum, vel lectum. E  
Collegiis Clariss. Carol. Drelincurtii communicata  
Excellentiss. D. Gnyot ejusdem Discipulò Medic. Doct.

### Anatomicae inspectiones.

#### *Empyema Pleuritidi succedens ante decimam quartam diem.*

Advertant juniores, quanquam Hippocr. ob-  
servatione pleuritidis non ante 14. diem ad sup-  
purationem tendit, Nostra tamen observatio-  
ne, non solum in juvenibus, sed etiam viris  
constantis ætatis, 7. vel etiam 4. id evenire, &  
evidenter id *deregi rigore* & subsequente febre,  
ab illis diebus invadentibus & singulis diebus  
recurrentibus: Sic sane in Nobil. adolescente  
*rigor febrisque*, 4. 5. 6. 7. uique repetentes prænu-  
tiant suppuracionem.

Dilectio autem cadaveris secundum intra  
septenarium morbi, in illo factam suppuratio-  
nem ante perfectam fuisse demonstravit, cum  
universus thorax pure prægnans repertus esset:  
Quin memini me vidisse pus in thorace ejus-  
dam Sacerdotis, qui 9. die extinctus obiit, quod  
præpostero consilio purgante medicamento  
usus esset, neglecta v. s. & dilata in sextum, quo  
sum advocatus. Carolus Piso de morbis ab illuvie  
Jerosa sect. 3. cap. 9.

#### *Empyema insigne Sinistri lateris thoracis, nulla sui signa exhibens.*

Suppuratum mortuum secimus in quo nulla  
pulmonis sinistri pars aderat, sed tota cavitas  
aqua & pure repleta erat: cum tamen per duo-  
rum mensium spatium, quo tempore ab hoc  
morbo vexatus fuit, nullam respirandi difficul-  
tatem, & paucam, tussim, sine ulla materix mor-  
bificæ ejectione habuisset, At eamensecto cor-  
pore tota thoracis sinistri cavitas aqua puru-  
lenta referta erat. Dom. Panarolus Pentec. 1.  
Observat. 46.

#### *Empyema pulmonum exulcerationem frequenter sequitur in Phthisicis.*

Pus in Pulmonum exulceratione genitum,  
non solum asperæ arteriæ ramis illapsum ex-  
spuitur, sed & tandem quando ex corruptione

Pulmonum substantia dividitur, in pectoris ca-  
vitatem influens, illicque sensim coacervatum,  
atque interdum magna copia congelatum, Em-  
pyema producit, Quod ab exulceratione hac  
in phthisicis eo modo prodire sectio patet acit,  
per quam in corruptione pulmonum puris sem-  
per aliquam saltem portionem, si non magnam,  
pectori adherere vel innatare deprehendimus.  
Platerus pract. lib. 3. cap. 5.

#### *Suppurati pericardium totum ferè corruptum reperitum est, & cordis major pars exesa.*

In suppurato, qui post diuturnam affectio-  
nem obierat, observatum est ferè pericardium  
totum corruptum fuisse, majoremque ipsius  
cordis, quod adhuc quidem, ob diutius scil. pu-  
tredinalem in eo aservatum calorem, palpi-  
tabat, partem exesam extitisse, ut quidem ulcus  
diutius tulisse facile credi possit: Franc. Rota  
cap. 23. de Tormentar. vulnerum curatione.

## ENCANTHIS.

Encanthis, Græcè *Εγκανθίς*, in oculi angulo,  
unde etiam nomen accepit, exiguum tu-  
berculum est, vel ex fluxione obortum; vel ex  
ungue parum exciso, ac proinde contracto,  
conglobato, & in tuberculum converso, conve-  
niunt Celsus & Paulus in Chirurgia, quod exci-  
pi hamulo & circumcidi debet. Paulus vossel-  
lam. ad apprehendendum usurpat, sed luc quo-  
que diligenter temperatâ manû utendum, ne  
quid ex angulo abscindatur; cum exiguum li-  
namentum, ut Cadmia, aut atramento suto-  
rio inspergendum est. Paulus Chalcitidem lavi-  
gatam usurpat. Sed mitiora, quæ non irritant,  
tutiora sunt, ut est tuthia præparata, aut pom-  
pholyx, aut sief album sine opio. Hieronim. Fa-  
bric. ab Aquapendente in Chirurgic. operation.

*Εγκανθίς* est Cornelio Celso, ac Paulo Ægine-  
tz, tuberculum, enascens, in oculi angulo:  
quem *νόθος* nominat, Ruffus Ephesius lib. 2. c. 5.  
dividitur autem in benignam, ac cancerosam.  
Illa ut occurrit frequenter, sic hæc nonnisi ra-  
rissime.

Vidimus tamen eam, luce clarius in naupego  
Hornano: cui, ex fluxu lacrymali per oleum  
vitrioli, intempestivè suppresso, usque eò luxu-  
riavit glandula, à narium parte, oculis adposita,  
ut ejus excrecentia cooperierit, non tantum  
malam: sed degeneraverit quoque in pernicio-  
sissimum carcinoma. Quod tentavit quidem fi-  
lo comprehendere, & convenienter ferro ex-  
scindere Cornelius Sasboutius, Lithotomus, ac  
Chirurgus satis felix: sed acquisiverat jam tum  
eam malignitatem hic tumor: ut vix potuerit  
attingi, quin protinus, profunderet plurimum  
sanguinis: ac proinde fuit necesse solis lenien-  
tibus uti: quibus exitum ægri magis fuit dila-  
tum, quam ablatum. Viderint itaque illi, quibus  
æria medicamenta in frequenti usû quàm fa-  
cile committatur error: nullâ arte deinceps  
emendabilis. Nicolaus Tulpus Observ. Medic. lib. 1.

## ENTEROMPHALOS

Vid.

## HERNIA

Bbbbb 3

EN-



## ENTEROCELE

Vid.

## HERNIA.

## EPHELIDES

Vid.

## CVTIS VITIA

## EPHIALTES

Vid.

## INCUBVS.

## EPILEPSIA.

**E**pilepsia vox Græca idem est ac apud Latinos *Prehensio*; deducitur enim à verbo *ἡλαρμόνιο* quod prehendere significat: quia scilicet inorbus hic incautos ac imparatos insidiosè & de subito adoritur. Dicitur alias *Morbus Sacer*, vel propter magnitudinem, quali sensu os omnium corporis maximum sacrum dicitur, vel quod cerebrum partem nobilissimam, Sacramque Palladis & animæ arcem pro hospitio habeat. *Morbus Herculeus*, vel quod eo Hercules laborarit, ut & alii maximi viri in laboribus continuis non tantum defudantes, sed etiam quasi contriti, vel quod Hercule Medico in eo edomando opus sit. *Morbus Comitialis*; Vel à solutis, diremptisque apud Romanos die eo quo quis in Senatu hoc morbo prehenderetur comitis, habebatur enim pro pessimo omine ac portento singulari; vel potius quod in comitiis seu magno hominum conventu affectus hic maxime & præcipue invadat. *Morbus Sonticus*, quod morbi gravitas utut vehementer fontibus justam absentiz excusationem, testibus Plinio, Gellioque in iudiciis afferret. *Morbus Caducus* à subitaneo casu ægrotantium, qui idcirco *caduci* & *cadivi* vocitantur. *Morbus Lunaticus*, eo quod, secundum quosdam, qui diebus illunibus vel concepti, vel nati reperiuntur hancce lumen vix effugiant, vel etiam quod hæc affectio ad Lunæ quadras sit quasi composita. *Morbus qui inspuatur*, eo quod temerè imaginarentur Antiqui Epilepsiam jam illatam ac spumantem per antispuitionem, ut ita dicam, percipi, sicuti recanendo incantationes retorqueri arbitrabantur. *Morbus Puerilis*, quod pueris sit vernaculus, unde non inmerito puerorum noverca dici meretur.

Est autem Epilepsia universi corporis convulsio cum repentina facultatum principum pro tempore eversione. Alias Petrus Joh. Faber in Pathologia Spagirica, dicit Epilepsiam esse affectum præter naturam, seu morbum à virulento quodam fermento inebriativo, potius quam soporifero oriundum, spiritum animale offendentem, & vitalem adeo oppugnantem, ut à virulentâ illâ qualitate velut inebrietur. Quæ sanè ulterius hic non exagitemus. Advertimus tantum quod etiam si plerisque lubeat Epilepsiam esse convulsionem periodicam, quæ accessus ac recessus suos, nunc insperato ingruentes, nunc statis temporis momentis, quasi ad edictum invadentes, hæc tamen conditio non sit de essentia morbi caduci, cuius quippè vel unica, nec inquam reversura prehensio verè epilepsiz nomen mereatur. Ut patebit ex

historia Anatomica è Clariss. Carol. Drelincurtio ad hujus capitis finem asserenda. Verum quid nos ulterius moramur in explicando morbo cuius non modò ideam accuratam, sed etiam descriptionem absolutissimam, tum theoreticam, tum practicam, exhibuit Clariss. Thom. Willisius libro de Morbis Convulsivis, cuius propterea Dissertationem integram præstiterit huc asserre, quàm propria sensa fusiùs enarrare? Sic itaque ille, initio à morbis convulsivis in genere, pro majori illustratione Epilepsiz in specie, petitò.

Ut *Spasmi*, sive *motus Convulsivi*, & *irregularis* natura, & causæ rectius innotescant, præmittendum esset, quo pacto *functio motiva regularis* in corpore animato peragitur: verum hujus plenior consideratio, quoniam ad Cerebri, & nervosi generis *Physiologiam* spectat, in alium differetur sermonem: In præsentì, quantum ad rei propositæ elucidationem facit, verbo annotetur, *spiritus animales* esse proximum *motus regularis* instrumentum, ipsorumque actionem, seu vim motricem in eo tantum consistere, quod densius agglomerati in parte motiva, ibidemque in spatium amplius expansi, eandem intuent, & intumescant, quæ proinde, quoad longitudinem contracta illico ad se partem sibi appensam attrahit. In nervorum descriptione nostra pridem edita, innuimus hujusmodi motum esse duplicem, scilicet *spontanum*, & *mero naturalem*, hujus instinctum à *cerebello*, ac istius à *cerebro*, utrumque autem per *nervorum* ductus veluti *canales* deferri, cum ad *musculos*, tum ad *fibras*, *membranas*, *parenchymatis*, aliisque *partibus* *motivis* intertextas; denique in hisce omnibus, tam expedite varias peragi actiones, quascunque aut *necessitas naturalis*, aut *voluntatis imperium* exigit, ea solum ratione, quod inter *spiritus animales*, qui animæ sensitivæ hypostasim constituunt, intra prædictas partes, continuata serie dispositas, ubique eadem est *communicatio officii*, *intima conjunctio*, & *celerissimum commercium*. At verò inter *motum à musculo*, eoque ab aliis *partibus* editum, discrimen hoc notabile occurrit; quod in *his*, actio sapissimè intra corporis motivi terminos circumscribitur, ita ut ejusdem tantum *membrana*, aut *visceris* pars una aliam moveat, & deinceps hæc à vicina moveatur: in *genere autem musculo*, plerumque *pars movens* in uno membro, & *movenda* in alio proxime constituta est (quanquam & inter partes musculosas quædam, uti *cor* & *diaphragma*, proprie seipsas ferè tantum movent: ) Hinc *membrana* & *viscera* *motum* quasi *intestinum*, & *vermicularem* habere dicuntur; qualis ubicunque incipitur, spiritus ibidem densius agglomerati, & expansi, primo partem istam, dein ultra pergentes, aliam, & mox ulteriorem intumesciunt, proindeque partem illam quæ à tergo est trahunt, adeoque intumesciunt, & propterea motum a loco in locum transferunt; simili ferè ritu ac lumbrici, aliaque reptilia progressus suos faciunt. Huic autem *membranarum*, ac *viscerum* *functioni motiva*, si frequens, aut indiscontinua fuerit, spiritus copiosi requiruntur, qui tamen sine tumultu, aut magno impetu, pensata sua satis tranquille exequuntur: Et quidem observare est, *spiritus animales* in *viscerum membrana* nasci haud multo parcius, quam in *musculis* infuere;



fluere; prout arguere licet ab istarum partium sensu exquisitiori, & in iisdem multiplici nervorum insertione, & diversimoda per plexus & fibras divaricatione; licet interea musculus uberiori sanguinis induxu irrigantur: Quoad motum vero in genere musculo peractum, spirituum agglomeratione & rarefactione per totam partis motivæ compagem subito ac simul explicatæ, tanto cum impetu, ac robore peraguntur, ut attritio musculi in nixu motivo, vim trochleæ, aut vellicis excedat; cumque vis ista tantum à spirituum partis motivæ intus expansione, sive rarefactione dependeat, nihil minus concipere possumus, quam spiritus ita expansos, pulveris pyrrici, veluti ignitos explodi. Enimvero supponere licet, spirituum, fibras musculo intertextas incolentium, particulis spirituum salinis, alias diversi generis particulis, à sanguine arterioso inter easdem fibras ubique interfluo, nitro sulphureas accedere, illisque intime accrescere: dein quoties particulæ utriusque generis, velut nitrum & sulphur combinata, propter motus instinctum per nervos advectum, tanquam à fomite ignario, commoventur, protinus ab invicem elise, & velut explosæ, musculum subito inflant, proindeque tractionem validissimam efficiunt: enimvero in hunc finem ita constitui videtur, ut musculi multo uberius quam viscera membranacea sanguine arterioso perfundantur: nimirum spirituum copula elastica, per motus valde crebros, ac interdum continuos absumptæ, ac perpetim deciduæ, subinde statim nova à latice sanguineo substituantur: interim ut ipsi spiritus in minori copia per nervos exiles suppeditati, usque in eadem statione, tanquam milites veteranæ, diutius persistant, & sæpe copulam multiplicem impendant. Secus enim, unde jumentis, dum per plures horas, imò per integrum aliquando diem, cursu citatiori musculos terè omnes exercent, spirituum penus pro tanto labore sufficiens derivatur? aut quis credat paucos spirituum manipulos, per exiles nervorum parvas vagi & intercostales propagines cordi adductos, proprio Marte adeo robustum, & indiscontinuum ejus motum efficere posse? Illis, equidem necesse videtur, copias subsidiarias perpetim à sanguine accedere, easdemque semper protinus explodi. Certe ob hanc rationem & cordis, & cæterorum musculorum virtus motiva robustior, & supra organum quodvis mechanicum elastica evadit: nempe in quantum spiritus animales, ubique in musculo genere agentes, sibi inet copulam explosivam adificiant.

Quod si Explosionis vocabulum, in Philosophia ac Medicina adhuc insolitum, cuiuspiam minus arrideat; proinde ut Pathologia aræmæ huic basi iuntes, tantum ignoti per ignotum explicatio videatur: facile erit istiusmodi effectus, circa res tum naturales, tum artificiales, instantias, & exempla quamplurima proferre; ex quorum analogia motum in corpore animato, tum regulariter, tum æmulo peractorem, rationes aptissimæ desumuntur. Nam præter Nitri cum Sulphure, cum Tartaro, & cum Antimonio mixturas, quæ omnes cum detonatione igniuntur; atque Aurum fulminans, & compositionem ex Sale Tartari, Nitro, & Sulphure, quæ absque ignitione actuali, tantum penitus exalefacta, cum fragore vehementi exploduntur; etiam huc re-

ferri possint multi liquores, qui simul commissi, aut quibusdam corporibus affusi, motus violentos, & plane explosivos ineunt, concitantur: Spiritus Nitri, & liquor Animæ glaciatis invicem confusi; quin & alteruter limatura ferri immixtus, ebullitionem maximam, cum calore & fumo atrato concipiunt. Vulgo notum est quanta effervescencia, & impetus plane explosivi à salibus fixis deliquatis, ac acetosis cujunque generis simul permixtis oriuntur: Nec minus explosionis effectus cernitur, quando liquor sale volatili imbutus, uti Spiritus Cornu Cervi aut sanguinis, stigmati salino vel fixo, vel acetoso, vel nitro sulphureo admoveatur; scilicet particulæ aliæ ab aliis vehementer elise, cum impetu dissiliunt, & quaquaversus longe proferantur; quæ proculdubio, si intra corporis cujuscumque spatia, uti musculi fibras coercerentur, ipsam subito intumescerent, adeoque motus localis instrumentum constituerent. Super his paulo apertius in *deplexia* nostra olim disseruimus, atque rem adhuc fufius, & accuratius explicatam forsan aliquando publici juris faciemus.

Interea tamen ne videar sententiam hanc, revera novam, tanquam mei unius Cerebri fortum, omni patrono inopem exposuisse; Libet hic Clarissimi Gassendi assertionem proferre: quæ ut hypothese huic nostræ apertissime faver, & quodammodo ejus ansam præbuit, ita fortasse poterit & auctoritatem aliquam conciliare. Itaque *nitrodephlogistatus* ille vir animo perpendens quanta sit vis illa sive robur, quo non modo brachium aut crur, sed tota etiam animalis machina moveatur, regitur, atollitur, transferitur: Subjungit. Equæ facile capiat tenue illud, quodcumque est, intra Elephantis corpus, quod seu animam, seu spiritum, seu aliud quodvis principium motus concipimus, posse illam tantam molem agitare, ac ad tripudium etiam velox, concinnumque componere? Ac tanto magis, quanto ubi tenue illud intra id corpus non amplius viget, tanta externa vi opus sit, ut vel minimum loco emoveatur: sed nempe ad hoc quoque primum facit, eadem natura animæ ignea, quæ tametsi sit flammula pertenuis, sui tamen mobilitate idem proportionem prestare intra corpus valebat, quod flammula ex pulvere pyrio intra torquentum bellicum: dum scilicet non modo globum tanto propellis impetu, sed tanta etiam vi depellit totam machinam. Quod vero ad spiritus attinet, qui (instar pulveris pyrrici explosi) agitationem istam subeunt, dubium esse, inquit, an ii sint qui adveniunt ex cerebro, an quæ in ipsis tendinibus quasi connati haberi possint: Verum tametsi utrique concurrant, videntur tamen ad hoc munus illi præsentim destinati, qui sunt connati tendinibus. Non pluribus hic opus est, ut declinetur functionem motivam à spirituum animalium copula elastica, ejusque decisione pendere. Attamen ex hoc supposito (quod quidem maxima cum probabilitate supponimus) facile sequetur, motum convulsivum multo magis à tali causa procedere: Quisquis enim in membris, aut partibus affectis, subitas intumescencias, violentas & validissimas contractions, quinimò interdum totius corporis concussionem, jactationesque impetuosissimas considerabit, nihil minus concipere potest, quam plures spirituum animalium glomeres, velut fulguris e nubis erumpentis, explodi. Porro hinc etiam Elencho velut reciproco arguere licebit, & quia motus aræmæ sunt explosivi



ptolivi *impet & regulares*, à spirituum explosionibus produci: quo tamen ritu, quor modis, & quibus de caulis spiritus animales explosi affectiones *in corpore* pariunt, præsentis instituti erit paulo fuit, & quantum res ita difficilis & abstrusa patitur, apertius demonstrare.

In recitandis aliorum, circa *spasmi naturam & causas*, sententiis non multis hic moror; quæ apud antiquos diu celebris increbuit opinio, affectionem hanc tantum è *repletione*, aut *inanitione* produci (utcumque huic stabiliendæ præter autoritatem Hippocratis, præferatur exemplum de *corio*, aut *fidium nervus*, qui aut madido aere implet, aut nimis siccò inaniti contrahi solent) facile ex se concidit; quia supponere videtur (id quod nemini fragilitatem nervi experto credibile esse potest) nimirum ipsos nervos quoquomodo abbreviatos atque contractos, posse vi quadam musculos ad se attrahere. Quod si reteratur *repletionem*, aut *inanitionem* respectu solidarum partium quæ convelli solent, intelligi debere, è contra observare licet, ubi musculi & nervosum genus humore aqueo maxime irrigantur, uti in *Anasarca*, aut eodem plane destituuntur, prout in *tabe*, vel *marasmo*, haud propterea motus convulsivos excitari. E recentioribus plerique solummodo *irritationem* nervosarum partium, convulsiones esse causam statuerunt, conjecturam inde opinor petentes, quod *atrophia* pateat ab ipsa *vellicatione*, soloque tactu nervorum spasmos induci: Et quidem plane observavimus, in dissectione vivi catuli, cultro nudatis nervorum spinalium caudicibus imposito, statim & ipsos, & musculos quibus inferebantur, corpora convelli: nec inutilitatum est, a nervorum, ac tendinum puncturis, in quibusvis ferè hominibus, spasmos excitari. Memini ab ulcere in cuiusdam brachio excitato musculi tendinem prorsus nudatum fuisse, qui cum specillo Chirurgico tangretur, patientem rigore quodam in toto corpore, & concussione illico oborta, aliquandiu inhorruisse. Verum enimvero ut concedamus partium nervosarum irritationes non raro causa evidenter vicem subire; insuper aliquando hac causa *solitaria* *spasmos* leviores, & cito transeuntes produci: nihilominus ut graviores huius morbi paroxysmi, iique crebra vice repetentes debite explicentur, alias, atque altiores causas, scilicet tum *conjunctam*, tum *procatarticam* investigare oportebit.

Quandoquidem igitur *spasmi* nequaquam accidunt, nisi in corpore vivo, ubi partes nervosæ instantur, & turgescunt spiritu animali, in promptu conicere ipsos *spiritus animales*, licet in *motu regulari*, ita in *convulsivo* esse proximum actionis instrumentum: nimirum illi quandiu *copula explosiva* idonea, & moderata imbuuntur, ac ad ipsam elidendam tantum *appetitus jussu*, aut *natura instinctu* proritantur, *motus* solummodo *regulares* pariunt: sin verò iidem spiritus sibimet copulam *heterogeneam*, ac nimis *elasticam* asciverint, vel si julto impetuosius, & vehementius in actus suos rapiantur; utique, tanquam equi estrænes stimulis agitati, inordinate exiliunt, & copulam suam, genuinam licet ac naturalem, violente explodunt; proindeque partes continentes, velut currus appensos, motu perverso, efferoque secum una corripunt.

Cum itaque, ut prædicitur, *motus convulsivi* ob duas potissimum causas excitentur; hinc totidem illorum *species* constituantur. Nam i. interdum accidit *convulsio* sine procatartici, aut copula heterogenea prius ascitis, tantum à causa evidenter *solitaria* induci: ita namque *passio vehemens* cerebro impressa, *solutio continui* alicubi in nervoso genere contingens, pathemata spasmodica nonnullis quibus Cerebrum & nervi debilioris sunt constitutionis: subito intulere: quippe spiritus animales, objecto improporcionado ipsos fugante, partes continentes exagitant, quin & copulam suam, licet idoneam, vehementer elidendo, easdem instant; proindeque alias hisce annexas convellunt: *Spasmi* hoc ritu excitati quoniam in iis spirituum copula naturalis vehementius eliditur, quodammodo sunt explosivi, qui tamen cito delinunt, & sæpissimè sine viscerum, aut membrorum jactationibus, cum *tremore* tantum & horrore aliquo in spirituum deliquia transeunt. Verum i. *convulsiones* quarum paroxysmi sunt graviores, atque diutius persistunt, aut crebrius repetunt, omnino à causa procatartica, sive dispositione prævia pendere, & ab alia, præter irritationem, causa conjuncta exoriri videntur. Ideoque in hoc casu *particulas heterogeneas*, & valde *explosivas* *spiritibus* in hac aut illa corporis regione agentibus accrescere supponimus: deinde ex iniqua hac combinatione, & irrequieta hujusmodi materia & spirituum collisione, crebras, vehementesque explosiones ediat, *paroxysmos* *marasmos* inducere.

Enimverò præter copulam elasticam, quæ spiritibus à sanguine arterioso ubivis accedit, & à cujus explosione ordinata *impetus motus*, juxta *appetitus naturæ*, aut *natura instinctum* in partibus quibusvis nervosis perficitur (prout alibi declaravimus: ) etiam alijsmodi interdum corpuscula naturæ effert, & pulveris *nurati* magis *amula*, spiritibus adveniunt, iisque intime adherent: cujus materia à spirituum anplexibus, cum frequentia & subinde divortia contingant, à mutua particularum elisione corpora continentia varic instantur, adeoque in *motus convulsivos* aguntur. Revera quoties *aff. Elia* *spasmodica* habitualis evadit, ut paroxysmi convulsivi non raro sua sponte, & sine causa evidenter, passim verò levi quavis occasione oriuntur, talis morbi procatartix in hujusmodi mala spirituum animalium diathesi consistit: Neque enim tantæ ægritudini excitandæ, *colluvies serosa*, aliique minus efferi humores, licet in ipsis cerebri ventriculis, aut circa nervorum origines depositi, sufficiunt: Quippè in defunctorum capitibus non raro cerebri medullia, ipsaque nervorum principia aquæ limpidæ prorsus immersa vidi; quibus tamen dum vixerunt, nec *Epilepsia*, nec *motus convulsivi* adfuerunt: Quin potius ad hos motus producendos requiruntur corpuscula maxime *activa*, qualia sunt *salina*, & *sulphurea*; quæ cum spiritibus combinata, & dein subito erumpentia, particularum mineralium combinationes, violentasque explosiones imitentur. Quandoquidem enim in motu regulari & ordinario (prout modo innuimus) musculi *impetum motum*, & *vim elasticam* concipere nequimus, nisi *spirituum animalium explosio* quædam supponatur: certe multo magis pro *insulibus epilepticis*, aliisque *convulsionibus admirandis*, quæ passim eveniunt,



niunt, excitandis, eorundem spirituum, cum aliis particulis valde essetis *complicationes*, eorumque ab invicem *et fines* vehementes requiri, alterere licebit. Circa ejusmodi vero *copulam spasmodicam*, quia differt a naturali & ordinaria, quam in motu regulari adesse, & ubivis à sanguine suppeditari alibi ostendimus, inquirere oportet unde illa provenit, & quo ritu, quibusque in locis spiritibus accrescere solet.

Quoad prius, observare licet *explosiones spasmodicas* non solum in *musculis*, quibus solis, quæ motum regularem efficiunt limitantur, sed etiam in *membranis*, scilicet *ventriculo*, *intestinis*, *mesenterio*, aliisque partibus fere exangibilibus passim contingere: porro *explosiones ipsas* in affectione *convulsiva*, licet contra appetitum nutum, & naturæ motum excitantur, longe *vehementiores* esse, & *diutius persistere*, quam in motu regulari: Ex quibus constare videtur, *copulam explosivam spasmodicam* aliunde quam motus regularis effectricem advenire: Et quidem probabile est illam, non uti hanc à sanguine arterioso inter fibras musculosas ubique interfluo, producere, verum à cerebro cum liquore nervos irrigante descendere, & dein juxta horum origines, medios processus, plexus, extremitates, quasi in morbi convulsi minieram congeri. Profecto nihil evidentius liquet, quam *affectus spasmodicos*, ob noxam imprimis cerebro affixam, & exinde in varias systematis nervosi partes transmissam, sæpissime oriri: hinc enim accidit, quod *passi vehementes*, uti *timoris*, *ira*, aut *tristitia* spiritus *diversos* hospites afficiens, ita crebro *pathemata dicta hysterica*, ac *hypochondriaca* ordiatur: Porro quod in malis *febrilium crisi- bus*, cum sanguinis recrementa adulta in caput transferuntur, convulsiones passim succedant: Porro & hæc ratio est cur *Verigo*, *capitis inflatio*, *mentis torpor*, aliæque *suprema regionis* accidentia, *spasmodorum in visceribus*, & non raro in toto corpore subsequenterum præmium esse solent. Quapropter minime dubitandum est, quin *particula heterogenea*, & *explosiva* c sanguine una cum succo nervoso cerebro intillantur, quæ postea in nervosum genus detrusa inibi spiritibus accrescunt, iisque diathesin convulsivam interunt. Revera *affectus morbosus*, qui aut *universales* sunt, aut saltem plures simul corporis partes occupant, hoc tantum ritu fere oriuntur. Interim tamen haud negamus, quin *Spasmi particulares*, qui se intra quoddam locos, capite nullatenus affecto, continent, aliis interdum modis inducantur. Nam siquidem *nervi* ab utroque fine, scilicet *radice*, & *extremis ramentis*, humorem suum imbibunt (quod *Dollissimus* & *Glissonius* verisimillimum esse statuit, & à nobis non sine summa probabilitate in *observat.* nostra ostenditur,) profecto hinc quoque inferre licebit, etiam particulas *spasmodicas*, non tantum à nervorum principis, sed aliquatenus per illorum extremitates intus admitti: Id quod fortassis aperte satis & plane constat, quod ex *liene* male affecto *Spasmi* circa ipsius regionem exorti *hypochondria*, & non raro *præcordia* infestant. Novi quibus à *tumore*, vel *ulcere* in *mesenterio*, *utero*, aliisque visceribus existente *Convulsiones* cum in parte affecta, tum circumcircæ eam increbrescere solebant: cujus ratio videtur non aliunde petenda, quam à particulis heterogeneis in loco affecto uberius congestis,

quæque simul in fibras nerveas per totam viciniam confusas irrepentes, iis motuum convulsi- vorum, velut *pulveris pyrii ignendi somitem* sup- peditant: ac vero *Spasmi* ob tales *causas* ori- undi haud sese solent longe lateque diffundere, neque semper ad caput ascendere.

His ita præmissis de affectionis *Spasmodicæ causa interna*, & *proxima*, quam scilicet et potissi- mum, ac sæpius ipsi capiti, quoad *hæc* item *nervorum extremitatibus* ortum debere statuimus; modo restat ut varias in utroque genere *causas remotiores*, & multiplicem hujus morbi appa- ratum particularius designemus. Aegritudo igitur *Convulsiva* plerumque originem suam a capite desumit: non irum quoties *particula heterogenea* & *explosiva* à sanguine in cerebrum aut *appendi- cem* ejus medullarem suffusa, illinc postea in *nervosum genus* derivantur, ibidemque spiritibus accrescunt: hoc autem fieri contingit variis de causis; *plures enim sunt rationes*, modique quibus *materies morifica* in caput admittitur; plures enim quibus in hanc, aut illam *systematis nervosi regio- nem* deducitur; & juxta varias ejusmodi *causa morificæ translationes*, diversæ motuum *convulsivo- rum* species constituuntur.

Igitur quod *particula heterogenea* & *spasmodica* intra *iniquum* admittuntur, & *sanguinis vitiosus*, & *cerebri suscipientis* vitio imputandum est.

1. Cum *sanguis* materiam morificam capi- ti suffundit, vel tota ejus massa depravatur, uti frequenter accidit in *febrilibus*, *malignis*, item in *affectione scorbutica*, *cacoehyma*, ac imprimis ori- ginaliter *morbida*; vel *sanguis* ex se *insans*, & in- corruptus corpuscula maligna aliunde accipit, eaque postea cerebro attingit, ita in magnis vis- cerum impuritatibus, ac præcipue cum partes aliquæ *abscessu* aut *ulcere virulento*, vel *fermento noxio* afficiuntur; è talibus enim *minieris* *particulæ noxiæ* in sanguinem ebulli- unt, ejusque commixtu postea in cerebrum deponuntur: ita ob *lientem*, *uterum*, aliæque *viscera* male affecta morbi *convulsi* excitantur; qui tamen immediatius à cerebro, istarum partium labes, per sanguinis commercium susci- piente, dependent.

2. Attamen 2. *sanguis*, utur vitiosus, & semi- nio morbido impræguatus fuerit, haud facile inquinamentum suum capiti allinit, nisi etiam *cerebri*, ejusque *appendicis* constitutio aliquate- nus in vitio fuerit; quandiu hæ partes bene conformantur, & vigore pollent, se, suæque tuentur; foribus occulis, nil præter liquorem spirituosum suis usibus dicatum, purum, putom- que admittunt: sin vero aut *cerebri meatui*, & *pori nimis laxantur*, aut *spiritus estuarii* ab excubiis suis cessant, vel avocantur, una cum *succo nervoso*, *materies heterogenea* & *morbifica* irrepit, ac in regimine animali malignitatem suam explicat. Quod spectat ad ipsius *cerebri malam dispositionem*, eadem aliquando *hereditaria* exiit: ita parenti- bus *epilepticis*, aut *convulsioni obnoxii* oriundi, in eosdem affectus plerumque & ipsi proclives sunt: & quidem constitutio cerebri à partu multis modis fieri potest vitiosa: nam aut ipsius *intemperies* justo est humidior, aut sicciior, vel alte- rius *qualitatis excessu*, aut *defectu* peccat. Inter- dum *pori* sunt *laxiores*, vel *consistentia* ejus nimis *dura* aut *mollis* est: quin & *partium Cerebri* & *appendicis* ejus *conformatio* indebito more ha- bere



bere potest: Cæterum aliquando *Cerebri & nervorum* indoles originaliter sana & firma ex accidentie vitatur, & diathesi morbidam acquirit: longa intemperantia has partes enervat: quin & febres malignæ, & morbi chronici eas plurimum debilitant: porro accidentia externa, uti frigoris & caloris excessus, vulnus, aut plaga earum crases sæpe pervertit, & impressionum morbidarum magis capaces reddit. Quod vero spectat ad spirituum animalium æmulationem, propter quas particulae heterogeneæ & spasmodicæ cerebrum absque repulsu subeunt, illique facilius cohererent; observare est spiritus animales quibusdam ab ipsa nativitate teneriores, & cito dissipabiles existere, ita quidem ut nihil sensui, aut imaginationi fortius & vehementius oblatum tolerare possint, quia statim in confusiones adigantur; propter hanc rationem, formæ præ viris earumque aliæ præ aliis affectibus dictis hysterici obnoxii sunt. Porro interdum passio violenta spiritibus utroque medioriter firmis ejusmodi prostrationem ac inordinationem imprimit, ut postea nihil fortiter sufficere, nec cuiusvis injuriæ resistere valeant: ita passim accidit subito dolore, aut ingenti tristitia regimini animali impressiones morbidas affigi, quæ postea vix unquam delentur: hinc enim mulieres sæpe affectiones dictas uterinas, & viri hypochondriacas primo contrahunt, istque postea ferè semper assuescunt.

Ex his constare videtur quibus modis & ob quas causæ materies spasmodica intra *lymphas* admitti solet: jam proxime videamus quod de illa fiat postea; siquidem ista materia ad Cerebrum adfecta affectus convulsivos aut non semper, aut non eodem prorsus modo inducit.

1. Interdum accidit particulae heterogeneæ & explosivæ in Cerebrum admitti, quæ tamen exinde sine magna noxa, & priusquam genus nervosum subeunt, rursus exterminantur: quippe vena & lymphæ ductus sæpe quod superfluum & regimini animali inimicum est, resorbent, & vel foras convehunt, vel in emunctoria deponunt. Dum talis materia parumper in cerebro agitatur, particulae ejus spiritibus nonnullis afficit, ab istque demum elisa, vertiginem & scotomiam cient; ac vero quia nervorum ductus haud subeunt, affectiones spasmodicæ minime succedunt.

2. Quando materies morbifica intra *lymphas* admissa, non exinde statim relegatur, sapienter noxam suam, priusquam nervo generi infertur, haud prodit; nam intra Cerebrum spiritus animales admodum vegeti, & spatium liberius nacti, copula cujusvis heterogeneæ complexus evadunt; quos equidem intra angustos nervorum canales evitare nequeunt: porro ipsa materies morbifica, siquidem e Cerebro per vasa excretoria amandari non potest, exinde mox in systema nervosum, utpote partem ignobiliorem dimittitur: sin vero invitis facultatum superiorum præsidis, talis materia intra Cerebrum diutius commoretur, ejusque spiritus incolas valde inficiat, Epilepsiam inducit, prout infra speciatim ostendetur: attamen multo crebrius, labes e Cerebro absque magna noxa ejus, in nervosum genus traducitur; hoc autem non uno semper modo heri contingit.

Enimvero particula heterogenea liquori nervoso immixta, ac versus nervorum principia delapsa, eadem non simul omnia, neque hæc aut illa,

prout fors tulerit, indifferenter subeunt, verum in aliorum ductus præ aliis, idque non sine aliqua ratione diriguntur. Namque observamus symptomata convulsiva sedem plerumque aliam in pueris ac in adultis, aliamque in tenerioribus ac in robustis sibi eligere.

In pueris, qui affectibus cordis, & membrorum exteriorum exercitiis nondum assueverunt (quibus scilicet utrisque causa morbifica longinquius a cerebro profertur) materies spasmodica in nervos proximos, eos scilicet tertii quinti & sexti paris lapius incurrit; quare illis faciei, ac oris partes maxime convelluntur: raturumque est & inadultum iis viscera, & præcordia, prout in adultis atcoli, motu inordinato affici: E contra in proventa ætate hominibus, aditu ad nervos parvi vagi, & intercostales, uti ad illos spinula medulla, magis patente, partes, quas nervi illi respiciunt, frequentius convelli solent: hoc tamen cum discrimine, quod in tenerioribus, & iis qui sunt valde immixti, quibus, ob passionem animi, præcordia & viscera lapius perturbantur, materies spasmodica nervorum interiorum ductus apertiores promptius subit; illique propterea spasmi, in abdomine, & thorace excitatis, magis obnoxii redduntur: Hinc enim est quod mulieres passionibus dictis hysterici, ac viri quidam hypochondriaci molestantur: sicut postea, cum de affectibus istis particulatim disceremus, fufius declarabitur.

Cum materies spasmodica quorumvis nervorum capita adpellit, vel ibidem sublitens vertiginem tantum, partiumque ad quas nervi illi pertingunt, leviores spasmos, & subsultus creat, vel in nervorum ductus altius prolapsa paroxysmos convulsivos atrociores parit: eadem vero in processu nerveos delata, per caudicis, sive trunci unius aut plurium propagines, modo omnes, modo aliquas tantum, cæteris patentiores disponitur; atque spiritibus tum intra ipsos nervos, tum intra fibras appendicis consitis paulatim accrescit: nimirum par ratio est, & similis hic apparatus in dispositione ad paroxysmos convulsivos, ac si pulveris pyris successive explodendi grana per longas series jacerentur. Spiritus ad hunc modum copula heterogenea imbuti, tum intra nervorum truncos, tum intra fibras membranas, & musculi intertextas potissimum verò intra plexus nervos hospitantur; cumque illi aut gravati ob nimiam plenitudinem, aut data aliqua occasione exagitati, copulam suam excutere coguntur, particulae elisæ & ab invicem profluentes partes continentes valde instant, adeoque impetum motuum contra appetitus & naturæ iussa, & leges exerunt: Porro spiritus ad motus convulsivos obeundos semel incitati, à systematis nervosi extremitate, una, aut altera, ut plurimum verò in sine explosiones ordiuntur. Illi autem, qui primo explosi sunt, proximos quosque prædispositos, velut raduce ignario corripunt; adeoque longa, & continuata spasmodorum serie, à meta una ad alteram affectionem inceptam propagant: nam convulsio ab imò abdomine, aut à pede, aut manu exorta, sensim ad superiora, & plerumque ad ipsum *lymphas* prorepat: idemque affectus cum à cerebro (prout in Epilepsia) orditur, illinc pariter deorsum ad viscera remota, etiam ad membra & artus exteriores derivatur.

Materies morbifica in capita nervorum influens



fluens pro varia sui copia & dispensatione, diversimoda convulsionum genera producit: nam primo observare est, abundante, & exuberante materia, interdum *systematis nervosi*, aut quarundam eius partium totos *dactus* occupari, ita ut *spiritus animales* tum infusi, tum insiti, *copula heterogenea*, ejusque supplemento perpetuo saturati, in *spasmos continuos* urgeantur. Novi quibus n. u. u. l. omnes, ac tendines in toto corpore *contracturis* & *substitutibus* sine intermissione afficiebantur: Novi alios, quibus *brachia*, & *crura*, ceterique artus in varias flexiones, & distorsiones perpetuo cogebantur: quin & alios vidi, qui saltare, huc illuc discurrere, pedibus, manibusque humum contundere necesse habuerunt; quod ni facerent in immanes viscera, & præcordiorum convulsiones incidebant.

2. *particulæ heterogeneæ & explosivæ*, si minori copia cum spiritibus combinatæ sint, ipsis sine tumultu, aut perturbatione adherent, donec post aliquod tempus utraq; particulæ iterum dissilientes, ac ab invicem elise paroxysmos convulsivos cient; cujusmodi *paroxysmi* sunt vel *periodici*, & *statis horis* exacte repetunt: quod accidit ob *inariam morbosam aequali dimensa* generi nervoso quotidie suffusam; proindeque circa idem temporis spatium, ad plenitudinem *explosivam* etiam quotidie aggestam; vel *vagi & incerti*, in quibus scilicet particulæ heterogeneæ minori adhuc copia suffusæ, non nisi longo tempore ad *saturationem explosivam* assurgunt; quarum interim cum plenior aggestio, tum *explosio* ob plures occasiones, sive causas evidentes modo *cerebri*, modo *rarii* solent accidere: hinc fit ut *affectio spasmodica* nonnunquam causæ evidenti in totum ascribatur, cum revera nisi *procatartica convulsiva* præcesserat, talis causa nullam excitasset.

Itaque ut de *convulsionum causis evidentibus* nonnihil dicamus: supra observavimus, si vehementiores fuerint, & *cerebri*, ac *nervosi generis* constitutioni teneriori, ac imbecillæ acciderint, eas interdum *solitarias*, *pathemata convulsiva* inferre: at vero quoties *affectio spasmodica* gravior, & *habitualis* tacta, sæpius redire solet, licet *causa evidens* in propatulo sit, & effectus culpam sustineat, nihilominus suspicari licet *procatarticeam* intus latere, & in efficiendo potiorē existere: nisi enim spiritus *copula heterogenea* imbuerentur, in *explosiones involuntarias*, & *præternaturales* nec tam facile, nec tam crebro adigerentur.

*Causarum evidentium duplex ordo*, sive *classis* occurrit; aut enim ejusmodi sunt quæ *procatarticeam adaugent*, eamque citius ad plenitudinem *explosivam* perducunt, uti sunt *mala victus ratiō*, & *errata in sex non naturalibus*, quæ *sanguinem* & *succum nervosum* inquinando, *particulas heterogeneas* majori copia spiritibus ad saturationem suggerunt, proindeque *accessiones spasmodicas* eo citius accersunt. Vel 2. *causa evidens* dicitur quicquid *spiritus de repente exagitant* & *irritant*, ut statim *explodantur*, efficiat, & *copulam suam*, qualicunque fuerit, elidant: atque hujus generis plurima sunt, quæ spiritibus modo intra *hæpato*, modo intra *systema nervosum* consistit, *accidentia*, motus convulsivos instituit *diversimodo* (prout in regularibus assolet) aut directos, aut reflexos cient.

1. *Prioris generis* potissimum sunt *violente animi perturbationes*, quibus *spiritus Cerebri* incolæ agitati, atque confusi, alios intra *nervorum genus* decatentes, & sæpe prædispositos ad *explosiones irregulares* incitant; ita vehemens timor, ira, aut tristitia non modo incommoda valetudine affectis *insulsum epilepticos*, aut *hystericos* inducunt; sed interdum aliis quibuscunque cordis *palpitationem* & *tremorem*, quin & *membrorum & artuum convulsiones horribiles* accersunt. 1. Quoad *alteram causam evidentem* genus, quo scilicet *Spasmi* actu reflexo incitantur, hoc quidem nec infrequenter locum habet, quoties *gravis molestia*, cum *fibrarum & spirituum irritatione*, *nervoso generi* alicubi exhibetur: quippe eadem *molestia* mox cum primis spirituum fontibus, nempe *cerebro* aut *cerebello* communicata, exinde *in us inordinati*, ac *violenti* præter animi arbitrium incepti, hoc est, *convulsivi*, retorquentur; ita namque *lunbrici*, *pharmaca*, aut *acres humores*, *intestinarum tunicas* immaniter vellicantia, *istarum partium*, & non raro *membrorum exteriorum spasmos* inferunt.

Hæc de *singulis causarum conjuncta*, *procatartice*, & *evidentium* generibus, a quibus *morbi convulsivi habituales* facti, & cum *gravioribus paroxysmis* repetere soliti, exoriuntur: cum vero *alteram hujus morbi speciem* assignavimus, ubi *paroxysmi* a *causa evidenti solitaria*, seu *terè* tantum ab *irritatione*, spiritibus nondum *copula explosiva* præoccupatis, dependent; jam proxime dilquiratur quibus, & quomodo hoc fieri contingit. Super his in communi statuitur *insulsum spasmodicos*, a *mera irritatione* productos, aut *leviores* esse, & cito *pertransientes*, aut *gravissimos*, & non raro *lethales*, prout quando *venenis assumptis*, aut *venenosis* superveniunt. Porro adnotetur cum *materies morbosica*, sive *irritativa* ipsis nervorum caudicibus, aut plexibus infederit, eam non raro etiam *explosivam* evadere, uti unaque *spasmos* etiam a *mera irritatione* productos (prout supra annotavimus) *explosiones* quassam esse. Itaque his prælibatis, rem *propositam* expediamus.

*Partium nervosarum irritatio*, quæ motus convulsivos efficere solet, *varius in locis*, *variisque rebus*, quæ spiritibus & fibris incongrue, atque inimice sunt contingit. Quoad *res spirituum naturæ adversantes*, observare est præter *venena*, & *quantitatum tangibilium excessum*, qui ab extra indiguntur, multa quæ intus in nobis gignantur, scilicet *varia sanguinis*, & *succi nervosi recrementa*, *miasmata febrilia*, *humores præternaturales*, *salinos*, aut *sulphureos*, quinimò *lunbricos*, *calculos*, cum pluribus aliis *nervoso generi* infesta esse, & *irritationes spasmodicas* passim cingere. Quoad *loca affecta*, sive *materia irritativa sedem*; licet hæc in qualibet *systematis nervosi parte* noxam inferat, ut plurimum vero maxime infesta esse solet cum juxta *systematis nervosi principia*, vel *extremitates*, vel circa *medios nervorum processus*, ac præcipue in eorum *plexibus* desigunt: Porro talis *materia*, quæ spiritus irritans, *causæ evidenti* loco esse solet, non raro, prout modo innuimus, etiam *procatarticea* rationem subit, quatenus *nimirum particula heterogenea* ab illa emissæ, *bras nerveas* subeunt, & cum spiritibus combinatæ, eos ad *explodendum aptiores*, & *procliviores* reddunt.



1. Igitur interdum accidunt humores malignos, & nervo generi infectos & sanguine in cerebri regionem suffusos, & exinde demum in posticam capitis regionem delatos, nervorum origini incumbere, ubi si disrupta pellicula, quæ medullam oblongatam invelit, in nervorum truncos nudos incidunt, eorumque fibras altius subeunt; propterea quidem motus convulsivi non modo in partibus capiti vicinis, verum aliquando in valde remotis, & non raro in toto systemate nervoso oriuntur: Hoc passim observare est in malis febrium crisis, materia morbifica in caput translata; item in affectibus cephalicis, in statum pessimum, ac lethalem evectis. Revera cum plurimum hoc ritu defunctorum capita aperuerim, reperi in omnibus posticam medullæ oblongatæ regionem sero acri & sanguineo immerfam.

2. Quemadmodum systematis nervosi extremitas interior, sive origo, ita non raro exterior, sive finis a vellicatione illicita, scilicet spasmus, sive motus convulsivus suscipit, eisdemque quaquaverius transtert: hoc in membris exterioribus passim fieri, testantur tendinum ac nervorum punctura. Nec minus a vellicatione in visceribus facta spasmus circumquaque excitari solent, si quando pharmaca, aut humores acres, nec non lumbrii in ventriculo, aut intestinis scatentes partes membranaceas vellicant, adeoque sensionem molestem primis sensoriis imprimunt; exinde statim ob spirituum exaulescentias motus convulsivi modo in partes affectas, modo indifferenter in alias quascunque retorquentur: nam a graviore visceris cuiusdam noxa sæpe spasmus non tantum partes affectas, & vicinas occupant, verum in faciem ac oris musculos, necnon in membra exteriora transferuntur. Calculus ureteri impactus haud tantum in isto ductu, verum in tota vicinia contractions immanes accersit. Porro symptomata quadam hysterica, atque hypochondriaca nonnunquam hac ratione inducuntur; quatenus namque vellicatione in visceris cuiusdam membranæ facta, illico spasmus retorquetur.

3. Materies irritativa, quæ spasmodorum causa evidens esse solet, interdum in dios nervorum procreij occupat; & propterea partes modo supra, modo infra illius sedem ad motus convulsivos incitantur: Hoc de nervorum plexibus satis constare videtur; cum enim succi nervosi recrementa acris in iidem congeriuntur, non raro spasmus per totam viciniam procreantur: hac ratione affectio colicæ, atque hysterica, nulla viscerum illorum culpa tantum ab humore in mesenterii plexibus deposito non raro progigni, ac excitari videntur (quod equidem posthac, cum de affectibus istis particulatim agemus planius ostendetur.) Pariter ob plexus gangliiformes humore acris & irritativo obseles, præsecutio in gutture, nec non varæ præcordiorum contractions inferuntur. Porro affectiones spasmodicæ ab humore acris intra totos nervorum corsices, & corporum nervosorum meatus scatente non raro dependent. Vidimus quosdam convulsionibus admirandis, ac perpetuis affectos, ut necesse habuerint (prout supra retulimus) membra huc illuc jactare, & distorquere, saltare, discutere, humum manibus, aut pedibus contundere, aliasque gestulationes stupendas exerere, haud secus ac si sagarum præstigiis læderentur, cuiusmodi passionum causa genuina in eo consistere videtur,

quod succus nervosus genus irrigant, instar aquæ stygiæ acerrimus, ac a debita crasi degener factus, spiritus insitos influosque continuo irritaret, ac velut vitro quodam afflaret.

Ex his quæ circa varias convulsionum causas differimus, multiplices earundem species & differentia eliciantur: Nam primo annotavimus respectu originis, pathemata spasmodicæ sæpissime a capite affecto, seu materia morbifica in nervorum principia influente, derivati; quandoque tamen, licet rarius, ea a tali materia in nervorum extremitates irrepente pendere.

2. Quoad morbi & symptomatum productionem, observavimus eandem aliquando a causa evidenti solitariæ, uti passione subita, & vehementi produci: Sæpius vero præcæxam, sive dispositionem præviā requiri: porro causas interdum ita comidere, ut causa præcæxica etiam evidens vicem suppleat; quin etiam e contra, ut hæc aliud loco fuerit.

3. Quoad morbi extensionem, affectus convulsivus distingui potest in universalem, quæ spiritus totum systema nervosum, ipsiisque synapsibus acinantes, successive exploduntur; & particularem, in qua spiritus intra privatam quandam ditionis animalis regionem aheuntur.

1. Prior ista cietur quando spiritus animales intra primos ipsorum fontes, nempe Cerebri, & Cerebelli medullæ intrantur, unde ipsorum explosiones violentæ accidunt: quapropter tum animæ functio quævis interna, scilicet sensus, & imaginatio obscurantur, ejusque facultas exterior locomotiva pervertitur: Hujusmodi affectio spasmodicæ universalis, in qua scilicet præter artuum & viscerum spasmos, interiores animæ potentie eclipsæ patiuntur, iterum duplex est: nempe aut primaria, quæ ab ipsius incipit, oriturque in quantum spiritus hujus incolæ patientis nitrosulphureis inbuti primo exploduntur, eorumque accensio, ceteros in appendice tum medullari, tum nervosa scatentes corripit, ibique explosiones convulsivas concitat, prout cernitur in epilepsia.

2. Vel passio isthac universalis animæ inferens secundaria est, quæ scilicet alicubi in nervoso genere inchoata, exinde spirituum copias successive affectis, factaque velut aquarum undulatione, demum ipsi synapsibus traditur: hoc passim accidit in paroxysmis, qui dicuntur hysterici, in quibus ob spasmodum principio in imo ventre incipientem, moles, sive intumescencia in abdomine excitatur; dein eodem affectu per nervorum ductus superius lato ventriculus, ac mox præcordia contrahuntur, ac tandem spasmus caput impetente, patientes corruunt, illque notitia omnis adimitur; denique morbo in nervos alios reflexo, membrorum exteriorum motus convulsivi succedunt.

2. Quod vero spectat ad spasmum particularem, in cujus paroxysmo ægrotantes animo constant, hic quidem varias differentias sortitur: Quoad materiam sedem, quæ circa nervorum principia, extremitates, aut medios processus contingit, spasmodorum (uti ostendimus) diversitas oritur: Quinimod prout ista materies morbifica, nervorum principia obsidens circa medullæ oblongatæ caput, medietatem, aut caudam deligitur; propterea accidit modo tantum faciei, aut oris partes, modo imi, aut medi ventris viscera, ac modo



modo arum exteriores potissimum, ac sere tantum convelli.

Porro convulsio, quoad insulsum durationem, ejusque magnitudinem, distingui solet in continuam, ac intermittentem: Prior licet supra innuimus dicatur *crasus*, live contractio permanens, uti cum pars una, aut simul plures constanti tensione contracta aut distorta in eodem situ præternaturali aliquandiu detinentur, sic quandoque musculus, aut membrum, puta oculus, labium, gena, a recta positione distortentur, nec statim facile reduci possunt: cujus causa interdum est resolutio, live *paralysis* in quibusdam ahis musculis; qui cum relaxantur, oppositi nimis fortiter agunt, & partem, quæ inter utroque velut in æquilibrio consistere debuit, versus se totam corripunt: aliquando tamen talis contractio permanens excitatur propter tendines humore seroso impacto obselesos, qui promde rigidi evadunt: Hujusmodi affectus in scorbuto familiaris existit, ut ægri quandoque nullum membrum aut articulum extendere possint; sed velut in orbem, seu globum contrahantur. Nonnunquam tendines in dorso, ob talem humoris incursum, ossa extra debitum situm trahunt, & gibbositatem, vel corporis incurvaturam pariunt. Tria hæc distinguuntur in universalem, cujus tres sunt species; scilicet *impulsivam*, *inductivam*, & *crasam* ita propriè dictam, & particularem, quæ membrum quoddam vel articulum privatum respicit: Super his postea speciatim dicemus.

2. Convulsio intermittens, aut brevis est & momentanea, quæ per crebras vices, & quasi per subsultus peragitur, prout observare est in *horrore* & *tendinum concussibus*, quæ semper crebra motus, & quietis alternatione interstinguuntur: vel *passimorum insulsum*, eorumque intervalia diutius protrahuntur; ita utitatem est *paroxysmos convulsivos*, quando repetunt, aliquandiu perdurare, ac rursus desinere; tales autem periodi modo certis sunt, atque statis horis eveniunt, modo rara, ac incerta, atque pro variis datis occasionibus diversimode contingunt. Plures sunt alii hujusmodi affectus differentia, quæ postea cum de singulis convulsionum speciebus particulatim ducemus, melius elucebunt.

Hactenus Spasmodum, live Convulsionem in genere naturam, causas, & differentias, juxta hypothesein plane novam, & insolitam, sed rationi (ut opinor) satis congruam tractavimus: jam proxime incumbit præcipuas istius affectus species particulatim explicare; inter quas Epilepsia prærogativam facile meretur, ejusque consideratio methodi, live ordinis jure quodam præcedere debet; quippè hic morbus in corpore humano quasi imperium amplissimum nactus, non modo in totum *hæmiplegia*, sed plerumque simul in omnes systematis nervosi partes tyrannidem exercet: quapropter ab affectionis inmanitate, morbus *Herculeus*, ab insultus more tanquam à numine immissi admodum stupendo, *monstrum*, live *monstrum facer*, ab antiquis appellabatur; cui accedit cujusdam nostratis, haud infimæ notæ. Theologi conjectura nempe plures, qui in novo Testamento pro *Dæmoniaco* habentur tantum Epilepticos fuisse; morbiq; hujus à Christo Salvatore curationem, spiritus mali ejectionem sive exorcismum dici: Revera in hoc affectu materia morbi sic adeo obscura aut prorsus nulla

vestigia apparent, ut merito hic spiritum malefici afflatum suspicemur: saltem probabile est, quoties diabolus præstigiis suis miseros mortales affligere permittitur, ipsum non posse ex alia pharetra gravioris sagittas torquere, aut sub meliori larva, quam monstruosi hujusmodi morbi insulsum miracula ostentare.

Epilepsie symptomata uti sunt plurimum stupenda, ita illorum causa, & ipsius morbi ratio formalis difficillime explicantur. Enimvero inter Authores tum de parte affecta, tum de efficiendi modo, res varie controvertitur: plerique hujus sedem in cerebro, aut ventriculis ejus, alii in meningibus, quin & nonnulli in medio, aut imò ventre collocant; quo tamen jure mox inquiretur: Interim ut missis aliorum opinionibus, rectè rationem si lo vera morbi hujus Theoria investigetur, primo descriptionem ejus, simul cum integro Phenomeno censu exarare; secundo, istis rite perpenfis, morbi subiectum, & partes præcipuè affectas eruere; tertio demum rationem & modum quo morbus iste generetur, cum veris symptomatum causis subicere nitentur.

Primo, quoad morbi ideam, insulsum epilepticum, universalis, ac immensior tantum convulsio esse videtur, in qua scilicet spiritibus cerebri incolis primo irregulariter commotis, & velut confusis ceteri omnes *sympliciter* appendicem tum medullarem tum nervosam incolentes, simul motus convulsivos, live contractiones inordinatas incunt, easque aliquandiu cum crebris subultibus continuant: morbi accessio ut plurimum ex improvise aggreditur, ægrosque nihil tale cogitantes opprimit, atque ita oculi citius sensu & intellectu orbos, in terram præcipitat; quippè non tam cadunt, quam cum impetu quodam prosteruntur, ut sæpe pars primo in terram aut corpora adjacentia allisa livore aut vulnere afficiatur; prostratis supervenit stridor dentium, cum spuma oris, sæpe etiam capitis concussio, & crebra ad humum allisio; brachia & crura, quinimò cervix & dorsum aut statim rigida fiunt, aut variis flexionibus huc illuc distortentur; alique pedes immaniter contundunt, alii brachia & crura valide exerunt; eaque, ac totum aliquando corpus huc illuc impetiose jactant; plerisque autem præcordia & hypochondria, necnon totum inferior venter intumescunt, & valde inflantur: post aliquod tempus modo brevius modo longius hæc symptomata, quasi Tragedia peracta, de repente cessant, & tunc ægroti denovo ad se redeunt, ac mente constant; superstitie verò post paroxysmum capitis dolore, cum torpore, & hebetudine sensuum, & non raro vertigine & scotomia.

Paroxysmi epileptici repetere solent, quandoque statis temporibus diei, mensis, aut anni, ut plurimum verò iuxta majores anni ætates, aut lunæ, aut solis ætates vel aspectus oppositos certius redire, & gravius affligere solent: quandoque accessiones sunt incertæ, & vagæ, pro occasione & varietate causarum evidenti: sunt autem paroxysmi modo leviores, qui cito pertranscunt, ita ut ægroti vix in terram præcipitentur, nec ardentiori corripantur, modo graves sunt, quibus correpti plurium horarum spatio insensiles decumbunt, & velut Dæmoniaco, horrendis symptomatis torquentur: aliquando, licet rarius, signa quædam paroxysmi præ-



nuncia lapsuros commonefaciunt, ut sunt *capitis gravedo, oculorum cornuscatio, aurium tinnitus*: interdum in parte quadam exteriori, *brachio* nempe, aut *crure*, aut etiam in *dorso*, vel *hypochondriis* spasmus præcedit, qui exinde vitæ *aurefrigida ascendens* & versus caput perreptans, caducum interre videtur: Morbo huic, *pueri, & adolescentes*, magis quam maturæ ætatis homines, aut senes obnoxii reperiuntur: quicumque insultum ejus semel perpeffi sunt, nisi remediorum ope curantur, postea vix per totam vitam ejus labe prorsus immunes fiunt; paroxysmi quo sæpius repetunt eo graviores usque evadunt, qui cum frequenter iterati valde atroces existunt, *memoria, imaginationis, & rationis* usum, & dein totius functionis animalis robur ac vires enervant; donec hujus œconomia valde perverta, functio demum vitalis labascatur, & sensim aboleatur. Explicatis ad hunc modum hujus morbi telis, & apparatu malefico, jam proxime inquiramus in qua parte sedem hgat: live quod sit proximum ejus subjectum.

2. *Epilepsia accessio* & invasionis modus plane innuere videntur sedem ejus primariam, live partem præcipuè affectam alicubi intra caput contineri; quod autem *paroxysmus* nonnumquam in partibus remotis incipiat, & exinde versus caput ascendat, hoc quidem ita fieri videtur tantum, & ex accidenti contingit, cum interim causa morbifica circa ipsum *infulsum* subsistit (prout inferius declarabitur:) verum quod à primo morbi insultu statim *universa* cum membrorum & viscerum fere omnium contractionibus succedit, hoc manifesto indicio est, una totam *infulsum* compagem, & nervorum omnium origines à causa morbifica occupari; At verò etiamnum explicatu difficillimum videtur, ubi causa ista, live *materies morbifica* præcipuè subsistit; neque enim probabile est, eandem per cunctas cerebri partes diffundi, nec tamen constat in quo loco singulari ea defixa, ceteras omnes partes ita subito in ejusdem noxæ consensum trahat.

E variis super hac re Authorum sententiis, due præ cæteris magis probabiles videntur, & pari verisimilitudine assensum vendicant. Quorum una asserit *Cerebri medullam*, atque altera *meninges ipsum investientes* esse primariam *Epilepsie* sedem: Prioris ratio in hoc fundatur, quod ubi spirituum animalium fons, & ipsius animæ sensitivæ origo consistit, ibidem hujus morbi causa poni debet; nempe cum principes facultates primo læduntur, cæteræ omnes ejusdem noxæ facile participant: verum enim verò ut concedam in *Apoplexia*, & *spirituum deliquio* ita habere, at tamen in *convulsione* (cujusmodi affectus est *Epilepsia*) non sequitur *fibras & nervos* omnes convelli, quia *cerebri medullam* prius convellitur: quippè hoc cum sit mollis & fluidæ substantiæ, atque motus & sensus expertus, contractionis, live affectionis *spasmodica* minime capax videtur: quapropter alii *cerebrum* & quamvis ejus partem à morbo hujus culpa eximentes, causam ejus omnino in *meningibus* rejiciunt; asserentes scilicet *membranas cerebri investientes*, ac imprimis illarum *processus cerebri, ac cerebelli fissionibus instratos*, siquidem à materia morbifica vellicantur, *spasmos, sive convulsiones immanes* concipere; dein à *meningibus istis contra-*

*ctis & ductis una cerebrum inclusum* valde comprimere, & constringi, ita ut poris, & meatibus ejus contractis *universa* inferatur, simulque nervorum caudices, quibus utraque mentis appenditur, in consensum illarum perducti, etiam motus convulsivos incant: Et quidem ad hunc modum, *Epilepsie ratio formalis* torte explicabilis videtur; at vero cum rem altius perpendo, etiam ab hac sententia discedere viduum est, quia nimirum haud constat quo ritu, & quam ob causam, imminente caduco, *meninges ista spasmos* adeo horrendos concipiant. Quinimo nec liquet, quomodo ab istis, ut ut *convulsis, paroxysmus epilepticus* inducatur.

Quoad prius, impossibile videtur *meningibus*, quoad *totas earum concavitates*, ita contrahi, ut instar marsupii arctius contracti, contenta sua undique convellant, ac in spatium angustius contrahant: quippè dura mater pluribus in locis *calvaria* firmitissime cohæret; quin & isti pia mater, juxta *sinuum processus*, mutuo membranarum nexu, & ubique præterea vasorum continuitate colligatur: hunc facile patet, utramque *membranam*, quoad magnam sui partem, *immobilem esse*, ita ut *spasmos universales* nequaquam incant: quod vero ad *spasmos minores* attinet, ut cum *meningibus hujus, aut istius*, vel simul utriusque portio quædam convellitur, revera tales evenire concedimus: nam sæpius audiivi *cephalalgia* graviore affectos, de magna partium sub *calvaria latere*, modo *dextro*, modo *sinistro* consitarum *constrictione* immaniter queri, nec tamen exinde ullus *caduci insultus* sequebatur: porro ut *membranz istæ* insigniter laxæ vellicationes maximas subeant, haud propterea tamen *paroxysmus epilepticus* induci solet: Novi enim *abscessu* in dura matre excitato, & postea disrupto cum à pure foetidissimo *meninx tenuior*, & *cerebri cortex* exederentur, ægrotantem primo in *stuporem*, & demum in *Apoplexiam lethalem* incidisse; qui tamen in toto morbi decursu, *symptomate* quovis *epileptico* immunis degebat: Item memini *duram matrem*, *terebella* à Chirurgo imperito adhibita valde dilaceratam; in alio casu eam cum parte *calvariz* per vulnus abscissam, ut portio quædam *cerebri* extuberaret; nec tamen cuilibet horum *pathemata* quævis *epileptica* supervenerunt: Quapropter nec verisimile est, *sanguinem*, aut *humores*, vel (si quispiam ita contendat) *vapores meningibus istis inimpactos*, majorem noxam inferre, quam aut *plagam*, aut *vulnera* iisdem indicta, aut *sanem ibi suffusam*: præterea *Epilepsia leviori affectu*, siquidem vix concidunt, ac per totum morbi insultum adhuc animo constant, *membranas ita contrahi*, & *cerebri globum* arctius compingi perciperent, si ejusmodi quæpiam affectio subesset, verum illi è contra *cerebrum* quasi *inflantur*, & *spiritus* cum efferatione quadam *exilientes*, ac velut *explosos* persentiscere videntur.

Et quidem, uti verisimillimum, arbitror *paroxysmum epilepticum* à *spirituum animalium cerebri incolarum* (qui nempe sunt primum & immediatum hujus morbi subjectum) *subita quadam rarefactione, & explosione concitri*; quæ scilicet *cerebrum ipsum inflatur*, adeoque *insensibile* redditur, simulque *nervi appensi in convulsiones* aguntur; hinc enim verò contingit hujus morbi *accessio-*



accessionem ita derrepente incipere, & perfecte terminari, sine magna materia morbifica aut pro-  
vione, aut reliqua; quia nempe *labe* non tantum  
partibus solidis, quam ipsis spiritibus inferunt.

Supra ostendimus, quo ritu copula heterogenea  
& explosiva particulis, uti videtur, nitrosulphureis  
constans spirituum animalium particulis spirituo-  
salinis accrescens, ab hisque ob plenitudinem, aut  
irritationem denuo elisa & explosa, symptomata  
convulsiva producit: quamvis autem ejusmodi  
copula spasmodica, e sanguine in cerebrum primo  
extillatur; plerumque tamen spiritus ibi non  
prehendit, aut cum his saltem illic non diu hospita-  
tur: quin potius versus appendicem nervosam  
illico detrusa, spasmos particulares, & juxta loca  
affecta respectivos accersit: interdum vero, si-  
quidem materies spasmodica uberior & potens, atque  
cerebri constitutio imbecillis fuerit, copula hetero-  
genea spiritibus non tantum in nervoso genere, sed  
etiam intra ipsum *involucrum* constitit affixa, dia-  
beseos epilepticam infert; atque spirituum & copula  
istius particula explosiva ab invicem elisa caduci  
paroxysmum ciunt. Quandoquidem enim urgente  
epilepsie insultu *audacia* plerumque symptoma pri-  
mum, & certe patognomicum existit, intere licet  
spiritus animales intra ipsum cerebrum medullarum  
scatentes, aut alios affici; proindeque par-  
tem eam esse principalem morbi sedem: dein qua-  
tenus agrotantis casu, live in humum projectio,  
atque membrorum & viscerum spasmi *capillime*  
*audacia* illi succedunt, sequitur spiritus anima-  
les etiam systematis nervosi *involucrum*, eadem copula  
explosiva umbui, cumque ipsis cerebri *involucris* in  
consensum trahi: ab hisque ad explosiones pa-  
riter inordinatas excitari; licet aliquando (to-  
ta spirituum tum in cerebro, tum in nervoso genere  
constitorum serie, imitar longioris pulveris pyri tra-  
ctus, ad explosiones prædisposita) *spasmi* exteriorius  
& e longinquo, forsan in membro quodam, aut  
viscere incipiens, posterius in cerebrum traduca-  
tur, prout intra plenius ostendetur. Interim  
ipsius cerebri regio semper hujus morbi sedes prima-  
ria statuatur; atque pro affectus causa conjuncta  
supponere debemus, non aquam in cerebri *ventriculis*  
congelatam, nec humorem crassum, aut viscidum  
ejus poris & meatibus impactum, tales enim  
cause sensim gignerentur, & proinde signa qua-  
dam paroxysmi imminentis prænuntia ederent:  
porro accessione morbi finita, talis materia non  
ita brevi tempore penitus discuteretur; quin à  
reliquis ejus functionis animalis impedimenta  
quædam manerent, quod equidem in Epilepsia,  
nisi inveterata rarius contingit: attamen pro  
caduci insultu excitando, nihil minus suspicari li-  
cet, quam spiritus animales, qui intra medulla-  
rem cerebri substantiam scatentes, sensus interio-  
ris imaginationis, & appetitus actus perficiunt, co-  
pulam heterogeneam natos inordinate explodi, pro-  
indeque, istis extra ordines & stationes suas  
perturbatis, superiores regionis animalis fa-  
cultates eclipsin pati; dein ab hac majori spiri-  
tuum explosione, velut à fonte ignario, spiritus  
alios, appendicis medullaris, & nervosa hospites,  
etiam in explosiones prædispositos, similes *ad eam*  
concipere, pariterque explosos, corporum conti-  
nentium motus convulsivos ciere.

Quamvis enim cerebri medullarum semper esse  
primariam Epilepsie sedem & ab initio, fere tantum  
in illa regione, materiam morificam congeri

statuimus, tamen affectu ingravescente, hæc  
uberius in caput delata lines suos latius expli-  
cat, adeo ut particula spasmodica, & in reliquo ce-  
rebro, & insuper in appendice nervosa, tanquam  
pulveris pyrii, live seminis explosivi strata; huc  
illuc, longe lateque protensa jaciuntur; quo ne  
ut primo *audacia* insultui, convulsiones modo  
in his, modo in illis partibus; & non raro in  
toto corpore excitantur, superveniant.

Hæc de Epilepsie essentia, & causis in genere;  
jam proxime incumbit hujus morbi differentias  
neque non accidentium quorundam, & symptomatum  
ad eum pertinentium rationes explicare: quibus  
denum observationes, & agrotantium historiz  
cum medendi methodo subjungentur.

Epilepsia maxime notabilis differentia peti so-  
let à subjecto, nempe quod cerebrum, aut pars ejus  
in hoc morbo laborans, vel primario, ac idiopa-  
thetice, vel secundo ac non nisi per consensum  
cum aliis partibus afficitur: de priori specie hæ-  
tenus duxerimus: quoad alteram, in qua scilicet  
caduci insultus alicubi extra caput oritur: vi-  
sus, dein ipsum secundo & velut attritu aliunde  
inmisso corripit: observare est, ejusmodi affe-  
ctum (prout Galenus annotavit) vel à partibus  
exterioribus, aut interioribus procedere: plura equidem  
epilepticorum exempla occurrunt, in quibus pa-  
roxysmo ingruente, primo *spasmi* cum stupore  
in manus, aut pedis digito, aliove membro par-  
ticulari sentitur, qui ita exinde, velut cum  
fornicationis sensu verius caput prorepit, quod  
cui attigerit: illico agrotans in terram pro-  
stratus *audacia*, atque pathognomonicis ca-  
duci symptomatibus corripitur: nec minus ulitatum  
est istius morbi prædictum, & primam quasi  
velitationem, à stomacho, liene, utero, intestinis,  
genitalibus, aut aliis visceribus incipere imprimis  
nempe in istorum aliquo, perturbatio quædam  
cietur; dein ab eo loco, aura velut frigida in ca-  
put ascensus percipitur; cui statim affectioni,  
caduci accessus, cum horrendo symptomatum  
apparatu succedit: hinc vulgo creditur Epilep-  
sia *transmissa* in parte ita primario affici visa, de-  
hescere, atque noxam suam in cerebrum, ex  
se insens, propagare.

Verumenimvero super his dicendum esse vi-  
detur, in quavis Epilepsia causam non modo pro-  
catarrhicam, sed & conjunctam omnino in cerebro  
consistere; nempe spiritus hujus *involucrum* ad explo-  
dendum dispositos, ibidemque explosos, caducum  
omnem inferre. Quoad præliminaria isthæc in  
quibusdam epilepticis symptomata, ea interdum  
cause evidenter, nonnunquam vero tantum signi-  
ficationem habent: si quando enim diæthetici  
epileptici mala cujusdam visceris, puta stoma-  
chi, lienis, aut uteri dispositio accadat; quoties in  
viscere illo affecto, perturbatio quæpiam cietur,  
facile contingit, observantur illic *transmissionem*,  
aut *spasmi* in caput *continuationem*, in cerebro præ-  
disposito accessionem epilepticam excitari.

Attamen ejusmodi caduci symptomata, quæ ex-  
terioribus suscitata affectum cerebro propagare vi-  
dentur, non raro ipsius cerebri consensu oriuntur,  
& paroxysmi epileptici ingruentis, live spirituum  
in cerebro explodi incipientium tantum signa  
existunt: cum enim spiritus animales in cerebro  
& cerebelli medullis, simulque in medulla oblon-  
gata juxta nervorum origines constiti, copula  
heterogenea ita saturantur, ut ad ipsam eliden-  
dam,



dam, proindeque morbi insultum acciendum parati sint, priusquam illi una omnes conglobatum exploduntur, spiritus aliqui exterius in privatis quibusdam nervis scatentes, siquidem assueto superiorum influxu delituntur, mordinationes quidam concipiunt, proindeque spasmos incunt; qui spasmi (prout in ejusmodi affectibus saepe mos est) a nervorum extremitatibus hinc, vel illi membro, aut visceri insertis incipiunt, unde sensim ad eorum principia prorumpunt, quo cum pervenitur, illico spiritus per totum *syncope* prius in explosiones dispositi, ab eo spasmio commoti, proindeque tanquam fomite ignario correpti, subito eliduntur; adeoque epilepsiae paroxysmum per se prius incipientem, velut iecundario, & instinctu aliunde tradito excitare videntur: ad hunc modum aliquando passiones hystericae, cum ab imo ventre incipientes, & cerebro communicantur, a visceribus illis oriri, & eorum culpa suscitare creduntur; cum interim causa morifica circa nervorum origines potissimum subsistit, sicut alibi innuimus, & infra, cum de affectibus spasmodicis particulatim agemus, fusius ostendetur.

Restant plures aliae morbi comitialis differentiae; nempe quod sit vel hereditarius vel acquisitus; rursus utraque species varie distinguitur, ratione aetatis seu temporis quo primo ingruit, nempe cum prima accessio ante vel circa pubertatem vel post eam contingit; porro quoad morbi efficaciam, in fortem, & debilem, quatenus paroxysmi cum vel sine *amissionibus*, & casu fiunt, quoad morem ejus inordinatum, cujus insultus sunt vagi ac incerti; quinetiam juxta symptomata his, aut illis aegrotantibus, propter quandam temperamenti indolem, aut idiosyncrasiam peculiaris, multifariam discriminari solet.

Ceterum ex praemissis, symptomatum plurimorum quae in hoc morbo occurrunt, causae facile elucescunt, ut non opus sit ista omnia particulatim hic considerare: de nonnullis vero quae magis intricata videntur, non abs re fuerit in hoc loco differere.

In primis igitur hic lubet inquirere, cur hoc morbo laborantes non tam cadunt, prout Apoplectici, aut syncopen passi, sed potius cum impetu prosternuntur, inque terram, aliave corpora fortuito objecta, tanquam a spiritu quodam malefico dejecti alliduntur; ita ut saepissime aliqua capitis aut faciei pars praecasu violento laedatur: affectique haud secus ac Daemoniacus in Evangelio non raro in ignem, aut aquam precipitentur: Huc referre oportet, Epilepticos ejusmodi malis obnoxios fieri, eo quod, urgente paroxysmo, iis notitia omnis, siue providentia admittitur: ac insuper nervis capiti vicinis valide contractis, tota corporis moles in praecipitum corripitur: Nimirum in syncope, & Apoplexia corporis affecti casus videtur tanquam aedificii ruina, quae ob fulcimenta eius substracta contingit: at vero in caduco, non aliter res habet quam si domus a pulvere pyrio explosa subverteretur, quae ut plurimum extra locum in quo steterat dimovetur.

2. Epilepsiae symptoma maxime pathognomicum vulgo habetur, si affectus in terram prostratus, & convulsionem horrendam passus, saliva spumosa ex ore effluit; quae quidem a cerebro con-

stricto in palatum exprimi putatur. Verum enimvero ut concedatur hoc spumae effluviū saepe numero caduci signum esse; tamen illud non ita huic morbo appropriatur, quin idem in Apoplexia, in Caro, in affectibus hystericeis, aliisque convulsivis interdum accidit: Porro ejusmodi spuma haudquaquam a cerebro descendit, nullus enim per quem transeat meatus patet, verum a pulmonibus inflatis, ac usque ad laryngem elevatis, unde velut cum effervescentia quadam, & ebullitione saliva spumescit: urgente enim caduci paroxysmo, cum plerique nervi in toto corpore contrahuntur, etiam qui pulmonum & diaphragmatis motibus inserviunt spasmos immanes passi praecordia omnia sursum elevant, eaque in systole diuturna fere immobilia continent; ita nimirum ut pullus & respiratio vix, ac ne vix periciantur: interea quia sanguis intra cordis sinus coëctus ipsum distendit admodum, ac fere opprimit, pulmones utcumque impediti ac more solito & naturali moveantur, quod possunt tamen festinata & spissa agitatione, quoquo modo sanguinem e corde exantlare lutagunt; a quo ipsorum nisu, aer humiditatem viscosam crebra respiratione succutiens, ut agitur ovi albumen in spumam attollit, mox sursum in oris cavitatem elevat, & illinc ulterius foras propellit: quare saliva spumosa etiam in aliis affectibus ubi nervi pneumonici, aut contrahuntur, aut a functione sua obeunda inhibentur non raro succedit.

3. Porro ob eandem hanc rationem evenit, quod epileptici quidam in terram prostrati, pectora sua manibus gravissime tundunt, & cohiberi se aegre tolerant: nam cum praecordia spasmio affecta & praepedita movere se solito more non possint, sanguisque in iis stagnans, non sine insigni cordis gravamine, vix suffocationem minatur; tunc fit ut laborantes, cerebro licet inscio, mero naturae instinctu, thoracem percussant; nimirum ut praecordia ita concussa, & velut exagitata, motus suos redintegrent, adeoque sanguis a stagnatione, & cor a gravi oppressione vindicentur: Non absimili ritu hic fieri videtur, ac cum dormientes aut titillati, aut pulicum morfu vellicati, illico locum affectum insci confricant, aut se scalpunt.

Quod spectat ad morbi hujus prognosin, eam difficillimae curationis esse supra innuimus, quae quidem difficultas in eo consistit, quod cerebri medullarum (in quo spirituum animalium prima scaturigo & fons est) non tantum a causa morifica, sed insuper ab effectis ejus, nempe singulis paroxysmis plurimum debilitatur, ejusque pori laxantur, ut deinceps materiae cujusque heterogeneae incursum facillime pateant; adeoque ipsa diathesis morbida repetitis paroxysmis confirmata, atque radices altius agens aegrius tollatur. Verumtamen observare est, epilepsiam interdum sua sponte terminari, item aliquando medicamentorum ope profligari: quorum illud circa pubertatem, & tunc fere tantum contingit; adeo ut qui ista periodo elapsa, h. e. ante 25. aetatis annum minime curantur, vix unquam postea sanitatem recuperent. Nimirum circa pubertatem corpori humano duplex exterior, atque propterea morbi comitialis, aut alterius cujusvis altius radicati non raro solutio contingit: Nam primo, hoc tempore humor genitalis in vasis sper-



spermaticis congeri incipit; unde sequitur particulas spirituosas, quæque ipsis accrescere solent nitrosulphureas, & morbuicas non tantum in cerebrum, sed etiam in testes deponi: quare si heterogenea ista spirituum copula in novum hoc promptuarium uberius interatur, exinde cerebrum immixtus degens diathesin epilepticam aut alias morbidam non raro exerit. 2. Circa pubertatem, prout sanguis aliquid cerebro prius destinatum per arterias spermaticas genitalibus suffundit: sic etiam fermentum quoddam ab iisdem partibus per venas retributum accipit; scilicet particulæ quædam seminali tinctura imbutæ in massam sanguineam regeruntur, quæ ipsam vigorant, ac virtutem novam & vegetiorem inspirant; quare tunc temporis & corporis, & animi dotes se potissimum exerunt, pili erumpunt, vox magis sonora evadit, fœminis catamena fluunt, aliaque accidentia superveniunt, quibus liquido constat & sanguinem & succum nervosum quædam recenti imprægnari: quare fermenta, live semina morbuica nisi ab hoc novo fermento naturali superantur, deinceps sæpe usque in mortem indomita persistunt.

At verò Epilepsiam aliquando medicamentorum ope sanari experientia testatur: de medendi methodo, & remediorum maxime celeberrimum rationibus mox disquiremus; interim quod ad morbi huius prognosin ulterius spectat, si nec circa pubertatem desinit, neque medicamentorum usu profligari potest. diversimodum adhuc eventum in variis ægrotantibus sortitur: nam vel immediate in mortem terminatur, vel in alium morbum, scilicet paralytin, stupiditatem, aut melancholiam plerumque incurabilem commutatur.

Quoad prius, cum paroxysmi crebro repetunt, & qualibet vice atrociores fiunt, functio animalis brevi debilitatur: atque hinc labe in spiritus, & nervos præcordis inservientes sensim traducta, functio vitalis paulatim enervatur, donec tandem languente toto corpore, pulsusque imminuto, ac demum cessante, postremo flamma vitalis extinguatur.

Quod autem hic morbus non raro in paralytin, melancholiam, aut maniam desinit, ratio est, quia crebris spirituum animalium explosionibus cerebri tonus, & conformatio depravatur, ejusque naturalis status tandem ita pervertitur, ut particulis morbuicis etiam alius generis intus admissis spiritus ligantur, nec amplius in explosiones iusto procliviores sint; quin potius vitio interdum contrario superinducto ipsorum virtus elastica nimium deficit, ita ut supra modum hebetes & torpidi evadant; non secus ac intensiora febris incendia sanguinis intemperies iusto frigidior sæpe excipit: atque hæc quidem spirituum depressiones partim propria ipsorum culpa contingunt; quippe particulis agilioribus nimium explosis, legniores tantum supersunt, & deinceps suppeditantur; partim verò uti dicimus, cerebri vitio accidunt: eo quod pori & meatus ejus à crebris caduci paroxysmis usque adeò dilatantur & aperiantur, ut postea una cum succo nervoso, particulis quibusvis heterogeneis, & diversimode morbuicis aditus pateat.

Hæc de Epilepsia diagnosi, & prognosi; qui-

bus explicandis necesse erat rationes nonnullas abstrusas, & a communis pathologia diversas inducere: nec minus in morbi huius Ther. peia, à vulgari, inque aliis affectibus trita medendi methodo recedere cogimur: Enimvero dogmaticorum præscriptiones, quibus fere tantum per cathartica materiam morbuicam educere, ac penitus eradicare conantur, in caduco parum, aut nihil profunt, inò frequenter obesse solent. Novi quosdam insignes Practicos, omissa penitus intentionum Therapeuticarum serie, ad remedia quædam empirica, absque ulla totius provisione se recepisse: hujusmodi praxis, licet interdum feliciter succedat, ea tamen multo certius propositam curationem assequeretur, si per alia itidem pharmaca corpore rite præparato, impedimenta quævis summoventur.

Quare circa morbi comitialis medelam, indicationes (prout vulgo recensentur) erunt vel curatoria, quæ paroxysmum respiciunt, cumque vel ingruentem arcent, vel præteritum citius abigunt: vel prophylactica, quæ morbi causam spectant, quam si tollant in posterum accessiones ejus inhibentur.

Quantum ad priorem intentionem, evacuantia generalia vix locum habent, nec enim in paroxysmo vomitus, aut purgatio, atque raro admodum venæsectio adhiberi debent; si enim diutius persistat, enemata interdum usui esse solent; id verò quod potissimum incumbit est spiritus animales nimis efferos & volatiles ligere, necnon eorum explosiones inceptas suppressere: in quos fines duo remediorum genera præcipue conducunt: scil. primo quæ spiritus animales efferrari & exilire aptos reprimunt, & velut suffitu quodam his ingrato repellunt, inque ordines suos cogunt: quod equidem medicamenta sale volatili, & ammoniaco, aut etiam sulphure vitriolico prædita efficiunt; cuiusmodi sunt sal, & oleum succini, spir. sanguinis, Cornu Cervi, fuliginis, tinctura Castorei, & similia; hæc enim intus sumpta, aut naribus admota, sæpe levamen conferunt, quin & malos huius morbi spiritus non secus ac apud lobitum fumus è felle piscis combusto dæmonem abigere creduntur. Secundo spiritus animales ab explosionibus ineundis avocantur, aut inhibentur, cum illi in opera quædam ipsis assueti alliciuntur, & occupati tenentur: quapropter urgente paroxysmo frictions per totum corpus adhibita, & aliquandiu continuata sæpe juvant: quod autem nonnulli affectos erigunt, eorum brachia & crura à motu convulsivo penitus colubent, vel in hoc, vel illo situ constringunt, porro quod sternutatoria naribus instant, & cardiaca fortiora ori ingerunt, aut cucurbitulas, & scarificationes adhibent, aliisque administrationum modis caducos asperius tractant, & paroxysmi morem interturbant: hujusmodi inquam praxis sæpissime perperam instituitur; quoniam hoc modo duplex natura molestia, alia nimirum à morbo, aliaque non levior ab assistantibus & ministris intentatur; cum longe præstiterat paroxysmo juxta morem suum transire permisso, laborantes unica tantum plaga absolvi.

Profecto maxima Medici cura & remediorum efficacia circa morbi huius prophylaxin versatur, ut causa ejus sublata, seu radice præcisa, fructus omnes emarcescant: Medicamenta



huic indicationi requisita plures intentiones respiciunt: quæ tamen ad duo hæc præcipua capita reduci possint: scilicet primo ut morbi fontes immediate a sanguine vitioso, aut succo nervoso, atque mediatus a visceribus, primisque viis suppeditatus præcidatur; dein secundo ut mala cerebri & spirituum ejus incolarum diathesis, quæ nempe Epilepsiz peculiaris est, tollatur.

Quoad prius indicatum, hic vomitoria, & purgantia, aliaque tum evacuantia, tum alterantia, quinimo phlebotomia, & cauteria locum habent; quatenus nimirum hisce modis ac viis & viscerum, & humorum impuritates subducuntur, ac discrasie emendantur, quanquam enim hujusmodi pharmaca, & administrationes medicæ per se raro aut nunquam Epilepsiam faciunt, attamen hæc impedimenta tollunt, naturam erigunt, atque ad hostem suum aggrediendum incitant, etiam vias præparant ut propterea remedia specifica certius & efficacius virtutes suas exerant; quare solenne est dum morbi hujus cura, per secreta & arcana peragitur, Vere, & Autumno, aliisque idoneis temporibus ejusmodi medicamentorum usus intercalare.

2. Quod spectat ad remedia specifica; quæ quidem sola, licet non semper, Epilepsiz causam attingere, eamque expugnare perhibentur, ejusmodi sunt Præonia mas, viscus quercinus, Ruta, Castoreum, ungula Aleis, præparata e cranio humano, succino, corallio cum multis aliis: quandoquidem hæc sine quavis sensibili evacuatione, aut etiam perturbatione in visceribus aut humoribus subsequente assumuntur, mirum est quæ ratione formali, aut agendi virtute in hoc morbo uspiam juvare solent.

Super hac re intricata satis & obscura, si quis conjecturæ locus sit, cum Epilepsiz procataxin in copula heterogenea spiritibus cerebri incolis accrescente, eoque ad explosiones præternaturales incitante consistere superius asseruimus; sequetur ea quæ talem causam expugnant, aut tollunt, ejus naturæ esse ut cerebrum corroborando, ejusque poros constringendo copulam istam excludant, spiritusque intra cerebri medullium scatentes eorum copulam exuendo ita figant & quasi coarctent, ut non amplius in explosiones irregulares apti & proclives fuerint; simili forsan ritu ac cum pulvis ~~zosteris~~ cum sulphure tritus, aut spiritu vitrioli irroratus, virtutem suam fulminantem amittit. Et revera hujusmodi proprietates, nempe alteram, aut simul utramque in plerisque remediis ant-epilepticis suspicari, imò aliquatenus detegere licebit: enimverò præonia, viscus quercinus, ruta, lilium convallium, cum multis aliis manifesta quadam astrictione pollent; ut verisimile sit eorum particulas intus sumptas, adeoque sanguinis, aut succi nervosi vehiculo ad cerebrum delatas, poros ejus nimis laxos & apertos ita constringere & occludere, ut in posterum materiam morbificæ aditui minime pateant: porro quoniam hæc concreta ~~zosteris~~, quasi ammoniacam, sive dissipativam spirant, idcirco eadem spiritus animales depurare, & copula heterogenea exutos figere, & corroborare dicuntur: hæc virtus spirituum depurativa a sale armoniaco procedens in remediis quæ

ex mineralium, & animalium familiis petuntur; qualia sunt cranii humani, sanguinis, succini, & coralli præparata, magis elucescit; sicut alia adstrictiora in vegetabilium partibus & præparatis potior exiit.

Non erit hic opus Epilepsia curanda completam medendi methodum, cum exactis præscriptionum formulis proponere, quia apud Authores & generalia præcepta, & elegantissima remedia passim extant, prudensque Medicus tum indicationes, tum uberem istum rei pharmaceuticæ apparatus ad particulares ægrotantium casus facile accommodabit. Verum quia morbi hujus theoriam hoc in loco plane novam exhibemus, etiam methodus Therapeutica eidem adaptata, hic tradi debet: quam equidem mox plenius adumbrabimus: postquam casus aliquor, sive historias Epilepsia laborantium descripsimus.

Puella venusta parentibus mediocriter sanis orta, ipsaque ad pubertatem usque bene valens, sub id tempus de capite male affecto queri cæpit: Et primo per vices quasdam vertiginem juxta synciput, quæ omnia circummagi videbantur perpessa est; simulque dum illud symptoma urgeret, mox delire loqui, & quicquid modo egerat oblivisci solebat: hujusmodi paroxysmi primo intra horæ quadrantem transire, & semel tantum aut bis in mense reperere, quorum intervallis satis rectè habuit: postea insultus sensim graviores facti, etiam sæpius redibant, atque intra sesquiannum, cerebro indies magis labefactato vertiginosus iste affectus plane in Epilepsiam mutabatur, ut ægrotans quovis paroxysmo in terram alissa, ~~convulsio~~ & convulsionibus horrendis, ore etiam spuma disfluente, afficeretur. Observabant domestici eam semper in idem latus præcipitari, ita ut juxta focum sedens, si angulum dextrum occuparet in medios ignes, sin vero sinistrum, in murum a tergo positum alideretur: semel cum sola in ædibus relicta supra carbones accensos corrueret, facies ei & synciput ita misere concremata sunt, ut cranio, cute & carne denudato, eschara lata & profunda inureretur: & postea exterior tabula ejus ad palmæ magnitudinem decideret. Ægrotata interim quamdiu ulcera ab ustione contracta sanie manabant paroxysmis caruit; postquam ea sanabantur caducus redit: Morbus hic comitialis circa pubertatem primo emicuit, nam puellæ statim ab initio ægrotudinis catamenia fluere cœperunt, & postea statas periodos ordinate satis observabant, affectu licet indies in pejus evecto: Varia medicamentorum genera huic ægrotanti adhibita nihil profuere, quoniam ipsius & amicorum ejus mos & studium fuit cum medicum, tum medicinæ methodum, siquidem iis felix eventus non statim successit, subinde mutare, seque ad empiricos quosvis, & ægyrtas circumforaneos ut plurimum recipere.

Quod in hoc casu affectus vertiginosus cum brevi delirio Epilepsiz prænuncius fuerat, plane arguit hujus morbi originem in cerebri medullio consistam, a spiritu inordinatione quadam pendere: nimirum illi ibidem scatentes, ab initio copulam heterogeneam admittente cœperant; quæ plenius aggelta aut sponte sua, aut occasionibus commota dum excutere-tur, ob spiritus perturbatos, necdum vero valde



explosos, priores istos affectus inducebat: postea cum ab eadem causa sentium in defectus evecta, spirituum perturbationes in ipsorum manifestas explosiones assurgerent, vertigo, & delirium in Epilepsiam migrabant.

Quod vero hæc puella circa pubertatem ægrotare cœperit, hinc plane sequitur uti fermenta naturalia, sic interdum præternaturalia eo tempore sese primo explicare; quare sicut purgationes menstruarum tunc primo erupere, ita morbi comitialis semina, sive innata, sive acquisita tunc paululum germinare, & sensim in fructus maturari contigit: cum fermentum præternaturale prius emicuit, non raro naturale succedens ipsum delet, hinc Epilepsia impuberis non raro circa pubertatem terminatur; si fermentum illud, sive *placens menses* fluxu menstruo posterius, aut cum eo simul in actum emergens non statim succumbit, postea ut plurimum ex se indomitum, & remediis quibuscumque insuperabile durante vita persistat.

Ex observatione ista, quod huic ægrotanti cauteria accidentaliter, & casu excitata à morbi insultibus immunitatem præstitere; interre liceat fontanellas in Epilepsie curatione utiliter adhiberi: ubicunque enim pro latice seroso, tum e sanguine, tum succo nervoso constanter educendo, emissarium aperitur, illac plures particulae heterogeneæ, ac morbificæ una effluunt, propterea ut cerebrum immuniùs persistat.

Filia Cerevisiarii Oxoniensis à prima infantia catarrho in oculos decumbenti graviter obnoxia fuerat, alias satis sana & robusta; item duris laboribus quotidie assueta degebat; circa 14. ætatis annum paroxysmis epilepticis tentari cœpit, quorum plures juxta majores lunc *tempora* præcipue redeuntes perpessa est: ut curationem ejus moliar rogatus, vomitorium ex præcipitato solari exhibui, & idem triduo ante quavis novi & plenilunii iterandum consului; insuper ut qualibet vice per quatrimum à vomitorio assumpto bis in die caperet pulv. rad. Prœniz maris ʒj. cum haustu aq. cerasor. nigr. His remediis paroxysmi tandem intermittebant ut morbus sanari videretur. Posthæc cum iterum redibant eorundem medicamentorum usu de novo recuperabatur; & dein fluxu menstruo erumpente, & periodos suas rite observante, in posterum à morbo isto immunis persistit.

#### Methodus Therapeutica.

In curatione Epilepsie à Catharsi incipiendum esse duco; & si æger vomitionem facile toleraverit, Emeticum imprimis exhibeatur; & per plures menses quatrimum ante plenilunium repetatur. Infantibus, & pueris vinum scilliticum, oleo amygdalarum dul. recenti admixtum, aut etiam sal vitrioli à ʒss. ad ʒj. exhibeatur: Adultioribus & constitutione robusta præditis sequentes medicamentorum formulæ præscribantur.

℞. Croci metallor. aut Mercurii vitæ gr. iv. ad vi. Mercurii dulcis gr. 16. ad ʒj. simul terantur in marmore, misce cum pulpa pomi cocti, aut conservæ Boraginis ʒj. f. Bolus. Vel exhibeatur infusio croci metallor., aut Mercurii vitæ in vino Hispanico facta ad ʒss. ad ʒij.

Vel ℞. Tartari emetici Mynsicht. gr. iv. ad vi. Qui tenerioris sunt constitutionis sumant

salis vitrioli ʒj. ad ʒss. & post horæ s. superbibant plures libras lactis cerevisiati: dein, penina, aut digito gutturi indito, vomitus provocetur, & aliquoties iteretur.

Die sequente vomitorium, nisi aliquid contra indicet, mittatur sanguis e brachio, vel e venis hæmorrhoidalibus hirudinum suctu: dein postridie sumatur medicamentum purgans; quod postea quatrimum ante novilunium constanti vice repetatur.

℞. Resin. Jalap. ʒss. Mercurii dulc. ʒj. Castorei gr. ij. Conservæ flor. Prœniz ʒj. f. Bolus.

℞. Pilul. fortid. Majorum ʒij. Resin. Jalap. gr. v. Ammoniaci solut. in aqu. hysterice q. s. f. Pilul. v.

℞. Fibrat. Hellebor. nigr. in acet. macerat. exiccat. & pulv. ʒss. Zinziberis ʒss. salis Absinth. gr. xii. Olei succini gutt. ij. f. pulvis. Detur in pulpa pomi cocti.

℞. Pulveris hermodactylor. composit. ʒj. Cramii humani præparat. gr. vi. f. pulvis, detur in haustu decoct. hyssop. aut salvia.

In diebus quibus à purgatione vacat, præsertim circa lunationum tempora, mane, & vespere exhibeantur remedia specifica, quæ virtute quadam secreta & innata hunc morbum curare dicuntur: horum immensa extat sylva, eaque variis compositionum formulis præscribuntur.

Medicamenta simplicissima, quæq; experientia valde efficacia fuisse comprobavit, sunt radix Prœniz maris, & semina ejusdem.

℞. Rad. Prœniz maris secat. & pulv. ʒj. ad ij. vel iij. detur bis in die in tinctura sequenti.

℞. Folior. visci qu. ʒij. Rad. Prœniz incis. ʒss. Castorei ʒj. Ponantur in vase clauso cum aq. Betonice, vel Prœniz simpl. & vini albi ana lbj. salis visci quercini vel communis ʒij. digerantur in vase clauso calore arenæ per duos dies, capiat ʒij. cum dosi pulv. præscript.

Panperes sumant pulverem prædict. in decoct. hyssopi, aut castorei in aq. fontan. & vino albo facto.

Eodem tempore radix Prœniz in taleolas discissa, & filo transfixa collo suspendatur. Etiam radices sartagine fixæ, aut ad teneritudinem coctæ, inter esculentia quotidie assumantur.

℞. Rad. & sem. Prœniz maris ana ʒij. Visci qu. ungulæ Alcis ana ʒj. incis. & contus. in sindonem raram insuantur, f. sacculus, qui super ventriculi scrobem gestetur.

Inter specifica hic pulvis à multis Authoribus valde commendatur.

℞. Castorei, Opoponacis, sanguinis Draconis, Antimonii, sem. Prœniz ana f. Pulvis, sumatur ʒss. ad ʒj. omni mane cum vino, aut decocto appropriato, aut cum aqua cerasor. nigror.

℞. Cramii humani præparat. ʒj. visci qu. Cinnabaris factitiæ, ungulæ alcis an. ʒss. misce. Dosis ʒss. ad ʒj.

Si formula pulveris cuiuspiam ingrata sit, vel si diuturnior ejus usus tardio fuerit, Elestuaria, pilulæ, trochisci, spiritus, & Elixires, quæ singula medicamentis specificis constant, præscribi solent.

℞. Conserv. flor. Prœniz maris, Lilior. convallis



vallis ana  $\mathfrak{z}$  iij. sem. & rad. Pzonix maris pulv. ana  $\mathfrak{z}$  ij. Corallii præp.  $\mathfrak{z}$  j. Margarit. pulv. Cranii humani præpar. ana  $\mathfrak{z}$  ij. salis visci quercini  $\mathfrak{z}$  ss. cum f. q. syr. e. Corallii, f. Electuarium; capiat mane & vespri qu. Nucis Moschat.

℞. Rad. Pzonix maris pulv.  $\mathfrak{z}$  j. seminum ejusdem  $\mathfrak{z}$  ss. visci qu. ungulae Alcis, Cranii humani præp. ana  $\mathfrak{z}$  ij. rad. Angelicæ, contrayervæ, serpentariæ virginianæ ana  $\mathfrak{z}$  j. succini albißimi, Corallii calcinat. ana  $\mathfrak{z}$  j. salis visci communis  $\mathfrak{z}$  ij. sacchari candi in f. q. aquæ anti-epilepticæ Langii solut.  $\mathfrak{z}$  viij. f. confectio, capiat bis in die qu. Nucis Moschat.

Pulveres isti addito sale succini, & Cornu Cervi cum f. q. Balsami Capiv. formentur in massam pilularem, cujus sumantur 3. vel 4. pilulæ mane, & vespri, superbibendo haustum liquoris appropriati.

Vel paretur hujusmodi Elixiris, cujus gutt. 8. ad 10. sumantur bis in die in cochleari Julapii appropriat. superbibendo parum ejusdem.

℞. Vitrioli Hungarici lb. vj. destillentur in retorta vitrea calore arenæ per horas 24. dein retorta eadem loricata cum recipiente amplo ponatur in furno reverberi, ut spiritus acidi igni fortissimo, quousque exhibuit, urgeantur. Liqueor totus extillatus in retorta minori vitrea calore arenæ avocetur, & in matraccio superaffundatur rad. Pzonix maris in taleolas sciss. & exiccatur.  $\mathfrak{z}$  iv. sem. ejusdem  $\mathfrak{z}$  j. Cranii humani præpar. Ungul. Alcis, coral. rubr. ana  $\mathfrak{z}$  ss. visci qu.  $\mathfrak{z}$  ij. digeratur leni calore per plures dies ad tincturæ extractionem: liqueor decantatus avocetur in retorta vitrea ad tertiæ partis remanentiam; extillatus seorsim asservetur: remanentia isti assunde spir. vini rectificatiss. & eorundem ingredientium infusione imprægnati parem qu. & digeratur per 6. dies in fimo equino f. Elixir cujus dosis  $\mathfrak{z}$  ss. ad  $\mathfrak{z}$  j. Liqueor extillatus detur à cochleari  $\mathfrak{z}$ . ad integrum propter easdem intentiones.

Vel paretur oleum ex sale Veneris juxta præscriptum apud Henricum ab Heers, & exhibeatur modo descripto.

Inter remedia specifica quæ (cum superiora non fuerint proficua) etiam tentari debent, habentur ranarum hepata, vesica apri, cum urina exiccata. Rad. Bryonix pul. pul. cuculi, corvorum, coagulum, & pulmo leporis, hepar lupi, lapilli hirundinibus exempti, milvi jecur, ova corvorum inter alimenta, & medicamenta quotidie assumenda, cum multis aliis, quorum catalogus insignis apud Henricum à Bra Medicum Zutphaniensem extat, & e quibus præscripta pro pauperibus, utpote facile, & sine magno pretio parabilia delumi poterunt.

Dum hujusmodi remedia juxta methodum prædictam intus sumuntur, administrationes quædam exterius adhibere opem contribuunt, & in curationis partem merito asciscuntur; quare semper in hoc morbo fontanella, scilicet una aut altera in locis idoneis excitentur, etiam vesicatoria sæpius adhibeantur.

Periapta collo suspensa, aut super ventriculi scrobem gestata, ului esse putantur: radices Pzonix recentes in taleolas scissæ, & filo transfixæ in bracteolas formentur quæ toti collo circumdantur; quamprimum exaruerint substituantur novæ, illæque in pulverem intus sumendum redigantur.

℞. Rad. & sem. Pzonix ana  $\mathfrak{z}$  ij. ungulae Alcis, cranii humani præpar. ana  $\mathfrak{z}$  j. visci qu.  $\mathfrak{z}$  ss. grosse pulv. in sericum rubrum insuantur & f. sacculus collo suspendendus.

Analeptum ex trutice sambuci in salice inventi valde commendatur.

Convenit nonnullis capillitio de rasso Emplastrum sincipiti applicari.

℞. Rad. & sem. Pzonix, Castorei, visci quercini, cranii humani tenuissime pulv. ana  $\mathfrak{z}$  j. Emplastri de betonica  $\mathfrak{z}$  ij. carannæ, Tacamahacæ ana  $\mathfrak{z}$  ij. Balsami Capiv. q. f. f. massa, extendatur super alutam. f. Emplastrum pro futuris capitis.

Tempora & nares sæpius inungantur oleo succini per se, vel cum oleo Capiv. admixto.

Sternutatoria, & Apophlegmatismi horis matutinis quotidiano sint in usu.

℞. Ellebori albi  $\mathfrak{z}$  j. Castorei, Euphorbii ana  $\mathfrak{z}$  ss. Majoranæ odorat. fol. Rut. ana  $\mathfrak{z}$  ij. f. pulv. Decoct. salviæ vel hyssopi cum confectioe sinapios in eo solut. ore, & gutture obvolvatur.

Enemata juxta usus exigentiam quandoque injiciantur.

Quandoquidem medicamenta solidiora liquidis interdum dilui, aut hæc illis superbibi debent, in hanc rem præsto sint Aquæ destillatæ, Julapia, decocta, aut tincturæ, quæ virtute quadam contra hunc morbum specifica prædita sunt.

℞. Vitrioli Hungarici lb. iv. cranii humani recentis pulv.  $\mathfrak{z}$  iv. Rad. Pzonix incis.  $\mathfrak{z}$  vj. simul contulis in mortario assunde vini Hispanici, vel albi tenuioris, vel vini è succo Cerasorum nigrorum in dolio fermentato lbj. destillentur in retorta vitrea calore arenæ.

℞. Resuræ ligni Buxi, Vitrioli Hungarici ana lbj. folior. visci qu. vel communis M. iij. folior. Rotæ M. ij. simul contulis assunde vini Hispani lb. iv. Destillentur in cucurbita vitrea calore arenæ.

℞. Vitrioli com. lb. vj. rad. Pzonix maris  $\mathfrak{z}$  vj. visci qu.  $\mathfrak{z}$  j. Juglandum viridum  $\mathfrak{z}$  viij. incis. & contul. destillentur in olla vitreata, alembico vitreo superimposito in calore arenæ.

℞. Hujus liqueoris lbj. Aqu. Cerasor. nigr. flor. Tiliz ana lb. ss. sacchari albißimi  $\mathfrak{z}$  iv. misce, f. Julapium: dosis  $\mathfrak{z}$  ij. ad iij. bis vel ter in die.

Oxymel scilliticum, item hydromel cum hyssopo incocto ab antiquis plurimum laudantur. Vel hujusmodi Apozema paretur cujus sumantur  $\mathfrak{z}$  iv. ad vi. vel v. ii. bis in die.

℞. Rad. Pzonix maris, Angelicæ, Imperatoris, Valerianæ ana  $\mathfrak{z}$  vj. folior. Betonicæ, Salviæ, Lili convallis, pulegii ana M. j. sem. Rut. Nigellæ ana  $\mathfrak{z}$  iij. Pzonix  $\mathfrak{z}$  ss. Passular.  $\mathfrak{z}$  iij. Liquiritiæ  $\mathfrak{z}$  ss. incis. & contul. coquantur in aqua fontan. lb. vj. ad tertiæ partis consumptionem. Circa finem adde vini Cerasor. nigror. lbj. vel  $\mathfrak{z}$  x. f. colatura, quæ servetur in vasis oclulis. Dos is  $\mathfrak{z}$  vi. ad viii. bis in die post remedia superius præscripta.

Vel prædicta ingredientia exceptis liquiritia, & passulis coquantur in hydromelitis lb. vi. ad consumptionem tertiæ partis: dos is  $\mathfrak{z}$  iv. ad vj.

Quod si prædicta methodus, cathartico. & specificor. usu constans, aliquandiu tentata prorsus incassum cedit, ad alius generis remedia,



dia, & præsertim ad illa quæ magna dicuntur, devenire oportebit: In hoc centu diaphoretica, salivantia, Theriaca, & Acidula ponuntur.

Alphonſus Læternus plurimos epilepticos, simplici Guajaci decocto bis in die ad ʒvi. vel viii. præſcripto; ejuſque decocto ſecundario, vice potus ordinarii (prout in lue venerea allolet) aſſumpto, ſe curatſe aſſeruat ſi tali decocto radi. Proximæ aliæque ſpecifica addantur forſan efficaſior fuerit. Probabile videtur ſalivationem à Mercurio potenter excitatam, ſuccedente poſtea diata ſudoriſera, hunc morbum certiffime eſſe curaturam. Quid Theriæ aut acidulæ poſſint, aut propria aut aliorum experientia, mihi nondum innotuit. Experiat forſan aliquando quid acidulæ noſtræ artiſciales, ſcilicet cum ferro, tum Antimonio imprægnatæ per plures dies in magna quantitate aſſumptæ, circa Epilepſiæ curationem valebunt.

Post Epilepſiam, velut principem Spasmodum in principio loco, ſcilicet intra cerebri medullia excitatum, ceteræ Convulſionum ſpecies ordine pertractandæ occurrunt. Harum differentia a duplici cauſarum genere & variis utriuſque modis, & accidentibus optime deſumuntur. Supra oſtendimus affectiones quæſcunque ſpaſmodicas vel a mera ſpiritus irritatione, vel ab eorum, propter copulæ elatiæ adhæſum, exploſione, vel ſimul ab utroque conjunctim profluere: Quapropter multiplices ſpaſmorum ideæ diſtingui, ac in claſſes quaſdam diſtribui poſſunt, prout hanc illamve, aut ſimul utramque cauſam in variis *ſymptomata* vel appendicis nervoſæ locis conſiſtere contingit. Eumvero materies ſpaſmodica, ſive ſpiritus copula exploſiva poſſimum, ac ſæpius, per cerebrum, interdum vero & aliquatenus per nervorum extremitates aditum inveniens, aut circa nervorum origines, aut medios proceſſus, aut fines extimos ſubſiſtit, vel in totis eorum ductibus ſcaturit, prout inferius ſpeciatiim declarabitur: porro irritatio per ſe, vel cum procataxi prævia convulſiones cieus, licet ubivis in nervoſo genere fiat: præcipue tamen, ac frequentius talem effectum circa nervorum principia, medios proceſſus, & plexus, aut fines producit. Cæterum ejuſdem generis cauſa, & effectus alio ritu in infantibus, ac pueris, alioque in adoleſcentibus & adultioribus habent. Cum itaque ſingulas convulſionum ſpecies particulatim conſiderare ſtatutum fuerit, imprimis de motibus Convulſivis infantum ac puerorum diſſertemus.

Infantes, & pueros affectibus ſpaſmodicis tentari paſſim, & tam frequenter accidit, ut hæc præcipua, & fere unica convulſionum ſpecies ſtatuatur; non enim ejuſmodi ſymptomata in adultis aliis inſignuntur nominibus, atque ad Epilepſiam, paſſiones hyſtericam, hypochondriacam, colicam aut etiam ad ſcorbutum referri ſolent; in pueris vero quaſi *motus convulſivi* appellantur.

Super his obſervare eſt, circa duo poſſimum tempora pueros convulſionibus maxime obnoxios reperiri, ſcilicet intra primum à partu menſem, & circa dentium eruptiones: Quamquam huius morbi inſultus etiam aliis temporibus, & quibuſdam aliis de cauſis non raro eveniant.

Primo igitur ſæpenumero accidit infantulos recens natos, aut ſaltem nondum bimeltres, crebra vice ſpaſmis in diverſis partibus excitatis affici. Quippe oculorum inverſiones, genarum, & labiorum diſtortiones, aut tremores, quummo tendinum contractiones, membrorum, & non raro totius corporis ſubſultus, & concuſſiones ſubitæ eos inſeſtant, eundemque affectum etiam præcordia nonnunquam afficere hinc ſat plane liquet, quod dum ſpaſmi ritus & membra exteriora occupant, etiam à ſanguine in corde, & pulmonibus una contractis ita gaunte, tacies modo pallorem, modo livorem contrahut. Cum itaque in pueris ſpaſmi tres corporis regiones inſeſtare ſoleant; nempe capitis & faciei partes, membra, & artus exteriores, atque præcordia & viſcera; obſervamus modo has, modo illas, modo binas, aut ſimul omnes regiones a cauſa morbitica occupari, nempe prout eadem aut circa nervorum origines aut extremitates deſigitur; & cum prius horum accidit, prout medulla oblongatæ pars ſuperior, media, aut minima ſpinalis, ſcilicet unica aut plures ſimul a cauſa morbitica impetuntur.

Quod verò ſpectat ad ceteras huius affectus cauſas, nempe procataxicas, & evidentes; quæ prioris generis ſunt, in his duobus præcipue conſiſtunt primo quod infantibus *nata* & *ſymptomata* valde ſunt imbecilla, & viſcoſa humiditate ſcateant; nempe cerebrum minus firmum, atque nervorum tonus valde laxus, ne leviores quidem cujuſvis materiæ impetus ſultinere poſſint, quin ſpiritus eorum incolæ, etiam à proprio, quo illæ partes irrigantur, liquore, paululum modo immoderatio affluxerit, ut ſaltem copioſior quam pro tantilli roboris modulo, facile in motus irregulares, ſive ſpaſmos incitantur. Attamen ſecundo quoniam obſervatione conſtat, puerulos nec ſolos, nec omnes qui tenuioris ſunt conſtitutionis in hunc morbum proclives reperiri; idcirco pro potiore procataxi eos morbidæ ratione haberi debet, quod infantibus quibuſdam, propter mala ab utero contracta, & ſanguis, & ſuccus nervoſus originaliter vitioſi exiſtunt: quippe recens natis maſſa ſanguinea per plures retro menſes eventilatione carens impurior evadit; quapropter plerique infantibus brevi à partu effloſcentia latæ, & rubicundæ morbillorum inſtar per totam cutem erumpunt; cujuſmodi *ſymptomata* ſi impeditur, aut reprimatur, ſæpenumero aphthæ periculofæ circa oris partes ſuccedunt. Hinc merito ſuſpicamur tales ſanguinis impuritates quandoque in cerebrum & nervoſum genus, utpote debiliora ſuſſundi, & propterea ſpaſmodicas affectiones oriri; nempe dum ſanguis ab utero vitioſus exiſtens depurare ſe ſtatagit, ſæculentias ſuas, effloſcentia in cutem facta exterminari ſolitas, in caput transfert: quare latex modo tenuis & ſeroſus, modo craſſior & viſcidus, ac uterque ſalium & ſulphurum præternaturalium particeps intra hos, aut illos cerebri, cerebelli, atque medullæ oblongatæ reſſus, & cavitates deponuntur, cujuſmodi recrementa cum nervi huius aut illius, ac interdum una plurium origines, aut caudices obſident, ſpiritibus eorum incolis particulas heterogeneas, atque in exploſiones ſpaſmodicas aptas.



aptas affigunt. Quamprimum enim nervi tales particulas altius imbibebunt, spiritus eorum copulati onuli, aut ipsoe sua, aut à causis evidentibus incitati, eam elidere, & excutere fatigant: proindeque explosiones spasmodicas ineunt.

Causæ evidentes, quæ in puerulis prædispositis motus convulsivos inferunt, sunt bini generis, scilicet primo quæcumque sanguinis effervescencias solito majores erant, uti sunt fragoris & caloris excessus, nutritio uberior, aut julto calidior; aeris, ac aere nautationes, ac imprimis lunationum periodi: etenim propter has, aliasque similes occasiones sanguis plus debito effervescens copulam heterogeneam spiritibus utique ad plenitudinem citius affigit: utque ab ipsis perturbatis e vestigio elidatur & explodatur, efficit. Secundo, irritatio fere in qualibet systematis nervosi parte dispositionem spasmodicam non raro in actum deducit: quare non modo qualitatem tangibilium excensus exterius insitum, verum & ac in ventriculo coagulatum, bilis, aliique humores acres, aut etiam vermes intestini vellicantes ipsos excitare solent: porro in quomodocumque causa evidentes, siquidem fortiores sunt, aliquando per se, absque diutius præiis, affectus spasmodicos inducunt; quippe tumidrici, forte & acres humores puerulis quibusvis, saltem tenerioribus motus convulsivos inferunt.

Quo certius atque ad sensum pateret cujusmodi in motibus convulsivis sit materies morbifica, plurimum quos hic morbus oppressit, defunctorum cadavera aperui: causam intra coctionis viscera & primas vias semper frustra quæsi. Multorum capitibus latex serosus intra cavitatem cerebello subjectam congelitus, & membranam, qua medulla oblongata investitur distendens, nervorum origines inundabat: in quibusdam nulla hujus morbi vestigia apparebant: adeo quod spiritibus accrescens, eos ad explosiones irritat: interdum imperceptibili prorsus constat mole, & originem tam occultam habet, ut vel perspicacissimum visus scrutinium on nino lateat. Olim in hac urbe cujusdam mulieris nati plures ex hoc morbo interierunt; tandem foetus quarti intra mensem, uti priores, interempti caput dissecuimus; nulla hic serosa colluvies ventriculos inundabat, sed cerebri tantum, ejusque appendicis substantia erat julto humidior, & laxior: quod potissimum observatu dignum erat, in cavitate quæ cerebello subiecitur, supra medullæ oblongatæ caudicem, sanguis grumosi, & velut coacti copiam insignem reperiebamus: et verò incertum est utrum materies isthac ibidem ab initio deposita spasmos primario intulerat; an potius sanguis iste à partium circumcirca conlitarum contractione expressus, & extravasatus, convolutionum effectus, & productum, ac minime istarum causa fuerit. Nam & in Apoplecticis ejusmodi phenomenon passim occurrit: quod tamen morbi effectum potius quam causam esse posthæc ostendemus.

Profecto quod particula heterogenea, quæ sanguini ab utero innata, in plerisque pueris per totum in toto corpore cutaneam amandari solent, in aliis capiti suffusa, affectionis spasmodicæ causa materialis existunt, præter

rationes superius citatas, etiam à remediis maxime juvantibus inferre licet: quippe in puerulis hæreditario huic morbo obnoxius, insultus convulsivi optime præcauentur, si mox à partu fontanella in nuca excutatur, & sanguis rudium suctu e venis jugularibus detrahatur; illa namque succi uterum corruptela subducuntur, atque hoc cruoris efflorescentiæ impuræ à capite aocantur: hæc administrationum modis, cum prius duo aut tres ejusdem parentis nati brevi post partum convulsivi interissent foetus, omnes alii ab eodem nido liberabantur.

2. Hæc de puerorum moribus convulsivis, qui mox à partu, propter labem ab utero contractam eos infestare solent. Quod si hæc vice aut ipsum morbum, aut saltem mortiferas ejus plagas evaserint; nihilominus circa dentitionis tempora eidem periculo denuo obnoxii reperiuntur: quando enim dentes, præsertim majores, e gingivis erupturi sunt, sæpe febris excitatur, cui non raro motus convulsivi adjuunguntur. Et licet hoc tempore infantes viribus plus valeant, eoque morbi insultus melius quam recens nati tolerant, attamen affectiones spasmodicæ etiam nunc, nec graviore aliqua occasione excitatæ valde periculosæ, ac interdum lethales existunt.

Quandoquidem autem pueri qui circa dentitionem febricitant, non omnes moribus convulsivis tentantur; ideo sequitur hujus morbi dispositionem quandam, sive innatam, sive acquisitam præcedere, atque dolorem à dentitione illatum tantum causæ evidenter fortioris rationem habere; scilicet pueri, quibus aut cacochymicis, aut cerebri & nervoli generis constitutione debiliore præditis, spiritus animales, vel adulterati, vel dissipabiles nimis existunt, in affectiones spasmodicas quandoque ineundas disponuntur: quare cum dolor admodum acutus una cum febre urget, dispositio ista latens in actum ducitur.

Si hic inquiretur, qua ratione febris, & dein qua motus convulsivi in prædispositis dentitioni superveniunt; dicendum erit quod uterque affectus ad dolorem velut causam in medi tam referri debet: In nobis ipsis experitur quis sit cruciatus qui irritationem circa dentium radices sequitur; revera tantus & tam atrox, ut excitari vix possit atrocior; quippe nervorum quinti paris una aut altera insignis propago ad cujusque dentis radicem pertingit, quæ cum à sanguinis, aliorumve humorum particulis acerbis illic congestis vellicatur, corrugatione sua acerrimum molellæ sensum, sive dolorem infert. Istiusmodi autem hujus nervi vellicatio in pueris dentientibus ideo contingit, quia dentibus jam in majorem molem crescentibus, & adhuc intra gingivas vix dum cavatas inclusis, membrana & fibræ quaquaversus distenduntur: hinc sanguis in circuitu præpeditus tu uorem infert adeoque nervos comprimit, quibus & aciores feri particulas iis suffundit, quibus illi insiguitur vellicati corrugationibus, & spasmodicis dolorificis torquentur.

Cum itaque pueris dolores ita atroces à dentitione contingunt, nihil mirum est si febres, ac etiam motus convulsivi interdum succedant: prior horum accidit & quatenus sanguis circa partem dolentem, ne soluto atque æquabili cur-



tu circuletur impeditus, propterea in toto corpore inordinatus movetur; & insuper quia spasmus alicubi in nervoso genere excitatus, nervi corrugati & contracti arterias comprimunt & convellunt, proindeque in sanguine fluctuationes irregulares & febriles concitant. Cæterum motus convulsivi dentitioni aliquando superveniunt, cum quia sanguis effervescent, particulas heterogeneas regimini animali sustundit, adeoque spiritus in explosiones ciet; tum præterea cum dolor ille acutus, & velut lancinatio dentes erupturos sequuta sensum valde molestum ac irritativum à partibus affectis *ad nervi distentionem* communicet, exinde statim per eosdem nervos, vel alios affines excurrentem motus (qui ob dispositionem præviam non raro convulsivus evadit) retorquetur.

Præter has binas (quæ in pueris præcipue, & crebriores esse solent) motuum convulsivorum occasiones, scilicet prima infantie, & dentitionis tempora; affectus ille etiam aliis temporibus, & propter alias causas sæpenumero excitatur: In quibus enim dispositionis spasmodicæ semina jaciuntur, illa interdum aut statim à partu se explicant, ac in morbos fructus maturantur, sed aliquando latitantia dentitionem modo præveniunt, modo eam è longinquo sequuntur; & propter causas evidentes alias, scil. vel internas, vel externas, cujusmodi sunt nutritrix invaletudinaria, aut præguans, lac in ventriculo coagulatum, aut in putrilagine acidam, aut amarâ degenerans, intemperies febris, capitis, aliarumque partium ulcera, aut exanthemata subito evanescentia, aeris mutationes, solis, ac lunæ *Cursus* aut aspectus oppositi, & similia, tandem incerto eventu in actum erumpunt. Super his non opus est ut particulatim differamus.

Cum viri cujusdam in hac vicinia degentis, nati omnes intra trimestre spatium convulsi interierunt; tandem ad præcavendum in puerulo recens edito ejusmodi fatalem eventum, remedia expetuntur. Post aliquot à partu dies accersitus, consulo ut imprimis fontanella in nucha excitetur; dein postmodum ut hirudine utriusque lateris venæ jugulari applicata, sanguis ad 3 ij. extrahatur; insuper ut juxta singulas solis & lunæ *Cursus* & aspectus oppositos, per tres dies mane, & vespere pulveris sequentis circiter gr. v. exhiberentur c cochleari Julepii.

℞. Cranii humani præparat. rad. Præonæ maris, ana 3j. Margar. pulv. 3ß. sacchari albisissimi 3j. misce, s. pulvis subtilissimus.

℞. Aq. Ceras. nigror. 3 iij. anti-epilepticæ Langii 3j. syrup. de floribus Præonæ maris 3vj. misce; item præcepi ut nutritrix iisdem temporibus medicis sumeret haustum seri lactis, cui sem. & rad. Præonæ maris & sol. Lili convallis incocta sunt. Infans per quatuor circiter menses bene valebat, tunc vero affectibus convulsivis tentari cæpit: quo tempore iisdem remediis in dosi majori tum infanti, tum nutritrici adhibitis, vesicatoria etiam pone aures applicabantur, & hirudinum suctu sanguis ex utraque vena jugulari fuit detractus: intra duos, vel tres dies puer convaleuit: postea cum intra 4. vel 5. menses spasmus aliquoties redirent, eorundem usque remedium usu sanabatur. Post sexquiannum affectiones convulsivæ penitus cessabant:

attamen circa infimam spinæ dorsii partem tumor indolens succrevit, a quo vertebrarum distortio quædam, atque crurum imbecillitas, & denique palsyis inducebantur. Videtur in hoc casu, quod materies spasmodica primo cerebrum, & nervorum principia impetere solita, ultimo spinalem medullam subiens, inque extremitatem ejus detrusa nervorum appendicum capita omnino obstrueret, atque spiritibus transitum præcluseret: nimirum quia particulis explosivis aliæ narcoticæ & crassiores sese adjunxerant.

*Methodus Therapeutica contra affectiones Convulsivas in pueris.*

In pueris ac infantibus passiones spasmodicas, aut imminentes præcavere, aut jamjam exorsas curare incumbit.

Nam si ejusdem parentis nati priores Convulsionibus obnoxii fuerunt, malum illud cæteris post natis tempestivo remedii rum usu præveniri debet: in hunc finem solenne est textui recens edito, quamprimum spirare incipit, medicamentum aliquod *antispasmodicum* ori ingerere: hinc nonnulli guttas quasdam mellis purissimi, alii cochleare vini canarium saccharo in butiri, quin & alii oleum amygdal. r. dul. recens extractum exhibere solent, a quibusdam olei succini gutta i. aut aquæ epilepticæ semicochleare infunditur.

Præter hæc prima infantum libamina, quæ certè nullius non momenti esse videntur, alia quædam remedia, & administrationum modi in usum ascisci debent: scil. bis in die propinetur cochlear i. liquoris huic affectui appropriati. c. g.

℞. Aqu. Cerasor. nigror. Rutæ, ana 3i. Anti-epilepticæ Langii 3j. syr. e. Coralliis 3vj. Magar. præpar. gr. xv. misce in phiala. Die tertio aut quarto post partum excitetur fontanella in nucha, dein si vultus sit floridi, parum sanguinis ad 3 i. vel ij. è venis jugularibus hirudinum suctu extrahatur, cavendo ne inter dormiendum sanguis copiose nimis effluat; tempora, & cervix blande fricentur tali linimento.

℞. Olei Nucis Moschat. per expressionem 3ij. C. pivii 3iij. succini 3j. Periaptem ex radicibus, & seminibus Præonæ maris, addito parum ungulæ alcis collo suspendatur.

Porro medicamenta antispasmodica nutritrici quotidie exhibeantur; sumat mane, & vespere haustum seri lactis, cui rad. & sem. Præonæ maris & sem. fenicul. dul. incocta sunt.

℞. Conserv. flor. Betonicæ, Præonæ maris, Antifos. ana 3ij. pulv. rad. & flor. Præonæ maris ana 3ij. Coralli rubri præparat. succini albisissimi, ana 3j. rad. Angelicæ, Zedoariæ præparat. ana 3ß. cum s. q. syrupi de Præonia f. Ele. Quarium: capiat q. Nucis Moschatæ mane & vespere.

℞. Pulveris rad. Præonæ maris 3ij. sem. ejusdem 3j. f. Pulvis, sacchari albisissimi solut. in aq. florum Tiliz & ad tabulat. cocti 3 iij. Olei succini 3j. f. s. artem Tabulæ, singulæ pendant 3ß. Comedat 1. hora qualibet sexta. Illa etiam exacta victus ratione utatur.

Quod si infans quispian Convulsionibus adhuc afficitur, quia fontanella minus, & tardius operatur,



ratur, vesicatorium in nucha, aut pone utramque aurem applicari expedit, & nisi temperamentum frigidius obitat, sanguis hirudinum suctu venis jugularibus extrahatur: Linimenta circa tempora, nares, & cervicem, item plantis pedum emplastra admoveantur; enemata quæ alvum copiose subducunt quotidie injiciantur: Porro sæpius in die, nempe sexta aut octava qualibet hora, remedia specifica intus sumantur.

℞. Olei Capivi, Castorei, una ʒij. succini ʒss. f. linimentum.

℞. Emplastri Oxycroci p.ij. Galbani solut. p. j. Olei succini ʒj. t. Emplastrum pro plantis pedum. Pulvis de gutteta juxta descriptionem Riverii exhibeatur bis vel quater in die.

℞. Cranii humani præparat. sem. Præniæ, unguis Alcis, Margarit. præpar. ana ʒss. Ambra griseæ gr. vj. f. Pulvis. Dosis gr. vj. in cochleari liquoris infra scripti, ter aut quater in die.

Vel ℞. Cranii humani præparat. Margarit. ana ʒss. salis succini ʒj. sacchari perlati ʒj. Dosis ʒss.

Vel ℞. Spir. Cornu Cervi gutt. iij. detur sexta vel octava qualibet hora in cochleari julepii infra præscript.

Pauperum natis exhibeatur pulv. radice Valerianæ sylvestris ʒss. ad ʒj. detur bis in die in cochleari lactis, vel liquoris appropriati.

Untrexus valde commendat fel catelli lactantis, nempe ut totus succus cysti felice exemptus puerulo cum pauxillo aquæ florum Tillæ propinetur.

Nuper mihi retulit Medicus Eruditus se novisse plures hoc remedio curatos: Porro solent empirici pueris majoribus, post fel epotum, etiam catelli hepar assatum comedendum tradere.

Julepia, aquæ destillatæ, alique liquores appropriati juxta præscripta sequentia parari possunt.

℞. Aq. Cerasor. nigror. ʒ iij. Anti-epilepticæ Langii ʒj. sacchari perlati ʒij. misce.

℞. Rad. Præniæ maris recent. in taleolas scissarum ʒvj. Vitrioli Hungarici ʒviii. Cranii humani ʒij. Aqu. Anti-epilepticæ Langii ʒss. Misce, & destillentur in retorta vitrea calore arenæ. Dosis cochlear. j. ad ij.

℞. Rad. Præniæ maris recent. incis. ʒiv. contusis in mortario marmoreo affunde vini Hispanici ʒss. f. expressio fortis, adde manus Christi perlata ʒss. servetur in vitro occluso. Dosis cochlear. j. vel ij. bis in die.

Cum ob dentitionem difficilem motus convulsivi eveniunt, symptomata hoc quemadmodum secundarium & minus periculosum existit, ita in Therapeia non semper primam aut præcipuam exigit medendi operam, sed nonnunquam de dolore sedando, & intemperie febrili summovenda potius solliciti sumus; quare & patiens, & nutrix victu tenui & refrigerante uti debent: dentibus erupturis gingivarum aut frictione, aut sectione exitus pateat, quin & partibus istis innumefactis & dolentibus anodyna applicentur: Enemata, & sanguinis detraçio non raro hic locum habent: somnum conciliare, & sanguinis ferociam attemperare decet: interim remedia Antispasmodica usurpentur, verum temperatiora, & quæ sanguinem, & humores minus exagitant: vesicatoria, quia

serum in caput nimis suffundi aptum evacuant, sæpe juvamen conferunt.

Quando pueri nec statim à partu, neque ob dentes erupturos, sed propter alias occasiones, & accidentia moribus Convulsivis tenentur; talis affectionis causa ut plurimum vel in capite, vel alicubi circa coctionis viscera subsistit. Quando prioris suspicio habetur, uti liquere solet à signis quæ colluviem serosam intra ʒijss. nimis congestam arguunt, remedia superius citata in paulo majori dosi exhiberi debent; insuper in istis qui catharsin bene ferunt, interdum vomitus, & levis purgatio instituantur: vinum & oxymel scilliticum, item Mercurius dulcis, Rhabbarum, & resina Jalap. egregii sunt usus.

Quoties affectionis spasmodicæ causa in visceribus subesse videtur, aut lumbrici, aut acres humores ventris tormina cientes in vicio deprehenduntur.

Contra Lumbricos purgatio ex Rhabbaro, aut Mercurio dulci, addita resina Jalappæ instituitur. Olim puero convulsionibus miserime affecto, ut jamjam moribundus videretur, dosim Mercurii dulcis cum resina Jalappæ exhibui; cum alvi dejectionibus, quas 4. habuit, lumbricos 12. excrevit, & derepente convaleuit.

℞. Rad. Serpentariæ virginianæ pulv. ʒj. Corallii ad albedinem calcinati ʒss. f. Pulvis, dosis ʒss. ad ʒj. bis in die per tres dies continuos, superbibendo decoctum rad. graminis.

℞. Specier. Hieræ ʒss. Theriacæ Vener. ʒij. f. Emplastrum pro abdomine, vel Emplastrum ex Galbano applicetur umbilico.

Si motus convulsivos à ventriculi, & intestinorum irritatione per acres humores facta, procedere suspicamur, lenis catharsis, aut vomitu, aut secessu, aut successive utroque institui debet. In hunc finem blanda emetica ex vino scillitico, aut sale vitrioli propinentur; si quando scilicet laborantes vomendi nixu sponte tentantur: sin evacuatio potius tentanda videbitur, Rhabbarum infusio, aut pulvis, syrupus de Cichorio cum Rhabbaro, aut rosarum cum agarico propinari debent: & non raro hisce remediis tempestive adhibitis, affectionem convulsivam in pueris sanatam vidi: Porro in hoc casu enemata sint crebri usus: Ceterum non omittantur medicamenta externa, scilicet fotus, linimenta, aut emplastra abdomini applicanda.

℞. Folior. Camomillæ minutim incis. M. ij. includantur duobus sacculis è lino tenui aut serico confectis, qui lacti calido intincti & expressi abdomini successive applicentur.

℞. Summitates, aut flor. malvæ pariter incis. incoquantur butyro recenti, vel levo porcino, & sub forma linimenti aut cataplasmatibus ventri applicentur.

Hæc fusè, ingeniosè ac doctè Clarissimus Willisus: Quibus subnectimus vim illam explosivam in spiritus animales cerebri incolas, à particulis effertis undecunque demum advenientibus inductam, quam pro causâ Epilepsiæ proximam habet, non ita omnibus arridere, quin contra eum hac in parte vehementer insurgat Doctissimus ac Politissimus Meniotius, dum Dissertatione sua Pathologicâ de Epilepsia sic habet. Scripsit nuperrimè Medicus studioso-



studiosissimus, cornicumque oculos, ut in proverbio est, nitens congerere, epilepsiam oriri spiritibus animalibus ad instar igniscentis pulveris pyrii intra cerebrum a materia nitrosulphurea subito rarefactis, indeque in systema nervosum effrante ac inordinate explosis, a quibus tensi musculi involuntarie contrahuntur. Sed novum istud opinionis commentum refellere per facile est; nam musculos usque adeo tensos, etiam potiori jure, quam in palpitantibus sentibiliter dilaturi necesse esset, qui tamen nullatenus videntur intumescere. Deinde in febribus ardentissimis, ac potissimum in mania & phrenitide, spiritus animales flammescunt & quantum terre potest eorum natura, rarefcent citra epilepsiam; sicque patet nullam spiritibus animalibus cum tormentario pulvere accenso similitudinem intercedere, nec præcipitem comitialium casum rite ad hunc comparari, quod subitanti pyrii pulveris ignitione non dirigitur modò, verum etiam extra locum in quo steterat, dimoveretur; conuulses enim epileptici partes quidem varie ac violenter jactant, sed in alium locum toto corpore non proficiunt, nec instar crepitantis tubuli catapulæ huc illucq; saltitant. Hæc Meniotius, cujus rationes quàm solidæ sint, penes lectorem judicium relinquo.

Remedia quod attinet antiepileptica sequentia suadet Clar. Dan. Ludovici. Qui pulveris nostri bezoardici albi, succini albi præparati, cinnabarisque nativæ selectioris ana miscuerit & adultis quidem ad ʒss. infantibus autem anniculis, ad gr. iij. iv. vj. natu minoribus dimidium horum, curative repetendoque dederit, ac pro indicantium ratione (præmissis aut interpolitis emeticis aut laxativis) modò volatilia urinosa (spiritum C.C. Armoniaci simpl. &c.) modo essentiam succini; camphoræ, castorei, tincturam corallior. antimon. &c. modo præcipitantia alia, imprimis ligantia illa ex Opio circumspicte superaddiderit, multum utique proficiet. Lactantibus autem non solum hic, verum etiam in reliquis inquietudinibus, torminibus, vomitibus, diarrhæis &c. admodum confert pulvis antiepilepticus anodynus. Pulveris bezoardici albi nostri ʒvi. succin. alb. præp. ʒiij. cinnabar. nativ. ʒiv. & laudan. opiat. nostri ʒj exacta mixtura compositus, trimestrique ad gr. j. &c. exhibitus. Bezoardicum autem suum parat, dum à mercurio vitæ communi sextuplum boni spiritus nitri per arenam ad siccitatem perfectam abstrahit; pulvere residuo (citra consueta hic cohobia, ulterioresve ignitiones, ac citra nimias grati ac innocentis aëoris elutriationes) sat validò atque securò. Si nitri spirit. levior sit, oportet addere nitri crudi an. ad mercurii vitæ pondus. De cætero compendiosius adhuc cum croco metallorum similiter proceditur, si pariter boni spiritus nitri sextuplum ad siccitatem inde abstrahatur. Pulvis hinc elegans priori ponderosior, securissimus & eximie diaphoreticus est. Elegantior rem adhuc habebit qui sulphur autimonii auratum simili sextupli abstr. ctione in albusimum pulverem fixarit. Laudanum verò ita paratur.

℞. Extract. opi part. 2. extract. croci & cinnabar. nativ. aut saltem corallior. an. part. 1. *Hactenus Ludovici. Medicus quidam apud no-*

stros olim celebris præmissis universalibus cochineæ pulveratæ grana iv. ex aquis appropriatis, per tres ultimos lunæ dies mane jejunò ventriculo epileptici exhibebat, hocque simplici medicamento plures a gravissimo morbo liberabat. Sequens vinum ab eodem etiam commendabatur.

℞. Sem. pæon. mar. ʒiij. rad. enalæ ʒi ss. fol. sab. ruta, hyssopi, salvia min. flor. calch. in medio nigra, major. abrotan. aneth. nepethæ, rorismar. pedis leonis, baccar. juniper. an. m ss. Theriacæ, Mithridati an. ʒij. pyrethr. ʒj. Bulliant omnia, exceptis electuariis, in vini ubi generosi lb xii. in vase fictili novo, probè lutato, ad consumptionem duarum tertiarum. Tum colentur, & in colaturâ dissolve electuaria. Dos. ad ʒiij. vel iv. pro ratione virium. Ambulet æger post assump. hoc vinum, spiritum subinde contineat, & aures oburet cotone hoc decocto imbutò, nec comedat aut bibat, nisi post duas aut tres horas. Decoctum hoc per novem dies continuos manè sumi debet, ubi morbus non est inveteratus. At si ante decem annos incepit, continuare oportet per dies quadraginta, interpolitis purgantibus, ex hellebori nigri, & pæoniæ extractis, paratis.

Continuò jam pergeremus ad Curationes epileptiæ e variis Autoribus tradendas, sed in illius absolutiorem cognitionem & explicationem adducenda prius veniunt, quæ super hoc argumento ordine Geometrico accuratissimè profert. *Laurentius Bellius in suo de morbis capitis tractatu. Sic itaque ille.*

#### *Epilepsia Antecedentia sunt.*

Animi, & corporis insueta conturbatio, capitis gravitas, cephalalgia, vertigo, vigilæ, aut plurimus somnus, a quo nullum levamen emergit, insomnia turbulenta, mentis torpor, vel anxietas, obliuio, mœlitia, pavor, formido, segnitie, artuum gravitas; saltus, & tremores membrorum, sensuum hebetudines, obtusus definitus, scintilla oculis obversantes, & interdum nubeculae, aut niarmyges, hoc est, splendores coruscationibus similes; aurium tinnitus, sædi odoris perceptio, lingua inlexilis, aut ejus inordinata motio, oscitatio, sternutatio: cordis palpitatio, iracundia, pectoris constrictio, mutata respiratio: cibi fastidium, aut appetitus immodicus, nausea molesta, cardiagmos, seu oris ventriculi morsus: salivæ per os effluuium, urinx tenues & crudæ, pollutio nocturna frequentior, faciei pallor, præcordiorum inflatio.

#### *Conjuncta.*

Cum perfecta Epilepsia sensuum omnium internorum, & externorum interceptio, subitus collapsus, totius corporis, aut partium aliquot varia concussio, oculorum prominentia, stridor dentium, respiratio suffocatoria, qualis in quo suspensis: lemnis. stercoreis, urinx involuntaria profusio: ad finem insultus spuma per os, & nares: ad finem paroxysmi ægro sui compote ante actiarum rerum nulla memoria, aut cognitio. Cum imperfecta autem capitis solum, vel brachii, vel tibiae, aut femoris, vel dimidii corporis concussio interceptis sensibus omnibus, vel sal-



va etiam mente, & quibusdam voluntariis motibus, nempe aliquorum partium aliis præter voluntatem concussis. Cum idiopathica mentis torpor, tarditas, memoriæ immutatio, insomniæ turbulenta, sensuum hebetudo, gravitas, & segnities, capitis dolor, optima reliquarum partium corporis habitudo, paroxysmi subitus sine ulla ægri præfensione intuitus. Cum sympathica nulla cerebri affecti signa, instantis paroxysmi perceptio, ut cuiusdam rei velut aliunde e corpore ascendente ad instar auræ; vitium ali cuius partis, vel symptomata aliquod gravius tempore invasionis: sic à ventriculo cibi fastidium, inedia difficilis tolerantia, nausea, dolor, aut eructio, punctio, aut distensio ventriculi, cordis etiam aliquando palpitatio per consensum. A jecore, & liene flatuum frequens, & copiosa excretio, ventris inflatio, rugitus, borborigini, ructus acidus, præcordiorum molestia coarctatio, eorundem dolor interdum ad ulque dosum, vitia in partibus abdominis. Ab utero hysterica passio, cum convulsionibus epilepticis conjuncta, menses, aut seminis retentio. Ab aliqua partium exteriorum auræ quædam frigida ab eadem illa parte veniens, & excurrentes ad cerebrum vellicans, ticillans, quæ imminenti paroxysmi nuncia est, qui prohibetur, si illa pars vinculo constringatur. Facit huius auræ fidem Galenus hunc in modum de Epileptico loquens puero tredecenni. *Andivi igitur tum narrante puero dispositionem ipsam ex libris initium capere, mox illinc recta ascendere perfermur, & superposui ipsi illa, ac per latera ad cervicem, donec ad caput perveniret, quod cum primum tangeret, ipsum haud quaquam sibi constare, interrogantibus autem Medicis, quale esset id, quod ferebatur ad caput, nihil habuit puer, quod responderet. Alius deinde adolescens compos mentis, quippe qui satis poterat & sentire quod fiebat, & alteri narrare, dicebat, veluti frigidam quandam auram esse id, quod ascendebat. Hactenus ille.* A lumbricis anhelitus, fœtor acidus, fœces cineritiæ, stridor dentium, membrorum tremor, terror, & clamor subitus in somno, narium pruritus, & frictio, salivæ nocturno præsertim tempore ex ore effluxus, facies pallida, subito incalescens, ac rubens, morsus, ac dolor stomachi, & intestinorum, inde frequens abdominis contrectatio, ejusdem insolita durities, rugitus, ac tormina ventris, membrorum atrophia, tussis sicca, singultus, vermium cum alvi excrementis egestio, quod est præcipuum, & maxime tutum. Est autem epilepsia aliquando cum abscessu conjuncta, ossis carie, urinæ suppressione, & similibus, quæ ex se ipsis innotescunt.

#### Succedentia.

*Epilepsia quibus ante pubertatem contingit, curationem recipit: quibus post vigesimum quintum annum, eos fere comitatur ad mortem usque, ait Hippocrates quinto Aphor. 7. Ubi notabis, a plurimis Medicis aliquatenus damnari Hippocratem quod Epilepticos post 15. annum laborare incipientes non curari asseruerit, quasi Hippocrates dixerit nunquam curari, alius verò damnari penitus, cum tamen ipse asserat apertissime, fere nunquam, aut plerumque non curari, ut ex Græcis verbis manifestum est. Apoplexia, vel*

Mors in ipso paroxysmo, divulsio partium cerebri per concussione, ita ut procellarum magnarum particule aliquando per nates sint redditæ, inquit Riverius, (quomodo autem reddentur, si nullus patet exitus?) Melancholia, Par. tyliis, Quartana, quæ superveniens, ac diu perferens morbum solvit. *Juvenes epilepsia laborantes mutatione præcipue aetatis, regionum, & vultus liberantur, inquit Hipp. 2. Aph. 45.*

Quod est ad convulsionem apoplexia, id ipsum est epilepsia ad motus convulsivos, quin in hac affectione plurima reperiuntur, quæ Apoplexiæ etiam conveniunt, Caro, Comati, Letargo, aliisque affectionibus capitis jam explanatis, ita ut nihil sit opus diutius immorari in explicatione sive præcedentium, sive conjunctorum, sive succedentium, cum eorum singula vel in aliis morbis superioribus jam explicata sint, vel tam facile pateant, ut ulteriori explicatione non indigeant. Aura autem illa in Epileptico Galeni patet ex his, quæ ostendimus de rigore, & horrore, nisi quod ibi solum de frigore sermonem habuimus: hic fieri fortasse potuit, ut non solum frigus fuerit id, quod ascendebat, sed quid aliud irritans, atque fermentans, & hoc ipsum etiam sine frigore conjuncto: sed hoc ipsum frigus succederet ex necessitate ejus vel fermentationis, vel irritationis ut ex eodem horrore, & rigore patet: Ex ejus autem vehementia, ac subita agendi vi evadebat puer ille sui impos, ubi primum aura illa cerebrum attingebat, quæ si in aliis fuerit mitior, atque seguior, mente alienare non poterit, ut in rigoribus, & horroribus febrium &c. sive autem à sola materia irritante, ac solo frigore sive ab aliquo fermento res proveniat, sive sciunt à causa solum vehementer concutiente, & in tremorem agente nervos, seu mutante contentum liquidum, prohiberi poterit, ac debet insultus epilepticus injecto vinculo parti auram mittenti, per vinculi enim constrictionem impiedietur tam ascensus materiæ corporis, quam protensio tremoris, ut patet. Itaque oriri poterit, ac debet Epilepsia non à sola materia acris, irritante &c. sed ab omnibus causis, à quibus excitari possunt motus convulsivi, quos ostendimus superius produci posse, ac debere pluribus modis, adeoque erit Epilepsia concussio totius, vel aliquarum partium corporis cum sensuum omnium, & voluntarii motus ablatione producta à quacunque causarum, à quibus convulsivi motus produci possunt: & idiopathica erit, cum causa illa primaria viget in cerebro, sympathica, cum eo perducitur ab aliis partibus. Hinc deduces, epilepsiam illam, quæ pueris tam familiaris est, eosque invadit fere subito ab exclusione, cum adhuc humidissimi sunt, & fere muellaginei toti, provenire posse, immò re ipsa forte provenire frequentius à nimia humiditatis copia, qua scætent, quàm ab acris humoribus, qui vellicent, & irritent; certè enim in illa humorum crassitie, qua nostrum singuli scætemus primis vitæ nostræ mensibus, vix quicquam acris, ac stimulantis contineri posse videtur, & si quid stimulant, atque acre generatur, non non plurimum retundi, ac temperari debet ab eadem crassiorum humorum copia, & proinde levem stimulum imprimere partibus illius corporis, quæ



quæ sunt adhuc tam teneræ, ut vix sibi ipsis hæreant, nedum sint rigide, ac maxime tenæ, cuiusmodi esse debent, ut acrem sensum concipiant? Lac corruptum potest quidem acetescere, atque idem stimulus heri, sed non temperabitur ab abundantia humiditatis in puero? Et ita autem, nec temperari possit in pueris aliquibus, id sane heri debet in paucioribus, aut saltem non in plerisque, quemadmodum tamen pueros tantum non omnes epilepsia vexari continue videmus. Ex epilepsia autem difficile evadunt pueri, si sint admodum parvi, hoc est, recens nati, cum per violentas illas concussiones partes corporis adhuc teneri divelli possint, præcipue autem cerebri vix dum constitentis, quod proinde vel divellatur a suis partibus, vel dissolvatur quasi in sphacelum, & facile morietur puer. Verosimilius igitur erit, Epilepsiam in pueris a copia pituitosarum materiarum, & pressione potius oriri, quam a stimulo, vel saltem illam esse frequentiorē.

Illud autem animadvertendum est, num Epilepsia a Vermibus proveniat a sola irritatione in partibus ventriculi, & intestinorum, unde validi refluxus, &c. an à materia humoribus permixta; cum etenim vermes supponantur, igitur datur materies eorum generationi apta, & chyli materies cum ipsorum excrementis miscetur, & ejus aliquid ab iis in cibum assumitur, unde vitari aliquatenus poterit, atque ita vitata, si in vasa trahatur, dabit suspicioni locum, num Epilepsia ab ipsa potius, quam ab irritatione, an ab utraque simul proveniat. Hactenus *Clariss. Laurentius Bellini*, jam videamus.

### Curationes, Consultationes, Observationes & Anatomica inspectiones ex variis.

#### Curationes.

Epilepsia & similes morbi, qui à paroxysmorum vehementia & perniciē infames sunt, duplicem habent indicationem. 1. quæ paroxysmum respicit, 2. quæ ipsas morborum radices.

1. Aqua vitæ Mulierum (*Weiber aqua vitæ*, aliàs balsamus Embryonatus. Vide *Pharmac. August.*) propinata prægnanti mensura cochl. j. cum spiritus Antepileptici nostri gutt. iij. vel iv. singulis mensibus semel in Novilunio a mense quarto ad partum usque factum ab Epilepsia præservat: præmissa illa majoris securitatis ergo datur hic pulvis.

2. Spinam dorli vitæ mustelæ non coctæ, sed crudæ a capite ad caudam probe mundatam & exsiccatam, eamque pulverisâ, hujus pulveris:

℞. Et magist. Corall. & perlar. an. ʒ ij. M. Dosis quantum cultelli mucro capit, in pulpa pomi allati.

11. præservantur pueri ab Epilepsia, vel prorsus liberantur, ne unquam succedente ætate tali passione capiantur, si recens jam natis antequam lac sugant vel cibum comedant, ingeratur ol. amygd. dulcium recens cum saccharo hno permixtum utriusque sit a ʒ β. ad ʒ ij. vel ʒ iij. Sic enim ubi paulisper à sumpto hoc absterivo quiescunt.

℞. Stercus de Vacca nigra adhuc calidum, indatur olla nova, & calcinetur, de quo exhibeatur ʒ j. vel ʒ β. mixto n. ro. infantis, (Electoris Saxonia Secretum) tandem evolvat pituitosam admodum copiam impuritatum in utero materno ante exitum collectarum, quæ impuritates sunt e. viz. multorum morborum in pueris, non inatim vero Epilepsie. Quod si non evolvunt, per alvum saltem purgantior deinceps ul. b. lueantur aliquandiu & in prius pertempus puerperii eoque in b. cortices salicis recentes. Sic nimirum non ab Epilepsia tantum, sed etiam a tæbe præservantur (specificum in aridura puerorum.)

Spir. Antepilepticus puerorum [vide not. ad Croll.] Cujus gutt. 6. 8. 9. cum aquis Epilepticis flor. tiliz, radie. præmiz, aq. luvundinum, cerasorum, Lavendulæ. It. cerasorum nigrorum cum aq. Langii Epileptica exhibita tum in paroxysmo, tum etiam post eundem nificet puerorum morbum tollunt, præsertim, si in primo paroxysmo exhibeatur.

Expertus sum in puctulo duorum, ni fallor, annorum, qui continuos fere convulsivos paroxysmos patiebatur, excellentiam spiritus lais argemoniaci, de quo, frustra tentatis aliis remediis gr. 4. tantum in aq. flor. tiliz exhibebam, statimque convulsiones cessarunt, post horam eandem dosim repetiti, qua puer optime convalevit & jamdum valet. Sal autem volatilis urinae longe præstantius est, præsertim, si cum calce luna sublimatur, quæ tum de muni præstat id, quod ipsi alias ascribitur. vid. præxin n. eam Chymiatr. cap. 5. pag. 44. & 45.

In Epilepsia adultorum 1. Præmittantur Universalia Vomitiva, Cathartica, in primis specili- cum purgans Paracelsi. Postea exhibeantur specifica, qualia sunt.

(Urgentia in epilepsia meliora non invenies, quàm Mercurii. li. E. gr. Mercurium dulcem, præcipitatum album &c. formula potest esse talis.

℞. Mercurii præcipitati albi ʒ β. Trochisc. alhandal vel resinæ Jalapp. gr. 3. Mass. pil. de succin. craton. ʒ β. c. q. f. Ellent. Castor. f. Prætolz. quarum usus continuandus ad aliquod tempus.)

1. Epilepticum Crollii.

2. Pulvis Antepilepticus ex Cinnab. Antim. qui talis est.

℞. Cinnab. Antim. magist. Coral. perl. ana Alius.

℞. Cinnab. nativi pellucidi & splendentis ʒ β. pulverisâ in marmore subtilissimè: adde magist. Corall. perl. ana ʒ ij. Croci ʒ j. tol. aur. diligenter triti, super lapidem, reduc. in pulverem, cujus gr. 7. ad 18. in aq. saliv. propinentur & sæpius repetatur. Vide supra de sudoriferis.

Alius pulvis Epilepticus magnarum virium.

℞. Cinnabaris Ungarici probe loti & depurat. ʒ β. imbebe cum spir. vitæ. ʒ iv. scobis cranii humani nunquam sepulti ʒ β. imbebe cum spiritu vini, relinque in loco calido per 15. dies & postea per retortam destilla liquorem, & illud, quod restat, seorsim serva hinc.

℞. Scobis Ungulæ alcis ʒ β. Myrrhæ rubræ ʒ β. solve in sp. salis, solutum a fecibus separa & serva postea.



2. Croci ꝑ. cum sp. vini tincturam extrahe, liquores omnes simul misce & in us imbebe cinabarium ante preparatam, lotam & pulverisatam. calore lento semper exsiccando, donec omnem liquorem imbibieris & in pulverem siccum abierit. dosis à gr. 2. ad 4. cum vino generoso aut sp. vini vel aq. antepileptica, in ante, & post paroxysmum.

4. Spiritus cerebri humani, qui sic fit.

26. Cerebrum hominis juvenis integri, bene sani ( adolescentis intra annum 24. & bonæ constitutionis violenta morte perempti, collige frustulatum cum omnibus membranis, arteriis, venulis & nervis cum medulla spinæ tota, conquassa in mortario lapideo, & adde in cucurbita vel phiala potius capaci aquarum capitulum scil. flor. tiliz, pzoniz, betonicæ, ceraforum, lavendulæ in primis, adde diaphoretici in acutis ad supereminentiam 4. vel 5. digit. (plus quam de reliquis simplicibus aquis; addunt etiam spir. v.) claudatur hermetice vas, & relinquatur aliquandiu, per annum 1. 2. 3. &c. postea per cohobiam destillatur ex B. roris, ut tota (aliquora) cerebri substantia simul transeat. Hanc aq. abjectis facibus curiose serva. Et facibus post sextuplex cohobium calcinatis elice sal, quem deinceps cum sp. facto junge, & totum curiose serva. Dos. à ʒj. ad iij. in vehiculis convenientibus.

NB. Si initio non addita est mistura simplex propter defectum; postea phlegmate per B. leniter abstracto, adde misturæ simpl. partem dimidiam, & procede, ut monitum est. Dos. à ʒj. ad iij.

5. Hepata Ranarum, quæ sic parantur: Collige hepata de ranis viridibus aquaticis non terrestribus 40. quibus vivis jecinora exime & sigillatim pone supra folia brassicæ capitata ad eam partem, quæ terram respiciunt, ita ut se invicem contingant, postea in ollis devitreatis & recentibus (*Irden Bratpfanne*) superius rectis, exsiccentur ad lentum ignem, ita ut in pulverem tenuissimum teri possint, à solis cautius separata. Postea divide pulverem integrum in 5. partes æquales & serva.

Partem unam exhibe patienti præmissis universalibus jejuno ventriculo in haustulo aquæ vel spiritus appropriati, cum Luna ingressa est in cancrum; Vespere duobus horis à cœna alteram partem, atque sic consequenter postero die mane tertiam, vespere quartam; tertio die ultimam partem mane.

Ubi tamen observandum, semper ante & post sumptionem pulveris 2. horis ab omni cibo & potu esse abstinendum. Si pateris præsertim adultus, post sumptam hanc medicinam in fronte & temporibus ludat, est testimonium operationis exquisitæ. Itaque si post 3. 4. & quantam exhibitionem sudor provocetur, vel in lecto, vel in laconico totius corporis, effectus sperandi sunt uberiores.

Caveant sibi ab omni terrore, ab ira, ab aqua & igne, à vino, & ne videat Epilepticos cadentes: horum minurum conspectu morbus, qui vel diu latuit, vel jam sopitus erat redire potest. Præterea etiam ab ejaculatione tormentorum. Præcipue verò studiose evitet omnes animi motus vehementes, ebrietatem tanquam pestem fugiat.

Dixit & ceteræ 6. res non naturales convenienti admodum ratione & modo observentur, ne aliquid accadat, quod isti curæ impedimentum aliquod afferre possit.

NB. 1. Ranz virides tantum & non aliæ accipiendæ sunt, & quidem vivæ. 2. hic pulvis Mense Maio, Junio, & Julio usque ad medietatem Augusti tantum cohiberi potest, extra hæc tempora ranz inutiles sunt. 3. Cum exsiccata sunt hepata, ut possint pulverisari, folia brassicæ capitata diligenter sunt segreganda & postea hepata in mortario contundenda. 4. Hic pulvis ultra annum non durat, ideoque singulis annis, si opus est, de novo præparandus.

Vix potest dici quantum emolumenti ab hac medicina simplici accadat. Instituentæ est cura in Junio circa solstitium, & si primo anno non correspondeat effectus, altero anno hæc cura reiteranda. Hoc remedio restitutus est *Fredricus IV. Palatinus*, qui ab anno 15. ætatis ad 26. Epilepticus fuit.

6. Amuletum ex frutice sambuci in salice inventi, i. diligenter observetur, ubinam in salicib. præsertim antiquis subnascatur sambucus, id quod sæpe fit, præsertim, in salicetis, ubi non procul ab iisdem ad hortorum sepes sambucus plantata fuerit. Hic nimirum grana matura ab avibus leguntur præsertim à pico. Picus nimirum excrementa sua post coniecta grana sambuci deponens super salicem antiquam (cui interdum innasci solent aliæ plantulæ vel frutices, nominatim vero Amaradulcis, urtica, Chelidonia) exinde quasi primordia figit & ponit sambuci exinde nascentis. Picus autem quia Epilepsia laborat, hoc nobile periapton ad similem morbum curandum facit. Colligitur frutex quolibet mense, melius tamen in Septembri & Octobri, quando maturaverint grana sambuci ante plenilunium diebus, duobus & reservetur usui (servari potest annos 12.) teneriores saltem furculi sufficiunt.

Ufus talis est: seca furculum unum tenuiorem in taleolas tenues, quantum fieri potest, integras. Earum 9. redigantur in nodulum vel ex luteo, vel ex serico confectum, & cum simplici filo lineo *Darin demselben Hause gesponnen und von dem Patienten*. licet parum referat. Amuletum adpende collo usque ad orinrium ventriculi, ut recte nodulus eo pertingat. Applicata verò huic nodulum post universalia exhibita ad mundificandum corpus quolibet tempore seu ante, seu post paroxysmum. Nodulus relinquatur tamdiu donec sponte sua citra omnem vehementiam rumpatur filum, & nodulus videatur cadere, quem deinceps neque in se pateris, neque ullum animal nudis manibus vel pedibus tangat, sed mediante aliquo instrumento vel forcipe, vel alio sepeliatur subtus terram, eo in loco, ubi neque homines neque animalia pertransire possint. Secus si tetigerit, morbus Epilepticus denno invadet eum: vel alios, antea morbum non passios corripit, id quod studiose est evitandum. Hoc amuleto curati possunt & ii, qui longissimo tempore hoc morbo laborarunt.

A curatione deinceps diligentissime præservandi sunt ab omnibus causis externis, alioquin huic morbo infestis, de quibus diximus in præcedentibus.



Nota: in adultis soleo ex majoribus succulis excavatis facere cannas, per quas tempore gestationis amuleti omnem suum potum hauriunt.

7. Spir. Vitriol. volatilis duplex, de quo in notis ad Crollium (præsertim in adultis.)

8. Laudanum Epilepticorum, de quo in o-  
piologia & infra de Apoplexia.

9. Radix Pœoniæ, maris nimirum, seu nigrae, Nam femina nullius efficacæ, si suspendatur de collo pueri Epileptici, morbus cedit, sed radix effodienda est in Julio Lunâ decrescente, Sole existente in Leone, in meridie & die solari.

10. Viscus quercinus Lunâ decrescente inter duo Mariæ festa, hoc est, 15. die August. & 8. Septemb. collectus; nobilior autem habetur illa pars, quæ quercui propior resecta est.

11. Mixtura Antepileptica, quæ sequam. fit:

℞. Spir. Vitrioli viridis ex Vitriolo & urina puerorum 3j. 3j. cum aqua rad. pœon. & fl. lil. an. 3j.

M. de hac mixtura exhibe in paroxysmo membris convulsis & contortis coch. ʒ. guttatim, & paulo post redibunt ad sese recollectis sensibus, quò animadverso demum aliquid exhibeto, atque ita tertio; quod si quidem reditus sit paroxysmus, ut heri potest, eundem processum repete. Postea confortantia cerebrum adhibeantur, ceu sunt Magist. Corall. perlar. Cranii humani. Multum possunt hæc Tabellæ.

12. Mag. Cranii humani 3j. (quod calcinatum primò, postea per aq. evaporatur pulvis instar magisterii) gran. pœoniæ excortic. m. 16. sacch. in aq. theriacali solut. F. s. a. tabulæ, quarum una atque altera tam manè jejuno ventriculo, quam vespere longè à pastu & coma exhibeantur.

Paroxysmus Epilepticus instans, ut evertatur, æger signa quædam præsentens statim capiat pil. j. laudani antepilept. vel rotulam unam antepilept. aut in horum defectu ol. succini gut. j. & alteram.

Nares autem inungat Balsamo antapoplectico, aut balsamo succini.

Præiens sedatur modo sequenti. Cadentis oricuncus immutendus est, ut apertum maneat, nec linguam commoveat, alta voce inclamandus, nares constringendæ & sternutatorio seq. irritandus.

℞. Rad. ellebori alb. 3j. Castorei, euphorb. ana ʒ ʒ. F. pulvis subtilis etiam fieri potest ex succino albo.

Membra incurvata molliter ad rectitudinem reducenda, fricanda & continenda.

Fauces Extracto castorei, oleo succini aut Mithridatio, Theriaca in aqua Epileptica solutis: nares autem & tempora balsamo apoplectico illinenda.

Et si suspicio sit, eam ob vitiosos humores in ventriculo collectos, & ad caput exhalantes fieri, utile est excitare vomitum cum aq. Benedicta aut Vitriolo albo in aqua pœoniæ, in qua scobs visci quercini bullierit, dissoluta paroxysmo sedato, si metus sit, ut mox revertatur, clysteres acres mijiendi ad avertendos humores acres, aliosque in cerebrum irruentes.

Cucurbitæ item cum scarificatione humeris applicandæ & si plethora adsit, vena secand.

Quò factò ad radicis Epilepticæ excisionem progrediendum, ubi præscripta bona vivendi

regula ad universalem totius corporis evacuationem perveniendum, observatis hac in parte practicanrium regulis. Nonnunquam utile est admiscere purg. utibus Extr. scammonii, aquam benedictam, Extr. Ellebori nigri, & sæpius præparatum corpus purgare Mercurio dulci, Mercurio vitæ, floribus Antimonii.

Hinc ad caput purgia, & ad ea, quæ à proprietate conferunt, accedendum, non neglectis iis, quæ caput exsiccant, & maxime roborant.

Tabulæ Antepilepticæ.

℞. Rad. pœoniæ 3j. magist. perlarum, corallorum an. ʒ i ʒ. magist. crani humani ʒ ʒ. sacch. in aq. liorum tilia soluti q. s.

F. Tabulæ. Detur una atque altera manè jejuno ventriculo & vespere longè à cœna.

Aqua Epileptica. ℞. Fl. lil. convallium M ij. infunde in l. q. Vini generosi, digere per 10. dies, vel donec habere poteris.

Fl. tilia recent. ʒ ʒ. pœoniæ ʒ iv. distilletur in M. B. ad siccitatem, in destillato iterum infunde.

Rad. pœoniæ ʒ j. dictammi albi, visci quercini an. ʒ ʒ. Crani humani præparati ʒ ʒ.

Rad. pyrethri ʒ ʒ. castorei ʒ ij. sol. cutz Mj. flor. stœcados Arabicæ, lavendulæ ana P iv. flor. betonicæ P vj. cubearum, maceris an ʒ ij. cinnamomi ʒ j. scilla præparata ʒ ij.

Digere iterum per 15. dies, hinc per alembicum in M. B. destillatur & aqua usus reservatur. Dosis ʒ ʒ. ad ʒ j.

Clysterem in epilepsia vide in capite seq.

Balsamum vide etiam in capite seq.

*Duo secreta hic bene nota.*

In capite porcino retro aures invenies in utroque latere ossa duo petrosa in quibus cochlea est, Hæc ossa pulverisata & in vehiculo convenienti administrata excellentissimum sunt. specificum in epilepsia, & in interna facie exactam capitis mortui signaturam habent: quæ verò ossicula ex dextro capitis latere maribus, quæ ex sinistro semellis conducunt.

Radix pœoniæ epileptico medetur, cuius effectus in quibusdam qui per 20. annos a prima nativitate laboraverant, probavi. Hoc autem requiritur, quod ignoratur, ut tempore exactiori colligatur. Quando solleonis signum ingreditur, iustum tempus esse putant, sed falso; verum quando sol signum librae, quod circa 12. Septembris erit, ingreditur, effodiatur. Datur ad ʒ j. continuando ad tempus.

Hæc specifica feliciter operabuntur, si per aliquod tempus radiis lunariis fuerint exposita. *Joan. Hartmann. in Praxi Chymiatr.*

Curatio Epilepsie duplex instituitur, alia in paroxysmo, alia extra paroxysmum.

Ad paroxysmi curationem raro vocantur Medici, nisi ipse interdum longius protrahatur, quo in casu conveniunt eadem remedia, quæ pro soporosis affectibus fuere proposita. Præsertim verò aqua apoplectica, cinamomi, aqua vitæ, & alia multum spirituosæ, ad paroxysmi materiam discutiendam efficacissimæ.

Extra paroxysmum curatio varianda est pro varietate causarum. Ac primum Epilepsie idiopathice curatio proponenda est, quæ in totius corporis evacuatione, materię morbose diffusionē, pravæque illius qualitatē emendatio:



vallis ana  $\mathfrak{z}$  iij. sem. & rad. Pzonix maris pulv. ana  $\mathfrak{z}$  ij. Corallii præp.  $\mathfrak{z}$  j. Margarit. pulv. Cranii humani præpar. ana  $\mathfrak{z}$  ij. salis visci quercini  $\mathfrak{z}$  ss. cum f. q. syr. e. Corallii, f. Electuarium; capiat mane & vesperi qu. Nucis Moschat.

℞. Rad. Pzonix maris pulv.  $\mathfrak{z}$  j. seminum ejusdem  $\mathfrak{z}$  ss. visci qu. ungula Alcis, Cranii humani præp. ana  $\mathfrak{z}$  ij. rad. Angelicæ, contrayervæ, serpentariæ virginianæ ana  $\mathfrak{z}$  j. succini albißimi, Corallii calcinat. ana  $\mathfrak{z}$  j. salis visci communis  $\mathfrak{z}$  ij. sacchari candi in f. q. aquæ anti-epilepticæ Langii solut.  $\mathfrak{z}$  viij. f. confectio, capiat bis in die q. Nucis Moschat.

Pulveres isti addito sale succini, & Cornu Cervi cum f. q. Balsami Capiv. formentur in massam pilularem, ejus sumantur 3. vel 4. pilula mane, & vesperi, superbibendo haustum liquoris appropriati.

Vel paretur hujusmodi Elixiris, ejus gurt. 8. ad 10. sumantur bis in die in coenæ Julapii appropriat. superbibendo parum ejusdem.

℞. Vitrioli Hungarici lbj. destillentur in retorta vitrea calore arenæ per horas 24. dein retorta eadem loricata cum recipiente amplo ponatur in furno reverberii, ut spiritus acidi igni fortissimo, quousque exhibuit, urgeantur. Liquor totus extillatus in retorta minori vitrea calore arenæ avocetur, & in matraccio superafundatur rad. Pzonix maris in taleolas sciss. & exiccat.  $\mathfrak{z}$  iv. sem. ejusdem  $\mathfrak{z}$  j. Cranii humani præpar. Ungul. Alcis, coral. rubr. ana  $\mathfrak{z}$  ss. visci qu.  $\mathfrak{z}$  ij. digeratur leni calore per plures dies ad tincturæ extractionem: liquor decantatus avocetur in retorta vitrea ad tertiæ partis remanentiam; extillatus seorsim asservetur: remanentia isti affunde spir. vini rectificatiss. & eorundem ingredientium infusione imprægnati parem qu. & digeratur per 6. dies in timo equino f. Elixir ejus dosiß. ad  $\mathfrak{z}$  j. Liquor extillatus detur à cochleari ss. ad integrum propter easdem intentiones.

Vel paretur oleum ex sale Veneris juxta præscriptum apud Henricum ab Heers, & exhibeatur modo descripto.

Inter remedia specifica quæ (cum superiora non fuerint proficua) etiam tentari debent, habentur ranarum hepata, vesica apri, cum urina exiccata. Rad. Bryonix pul. pul. cuculi, corvorum, coagulum, & pulmo leporis, hepar lupi, lapilli hirundinibus exempti, milvi jecur, ova corvorum inter alimenta, & medicamenta quotidie assumenda, cum multis aliis, quorum catalogus insignis apud Henricum à Bra Medicum Zurphaniensem extat, & e quibus præscripta pro pauperibus, utpote facile, & sine magno pretio parabilia delumi poterunt.

Omnia hujusmodi remedia juxta methodum prædictam intus sumuntur, administrationes quædam exterius adhibita opem contribunt, & in curationis partem merito asciscuntur; quare semper in hoc morbo fontanella, scilicet una aut altera in locis idoneis excitentur, etiam vesicatoria sæpius adhibeantur.

Periaptæ collo suspensa, aut super ventriculi scrobem gestata, ului esse putantur: radices Pzonix recentes in taleolas scissæ, & filo transfixæ in bracteolas formentur quæ toti collo circumduntur; quamprimum exaruerint substituantur novæ, illæque in pulverem intus sumendum redigantur.

℞. Rad. & sem. Pzonix ana  $\mathfrak{z}$  ij. ungula Alcis, cranii humani præpar. ana  $\mathfrak{z}$  j. visci qu.  $\mathfrak{z}$  ss. grosse pulv. in sericum rubrum infuantur & f. sacculus collo suspendendus.

Amuletum ex frutice sambuci in salice inventi valde commendatur.

Convenit nonnullis capillitio derafo Emplastrum incipiti applicari.

℞. Rad. & sem. Pzonix, Castorei, visci quercini, cranii humani tenuissime pulv. ana  $\mathfrak{z}$  j. Emplastri de betonica  $\mathfrak{z}$  ij. caramæ, Tacamahaccæ ana  $\mathfrak{z}$  ij. Balsami Capiv. q. f. f. massa, extendatur super alutam. i. Emplastrum pro futuris capitis.

Tempora & nares sæpius inungantur oleo succini perse, vel cum oleo Capiv. admixto.

Sternutatoria, & Apophlegmatismi horis matutinis quotidiano sint in usu.

℞. Ellebori albi  $\mathfrak{z}$  j. Castorei, Euphorbii ana  $\mathfrak{z}$  ss. Majoranæ odorat. sol. Rut. ana  $\mathfrak{z}$  ij. f. pulv. Decoct. salviæ vel hyssopi cum confectio sine peos in eo solut. ore, & gutture obvolvatur.

Enemata juxta usus exigentiam quandoque injiciantur.

Quandoquidem medicamenta solidiora liquidis interdum dilui, aut hæc illis superbibi debent, in hanc rem præsto sint Aquæ destillatæ, Julapia, decocta, aut tincturæ, quæ virtute quadam contra hunc morbum specifica prædita sunt.

℞. Vitrioli Hungarici lbj. cranii humani recentis pulv.  $\mathfrak{z}$  iv. Rad. Pzonix incis.  $\mathfrak{z}$  vj. simul contulis in mortario affunde vini Hispanici, vel albi tenuioris, vel vini è succo Cerasorum nigrorum in dolio fermentato lbj. destillentur in retorta vitrea calore arenæ.

℞. Rursus ligni Buxi, Vitrioli Hungarici ana lbj. Folior. visci qu. vel communis M. ij. Folior. Rotæ M. ij. simul contulis affunde vini Hispani lbj. destillentur in cucurbita vitrea calore arenæ.

℞. Vitrioli com. lbj. rad. Pzonix maris  $\mathfrak{z}$  vj. visci qu.  $\mathfrak{z}$  j. Juglandum viridium  $\mathfrak{z}$  viij. incis. & contul. destillentur in olla vitreata, alembico vitreo superimposito in calore arenæ.

℞. Hujus liquoris lbj. Aqu. Cerasor. nigr. flor. Tilix ana lbj. sacchari albißimi  $\mathfrak{z}$  iv. misce, f. Julapium: dosiß.  $\mathfrak{z}$  ij. ad iij. bis vel ter in die.

Oxymel scilliticum, item hydromel cum hyssopo incocto ab antiquis plurimum laudantur. Vel hujusmodi Apozema paretur ejus sumantur  $\mathfrak{z}$  iv. ad vi. vel vii. bis in die.

℞. Rad. Pzonix maris, Angelicæ, Imperatoris, Valerianæ ana  $\mathfrak{z}$  vj. folior. Betonicæ, Salviæ, Lili convallis, pulegii ana M. j. sem. Rut. Nigellæ ana  $\mathfrak{z}$  iij. Pzonix  $\mathfrak{z}$  ss. Passular.  $\mathfrak{z}$  iij. Liquiritiæ  $\mathfrak{z}$  ss. incis. & contul. coquantur in aqua fontan. lbj. ad tertiæ partis consumptionem. Circa finem adde vini Cerasor. nigror. lbj. vel  $\mathfrak{z}$  x. f. colatura, quæ servetur in vasis oclusis. Dosiß.  $\mathfrak{z}$  vi. ad vii. bis in die post remedia superius præscripta.

Vel prædicta ingredientia exceptis liquiritia, & passulis coquantur in hydromelitis lbj. ad consumptionem tertiæ partis: dosiß.  $\mathfrak{z}$  iv. ad vj.

Quod si prædicta methodus, cathartico. & specificor. usu constans, aliquandiu tentata prorsus incassum cedit, ad alius generis remedia,



dia, & præsertim ad ista quæ magna dicuntur, devenire oportebit: In hoc centu diaphoretica, salivantia, Theriaca, & Acidula ponuntur.

Alphonſus Ferrus plurimos epilepticos, simplici Guajaci decocto bis in die ad ℥vi. vel viii. præscripto, ejusque decocto secundo, vice potius ordinarii (prout in lue venerea affolet) assumpto, se curasse affirmat si tali decocto radi: Promæ aliæque specifice addantur forsitan efficacior fuerit. Probabile videtur salivationem à Mercurio potenter excitatam, succedente politica dicta sudorifera, hunc morbum certissime esse curaturam. Quid Theriæ aut acidulæ possint, aut propria aut aliorum experientia, mihi nondum innotuit. Experiar forsitan aliquando quid acidulæ nostræ artificiales, scilicet rum ferro, tum Antimonio imprægnatæ per plures dies in magna quantitate assumptæ, circa Epilepsie curationem valebunt.

Post Epilepsiam, velut principem Spasmodum in principe loco, scilicet intra cerebri medullæ excitatum, ceteræ Convulsionum species ordine pertractande occurrunt. Harum differentia a duplici causarum genere & variis utriusque modis, & accidentibus optime desumuntur. Supra ostendimus affectiones quascunque spasmodicas vel a mera spirituum irritatione, vel ab eorum, propter copulæ elasticæ adhæsum, explosione, vel simul ab utroque conjunctione profluere: Quapropter multiplices spasmodorum idæ distingui, ac in classes quasdam distribui possint, prout hanc illamve, aut simul utramque causam in variis *Ætibus* vel appendicis nervosæ locis consistere contingit. Enumvero materies spasmodica, sive spirituum copulæ explosiva potissimum, ac sæpius, per cerebrum, interdum vero & aliquatenus per nervorum extremitates aditum invemens, aut circa nervorum origines, aut medios processus, aut fines extremos subsistit, vel in totis eorum ductibus scaturit, prout inferius speciatim declarabitur: porro irritatio per se, vel cum procataxi prævia convulsionem ciens, licet ubivis in nervoso genere fiat: præcipue tamen, ac frequentius talem effectum circa nervorum principia, medios processus, & plexus, aut fines producit. Ceterum ejusdem generis causa, & effectus alio ritu in infantibus, ac pueris, alioque in adolescentibus & adultioribus habent. Cum itaque singulas convulsionum species particulatim considerare statutum fuerit, imprimis de moribus Convulsivis infantum ac puerorum distemus.

Infantes, & pueros affectibus spasmodicis tentari passim, & tam frequenter accidit, ut hæc præcipua, & fere unica convulsionum species statuatur; non ejusmodi symptomata in adultis aliis insigniuntur nonnibus, atque ad Epilepsiam, passiones hysterica, hypochondriacam, colicam aut etiam ad scorbutum referri solent; in pueris vero quasi *motus convulsivi* appellantur.

Super his observare est, circa duo potissimum tempora pueros convulsionibus maxime obnoxiosos reperiri, scilicet intra primum à partu mensem, & circa dentium eruptiones: Quamquam hujus morbi insultus etiam aliis temporibus, & quibuscumque aliis de causis non raro eveniant.

Primo igitur sæpenumero accidit infantulos recens natos, aut saltem nondum bimestres, crebra vice spasmodis in diversis partibus excitatis affici. Quippe oculorum inversiones, genarum, & labiorum distorcionem, aut tremores, quinimo tendinum contractiones, membrorum, & non raro totius corporis subsultus, & concussiones subitæ eos infestant; eundemque affectum etiam præcordia nonnunquam afficere hinc sit plane liquet, quod dum spasmi, rursus & membra exteriora occupant, etiam à sanguine in corde, & pulmonibus una contractis stagnante, facies modo pallorem, modo livorem contrahit. Cum itaque in pueris spasmi tres corporis regiones intestare soleant; nempe capitis & faciei partes, membra, & artus exteriores, atque præcordia & viscera; observamus modo has, modo illas, modo binas, aut simul omnes regiones à causa morbifica occupari, nempe prout eadem aut circa nervorum origines aut extremitates dehiguntur; & cum prius horum accidit, prout medullæ oblongatæ pars superior, media, aut minima spinalis, scilicet unica aut plures simul à causa morbifica impetuntur.

Quod verò spectat ad ceteras hujus affectus causas, nempe procataxicas, & evidentes; quæ prioris generis sunt, in his duobus præcipue consistunt primo quod infantibus *Ætibus* valde sint imbecillia, & viscosa humiditate scateant; nempe cerebrum minus firmum, atque nervorum tonus valde laxus, ne leviores quidem cujusvis materis impetus sustinere possint, quin spiritus eorum incolæ, etiam à proprio, quo istæ partes irrigantur, liquore, paululum modo immoderatio affluerit, aut saltem copiosior quam pro tantilli roboris modulo, facile in motus irregulares, sive spasmos incitantur. Attamen secundo quoniam observatione constat, puerulos nec solos, nec omnes qui tenuioris sunt constitutionis in hunc morbum proclives reperiri; idcirco pro potiore procataxi eos morbidæ ratione haberi debet, quod infantibus quibuscumque, propter mala ab utero contracta, & sanguis, & succus nervosus originaliter vitiosi existunt: quippe recens natis massa sanguinea per plures retro menses eventilatione carens impurior evadit; quapropter plerisque infantibus brevi à partu efflorescentia latæ & rubicundæ morbillorum instar per totam cutem erumpunt; cujusmodi *æstus* si impeditur, aut reprimitur, sæpenumero aphthæ periculosa circa oris partes succedunt. Hinc merito suspicamur tales sanguinis impuritates quandoque in cerebrum & nervosum genus, utpote debiliora suffundi, & propterea spasmodicas affectiones oriri; nempe dum sanguis ab utero vitiosus exillens depurare se fatagit, feculentias suas, efflorescentia in cutem facta exterminari solitas, in caput transfert; quare latex modo tenuis & serosus, modo crassior & viscidus, ac uterque salium & sulphurum præternaturalium particeps intra hos, aut illos cerebri, cerebelli, atque medullæ oblongatæ recessus, & cavitates deponuntur, cujusmodi recrementa cum nervi hujus aut illius, ac interdum una plurium origines, aut caudices obsident, spiritibus eorum incolis particulas heterogeneas, atque in explosiones spasmodicas aptas



aptas affigunt. Quamprimum enim nervi tales particulas altius imbiberunt, spiritus eorum copula onusti, aut sponte sua, aut à causis evidentibus incitati, eam elidere, & excutere sagunt: proindeque explosiones spasmodicas ineunt.

Causæ evidentes, quæ in puerulis prædispositis motus convulsivos inferunt, sunt bimæ generis, scil. primo quæcumque sanguinis effervescencias solito majores cient, uti sunt frigoris & caloris excessus, nutritio uberior, aut julto calidior; aeris, ac aëris nationes, ac imprimis inuentionum periodi: etenim propter has, aliasque similes occasiones sanguis plus debito effervescens copulam heterogeneam spiritibus uque ad plenitudinem citius attingit; utque ab ipsis perturbatis e vestigio elidatur & explodatur, efficit. Secundo, irritatio fere in qualibet systematis nervosi parte dispositionem ipsamodicam non raro in actum deducit: quare non modo qualitatum tangibilium excessus exterius insitit, verum & ac in ventriculo coagulatum, bilis, aliique humores acres, aut etiam vermes intestini vellicantes ipsos excitare solent: porro hujusmodi causæ evidentes, siquidem fortiores sunt, aliquando per se, absque diutius præterea affectu spasmodico, inducunt; quippe lubrici, forte & acres humores puerulis quibusvis, saltem tenerioribus motus convulsivos inferunt.

Quo certius atque ad sensum pateret cujusmodi in motibus convulsivis sit materies morbifica, plurimum quos hic morbus oppressit, defunctorum cadavera aperui: causam intra coctionis viscera & primas vias semper frustra quæsi. Multorum capitibus latex serosus intra cavitatem cerebello subjectam congestus, & membranarum, qua medulla oblongata investitur distendens, nervorum origines inundabat: in quibusdam nulla hujus morbi vestigia apparebant: adeo quod spiritibus accrescens, eos ad explosiones irritat: interdum imperceptibili prorsus constat mole, & originem tam occultam habet, ut vel perspicacissimum visus scrutinium omnino lateat. Olim in hac urbe cujusdam mulieris nati plures ex hoc morbo interierunt; tandem fœtus quarti intra mensem, uti priores, interempti caput dissecurimus; nulla hic serosa colluvies ventriculos inundabat, sed cerebri tantum, ejusque appendicis substantia erat julto humidior, & laxior: quod potissimum observatu dignum erat, in cavitate quæ cerebello subicitur, supra medullæ oblongatæ caudicem, sanguis grumosi, & velut concreti copiam insignem reperiebamus: at verò incertum est utrum materies isthæ ibidem ab initio deposita spasmos primario intulerat; an potius sanguis iste à partium circumcirca contrahente contractione expressus, & extravasatus, convulsionum effectus, & productum, ac minime istarum causa fuerit. Nam & in Apoplecticis ejusmodi hæmomenon passim occurrit: quod tamen morbi effectum potius quam causam esse posthæc ostendimus.

Profecto quod particula heterogenea, quæ sanguini ab utero innata, in plerisque pueris per totum in toto corpore cutaneam amandari solent, in aliis capiti suffusa, affectionis spasmodicæ causa materialis existunt, præter

rationes superius citatas, etiam à remediis maxime juvantibus inferre licet: quippe in puerulis hæreditario huic morbo obnoxii, insultus convulsivi optime præcaventur, si mox à partu fontanella in nuca excutatur, & sanguis hærudinum suctu è venis jugularibus detrahatur; illa namque succi nervosi corruptela subducuntur, atque hoc cruoris efflorescentiæ impura à capite aocantur: hisce administrationum modis, cum prius duo aut tres ejusdem parentis nati brevi post partum convulsivi interissent fœtus, omnes alii ab eodem nulo liberabantur.

2. Hæc de puerorum motibus convulsivis, qui mox à partu, propter labem ab utero contractam eos infestare solent. Quod si hæc vice aut ipsum morbum, aut saltem mortiferas ejus plagas evaserint; nihilominus circa dentitionis tempora eidem periculo denuo obnoxii reperiuntur: quando enim dentes, præsertim majores, e gingivis erupturi sunt, sæpe febris excitatur, cui non raro motus convulsivi adiunguntur. Et licet hoc tempore infantes viribus plus valeant, eoquæ morbi insultus melius quam recens uari tolerant; attamen affectiones spasmodicæ etiam nunc, nec graviore aliqua occasione excitantur valde periculosa, ac interdum lethales existunt.

Quandoquidem autem pueri qui circa dentitionem febricitant, non omnes motibus convulsivis tentantur; ideo sequitur hujus morbi dispositionem quandam, sive innatam, sive acquisitam præcedere, atque dolorem à dentitione illatum tantum causæ evidentis fortioris rationem habere; scil. pueri, quibus aut cacochymicis, aut cerebri & nervosi generis constitutione debiliore præditis, spiritus animales, vel adulterati, vel dissipabiles nimis existunt, in affectiones spasmodicas quandoque ineundas disponuntur: quare cum dolor admodum auctus una cum febre urget, dispositio illa latens in actum ducitur.

Si hic inquiratur, qua ratione febris, & dein qua motus convulsivi in prædispositis dentitioni superveniunt; dicendum erit quod uterque affectus ad dolorem velut causam in medietatem refertur debet: In nobis ipsis experitur quis sit cruciatus qui irritationem circa dentium radices sequitur; revera tantus & tam atrox, ut excitari vix possit atrocior; quippe nervorum quinti paris una aut altera insignis propago ad cujusque dentis radicem pertingit, quæ cum a sanguinis, aliorumve humorum particulis acerbis illic congestis vellicatur, corrugatione sua acerrimum molestiæ sensum, sive dolorem infert. Istiusmodi autem hujus nervi vellicatio in pueris dentientibus ideo contingit, quia dentibus jam in majorem molem crescentibus, & adhuc intra gingivas vixdum cavatas inclusis, membrana & libræ quaquaversus distenduntur: hinc sanguis in circuitu præpeditus tumorem infert adeoque nervos comprimit, quin & aciores feri particulas iis suffundit, quibus illi insigniter vellicati corrugationibus, & spasmis dolorificis torquentur.

Cum itaque pueris dolores ita atroces à dentitione contingunt, nihil mirum est si febres, ac etiam motus convulsivi interdum succedant: prior horum accidit & quatenus sanguis circa partem dolentem, ne subito atque æquabili cur-



in circuletur impeditus, propterea in toto corpore inordinatus movetur; & insuper quia ipsius alicubi in nervoso genere excitatis, nervi corrugati & contracti arterias comprimunt & convellunt, proindeque in sanguine fluctuationes irregulares & febriles concitant. Ceterum motus convulsivi dentitioni aliquando superveniunt, cum quia sanguis effervescens, particulas heterogeneas regimini animali sustulit, adeoque spiritus in explosiones ciet; tum præterea cum dolor iste acutus, & velut lancinatio dentes erupturos sequuta sensum valde molestum ac irritativum à partibus affectis *si nervi dentitionis* communicet, exinde ita per eosdem nervos, vel alios affines excandescentiæ motus (qui ob dispositionem præviam non raro convulsivus evadit) retorquetur.

Præter has binas (quæ in pueris præcipue, & crebriores esse solent) motuum convulsivorum occasiones, scilicet prima infantie, & dentitionis tempora; affectus iste etiam aliis temporibus, & propter alias causas sæpenumero excitatur: in quibus enim dispositionis spasmodicæ semina jaciuntur, illa interdum aut statim à partu se explicant, ac in morbidis fructus maturantur, sed aliquando latitantia dentitionem modo præveniunt, modo eam è longinquo sequuntur; & propter causas evidentes alias, scil. vel internas, vel externas, cujusmodi sunt nutritrix invaletudinaria, aut præguans, lac in ventriculo coagulatum, aut in putrilagine acidam, aut amarâ degenerans, intemperies febrilis, capitis, aliarumque partium ulcera, aut exanthemata subito evanescentia, æris mutationes, solis, ac lunæ *Aspectus* aut aspectus oppositi, & similia, tandem incerto eventu in actum erumpunt. Super his non opus est ut particulatim differamus.

Cum viri cujusdam in hac vicinia degentis, nati omnes intra trimestre spatium convulsi interierint; tandem ad præcavendum in puerulo recens edito eiusmodi fatalem eventum, remedia expectantur: Post aliquot à partu dies accersitus, consulo ut imprinis fontanellæ in nucha excitetur; dein postmodum ut hirudine utriusque lateris venæ jugulari applicata, sanguis ad 3 ij. extrahatur; insuper ut juxta singulas solis & lunæ *Aspectus* & aspectus oppositos, per tres dies mane, & vespere pulveris sequentis circiter gr. v. exhiberentur e cochleari Julepii.

℞. Cranii humani præparat. rad. Præoniz maris, ana 3j. Margar. pulv. 3ß. sacchari albißimi 5j. misce, f. pulvis subtilissimus.

℞. Aq. Ceras. nigror. 3 iij. anti-epilepticæ Langii 3j. syrup. de floribus Præoniz maris 3vj. misce; item præcepi ut nutritrix iisdem temporibus medicis sumeret haustum feri lactis, cui sem. & rad. Præoniz maris & sol. Liliæ convallis incocta sunt. Infans per quatuor circiter menses bene valebat, tunc vero affectibus convulsivis tentari cœpit: quo tempore iisdem remediis in dosi majori tum infanti, tum nutritrici adhibitis, vesicatoria etiam pone aures applicabantur, & hirudinum suctu sanguis ex utraque vena jugulari fuit detractus: Intra duos, vel tres dies puer convalescit: postea cum intra 4. vel 5. menses spasmi aliquoties redirent, eorundem usque remedium usu sanabatur. Post sequentiam affectiones, convulsivæ penitus cessa-

bant: atramen circa infimam spinæ dorsæ partem tumor indolens succrevit, à quo vertebra-rum distortio quædam, atque crurum imbecillitas, & demum palsyis inducebantur. Videtur in hoc casu, quod materies spasmodica primo cerebrum, & nervorum principia impetere solita, ultimo spinalem medullam subiens, inque extremitatem ejus detrusa nervorum appendicum capita omnino obstrueret, atque spiritibus transitum præcluseret: nimirum quia particulis explosivis aliæ narcotica & crassiores sese adjunxerant.

*Methodus Therapeutica contra affectiones Convulsivas in pueris.*

In pueris ac infantibus passiones spasmodicas, aut imminentes præcavere, aut jamjam exortas curare incumbit.

Nam si ejusdem parentis nati priores Convulsionibus obnoxii fuerint, malum illud ceteris post natis tempestivo remedii rum usu præveniri debet: in hunc finem solenne est tactui recens edito, quamprimum spirare incipit, medicamentum aliquod *anarapudis* ori ingerere: hinc nonnulli guttas quasdam mellis purissimi, alii cochleare vini canarini saccharo in buti, quin & alii oleum amygdal. r. dul. recens extractum exhibere solent; à quibusdam olei succinici gutta i. aut aqua epileptica semicochleare infunditur.

Præter hæc prima infantum libamina, quæ certè nullius non momenti esse videntur, alia quædam remedia, & administrationum modi in usum ascisci debent: scil. bis in die propinetur cochlear i. liquoris huic affectui appropriati. c. g.

℞. Aqu. Cerasor. nigror. Rutæ, ana 3j. ß. Anti-epilepticæ Langii 3j. syr. e Corallis 3vj. Magar. præpar. gr. xv. misce in phiala. Die tertio aut quarto post partum excitetur fontanella in nucha, dein si vultus sit floridi, parum sanguinis ad 3j. ß. vel ij. e venis jugularibus hirudinum suctu extrahatur, cavendo ne inter dormiendum sanguis copiose nimis effluat; tempor., & cervix blande fricentur tali linimento.

℞. Olei Nucis Moschat. per expressionem 5ij. C. pivii 3ij. succini 5j. Periaprum ex radicibus, & seminibus Præoniz maris, addito parum ungulæ alcis collo suspendatur.

Porro medicamenta antispasmodica nutritrici quotidie exhibeantur: sumat mane, & vespere haustum feri lactis, cui rad. & sem. Præoniz maris & sem. feniculi. dul. incocta sunt.

℞. Conserv. flor. Betonicæ, Præoniz maris, Antios, ana 3ij. pulv. rad. & flor. Præoniz maris ana 3ij. Coralli rubri præparat. succini albißimi, ana 3j. rad. Angelicæ, Zedoariæ præparat. ana 3ß. cum s. q. syrupi de Præonia f. Ele. Quarium: capiat q. Nucis Moschatæ mane & vespere.

℞. Pulveris rad. Præoniz maris 5ij. sem. ejusdem 3j. f. Pulvis, sacchari albidum solut. in aq. florum Tilie & ad tabulat. cocti 5 iij. Olei succini 5j. f. s. artem Tabulat. singulæ pendant 3ß. Comedat i. hora qualibet sexta. Illa etiam exacta victus ratione utatur.

Quod si infans quispiam Convulsionibus ætati afficitur, quia fontanella minus, & tardius operatur,



ratur, vesicatorium in nucha, aut pone utramque aurem applicari expedit, & nisi temperamentum frigidius obstat, sanguis hirudinum suctu venis jugularibus extrahatur: Linimenta circa tempora, nares, & cervicem, item plantis pedum emplastra admoveantur; enemata quæ alvum copiose subducunt quotidie injiciantur: Porro sæpius in die, nempe sexta aut octava qualibet hora, remedia specifica intus sumantur.

℞. Olei Capivi, Castorei, una ʒij. succini ʒʒ. f. linimentum.

℞. Emplastri Oxycroci p.ij. Galbani solut. p. j. Olei succini ʒj. t. Emplastrum pro plantis pedum. Pulvis de gutteta juxta descriptionem Riverii exhibeatur bis vel quater in die.

℞. Cranii humani præparat. sem. Præoniz, unguis Alcis, Margarit. præpar. ana ʒʒ. Ambra griseæ gr. vj. f. Pulvis. Dosis gr. vj. in cochleari liquoris infra scripti, ter aut quater in die.

Vel ℞. Cranii humani præparat. Margarit. ana ʒʒ. salis succini ʒj. sacchari perlati ʒj. Dosis ʒʒ.

Vel ℞. Spir. Cornu Cervi gutt. iij. detur sexta vel octava qualibet hora in cochleari julepii infra præscripti.

Pauperum natis exhibeatur pulv. radicis Valerianæ sylvestris ʒʒ. ad ʒj. detur bis in die in cochleari lactis, vel liquoris appropriati.

Untzeus valde commendat fel catelli lactantis, nempe ut totus succus cysti fellea exemptus puerulo cum pauxillo aquæ florum Tiliæ propinetur.

Nuper mihi retulit Medicus Eruditus se novisse plures hoc remedio curatos: Porro solent empirici pueris majoribus, post fel epotum, etiam catelli hepar assatum comedendum tradere.

Julepia, aquæ destillatæ, aliique liquores appropriati juxta præscripta sequentia parari possunt.

℞. Aq. Cerasor. nigror. ʒij. Anti-epilepticæ Langii ʒj. sacchari perlati ʒij. misce.

℞. Rad. Præoniz maris recent. in taleolas scissarum ʒvj. Vitrioli Hungarici ʒviii. Cranii humani ʒij. Aqu. Anti-epilepticæ Langii lbʒ. Misce, & destillentur in retorta vitrea calore arenæ. Dosis cochlear j. ad ij.

℞. Rad. Præoniz maris recent. incis. ʒiv. contusis in mortario marmoreo affunde vini Hispanici lbj. f. expressio fortis, adde manus Christi perlata ʒʒ. servetur in vitro occluso. Dosis cochlear j. vel ij. bis in die.

Cum ob dentitionem difficilem motus convulsivi eveniunt, symptomata hoc quemadmodum secundarium & minus periculosum existit, ita in Therapeia non semper primam aut præcipuam exigit medendi operam, sed nonnunquam de dolore sedando, & intemperie febrili summovenda potius solliciti sumus; quare & patiens, & nutrix victu tenui & refrigerante uti debent: dentibus erupturis gingivarum aut frictione, aut sectione exitus patefiat, quin & partibus istis intumefactis & dolentibus anodyna applicentur: Enemata, & sanguinis detractio non raro hic locum habent: somnum conciliare, & sanguinis ferociam attemperare decet: interim remedia Antispasmodica usurpentur, verum temperatiora, & quæ sanguinem, & humores minus exagitant: vesicatoria, quia

serum in caput nimis suffundi aptum evacuant, sæpe juvenien conferunt.

Quando pueri nec statim à partu, neque ob dentes erupturos, sed propter alias occasiones, & accidentia moribus Convulsivis tenentur; talis affectionis causa ut plurimum vel in capite, vel alicubi circa coctionis viscera subsistit. Quando prioris suspicio habetur, uti liquere solet à signis quæ colluviem serosam intra iuxta prædictum nimis congestam arguunt, remedia superius citata in paulo majori dosi exhiberi debent; insuper in istis qui catharsin beneferunt, interdum vomitus, & levis purgatio instituantur: vinum & oxymel scilliticum, item Mercurius dulcis, Rhabarbarum, & resina Jalap. egregii sunt usus.

Quoties affectionis spasmodicæ causa in visceribus subesse videtur, aut lumbrici, aut acres humores ventris tormina cientes in vicioprehenduntur.

Contra Lumbricos purgatio ex Rhabarbaro, aut Mercurio dulci, addita resina Jalappæ instituitur. Olim puero convulsionibus intermitte affecto, ut jamjam moribundus videretur, dosin Mercurii dulcis cum resina Jalappæ exhibui; cum alvi dejectionibus, quas 4. habuit, lumbricos 12. excrevit, & derepente convulvit.

℞. Rad. Serpentariæ virginianæ pulv. ʒj. Corallii ad albedinem calcinati ʒʒ. f. Pulvis, dosis ʒʒ. ad ʒj. bis in die per tres dies continuos, superbibendo decoctum rad. graminis.

℞. Specier. Hieræ ʒʒ. Theriacæ Vener. ʒij. f. Emplastrum pro abdomine, vel Emplastrum ex Galbano applicetur umbilico.

Si motus convulsivos à ventriculi, & intestinorum irritatione per acres humores facta, procedere suspicamur, lenis catharsis, aut vomitu, aut secessu, aut successive utroque institui debet. In hunc finem blanda emetica ex vino scillitico, aut sale vitrioli propinentur; si quando scilicet laborantes vomendi nixu sponte tentantur: sin evacuatio potius tentanda videbitur, Rhabarbari infusio, aut pulvis, syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro, aut rosarum cum agarico propinari debent: & non raro hisce remediis tempestive adhibitis, affectionem convulsivam in pueris sanatam vidi: Porro in hoc casu enemata sunt crebri usus: Caterum non opittantur medicamenta externa. scilicet fotus, linimenta, aut emplastra abdomini applicanda.

℞. Folior. Camomillæ minutim incis. M. ij. includantur duobus sacculis è lino tenui aut ferico confectis, qui lacti calido intincti & expressi abdomini successive applicentur.

℞. Summitates, aut flor. malvæ pariter incis. incoquantur butyro recenti, vel sevo porcino, & sub forma linimenti aut cataplasmatiss ventri applicentur.

Hæc fusè, ingeniosè ac doctè *Clarissimus Willisus*: Quibus subnectimus vim illam explosivam in spiritus animales cerebri incolas, à particulis effertis undecunque demum advenientibus inductam, quam pro causâ Epilepsiæ proximâ habet, non ita omnibus attridere, quin contra cum hac in parte vehementer insurgat *Doctissimus ac Politissimus Meniorius*, dum Dissertatione sua Pathologica de Epilepsia sic habet. Scripsit nuperrimè Medicus *op. 1142 p. 1142* studio.



studiosissimus, cornicumque oculos, ut in proverbio est, nitens coningere, epilepsiam oriri spiritibus animalibus ad instar ignescentis pulveris pyrii intra cerebrum a materia nitrosulphurea subito rarefactis, indeque in systema nervosum effrante ac inordinate explosis, à quibus tensi muscoli involuntarie contrahuntur. Sed novum illud opinionis commentum retellere perfacile est; nam musculos usque adeo tensos, etiam potiori jure, quam in palpitationibus sensibilibus dilatari necesse esset, qui tamen nullatenus videntur intumescere. Deinde in febribus ardentissimis, ac potissimum in mania & phrenitide, spiritus animales flammescunt & quantum ferre potest eorum natura, rarescunt circa epilepsiam; sicque patet nullam spiritibus animalibus cum tormentario pulvere accenso similitudinem intercedere, nec præcipitem comitialium casum rite ædificio comparari, quod substrati pyrii pulveris ignitione non diruitur modo, verum etiam extra locum in quo steterat, dimovetur; corruentes enim epileptici partes quidem varie ac violenter jaciunt, sed in alium locum toto corpore non proficiunt, nec instar crepitantis tubuli catapulæ huc illucque saltitant. Hæc Memorius, cujus rationes quam solidæ sint, penes lectorem judicium relinquimus.

Remedia quod attinet antepileptica sequentia suadet Clar. Dan. Ludovici. Qui pulveris nostri bezoardici albi, succini albi præparati, cinnabarisque nativæ selectioris ana miscuerit & adultis quidem ad ʒʒ. infantibus autem unguiculis, ad gr. iij. iv. vj. natu minoribus dimiduihorum, curative repetendoque dederit, ac pro indicantium ratione (præmissis aut interpositis emeticis aut laxativis) modò volatilia urinosæ (spiritum C.C. Armoniaci simpl. &c.) modò essentiam succini; camphoræ, castorei, tincturam corallior. antimon. &c. modò præcipitantia alia, imprimis ligantia illa ex Opio circumspicte superaddiderit, multum utique proficiet. Lactantibus autem non solum hæc, verum etiam in reliquis inquietudinibus, torminibus, vomitibus, diarrhæis &c. admodum confert pulvis antepilepticus anodynus, e pulveris bezoardici albi nostri ʒvi. succin. alb. præp. ʒiij. cinnabar. nativ. ʒiv. & laudan. opiat. nostri ʒj exacta mixtura compositus, trimestrique ad gr. j. &c. exhibitus. Bezoardicum autem suum parat, dum a mercurio vitæ communi sextuplum boni spiritus nitri per arenam ad siccitatem perfectam abstrahit; pulvere residuo (citra consuetam hic cohobiam, ulterioresve ignitiones, ac citra nimias grati ac innocentis aëoris elutiones) sat validò atque securò. Si nitri spirit. levior sit, oportet addere nitri crudi an. ad mercurii vitæ pondus. De cætero compendiosius adhuc cum croco metallorum similiter proceditur, si pariter boni spiritus nitri sextuplum ad siccitatem inde abstrahatur. Pulvis hinc elegans priori ponderosior, securissimus & eximie diaphoreticus est. Elegantiorrem adhuc habebit qui sulphur antimonii auratum simili sextupli abstractione in albidissimum pulverem fixarit. Laudanum verò ita paratur.

ʒ. Extract. opii part. 1. extract. croci & cinnabar. nativ. aut saltem corallior. an. part. 1. *Haec enim Ludovici. Medicus quidam apud no-*

stros olim celebris præmissis universalibus cochineæ pulveratæ grana iv. ex aquis appropriatis, per tres ultimos lunæ dies mane jejunò ventriculo epilepticis exhibebat, hocque simplici medicamento plures a lævissimo morbo liberabat. Sequens vinum ab eodem etiam commendabatur.

ʒ. Sem. peron. mar. ʒiij. rad. enulæ ʒi ʒ. fol. labin. rutæ, hyssopi, salvia min. flor. calth. in medio nigra, major. abrotan. aneth. nepethæ, rosimar. pedis leonis, baccar. juniper. an. m ʒ. Theriacæ, Mithridati an. ʒij. pyrethi. ʒj. Bulliant omnia, exceptis electuarius, in vini albi generosi lb xii. in vase ferri novo, probè lutato, ad consumptionem duarum tertiarum. Tum colentur, & in colaturâ dissolve electuaria. Dos. ad ʒiij. vel iv. pro ratione virium. Ambulet æger post assumptum hoc vinum, spiritum subinde contineat, & aures oburet cotone hoc decocto imbutò, nec comedat aut bibat, nisi post duas aut tres horas. Decoctum hoc per novem dies continuos manè sumi debet, ubi morbus non est inveteratus. At si ante decem annos incepit, continuare oportet per dies quadraginta, interpositis purgantibus, ex hellebori nigri, & peronæ extractis, paratis.

Continuò jam pergeremus ad Curationes epileptiæ e variis Autoribus tradendas. sed in illius absolutiorem cognitionem & explicationem adducenda prius veniunt, quæ super hoc argumento ordine Geometrico accuratissimè profert. *Laurentius Bellini in suo de morbis capitis tractatu. Sic itaque ille.*

#### *Epilepsia Antecedentia sunt.*

Animi, & corporis insueta conturbatio, capitis gravitas, cephalalgia, vertigo, vigilæ, aut piusculus somnus, a quo nullum levamen emergit, insomnia turbulenta, mentis corpor, vel anxietas, obliuio, mœlitia, pavor, formido, segnities, artuum gravitas; saltus, & tremores membrorum, sensuum hebetudines, obtusus definitus, scintillæ oculis obversantes, & interdum nubeculæ, aut nymphyges, hoc est, splendores coruscationibus similes: aurium tinnitus, sædi odoris perceptio, lingua inuexilis, aut ejus inordinata motio, oscitatio, sterminatio: cordis palpitatio, iracundia, pectoris constrictio, mutata respiratio: cibi fastidium, aut appetitus immodicus, nausea molesta, cardialgias, seu oris ventriculi morsus: salivæ per os effusum, urinx tenues & crudæ, pollutio nocturna frequentior, faciei pallor, præcordiorum inflatio.

#### *Conjuncta.*

Cum perfecta Epilepsia sensuum omnium internorum, & externorum interceptio, subitus collapsus, totius corporis, aut partium aliquot varia concussio, oculorum prominentia, stridor dentium, respiratio suffocatoria, qualis i quoque suspensis: seminis, stercoreis, urinx involuntaria profusio: ad finem insultus spuma per os, & nares: ad finem paroxysmi ægro sui compote ante arctatum rerum nulla memoria, aut cognitio. Cum imperfecta autem capitis solum, vel brachii, vel tibie, aut femoris, vel dimidii corporis concussio interceptis sensibus omnibus, vel sal-



va etiam mente, & quibusdam voluntariis motibus, nempe aliquorum partium alius præter voluntatem concussis. Cum idiopathica mentis torpor, tarditas, memoriæ immutatio, insomnia turbulenta, sensuum hebetudo, gravitas, & segnities, capitis dolor, optima renquarum partium corporis habitudo, paroxysmi subitus sine ulla ægri præsentione intuitus. Cum sympathica nulla cerebri affecti signa, imitantis paroxysmi perceptio, ut cuiusdam rei velut aliunde e corpore ascendente ad instar uræ; vitium ali cuius partis, vel symptoma aliquod gravius tempore invasionis: sic à ventriculo cibi fastidium, inedia difficilis tolerantia, nausea, dolor, aut erosio, punctio, aut distensio ventriculi, cordis etiam aliquando palpitatio per consensum. A jecore, & liene flatuum frequens, & copiosa excretio, ventris inflatio, rugitus, borborismi, ructus acidus, præcordiorum molesta coarctatio, eorundem dolor interdum ad ulique dorsum, vitia in partibus abdominis. Ab utero hysterica passio, cum convulsionibus epilepticis conjuncta, mensium, aut seminis retentio. Ab aliqua partium externarum aura quædam frigida ab eadem illa parte veniens, & excurrens ad cerebrum vellicans, titillans, quæ imminenti paroxysmi nuncia est, qui prohibetur, si illa pars vinculo constringatur. Facit huius auræ idem Galenus hunc in modum de Epileptico loquens puero tredecenni. *Audio igitur tum narrante puero dispositionem ipsam ex illius initium capere, mox illinc recta ascendere perferamur, & superposita ipsi illa, ac per latera ad cervicem, donec ad caput perveniret, quod cum primum tangeret, ipsum haud quaquam sibi constare, interrogantibus autem Medicis, quale esset id, quod ferebatur ad caput, nihil habuit puer, quod responderet. Alius deinde adolescens compos mentis, quippe qui scire poterat & sentire quod fiebat, & alteri narrare, dicebat, veluti frigidam quandam auram esse id, quod ascendeat. Hactenus ille.* A lunaticis anhelitus, fœtor acidus, feces cineritæ, stridor dentium, membrorum tremor, terror, & clamor subitus in somno, narium pruritus, & frictio, salivæ nocturno præsertim tempore ex ore effluxus, facies pallida, subito incallescens, ac rubens, morsus, ac dolor stomachi, & intestinorum, inde frequens abdominis contrectatio, ejusdem insolita durities, rugitus, ac tormena ventris, membrorum atrophica, tussis sicca, singultus, vermium cum alvi excrementis egestio, quod est præcipuum, & maxime tutum. Est autem epilepsia aliquando cum abscessu conjuncta, ossis carie, urinæ suppressione, & similibus, quæ ex se ipsis innotescunt.

#### *Succedentia.*

*Epilepsia quibus ante pubertatem contingit, curationem recipit: quibus post vigesimum quintum annum eos fere comitatur ad mortem usque, ait Hippocrates quinto Aphor. 7. Ubi notabis, à plurimis Medicis aliquatenus damnari Hippocratem quod Epilepticos post 15. annum laborare incipientes non curari asservit, quasi Hippocrates dixerit nunquam curari. alius verò damnari penitus, cum tamen ipse asserat apertissime, fere nunquam, aut plerumque non curari, ut ex Græcis verbis manifestum est. Apoplexia, vel*

Mors in ipso paroxysmo, divulsio partium cerebri per concussione, ita ut procerum manillarum particula aliquando per nares sint redditæ, inquit Riverius, (quomodo autem reddentur, si nullus patet exitus?) Melancholia, Paralytis, Quartana, quæ superveniens, ac diu perseverans morbum solvit. *Juvenes epilepsia laborantes mutatione præcipue animi, regionis, & vultus liberantur, inquit Hipp. 2. Aph. 45.*

Quod est ad convulsionem apoplexia, idipsum est epilepsia ad motus convulsivos, quin in hac affectione plurima reperiuntur, quæ Apoplexiæ etiam conveniunt, Caro, Comati, Letargio, aliisque affectionibus capitis jam explanatis, ita ut nihil sit opus diutius immorari in explicatione sive præcedentium, sive conjunctorum, sive succedentium, cum eorum singula vel in aliis morbis superioribus jam explicata sint, vel tam facile pateant, ut ulteriori explicatione non indigeant. Aura autem illa in Epileptico Galeni patet ex iis, quæ ostendimus de rigore, & horrore, nisi quod ibi solum de frigore sermonem habuimus: hic fieri fortasse potuit, ut non solum frigus fuerit id, quod ascendebat, sed quid aliud irritans, atque fermentans, & hoc ipsum etiam sine frigore conjuncto: sed hoc ipsum frigus succederet ex necessitate ejus vel fermentationis, vel irritationis ut ex eodem horrore, & rigore patet: Ex ejus autem vehementia, ac subita agendi vi evadebat puer ille sui impos, ubi primum aura illa cerebrum attingebat, quæ si in aliis fuerit mitior, atque segnior, mente alienare non poterit, ut in rigoribus, & horroribus febrium &c. sive autem a sola materia irritante, ac solo frigore sive ab aliquo fermento res proveniat, sive scilicet à causa solum vehementer concutiente, & in tremorem agente nervos, seu mutante contentum liquidum, prohiberi poterit, ac debet insultus epilepticus injecto vinculo parti auram mittenti, per vinculi enim constrictionem impeditur tam ascensus materiæ corporeæ, quam protensio tremoris, ut patet. Itaque fieri poterit, ac debet Epilepsia non à sola materia acris, irritante &c. sed ab omnibus causis, à quibus excitari possunt motus convulsivi, quos ostendimus superius produci posse, ac debere pluribus modis, adeoque erit Epilepsia concussio totius, vel aliquorum partium corporis cum sensuum omnium, & voluntarii motus ablatione producta a quacunque causa, à quibus convulsivi motus produci possunt: & idiopathica erit, cum causa illa primario vigeat in cerebro, sympathica, cum eo perducitur ab aliis partibus. Hinc deduces, epilepsiam illam, quæ pueris tam familiaris est, eosque invadit fere subito ab excludione, cum adhuc humidissimi sunt, & fere muellaginei toti, provenire posse, immò re ipsa forte provenire frequentius à simia humiditatis copia, qua scitent, quàm ab acris humoribus, qui vellicent, & irritent; certe enim in illa humorum crassitie, qua nostrum singuli scatemus primis vitæ nostræ mensibus, vix quicquam acris, ac stimulantis contineri posse videtur, & si quid stimulantis, atque acre generatur, an non plurimum retundi, ac temperari debet ab eadem crassiorum humorum copia, & proinde levem stimulum imprimere partibus illius corpori, quæ



quæ sunt adhuc tam teneræ, ut vix sibi ipsis hæteant, nedum sint rigide, ac maxime tenses, cuiusmodi esse debent, ut acrem sensum concipiant? Lac corruptum potest quidem acceſcere, atque ideo stimulare heri, sed non temperabitur ab abundantia humidi in puero? Eto autem, nec temperari possit in pueris aliquibus, id sane heri debet in paucioribus, aut saltem non in plerisque, quemadmodum tamen pueros tantum non omnes epilepsia vexari continue videmus. Ex epilepsia autem difficile evadunt pueri, si sint admodum parvi, hoc est, recens nati, cum per violentas illas concussiones partes corporis adhuc teneri divelli possint, præcipue autem cerebri vix dum confluentis, quod proinde vel divellitur a suis partibus, vel dissolvitur quasi in lachrylam, & facile morietur puer. Verosimilius igitur erit, Epilepsiam in pueris a copia pituitolarum materierum, & pressione potius oriri, quam a stimulo, vel saltem illam esse frequentiorē.

Illud autem aniadvertendum est, num Epilepsia a Vermibus proveniat a sola irritatione in partibus ventriculi, & intestinorum, unde valdi refluxus, &c. an a materia humoribus permixta; cum etenim vermes supponantur, igitur datur materies eorum generationi apta, & chyli materies cum ipsorum excrēmentis miscetur, & ejus aliquid ab iis in cibum assumitur, unde vitari aliquatenus poterit, atque ita vitata, si in vasa trahatur, dabit suspicioni locum, num Epilepsia ab ipsa potius, quam ab irritatione, an ab utraque simul proveniat. Hactenus *Clariss. Laurentius Bellini*, jam videamus.

*Curationes, Consultationes, Observationes  
& Anatomica inspectiones  
ex variis.*

*Curationes.*

Epilepsia & similes morbi, qui a paroxysmorum vehementia & perniciē infames sunt, duplicem habent indicationem. 1. quæ paroxysmum respicit, 2. quæ ipsas morborum radices.

1. Aqua vitæ Mulierum (*Weiber aqua vitæ*, alias balsamus Embryonatus. Vide *Pharmac. August.*) propinata prægnanti mensura cochl. j. cum spiritus Antepileptici nostri gut. iij. vel iv. singulis mensibus semel in Novilunio a mense quarto ad partum usque factum ab Epilepsia præservat: præmissa illa majoris securitatis ergo datur hic pulvis.

2. Spinam dorſi vitæ mustelæ non coctæ, sed crudæ a capite ad caudam probe mundatam & exsiccatam, eamque pulverisā, hujus pulveris.

℞. Et magist. Corall. & perlar. an. ʒ ij. M. Dosis quantum cultelli mureto capit, in pulpa poni assati.

11. præservantur pueri ab Epilepsia, vel prorsus liberantur, ne unquam succedente ætate tali passione capiantur, si recens jam natis antequam lac sugant vel cibum comedant, ingeratur ol. amygd. dulcium recens cum saccharo lino permixtum utriusque sit a ʒ β. ad ʒ ij. vel ʒ iij. Sic enim ubi paulisper a sumpto hoc abstergivo quieverint.

℞. Stercus de Vacca nigra adhuc calidum, indatur olla nova, & calcinetur, de quo exhibetur ʒ j. vel ʒ β. modo nato infanti, (Electoris Saxonia secretum) tandem evomunt pituitosam admodum copiam impuritatū in utero materno ante exitum collectarum, quæ impuritates sunt c. usq. multorum morborum in pueris, non inatim vero Epilepsia. Quod si non evomunt, per alvum saltem purgantur demiceps ul i b. lincantur aliquandiu & in primis per tempus puerperii coq. in B. cortices salicis recentes. Sic nimirum non ab Epilepsia tantum, sed etiam a tæbe præservantur (specificum in aridura puerorum.)

Spir. Antepilepticus puerorum [vide not. ad Croll.] Cujus gutt. 6. s. 9. cum aquis Epilepticis flor. tiliz, radic. præmiz, aq. lucundinam, cerasorum, Lavendulæ. It. cerasorum nigrorum cum aq. Langii Epileptica exhibita tum in paroxysmo, tum etiam post eundem mirifice puerorum morbum tollunt, præsertim, si in p. mo paroxysmo exhibeatur.

Expertus sum in puerulo duorum, ni fallor, annorum, qui continuos fere convulsivos paroxysmos patiebatur, excellentiam spiritus laus armoniaci, de quo, frustra tentatis aliis remediis gr. 4. tantum in aq. flor. tiliz exalib. m. statimque convulsiones cessarunt, post horam eandem dosim repeti, quæ puer optime convaleuit & jamdum valet. Sal autem volatilis urinz longe præstantius est, præsertim, si cum calce lunæ sublimatur, quæ tum de mure præstat id, quod ipsi alias adscribitur. vid. præm. n. cam Chymiatr. cap. 3. pag. 44. & 45.

In Epilepsia adultorum 1. Præmittantur Universalia Vomitiva, Cathartica, in primis Specificum purgans Paracelsi. Postea exhibeantur Specifica, qualia sunt.

(Urgentia in epilepsia meliora non invenies, quam Mercurialis E. gr. Mercurium dulcem, præcipitatum album &c. formula potest esse talis.

℞. Mercurii præcipitati albi ʒ β. Trochisc. alhandal vel resinæ Jalapp. gr. 3. Mass. pil. de succin. craton. ʒ β. c. q. f. Essent. Castor. f. Præparat. quarum usus continuandus ad aliquod tempus.)

2. Epilepticum Crollii.

3. Pulvis Antepilepticus ex Cinnab. Antim. qui talis est.

℞. Cinnab. Antim. magist. Coral. perl. ana: Alms.

℞. Cinnab. nativi pellucidi & splendentis ʒ β. pulverisā in marmore subtilissimē: adde magist. Corall. perl. ana ʒ ij. Croci ʒ j. tol. aur. diligenter triti, super lapidem, reduc. in pulverem, cujus gr. 7. ad 18. in aq. saliv. propinentur & sæpius repetatur. Vide supra de sudoriferis.

Alius pulvis Epilepticus magnarum virium.

℞. Cinnabaris Ungarici probe loti & depurat. 16 β. imbibere cum spir. vitæ. ʒ iv. scobis cranii humani nunquam sepulti ʒ β. imbibere cum spiritu vini, relinque in loco calido per 15. dies & postea per retortam destilla liquorem, & illud, quod restat, seorsim serva hinc.

℞. Scobis Ungulæ alcis ʒ β. Myrrhæ rubræ ʒ β. solve in sp. salis, solutum a scobibus separa & serva postea.



2. Croci ꝑss. cum sp. vini tincturam extrahe, liquores omnes simul misce & in eis imbebe cinabarin ante preparatam, lotam & pulverisatam. calore lento semper exsiccando, donec omnem liquorem imbiberis & in pulverem siccum abierit. dosis à gr. 2. ad 4. cum vino generoso aut sp. vini vel aq. antepileptica, in ante, & post paroxysmum.

3. Spiritus cerebri humani, qui sic fit.

26. Cerebrum hominis juvenis integri, bene sani ( adolescentis infra annum 24. & bonæ constitutionis violenta morte perempti, collige frustulatim cum omnibus membranis, arteriis, venulis & nervis cum medulla spinæ tota, conquassa in mortario lapideo, & adde in cucurbita vel phiala potius capaci aquarum capitulum scil. flor. liliz, pzoniz, betonicæ, cerasorum, lavendulæ in primis, adde diaphoretici in acutis ad supereminentiam 4. vel 5. digit. (plus quàm de reliquis simplicibus aquis; adtunt etiam spir. v.) claudatur hermetice vas, & relinquatur aliquandiu. per annum 1. 2. 3. &c. postea per cohobia destillatur ex B. coris, ut tota ( aliquota ) cerebri substantia simul transeat. Hanc aq. abjectis facibus curiose serva. Et facibus post sextuplex cohobium calcinatis elice sal, quem deinceps cum sp. facto junge, & totum curiose serva. Dos. à ʒj. ad iij. in vehiculis convenientibus.

NB. Si initio non addita est mistura simplex propter defectum; postea phlegmate per B. leniter abstracto, adde misturæ simpl. partem dimidiam, & procede, ut monitum est. Dos. à ʒj. ad iij.

5. Hepata Ranarum, quæ sic parantur: Collige hepata de ranis viridibus aquaticis non terrestribus 40. quibus vivis jecinora exime & sigillatim pone supra folia brassicæ capitata ad eam partem, quæ terram respiciunt, ita ut se invicem contingant, postea in ollis devitreatis & recentibus ( *Irden: Bratpfanne* ) superius tectis, exsiccantur ad lentum ignem, ita ut in pulverem tenuissimum teri possint, à solis cautius separata. Postea divide pulverem integrum in 5. partes æquales & serva.

Partem unam exhibe patienti præmissis universalibus jejuno ventriculo in haustulo aquæ vel spiritus appropriati, cum Luna ingressa est in cancro; Vesperis duobus horis à cœna alteram partem, atque sic consequenter postero die mane tertiam, vespere quartam; tertio die ultimam partem mane.

Ubi tamen observandum, semper ante & post sumptionem pulveris 2. horis ab omni cibo & potu esse abstinendum. Si patiens præsertim adultus, post sumptam hanc medicinam in fronte & temporibus sudat, est testimonium operationis exquisitæ. Itaque si post 3. 4. & quintam exhibitionem sudor provocetur, vel in lecto, vel in laconico totius corporis, effectus sperandi sunt uberiores.

Caveant sibi ab omni terrore, ab ira, ab aqua & igne; à vino, & ne videat Epilepticos cadentes: horum nimirum conspectu morbus, qui vel diu latuit, vel jam sopitus erat redire potest. Præterea etiam ab ejaculatione tormentorum. Præcipue verò studiosè evitet omnes animi motus vehementes, ebrietatem tanquam pessent fugiat.

Dieta & cæteræ 6. res non naturales convenienti admodum ratione & modo observentur, ne aliquid accadat, quod isti curæ impedimentum aliquod asserre possit.

NB. 1. Ranz virides tantum & non aliz accipiendæ sunt, & quidem vivæ. 2. hic pulvis Mense Majò, Junio, & Julio usque ad medietatem Augusti tantum coñchi potest, extra hæc tempora ranz inutiles sunt. 3. Cum exsiccati sunt hepata, ut possint pulverisari, folia brassicæ capitata diligenter sunt segreganda & postea hepata in mortario contundenda. 4. Hic ~~remedio~~ annum non durat, ideoque singulis annis, si opus est, de novo præparandus.

Vix potest dici quantum emolumenti ab hac medicina simplici accadat. Instituendæ est cura in Junio circa solstitium, & si primo anno non correspondeat effectus, altero anno hæc cura reiteranda. Hoc remedio restitutus est Fredericus IV. Palatinus, qui ab anno 15. ætatis ad 26. Epilepticus fuit.

6. Amuletum ex frutice sambuci in salice inventi, diligenter observetur, ubinam in salicib. præsertim antiquis subnascatur sambucus, id quod sæpe fit, præsertim, in salicetis, ubi non procul ab iisdem ad hortorum sepes sambucus plantata fuerit. Hic nimirum grana matura ab avibus leguntur præsertim à pico. Picus nimirum excrementa sua post conjecta grana sambuci deponens super salicem antiquam ( cui interdum innasci solent aliz plantulae vel frutices, nominatim vero Amara dulcis, urtica, Chelidonia ) exinde quasi primordia figit & ponit sambuci exinde nascentis. Picus autem quia Epilepsia laborat, hoc nobile periapton ad similem morbum curandum facit. Colligitur frutex quolibet mense, melius tamen in septembri & Octobri, quando maturerant grana sambuci ante plenilunium diebus, duobus & reservetur usui (servari potest annos 12. ) teneriores saltem furculi sufficiunt.

Usus talis est: seca furculum unum tenuiorem in taleolas tenues, quantum fieri potest, integras. Earum 9. redigantur in nodulum vel ex linteo, vel ex serico confectum, & cum simplici filo lineo *Dar in demselben Hause gesponnen und von dem Patienten*. licet parum referat. Amuletum adpende collo usque ad orificium ventriculi, ut recte nodulus eo pertingat. Applica verò hunc nodulum post universalia exhibita ad mundificandum corpus quolibet tempore seu ante, seu post paroxysmum. Nodulus relinquatur tamdiu donec sponte sua citra omnem vehementiam rumpatur filum, & nodulus videatur cadere, quem deinceps neque in se patiens, neque ullum animal nudis manibus vel pedibus tangat, sed mediante aliquo instrumento vel forcipe, vel alio sepeliatur subtus terram, eo in loco, ubi neque homines neque animalia pertransire possint. Secus si tetigerit, morbus Epilepticus denovo invadet eum: vel alios antea morbum non passos corripit, id quod studiosè est evitandum. Hoc amuleto curati possunt & ii, qui longissimo tempore hoc morbo laborarunt.

A curatione deinceps diligentissime præstemandi sunt ab omnibus causis externis, alioquin huic morbo infestis, de quibus diximus in præcedentibus.



Nota: in adultis soleo ex majoribus furculis excavatis facere cannas; per quas tempore gestationis amuleti omnem suum potum hauriunt.

7. Spir. Vitriol. volatilis duplex, de quo in notis ad Crollium (præsertim adultis.)

8. Laudanum Epilepticorum, de quo in o-piologia & infra de Apoplexia.

9. Radix Pœonia, naris nimirum, seu nigra, Nam femina nullius efficacior, si suspendatur de collo pueri Epileptici, morbus cedit, sed radix effodienda est in Julio Lunâ decrescente, Sole existente in Leone, in meridie & die solari.

10. Viscus quercinus Lunâ decrescente inter duo Mariæ festa, hoc est, 15. die Augusti & 8. Septemb. collectus; nobilior autem habetur illa pars, quæ quercui propior resecta est.

11. Mixture Antepileptica, quæ sequim. fit:

℞. Spir. Vitrioli viridis ex Vitriolo & urina puerorum ʒj. ʒj. cum aqua rad. pœonia & statil. an. ʒj.

M. de hac mixtura exhibe in paroxysmo membris convulsis & contortis cochl. ʒ. guttatim, & paulo post redibunt ad sese recollectis sensibus, quò animadverso denuo aliquid exhibeto, atque ita tertio; quod si quidem rediturus sit paroxysmus, ut fieri potest, eundem processum repete. Postea confortantia cerebrum adhibeantur, seu sunt Magist. Corall. perlur. Crani humani. Multum possunt hæ Tabellæ.

℞. Mag. Crani humani ʒj. (quod calcinatum primò, postea per aq. evaporatur pulvis instar magisterii) gran. pœonia excortic. nu. 16. sacch. in aq. theriacali solut. F. s. a. tabulæ, quatum una atque altera tam manè jejuno ventriculo, quam vespri longè à pastu & cœna exhibeantur.

Paroxysmus Epilepticus instans, ut evectatur, æger signa quædam præsentens statim capiat pil. j. laudani antepilept. vel rotulam unam antepilept. aut in horum defectu ol. succini gut. j. & alteram.

Nares autem inungat Balsamo antapoplectico, aut balsamo succini.

Præiens sedatur motu sequenti. Cadentis oricuncus immittendus est, ut apertum maneat, nec linguam commoveat, alta voce inclamandus, nares constringendæ & sternutatorio seq. irritandus.

℞. Rad. ellebori alb. ʒj. Castorei, euphorb. ana ʒʒ. F. pulvis suffusus etiam fieri potest ex succino albo.

Membra incurvata molliter ad rectitudinem reducenda, fricanda & continenda.

Fauces Extracto castorei, oleo succini aut Mithridatio, Theriaca in aqua Epileptica solutis: nares autem & tempora balsamo apoplectico illinienda.

Et si suspicio sit, eam ob vitiosos humores in ventriculo collectos, & ad caput exhalantes fieri, utile est excitare vomitum cum aq. Benedicta aut Vitriolo albo in aqua pœonia, in qua scobs visci quercini bullerit, dissoluta paroxysmo sedato, si metus sit, ut mox revertatur, Clysteres acres injiciendi ad avertendos humores acres, alioque in cerebrum irruentes.

Cucurbitæ item cum scarificatione humeris applicandæ & si plethora adsit, vena secand.

Quò factò ad radicis Epilepticæ excisionem progrediendum, ubi præscripta bona vivendi

regula ad universalem totius corporis evacuationem perveniendum, observatis hac in parte practicanum regulis. Nonnunquam utile est admiscere purgantibus Extr. scammoni, aquam benedictam, Extr. Ellebori nigri, & sæpius præparatum corpus purgare Mercurio dulci, Mercurio vitæ, floribus Antimonii.

Hinc ad caput purgia, & ad ea, quæ à proprietate conferunt, accedendum, non neglectis iis, quæ caput exsiccant, & maxime roborant.

Tabulæ Antepileptica.

℞. Rad. pœonia ʒj. magist. perlarum, corallorum an. ʒi ʒ. magist. crani humani ʒʒ. sacch. in aq. liorum tilia soluti q. s.

F. Tabulæ. Detur una atque altera manè jejuno ventriculo & vespri longè à cœna.

Aqua Epileptica. ℞. Fl. lil. convallium M ij. infunde in s. q. Vini generosi, digere per 10. dies, vel donec habere poteris.

Fl. tilia recent. ʒʒ. pœonia ʒiv. distilletur in M. B. ad siccitatem, in destillato iterum infunde.

Rad. pœonia ʒj. dictamni albi, visci quercini an. ʒʒ. Crani humani præparati ʒʒ.

Rad. pyrethri ʒʒ. castorei ʒij. sol. cutæ Mj. flor. stœcados Arabicæ, Lavendulæ ana P iv. flor. betonica P vj. cubebatum, maceris an ʒij. cinnamomi ʒj. scilla præparatæ ʒij.

Digere iterum per 15. dies, hinc per alembicum in M. B. destillatur & aqua usui reservatur. Dos ʒʒ. ad ʒj.

Clysterem in epilepsia vide in capite seq.

Balsamum vide etiam in capite seq.

*Duo secreta hic bene nota.*

In capite porcino retro aures invenies in utroque latere ossa duo petrosa in quibus cochlea est, Hæc ossa pulverulata & in vehiculo convenienti administrata excellentissimum sunt, speciem in epilepsia, & in interna facie exactam capitis mortui signaturam habent: quæ vero ossicula ex dextro capitis latere maribus, quæ ex sinistro semellis conducunt.

Radix pœonia epileptico medetur, cujus effectus in quibuidam qui per 20. annos a prima nativitate laboraverant, probavi. Hoc autem requiritur, quod ignoratur, ut tempore exactiori colligatur. Quando solleonis signum ingreditur, iustum tempus esse putant, sed falsò; verum quando sol signum libra, quod circa 11. Septembris erit, ingreditur, effodiatur. Datur ad ʒj. continuando ad tempus.

Hæc specifica feliciter operabuntur, si per aliquod tempus radiis lunaribus fuerint exposita. Joani. Harthmanni. in Praxi Chimiæ.

Curatio Epilepsia duplex instituitur, alia in paroxysmo, alia extra paroxysmum.

Ad paroxysmi curationem raro vocantur Medici, nisi ipse interdum longius protrahatur, quo in casu conveniunt eadem remedia, quæ pro soporosis affectibus fuerunt proposita. Præsertim verò aqua apoplectica, cinamomi, aqua vitæ, & alia multum spirituosæ, ad paroxysmi materiam discutendam efficacissima.

Extra paroxysmum curatio varianda est pro varietate causarum. Ac primum Epilepsia idiopathica curatio proponenda est, quæ in totius corporis evacuatione, materiæ morbificæ discussionem, præterque illius qualitatis emendatio:



vallis ana  $\frac{3}{4}$  iij. sem. & rad. Pzonix maris pulv. ana  $\frac{3}{4}$  ij. Coralli præp.  $\frac{3}{4}$  j. Margarit. pulv. Cranii humani præpar. ana  $\frac{3}{4}$  ij. salis visci quercini  $\frac{3}{4}$  ss. cum f. q. syr. e Corallus, f. Electuarium; capiat mane & vespere qu. Nucis Moschat.

24. Rad. Pzonix maris pulv.  $\frac{3}{4}$  j. seminum ejusdem  $\frac{3}{4}$  ss. visci qu. ungulae Alcis, Cranii humani præp. ana  $\frac{3}{4}$  ij. rad. Angelicæ, contrayervæ, serpentariæ virginianæ ana  $\frac{3}{4}$  j. succini albiissimi, Coralli calcinat. ana  $\frac{3}{4}$  j. salis visci communis  $\frac{3}{4}$  ij. sacchari candi in f. q. aquæ anti-epilepticæ Langii solut.  $\frac{3}{4}$  viij. f. confectio, capiat bis in die q. Nucis Moschat.

Pulveres isti addito sale succini, & Cornu Cervi cum f. q. Balsami Capiv. formentur in massam pilularem, cujus sumantur 3. vel 4. pilulæ mane, & vespere, superbibendo haustum liquoris appropriati.

Vel paretur hujusmodi Elixiris, cujus gutt. 8. ad 10. sumantur bis in die in cochleari Julapii appropriat. superbibendo parum ejusdem.

25. Vitrioli Hungarici lbj. destillentur in retorta vitrea calore arenæ per horas 24. deia retorta eadem loricata cum recipiente amplo ponatur in furno reverberii, ut spiritus acidi igni fortissimo, quousque exibunt, urgeantur. Liquor totus extillatus in retorta minori vitrea calore arenæ avocetur, & in matraccio superafundatur rad. Pzonix maris in taleolas scissæ, & exiccet.  $\frac{3}{4}$  iv. sem. ejusdem  $\frac{3}{4}$  j. Cranii humani præpar. Ungul. Alcis, coral. rubr. ana  $\frac{3}{4}$  ss. visci qu.  $\frac{3}{4}$  ij. digeratur leni calore per plures dies ad tincturæ extractionem: liquor decantatus avocetur in retorta vitrea ad tertiæ partis remanentiam; extillatus seorsim asservetur: remanentia isti affunde spir. vini rectificatiss. & eorundem ingredientium infusione imprægnati parem qu. & digeratur per 6. dies in fimo equino f. Elixir cujus dosi  $\frac{3}{4}$  ss. ad  $\frac{3}{4}$  j. Liquor extillatus detur à cochleari  $\frac{3}{4}$  ad integrum propter easdem intentiones.

Vel paretur oleum ex sale Veneris juxta præscriptum apud Henricum ab Heers, & exhibeatur modo descripto.

Inter remedia specifica quæ (cum superiora non fuerint proficua) etiam tentari debent, habentur ranarum hepata, vesica apri, cum urina exiccata. Rad. Bryonix pul. pul. cuculi, corvorum, coagulum, & pulmo leporis, hepar lupi, lapilli hirundinibus exempti, milvi jecur, ova corvorum inter alimenta, & medicamenta quotidie assumenda, cum multis aliis, quorum catalogus insignis apud Henricum à Bra Medicum Zutphaniensem extat, & e quibus præscripta pro pauperibus, utpote facile, & sine magno pretio parabilia desumi poterunt.

Dum hujusmodi remedia juxta methodum prædictam intus sumuntur, administrationes quædam exterius adhibita opem contribuant, & in curationis partem merito asciscuntur; quare semper in hoc morbo fontanella, scilicet una aut altera in locis idoneis excitentur, etiam vesicatoria sæpius adhibeantur.

Periapta collo suspensa, aut super ventriculi scrobem gestata, usui esse putantur: radices Pzonix recentes in taleolas scissæ, & filo transfixæ in bracteolas formentur quæ toti collo circumdantur; quamprimum exaruerint substituantur novæ, illæque in pulverem intus sumendum redigantur.

26. Rad. & sem. Pzonix ana  $\frac{3}{4}$  ij. ungulae Alcis, cranii humani præpar. ana  $\frac{3}{4}$  j. visci qu.  $\frac{3}{4}$  ss. grosse pulv. in sericum rubrum insuantur & f. sacculus collo suspendendus.

Anuletum ex trutice sambuci in salice inventi valde commendatur.

Convenit nonnullis capillitio derafo Emplastrum sinepiti applicari.

27. Rad. & sem. Pzonix, Castorei, visci quercini, cranii humani tenuissime pulv. ana  $\frac{3}{4}$  j. Emplastri de betonica  $\frac{3}{4}$  ij. carannæ, Tacamahaccæ ana  $\frac{3}{4}$  ij. Balsami Capiv. q. f. f. massa, extendatur super alutam. f. Emplastrum pro suturis capitis.

Tempora & nares sæpius inungantur oleo succini perse, vel cum oleo Capiv. admixto.

Sternutatoria, & Apophlegmatismi horis matutinis quotidiano sint in usu.

28. Ellebori albi  $\frac{3}{4}$  j. Castorei, Euphorbii ana  $\frac{3}{4}$  ss. Majoranæ odorat. fol. Rut. ana  $\frac{3}{4}$  ij. f. pulv. Decoct. salviæ vel hyssopi cum confectioe sinapeos in eo solut. ore, & gutture obvolvatur.

Enemata juxta usus exigentiam quandoque injiciantur.

Quandoquidem medicamenta solidiora liquidis interdum dilui, aut hæc illis superbibere debent, in hanc rem præsto sint Aquæ destillatæ, Julapia, decocta, aut tincturæ, quæ virtute quadam contra hunc morbum specifica prædita sunt.

29. Vitrioli Hungarici lbj. cranii humani recentis pulv.  $\frac{3}{4}$  iv. Rad. Pzonix incis.  $\frac{3}{4}$  vj. simul contusis in mortario affunde vini Hispanici, vel albi tenuioris, vel vini e succo Cerasorum nigrorum in dolio fermentato lbj. destillentur in retorta vitrea calore arenæ.

30. Rasure ligni Buxi, Vitrioli Hungarici ana lbj. folior. visci qu. vel communis M. ij. folior. Rotæ M. ij. simul contusis affunde vini Hispani lbj. destillentur in cucurbita vitrea calore arenæ.

31. Vitrioli com. lbj. rad. Pzonix maris  $\frac{3}{4}$  vj. visci qu.  $\frac{3}{4}$  j. Juglandum viridum  $\frac{3}{4}$  viij. incis. & contus. destillentur in olla vitreata, alembico vitreo superimposito in calore arenæ.

32. Hujus liquoris lbj. Aquæ Cerasor. nigr. flor. Liliz ana lbj. sacchari albiissimi  $\frac{3}{4}$  iv. misce, f. Julapium: dosi  $\frac{3}{4}$  ij. ad iij. bis vel ter in die.

Oxymel scilliticum, item hydromel cum hyssopo incocto ab antiquis plurimum laudantur. Vel hujusmodi Apozema paretur cujus sumantur  $\frac{3}{4}$  iv. ad vi. vel v. ii. bis in die.

33. Rad. Pzonix maris, Angelicæ, Imperatoriz, Valerianæ ana  $\frac{3}{4}$  vj. folior. Beronicæ, Salviæ, Lili convallis, pulegii ana M. j. sem. Rut. Nigellæ ana  $\frac{3}{4}$  iij. Pzonix  $\frac{3}{4}$  ss. Passular.  $\frac{3}{4}$  iij. Liquiritiæ  $\frac{3}{4}$  ss. incis. & contus. coquantur in aqua fontanæ lbj. ad tertiæ partis consumptionem. Circa finem adde vini Cerasor. nigror. lbj. vel  $\frac{3}{4}$  x. f. colatura, quæ servetur in vasis occlusis. Dosi  $\frac{3}{4}$  vi. ad vii. bis in die post remedia superius præscripta.

Vel prædicta ingredientia exceptis liquiritia, & passulis coquantur in hydromelitis lbj. vi. ad consumptionem tertiæ partis: dosi  $\frac{3}{4}$  iv. ad vj.

Quod si prædicta methodus, cathartico. & specificor. usu constans, aliquandiu tentata prorsus incassum cedit, ad aliud generis remedia,



dia, & præsertim ad ista quæ magna dicuntur, devenire oportebit: In hoc cenlu diaphoretica, salivantia, Theriaca, & Acidula ponuntur.

Alphonsus I certius plurimos epilepticos, simplici Guajaci decocto bis in die ad ʒvi. vel viii. præscripto, ejusque decocto secundario, vice potus ordinarii (prout in lue venerea attolet) assumpto, se curasse affirmat si tali decocto rad. Prunæ aliæque specifica addantur forsitan efficacior fuerit. Probabile videtur salivationem à Mercurio potenter excitatam, succedente postea diata sudorifera, hunc morbum certissime esse curaturam. Quid Theriaca aut acidula possint, aut propria aut aliorum experientia, mihi nondum innouit. Experiat forsitan aliquando quid acidula nostræ artificiales, scilicet tum ferro, tum Antimonio imprægnatæ per plures dies in magna quantitate assumptæ, circa Epilepsie curationem valebunt.

Post Epilepsiam, velut principem Spasmodum in principe loco, scilicet intra cerebri medullæ excitatum, ceteræ Convulsionum species ordine pertractande occurrunt. Harum differentia a duplici causarum genere & variis utriusque modis, & accidentibus optime desumuntur. Supra ostendimus affectiones quascunque spasmodicas vel a mera spirituum irritatione, vel ab eorum, propter copulæ elasticæ adhæsum, explosione, vel simul ab utroque conjunctim provenire: Quapropter multiplices spasmodorum idæ distingui, ac in classes quasdam distribui possint, prout hanc illamve, aut simul utramque causam in variis *partibus* vel appendicis nervosæ locis consistere contingit. Eumvero materies spasmodica, sive spirituum copulæ explosiva potissimum, ac sæpius, per cerebrum, interdum vero & aliquatenus per nervorum extremitates aditum inveniens, aut circa nervorum origines, aut medios processus, aut fines extremos subsistit, vel in totis eorum ductibus scaturit, prout inferius speciatim declarabitur: porro irritatio per se, vel cum procataxi prævia convulsionem ciens, licet ubivis in nervoso genere fiat: præcipue tamen, ac frequentius talem effectum circa nervorum principia, medios processus, & plexus, aut fines producit. Cæterum ejusdem generis causa, & effectus alio ritu in infantibus, ac pueris, alioque in adolescentibus & adultioribus habent. Cum itaque singulas convulsionum species particulatim considerare statutum fuerit, imprimis de morbis Convulsivis infantum ac puerorum diserteemus.

Infantes, & pueros affectibus spasmodicis tentari passim, & tam frequenter accidit, ut hæc præcipua, & fere unica convulsionum species statuatur; nunc ejusmodi symptomata in adultis aliis insigniuntur nominibus, atque ad Epilepsiam, passiones hystericam, hypochondriacam, colicam aut etiam ad scorbutum referri solent; in pueris vero quasi *motus convulsivi* appellantur.

Super his observare est, circa duo potissimum tempora pueros convulsionibus maxime obnoxiosos reperiri, scilicet intra primum a partu mensem, & circa dentium eruptiones: Quamquam hujus morbi insultus etiam aliis temporibus, & quibusdam aliis de causis non raro eveniant.

Primo igitur sæpenumero accidit infantulos recens natos, aut saltem nondum bimetros, crebra vice spasmi in diversis partibus excitatis affici. Quippe oculorum inversiones, genarum, & labiorum distorsiones, aut tremores, quinimo tendinum contractiones, membrorum, & non raro totius corporis subsultus, & concussiones subita eos inestant; eundemque affectum etiam præcordia nonnunquam afficere hinc sat plane liquet, quod dum spasmi rursus & membra exteriora occupant, etiam a sanguine in corde, & pulmonibus una contractis ita guante, facies modo pallorem, modo livorem contrahit. Cum itaque in pueris spasmi tres corporis regiones inestare soleant; nempe capitis & faciei partes, membra, & artus exteriores, atque præcordia & viscera; observamus modo has, modo illas, modo binas, aut simul omnes regiones a causa morborum occupari, nempe prout eadem aut circa nervorum origines aut extremitates deligitur; & cum prius horum accidit, prout medullæ oblongatæ pars superior, media, aut minima spinalis, scilicet unica aut plures simul a causa morborum impetuntur.

Quod verò spectat ad exteras hujus affectus causas, nempe præcatæricas, & evidentes; quæ prioris generis sunt, in his duobus præcipue consistunt primo quod infantibus *ita* & *ita* valde sint imbecillia, & viscosa humiditate scateant; nempe cerebrum minus firmum, atque nervorum tonus valde laxus, ne leviores quidem cujusvis materis impetus sustinere possint, quin spiritus eorum incolæ, etiam a proprio, quo istæ partes irrigantur, liquore, paululum modo immoderatio affluerit, aut saltem copiosior quam pro tantilli roboris modulo, facile in motus irregulares, sive spasmos incitantur. Attamen secundo quoniam observatione constat, puerulos nec solos, nec omnes qui tenuioris sunt constitutionis in hunc morbum proclives reperiri; idcirco pro potiore præcatæricos morborum ratione haberi debet, quod infantibus quibusdam, propter mala ab utero contracta, & sanguis, & succus nervosus originaliter vitiosi existunt: quippe recens natis massa sanguinea per plures retro menses eventilatione carens impurior evadit; quapropter plerisque infantibus brevi a partu efflorescentiæ latæ, & rubicundæ morbillorum instar per totam cutem erumpunt; cujusmodi *eruptio* si impeditur, aut reprimitur, sæpenumero aphtharum periculosa circa oris partes succedunt. Hinc merito suspicamus tales sanguinis impuritates quandoque in cerebrum & nervosum genus, utpote debiliora suffundi, & propterea spasmodicas affectiones oriri: nempe dum sanguis ab utero vitiosus existens depurare se fatigat, sæculentias suas, efflorescentia in cutem facta exterminari solitas, in caput transfert: quare latex modo tenuis & serosus, modo crassior & viscidus, ac uterque salium & sulphurum præternaturalium particeps intra has, aut illos cerebri, cerebelli, atque medullæ oblongatæ recessus, & cavitates deponuntur; cujusmodi recrementa cum nervi hujus aut illius, ac interdum una plurium origines, aut caudices obsident, spiritibus eorum incolis particulas heterogeneas, atque in explosiones spasmodicas aptas



aptas affigunt. Quamprimum enim nervi tales particulas altius imbibebunt, spiritus eorum copulati onusti, aut ponte sua, aut à caulis evidentibus incitati, eam elidere, & excutere satagunt: proindeque explosiones spasmodicas ineunt.

Causæ evidentes, quæ in puerulis prædispositis motus convulsivos inferunt, sunt bini generis, scilicet primo quæcumque sanguinis effervescencias solito majores cient, uti sunt frigus & caloris excessus, nutritio uberior, aut julto calidior; aeris, ac aëris mutationes, ac imprimis lunationum periodi: etenim propter has, aliasque similes occasiones sanguis plus debito effervescens copulam heterogeneam spiritibus usque ad plenitudinem citius attingit; utque ab ipsis perturbatis e vestigio elidatur & explodatur, efficit. Secundo, irritatio tere in qualibet systematis nervosi parte dispositionem spasmodicam non raro in actum deducit: quare non modo qualitatem tangibilem excensus exterius influit, verum & ac in ventriculo coagulatum, bilis, aliique humores acres, aut etiam vermes intestina vellicantes ipsos excitare solent: porro hujusmodi causa evidentes, liquidem fortiores sunt, aliquando per se, abique diuturni præterea, affectus spasmodicos inducunt; quippe umbrici, forte & acres humores puerulis quibusvis, saltem tenerioribus motus convulsivos inferunt.

Ogo certius atque ad sensum pateret cujusmodi in motibus convulsivis sit materies morbifica, plurimum quos hic morbus oppressit, dysfunctionum cadavera aperui: causam intra coctionis viscera & primas vias semper frustra quæsi. Multorum capitibus latex serosus intra cavitatem cerebello subjectam congestus, & menibrana, qua medulla oblongata investitur distendens, nervorum origines inundabat: in quibusdam nulla hujus morbi vestigia apparebant: adeo quod spiritibus accrescens, eos ad explosiones irritat: interdum imperceptibili proclius constat mole, & originem tam occultam habet, ut vel perspicacissimum visus sermone non nullo lateat. Olim in hac urbe cujusdam mulieris nati plures ex hoc morbo interierunt; tandem foetus quarti intra mensem, uti priores, interempti caput dissecurimus; nulla hic serosa colluvies ventriculos inundabat, sed cerebri tantum, ejusque appendicis substantia erat julto humidior, & laxior: quod potissimum observatu dignum erat, in cavitate quæ cerebello subiacet, supra medullæ oblongatæ caudicem, sanguis grumosi, & velut concreti copiam insignem reperiebamus: et verò incertum est utrum materies isthæ ibidem ab initio deposita spasmos primario intulerat; an potius sanguis iste à partum circumcirca confictarum contractione expressus, & extravasatus, convulsionum effectus, & productum, ac minime istarum causa fuerit. Nam & in Apoplecticis ejusmodi hæmomenon passim occurrit: quod tamen morbi effectum potius quam causam esse posthæc ostendimus.

Profecto quod particula heterogenea, quæ sanguini ab utero innata, in plerisque pueris per ætatem in toto corpore cutaneam amandari solent, in aliis capiti suffusa, affectionis spasmodicæ causa materialis existunt, præter

rationes superius citatas, etiam à remediis maxime juvantibus interire licet: quippe in puerulis hæreditario huic morbo obnoxii, insultus convulsivi optime præcaventur, si mox à partu fontanella in nuca excutatur, & sanguis rudium suctu e venis jugularibus detrahatur; illa namque succi nervi corruptela subducuntur, atque hoc cruoris efflorescentiæ impura à capite a. ocantur: hisce administrationum modis, cum prius duo aut tres ejusdem parentis nati brevi post partum convulsivi interissent foetus, nonnes alii ab eodem nulo liberabantur.

2. Hæc de puerorum motibus convulsivis, qui mox à partu, propter labem ab utero contractam eos molestare solent. Quod si hæc vice aut ipsum morbum, aut saltem mortiferas ejus plagas evaserint; nihilominus circa dentitionis tempora eidem periculo denuo obnoxii reperiuntur: quando enim dentes, præsertim majores, e gingivis erupturi sunt, sæpe febris excitatur, cui non raro motus convulsivi adiunguntur. Et licet hoc tempore infantes viribus plus valeant, eoque morbi insultus melius quam recens nati tolerant; attamen affectiones spasmodicæ etiam nunc, nec graviore aliqua occasione excitatæ valde periculose, ac interdum lethales existunt.

Quandoquidem autem pueri qui circa dentitionem febricitant, non omnes motibus convulsivis tentantur; ideo sequitur hujus morbi dispositionem quandam, sive innatam, sive acquisitam præcedere, atque dolorem a dentitione illatum tantum causæ evidenter fortioris rationem habere; scilicet pueri, quibus aut cacochymicis, aut cerebri & nervoli generis constitutione debiliore præditis, spiritus animales, vel adulterati, vel dissipabiles nimis existunt, in affectiones spasmodicas quandoque ineundas disponuntur: quare cum dolor admodum auctus una cum febre urget, dispositio ista latens in actum ducitur.

Si hic inquiretur, qua ratione febris, & dein qua motus convulsivi in prædispositis dentitioni superveniunt; dicendum erit quod uterque affectus ad dolorem velut causam immediatam referri debet: In nobis ipsis experitur quis sit cruciatus qui irritationem circa dentium radices sequitur; revera tantus & tam atrox, ut excitari vix possit atrocior; quippe nervorum quinti paris una aut altera insignis propago ad cujusque dentis radicem pertingit, quæ cum a sanguinis, aliorumve humorum particulis acerbis illic congestis vellicatur, corrugatione sua acerrimum molestiæ sensum, sive dolorem infert. Istiusmodi autem hujus nervi vellicatio in pueris dentientibus ideo contingit, quia dentibus jam in majorem molem crescentibus, & adhuc intra gingivas vixdum cavatas inclusis, membrana & fibra quæquaversus distenduntur: hinc sanguis in circuitu præpeditus tumorem infert adeoque nervos comprimit, quin & æriores feri particulas iis suffundit, quibus illi insigniter vellicati corrugationibus, & spasmus dolorificis torquentur.

Cum itaque pueris dolores ita atroces à dentitione contingunt, nihil mirum est si febres, ac etiam motus convulsivi interdum succedant: prior horum accidit & quatenus sanguis circa partem dolentem, ne sicut atque æquabili cur-



in circuletur impeditus, propterea in toto corpore inordinatus movetur; & insuper quia spasmis alicubi in nervoso genere excitatis, nervi corrugati & contracti arterias comprimunt & convellunt, proindeque in sanguine fluctuationes irregulares & febriles concitant. Cæterum motus convulsivi dentitioni aliquando superveniunt, cum quia sanguis effervescens, particulas heterogeneas regimini animali sustundit, adeoque spiritus in explosiones ciet; tum præterea cum dolor ille acutus, & velut lancinatio dentes erupturos sequuta sensum valde molestum ac irritativum à partibus affectis *πρὸς ἀσθενείαν* communicet, exinde statim per eosdem nervos, vel alios affines excaudentis motus (qui ob dispositionem præviam non raro convulsivus evadit) retorquetur.

Præter has binas (quæ in pueris præcipue, & crebriores esse solent) motuum convulsivorum occasiones, scilicet prima infantia, & dentitionis tempora; affectus ille etiam aliis temporibus, & propter alias causas sæpenumero excitatur: In quibus enim dispositionis spasmodicæ semina jaciuntur, illa interdum aut statim à partu se explicant, ac in morbos fructus maturantur, sed aliquando latitantes dentitionem modo præveniunt, modo eam e longinquo sequuntur; & propter causas evidentes alias, scil. vel internas, vel externas, cujusmodi sunt nutritrix invaletudinaria, aut præguans, lac in ventriculo coagulatum, aut in putrilagine acidam, aut amarâ degenerans, intemperies febrilis, capitis, aliarumque partium ulcera, aut exanthemata subito evanescentia, æris mutationes, solis, ac lunæ *ἀσθενεία* aut aspectus oppositi, & similia, tandem incerto eventu in actum erumpunt. Super his non opus est ut particulatim differamus.

Cum viri cujusdam in hac vicinia degentis, nati omnes intra trimestre spatium convulsi interierint; tandem ad præcavendum in puerulo recens edito ejusmodi fatalem eventum, remedia experuntur: Post aliquot à partu dies accersitus, consulo ut imprimis fontanellâ in nucha excitetur; dein postmodum ut hirudine utriusque lateris venæ jugulari applicata, sanguis ad 3 ij. extrahatur; insuper ut juxta singulas solis & lunæ *ἀσθενεία* & aspectus oppositos, per tres dies mane, & vespere pulveris sequentis circiter gr. v. exhiberentur c cochleari Julepii.

℞. Crani humani præparat. rad. Præoniz maris, ana 3j. Margar. pulv. 3ß. sacchari albilissimi 3j. misce, f. pulvis subtilissimus.

℞. Aq. Ceras. nigror. 3 ij. anti-epilepticæ Langii 3j. tyrop. de floribus Præoniz maris 3 vj. misce; item præcepi ut nutritrix iisdem temporibus medicis sumeret haustum feri lactis, cui sem. & rad. Præoniz maris & sol. Lili convallis incocta sunt. Infans per quatuor circiter menses bene valebat, tunc vero affectibus convulsivis tentari cœpit: quo tempore iisdem remediis in dosi majori tum infanti, tum nutritrici adhibitis, vesicatoria etiam pone aures applicabantur, & hirudinum suctu sanguis ex utraque venâ jugulari fuit detractus: Intra duos, vel tres dies puer convaleuit: postea cum intra 4. vel 5. menses spasmi aliquoties redirent, eorundem usque remedium usu sanabatur. Post sequiannum affectiones convulsivæ penitus cessabant:

attamen circa infimam spinæ dorsæ partem tumor indolens succrevit, a quo vertebra-rum distortio quædam, atque crurum imbecillitas, & demump ralyis inducebantur. Videtur in hoc casu, quod materies spasmodica primo cerebrum, & nervorum principia impetere solita, ultimo spinalem medullam subiens, inque extremitatem ejus detrusa nervorum appendicum capita omnino obstrueret, atque spiritibus transitum præcluser. : nimirum quia particulis explosivis aliæ narcotica & crassiores sese adjunxerant.

*Methodus Therapeutica contra affectiones  
Convulsivas in pueris.*

In pueris ac infantibus passionibus spasmodicis, aut imminentes præcavere, aut jamjam exorsas curare incumbit.

Nam si ejusdem parentis nati priores Convulsionibus obnoxii fuerunt, malum illud exteris post natis tempestivo remedii rum usui præveniri debet: in hunc finem solenne est lactui recens edito, quamprimum spirare incipit, medicamentum aliquod *ἀντισπασμωδικόν* ori ingerere: hinc nonnulli guttas quasdam mellis purissimi, alii cochleari vini canarii saccharo in buti, quin & alii oleum amygdal. r. dul. recens extractum exhibere solent, & quibusdam olei succinici gutta i. aut aquæ epilepticæ semicochleari infunditur.

Præter hæc prima infantum libamina, quæ certe nullius non momenti esse videntur, alia quædam remedia, & administrationum modi in usum ascisci debent: scil. bis in die propinquetur cochlear i. liquoris huic affectui appropriati. c. g.

℞. Aqu. Cerasor. nigror. Ruta, ana 3j. ß. Anti epilepticæ Langii 3j. syr. c. Coralliis 3 vj. Magar. præpar. gr. xv. misce in phiala. Die tertio aut quarto post partum excitetur fontanella in nucha, dein si vultus sit floridi, parum sanguinis ad 3 i. ß. vel ij. c. venis jugularibus hirudinum suctu extrahatur, cavendo ne inter dormiendum sanguis copiose nimis effluat: temporis, & cervix blande fricentur tali linimento.

℞. Olei Nucis Moschat. per expressionem 3ij. C. pivi 3ij. succini 3j. Periaptem ex radicibus, & seminibus Præoniz maris, addito parum ungulæ aleis collo suspendatur.

Porro medicamenta antispasmodica nutritrici quotidie exhibeantur: sumat mane, & vespere haustum feri lactis, cui rad. & sem. Præoniz maris & sem. fenicul. dul. incocta sunt.

℞. Conserv. flor. Betonicæ, Præoniz maris, Antilios, ana 3ij. pulv. rad. & flor. Præoniz maris ana 3ij. Coralli rubri præparat. succini albilissimi, ana 3j. rad. Angelicæ, Zedairæ præparat. ana 3ß. cum f. q. syrupi de Præonia f. Eleæctuarium: capiat ij. Nucis Moschatæ mane & vespere.

℞. Pulveris rad. Præoniz maris 3ij. sem. ejusdem 3j. f. Pulvis, sacchari albilissimi solut. in aq. florum Tilia & ad tabulat. cocti 3 ij. Olei succinici 3j. f. s. artem Tabulæ, singulæ pendant 3ß. Comedat i. hora qualibet sexta. Illa etiam exacta videtur ratione utatur.

Quod si infans quispiam Convulsionibus acuti afficitur, quia fontanella minus, & tardius operatur,



ratur, vesicatorium in nucha, aut pone utramque aurem applicari expedit, & nisi temperamentum frigidius obstat, sanguis hirudinum suctu venis jugularibus extrahatur: Linimenta circa tempora, nares, & cervicem, item plantis pedum emplastra admoveantur; enemata quæ alvum copiose subducunt quotidie injiciantur: Porro sæpius in die, nempe sexta aut octava qualibet hora, remedia specifica intus sumantur.

℞. Olei Capivi, Callicorei, una ʒij. succini ʒʒ. f. linimentum.

℞. Emplastri Oxycroci p.ij. Galbani solut. p. j. Olei succini ʒj. t. Emplastrum pro plantis pedum. Pulvis de gutteta juxta descriptionem Riverii exhibeatur bis vel quater in die.

℞. Cranii humani præparat. sem. Pzoniz, ungulæ Alcis, Margarit. præpar. ana ʒʒ. Ambra griseæ gr. vj. f. Pulvis. Dosis gr. vj. in cochleari liquoris infrascripti, ter aut quater in die.

Vel ℞. Cranii humani præparat. Margarit. ana ʒʒ. salis succini ʒj. sacchari perlati ʒj. Dosis ʒʒ.

Vel ℞. Spir. Cornu Cervi gutt. iij. detur sexta vel octava qualibet hora in cochleari julepii infra præscripti.

Pauperum natis exhibeatur pulv. radices Valerianæ sylvestris ʒʒ. ad ʒj. detur bis in die in cochleari lactis, vel liquoris appropriati.

Untrexus valde commendat fel catelli lactantis, nempe ut totus succus cysti fellea exemptus puerulo cum pauxillo aquæ florum Tilie propinetur.

Nuper mihi retulit Medicus Eruditus se novisse plures hoc remedio curatos: Porro solent empirici pueris majoribus, post fel epotum, etiam catelli hepar allatum comedendum tradere.

Julepia, aquæ destillatæ, aliique liquores appropriati juxta præscripta sequentia parari possunt.

℞. Aq. Cerasor. nigror. ʒ iij. Anti-epileptice Langii ʒj. sacchari perlati ʒij. misce.

℞. Rad. Pzoniz maris recent. in taleolas scissarum ʒ vj. Vitrioli Hungarici ʒ viii. Cranii humani ʒij. Aqu. Anti-epileptice Langii ʒʒʒ. Misce, & destillentur in retorta vitrea calore arenæ. Dosis cochlear j. ad ij.

℞. Rad. Pzoniz maris recent. incis. ʒ iv. contusis in mortario marmoreo affunde vini Hispanici ʒʒ j. f. expressio fortis, adde manus Christi perlata ʒʒ. servetur in vitro occluso. Dosis cochlear j. vel ij. bis in die.

Cum ob dentitionem difficilem motus convulsivi eveniunt, symptomata hoc quemadmodum secundarium & minus periculosum existit, ita in Therapeia non semper primam aut precipuam exigit medendi operam, sed nonnunquam de dolore sedando, & intemperie febrili summovenda potius solliciti sumus; quare & patiens, & nutrix victu tenui & refrigerante uti debent: dentibus erupturis gingivarum aut frictione, aut seditione exitus pateat, quin & partibus istis intumefactis & dolentibus anodyna applicentur: Enemata, & sanguinis detractio non raro hic locum habent: somnum conciliare, & sanguinis ferociam attemperare decet: interim remedia Antispasmodica usurpentur verum temperatiora, & quæ sanguinem, & humores minus exagitant: vesicatoria, quia

serum in caput nimis suffundi aptum evacuunt, sæpe juvamen conferunt.

Quando pueri nec statim à partu, neque ob dentes erupturos, sed propter alias occasiones, & accidentia motibus Convulsivis tentantur; talis affectionis causa ut plurimum vel in capite, vel alicubi circa coctionis viscera subsistit. Quando prioris suspicio habetur, uti liquere solet a signis quæ colluviem serosam intra *lyrisphalos* nimis congestam arguunt, remedia superius citata in paulo majori dosi exhiberi debent; insuper in istis qui catharsin bene ferunt, interdum vomitus, & levis purgatio instituantur: vinum & oxymel scilliticum, item Mercurius dulcis, Rhabarbarum, & resina Jalap. egregii sunt usus.

Quoties affectionis spasmodicæ causa in visceribus subesse videtur, aut lumbrici, aut acres humores ventris tormina cientes in vitioprehenduntur.

Contra Lumbricos purgatio ex Rhabarbaro, aut Mercurio dulci, addita resina Jalappæ instituitur. Olim puero convulsionibus miserissime affecto, ut jamjam moribundus videretur, dosim Mercurii dulcis cum resina Jalappæ exhibui; cum alvi dejectionibus, quas 4. habuit, lumbricos 11. excrevit, & de repente convaleuit.

℞. Rad. Serpentina virginianæ pulv. ʒj. Corallii ad albedinem calcinati ʒʒ. f. Pulvis, dosis ʒʒ. ad ʒj. bis in die per tres dies continuos, superbibendo decoctum rad. graminis.

℞. Specier. Hieræ ʒʒ. Theriac Venet. ʒij. f. Emplastrum pro abdomine, vel Emplastrum ex Galbano applicetur umbilico.

Si motus convulsivos à ventriculi, & intestinorum irritatione per acres humores facta, procedere suspicamur, lenis catharsis, aut vomitus, aut secessus, aut successive utroque institui debet. In hunc finem blanda emetica ex vino scillitico, aut sale vitrioli propinentur; si quando scilicet laborantes vomendi nixu sponte tentantur: sin evacuatio potius *tem* tentanda videbitur, Rhabarbari infusio, aut pulvis, syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro, aut rosarum cum agarico propinari debent: & non raro hisce remediis tempestive adhibitis, affectionem convulsivam in pueris sanatam vidi: Porro in hoc casu enemata sint crebri usus: Caterum non oquantur medicamenta externa, scilicet fotus, linimenta, aut emplastra abdomini applicanda.

℞. Folior. Camomillæ minutim incis. M. ij. includantur duobus sacculis è lino tenui aut serico confectis, qui lacti calido intincti & expressi abdomini successive applicentur.

℞. Summitates, aut flor. malvæ pariter incis. incoquantur butyro recenti, vel sevo porcino, & sub forma linimenti aut cataplasmatris ventri applicentur.

Hæc tuse, ingeniosè ac doctè *Clarissimus Wilisus*: Quibus subnectimus vim illam explosivam in spiritus animales cerebri incolas, à particulis effertis undecunque demum advenientibus inductam, quam pro causâ Epilepsiæ proximâ habet, non ita omnibus arridere, quin contra cum hac in parte vehementer insurgat Doctissimus ac Politissimus Meniorius, dum Dissertatione sua Pathologica de Epilepsia sic habet. Scripsit nuperrimè Medicus *regius* studio-



studiosissimus, cornicumque oculos, ut in proverbio est, nitens contigere, epilepsiam oriri spiritibus animalibus ad instar igniscentis pulveris pyrii intra cerebrum à materia nitrosulphurea subito rarefactis, indeque in systema nervosum effracte ac inordinate explosis, à quibus tensi muscoli involuntarie contrahuntur. Sed novum illud opinionis commentum refellere per facile est; nam musculos usque adeo tensos, etiam potiori iure, quam in palpitationibus sensibilibus dilatari necesse esset, qui tamen nullatenus videntur intumescere. Deinde in febribus ardentissimis, ac potissimum in mania & phrenitide, spiritus animales flammescunt & quantum terre potest eorum natura, rarefcent citra epilepsiam; sicque patet nullam spiritibus animalibus cum tormentario pulvere accensio similitudinem intercedere, nec præcipitem conititium casum rite ædificio comparari, quod sublati pyrii pulveris ignitione non diruitur modo, verum etiam extra locum in quo iterat, dimoveretur; contuentes enim epileptici partes quidem varie ac violenter jactant, sed in alium locum toto corpore non prosiliunt, nec instar crepitantis tubuli catapultarii huc illucq; saltitant. Hæc Menorius, cujus rationes quam solidæ sint, penes lectorem judicium relinquimus.

Remedia quod attinet antepileptica sequentia suadet Clar. Dan. Ludovici. Qui pulveris nostri bezoardici albi, succini albi præparati, cinnabarisque nativæ selectioris ana misceat & adultis quidem ad ʒss. infantibus autem anniculis, ad gr. iij. iv. vj. natu minoribus dimidium horum, curative repetendoque dederit, ac pro indicantium ratione (præmissis aut interpolitis emeticis aut laxativis) modò volatilia urinosæ (spiritum C.C. Armoniaci simpl. &c.) modo essentiam succini; camphoræ, castorei, tincturam corallior. antimon. &c. modo præcipitantia alia, imprimis ligantia illa ex Opio circumspicere superaddiderit, multum utique proficiet. Lactantibus autem non solum hic, verum etiam in reliquis inquietudinibus, torminibus, vomitibus, diarrhæis &c. admodum confert pulvis antepilepticus anodynus, è pulveris bezoardici albi nostri ʒvi. succin. alb. præp. ʒiij. cinnabar. nativ. ʒiv. & laudan. opiat. nostri ʒj exacta mixtura compositus, trimestrique ad gr. j. &c. exhibitus. Bezoardicum autem suum parat, dum à mercurio vitæ communi sextuplum boni spiritus nitri per arenam ad siccitatem perfectam abstrahit; pulvere residuo (citra consueta hic cohobia, ulterioresve ignitiones, ac citra nimias grati ac innocentis æcoris elutiones) sat validò atque securò. Si nitri spirit. levior sit, oportet addere nitri crudi an. ad mercurii vitæ pondus. De cætero compendiosius adhuc cum croco metallorum similiter proceditur, si pariter boni spiritus nitri sextuplum ad siccitatem inde abstrahatur. Pulvis hinc elegans priori ponderosior, securissimus & eximie diaphoreticus est. Elegantior adhuc habebit qui sulphur antimonii auratum simili sextupli abstractione in albidissimum pulverem fixavit. Laudanum verò ita paratur.

℞. Extract. opii part. 2. extract. croci & cinnabar. nativ. aut saltem corallior. an. part. 1. *Hailem Ludovici. Medicus quidam apud no-*

stros olim celebris præmissis universalibus cochineis pulverate grana iv. ex aquis appropriatis, per tres ultimos lunæ dies mane jejuno ventriculo epilepticis exhibebat, hocque simplici medicamento plures a gravissimo morbo liberabat. Sequens vinum ab eodem etiam commendabatur.

℞. Semi. pæon. mar. ʒiij. rad. enolæ ʒi. ʒss. sol. labin. ruta, hyssopi, salvia min. flor. calch. in medio nigra, major. abrotan. anerb. nepe- tha, rorisinar. pedis leonis, baccar. juniper. an. m. ʒ. Theriac, Mithridat. an. ʒij. pyretlu. ʒj. Bulliant omnia, exceptis electuariis, in vini albi generosi lb xii. in vase fictili novò, probè lutato, ad consumptionem duarum tertiarum. Tum colentur, & in colaturâ dissolve electuaria. Dos. ad ʒiij. vel iv. pro ratione virium. Ambulet æger post assumptum hoc vinum, spiritum subinde contineat, & aures oburet corone hoc decocto imbutò, nec comedat aut bibat, nisi post duas aut tres horas. Decoctum hoc per novem dies continuos manè sumi debet, ubi morbus non est inveteratus. At si ante decem annos incepit, continuare oportet per dies quadraginta, interpositis purgantibus, ex hel- lebori nigri, & pæoniz extractis, paratis.

Continuò jam pergeremus ad Curationes epileptiæ e variis Autoribus tradendas, sed in illius absolutiorem cognitionem & explicationem adducenda prius veniunt, quæ super hoc argumento ordine Geometrico accuratissimè profert. *Laurentius Bellinus in suo de morbis capitis tractatu. Sic itaque ille.*

#### *Epilepsia Antecedentia sunt.*

Animi, & corporis insueta conturbatio, capitis gravitas, cephalalgia, vertigo, vigilix, aut plurimus somnus, à quo nullum levamen emergit, insomnia turbulenta, mentis torpor, vel anxietas, oblivio, mœlitia, pavor, formido, segnities, artuum gravitas; saltus, & tremores membrorum, sensuum hebetudines, obtusus defixus, scintillæ oculis obversantes, & interdum nubeculæ, aut niarnaryges, hoc est, splendores coruscationibus similes: aurium tinnitus, sædi odoris perceptio, lingua inlexilis, aut ejus inordinata motio, oscitatio, sternutatio: cordis palpitatio, iracundia, pectoris constric- tio, mutata respiratio: cibi fastidium, aut appetitus immodicus, nausea molesta, cardiag- mos, seu oris ventriculi morsus: salivæ per os effluvium, urinx tenues & crudæ, pollutio nocturna frequentior, faciei pallor, præcordiorum inflatio.

#### *Conjuncta.*

Cum perfecta Epilepsia sensuum omnium internum, & externorum interceptio, subitus collapsus, totius corporis, aut partium aliquot varia concussio, oculorum prominentia, stridor dentium, respiratio suffocatoria, qualis l. quæ suspensis: seminis, stercoris, urinx involuntaria profusio: ad finem insultus spuma per os, & nares: ad finem paroxysmi ægro sui compote ante arctarum rerum nulla memoria, aut cognitio. Cum imperfecta autem capitis solum, vel brachii, vel tibix, aut femoris, vel dimidii corporis concussio interceptis sensibus omnibus, vel sal-



va etiam mente, & quibusdam voluntariis motibus, non pe aliquorum partium aliis præter voluntatem concussis. Cum idiopathica mentis corporis, tarditas, memoriæ immutatio, insomnia turbulenta, sensuum hebetudo, gravitas, & segnities, capitis dolor, optima reliquarum partium corporis habitudo, paroxysmi subitus sine ulla ægri præfensione initus. Cum sympathica nulla cerebri affecti signa, initantis paroxysmi perceptio, ut cuiusdam rei velut alium de corpore ascendentis ad instar auræ; vitium ali cuius partis, vel symptoma aliquod gravius tempore invasionis: sic à ventriculo cibi fastidium, inedia difficilis tolerantia, nausea, dolor, aut eructio, punctio, aut distensio ventriculi, cordis etiam aliquando palpitatio per consensum. A jecore, & liene flatuum frequens, & copiosa excretio, ventris inflatio, rugitus, borborigini, ructus acidus, præcordiorum molesta coarctatio, eorundem dolor interdum ad usque dorsum, vitia in partibus abdominis. Ab utero hysterica passio cum convulsionibus epilepticis conjuncta, mensium, aut seminis retentio. Ab aliqua partium externarum aura quædam frigida ab eadem illa parte veniens, & excurrentes ad cerebrum vellicans, titillans, quæ imminuentis paroxysmi nuncia est, qui prohibetur, si illa pars vinculo contringatur. Facit huius auræ fidem Galenus hunc in modum de Epileptico loquens puero tredecenni. *Andivi igitur tum narrante puero dispositionem ipsam ex tribus initium capere, mox illinc recta ascendere per femur, & superposita ipsi illa, ac per latera ad cervicem, donec ad caput perveniret, quod cum primum tangeret, ipsum hand quaquam sibi constare, interrogantibus autem Medicis, quale esset id, quod ferebatur ad caput, nihil habuit puer, quod responderet. Alius deinde adolescens compos meus, quippe qui satis poterat & sentire quod fiebat, & alteri narrare, dicebat, veluti frigidam quandam auram esse id, quod ascendebat. Hætenus ille. A lumbricis anhelitus, fætor acidus, fæces cineritæ, stridor dentium, membrorum tremor, terror, & clamor subitus in somno, narium pruritus, & frictio, salivæ nocturno præsertim tempore ex ore effluxus, facies pallida, subito incallescens, ac rubens, morsus, ac dolor stomachi, & intestinorum, unde frequens abdominis contrectatio, ejusdem insolita durities, rugitus, ac tormina ventris, membrorum atrophia, tussis sicca, singultus, vermium cum alvi excrementis egestio, quod est præcipuum, & maxime tutum. Est autem epilepsia aliquando cum abscessu conjuncta, ossis carie, urinæ suppressione, & similibus, quæ ex se ipsæ immutescunt.*

#### *Succedentia.*

*Epilepsia quibus ante pubertatem contingit, curationem recipit: quibus post vigesimum quintum annum eos fere comitatur ad mortem usque, ait Hippocrates quinto Aphor. 7. Ubi notabis, à plurimis Medicis aliquatenus damnari Hippocratem quod Epilepticos post 15. annum laborare incipientes non curari asseruerit, quasi Hippocrates dixerit nunquam curari. aliis verò damnari penitus, cum tamen ipse asserat apertissime, fere nunquam, aut plerumque non curari, ut ex Græcis verbis manifestum est. Apoplexia, vel*

Mors in ipso paroxysmo, divulsio partium cerebri per concussione, ita ut procerum manillarum particule aliquando per nates sint redditæ, inquit Riverius, (quomodo autem reddentur, si nullus patet exitus?) Melancholia, Paralytis, Quartana, quæ superveniens, ac diu perseverans morbum solvit. *Juvenes epilepsia laborantes mutatione præcipue ætatis, regionis, & villæ liberantur, inquit Hipp. 2. Aph. 45.*

Quod est ad convulsionem apoplexia, idipsum est epilepsia ad motus convulsivos, quin in hac affectione plurimæ reperiuntur, quæ Apoplexiæ etiam conveniunt, Caro, Comati, Letargo, aliisque affectionibus capitis jam explanatis, ita ut nihil sit opus diutius immorari in explicatione live præcedentium, live conjunctorum, live succedentium, cum eorum singula vel in aliis morbis superioribus jam explicata sint, vel tam facile pateant, ut ulteriori explicatione non indigeant. Aura autem illa in epileptico Galeni patet ex his, quæ ostendimus de rigore, & horrore, nisi quod ibi solum de frigore sermonem habuimus: hic fieri fortasse potuit, ut non solum frigus fuerit id, quod ascendebat, sed quid aliud irritans, atque fermentans, & hoc ipsum etiam sine frigore conjuncto: sed hoc ipsum frigus succederet ex necessitate ejus vel fermentationis, vel irritationis ut ex eodem horrore, & rigore patet: Ex ejus autem vehementia, ac subita agendi vi evadebat puer ille sui impos, ubi primum auræ illa cerebrum attingebat, quæ si in aliis fuerit mitior, atque segnior, mente alienare non poterit, ut in rigoribus, & horroribus febrium &c. live autem à sola materia irritante, ac solo frigore live ab aliquo fermento res proveniat, live scilicet à causa solum vehementer concutiente, & in tremorem agente nervos, seu mutante contentum liquidum, prohiberi poterit, ac debet insultus epilepticus injecto vinculo parti auram mittenti, per vinculi enim constrictionem impediatur tam ascensus materiæ corporeæ, quam protensio tremoris, ut patet. Itaque oriri poterit, ac debet Epilepsia non à sola materia acris, irritante &c. sed ab omnibus causis, à quibus excitari possunt motus convulsivi, quos ostendimus superius produci posse, ac debere pluribus modis, adeoque erit epilepsia concussio totius, vel aliquorum partium corporis cum sensuum omnium, & voluntarii motus ablatione producta à quacunque causarum, à quibus convulsivi motus produci possunt: & idiopathica erit, cum causa illa primaria viget in cerebro, sympathica, cum eo perducitur ab aliis partibus. Hinc deduces, epilepsiam illam, quæ pueris tam familiaris est, eosque invadit fere subito ab exclusione, cum adhuc humidissimi sunt, & fere mucilaginei toti, provenire posse, immò re ipsa forte provenire frequentius à nimia humiditatis copia, qua scatent, quam ab acris humoribus, qui vellitent, & irritent; certè enim in illa humorum crassitie, qua nostrum singuli scatemus primis vitæ nostræ mensibus, vix quicquam acris, ac stimulantis contineri posse videtur, & si quid stimulant, atque acre generatur, an non plurimum retundi, ac temperari debet ab eadem crassiorum humorum copia, & proinde levem stimulum imprimere partibus illius corpori, quæ



quæ sunt adhuc tam teneræ, ut vix sibi ipsis hæreant, nedum sint rigida, ac maxime teula, cuiusmodi esse debent, ut acrem sensum concipiant? Lac corruptum potest quidem acceſcere, atque idcirco stimulus fieri, sed non temperabitur ab abundantia humidi in puero? Esto autem, nec temperari possit in pueris aliquibus, id sane fieri debet in paucioribus, aut saltem non in plerisque, quemadmodum tamen pueros tantum non omnes epilepsia vexari continue videmus. Ex epilepsia autem difficile evadunt pueri, si sint admodum parvi, hoc est, recens nati, cum per violentas illas concussiones partes corporis adhuc teneri divelli possint, præcipue autem cerebri vix dum consistens, quod proinde vel divellitur a suis partibus, vel dissolvitur quasi in phacellum, & facile morietur puer. Verosimilius igitur erit, Epilepsiam in pueris a copia pituitosarum materiarum & pressione potius oriri, quam a stimulo, vel saltem illam esse frequentiorē.

Illud autem animadvertendum est, num Epilepsia a Vermibus proveniat a sola irritatione in partibus ventriculi, & intestinorum, unde validi renexus, &c. an a materia humoribus permixta; cum etenim vermes supponantur, igitur datur materies eorum generationi apta, & chyli materies cum ipsorum excrementis misceatur, & ejus aliquid ab his in cibum assumitur, unde vitari aliquatenus poterit, atque ita vitata, si in vasa trajiciatur, dabit suspicioni locum, num Epilepsia ab ipsa potius, quam ab irritatione, an ab utraque simul proveniat. Hactenus *Clariss. Laurentius Bellini* jam videamus.

### Curationes, Consultationes, Observationes & Anatomica inspectiones

ex variis.

#### Curationes.

Epilepsia & similes morbi, qui a paroxysmorum vehementia & perniciē infames sunt, duplicem habent indicationem. 1. quæ paroxysmum respicit, 2. quæ ipsas morborum radices.

1. Aqua vitæ Mulierum (*Weiber aqua vitæ*, alias *baſamus Embryonatus*. Vide *Pharmac. August.*) propinata prægnanti mensura cochl. j. cum spiritus Antepileptici nostri gutt. iij. vel iv. singulis mensibus semel in Novilunio a mense quarto ad partum usque sortum ab Epilepsia præservat: præmissa illa majoris securitatis ergo datur hic pulvis.

2. Spinam dorsi vitæ mustelæ non coctæ, sed crudæ a capite ad caudam probe mundatam & exsiccatam, eamque pulverisā, hujus pulveris:

2℥. Et magist. Corall. & perlar. an. ʒ ij. M. Dosis quantum cuticelli mureo capit, in pulpa pomiatati.

11. præservantur pueri ab Epilepsia, vel prorsus liberantur, ne unquam succedente ætate tali passione capiantur, si recens jam natis antequam lac sugant vel cibum comedant, ingeratur ol. amygd. dulcium recens cum saccharo lino permixtum utriusque sit a ʒ β. ad ʒ ij. vel ʒ iij. Sic enim ubi paulisper a sumpto hoc absterſivo quieverint.

2℥. Stercus de Vacca nigra adhuc calidum, indatur olla nova, & calcinetur, de quo exturbetur ʒ j. vel ʒ β. modo nato infanti, (electoris Saxoniæ secretum) tandem evolvunt pituitosam admodum copiam impuritatū in utero matris ante exitum collectarum, quæ impuritates sunt c. ut multorum morborum in pueris, non inatim vero Epilepsia. Quod si non evolvunt, per alvum saltem purgantur deinceps ul i b. Incantur aliquandiu & in primis per tempus puerperii coq. in B. cortices salicis recentes. Sic nimirum non ab Epilepsia tantum, sed etiam a tabe præservantur, (specificum in aridura puerorum.)

Spir. Antepilepticus puerorum [vide not. ad Croll.] Cujus gutt. 6. d. 9. cum aquis Epilepticis flor. tilia, radic. prœniz, aq. larundinum, cerasorum, Lavendulæ. It. cerarum nigrorum cum aq. Langii Epileptica exhibita tum in paroxysmo, tum etiam post eundem mistic puerorum morbum tollunt, præsertim, si in primo paroxysmo exhibeatur.

Expertus sum in puerulo duorum, ni fallor, annorum, qui continuos fere convulsivos paroxysmos patiebatur, excellentiam spiritus salis armoniaci, de quo, frustra tentatis aliis remediis gr. 4. tantum in aq. flor. tilia exercebam, hactenus convulsiones cessarunt, post horam eandem dosim repetiti, quæ puer optime convalevit & jamdum valet. Sal autem volatilis urinæ longè præstantius est, præsertim, si cum calce lunæ sublimetur, quæ tum de mum præstat id, quod ipsi alias adscribitur. vid. praxim n. cum Chymiatr. cap. 5. pag. 44. & 45.

In Epilepsia adultorum 1. Præmittuntur Universalia Vomitiva, Cathartica, in primis specificum purgans Paracelsi. Postea exhibeantur specifica, quæ sunt.

(Iurgantia in epilepsia meliora non invenies, quam Mercuria. ha. E. gr. Mercurium dulcem, præcipitatum album &c. formula potest esse talis.

2℥. Mercurii præcipitati albi ʒ β. Trochisc. alhandal vel resinæ Jalapp. gr. 3. Mass. pil. de succin. craton. ʒ β. c. q. l. Essent. Castor. f. Pilulæ. quarum usus continuandus ad aliquod tempus.)

2. Epilepticum Crollii.

3. Pulvis Antepilepticus ex Cinnab. Antim. qui talis est.

2℥. Cinnab. Antim. magist. Coral. perl. anas Alius.

2℥. Cinnab. nativi pellucidi & splendentis ʒ β. pulverisā in marmore subtilissimè: adde magist. Corall. perl. ana ʒ ij. Croci ʒ j. lol. aur. diligenter triti, super lapidem, reduc. in pulverem, cujus gr. 7. ad 18. in aq. salv. propinentur & sæpius repetatur. Vide suprà de sudoriferis.

Alius pulvis Epilepticus magnarum virium.

2℥. Cinnabaris Ungarici probe loti & depurat. 15 β. imibe cum spir. vitæ. ʒ iv. scobis cranii humani nunquam sepulti ʒ β. imibe cum spiritu vini, relinque in loco calido per 15. dies & postea per retortam destilla liquorem, & illud, quod restat, seorsim serva hinc.

2℥. Scobis Ungulæ aleis ʒ β. Myrtæ rubræ ʒ β. solve in sp. salis, solum a scobibus separa & serva postea.



Nota: in adultis soleo ex majoribus surculis excavatis facere cannas, per quas tempore gestationis amuleti omnem ium potius hauriunt.

7. Spir. Vitriol. volatilis duplex, de quo in notis ad Crollium (præsertim in adultis.)

8. Laudanum Epilepticorum, de quo in o-piologia & infra de Apoplexia.

9. Radix Pæoniæ, maris nimirum, seu nigra, Nam femina nullius efficacis, si suspendatur de collo pueri Epileptici, morbus cedit, sed radix effodienda est in Julio Luna decresciente, Sole existente in Leone, in meridie & die solari.

10. Viscus quercinus Luna decresciente inter duo Mariæ festa, hoc est, 15. die Augusti. & 8. Septemb. collectus: nobilior autem habetur illa pars, quæ quercui propior resecta est.

11. Mixture Antepileptica, quæ sequim. fit:

℞. Spir. Vitrioli viridis ex Vitriolo & urina puerorum 3 j. ̄j. cum aqua rad. pæon. & fl. tul. an. 3 j.

M. de hac mixtura exhibe in paroxysmo membris convulsis & contortis cochl. ʒ. guttatim, & paulo post redibunt ad sese recollectis sensibus, quo animadverso denuo aliquid exhibeto, atque ita tertio; quod si quidem rediturus sit paroxysmus, ut heri potest, eundem processum repete. Postea confortantia cerebrum adhibeantur, cœu sunt Magist. Corall. perlar. Crani humani. Multum possunt hæc Tabellæ.

℞. Mag. Crani humani 3 j. (quod calcinatum primo, postea per aq. evaporatur pulvis instar magisterii) gran. pæon. excortic. m. 16. sacch. in aq. theriacali solut. f. s. 2. tabulæ, quarum una atque altera tam manè jejuno ventriculo, quam vespere longè a pastu & cœna exhibeantur.

Paroxysmus Epilepticus instans, ut evertatur, æger signa quædam præsentens statim capiat pil. j. laudani antepilept. vel rotulam unam antepilept. aut in horum defectu ol. succini gut. j. & alteram.

N. res autem inungat Balsamo antapoplectico, aut balsamo succini.

Præsens sedatur modo sequenti. Cadentis ori cuneus immittendus est, ut apertum maneat, nec linguam commoveat, altà voce inclamandus, nares constringendæ & sternutatorio seq. irritandus.

℞. Rad. ellebori alb. 3 j. Castorei, euphorb. ana 3 ʒ. F. pulvis suffitus etiam fieri potest ex succino albo.

Membra incurvata molliter ad rectitudinem reducenda, fricanda & continenda.

Fauces Extracto castorei, oleo succini aut Mithridatio, Theriaca in aqua Epileptica solutis: nares autem & tempora balsamo apoplectico illinienda.

Et si suspicio sit, eam ob vitiosos humores in ventriculo collectos, & ad caput exhalantes fieri, utile est excitare vomitum cum aq. Benedicta aut Vitriolo albo in aqua pæoniæ, in qua scobs visci quercini bullierit, dissoluta paroxysmo sedato, si metus sit, ut mox revertatur, clysteres acres injiciendi ad avertendos humores acres, alioque in cerebrum irruentes.

Cucurbitæ item cum scarificatione humeris applicandæ & si plethora adsit, vena secand.

Quò factò ad radicis Epilepticæ excisionem progrediendum, ubi præscripta bona vivendi

regula ad universalem totius corporis evacuationem perveniendum, observatis hac in parte practicanrium regibus. Nonnunquam utile est admiscere purgantibus Extr. scammoni, aquam benedictam, Extr. Ellebori nigri, & sæpius præparatum corpus purgare Mercurio dulci, Mercurio vitæ, floribus Antimonii.

Hinc ad caput purgari, & ad ea, quæ à proprietate conferunt, accedendum, non neglectis iis, quæ caput exsiccant, & maxime roborant.

Tabulæ Antepileptica.

℞. Rad. pæoniæ 3 j. magist. perlarum, corallorum an. 3 i ʒ. magist. crani humani 3 ʒ. sacch. in aq. horum tilis soluti q. s. F. Tabulæ. Detur una atque altera manè jejuno ventriculo & vespere longè a cœna.

Aqua Epileptica. ℞. fl. lil. convallium M ij. infunde in f. q. Vini generosi, digere per 10. dies, vel donec habere poteris.

Fl. tilis recent. ʒ ʒ. pæoniæ 3 iv. distilletur in M. B. ad siccitatem, in destillato iterum infunde.

Rad. pæoniæ 3 j. distammi albi, visci quercini an. 3 ʒ. Crani humani præparati 3 ʒ.

Rad. pyrethri 3 ʒ. castorei ̄j. sol. rutæ Mj. flor. Stœcados Arabicæ, lavendulæ ana P iv. flor. betonicæ P vj. cubebæ, maceris an 3 ij. cinnamomi 3 j. scillæ præparatæ 3 iij.

Digere iterum per 15. dies, hinc per alembicum in M. B. destillatur & aqua ului reservatur. Dos ʒ ʒ. ad 3 j.

Clysterem in epilepsia vide in capite seq.

Balsamum vide etiam in capite seq.

*Duo secreta hic bene nota.*

In capite porcino retro aures invenies in utroque latere ossa duo petrosa in quibus cochlea est, Hæc ossa pulverisata & in vehiculo convenienti administrata excellentissimum sunt. Specieum in epilepsia, & in interna facie exactam capitis mortui signaturam habent: quæ vero ossicula ex dextro capitis latere maribus, quæ ex sinistro femellis conducunt.

Radix pæoniæ epileptico medetur, cuius effectus in quibusdam qui per 20. annos a prima nativitate laboraverant, probavi. Hoc autem requiritur, quod ignoratur, ut tempore extractionis colligatur. Quando solleonis signum ingreditur, iustum tempus esse putant, sed falso; verum quando sol signum libræ, quod circa 12. Septembris erit, ingreditur, effodiatur. Datur ad 3 j. continuando ad tempus.

Hæc specifica feliciter operabuntur, si per aliquod tempus radiis lunaribus fuerint exposita. *Joan. Harthmann. in Praxi Chimiæ.*

Curatio Epilepsie duplex instituitur, alia in paroxysmo, alia extra paroxysmum.

Ad paroxysmi curationem raro vocantur Medici, nisi ipse interdum longius protrahatur, quo in casu conveniunt eadem remedia, quæ pro soporosis affectibus fuere proposita. Præsertim verò aqua apoplectica, cinamomi, aqua vitæ, & aliæ multum spirituosæ, ad paroxysmi materiam discutendam efficacissimæ.

Extra paroxysmum curatio varianda est pro varietate causarum. Ac primum Epilepsie idiopathice curatio proponenda est, quæ in totius corporis evacuatione, materis morbificæ discussionem, pravæque illius qualitatis emendatio:



he, & cerebri roboratione consistit. Cum autem materia peccans in idiopathica Epilepsia, ut plurimum pituitosa sit, nos ad illius oppugnationem curationem universam dirigemus, tyrones alioqui admonentes, ut si humores biliosi, aut melancholici in vitio esse videantur, medicamenta illos preparantia & expurgantia substituuntur. Specifica verò remedia à quacumque causa morbus oriatur, eadem perpetuo usurpanda sunt.

Ad integram ergo curationem sequenti via procedendum est. Primo potro Phlegmagoga erit propinanda, aut aliud medicamentum, ægrotantis naturæ accommodum, ex iis quæ in frigida cerebri intemperie fuerunt proposita, injecto prius clystere, si alvus non sit libera.

Postea si plenitudo notæ appareant, aut æger sit sanguineo temperamento præditus, phlebotomia erit celebranda, sin minus omittenda.

Mox cura universalis frigida intemperiei cerebri supra proposita sigillatim celebranda erit, hoc observando, ut decoctis apozematibus, dictæ sudorificæ & syrupo magistrali, tum etiam masticatoriis, & pulveribus cephalicis, addantur radix & semen pæoniz, & viscus quercinus quæ proprietate specifica epilepsiam curare tota credidit antiquitas.

In dicta vero ex sudorificis guajacum præferatur; cuius usu se multos epilepticos curasse refert Jachinus. Continuetur autem per triginta vel quadraginta dies.

Singulis dosibus decocti sudorifici aliquot guttæ spiritus vitrioli addantur, qui etiam specificus creditur ad epilepsiam.

Notandum est purgantia usualia, nimirum pilulas, aut syrupum magistrale, in frequenti usu habenda, nempe semel aut bis in septimana, prout vires ægrotantis ferre poterunt, & per plures menses purgationes esse continuandas: imo ad fortiora interdum purgantia esse transeundum, juxta præceptum Massariæ, quæ hinc fieri dicit, quod epilepsia raro curetur, quod Medici semper in levioribus hæreant.

Hac ratione Chymici purgantia mineralia usurpare solent, quæ à remotissimis partibus humores attrahunt, at non sine periculo, præsertim si à peritissimo artifice præparata non fuerint. Sitamen in hoc casu scilicet eventus ex hujusmodi remediis aliquando contingat, ille in primis sperandus est ex mercurio, per se, vel cum auro calcinato in furno arenæ, longo ignis regimine, probè cavendo, ne qua illius portio cruda adhuc & volatilis maneat, quæ summam vehementiam medicamento conciliaret, alioqui satis blandè purganti, si cum Pilulis coctis, aut quod melius erit cum extracto aliquo phlegmagogo, vel, panchymago, pondere gutt. iv. vel v. usurpetur.

Recens autem Epilepsia sale vitrioli aliquando curatur, quemadmodum refert Angelus Sala, ex hoc remedio, quarto quoque die exhibitio, se epilepsiam tertia exhibitione curasse. Posteriùs verò curat. 77. cent. 1. gloriatur se stibio calcinato ter exhibitio, puellam undecim annorum ab epilepsia hæreditaria liberasse.

Syrupus de petro Quercet. maximam vim habet ad curandam Epilepsiam, sed non nisi à prudenti Medico usurpandus, quia vehemen-

tissimum est medicamentum.

Loco opiata dicto loco propositæ, sequens, magis huic affectui specifica, erit subroganda.

℞. Conserv. flor. anthos, pæoniz, buglossi ana ʒ β. corticis citri saccharo conditi ʒ ij. pulv. visci querni, sem. pæoniz decresciente Luna collecti, & ungula alces, ana ʒ β. crani humani non humati, ad albedinem calcinati ʒ i β. coral. præp. margarit. præp. & cornu cervi præp. ana ʒ iv. lapid. bezoard. veri ʒ j. diamoschi dulcis, diatriasant. ana ʒ ij. theriac. vet. & confect. de hyacinth. ana ʒ j. spiritus vitrioli gutt. ij. Cum syrupo condituræ corticis citri, fiat opiata, de qua capiat ad magnitudinem avellanæ superbibendo aquæ cinam. parum.

Sequens vero efficacissima est ad morbum radicatus tollendum, post diligentem corporis purgationem.

℞. Conservæ flor. betonicæ, & rorism. ana ʒ ij β. rad. cryngii conditæ, & mithridatii, ana ʒ j. pulv. liqui assafras ʒ vi. castorei, ʒ iij. crani humani non humati, ungula alces, ana ʒ ij. rad. & sem. pæoniz, sem. nigellæ, rutæ sylvestris, & rad. pyrethri, ana ʒ j. oxymel. q. s. Fiat opiata de qua capiat ʒ ij. vel iij. Reliquas omnes efficacia superat opiata Montagnanæ, cujus beneficio multi epileptici liberantur illius descriptio talis est.

℞. Rad. pæoniz maris, stœchados, costi, an. ʒx. agarici ʒ v. pyrethri, carvi, sem. anethi, assæ foetida, & aristol. rot. ana ʒ ij β. succi scillæ, & mellis electi an. ℞ j. & ʒ ij. Scilla & mel simul coquantur lento igne usque ad bonam consistentiam; deinde superadditis speciebus fiat electuarium, de quo capiat æger ʒ ij. vel iij. iv. pro ætatis ratione, continuando per 10. aut 30. dies.

Post usum emplastri epipastici, vesicatorium etiam sincipiti erit admovendum, & cauterium posteriori parti cervicis.

At setaceum multò efficacius humores extrahit à cerebro. Refertque Fabritius Hildanus, se juvenem quotidie Epilepsiâ laborantem, & cui frustra alia remedia adhibita fuerant, & puellam 18. annorum, ab ipsa infantia epilepticam, solo setaceo restituisse.

Si conjectura sit, vapores ad cerebrum exhalantes à partibus inferioribus, affectum producere, vel fovere; utilissimum erit causticum sincipiti admovere, vitatis futuris: refert enim Carolus Piso, duos Epilepticos hoc cauterio fuisse curatos. Tum etiam si à partibus inferioribus affectus producat, aquæ acidulæ mirabiles sæpè effectus producunt, & morbum interdum radicatus tollunt, si prius evacuationes universales, & venarum inferiorum sectiones celebrantur.

Peculiariter vero ab utero procedens Epilepsia curationem sortitur pulvere granorum actes à Quercet. descripto in Pharmacop. restit. per triduum exhibitio ad ʒj. cum aqua quadam hysterica.

Si cætera non profuerint, extremum remedium erit sinciput terebello perfodere, vitatis futuris, ut hoc veluti spiraculo aura maligna exhalare possit. Hoc remedio aliquando desperata epilepsia curata sunt; & sine periculo celebrari potest, si periti Chirurghi manu adhibeatur.

Utatur



Utatur ager pro potu ordinario hydromelite, vel bochneto ex guaiaco, & rad. pœonia.

Sacculus de collo suspensus continuo gellabitur, insequentem modum paratus,

℞. Rad. pœonia, visci querc. ana ʒj; ungulæ alces ʒij. nucis mosch. caryophyll. macis, ana ʒij. sol. rutæ & hyssopi, ana ʒi ʒ. pulverentur, & rubra sindone excipiantur. Fiat sacculus, debeat appensum collo, sæpe illum odorando.

Post universales evacuationes, inter aliorum remedium usum, specificis præsertim morbus oppugnandus est, quorum infinitus sæpe numerus reperitur apud Autores. Nos ex selectioribus nonnulla proponemus, præter opiatas supra descriptas, quæ ad hunc morbum expugnandum non infimum locum obtinent.

Rondeletius maxime commendat aquam hircundinum, quam etiam ab eo mutuatus est, Quercetanus in Pharmacopœa. Non minoris est pretii aqua theriacalis cephalica, & syrupus antepilepticus, ab eodem Quercetano dicto loco descriptus.

Radix valerianæ sylvestris à Fabro Columna tantopere celebratur, ut semel, aut bis exhibitam ab epilepsia liberare asserat, Refertque se hanc multis amicis dono dedisse, qui deinde divino prius numine & fautore glorificato, pulvere hujus radice sibi restitutam sanitatem asseverarunt. Dosis autem est cochlear semis cum vino, aqua, lacte, aut quovis liquore appropriato. Pueris vero in minori dosi cum lacte datur.

Chymici valde commendant mixturam spiritalem, qua in Epilepsia nullum medicamentum præstantius exoptari posse asserunt. Illius autem compositio talis est.

℞. Spiritus vitrioli partem unam, spir. tartari partes tres, aquæ theriacalis camphoratæ partes quatuor. Misceantur, & vitro bene clauso, per tres aut quatuor septimanas digerantur. Dosis est ʒj in convenienti vehiculo.

Rulandus oleum ligni heraclei (quod corylinum esse asserunt chymiatræ) in frequenti usu habebat; & nonnullas historias refert in centuriis, eorum qui hujus medicamenti usu ab eo morbo liberati sunt. Dosis autem est trium vel quatuor guttarum cum liquore idoneo, per quinque dies.

Huic nullo modo cedit, aut forte multo præstantius est oleum succini albi, a perito artifice extractum, quod nullum empyreuma redolet, imo vero fragrantissimum expirat odorem. Dosis à ʒss. ad ʒj.

Oleum buxi ad gutt. 4. cum pari quantitate spirit. sulphuris, & aquæ flor. lilæ arboris ʒiv. per aliquot dies exhibitum, insignis est efficacitæ, & à multis creditur verum ligni heraclei oleum; & per descensum elicitur.

Crato cinnabarim nativam epilepsia magnetem vocat, ex eaque talem pulverem parat.

℞. Cinnabaris nativæ pellucidæ limatæ, & in tenuissimum pulverem tritæ ʒss. coralli rubri & margarit. præpar. an. ʒij. croci Orientalis ʒj. fol. auri nu. 15. Terantur omnia subtilissime super lapidem Dosis in ipsa accessione à granis vi. ad ʒj. in aquis app. opriatis.

At non minoris virtutis censetur à non paucis Chymiatris, cinnabaris antimouii, quæ post

mercurii vitæ extractionem eliciunt. Si enim æquali pondere jungatur cum magisteris perlatum, corallorum & crani humani, specificum esse aiunt in epilepsia etiam inveterata. Dosis a granis 10. ad 15. in liquore idoneo.

Sympathicæ Epilepsia curatio ad partem primario affectam dirigenda est. Hæc remedia convenientibus, & propriis capitibus desumendis, evacuanda & roboranda est, non omnis specificis & antepilepticis, quæ in omni epilepsia perpetuo usurpanda sunt. Attamen si à parte aliqua externa concitetur Epilepsia, præter curationem universalem, ad eam peculiariter respiciendum est, & materia maligna in ea contenta educenda cucurbitulis scarificatis, vesicatoriis, & cauteriis admotis. Et si malum perseveret, supra cauterium post escharæ casum cucurbitula frequenter admoveatur: ac tandem urgente necessitate, ad cauterium actuale confugiendum est. Si à crani carie malum oriatur, trepano & uestione illa auferenda est. *Lazarus Riverius Præcos Medic. lib. 1.*

In Epilepsia, si adsit plethora, primò instituat venæ sectio in brachio.

Si ventriculus aliquo modo afficiatur, adsitque nausea, vel ad vomitum inclinatio, exhibeatur emeticum ex infuso croci metallor. cum oxymel. scillit. & aq. aliqua antiepilept. aut ex vitriol. alb. depurat. Vitriolum album sæpius solvi, filtrari & coagulari debet ad rectam ejusdem præparationem. Dosis est ad ʒj. in posseto aliove liquore soluta: nullam turbam excitat per alvum, & ventriculum postea multum corroborat. N. B. Ante Emetici (fortioris) propinationem pridie injiciatur clyster; regio ventriculi & hypochondriorum foveatur lotu relaxante & emolliente: post vomitum finitum autem lotu corroborante & astringente. Repetatur Emeticum semel in mense biduo ante plenilunium.

Prodest quoque citra ullum medicamentum semel aut bis in mense post largiores epulas post duas horas immisso in fauces digito quicquid ingestum fuerit regurgitare. Si facile vomat ager, instituat vacuo ventriculo; si difficulter, post ciborum assumptionem.

Purgetur ager cum pil. Macr. & speciebus de hier. Aliquando ususum hell. alb. ad gr. 3. quod violenter sursum deorsumque evacuat, in robustis tamen optimo cum successu. Convenit etiam sp. vitæ aureus Rulandi, hoc est infusio colocynthid. in sp. vin. Dos. coch. j. ad iv. Aquæ quoque Ebeshamenses bene purgant, exhibitæ sub noctem pil. Macr. drachma ʒ. cum spec. hier. gr. x. & troch. Alhand. gr. 3. Quibus aquis soleo aliquando admiscere crystal. syderei gr. x. ascendendo ad ʒj. Convenit hic quoque syrupus noster pantagogus amarus in aq. ceras. nigr. flor. lil. convall. solutus ad ʒj. aut ʒx. Addi potest aliquando syrup. elleborat. ad ʒij. aut amplius aquis prædictis, persistend. in earum usu ad dies x. N. B. quod purgatio semel saltem, melius bis, imo quater in mense institui debet, donec materia morbifica evacuetur. Soleo quoque aliquando exhibere ʒj pil. seq. mane duabus horis ante haurtum aquarum, quæ continuari item possunt postea per plures dies superbibendo haurtum hydromelitis.

℞. Sagapen. ʒij. galban. castor. ass. fetid.



myrrh. ana ʒj. balsam. succin. ʒjß. balsam. sulph. inspissat. ʒiv. camph. ʒß. cum balsam. Peruv. nigr. q. s. f. massa pil.

Possit usum aquarum deveniat æger ad usum pulveris specif. seq. per x. dies mane hor. 4. ante prandium, superbibendo haustum alæ maciatæ.

℞. Miner. argent. transparentis uitar. rubin. quæ *Rottgold* in todinis appellatur gr. 4. cinnab. mineral. ex Ungar. gr. 8. bezoar. C. C. cornu alcis, cran. human. ad albed. calcinat. & sp. vitriol. subactorum an. gr. 5. sal. vol. succin. gr. 5. camph. gr. 2. auriferientis, vel, si desit, flor. Jovis gr. 4. croc. gr. 1. secundin. primipar. maris gr. 10. ol. succin. rectif. gutt. 2. f. pulvis cum mucilag. baccar. junip. vel succ. rut. saccharat. q. s. f. bolus. Quidam laudant *Rottgold* per se cum conserv. flor. pæon. sed exhibui sine ullo manifesto effectu.

N. B. Pulvis dictus, aut bolus, per triduum, viz. pridie, postridie, ipsoque die Novilunii mane est sumendus; itidem in plenilunio repetendus, superbibend. haustum aq. ceras. nigr. flor. til. vel lil. convall. & differatur prandium ad 4. hor. superambulando per aliquod tempus. Aliquando ʒj. hujus pulv. add. verm. terrestr. præp. ʒj. rad. valerian. sylv. ʒj. sol. sen. pulverizat. ʒß. syr. pæon. q. s. ut f. bolus pro una dosi.

Pulvis sequens raro me fecellit post humorum præparationem & evacuationem per Emericos & purgantes, ad dies 12. continuatus.

℞. Corn. Rhinocerot. cran. human. præp. an. ʒij nepenth. Quercetan. pulv. cordial. Banisteri an. ʒj. m. ʒ. f. pulvis in vitro exactissime clauso asservandus. Dos. ʒß. ad ʒj. in idoneo vehiculo.

Nepenthe Quercetani est talis.

℞. Limatur. chalyb. puriss. part. 1. vitriol. Ungar. part. 2. pulveriz. & phialæ indantur; atund. acet. distillat. ad supereminentiam digiti & ʒ. diger. moderate per dies 12. distilla per gradus in arena donec vitriolum sit calcinat. ad rubed. Huic pulveri adde acet. stillat. q. s. ut supernatet 4. digit. digere in B. per 5. aut 6. hor. ad tincturæ extractionem: acetum decanta & novum affunde, & digere iterum, sicque porro quamdiu tincturam præbebit. Liquor tinctus filtretur & evocetur per alembicum dissolvens (ad eundem usum asservandum) ad mellaginem usque, cui instill. guttatum ol. tart. unde præcipitetur pulvis: liquorem decanta, residuum ablue aq. commun. distillat. ad dulcedinem; sicca, & usui serva sub nomine sulphuris vitrioli fixi anodyn.

Pulv. cordial. Banist. hic est.

℞. Succin. alb. præp. ʒß. bol. Arm. aut terr. sigillat. aut antim. diaphor. Croll. ʒij. C. C. ʒj. ralur. ebor. ʒj. & gr. 15. coral. rubr. præp. marg. præp. lap. bez. oriental. fantal. citrin. sem. citr. an. ʒj. corn. unicorn. ʒj. & gr. 12. cort. citr. exter. ʒß. & gr. 15. ambr. gris. gr. 10. mosch. gr. 2. sol. aur. argent. an. gr. 15. m. ʒ. f. pulvis subtilis.

#### *Materia Medica in hoc affectu.*

*Rottgold*. Cinnab. mineral. Bezoar. Cran. human. Cornu Cervi, Alcis. Ocul. can. vitriol. Corall. Succalim. Ceruss. antim. vel Jovis. H. Jovis volat. Succin. alb. Sal volat. Succin. Rad. Valerian. sylv. Contrayerv. Serpent. Virg. Angelic. Pæon. mar. Calam. aromat. fol. sic. Rut. Rorismar. Majoran. Flor. Rorismar. Lavend. Stæch.

Arab. Junip. baccæ. Camphor. Ambr. gris. Moschus. Stercus pavon. alb. Secundin. mulier. primipar. quæ marem peperit.

Ex his fiant Pulveres, Pilulæ, Elecuaria, & extracta specifica ad hunc affectum.

His addi possunt smaragdus, crystallus rupis, lapis contrayerv. galega, pastinac. sylvest. rad. vincetoxic. lcorzon. Hispan. petasit. aristol. rotund. enul. camp. filipend. fraxinel. tormentill. chelidon. maj. sol. verben. tanacet. thym. hyssop. nepeth. majoran. salv. meliss. trifol. odorat. visc. querc. flor. chamæmel. nobil. tiliz. beton. sem. pæon. rut. galeg. coriand. cardamom. lign. Rhod. lassafr. aloes, buxi, cortex Winteran. iux moscat. macis, corallina, mater perl. chel. nigr. canceror. hepar ranarum virid. castor. carbo odoratus sub artemisiz radicibus sollicitio ætivo inventus, sanguis mutellæ calens, coagulum leporis vino solut.

N. B. Rad. pæon. mar. effodienda est crescente Luna & in Ariete existente ante ortum solis. Et cornu cervi, alcis, cranium human. non sepultum, calcinata redigantur in trochiscos cum ol. vitrioli Philosophico, aut Philosophicè calcinentur in vapore cephalicorum suspensa.

Opt. f. remedium è visceribus Talpæ, si talpam viventem in medio findas, sanguinem effundas in cyathum vini clareti calidi, viscera omnia palpitantia & calida citissime comminuas in disco ligneo calido cultro acutissimo, cum vino commisceas, & totum ebibas sine mora.

Specificæ quoque desumuntur ex corvo, hirundine, pica, graculis & lumbricis. Vid. apud Authores.

In pera gerat baccas juniperi, de quibus, sapius comedat. Baccæ autem hæ sic præparari possunt.

℞. Bacc. junip. recentium, pulpolarum, maturarum lbj. irrorentur successivè vino de Malaga generosissimo veteri, & post exemptum è furno panem sine unctione siccentur: ultimâ vice baccis ut cunque adhuc madentibus inspergatur ʒj. sacchar. crystall. pulv. ambr. gris. ʒß. omniaque versentur diu ut pulvis per omnia diffundatur: serventur baccæ sic præp. in vase vitreo. Singulis auroris sumantur hæ baccæ à 10. ad 10. per totum mensem, superhauriendo alam maciatam, ac superambulando.

N. B. Ex harum baccarum usu ad annum integrum incipiendo à 12. & ascendendo ad 40. deploratos curavi, irritis omnibus aliis remediis.

Remedium nobilissimum fit ex sem. hyoscyam. ultra 40. dies usurpat. incipiend. à gr. 6. vel 8. & gradatim ascendend. ad ʒj. aut gran. 24. ex cochl. j. succi semperviv. recenter express.

Expletis 40. diebus in usu hujus deveniat ad medicamentum sequens.

℞. Vin. alb. lbij. quibus add. succi sol. rut. succi inter. cortic. sambuc. an. lbß. coq. ad medium. Sum. cochl. ij. vel iij. quotidie mane vacuo ventriculo, donec totum sumatur.

Pulvis Hartmanni talis est.

℞. Cinnab. Antim. vel mineral. ʒß. magister. corall. perlar. an. ʒij. croc. ʒj. sol. aur. nu. vi. m. f. pulv. Dos. à gr. 7. ad gr. 18. in aq. salvia.

℞. Rad. valerian. sylv. debite collect. & siccat. summit. rut. an. ʒij. viscerum talpæ præp. ʒij. cran. human. præp. succin. alb. præp. an. ʒj. ʒß. secund.



secundum mulier. præp. (h. e. per ablutionem cum vino alb. siccatur & pulverizatur.) 3 j. castor. 5 j. Omnia seorsim debite præparata misceantur, & cum mellag. liquida baccar. junip. recenter extract. per decoctionem in aq. pæon. flor. til. lil. convall. & cerasor. acid. (ita viz. fact. cum alperione spir. vitrioli Philosoph.) f. massa pilularis, de qua recipe 3 j. cinnab. mineral. 3 j. ol. succin. limpid. gutt. ij. vel q. s. pil. pro una dosi matutina, superbibend. haustum aq. flor. til. & lil. convall. cum syr. pæon. eduleorat. Continuetur usus ad dies sex aut plures cum exercitio. His pil. addi quoque possunt grana aliquot sem. hyoscyam. post primos sex dies finitos. Addere quoque soleo sterqus pavonis, sem. galeg. & rut. & tertio quoque die dosi pilular. admisceo trochisc. alhand. gr. 3. ad alvum solvendam.

1. de Castoreo quibus sæpius uti soleo, tales sunt, sumique possunt ad aliquot septimanas.

2. Castor. opt. ceruss. antimon. vel (quod melius) flor. ejusdem ad sumum albed. fixatorum an. 5 x. opopanax. 3 j. sol. & sem. rut. rad. valerian. sylv. succin. alb. præp. an. 3 j. rad. vincetoxic. contrayerv. viperin. Virgin. cort. rad. sativ. cort. Winteran. cardan. om. nuc. moschat. an. 3 j. camph. sal. volat. succin. an. 3 j. Optime præparata misceantur cum q. s. mellag. liquid. bacc. junip. f. massa pilularis, cui add. ol. stillatit. rosini. & succin. rectincat. an. 3 j. malaxentur diu & f. fermentatio per dies aliquot ante usum, quotidie sedulo pinsendo & volutando in vola. Servetur in vase vitreo probe clauso ad usum. Dosis 3 j. mane superbibendo haustum aquæ antiepileptica, vel Julap. seq.

3. Aq. illat. ceras. nigr. pæon. lil. convall. an. 3 iv. sp. castor. 3 j. aq. cinam. 3 j. confect. alkerin. 3 j. syr. flor. pæon. mar. veron. rubr. an. 3 i j. aq. sal. majoran. lavend. an. 3 j. sp. vitriol. antiepilept. (postea describend.) q. s. ad gratiam, m. f. Julapium.

Brunier multum laudat decoctum seq.

4. Sem. ricin. 3 j. pæon. visc. querc. an. 3 iij. Coq. in aq. font. lb iij. ad med. & potet mane per dies xv.

Aut 4. Sem. ricin. pæon. visc. querc. an. 3 j. sacchar. q. s. misce. mane sumatur cum exercitio.

Convenit quoque Electuarium seq. ad sex septimanas continuatum pro illis qui pilulas sumere reculant.

5. Rad. valerian. min. Pæon. mar. præp. an. 3 j. enul. 3 j. calam. aromat. 3 x. scicul. brion. & raphan. rustic. an. 3 iij. cratu. human. C. C. calvar. cervin. calcinat. & spiritu Philosoph. inebriat. ut supra an. 3 iij. secundum mulier. sterq. Pavon. an. 3 v. pulv. stomach. magistral. diaphoret. antimon. fixat. sem. galeg. rut. fol. bux. an. 3 iij. succin. alb. præp. sem. myrrhid. levistic. dictamn. alb. Cret. an. 3 ij. viper. Virgin. rad. contrayerv. ana 3 x. i. pulvis, & cum q. s. mellag. baccar. junip. addita quarta parte mell. scillit. f. Electuarium. Dosis 3 iij. superbibend. haustum potus medicati postea in hoc capite describendi.

Usus Mithrid. cu. cum pulv. rad. Pæon. mar. ad longum tempus multos sanavit epilepticos.

Tinctura sequens sumatur ad 3 iv. mane quotidie hor. 4. ante prandium.

6. Aq. flor. til. lil. convall. ceras. nigr. an. lb j. reddantur acidula ad gratiam saporis cum q. s. sp. vitr. (jamjam describendi) add. rad. Pæon. mar. incis. 3 j. visc. querc. 3 j. sem. Pavon. mar. per medium lect. par. 12. spong. bedeguar. sicc. 3 j. flor. lavend. primul. ver. ana p. 3. hyperic. p. 4. Pæon. mar. p. vi. Extrahe tincturam, que coletur, in qua dissolve syr. è flor. galeg. 3 j. sp. junip. 3 j. m. ad usum.

Specifica est Marcasita illa quæ lapidicinis cretaceis reperitur quæ ad ærem rubiginem contrahit, & tandem dissoluta in pulverem reducitur, si ad ignem uratur, & detur cum succ. imperatoris à 3 j. ad 3 j.

Succus quoque ruta multum hic facit, qui in quibusdam alvum subducit, in aliis vomitum ciet, ut plurimum verò insensibiliter agit.

Ruta sicca pulv. ad 3 j. in veteri cerevisia multum præstat ad longum tempus continuata.

Item Græculi exenterati & optime depilati, cum sem. cumin. & aneth. an. repleti, elibano siccati & tenuissime pulverizati multum in hoc affectu laudantur. Dos. cochl. j. aut ij. mane jejun. tribus diebus ante & post plenilunium & novilunium.

Pilulæ sequentes multum valent.

7. Rad. Pæon. mar. siccatur. 3 j. rad. valerian. utriusq. an. 3 j. rad. oxylapath. rhubarb. Monach. oxalid. scorzon. Hupan. an. 3 vi. fol. betonic. visc. querc. an. m j. flor. anth. stœchad. utriusque calendul. galeg. an. p. iv. flor. til. lil. convall. primul. veris an. p. 3. sem. Pæon. nigell. Rom. an. 3 j. cortic. exter. citr. & aurant. an. 3 iij. caryophyl. mac. an. 3 j. f. decoctio in aq. ceras. nigr. card. bened. ulnar. meliss. mox expressio fortis & per manicam colatura: In qua dissolve aloës succotrin. 3 iv. f. lent. igne coagulatio ad mellaginem.

8. Fol. sem. mundat. minutissime incisorum 3 iv. rhab. Elect. 3 j. Infund. per biduum in aq. Pæon. & cichor. q. s. idque in balneo: mox. t. expressio lento calore coagulanda & miscenda cum prædict. mellagine: reduc ad consistentiam pilular. Dosis 3 j. vel 3 j.

Elect. de lassafas. carminativum sequens multum conducit, si ventriculus & intestina flatibus turbentur.

9. Ligu. lassaf. fragrantiss. 3 j. lign. Rhod. 3 j. rad. valerian. utriusque gentian. aristoloch. rot. enul. camp. an. 3 vi. fol. sicc. absinth. Rom. menth. hyssop. puleg. dictamn. Cret. an. 3 j. flor. centaur. min. hyperic. sambuc. an. p. 3. bacc. junip. matur. 3 j. Omnia sicca concis. & contus. coq. in q. s. hydromel. malvat. vel ejus defectu in vin. Canarin. tenui. f. expressio fortis & colatura per spongiam vel arenam, & tandem coagulatio ad mellaginem: de qua recipe 3 viii. pulv. subtiliss. cort. lassaf. ex radice 3 j. fol. rut. cortic. laur. an. 3 iij. spec. diacym. nostr. 3 vi. flaved. citri, aurant. sicc. an. 3 j. sal. absinth. tartar. an. 3 j. syr. menth. maj. Mesue. q. s. f. Electuar. ad usum dictum.

Victus sit tenuis & siccans. Vitentur vapores, vinum præsertim generosum. Repletio omnis in la. Cœna sit parca, aut nulla: & habitu athletico sæpius imperandum jejunium. Vescatur caricis assatis, passulis & prunis coctis; amygd. pistachiis, & pane bis octo amato. Conveniunt quoque pulveres digestivi post pastus



pallus & ad lecter ingressum. N. B. dietam distinguendam esse prout calus est pituitosus & viscosus, aut salinus; in illo enim casu attenuantia conveniunt, in hoc temperantia & acrimoniam demulcentia. Abstinere a lacte, fructibus multis & piscibus.

Exercitium sit constans, & alvus fluida servetur.

Si ventriculus flatibus repleatur & concoctio non rite procedat, præscribatur talis pulvis pepticus.

℞. Laminæ panis albi. vin. malvat. sæpius infus. & liccat. ʒij. cort. citr. siccat. ʒj. sem. anil. toment. d. an. ʒss. Cran. human. præp. corall. rubr. præp. marg. præp. an. ʒj. succin. alb. præp. ʒj. cinamom. inter. ʒj. ambr. grise. ʒss. sacchar. albi. quadruplum, m. f. pulvis. Dosis cochl. ʒ. aut j. post singulos pastus.

Aliquando soleo iulecula medicata præscribere, pullum viz. infarcendo. C. C. ebor. lign. Rhod. rasur. junip. vite. quere. cartham. coquendo & addend. calend. hyssop. meliss. charephyl. cichor. endiv. &c. In iuleculo post colaturam dissolv. crem. tart. cum aliquot guttis sp. vitrioli sequentis.

℞. Vitriol. Ungar. proprio phlegmate imbut. ad siccitatem redact. (ut artis est) septuplici cohobatione ʒij. corall. rubr. ʒj. Irrocen. tur optime in retorta cum sp. junip. lil. convall. an. ʒss. distilla per gradus ad summum usque & rectificetur, & per vitrum pulverizatum nitretur.

℞. Succin. subtiliss. trit. ʒi. cran. hom. suspens. limat. cornu junioris cervi an. ʒss. Pulveriz. tis affunde aceti acerrimi distillat. q. s. infuso per quadriduum, mox decanta, & cum sp. vini tinctura quæ servetur per se, & magna pellatur per retortam, & colligatur sal volatile collo retortæ adhaerens, cui affundatur sp. vitri. extractus ut supra, digerantur per quadriduum in cineribus in vase collo oblongo, mox in reverberio clauso distilla ad summum usque per gradus. Hic spiritus misceatur cum iuleculis guttatim.

Vel ℞. Sp. tart. rectificat. super cineribus rosin. juniper. guajac. ʒss. sp. buxi & lign. Rhod. rectificat. an. ʒij. sp. vitri. supra præscript. ʒiv. m. & rectifica. Gutta aliquot instillantur iuleculis.

Vel ℞. Crem. tart. alb. ʒiv. instilla sp. vitriol. ʒss. sensim & guttatim de hoc cremore dissolv. ʒss. in iuleculo.

Vel denique huiculus Oxoronia. Zving. optime convenit.

℞. Urin. hominis sani & vinum bibentis ʒij. vitriol. Ungar. ʒij. m. putrescant simul per 12. dies, dem distilla per gradus ad ultimum usque sp. rectificetur ad usum.

N. B. iulecula usurpentur quotidie mane per annum.

Potus medicatus sic decoct. rad. & sem. Pæon. mar. addita mellis deipumati parte octava, & magna quantitate bacc. junip. & fermentetur ad perfectam puritatem, & lagenis indatur ad usum. Sum. haustum extra pastus, & post singulas sp. citricorum dos.

Vel ℞. Rad. Pæon. mar. ʒiv. lign. Rhod. bux. an. ʒj. lassat. cum cortic. ʒj. sol. beton. char. nap. an. m. j. flor. paralyt. beton. Pæon. an. p. 4.

lavend. bux. an. p. 1. summit. rosimar. majoran. an. p. j. sem. Pæon. ʒj. rut. ʒss. bacc. junip. ʒij. spong. bedeguar. ʒss. nuc. mosch. mac. an. ʒij. aq. font. galon. 4. Coq. ad unius consumption. Colaturæ add. mell. deipumat. ʒviii. ferment. allæ recent. ʒb. iv. fermentetur per dies 7. tunc add. allæ recent. cong. 2. fermeiretur adhuc per dies 7. Depromatur in lagenas ad usum. Usurpatur ut supra.

Potui diætet. addo aliquando rasur. C. C. ebor. Cran. human. sariaparil. rad. filic. scorzon. (et in casu melanchol. fol. agrim. ceterach. adiant. &c.) sem. cochlear. Batavic. naturt. horrent. (in casu viz. scorbutico) bacc. heder. murar. cortic. pomor. redolent. Aliqu. nuo lin. teo meudo ceruss. antim. hxiil. ʒb. j. & potui infundo, ut quoque squamas Martis inter cudentum decimas præcipue si sit melancholica.

Ad paroxylum fugandum convenit aqua stillatit. seq.

℞. Rad. aristol. utriusque, gentian. enul. chelidon. maj. cyper. caryophyllat. an. ʒij. zedoar. galang. calâm. aromar. an. ʒj. valer. u. sylv. & hortem. vincetox. Pæon. mar. an. ʒij. visc. quere. & coryl. an. ʒij. fol. siccat. menth. meliss. chamæpit. abinch. centaur. min. hyperic. puleg. hyssop. thym. latucreia, major. rosin. an. m. j. fol. laur. m. j. malabach. ʒss. flor. calend. primul. veris, galleg. itochad. an. p. iv. bacc. juniper. ʒiv. cort. aurant. citr. an. ʒv. pullos picar. nu. 4. pullos lurrund. nu. 8. Huic rite præparatis affunde sp. juniper. ʒij. aq. flor. cil. lil. convall. ceras. nigr. sang. cervin. vel human. ex vitr. ad siccitatem magmatis distillat. an. ʒb. hydromel. malvat. ʒij. digere per octiduum in B. vaporoso: dein distilla in B. M. ad medias: Residuus liquor coletur, magna exprimatur, & post residuum t. distillatio ad mellaginem.

℞. Aquæ stillatit. huiusmodi ʒb. theriac. vet. ʒij. mellaginis extract. ʒj. sp. vitriol. supradict. q. l. ad gratiam (viz. ʒj.) m. & digere per triduum in B. vaporis in vase oblongo colli: cola per chartam, & ulsi servetur in phiala vena optime clausa. Sumat cochl. unum aut alterum cum paroxysmus instare percipiatur, imo in paroxysmo.

Huic addo aliquando verm. terrestr. ʒb. rad. cyclam. flor. lavend. vitriolum Ungaricum aut Roman. ad ʒb. rad. brion. &c. Au ʒb. ij. huius liquoris addo camph. ʒj. sal. succin. volatil. ʒss. myrob. ʒij. cohobo in B. M. quater, ultimâ vice pro ʒb. j. huius liquoris add. sp. castor. ʒij. sp. vitriol. antiepilept. ʒij. aq. ardent. ceras. nigr. per fermentat. ʒiv. sp. saturn. ardent. ʒj. syr. Pæon. itoen. an. ʒss. m. Indatur nodulus ex lign. aloës ʒij. cinam. ʒij. ambr. grise. ʒss. mosch. (nisi sit pro feminis) gr. vi. camph. ʒj. m. sumatur cochleatim in paroxysmo.

Vel ℞. Succ. rut. & scord. an. ʒb. succ. calend. sily. betonic. an. ʒb. rad. brion. recent. ʒviii. rad. Pæon. mar. recent. ʒvi. baccar. junip. matur. recent. ʒb. flor. anth. itochad. Arabic. an. ʒij. flor. lavend. ʒj. castor. opt. ʒss. cinam. ʒij. caryophyll. ʒvi. mac. ʒss. succ. ceras. nigr. ʒb. iv. vin. Hiss. ʒb. vi. Diger. per octiduum in fumo, deinde per B. aqua eliciatur. Aromatiz. ambra & moicho: v. g.

℞. Huius aq. ʒb. ambr. grise. ʒj. mosc. orient. gr. 4. m. & l. iterum distill. Cap. cochl. j. in paroxysmo.

Electua-



Electuarium hoc etiam in paroxysmo præcribo.

℞. Pulv. de gutt. ʒiij. secundin. mulier. præp. ʒij. castor. ʒß. camph. ʒij. sal. volat. succin. & cran. human. rectif. an. ʒijß. m. & cum q. s. syr. alicujus appropriat. f. Opiata. Dosis ʒj. ad ʒj. in aq. Langu exhibend.

Aliquando addo theriac. confect. alkerm. spec. diamb. visc. querc. lap. contrayerv. &c.

Pulvis de gutteta multum quoque valet in paroxysmo, qui talis est.

℞. Rad. Pæon. mar. sem. ejusdem, succin. alb. præp. crystall. rupis præp. C. C. vitriolat. an. ʒij. Cran. human. vitriolat. & crud. an. ʒß. calam. arom. t. visc. querc. rasur. lign. bux. an. ʒijß. coral. rub. corallin. rad. valerian. sylv. spong. bedeguar. an. ʒij. nuc. mosc. flor. lavend. an. ʒj. secundin. mulier. ʒj. ʒvi. & ʒj. ambr. gris. pro quaque uncia ʒj. fol. aur. & argent. minutim. concis. an. 24. m. f. pulv. Dos. ʒj. ad ʒj. in adultis. Detur in liquore seq.

℞. Aq. flor. lil. convall. ceras. ingr. an. ʒij. aq. capit. cervin. rubr. ʒij. sp. castor per insul. ʒi. syr. flor. Pæon. papav. Rhoad. caryophyl. an. ʒx. confect. alkerm. (in adultis) ʒij. sp. vitrioli Philosoph. (qui est residuum ex mercurii vitæ ablutione) q. s. ad gratiam. Detur cochl. i. vel 2. in paroxysmo.

In paroxysmo naribus admoveantur medicamenta ex succino, gagate, carbone lapideo, plumis combustis, ruta, alla foetida, galban. castor. camph. &c.

℞. Sp. vitr. ʒij. affund. coral. rubr. subtiliss. pulverizat. ʒß. rad. Pæon. mar. ʒj. digere ad lenem calorem per dies 3. aut 4. corallium redigetur in pulviculam albam, f. residentia per dies aliquot & supernatabit liquor, de quo sume cochl. i. aq. Pæon. aut ruta cochl. vii. sal. verben. ʒß. m. pro una dosi post paroxysmum statim exhibenda: item ad præcautionem ter aut quater.

Si oriatur Epilepsia ab aliquo affectu uterino, educantur fœces ex alvo per clisterem. Instituat Vomitorium ex vitr. albi ʒii. cum conserv. ros. rubr. ʒij. Præscribatur apozema aperiens, hepaticum, spleneticum, hystericum & purgans. Instituat item purgatio solennis cum pil. cephal. Galeni min. Præparentur humores viscosi in mesenterio, & attenuentur, idque oxymelite sequenti, bis in die sumendo cochl. i. per se.

℞. Rad. eryng. apii, fœn. rusci, taraxac. mund. an. ʒj. cortic. median. fraxin. heder. arbor. an. ʒijß. rad. ireos Florent. nostrat. asar. (in vin. alb. prius lot.) scill. ebul. an. ʒvi. silic. fœnin. Pæon. mar. visc. querc. an. ʒij. fol. marrub. alb. hyssop. puleg. calament. thym. dictamn. Cretic. an. m. i. flor. genist. p. 3. sem. Pæon. ʒj. ocym. alkekeng. an. ʒß. spic. nard. calam. aromat. an. ʒij. cortic. exter. citr. sicc. ʒv. Præparata omnia f. a. infund. per triduum in ciner. calid. vase vitreo probe obturat. in acet. alb. sambucin. vel simpl. acer. rimi. q. s. ad 4. digit. supernat. mox f. expressio; & colaturæ add. mell. Narbonens. despum sacch. cand. pulver. an. lbj. Coq. (non in vase cupreo) ad acet. consumpt. aromatizetur cinam. mac. costi, caryophyl. an. ʒjß. suspendendo in mod. inter coquendum M. f. oxymel ad usum prædict.

De Uterinis in specie vide in cap. de Menstrui obstructione.

Si oriatur à melancholia, aut à lienis obstructione aut alicui alio, purg. tur ager pil. noctris cathol. ʒ gr. 20. ad 24. aut pil. Tralli. in de lap. Armeno, & repetantur ter quaterve ante usum Martis, & in usu ejusdem undecimo quoque die.

Pro chalybeato sumat bolum seq. ad 30. dies.

℞. Sacch. alb. dur. ʒvi. anima hepatis ʒxii. aut ʒß. m. f. pulvis subtilissimus in 30. partes dividendus. & cum syr. violar. q. s. m. f. bolus ex quaque dosi pulveris mane sumendus. superbibend. liquorem posseticum, moderate corpus exercendo.

Cerevisia pro potu ordinat. indatur squama ferri optime purgata & ignita.

Vinum chalybeatum medicatum tale optinere convenit.

℞. Limatur. chalyb. lbjß. polypod. querc. rad. valerian. sylv. vinetoxic. cyper. recent. an. ʒvi. lign. Rhod. cort. lign. sancti. an. ʒß. fol. sicc. melis. rut. ceterach. an. ʒijß. bacc. junip. rec. ʒv. visc. querc. sem. Pæon. mar. an. ʒijß. caryoph. mac. cinam. an. ʒij. Limatura iteretur bis vel ter aceto sambucin. & siccata teratur; dein in ampulla vitrea ampla affund. omnibus mixtis vin. alb. generos. lbvi. obturetur exacte; locetur super furnum piloris per dies 15. sæpius commovendo. De colatura sumat ʒiv. alternatim cum sero lactis oxymelite depurato ad lbj. facchar. rosato edulcorato.

Quibusdam multum profuerunt aquæ Tunbrigenes.

Harudines quoque hæmorrhoidibus applicentur.

Instituatur quoque balneatio in aqua ferruginosa, aut aqua dulci.

De Antimelancholicis in specie vide in capite de Melancholia hypochondr. quæ cum antiepileptis specièis sunt admiscenda.

Si status adstet (uti sæpius in Melancholicis evenit) bis in die ventric. foveo foru seq.

℞. Rad. aristoloch. utriusque, gentian. enul. can. p. angelic. an. ʒij. lign. Rhod. cort. citr. aurant. an. ʒijß. fol. absinth. utriusque, menth. nalturt. hortens. coll. hortens. an. m. 2. summit. rut. origan. puleg. serpyll. an. m. i. bacc. laur. junip. an. ʒijß. caryoph. nuc. moscat. an. ʒijß. zinzib. ʒvi. Include sacculis duobus & decoque in aq. fabror. part. 8. & una acet. sambucin. acerr. addendo quartam partem vini muscatellin. f. s. totus mediocriter calide applicand.

Post forum utor linimento seq.

℞. Ol. lil. alb. rutac. an. ʒj. ol. express. nuc. moschat. ʒij. ol. anis. rosimar. baccar. j. nip. an. ʒß. m. f. linimentum pro regione ventriculi.

In pueris epilepticis, vel ob dentitionem convulsis, pulvere seq. optimo cum successu usus sum.

℞. Pulv. nostr. antiepilept. (suprà descript.) aut secundin. mulier. ʒij. rad. valerian. sylv. viper. Virgin. contrayerv. an. ʒj. C. C. vitriolat. magister. vel sal. coral. an. ʒiv. lap. bezoar. Orient. & Occident. ambr. gris. an. ʒij. camph. ʒß. fol. aur. argent. ana num. ii. (vel quod melius aur. fulminant. crystall. Diana ana gr. 15.) m. f. pulvis subtilis, cui add. cinab. mineral. in alcohol. redact. ʒv. & grau. 15. Rhialz fidelissimè obturatæ indatur ad usum. Dos.



Dof. 2 gr. 12. ad 30. ad singulas Lunæ quadras ad præcautionem, alias statim post paroxysmum. Convenit hic quoque Mercurius præcipitatus solaris per se præcipitatus : & pulvis de gutteta supra descript.

In infantibus usus sum inunctione cum linimento seq. per totum caput, abradis capillis.

℞. Lumbrie. terrestr. ℥ij. catell. ping. lactant. exenterat. & per frusta sect. num. 2. ol. com. ℥j. ol. amygd. dulc. recent. ℥ss. vin. alb. generosiss. ℥ij. bulliant ad animalium putrilaginem, sub finem addend. flor. primul. ver. m. iv. viol. m. iij. flor. keyr. m. ij. Exprime, & adde medull. crurum vituli 3 iij. sperm. cet. rec. 3 iij. m. Huic addi potest pro re nata ol. de castor. & keyr.

Soleo quoque mane & vesperi exhibere 3j. pulv. Cran. human. & cochl. cum syr. viol. Si suspicio sit verminum, exhibeo conserv. ros. rub. cum sp. vitrioli nostro acidulatam.

Ad roborandum caput sine insigni calefactione applicetur Empl. seq.

℞. Empl. diachalcit. 3ij. diachyl. ireat. 3ss. de betonic 3j. cum tantill. ol. catell. f. empl. Si calidius velis, adde pulv. succin. sal. lavend. &c.

D. de la Mer. dicit, se multos curasse Medicament. seq.

℞. Acet. acerrimi (vin. viz.) q. s. distilla in alembico lato & amplo plumbeo novo aut saltem abrafo (iosario dicto) evocetur phlegma relictis sp. acrioribus. Dof. 3 iij. Vomitus movet non nimis violentum, & potenter expurgat ventriculum sine ullo pravo symptomate. Ito fuso coloretur cum santal. citrin. odorque concilietur cum grano moschi. Quidam distillant in alembico cuius fundum sit cupreum & capitellum plumbeum, & post distillationem ad mellaginem, totum simul commiscunt. Pueris exhibeatur à 3 ij. ad 3 ss. Convenit quoque in omnibus capitis affectibus difficilibus, Apoplexiâ, Lethargo, Phrenitide, oculorum & aurium inflammatione, Cephalalgia, &c. imò in tophis Venericis, tinea, scabie, lepra, herpete, arthritide, &c. in obstructionibus item hepatis & lienis.

Mulier quædam sæpius in die ex caduco decedens, stupida, pallida, cachectica, hinc perfectè convaluit.

Empiricus quidam post universalia remedia nucham candelâ cereâ incensâ, cauteriis instar, inurebat, & radices Peconie in patella cum butyro frixas continuo comedendas dabat, & ita juniores & adultos magna cum admiratione curabat.

Medicus quidam Gallicus (nomine Potier) solebat dare solam cerussam autimon. per cochlearia bis terve in die per plures dies consequentes ad debellandos graves, morbos chronicos (& hunc inter ceteros.) Est præparatio Angeli Salæ, & color juxta ignis gradum mutatur.

Thermæ naturales vel artificiales multum hic profunt, præcipuè si sit conjunctus hic affectus cum affectu soporoso. Balnea laconica usurpari possunt è vapore decocti laur. lavend. majoran. sal. calamenth. origan. puleg. stæchad. aliisque nervinis præparata.

Fontanella convenit, si sentiatur aura ab aliqua parte externa ascendens in caput, quæ aperitur in illa ipsa parte affecta.

Sæpius Pyroticum applico inter primam & secundam vertebra collis, cujus eschara debet esse lata, & ulcus trium quatuorve pilorum capax; & diu apertum teneri: & post annum si ulcus occludi debet, fontanellas duas in scapulis latas facio. Hoc tantum in casu desperato.

Emplastrum quoque sequens capiti raso adhuc continuo gestandum & octavo quoque die renovandum, post ejus totum cum vino malvatico calente & spongis.

℞. Empl. de betonic. 3 vi. gum. elem. carann. guajac. ladan. puriss. ℥ij. styrac. calamit. benzoin. succin. (vel, si habeatur, balsam. ejusdem) ana 3j. sterc. columbin. 3x. turbit. hermodact. agaric. ana 3vi. rad. helieb. utriusque, pyrethr. ana 3i ss. caryoph. nuc. moschat. ana 3iij ss. terebinth. Venet. balsam. Peruv. nigr. (aut liquidambr.) an. 3vii. ceræ novæ q. s. (3 viii.) terantur terenda ut alkool, & f. s. a. emplastrum.

Operimenta capitis sustinere soleo mane & vesperi in ingressu lecti vitato nimio calore, idque pulvere seq.

℞. Thur. maitich. vernic. oliban. lign. Rhod. an. 3vi. ros. rub. flor. lavend. rasur. lign. juniper. an. 3v. sem. nigell. Roman. cortic. vivid. pistach. an. 3iij. m. f. pulvis crassiusculus pro suffitu.

Huic suffitui addo sæpe f. ndarach. benzoin. styrac. calamit. succin. lign. guajac.

Periapta fiant ex lapide ætite pulv. & cerato calefaciente excepto. Aut ex ungula Alcis f. annulus digito gerendus, aut collo suspendatur. Item Ambar. Coral. caput Cuculi collo suspensum, lapis Chelidon. qui in hirundinum pullis dissectis primo partu exclusis invenitur, quod accidit plerumq; Lunâ crescente. Item ossa Lacertæ viridis sale corrosa dum adhuc vivæ induntur ollæ & sale consperguntur. Item cingulum de corio lupi. Item rad. & sem. Pæon. mar. Ruta sylvest. radix aceto humectata & naribus oblata; ut quoque semen ejusdem. Smaragdus integer collo suspensus. Umbilici Infantis portuncula in annulo gestata. Batrachii rad. recens effossa.

Amuletum compositum sit tale.

℞. Lap. ætite rad. & sem. Pæon. mar. flor. album gerentis, batrachii an. 3j. sol. & sem. rut. sylvest. abrotan. hyssop. an. 3 ss. ungu. dextri pedis posterioris Alcis, ossium lacertarum viridium, cineris cuculi, succin. alb. Corall. rubr. an. 3vi. flor. lavend. stæch. Arab. an. 3iij. lapid. chelidon. rursi mense Augusti collect. in augmento Lunæ nu. 3. 5. 7. caryophyl. 3ij. amb. gris. 3j. mosch. 3j. Terantur omnia, exceptis lapidibus hirundinum, in pul. subtiliss. & cum muceag. gum. tragacanth. aq. rutæ extract. q. s. f. pasta, ex qua fiant placentulæ, quibus imprimantur sigillo quæcunque volueris, sive literæ, sive notæ aliz: Placentula à summo ad imum transfigatur penna nivi calamo, cui indantur lapides chelidonii, & repleatur amalgamate ex parte una Lunæ, & tribus vel quatuor Mercurii vivi puriss. Penna obturetur subere, & cerâ Hispanicâ sive laccâ. Totum siccatum exactissimè includatur sacculo ex Corio lupi, tegatur syndone coccineâ, & suspendatur e collo loro serico coccineo, ita ut os itomachi attingat. Gestetur continuo. Potest placentula sine involucrio, aureo vel argenteo circulo lævissimo circumsepta, suspendi ex collo, ita ut immediate nudam cutem tangat.



Mihi contingit Casus cujusdam qui post varia medicamenta incassum exhibita tandem in febrem incidens intermittentem, transactis aliquot paroxysmis perfecte convaluit. *Theod. de Majern. Prax. Medic. lib. 1.*

Licet insanabilis putetur epilepsia, plerique tamen ab illa evaserunt. Verum recens, in pueris, breves habens, & leves paroxysmos, atque a causis evidentibus excitata, facilius solet esse curationis; Diuturna vero, hæreditaria, in senibus, crebrius repetens, & diutius perdurans, cujus etiam occulta causa est, vel nunquam, vel difficillime curatur. De ea autem scribit Hippocrates 1. *Aph. 45.* Quicumque Juvenes morbo comitiali laborant, mutatione maxime ætatis, & temporum, & locorum, & victuum quoque liberantur. Et 5. *Aph. 7.* Quibuscunque morbi comitiales sunt ante pubertatem, mutationem accipiunt; Quibuscunque autem vigesimoquinto anno, serè commoriantur, & eodem libro 1. 70. A quartanis capti non admodum convulsionibus capiuntur; si verò prius capiantur, & quartana supervenerit; liberantur. Idem etiam reperit 6. *epid. sect. 6.* quartana correpti à magno morbo liberantur.

Remedia Medici distinguunt, nedum pro causarum, sed etiam pro temporum diversitate. In ipso paroxysmo omnem industriam adhibent ut quàm citius fieri potest æger in sensus redeat; In posterum vero præcavere conantur, ne denuo illo corripiatur, pervestigatis scilicet causis, unde fomitem is habeat, & repetitionem, hisque pro re nata, domitis, vel expulsi.

Ad primum, plura solent in hanc rem adhibere: extremas partes arcte obligant: nares, tempora, & palatum oleo succini, rutæ, Castorei, aliove inungunt: podici supponunt balanos acres ex felle, aut sapone Genuensi: scapulis, & cruribus cucurbitulas cum frictionibus, & cutis incisione, admovent: Capillos evellunt, aut cum spiritu vini cremant: ungulam Alcis, quæ a proprietate dicitur epilepticis succurrere, collo suspendunt: fortiora enemata injiciunt: acerrima violenter in os immittunt, maxillas diducunt & lignum aliquod interficiunt, ne à dentibus vehementiori motu compressis lingua scindatur: neque desunt, qui in aures cantilenas quasdam insurgent, aut inclament.

Alii solis anti-epilepticis patientes blandiis eunt, ductus cum cerebro consentientes roborando, fovendoque spinam, essentiis capitalibus, ut lavendulæ, Castorei, rutæ sylvestris, salvie, rorismarini, succini, opobalsami. Quare ad excitandos epilepticos immitte in nares succum rutæ ad unciam semis cum Castorei drachma una Rodericus à Fonseca. Intrudunt etiam in os anti-epilepticum aliquod medicamentum, ex his quæ infra referemus. Quod autem nonnulli affectos erigunt, illorumque brachia, & crura à motibus cohibent, vel in hoc, vel in illo situ constringunt, sternutamenta moventia naribus induunt, cucurbitulas, & incisiones adhibent, diversisque modis patientes asperius tractant, & paroxysmi morem interrumpunt, & Naturæ conatus impediunt: hujusmodi enim Praxis sæpissime perperam instituitur; quoniam hoc

pactio duplex Naturæ molestia: altera nimium à morbo, & altera non levior a Medentibus intentatur; cum longè præstitisset sinere paroxysmum juxta morem suum transire, & laborantes unica tantum plagâ affligi; sapienter quidem concludit Willilius *de morb. Convuls. cap. 3.* solum vomitoria conferrent plurimum, si à ventriculi gravamine æger convelleretur, & natura per eam partem seipsam exonerare tentaret.

Ad secundum, Prophylaxim variè instituunt, pro varietate causarum, & partium quas putant affectas. Qui in Idiopathica epilepsia obstrui arbitrantur cerebri ventriculos crassis, viscosisque succis, toti sunt in evacuando; neque solum per ea, quæ alvum laxant, aut vomitum movent, sed etiam per erina, caputpurgia, cauteria, tum sinelipiti, tum collo, tum brachiis, & tibiis adhibita. Quinimo Petrus Salus Lusitanus Diversus, & Zacutus, etiam sanguinem mittendum aliquando suadeat, arbitrati dari posse epilepsiam à sanguine. Exhibent similiter decocta capitalia dicta, ad extenuandos humores, eosque per cutim educendos; ac præterea nonnulla alia medicamenta, quæ ipsis dicuntur a proprietate occulta epilepticis opitulari, & imminentes paroxysmos præcavere. In sympathica vero, præter ante dicta, quæ cerebro succurrunt, offerunt quoque quæcumque malè affecta viscera, unde labes tanti mali provenire creditur, repurgent, & moderentur.

At Hippocrates præter usum Hellebori utriusque, sed præsertim albi quo vomitus provocaretur commendavit Pyrethrum. Et Galenus usus est oxymelle, tum simplici, tum scillitico.

Qui vaporibus acerbis, maligna conditione cerebrum stimulantibus, causam hujus affectus attribuerunt, ipsis retundendis, & castigandis incumbunt, atque insuper humores ex quibus illi elevantur, apposis medicamentis educere conantur; non neglectis interea, quæ visceribus consentientibus occurrant.

Sylvio Leboë commendantur quæ salempossident per lixivium parandum, tum fixum, tum volatilem; ut Ruta, Polium Montanum, Prænix semina, & radices, etiam valerianæ, & Dentariæ; Liliorum convallium, & Tiliæ flores, viscum quernum, & Corylinum. similiter spiritus, & sal volatile C. C. Castoreum, Corallium, succinum, Hirundines, Picæ.

At verò Gerardo Blasio visum est curationem absolvi per emendationem causarum irregularem motum in musculis efficientium. Quamobrem spiritus tenuiores, & mobiliores alterandos præcipit refrigerantibus, & opiatibus: Nervos obstruatos aut compressos, reserandos, & amplificandos: vitiosos humores purgandos, & corrigendos: roboratis tamen partibus ad illorum generationem dispositis, & Cephalicis anti-epilepticis remediis congruenter adhibitis.

Paulus Barbette purgantibus insistit, & lympham temperantibus; neque vero omittit, caput roborantia, simul cum visceribus compatiens, sed præcipue anti-epileptica tum simplicia, tum composita.



Willisio Therapeia instituitur, primo per emeticum, si æger vomitionem toleret, & quidem usu salis vitrioli in tenerioribus; croco metallorum, vel mercurio vitæ in adultioribus. Secundo per phlebotomiam, vel affixas hirudines. Tertio per medicamentum Catharticum. Quarto per specifica anti-epileptica. Quinto per cauteria, & vellicantia, itemque emplastra Capitalia, sternutamenta, enemata, decocta: atque his non proficientibus per diaphoretica, & salivam educentia.

Non dissimiliter procedit Cheimau. Nam instituto in primis victu tenui, & exiccante, parumque calefaciente, prohibitoque vini, & veneris usu, ab enemate incipit, cujus peculiarem descriptionem habet: mox venam cephalicam utramque aperiendam præcipit; postmodum purgat bis saltem in menſe. Ad hæc utitur specificis, sed præsertim porione, qua se expertum dicit, composita ex aquæ Pæoniz ꝑij. Theriacæ veteris ꝑj. Spiritus vitrioli gutt. iv. sumenda tribus horis ante prandium. Neque negligit externa, ut emplastra, pulveres capiti deterso inspergendos, cauteria, & reliqua respicientia partes, unde malignus vapor ad cerebrum exhalat, ut fufius apud ipsum est legere.

Hennetici, quia morbum hunc cum Paracello vitriolatum appellant, in spiritu vitrioli viridi illius curationem collocant, illumque præ omnibus aliis remediis proprium, & præsentaneum fatentur: Cujus descriptionem, præparationem, & usum refert Quercetanus in *Tetrade gravissim. cap. affect. cap. 30.* Transcribit etiam Idem Author ibidem ex Paracello Anti-epilepticum aliud medicamentum ex vitriolo pariter, aliisque simplicibus compositum. Commendant præterea Paracelsistæ plura alia ad hunc affectum penitus extirpandum. tum purgantia, tum specifica medicamenta ex Mercur. Antimon. Cinnabar. Antimonii, Cinnabari fossili, & nativa, helleboro, cranio humano, & Coralliis elicita, quæ præ cæteris referunt, & describunt idem Quercetanus, Crollius, Hartmannus, Grullingius, & Rollinchiuss.

Helmontius multa adversus epilepsiam sparsim recitat, præsertim verò ungulam Alcis asfrictam, appensamque instar Amuleti: Sympathicè enim ait epilepticos impetus paulatim arcere, sed assiduo usu effectam, & inefficacem reddi. Hirundinibus etiam magnam vim attribuit. Alibi commendat saltem volatilem sanguinis humani, & salia volatilia vegetabilium cephalicorum. Itemque tam Adultorum, quam Infantum epilepsiam curari dicit Spiritu salis Cruoris.

Quoniam verò ab experimentis innotuit epilepsiam à constitutis quibusdam causis, superius memoratis, oriri posse, quæ nisi auferantur, impossibile sit illam curari, propterea peculiaribus remediis, eisdem occurrendum. Quare Abscessus, vel præcaveatur, si imminet, vel ad resolutionem, modis supra relatis, perducatur, si jam factus sit, vel alio officio digeratur, & expurgetur. Idemque opus in ossis calvarie carie omnino adhibendum.

Si per consensum ventriculi fiat, præter vo-

mitoria, vel subducentia medicamenta congruenter adhibita, specialiter de eo roborando, deque corrigendis succis in eum confluentibus, ratio habenda erit: in quem usum summe conferent electarium baccarum Juniperi, spiritus earundem, elixir proprietatis, spiritus malliches, pulvis stomachicus Quercetani, pilulæ Ruti, Oleum Cinnamomi, essentia menthæ, aut salvæ, electuarium absinthii, decoctum cooffe: coque magis, si cum his commisceantur anti-epileptica.

Si ab Hypochondriorum vitio, atque scorbutica affectione, dependeat, ad Anti-scorbutica deveniendum, spiritum cochleariæ, beccabungæ, nasturtii aquatici, raphani; non omisſis acidum retundentibus alkalicis, & ex chalybe compositis medicamentis.

A retentis secundinis, & Placenta, nedum sternutamenta evocantia proderunt, commendata ab Hippocrate 5. *Aphor. 49.* Verum etiam hysterica involentia, ut radix dictamni, valerianæ, aristolochiæ: extractum granorum actes, sæcula bryoniæ, trochisci de myrrha, extractum Castorei, & hyperici, Tinctura succini, essentia Croci.

Si à vermibus, illi necandi, & deturbandi medicamentis ad id comparatis, quæ suo loco referemus. Pari modo in reliquis causis agendum.

Inter purgantia (cum corpora sunt succi plena) præstant extractum catholicum, Miera picra, Pilulæ cochæ, trochisci alhandal, extractum agarici, resina jalapæ, oxymel scilliticum, antholatum dictum, pulvis Comitis de Warvich, extractum hellebori nigri, Pilulæ ex tribus Galeni, Barbettianæ, & similes.

Præ cæteris prodesset speciatim experti vocant Medici hæc ab effectu anti-epileptica vocata: suntque Radix, & semen Pæoniz ex Galeno, & Zacuto; ejusque elixir ex Mynsicht: Radix valerianæ sylvestris ex Riverio: Radix Dentariæ, ejusque aqua: semen suponariz ex Borello: Ruta crucigera, ejusque succus ex Langio: viscum Quercicum ex Boyle, aut etiam Corylinum, illiusque oleum Rutando celeberrimum: Caranus, & millefolium ex Cratone: essentia lavendulæ, spiritus cerasorum nigrorum; saxifragæ, liliorum convallium, & horum tiliz, ac verbenæ pulvis ex Mizaldo: Frutex sambuci in salice inventi ex Hartmanno; unde Amuletum ipse componit, quo curari posse, ait, etiam qui longissimo tempore hoc morbo laborant: comprobaturque Thomas Bartholinus in *Cent. hist. 4. 69.* Pulvis radices Phn, seu valerianæ sylvestris ex Fabio Columna, & Panarolo: Acori radix contusa, & in potum exhibita ex Heurnio: succus Aquilegiæ ex A. Cassero: Radices Arthemisiæ annosæ emortuæ ex I. Deckers: Lunus nicotianæ, seu Tabaci ex Riverio.

Similiter hepata Ranarum, quorum præparationem, & usum memorat Hartmannus: Cerebrum humanum, ejusque spiritus ab eodem descriptus: Castoreum ex Galeno, illiusque extractum: Jecur lupinum ex Borello: Spina dorsi mulæ fluvialis, ipsiusque sanguis, quo se viduæ sanatum epilepticum viginti quinque annorum reſert Mor. Augu-



nus : Caro lupi in pulverem redacta, & fel catelli nigri ex Riverio, quod utilitissimum in Anglia testatur Schlegius : Pulvis corvinus, quem ex Gelnero summum secretum esse scribit Reusnerus : Aqua Picarum, & Hirundinum ex Rondeletio : Ipsæque Hirundines in pulverem redactæ ex Forcillo : Pulvis secundinæ primiparæ ex Finckio, & Deckers : Cranium humanum, ejusque extractum, spiritus, sal volatile, magisterium, oleum ex Paracelso, Quercetano, Hartmanno, Schrodero, Sennerto. Sanguis humanus ex Thoma Bartholino, qui pro Amuleto haberi quoque ait lapidem nephriticum collo suspensum : spiritus ejusdem sanguinis humani ex Helmontio : stercus Pavonis in pulverem contritum ex Cratone, Borello, & Riverio : Cornu Cervi crudum, vel usum, ejusque spiritus, & sal volatile ex Hartmanno, Sennerto, & Grullingio : Lotium vaccinum ex Libavio : vesica Apri cum lotio in clibano exiccata ; vel testes ejusdem, & Galli ex H. Angenio : Pulvis lumbricorum terrestrium ex Heurnio.

Præterea Cinnabaris nativa Craton. & River. vel ejus loco cinabrium Antimonij, F. Hofmann. Succinum, atque illius magisterium, oleum, sal volatile, Tinctura, Quercet. River. Chafnau : Pulvis chrysoliti Cardan. Smaragdus digitis gestatus A. Boet. vel cum Corallio ut carnem contingat, Zecch. Corallium rubrum, cujus grana x. cum materno lacte exhibita ante omnem alium cibum, vel potum pueros ab epilepsia tueri tradit Villanovanus, & Camillus Leonardus, atque ab his testantur idem, Boëtius, & Hoëferus : Crystallum præparatum, & simul cum smaragdo, & Corallio rubro exhibitum, Sennert. Bezoarticum lunare, & diâ luna Mynliche.

Inter composita demum, & usu magis comprobata recensentur Aquæ, Pulveres, electuaria, Potiones, emplastra, & olea.

Ex aquis, ut est quæ P. Barbette mirabilis dicitur : hic sapon. hiip. albiss. ʒʒ. Coq. in lacte vaccino, & Col. ʒiij. exhib.

Item quæ ex Hirundin. xc. rutæ m. ij. Castor. ʒj. vini albi lib. ij. destillat. in B. M. & servatur usui. Dosis cochlearia duo in paroxysmo, vel mane, extra paroxysmum, etiam in inveterata epilepsia, apud Guil. Rondelet.

Vel facilius : Hirundines juvenes q. v. Contrund. & cum Castor. m. add. mod. acet. acerr. destill. more solito.

Aliam aquam stillatitiam describit, & extollit H. Augen. tom. 2. epist. & Consil. lib. 8. epist. 2. Describitur & alia à B. Sylvatic. cem. 1. observ. 47. ex hirundinibus, & Picis, additis variis simplicibus anti-epilepticis, quæ ab eodem mirabiliter commendatur.

Ex potionibus, & iulapiis : Aq. beton. & flor. tiliz singul. ʒij. Aq. fœnic. vitæ Matth. & anti-epilept. Langii, singul. ʒj. spirit. sal. Ammon. ʒʒ. Tincturæ Castor. gutt. x. flor. hyperic. ʒj. laud. opiat. gr. iv. ol. succ. gutt. v. Syr. itachad. ʒj. m. & singulis diebus ad minimum cochlear unum, aut alterum quater exhibet Deckers ad Prax. Barbett.

Aliud : Ther. vet. ʒj. aqu. Pzon. ʒvi. spirit. vitriol. gutt. iv. expertum dicit Chelneau.

Pro infantibus verò : Aq. flor. tiliz, & fœnic. singul. ʒj. Syrup. itachad. & diacod. singul. ʒʒ. spirit. sal. Ammon. ʒʒ. Ex eodem.

Ex opiatīs, & electuariis : Pyrethr. itachad. & Coli. singul. ʒx. agar. ʒv. sem. Carui, anethi, assæ fetidæ, & aristolochiæ rotundæ singul. ʒijʒ. succ. squill. & mell. elect. singul. lib. x. & ʒij. Coq. simul scill. & mel lento igne usque ad consistentiam, deinde superadd. speciebus. f. elect. Dosis omni mane ʒij. quatuor horas ante cibum. Ex Montagnana.

Aliud : Conf. flor. beton. & anth. singul. ʒij. Rad. eryng. condit. & mithrid. singul. ʒj. pulv. lign. salisfræ ʒvi. Castor. ʒiij. Cran. hum. non humati, & ungulæ Alcis singul. ʒij. Rad. & semin. Nigell. rutæ sylvestr. & radic. pyreth. singul. ʒj. oxymell. q. f. f. opiatæ. Dosis ʒij. vel iij. singulo mane. Ex Riverio. Utraque morbum radicatus tollere dicuntur.

Ex pulveribus : Castor. Cran. hum. ungulæ Alcis, C. C. calcinati, itybij præparat. opopon. sanguin. drac. & lapid. ætit. singul. ʒʒ. Sal. sylvestr. & tormentill. singul. ʒj. semin. & radic. Pzon. sem. rutæ, & beton. singul. ʒʒ. Margar. & smaragd. præparat. singul. ʒj. succin. albiss. ʒj. stercor. asser. sylvestr. vilci querc. & Corall. rubr. præparat. singul. ʒʒ. spinæ dors. serp. ʒij. & calcit. præparat. ʒʒ. f. Pulvis. Apud Grulling. mirabilis dicitur in suo Florilegio ; cujus dosis ʒʒ.

Alium pulverem admirabilem prædicat H. ab Heers, quem componit ex cranio hominis, stercore pavonis, vesica Apri cum lotio in furno siccata, visco columno, oleo succini inodoro.

Sed longè efficacior observatus est, qui conficitur ex Cinnabar. Antimon. magist. corall. margar. & cranij human. singul. ʒj. lign. visc. querc. & Castor. veri singul. ʒiʒ. sem. rutæ, & Pzon. singul. ʒʒ. sal. volat. succin. & Ammon. singul. ʒj. Cinnam. q. f. Dosis à ʒʒ. ad ʒj. in aqua hirundinum, lavendulæ, flor. tiliz, vel alterius similis mane jejuno stomacho.

Celebratur etiam pulvis corvinus à Reusnero ex corvis juvenulis combustis, & in pulverem redactis cum aliquo liquore convenienti. Alius efficacissimus conficitur ab Hartmanno ex Jecinoribus Ranarum, quo restitutum fuisse scribit Fridericum IV. Palatinum qui ab anno 15. ad 26. fuerat epilepticus. Simplicior verò est qui ex verò visco querno fit, & ad ʒj. exhibetur in aqua ceraforum nigrorum singulo mane per dies aliquot (circa Plenilunium nonnulli volunt,) eoque nobilissimam quandam sceminam epilepsiā penè hæreditariā diu afflictam, cum cætera irrita fuissent, sanitatem obtinuisse testatur Boyle : Et nos aliquando Nobilem quendam puerulum novem annorum deformi capite progenitum, & pluribus epilepticis invasionibus confectum, unā cum tertiana febre, perfectè curatum vidimus, cum quo tamen miscebatur cortex Peruvianus, ante imminuentem accessionem exhibitus, quem anti-epilepticum quoque esse aliās deprehendimus.

Ex emplastris præstat, quod habet : succ. albiss. thur. & mastich. singul. ʒiʒ. galban. & opopon. singul. ʒj. visc. querc. ʒij. ambr. griff. gr. vi. mosch. gr. iij. sem. Pzon. mar. ʒʒ. lada-



ni 3 i β. ol. nuc. myrist. parum. Extend. super corium, & asperg. pulv. cubeb. & futuræ coronali imponatur. Ex Cratone, & Horthio, qui efficacissimum tum pueris, tum adultioribus factentur.

Aliud: gumm. amm. gumm. junip. thur. & mastich. singul. 3 ij. sem. prœn. mar. & nuc. myrist. singul. 3 ij. Corall. rubr. præp. ras. ebor. & C. C. sing. 3 j. malax. cum styr. liquid. & f. emplastrum, atque extenditur super alutam. Arcanum habitum est Salieno Medico Monspelienſi, quo etiam provecæ ætatis epilepticos integræ sanitati se restituisse testatur, præmissis tamen universalibus, atque interea epotâ hac aquâ. Hirundines adhuc in nido existentes viij. rad. prœn. visc. querc. singul. 3 iij. fol. rutæ m. j. flor. Lil. convall. p. ij. Castor. Caryophyll. & macis singul. 3 ij. in suff. quant. vini alb. acet. scillit. & aq. meliss. super cineres calidos infund. per hor. xxiv. deinde distill. atque in vase vitreo opt. claus. collig. & servet. Aqua. Dosis pro natu majoribus ab 3 j. ad 3 ij. pro minoribus ab 3 β. ad 3 j.

Ex balsamis, & oleis, valet hoc: gumm. galb. bdell. in aq. ard. dissol. singul. 3 β. benzoin. 3 j. styrac. liquid. 3 j. fol. rutæ, chamædr. flor. stœcnad. & lavend. singul. 3 ij. rad. cost. 3 β. Castor. 3 j. infund. incisa, & pulver. in aq. vitæ, & detin. ad macerand. in loco calid. per dies aliquot. Eo postmodum frequenter fricetur spina. Plater. lib. 1. obs.

Henricus ab Heers describit oleum quoddam à se ipso expertum, quod sit: vitrioli Merc. aut viridis æris calcin. lib. j. β. cran. hum. & ungu. Alcis singul. 3 ij. visci querni, vel potius colurni, & sem. prœn. mar. singul. 3 j. Hæc cum spirit. vini purul. lib. ij. diger. in retorta, & distill. secundum artem. Ingratissimum est & odore, & sapore, sed miræ efficaciz si cum aqua convenienti sumatur.

Mirtheum etiam est oleum Buxi, cujus guttæ tres in cond. prœniz exhibentur jejuno stomacho; & in ipsa accessione cum aqua flor. tiliz, vel prœniz ad 3 iij. gutt. x. Roderic. à Fonseca in Consil.

Plurimum quoque valet essentia lavendulæ, rosmarinii, salviæ, & Castor. cum opobalsamo, si his universa spina cum occipitio usque ad futuram coronalem inungatur.

Intrinfecus apud Nostrates in usu frequentior est spiritus ceraforum nigrorum sylvestrium, sal volatile C. C. spiritus sanguinis, ex sale ammoniaco & tartaro elicitus, sal ammoniaci flores, sal volatile succini. Valde efficax expertus sum, præsertim in sceminis magisterium succini, hoc modo paratum. Dissolvitur succinum albisimum in spiritu vini, ita ut hic tingatur: per filtrum postea trajicitur, & leni calore ad dimidium evaporet: reliquum servetur. Dosis g. x. usque ad xx. & ultra in aqua lavendulæ, aliove simili liquore.

Pro coronide non præteribimus quod Paracelsus in dicta commendat cum oleribus coquenda folia hellebor. nigri, & pro sale viscum querceum in pulverem redactum substituendum quo contentus patiens salem communem minime expetierit, certò constare, ait, eum, caduco morbo laborare. Num insuper reverà curatus sit, eodem signo dignosci posse: si nimirum con-

dimentum visci quernei nauseam moveat. Conjecturam alij faciunt ex hoc suffitu. Rasuram cornu caprini ad 3 j. cum semidrachma altæ foetidæ injiciunt in prunas; si morbosus concidar, jam curatum dicunt. Commendat denique idem Paracelsus pro cibis: radicem pyrethri, carnem agnam, tuniculum, cuminum, & lac ovium: damnat verò carnes caprinas, poma, pyra, rapa, raphanum, aromata, & libidinem provocantia. Luc. Tozzi, *Medic. Prædic. parte 1.*

### Consultationes.

Cum apud eruditos experientesque viros scholastica & minutissima quæque persequi indignum videatur, & supervacaneum; operæ pretium & vestra eruditione dignum de affectione proposita duxeram, etiam si apprimè gravis & curatu sit difficilis paucis multa complecti, & summas rerum sententias apposite apud vos proferre. At quoniam ita nunc vestra exigit sedulitas, ut non contracta, sed effusiore quadam orationis serie rem totam particulatim explicem, observata quadam styli moderatione neque periphrasi neque metaphoris neque jocis sed seriis nudisque verbis orationem aliquantum dilatare contendam: non tam vobis, quàm laboranti, & iis qui ingentem admirantur scriptorum vocem, satisfactorius. Sequar autem non cum quem de exponendis naturalibus, non naturalibus, & contra naturam rebus artificiose ordinem proponitis, sed quem tandem resolutione ad curationem tenendum exillimavi. Primumque quæ propositi morbi aut symptomatis notio sit & ratio, & quævis attingam.

Morbus, item symptoma quod in consultatione & deliberatione venit, epilepsia est, quæ annos decem insedit ac inveteravit. Hæc licet à levioribus orta initiis, olim in vertiginis potius, quàm in epilepsiz genus divertisse videbatur, progressu tamen dierum veram & exquisitam epilepsiz speciem esse consecuta. Tanta affinitate hæ affectus connexi sunt ut rectè Avicenna, vertiginem diminutam epilepsiam, ex eaque in hanc transiunt fieri notaverit. Cum etiam in consummata epilepsia observemus, non semper graviores illos & immaniores, sed & interdum leviores quosdam & irritos insultus fieri, qui ut in vertigine nulla convulsione, sed sola sensuum & visus hallucinatione cerebrum impetunt. Cum nimirum proxima illa continensque malæ causæ levius excandescit, & exiguum de se vaporem effert. Hanc autem quæ illustrem & magnificum virum diris modis exercet, & exquisitam & consummatam epilepsiam esse recipio, quod in eius paroxysmo absoluta fiat totius corporis convulsio, quodque spuma stridore quodam elidatur ab ore, & sensus omnis atque cognitio cum memoria pereat. Imò verò si neque nulum ejus signum describeretur à vobis, vestra tamen autoritate innixus, hanc pro epilepsia habendam esse non dubitarem.

Sed quum tamen tria à Galeno tradantur, usque notentur epilepsiz genera, unum ab extrenis suscitatum corporis partibus, ut a manuum pedumque digitis. Alterum ab interioribus visceribus: Tertium à cerebro, quod primum est & ipsi proprium: Optarem sanè à vobis indicia



dicia tradita pathognomonica, tum epiphœnomena, quibus certo & luculenter intelligerem in quod genus epilepsiâ hanc referendam putatis. Id enim tum ad medendi rationem, tum ad remedium inventionem imprimis necessarium videbatur quum non una omnium, sed suasit cuiusque generis curatio. Aliis nullo ante paroxysmum tempore, caput artusque omnes ingravescunt, aliis nausea, aut etiam vomitio molesta est, aliis stupore quodam refrigerescunt artus: Alij instantem paroxysmum præsentunt possuntque impendentis repentini casus pericula vitare: alij derepenteprehenduntur & concidunt, nulla præsentione futuri mali. Sunt qui paroxysmo soluto protinus surgunt nullo affecti symptomate: nonnullis vero symptomata quadam ab accessione gravia manent. Horum igitur animadversione proprium epilepsiz genus designari internoicique debuerat. Cæterum in hac reticentia conjiciendum nobis & disquirendum in quod hoc genus maximè pertineat. Comitiali morbo intercipiuntur mentis sensuumque functiones: hinc cerebri censetur affectio. At quoniam ea interceptio interdum sit consensu aliarum partium, ut duobus prioribus generibus: interdum verò per se affecto cerebro, neque ex his quæ describuntur ulla proprium generum audio pathognomonica signa, in postremum divertendum puto, & recipiendum, cerebrum *idiotia*, atque etiam *paroxysmum* concuti. Nec enim venenatus vapor instat auræ frigidiusculæ aut e pedibus, aut e manibus, sensum partium continuatione in caput aut cerebrum obrepere percipitur, nec ventriculi cordisve subversio, aut præcordiorum molesta coarctio paroxysmum antevertit aut ob oculos nonnulla quasi spectra observari videntur. Sed cum Illustrissimus derepente quasi attonitus, aut fulgure percussus corruat, necesse est cerebrum & ipsam mentis ac sensuum arcem obsideri, in eaque proximam, & continentem hujus epilepsiz causam contineri, ac proinde in tertium hanc genus esse conjiciendam. Hanc denique epilepsiam esse primariam & ut appellant essentialem.

Percepta jam affecta sede, & quod cerebrum non aliarum partium consensu, sed per se & primario laborat, disquirendum quæ in ea sit causa Galenus tertio de locis affectis & libro de symptomatum causis, epilepsiam, quæ præsertim sit, contendit ex obstructione quadam omnium ventriculorū cerebri proficisci, ob quā animalis spiritus liberè nequit in sensuum motusq; nervos influere, & omnis legitima tum movendi, tum sentiendi, atque ratiocinandi functionio perit. Impedita vero natura arctius oppressa nondum tamen prostrata onus quasi excutens, caput, corpusque vehementer concutit, dum obstructione soluta infarctum humorem expellat. Hanc causam, quam vos rectè formaleni nuncupatis, magnæ licet rationum probabilitati innixam, & Galeni decreto passim comprobata, validis tum argumentis tum experimentis in pathologia & in dialogis de abditis rerum causis infregimus: aliam statuentes, nempe malignam & occultam qualitatem cerebro cunctisque facultatibus animalibus perinde atque venenum insensam quæ ut e pede percipitur specie quadam frigidioris & malignæ auræ per conti-

nuatas partes sursum in cerebrum effertur: ita ex ipso quoque cerebro suscitari potest, idque protinus sua malignitate terere nulla præsentione paroxysmi futuri. Hanc vero qualitatem malignam & adversissimam cerebrum multo validius excutere contendit, quàm humorem simplicem sola mole obstruente, neque tamen concussioni aut conversioni huius est, donec qualitas illa, vaporis specie suscitata dissipetur, aut sponte sua evanescat, causa hæc non admodum ei dissimilis est quam vel ipse Galenus lib. sexto de locis affectis de uteri strangulati fatetur. Ut enim e sanguine menstruo, atque e semine corrupto vis quædam venenata profertur, quæ in præcordia, infantes, atque in ipsam cerebrum prorepens paria strangulatus symptomata gignit. Ita sane & alia quædam venenata & malignæ qualitatis species epilepsiam facit. Proprie autem epilepsia symptoma est: qualitas vero maligna cerebro insidens ipsa morbus est isque partis similis, & quem alibi demonstravimus totius substantiæ morbum appellandum esse. His ergo principiis firmitus innitendum, hæc itabillenda sunt nobis fundamento, si quæ tam diu & inveterati morbi curatio speretur.

Quamquam autem huiusce qualitatis ad excitandam epilepsiam summa atque etiam præcipua vis est, non parva tamen existit & ejus materiæ, e qua tanquam e fonte qualitas illa prodit, & sine qua vix illa subsistit. Eam quidem esse crassam, lentamque pituitam cuidam melancholico humori permixtam, & in cerebro contineri, eique pertinacius adherere, multis complector indicis. Ac quidem verus illa dextræ naris obturatio, ante unos quindecim nata, oculi quoque dextri obtusior acies, dextræ auris gravior auditio, dextram ipsam cerebri partem non parum offendi, luculenter demonstrant. In ea autem cerebri parte dextra, pituitæ lentæ magnum esse proventum, ostendit insita cerebri temperatura humidior, quam deinde supra modum auxerunt ingluviæ, crapula, cruditates, & ær impensè frigidus ac humidus. At verò melancholiam pituitæ permisceri, testantur ætas in eum humorem gignendum propensa, curæ, mæores & graves cogitationes quibus Dominus implicatur. Quod etiam nobilissimus vir plerumque citra occasionem metû atque mæltitiâ jactetur, Hippocrati indicium est jam obsidentis melancholiæ. Hic certe affectus illos tantâ affinitate conjunxit, ut ex eo eodemque melancholico humore nasci putet: qui si in cerebrum insideat, epilepsiam: si in mentem, melancholiam facit. Itaque pituitæ ac melancholiæ non exigua est redundantia in parte dextra cerebri. Sed hæc si simplex sit, minimè epilepsiam infert, nisi & ea quam dixi externa qualitas accedat. Quocirca varia hæc cerebri excrementa diutius cohibita & inharcentia, dierum numero, progressuque temporis, corruptione nacta sunt exte- nam illam ac prorsus malignam qualitatem, in qua dixi mali essentiam haberi. Ad hæc multum mihi contulisse videtur tuberculum in dextro tempore instar ovi columbini exortum, & comitiali morbo coxtaneum. Meminisse distetis quos viventes morbus comitialis aliquando immaniter corripuerat, me alias circa meningis, aliàs in cerebri substantia putridam quandam & glutinosam sanem quantitate fab-



aut aucis juglandis invenisse, quæ crudelis hujus & immanis affectus tones fuerit, ita igitur de continenti mali causa, deque primaria affecta se de statuendum.

Quoniam vero continentem illam & proximam morbi causam alia quædam antecedens appellata solet, quæ & ipsa interior existit, & sine qua summo veri illa integre non possit, de hac quoque dicendum. Ea est totius corporis cacochymia & impuritas ex prava viscerum constitutione protecta. Magna hæc quidem & in primis observanda, quod affectus sedi ipsique cerebro primo mali fonti novam assidue materiam suppeditet. Illustrissimo igitur viro jecoris, cordis, cerebri, & renum insita temperatura principum partium, ut autor est Galenus, constitutionem terere sequitur. Optima quidem illa, & ad probum sanguinem, & bene quadratum corpus comparandum apta; at vero postea in frigidiore humidiorique cælo frequens habitatio, paludum, lacuum & stagnorum exspiratio foetida, victus omnium quos antequam intemperantissimus, omnium obsoniorum & ferculorum varietate confectus, nullo institutus ordine, supra satietatem ferina quadam voracitate gravis, ut ei qui gulæ & abdomini omnino sit natus, viscera, Venæ, habitumque totum cruditatibus implens: somni, laboris, exercitationis, inanitionis, & pathematum animi ratio prorsus neglecta: bonam illam & laudabilem temperaturam atque insitam corporis constitutionem penitus evertunt, & pro ea vitiosam substituerunt: nuncque ingluvie aliisque commemoratis causis obruto calore nativo vires & facultates præsertim naturales quæ illius beneficio soventur, impeditur ac etiam debilitatur, tantam alimentorum molem modificare atque domare minime potuerunt. Hinc non cruditates modo, sed & omnis generis excrementorum proventus, toto sic corpore succrevit, ut pars nulla existat, quæ non proprio quodam supervacui humoris vitio prematur. Ventrículum multa esse pituita confectum indicio est nausea illa frequens, & tenebræ à cibo ob oculos offusa: hujusque ingentem copiam in intestina devolvi, aliam in eis etiam gigni, minime dubitari potest. Cerebrum multo gravius illius redundantia offundi testantur peculiæ ejus affectiones. Sed & jecur, & lienem obstrui, atque etiam turgere, illud quidem bilis flavæ, hunc vero atræ copia, indicio sunt præter cætera mores, olim quidem ob hepatis calorem & bilis fervorem in iracundiam, nunc vero ob nimiam adustionem in melancholiam propensi. Sub hac vitiosa constitutione viscerum, quis reliqui corporis bonus habitus esse possit? Corpus totum supra naturam & ætatem ingravesceat, impuritatis ingentem molem & acervum confirmat. Hæc igitur corporis impuritas ob viscerum imbecillitatem & continuatam vivendi rationem illegitimam, quotidie nova etiam atque etiam succrescens, novum quoque pabulum suggerit continenti causæ quam in cerebro constituimus. Neque hæc ante convenienter extirpari potest, quam corpus ipsum omni sorde & illuvie sit expurgatum.

Epilepsiam quæ aut annum ætatis vigesimum quintum excessit, aut postea hominem adortur, commori, & in supremum vitæ diem manere,

autor est Hippocrates: cum præsertim, ut hæc venemens fuerit, & o ignis sua nec certum habuerit initium, nec compertam sedem. Classici vero autores toto hanc genere inmedicabilem statuunt, quod causa non satis perspecta; illam videant neque medicamentis, neque vaccinationibus ullis, neque cæli mutationi, neque vivendi legibus cedere, neque temporis diuturnitate vinci. Quibus de causis plerique omnes divinam hanc appellant, & pro ejus curatione implorant divorum operam. Hujus sane conditio & essentia supra elementorum naturam est, omnemque sensum, & humanæ mentis aciem, effugit: non ratione aut demonstratione, sed observatione sola & usu comprehensa. Quanquam autem difficilis est epilepsie curatione præsertimque in male habito corpore suscipienda tamen ea est, atque iis remediis tentanda quæ multis sæpè protulerunt. Ea licet quadam substantiæ proprietate id præstant, arte tamen adhibenda sunt exinanito & puriori jam facto corpori.

Curationis initium ab eo quidem ducendum est, quod resolutione atque investigatione postremo fuit inventum; id autem est totius corporis cacochymia & impuritas, quæ præsentem, nec tuto quidem medicamenta, quæ substantiæ proprietate prodente solent, adhibeantur. Sæpe enim vel malum ipsum ingeminatur, vel etiam nova quadam symptomata accerunt. Itaque corporis hæc inmodica moles imprimis absumenda, & in pristinum naturalemque statum quoad licet revocanda. Deinde caput & cerebrum modis omnibus exhauriendum, ac demum ipsa morbi radix funditus evellenda, corroboratis simul hisce partibus quæ vehementius affectus fuerunt. Quæ omnia si non æque distincte, ut pronuntiatur, tuto nihilominus, & pro ejus quod curationi profuerit judicio, opportunè decernentur.

Nec supervacuum humorum exuperantiam, nec corporis tantam molem semel & universè demoliri licet. Non enim tam repentinam mutationem illa naturæ feret, sed sensim ac pedetentim, ut quæ longo tempore contracta sunt lentè quoque citra virium offensionem tollantur. Neque id profectò solis medicamentis præstandum, ut quorum inmodico usu corpus nimium labefactetur, sed tum his, tum vitii tenui & accommodato. Hic enim cruditates & luxuriantem corporis molem sensim absumet: illa verò supervacuos ac etiam corruptos humores sensim quoque excludent.

Quoniam verò methodicam illam curandi formam satis videor demonstratione prosecutus, ut tandem frugifera sit hæc nostra contemplatio, conducibile sit omnem deinceps curationis seriem subnectere. Nec enim verebor apud eruditissimos viros ipsas medicamentorum formas depromere, quod sæpè curandi summa vis posita sit in remedium quantitate & utendi ratione. Autumno igitur aut alio quovis elementiore cæli statu curatione suscepta, primum alvus si adstrictior erit: clystere proritetur, qui etiam crassam intestinorum pituitam eluat atque detrahat. Atque is in lib. i. decocti accommodati habeat hieræ simp. diapnoici an. ʒ i. mellis ros. & anthosati ana ʒ i. olei rutæ & anethi ana ʒ i. f. Postridie portio humo-



morum supervacuatorum qui in ventriculo & in primis ductibus sine adhæsu fluctuant, expurgetur hoc medicamento:

℞. Polypodii quercini, sem. carthami, arui, fœniculi, tolliorum senz ana ℥ iij. epithymi ℥ j. hat decoctio in unam dosim. in colatura infunde Rhabbarbari electi ℥ i. f. Agarici trochiscati ℥ j. Cinamomi ℥ ss. expressioni adde Syrup. Capillorum Ven. ℥ vi. nat potio. Detur mane horis saltem quatuor ante cibum.

Tertio die constituitur vivendi ratio tenuis, & citra manifestum calorem attenuans, eaque ex cibis euchymis, ut ex pullis gallinaceis & columbinis, ex perdicibus, aviculis montanis, phasianis, & similibus: hisque assis potius quam elixis. A iusculis & sorbitionibus multis abstinendum, quoniam præcordia nimis implent atque distendunt. A fructibus quoque, & leguminibus, & ab omnibus itatulentis aut vaporosis. His igitur & purioribus cibis qui facile designari poterunt, parce nec unquam ad satietatem utatur, & solum bis die cibum sumat, idque ex iustis intervallis quæ concoctioni sint satis. Percipiet autem dominus laborans se his convenienter uti, si nec ventriculi distensionem, nec rugitum, nec ructum ullum in concoctione sentiat. Ut etiam potu crudiatum portio facilius absorbeat, in easque natus calor validius incubat, parcus sit potus, isque in passu solo: potu enim quam cibo impleri facilius est. Immoderatus corpus gravat, omnemque concoctionem interpellat.

Hoc etiam tempore humiores ad plenioram purgationem apparandi erunt, vel apozemate ex rad. petroselinii, fœniculi, & polypodii, cum hyssopo, betonica, & stœchade, in quo nonnihil oximelitis dissolutum sit. Vel si mavult, guajaci decocto in quo commemoratæ radices & herbe sub finem aliquantum incoctæ fuerint. Alterutro aut bis die, aut certe semel utendum, horis duabus tribusve ante cibum. Sed quam minimè ciendi sunt sudores. Si interim alvus subsistat, sollicitetur commemorato clystere. Cum & victus ratione, & apozemate, diebus quinque aut sex, apparati jam satis ac fortassis concitati erunt humores, altero medicamento proficiendi erunt; quod aut priori simile sit, aut aliquantò efficacius, & curando affectui accommodatius.

Quale hoc est: ℞. Rad. apij, polypodii quercini, sem. carthami, passularum mundatarum, fol. senz mundatorum ana ℥ iij. Epithymi ℥ j. fiat decoctio pro una dosi. In colatura dissolve pulveris hieræ simp. diaphœnici ana ℥ ij. fiat potio. Detur mane horis saltem quatuor ante cibum.

Ab hac purgatione ad apozema redeundum, victusque similis continuandus, ac deinde post dies circiter quinque, tertio medicamento, si res postulet, purgandum, quod horum pertimile sit.

Ubi autem circiter diebus quindecim horum remediorum ope ventriculus, jecur, lien, pancreas, & partes omnes quæ in prima corporis regione consistunt, puriores existent, tum deinde secunda corporis regio quæ majorum est venarum, compellitur vacuabitur sectione venæ. Hanc enim non modò morbi species atque magnitudo, sed & corporis habitus & ante acta

vita postulant, vires verò & ætas permittunt. Secunda porro erit vena cuncti media, quæ & e cerebro, & e jectore, ac inferis partibus perinde vacuat: & ea quidem in brachio dextro, quod oculus dexter sit hebetior, ejusque lateris auris, atque etiam naris obruretur, & tuberculum in dextro tempore promineat, partesque omnes dextræ ad motum & ad sua munera sint ob humorum copiam & gravitatem ignaviores. Detrahetur autem sanguis non minus quam libra una, quæ unciarum est duodecim.

A venæsectione cum jam corpus extenuari & macerescere coeperit, ne quid ad perfectam curationem desit, tertia corporis regio, quæ summæ omnes partes ipsiusque caput complectitur, exinanienda erit.

In idque utiliter guajaci decocto, vel simplici, vel, ut dixi, composito, sudores bis die aut semel erantur. Et quo tempore diminabunt, tonso jam capite adhibeantur hæc caldriica.

℞. Seminis anisi, fœniculi, cumini, baccarum lauri contusarum ana ℥ ij. milij ℞ j. salis vulgaris libram semis. torreat omnia in sartagine, reponantur in sacculis, qui calidi applicentur capiti tempore sudoris.

Sudore deterso pituita è dextra præsertim nare proliciat. Hoc errhino:

℞. Salviæ, majoranæ ana ℥ iij. tritis affundantur vini albi ℥ iv. hat expressio, in qua maceretur radices cyclamini minutim concisæ ℥ j. rursum exprimatur, reponatur pro errhino, hauriatur in narem dextram, vel penicillus in eo intinctus immittatur in narem dextram, contineaturque dum pituita profluat.

In aurem verò dextram quotidie mane hujus liquoris duæ tresve guttulae instillantur:

℞. Aquæ vitæ, succi cepæ ana ℥ ij. in quibus infundatur pulpa colocynthidos ℥ j. in expressione Castorei ℥ ij. reponere & utitur, ut, dixi, obturereturque auris bombace.

Pomeridianis horis sub canam cucurbitula scapulis, cervici, & occipitio affigenda, modo leves, modò cum scarificatu, idque maxime parte dextra quæ gravius afficitur.

Hæc igitur topica remedia cum guajaco & victu tenui eò usque continuanda erunt, dum odoratus nari, & auditus auri dextræ sit restitutus. Quod si non facile sit assequi, nonnunquam mane caput jejuno lavandum, fovendumque erit lixivio calido in quo cephalicæ herbæ incoxerunt, quod & ejus noxios humores vetustate concretos colliquabit, fluxosque reddet, ut deinde topicis illis promptius obtemperent, simul etiam occulta quæcunque cerebri vitia deterget.

Superiorum remediorum continuatione, cum & corporis totius, & cerebri vitiosa constitutio, in pristinam ac ferè naturalem rediisse videbitur, intermisso guajaci & topicorum remediorum usu, sed tamen victu siccante, tenui & attenuante semper observato, epilepsiz remedia propria opportunè decernuntur, hac ferè methodo. Primum quod universalis purgatio aliquandiu fuerit intermissa, hoc modo repetenda erit:

℞. Fol. salviæ, betonicæ, stœchad. anthos, ana m. f. epithymi ℥ j. fol. senz mundat. ℥ iij.

Ecccc + hat



fiat decoctio pro una dosi, addendo sub finem, agarici ʒss. in expresso adde pulv. hieræ diacolocynthidos ij. fiat potio sumenda die electa, horis quatuor ante cibum. Postridie bolus hic voretur.

℞. Conservæ betonice, anthos ana ʒss. mithridatij veteris ʒj. nucce, capiat mane horis tribus vel quatuor ante cibum. Sequenti die qui tertius erit, pulvis hic sumatur, vel solus vel hydromelite dilutus.

℞. Rad. Aristolochiæ rotundæ, epithymi ana ʒss. Rad. asari ʒij. fiat pulvis tenuis, sumat horis duabus ab accepto iusculo aut ab alio quovis levi cibo, si forte vomitionem concitet, non ante cibum alius offeratur quam ea delierit: ac tum pulli aut capi iusculum apprimere conveniet, ad hoc deinde consuetus cibis. Si ob amarorem huius pulveris difficilior sit usus, poterit in pilulas redigi, quæ parem vim & facultatem obtinent. Est autem vis huic medicamento summa ad epilepsiam.

At nihilominus ne quid suspectum super sit, die quarto, cauterio aperiatur tumor in tempore dextro prominens, illæsiq; venis, arteriis, & musculis, sensim omnis ejus illuvies eluatur atque detergatur, sinaturque aliquandiu manare dum in naturalem statum redeat. Occipitum vero aut sinciput ad coronalem commissuram cauterio inurere, nihil mea sententia contulerit, neque id citra gravioris periculi discrimen experiri licet. Thermarum, quacunque sint facultate prædita, vis ad affectum hunc nulla deprehenditur. Neque fieri potest, ut corpus a pravis humoribus aptius vindicetur, quam exposita ratione curandi. His ita paucis videor ad quæstiones respondisse, in quibus plurimum inerat difficultatis.

Cæterum, ut totam curationem compleam, & huic quali colophonem addam, dum ulcus in dextro tempore multum curabitur, usurpanda erunt remedia, quæ secreta proprietate epilepsiam inhibent, atque etiam depellunt. Cujusmodi est pulvis aut electuarium ex scobe cornu cervi, & eboris, crano humano, radice & semine Præoniz maris, visco quercino, corallio, & gingibere, exceptis saccharo soluto aqua betonice. Semen Præoniz maris collo subneum vim habere experimur, & ungulam ejus animalis quod veltrates *ellend* appellant, vel appensam, vel annulo inclusam vidimus epilepticam accessionem cohibere. Astivo solstitio, & maxime divi Joannis Baptiste profesto, si artemisiæ herbæ radix evellatur, sub ea verus carbo, sed tamen bene odoratus, inveniri solet, qui siudone inclusus appensusque collo epilepsiam arceat. Et hæc quidem propriè symptomati, cætera verò quæ prædixi ejus causæ succurrunt.

Hæc autem curatione prorsus & ad unguem completa, ne postea in contumilem affectum relapsus contingat, observanda erit aut exquisitè, aut quam proximè licebit, vivendi ratio jam exposita. Circum solstitia & æquinodia luna decrecente, clystere præmisso corpus purgetur etiam medicamento quod præscripti ex hiera diacolocynthidos. Postridie bolus detur ex mithridatio. Tertio die vomitio proritetur, vel pulvere, vel pilulis præscriptis. Reliquo deinceps tempore ex intervallis ea usurpentur,

quæ dixi proprietate valere. Si certus & litatus est epilepticæ accessionis recens, iisdem mediis quinque sexve diebus utiliter antevertentur, nec ejus præcavendi certior lex ulla statui potest. *Joh. Fernelius in Consiliis Medicis.*

*Pro quadam Nobili Puella Epilepsiam ex vermicibus incurrente.*

Quod puella nobis proposita sit Epileptica, præterquam instante accessione cadit, convellitur secundum totum, ex eo etiam potissimum deprehendo, quod motu, sensu functioneque animæ principali interim destituitur, atque spumatore, sed an per essentiam, vel potius per consensum sit epileptica, merito dubitari potest, nam ipsam essentiam laborare Paroxysmus longior, & vehementior, spumaque copiosior, quam si per consensum laboraret, suaderet; adhuc & pars corporis dextra ferè semper prius convellitur, accedit dispositio hæreditaria ex parte matris, quæ ad musculos faciei convellatur. Ex adverso tamen quoniam patiens adscensum quendam, & dolorem prius circa ventriculum percipit, atque vermes excreti ab accessione puellam præcavent, Epilepsiam hanc per consensum accedere unusquisque faciliè distinguet. Puto itaque ego per consensum hoc morbi genus propositam patientem affigere, nec mirum, si illa symptomata sint adeo intensa, quoniam causæ morbiæ plures agunt, nam præter vermes quasi mordentes, vapores etiam huius mali causas agentes existere puto, aliter ab accessione, non ita puella superet per aliquod temporis intervallum; Amplius hujusmodi causæ, potissimum autem vermes sunt maxime activitatis, ut ex convulsionem, quam ferè semper patiens incurrit clarius innotescit. Accedit demum, quod perspicacia illa ingenij, & propensio ad munia animalia solita, nullam materiam morbiicam per essentiam cerebrum obsidere demonstrant, ut necessariò hoc Epilepsia germen aliunde originem ducat, & per consensum caput afficiat.

Utrumque tamen hujus Epilepsia causam duplicem esse, mediæ tam inquam, & immediatam constituo; Immediata meo judicio duplex existit, vapor scilicet, & qualitas dolorifica, vaporem interim à vermicibus mortuis, & a materia cruda in intestinis putrescente elevari pro certo habeo, nam primum, quod vermes ad sunt, patet, quia illos puella sæpius excernit, patitur item omnia Symptomata vermes existentes subsequenter, pluries nempe sibi nec scalpit nares, est iracunda cum delirio temerario, dolore intestinorum perforativo angitur, dentibus stridet; Quod secundo sint teretes, rotundi, atque longi, præterquam quod sensus visus persuadet, patet etiam ex noxa ad ventriculi lundum percepta, nausea, itemque siti; Ab his ergo vermicibus existentibus vapor elevatur sine dubio, quemadmodum & a putredine, quoniam ab hac vermes fiunt hæcque interim insignis existat oportet, quoniam numerosi vermes existunt. Qualitas autem dolorifica ex morfu vermium viventium pendet.

Sed vis interea harum causarum est perpendenda, vapor itaque ut motu undoso movetur, hæretque parietibus ventriculorum cerebri,



bri, idem facit cerebrum contrahere ad expellendum, unde & nervi contrahantur oportet, hinc oritur convulsio, ut vero poros cerebri lædit est in causa, ut functiones animales auferrantur. Ut vero muscoli mandibularum immodice agitati agant in pituitam descendantem vaporosam spiritui immixtam, spumam ad os henni contingit.

Quod si tertio loc. aff. Epilepsia ob pituitam, & melancholiam obstruentem fiat, tunc de Epilepsia per essentiam, quæ etiam ab humore, sed non sit abique vapore (ut notat Avic.) Cæcitus est intelligendus, quasi quod humor sit mediata tantum causa, quæ postmodum immediatam, vaporem inquam suppeditet in Epilepsia, tunc autem de ea, quæ per consensum, sermo prout occasio requirit, est institutus.

Verum præter causam immediatam illam duplicem, vaporem, inquam & qualitatem dolorificam, est & mediata, minera videlicet illius vaporis, nec non errata in victu, quæ us habilitas passi ratione proportionis nativæ a matre (ut dictum fuit) necnon etiam ratione ætatis propter redundantes humiditatem, & cruditatem est addenda, vapor autem ille a facultate non regente mueram generatur, ideoque causa vaporis erit illa eadem, quæ mineram gignit, & hæc nulla alia est, nisi ventriculi frigiditas, calor imbecillus, & materia cruda.

Vermes pariter & sui materiam, atque causam effectricem præsupponunt, à quibus producantur, materia est putredo tertio Aphorism. vigesimo sexto, & quarto Meteor. tertio. Idcirco pituita, quæ quoniam est humida, facile putrescit, quoniam lenta, calorem intensum, & ob id putredinalem suscipit, quod Avicenna, & Paulus tradunt, ac illa putredo ad mentem Avicennæ in rotundis est remissa, in latis verò mediocris, in ascaridibus autem summa, & hæc pituita evadit pus pituitosum, causa verò vermium effectrix est tum calor celestis tum proximus insignis, aliter ab alieno dissiparetur materia, neque mutaretur in vermes, calor verò hic est putredinalis, sed aliquo modo naturalis, quia rursus terminat humidum cum sicco, præter naturam respectu dissoluti mixti, utcumque tamen debet esse insignis, hinc Avicenna vermes fieri à potente factore scriptum reliquit.

Scopi itaque curativi, si in accessione, erunt sensum ablatum remediis dolorificis restituere, convulsionemq; membrorum retrahentibus deorsum emendare, & respectu causarum effectricum vapores fluxos discutere, qui vero fluunt, una cum vermibus retrahere.

Extra accessionem autem scopi Medici sunt vermes jam genitos interficere, allicere & enecare, eorum denuò generationem cohibere: Materiam putridam eradicare, copiosam minuere, viscidam detergere, ac humidam exicare, causamque illius generantem per calefacientia, & siccantia ventriculum impedire.

Quo pervenire possibile quidem, sed difficile admodum erit, periculum enim subest ne ex symptomatibus magis ex causa vehementi, atque multiplici, per essentiam puella fiat Epileptica, quod etiam hereditaria veluti dispositio persuadet: præterea vermes sunt magni, pingues,

crassi, rubri, quia sanguinem exugunt, exeunt vivi, signum multam alimenti copiam assumpsisse, amplius teretes generantur in intestinis nobilioribus superioribus inquam, nec obstat, quod Celsus dicat latos esse deteriores, quoniam hoc eo tantum nomine dicit quod latum generatio est irremediabilis. Sed quod timorem non levem incutit, est facultas laud admodum resistent, quoniam multa symptomata fere semper sunt in orbo supersunt, adhuc, & domicilium facultatis animalis afficitur.

Plurimum tamen in ætatis mutatione fidentum, tum ratione morbi imminenti, tum ratione lumbricorum, & eo magis, quia patiens (etiam si puella septem annorum) quam facile tamen admittit medicamenta.

Quocirca ad materias præsidiorum deveniens ex chirurgicis extra accessionem probo fonticulum in crure propter pituitam, sicuti in accessione frictions deorsum factas approbo.

Medicamenta extra accessionem aut vermes, aut pituitam, aut cerebri proportionem respiciunt, si vermes occurrunt primum quæ ipsos interficiunt, quæ cum varia sunt, interim etiam calida, quia non adest febris admittuntur, sed non adstringentia, quia non adest fluxus; verum quemadmodum hæc tum interna, tum externa esse possunt, ita interna tum communia tum propria existunt; inter communia oleum, quo ego felici cum successu uti soleo est huiusmodi.

℥. Absinthii pontici santonici, Abrotani ana unc. j. Hyssopi, thymi, Rutæ, Cardui ana unc. s. menthæ, prælii, Centaur. min. corallinæ unc. ij. florum Hypericonis unc. j. s. succi galeæ drag. ij. radices ireos, radices enulæ, Gentianæ, Diptami albi, tormentillæ, myrrhæ, cornu cervi uli ana unc. ij. Agarici, Rhabarbari ana unc. s. Aloës, Cardamomi, lupinorum ana unc. j. s. seminum brassicæ, portulacæ ana unc. j. Coriandrorum præp. Amygdalar. amar. ʒj. seminum citri ʒ. s. seminum secalæ ʒij. Sebestem pinguium ʒij. s.

M. & incisis, & contusis, incidendis, & contundendis, omnia in vase vitreo ponantur, addaturque olei olivarum dulcium tantum, quantum possit omnibus supernatare, & per quadraginta dies vas soli subjiciatur, vel si citius hoc parandum sit, bulliant omnia: in balneo Mariæ per duodecim horas continuo, deinde oleum coletur absque forti expressione, cujus ego soleo drag. j. pueris exhibere, adultis autem drag. ij. exhibeo, & meritisce prodest, & eo magis, si partes etiam pulsatiles iungantur.

Syrupus præterea, vel oxymel, & conserva ex floribus persicorum & ex scordio. Pulvis ex Abrotano, Corallina, costo, citri seminibus, nucleis persicorum ex aqua graminis, & Pzoniz datus ex Actio, oleum omphacinum, nucleorum persicorum, amygdalarum amararum, sulphuris & calcanthi ex aqua graminis propinatum, & vinum infusionis Mercurii sunt miri usus.

Propria verò Teretum Medicamenta ex absinthio, sem. sancto, centaurio minore, lupinis, Diptamo albo. & secundum Actium ex pulvere lumbricorum terrestrium ex sapa, vel mulla conficiuntur.

Cæterum pro externis medicamentis variæ



primum occurrunt inunctiones, tum ex oleo ad vermes jam dictos partibus pulsanibus, cordi, ventriculo, & umbilico ilito, tum ex oleo magni Ducis ad vena; Theriaca pariter cum aloë, scordio, & myrrha, eodem modo illita probatur; in hunc etiam usum medicamentum hujus census preparatur.

Accipitur Arancium acetosum, in quo per foramen imponitur pulvis centaurii minoris, Dictami, absinthii, lupinorum, aloës, & myrrhæ cum modico theriacæ, deinde infunditur oleum amygdalarum amararum, vel rutaceum, ac fel Bovis, demumque coquitur super laterem ad ignem, succus extrahitur, & usui est opportunus. Emplastrum quoque ad umbilicum ex foliis persicorum, farina lupinorum, pulvere aloë, oleo rutaceo, & aceto acerrimo exceptis conveniens erit, eo tamen ordine hæc externa sunt adhibenda, ut scilicet partibus superioribus prius admoveantur.

Atque interim quæ vermes alliciunt Medicamenta, non sunt improbanda, uti Clysteres ex lacte, præcipue asinino, cum saccharo, & melle, vel ex jure pingui, sapa, & butyro, uti giandes ex melle sine sale butyro illitæ.

Interfectos autem vermes educunt pilulæ Ruffæ hiera, aloës non lota, & Agaricus trochiscatus. Interficet verò limul, & educit aqua Tetrucciana cum melle rosato solutivo pota ad libram unam in casu nostro.

Medicamenta quæ pituitam respiciunt lenientia, præparantia, & purgantia, tum sensibilibiter, tum insensibiliter sint oportet; leniatur igitur alvus cum mel. ros. sol. cum syrupo de cichoreo, cum Rhabbarbo, & aqua graminis, Humores præparentur decocto betonicæ, dictami, hyssopi, cichorii, & radicum Proniæ, atque graminis cum oxymelle simplici; Purgentur pilulis de hiera cum Agarico, vel infuso Agarici trochiscati, mel. ros. sol. & modico Rhabbarbo in tota substantia, nam Rhabbarbarum potius ad enecandos vermes, & absumendam humiditatem excrementitiam, quam ad purgandum additur, alias detrahendo bilem, quæ suo amaro posset vermes interficere, noceret, & hac ratione forsan Paulus scammonium laudavit.

Pro purgatione insensibili præter trochiscos Andronis ex Aetio & oleum sulphuris vel calcanthi in minima dosi ex aqua Proniæ, duo præsertim propono, unum est oxymel ex decocto hyssopi cum aceto scillino destillato, Alterum, in quo maxime fido, est decoctum guajaci, ligni visci quercini, & corticis guajaci, additis Proniæ, hyssopo, & cichoraceis.

Tandem ad cerebri proprietatem individua-lem servandam, ac morbum profligandum præterea, quæ aliis superius sunt immixta, secreta quadam proprietate ab usu olei Chymici ex cranio humano cum aqua Proniæ, & betonicæ, vel conservæ salviæ, & stœchadis cum pulvere crani humani, aut asinini, ac Mithridato, vel florum rutæ caprarie saccharo conditorum non abhorreo.

Medicamenta accessionis vapores in capite exilientes discutiant, & eos, qui extrâ caput, ac vermes repellant oportet, Pro discussione ergo nares internæ, atque palatum Mithridatica confectione inungantur, hanc naribus evapora-

tiones cum spongia madefacta in aceto acerrimo decoctionis thymi, pulegii, calamintæ, diptami albi, & origani, castoreum quoque, & assa fœtida ignita in eundem faciunt usum sicuti & allium atque Ruta.

Pro repulsione haustus aceti, succus absinthii concreti devoratus, & oleum omphacinum bibitum summopere valent, quo spectant & petiæ linæ in aceto, & aqua absinthii madefactæ, collo, cordi, & ori ventriculi applicitæ.

Sed inter cætera instituatür victus accommodatus, qui sit calefaciens, siccaus, attenuans, & detergens, acris, vel acidus, ideoque carnes, piscesque saliti, modestè tamen commansi, carnes item animalium exercitatorum, olivæ, feniculum sale, ac aceto condita, cappares saliti, amygdalæ, nuces siccæ, brassica, cicerum jus, limones, araucia, citria, acetum, oleum, quod omnia animalia insecti generis ex Aristotele enecat, probantur; præ cæteris autem amygdalorum amarorum, emulsionem seminum citri mundatorum cum modico sacchari etiam, atque etiam laudo. Verum & simplicia Capitula pro condiendis cibis haud sunt spernenda, hujusmodi vero essent salvia, anthos, sampucus, atque similia. Pulvis quoque cibariis inspergendus ex semine caulium, absinthii santonici, & Proniæ cum modico sacchari factus. At victus nullo modo tenuis existat, ideo summopere probo, ut sapè, sed parùm cibi detur. Potus sit vini granatorum mediæ saporis cum aqua graminis, quod si vinum commune sit offereendum, eligatur subruorum medicatum cum guajaco, vel absinthio, vel rore marino, Reliqua sint hujus census, ex quibus Deo annuente plurimum utilitatis sibi puella comparabit. *Julius Casar Claudinus in Consultationibus Medicæ.*

#### *De Epilepsia. Pro Muliere Civitatû Forojuliensis.*

Meam sententiam prolaturus de gravi illo symptomate, quo per vices conflictatur egregia, & præclara Mulier, annorum 35. temperamenti calidi, & humidi, duodecim ab hinc annis orbatâ marito; ambigo primò numquid symptoma relatum sit Epilepticum, necne. Novi siquidem Epilepticum symptoma semper esse convulsivum teste Gal. tertio de l. Aff. 7. l. de Sympt. differ. tertio, & alibi; idem suadente ratione. Quando enim causa comitialis morbum inducens irritat, & vellicat internas ventriculorum cerebri membranas, quod facit in epilepsia, expultricem inquietiam excitat ad sui expulsionem, atque inde fit aliqua concussio cerebri, ad quam necessariò convelluntur internæ partes, vel omnes, vel aliquæ: at in hoc affectu nullus motus observatur; quare hic affectus inter comitiales non videtur reponendus. Quod si Gal. asseruit eodem tertio de l. Aff. senium aliquando amitti, nullo accedente motu convulsivo, non tamen dixit, accidens illud esse epilepticum; sed tantum fieri à causa frigida, innuens scil. symptomata illa omnia facultatis animalis, in quibus deperditur sensus, non accedente motu, à causa frigida provenire; cujus generis est etiam lethargus. Affectus itaque nobilis Patientis vel Caros dici debet quarto de Loc. Aff. 1. quinto Aphor. j. & secundo de Articulis



ticulis 21. vel Suffocatio, seu præfocatio, quando insensibilitati, & immobilitati jungitur insignis pulsus cordis & arteriarum imminutio, ex Gal. sexto de Loc. Aff. §. Verrum quia relatum video, Matronam hanc accessionis tempore dentes clausos habere, & ab accessione spumam ab ore fluere, credibile est adesse aliquam mandibularum convulsionem, cujus ratione prædictus affectus inter comitiales, eosque leviores referri potest. Hic autem affectus necessario consequitur cerebri noxam, non sanè essentialem, quia tunc accessiones essent frequentiores, graviores, & derepente supervenientes; sed potius inferiorum partium vitio consentientem. Cuinam autem membro essenti liter affecto consentiat cerebrum in hac affectione non immerito dubitatur; num scilicet ventriculo, utero, vel utrique visceri. De horum enim viscerum mala dispositione certissima adsunt indicia, nullum vero de aliarum partium vitis.

Et sanè quod ex ventriculo malè affecto crassos, & frigidos vapores cerebro communicante fiat Epilepsia, manifestissimis verbis expressit Gal. confirmat experientia, & ex cotacile colligitur, quod aliàs in pueritia propter vermes huic affectui sunt obnoxia, nec in præsentia invadit affectus. Addo, quod præcedat dolor, anxietasque ventriculi, ac inde flatus elevari sentiat paries; & præcesserint causæ cruditates in ventriculo coacervantes, quales sunt usus piscium, & incomposita victus ratio tempore quadragesimali nuper elapso. Nec minus extant indicia uterine passionis: quandoquidem invasit affectus dum utero gestabat, tempore verò partus, & post ipsum hoc symptoma corripiebat. in præsentia sentit quinetiam quosdam vapores elevari ab imò ventre, mensisque nunc sunt inordinate.

Quare crediderim primariam affectionem in utero latitare, inde ex ventriculi consensu contingere jam enarrata symptomata, non sanè ratione feminis. Quia tunc accidentia essent leviora, nec ipsi fuissent familiaria, quando erat Viro juncta; sed ratione sanguinis menstrui statutis temporibus, & debita quantitate non expurgati. Hanc enim solam ob causam superveniebat affectus purgationis tempore, in partu, & parum post partum. Quia tunc licet semen emittere potuerit, sanguis tamen menstruus ex sui natura vitiosus, & deteriore naturam adeptus in prægnatione retinebatur, nec perfecte purgabatur: cujus certiores nos reddit exacerbatio hujus affectus tempore menstruæ purgationis. Quod si aliquis aliquid noxæ semini adscribat, non reluctabor, qui norum gravissima mala consequi feminis retentionem in illis præsertim, quæ a virili congressu, quem habebant familiarem, omnino abstinent: sic nos docente Galeno sexto de Loc. Aff. §. ubi de affectibus uteri verba facit. Sanguis autem menstruus imperfectè fluit ob angustiam vasorum, consequentem crassitiem sanguinis cum melancholici, tum pituitosi: quam ob causam summa cum ratione dubitatur de melancholia superveniente, tum hypochondriaca, tum & essentiali, quia præsens affectus diutius durans protractus cerebrum essentiali affectione corrumpit.

Ideo me quoque iudice, remediis congruis agendum est, quæ melancholicam, & pituitosam

materiam præparent, & evacuent; ventriculum abstergant & robovent; uteri venas referant, & ab infarctu liborent, & deinde caput corroborent.

His autem scopis satisfieri poterit per ea, quæ diligenter expurgant totum corpus, non omissa educatione sanguinis per venam saphenam, & hæmorrhoidum apertionem, per ea quæ diligenter abstergant ventriculum, & flatus discutiant, in quem usum valent aquæ Terebinthina, & frequens usus hieræ picæ Galeni, & per ea, quæ divertant a capite, quod præstabitur per fonticulum in interna parte dextræ coxæ paratum; & tandem per corroborantia cerebrum; calefacientia, & exsiccantia ventriculum; uterique vasa referantia absque insigni calefactione jecoris. In quem usum valebit decoctum paratum ex radice chinæ, cum portunculâ lassastras. & hordei, additis Præmia, visco quercino, capillo veneris, matricaria, mentha, & cichoraceis omnibus; una cum inunctione ventriculi, & uteri infusionibus, & infernarum partium frictionibus, imminentibus mensibus, opportunis maxime ad mensum provocationem. Et hæc est mea sententia, de affectu præsentis. Iaxit Deus ut feliciter cedat patienti, & ad vota virorum in re medica præstantissimum. *Bened. Silvatic. Consil. & Respons. Medic. Cent. 1.*

#### *De Epilepsia. Pro Nobili Feltrensi.*

Affectum generosi nostri Patientis comitialesse esse consentiunt omnes Viri doctissimi, qui de hoc affectu scripserunt, confirmantque accidentia tempore paroxysmi apparentia. Numquid autem cerebrum in ipso afficiatur essentialiter, vel per consensum, & a qua causa proveniat, non adeo constat. Quod enim cerebrum essentialiter lateat, vel inde colligendum videtur, quod caput excedit in magnitudine, quodque affectus hic est fere continuus, cum bis & ter in die recurrat, & diuturnus, quinque scilicet annorum. Caterum cum vix ullus appareat excrementorum preventus in cerebro, non præcesserint morbozæ capitis affectiones, præter ipsius dolorem, & vertigines non semper essentielles in capite, cum in tam diuturno affectu non ingravescat morbus, recordeturque patiens omnium, quæ ipsi contigerunt tempore paroxysmi, ut relet Excellent. Medicus in consultatione, in eam facile concedo sententiam, quod cerebrum sit quidem ad hanc affectionem dispositum, tum ob intemperiem calidam, & humidam ipsius tum ob insignem magnitudinem: affectum tamen ipsum heri consentiente cerebro cum partibus infernis, eoque magis, quoniam consentiunt Viri præclarissimi præcedere affectionem aliquam circa os ventriculi, quam aliqui angorem, alij palpitationem, alij evaporationem nominant. His accedit quod ætate 23. vel 24. annorum raro supervenit essentialis Epilepsia, absque aliqua morbozæ capitis affectione, contusione, vulnere, ulcere, aliove simili affectu precedente, quæ saltem perdurare soleat tam longo temporis spatio. Verum enim vero, quæ pars sit essentialiter affecta, nec tam facile determinari potest. Multa enim sunt, quæ suadere possunt os ventriculi esse essentialiter affectum, languor scilicet pal-

pitatio.



pitatioque in illa parte observata, exquisitus sensus ipsius, ejusdemque maximus consensus cum cerebro per nervos sextæ conjugationis, quas ob causas Grammaticus ille, de quo Gal. de Loc. affectis, ex clamore, ira, inedia, & cogitatione in epilepsiam incidebat, ob exquisitum sensum oris ventriculi, ut inquit Gal.

Verumtamen cum audiam generosum nostrum patientem æquè hunc affectum pati, cum bene se gerit in victu, quàm cum aliquos committit errores, cum cibis quadragesimalibus vescitur, vel cum ab ipsis abstinet, æquè tempore purgationum, quando ventriculus est ab excrementis immunis, quàm extra illud tempus, neque juvamentum ex assumptis suscipiat, prout Grammaticus ille, suspicor & ego cum Excellentiss. Viro partem essentialiter affectam esse hypochondria, & fortè sinistram, & lienem, posteaquam audio ipsum esse jecore præcalido, habitusque ad melancholicum vergentis; estque ea ætate, in qua magis viget cum bile melancholia, quàm pituita, dolentque, & tument aliquando hæmorrhoides. Quæ omnia suadere nobis possunt congestam esse copiam sanguinis melancholici in liene, hincque vapores elevari, & fortè palpitationem cordis inferre, non autem oris ventriculi, quidem caput petentes, malaque qualitate peccantes, vellicando internos parietes ventriculorum cerebri irritata expultrice, concussionem ipsorum inferre, sicque motum convulsivum cum aliqua detentione functionum principum, ob agitationem spirituum animalium, impeditumque ipsorum transitum ad principium spinalis medullæ, & ad sensoria: hinc levis affectus, & cito recedens. Quod si aliquando irruant majori copia, cum impetu majori, magisque molesti sint, tunc gravem pariunt affectum, cum prolapsu in terram: quod ter, & quater in anno accidit. Exercitium quin etiam patientis ipsius ad ignem, & attractio fuliginis ex carbonibus accensis juvare potest plurimum: & fortè huic affectui supervenit aliqua mæstitia, & affectus melancholicus: epileptici enim magna ex parte sunt melancholici, ex Hippocrate, quod dictum tunc potissimum verum est, quando epilepsia fit ab humore melancholico. Et hæc de affectu, & causis affectus, quantum ex consultationibus colligi potest.

Prognosticum quod attinet, scriptum quidem reliquit Hippocrates Epilepsiam ante pubertatem curationem recipere, post 25. annum serè comitari ad mortem usque: non ob id tamen negat etiam post illam ætatem sanari posse per medica præsidia, si præsertim proveniat ab alia causa. Ibi enim agit de epilepsia facta à pituitosa materia, curationemque suscipiente per mutationem ætatis, regionis, & victus; de qua etiam 1. Aph. 45. locutus fuerat. Propterea licet affectus hic sit diuturnus, & confirmatus, non ob id desperandum est de salute per medica præsidia adipiscenda.

Quare divertenda est evaporatio, tollenda minera, corrigenda intemperies tum jecoris per refrigerantia; tum cerebri per exsiccantia; & corroborandum est cor, & cerebrum; non omisissis iis quæ à proprietate juvare dicuntur. Idque præstandum remediis, Chirurgicis, Pharmaceuticis, & Dieteticis.

Inter Chirurgica, me quoque consule, principem locum habet sanguinis missio, tum ex sapheza pedis dextri pro revulsione, tum ex interna brachij sinistri pro interceptione, tum & ex venis sedalibus, pro revulsione & derivatione; imò hinc singulis mensibus bis educetur sanguis ad quatuor uncias singulis vicibus, cum præsertim aliquando intumescant, & dolent: si enim natura sanguinem inde excreverit, hoc ipsi erit maximo juvamento: post aliquot menses, sufficet hæmorrhoides aperire semel in mense propè plenilunium. Fonticulus pariter sinistro interno femori muri poterit, abstinendo à setaceo; non tamen ab unctione occipitis, ad exsiccandos, & roborandos nervos; sicuti pro capitis exsiccatione placet præter alia frequens applicatio carbonis accensi cum cochleari, supposita papyro, & præsertim circa sinciput, & iuturas capitis. Vesicantia, unctiones, & similia parti essentialiter affectæ applicari non poterunt. Et hæc de Chirurgicis.

Pharmaceutica remedia Universalia respiciant humorem melancholicum prædominantem, cum subdominio pituitæ; lenientia scilicet præparantia, purgantia quæ brevitatis causa tanquam notissima mittenda sunt; hoc adnotato, quod inter purgantia conferret extractum helleb. nigri, necnon & antimonium diligenter præparatum, ne sit vomitorium. Sic conf. hæmæch, & pil. coccia cum helleboro, & de lapide lazuli ex usu erunt. Peculiariora capitis remedia sint leviora, & inter hæc mastiche proderit etiam ad roborandum ventriculum; factaque totius, & capitis purgatione, laudo aquam Letutianam pro majori ventriculi deterfione, cum mell. ros. sol. in primo cyatho ad lib. 4. singulis diebus, per triduum. Mox pro detergenda materia melancholica attenuanda, ac evacuanda, si quæ latitat in liene, aut mesenterio, placet summo opere jus galli antiqui flagellati, exenterati & saliti, paratum cum ligno buxi inciso, radice liliorum convallium, & zoniæ mare, ruta capraria, fumaria, borragine, melissa, & seminibus odoratis; cum quo jure exhiberi poterunt quinque aut sex guttulæ olei de succino, & spiritus salis, persillendo in usu hujus medicamenti 10. dies circiter præmisso bolo ex conf. alchermes. & de hyacinto, cum modico gelu cornu cervi. Victus interim sit quidem tenuis, & attenuans, boni tamen succi, & facilis digestionis. Ab hoc medicamento, adventante tempore calidiore, duorum alterum mihi probatur, vel serum lactis caprini optimè depuratum, vel aqua Beata Virginis: nisi adsit excedens humiditas capitis, placet magis serum lactis, modo diureticum cum syr. de acetositate citri, & capill. veneris; modo dejectorium cum infus. epithymi, & sennæ, qua infusione frequenter utendum erit cum jure galli præscripto. Si verò aderit imbecillitas ventriculi, vel excedens capitis humiditas, præferendus erit usus aque B. Virginis. Extrinsecus pulveres capitales appropriati, lotiones, & stillicidia ex aquis thermalibus compescere poterunt nimiam humiditatem, & roborare cerebrum. Atque stillicidium ventriculo adhibendum, si essentialiter laboraverit. Nec omittendæ erunt conservæ proprietate juvantes cum modico theriacæ, a Viris doctissimis propositæ.



*Vinum* debet esse ciborum boni succi, & facili digestioni, conditus modico nucis moschata, seminum ocymi, caryophyllorum, anisorum, dauci, & similibus. A vino prorsus abstinendum censeo. Si quid enim est, quod officiat, est vinum ipsum, qualecumque sit. Propterea multi sanantur sola abstinence à vino: cujus loco confici poterit vinum ex cerasis nigris, quod est optimum. Proponitur aqua antepileptica à Quercetano valde utilis: fierique potest mulla cum aqua, in qua decocti sint santali, lignum buxi, & radix Poroniz. Laudant aliqui sanguinem humanum destillatum. Vitandus est vapor ex carbonibus accensis, & congrua victus ratio servanda in aliis rebus non naturalibus. Sic enim spero fore, ut pristinam sanitatem recuperet, quam ipsi à præpotente Deo precor. *Idem ibidem.*

*De Epilepsia, & Oris Tortura. Pro Illustrissimo Gualdonio Lucensi.*

Affectus Juvenis Nobilissimi, annos nati 25. sunt duplices. Alii namque sunt antiquiores ab anno 1647. in hunc usque diem per vices recurrentes; posteriores alii anno 1649. post lapsum præcipitem supervenientes, & continuo affligentes. Primi generis symptoma duplex est, epilepticum scilicet, & maniacum. Maniacum quidem fuit illud, quod contigit mense Junio anni 1647. in quo mota mente nudus per cubiculum oberravit virga ferrea quolibet etiam familiares cadere tentans. Epilepticum verò fuit, & est illud, in quo noctu & repente edito quodam vocis incomposito sono, tanquam vomiturientis (ut scribitur à præclarissimo Viro) cum quadam membrorum concussionem, sine sensu brevi temporis spatio in terram corruit. Qui affectus sæpius eodem modo, & fere eadem hora corripuit Patientem Illustriss. & etiamnum invadit: à quo tamen menses triginta duos continuos prorsus immunis perstitit. Secundi generis affectus est oris tortura contusionem capitis subsecuta, cum effusione sanguinis ex aure dextra, & aliquo levi dolore musculi temporalis dextri, & in præsentia perseverante.

*Affectuum* prædictorum essentiam, & ideam quod spectat dubitandum non censens cum Viris præclarissimis de symptomate epileptico, cum aquam antepilepticam pro ipsius curatione in usum revocarint. Tria tamen circa epilepsiam discutientia veniunt. Primum est, an præsens affectus sit vera epilepsia. Secundum, an sit essentialis. Tertium, à qua causa proveniat. Nec immerito dubitari potest, an sit vera epilepsia, vel potius somnium in somnis apparens; cum superveniat patienti somniis terrificis affluente, in primo somno semper, & eadem hora saturato ventriculo; atque aliquando successit loco epilepsiz delirium terinum, quod non raro fit in somno, ut patet in noctambulis. Ex quibus quis suspicari posset, hoc accidens somnianti supervenisse, dum scilicet vapores à cibo, eoque copioso elevati opprimunt ita primum sensorium, ut impedita spirituum animalium effusione ad instrumenta respirationi dicata, suffocationis periculum inferant, ac incompositus vocis sonus edatur cum suffocationis periculo, quod vi-

tare tentans Pater Illustriss. natura excitante, ut sit dum dormientes revolvuntur in lecto surgit, præcepitque ruit in terram instar epileptici. Ceterum hoc in casu nostro locum non habet. Primo, quia si prolapsus in terram fieret à somno, expectatus non permaneret immobilis, & sine sensu, vel potius cum moribus convulsi vivens. Secundo, quia excitatus præteritorum recordaretur, & aliqua referret: quod non fit. Tertio, quia invaderet in somno semper: cum tamen aliquando invadat quæ hora it cubitum, & quandoque pomeridianis horis, quo tempore non decubuerat: ac propterea statuendum censeo, incipere aliquando in somno, perfici tamen in vigiliis, ut non raro evenit cum in epilepsia, tum in vertigine, & aliis affectibus. Affectumque hunc fieri censeo, cerebro tum primario affecto; tum aliunde vapores recipiente, & præsertim à ventriculo, & à præcordiis, ideoque prænunciari modo per aurium sibilum, modo per angustiam partium spiritalium, & aliarum interiorum partium, semper tamen affecto cerebro, quam ob causam immunitis ab affectu gravitatem capitis observat, obtusosque sensu, habet aliquo temporis spatio.

*Majori* cum difficultate determinari potest à qua causa proveniat, nunquid scilicet à pituitosa materia, quod fit ut plurimum, vel à biliosa, vel ab atrabiliari. Si proclivitatem ad somnum spectamus, de pituitosa prædominio inspicari possumus. Sed si temperamentum totius & jecoris, si accidentia supervenientia, si excreta, dicendum est, adesse quidem aliquam pituitæ copiam in cerebro humidioris temperamentis, prædominari tamen bilem, & melancholicam; imò suspitione non vacat, humorem melancholicum exultum cæteris omnibus præpolere: ita ut massa sanguinea in casu nostro sit à prædominio melancholica. Quæ ratione prodidit Hip. melancholicos magna ex parte fieri epilepticos, dum enim irruit humor in mentem, fiunt melancholici: dum verò in corpus cerebri, epileptici: quod accidisse observamus in casu nostro; quando namque vapores acres atrabiles impetum fecerunt in corpus cerebri, vellicando membranulas ventriculorum cerebri, factus fuit & fit epilepticus; quando verò mense Junio anni 1647. affecterunt iidem temperamentum cerebri ascendentes spiritus, factus fuit maniacus, sive delirus: nunquam tamen bilem evomit, ut mihi retulit: ex quo conjectare possumus affectum præsentem à bile provenire. Verum cum Pater Nobilissimus sit famelicus, atque affectus invadat post aliquod tempus ab assumpto cibo, statuendum potius in ventriculo atram bilem aliquando congeri, insultusque epilepticos inferre: quod confirmatur ex sanguine melancholico aliquando per hæmorrhoidales venas sponte fluente. Et hæc de delirio, & epilepsia sat erunt, maturiori iudicio semper subjienda.

*Quod* spectat ad oris torturam, cum hæc successerit valida contusioni capitis post præcipitem lapsum à loco sublimi noctu, cum aliqua mora sub dio, & subgrundiis tempore pluvio, cumque tunc non brevi temporis spatio jacuerit sine sensu & motu; ut suspicio subsit Nobilissimum Patientem tunc apoplexia levi fuisse detentum ab Hippocrat. proposita, 7.



Aph. 58. his verbis: *Quibus occasione aliqua cerebrum fuerit vehementer concussus, mutos fieri protinus necesse est;* addente Galen. in comm. Hippoc. consuevisse sub nomine Aphoniae significasse eos, qui cuiusvis motus aut sensus iacturam faciunt, non aliter ac apoplectici, & attoniti sine ullo sensu omnino, ac motu prostrati jacent. Credibile quinetiam est paralyticis subsecutam fuisse, hancque ob causam spasmus cymcum seu oris torturam supervenisse potius in paralyti, quam ex convulsione, quandoquidem contusio facta est in parte dextra capitis, tortura autem facta est ad sinistram. Et sicuti predictam contusionem subsecuta est sanguinis effusio ex aure dextra, indicio manifesto disrptionis venarum; ita certo certius affirmandum existimo, paralyticam factam fuisse ob disrptos surculos nervorum tertie conjugationis, cum praesertim nec dextrum superciliium elevari, nec dextra palpebra perfecte deprimi possit, sicuti alias perpendebam, quando de praesenti affectu consului.

Concludendum itaque existimo torturam oris esse prorsus incurabilem, ac propterea de ipsa nil ulterius addendum esse cenleo. Si itaque de epilepsia loquimur, hanc utique curatu difficilem fore non nego, cum sit antiqua, cumque ab aetatis mutatione juvamentum nullum suscipere possit, quale ab Hipp. praenunciatum fuit in 1. Aph. 45. his verbis: *Epilepsia laborantes pugni, cum loet vitulique, tum maxime aetatis mutatione liberantur:* ibi enim loquitur de epilepsia ab ortu naturae a pituita proveniente; cuius ratione 5. Aph. 7. dixit: *epilepsia ante pubertatem mutationem recipit post 25. vero annum ferè comitatur ad interitum:* quandoquidem jam statutum est epilepsiam praesentem aut fieri a bile flava, aut ab exulta & melancholia, ut ego existimo; qui humores tantum abest, ut aetatis mutatione imminuantur & contemperentur, quin potius intentionem, & augmentum suscipiant; removeri tamen poterit, Medicis praesidiis, & congrua victus ratione. Medica verò sunt Chirurgica, & Pharmaceutica.

Inter Chirurgica commendatur sanguinis detractio antehac experimento comprobata in Juvene Nobilissimo, quae fieri debet ex jecoraria dextri brachii, vel ex communi ad uncias octo circiter: aperiuntur deinde venae sedales, non hoc tantum tempore, sed singulis mensibus per duos dies ante novilunium, cum affectus hic accesserit die novilunii, vel subsequenti; propterea diligenter observandum est quo tempore frequentius invadat paroxysmus, tuncque occupandus est affectus haemorrhoidum reseratione, quae repetatur per plures menses, quo materia alluescat praedictae evacuationi. Funiculus inuratur dextro interno femori. Et haec de Chirurgicis.

Lentatur alvus syr. viol. sol. de polypod. compos. cum sol. sennae. Praeparantur humores syr. de pomis, de succo horrag. & de cichorio, cum diluto cichorii, rutae caprar. pentaphylli, acetosae, purganturque infusione rhabar. & sennae ipsi familiari, addito syrupo de polypod. compos. & ros. sol. Quod si alvus fuerit adstricta utatur frequenti clystere ex oleo viol. amygd. amar. cum melle ros. sol. Repetatur deinde humorum praeparatio cum syr. de pomis compos. de cicho-

rio compos. & melle scyllitico, cum decoct. suprascripta; alternisq; diebus praescribantur 3 iij. decoct. epithymi Mef. loco suprascriptae decoctionis, insistendo huic evacuationi plures dies. Qua peracta, duo genera remedium usui erunt, serum scil. lactis capr. & aq. Villensis, vel Noce-raz. Illud exlubeatur modo dejectorium. modo diureticum; dejectorium cum syr. ros. sol. aut cum infus. sennae & epithymi: tuncque erit depuratum. Diureticum verò fiet destillatum cum seminibus quatuor majoribus frigidis, oxalide, portulaca, & succo cichorii depurato, cui praemittetur bol. confect. ex margar. prap. sinarag. seminib. Paeoniae pulver. ac specieb. diarrhodonis abbatis: cuius usus erit dies quindecim: exhibendo dejectorium ad 3 iij. qualibet vice, & diureticum ad 3 viii. Interim adventabunt tempora calidiora, tuncque aq. Villensis dari poterit duodecim dies circiter, ea quantitate, eoque modo, ac forma, quae est notissima viris praclarissimis. Observando quod autumno repetenda erit etiam purgatio.

Major autem diligentia adhiberi debet in recto usu sex rerum nonnaturalium, ideoque cibi sint boni succi, refrigerantes, & facili digestioni, concessis prunis Damascenis, passulis, melonibus, cucurbitis, uva crispa, ribes, cerasis acidis, & similibus; ita tamen ut arida ultima mensa usurpentur, interdictis lacticiniis, apio selino, aromatibus acerbis, omnibusque vaporosis caput petentibus. Coena sit parcior prandio, & semper a cibo sumat quidpiam subadstringens, & intra horam saltem post cibum non decumbat. A vino prorsus abstinendum cenleo saltem aliquot menses, cuius loco in usu erit cerevisia ex lupulis confecta, vel aq. Noce-raz, vel hordeacea dulcorata cum acido limonum saccharato, vel sorbeto dicto Constantinopolitano; ac interim paretur ipsi potio ex cerasis nigris maturis, accipiendo libras ducentas horum cerasorum contendantur cum ossibus, deinde affundantur librae centum aquae fontis in qua infundantur per diem naturalem librae duae ligni buxi incisae, & ligni arboris Tili: necnon 3 3. radice. Paeoniae, & tantundem radice. lilior. convallium, factaque infusione per diem naturalem in aq. calida & ebullitione ad tertiam partem, aqua praedicta calida colata affundatur cerasis contusis, & fiat ebullitio duos ad dies, postea coletur, & succus seu vinum recondatur in doliolo, impositis iisdem lignis, quae subsidebunt, & succus clarescet, in usum continuum prandii, & coenae. Fugiat aerem nocturnum, radiosque solares; somni sint mediocres, pomeridianis vel interdiciatur, vel fiant corpore supino, nec nocturni sint admodum longi, exercitium mediocre, non statim a cibo; mediocriusque sit veneris usus; alvus continuo lubrica servanda, cuius ratione modicum floris cassiae nuper extractae, cum pulpa tamarindorum familiare erit, horisque vespertinis a coena sumere poterit cochlear conservae ex floribus liliorum convallium, florib. Paeoniae, & rosae Damascenis, cum succo granatorum, & saccharo, & quando se quieti tradet, detineat in ore rotulam pararam ex ungula alces in pollinem redacta, Cranio humano uto, rasura eboris, oleo de buxo & saccharo, formatis in rotulas cum aqua Paeoniae, & in ore nocturnis horis detineatur una vel altera. His enim observatis, aut-

mique



maque pathematibus omnibus longe missis, & præsertim ira, spero fore ut ab hoc affectu præterveretur. Faxit Deus Optimus Maximus ut ad vota succedat. *Idem ibidem.*

*De Epilepsia. Pro Nob. Linonetti Recanatensi.  
Ad Excellentiss. Pelliciani.*

Quemadmodum compertissimum est Nobil. hunc patientem epileptica affectione detinere, involuntaria namque membrorum concussio, cum abolitione functionum principum, spuma circa os, pallor faciei, & memoriæ lapsu a paroxysmo perdurante, id manifestissime confirmant; ita ex relatis a Viro præclarissimo constat, cerebrum esse affectum essentialiter, & dependere affectum præsentem ab intemperie ejus humidioris, cum materia pituitosa partim in ipso genita, partim a subiectis partibus suppedicata; diuturna namque oculorum lacrymatio præcedens, frequens expulsiō pituitæ crassæ, morbi incrementum anni tempore frigidus, hyberno scilicet, pallor faciei, & similia id apertissime confirmant; cum præsertim nullam terè mutationem susceperit affectus a victus ratione ordinata, vel inordinata, ex veneris usu, aliisque erroribus commisis.

Quare dubium esse potest, serosam illam materiam alias in cerebro secatentem, quæque antehac per oculorum angulos in fluxu lacrymali jugiter expurgabatur, crassiorem jam factam, diuturna mora in penitiori cerebri substantia corruptionem aliquam, & venenatam qualitatem contraxisse; vel succo melancholico permisceri, cujus in juvenili ætate, & regione calida facilis proventus, sicque affectum hunc contumacissimum & refractarium Productum fuisse, qui tot tamque validis remediis hæctenus a Viro Doctissimo præscriptis non cessit; inustioni præsertim duorum cauteriorum ipsimet capiti.

Ex quibus prænuntiare quis poterit cum Hippocrate, & Galeno epilepsiam hanc post vicissimum quintum ætatis annum jamdiu perdurantem incurabilem futuram; nec difficili negotio ætate senili, in apoplexiam desituram, quod Deus avertat. Non ob id tamen a validioribus, & generosioribus remediis desistendum censeo, cum vires habet ita robustas, ut quælibet etiam generosissima remedia tolerare facile possit.

Quare transacta Cunicula, totum corpus, & caput erit diligenter expurgandum, materiaque peccans attenuanda, incidenda, sensibilibiterque, & insensibiliter evacuanda; cerebrum calefaciendum, & exsiccandum; metasyntiticeis, & a proprietate juvantibus venetica qualitas est eradicanda. Hæc præstabuntur remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis, & congrua victus ratione.

Quoad Chirurgica, ratione totius, vena dextri brachii primo erit secanda; deinde aperiendæ venæ sedales, si corpus fuerit plethoricum; nihil enim nobis relatum de corporis habitu, ut propterea ex suppositis sit consulendum, licet capilli sint nigri, somnique turbati, ex quibus calor is quidam excessus in jecore se prodatur. Detrahatur etiam parum sanguinis ex vena frontis in progressu curationis;

imò & vesicantia retro aures, & unctiones variis partibus capitis potest adhiberi. Nec abs re esset in affectu adeo refractario, devenire ad terebrationem Cranii usque ad deliquamtionem primæ laminæ, quod remedium magis erit ex usu, si in parte aliqua capitis fuerit gravitas, vel molestia: non omisiss aliis levioribus revellentibus ad impediendam illuxionem.

Pharmaceutica sint duplicis generis, universalis scilicet, & particularis: præparantia, & purgantia humores crassos pituitolos, & serositates melancholicas, eaque generosiora. Ac proinde inter validiora præparantia locum habere poterit, syrupus de hyssopo, de prassio & oxymel scylliticum, cum decoctione radicum Pæoniæ, rutæ capraræ, radicum liliorum convallium, foliorum tiliæ, pencedani, tumariæ, & similibus. Inter purgantia probantur pilule de nitro Alex. de lapide lazuli, & coccæ, præparatæ cum helleboro, & castoreo. Factaque totius purgatione duplici, & triplici, purgandum erit caput validioribus primo malticatoriis, tum & erthinis, malticatoriaque hant ex pyrethro, staphisagria, & zingibere, cum cera, & resina, erthina vero parentur ex elaterio in lacte dissoluto, vel ex succo majoranæ, & seminibus nigellæ, aut helleboro pulverizato, cum succo malvæ, aut ex tabaco, seu nicotiana per nares attracta. Accedant tertio quæ lacrymas excitare valeant. Si enim lactynarium suppressio huic affectui ansam dedit, earundem revocatio proderit necessario. Hoc autem præstabunt vapores acres ceparum, allii, nasturtii, oculorum abiunctio cum aquis acerbis. Inter cetera caput purgia censeo primas partes debere sumo tabaci supra proposito. Factaque universali totius, & particulari capitis expiatione, duo interna topica præscribenda censeo, primo laudo aquas thermales magni Balnei Divi Petri in agro hoc Patavino secatentes, si temperamentum totius fuerit calidius; sin minus, uti poterit Aponitanis, tanquam calidioribus, & magis exsiccantibus; hæc enim per vapores caput petentes facile digerere poterunt materiam in cerebro peccantem. Si hæc non contulerint, vel si patiens Patavium se conferre non poterit, laudo aquam Bullati-tiam hunc in modum paratam. Recipe sex paria hiruudinum, & totidem picatum lanugine tectatum, radicum Pæoniæ maris, Luna decrecente sub signo Leonis collectarum, ligni visci quercini, buxi raspati ana ꝑ ij. Salsatras incisi ꝑ j. florum liliorum convallium, florum hyperici, tiliæ arboris, primulæ Veris, toris marini ana pugil. duos: incidantur pulli cum visceribus, & lanugine, contendantur radices, & imponentur in vase vitreo, affundendo succi cerasorum nigrotum, de rutæ capraræ, acetosæ, limonum, aceti scyllitici ana uncias quatuor, vini albi generosi libras duas, macerentur triduum in balneo Mariæ, additis floribus præscriptis in maceratione, factaque forti expressione, & colatura, destillentur, & servetur aqua; cujus dosis singulis matutinis horis erit ad uncias tres cum tribus guttis olei de buxo, & spiritus salis, præmissio bolo hunc in modum parato. Recipe terebinthinæ Cypriz lotæ in aqua lavendulæ, castorei ana



drachm. i. sem. seminum Peroniz pulverizatorum, cardamomi, Crania humani ana drach. i. sem. ungulæ alces pulver. scrup. ij. cum oxymel. scyllitic. folia boli decem quorum singulis diebus sumat duos, & superbibat aquam prescriptam. Ab his internis duo alia externa utilissima futura censeo, primum erit stillicidium ex aquis thermalibus, amplo tubulo suturam coronalem cum impetu perfundens, hoc enim humores etiam crassissimos digerere valebit. Secundum est inunctio venarum jugularium, & retro aures cum oleo de buxo, ejusdemque olei instillatio in aures. Hæc sunt validissima, quæ tutissimè administrari poterunt. Quibus si non cesserit affectus, cogitandum erit de inunctione cum hydrargyro. Hæc enim sicut in lue Gallica contumacissima attenuat etiam gummata durissima capitis, tota materia morbifica per os excreta, sic in casu præsentis extirpare poterit materiam hanc veneticam in penitioribus cerebri partibus conclusam.

*Videtur ratio sit tenuis, attenuans, excilians, Viro præclarissimo quam notissima: quam propterea lubens onittendam duxi. Idem ibidem.*

*De Epilepsia cum Albugine oculi. Pro Nobili Puero.*

Illustrissimus Puer ætatis annorum tredecim, temperamenti calidi & humidum totius, habitusque carnosum, cum inæquali viscerum naturalium intemperie, calida scilicet hepatis & frigida ventriculi, à naturæ primordiis cerebrum impense humidum & magnum sortitus, nec unquam in infantia favis, achoribus, aliisque capitis ulceribus sordatus, sed semper mundus, itatim ab incurabilibus gravissimis malis contlictatus fuit. Ex valido namque materię defluxu ad oculum albugo suborta fuit, cum ejusdem cæcitate, gravisque accessit sensus, motus, & actionum principum deperditio, cum concussionem corporis, quæ tamen per medica præsidia præscripta, tenellæ ætati accommodata ita remiserunt, ut fieret quidem aliqua mentis alienatio, cum rubedine faciei, subobscura locutione, & aliqua brachiorum levi extensione: quæ tamen statim ita cessabant, ut consueta puerorum ludicra jam missa repeteret, prævideretque imminens symptoma, quod altantibus significabat: atque ideo sedens, vel alicui innixus, accensa facie subobscurè loquebatur, cum levi brachiorum motu, & quadam mentis alienatione, ac brevi temporis spatio cessabat affectus. Symptoma prædictum non raro præcedebat, & aliquando subsequerebatur singultus, semperque à ventre inferiore morbum ortum ducere referebat, qui nunquam tempore somni invasit, sine ulla periodo, nec magis in novilunio, quam plenilunio. sed indifferenter quolibet tempore corripiebat. Quatuor vero ab hinc annis, dum symptomaticè gravius corriperebatur, urina involuntariè fluxit, semel atque iterum recurrente symptoma: quod ab anno frequentius est, levius tamen, præterquam mensibus elapsis, cum tota die interesset solemnem belli ludicrum equitum hastis concurrentium sub radiis solaribus,

bus, sequenti die conitiali morbo graviore fuit detentus. Apparuit enim totius corporis convulsio, spumaque in ore, cum detentione omnium functionum principum: a quo tempore bis aut ter vera epilepsia correptus fuit. Multa remedia variis temporibus adhibita fuerunt, plures annos gestavit fonticulum in occipite, mox exacto octavo ætatis anno occinium, inusto alio sinistro brachio. Decocta varia sumpsit radices Chinæ, ligni visci quercini, & similium: assumpsit serum lactis caprini: alvum valde adstrictam habet, urinam crassam, turbidam, iumentorum urinæ similem, & in magna copia. De agendis consulit.

*Quare pro præsentis affectus curatione, supponendum est primo tanquam indubitatum, ex accidentibus propositis, affectum hunc statim ab initio epilepticum fuisse, beneficio tamen remediorum tunc administratorum mitiorem fuisse redditum, ita ut referret speciem vertiginis, & delirii; cum mente non constaret, brachia leviter extenderet, & lapsus periculum adesset, nisi fulcumento alicui inniteretur; progressu tamen temporis in veram epilepsiam degenerasse, talemque esse in præsentia. Difficultas aliqua suboritur in assignanda parte essentialiter affecta, & causâ morbifica. Cum enim ratione partis affectæ triplex sit Epilepsie species, teste Galeno, tertio de Locis Affectis septimo alia scilicet, in qua caput, & cerebrum essent: aliter afficitur; alia per consensum à toto; & alia per consensum a parte aliqua determinata, tria sunt, quæ nos in eam opinionem ducere possunt, quod caput sit essentialiter affectum; quorum primum spectat ad malam capitis conformationem. Magnum enim caput habere referunt, in quo propterea magnam pituitæ copiam adesse supponendum est; secundum est, quod achoribus & favis non laboraverit lactantibus in capite erumpere consuetis, per quæ ulcuscula vitiosa illa excrementa ex sanguine menstruato congeita solent expurgari; de quibus Divinus Hippocrates in Libro de Sacro morbo prodidit; pueros epilepsia non tentari: qui ulcuscula illa passi fuerint; tertium est, quod in infantia ex copioso humoris defluxu albugo supervenerit, cum cæcitate alterius oculi, quo tempore gravi epilepsia correptus fuit. Ac proinde per signa desumpta ab essentialiter inhzrentibus, ab actionibus læsis, ab excretis præter naturam retentis, atque partibus à capite oriundis facile colligere est cerebrum in casu præsentis essentialiter esse affectum, quod & à Viris Excellentissimis curæ ejus præpositis suppositum esse censeo, cum fonticulum occipiti inurendum præceperunt. Non desunt tamen validissima argumenta, quæ nobis contrarium suadeant: quorum primum, & palmarium est, quod ab illustrissimo latente præsentiat paroxysmus imminens, ut relatum est: quod signum tanti ætimationum fuit à Galeno, ut in libro de puero epileptico, hoc solo argumento ductus statuerit, puerum illum de quo agebat, laborasse epilepsia per consensum à pede; quoniam sentiebat autem quandam inde elevari, antequam caderet. Aliud est, quod præsens affectus nunquam habuerit certas periodos, quæ in essentiali recurrere*



rere solent ad Lunæ motum, ut hanc ob causam morbus Lunaris vocetur. Tertium, quod levioribus remediis in principio administratis ita remiserit, ut in vertiginosam passionem degeneraverit. Quartum & ultimum, quod invadente symptomate rubescat facies, quodque recedens nullam molestiam relinquit in capite. Refertur etenim in historia, quod ita tunc ad se redibat, & convictos puerorum ludos inchoatos continuabat; cum tamen essentiali affectum subsequi soleat capitis gravitas, & sensus obrusus; præterquam quod singultus modo præcedit: modo subsequitur atæaum. Quæ cum ita sint, non immerito quis existimaverit affectum hunc essentiali non esse, sed per consensum ab hypochondriis, quorum molestia præcedit.

Quare statuendum censerem, adesse quidem maximam in capite dispositionem ab ortu naturæ contractam, non tamen à sola capitis magnitudine indicatam. Non enim semper caput magnum est vitiosum, ut habemus ex Galeno in Libro Artis medicæ, Capite secundo, sed tunc tantum quando est male conformatum, de qua mala conformatione in historia nulla mentio; sed potius ex detentis menstrualis excrementis, & humidioris intemperie, ob quam multa congerit excrementa: concurrere tamen etiam evaporationem à subjectis partibus elevatam, tanquam causam prædictos humores attenuantem, impuriore reddentem, concitate moventem: atque hinc fieri quod humores prædicti, qui antea quiescentes nullum inferebant incommodum, concitatus deinde moti, irruentesque in ventriculos cerebri, sua mala qualitate, & acrimonia vellicent internam membranulam ventriculorum ejus, atque ita excitent expultricem ipsorum ad sui expulsionem; quam necessario consequitur membrorum concussio, ob consensum nervosæ substantiæ, & functionum principum abolitio, ob perturbationem spirituum animalium; non enim censeo epilepsiam fieri ex ventriculorum obstructione, magis aut minus perfecta, ut determinasse visus est Galenus cujus doctrinæ multi in hoc assensum præbent, sed ex simplici irritamento; alioquin apoplexiam semper præcederet Epilepsia. Hæc autem causa movens interna est vapor impurus à ventriculo, & venoso genere elevatus, ex crudis & calidis humoribus in illis partibus contentis, cuilibet obviis ex urinis illis crassis, & turbidis, quas continuo excernit; unde tunc observat Patiens læsionem sensibilem circa viscera, singultusque præcedit, vel subsequitur affectum invadentem cum rubedine faciei; idque confirmatur ex eo quod in vehementem incidit Epilepsiam, postquam totam diem mansit sub radiis solaribus, occasione equestri certaminis supra propositi. Quare concludendum censeo, mineram in capite contineri, eamque ab exhalationibus agitari, atque ita affectum esse essentiali, & per consensum à visceribus naturalibus, & à venoso genere. Hincque facile statui potest, quænam sit causa morbifica. Non enim est materia pituitosa simpliciter, à qua ut plurimum fit Epilepsia in pueris, neque biliosa, à qua ex Galeno facta fuit in illo Grammatico; sed à menstrualis illo

excremento ut plurimum expurgari consueto per achores; hæc etenim materia deleteria quadam qualitate affecta, magnum morbum, quem Epilepsiam vocant, producere valet, dum præteritum attenuatur, acriorque redditur à vaporibus, & ab aliis extrinsecis causis calefacientibus.

Quæ si vera sunt, compertum est præsentem affectum hæreditarium esse, non solum ex paterna capitis excedente humiditate, sed longe magis ex menstrualis matris excremento non expurgato. Non ob id tamen de salute desperandum, non solum ob mutationem temperamenti per ætatem, de qua Hippocrates, sed & per medica præsidia à Viro præclarissimo alias administrata, nuncque etiam proposita, quibus libens & volens subscribo.

Duo tamen præ cæteris summo opere profutura censeo, videlicet plures unctiones in variis capitis partibus factæ, intactis futuris Cranii, putrefacta & remota eschara, ita ut diu ulcuscula servantur aperta. Aliud est sectacum in occipite, & fonticulus in dextro interno femore, quæ pariter aperta servantur.

In reliquis, insistendum lenientibus, præparantibus & levioribus purgantibus. Inter præparantia oxymel scyllitum tantopere à Galeno commendatum, & inter purgantia rhabbarum, & agaricus, erunt peropportuna: à quorum usu præscribetur decoctum ex ligno buxi, santalis citrinis, & ligno visci quercini, cum ruta capraria, radice Pæoniæ, cichorio, betonica, & radice liliorum convallium, præmisso bolo ex Cranio humano, castorio, & ungula alces.

Vinum proportionem respondeat, vino prorsus interdicendo, ipsiusque loco, fiat vinum cerasorum nigrorum continuo bibendum: cuius inopia, paretur aqua ex ruta capraria. Et hæc annotanda duxi, in confirmationem propositorum à Viro in arte versatissimo. Idem ibidem.

#### De Epilepsia. Pro Illustrissimo Comite Bonifacio de S. Bonifacio.

Comes Illustrissimus vicesimum ætatis annum agens, temperamenti calidi ad humidum vergentis quoad totum, & caput, hepatis calidioris, & humidis, & ventriculi subfrigidi, quinque abhinc annis motum convulsivum totius corporis, cum detentione functionum principum passus fuit: morbum scilicet Comitialem à Latinis, à Græcis verò Epilepsiam vocatum, à Galeno descriptam in Libro de Symptomatum differentiis tertio per totius corporis convulsionem, cum detentione functionum principum, symptoma scilicet in actione animali læta, & ea depravata, quæ annum cessavit, post diligentem totius expiationem, & aqua Beatæ Virginis potum: rediit tamen, atque iterum usu medicamento-rum cessit, & præteritum decoctum confectum ex radice Chinæ, & ligno sassafras. Verum anno elapso, æstivo tempore, dum incompositissima victus ratione usus fuit, dumque æstivante Sirio iter fecit in curru aperto, post plures febres tertianas, semitertianas, & erraticas;



cas, cum universali pruritu, cutis efflorescentiis, & excretionem bilis per vomitum, & alvum, mense Octobri verriginem passus fuit, cum febre, quibus denuo successit Epilepsia.

*Pro ejus curatione, consultatione habitata determinatum fuit, adesse quidem pituitæ copiam, genitæ cum in ventriculo, ob errores in victu, tum in capite humidissimo: longè tamen præpollere bilem, & melancholicam, indicatam à febribus præteritis, temperamento jecoris fervido, & excretis per alvum, & vomitum; horumque humorum alios in capite genitos esse, pituitosos scilicet, alios in jecore, ab eoque per venosum genus caput perere, cum sua forma humoris, tum sub forma vaporis: atque ideo epilepsiam hanc esse modo essentiali modo per consensum à toto venoso genere. Quem consensum licet non proposuerit Galenus quinto de Locis Affectis sexto, uti ex professio de hoc affectu egit, & proposuit tantum consensum ab ore ventriculi, utero, & à partibus extremis; attamen cum asseruerit ex Hippocrate, melancholicos magna ex parte fieri epilepticos, dixeritque tres esse melancholicæ species, essentiali scilicet, per consensum à toto, & ab hypochondriis, quodammodo admisit epilepsiam factam per consensum à toto, propositam à Victore Trincavello in quodam male curato ex scabiei inunctione, non præmissa corporis purgatione: cujus consensum habemus indicia manifestissima: primo ex præcedente pruritu cum febre, deinde ex puncturis quibusdam partium subcutaneatum, & fornicatione veluti quadam parum ante accessionem: quo solo signo distinxit Galen. epilepsiam essentiali ab ea quæ fit per consensum 3. de Loc. Affect. 7. Essentialis autem patet ex gravitate capitis, & ex copia pituitosæ materiæ per nares emunctæ: hinc itaque fit, ut à vaporibus acerbis vellicatis membranis internis ventriculorum cerebri, excitata expultrice ad expellenda noxia, fiat concussio cum ventriculorum cerebri, tum & totius corporis, quam sequitur eorumdem ventriculorum subsidentia, dissolutis spiritibus animalibus, atque hinc abolitio functionum principum, non propter obstructionem ipsorum, ut est communior opinio, alias semper apoplexiam præcederet epilepsia. Et hæc de essentia, & causis præsentis affectus.*

*Ex quibus non est difficile colligere, quid de hoc affectu sperandum sit; negandum etenim non est summa cum difficultate sanatum iri, cum sit antiquus, atque frequentior quam antehac, & dependeat ab humoribus crassis, necnon & ab inæqualibus viscerum intemperiebus. Nec sperandum est cum Hippocrat. 5. Aphorism. 7. Curationem ante pubertatem admitturum esse; loquitur enim ibi Hippocrat. de epilepsia in infantia molesta, ob nimiam cerebri humiditatem, & de ipsius remotiore mutatione temperamenti per ætatem, non ideo negans epilepsiam ultra illam invadentem ob alias causas, tolli posse per mutationem victus, & æris, vel per medicamenta: propterea dixit idem Hippocrat. primo in 6. Epid. 5. Puerorum eclampsies una cum pubertate quibusdam mutationes habent: Galen. in*

comment. dixit, non omnes epilepsias pueris supervenientes mutatione ætatis tolli, sed illas tantum, quæ ab ortu naturæ sunt, ob nimiam humiditatem cerebri. Aliæ namque ex erroribus in victu, remediis opus habent, ut in casu præsentis, cum Patiens Illustrissimus vires habeat robustas.

*Ideo Curatione tentanda, vel saltem præservationi incumbendum, si affectio morboza removeri non poterit. Quod hæc si humores peccantes in toto, & partibus evacuabuntur, intemperiesque jecoris refriger. utibus, ventriculi exsiccantibus, & cerebri refriger. utibus, & exsiccantibus, cum corroboracione corrigentur, non omittis bezoardicis, & à proprietate juvenilibus. Quæ præstabuntur remediis Chirurgicis, Pharmaceuticis, & Dieteticis.*

*Et primo quantum ad fontem Chirurgicum, cum jam fuerit eductus sanguis non sentiet, sed sæpius ex utroque brachio, pede, hæmorrhoidibus, & ex an. bitu rotas, supersecundum videretur quacunque sanguinis evacuatione; attamen in hac excedente jecoris caliditate melancholicæ copiam generante, non erit inconsultum venas fedales singulis mensibus prope novilunium aperire, quo natura edocta, prædictæ assuescat evacuationi. Quoad alia Chirurgica præsidia, gestat duos fonticulos, in brachio sinistro, & dextro interno femore; qui non ocludantur; neque de setaceo in occipite; neque de cauterio prope suturam coronalem cogitare, ne major materiæ copia trahatur ad caput.*

*Inter Pharmacopœia, repetantur lenientia, præparantia, & purgantia, antehac cum juvenimento sumpta, abstinendo à generosis purgantibus, ratione ventriculi: purgeturque caput gar. garismatibus, & masticatoriis, nullis erethicis sternutamentum cientibus, metu paroxysmi epileptici. Hisque peractis sumat triduum aquam Letutianam ad ℥iij. singulis diebus, cum melle ros. solutivo. Præscribatur deinde decoctum ex salsa parilla, ligno buxi, santalis citrini, & ligno visci querecin, cum radice Leonice, ruta capraria, & cichoraceis, præmissis bolo ex ungula alces, Cranio huius auro, & stercore pavonis maris, cum terebinthina Veneta, contumando usum ipsius per 20. dies. Ac tandem bibat aq. B. Virginis ex agro Patavino per 15. dies citaret, cum syr. capul. Ven. & modico spir. vitr. eo modo quo in usu est ut per urinam excernatur. Extrinsecus fiat itilicidium ventriculo cum aq. Aponitana, munito jecore unguento Santalino, superposito deinde cerato masticino, cum oleo nuc. mosch. Capiti fiant lotiones ex aqua nostra Laltrenti. Nec omittantur consilior. Pæconiz, rutæ caprar. lilior. convallium, & stor. borraginis, cum ungula alces ad 5 j. in aurora.*

*Vitæ sit refrigerans & humectans: abstinere ab aromatibus, a placentis, lacticiis, piscibus crustatis, & palustribus, carnibus leporinis, agninis, cervinis, & avium palustrium: potu item cujuslibet vini ad annum integrum, cujus loco pareretur ex cerasis nigris coutulis, quæ in aqua ebullierint quatuor dies, servata colatura facta prædicta corporis expiatione, sanguine ex venis sedalibus in plenilunio educto singulis mensibus, assumpto vino cerasorum, convaluit utique ad annum 36. circiter, quo tempore interfectus fuit, non obstante sententia Hippoc. & Gal. 5. Aph. 7. quod*



quod post 15. annum ferè comitatur ad interi-  
tum affectus. *Idem ibidem.*

*De Epilepsia. Pro Spectabili Viro.*

Affectum præsentem Epilepsiam esse, summa cum ratione determinatum video à Viro Excellentissimo. Motus namque convulsivi, cum detentione facultatum principum, & spuma circa os id clarissime confirmant. Quibus forsitan jungitur vox inarticulata, & gemitus, prout sæpe evenit in hoc affectu. In quo cerebrum esse partem affectam testantur actiones motrices, & principes læsæ; illæ quidem depravatæ, hæ vero, non dixerim, deperditæ in casu præsentis, cum memoria recolat omnia post accessiōnem, sed saltem immutata, eoque magis, si paroxysmi tempore in terram cadat; Ita tamen afficitur, ut me quoque iudice, id fiat per consensum à ventriculo, non secus ac in Grammatico illo, cuius historiam retulit Galen. lib. 5. de Loc. aff. 6. ubi asseruit, non raro epilepsiam fieri per consensum ab ore ventriculi exquilito sensu prædito. Verum quidem est quod aliquando cerebrum trahitur in consensum ab ore ventriculi, ob cruditates in ipso congestas, aliquando ob humores acres, & biliosos, ut illi Grammatico contigit, tunc epileptico facto, quando vel irascebatur, vel mediam patiebatur, quod de Patientis nostro nobis non constat, cum vomitus vel non sit subssecutus, vel de eo nulla fuerit mentio. Utcumque tamen sit, consentit absque dubio mediantibus nervis sextæ conjugationis, ventriculus cerebro, vaporesque ad hoc transmittit acrimoniæ alienijus participes, ejus ventriculis noxam inferentes, ac vellicantes internam ipsorum membranam, qui propterea sunt in causa ut cerebrum sese concutiat ad expellendam causam noxiam, ad cujus concussionem agitantur postmodum spiritus, prohibetur ipsorum influxus ad sensoria, & convellitur nervosa substantia intra cranium contenta, atque ita tollitur sensus & motus voluntarius, cum abolitione functionum principum, & convulsione corporis, modo totius, modo quadrantis tantum partium, prout major est, vel minor convulsio, quod proditum ab Hippocr. & Galen. videl. ab eodem humore melancholico fieri epilepsiam, & melancholiam; epilepsiam, dum irruit in corpus cerebri, melancholiam vero, dum afficit mentem, idest dum alterat temperamentum ejus.

*Materiam* autem peccantem à prædominio melancholicam esse ego quoque mihi persuadeo, dum video patientem ipsum tot annos ab affectu immunem vixisse, à quo sanè majorem labem suscepisset in puerili ætate, si à pituita prædominante fieret.

*Propterea* Hippocraticum prognosticum locum non habet, dum dicit epilepsiam antè pubertatem curationem suscipere, post 15. annum ferè comitari ad mortem usque: ibi namque loquitur de epilepsia infantibus familiari, à pituitosa materia proveniente. Non ob id tamen negandum est affectum præsentem magni momenti esse, medicisque præsidii tentandum, antequam ulterius progrediatur.

*Quare* præscripta universali corporis expiatione, revellendi sunt vapores à capite, mine-

ram congestam evacuando, ventriculique intemperiem corrigendo, eundemque cum capite corroborando, remediis Chirurgicis, Pharmacæuticis, & Dieteticis.

*Chirurgiam* quod attinet, sanguis equidem ratione totius educendus erit ex interna dextri brachii, ratione jecoris sanguinis officinæ, dummodo in sinistro hypochondrio tenuio aliqua non observetur, in quo casu educendus est ex interna sinistri brachii; interpositoque congruo temporis intervallo, aperientur etiam venæ sedales, à quarum menstrua purgatione parca tamen, maximam utilitatem percipiet. Fonticulos quod spectat, unum jam admitterem in dextro interno femore. Crurum frictiones frequentes cum aqua valde calida ad varices excitandos mihi probantur.

*Pharmacæutica* sint semper leviora, ne ventriculo officiant: ideoque hieram picram Galeni ceteris omnibus præterendam centerem, Galeni exemplo quinto de Loc. Affeci. tantopere commendatam, ut ipsa sola congrua victus ratione asseruerit se cum Grammaticum illum incolumem præstitisse, cum quolibet anno bis aut ter medicamento ex aloë uteretur; non omisis syrupis à Viro Excellentissimo propositis, sine diluto, & purgatione facta cum agarico, & rhabarb. infus. addito mel. ros. solutivo, & de polypod. comp. abstinendo à validioribus attenuantibus, & incidentibus; quorum loco exhibendam centerem aquam Letutianam triduum, cum mel. ros. scilicet ac deinde decoctum ex ligno Sando, visco quercidentisæ, & buxo, cum columba turricola per 20. dies, præmisso holo ex castoreo, Cranio humano, & ungula alces; exhibita singulis 8. diebus eadem hiera picra, & intermedium ten poribus, pi. ex aloë lot. cum succo rosarum. Peculiarem capitis evacuationem non adeo ex usu existimo, cum statutum sit, caput affici per consensum: nihilominus familiarem mastiches pinguis masticationem non improbo, tamquam ventriculo familiarem; nec minus placet conserva ex ruta capr. florib. cilix. lilior. convall. & florib. Pæoniæ, cum conserv. rorismar. & absinth. umbelliferi. Iaretur vinum medicatum ab Excellentissimo Viro propositum: quod si utatur vino ex cerasis nigris huic affectui appropriatis, abstinere posset à quocumque alio vino. A cibo sumat semper aliquid adstringens, ut puta diacydonium, diacornu, saccharum ros. antiq. vel sorba matura, quæ hoc tempore habentur. Et hæc in confirmationem propositorum à Viro Excellentissimo annotanda duxi. Faxit Deus ut ad vota succedant. *Idem ibidem.*

*De Epilepsia, & Phthisis suspitione. Pro Viro Nobili.*

Duo sunt affectus Viri Nobilis ætatem agentis 31. annor. Alter est epilepticus, antiquus, ab anno 15. ætatis in hodiernam usque diem ipsi molestus; alter phthisis, ut colligere possumus ex scheda ad nos transmissa, hincque recens, dependens à catarrho putrido ad pulmones cum impetu irruente autumnæ præterito, tussim, spirandique difficultatem excitante: cui deinde ob corrosionem pulmonum sanguinis spurum successit, febricula lenta, corporis macies, virium imbecillitas, & excretorum fætor, prædictam



fluxionem juvante cauterio occluso aliàs inusto sincipiti.

*Uterque affectus gravissimus, primus quidem, ob ejus durationem quem propterea nec ætatis spatium superare potuit: 15. enim ætatis annum jam excessit, quem sanationis terminum præscripsit Hippocr. 5. Aph. 7. & nihilominus perseverat affectus. Alter vero propter difficultatem sanationis ulcerum pulmonum, cum ratione membri continuo motu agitati, tum ratione medicamentorum, quæ vix ad partem affectam pertingere possunt.*

*Quæ ob causas libere affirmandum censemus, utrumque affectum insanabilem futurum. Epilepsia namque vix debellari poterit temporis progressu & medicis præstidiis: phthisis autem affectus longè gravior, & prorsus insanabilis, quippe qui longè breviori temporis spatio patientem hunc Nobilem in medio tollere potest: ubi enim primum tabidus reddetur, labefactatis viribus, non poterit extundere materiam in pulmonibus collectam, & facto cedit. Non ob id tamen solo prognostico relinquendus est, quanquam à medicis præstidiis vel nulla, vel levissima utilitas sit speranda.*

*Eo autem dirigi debent medica præstidia, ut impendant quo minus à capite nova materia decumbat ad pulmones, evacuent materiam fluxam, detergant ulcus, & exsiccant, cum ratione materię fluxæ, tum ratione ipsius ulceris, additis substantiis humectantibus, ratione maciei, & moderate refrigerantibus, ratione febris; non spreto affectu epileptico, qui exposcit capitis exsiccationem, & sensibilem, ac insensibilem materię morbificę evacuationem; primo tamen & præcipue insilendum est curationi ulceris.*

*Atque ideo præmissa blanda totius corporis expiatione, eclegmata detergentia sunt præscribenda, parata ex syr. acetoso simpl. melle ros. simpl. syr. de farsara, de pulmonaria, & looch. de canibus, cum saccharo cand. violato. Conferet potus aquarum thermalium sulphurearum, ad lb. vj. & plures singulis matutinis horis sumptarum, mediocriter calidarum, cum syr. de farsara sensim & sensim, ut facilius illabi possint per asperam arteriam ad pulmones, per octo, vel decem dies; mox paretur decoctum ex radice Chinæ, ligno visci quercini, pulmonaria, & hyssopo, cum gallo juniore, præmisso bolo analeptico, confecto cum carne caponis, pistaciis, nucleis pineis, & nuce Indica, usurpandum per 20. dies circiter; tandemque sumat singulis matutinis horis lac asinum nuper è mammis extractum, ad 3 ij. cum buccella panis & modico saccharo pulverizato, quinque horis ante cibum, instillatis quinque, aut sex guttis olei de buxo, addito modico unguis Alces detrosæ, pergatque in usu ipsius 30. dies circiter, somnoque se det; post ejus usum: ac interim vel renoveretur cauterium in sincipite, quod tantum defigatur ad primam ossis laminam & apertum servetur: vel ipsius loco, fiat setaceum in occipite. Dumque hæc peragentur intrinsecus, fiant extrinsecus blandæ frictiones toti corpori, manibus inunctis oleo amygd. dulcium extracto sine igne. Accendatur ignis ex lignis juniperi, & lauri, excipiat per tubulum fumum ex sulphure, benjow, & styrace; detineatque frequenter in*

ore rotulas paratas ex flore sulph. terra sigillata & saccharo cum aqua pulmonariæ.

*Videtur interim sit renutrens, in pauca copia sumptus, & pro potu paretur mulla diluta. Sic enim prospiciemus etiam epilepsię, ratione cuius hæc conserva ex flor. Poroniz, & ruta caprar. cum sacch. ros. antiquo, & terra sigil. cuius sumatur singulis diebus 3 j. duabus horis ante cœnam. Et hæc sunt quæ pro vitæ productione prodesse poterunt in casu (ut dictum est) incurabili. Paxit Deus ut usui sint. Idem ibidem.*

*Epilepsia essentialis, non sine consensu à toto.*

Nobiliss. Puer novem annorum, temperamenti totius calidi & humidum, capitis humidioris, & modo habitus submelancholici, qui Avum maternum ob capitis copiosam humiditatem defunctum habuit. Statim ac natus fuit, exolutus, sine sensu & motu aliquot noris pro mortuo habitus est; inde Nutricem optimi lactis sortitus melius habuit: solum anno tertio febricitavit, sed faciliè quoque a febre evasit; attamen morphaam, sive lactumen in capite, necnon scabiem in toto, usque ad quintum suæ ætatis annum passus est. Tunc vero à Mulieribus domesticis lavacro ex vino & herba regina parato, & lactumen & scabies in toto absterfa & suppressa fuere, unde statim Puer melancholicus visus est cum carniū considerabili tumefactione, urinaque turbida, copiosa & nigra apparuerunt, & ideo expurgatus fuit Puer ipse, extractusque sanguis ex brachio. Nihilominus mense Maio rursus animi deliquio, sive exolutione correptus fuit, cum principum actionum abolitione; & eodem paroxysmo noctis tempore sed intensiori recurrente cum febre, pro mortuo rursus habitus est. Post multationem tamen cervicis, & cucurbitulas incisas, quibus sanguis evacuatus fuit, pravae conditionis observatus, in se reversus est, & urinas reddidit copiosas & crassas. Tunc inustum fuit Cauterium: sed post duos annos fuit quoque suppressum, nulla prægressa totius expurgatione. Anno septimo suæ ætatis Variolæ supervenere, sed deficientes & paucæ; & ideo eodem anno tumor in humero contumax apparuit, insensibiliter resolutus, & rursus ad pertum fuit Cauterium. Tandem mense Junio proxime præterito, dum ruri degebat, frequenter rubedine in facie, quæ in flavitatem permutabatur, & præterea motibus in manibus & oculo semiconvulsivis corripitur, progressu vero epileptici paroxysmi, licet leves, bis tamen & ter in nocte contingebant, cum urina involuntaria sine spuma per os: qui usque adhuc, octo nimirum abhinc mensibus eodem modo perseverant præsertim in pleniluniis; antequam autem invadant, præcedere solet ventriculi molestia, (multum enim comedit, cibosque devorat non masticatos, & copioso potu delectatur) facies inflammatur, & futurum paroxysmum præsentit, adeo ut tempus eidem supersit, quo sedere possit. Nostri primi Medici intentio pro curando hoc Pueri est, totum corpus una cum capite, validioribus quoque (habita tamen ætate ratione) expurgare & cacochymiam auferre; deinde caput decocto convenienti exicare



care; alexipharmaca in usum ducere; vini potum omnino prohibere. Quæ omnia tuo sapientill. consilio subijcimus, quod quamprimum moræ impatientes expectamus.

Quod à nativitate Puer ille præhumidam sortitus fuerit capitis intemperiem, testis fuit Paroxysmus ille, cum omnium functionum abolitione, qui contigit ipsi statim in lucem edito: quam mox continuavit Morphæa, sive latuit in capite ad quintum usque suæ ætatis annum perseverans; præterquam quod aliqua quoque ab Avo materno hæreditaria capitis prava constitutio supponi potest. Verum non minus totum venosum genus excrementis scætere, tebris anno tertio suæ ætatis oborta, universalis scabies, carum intumescencia, pravus sanguis per cucurbitulas extractus; anno vero septimo tumor in humero post Variolas, urinz copiosæ, turbidæ, & aliquando nigre, satis superque nobis significare valent; sicut excrementorum copiam producere & suppeditare potuisse censendum, naturalium viscerum Dyscrasias, & facillè multo magis objecta improporcionata cibi & potus, & quoad quantitatem, & quoad qualitatem, ex ingurgitationibus cum imperfecta masticatione & superingestionibus, superaddita prava cibendi consuetudine: unde habitus corporis alioqui probus, ut calidus & humidus depravari, & melancholicus evadere visus est. Quoniam verò sicut provida natura morborum Medicatrix, tum capitis, tum totius venosi generis vitiosos humores expellere, & Puerum ab affectibus tum capitis, tum totius præservare potuit, eo modo quo *Quartana capiti magno morbo non capiuntur*: ita ab importuno lavacro anno suæ ætatis quinto à Mulieribus administrato, cute deterfa, & eodem tempore exiccata ac roborata, excrementosis humoribus exitus fuit interceptus: perseverante tamen quotidiana eorundem reproductione, quorum copiam nonnihil immnuere & educere poterat Cauterium infixum, quo etiam beneficio destituta fuit ipsa natura, dum importune nulla prægressa totius expurgatione suppressum fuit. Quare mirum non sit quod Puer modo levibus, licet frequentibus epilepticis insultibus corripiatur; sed potius mirandum vitam hucusque traducere potuisse, post secutos tam varios adeoque multiplices capitis insultus, facile caroticos, mutos ab Hippocrat. dictos, vel apoplecticos, cum utriusque tebris subsecuta profuerit. Caput enim essentialiter affectum esse non est dubitandum; sed præterea sanguinem in toto, crudis & exustis inquinatum excrementis, circulando continuo eidem capiti materiam suppeditare, & ventriculum iugibus cruditatibus, ac meri potu fovere certum est. Ut propterea vehementem sicut frequentem Epilepsiam non induci, equidem admiratione dignum, & valentis atque strenue resistentis naturæ indicium. Etenim non solùm ipsa natura, & medicis auxiliis opitulantibus, levis tantum invasit Epilepsia; verum & caput, quamvis essentialiter affectum, à primaria læsione fuit præservatum: præcedit enim querela de ventriculo & inferiis partibus malè affectis, cum calidis evaporationibus in caput, antequam ingruat epileptica accessio, adeo ut eandem proximam præsentiat Puer ipse, & se-

dere valeat. Affectio autem certis Lunæ positionibus exacerbari observatur, quoniam Luna, dicebat Gal. Comitiales custodit, & ideo plena valentiora omnia quàm in falce, reddere solet.

Affectus iste ex sui natura magnus, tum ratione essentia, tum ratione resistentia, ideo Hercules dictus fuit: eoque m. jor in hoc Puer. cum non a solis erroribus in victu, sed à nativitate originem ducat. Nihilominus quoniam ante pubertatem contingentem, in melius mutari promissit Hippocrat. dummodo tamen addatur congrua victus ratio, ut ait Galenus in Comment. non est desperanda salus.

Interim ego, ut verum fatear, non possum in hoc casu soli ætatis mutationi, cum Gal. h. de re, ob altas, tum in capite, tum in toto, hujusmodi affectus radices existentes; & ideo ad Medica selectiora & validiora remedia confugere, tutius non solum, sed necessarium existimo; incunte Vere primas vias expiando; Obstructiones, si quæ adsint, aperiendo. Totius Cacoehymia levioribus primò, mox etiam validioribus auferendo; Caput expurgando; eiusdem intemperiem humidam corrigendo; atque tandem illud idem roborando, & à proprietate juvantia non negligendo. Quibus intentionibus explendis, parum aut nihil adducendum mihi superest, sed paucis ab Eximio Viro proposita confirmabo. Et primo sanguinis educationem secta vena in brachio necessariam puto, sicut Cauterium alterum coxæ affixum. Pariter primarum viarum expiatione congruis Lementibus & Præparantibus subscribo. Itæ Præparantibus ulterioribus & Purgantibus, massæ sanguineæ depurationem commendo, ut inde ad capitis expurgationem deveniri possit. Et in hunc finem extractum ellebori cum castia, & pilulas coch. cum ellebor. præpar. necessarias fore existimo: non paucos enim Comitiales validis Purgationibus sedavit ipse Galen. quibus tamen potiones humectantes exhibeantur superbibendæ. Tandem capitis intemperies humida corrigi debet decocto, jam in relatione descripto, nimirum ex visco quere. falsa, lig. ros. mar. buxi & rad. Pæoniæ in aqua stillat. cichor. beton. & rutæ caprar. paratos; quod tamen non satis profuturum vereor, nisi sudor accedat in hypocanto, adeo ut totum corpus, & caput præsertim exudet, alioqui potius liquando, & caput implendo, obesse quàm prodesse posset: universali namque evocato sudore. & caput desiccari ac roborari, & reliquum totum corpus à vitiosis humoribus atque ichoribus vindicari poterit. Nec reclamabit, ætas, seu vires, quas conservabit victus ratio, non adeo tenuis; quotidie concedendo, modo carnes assas, modo ptisanam hordeaceam: condonandum enim est ætati, consuetudini, &c. Decocto autem si præmittantur grana pul. viper. sudor facilius provocabitur: valde enim exiccatur, digerit & ad cutem properat, ut dicebat Galen.

Tandem à proprietate juvantia, non est quod proponam; sed quæ mihi in usu esse solent, sunt Conserva è flor. lil. convall. quæ incunte Vere parari, & domi servari poterit: sicut aqua stillat. e cerasis nigris: & ventura Æstate colligi po-



gi poterunt flores galegæ, sive rutæ caprar. ut paretur Conserva in usum ducenda: quibus immisceri possunt gutt. aut spirit. vitæ præsertim Philosoph. aut tinctura Corall. Olei autem buxi, succini, & gagatis usus, erit potius externus quam internus ob eorum insuavitatem in hoc vero. Intrinsecus verò & extrinsecus inservire poterit quinta essentia ros. marini. Sma-ragdis quoque, & Pæoniæ radix collo eppensa, ex Gal. præservant atque defendunt.

Circa victus rationem, licet omnia tanto Viro silentio obvolvere debeam, subscribam tamen vini omissioni & ciborum omnium qui in caput evaporare, & Epilepsiam fovere atque movere solent: sicut approbare debeo usum elicius medicamenti bis in mense assumendi, quale esse posset electuarius lenis. addito extracto senz. Hæcque scripta sint in confirmationem eorum quæ ab Excellentiss. Viris in relatione mihi significata fuere. *Raim. Joan. Foris Consult. & Respons. Medicin. Tom. 2. Cent. 1.*

Illustrissimus Vir quinquagesimum tertium annum agens, temperamentis totius, & capitis, calidi & humidi, Melancholia quoque subdominante, postquam semper liberam vitam duxit, ac tandem jam duobus annis mense Januario in loco frigido diutius immoratus caput magnopere a frigore sibi lædi percepit, ex temporanea Epileptica accessione correptus fuit cum motibus convulsivis & spuma cruenta ex ore egrediente, imò cum aliqua serosi sanguinis excretionem, quæ accessio tertia die repetivit adhuc fortior, cum motibus pariter convulsivis atque oris tortura, necnon spumæ & serosi sanguinis excretionem. Redierunt post paucas horas plures Epileptici insultus semperque ferociore, adeo ut quinque horarum spatios, supra viginti observati fuerint, quibus Apoplexia successit, quæ in levem Paralysem totius dextere partis degeneravit, à qua multis administratis Medicis auxilium, & sanguinis repetita eductione, & purgantibus medicamentis paulatim levatus, & fere ex toto liberatus fuit, sola superstite ejusdem partis imbecillitate. Perseveravit tamen epileptica affectio, licet non adeo frequens, cum copiosa materie pituitosæ ab ore expulsionem, cui præterea successit ejusdem materie ad vias respirationis destillatio, quinimò & ad alias plures corporis partes, nimirum ad musculorum spatia, ad spinalem medullam, usque ad os sacrum, unde semel respiratio adeo læsa fuit atque imminuta, ut propè ad suffocationem cum stertore, & principum omnium facultatum labefactionem, non sine novæ Epilepticæ accessionis suspitione, Virum Illustriss. duxerit, superstite operationum omnium, tum animalium, tum vitalium, tum naturalium imbecillitate, adeo ut pulsus languidior sit redditus, totius macies invaluerit, neque excrementa facilia sine auxilio reddere valeat: Urina verò, vel ipso nesciente effluit.

De causa Epilepsia non omnino conveniunt Medicinæ Scriptores, dum Hippocrat. copia vaporum Epilepsiam excitari credidit, cui inscripserunt quoque & Arist. & Averroës, Galenus verò à frigido & crasso humore; Avicenn. & ab humoribus, & à vaporibus; Aret. ex solo animi angore & calore; Paulus verò,

& à pituitosis, & ab atrabiliis humoribus, & nonnunquam à sola aura fieri credidit. Sed quod magis est, quod Medicinæ Principes & Auctores inconstantes semetipsos ostendunt, dum Hippocrat. ab humore Melancholico Epilepsiam excitari asseruit, ubi dicebat, quod *Quartana laborantes magno morbo non capiuntur; & si prius capiuntur, quartana vero superveniat liberantur*: unde repetit Galenus: *Novimus Comitiales quartana discessos; & præterea cum eodem Hippocrat. observavit, Melancholicos magna ex parte & facile fieri Epilepticos & contra.* Idem insuper Galenus ab aura sola à tibia ad caput ascendente, Epilepsiam contigisse puero decimum tertium annum agentem, Diodoro Grammatico ex inedia a ventriculo memorat. Alios omittimus recentiores, qui ex solis vermibus, ex solo timore & ictu scorpionum fieri observarunt, sicut misum facimus Paracelsum, qui causam hujus affectus ignorans eundem morbum astralem appellavit. Quapropter in dubium revocari posse videtur causa Epileptici insultus pluries repetiti in Illustriss. Viro, num scilicet à materia melancholica, an potius pituitosa ortum duxerit, cum ex una parte submelancholicus describatur, sanguine abundans, & per consequens plurima ejusdem sæce. At cum ex altera humidum habeat caput pituitosis excrementis redundans, ut propterea insignis pituitæ copia excreta in accessionibus visa fuerit, ac tandem Epilepsia in Apoplexiam degeneraverit, atque hæc in levem paralysem, ideo harum accessionum materiam, pituitosam potius, quam melancholicam fuisse jure merito credendum; quam veritatem confirmare possunt causæ exterarum prægressæ, nimirum diuturna mora in aëre frigido, qui caput ipsum penetrando ad frigidum alterare, & densando implere valuit. Nec pro altera parte ullus melancholicus præcesserat affectus, ut concludere possimus, à sanguine pituitoso prædominante non sine aliqua melancholicæ ferositatis mixtione, ventriculorum cerebri expultricem facultatem irritatam fuisse, à quo irritamento membranis eorundem ventriculorum contrectatis, motus convulsivi in iisdem primum, & inde in reliquo corpore excitati fuerint, quæ secuta contrectatione & convulsione, quoniam impeditur transitus spiritibus animalibus, ideo hoc impedito, animales quoque functiones necessario pereunt, ut eleganter describit ipse Galenus, sicque Epilepsiam essentialem in capite fuisse credimus, tum quia nulla præcesserat querela de aliqua alia parte male affecta, tum quia de repente invasit & frequentissime rediit, nisi concedamus aliquem consensum à toto venoso genere, portionem acidæ & melancholicæ ichoris capiti suppeditante; & propterea multiplicata pituitosa materia, facilis fuit Epilepsia ad Apoplexiam transitus, indeque ad Paralysem, cum dixerit Galenus, quod inter soporem, & Apoplexiam morbus Comitialis est medius convulsionem asserens universo corpori, qui tamen in Paralysem non finitur. Quoniam vero fons malorum omnium, nempe caput essentialiter affectum, nunquam satis exiccatum fuit, licet tota massa sanguinea, & repetitis sanguinis eductionibus, & electivæ Pur-



gantibus depurata fuerit, idcirco neque Epileptici insultus infestare cessarunt, neque humiditates à capite in varias corporis partes, nempe ad vias anhelitus, atque tandem per spatia ad musculosas corporis partes decumbere, & ad motum difficultatem augere, totamque naturam magno tædio atque molestia frangere unquam desierunt.

Quod affectus iste & à natura, & ab arte sit insuperabilis, non est Medicus qui non videat; & quamvis quodammodo sedari atque minui antehac potuisset in Illustriss. hoc Viro, in præsens tamen veremur ne medicæ opis incapax sit, & Medicinæ superior: Cum enim magnus sit morbus, magna quoque remedia expetit, dum morbo magno convenit remedium magnum; imbecilliora namque omnino contemnet, nec validiora sustinebit ipsius Patientis status. Quare pronunciare cogimur cum Galeno, quod deploratos non oporteat attingere, sed relinquere, & finem orbi tantummodo prænunciare, alioquin infamantur remedia quæ alios sanitati restituerunt.

Nihilominus cum impium etiam iudicetur, Aegros solo prognostico relinquere, & cum apud eundem Galenum atque Trallianum satius sit anceps remedium experiri, quam Aegrum certa morti relinquere, ideo nec nos auxilium petentibus prorsus denegare possumus, quod unicum erit Excellentissimorum Assistentium iudicio proponendum & committendum, estque sudorificum Decoctum ex China, visco querc. ligno buxi. in aqua stillatich. beton. & Peronæ parandum, in quo stillentur guttulæ olei de ligno Heraclei, vel quint. essent. toris marini, Aegrum ipsum Illustrissimum post horam ab assumpto Decocto ad hypocaustum mane tantum ducendo, adeo ut totum corpus, & caput præsertim sudare possit; sed primis diebus prorumpente sudore, ex hypocausto immoretur, ita ut mox sudor prolixiatur in lecto, & inde paulatim diutius in hypocausto immoretur, sic ut progressu ad horæ dimidium perduret, si vires ferant. Pro quibus sustinendis consueta tenui dextra utendum non erit, sed quotidie & ova sorbilia, & ptisana hordeacea, & quandoque pullus junior offerri debebunt, semper tamen sine vino, pro potu namque consuetudo aqua secunda ex residuis erit paranda. Ad hoc autem remedii genus tanquam ad sacram anchoram, si confugere liceat, quamprimum accedendum, cum jam totum corpus, & caput sat expurgatum à nobis supponatur, adeo ut præmissum medicamentum primas vias expurgans a nobis supponatur, adeo ut præmissum medicamentum primas vias expurgans sufficere possit.

Interim quamvis à proprietate iuventia jam administrata & administrari supponamus; attramen aliqua subdemus. In actuali accessione Trallianus à cuiusdam rustici experientia sic edoctus, nares fricabat foliis rutæ sylvestris, quam nos rutam caprariam, & galegam appellamus, in quem finem succus ejusdem paratus servari poterit, quo & nos passim uti solemus. Sub ingressum lecti assumat conservam ex floribus lil. convallium, vel ex floribus rutæ capraræ cum sale Crani humani reformatam.

Mane & Vespere illinantur nares, tempora & futura coronalis oleo de Ladano, vel de buxo, vel de succino. Nec pericula spernenda, ut magna portio radicis Peronæ rec. collo appendita, tum a Galeno, tum ab Orisatio commendata. Smaragdus quoque collo appensus laudatur ab eodem: Sicut ungula aleis in annulo gestata, ita ut tamen cutem tingeret. Ab his commendatur quoque os de corde cervi pariter suspensum.

Quibus paucis jam dictis congrua & jam præscripta erit vicus ratio à Viris Excellentiss. addenda: & vinum prorsus interdicendum, cuius vicem supplebit aqua stillat. ex ceteris nigris paranda, si Deo placuerit. Omnia vero prudenti iudicio Excellentissimorum Assistentium remittenda. *Idem ibidem.*

#### *Epilepsia per consensum à Ventriculo.*

Pater Admodum Reverendus trigessimum annum agens, temperamenti totius ad calidum & siccum vergentis, mediocris habitus, jecoris calidioris, Lienisque obstruccionibus occupati; septem abhinc annis pati cepit tremores in brachiis & capite, cum viis obicuratione & progressu, cum principum actionum abolitione & motus privatione, ita ut interram cadere cogeretur. Insultus autem huiusmodi aggredi solebant in Lunaribus conjunctionibus præsertim & oppositionibus. Primis annis sicut frequentius, ita vehementius invadebat affectus cum spuma circa os, semper tamen citra evidentes motus convulsivos. In præsens autem non adeo pravæ sunt invasiones, quæ cum semper matutinis horis jejuno ventriculo contigerint & contingant Patri Adm. Rev. etiam in lecto degenti; modo tamen si decumbens maneat, nec e lecto surgat, invasiones evitare solet: semper enim prævidere & præsentire potuit imminentem futuram aggressionem, affecto nempe ventriculo ipso, a quo evaporationes elevari percipit ipse, indeque caput in consensum trahi, & ipitibus animalibus confusis atque irregulariter commotis ipsam subsequi affectionem puncturis quibusdam, ut ait ipse, pariter præcedentibus in capite ipso. Modo ab Eximio Viro quid agendum pro salute implorat.

Quamvis convulsivi motus adeo Epilepsiam addicti esse soleant, ut ideo Galenus Epilepsiam ipsam per convulsionem definiverit, dicens, quod sit convulsio non perpetua omnium partium corporis cum principum actionum abolitione, ob humores vias spiritibus animalibus impediētes, & facultatem expultricem irritantes; at tamen non semper eodem modo manifestantur, sed quandoque (quia leves) obscuri sunt convulsivi motus, ut ideo Celsus asseruerit, Epilepsiam fieri aliquando cum convulsione, & aliquando sine, & præsertim dum caput non idiopathice, sed sympathice læditur; ut ego existimo in hoc Adm. Rev. Patre, cuius Epilepticum affectum sicut demonstrant symptomata omnia, mandibularum scilicet convulsiones, quibus lingua jam læsa fuit; leves tremores quoque in brachiis & cruribus, quibus partes illæ impotentes reddantur, principum actionum læsiones, ita eundem confirmavit spuma



Spuma circa os, quæ licet non sit perpetuo Epileptici necessaria, affectus tamen ideam contrahat, quotiescunque successerit. Et quamvis semper in Epilepsia afficiatur caput, non tamen semper essentialiter & primario, ut dictum fuit, sed quandoque per consensum, vel à toto, vel ab aliqua alia interiori corporis parte, ut in nostro casu; si enim essentialiter caput afficeretur, repente invaderet, & necessario procideret; nec præcederet querela de alia parte inferiori affecta, sicut evenit Adm. Rev. P. nostro, cui tantum temporis petmittit invasio, ut veluti admonitus sedere & casum prævertere possit; imò conqueritur ante de ventriculo affecto. Quare sicut de idea morbi dubitari non potest, ita de modo, sive parte affecta non est ambigendum. Restat igitur consideranda pars mandans, quæ caput ipsum in consensum trahat, quam ego quidem Ventriculum esse existimo, tum quia eodem jejuno invadit affectus, ut Diodoro Grammatico evenire solebat, tum quia de ipsius affectione præcedit querela. Verum viscerum quoque, & præsertim lienis læsionem concurrere puto, ab obstructis nimirum splenicis vasibus, & sanguine crasso atque melancholico in iisdem stagnante: ab hac enim parte primam originem habuisse & habere epilepticum affectum in Adm. Rev. Patre ego credo, quamvis capitis imbecillitatem atque ad eundem dispositionem præcessisse pro certo sit habendum: ut propterea videamus, plures Melancholicos, Epilepticos fieri, & contra, quem facilem transitum nobis insinuavit Hipp. & Galenus confirmavit, facta nimirum metastasi à mente ad corpus cerebri, & contra: quam metastasin licet Galenus crassiorum humorum esse existimaverit, frequentissimè tamen, ut & in casu nostro, Epilepsia à vaporibus excitatur à minera melancholica elevatis, mediante tamen facultate expultrice irritata. Irritatur autem in cerebro per consensum ab ipso ventriculo: nec adeo difficulter, cum nulla pars nostri corporis adeò exquisitum sensum habeat, nec ita facile in consensum trahat utrumque principium, nimirum cor & cerebrum, ut os ventriculi; & ideo sicut ex biliosis humoribus ad ventriculum perreptantibus, & os ejusdem corrugantibus, Diodoro jejuno epilepticus contingebat insultus, tracto in consensum cerebro ab ore ventriculi ex nervosa substantia conflato; ita & in Adm. Rev. Patre nostro à vasibus splenicis acida & melancholica serositas ad ipsum matucinis vacuum transmissa eundem effectum producit, dum ab eadem acida serositate agitata vapores feruntur ad caput, qui ventriculi parietes exquisitissimo sensu præditos, mordicantes & irritantes, contractationem quandam excitant, ob quam spiritus animales inordinate commoti ad partes recta via non transmittuntur, & ita motus regularis partibus corporis denegatur, unde necessariò procidit, cum motibus irregularibus, si non convulsionis, saltem tremoris: quam procidentiam evitare potest in lecto quietus manens, quoniam capite & corpore quiescente, quiescunt quoque animales spiritus, nec inordinate moventur; quod idem evenire videmus Vertiginosis, quibus stantibus, aut decumbentibus, ut plurimum Vertigo cessat. Movetur au-

tem affectus iste ad Lunæ motum, ob causas à Gal. adductas, ubi ait, quod *Luna Comitiales custodit.*

Ope medica opus habet Rever. Patiens. Et quamvis Hippoc. asseruerit quod Comitiales post vigesimum quintum annum non liberantur, intelligendus tamen est, quod ante vigesimum quintum annum sine medico auxilio, sola congrua vivendi ratione & ætatis mutatione liberari possunt: sicut post vigesimum quintum sine medicamentis perseverat Epilepsia usque ad mortem. Curatio igitur est aggredienda, & non sine salutis spe, cum Morbus iste ex sui natura semper increseat, ut monuit Hipp. in Rever. verò Patre potius decreseat, & rarius invadat. Spem auget quoque Galenus dicens se non paucos Comitiales purgandos edasse.

Quare omnium primò viz primæ ab excrementis expiandæ. secundò Obstructiones mesenterii, magisque lienis, aperiendæ. Tertiò Totum & Caput purgandum. Quartò Evaporationes in caput revellendæ. Quintò Calida jecoris intemperies nonnihil remittenda, & acrimonia atque aciditas sanguinis corrigendas & ultimo, à proprietate juventia in usum ducenda.

Pro prima intentione explenda, primum leniens erit.

℞. Elect. lenit. sive Diasenæ ʒj. crem. tart. ʒij. m. f. boli. Præparans quinque diebus præbendum, erit.

℞. Julap. acet. syr. de cortic. citri, aq. florum citri an. ʒj. m. pro syr. matutino, & sic pro aliis. Alterum leniens erit.

℞. Syr. ros. solut. de polyp. an. ʒij. aq. florum citri parum, m. f. potio.

Pro secunda intentione, Præparantia debent esse.

℞. Succī depur. cich. borag. an. ʒj. salis tart. fixi gr. x. decoct. in jure pullæ paratæ, endiviz, melissæ, lupulorum, asparag. ʒiv. m. pro syr. & sic pro aliis septem. Mox præbeatur Purgans.

℞. Rhabarb. maturi, agarici trochisc. sol. senæ rec. an. ʒj. cinnamom. integri ʒss. aq. stillat. cich. q. s. m. inf. per hor. xii. deinde facta expressione, colaturæ adde syrupi de polypod. ʒiv. aq. florum citri parum, m. f. potio; cui tribus transactis horis superbibat aquæ hordeac. libram, & post horam prandium sumat. Inde ad ulteriora Præparantia, & Aperiencia deveniendum ita.

℞. Succī depur. cichor. pom. dulc. sumariæ an. ʒj. decoctionis melissæ, lupulorum, betton. Peronix ʒiv. spirit. tart. ter rectificati gutt. xii. m. pro syrup. & sic pro aliis septem; Quibus succedat Purgans ex infusione, ut supra.

Vel ℞. Elect. lenit. sive Diasenæ, diacathol. an. ʒiv. pulul. de trib. cum rhabarb. ʒij. misce fiant boli, quibus post horam superbibat aqua hordeac. vel seri asin. depur. lbj. sem. tribus vero horis ab epoto sero prandeat. Interim secunda die horum syruporum aperiatur Jecoraria sinistra pro curatione, & educatur sanguis ad ʒvi. & amplius, si exeat niger.

Pro tertia intentione explenda, syrupus de cicho-



cichorio cum rhabbaro Nicolai prerogativam in hoc affectu habere solet. Præbeatur itaque octo aut decem continuatis diebus, hunc in modum.

℞. Aqu. stillat. agrim. Præpar. ana ʒ iij. syr. de cich. cum rhabarb. ʒj. acetosi ʒβ. salis cranii hum. gr. x. m. pro syr. & sic pro aliis. Quibus assumptis, totius & capitis expurgatio ita sequatur.

℞. Pilul. coch. cum helleb. præpar. aggregat. ana ʒβ. aurearum ʒj. m. reform. pilulæ in Aurora sumendæ.

Pro quarta intentione explenda, Cauterium coxæ sinistræ erit inurendum, & sanguis ex pede detrahendus: jubet enim Galenus quod Comitialibus, & Vertiginibus obnoxii sanguis ex pede sit educendus pro præservatione; cui subitui posset etiam hæmorrhoidalis evacuatio.

Pro quinta intentione adimplenda, efficacissimum remedium erit usus lactis Alimini, per quadraginta aut quinquaginta dies, quod de more cum saccharo summo mane statim mulctum, erit assumendum: valet enim jecoris caliditatem corrigere, massam sanguineam temperare, sicque per consequens facultatem expultricem ventriculorum cerebri irritatam sedare.

Tandem aliquod Alexipharmacum anti-epilepticum sub ingressum lecti usurpandum consulo, quod esse poterit.

℞. Conservæ floribus beron. rutæ capr. Præpar. ana ʒ ij. tincturæ corall. chym. spir. vitrioli ana gutt. x. salis cranii hum. ʒj. m. reform. electuarius cum succo pom. dulc. q. s. cujus dosis erit ad semiunciam.

His autem omnibus congrua erit addenda vivendi ratio. Et primò fugiat aeris excessus, tum frigoris, tum vero maxime calidos. Quare caput erit custodiendum, & a ventis, & ab hypocaustis, sive stufis, & à duntum. mora prope ignem hyeme, sub radiis vero solaribus æstate. Secundò abstinere ab Alimentis huic affectui sympathicis, qualia sunt inter carnes, hordina, Volatilia palustria, perdices & coturnices; neque suilla adeo convenit; sicut neque extremitates animalium, ut pedes, caput vituli, &c. Inter pisces, admittuntur tantum saxatiles. Inter lacticia, caseus, præsertim vetus, damnatur. Inter legumina, admittuntur hordeum, oriza, piselli. Edulia ex crassiori pasta parata nocent. Ex fructibus, damnantur acidi & vaporosi, ut esset uva. Ex oleribus, à proprietate epilepsiam movere possunt petroselinum, & magis apium atque fœniculum: Item smirnum, daucus, cœpa, allium, tubera terræ. Inter condimenta, nimis acida & vaporosa evitanda essent; quare inter Aromata, cinnamomum tantum & piper ruditer confusum admitti poterunt. Pro potu consuetus sit aqua cinnamomo & saccharo condita: à vino enim saltem per annum abstinendum, ut consulunt Medicinæ Principes, Paulus, Aëtius & Oribasius, nisi forsitan reclamet ventriculi imbecillitas: tunc enim quandoque vini albi, tenuis cyathus admitti debet. Et quoniam jejuno ventriculo facilius invadere solet affectus, idcirco summo mane Conserva rosarum, aut boraginis assumpta facile pro præservatione sufficiens erit; sive Electuarius Anti-epilepticum suprâ descriptum.

Quibus non sufficientibus, aliquid comedat ut patem jure carnum imbutum: ita Diodorus Grammaticus præservabatur ossa panis vino madefacta, cui ventriculus a bile vexabatur. Tercio Somnus pomeridianus Epilepsias excitare solet, & ideo evitandus: quod si fuerit consuetus, sit brevissimus, & non decumbendo, sed sedendo; capite nimium elato. Quarto Violenti motus sunt evitandi, exercitium tamen necessarium non omitendo, deambulando, non prope flumina, & longe ab omni præcipiti loco. Quinto sicuti conducere poterit ad præservationem levis aliqua purgatio excrementorum inutilium arte procurata, ita utilium perniciosâ semper erit, altera Epilepsia ab Hippoc. nuncupata. Itaque pilulæ præsto sint, ut semel in hebdomada hora una ante cœnam ex his duæ assumantur.

℞. Pilul. Mastic. ʒ ij. Magist. Mechoa. ʒβ. m. reform. pilulæ num. x. & aurentur. Tandem omnes animi motus, atque perturbationes, ut ira, tristitia evitentur: sic & animi applicationes atque nimia studia, saltem per annum, si non omnino omittenda, valde tamen remittenda. Et interim alacri animo vivat, nec adeo proluxa Purgatione & stricta vivendi ratione gravetur, dum pugnandum est contra sortem & pertinacem affectum, quem ideo Antiquiores Græci Magnum, Herculeum & Sacrum appellare solebant. Idem ibidem.

*Epilepsia per Consensum à Stomacho, & forsitan ab Utero.*

Adeo deficiens est & mutilata hujusmodi casus historia, ut vix quicquam certi scribere queam; attamen quia An. ius inservire debeo, verisimiliori, quæ potero, conjectura utens, neam de hac re sententiam exarare conabor.

Affectus quo detinetur honesta Virgo, quibuslibet ejus accessum insipientibus notissimus evadit: epilepsiam enim facile demonstrant totius corporis convulsivi motus cum principum actionum latione. Hanc tamen essentialem non esse existimamus, sed per consensum ab infernis partibus, tum quia accessio ab ipsamet antea observatur, tum etiam quia præcedit querela, & sensus trilis circa ventriculi os. Itaque Grammaticus præsentiebat in ore ventriculi molestiam. Ita luer a tibia auram quandam ad caput ascendente prædicebat; quare à ventriculo ortum habere credendum, qui in hujusmodi affectu lædi solet ab una, vel pluribus ex tribus causis, cruditate scilicet meri potu, aut nimia Venere; tertia quidem excluditur, ergo à duarum altera læsus est; & potius à cruditate persuadent mihi ætas, sexus, corporis habitus & Virginis conditio. A ventriculo itaque tanquam à minera vapores ad caput elevantur (nisi & ab utero) à quibus vaporibus etiam solis, ut placuit Hipp. de flatibus, Arillot. & Averroi, cerebri ventriculos replentibus, & expultricem irritantibus, ipso cerebro seipsum quatiente, convulsivi motus contingunt, deficientes, quando expulsionem, & resolutionem, victoria potitus est. Nec mirum esse debet si circa pleniluniam exacerbari soleant: Luna enim Comitiales custodit, & plena, valentiora omnia, quam in falce, reddit.



Est affectus quidem contumax, sperandum tamen fore ut p. t. liberari possit, quia vigesimum quintum annum nondum attigit, & quia mutationi vitæ maxime confidendum, præsertim si medica addantur auxilia.

Est itaque ventriculus evacuandus, mox roborandus; & sicuti cruditates, ita quoque nimia mediæ inhibenda; nec onittenda a proprietate iuventutis. Ita Grammaticus Juvenis præservabat mica panis in vino madefacta, purgatione ter in anno ex hiera & bonis concoctionibus.

Necessarium remedium existimavit Gal. sanguinis immutationem, hancque Comitialibus & Vertiginosis, potius ex crutibus pro præservatione, ideo instantibus mensuris purgationibus saphæna periri poterit, & bis & ter singulo mense, si immutæ prodeant. Nisi Patiens nubilus esset, libenter ponticulum in coxa inurerem. At saltem quotidie semel ante cibum utatur lotionibus & frictionibus crurum aqua calente.

Evacuatur ventriculus electuario lenit. & hiera. Præparentur humiores Julapio acet. melle ros. simplici, & syrupo de cortic. citri sine diluto. Inde expurgentur electuario lenit. hiera & agarico. Repetatur Præparans oxymelite simpl. syrupo de beton. syr. de cich. Nic. in decoctione borag. beton. storach. d. salvia, lil. convall. & Pæonia. Expurgetur postea jam dicto, aut consimili medicamento. Hoc tempore propinari poterit decoctio Epithymi Mef. tribus saltem diebus ad 3vj. Post hæc laudo aliquod medicamentum ex Scilla, quo solo Gal. promittit quadraginta dierum spatio Epilepticos sanari. Oxymel itaque scalliticum ad 3ij. singulo die propinatem in jure Pæonia & majorana. Tandem optimus erit usus Theriacæ, & efficacissima erit aqua theriac. cum gutt. ol. succini ad cochlear j. mane, & sero: proderit enim & Utero, si opus fuerit.

Victus ratio proportionem respondeat. Caveat à superingestionibus: nil enim deterius quam comestio supra comestionem. Abstineat a pituitam generantibus & a proprietate nocentibus, ut sunt carnes caprinæ, hordinæ, Perdices & Coturnices. Præterea ab oleribus, lacticiis, leguminibus, vinis generosis; imo perseverante affectu, fiat abstinentia saltem per annum, & bibat aquam sanctalinam cum Pæonia. A cibo abstinentium sumat. Utatur singulo mense 3j. Pilul. de hiera cum agarico; & quamprimum Viro jungatur. *Idem ibid. m.*

#### *Epilepsia per consensum à Liene.*

Illustrissima Mulier annum agens trigelimum novum, temperamentum sanguinei, jecur torridum; post prægressas intensas applicationes, ac vehementes animi perturbationes atque molestias, pati cepit cordis oppressiones, cum inexplicabili animi moerore, & faciei ex roseo in lividum colorem mutatione; tandem jam quatuor annis, ineunte Autumno noctu incidit in totius corporis convulsiones cum difficili respiratione, Aphonia & omnium principum actionum abolitione, ut merito crederetur penitus extincta, nisi deglutiens ac in ipsius ore spumosa quædam humiditas apparuisset. Ab hoc Accidente libera nunquam evadebat,

nisi postquam spumosa cruorem aliquando ad libram eiecisset. Triduo & ultra, tunc tuli tamen, cruenta expuebat, & adeo languida remanebat, ut vocem edere & cibum assumere vix posset. Abdominis, & præcipue versus sinistram hypochondrium, flatuosa passione divexabatur, & ad somnum propensione tenebatur cum tertiana periodo. In Muliebribus nullus error, minus in viciis ratione; in omnibus enim temperatissima Patiens. Nihilominus usque in hunc diem perseveravit affectus ipse cum enarratis symptomatis, excepto semeltri, post medicam purgationem initam, quo immunis semper ab hoc affectu vixit. Sed rursus rediit, & interim subsultibus per membra sæpe afficitur; noctu dormiendo semper insurgit affectus, una excepta vice, dum sacris operam dabat. De affectibus istis, Vir Illustrissime ac Præstantiss. cui Par Nemo, cum D. Carolo Fontana alias consului; Accidens, Ephialtem, live Incubum appellasti, pro cujus Curatione duplicatam expurgationem decrevisti; Succos alterantes depuratos commendasti; Aquarum Virginis usum, Lactis, Balnei, & ex pedibus singulo mense sanguinis educationem imperasti. Quibus omnibus religiose observatis, adhuc tamen menstruale Accidens pertinax concitatur, inò dum balnearer Illustriss. Patiens, symptoma illi supervenit acutum. Solum præscripta Aqua Virginis duobus annis feliciter assumpta profuit, lactisq; etiam usus fuit perutilis, habitus quippe corporis & vires increvere: tunc enim sex menses se gessit immunem. Verum quia iterum se prodit Accidens, & adhuc magis magisque viget, ideo nos de Nobilissimæ Egroræ salute solliciti, ac ejusdem jussu, ad Te confugimus, ut salubriora consilia recipientes, optatum finem, qui salus est, possimus obtinere.

Affectum qui jam diu Matronam Illustriss. divexabat, Incubum, seu Ephialtem à nobis, tunc temporis consentibus existimatum & appellatum fuisse sat bene recordor. Verum quia ob insignem analogiam quam habet affectus iste cum Epilepsia, facile diu perdurans in ipsam Epilepsiam convertitur, idcirco in eandem migrasse attestatur adducta relatio, cum convulsivi motus cum principum actionum abolitione spumæque copiosa ad os supervenerint ipsum affectum comitantes: quæ omnia symptomata epilepticam ideam constituunt. Hanc autem ab humore melancholico provenire non dubito, ut facile conspici potest ex prægressis animi passionibus, ex melancholico & flatuoso affectu quo multo jam tempore detinetur. Et præterea quia prædicat Hipp. in morbis melancholicis periculosos fieri decubitus, nimirum stuporem corporis, vel convulsionem, vel furorem, &c. atque tandem quia quandoque & ego cum Do. vyneto observavi, à sanguine melancholico lienis vasa replente, & ad ventriculum motu præter naturam confluyente, affectum hujusmodi concitatum fuisse, quo per vomitum electo, ab insultu Patientis liberabantur; quod idem Matronæ Illustriss. evenire potuit, nisi dicamus, quoniam spumosa est, & cruenta materia ad os perveniens, in capite potius, ex spiritu & vaporum agitatione talis reddita, quod dum à toto per venam cavam, vitiosus atque copiosus sanguis ad cor, indeque per arterias caro-



carocidas ad caput pervenit, in illa epileptici tumultus agitatione, in glandulis non solum saliva secretatur, sed cum illa aliquid cruoris, qui agnatus & spumans per ductus salivales in os delabitur, & sine ulla tussi educitur; cuius cruoris spuma sequentibus quoque diebus pervenerant extrahissim, ut idcirco a pulmonibus prodire non sit credendum: caput enim cum sit pars in Patiente Nobiliss. jam imbecillis reddita, & principaliter læsa, redundantem sanguinem atque vitiosum, naturam in illo deponere iure merito existimandum. Et quamvis Incubi accessiones nocturnæ, & in somno contingere soleant, id tamen non verat, quin & accessiones epileptice horis nocturnis accidere possint. Quæ jam dicta omnia jecur julto calidius, sicut caput præcalidum & humidum necessario supponunt, ut propterea viscus illud sanguinem intervidiorem, adustum & acidum generare, hoc vero eundem facile admittere atque recipere potuerit: a quo, obstructo cerebri ventriculo, præsertim posteriori, motus corporis atque linguæ magnopere offenditur, quia septima nervorum conjugatio principio spinalis medullæ proxima est, nempe prope posteriorem cerebri ventriculum, sicque sit Incubus, sicut progrediente non solum obstructione, sed multo magis in ventriculis, ab aciditate irritamento, Incubus ipse quem Epilepsiam quandam nomenabat Gal. Epilepsia vera, atque legitima factus fuerit, menstruales periodos forsitan recipiens à menstrui sanguinis motu, non sine aliquo uterino consensu.

Affectus quidem gravis, & qui quotidie seipso gravior evadit, ut ideo ætatis progressu in Apoplexiam converti posse sit dubitandum. Quæ ut arceatur, & præsens affectus remittatur, repetenda Purgatio hoc Verno tempore congruo, primas vias expiando; Obstructiones aperiendo; Sanguinis copiam imminuendo, & acrem atque acidam ejusdem qualitatem corrigendo; Jecur refrigerando; & a proprietate juvenibus caput roborando.

Quibus intentionibus ut satisfiat, ex Chirurgico fonte repetita sanguinis missio, ex partibus, tum superioribus, tum inferioribus est desumenda, & Cauterium sinistræ coxæ affigendum, frequentes etiam pedum lotiones ante coenam aqua calente sunt exercendæ.

Pro prima intentione explenda, repetitum leviens erit syrupus ros. solut. & de polypodio, vel potio ex man. Clarif. vel elect. lenit. cum tartaro; & intermediis diebus, pro Præparante julap. acet. Cortic. Citri aromatizatum.

Pro secunda intentione, succi depur. erunt in usum ducendi per x. dies, Cich. borag. & fumariz, in decoct. Cichorac. additis sol. mellissæ, sonchi, lupulorum, cui addatur salis prunellæ ℥j. in quorum intermedio atque fine præbeatur Purgans, ex elect. lenit. Extracto senæ, & rhab. paratum, cui superbibat serum depuratum. Mox per x. alios dies præscribantur succi depur. Cich. fumar. atque beton. in sup præscripta decoct. addendo folia Pruniz, & lil. Conval. in qua dissolvantur gr. xij. salis tart. fixi; Et in horum pariter intermedio ac fine præbeatur Purgans, ex elect. lenit. diacath. & Confect. Hamech compositum, cui pariter serum depur. superbibat ad lib. ij. Et quoniam ad

huiusmodi affectum debellandum fortiora proponunt Medicina Principes, nimirum Veratrum nigrum cum scam. & hieram Archig. idcirco hiera Iuta Alexandri locum habere videretur, sed mihi magis arrident Pilulæ Paracelsi, quæ Extracta continent hellebori, diagryd. & Colocynth. ad ℥ ij. medi. nocte assumendæ; quibus summo mane superbibat seri, aut aquæ Nocerianæ lib. ij. Et autem tertio aut quarto quoque die repetendæ. Et quoniam diebus tantum Canicularibus præparari possunt, ideo paratæ inveniuntur hæc Patavii ad signum Sirenis.

Ita depurato & imminuto sanguine, jecoris fervor erit contemperandus aqua potius Noceriana, quam Beatæ Virginis. Et quamvis vitriolata in Valle Solis nascentes utiuires esse possent, attamen ob itineris incommodum, præsertim in hoc genere mali, sunt omittendæ, & potius Nocerianæ vitriolatæ sunt reddendæ, infundendo prunis Cy. this aquæ pro vehiculo guttulus spiritus Vitrioli: habet enim Chalcanthum vim & facultatem vapores sursum petentes reprimendi, atque impetum sanguinis sistendi: magis autem prodesse poterunt aquæ Nocerianæ, quam Beatæ Virginis, quoniam prorsus omni evaporatione carent.

Post aquas epotas, ad sanguinem edulcorandum atque refrigerandum, lactis asinini usus quadraginta vel quinquaginta diebus erit præcipiendus; & interim Alexipharmaca & a proprietate juvantia in usum ducenda: inter quæ omnes Medicinæ scriptores extollunt peroniz grana nigra n. 15. cum aq. stillat. ejusdem peroniz. lotens est sal Crani humani, inscia Patienti in aliqua Conserva exhibendum. Efficacissimus est spiritus Vitrioli philosoph. in aqua stillat. lil. Conval. sic & tinctura Lunæ: De more autem sub ingressum lecti assumat Conservam à flor. beton. aut liliorum Conval. aut rutæ caprariz.

Quibus omnibus congrua vivendi ratio erit addenda, ab Excellentissimis Viris Adstantib. præscribenda; circa quam iidem considero à vino abstinendam per aliquot menses, & potum quæ santalinæ, cui immista sit aqua stillat. Cerasorum nigrorum, quæ saccharo & frustulis citri recentis suavior reddi possent. Hæcque omnia à prudentissimo judicio Excellentiss. Viroium, non solum dirigenda, sed alteranda atque mutanda libenter remitto. *Idem ibidem.*

#### *Affectus Epilepticus in Hypochondriaco.*

Jam affectu melancholico hypochondriaco antiquo & consummato detineri Nobilissimum Pat. clare nobis ostendit relatio clarissima, accurata & erudita expressio Præstantissimi Viri. Et quoniam Melancholici facili sunt Epileptici, & contra, ideo epilepticis multibus à decimo octavo usque ad vigesimum octavum annum fuit obnoxius: qui tunc desierunt & recesserunt dum in affectum melancholicum prorsus migrarunt: unde & timores, & mærores, & inania animi sollicitudo ad res proprias, imò & alienas agendas; & præterea flatuositates copiosæ, quæ caput per vasa petentes, & spiritus visorios agitantes, trepidationem ad vertiginem veram non perveniens excitant atque conservant, præterquam quod eosdem animales inficientes atque obtenebrantes, mærorem atque timorem incurrunt, somnia terrificæ in-



ducunt non sine cordis passione. Etenim cum spiritus nihil aliud sint quam tenuissima sanguinis portio, hæc à jecore per venam cavam ad cor, & inde per arterias carotidas ad cerebrum crassa & nigra perveniens, in plexu choroide pravos jam dictos affectus producit, nec interim cor sine læsione relinquit, & ideo totum quoque capiti contribuere in adeo diuturno affectu juvenerit credendum, eoque magis ætate præterita, temperamento totius & jecoris, & habitu corporis consideratis; quinimo & caput ipsum capillis nigris natura præditum libem aliquam, sive intemperiem facile contraxisse suspicandum. Has autem affectiones hypochondriacum affectum præcessisse non est quod dubitemus, dum vitam anteaquam consideramus studiis intensis deditam, gignendis cruditatibus magnopere aptam, a quibus obstructions in vasis naturalium viscerum genitæ necessario fuere, & ab his exsiccatis crassa flatuositates, nimirum exhalationes elewantur, & flatuosum affectum cum Galeno tandem constituunt.

Et quoniam affectus isti antiqui & confirmati sunt, nec tot tantisque remediis administratis unquam cesserunt, ideo potius remitti, quam deleri posse sperandum, auxilio quoque advenientis senectutis.

In quem finem propositis à Viro Excellentissimo intentionibus satisfacere conandum: in alteratione tamen multo magis quam in expurgatione insistendo, atque idcirco vacuantibus, aperientibus & electivè purgantibus à Viro Excellentissimo aptissime & administratis, & propositis subscribendo; Inde statim ad humectantia & refrigerantia deveniendum esse cum eodem necessarium censemus, nimirum ad usum lactis asiniui quadraginta aut quinquaginta diebus assumendi; nec obstat Lac dare caput dolentibus malum esse: locum enim habet exceptio illa in capitis affectionibus frigidis, non autem in calidis, minus adhuc in siccis. Obllare videntur quodammodo hypochondria suspensa & murmurantia; sed objectio tollitur à prægressis aperientibus, evacuantibus, calorem contemperantibus, & siccitatem remittentibus, quibus ad majorem cautelam nos quatuor aut quinque diebus ante lactis exhibitionem serum caprinum aut asinum depur. ad lib. 4. vel 5. cum vehiculo dejectorio syr. ros. sol. præmitti posse putamus; nec evaporatio in caput timenda, cum data opera procurat debeat ad intemperiem calidam capitis corrigendam; præterea extrinsecus balneum aquæ dulcis supra viginti dies administrandum, herbis refrigerantibus alteratum, nullo modo omittendum.

Reliqua omnia tum à proprietate juvantia, tum capitis roborationem respicientia, proposita omnino probamus, sicut quoque purgationem aliquam humectantem & evacuantem cum sanguinis ex venis sedalibus educatione venturo autumno iterandam, dum quodlibet decoctum exsiccans suspectum habemus, cum dictorum affectuum nullus à pituitoso humore, sed à melancholico sanguine, spiritu & flatuosa exhalatione proveniat, quibus correctis & emendatis, & timores, mærores, & terrifica insomnia, mentis commotiones, & visus trepidationes, omnia cessura speramus, præsertim cum statum p. n.

Nobiliss. Par. ejusque causas Viro Doctissimo nobilissimas esse videamus. *Idem ibidem.*

### *Epilepsia pueri.*

Puerulus quidam qui unius fere anni spatium emensus, honestis, vegetis, tam publico, quam privato seculo iungentibus officio parentibus oriundus, nondum ablactatus, omnis generis alios cibos, simul cum lacte matris (quæ acidorum & frigidorum seu delectabatur) capiens, in prandio lætis repletus, alvum insolito more habens sicciozem, horis pomeridianis in lectum somnum capessendi gratia repositus, placide quidem requievit, mox autem in somno corpusculum cum anxietate circa præcordia hinc inde movere cepit, donec ex improvviso oculi aperti, labia, mandibulæ, reciproco motu per horæ penè quadrantis spatium convellerentur, à quo paululum quidem symptomatum cessavit vehementia, mox autem redit, unde Parentes, spectaculo hoc commoti, sollicitè Medici exposcunt consilium.

### *Resolutio.*

Affectus, quo noster Ager tenellus laborat, est Epilepsia, quod ex symptomatum concurrentium colluvie facile perspicere licet; I. enim Actiones læsas & quidem depravatas testantur illi motus clonici oculorum, labiorum, & mandibularum ob spirituum animalium impetuosum & inordinatum ad musculos motum, & nihilominus tamen eorum vigorem sensorium fixatum & insulatum. II. Anxietas vero circa præcordia ob sanguinis vaporosi impeditiorem per pulmones & cor motum oriri videtur. III. Inter Excreta læsa Alvi siccitas ob acidæ particulæ, sive succi pancreatici, sive etiam bilis ex assumptis eo collectas excrementitias intestinorum motum peristalticum cohibentes urget.

Est vero Epilepsia varia & mixta actionum, præsertim animalium, læsio, cum aliorum symptomatum sæpe concursu, imprimis motus localis depravatus, vel totius corporis, vel certorum saltem ejus membrorum, cum sensuum hebetudine ab aura vitiosa acidæ spiritus animales & lympham potissimum diversimode inquinante, dependens.

Subiectum in nostro ægro potissimum patiens, sive pars recipiens, sunt Organa sensuum, quæ externorum, quæ internorum, quorum agendi facultates & functiones in ipso paroxysmo abolentur, aut nimium imminuuntur; nec non Musculorū partes earumque fibræ, præsertim oculorum, labiorum, & mandibularum, quamvis sine dubio musculi quoque thoracis & intercostales ipsamque Diaphragma, seu primarium respirationis instrumentum, compatiuntur. Pars verò mandans non tam Cerebrum, Cerebellum, & Principium nervorum, quam consensualis ventriculus corrupto acescente chyloso liquore effluvia vitiosa acidæ expirante refertus, & nervoso generi communicans hic potissimum attendi debet, latellinis non exclusis, præsertim tenuioribus.

Differentia enim datur inter Epilepsiam per essentiam, cujus causa interna & proxima in ipso cerebro & cerebello sedem suam & originem obtinet; & per consensum, quæ causam recipit aliunde è ventriculo, licet, utero & similibus.



libus, vid. *Willis. d. l. cap. 3.* alique. Nostri instituti non concedit ratio, ea prolixius declarare. In nostro vero agro puerulo consensualem esse affectum, extra dubitationis aleam positum est.

Causa proxima irritans est Halitus, quidem mixtus ex acido nitroso & vitriolaceo, aut Onoso styptico cum spiritibus animalibus sive ad principium nervorum commune delatus, & sensuum vigorem obtundens, sive in fibras motrices partium affectarum sese intinuans: ibidemque notatam irritationem convulsivam instituens. Antecedens hic gemina concurrere videtur, partim fermenti in ventriculo dispositio vitiosa & acida assumpta alimenta facile corrumpens; partim etiam sanguinis crudis chylosis portionibus multum referti ad fermentationem inordinatam prout mala constitutio. Procatartica in historia recensita duplices occurrunt, quarum quaedam ad infantem, quaedam ad matrem spectant. Illæ sunt vitiosa alimentorum variorum ætati tenellæ inconvenientium assumptio, & per copiam majorem ventriculi aggravatio, ut rite chylicare nequiverit: Hæc est lactis materni vitium, quod acidorum alimentorum & frigidorum frequenti usu contractum est: Qualis enim cibus & potus, talis etiam habetur chylus, lac & sanguis. Nonnulli cum *Willis* causam proximam per auram explicant, & quidem nitrosam explosivam, qualis excitatur a pulvere pyrio accenso: de cujus tamen universali veritate merito dubitant alii, ob duas præsertim rationes, (1.) quod febres supervenientes Epilepsiam plerumque solvant, causam hujus rarefaciendo & dissolvendo. (2.) propter curationem sæpe per volatilia, spirituosâ, rarefacientia instituendam; Alii spiritum sylvestrem appellant. Ex *Halmonii* hypotesibus *Gas* nomine venire posset, non quidem vitalis, quod lumen est atque balsamus a corruptione præservans, solari lumini adæquaturn, sed sylvestris, qui in se est spiritus concretus & corporis more coagulatus, sed accedente fermento excitatur, quemadmodum utriusque Gas naturam prolixius descripsit *trall. Complex. atque Mist. Elem. figm. num. 14. 21. 42.* Causas antecedentes internas in aliis subjectis occurrentes per essentiam & per consensum ob temporis penuriam non licet hoc loco exponere. Ad Procatarticas alias quoque pertinent Dentitio, quæ fortassis etiam in nostro infante concurrere potuit, suadente hoc ipsa ætate dentitioni favente; licet in historia mentio non fiat, contagium quoque saliva per pocula communia communicatum inter causas Epilepsie procatarticas scilicet, retulit historia observata a *D. D. Vito Kiedleno observ. 33.* Inter causas procatarticas haud infrequentes etiam esse solent vermes sive Lumbrici quæ Ascarides, quæ Tereæ oblongi, quibus pueri obnoxii esse solent sæpius, quoniam generantur ex crudis portionibus ab infantis cibis copiosis atque corruptis, imprimis carniū & victuum horariorum ingurgitatione, qui postea mordentes fibrosas intestinorum partes interiores, in motus convulsivos irritari & per consensum & interventum halituum acidorum acrimia ipsam principium nervorum afficere possunt, teste *Sylvio. d. l. cap. 10.* De causis fortuitis & contri-

gentibus, quales sunt terror ex tonitru, moræ longa in balneo, Epilepticus alius repente in terram prostratus videatur *Sennertus Med. Prax. L. 1. part. 2. cap. 21.* Alias & variolæ, morbilli, & febres malignæ acutæ ansam quoque ad generationem hujus affectus præbere solent, ob sanguinis crudis acidis chylosis aut maligne coagulativis portionibus ac feri effervelescentiam halitus vitiosos siniles nervoso quoque generi impertientem. Verum de his satis,

Quoad Prognosin: Ratione effectus hic affectus minime lethalis in hoc subjecto, sed salutatis erit. 1. Quia non Essentialis, sed per consensum. 2. Quia non connatus vel hereditarius, ut ex historia liquet, sed ab errore externo proveniens. 3. Quia recens nec inveteratus. 4. Quia paroxysmi breviores; Longiores enim majorem causæ peccantis copiam ac vehementiam arguunt, hinc & lethalem eventum asferre, licet à pleniori etiam victu fuerit malum, testatur *Casus VII. lib. 5. apud Timæum de Guldenkleee.* 5. Quia acidum peccans volatile explosivum cum acrimonia conjunctum. 6. Quia Epilepsia ante pubertatem curabilis, Conitiales morbi aut convulsionem epilepticæ, quibus ante pubertatem eveniunt, curationem recipiunt; ac quibus ea veniunt vigesimo quinto ætatis anno maximam partem commoriuntur; cuius rationem petere licet ex 1. *Aph. 45.* In aliis casibus eventus etiam lethalis prælagiendus v.g. si post febres malignas succedit ob coagulationem & putredinem sanguinis acidioris ferosi. Ita etiam ob eandem rationem si variolis & morbillis supervenit, non tam morbi quam errorum in rebus non naturalibus commissorum culpa mortem infert. Rursum in aliis subjectis licet non mortem acceleret, malum tamen inveterascit, & per periodos sive certas, sive plerumque incertas suos habet insultus, atque ad vitam suam usque comitatur, v.g. quando causa vel hereditaria fuerit, vel mox a nativitate propter labem ab utero contractam, uti loquitur *Willis*, infestare solet, aut quando tenelli adhuc terroribus gravioribus percelluntur, à quo periculo neque adultiores plane immunes esse, exemplum quoque puellæ cujusdam hoc in oppido Epilepsia curationem nullam admittente, sed per intervalla adhuc redeunte, afflictae relatum vobis fuit.

Cura: Quid verò nunc consilii? anxie quarunt exposcentes auxilium omnis moræ experti moesti atque animo contemnati Parentes, filioli vibrari membra videntes. Desiderio igitur illorum ut pro virili satisfaciamus, solutio partim methodo extraordinaria, partim ordinaria procuranda. Cum enim paroxysmi Epileptici rationem habeant symptomatum urgentium, quæ flammæ vitali interitum minantur, scilicet ob causæ proximæ internæ vehementiorem motum curationem quoque & hi non ad se trahunt sed rapiunt. Quamvis verò in agro hoc puerulo paroxysmi hactenus sint breviores, omni tamen studio cavendum, ne sæpius redeant, & infestent remedia exhibendo talia, quæ spiritus animales inimicos dissipent, vel eos exilire & errari aptos repriment quod sit, quando acidum illud volatile & explosivum cohibetur præcipitantibus & imbibentibus, ne principium spinæ medullæ irritare, cerebrique concussionem



inducere valeant. Applicentur igitur extemplo frictiones artuum paulo asperiores & ligaturæ, sique in promptu sit emplastrum vesicatorium, vel saltem iulificans ad umbilicum & nucham, vel facculus ex r. d. pœon recenti cum nitr. sem. sinapi paratus, imponatur. Inungantur nares balsamo rutæ vel succini, si manuum digiti contracti fuerint, leniter in rectum ocyus extendantur. Lignum Aloës vel pennæ Perdicum & similia accendantur. In aliis casibus, ubi acuitas convulsiva magis prædominaverit, in paroxysmo etiam fortioribus opus est remediis, inprimis os apertam servandum, interposito aliquo corpore non duro, aut frangibili, sed tenaci, siue lacculus è tela lineæ crassiori antiepilepticis refectionibus tuerit, siue è corio, ne linguam morfu lædere possit. Umbilicalia topica extrahentia minime negligantur, quæ ex propria experientia laudavit nunquam satis laudanda. *Excellentissimus Dn. D. Hoffmannus Senior Prud. Med. Diss. 13. Corall.*

Extra paroxysmum Curatio extraordinaria partim prosequenda, partim ordinaria secundum tres indicationes adiungenda. Cum igitur malum in nostro puerulo a nimia repletione provenisse cognoverimus, operæ pretium esse censemus, remittente paroxysmo, mox offerre infanti leve vomitorium v. g. syr. emet. Forest. ʒj. dilutum pauca quantitate aqu. destillatæ alicujus, aut etiam cerevisiæ tenuioris calidæ, vel gr. i. Tartari Emet. aut unum cum dimidio, ut ita labutæ cruda accensæ è ventriculo maturius rejiciatur. Exhibeantur deinde alia remedia paroxysmi novi insultum inhibentia. Pulver. Marchion. ʒʒ. aut similis alius v. g.

ʒ. C. C. f. igne ʒj. Cran. human. Philosoph. calcin. ʒij. Sem. pœon. visc. quern. vel corylini. ana ʒss. Margarit. præp. Corall. rubr. præp. ana ʒj. Smaragd. præp. ʒss. Croc. orient. gr. v. M. f. Pulv. tenuiss.

ʒ. Pulver offerri davon zu geben. Dosis ʒʒ. aut etiam paulo plus minulve pro libitu. Potest etiam addi pulveribus Cinnab. nativæ aut Antinonii rite præp. ad gr. iij. 4. vel 5. vel etiam sal. succin. aut C. C. volat. Vehiculum sit aqu. cistata. v. g.

ʒ. Aq. flor. pœon. tiliz, Ceras. nigr. ana ʒj. ʒ. Epilept. Lang. ʒj. Manus Chr. perlat. ʒij. vel q. s. Pro grata edulcoratione.

ʒ. S. Krafft vasser, zu dem Pulver, auch sonst davon zu gebrauchen. Externa quoque applicari possunt non quidem superfluitosa, qualia sunt characteres, numismata, sed naturalia amuleta, inter quæ radix Pœoniæ maris ejusque semina palmam obtinent, ut patet ex *Foresti observ. l. 10. observat. 59.* si remiserint paroxysmi, occasione commodâ alvi quoque siccitas tempestivè corrigi debet vel Lenitivo per os assumendo v. g. syr. de Cichor. cum Rhabarb. Rosar. solut. simpl. Intus. Laxativo D. Mannagetta in debita dosi, & per intervalla propinandis, vel Crem. Tartar. à gr. vi. ad ʒʒ. aut ultrâ in iusculo offerendo. Vel Clyster aliquis facillè parabilis malvaceus ab ʒij. ad ʒss. pro varietate ætatis injici potest, quales formulæ passim in *Materiæ Medicæ* scriptoribus prostant. Cæterum cum ab errore in victu & nimia *adipositas* infans in horrendum hunc inciderit affectum, è fonte Dietetico talis vicinis ratio infanti & matri, quandiu lactaverit,

ordinanda, quæ nec quantitate excessiva, nec qualitate vitiosa præsertim aciditate peccante nocere possit, cum reliquarum rerum non naturalium debito regimine, quale etiam non solum præservationis, sed & curationis gratia probe inculcavit *Sylv. d. l. 9. 66. seq.* pluribus. Inprimis verò terrores omnes animique commotiones præcavere necesse est. Quibus ritè & ex præscripto observatis per Divinam benedictionem reconvalescentia perfecta erit speranda, & filiolus vitam in posterum vivet gravissimè huic mali prorsus immunem *Joh. Michael. in Praxi Clinica speciali.*

*Historia & Consultatio pro Nobiliss. Matronæ Genevensi, quæ post affectum convulsivum in tremores intestinos, cum summo virium languore, &c. incidit; quamvis de naturâ morborum epilepticorum propriè non sit.*

Nobilissima Matrona N. N. annos circiter 40. nata, duarum prolium mater, & a 12. annis vidua, delicatula admodum, & naturaliter meticulosa, jam a teneris annis, affectibus, qui vulgo hysterici dicuntur, vixit obnoxia; verum per longiora intervalla recurrentibus, & tantum occasione datâ, per incussum v. g. terrorem, vel molestiam grandiorē susceptam. Paroxysmi etiam tum non lucte satis magni momenti, ut ex *Ægræ* sententia curam aliquam mererentur, ac eo præcipue quod omnis generis remedia quàm maxime oderit, nec etiam ea quæ aut alvum movent, aut odoris vel leviculi sunt, tolerare prorsus queat. Cum autem prædicta Matrona à quatuor annis Lutetiam iter habuisset, illinc à Chymista quopiam essentiam nescio quam surditati, ut ipse aiebat, conducem accepit, cujus guttæ duæ aut tres in aurem affectam instillari debuerint, immisso desuper gossypio. Illa Lutetia redux, quamvis de obauditione auris dextræ conquereretur, essentiam tamen suam per quinque menses intactam asservavit, donec insautâ quadam nocte, postquam in magnò conventu vigiliam longius promovisset, de affectione, ut sibi tum videbatur, etiam alterius auris perterrita, essentiam prædictam per ancillam in aurem primò affictam sibi intundi curavit: Unde, siue ancillæ imprudentiæ, largiorē liquoris dosim quàm quæ præscripta fuerat immittentis, siue remediū ipsâ acrimoniâ, siue potius maximâ *Ægræ* nostræ sensibilitate, propter fibrillas nerveas, quibus meatus auditorii membrana resperfa est, nimium nudas, fulmine quasi percussa concidit, omni sensu & pulsu destituta; ad se tamen vi remediorum post horam circiter rediit, sed ita agitata ac etiam debilis permansit, ut vix capite erecto in lecto subsistere per aliquot momenta potuerit, eoque magis quòd, ut jam significavi, medicamentorum etiam pure corroborantium, ac vel leviculò odore præditorum, vim perferre vix admodum valuerit. Post plures tandem menses resumpsit quidē aliquatenus vires, & e lecto surgere potuit, sed auris quæ prius serosum quid effuderat, jam saniem, & demum pus copiosum ac foetidum evomit. nec domo egredi, aut liberiori se aëri tradere Nobiliss. Domina quivit; quinimò etiam ad minimum corporis in cubiculo proprio motum toto



corpore quasi convellebatur, ac de tremoribus intestinis, perquam gravibus, viscera imi ventris, & inde per consensum cerebrum, non minus quam cor ipsum afficientibus, continuò conquerebatur, mortique se subinde proximam credebat. Sic elapsi sunt anni ad minimum duo, in perpetuis scilicet agitationibus, quæ cum intenderentur live sub adventum mentis fluxus, live etiam alià data occasione, urinae immoderatus profundeabantur, aurique fluxus, qui per intervalla cohibitus fuerat recrudescerebat. Tandem morbus prorsus quasi prostrigatus videbatur, vi præcipue junculorum quibus viperæ intoxicaverant, aut ultimo ex molititia quam de Nobilissima Matris longo morbo ac obitu habuit, rediit, illamque non minus crudeliter quam prius afflixit, in cujus morbi ulteriorem explicationem addere non pigebit. Pulsu n, qui naturaliter est parvus, sed æqualis, in paroxysmis veri debilissimum, inæqualem ac per subsultus tantum digitorum apicem ferire. Paroxysmos nihil prius epileptici quoad omnia sua signa extus se prodentia præbere, nec adesse cordis ullam palpitationem aut tremorem sensibilem, sed tantum totalem virium prostrationem cum doloribus in occipitio, pulsationibus in auribus, flatibus ac rugitibus in imo ventre. Tandemque appetitum qui satis aliàs viget, tempore exacerbationum omnino disjici. Quærit jam Nobil. Matr. quænam remedia ad præcavendos paroxysmos, vel eorundem insultos jam advenientes debellandos, inò ad præveniendani vel Apoplexiam, vel Syncopen lethalem (in quam se quotidie prolepsin arbitrat) in tanta auxiliorum aversatione, seu potius, si ita loqui liceat, intolerabilitate, adhibere queat? An thermis aliquibus sulphureatis, quales sunt Aquenses in Sabandia, pro nervis a particulis heterogeneis profundius impactis, liberatis tuto uti possit? An pro sanguinis ac feri acrimonia, succoque nervoso degeneri, corrigendis, lac assumere possit; siquidem ex ejusdem usu se aliquando in febrem intermittentem incurrisse opinatur? Scire tursus expectit, quæ purgantia præter clysteres sibi maxime profutura sint, item quales pulveres alcalici, spiritusque volatiles conducibiles fuerint? *Geneva die septima Februarii, Anno 1693. Manget. D. M.*

#### Responsum Medicum.

Ex qua classe symptomata hysterica, quæ Nobilissima Domina ægra a teneris per paroxysmos longis intervalis distantes, passa est, delinenda, aut cui annumeranda sint, disceptare nolo, quia illa ipsamet non magni fecit: Nervinis tamen non immeritò accenseri ea videntur, quia illis corripiebatur citra mentionem magni apparatus vitiosorum humorum, solo terrore, aut metu. Manifestius agitationes ab essentia acoustica in aurem infusâ obortas ex horum numero esse constat, quia subito sine sensu & motu concidit, ac sic affecta per horam jacuit, & postquam ad mentem rediit, nihilominus caput etiam in lecto, propter agitationes illas, erectum firmiter tenere nequit. Certe subita virium atque omnimoda prostratio, citrà dissipationem aut profusionem spirituum vitalium, ut cum veteribus loquar, eveniens,

nonnisi spirituum animalium vitio imputari potest, propter quod multarum partium motus, vel sustinatur, vel vitiosus fit: Ob hanc causam crura inferiorem reddita fuerunt, ut illis amitti diu non valuerit. Et quoque adscribi proculdubio debent tremores viscerum imi ventris, thoracis & capitis, licet foris nec conspiciantur, nec tangantur. Certe systema nervosum cujus primaria sedes intra cranium est, admodum irritabile esse, illoque vel immediate, vel etiam in parte distantiore, provocato, universales turbas cieri ex multis apud Nobiliss. Dom. patet; illud enim commovent phantasmata terrificæ, aut aliter horrida, à metu, tristitia, terrore oblata, odor nares fortius feriens, purgantia, mentruus fluxus, urinae largior emissio, puris ex auribus copiosior profusio, &c. Systema nervosum irritatis partibus nervinis à cerebro disitis in consensum rapi, mirasque turbas excitare, nunc scilicet Epilepsiam, nunc Catalepsin tandem in Epilepsiam degenerantem, quod etiam in suffocatione ab utero vulgò dicta atque aliàs sæpe observatur certum est, ut demonstrare multis experimentis & observationibus annis sum in *Commentario de Cicuta Aquatica*. In uno tamen individuo & sexu quàm in altero hoc systema magis irritabile esse quotidiana docet experientia, sceminaque ad hujus generis symptomata procliviores sunt. In quibus hæc irritabilitas consistat, an in spirituum animalium subtilitate, an in cerebri, cerebelli, aut membranarum nervosarum peculiari conformatione, aut harum sensu acutiore & exquisitiore, quem morbum esse semel agnovit, definire nolo & forte non possem. Nobil. Dom. quia à teneris delicatula erat, & tam graviter ab essentia acoustica læsa fuit, exquisitiore sensu in ductu aurium, forsan etiam in tympano, & intra illud in concha prædita erat. Licet enim apud omnes sensus acutus sit in his locis, teste Otalgia dolore omnium prope acerrimo, tamen & aures aciores essentias tolerare novi: suadeo enim frequentius junioribus & adultioribus obaudientibus, ut sublatâ cerumine crassiore, mudent aures turundâ oblongâ ex linteo contorto, in extremitate imbuta essentia fells; nec memini ulli vel minimum dolorem peperisse. Fortè periculum citrà damnum in robustiore illa essentia acoustica fieri posset, ut veritas magis innotesceret: Ventris murmura, appetitus prostratus, alvus seignior, pulsus debilissimus & subsultans, ac pulsatio intra aures forsan sunt *impedimenta*: quibus accenseri posset dolor occipitis nisi velimus causam ibi hære tot symptomatum, quia ibi prodit par vagum ramos quoque cordi, pulmonibus, ventriculo, &c. impertiens.

Quæ cum ita sint, imprimis cerebrum & cerebellum officinæ spirituum animalium roboranda, irritationes cavendæ & mature compescendæ, ac partes horum symptomatum culpâ debilitatæ instaurandæ sunt. Quibus vero remediis præstandum sit judicari vix potest cum medicamenta aversetur. Dominus Della Torre quem in praxi Patavi secutus sum his regerebat. *Noi medici non sapiamo guarire con gli brevi di Capuccini*. Quoniam verò ad usum fuit junculo viperarum carne alterato, in morbo ultra biennium cum semestri, quod proculdubio factum



lucida massa sanguinea à particulis acerbis viudicata; hanc etiam vim purificandi sanguinem inelle viperis ex Galeno habemus. Hujus vices egregie præstaret lactis potus diu continuatus observatis legibus medicis: nam nunc multorum experientia constat dolores podagricos hoc vel sublatis vel mitigatos fuisse; atque etiam in affectu præsentis prodelle succurrit oportune Nobil. Dom. Mibeli Syndici Friburgensis in Brisgovia Uxoris exemplum. Hæc lapsum horrendas convulsiones hystericas, ut vocabantur, passa est, atque aliquoties vidi contorto collo plane lividam in facie instar pruni Damasceni, & sine motu, sensu, ac respiratione etiam intercepta jacentem: multis frustra usata est, tandem vinu n egeravit, ac ejus loco lac promiscue bibit in palatu, & aliàs, nullis legibus medicis observatis; nam non abstinuit à fructibus crudis, acetariis, &c. nihilominus ab Epilepsia hac immunis fuit ad satis provectam ætatem, atque ex alio morbo obiit, Friburgo protuga post captam à Gallis urbem. An febris tertiana quam passa est Nobil. Dom. lacti tribuenda sit ignoro; multi hac corripiuntur nullum lac bibentes, p. uicissimi illam experiuntur, & fortè nulli, qui alias sibi à vetitis temperare norunt. Thermas quod attinet, longe plura occurrerent argumenta dissuadentia: roborant quidem artus & multum feri dissipant; ac sanguinis acrimoniam emendare vix persuaderi possum. Multis vapores sulphurei adversissimi sunt. Nobilis & nubilus Virgo nostras pergens ad Thermas nostras Badenses vaporesque hauriens ex eis elevatos, equo insidens leipothymia correpta illò decedit diuque restaurari nequit. Si omnino balneandum sit tale artificiale balneum parari posset, quò frequenter Austriaci ac Bohemi uti solent, ac quidam etiam apud nos.

℞. Sulphur. vivi ℥ss. Calc. viv. ℥ij. coque in s. q. aq. Font. Quidam seorsim coquunt in aq. Tartar. vini alb. crud. E. g. ℥iv. ac balneo addunt. In hoc semel vel bis in septimana ad bonam tolerantiam balneari posset. Sic radia itineris evitaret.

Unicum antispasmodicum præstans addo quod mihi hic & Stuttgartiæ in frequenti usu est, insipidum & inodorum.

℞. Cinnabar. antimon. p. j. Cinnabar. nativ. p. ij. sublimentur l. a. Cinnabaris hæc sublimata novæ Cinnabari nativæ additur & rursus sublimatur: hæc sublimatio ter repetitur. Hujus dantur gr. vi. ad viii. bis in septimanâ, si affectus urgeat, aut saltem præservationis causâ circa novi & plenilunium summo mane in congruo vehiculo. Stuttgartiæ ejus ℥j. addo sacchar. alb. ℥ij. & olei cinnam. dest. gutt. ij. sit efficax & suavis.

Purgantia, seu merè irritantia, vix tuta credo, imprimis magisterium jalappæ, scammonii, &c. Infus. senn. rhab. agar. mann. abhorrebit. Aliàs suadeo syrupum ros. sol. ad ℥viii. & ad ℥ij. partitis sic vicibus, scilicet ℥ij. vel iij. mane hora 5. rursus hora 7. vel 8. & nisi purgaverit hora 10. reliquum. Sic blandissime alvum tenerioribus sæpe movi, etiam apud Principes teneræ constitutionis.

Ad aures purulentas. ℞. Ferrugin. subtiliss. q. v. mellis parum M. f. linim. indatur hora

somni cum turunda ex gossypio, aut linteò raro, mane aures mundentur turunda ex luteo, imbuta lacte & aqua calidis. Fonticulus ipsi necessarius foret. *Scaphusii die 17. Februar. 1693. Job. Jac. Wepfer. M. D.*

### Observationes.

Calcearius quidam annos 50. natus Epilepsia repente correptus erat, vociferabatur, illecebatur & spuma ad os terebatur, & concussio totius corporis valida aderat: ad eum accitus, ne ex concussione linguam sibi amputaret, inter dentes ligneum cuncum intromittebam, ad anhelitum facilitandum & spumam & humiditates extra mittendas ad os: fortèque deinde frictiones membrorum extremorum & ligaturas dolorosas adhibeo, ut ita ægrum misere afflictum à paroxysmo excitarem rutam quaque intra manus meas contritam naribus ægri applicabam, & succum quantum potui naribus infundebam, naresque contrungebam & digitis contorquebam, quibus remediis mox à paroxysmo liberatus fuit. Verum ne postea recideret, cum hæc valde pituita abundaret, & etiam ex parte succo melancholico, post exhibitam hieram picram, hoc decocto utebatur.

℞. Beton. hyssop. meliss. ana Mj. Salv. majoran. fol. Lauri, ana Mð. vel loco fol. lauri ℥j. bacc. lauri, rad. bugl. borrag. pæon. polyp. q. aa. ℥ß. thym. i. epithymi, ana ℥j. f. decoctio in aqu. q. l. colat. adde squillæ, ℥j. Crani human. ℥i. ß. nuc. mosch. ℥j. iterum bulliant & denuo colentur, hujus decocti accipiebat omni mane ℥iv. oxymel. scillit. ℥i. ß. M. deinde & hoc decoctum descriptum est.

℞. Beton. salv. majoran. hyssop. ana Mj. fl. stœchad. anthos. an. p. j. sem. pæon. fœnic. ana ℥ij. rad. pæon. ℥ß. fol. seu. ℥j. agar. alb. ℥ij. epithymi. ℥i. ß. polypod. q. ℥ß. sem. cartham. contus. ℥ij. uvar. pall. exacinat. ℥j. liquirit. ras. ℥ß. Coq. in aqu. communi pro ℥x. fortissimæ expressioni adde syrup. de stœchade oxymel. scillit. syr. de beton. an. ℥j. M. pro tribus dosibus matutinis. Postea & has pilulas deglutivit.

℞. Pil. coch. de hiera simp. an. ℥j. agar. troch. pil. aggregat. an. ℥ß. troch. alhand. gr. v. cum melle anthosato f. pilulæ viæ corpore ita expurgato, quotidie ex infra scripto medicamento sumens, ad magnitudinem fabæ majoris, epilepticos paroxysmos quos antea crebrius habuerat, amplius non patiebatur.

℞. Hirundin. deplumatar. & lotar. in vino & in furno exsiccant. num. 5. pulveriscentur subtiliter; quibus adde conserv. flor. pæon. luna de crescente paratæ, conserv. fl. herb. paralyt. ana ℥j. rad. pæon. collect. luna de crescente, exsiccant. & pulv. ℥ij. conserv. anthos. ℥ß. probe misce cum oxymel. scillit. exiguo adjecto aceto scillitico, F. s. a. opiata. sapor non aridebat; tamen sumens curatus fuit. Alium Epilepticum novi, qui corde hirundinis solo pulverisato utebatur, nostro ægroto magis profuit hirundo cum reliquis pulverisata; cujus usu liberatus fuit. *Petrus Forestus observ. 55. lib. 10. De Cerebri morbis.*

Puerulus duorum mensium Epilepsia continuo affligebatur, ita ut me vocari jussissent, quem cum spectarem misere afflictum, ex Galeni testamento



mento sacculum hunc quadratum collo suspendi ut turculam stomachi nudam attingeret.

24. Rad. pœoni. virid. ʒss. sem. pœoni. maris nempe nigri, ʒi. ʒ. radice concisa, & semine contuso, hæc in sacculum concludebani, bombace interjecta & syndone coopertum & interfutum, ad collum cum filo sericeo rubro suspendi mandavi, ut ventriculi os attingat: & ut ibidem suspensum ad aliquos dies permaneret, hoc suspensorio nuncius instat, paroxysmi cessarunt, neque amplius reversi sunt, eodem remedio eoque solo plurimi alii convalescere, ante hoc tempus & postea in aliis hujus suspensorii maximam esse vim & præclaram experti sumus. *Petrus Forestus, observ. 59. lib. 10.*

Puer trium annorum cum Epilepsia corripere, simul vermes mortuos cum excrementis subinde ejiciebat. Existimaui, quod ex tetrivermium sumis in cerebrum elatis hic Epilepsiam incurreret, quare cum eidem pulverem sequentem cum aquis destillatis dedissem, optime deinde habuit.

25. Sem. contra vermes, pulv. rad. pœoni. agar. troch. ana ʒss. diamosch. dulc. ʒi. syrup. acetos. simpl. ʒss. Aq. absinth. n. elix. ana ʒi. M. Dedi illico in intervallis paroxysmo. vin. & jussi ut continuo sumeret parum rem. Zedo. r. saccharo incrustati, usque sum ptis hic statim melius habere coepit; & ejectis vermibus ab Epilepsia liberatus est. *Petrus Forestus, observ. 63. lib. 10.*

Pro Epilepsia in puero duodecim annorum. Præmissis universalibus commendare soleo sequens Electuarium solidum.

26. Coagul. leporis, ʒij. sem. pœoni. maris ʒss. visci q. ʒv. sang. mustel. præp. ʒi. ʒ. sem. anis. cinnamom. caryophyll. ana ʒi. ʒ. corall. rub. ʒi. Crani humani anterioris partis adulti, ʒvi. pulverisatis omnibus cum sacch. tunc in aq. pœoni. dissoluto. Tabellæ ponderis ʒij. capiat unam pro vice tribus horis ante prandium. Mustellæ sanguis hoc modo præparatur.

Mustella decollata totus sanguis alteratur in vase vitreo; mox ubi concreverit, dividitur in partes minutas, & umbra altivo tempore expositus, siccare sinitur. Mustellæ sanguis præstitutissimus censetur pro Epilepsia sananda; imò hoc certissime tibi dicere possum, vidisse me sanatum epilepticum 24. annorum solo hujus sanguinis usu, potati scilicet statim atque e venis exiit ad ʒij. cum ʒj. aceti. Curato diligenter ut copiam habeas testiculorum apri, aut saltem veris, ij. e. suis domesticæ venere utentis, ac simul testiculorum galli; exsicabis illos in furno: mox in pulverem tenuissimum rediges. Sint pulveris apri ʒij. galli ʒi. Deinde addito duplum sacchari fini. De hoc pulvere continuò sumat puer tuus in omnibus ferculis; nam experieris Pharmacum absolutissimum. Referebat mihi *Ludovicus* pater solitum sese dare ʒij. hujus pulveris cum aq. betonic. decem continuis diebus sine saccharo, & sanasse mulierem, quæ passa fuit Epilepsiam annis octo, præcipiebatque ut omnino mense integro abstineret a potu vini. Nunc tibi communico aquam verè præstantem pro hoc morbo aut omnino propulsando, aut certè magna ex parte mitigando.

27. Flor. lavend. Mviii. fl. lil. convall. Miv. macerentur 6. diebus in lb xxv. vin. flavescen-

tis ac generosi, mox destillentur in M. B. lento igne hinc tuno, tum verò postea aq. destill. addito spec. diamosch. d. ʒss. visci, q. ʒj. sang. mustel. præpar. ʒvi. rut. hcc. Mj. cubeb. & sem. citri, ana ʒij. macerentur hæc quatuor: ac quod destillaverit, postea usui reservetur. Exhibeatur hujus aquæ ʒss. ex cochleari mane post Electuarium solidum superius descriptum, antequam invadat epilepticus insultus, detur ʒss. hujus aq. cum ʒij. juris pullæ, in quo decocta sit radix pœoni & semina. Equidem accessione si non removeret, saltem retardat. observes tempus invasionis, & antea quam invadat, diebus quatuor aut quinque, aquam exhibeas ante cibum horis tribus. Cum vero noveris jam proximè insitare accessione, eandem propinabis; nam aut non revertetur accessio, aut certè quotidie magis brevior faciet. Hæc medicamenta apud me potiora sunt. *Horatius Angeninus, Tom. 2. Epist. & Consil. lib. 3. Epist. 2.*

Juvenis quidam Epilepticus postquam bene purgatus esset, nostro jussu continuo comedit radices pœoniæ virides per longum scissas & in sartagine frictas, quæ valde profuere: ut & etiam alteri puellæ, quæ ab illarum usu ab Epilepsia admodum gravi curata fuit.

Empiricus quidam post universalia remedia, nucham candela cerea incensa cauteriis instat inurebat, & radices pœoniæ in patella cum butyrostrictas continuo comedendas dabat: & ita juniores & magis adultos magna cum admiratione curabat. *Petrus Forestus Schol. obs. 61. lib. 10.*

Ego summo opere laudarem cauteria in brachiis, imò hoc est familiare remedium, & vidi anno præterito Nobilem senem qui solo cauterio sanatus est. Laudatur pœonia ob singularem quandam occultam vim. Ego tamen sæpe eam exhibui, sed semper coactus sum ad alia remedia devenire, nec unquam ita efficacem expertus sum, detur tamen cum non possit obesse. *Joh. Baptista Montanus, consil. 50.*

Setone ad cervicem adhibito, *Hollerii* Medici unde quaque doctissimi decreto, Adolescentem quendam 10. annos natum, morbo caduco, cujus insultibus ante crebrò prehendebatur, liberavi: derivatis, ut credere par est illa arte ichoribus mali fomitibus. *Ambrosius Paracelsus, 10. c. 25.*

Puer quidam singulis 15. diebus Epilepticus concidebat. Per affectum capitis hoc fieri Medicorum præstantissimi *Frisimelici*, *Montani*, *Odu*, & *Francavillani* existimant. Sed quo plura pharmaca exhibuerunt, eò affectus magis crevit, ita ut in 24. horis paroxysmos haberet plures centum & quinquaginta, leves tamen, quia parva commotio capitis cum bulla circa frœna labiorum aderat, unde tandem cognoverunt morbum esse, non per affectum capitis, sed per consensum à ventriculo, quare cum illum pharmacis exagitare desisterent, & roborarent, puer egregiè convaleuit. *Vissor Trincavellius, consil. 21. lib. 1.*

Ut præservetur puer ab Epilepsia quæ imminere videtur, abstineat omnino à vino, bibat aquam decoctam cum Cinnamomo, tormentilla, & pœonia, utatur frequentissimè Agarico, & faciat hoc sibi familiare, ut evacuetur caput, sit dosis pro vice ʒss. *Joh. Baptista Montanus, consil. 46.*

Mirabilia scripsit *Galenus* de pœonia & maxime experimentaliter cum dixit, quod volens



experiri iuramentum ejus, suspendat eam collo patientis, & nunquam evenit ei paroxysmus; cum autem eam deponit, reversus est paroxysmus. Et ego iterum depono me hanc experientiam oculo meo sepe vidisse.

Hoc Electuarium quod sequitur in usum vocetur: cujus experientiam, apud Deum testor, nullies me vidisse sanavisse homines ab Epilepsia, & inter alios socium domum Archangeli, qui paroxysmis Epilepticis decies in die vexabatur.

℞. Pyrethr. flor. chad. costi. ana 3x. agar. 3v. Scin. caryi, anethi, assz fortid. aristol. rot. ana 3 ij β. succi squill. mell. el. ana 1 β j. & 3 ij. coq. simul Scylla & mel lento igne usque ad bonam viscositatem, deinde superadditis speciebus ℞. Electuarium cujus dosi sit omni mane 3 ij. & tardetur post ipsum cibum ad minus 4 horis. *Marthol. Montagnana. consil. 43.*

Mulier quidam 20. annos nata, integrum per annum laboraverat motibus Epilepticis, non quidem vehementibus, sed à septima matutina in horam nonam vespertinam durantibus, cum spuma oris, sine loquela, sensuumque manifesto usu, præscripsi ipsi hæc pilulas unica pro vice.

℞. Castor. lilis artemis. ana gr. iv. Resin. Jalap. gr. vi. Aloës succotrin. gr. ix. ol. majoran. gutt. ij. M. F. Pil. num. v. deaurentur. Pro voto illis purgata usa est bis quotidie haullulo sequenti.

℞. Sapon. Hispanici albiss. 3 β. coq. ex lacte vaccino, & colat. 3 ij. dentur usui. miratu dignum erat hoc remedio assumpto paroxysmus indies gradatim, deque hora in horam ita ivisse imminutum, ut trigesimo die plenissime curata exiverit, manseritque rellituta. *Paulus Barbette. Prax. lib. i. cap. i.*

Juvenem quendam Epilepticum hoc solo condito purgante curavi, sed non ante septimum mensem.

℞. Elect. è succo ros. 3 j. pulv. jalap. 3 j. spir. salis rectific. 3 j. ol. rosmar. gr. viii. M. F. conditum molle, de quo sumat. nucis mosch. magnitudinem ter in hebdomada, loco spiritus talis poterit substitui spiritus salis armoniaci, aliusve salis volatilis oleosi; vel ex hisce duobus mixtis & binis ternisve cohobationibus junctis destillati spiritus 3 j.

Pilule sequentes in Epilepsia conveniunt.

℞. Extract. rhei, Aloës lucid. resin. jalap. ana gr. vi. salis succini, gr. ij. olei lavend. gr. ij. M. F. Pilulæ iv. deaurentur pro una dosi. *Paulus Barbette. Prax. lib. i. cap. i.*

Commendantur hic spiritus C. C. salis dulcis, ut & nitri dulcis, ast omnibus serè antecellunt, salis armoniaci flores albi, rubri, flavi, vel ejusdem salis spiritus, qui non tantum pituitam incidit, verum etiam acido austerum corrigit, estque valde volatilis ac penetrantissimus; quo ipsi melancholici redduntur hilares, quod quidem centies observavimus; atque non tantum puerorum, ast quoque adultorum Epilepsias varias hujus beneficio, iusto vehiculo mixti, annuente divino numine, curavimus.

Ad Epilepticum quendam vocatus inter alia remedia, quibus tandem annuente Deo opt. max. curatus est, hunc julepum præscripsi.

℞. Aq. beton. flor. tiliz, ana 3 ij. Aq. scenic. ita Matthiol. ant-epilept. Langii ana 3 j. spirit.

salis armoniac. 3 β. tinstur. Castor. gutt. x. flor. hyperici 3 j. Laudan. opiat. gr. iv. ol. succini gr. v. syr. rzechad. 3 j. M. cujus singulis diebus ad unum nun cochlear unum atque alterum quater a. timebat. *Fridericum Deckert, in Nouv. ad Prax. Barbetian. lib. i. cap. i.*

Infantes plures moribus convulsivis Epilepticis afflictos sequenti mixtura cochlearum utiupata sanavimus.

℞. Aq. flor. tiliz, scenic. ana 3 j. syr. rzechad. diacod. ana 3 β. spir. sal. armoniac. 3 β. M. *Idem ibidem.*

Civis quidam Lavingani filia decem annos nata, per tres menses quotidie incurrebat in Epileptica symptomata, rogatus ego a puellæ matre, gravi, lævo, & longo huic morbo curationem talem adhibeo.

Purgato recte capite propinabam per 5. dies mane jejuno stomacho & in ipsa accessione tres guttas olei ligni heraclei: cujus usi mox cum omnium admiratione. Deique laude o. nino liberatur a Chronico & quotidiano malo: quod jam annis multis amplius non rediit. Laus soli Deo & gloria; qui contra morbum conatiale peculiarem & occultam huic oleo vim & facultatem indidit. *Martinus Rulandus, curat. 6. cent. 2.*

Puer quidam Lavinganus 7. annorum torquebatur graviter Epilepsia dies noctesque, sed ex hac ægritudine sanus factus est isto remedio.

℞. Olei ligni heraclei, gr. vii. has meo consilio ante & in paroxysmo exhibuerunt per 7. dies, atque efficacia ejus Epilepticus paroxysmus postmodum non visus est amplius, sed liber ab hoc malo & incolumis semper mansit. *Martinus Rulandus, curat. 86. cent. 4.*

Consul quidam quinquagenarius gravi Epilepsia correptus erat, in ipso paroxysmo decem 13. guttas antepileptici nostri: quo aditantes omnibus obtupescitibus, confestim quievit, ad se rediit, & convalescit, convalescunt & sanantur per idem oleum etiam innumeri alii ex hoc horribili morbo. *Martinus Rulandus, curat. 31. cent. 10.*

Vir quidam triginta annorum levem passus Epilepsiam, à nobis curatus fuit scilicet & integre hac ratione.

℞. Pulv. Sen. Laxativ. 3 i. si. vini, 3 v. commixta stabant per noctem: mane exhaurebat, multaque ac varia excernebat. Pulvis hic Senæ laxativus, non est pulvis Senæ Montagnanz qui passim in officinis prolatat, sed est pulvis Senæ laxativus *Joh. Wieri*, cujus descriptio hæc est.

℞. Fol Sen. Tartar. a. b. ana 3 j. sem. anisi, Caryoph. cinamom. galang. ana 3 j. diagrid 3 j. F. omnium pulvis subtiliss. S. A. dosi est à 3 β. ad 3 i β. in substantia ad summum cum convenienti liquore. Dosi in infusione est ad 3 β. educit per inferna bilem tam flavam quam atram, & pituitam, atque inde natos morbos curat scilicet: quare in officinis parari suadeo, cum usus ipsius sit maximus & salutaris & tutissimus in omni morbo, ut sum per diu expertus. *Martinus Rulandus, curat. 3. cent. 10.*

Mulier quidam epileptica me consulto & maxime Deo implorato ad sanitatem reducta est hac via.

℞. Aq. flor. tiliz, 3 vi. trochisc. alhand. 3 β. M. F. infusio. S. A. pro duabus vicibus colandis ac per duos continuos dies bibendis, post ho-



nam per alvum factam purgationem, septem dies in lecto sudavit, capiendo de hyssopi decocto calente  $\frac{3}{4}$  vi. his ita peractis, liberata ex toto fuit. *Martinus Rulandus, curat. 66. cent. 10.*

Mulier quidam, sexagenaria sexies facta est epileptica, hæc a me per Dei gratiam adjuta ac sanata est sequenti solo, faciliq. remedio.

Vino sublimato imposuit, meo jussu, hyssopum, de quo manè & noctu cubitum abitura bibir tria cochlearia, vel ad  $\frac{3}{4}$  ij. hoc cum singulis diebus per septimanam fecisset convulsio hæc ex toto intermisit, & nunquam reversa est. *Martinus Rulandus, curat. 95. cent. 10.*

Erat qui Epilepticos multos etiam provesta ætate, & qui diu laboraverant. post purgationes. hoc pulvere percuraret.

$\mathcal{R}$ . Crystall. præparat.  $\frac{3}{4}$  j. Corall. rub.  $\frac{3}{4}$  ij. Margarit. or. smaragd. præp.  $\frac{3}{4}$  β. M. F. Pulvis, cujus pars humidra est una dosis ex aqua taraxaci.

Alius Empiricus hoc sæliciter utebatur, in æcervis fornicarum reperitur aliquid simile thuri, quod pulverisatum dabat Epilepticis ex aqua pœon. vel florum tiliz. *Hieronymus Reusnerus, observat. 15.*

$\mathcal{R}$ . Corvos juvenulos ferè implumes, mense Martio exclusos, statimque nido extractos in ollam novam conjice, probeque lutatam clibano impone ut comburantur corvi, quos tere in pulverem, qui plures annos efficax servari potest, capiat de eo parum in liquore appropriato semel in die. Est hic pulvis corvinus summe secretus.

De corvis *Conradus Gesnerus lib. 3. De Avib. p. 2. 341.* hæc habet.

Medicus quidam celebris nostra ætate, corvos duos mense Martio e nido combustos, in levissimum polinem redactos epilepticis propinabat bis vel ter in die,  $\frac{3}{4}$  j. pondere exhibito cum aq. de oca. Cator. & paulo post cerebrum corvi in stillatice liquore verbenæ haultum epilepticis prodelle nuper amicus quidam ad nos scripsit. *Hieron. Reusnerus, observ. 13. & schol.*

Labro claustratio annorum circiter viginti, apud ejusdem artis opificem *Barba* operanti, tumor exiguus subortus est in vola manus dextre, sub radice minimi digiti, cum dolore, qui tumore crescente augebatur. Post dies aliquot, nihil gravius sentiens, subito corruit, epilepsia præhensus, convulsus, sensibus sublati, motuque inordinato aliquandiu agitatus, finito paroxysmo ad se rediens, munia consueta obivit, verum exactis diebus 14. paroxysmus rediit; ab eo, diebus octo post, denuò recidivam passus, quo magister perterritus, eum à se dimisit, itaque in patriam ad nos reversus, Magistratu sumptus pro remediis solvente, sic cura fuit instituta.

Purgatus fuit primum hoc pacto.

$\mathcal{R}$ . Rad. pœon. rec.  $\frac{3}{4}$  ij. polypod.  $\frac{3}{4}$  i β. fol. sen.  $\frac{3}{4}$  ij. epithymi,  $\frac{3}{4}$  β. sem. fœnic.  $\frac{3}{4}$  ij. sumar. Mj. l. decoctio in aq. & vino pro tribus vicibus sumenda.

Inde pulvere usus est sequenti.

$\mathcal{R}$ . Crani hominis triti,  $\frac{3}{4}$  ij. rad. pœon. ungu. asini, ana  $\frac{3}{4}$  i β. cineris hirundinum,  $\frac{3}{4}$  j. visci querni,  $\frac{3}{4}$  β. ras. eboris,  $\frac{3}{4}$  j. sacch. ad pondus omnium, fiat pulvis, capiat singulis matutinis cochlear unū superbibendo aq. fl. pœon.  $\frac{3}{4}$  i β.

Denuo purgatus fuit sequenti modo.

$\mathcal{R}$ . Tartar. vini,  $\frac{3}{4}$  ij. diagrid.  $\frac{3}{4}$  β. sem. anic.  $\frac{3}{4}$  j. rad. pœon.  $\frac{3}{4}$  β. sacch. alb.  $\frac{3}{4}$  v. F. Pulvis tribus vicibus sumendus.

$\mathcal{R}$ . Sem. ocyni, homini, pœon. palma Christi, ana  $\frac{3}{4}$  i β. visci, q. rad. pœon. ana  $\frac{3}{4}$  j. Corall. utriusque  $\frac{3}{4}$  i β. cineris ungu. asini, & Crani anterioris humani, ana  $\frac{3}{4}$  β. spec. diamargar. trigid.  $\frac{3}{4}$  j. sacch. dissolut. in aqu. beton. & pœon. q. s. l. tabulæ, dosi  $\frac{3}{4}$  j.

Postea hæc opiata præscripta.

$\mathcal{R}$ . Theriac. veter.  $\frac{3}{4}$  vi. rad. & sem. pœon. visci. q. ana  $\frac{3}{4}$  ij. sem. homini, & ocyni, ana  $\frac{3}{4}$  j. Crani hominis.  $\frac{3}{4}$  β. cum melle scillitico. F. opiata detur  $\frac{3}{4}$  j. cubitum ituro, & continuet.

Cauterium postea inustum cervicis posteriori regioni, à quo tempore licet præludia quidam paroxysmi sentiret, non tamen eo ulque ut caderet, invaluerunt.

Postea pilulæ sequentes ordinatæ.

$\mathcal{R}$ . Cator. asfætid. ana  $\frac{3}{4}$  j. gummi ammoniac sagapem dissolut. in aceto scillit. ana  $\frac{3}{4}$  ij. fellis bovis.  $\frac{3}{4}$  j. ol. succini, gutt. viii. cum succo rad. pœon. l. pilulæ pond.  $\frac{3}{4}$  β. capiat unam nocte cubitum iturus aliquoties, iterum etiam fuit purgatus sic.

$\mathcal{R}$ . Pil. aggregat.  $\frac{3}{4}$  j. cum aq. pœon. F. pilulæ, deiecit per biuum octies.

Ut vinum sequens biberet injunctum.

$\mathcal{R}$ . Rad. pœon.  $\frac{3}{4}$  iv. iros, enul. camp. ana  $\frac{3}{4}$  β. fol. salv. majoran. chamæpit. ana  $\frac{3}{4}$  ij. sem. pœon.  $\frac{3}{4}$  ij. sem. fœnic.  $\frac{3}{4}$  j. incidantur pro duabus mensuris vini, bibat singulis matutinis haultum. Ab eo tempore quo fontanella fluebat, sex septimanarum spatium, à paroxysmo liber fuit: & post vini præscripti usum, dicebat convulsivos illos motus seu palpitationes in pedibus cessasse, saltem in brachio remanere, quare etiam brachio cauterium fuit applicatum, ulcere inducto, dicebat se noctu ter aut quater sensisse convulsionem levem in digitis, sed non alibi, quapropter iterum pilulis aggregativis fuit purgatus, denuoque vinum prius præscriptum bibit per dies duodecim, cauteriumque tertium in sura pedis dextri fuit appositum, denuoque pilulis purgatus.

Cum adhuc sentiret reliquias aliquas, incepit hoc uti Electuario.

$\mathcal{R}$ . Rad. pœon. pyrethri, ana, hyssop. sem. pœon. ana  $\frac{3}{4}$  ij. mell. scillit. q. s. F. Electuarium, utatur singulis matutinis.

Postmodum sentiebat tantum, ut exponebat ab ulcere manus, vaporem per brachium ferri, & per cauterium brachii, & nuchæ, & suræ pedis evaporari, alioquin graviolem paroxysmum non sentiens. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 24.*

$\mathcal{R}$ . Conserv. flor. pœon.  $\frac{3}{4}$  i β. Conserv. majoran. meliss. beton. & flor. rosar. ana  $\frac{3}{4}$  j. calam. aromat. Zinzib. cortic. citri condit. ana  $\frac{3}{4}$  β. pulv. sem. & rad. pœon. visci. q. ana  $\frac{3}{4}$  j. ras. ebor.  $\frac{3}{4}$  β. Crani hominis pulver. subtiliter,  $\frac{3}{4}$  i β. Cinnamom.  $\frac{3}{4}$  ij. nuc. molch  $\frac{3}{4}$  j. spir. plirifarch.  $\frac{3}{4}$  β. cum syr. cortic. citri. F. Electuarium, capiat alternis diebus,  $\frac{3}{4}$  j. manè jejunos superbibendo julepi sequentis  $\frac{3}{4}$  j.

$\mathcal{R}$ . Aqu. salv. meliss. ana  $\frac{3}{4}$  ij. vini alb.  $\frac{3}{4}$  j. sacch. rosar. periat.  $\frac{3}{4}$  j. M.

Balsamolæo sequenti fricet Spinam.

$\mathcal{R}$ . Gummi galban. bdellii in aq. vit. dissolut. ana



ana ʒʒ. benzoin. ʒj. styrac. liquid ʒj. fol. rut. chinapit. flor. thechad. lavendul. ana ʒ ij. rad. colti. ʒij. castor. ʒj. infundantur incisa & pulverizata in aq. vitæ. Stent in maceratione in calore per dies aliquot ante usum. Hæc profuerunt epileptico cuidam cordis palpitatione simul cum larorante. *Felix Platerus, obs. l. i. p. 136.*

Per triduum tere paroxysmus epilepticus corripiebatur puella infans, iussu succum rut. cum aceto fortissimo permixtum in spongia naribus adhibere: cuius usu statim ad se redibat, sed mox iterum recidivam patiebatur, brevibus tamen quando hæc naribus admovebat paroxysmus. Emplastrum hoc cordis regioni applicavimus.

℞. Theriac veteris ʒj. rad. Pæon. pulv. ʒʒ. M. Item pulvere rad. Pæon. capilli conspergantur, & sic præter omnium spem evasit. *Felix Platerus, observ. lib. i. pag. 19.*

Quidam ultra viginti epilepticos uno anno sanavit hac ratione. Cane vivo dissecto, fel poculo excipiebat, & cystin felleam aceto eluens miscebat, mixturam potuaculæ instar ægroti exhibebat; quam si forte vomitu rejiceret, ex alio cane repetebat. Eligebar autem iuvenibus bimulum, senioribus trinem, feminam forminis, & viris marem. *Jeremias Martius, observ. 45.*

Insuave quidem remedium, sed quod ipse sanitatis jucundus effecerit, quam crudelissimum sanguinis humani potu neciterum eodem felle canino cum duplo vini cretici seu aq. picarum aut flor. lilæ feliciter usum *Ludovicum Hermaunum* idem hic *Martius* alio loco adnotavit, cum aceto sumendum, probeque a potione sudandum nonnet. *Franciscus Hideshemus. De capitis morbis, Spicileg. 7. Hier. Velschium notis in observ. 45. Jer. Martii.*

Epilepsia læpius remedio arcano curata ab avo meo *Petro Gassero*, succo nimirum aquilegiæ cum succo vermium terrestrium æquis portionibus ad ʒ. diebus 40. continuus dato. *Achilles Gasserus observ. 55.*

Dum anno 1659. medicinx studiis *Monspeli* incumberem; unus ex præceptoribus meis *Clarissimus Dominus Saltemus*, Practicus consummatissimus, perpetuæque memoria dignissimus, mihi tanquam secretum insignæ Emplastrum sequens ad Epilepsiam benigne communicavit; quo aiebat se plurimos cum in provecitæ ætatis Epilepticos sanitati integræ restituisse, præmissis scilicet universalibus.

℞. Gummi ammoniac. gummi juniperi, thuris & mastich. ana ʒ ij. sem. Pæon. maris suo tempore collect. & nuc. mosch. ana ʒ ij. Corall. rubr. præpar. raf. eboris & Cervi, ana ʒj. malaxentur cum Styrace liquida, formenturque in Emplastri massam in sequentem usum.

℞. Mass. Emplast. præscript. q. s. extend. super alutam vel pannum sericeum rubr. & formentur Emplastrum magnitudinis & figuræ debita, admoveendum vertici & suturæ coronali calidæ, detonsio prius capillitio, ibidemque diu gestandum.

Hæc etiam aqua hircinaria in eodem affectu feliciter utebatur.

℞. Hirund. adhuc in nido existent. num. 8. rad. Pæon. visci, q. ana ʒij. fol. rutæ, Mj. flor. lil. convall. p. ij. Castor. caryophyll. macis, an. ʒ ij. cum sufficiente quantitate vini albi, aceti

scillit. & aq. meliss. super cineres calidos mund. per 24. horas. Dein detullentur, atque in vase vitreo optime clauso servetur aqua, donis pro majoribus ad ʒj. ad ʒij. pro minoribus ab ʒ b. ad ʒi.

Nobilis quidam *Damus* in gravem Epilepsiam incit, ex translatione peccantis materis a partibus externis ad internas; de dolore enim in aure interno prius conquiescit erat, quo remittente, protinus succendit hic affectus, non tantum rura concussa & in aceto nacerata laborantem a paroxysmo excitans, guttulis etiam olei succini aliquot n. ribus per penam immisiss, sed lenito quodammodo paroxysmo pro corroboracione cochlear unum atque alterum de spiritu ceras. nigror. item aliquid syr. H. Pæon. cum spiritu vitrioli permixtum, & linna exhibuimus: capiti vero raso Emplastrum *Cra-* tons applicare iussimus quod,

℞. Succin. ab. thur. mastich. ana ʒi ʒ. galbani, opopon. ana ʒj. visci, q. ʒ ij. ambræ gris. gr. vi. mosch. gr. ij. l. ns. l. æon. ʒij. ladan. ʒi ʒ. ol. nuc. mosch. parum. ol. ros. q. s. extend. in corio, aspergatur pulvis cubeb. & luteæ coronali imponatur.

His remissionem gravissimorum symptomatum introduximus, ut æger mentis compos vicissim rediretur, & adjuvantes cognosceret, cum usque loqueretur ad tempus, donec gravibus reactivis remorantibus, equenti die nature delitum soveret. *Gregorius Horstius, observ. 21. lib. 2. De Morbis capitis.*

Puer quidam duodecim annorum perfectæ ratiocinatione & articulo sermone delictus, post paralyin dextri lateris in Epilepsiam incidit, ad eum vocatus ante omnia Phlegma, serosisque humores evacuandos esse censui, quare pulverem hunc purgantem præscripsi.

℞. R. d. Pæon. ʒʒ. crem. tart. r. ʒij. spec. diaturbith. cum rhab. ʒj. diagrid. cum ol. tenniculi præpar. ʒʒ. sem. anis. coriand. præp. ana ʒb. M. l. l. pulvis divisus in duas partes pro duabus doibus.

Ad cerebrum roborandum utatur interius per vires hoc pulvere corroborante.

℞. Pulv. m. reliquis, ʒi ʒ. C. ult. præp. Corall. rub. præp. ana ʒʒ. sacch. ros. tabul. ʒʒ. M. l. l. pulvis.

Spinalem medullam & partes lasas hoc limimento mungat.

℞. Ol. de castor. lumbric. rutæ. ana ʒi ʒ. unguenti ne. vini, ʒ vi. ol. semic. distill. ʒʒ. M. pro limimento. Hæc aliisque ejus generis per semelre diuigenter adhibitis, Dei gratia, non tantum ratiocinationis & loquelæ defectus corripiebatur, sed etiam pristino vigori restitutus puer, nihil amplius de subitaneo lapsu vel insultu conquerebatur. *Gregorius Horstius, lib. 2. observ. 41. lib. 2.*

Decoctum radicis Salsaphras, aut solum, aut cum vino singulare. Iustulum Aloës perpetuo gestandum, ut cutem attingat. Lupi etiam corium ea parte desumptum, qua spina adhæret, latitudine duorum digitorum in cuiusli formam effingendum, ventrique & lumbis circumcungendum, & semper gestandum, ut corium attingat cutem, pilis exterius positis.

Cum primum pullus equinus in lucem prodit, vomitu materiam quandam rejicit, quam nisi



nisi quis præcipiat, mater statim devotat, hæc materia siccata & pulverisata, à morbo comitiali liberat certo experimento, ut mira quædam res videatur. Chalcanthini olei præparati gr. v. in jusculo mane sumpta per multos dies plurimos ab hoc morbo liberant.

Theriaca etiam tam idoneum est morbi hujus remedium, ut ea sola quotidie liberentur multi: aqua etiam theriacalis plurimum prodest. Hier. Donzellinus, consil. 38. lib. 6. consil. Cratonis & aliorum Medicorum à Schoitzio editorum.

Præscripseram nuper cuidam puero Emplastrum futuræ coronali apponendum, is tentatis multis remediis, beneficio Dei convaleuit. Pharmacopæi conjunx Emplastrum hoc aliis pueris epilepticis adhibuit, itaque tam multus de eo sermo, ut etiam senes bono successu uterentur. Descriptio Emplastri hoc est.

℞. Succin. alb. thur. mastich. an. ʒi ʒ galb. opoponac. an. ʒj. visci q. ʒ ij. ambr. gr. gr. 6. mosch. gr. 3. sem. pæon. maris, ʒʒ ladani, ʒʒ ol. nuc. mosch. parum, aspergatur pulvere cubebærum & extend super alutam Jo. Crato. epistola ad Jordanum, lib. 4. epist. Cratonis, &c.

Radice[m] Pæon. collo appendimus, ac in forbitiunculis eam coquimus. Damus mel Scilla vi imbutum, hyssopo ac roremarino cibos coqui jubemus.

Cuidam juveni à manu repebat quid per humores in cervicem & c. put; mox cadebat. Post provisionem habit in totius corporis, phænigmos adhibui manui, tum malum incipiebat ab humeris: illis cantica admovi; ac ut theriaca uteretur quotidie mane ad ʒj. jussu. Mox à lingua invadebat & à genis, genis phænigmos admovi. perennique theriacæ usu summi Dei beneficio evasit. Sed diu nutus perseverabat, ac loquela redit tandem. *Joan. Hearnius ad aphor. Hippoc. 7. sect. 5.*

Cum advenissem hominem veluti in agone mortis reperi, pulsus adeo erat variabilis, ut nunquam similem in homine qui evaserit, me observasse ausus sim affirmare, jam enim erat magnus & celer, jam tardus, rarus, inæqualis, formicans, parvus, & languidus, sed & (quod omnibus admirabilis est) aliquoties adeo intermittebat & quiescebat, adeoque deficiebat pulsus, ut æger jam animam effudisse videretur, non enim ictum unum aut alterum, verum quatuor aut quinque, aut etiam plures intermittebat, & ita quidem ut facillimè passus quatuor aut quinque, quiescente pulsu, per cubiculum fecisset, interim dum ita quiescebat pulsus, corpus apoplecticorum more, plane sine motu & respiratione jacebat; oculi aperti & fixi erant, & vix signum ullum vitæ in ipso observari potuit, nisi quod partes corporis, imò ipsæ quoque extremitates suo calore naturali fruebantur. Ego cum advenissem protinus nares, labia & tempora succo rutæ (maximas istius succi in Epilepsia esse vires testantur viri docti) in quo nonnihil theriacæ dissolutum erat, inunxi, regioni cordis & carpis epithema calidè applicui, & pulverem epilepticum & aliquantum confect. alkerm. cum aq. lil. convall. Pæon. & beton. exhibui. Sequenti die cum iterum præscriptam potiunculam sumpsisset, præter meam & adstantium opinionem melius se habuit: deinde observata victus ratione expurgatoque corpore, brevi

resistens fuit. In hoc autem casu videmus quid natura valida etiam præter spem & opinionem Medici præstare possit, quandoquidem ego ut ingenue fatear, cum pulsus ut dixi, non solum variabilem & summe imbecillum, verum etiam omnino intermittentem in ipso observassem, mortem in propinquo esse adstantibus significavi; ille tamen quia juvenis & robustus adhibitis remediis idoneis, intra dies quatuor sanitati restitutus fuit. Inspexi autem in prognostico meo non solum ad ea quæ quotidie in præxi accidere observamus: verum etiam ad locum illum Galeni lib. 2. De præcognitione ex pulsu ubi ita scriptum reliquit, si arteria duorum pulsuum tempus moretur, hanc scio an quisquam superites esse possit & eodem libro, naturalis arterie motus sanitatem refert; vitiosus morbum, internullus mortem *Gul. Fabricii. Hilda. 10. Observ. 22. cent. 4.*

Cum piscator quidam bis, ter & sæpius quotidie Epilepsia corriperebatur, nec radix Pæoniz, Cranium humanum, alcis ungula, aliæque remedia, à multis an. horibus enumerata juvarent; accidit sorte ut legerem in Fabii Columnæ historia Plantarum, cap. de Phu. hæc verba. Præter has vires plantæ huic tributas, addo & hanc proprietatem jam diu in multis, atque in memetipso expertam, quod pulveris radicis plantæ hujus sponte ortæ extirpatæ antequam caulem edat, cochleari dimidium cum vino, aqua, lacte, aut alio quovis decenti succo semel sumptum, aut bis Epilepsia correptos liberet; hunc pulverem amicis dono dedi, qui deinde divino prius numine laudore glorificato, ejus usu illis restitutam sanitatem affirmarunt. Hæc sunt ipsius verba: & sicut ipse jubet, ita dedi, & sanatos est æger, & in posterum feliciter hoc remedio usus sum. *Dominicus Panarolus. Observ. 33. Penecostæ 1.*

*Adrianus Spigelius* memoravit Nobilium Patavinum 19. annor. sæpius Epilepsia conflictatum; quum à gravi de scalis lapsus, Fabricius ab Aquapendente cranio terebram admovisset, nunquam ex eo malum percepisse. *Jo. Rhodius obs. 66. cent. 1.*

*Celsus* & *Galienus* aliumque Nobilium melancholia & comitiali morbo alternatim laborantes, & frustra à Medicis vexatos somniferis & lotionibus capitis: solo potu pulveris chrysolithi ex vino, octo dierum ipatio sic liberavi, ut nunquam morbus redierit. *Hieron. Cardanus curat. 3.*

Ancilla Epileptica usu oxycrati liberata est; cujus cyathum sumebat mane singulis diebus, & ante tempus invasionis acetum purum curato morbo doloribus artuum correpta est, qui usu theriacum curati sunt. *Lazarus Riverius obs. 10. cent. 4.*

Puella duodecim annorum Epilepsia frequenter corripiebatur, ad cujus curationem multa remedia frustra tentata fuerant, cum autem pleuritide correpta fuisset, plures ei secta fuit vena, & ab eo tempore Epilepsia nunquam correpta est: inde colligere licet, venæ sectionem ad Epilepsie curationem plurimum conferre. *Lazarus Riverius, obs. 38. cent. 4.*

Puer quidam trimulus patiebatur insultum epilepticum à quo liberatus fuit fumo tabaci, quem minister tubulo attrahebat, & insufflabat in os pueri apertum, vomitus inde illi concitatus est, & paroxysmus solutus. *Laz. River. obs. 60. cent. 2.*

H h h h h



Quidam ab aliquot annis Epilepticus, si quandoprehendus esset paroxysmo, auram quandam frigidam ex crure, itemque ex brachio quasi ascendere sentiebat, moxque concidebat. Quasi itaque post adhibita varia medicamenta, ut sentiens vaporis ascensum, partem, ligaret; id quod præstitit, sicque semper paroxysmum inhibuit. *Philippus Salmutius obs. 90. cent. 1.*

Rusticus quidam longo tempore morbi comitialis paroxysmis frequenter confectus nullo remedio curari potuit; donec febre quartana superveniente, ab eo liberatus fuerit. Ita enim *Hippoc. Aph. 9. Sect. 6. lib. 6. Epid.*

Quartana laborantes nullo magno morbo corripuntur, si prius autem corripiantur, & quartana superveniat, liberantur. Galenus in *Comment. nomine magni morbi Epilepsiam intelligit. Philippus Salmutius Obs. 84. cent. 2.*

Nobilissima quædam domina Epilepsia penè hæreditaria diu afflicta, irritis omnibus remediis ab excellentissimis Medicis præscriptis, tandem solo pulvere veri visci querni ad 5j. quantitatem in aq. ceræ nig. vel cerevisiæ singulis matutinis per dies aliquot circa plenilunium exhibiti, sanitatem obtinuit. Licet nullam haberat medicamentum sensibilem operationem, tamen post primum diem, nisi unum paroxysmum passa est, *D. Robert. Boyle Tractat. de Utilitate Naturæ Philosophiæ, part. 2. sect. 5. cap. 7.*

Ungula alcis præsentanea vi pollet adversus morbum comitalem, quod multis experimentis comprobatum habeo, licet mihi ratio visa sit obscura semel atque iterum contigit, ut muliercula quædam in ædium nostrarum vestibulo, tanquam fulmine icta, concideret, quod ubi effem conspicatus accedo propius, atque annuli gestamen, cui alcis particula inserta erat, digito qui infimo proximus est infero, illa e vestigio erexit se in pedes, potuque refocillata iter inceptum alacriter peregit. *Levinus Lemnius lib. 2. De Occultis Naturæ Miraculis, cap. 3.*

Illustri Neogamus amore foris ossissimæ puellæ, quam jam quantum deperiebat annum, poëtitus, in arcem milliari à Leodio distitam eam ducit, ibicum amore se pulcherrimo ad fatietatem explet, depleri facultatem animalem, purissimamque spirituum partem absumi non sentiens, Epilepsia corripitur, ad volo ego citato equo, atque à paroxysmo excitato; album pavoninis excrementis detersum in decocto millefolii (erat casu ad manum) propino, à cuius sumptione cum aliquot horas liber fuisset, iterumque corripere, antepilepticum Sereniss. Ernesti Principis mei, quod oleum heracleum, qui ingenti pretio ipsi vendiderat Chymista indigitabat; Leodio adferri curavi; quo bis terve sumpto, per omnem vitam ab Epilepsia immunis fuit, ejus olei, quod sæpe fidum expertus sum, descriptionem hic ponam.

℞. Vitrioli veneris, aut viridis æris calcinati, ℥b i β. Cranii humani, unguis alcis, an. ʒij. visci querni (malim columnum) sem. Poron. maris, an. ʒ i. cum spir. vini rectificatissimi ℥b ij. digere in retorta & distilla S. A. ingratiſſimum est hoc oleum, & odore & sapore, sed miræ efficaciz, si cum aqua convenienti sumatur. Huic omiſſis universalibus, quia ob virium imbecillitatem mortem timebam, solis antidotis consului, monuique meminisset, dicere Itagiritam na-

tura ocellum, synusiam seu coitum esse parvam epilepsiam, a parva autem ad majorem proclivem esse transitum *(Henricus ab Heer. obs. 18.)*

Puella quædam ab ebris duobus ad stuprum sollicitata, in epilepsiam ex subito terrore & animi consternatione incidit gravissimam. Ad illam accersitus, duos, quæ lecto aditabant famulas rogo, quoties concideret? jam videbis inquit, adhuc loquebantur, cum s. x. fissione convulsa fuit, lecto affixus, observo illam duos utriusque pedis pollices contricare, nec ullam in illis movendis, quoties paroxysmo libera erat, quietis partem interponere, exten. plo curo fieri butyrum antimonii, ex æquis antimonii crudi & mercurii sublimati concinnatua. partibus: quo utrique pollicum applicito, ventrique magnis excitatis, illeque abiectis, denum eam ne ad oſa ablata, ab omni paroxysmo, tri duo liberissima fuit: quanto die cum levissime convulsam domestici dicerent, sumpto antepileptico, ex Crano hominis, pavonino excremento, vesica. pri. cum lotio in furno siccata, visco columno, oleo succini inodoro, aquisque ei rei dicatis asprine factis, nunquam postea vel umbram convolutionis sensit, *Henricus ab Heer. obs. 24.*

*Hartmanni* an. uleto ex frutice sambuci in salice inventi, plurimi epileptici salutem suam debent. Medicus quidam nostræ urbis exercitissimus plusculos solo isto an. uleto restituit, præmissis præmittendis

Sartor Juvenis Halſnienſis tumido ventre diu aquam inter cutem collegerat, nullis adjutus medicamentis, transmissio ad cerebrum sero copioso, epilepticus evasit: urgebat viginti & quatuor horis paroxysmus, & n. sere torquebatur; sed appenso an. uleto, imminutus primum paroxysmus, mox plane remiſit, hydrops vero tractu temporis alvi fluxu superveniente detumuit. *Thom. Bartheolinus, hist. 6y. cent. 4.*

#### Morbus comitalis sponte sanatur.

Plurima non minus graviter, quam verè dixit uberrimus auctor, Hippocrates, sed nihil majestate ipsius dignius, quam ingenium illud. Naturæ morbis medentur. Cuius etati dignitatem, ut passim on. nes, sic ostendit præcipue morbus comitalis, quem eradictum ubi vult natura, utitur modo, variantis ætatis mutatione, modo vero ulceribus in capite excitatis; vel excogitans aliud aliquod solers inventum, dissolvit industrie nodum, arti Medicæ planè indissolubilem.

Consulis Amstelredanensis filia exagitata vehementer a morbo comitali; & parum aut nihil auxilii ab arte impetranti, suppetias eandem tulit officiosa natura: expellens potenter, acrim periodicæ distentionis causam a cerebro in subjectos faucium musculos. Quibus impeditis, cessit quidem, ex toto, morbus comitalis; sed interim intumuit haud parum guttur; perit elocutio; neque deglutit, nisi admodum graviter.

Sed præcipua molestia fuit à suppressâ voce, quâ caruit ad sextum usque mentem: licet interim non negligerentur, vel convenientia cathartica; vel requilita roborantia: inter quæ facili primas tenuit oleum, arte Chymicâ e succino elicatum. Quod sane plurimum profuit,



fuit, recuperanda voci. Quam iterum adeptus, fecit primum, recepta locutionis initium (quo etiam ab aliis, alias observatum) vocalibus A & O. Quibus aliquoties ruditer prolatis, profecit brevi tempore, ut ante diem quartum decimum, loqueretur, non minus articulatè ac si nunquam obmutuisset.

Quod ipsum, benevolæ naturæ, auxilium, etiam in aliis, subinde licuit videre: sed præcipuè in duobus infantibus, quorum epilepsiam sanavit, per manantia capitis ulcera. Quibus improvide aliquando suppressis, retinebantur non tantum tetri, maligni morbi, vapores: sed revertebatur ilico terribilis hæc nervorum contractio. Neque desinebat iterum nisi remota cicatrice, referaretur hiatus, exhalandis fuliginibus à natura destinatus.

En præeuntem naturam, o Chirurgæ; monstrat ipsa, quasi digito, salutarem, mustorum ulcerum usum: ex fama tua erit, imò ex usu ægrorum, si hanc sequaris ducem. Profunt ulcera arthritidis, expellunt lippitudinem; sed neminem efficacius juvant quam morbo comitiali, obfessos.

A quo utique adfertur vidi aurifabrum, per squamosas quasdam crustas, scædum in modum pedis cutem exasperantes, quibus scalpelli apice dextere ablatis, destillare protinus per exilia cutis ulcuscula, frequens, ac acer humor, qui per anfractuosas ambages ad pedes delatus, eo proculdubio descendit sive à capite, genuino hujus mali fonte; sive ab hepate, aliove aliquo inaccessio somite, secreto alicubi latitante. *Nicol. Tulpus Observat. Medic. lib. 1.*

#### *Morbus comitialis à splene.*

Ex ætri quarumlibet partium vapore, cerebrum vellicante, morbum comitalem excitari, novum non est. Sed parti alicui, tam exquisitum inesse sensum, ut attacta duntaxat levi digitorum apice, protinus contrahat nervos; id certe summe rarum est. Et præter unum Lernelium (qui ex simili occipitis attactu, vertiginem vidit obortam) vix cuiquam fortassis observatum.

Juvenis patritius annorum circiter quindécim, doluit ex pube, tam intolerabiliter; extra omnem suspicionem calculi, ut ibidem loci, neque litum olei amygdalini, neque linteolum eodem madens, foret ferendo. Sed converso post mensem, omni doloris impetu, à pube, versus latus sinistrum, unde fortassis descenderat, desit ex toto illius partis cruciatus: & ilico male habuit lien: & ex ipsius consortio, cerebrum. Non secus ac aliis, ex pede vulva; ex liene ventriculus: & à ventriculo caput; instar cucurbitæ universo corpori impositum.

Noxiam autem materiam, à liene, per venas iliacas, ad ilia, ac pubem descendere, vidit olim vir oculatissimus Hippocrates: sed innuit id adeo rectè, ut à paucis observetur. Qui nigra (inquit) vomunt, ad pubem dolent. Lib. præd. Expulsâ videlicet illuc acri sanguinis lœce. Unde certe est, quod melancholicis fiant, maximi morbi, ab illibus. De quorum molestâ dilaceratione, non minus quoque conqueruntur,

scorbuto qui obnoxii: quibus propterea videntur illa rumpi. cum ob continuam humoris erosionem; tum propter urgentem, dilaceratarum membranarum, distentionem.

Inquirendum itaque curiose Medicis, in naturam humoris, à natura expulsi: & cavendum obnixè, ne facile regurgitet a loco ignobili, in partem principem. Satiùs quippe est, pestilentem ejuscemodi frugem in semine comprimere, quam adultam demetere mellem.

Sed ad rem. Lien a turgido hoc, atra bilis, fermento, jam tumidus, distendit ilico ex le vapores cerebro tam inimicos, ut juvenis protinus concideret in vehementissimos morbi comitialis insultus: excitatos non tantum à causa interna; sed subinde quoque, ab externa.

Nam pressâ, vel solo digito, regione lienis, contrahebantur ilico, omnes nervi: & sequebatur confestim miserabilis universo corporis distentio: lardens iteratis suis circuitibus, usque eo, mentem jam aliquoties labefactatam & cumprimis, vim ipsius imaginatricem ut crederet se nescio quem regem, distribueretque non minus largiter qualiacunque munera; imò integras regiones ac si revera rerum potius fuisset.

Insidente ipsi, hac conceptæ majestatis opinione, adeo profundè, ut summe exandesceret, conipereturque gravissimâ epilepsiâ, si quis majestatis oblitus, ipsum compellasset nomine ulcato; Ceu inferius dignitate sua ratus alio, quam regio insigniri titulo. Impositis interim familiaræ suæ (quæ erat amplissima) promiscuis, quorumcunque animalium, nominibus. Quæ semel data (quod melancholicis proprium) tam firmiter memoriæ mandavit, ut nunquam deinceps, inde exciderint, licet vel longissime quis peregre abfuisset.

Quod si vero quis, loco ursi, felis, canis, draconis, aut leopardi, desideraret proprium sibi restitui nomen, cum reddebat ilico, voti compotem; modo donaretur aliquo munere, quâ facilitate, ab amicis observata, redemere plerique omnes, ignominiosa illa nomina. Et quæ donis ipsorum imposita, retinuit invicem tam strictè, ut etiam post plures menses, recordaretur nominatum; quod quisque, vitandæ ignominie ergo, obtulisset munus.

Inusitato autem huic morbo, plurima quidem nobiscum opposuit felicissimus Medicus Joannes Fontanus: sed nihil præponderavit, vel vino chalybeato; vel veratro nigro: quorum primum, posteris quo commendaret Cornelius Cellus scribit expressè animadversum esse, ea animalia, quæ apud fabros ferrarios educantur, exiguos habere lienes: constabat autem hoc vinum, ex sequentibus.

℞. Radic. althææ, asparagi singularum ʒ ij. deoquantur ex aceto vini, & infunde colaturæ limaturæ chalybis, ℥ ij. cum dimidia; deinde insolentur, vel macerentur per biduum, in cineribus calidis, addendo chalybi exsiccatæ, & tenuiter trito, vini Rhenani ℥ iv. aquæ melissæ ℥ ij. ligni guajaci rasi unciam mediam, corticum radicum capparum, tamarisci, ceterach, serpilli, singulorum dragmam, croci Britannici scrupulum: concutiantur quotidie fortiter, in lagenâ vitreâ; &

H h h h h 2



ex colatura fiat, vinum chalybeatum.

Ipsi cuius usum, inurebatur crura sinistro ulcus, sed vix deciderat ipsius crusta, quin effervesceret usque eo, turgida bilis: ut nihil disferret a furibundo, Cantillans noctu, taciturnus interdum, cum vultu semper truci, mente perturbata, fume insatiabili, & obstruktionem gulæ, tam pertinaci, ut vix ullis remediis reseraretur iterum: nisi fortè, per clysteres crebrius infusos: utique veratrum nigrum, dejectionis causa, aliquoties, potui datum.

℞. Corticum radicum capparum, tamaricis, fœniculi, singulorum unciam. Herbarum fumariz, meliliz, boraginis, singularum manipulum, seminum melonum, limonium, anisi, singulorum dragmas duas, radicem veratri nigri, dragmas sex, uvarum passiarum cornithiacarum uncias quatuor. Decoque ex aqua hordei ad libras duas, & dissolve in colatura, syrupi rosacei cum sena, uncias quatuor, melle, fiat potio.

Cujus medicamenti beneficio, licet uberius deponeretur atra bilis; peperit tamen ingratum ipsius sapor, tantum fastidii, ut necesse fuerit, eo derelicto, præparare insequens catharticum: quod etiam summo opere ipsi in rem fuit.

℞. Foliorum senæ mundatorum à stipitibus dragmas duas, radicem veratri nigri, scrupulos duos, seminum limonium, & fœniculi, singulorum scrupulum, infunde per noctem, in decocto fumariz viridis, adde deinde colaturæ, confectionis hamech dragmas duas, syrupi rosacei solutivi, unciam cum dimidia, fiat potio.

Qua aliquoties propinata, ejecit continenter tantum atræ bilis; ut tandem ad se redierit: debellato contumacissimo hoste, & expulsa, gravissimæ epilepsiz, materia, attamen non sine aliqua mentis labe. Quæ tamen tanti non fuit; quin potuerit deinceps, & literis rite operam dare: & alia peragere non secus, atque sanissimus. *Idem ibidem.*

#### *Morbus comitialis, à vulva.*

Mulierem prægnantem coniecit malignus vulvæ vapor, in tam acerbis nervorum contractionibus: ut pepererit. Ignara tamen partum illum, à se, editum: derogans ad hæc fidem, amicis, id uno ore adseverantibus. Ea quippe fuit hujus dissentionis vehementia: ut extendere se, ultra horas novem. Quibus exactis, corripere ipsam febris, ac sopor adeo torpidus, à sanguine impetuosius sursum rapto: ut tali vena aliquoties fuerit ferienda antequam iterum descenderent ipsi menstrua, & cessaret ex toto febris vehementer ipsam exagitans.

In quem inscium partum, ab eodem vulvæ consortio, incidit utique, haud diu post, affinis nostra Maria Corvina sed privabatur hæc pueræ vultu. Licet foris nec hebetudinem aciei, nec aliud aliquod vitium ostenderet externa oculi tunica. Quam cæcitatis speciem, *signis* veteres; & guttam serenam appellant recentiorum nonnulli.

Quod vitium ut insanabile haberetur, siquidem insidet ipsi cerebro: sic curatur etiam difficillime, quantumvis fiat, ex aliarum partium co-

sensu. Ac proinde nequit etiam in hac ægra tolli; nisi per remedia valentissima. In quibus excellere emplastra venicatoria, internis semoribus admodum. Quorum ope retraheretur, tam potenter sanguis luctum vergens, ut recuperata gratissimi luminis visus evaserit feliciter perniciosissima illa cæcitas, quam plerique Medicorum judic. verant habere, certam desperationem.

Sed circumspici Medicus est, prælagre quidem pericula, sed interim non omittere, quæ ars requirit. Et cur quæto desperare quis fieri potest quæ hic facta sunt? Incipio animose, perge prudenter, & annuet forte coeptis tuis Deus. *Id. ib.*

#### *Epilepsia, sexies cotidie, accedens.*

Quod in mari est ætus ac recessus: id in morbis vocatur reciprocus circuitus. Quem quod comprehendis minus, eo admiraris magis. Latet quippe plerumque ipsius causa, & absconditi ordinis ratio, detrahit etiam acutissima ingenua, & resertim quorundam minorum, ea cum ac conditio: ut quotidie, non tenet, atque iterum, sed interdum quinquies, vel sexies accedant, recedantque. Idque non angustat menses; sed integros lubinde annos, servante quolibet insultu, ex ætu reciprocantis periodi, momentum. Ubi id nonnunquam videre est, vel in interpolato capitis dolore: vel reciproco artuum tremore, sed nullibi evidentius, quam in periodica illa epilepsia, quam hic inferam.

Matronæ locupleti, intervenire, ex ventre diutius adstricto, non modo horror, ac febris; verum etiam frequens animi deliquium: accedens primum quidem promiscue, & inelincte, sed niox ordinate, cum in accessione tum in recessione. Quod tamen reciprocantis animi deliquium destitit ex toto, post duos menses. Sed ea cum lege, ut illi, & vestigio inaccesserit acrimonia bilis quædam epilepsia: insurgens cotidie, modo ternis, modo quinis, modo senis circuitibus, quorum impetus fuit lubinde adeo effusus: ut opus non semel fuerit ipsam detineri à quatuor mulieribus.

Suppressa interim (qualibet accessione) voce; occæcatis oculis; obstitit decentibus auribus, & cessante tam diu, sentium interiorum, functione: donec post horam quartam (is enim terminus cuilibet periodo sunt perfixus) ad se reverteretur mentis iterum compositi & protinus apta respondere, ad quæcunque interrogata. Quæ animi præsentia manit illi semper immota; usque dum recurret, iterum novus insultus aboliturus denuo & interiores, & exteriores sensus.

Quem tamen reciprocantem ordinem immutaverunt lubinde, vel seris incrementis; vel animi affectus, vel inopinatum aliquod infortunium. Et prout vel leniretur, vel exacerbaretur hic morbus; pro eo etiam, vel tolerabilius, vel deterius sese habuere utique ipsius accessiones: modo leves, modo asperæ, nunc pures, mox pauciores.

Quin imo, deficiente fomite, defecit nonnunquam integer aliquis insultus, sed commoto iterum corpore, rediit utique facillime. verum cum novo invadendi, ac remittendi ordine. Quæ recidiva frequentius ipsi interveniente, vix causa fiat propterea, mutare nunquam cubue-



suum, nisi fortè sub horam, venientis accessio-  
nis. Ne si secus faceret, precipitaretur denuo,  
ex motu illo, in novum circuitum. Qui plerum-  
que excurrerat ultra quartum, quintumve men-  
sem, antequam ipsam iterum desereret.

Unde factum, ut circa summum in orbi incre-  
mentum epilepsia hæc habuerit, senos circuitus:  
statis horis, quotidie, & accedentes, & rece-  
dentes. Quarum periodorum frequentia, exagi-  
tavit usque eo, defatigatum hocce corpusculum;  
ut tandem inciderit, in accessiorem longissi-  
mam continuantem quotidie, sine ulla intermis-  
sione, ullove, vel cibi, vel potus usu, ad horam  
circiter vigesimam.

Cui oneri impar, credebatur ipsa, jam ad ultima  
ventum. Sed re plane desperata, apparuit nec  
opinanti, quasi, ex machina, Deus. Et sedata, post  
diem quantum intolerabili hac tempestate, su-  
stulit, ex toto, productum illum paroxysmum,  
relictis duntaxat in locum ipsius duobus insul-  
tibus, quorum alter durabat ab octava maturi-  
na: in horam undecimam; alter vero à secunda  
pomeridiana, in quintam vespertinam.

Donec decreverit paulatim fomite, usque eo  
decreverit utriusque longitudo: ut tandem vix  
median. excesserint horam. Qua utique decli-  
nante, vidimus, post annum secundum, conla-  
grato jam omni igni, terribile hocce incendium,  
integre fuisse extinctum. Debellata, ex toto,  
perniciosa illa epilepsia, quam, trigesimo  
octavo ætatis anno, (quem, id temporis, agebat  
ægra) ceu invincibilem, cum omni antiquitate,  
crediderat, tota nostra Civitas.

Sed summe admirabamur, nunquam ipsi in-  
tervenisse, novum insultum: quin evidenter ip-  
sum præfagierint, vel concitaret temporum arte-  
rix, vel horridus manuum, ac malarum rubor.  
Quibus præcisus sanguis, tantam fidem habuit æ-  
gra: ut his apparentibus, certo semper prædixe-  
rit, aliquid monstri ali, neque sane præter ratio-  
nem: accento enim sanguine mirum haud fuit,  
motus fuisse temporum arterias: tinctam manus,  
ac faciei cutem: & ex acri, fervidi humoris, va-  
pore concitatam fuisse, novam contractorum  
nervorum, periodum.

Quotquot autem accederent Medici, acce-  
debant vero plurimi, omnes contulere, primo  
saltem accessu, morbi hujus causam, in vulvam;  
sed intellecto legitimo menstruum ordine; &  
audita gutturis libertate, direxere contra, con-  
silia sua, in lienem, ac atram bilem, in pancreate  
stabantem. Hæc enim loca, designabant perspi-  
cua, cum dolor lateris sinistri, tum calor in lum-  
bis evidentior, quàm alibi. Quib. accessere excreta  
subinde quidem flava, ac porracea; sed plerum-  
que atra, ac vere nigra: ex quibus, luce clarius  
apparuit, cum lienis, tum pancreatis vitium.

Quarum partium calor, adstrinxit ipsi, tam  
pertinaciter alvum: ut totius morbi decursu, vix  
quicquam reddiderit sponte. Ac proinde neces-  
se fuit, eam cunctanter ducere, per cathartica:  
præsertim per catapotia (clysteres quippe aver-  
santur) concinnata, ex granis undecum extracti  
catholici, & quatuor pilularum nitri Tralliani.  
Aut tantumdem, vel veratrum nigrum, vel pulveris hie-  
raz Galeni; prout variaret morbi inclinatio.

Non omisis interim illis, quæ longo usu, judi-  
cantur morbo comitiali apta; quorum tamen  
tedium perpulit ipsam assiduo ad eandem pila-

las, quibus etiam, usque eo, benedixit misericors  
Deus, ut illis propenodum solis, cesserit perti-  
nacilissimus hic morbus. Devictus proculdubio,  
eo tardius quo minus dormiverit noctu, & par-  
cius aleretur interdium, semel tantum capiebat  
cibum, in die: eum que semper, circa octavam  
vel pertinam: & quolibet nocte exagitabatur ab  
indefatigabili vigilia: uti interdium, à periodicis  
nervorum distentionibus: plerumque ita efferis;  
ut continenter opus fuerit excarnificatos ner-  
vos, illinere leni aliquo cerato: sed præcipue in  
planta pedis, à qua, uti incipit, ita quoque de-  
scit, gravissimus hic morbus. *Idem ibidem.*

#### *Epilepsia ex pollice pedis,*

Morbi comitialis, causam statuunt Medici,  
vel in ipso itabulari cerebro; vel aliunde eo de-  
ferri, live ex ipsis visceribus, seu à partibus ex-  
ternis, planè eodem modo, quo ex ictu scorpio-  
nis, ac phalangi, vel à morfu viperæ, instar ali-  
cujus aura, venenum perferitur ascendere, ac  
sensim sese insinuare, in principes nostri cor-  
poris partes, uti luce clarius videre est apud  
Galen. lib. 3. locor affect. cap. 7.

Curtium Rogerium, uxore orbatum, ac mor-  
stè viventem, quavis primus morbi comitia-  
lis insultus invaserit, sine ullo vel levissimo ipsius  
præfagio, sensit tamen insequentibus exacerba-  
tiones manifestam originem trahere, ex pol-  
lice pedis sinistri; inæque, ab ipso articulo,  
vagum, ac oberrantem elevari vi: porum, pri-  
mum quidem genu, ac humero, deinde verò  
cervici, ipsique cerebro molestum: cum consp-  
picua mentis labe, ac terribili nervorum con-  
tractione, reflexo capite versus dorsum, per  
eam convulsivæ speciem, quam Græci *ἰσχυρὴ*  
vocant.

Quo diro symptomate, non quidem conti-  
nenter, sed interpolatis vicibus modo serius,  
modo ocysus fuit exagitatus, prout venenata  
hæc materia vel citius, vel tardius vapores suos  
emiserit, qui etiam non semper recta, in cere-  
brum feruntur, quin potius nonnunquam ali-  
quandiu subsistunt, cum evidente doloris sen-  
su, vel in genu, vel in humero, aut in cervicis  
aliquo musculo, antequam eorum offensam per-  
sentiat cerebrum, quo tamen tandem irritato,  
contrahuntur quidem omnes nervi, sed po-  
tissimum illius partis, ex qua malignus vapor  
speciatim in cerebrum fuisset delatus.

Quæ venenata fruges in herba quo opprime-  
retur, nihil non tentatum, cum per cathartica,  
tum per convenientem sanguinis detractionem,  
sed potissimum, per arctius vinculum, pollicis  
supra articulum, tam arctè circumligatum: ut  
coërcitus halitus ne minimum quidem invene-  
rit exitum, ad superiora deinceps evolandi,  
non omisis interim, quin potius pro virili, par-  
te dolenti articulo impositis cucurbitulis an-  
gusti oris, ad eliciendum venenum illi penitus  
insidens. Quo tamen minus cedente, ad morum  
aliquoties pollicis fuit ferrum candens, & in-  
stum ibidem loci ulcus, ad os usque penetrans.  
Cujus beneficio malum hoc potissimum fuit de-  
victum, uti etiam per reliqua manantia ulcera,  
quæ cruribus, ac brachiis fuere imposita, quæ  
tandiu mansere aperta; donec post menscm  
tertium morbus ex toto desiniret, ægerque  
annos jam natus duodequadraginta, præli-  
t



nam recuperaverit sanitatem, extra omnem recidivæ metum. Licet Hippocrati videatur hoc malum, id ætatis, homines ad mortem usque commitari, et non omnes, inquit optimus aphorismorum interpres Philotheus lib. 5. cap. 7.

In dissipandis autem vaporibus, ac sudore per cutis foramina eliciendo, præter Theriacam, lapidem bezoardicum, radicem contrayervam, ac decoctum radicum chinæ, nihil ægro magis ex usu fuit, quam aqua arte Chymica elicita ex tartaro & vitriolo, quam aurum potabile vocant. Cujus quotidianus usus, primum quidem sudorem elicit, ex illa parte, in qua id temporis, venenum delitesceret: At deinde ex capite, ac corpore universo, donec ex toto cessaret perniciosissimus hic morbus, docens suo exemplo optime agi cum medicamentis chymicis, ubi in gravi morbo dantur à provida manu, universalibus auxiliis jam tum ritè administratis, qua circumspectione destituta, videntur quidem magna, & quantivis pretii in oculis vulgi, verum nequaquam apud illos, qui rem non tam opinione, quam veritate metiuntur. *Idem Observat. lib. 4.*

#### *Epilepsia cum vocis suppressione.*

Isbrando Colineo, adolescenti unde viginti annor. ex pedis pollice, simillima quum elevaretur aura, contremuit intense brachium, & præter periodicas, ac vehementes convulsiones, incidit non modo in resolutionem nervorum, quam paralytin vocant, in tantum etiam vocis suppressionem, ut coactus sit, scribendo mentem suam exprimere, quamdiu obsiderentur nervi recurrentes, voci formandæ à natura destinati.

E quibus tamen intricatis scopulis, felicissime enavigavit, eodem magnete, quem jam propositum ivimus, sed præ cæteris, præter tenacius vinculum, quo ne tantulum quidem pollex carere potuit, profuerint ipsi ferramenta candentia, primum quidem timide, at mox audacius, usque ad ipsum os pollicis, inusta, ex consilio Egberti Bodxi, Bonnii, ac Hartochveldii, qui juxta necum ipsi Medicinam fecere. *Idem ibidem.*

#### *Sanguis humanus Epilepticis datus.*

A Morbo comitiali, ut merito perterrentur ægri, sic non injuria detestantur sani inusitata quædam ipsius remedia, suadentibus aliis calvariam hominis viventis, aliis ejusdem jecur, aut pulmonem; aliis contra audaciore ore, calidum spirantemque sanguinem (horresco referens) hominis recens interempti, quasi vero, ut cum Plinio loquar, lib. 28. cap. 1. sanitas videri possit, feram ex homine fieri, & violare divina, humanaque jura.

Vide sis ô Medice, quid astruatur à Mose Genes. cap. 9. Luca, Actor. cap. 15. & tandem ab Imperatore Leone in Novell. constitut. 58. ubi lex flagris cædit, bonorum publicatione, ac perpetuo exilio multat, qui sanguinem intestinis infartum in cibum convertit sive vendat, sive emat; quo certè delictio annon multò gravius est, recentem sanguinem quasi cum ipsa anima sorbere, simul ac gladius viam erupturo cruori aperiens, crudeli supplicio, locum fecerit crudiori Medicinæ, quam abominandam feritatem

ecquis non execraretur, etiam in ævulaniis bellis?

Movit quidem prior ætas prodigiosum hoc auxilii genus, sed vixi scire ejus judicium audi Cornelium Celsum adferentem, quosdam jugulati gladiatoris calido sanguine epoto, à morbo comitiali se liberaisse: apud quos, inquit, miserum auxilium tolerabile fecit, miserius malum, audi Aretzum Cappadocem exclamantem lib. 1. de morbo. c. 4. ô ingentem necessitatem quenquam eo redigi, ut malum malo piaculo depellat? unde tamen ad sanitatem utrum perventum nemo potuit mihi vere affirmare. quocirca non male Scribonius Largus lib. 1. cap. 11. compos. Medic. Licet aliquibus profuerit proscribendum tamen ejusmodi remedium extra professionem Medicam.

Lambertus Vitellius, adolescens florentis ætatis, plurimum molestiarum percellus, a frequentibus morbi comitialis insultibus, decrevit tandem ultima experiri, secundum illud Celsi: quos ratio non relictuit, illos adjuvat interdum temeritas; confugitque quanvis invictissimus (ô durum necessitatis telum!) ad execrandum, ac detestabilem humani sanguinis usum, quo tremula manu, averfis oculis, pallida facie ac horrente universo corpore in oblucentes fauces violenter infuso, tantum abest ut terribilis morbus inde iominueretur, ut potius plurimum incrementi sumplerit, habueritque multo pejus, quam ante Thyesteam hanc mensam unde factum, ut præ augescentis mali vehementia, corruerit præceps in ignem, exulto illic vehementer crure, & excitata tam ingenti gangræna; ut necesse fuerit, (quo cætera femoris pars rura foret) emortuum crus ferrula præcidere, quo crudeli remedio quantumvis ritè satis administrato, occidit tamen ipsum, postridie ejus diei, major morbi comitialis vehementia, quam vires à recenti cruris amputatione attrita luere ferendo.

In quod ipsum præsens vitæ periculum, licet nequaquam inciderit adulta quædam virgo eundem jugulati juvenis sanguinem, id temporis itidem bibens, adeo tamen non recuperavit, horrendo hoc remedio, amissam valetudinem, ut potius in eisdem, modo non & periculosioribus permaneret morbi comitialis scopulis, nolente quasi Deo, ultiore experimento confirmari enorme, atque execrandum hocce piaculum, cujus ignominioso usu, dispudet certè commaculati Medicinam, innocentissimam cæteroquin sanitatis præsidem. *Idem ibidem.*

#### *Epilepsia duos, aut tres menses à vulnere cranii intempestive obducto, cerebratione sanata.*

Consultationem me habui, se aliquando meminimus cum præclarissimo D. Julio Sala Professore Patavino, de quodam vulnerato pugione in capite, cum læsione non solum Cranii, & membranarum, sed & cerebri ipsius. Vulnus quibusdam Medicis exterius curatum fuerat, introducta quinetiam cicatrice, ex qua duobus, aut tribus post mensibus, epilepsia correptus est æger, quavis, aut ter quolibet mense divexabatur, quem cum Exc. Sala interrogaret, an aliquando vulnus aliquod in capite passus esset, ipso vero id affirmante, specillo itatum immisso, sub ipsa crusta



crusta inveni vulnus prædictum penetrans: unde illico deveni ad sectionem, & dilatationem partis, adhibita sequenti die terebratione, in qua effluerunt ichores quidem flavescerent, quorum ratione, supra cerebrum & membranam, balsamum nigrum occidentale viginti dies adhibui, quorum usu caro rubra coepit succrescere, ægro spatio triginta dierum à vulnere & Epilepsia sanato. *Petrus de Marchett. Obs. Medic. Chirurgic. Sylloge.*

*Ex vulnere thoracis inter quartam & quintam costam, Epilepsia suborta, quæ nunquam alias correptus fuerat æger, turunda immissa recurrens.*

Cum duo studiosi inter se digladiarentur, eorum alter ex familia Curtorum, vulneratus thorace, inter quartam & quintam costam, prolapsus est in terram Epilepticus, cum spuma in ore, motibusque convulsivis, à quibus symptomatibus, patiens mortuo similis domui deportatus, pulvis tamen validis: quia verò Barbitonfor jam obligaverat vulnus, ipsum eodem statu dimissi, quod cum accideret matutinis horis, sub vesperam denuo accitus, redintegratis sensu, & motu, postero die vulnus obligavi, cum facultates principes convalescent; quod cum curarem demisso specillo, patiens graviter conqueri coepit de dolore, cum levi quadam convulsione, Epilepsia simili, cujus causa specillum removi, atque à turunda abstinui, à Barbitonfore antea immissa, appositis solis flamentis digestivo rosaceo imbutis, ac superaddito cerato ex cerussa, & quidem tertia die, quarta vero, applicato eodem cerato, quibus spatio novem dierum ex toto fuit sanatus æger, qui cum nunquam alias Epilepsia laborasset, ut mihi retulit, ex vulnere solo ea correptus est, ratione scilicet nervi intercostalis læsi, inculcata valetudine etiam nunc Venetis degens. *Idem ibidem.*

#### *Epilepsia laudano opiato curata.*

In filio mercatoris cujusdam primarii hujus Civitatis Posonienfis, paroxysmi Epileptici ex dolore dentium & capitis 24. horas continue durantes, nullis remediis licet satis alias efficacibus sisti poterant, tandem ex mea præscriptione sumit Laudani Opiati granum unum cum dimidio in syrupo flor. Pæoniar, & sedati sunt subito, nec amplius redire, sicque evidenti auxilio liberatus æger omnibus jam de eo desperantibus anno 1666. *Paul. Spindlerus apud Carolum Raygerum obs. Medicin. Centuria.*

#### *Epilepsia periodica.*

Fatigavit majores nostros, quotquot labores suos hominum sanitati procuranda consecraverunt, omnes, & etiamnum fatigat illa februm proprietas, quod ita certis intervallis redeant, tanquam si ad conditum citatæ tempus mutandam suam, vel absentiam, vel tarditatem vererentur. Invenit non pauca, quæ hactenus latebant conspirans in Medicinæ studium temporum nostrorum industria, qua in parte mirum in modum excellit Anglorum illud præstantissimum collegium: hujusce tamen rei rationem nemo, quod sciam, hactenus eam red-

didit, cui mens humana acquiesceret. Quid ego? nescio, an minuiam, an augebo difficultate mihi, dum statos illos recursus non tantum in febribus, in mania, & mirum! in dentium doloribus, sed etiam in epilepsia observatos esse a peccante natura observo. In puella id factum annos nata decem & septem, hæc subsistente menstruorum fluxu suffocationibus uteri gravissimis laborare primum, deinde augecente quotidie malo, epilepsia corripitur coepit vehementissima, quæ tertio singulis diebus eam assiliebat, hora nimirum septima matutina, & decima, atque iterum sub noctem hora octava, quæ tempora integro anni vertentis spatio, ita servavit accuratè, ut nullæ ad horam certam conductæ operæ temporis sui rationem habere possint magis exactam. Sentiebat autem in orbem per dextrum crus, uti agebat, sursum ascendere, quod mitigato deinde malo adhibitis ligaturis, primum aliquamdiu retardari poterat, deinde etiam, ne ad caput ascenderet, prorsus impediri. jamque sanitati suæ pristina restituta valet & vivit, nam sic, ut antea valere, vivere non erat, sed perpetuo cum mortis satellitibus conficiari. *Theod. Kerckring. Spicileg. Anat. obs. 71.*

Virgo quatuordecim annorum ex terrore & spectri apparitione cum affectu colluctabatur convulsivo, *ignem* dixisset Epilepticam: hæc postquam unam noctem velut furcata obambulasset, spectri semper specie obversante, postridie ad quietem se composuit voce plane suppressa, quæ nec sollicitata prodere volebat. Duraverat hæc quies unum diem, cum major quam pridem membrorum distortio convolutioque mixta Cephalalgia & Pandiculatione apparere coepit. Accedebat perpetuus digitorum velut aliquid comprehendentium lusus, jam etiam labiorum orisque major distortio in risum deinde effusissimum abitura; Cordis palpitationes erant enormes & tantæ, ut allidi Cor, jam aquis Pericardii jam Costis, videretur. Respiratio erat sedata, nisi quod suspiriis aliquando interrumperetur; Oculi adhuc semper aperti atque irretiti; Dentes initio valide in se coibant; Saliva per oris rimam exilem profluebat plurima, limpidam magis quam spumescens. Quæ in Paroxysmo acta erant, plane non recordabatur & velut somnia accipiebat. Hæc tertio quoque die cum febricula redibant & cum quarto demum Paroxysmo finiebantur. In hoc autem duo imprimis memoranda nec quotidie obvia, risus nempe ille spasmorum complementum, & deinde mirum Palpitationis genus, quo Cor velut in aquis quasi sari audiebatur. Primum illud fortè se debuit spectri aut phantasmatis ingenio ista representatione ideali risum provocantis, quod tamen non ante fiebat, quam à morbi invadentis dolore victus animus phantasiæ pridem corruptæ impetum sequi cogeretur. Alterum phenomenon ter mihi visum, ubique in Epilepticis, an aliunde quam ab aquis Pericardii deduci possit, nescio; admotæ enim aures, ut ne dicam procul, audiri aquarum illam collisionem, *als wenn es schulperre*, luculente percipiunt. Uti Epilepsia, ita hoc quoque symptoma, feminam exercebat, cujus supra facta est mentio; & vero hæc ipsa adfuturum jamjam paroxysmum inde ominabatur. Sane Calculus erat in utraque femina, quem prodromi Epileptici insultus jam multo ante significava-



dat. *Juan. Nicol. Pechlinus Observ. Physico-Medicar. lib. 2.*

*Epilepsia à vulnere siccato.*

Anno hujus seculi septuagesimo & nono inenite vere terax erat morborum tempestas, imprimis Epilepticorum insultum, qui adultos etiam Juvenes Plethoricos gravissime exercebat. Eumvero uno eodemque tempore sex mihi objecti Juvenes epileptici, quorum tamen nemini, si unum exceperis, hic morbus in habitum transierat: tribus sane una vena sectione subventum. Quarto pessime ab hoc morbo habito Natura crisis aerisque mutatio profuere. Quinto familiaris jam ante morbus nec postea remisit. Ultimo revocata per artem ulcera morbi immunitatem præstiteret. Atque horum utriusque exempla necesse est deducam. Coquus erat viginti novem annos natus, qui jam a multis retro annis cum Epilepsia conflictabatur. Is pridie Pentecostes festi ex capitis dolore, prothomo plerumque morbi, laborare coeperat; minimum postquam Fontanellas in utroque brachio, quas valetudinis causa per annum magno suo commodo apertæ servaverat, consolidari securus jam & sui tunc curasset. Vix coiserant vulnrum labra, cum altero die post gravis incessit & decretorius Paroxysmus, qui tamen eodem ipso die inducias fecit. Ergo morbo detunctum se existimans festi sese religioni impendit, Deumque sacramento sibi propitiare parat; cum, ecce, ingens capitis dolor non tantum à Ceremoniis factorum ipsum prohibere, verum etiam in tristem conicere Paroxysmum videretur. Atque altero inde die detonuit illa tempestas, misereque exerceri à ferali Paroxysmo incepit æger. Summa erat in facente pectoris anxietas abrupta respiratione aliisque signis nimium quantum tentata. Pulsus ad hæc exilis, lentus, sed tamen numeris suis constans, membrorum vero tam violenta concussio, ut vix quidem coerceri à pluribus potuerint. Toleraverat jam Paroxysmum viginti quatuor horas, cum accederem rogatus; quod primum erat, pectus spiritu Salis Ammoniaci, sed per Vini spiritum temperato, illini, nares autem acriori Odore ex eodem sale sollicitari jussi. Pedes atterebantur spiritu C. Cervi, Essentia Castorei & Aquâ antapoplectica Hartm. permixto. Quando autem mali occasio ab intempestiva Fonticulorum exsiccatione orta videbatur, nihil potius duxi, quam itagnantem in Cerebri Continuis humorem Vesicatoriis revellere. Itaque protinus quatuor Vesiculas binis scapulis & totidem brachiis, singulis unam, imposui jussi. Vesperti rationem dari curabam ex aqua Hirundinum comp. II. Lilii, Lilior. Conv. Pulv. March. Cinnabari Antimonii & Sale volatili succini, & Symplo II. Peroniz. Sed neque his neque illis quidquam profectum, donec tertio die post ultro mitesceret Paroxysmus, & æger ad se rediret. Altera nocte subrepens sitis inexhausta novum portendere malum videbatur, nam que nulla eadem potio domare poterat infelici aspicio; quamvis enim convulsiones nullæ subsequerentur, morbus tamen ipse in insaniam aut furoris quoddam religiosi genus transisse vide-

batur. Totos enim dies voce violentissima sanctissimum non en Jesu ingeminabat, neque ullis vel precibus aut delinientis conprimi se patiebatur. Inde ad æque absurda prolapsus lecto se effert in penam si nec volebat; nec mora, quin, ut erat nudus, pavimento se committeret, & quas poterat conquerere imagines gypseas, manu prehenderet pectorique vehementius applicatis non en Jesu imponeret; has deinde sibi assertas in lecto attentius inspiciebat & velut religione quadam prosequabatur. Sex totos dies pius hic furor ægrum occupabat, atque inde viginti quatuor horarum somnus paroxysmo deliriique finem imposuit. Tertio ab invasione die pulitæ lividæ humidæque in carpo manibusque emerlerant, manifesto indicio, repressam à Fonticulorum consolidatione materiam novos sibi exitus & latibula querere. Cum hinc denique convaleuit, sed ita, ut morbi immunitatem spondere sibi non posset. Neque ex illo morborum genere hic est, qui, ubi per annos invaluerit, solent *sanari*. Notent autem vel Medici, aut qui cum hoc morbo conflictantur ægri, quando semel vel vulnere aut Fonticulo corpus affuevit, non temere tentandam esse consolidationem; nam sæpe etiam ex illo invadit, quæ ante non erat, Epilepsia, & quæ erat, gravius quam olim insurgit, quod jam priori exemplo vidimus; at nunc, quam in corpore etiam ab hoc morbo immuni curata vulnrum siccatione Epilepsia orta sit, memorabili historia recensito. Adolescens septemdecim annorum, Pharmacopœi & filius & famulus, tristioris, ut videbatur, animi, laboraverat tota hyeme inveteratis pedum ulceribus, quæ consolidationem sæpe tentatam semper respuebant; cum autem in illo pedum incommodo operis non sufficeret & negligentia ab hero argueretur, urget, inquit imperat Chirurgus, quavis arte excogitata ulcerum sanationem moliretur. Paret is inconsiderati Adolescentis precibus & vulnera data opera consolidat. Vix abierant quatuordecim dies, cum Luna plena, cujus in hoc affectu fovendo vires voluntarie quam magnas, in Epilepsiam incidit periodicam inque dies statis horis redeuntem, tribus ante & totidem post meridiem Symptomata tamen uno die remissa, quam altero. In Paroxysmo nullius rei nec sensus nec memoria. In intermissione quies & tranquillitas, & quamvis mens illi constaret, tamen nec cibo nec voci commodare oris usum vel veratustoto illo tempore voluit. In Paroxysmo manuum convulsiones erant gravissimæ, quæ nisi molliculare, pulvinis pannisque in cavum earum intrusis fulcirentur, damnum patiebantur, imo & Paroxysmus, quæ seminatæ erat sollicitudo, diutius perseverabat. Pectoris autem mirificæ erant in omnem partem contortiones, respiratio frequens correpta & intermissa. Diaphragmatis musculorumque intercostalium tam vaga erat atque incerta reciprocatio & velut undulatio ut, qui officium facerent, non facile dignosceres, adeo nulli in totum, omnes ex parte se contrahebant, senè nudato pectore potius crispari aut fluctuare musculos quam contrahi dixisses; & si ulli in vivis, certe hic musculorum & fibrarum motricum varios quasi versus & statum agnoscere licuit. Venæ sectio, quamvis



turgeret sanguis, nihil proficiebat. Vesicatoria pone aures admissa nullum præstabant emolumentum. Iurgatio omnia averfanti & velut ecstático obrudebatur. Constabat autem ex Sennæ Agaricique partibus, sed correctis, storumque Rosimarini, Stœchados Arabica & Acaciæ pugillo in aquâ Decoctis, quibus ad augendum vires aliquid spiritus Liliorum convallium & salis Ammoniaci addebatur. Atque his quidem alvus commodè purgata nihil tamen Paroxysmorum imminuit tenorem, ibant enim redibantque iisdem numeris & pari vehementiâ. Quatuordecim autem dies inlesu erant hi Paroxysmi, cum sanitatis spes affulgere cœpit. Interea mirandum erat intra decem dies nihil prorsus ægrum vel edisse aut bibisse, semel duntaxat, idque rogatum, potionis aliquid adnihil. In hoc tumultu morbi que vehementiâ repertus est, qui suaderet spiritus Vitrioli usum, ejus namque Drachmâ in aquâ Bertonica per Syrupum Stœchados temperatâ Paroxysmum propulsatum se vidisse affirmabat. Itaque hujus honori, quod Medicinæ sacra degustasset, vesificaturus jus si addi in misturam Cephalicam aliquid spiritus Vitrioli, sed nec feliciore, quàm ante, successu, sive quod famâ magis quàm experimento constaret spiritus hujus usus, sive quod qui in officinis venit vulgatis, nihil sapiat Philosophici, crudus nimium & acris. Postquam ergo nec Cinnabarinis nec Salibus volatilibus expugnari potuit morbus, attrivit tandem ipse post quindecim dies, & prodeuntibus cum singulis Paroxysmis sudoribus copiosis ægrum sibi Parentibusque omnia alia cogitantibus, imò optantibus, restituit. Deinde Fonticulo pedibus inulto immunis ab hoc morbo ex occasione nato vixit. De pulsu hoc testari possum, fuisse cum non multum sibi dissimilem tam Paroxysmi quàm intermissionis tempore, etsi tum paulo tenuior esset contractiorque. Dentium stridor in Paroxysmo erat continuus, nulla tamen ore spuma effuebat, quod alias frequentissimum. Illud verò semper mirandum, quomodo tam validis totque dies continuatis membrorum jectigationibus concussionibusque sufficere ægri, & tamen ita se gerere in intermissione possint, ac si nullis laboribus fatigati essent, cum vel minimum illorum magnam creare sanis lassitudinem eosque infringere soleat, quod in primo exemplo factum. Deinde, cum nihil in tam obstinatâ inedia suppetat, quod fluidi haud dubiè pereuntis vel absumti damnum refarciat, quem in modum fibræ inflandis ac tendendis tam diu pares esse possint spiritus animales. At verò, si eisdem illos spiritus à musculis aut musculorum vel fibrarum ordinibus unis in alios, mutato duntaxat loco, transmitti quis supponat, utique facilius decerni poterit, qui tot tamque mirificis crispationibus spasmiisque sufficiant. *Idem ibidem.*

#### *Epilepsia Apoplexia superveniens letalis.*

Non infrequens alias apud nos est apoplexia supervenire epilepsiam, eventu quandoque bono, quandoque malo, ut multis exemplis probat D. D. Spindler. in observat. suis propædicandis. Hoc anno pellionis cujusdam

filii 12. annorum, diu, antequam ipsum inviserem, ægrotans, uno vel altero a me sumpto medicamento convalescere vius, redeunte appetitu, viribus, colore faciei &c. Ita constitutus derepentè aliquando in brachii dextri enormes incidit dolores, Jussi sumigari thure, agallocho, myrrha, &c. Cessavit dolor, sed manus intumuit, curiosius palrans tumorem, materiam subesse deprehendi. Commisus curæ Chirurghi, qui legitime tractavit & facta apertura, magna copia puris effluxit, consolidatum vulnus, motusque rediit. Hæc cum aguntur prægresso leuissimo dolore, paralyti corripitur totius lateris sinistri, institui frictiones cum lintheis calidis, aquis arthriticis, unguentis appropriatis, sed sine fructu. Altero die supervenit epilepsia gravissima, qua sinistrum tantum latus, quod alias immobile, mirum in modum convellebatur, dextro, toto durante paroxysmo, immobili ac quasi rigido manente. Finito paroxysmo, iterum motus rediit dextræ, mansit immobilitas sinistræ, ægrotus melius se habuit, comedit & tota nocte dormivit. Hoc in tertium continuavit diem, semper circa horam secundam redeunte epilepsia planè eodem, ut dictum, modo: Dedi laud. opiatum, & continuo suppressum malum, nec amplius rediit, usque ad finem vitæ, qui post aliquot dies secutus. Morbi enim longitudine confectus, viribusque exhaustus, placidè vix advertentibus adstantibus obiit. Credo paralyseos causam fuisse materiam, quæ in dextra per suppurationem fuit evacuada, hic autem nervis impacta hæsit, motumque impedivit; cur autem durante convulsione immobile manserit dextrum, convulsam autem fortissime atque hinc inde jactitatum sinistrum latus, non video, nec satis capio. *Dom. Caroli Raygeri.*

#### *Epilepsia Periodica.*

Non solum exactissimis periodis febres intermittentes intervalla sua dimetiuntur, & non minus quam fluxus refluxusque maris in macrocosmo circa genuinam causam hominum ingenia fatigant, sed etiam in morbis quibusdam Chronicis eodem mysterio non raro ludere solet natura. In Anno 1. Miscell. Observ. si. exhibuimus Hemitaniam Periodicam, Delirium Periodicum Salmuth. Centur. 1. Observat. 63 nunc subiungemus Epilepsiam Periodicam, non ad menstrua Lunæ intervalla redeuntem, sed singulis diebus aliquoties recurrentem. Anno 1668. M. Nov. ex Polonia Nobilis quidam juvenis 12. annor. cum fratre natu majore è Volchinskiorum Nobili familia, Uratislaviarum studiorum gratia venit, & in convicium in Collegio Jesuitarum recipitur. Post aliquot dies motibus convulsivis corripitur, qui singulis diebus circa horam septimam mane, circa horam primam & sextam pomeridianas, statò semper tempore redierunt, indices tamen ingravescentes. Principium affectus sensit provenire ex contorsione pollicis in dextro pede, unde postmodum miserime contortum & intortum fuit corpus, salvis manentibus sensibus per primos dies, postmodum vero ingravescente malo in



in paroxysmo omnes sensus deperditi. Cum in consiliū vocarer causam investiganti relatum, utrumq; parentem familiarissimo Polonis morbo, plica scilicet laborasse in lenio potissimum, cum hic filius natu minimus conceptus fuisset. Unde non levis subiit suspicio, corruptum a latente Plica sanguinem hosce motus suscitare, nec forte desituros nisi natura plicam istam ad exteriora expulisset. In hoc casu hoc singulare animadverti, quod toties, quoties ant-Epileptica Medicamenta autnerentur, Paroxysmus anticiparet. Inprimis id observare licuit post exhibitum spiritum acidum ex Vitr. Ven. quem alias D. Zvvelf. pro singulari deprædicavit Antiepileptico; vixeo ad paucas guttulos deglutito, commota materia extraordinarium Paroxysmi tempus antevertens statim contorto pedis pollice & incurvato corpore, convulsiveque membris Paroxysmus se manifestavit: cui tandem non adhibuisse sanitatis Præfecto hæc narranti, nisi ipsemet bis vel ter eundem spiritum exhibendo vidissem in momento excitatum tuisse Paroxysmum. Constitueram ad eradicationem hoc malum tum tentare expulsionem plicæ, tum ex mente Excell. Willisi in tract. de Morb. convuls. ligaturis stricioribus Paroxysmum vehementiam frenare, aut quod Excellent. Nic. Tulpus lib. 4. observ. 2. in Epilepsia a pollice pedis proveniente feliciter observavit, imponere cucurbitulas angulli oris articulo dolenti ad eliciendum venenum, admoveere pollicis ferrum candens, & inurere ibidem ulcus ad os usque penetrans: sed cum ipsius agnati morbum hunc ex fascino ortum falso sibi persuaderent, & agrum in Poloniam revocarent, curatio hæc methodica impedita fuit. Similem Epilepsiam periodicam narrat. Excell. D. Theodorus Kerkringius observ. Anatom. 71. pag. 142. in puella 17. annor. quæ ægramter singulis diebus aggressa est, nimirum hora 7. matutina, 10. & sub noctem hora octava, quæ tempora integro anni vertentis spatio servavit accuratissime, sensitque morbum per dextrum crus ascendere. Phil. Jac. Sachs à Leveenb.

#### *Epilepsia ex ipsius terrore inducta*

“Scribit Christophor. à Vega l. 1. de Arte Medica cap. 12. se vidisse quendam, cum altantem inspexisset eum qui in comitalem morbum inciderat, subito eo malo correptum fuisse: Talem ego recordor fuisse juveniculam quandam prius a vice gravidam, quæ præ foribus adium propriarum stans, nendicumque Epilepsia laborantem, prætereuntem, & paroxysmo Epileptico obrutum videns, mox eodem affectu prehensa obiit misere. Novi etiam quendam Excell. Medicum, Serenissimi cuiusdam Regis Archiatrum, adhuc viventem, qui neminem Epilepsia obnoxium in ipso paroxysmo inspicere, multo minus rogatus, tali agro opem Medicam ferre potest, adeo ipsi morbus hic terribilis est. Simon Schultze.

#### *Oculorum splendores Epileptici funesti.*

Verissime Hippocr. l. 1. Prorrh. & l. 2. Coac. prænot. Quibus convulsis oculi intente relucet, neque apud se ipsos sunt, & diutius æ-

grot. ne: Solent enim istiusmodi ignitos splendores creberrime sequi funesta Epilepsia, ut exemplum a D. Heublero communicatum in Capitaneo Regie navis adducit Exc. Bartholinus Cent. 3. histor. observ. 45. & de Laura femina Marc. Donatus l. 1. Histor. Medic. cap. 8. quæ per aliquot dies globulum ignem sibi videre visa est, qui postea in magnam flammam excrevit, deinceps melancholicis & Epilepticis synptomatibus per intervalla vexata. Thomas Bartholinus, in de Luce Ann. cap. 6. pag. 33. causam refert ad lucidos spiritus animales condensatos & vi ex nervis expressos. Similes casus in praxi videre mihi contigit, Anno 1667. Joan. Georg. Hank, Uratislaviensis Chirurgus, experientissimus & decemaliter India Orientalis peregrinatione clatus, (adeo, ut testis Arnold. Monacho in descript. Imper. Japonic fol. 368. Sickingodome & neollarius Regni Japonici in urbe Jedo, cum legationem Bataviam comitaretur, cum ipso verba fecerit) extor itineribus vario sub celo & aere peractis valeatunarius per aliquot annos, inopinato Epilepsia corripitur, Adhibita varia fuerunt remedia, & quidem eo cum successu ut videretur malum esse debellatum. Sed dum per aliquot dies conquereretur de splendoribus igneis & globulis flammæ continuo ante oculos volitantibus, & visum depravantibus, tandem tan vehementer ab Epilepsia correptus fuit, quæ nullam pausam fecerit, nisi cum ipsa vita extincta fuisset. Eodem anno femina quæ in cachectica 46. annorum, variis variorum morborum symptomatibus conflictata, demum splendorum igneorum molestias continuo oculos f. rigantes, accusavit: Ego prioris exempli optime memini, malum exinde astantius pronuntiavi augurium, & instantes motus convulsivos, quæ ante nunquam periculeret prædixi: qui etiam nondum elapso biduo supervenerunt, tanta cum vehementia ut agrum in ipso paroxysmo strangularent. *Matthias Bernardus à Berni.*

#### *Epileptica à spectro.*

Honestæ quædam femina, morbo satis gravi vix liberata, & adhuc titula in brachio iterum aperta molestata, post inopias peractas vix duas vel tres septimanas melius se habere visa est. Accidit ex improviso, ut in vicina Mulica audiretur, juvenculus ejusmodi acceptissima, illa de lecto surgens, fenestram aperit, at mox miseræ ex ipso tecto nigrum quippiam ante oculos pedesque videtur decidere, cum tremore & dentium stridore illa sese ad maritum in lectum confert, iterumque de horrore febrili conqueritur. Ego adveniens manè bezoardicum propinquorem provo, cordialia præferendo. Sed illa crebro in lecto exhorrebat tota, claudit os, ut ne specillum quidem admitteret, tandem accedit Epilepsia ipsa, miseramque post unum atque alterum paroxysmum e medio vivorum summo cum mariti mœrore eripit.

Schollen.) Mathias Untzerus lib. 1. de Epilepsi. cap. 16. §. 11. inter causas Epilepsie externas dæmonem seu spiritum malignum, qui corpus exagitat & materiam ad cerebrum defer-



Vert. recenset. Et certè Diabolum esse spiritum malignum notum evadit è Scholio Obser. 18. ubi è cista Medica Hornungi attuli, etiam pellem a terrore ortam. Si itaque pellem Diabolus per terrorem potuit inducere, quidni Epilepsiam? Huc accedit, quod Epilepsia vocetur morbus dæmoniæ, inò Theologus Angelus, referente Thom. Willis in Pathologia cerebri cap. 1. audeat affirmare plures dæmoniacos in Novo Testamento tantum Epilepticos fuisse. Puto itaque materiam acrem & malignam a præterito morbo adhuc in capite vel ipso cerebro superstitem latuisse, (residuum aliquid materię peccantis adfuisse, fistula in brachio testimonium exhibet,) illam vero Diabolum per terrorem spectri agitasse, & maligna qualitate imbuisse, (malignitatem spectris induci testatur oris & nasi exulcerationes eorum, qui ea viderunt) & sic per irritationem Epilepsiam & per illius atrocitatem mortem induxisse. *Daniel Vincleri.*

#### *Epilepsia à Lapsu curata.*

A casu Epilepsiam ortam cum rarioribus symptomatibus refert Dn. D. Schubart, Collega charissimus. Sed unde hæc orta sint symptomata, tam principium quam solutio morbi ostendunt. Nam V. S. à principio intermissa, & sanguini affluxus liber ita permissus: in fine & solutione morbi videmus materiam peccantem, & sanguine concreto collectam, rejectam esse. Et ita sapius errores committuntur, ob non accersitum a principio medicum. Afferam simile exemplum, ubi à principio recta methodo cura instituta, pessima symptomata facile manus victas præbuere.

Ancilla quædam spiritu vini onusta cecidit in glacie alliso admodum capite, attonita jacebat cum obmutescencia, usu oculorum & aurium privata, ita ut quasi mortua domum portaretur. Cum Chirurgo adveniens, exploravimus, an aliquid fractum esset vel in capite vel aliis partibus, ast nihil animadvertere potuimus. Mox nobis præsentibus Epilepsia corripitur, præcedente anxietate & angustia pectoris. A paroxysmo liberata, V. S. instituto in brachio dextro, & rediit ad se, remittente simul pectoris angustia. Dedi duabus vicibus pulverem contra casum, & capiti dolenti solum è cephalicis adhibui, sic paucis diebus convaleuit. *Christ. Vincleri.*

#### *Epilepsia ex decocti hyoscyami fomentatione.*

Textoris cujusdam filia, quoties Mensium fluxum pateretur, toties immani capitis dolore vexabatur. Mater Empiricos adventantes omnes & singulos a consiliis incautum habuerat. Præterito anno quidam mirum quantum laudibus extulerat decoctum hyoscyami pro fomentatione circa vesperam adhibendum. Cum itaque 18. Novembr. Anno 1681. in caupona choreas duceret, & ex hac corporis agitatione nimium incallescere, Mensiumque tempus instaret, cephalalgia irruit; 19. ejusdem circa vesperam prædicti consilii memor decocto hyoscyami totus loco utitur, sed post semihoram horribilis supervenit Epilepsia matrem perter-

ritam ad me adigens, casumque filię cum remedi recitatione aperiens. Huic in ipso paroxysmo specificum cephalicum ex Cinnabari nativa & grana aliquot Castorei in aqua squamarum & ruta propinabam, cumque eo per aliquot dies continuabam, dein præmiso nodulo ex uterinis & emmenagogis, cum martialibus patientem plenarie, D. B. restituebam, & ut impostorum cautius mercari disceret, serio admoneram.

*Scholium.*) Hyoscyani lethale venenum in sinu suo abcondere, ideoque ex toto medico esse eliminandum, multi sunt qui statuunt; quamvis autem ejusdem in operando vehementiam, & ita, si intempestive aut nimia in quantitate adhibeatur, nocivam admodum qualitatem, quam tot exempla apud Autores passim notata testantur, negare nemo possit, tunc tamen in usum vocatus salutaribus non omnino caret viribus; unde eundem Hippocrates lib. 2. de n. orb. in quartana commendare sustinuit; conferantur etiam, si lubet, Pharmacopœiæ August. à me restituta pag. 141. & 142. Ipse Dioscorides licet in lib. 6. cap. 15. venena inter reponere cum non dubitaverit, lib. 4. tamen cap. 63. solia medicamentis omnibus dolorem sedantibus per se, & ex polenta utilissime imponi perhibuit. Quare in hoc casu Epilepsiam excitaverit decoctum hyoscyami pro fotu adhibitum, jam paucis videbimus. Sanguinea scilicet massa, multis dubio procul impuritatibus gravata, & jamjam per instantia catamenia, non sine quadam fermentatione & impuriorum partium evolutione, deplenda, à vehementiori corporis agitatione in hæc præcipua concitata impetuosius in cerebri membranas cum irrueret, adplicatum illud medicamentum, narcoticas suas atomas confertim inspirando, impuras biliosas sanguinis partes altius cerebro impegit & quasi in centro detinuit, quæ salino-sulphureis fœtidis atomis junctæ convulsivas illas irritationes commovebant. *Christoph. Seligeri.*

#### *Epilepsia ex incanto usu Olei Juniperini.*

Epilepsie varias, & nonnunquam satis mirandas causas apud autores passim reperire licet. Haud absimilem, & forsitan hæcenus adhuc non observatam jam subjungam. An. præterito 1669. mense Febr. honesta hujus loci Matro. sexagesimum ætatis anni supergressa, corripitur doloribus Nephriticis sibi familiaribus. Utitur igitur per aliquot dies remediis domesticis, Emulsionibus scil. Oleo amygd. d. Enematibus, aliisque, quæ mulierculæ adstantes suppeditarunt. Tandem accessit vetula audacissima, fama curandi inter mulierculas celebris, quæ, pro more horum hominum, repetito jurejurando præsentissimam pollicetur opem. Et, quo major ei adhibeatur fides, & hanc, & illam, & istam, in instanti à doloribus Nephriticis immentis, ipsaque inde imminente morte, se liberasse contendit. Ægra cum adstantibus nil aliud quam id quoque exoptantes, consentiunt facile, & salubre illud remedium maximo cum desiderio præstolantur. Sic igitur vesperi medicatrix accedens, secum affert Oleum Juniperinum destillatum, urpote vulgi Nephritide laborantis Panacæam; Ægra, ubi medicamento nomen resevit, primum quidem illud assumere renuit, dein verò dolori-



doloribus & persussionibus victa, quicquid cum cerevisia mutum ei propinaverat anilis ille Machaon absorpsit. Sed ecce, vix cochleare exhausserat infelix Matrona, dum simul quoque de medicamento nimia doli viribusque gravioribus conqueri coepit. Subsecuti mox intensissimi capitis, & imprimisincipitis dolores, ructus frequentes, vomitus, lipothymia, & tandem Epilepsia. Quibus omnibus amici consternati, sub mediam noctem me in subsidium vocant. Accedo, quæ facta sint, audio, muliercularum credulitatem reprehendo, vetulam graviter increpo, columque tractare jubeo, & factio prognostico ad curam me accingo. Quia autem ægr., hinc primo Paroxysmo Epileptico, ob gravissimam sitim plurimum cerevisiæ secundariæ ingurgitaverat, eademque ante accessum secundi Paroxysmi per vomitum rejecerat, simul quoque oleum juniperinum rejectum jam esse conjeci, clystere revulsionis gratia sollicitata alvo, alterantia atque antiepileptica, non neglecto Cranio humano preparato, quippe cuius vires antiepilepticas haud satis deprecari possum, præscripti, quorum usu morbus comitialis ita per Dei gratiam debellatus fuit, ut discusso tertio Paroxysmo amplius non redierit, & ægr. post elapsas duas septimanas pristinam sanitatem recuperavit. Et licet rursus per totum ferè hunc annum 1670. Matrona hæc pietate inelyta e calculo ream decubuerit, de dicto tamen morbo hæcenus ne levissimum quidem sensit insultum. D. Georg. Segeri.

*Ex casu Epilepsia cum symptomatibus rarioribus.*

Juvenis 17. annorum, Textoris cujusdam discipulus, ante biennium per scalam 20. graduum præcipitem graviter decidit super hypochondrium dextrum, subsequente dolore & tumore; vocatus barbitonior, inunxit locum dolentem, & superposuit emplastrum, paucos post dies sequitur vomitus grumosi sanguinis copiosus & frequens: aditantes ob metum periculi vomitum siliunt, paucorum dierum intervallo, ab una vel altera bucca panis fermentati, corripitur motu convulsivo totius corporis, sat gravi, sensibus tamen illæis; varia mox adhibita curationis, tum præservationis gratia, sed, quod notandum, a spirituosius & aliis specieis odoriferis internis & externis, calci pedum licet applicatis, motus illi convulsivus exacerbat, ut miser homo posthac nullum odorem seu suavem seu foetidum, etiam in longinquo, sine convulsione, perterre potuerit. Ex minima enim mica panis fermentati deglutata vel saltem olfactu percepta, ab esu carnum tam allatarum quam elixarum, lotionem pedum ex aqua calida, iusculis, medicamentis, &c. Paroxysmo nunc graviore, nunc levioze, prout latio major vel minor, correptus fuit. Breviter nullo cibo vel potu ultra annum usus est, excepto pane azymo, melle, lacte crudo, passulis minoribus & majoribus; & sic nunquam vel rarissime ab interna causa proxima in ventriculo hærente, sed semper & solummodo ab externis ingestis vel applicatis, iste motus convulsivus excitatus est. Quamprimum enim panem fermentatum deglutiret singultus obortus, quia materia putrida in ventriculi fundo,

tanquam parte nervosa latens, à fermento panis, seu vaporoso, commota, unde statim à deglutitione illa pars linguæ correpta, mox hujus materiæ vapores per nervos cerebro communicati, hinc ad principium Medullæ spinalis protrusi, universum corpus motu convulsivo prehensum. Percussio enim vel affectio cerebro ventriculus turbatur, & vomitus nunt, maxime in Hemierania: Quid miremur, si vicissim ventriculo affecto, cerebrum totumque nervosum genus compatiatur. Oblatus mihi iste juvenis elapso anno sub finem Mensis Augusti, ubi cum ex unica mica panis hoc triste spectaculum viderem, & quod medicamenta ob metum convulsionum nec acceptare, multo minus tolerare posset, prognostico derelinquendum ipsum statui, urgentibus vero consanguineis ultro, divina adjuvante gratia, desumpta indicatione à juvantibus ac ludentibus, remedium singulare in forma sal. inven, virtutis incidentis, attenuantis & discutientis, & causa proxima (nam sublata causa, tollitur effectus) quod ipsum absque metu & exacerbatione Paroxysmi Convulsivi, condimenti loco cibus, (at inscio Patientē) immittum, quotidie assumit, & sane divino cum effectu. Sunt enim salia medicata introducta loco Decorum longorum, & videntur quibusdam unus esse valoris & efficaciz. Guilielm. Fabric. salia quidem illepidia vocat, quod non nisi corrugata fronte hauriantur: Sed recte Quercetan. in Pharmacop. Rediv. ablegat dubitantem ad experientiam, quæ habetur in diversitate salium; item ad sensus externos, saporem, odorem, &c. quibus constabit salia plurima plerumque conservare virtutem simplicium suorum: hinc dantur sudorifera, diuretica, cephalica, stomachica, deobstruentia, anodyna, &c. Post usum prædicti sal. nulla amplius convulsio secuta, sed spatio 14. dierum, præcedente pruritu artuum, ibidem scabiosus factus, hinc continuavit hoc medicamentum ad 6. septimanas, donec, fortè satis præparata materia, natura exsuscitata, eam per vomitum & alvum eiecit, quæ excreta, laxativo reliquis per vias eduxit. Ex eo ita convulvit, ut non solummodo pristinam artem textoriam denuo resumere, sed & liberè sine metu recidivæ convulsionis pane fermentato, carnibus, &c. & us omnibus, quæ ante cane pe us & augue fugerat, innoxie trui & vesci potuerit. Godofred. Schubart.

*Epilepsia & Insania à venæ sectione sub lingua.*

Haud incongrue loquitur Rozack à Præbien in *Fragm. Spagy. de Pæleb. cap. 2. pag. 21.* Sanguis in venis & arteriis contentus, live illis paucus sit live multus, thesaurus tamen est tum vitæ tum mortis, & completitur semina sanitatis & morborum. Ideo non potest vel debet a quolibet impune effundi, nec etiam ab aliis suaderi, quam qui semina & matrices morborum à nutritivis principiis discernere & separare sciunt, cum æque multa incommoda ac commoda derivari possint in hominem sine ratione ad phlebotomiam suadendam vel admittendam primum. Ergo & Galenus & Avicenna quanto magis medendi artem exercuere, tanto semper timidiore erga phlebotomiam facti sunt, eò



quod plus trahat phlebotomia ex naturali & bono & ex spiritibus, quam ipsa pharmaca; ut verbis utar *Seileri l. de catarro*. Prima igitur in morbis curandis ut cautela, an vena secanda? sed cum hæc non sufficiat, altera adjuvenda, quænam vena eligenda? ubi multi perperam accipiunt sententiam *Walai*, qui circulations sanguinis insitens dicit: nihil referre quæ vena secetur, modo in superioribus superior, in inferioribus vero morbis inferior vena eligatur, adeoque putant nihil discriminis esse in eligenda vena. Sed *Clariss. ille Vir* hic loquitur de venis communibus & usitatis, scil. in brachijs & pedibus, & tamen secundum morbi sedem venam eligit. Revulsionis enim omnino ratio habenda, cujus proprium in contrarium avertere, & a parte nobili in ignobilem, minime vero contra. In observatione mea superiori enarraui infelicem venæsectionis sub lingua eventum, ubi scil. ægrotus mortis alumnus factus: Alteram de eadem materia proferre aumus est, ubi quidam per venæsectionem sub lingua in fauces mortis quidem detrusus, sed tamen ex illis ereptus est. Civis quidam *Bregensis* pleuritide spuria cum febre maligna laborans Chirurghi opem implorat, qui nescio quale julepium ipsi præbet ac simul venas sub lingua aperit. Ægrotus circa vespæram saltare prius, deinde irasci omnia frangere & præfentes verberare incipit, ira percitus in Epilepsiam satis gravem incidit, ita ut furor Epilepsiam præcederet, & illius remissionem insania sequeretur. Accersitus invenio ipsum sub manibus duorum virorum robustorum, quorum tamen robur non sufficiens erat ad eum detinendum; truculentus erat, omnibus mortem minabatur: nihil de medicamentis assuñebat, omnia respuebat. Adhuc duos (ut quatuor essent) viros robore pollentes nactus, ut in lecto prostratus jaceret, curavi. Præscripsi bezoardica cum ant-Epilepticis mixta, occasione invigilans, quando Epilepsia remitteret, tunc enim os apertum manebat: ubi quantum cohelear unicum medicamentum caperet, saltem infundere potui. Cum parum in tam pauca quantitate exhibitis hisce proficerem, sequens unica vice infundebam:

℞. Aqu. ceras. n. ʒiij. lap. bez. or. ver. ʒss. M. Horis duabus elapsis remisit Epilepsia cum furore, sed tamen inconvenientia loquebatur, delirio adhuc durante, neque vel preces vel pastorem vel me ferre potuit. De V. S. cogitavi, sed impossibile erat propter inquietudinem, medicamenta tamen tandem admittebat, paululum mansuetior factus, & post horam 10. vespertinam ad sanam rediit mentem. Dedi deinde antipleuritica, & paucis diebus ipsum annuente Divina gratia integræ sanitati restitui. *Guil. Christ. Windert.*

*Epilepsia, ex contusione capitis, gravissima ac diuturna, tandem tamen penitus profligata.*

Juvenis 22. quasi annos natus, athletici habitus, inter compotationem solemnem, exorta magna rixa, benè potus ab aliquot symposiastis in terram prostermitur, saxeo pavimento fortiter aliquoties ita illiso capite, ut inde in occipite paulo supra nucham cutis leviter intumesceret, sugillaretur, & nonnihil attrita

conspiceretur; quæ tamen intra octiduum ita iterum subsedit ut nulla amplius externa lætio appareret. Nihil autem minus altero statim a percussione nocte inopinato exorta a sanguine, proculdubio extravasato, concito, acido reddito, ac principium nervorum vellicante Epilepsia gravissima miseram Juvenem annuenter invasit, & per menstruum pene illud ipsatum, quo indies aliquoties cum excruciauit, ita viribus exhaustis, ut propemodum exanimis mortis candidus non semel videretur. Huic malo primo statim die venæsectione iterata obviam itum est, sed irritò sermè molimine. Sanguis enim mox restitit, nec fluere etiam altera vice, sicut incepit, ex vena licet rectissime tusa perrexit. Chirurgus capillos novacula abrasit, ut inunctiones atque inducra Emplastra efficacius penetrare possent, & ego cardiaca, cephalica & ant-epileptica decantatissima varii generis & diversæ formæ nullis parens sumptibus continue adhibui, quibus tandem tantum per Dei gratiam effectum est, ut epilepsia indies minor deprehenderetur, tandemque plane remitteret, salvo jam atque sic satis recte se iterum habente hæc perpeffo ægro, nisi quod de capitis gravedine præcipue circa lunæ phasæ & tempestatis mutationes adhuc subinde conquerebatur. *Georgii Abrahami Merolini.*

*Mors repentina ex morbo caduco.*

Anno Domini 1659. Mense Octobri, dum essem in Italia Ducatus Parmensis Oppido *Calestano* dicto, contigit quod *Donna* loci illustissima *Comitissa Tarascentina*, provecæ jam ætatis, ac fortis & robusta mihi conquerebatur se nocte, & mane dum surgeret, semper opprimi, & quasi suffocari, alias totam diem bonè agebat, nisi quod observatum fuerit aliquoties non a longo tempore eandem in orbo Comitiali laborasse. Ego ex animo oravi, ut hac oppressio illi oriri posset, tandem quæro, quo ritu solet decumbere? fatetur illa se prout ordinarie tollere noctem transigere, namque eidem locum decubitus, utpote periculosum: promittit illa obedientiam. At qui id uti huius tam omnes cubitum, in ne summo concludatur ab illutrist. ejusdem Domini Marito Illustrissimam Comitissam fato cessasse, Accurrit Illustrissima mihi, vocor ego, lustramus corpus delunctæ, invenimus situm prono capite in pulvum directo, obverso spumante ore, probabile morbo Comitiali superveniente, talique situ inventam luto-catam fuisse. *Joh. Jacobus Wenceslaus Dobrzensky.*

*Epilepsia rara.*

Anno 1678. Mense Januario l'uellam vidi Memmingæ, Davidis Hummelii tutoris filiam, 9. circiter vel 10. annos natam, quæ per vices, non sine veneficii suspitione, horrendis tentabatur convulsionibus epilepticis, quas intare nunc dolor quidam punctorius in externa aliqua, eaque varia, corporis parte, maxime in digiti indicis apice perceptus; nunc sensus quidam reptantis intra corpus animalculi, præmonuit. Paroxysmus aliquoties in die nunc sedentem, nunc decumbentem, quin & stantem non raro corripuit. Motus convulsivi fuere varii; post mensam sedens corpus coacta retro ad parietes alhsit, ante se quicquid in mensa occur-



occurrebat, manibus disjiciens: humi prostrata pedibus mirum in modum calcitravit, nec uno in loco hærens, huc illuc corpus provolvit: manibus prehensa, nullo membro flexilis tota rigida surrexit: stans erecta aliquando lecti, quo decumbebat, rectum, ponderosum licet & ei nemine annexum, capite contra nitens e sede sua movit. Per tres circiter horarum quartas partes paroxysmus duravit; qui hoc singulare habuit, quod eo durante ægra sensum tam internorum quam externorum usum non exuerit, interrogata quippe, qua nunc in parte punctiōnem sentiat, vel animalculum reptare percipiat? locum digito monstravit. Alia vice, dum paroxysmum sustinenti adlito, illa per fenestram cubiculi apertam hominem notum eamius vehementer vidit, & nomine suo, rauca licet voce appellavit. Biennium tunc erat, ex quo affectus hic prima vice in ea fuit notatus, qui eo quidem tempore, post multa remedia frustra adhibita, balsamo cuidam Magico, Sturgardia allato, cessit: Præterito vero anno, cum malum recrudesceret, nec balsamo modo laudato amplius obediret, V. S. profuit; quæ & hoc anno tertia vice redeunti, Menie Januarii medelam attulit, non diu licet durantem, paucis enim post menibus malum repululavit. Tum quidem menie Junio Emeticum illi fuit exhibitum, quod aliquot per gulam exturbavit vermiculos alatos seu scarabæos parvos, eo tempore circumvolitantes & floribus, rosarum imprimis, insidentes, & à Menie Junio in vernacula nostra *Bracke'ertein* appellatos, quorum ego duos vivos ab ipsa per vomitum rejectos ipse vidi, & manibus palpavi, brevi post avolantes. Curæ postmodum ejusdam sacriticuli Chymistæ comassa, an ab hoc affectu liberata sit, civitate dicta valere iussa, ignoro.

*Epilepsia mira, Melancholico hypochondriaca, mere Ecstatica.*

*Dn. D. Balihassar Timæus à Guldens'ee L. i. Epistolar. Epistola 9. p. m. a 20. usque ad 16. Epilepsia miram enumerat speciem Nobilissimæ pueri à Crocavæ, cujus motus præter & ferre supernaturales exinde dicuntur, quia puer ille adstantium manus clam subterfugit, parietibus se adaptavit, & mira celeritate eos ascendit. Quam historiam loco allegato fusius videre est: Miram, raram, & fide dignam chartæ concredo epilepsiam puellæ cujusdam annum dyodemum jam agentis, cognomine Rauteubergeriz. Hæc quoad externam faciem nigricans, torveque videns; profunda, sani adhuc dum corporis esset, & integra frueretur valetudine, semper meditabatur, ideo, & merito quidem, pro melancholica habebatur. Die 14. Maij anni hujus currentis, morbus quidam illam invasit, in quo membra extrema, manus & pedes, erant rigida, anxietasque maxima circa præcordia & cordis palpitatio eam defatigabat, ita ut præ dolore clamare, ejulare, preces ad Deum fundere cogeretur, morique cuperet. Morbum pro melancholia hypochondriacâ ex uteri consensu habebamus. Motus interni ab extra explorari poterant, pulsus erat durus & celer paululum, sed sine manifesto febris indicio. Sensus interni omnes, caput, oculique naturaliter erant*

constituti. Adhibitis decentibus medicamentis cordialibus, epilepticis, uterinis, vicinis, Deo benedicente, die tertio morbum gravissimum; surgebat postea, & ad nimia comiecta, ac in nunquam reditum sibi perinadentes. At die decima Junij, hora sexta pomeridiana immensi corripitur epilepsia cum subsequente delirio. Noctu dormit, sed anxie. Die sequenti aliam morbus induens larvam, epileptica antequam fieret, quod vigetis vel sapius de die factum, semper prius digito protento, torvo cum vultu ad angulum, ac si inibi horrendi quid videret, monstrabat, & quidem cum turore & exandescencia reclinans se ad latus dextrum, è veltigio insultus epilepticus se manifestabat, pollices in manus fortiter comprimendo, oculos hinc & hinc, quævis clausos, movendo, ex ore spumam emittendo, ommesque sensus amittendo. Explicatis pollicibus paululum quiescebat oculis planè clausis, postea prius brachium dextrum extollens digito desuper, mox ita & cum sinistro nutabat. Ambobus brachiis dicto modo elevatis manus comprimebat, ac si exciperet aliquem, pectorique admovebat; paulo post oculos aperiebat, & manus complicatas lubralisque, tartiter pectori applicabat, omnia tamen sine auditu, loquela & ratione, dem oculos apertos cum manibus complicatis ad cælum dirigendo, labia movebat, & momento temporis præteritio, sensus redibant omnes. Secundo morbi die tanto proferebat, se videre Jesum, sanctos Angelos, patrem, matrem, agnatos & cognatos in cælo triumphare & tripudiare, quare & ipsi esset tripudandum. Sequentibus autem diebus amissa, vel potius interdum omissa loquela, cum adstantes visiones superius recitatas ipsi in mentem revocarent, capitis nutu veras esse affirmabat, & exinde tale eam gaudium percipere præ se ferebat, ut manibus & brachiis extensis, iterum retractis, & cordi applicatis, capitis nutu, totius corporis elevatione, inconvulsionem, vibrationem, & pedum motu fortissimo, non aliter ac si jaciendo saltaret, hilariterque tripudaret, ac gaudium celeste cum blando aliquo risu adstantibus, preces ad ipsius voluntatem inaudientibus annuntiaret. Secundo morbi die articulata voce pronuntiaverat Dominum Jesum non inane, sed vesperi venturum, & in cælum eam recepturum, & hæc impressio unica erat causa, cur ad quintum usque omnia medicamenta, cibumque & potum respueret mortis cupida, quod & nos ægram in summo vitæ periculo versantem, concessimus, crisin expectaturi. Noctem determinatam non moriendo, sed placide dormiendo absolvit. Manè aliquoties redibant insultus epileptici cum supra scripto tripudio, igitur mortis cupidam morte consolandam ratus, utrum vivere, an mori veller, interrogabam. Respondebat voce vix perceptibili, lingua babutiente, sed ore ridente, & corde gaudente: Mori cupio, ut mox cum Jesu meo in cælo esse possim. En? morimur, aiebam, sanguinem mittendo, ut autem eo citius moriaris, & Jesum tuum videas, venæsectio erit adhibenda. Quanto hoc nuntium perceperit gaudio, vix dici potest. Hora post decimam media, absoluto prius tripudio consueto venam schiaticam minorem in sinistro pede (saphæa & reliquæ erant imperforata-



biles) secum ad uncias duas. Deligato vulnere incidit in animi deliquium adeo forte, ut me excepto, omnes mortuam proclamarent, brevi restituta, paulo melius mox habere cepit, sine ulteriori epilepsie recidiva & tripudii gaudio. Interim vires erant prostratæ, uri & appetitus, lipothymia interdum cor petebant, sed nihil factorum munnerat, nec mori amplius desiderabat. Die morbi septimo conque- rebatur de collo, venæ enim jugulares tumentes cernebamur cum aliqua doloris perceptione; circa meridiem laute prandebat, placide dormiebat die nocteque. Die decimo, ne malum recrudesceret, sedes utrum extirpari funditus posset, tentavi ab initio blandissimo laxativo:

℞. C. yllall. Tartari gr. xii. Tartari Vitriolati gr. iij. Resin. galap. gr. iv. Diagryd. sulphurat. gr. ij. M. F. Pulvis laxativus. Pars humorum peccantium decem dejectionibus imminuebatur, & sic purgatio cum *noxia* absolvebatur. De reliquis impotterum. *Melenior. Fribe.*

#### *Epilepsia ex Utero mirabilis.*

Anno Chr. 1659. puella pia, pulchra, modesta, ætatis anno tredecimo, inceperat quiritari angustias circa præcordia, evaporationes tulin- ginosas, anhelitus graves, post aliquot dies epilepsia correpta ad quinque sepe septimanas, singulis diebus semel vel bis insultus graves, interdum ad trihorium durantes, interdum breviores sustinuit, ab initio cum iactatione capitis & brachiorum ingente, inferioris vero corporis motu vix sensibili, sub interstitio paroxysmi unius ad alterum se bene habebat. Hæc quando sentiebat, veluti matri assistenti atque mihi ipsa indicaverat, vaporem e lumbis per dorsi spinam sursum nucham usque repen- tem, tunc oculi caligare inceperunt, caput postmodum & brachia jactabantur, ac subsequenter quasi cataleptica apertis oculis, sine omni corporis motu & sensu ultionem, servata tamen naturali respiratione, succumbebat; at sub hoc temporis spatio plena ac absorta voce clamavit, paulo post gallum cantantem sæpius imitata est, aut arguto & suavissimo sono melodias veriorum hymnorum in templo usitato- rum edidit, atque demum fatigata aliquantulum adhuc immota, tanquam dormiens decubuit, evigilans dein e sonno quasi profundo, mirabatur circumstantes, nec ullius quicquid sub paroxysmo egerit, vel passa sit, conuenio, nihil mali præter obtusum & exiguum dolorem capitis querebatur, ac omnia sua rursus, tanquam mente & corpore sana, subivit. Hoc autem malo, auxiliante Deo, præter plurimorum spem devicto, adhibitis clysteribus vapores discutientibus & revellentibus, assumptis pilulis melanogogicis, aliisque remediis hysteri- cis, quibus cardiaca & ant-epileptica permista, necnon sanguinis missione, itemque frictionibus, ac ventosis sine scarificatione in femorum interiori parte deorsum sæpius tractis menstrua prodire inceperunt, tuncque tam æcerbus morbus & enumerata symptomata omnia cessarunt, & ejusmodi malo ultro, præter unam alteramve vicem in subsequente solummodo bimestri, ac brevissimo quidem insultu puella infestata, deinceps optime semper valuit. *Helovigiu.*

#### *In Epileptico paroxysmo Risus involuntarius.*

Illustranda Persona epileptica per multos annos solet in Paroxysmo maxime & durare. De Risus natura & causis *Valletola l. 3. Enarr. 9.* multa reliquit, & eandem cum Combricensibus in lib. *Arist. de anim. cap. 3. Art. 6.* Tradit denominationem: Risus est concitator quidam animi ex re jucunda motus, ad conceptum intro Gaudium explicandam, quo thoracis & oris muscoli impetu quodam moventur. Secundum hanc denominationem hinc rursus verum risum non fuisse, quis non videt? Sed potius ortum habuit ex motu musculorum thoracis & oris impetuoso, à vapore acri & stimulante cum concitante. Et puto nunc vaporem simul Epilepsie causam extitisse, & ex utero ascendente; fuit itaque hæc Epilepsia, mea quidem sententia, non per idiopathiam, sed potius per sympathiam Uteri. *Hell-vius enim lib. 1. de morb. int. cap. 39.* in scholiis, varia recenset exempla illarum quæ uteri suffocatione laborant, & rursus involuntario fuerunt obnoxie. Ipse Convulsion- nes ex utero in Virgine adhuc superstitie vidi, cum delirio levi & risu symptomatico, quæ nullis aliis sopiebantur remediis, nisi exhibitis Cinab. nativ. gr. xvi. in Aquis ant-epilepticis & appropriatis. *Christ. Roesteri.*

#### *Epilepsia gravidam ejusque embryonem per 25. hebdomadas infestans.*

Friderici Waltheri Bibliopegi nostratis uxor, temperamenti sanguinei, annos triginta circiter nata, postquam Anno 1665. die 9 Martij uterum jam ultra quartum mensem gesserat, de dolore sinistæ scapulæ mane conqueri cepit, quem tamen ex casu in cellam ante paucos dies facto se contraxisse suspicabatur. A meridie nihil sinistri cogitans Convulsionibus Epilepti- cis gravissime corripitur, quas aqua biatruana, suminaque debilitas & paroxysmi aut epileptici exceperunt. Præscriptum tum varia ant-epileptica, sed quod magis illis utebatur, eò plures experta est Paroxysmos. Quod tum etiam ei ex assumptis contigit iusculis, aliisque edulis. Unde per integrum octiduum cunctorum vium ita respuit, ut vix unum aut alterum cochlear iusculi alicujus interdum, attamen agerit, ad- miserit, subsequente semper Paroxysmo aliquo. Qui tamen etiam, licet nihil quicquam assumeret, ei satis erant molesti. Die 16. Martii eduxit ei e pudendis albicans quidam atque lentus humor, cum horrore totius; quem excepit ter- rissimus animæ tortor, anxietates ingentes, inguinum dolores gravissimi, & summa virium prostratio, ita ut ad carpum motus arteriæ vix esset perceptibilis. Suavi usum Cordialium, & matrem fortumque roborantium, sed inutillâ. Orta tum est suspicio de Embryone extincto, quam præter continuum enimque de die in diem ingravescentem anhelitus fortorem, (quem ubi prægnans ex inferiori ventre ascendere sensit, simul quoque Paroxysmum instare præsensit) auxit motus Embryonis ab initio morbi hucusque à matre non observatus. inferioris quoque ventris refrigeratio, & aliqualis gravitas. Et quia ab externis; quæ mulierculæ pro vi fetus sopita exsuscitanda applicare solent, nullum per-



perceperant emolumentum, fœtum extinctum esse pro certo affirmarunt, neque ad illius expulsionem adhortati sunt, sola ægra id renuente. Ego licet ex tot denotatæ fœtus lignis præsentibus in illarum partes haud gravate transierim, vix tamen pluribus persuasionibus id obtinere potui ab ægra, ut aliquando cochlear aquæ Cuiam cordialis assumeret, cum & illius usu Paroxysmos acceleraret. Contigit die 19. Martii a meridie, ut mater ægræ me absente ad usum cochlearis dictæ aquæ, cui pauxillum aquæ lil. Convall. cum vino destillatæ admiscuerat, adegerit uliam, quo assumpto, insignes primum motus in abdomine experta est ægra, quos Paroxysmus insequatur gravis. Et ab hoc tempore motu fœtus percepit ægra, qui licet alias satis fuerit debilis, interdum tamen, & quidem eo semper tempore, quo ægræ imminabat Paroxysmus, iusto vehementior ac inordinatior erat, ut tætu n. primum, post matrem coaveili, extra omne esset dubium. Quasi usum ant-epilepticorum & confortantium fœtum internum, sed quia assumptis his frequentiores numeravit Convulsiones, omnem omnino usum Medicamentorum internorum respuit ægra. Fateor, quod cum me præsentem vel tantillum pulveris marchionis aut balsami embryonis hauserit, mox quoque Paroxysmum instare e convulsivo fœtus motu præsenferit. Cibi verò & potus usus moderatior non ita jam erat noxius. Unde me quoque suadente soli naturæ ejusque Autori Deo Omnipotenti res commissa, imprimis cum Paroxysmi non adeo crebro ægram infestarent, & ita vegetior jam exillens, domesticos labores satis commodè expediret: nisi quando convulsiva fœtus agitatione, quæ à solito ejus motu plurimum differebat, de instante sibi Paroxysmo præmonita, lectum repetere cogebatur. Sic misera inter spem atque metum molestum trivit tempus, donec tandem die 21. Augusti exoptata affulgeret partus hora, qua adhuc his graviter convulsa, in ipso Paroxysmo posteriori infœcia peperit filiolum egregium, sacro Baptismatis fontem me sponse expetitum. Atque ab eo tempore nec mater, quam hæcenus per 25. hebdomadas morbus Conitialis satis strenuè exercuerat, nec filius, similes sentire insultus. Vivuntque ambo adhuc per Dei gratiam salvi atque incolumes. *Georgii Segeri.*

#### *Epilepsia in prægnante.*

Domini *Alschioris à Senis* uxor gravida, passa est periodicum dolorem circa inguina & dorsum, ventris etiam inflationem: hæc in tertiam septimanam duraverunt cum calore quodam febrili & dysuria. Postea 8. Martii mane habuit paroxysmum epilepticum, qui quindecies rediit. Ultimis 9. Martii accessit circa horam 9. A Paroxysmo semper dormivit, quandoque se movit & crexit in lecto anxie. Ad quæsitam non respondit, nec visu agnoscere quæquam potuit. Post ultimum paroxysmum quævit ea parte diei & nocte sequenti 10. Martii. Cæpit autem eo die ad se redire & 11. Martii benè se habuit. Sequenti nocte circa horam secundam post mediam noctem cæperunt dolores partus, & hora 9. enixa est filium sanum, ipsaque sana vivit.

In Mulieribus cachecticis, commotis circa partum humoribus peccantibus circa uterum stabulantibus, a tetrivis vaporibus ascendentibus Epilepsiam oriri haud mirum; illas a partu evadere, non sempiternum est. *Jacobinus* quidem ad c. de Epil. Rnatis scribit: Et ego prægnantes aliquas Epilepsia affectas vidi, & sanatas sunt partu, non prius. Sed mihi videtur illas sanatas in quibus materia peccans non copiosa & tantummodo circa uterum collecta fuit, ita ut ab illius excretionem alleviatio necessario secuta sit; ut in Fabri lignarii uxore vidi quæ paucis adhibitis remediis partu subsequente ab atroci Epilepsia evasit, infante mortuo. Contrarium accidit in Viri nonoratoris uxore admodum cachectica & morbis debilitata, quæ ante partum Epilepsia affecta, enixa est puellam ipsam planè infœcia, in Paroxysmo scil. degens: post partum soporata mansit, & horis 4. a partu elapsa animam Creatori reddidit, puella adhuc in secundum diem superstitit. *Christophori Kæstl.*

#### *Epileptica mulier sanata medicamento Ant-epileptico per Chirurgiam infusoriam in venas immisso.*

Mulier 35. & Ancilla Virgo 10. annorum, horrendum in modum affligebantur Epilepsia, ut parum boni de cura harum sperare daretur: Ambæ illæ subibant hæc operationem, qua in venas earum infundimus laxativum medicamentum, dissolutum in spiritu Ant-epileptico. Prima harum aliquot horis post injectionem senas habebat sedes, & postridie illius die Epileptice convulsiones subinde redibant, sed multo lenius, tandem evanescere. Altera autem, nempe Ancilla, eodem die quatuor habuit sedes, & aliquot postridie, sed aëri se committens, nec observans dietam, semetipsam perdidit. Notatu dignum est, omnibus commune fuisse vomere mox post infusionem, idque violenter & frequenter, cujus rei rationem assignandam relinquimus eruditæ Medicis. *D. Fabri, Medici Germanici, in Actis Philos. Aigl. Dec. 1667.*

#### *Epilepsia Fœmina parturientis.*

Anno Domini 1670. die 14. Julii vocor circa ipsam meridiem ad uxorem cujusdam lanionis, quæ alias sana & robusta, tempore debito doloribus partus affici cæpit, id est nominata die circa horam 7. matutina accurrit obitetrix, sequæ ad ea accingit quæ conveniunt, interim fœmina primipara, & quidem adulta ætate maritata, ingentibus doloribus partus excruciarî cæpit, quos subsequuta sunt tantæ convulsiones totius corporis ab hora 8. usque meridiem ipsam perdurantes, ut 4. fœminæ robustæ habuerint quod agerent ad retinendam fœminam in lecto. Præcipuum, quod observatu dignum, erat uterus fœtum continens; videlicet cum stupore in eodem tam variis inordinatis flexibus jactatum infantem, ut sine omni dubio eundem mortuum, ossaque omnia in eodem comminuta proclamasset, ita etiam omnes adstantes redebant. Ego casui tam horrido adstans, ne numeri meo deessem, cum ad intra nil propinare ob continuas convulsiones liceret, hoc sequens linimentum ordinavi, quo eidem umbilicus inungebatur.



24. Axung. Cast. 3j. Salis 2℥. Satur. 3. M. femori Chirothecam odoratam alligari, naribus foetida applicari, ad intra per occasionem si liceret præberi Aqu. Hystericam cum pulv. March. Aureo vitæ, inicitur. Luna juli. Sed unctio bis ter vè spatio mediæ horæ repetita, me jam absente, ecce quies inopinatæ & pax naturæ, præsentia formæ reddita, vix obstetrice advertente, edidit infantem, omnibus obitupescens, sanum & saluum: Vivunt mater & infans hodiernam usque in diem incolumes.

Quid amabo causæ tantarum furiosarum convulsionum in foemina sana, & nunquam simili affectui obnoxia, an nuntii dolores? an difficultas divaricationis locorum genitalium viam foemini de more stermentium? Ut pote quæ jam 30. annum accedens de natura difficilior, ad laxationem eorum, quæ constricta fuere, an alia fors interna causa? Sed ab hac aut antea, ut jam sæpius sese affectus idem insinuasset. Ab eadem causa dependere mihi videntur casus illi, quos duos ipse observavi in juvenibus ætatis 15. Annorum, qui de repente ingentibus convulsionibus agitati, unus quidem longiore tempore quàm alter, repetitis paroxysmis; tandem cujus causa hæc accidere? Natura parturiebat, & oh hunc futurum partum tantos contus cum discrimine vitæ moliebatur. Quinam autem tandem ille partus fuit, si non ridiculus nius, saltem formidine plenus dens sese prodidit. Constatum horum naturæ causam explicare hic labor, hoc opus, meum hoc excedit adhuc intellectum, Joh. Jac. Wenceslai Dobrzenski de Nigropontia.

#### *Epilepsia Puerpera Vesicatorio curata.*

Anno 1663. Steinovix ad Oderam in Silesia cum medicinam facerem, vocabar ad foeminam juvenulam, uxorem cujusdam paupercis, ante paucos dies puerperam factam, ac feliciter infantulum enixam, convulsionibus verò epilepticis graviter afflictam, Accedens inquirebam in lochiorum constitutionem, utrum rite mererent, & hæcenus fluxerint; respondebatur autem, quod initio quidem parce manaverint, postea vero copiosius, exhibitis remediis mulierculis alias hoc in affectu consuetis: præscribo autem Epileptica uterinis mixta, imprimis *Confect. Smaragd. Excell. D. Jo: Joni*, patroni t. c. ac compatriis mei plurimum honorandi, quem ut simul advocari curarent, ac ipsius consilium & auxilium implorarent, marito ac parentibus injungebam. Vocatus advenit ac misellam horrendo paroxysmo correptam mecum iussit. Varia tentata remedia, sed frustra fere omnia, donec tandem ex consilio prælaudati D.D. *Jo: Joni* Vesicatorium erubus admotum, quod, divina benedicente gratia, tantum effecit, ut paroxysmi non modo rariores ac breviores fuerint redditi, sed altero ab applicatione die plane cessaverint, & puerpera optimæ valetudini restituta fuerit. *Gottfriedi Samuelis Polisi.*

#### *Epilepsia cecitate soluta.*

Civis quidam honestus, constitutione melancholicus, subito in Epilepsiam incidit, ea recedente cæcus remanet per dies aliquot. Ego in consilium vocatus, scorbuticam dispositionem animadverto. Quapropter per clysteres mate-

riam a capite revellere studeo, humorem melancholicum expurgo, antiscorbutica exhibeo; post aliquot dies vultum integrum cum sanitate integra recipit patiens.

Crisis fuit, etsi perfecta, tamen admodum molesta. Epilepsia orta ex humoribus acerbis scorbuticæ malignitate inecus, quibus in nervos opticos protulis, epilepsia cecidit. Deinde materia peccans revellentibus magis magisque retracta, cum nondum fixam sedem habuerit, & tandem antiscorbuticis sale volatili gaudentibus discussa est. *Fabrii. Hildanus c. 5. Obs. 5.* duos ejusmodi casus refert, scilicet ab Epilepsia curata cecitatem obortam, sed ab empiricis medicamentis fortioribus causatam. Etenim non videam, quomodo crisis etiam hoc loco excludenda, cum natura onere levata insurgere & reliquis molestias e corpore propellere soleat, etsi per errorem aliquando in partem nobilem sarcinam deponat. Interim tamen cum hæc cecitas, & prægressa Epilepsia à scorbutico originem non traxerint, & fortassis à principio neglecta ad impactionem usque materię incurabilem eam fuisse dubitare nolo. *Danielis Wincleri.*

#### *Epilepsia transplantata in Canicula.*

Quod de cane habet *Robertus Flud*, cum in se podagram Domini & adictionum periodos & morbi formam accepisset, huic ego similem observavi historiam de transplantata caniculæ beneficio Epilepsia. Antea illa gynæcei Hufmenis ante annos aliquot subito in Epilepsiam inciderat, tanta cum membrorum convulsione & exaggeratione, ut adstantes quosque commiseratione afficeret, nihilque ipsa certius morte expectaretur, nam & probatulin a quæque remedia frustra adhibebantur: Adjuverat eodem in grabato canicula dormire, ex illarum genere quæ plane depiles sunt, atque ut plumarum valde amantes: hæc itaque paroxysmis ingravescens nihil magis quam sui & caloris secura lectum querit & se laborantis corpori applicat. Verum illa, cum aliquandiu in lecto esset commorata, ingenti ululatu noxam invasisse corpus videbatur queri, ad quem sonum converiti adstantes productum canem eodem illos Epilepsie motus, eadem contractiones representare cum stupore vident, & quo magis animal hoc convulsionibus percellitur, hoc nimis affectam ancillam, jamque ad se redeuntem gratulandi notant. Continuant ex, usque dum animam canis efflaret. Ancilla verò impetrato hoc beneficio liberata nunquam ab illo impotenter tentata fuit, nec quoque puerpera, quando nimirum arcani fermentorum semina erumpere solent, quidquam mali sensit, vel in liberos transfusum, id quod non ita pridem maritus mihi retulit. *Jo: Langlois.*

#### *Epilepsia Hypochondriaca curata.*

Miles juvenis 24. circiter annorum ex iis qui Civitati Hannoveranæ pro præsidio sunt, Anno 1666. circa autumnum tentare incipit iniquissimam hypochondriæ dolores pungentes cum eorundem intumescencia, qui tamen mox in diarrhœam serotam terminabantur. Hanc diarrhœam cum metu tum temporis Hannoveræ Epidemicæ grassantis dysenterię listeret, hypochondriæ iterum instantur, hincque halitus



terri ascendentes ad cerebrum illud adeo in consensu intraxerunt, ut miles iste quotidie vel decies incideret in vehementissimi nos morbi comitialis insultus. Vorax erat valde, sed statim post potum concidebat, referebatque se ex hypochondriis auram quandam sentire ascendentem, a qua temulentus primum & vertiginosus evaderet, post quasi vi ad terram dejectus, quod a spectro ne existimabat. Jejunus nil nisi dolore in hypochondriis & anxietatem sentiebat, statim autem ac quippiam assumpsisset prosternebatur. Erat ceteroque boni habitus, temperamenti ut videbatur sanguinei cum plegmate temperati.

Huc mihi ego hoc modo Medicinam faciebam, Primum purgato corpore in operam dabam, ut acidum illud excedens naturalem ad statum reduceretur: cui nni singulis diebus horis matutinis utebatur pulvere digestivo ex Vitriolo Martis, Sale Essentiali Zveltr. & saccharo cantho. post patium autem semper utebatur pulvere ex seminibus coriandri, anisi, anethi, grani paradyfi cum aliqua portione Crani humani rati. Aliquando circa novissimum vomitum movebam cum antimoniali aliquo vomitorio: aliquando etiam sudores movebam cum cinnabari antimonii, tinctura Corallorum & similibus, quæ qualitatem cephalicam habent. Tandem cum corpus satis exaltissem præparatum esse, commendabam usum lactis vaccini, in cuius unc. iij. drach. s. saponis Hispanici albiissimi soluta erat. Hoc lac mane semper jeuno bibebat ventriculo, abstinens postmodum per totum diem ab acidis, idque tanto cum fructu ut brevi à molesto hospite liber evaserit, & hinc usque in diem sanus degat. *Alhardi Hermannii Cummi.*

#### *Epilepsia ex retentis Menstruis Venere & Puerperio sanata.*

Nota mihi est nobilissima quædam fœminæ, quæ cum Virgo adhuc ex menstrui retentione Epileptica fieret, a Medico persuasa ut se viro subliteret, inde gravida, feliciter peperit puellam; a puerperio autem optime purgata prorsus ab Epilepsia libera evasit. *Alhardi Hermannii Cummi.*

#### *Sanguis humanus Epilepsiam non curat.*

Varia ad Epilepsiam remedia in foro occurrunt Medico. Lac capri, (quod rarum) quem nutrit *Petr. Andr. Maubilius*, apprimè Epileptiis infantum profuisse allegat *Baribolium in cista medica H. ff. de si p. m. 1511*. Nobilis ut expertissimum commendabat remedium cor coracis pulverisatum, aliis, cor corvi ita præparatum. Nonnemo Margaritam aut unionem gallo gallinaceo loco testiculorum exsectorum imponit, ibique per annum relinquit: elapso anno, ita, qua imposuit, hora, eandem eximit, putatque se sic habere expertissimum in Epilepsia arcanum. Eiset amplissimus scribendi campus, si placeret catalogum condere medicamentorum anti-epilepticorum. Aliqui commendant sanguineum decollati calidè assumptum, quid autem circa usum hujus observaverim, subiungam. Bibebat dora Epilepticus sanguinem decollati calidum, sed absque ullo notabili juva-

nine. Alius morbo caduco laborans ibidem, eundem bibebat sanguinem, & tertio die obiit. Non ita pridem decollabatur hic *Gün.berge* juvenis eufarcus, bonique habitus; bibebat sanguinem in decollatione scutella exceptum eandem gemina Epileptica, seque, ut metnodus hujus curæ requirit, bene cusu commovebat: una nauseam cum cardialgia incurrebat, Epileptico insultu iterum nato tempore ingruente: altera majores & crebriores jam sustinebat cogitur paroxysmos, quæ n ante, sicque in utraque effectus erat fructuaneus. *Sennertus lib. 1. part. 2. cap. 51. Med. pra. l. quætionem movet, an usus sanguinis humani conveniat in Epilepsia? negandoque respondet. Tinnem & Guider-Klee cas. medic. lib. 7. cas. 15. annotavit quid nocuerit sanguis taurinus, item aserinus torte fortuna haultus, cur non noceret humanus? Sed vulgus qualia non tentat remedia! Sam. Ledelii.*

#### *Amuletum Epilepsia.*

Recententur plurima Amuleta a diversis Auctoribus adversus morbum comitalem sive Epilepsiam, quæ an omnia promissis respondeant, experientia consulenda est. Mihi nuper a fide dignis commendata est in Epilepsia infantum radix *Ostrutii, Imperatoria seu Magistranica, Germ. Meßler-Wurzel* dicta, recens dilecta & pollicibus tam minimum quam pedum alligata. Hujus rei veritatem indagare mihi non ita pridem occasio se obtulit in puella triumseptimanarum a paroxysmo epileptico misere divexata, cui post alia ista radix prædicto modo adhibita est felici cum successu; qui an radici soli, an etiam aliis antea præmissis remediis adscribenda sit, nescio, cum ipsi primum exhibuerint aliquot grana Cinnabaris nativ præp pulveri Epileptico immixta: quod remedium, Cinnabarim scilicet nativam quæmeralem veram celeberrimus ille trium Imperatorum Medicus Crato in Epilepsia magni fecit, ut testatur *Samuel Schonbornius in Manuali Medic. pract. p. m. 6.* quanquam alii Cinnabarim Antimonii exlubeant; *Sennertus* tamen nativam huic rectius præferat, utpote cujus admirandas vires in Epilepsia tam adultiorum, quam juniorum nec sæpissimè expertum esse vere testari possum. Congessit alias catalogum medicamentorum simplicium & facile parabilium adversus Epilepsiam *Henricum à Bra, Medicum Zuphringensis*, qui ibidem pag. 56. radicem Imperatoriam pulverisatam & ex vino potam comitialibus auxilio esse ex *Matthiolo* refert.

#### *Fellis Canis efficacia adversus Epilepsiam.*

Felis canis adversus Epilepsiam infallibile esse Euporiston duabus historiis probare queo. Ad puellam septimanam una quindecim paroxysmis epilepticis correptam vocatus fui, dedi ei pulveres anti-Epilepticos cum aqua nostra picarum & Epileptica Langii, quæque ceteroquin contra comitalem morbum laudantur. Verum omnia frustra; tandem famosum illud Euporiston experiri placuit, dedi infanti guttas quinque fellis recenter ex cane vivo extracti cum aqua Epileptica Langii, & sic præter omnium opinionem sana evasit. Alii eundem puero Epileptico guttas aliquot fellis recenter ex cane extracti cum aqua nostra picarum dedi, & hic quoque ab Epilepsia convaleuit. Hocque reme-



dio Ducis Bockingam filiolus curatus teste Rolinckio. Quæ D.D. Wntzerus & alii monent de hoc felle, magis anilem & superstitiosam traditionem, quam rationem sanam sapiunt. Adversus Epilepsiam in sexu muliebri recommendat fel ex cane feminini sexus, sicque etiam fel ex cane masculo utile prædicant adversus Epilepsiam Virilis sexus, hæc & alia quæ de colore monent, inutilia sunt. Puellæ dedi fel ex Cane masculo & benè successit. *Thomas Barbo-linus.*

*Epilepsia remedium certum, ex osse Tali Leporis.*

In quodam confesso Chirurgico fidem nobis fecit *Joh. Cocus*, mulieris cujusdam quæ opera ejus usâ fuerat, experimenti; pro certo Epilepsia remedio haberi Leporis os tali, quod *Hassprung* vulgus appellat; triaque ossa pulverisata in liquore idoneo, v.g. Aqua borrag. exhiberi bibenda, quod in puero Halimienti nuper probatum sit, exitu felici. *Thomas Bartholinus.*

*Musci terrestrii clavati vis adversus Epilepsiam.*

Anthera commune vocabulum est pulvilli, foliis quarundam herbarum indidentis, ut Junipero, Lupulo, Typhæ palultri, (in qua curiose illam Jenz invenimus, tunc postmodum ablatam) & imprimis Musco terrestri clavato. Copiosè reperitur hic Muscus in sylvanotira Thuringica à venatoribus nostris dictus *Dehnkraus*. *Minsicht* in historiis Miscellaneis vocat *Plam, ist ein geeler Staub*. inquit, der ex Musco terrestri *geschlagen wird*. pag. 432. ibidemque egregiè locum natalem Ruslorumque procellum describit. Si folia betulæ pulverisata simul misceantur, strepitum majorem edit, in flammam protulit. Usus hujus partim est mechanicus, pro ignibus artificialibus aliisque inventis novis, quo nomine Sereniss. noster Princeps aliquot pondo colligi curavit, partim Medicus; hinc commendatur in Epilepsia, experientia D. D. *Kolsinckii* in. de aff. cap. partic. de Epil. pag. 51. Reticere nolumus, inquit, pulverem flavescensem in spicis Mulci terrestrii clavati, coryli julis similibus, inflammabilem, qui reperitur, ant-epilepticam vim obtinere. Eo sine quoque familiari in usu erat D. D. *Widemark* ex p.m. Archiatro Saxonico & Physico Ilnacensi ordinario. In calculo sunt qui vim ejusdem maxime laudent, nec minus in phthisi & impotentia virili, quorum singulorum experimenta propediem faciam.

In Epilepsia infantum, præcipuè, ut sæpè contingit, si ab urina retenta oriatur, summum est experimentum, si de semine hoc Lycopodii, quantum cuspidè cultelli contineri potest, propinetur. Egregiè enim urinx faciliat exitum, quo de unicum saltem exemplum hac vice recensēbo, Nuper Anno 1671. die 3. Aprilis puero 3. annorum cum laboraret Ischuria cum dolore & clamore, accedentibus Epilepsia, qua ante annum etiam sæpius affligebatur, notis, propinavi Lycopodii ʒj. pro duabus dosibus, præsentaneo cum successu; Antheram Pini Antiscorbuticam donavit mihi Altenburgi D. D. *Clauderus*, Simile quid etiam observatur in ipso secali. *Georgii Wolff. Wedelii.*

*Corde Talpæ in Epileptico usu.*

Quæ ad Epilepticos insulsus laudantur pharmacæ, talia sunt, ut cum sæpe respondeant, præsertim in pueris, & adultis, morbo nondum diuturna mora firmato, non raro tamen, præcipue in hæc editatio, chronicove malo destituant Medentem. Quin & cauterium in brevitate sæpe fallit, in occipite rarius. Est tamen cum etiam fructu caret. Novum fortassis medicamen assero, & practicum libris, quantum memoria teneo nondum insertum, civi tamen Academi-cotalutare, an pluribus ea felicitas aspiet, experimentis docebitur. Is vehementissima aliquot annorum Epilepsia, & pharmacis vulgo ad eam tollendam commendatis fatigatus, tandem in corde talpæ invenit auxilium, jam a triennio liber ab omni comitialis impetu, nec nisi triduo usus hoc remedio convaleuit. Eum-verò quotidie cor unum talpæ recens, sed ieniter exsiccatum haurit cum paucis Pœoniæ maris granis, & ocul. cancr. scrupulo, in aqu. st. tizæ. Hoc totum artificio, quod utinam & aliis æque frugiferum sit. *Schröderus* ad herniæ laudat cor talpæ, de quo nisi factò periculo nihil deniendum. *Orai norrichi.*

*Secretum Ant-Epilepticum.*

Invisa mihi semper sunt secretorum occultatio, indignarique soleo illorum invidia qui ubi servant quod omnium utilitati Deus & Natura commune voluit. Tanto magis exsecrari hanc hominum malitiam solitus sum, quanto minus occulti habeant secreta si revelentur. Jactantur passim arcana quæ Medicis in quotidiano sunt usu. Et plerumque ex Medicorum scriniis vel schedulis omnia prodierunt, quæ magnifico ritu pro secretis jactantur. Exempli ubivis obvia, Unum signabo: Pro arcano Epileptico hæctenus habuit Nobilissima Matræna remedium, quod multorum applausum meruit & admirationem. Ad quod, tanquam ex *Æsculapii* sacro depromptum, multi in urbe confugere solent. Non paucos vim salutarem ex usu remedii sensisse certum est, certum quoque est non pauciores fuisse incurabiles. Nec aliter heri potest. Panacea enim necdum illa innotuit quæ vel omnium morborum spondeat medicinam, vel unius morbi apud omnes curationem. Quicquid horum sit, secretum illud remedium mihi singulari occasione communicatum fuit, cujus formulam non invidēbo publico, ut videant Artis filii parum vel nihil secreti continere, quod non vel in Medicorum libris legatur, vel quotidiano usu adinbeat.

ʒss. Cranii hum. gr. x. Sem. Pœon. gr. x. Succini albi gr. vij. Auri heredit. gr. ij. Margar. gr. v. Corall. gr. v. Sambu. i cortic. ex Salice nascentis gr. x. Castor. gr. iij. Pulv. Calendul. gr. ix. Pulverisata dentur in .q. Lavendulæ.

Quod auro per hereditatem à parentibus relicto tantum pretii statuatur vulgus, superstitioni vicinum est. Nec rationem video, nisi quod illud ex vetustate purius sit. Hoc Corde roborando efficacius creditur, at Luna Cerebro in Epileptico. De Cranio humano notandum i. insensibilem esse debere, monente *Remedes* l. 3. diff. cap. 19. h. e. furis suspensi vel alterius hominis, nullius tamen morbi interventu mortui, expli-



explicante *Henn. Ranzovio de Tuend. Sanit. c. 13.* sed præcipue *Plinio lib. 18. cap. 12.* Partem anteriorem crani commendari potius à *Crollio* de Signa. quam posteriorem. Fœmine fœtū in atriā, ac mari maculum accommodatius esse, si credimus eidem *Crollio* aliisque, quod verum sua experientia testatur *Unzerus lib. 2. de Epilepsia. n. pag. 112.* Semen Pœoniæ maris p. limani fœmini præcipit, quod tamen in o. fœinis valde rarum. Nuntz sedulo curant ut aliud habeant.

De Sambuci cortice, & ramo in salice enato experientias attuli in *Centuriis Hist. Anatom. c. 11.* pro externo amuleto efficacem deprehendi. Calendulam Epilepsia adversari non memini alibi me legisse, nisi quatenus calida siccaque sua virtute cerebri humores absorbit. Alias cordi appropriata, & in pestilentia vires potentius exserit. *Thomas Barish. lib. 1.*

Puerulus sex circiter mensium, ubi obstetrix nucum à naribus abtergit, de repente insul-  
tuus concutitur epilepticis, tumet facies, angitur, convulsionibus agitatur, spuma est in ore; paroxysmus per horæ durat quadrantem, alias sanus est & bene valet. Jam novem menses & ultra per intervalla furia redit immitis, neque unquam invadit nisi a causis externis offensus infans; sic contigit aliquando ut amiculum ejus virgis exderet filia suam, id quod ille videns adeo fuit consternatus, ut dictum factum sentiantis concideret. Aliquando in nunum suam leviuscule ad carpenti rotam allidens paroxysmo multatur epileptico, minimeque usque adeo offenditur, ut novumquam ter de die huic succubnat malo. Ancilla quædam comiter cum affata, digitoque leatiter illius nianum teriens, paroxysmus ipsi accessit. Nunc temporis ablactatus nihil sentit levitatis, quin aliud ipsi discrimen immutare videtur, ut taceam medicamenta ant-epileptica & alia volatilia oleosa malum non modo non imminuere, sed anticipare paroxysmum; quin & medicamentorum tanto tenetur fastidio, ut periculum sit, ne ita offensus paroxysmum incurrat; illud certe silentio præterire nefas est, cum præter cerevisiam nihil assumere, panem, carnem, iuscula quæcunque emulsionem; prætractè respuit, pulverem quidem acidum absorbentem, eumque insipidum in cerevisia assumpsit, sed cum & hic dolus ipsi suboleat, mater cum ulterius ipsi propinare recusat, veretur enim, ne, si & ipsius cerevisia contrahat fastidium, fame pereat ægrotulus. Mihi causa hujus mali, non in sanguine, sed in ipsius cerebri dispositione hæere videtur. Mater cum iterum generet gravi mœrore affecta, omnium rerum coepit laborare tadio, moleste præterea tulit quandam rem, ideoque ira & tristitia se totam permisit. Tum forte temporis spiritus animales eodem modo concusserunt tenellas fibras cerebri infantis, eademque inibi excitant vestigia, quæ ab objectis externis valde ingratis in cerebro matris erant efformata. Matre itaque offensâ, irâ & mœrore affecta, infantem offendi, irâ & mœrore affici oportuit. Ponamus jam matrem, quod quasdam res contra animi sententiam fieri indignè tulerit, eas continuo nonnisi cum horrore & fastidio conspexisse, de iis cogitasse & nescio quid sibi timuisse; perspicuum est hanc cogitationem sequi debuisset certum motum spirituum, qui ad infantem delatus occasionem dedit illius menti de iisdem rebus cogitandi, &c. ex *Epistola Martini Harmer Medici. Doli. Brenne jii ad Clariss. Joh. Mayr.*

se certum motum spirituum, qui ad infantem delatus occasionem dedit illius menti de iisdem rebus cogitandi, &c. ex *Epistola Martini Harmer Medici. Doli. Brenne jii ad Clariss. Joh. Mayr.*

Phænomena pueruli, de quo loqueris, epileptici solent, erudite & distincte explicumina videris, sed ingeni est hoc malum non invasisse mitem agrotulum ante sextum mensem. Recurriendo morbum non latere in sanguine, alias infans extra paroxysmum non foret incolumis; dicitur igitur morbum hæere in mala dispositione cerebri, ejusque causam extitisse matris prægnantis irregulares passionem, opime Philosopharis. Ante aliquot annos (*sic narrat acutissimus Malebranche*) Parulus fœmina iterum gerens compiciebat malecium, cui ossa publicæ a carnice per totum corpus contrangebantur. Infans hujus mulierculæ in lucem editus solidus exitebat, omniaque ejus ossa apparebant misere contracta. Quod si jam spiritus animales, vel ut hodierni Medici loqui solent, succus nerveus tantum in petum in tenellis cerebri fœtus fibrillis, imo & in ipsa ossa facere potest, multo facilius fibrillas cerebri in fœtu ita distringere & distorquere potius est, ut à minima causa externa succus nerveus concitatus ægrotulo accersat Epilepsiam. Medicamenta assumpta nihil protulisse faciliè persuaderi possum ut credam, nam in Gælia, quam inhabitato, tres vel quatuor pueruli sex septemve annorum miris & ineffabilibus Epilepsia moribus, continuo per longum tempus gesticulatorem instar, sed inviti agitabantur non ita pridem, quos inopinato huic morbum ex teriore corripuisse existimabant parentes, sed medicamenta interna nequequam usurpata fuere, progressu tamen temporis omnes convalescerunt. Quantum ad medelam ægrotuli, de quo narras, optimum mihi videtur ingens vesicatorium nunc applicandum; & si hoc non succederet, cuti capitis circa conjunctionem futuræ coronalis cum sagittali inurerem fonticulum, eumque aliquandiu apertum servarem, nam dolor & contractiones hinc excitatæ, n. utando partium situm hic prodelle posse videntur, cui sententia experientia etiam aditipulatur; quomodo autem locus ille inveniatur, non est quod dicam, quandoquidem Scultetus id jam dudum in *Armentario suo Chirurgico* aperuit. Non ita pridem fœmina quædam ter vel quater de die affligebatur miserum motibus convulsivis; nullus Medicorum veram causam expiscari potuit. Advenit Chirurgus inveniens in brachio ægrotæ tuberculum lividum, pisum mole non superans quod causam mali judicans, sectione simul & senuel sustulit, ac n. ulter ab hoc tempore nunquam amplius quicquam mali Epileptici perferit; humor utem in tuberculo contentus erat instar aquæ fortis corrosivus. Nimirum portio quædam exigua ter vel quater de die ex hoc tumore evacuebatur, ac sanguinem succumque nerveum, quibus commiscelatur, adeo tumultuarie commovit, ut n. ulter hæc moribus Epilepticis tam crudeliter affligeretur. Non mirum videri debet cuiquam, quod pauculum hujus humoris tantos motus in corpore humano excitare potuerit, ubi consideraverit quam stupendi effectus consequantur morsum *Tarantulæ*.



tulz, quæ est bestia inſar araneæ in Italia fre-  
quens, & tamen a ſe demorſos homines ridi-  
culè, ſaltantium more invitos convellit, exigua  
nempe, humoris corroſivi quæritate, quæ ſan-  
guini & ſucco nerveo vulneratorum hujus be-  
ſtia mori communicatur. Anus coram ſcabi-  
nis ſuis non ita pridem juraturus, dum more ſo-  
lito dextram duobus digitis erectis in cælum  
elevat, corripitur ſpafmo ipſius manus & digi-  
torum in rigiditate per aliquot dies cum dolo-  
re atroci perfeverantium; paulo poſt confe-  
tur perjurium. Tantumpoteſt imaginatio, quæ  
male conſcienſia æternos cruciatus ob perpetra-  
tum perjurii crimen ſibi vivide repræſentans  
ſpiritibus impetuoſiſſimum hunc motum im-  
preſſit, eoſque præcipuè in manum & digitos  
extenſos direxit. Brevi hic ſectione tollitur  
ſarcoma quatuordecim vel quindecim librarum  
dependens e nucha alicujus mulier. ulz ruti-  
ca, ex ramis carotidum nutrimentum acci-  
piens, ſanguinemque per ramos venæ jugularis  
remittens, quod poſterius viſu manifeſtum fit,  
prius acie mentis; quomodo operatio ſucce-  
det tempus docebit. Vive vigeque. *Ex Reſpon-  
ſione Clariff. Johani. Muys ad mox allatam Pueruli  
Spileptici hiſtoriam. Decad. ſeptima Obſervationum  
huiusce Autoris inſerta.*

Puerulus duodecim circiter annorum moribus continuis epilepticis leviter in brachio dextro gesticulatoris instar agitur, quod malum tamen in dies adaugetur; ante biennium eodem modo hic morbus incepit, ac eo usque accrevit, ut manus pedesque ægrotulo invito assidue mirum in modum convellerentur, & ægrotulus tandem mutus evaderet. Ubi objectum aliquod attingere volebat, manus pergebat in aliam partem ab objecto longè remotam. Multa medicamenta à pluribus Medicis tum temporis frustra præscripta fuisse, tandemque puerulus sponte convuluit, & studiis non sine induritia & cum progressu non contemnendo incubuit. Parentes metuebant ne malum, quò jam temporis infestabatur puerulus, tractu temporis eò pravitatis perveniret, ut ante biennium, quapropter accersitus ingens vesicatorium ex cantharidibus confectum nuchæ applicui, locumque per octiduum apertum fervavi; interea temporis malum non vergebat in pejus, sed brevi post ægrotulus corripitur variolis, omnem totius corporis cutim contegentibus. Quid contingit? Variolis sanatis, puerulus à moribus epilepticis prorsus immunis exsistebat & in hunc usque diem permansit, nec puto morbum unquam rediturum. Hinc non incongrue concludi posse videtur hos motus convulsivos originem suam traxisse ab acido principia nervorum infestante & vellicante, quare etiam vesicatorium nuchæ apposui, ut nempe acidum illud temperarem sale volatili cantharidum penetrante, quamquam vesicatorium alia etiam ratione juvare possit, ut videre datur in respons. mea ad Epistol. præcedentem. Acido vero peccante per variolas evacuato, puerulus à malo tam crudeli convuluit; unde etiam inferri posset, fonticulum in brachio, vel potius in capite hic loci egregie convenire ad humorem peccantem extra corpus proturbandum. Morbus hic non dissimilis mihi videtur illi malo quod *Vulsulum*

ab Autoribus nuncupatur, & cujus exemplum  
habet et cetera Platerus lib. 1. Observat. pag. mihi  
85. Ecce una, aille, assidue tripudiabat, & licet  
aliquando ut cibum caperet, & somno corre-  
pta, sedere cogeretur, tamen gestu motuque  
corporis inquieto interim corpus nihilominus  
veluti saltans agitabat, donec omnino viribus  
prostratis, adeo ut nec stare amplius posset, a  
saltu cessare coacta, in hospitale vecta est, ubi  
refecta sentim denuo convalescit. *Johns. Abuss  
observat. Præceps Chirurg. rational. Decad. 7.*

Puella annos circiter 14. nata paroxysmis epilepticis per intervalla tantum longiora recurrentibus a duobus tentabatur annis. Vultus erat tumidus ac rubi. undior, & dolor pulsativus ac itidem gravativus caput continuo affligebat. Venæsectionem in pede pro revulsione celebravi, am, corpus remediis aptis satis exquisitè purgabam, postque sequentia præscribendam, scil. primo rotulas virales ex abortivæ us, cephalicis, ac aperientibus paratas, quarum hæc est compositio.

℞. Diaphoretic. antimonii albiſſ. Maſſiller.  
Mart. ſolub. C. C. Croſſelliana methodo præ-  
parati ana ℥ij. cuticul. citri ℥j. ſacch. dr. aqua  
cinnam. ſoluti q. ſ. ut ſunt. c. 3. rotulæ mino-  
res, Sumeb. & ſapius de die unam aut alteram  
ſuperbibendo cochlearia aliquot juxta tubſe-  
quentis.

22. Aquar. beton. lilior. convall. flor. tiliz  
ana ꝑ iij. Imperial. ꝑj. spir. sal. armon. aroma-  
tiz. ꝑ in. Syr. Peroniz & de corticibus citri ana  
ꝑ. Extract. opu cydoniati gr. iv. M. Secundò  
pediluvia ex cephalicis ac anodynis quotidie  
præparabantur, & plantis pedum exsiccatís ap-  
ponebantur sacculi e simplicibus cephalicis ac  
aromaticis, ut & sale armoniaco depurato.  
Tertio præter purgantia medicamentá genero-  
siora sub ipsius curæ initium adhibita, in toto  
eiusdem decursu singulis septimanis bis vora-  
b. & pilulas ex Aloë succotrina, Magister. Mart.  
solub. cinnab. antimon trochiscis alandhal, &c.  
Vescebat cibus boni succi & facilioris dige-  
stionis, ac pro potu utebatur decocto ligni ju-  
niperini. visc. querni, rasuræ C. C. & Crani hu-  
mani His intra unum ac alterum mensem inte-  
gre restituta, nulla prius per plures, qui sunt  
subsecuti, annos, perseveravit morbi illius hor-  
rendi vel levicula symptomata. Hæc methodus  
paucissimis immutatis pro ratione temperamen-  
ti in aliis etiam agris quam optime cecit: Ve-  
rum alteram itidem in juvenula quatuordecim  
circiter annorum institui. scilicet præmissis  
præmittendis, pulverem composui e Crano hu-  
mano, ungu. alc. corall. rubr. cinnabar. nativ.  
I. iaphoret. Mart. camphor. & paucò opio, eun-  
que ad plures dies continuos mane & vespere  
exhibendum dedi. Superbibebat aliquid emul-  
sionis e semin. Peroniz maris, papav. albi, ac  
nucleis cerasor. nigr. ex aq. flor. tiliz calendul.  
ac peron. extracta. Subinde potui adjungebat  
guttulas aliquot spir. volatil. sanguin. hum. tan-  
dem his expurgati est remedio e scammon.  
Mercur. vitæ, & Mercur. dulc. apprimè loto,  
confecto. Potus erat decoctum chinæ, visc.  
querc. ungu. alcis, & Crani humani per lon-  
gam in rore vitrioli macerationem prius bene  
præparati. De frictionibus, aliisque multis in  
dicta exquisitè observatis, nihil jam addo. Illa  
autem



autem à pluribus annis remediis descriptis sanata, paroxysmus epilepticis intentata hilaris vivit. Annam rursus annorum octodecim, non minus, imo crudelius ac frequentius quam mox præmemoratas afflictam curavi, post generalia, per exhibitas pilulas ex extracto panchyniagogi, tartaro emetico, cinnabar. nativa ac oleo spica stillat. paratas, quas quater repetendas, volui, scil. bis in mense. Per opiatam à diapno-ret. Martial. cinnab. antimon. super cinnabar. nativa rectificat. radic. viperinæ Virginian. sale volat. succin. vere urinofo, ac mixtura bezoartica, &c. in baccar. juniperi rob. ac syr. Itach. ana q. l. exceptis, concinnatam, ac per mensem & dimidium hora somni singulis diebus ad quantitatem unius itæ absumptam. Per pulverem & radic. viperin. Virginian. antihæctico Petherii, marie per triturationem præparato, oleo spic. still. bals. Peruvian. ac munito Itach. ro, confectionem; singulis itidem diebus ad ʒ ij. & juleño carum in quo incerta torent simplicia cephalica, per mensem unum ac dimidium, adhibitu. Ac tandem per unctiones verticis & uuchæ & juniperi baccarum spiritu ardenti in quo dissolutum esset aliquid olei rectificati.

Una eademque septimana duos habui curandos infanculos epilepticos annum circiter unum natos, post aliquot horas uterque, ex deficiente pulsu, aliisque signis mortuus ab assistentibus misereculis credebatur. N.ribus primo admovebam spiritus acroies sc. C. C. viperarum, sanguin. humani; itidem insufflabam aliquid pulveris cephalici & liliis convall. flor. tilia, sol. betonic. rorissinar. salv. ocimi, majoran. rad. irid. florent. paucos elebor. alb. & oleo rutæ & succin. confecti. Eodem tempore clysterem acriorem injici curabam, sicque aliquatenus excitato cerebro, redeunteque pulsu, prius omnino suppresso, sanguinem ad ʒ ij. & circiter tres, per lanceolam e vena brachii satis commodè educeram, posteaque vomitorium paucis purganti infuso cum volatilibus spiritibus admistum propinabam; unde discussis particulis heterogeneis cerebro & nervis impactis, mox repetebant sua cum aliqua obnubilatione, & subsultuum leviorum per intervalla redeuntium tumultu, quæ ulterius profligabantur continuato subinde per dies aliquot usu aquar. lilior. convall. flor. tilia & peroniz cum syr. Stœchad. arabic. & pauxillo spir. sanguin. hum. ad cochleare unum; ut & clysteriorum, pro exigentia. Sicque ab orci faucibus contra omnium spem, quasi erepti, jam hilares & bene sani vivunt.

#### *Anatomica inspectiones;*

#### *Idiopathica Epilepsia ex ventriculorum infarctu non semper suscitatur.*

Quæ in cerebro sit Epilepsia, aperto eorum qui è vivis decesserunt capite, annadversa est sapius aliunde suscitari quam ex ventriculorum infarctu: Causam interdum deprehendi cerebri abscessum esse: interlum corruptum meningis portionem calvæ adhaerentem summo dolore; quibus è locis tetet vapor in cerebri ventriculos penetrabat. *Fernelius Patbol. lib. 5. cap. 3.*

#### *Epilepsia ab abscessu in cerebro genita.*

Nobilis adolescens equestribus deditus exercitiis tentabatur cerebro tussicula, sed sicca, & subinde dentium doloribus. Rejecta in collum angustius, & catarrhum a glandulis capitis deludentem culpa; augebatur suspicio, quod oculi tantillum extra orbitas suas eminerent, & nonnihil erubescerent. Sed cum sapius, & gravius admoneret odontalgia, dentem, cui dolor præcipue incubabat, evelli jussit, nullo tere opere præcio, serpeb. t enim malum ad vicina, & ad ipsam maxillam penetrabat. Sociis interea delicatulum clamantibus, quod à muliebri agitudine constantiam suam turbare pateretur, ille die quodam in publico divertorio inter amicos subito corruit exanimis quasi fulmine percussus. Deportatur in ætium, ibique odoribus & aquis apoplecticis varie excitatus tandem post horam dimidiam vivere se ostendit, domumque translatus postero die surgit sed languidior, & in narcolem cum gravitate capitis junctam propensus. Vocati Medici cephalicis & iis, quæ comitalem avertere solent, insunt. exiguo fructu, quippe æger ex intervallo jam animi deliquit, jam epilepticis convulsionibus, usque horribilibus divexatus, tandem pleno rationis usu ex languore insolito succubuit. Cumque testamento ultimo jussisset se in Patriam a morte transferri, adeoque balsamo, more Gallico, conditi, ne navigantibus fortore molestus esset, denecio ejus ad celsari non placuit. Aperitur ad condituram a quatuor Chirurgis, & in reliquo corpore, nihil adeo morbum deprehenditur, præterquam quod superior dextri pulmonis facies præter morem nigresceret, ex acidis, opinor, humoribus ituc sensim à capite depluentibus, & dexteri testiculus inter abdomen conderetur, pusillus & exsuccus; Sed ubi ad cerebrum perventum est, abscessus se obtulit in dextra ejus, & quidem superiori parte, non dilatatus, sed propemodum in medullis, nique tordidissimo pure albo stagnans, ad amplitudinem ovi gallinacis; aderat & serum, sed parvum, quod ad spinalem medullam videbatur sibi aditum patefecine, unde convulsionum frequentia. Æger autem, qui sæpe conquiescere erat de dolore frontis, & quandoque occipitis, nunquam ostendit illam partem dolere, quæ vomica occultabat, haud dubio argumento, cerebrum ipsum non patere doloribus, sed duntaxat, quibus involvitur, membranas. Constat inter alia ex hoc exemplo quam vana sint sollicitationes quorundam, spondentium certam cujusvis epilepsie, etiam hereditarie curam. cum hic ipsum Apollinem, ipsum Asculapium frustra advocassent Amici. Nihilominus ne nunc quidē quiescit in urbe nostra Empirica, sed promissive omnibus hoc in loco aggravisatam operam promittit. Illa autem (ne mysterium publice ignoretur) ex sutoria pice, granis Peroniz, & oleo Castorei emplastrum format, & occipiti, erasis, si qui obstant, capillis, calidè applicat, tandiu hæsurum, donec sponte decidat, quod plerumque circa duodecimum diem solet accidere. Quod si perseverat adhuc malum, toti capiti, sed raso, idem emplastrum circumfundit; succo u aliquando non pernitendo, sapius tamen nullo, ut palam



palam est. Quid enim faceret hoc emplastrum ad tollendum abscessum cerebri? quid, quoties malum urget per sympathiam? quando maligna aura attolitur vel a tumore manus dextræ, quod *Platero* observatum, vel a sinistra, quod *Hæsthero*, vel a mamma, cruribus, testibus, pollice pedis, quod *Schenckio* & aliis; imò innumera sunt exempla Epilepsiæ per consensum, quibus ab illo emplastro parum sperari potest præsidii. Id rarum in quodam cive nostro, cui a carioso pedis pollice oboriebatur hoc malum; quoties percepto prius in pollice motu inquietiore, & mox in crure, fascia cruris ipsum paulo infra genua stricte ligabat, antequam ultra pergeret fornicans iniquus, paroxysmum notabat suspendi; sed si negligentior pateretur malum superare genua, postea nullum a fascia injecta observabatur auxilium. Potuisset is vel exstirpatione pollicis, vel inunctione butyri Antimonialis, de qua medicatione *Henricus ab Heer*, perferari, sed maluit periclitari totum, quam partem ignobilem tolli. *Olai Burichii*.

*Epilepsia suscitata à carie cranii, parte interna juxta cerebellum.*

Juvenis 30. annorum diu capitis dolore vexatus, tandem in melancholiam taciturnam incidit; Sed capitis dolor, quando tunc temporis mitigari videbatur, ob affecta partis innatum calorem quasi emotuui, Epilepsia vehementissima corripitur, cujus paroxysmo tertio extinguitur.

Dissecto cadavere, diligenterque calvariz osse in posteriori parte interna, quæ perpetuo ante dolebat, perspecto, nullum ibi notabilis morbi signum notavimus, At capite aperto, ossis posterioris anteriorem partem, juxta cerebellum satis notabilem cariem contraxisse vidimus: Tetigimus ea in parte foramen quoddam, ad denarii magnitudinem, quod quidem usque ad summam laminam, exclusive tamen perveniebat.

Coniectandum hinc Epilepsiæ & mortis causam, fuisse malam quandam auram ab osse & partibus affectis in cerebri substantiam sublevatam: Cujus mali causa exterior nobis fuit incognita, nimirum capitis illinitio ex hydrargyro frequens, non sedandi doloris gratia, sed aliam ob causam: Hydrargyrus autem usque adeo frigida est, ut vi narcotica dolores quosvis sopiat quidem, at partium tenuitate corpora omnia, vel etiam durissima ossa subeat penetretque, emolliat atque dissipet; unde frigiditate cerebrum valde offendit, nervos & artus valde infirmat, inde tremor & paralytis, necnon partium frigidarum corruptio aut caries, ut dentium aliorumque ossium. *Zecchi Consult. 9.*

*Epilepsia à Vitio dura Meningis pustulis obstructa, & perforata, nigro sanguine per cerebri spiras sparsa, cum inflammatione, hinc ventriculorum constrictione, &c.*

Anno 1588. obiit juvenis qui diu in carcere detentus, Epilepsia correptus erat cum aliis symptomatis, diu enim languidus decubuerat, perpetuo stupore afflictus.

Seçto capite, pustulæ supra duram meningem

apparuerunt, erosa ipsa & cerebro per foramina eminenti pluribus in locis: Omnes ejus spiræ nigro sanguine replete erant: In ipsa etiam innumera copia laterebat, unde inflammatio exorta erat, & hanc ob causam anteriores ventriculi vix in conspectum veniebant: Communis humor seroso piens. Rete autem mirabile rotunditacis apparet: cerebelli substantia, præterquam quod solito esset mollior, sanguine etiam pituitoso affluebat. Hinc ad pulmones devenerunt, qui collis & sterno adligati flaccidi omnino erant, oleo tamen magni, humore spumoso repleti, dextero latere innumera: Similiter & cordis ventriculus dexter sanguine plenus repertus est, similis vacuus: hepatis unius quasi globus apparebat, stupendæ magnitudinis, laudabile alias & sanguine bono abundans: hujus molis ut cederent renes, ipsi quasi ventis cavæ ad spinam dorsi adalligati erant: *Kumlerus of. sc. v. 33.*

*Epilepsia à Sero caput replente.*

Epilepticos affectus à sero caput opplente, & præcipue pollicum ejus parte, excitari ex Anatomia didici, Nam dissecio anno superiore cadavere, pollicum caput unguem aqua turgens repertum, ut non solum principium nervorum aqua innataret, sed membrana ipsa aqua prægnantes & imbutæ, non secus atque papyrus aut tela aquæ diu immerfa, compicerebantur: At quamprimum cranium sectum, aqua ex ea parte diffuxit plurima, quin etiam sanguis in venis ea parte concretus inventus, a frigore scilicet aquæ stagnantis. *Carol. Piso de morbis a coluvie serosa sect. 2. part. 2. cap. 7.*

Amorrhæi Consulis pueri quæ drimestris torminibus vexabatur, ut colligere erat. Non longe post, aphonos, oculos intorquebat, convellebatur, minime hoc, repente facies mutabatur, tanquam conantis aliquid excurrere; deinde velut comprimebatur, tuncque occurtebat in os spuma, & spiritu velut compresso diu, quasi ad se rediens, magnum spirabat, eorum more qui contentione animi aliquid inuentes spiritum cohibere. Per totam noctem convalescebat tantum brachio sinistro, & illud convulsorio modo agitabatur, deinde cessante hoc, idem brachium dextrum ipsi assuetum est: & ex intervalis occurtebat spuma magna copia, & aphonos erat, & excrescit spuma salivaque, magna spiratione, tunc restituebatur. Epilepticum hoc fuit: Provisum ventri: aliquid sufficit. Duodecimo ætatis mente interit.

Aperto cadavere ingens aquæ copia in cerebro reperta est: nervi optici erant v. lde angustissimi, alii nervi erant fere duplo majores. *Babini cons. lib. 2. annot. 1.*

*Epilepticorum cerebrum, ventriculi & sacra fistula plerumque limpidâ aqua imbuta sunt & repleta.*

Pluries invenimus in cerebri ventriculis sacraque fistula aquam limpidam, tenuem & puram, quam flavam, vel bili colore similem, vel etiam alium humorem: Majorique itaque ex parte, si non semper, paralytin excitat tenuis limpidaque aqua in cerebri ventriculis atque in spina dorsi collecta, quæ sensim à superiori parte nervos irrigat, quoad pervenerit ad eorum extremitates.



tre nitatem. De Epilepsia causa, idem quasi antecendendum opinor, nam similem aquam in epileptiis & apoplecticis multoties vidi, &c. Nihil in cerebri ventriculis pituita, nullam in eis obstruccionem, & non plus tenuis humoris aquosi & limpidi in medio ventriculo, atque in reliquis depicciendæ quivi, ceterum totam cerebri substantiam inveni aquosa humiditate infarctam. ventriculoque omnes eadem aqua plenos. *V. Couter lib. observ. Anatom. & Chirurg.*

*Epileptici insulti à seroso humore in cerebri substantia & ventriculis.*

Filia D. N. septennis cum dolore capitis gravi paroxysmos quoque epilepticos passa est, cum spuma in ore: Consilium initurus nuntiatum eam novo paroxysmo Epileptico sublatam, ac post mortem puris aliquid per nares effluxisse, quod nobis abscessus latentis suspicionem fecit.

Sub cerebro aperto nihil repertum præter serosum lammorem in cerebri substantiam & ventriculos effusum. *Laz. Riverius observ. 37. cent. 1.*

*Epilepsia ab aqua limpida in cerebro, ventriculis & Sacra Fistula.*

Hippocrates cum ovicularum Epilepsia sublatarum cerebra, aqua liquore plena repperit, cum morbum inde tradidit distendi: Quidam puerulus levi Epilepsia arripiebatur, cujus mox in dies intumescerebat caput, ut tandem morbo, cui nomen est Hydrocephalus, diu teneretur. Hujus iam defuncti cerebri tenui sero perfusum erat, & hic semel tantum Epilepsia attentatus fuit. *C. P. Schneiderus l. de Catarrhis special. p. 257.*

*Epilepsia in Apoplexiam desinens à sero acri in cerebro, inter meninges & in ventriculis stagnante, cum vermibus in intestinis.*

Anno 1672. die 23. Maii, in Xenodochio, vir annorum circiter 30. habitu carnosus, pilis nigris, temperamento sanguineo melancholicus, disiectus est à D. D. Glaser. Qui occubuit tandem Epilepsia terminata in Apoplexiam, cum anno ante agrotaret febre lenta, dein intermittente, ictero, quartana, hydrope, a quibus malis sibi videbatur convalescere ut nulla videretur aqua adesse, sed versa pagina è vivis excessit, in cujus corpore sequens anomalia inventa.

In infimo ventre 1. Hepar ingentis magnitudinis & ponderis, licet mollitie naturale, colore vero livido, duplo fere majus erat quam natura esse deberet. 2. Lien etiam duplam magnitudinem vel triplicem ad naturalem habebat, substantiam flaccidam, friabilem, colore ad lividum accedens; Scirrhus neque in hepate neque in liene reperiebatur. 3. Epiploon putridum, a quo mesenterium infectum inflammatione tentatum. 4. Intestina copiam non agnam vermium continebant, ut aliquibus locis instar nodorum complicarentur: aqua pauca, aut fere nulla reperiebatur: infimi ventris reliqua erant naturalia. 5. In thorace cor flaccidum, molle, ita ut substantia cordis tantum diindiam crassitiem contineret, quam habere debe-

ret; Capsula cordis aqua repleta, uti & in toto thorace feri magna copia stagnavit. 6. Pulmo in sinistra parte adnatus, ceterum semiputridus. 7. In capite inter piam & duram matrem, ubique, uti & in ventriculis, magna feri copia stagnavit, cujus sapor acris, subacidus & salus & parum exedens repertus. Venæ circa membranas valde turgebant. In tertio ventriculo, inter anum & vulvam, ponticulus instar duorum nervorum complicatorum reperiebatur, colligans quasi crura cui innitebatur septum lucidum: exterior cutis color lividus erat, ob sanguinem per circulationem revertentem, circa cutem stagnantem. *Ex communicatione Clar. DD. Mavigole Medici Basiliensis.*

*Epilepsia orta à panco humore putri inter calvariam & crassam meningem delitescente.*

Aliquando observavimus è summo capitis vertice, in quo sub pericranio vitiatum venenatumque humor coerebatur, vaporem manifesto sensu intro subire, qui Epilepsiam concitaret, hancque postea caustico perianatam medicamento; Ita proculdubio existimari debet vitus, vel circum meningas, vel circum cerebri substantiam, vitium contineri veneni anulum, cujus ex intervallis impetu tacto Epilepsia suscitetur: Aperto Epileptici Philosphi, qui decesserat, capite, qui vehementissimo dolore circa sinciput torquebatur, deprehendimus crassiorrem meningem ea sede calvæ ossi adhærescere, p. uculo humore putri interjecto. *Fernelius Pathol. lib. 5. cap. 3. & lib. de Abditis 2. cap. 15.*

*Epilepsia à cerebro Sphacelato post cranii vulnus.*

Vulneratur quidam in cranio, qui visus est Cheirurgo sanitati restitutus, Egreditur domo & sumus quoddam procurat, altera vero die repente concidit & Epilepsia extinguitur.

Aperitur cranium & dimidium cerebrum Sphacelatum reperitur. *Philip Salmus, Cent. 3. Observat. 22.*

Cerebrum Sphacelatum vidit Glandorpius Observat. 6. atque hunc ortam Epilepsiam.

*In Epileptica mulieris Sinu meningis dura Polypus insignis repertus.*

In sinu meningis duræ longitudinali subjecti muliebris, publice in Theatro Amstelodamensi dissecti, materia continebatur alba, tenacissima, quæ sinum replebat & ad omnes sinus rivulos diffundebatur. Epilepsia laboraverat mulier jam ab aliquo tempore, quæ etiam extincta. *G. Blasius Observ. Med. 2. Parte 6.*

*Epilepsia à gladioli frustulo in ipsa cerebri substantia impacto.*

Retulit Joan. Dom. Sala. in ipsa cerebri substantia gladioli impacti frustulum perpetuo cuidam, reliquo curato vulnere, sine detrimento hæsisse, nisi quod Comitiali morbo frequentius convelleretur. *Thom. Baribolinus hist. 67. Cent. 4.*



*Epilepsia oborta à carnosio tuberculo in cerebri  
ventriculo contento.*

Nullo ingenio huic malo admodum gravi, quandoque medelam reperiri miretur nemo, qui communis mali causas, ut plurimum inexpugnabiles consideraverit. Quidam singulari Joan. Pravotii fama excitatus, recuperandæ valetudinis spe Patavium venerat. Nullo effectu ad suos reversus, quum paulo post fato cessisset, in cerebri ventriculo Tumor carnosus fuit inventus, qui cerebro compressio inanem huic morbo Medicinam docuit. *Joan. Rhodius Centur. 1. Observ. 35.*

*In Epileptici cadavere angustia nativa ventriculorum cerebri reperta est.*

Anno 1649. adolescens quidam 18. annorum Epilepticus in nosodochio Leydensi, in ipso Epileptico insultu mortuus est, cujus dissectionem cum Clar. Falcoburgius aggressus esset, & inter cetera in causam mortis accurate inquireret, Nullam invenire potuit manifestam, præterquam quod ventriculi cerebri nimis erant angusti quam alias naturaliter constituti esse solent: In Pectoris vero capacitate humoris sanguinei cochlear unum inventum est. In imo ventre omnia optime constituta erant, Lien solito gravior, sed boni coloris & habitus: Præterea membra generationi inservientia p. n. erant conformata, nam vasa semen Deferentia vix conspiciebantur. Præparantia in uno latere deerant, Testiculi autem intus retracti fuere. *D. Simon Schinzius miscell. cur. anni 1671. Obs. 62.*

*Epilepsia à compressione ventriculorum cerebri,  
& sanguine concreto in substantia ejus.*

Nonnunquam cerebri ventriculi ita collapsi sunt in Epilepticiis, ut spirituum non facilis sit transitus liber: Adr. Falcoburgius puerum 16. annorum in ipso Epilepsie paroxysmo extinctum aperuit, nullamque aliam Epilepsie mortisque causam invenit, nisi quod cerebri ventriculi valde fuerint compressi, sibi que invicem superjacentes, sine ulla manifesta cavitate: In supremo vero cerebro, prope cranium, sanguinem concretum detexit. *Thom. Bartholinus cent. 2. histor. 92.*

*Epilepsia à materia adipi simili inter cerebri  
ventriculos sita.*

Fato functo Epileptico quodam, inter cerebri ventriculos magnam materiam adipis æmulæ copiam reperi. Hæc autem materia sine dubio, vel ventriculos comprimebat, vel vasa, adeo ut obstruerentur, nec spiritus animales facile ea permeare valerent. *Petr. Borellus Cent. 2. Observat. 78.*

*In Epileptica cerebro nihil secanti occurrit præter tenuia & exilia quadam corpuscula  
in ventriculis.*

Mulieri intra paucas horas extinctæ cum convulsionibus, in cerebro nil ferè alienum compertum est. In ventriculis aliqua erant corpuscula, sed adeo tenuia & exilia ut parvi essent momenti. Accepimus eam huic morbo alias obnoxiam fuisse. Erant hæc Epileptica. *G. Ballonius Epid. lib. 1. p. 69.*

*Epilepsia ab incurvatione diplois interna  
excitata.*

Viri cujusdam magni nominis filiolus septimeltris, cum nutrice de nocte ad lactandum traderetur, somno, si non vno, obrutus (nam solebat per vetulam hircum vnum emendicare, matula deportatum) postquam denuo puellum in cunas reponeret, cecidit supra eam quandam prominentiam, unde post quatuordecim dies correptus Epilepsia ad plures abiit.

Ut ignota, & à perversis mulieribus suppressa innotesceret causa, dissectum fuit caput, in quo paulo supra tempus sinistrum inferior cranii lamina, seu tabula, in notabilem tumorem elevata versus cerebrum, superiori omnino illæsa, viscebatur: unde facta eo loci membranarum compressione, humorum affluxu, ac cerebri notabili corruptela, Epilepticus exspiravit. *Anton. de Pozzæ Obs. 35. miscell. curios. An. 4.*

*Suturarum prava dispositio in tribus Epilepticis.*

In figura deviantur Suturæ capitis fatui cujusdam, quæ omnes uno quasi clivo exaltatæ eminebant, Quod in tribus Epilepticis pueris Neapoli vidimus, præsertim coronalis, ut novam Epilepticorum & causam & curationem suggereret. *Bartholinus Anatom. Reformatæ lib. 10. cap. 5.*

*Epileptici motus per consensum à Pulmone dextro adusto, nigerrimo, thoraci adherente,  
Cerebro & reliquis partibus salvis.*

Adolescens Basileensis territorii, annorum forte aliquot supra viginti, ingenti Parotide laborans, à Chirurgo nuper curatus fuerat: Certa die incalescens frigida haustum avidissime sumit & herbarum incubat. Paucis diebus post de cephalalgia conqueritur, febricitat, delirat, ita ut in Xenodochio nostro detentus pauper vinciri juberetur: Inde omnibus fere hora diei quadrantibus buccas extraordinarie motans, Epilepticis insultibus corripitur, sputum album bulis refertum plurimis exprimens, oculos intorquens, servato semper judicio & sensibus, ut mihi interroganti in ipso vigore observare contigit, imo expedita satis post paroxysmos brevissimi temporis ad interrogata responsum. In collo dolere se compellatus respondebat, ubi tamen & nihil p. n. exterius deprehendebatur: urina citrina, crassa erat cum hypostasi: pulsus debilis, æqualis & parum febrilis, sudoribus facillime distillabat æger: Deliria quidem theiaca & syrupo de succo limonum cum aqua acetosæ pacari potuerunt, nunquam illis vel aliis curari morbus.

Aperto cadavere, felle vesiculam externe & interne albam & vacuam plane reperimus: Pulmonem dextrum adustum, nigrum atramenti nigrum & thoraci humiter adhaerentem, Unde per consensum cum cerebro motus epileptici & deliria accesserant: In cerebro & reliquo corpore nihil contra naturam invenimus. *J. Nic. Binningerus Obser. 38. cent. 3.*

*In Epileptici cordis sinibus humor concretus  
reperitur.*

In hominis cadavere per me secto, inventus uterque Sinus cordis humore obsitus concreto, instar



lutar vulgaris gelatinæ flavioris : quam ego putavi putrem pituitæ mucaginem, bilis aliqua portione tinctam. Hic primum epilepticus & clunensis, denum occubuit cum sinistri brachii convulsionibus : ejusmodi ad unguem concretum repetitum est & in magnis venis quæ cordi inferuntur, atque etiam in nujus auriculis Religiosi. *Severinus de Abscessibus pag. 277.*

*Epilepsia illo cerebro ejusque ventriculis excitata.*

Decembr. x. 1613. aperui corpus cujusdam decollatæ quæ Epileptica dicebatur : In ejus tamen ventriculis cerebri nullus omnino humor apparuit : Ipsa etiam cerebri substantia erat temperamenti licioris : Unde conjeci ipsam aut Epilepsia non laborasse aut Epilepsiam fuisse percontensum. *Salzmännus Obs. Ana. om. pag. 48.*

*In muliere Epilepsia & convulsionibus obnoxia solum Pancreas male affectum deprehensum est.*

Licet sæpius contingat Epatis, Lienisve affectiones pravæ malam Pancreatit, constitutionem insequi, non raro tamen contrarium evenire experientia docet, Hoc in Nob. Joannæ Highmorus observasse se in disquisitionibus Anat. scribit, quæ annos retro plures convulsionibus, Epilepsia & passione hysterica laborabat, & tandem post dolores & cruciatus exquisitos obiit. Aperto corpore solum Pancreas male affectum & ulceratum inveniebatur. *Ger. Blasius ad cap. 4. Anat. Veslingii.*

*Infans Epileptici cadavere aperto, vitium in intestinis & ventriculo repertum est.*

Sæpius apud Nos infantes recens nati, vel etiam à semet ipsis accedentes, derepente sine ulla quandoque cum manifesta causa, quandoque sine magnis clamoribus Epilepsia corripuntur, emoriuntur, ut suo merito hinc *rom. x. vultus* ex Hipp. sententia audiat : vix enim denos inter centenos reperire licebit infantes mortuos, qui non convulsionibus, vel illis certe superveniuntibus, mortui. Novi in Ill. familia aliquot successive Epilepticos obiisse infantes, omnes sex vel septem septimanis à partu, ita ut desperabundi parentes in proxime nascituro inultionem occipiti, more in Italia, imprimis Florentiæ receptissimo, instituere decreverint, ad averendum gravissimum hunc effectum. Alios notavi, qui à convulsionibus servati, ad primum tamen ulque septennium stato tempore singulis annis semper recidivam passi, reliquo tempore bene & extra ullam molestiam, constituti. Varias & diversas vulgus pronit hujus n. ali. causas : nec minus operosi sunt Practici, nunc cæli constitutionem, nunc horam nativitatis, nunc cerebri imbecillitatem, nunc aliud incusantes.

Cum mense Martio anno 1674. Viennæ essem, mercatoris cujusdam, in vicinia, ubi diverterem, habitantis filioli 24. septimanarum, per aliquot dies alvi profluvium cum torminibus clamoribusque die ac nocte passa, hoc ipso die suavis adstantium foeminarum, licet satis debilis, purgata fuit syr. ros. mosch. circa vespertinam : post unam vel alteram operationem extreme debilitata, in consilium vocor : Vixi statim fatalem intare terminum, & cum Epilepsia finem vitæ prædixi, id quod & factum, non media nocte supervenere convulsionibus Epilepticæ, per tres horas durantes, & altero die mane mors. Simili plane fato ante annum ejusdem ætatis obiit ipsi filioli,

Hinc avidus sciendi morbi causam parens, petiit ut interesset apertioni corpusculi.

Nihil autem in aperto cadavere invenimus, nisi intestina inflata, distenta, vacua, & paucis excrementis biliosis, liquido hinc inde fluctuante repleta : ventriculus inflatus continebat materiam pituitosam spumantis, & quasi adhuc fermentantis, quantum binis cochlearibus excipi potuisset.

*Epileptici canis anatomie cujus intestina vermibus erant obsita.*

Adrianus Spigelius Catellum Milesium, quem in deliciis habebat, Epilepsia confectum aperuit, Intestina vermibus scatebant : Sed imprimis latus Lumbricus iis adhaere capite bifido, qui veram candidi coloris fasciam referebat. *Joan. Rhodius centur. 1. observ. 59.*

*Anatome Pueri Epileptici, cujus Lien induratus, scirrhusus & fere lapidosus repertus est.*

Sereniss. ac Cellissimæ Principis D. Ferdinandi Alberti Ducis Brunsvicensis, & Lunaburgensis. Filiolus unius anni, Convulsionibus Epilepticis admodum erat obnoxius, Cum his ita graviter affligeretur ut tandem vitam cum morte commutaret, corpus ejus die 27. Jan. 1673. aperui, & Lienem colore lividum & nigrum, substantia admodum induratum, scirrhusum & fere lapidosum juveni. *Matth. Tilingus in miscell. curiosis an. 1674. 1675. & 1676. p. 280*  
*Anatome Epileptici, cujus viscera salva inventa, solum ventriculus repertus tenuissima membrana instar.*

Chirurgus ex majori Polonia, artis suæ bene peritus scripsit nuper Nobilem quandam anxietate cordis diu vexatum, infiniti quæ usum remediis, tandem Epilepsia correptum per duos dies mortuo similem jacuisse, tandem satis cessasse.

Aperto cadavere reliqua viscera salva inventa fuisse (ut ille ait) solum ventriculum repertum tenuissimæ membranæ instar. *Joan. Paterfonius Hain, in miscell. cur. ann. 6. & 7. p. 239.*

*Epilepsia à suppresso semine.*

Nob. quidam coitui addictissimus, tandem hujus sceditatis pertævus, castitatem sibi servandam ita rigide proposuit, ut deinceps jejuniis, abstinentiæ & orationi solum esset intentus : Ecce post sex menses nausea correptus, vertigine concutitur, & post paucos dies Epilepsia sæva opprimitur : Medici à vitio ventriculi subortam rati, ventriculo, sed frustra consulunt : nam malo ferocius infestante in plenilunio præcedentibus inordinato linguæ motu capitis rotatione, pallore faciei, caligine oculorum, Epilepsia cum valido dentium fragore correptus, post paucas horas velut sideratus enectus est.

Dissecto corpore, nullum vitium in stomacho, cerebro reliquisque partibus inventum, præterquam in cavitate valis semen in penem deferentis, quæ licet conspectum quodammodo Anatomicis fugiat, & coitus tempore solum aperitur, tamen ea semine in virorem mutato oppleta visa est, & ulceribus sordidis, ab hac virulenta substantia retenta & corrupta fortè contractis conspurcata, è quibus ascendebat indefinenter aura noxia, quæ cerebrum lancinans, excitata Epilepsia, ægrum ad interitum deduxit. *Zach. Prax. Admir. lib. 2. Obs. 119.*



*Epilepsia, ex intestinorum tenuium erosione & gangranosi.*

Die 5. April. vocati fuimus ad infantulum trium septimanarum, qui miris vexabatur ventris torminibus ab ipso ortu quibus ab utero mulierculæ ol. amygd. dulc. cum sacchar. occurrerunt: posteaquam vero malum magis ingravescere animadverterunt, nostram implorantem opem: omnibus probe exploratis reperimus torminibus incipientibus, spasmodici quid secundum fibras œsophagicas accidere, a quo deglutitio impediatur & misellus singultientis instar clamitet: depiciebat viridia odoris acris, appetitus prostratus fuit, sitis intensa. De iracundia matris cum aliquâ ex parte nobis constiterit, magis de dicta tempore graviditatis percontati fuimus, quæ satis mordicata fuit, dum carne suilla & brassica capitata salita admodum palato blandita fuit: præstipimus antepileptica nervina, absorbentia & præcipitantia, atque externe Bals. de Peru & onnicist. ventric. prospeximus, matri quinectiam tragema suavis ex spec. diatrag. frig. gum. arab. ocul. cancr. præp. rasur. ebor. coral. rub. præp. cum sacch. ros. tab. verum enim verò biduo post convulsiones evidentius comparuerunt, dum emissio prius statu sonoro, in faucibus difficultas major iniecit, & manus pedesque variè contremuerunt, injectum clystina ex lact. vaccini. cui additur ol. rut. cum sale tartari & ordinat. mixtur. antepil. ast nequicquam his effectum, minus aliis a garrulis mulieribus hinc illinc allatis, quinimo convulsiones tanto impetu misellum prehenderunt, ut mirari subierit maxime, qui tot armatis tandem resistere misellus potuerit, siquidem post decimum demum diem, corpusculo verè enecto, fatis cessit.

Secuimus cadavericulum præsentibus Vir. præstantiss. D. Ritz. Affine nostro I. harnacopolæ, & D. Passavant Chirurgo: Abdomine aperto intestina admodum erant distenta, crassaque cum tenuibus materiam viridem, grumofam, qualem in vivis cum torminibus æcetrinus sæpius excrevit, monstrarunt: intestina tenuia hic illic qualemunque ruborem conceperant, præprimis autem sub finem ilei ad aliquot uncias manifestam gangranosin deprehendimus. Cæcum parvulum, mane ex vaccini, a labe immunefuit, hepar subpallidum: vesicula fellis bile subviscida & viridi plena, pancreas duriusculum, ea etiam parte, qua duodeno necitur. Mesenterium & renes, qui bubulis similes erant, laudabiliter habuerunt, nec pulmonibus quidquam vitii inerat, quin tenerrimæ vesiculæ egregiè in his conspicuæ: Cranii futura, anterior & posterior, insigniter ab invicem dehiscabant: sanguinem quoque extravasatum cranium hic illic monstravit: cerebri meningis huic aliquo modo erant adnatæ, quibus disruptis modicum serum promanavit. quale concretum in cortice quoque hinc inde notavimus, cum sanguine grumoso & extravasa stagnante, haud dubie ab motu, intra ita graviter infestantibus motibus spasmodicis, impedito. *J. Jac. Hardeni Apiarii. Observ. vii. 99.*

Plurimum Epilepticorum infantum aperta calva Cl. Car. Drelin. aliud nihil reperit quam ventri-

culos cerebri anteriores sero flavente & acritugidos, & e plenitudine tanta coniecit quippiam illius feri mordacis irruere in ventriculum 3. & in 4. ac nervorum fibrillas inibi lacessere, convulsince, atque lethaliter. Inter autem Epilepsia sympathica exempla Parisinum militem mihi recitavit, pari lato ac apud Gal. ext. t. fonticam auram sensisse frigidam a summo dextri pedis pollice in crus efferri, ac consecutione quadam in cervicem & cerebrum: conveniente viro totis artibus horride succussato. *E The-sib. Discipulor. Clariss. Caroli Drelincurti.*

*Epilepsia atq; dyspnœa altera & inaudita causa.*

Vir ebriosus jam olim cibus pepercit, sed vino & Nicotiana indulsit impendio: quinectiam sp. V. milles sese dementavit, ac tandem sub æt. an. 30. frequens convulsus est, sensibus orbis, spumans & anhelans. Ubi mentis compos est, queritur de capite gravi & sensuum hebetudine: sed præprimis ailerit sese serpentes atque viverras gerere pectore clausas, quæ ibi pulmones gravent atque divellant. Tandem cum plateas Novembri perreptaret cecidit derepente convulsus, cum spuma & stertore, ac intra paucas horas extinctus est.

Revelia calva dura meningis ductus potiores concreta pituita flava turgabant. Illis patefactis mucaginem illam ex ipsis, haudsecus ac è sambuco medullam, sed totaliter coherentem atque tenacem C. D. eduxit. Lumbricos esse sustinebant adstantes, sed pura puta fuit gelatina e sero intra sinus concreto, ubi, cum in proplasmate, teretem formam consecutum est. Dura matre leniter & industrie reducta nullum spatium detectum est intra meningas, uti vulgo. Universus enim cerebri ambitus gelatina obducebatur fulva ad ejus intimos usque gyros. Miro igitur spectaculo tota isthæc concretio uti finis meningum, ita & anfractus cerebri complebat. Imo tota eminebat super cerebri corticem griseum digiti auricularis altitudine ad basin usque cerebri, atque sic suis e sedibus piam matrem expulerat. Hæc enim non nisi intermedia gelatina cerebrum contegebat.

Hæc concretionem pituitosa, viscida, tenaci, fulvaque sedulo derata, novacula in cerebri substantiam griseum atque candicantem est adacta, & firmior illa atque compactior solito deprehensa est, sicut in hydrocephalo idipsum annotavit Cl. Promotor. Ventriculi quatenus lymphascebat subfulva, salis more feriente linguam. Plexus choroidæus & ejus glandulæ, ac etiam pinealis, impense tumebant, ac firmitudinem præ se ferebant haud profecto vulgarem. Istitis peractis totus arsit Præceptor meus pectoris aperiendi desiderio serpentum visendorum gratia. Sed ecce dum cordis recessus indagat, dira moles pituitæ fulvæ, tenacis & compactæ ventriculum opplet utrumque. Iud sese exinde per universos venæ & arteriæ pulmonariæ diremptus diffundit, tot scilicet pedes polypus ille cordis in pulmones infert, quot profecto pulmonis sunt sanguinei ductus. Corpus autem illud soletter e suis thecis seu vaginibus educum est, ac supra chartam bibulam extentum, quo aciculis confixum siccaretur.

Non alii certe serpentes, nec aliæ viverræ fuerunt, de quibus vir ille toties questus



erat, quam polypi illius pedes per pulmonis sanguinea vasa longe lateque protendi, atque sua crassitudine sanguinis a corde in pulmones impulsu liberum iter intercipientes.

Coronidis vici notare est cerebri candorem Nicot. Mepanti usque in opacatum fuisse, sed protecto pulmonis utriusque haud fuit fors eadem. Is etenim uterque intrus & extra nigricabat; & tartareas insuper glandulas bronchiales ad l'asin cordis habebat, vere petricosas & opacas ac illa Nicot. fuligine tetra plene perfusas atque demigratas. Et diverso autem tartarum onue quod intra bronchia Cl. Promotor meus reperit, id omnino candidum fuit, & grandines illas cessit ipsi, de quibus scriptores nostri scienter omnino scribunt, & quas aliquoties tussi expiosas, & mucro convolutas contuitus est Præc. meus, & siccitas asseruat.

Sic perfectò sagaciss. vir idem calculos è renibus humanis atque caninis nivei candoris zmulos nobis cessit. Valeant ergo Medici dum profitentur, calcithum renalem nullum candidum esse. Valeat & Philosophus (Probl. 42. sect. 10.) reputans nullum animal præter hominem calculo vexari.

Ita curiosiss. atque peritiss. Promotor meus C.D. dum mirinca hoc anno, cadaveris humani retexeret telam, reperit præter arter. hecalem hinc inde protuberantem atque tophaceam, arteriam quoque coronariam cordis lapidosam. Ino quidpiam offendit petrez naturæ cordis ipsius tholamo sinistro adnatum, eo Loci ossa deteguntur in elephanto, cervo, dama, tauro Ac.

*In puerulo Epilepticiis motibus extincto varia in visceribus trium ventrium adnotantur.*

Pueilus septimestris postquam febricula per mensem integrum laborasset cum urinis glutinosioribus & rubore saturato intectis, derepente in motus Epilepticos ac affectionem lethargicam, incidit, quibus quinque dierum spatio exstinguebatur. Hujus cadaverculum cum cultro nostro subiceretur sexto April. Ann. 1686. vidimus primò totum Abdomen quàm maximè tensum, illoque reterato reperimus Omentum totum versus ventriculum replicatum; ventriculum ipsum contractum ac prorsus vacuum; Pancreas ventriculo subiectum, duriusculum ac pallidius; Intestina tenuia flatibus distenta, crassa verò & flatibus & excremento fluidiori sed lutofo, coloris grisei, repleta; utraque tamen in propria substantia intempera; Jecur per totam propè sui gibbam partem diaphragmati agglutinatum, magnitudinis monstrosæ, coloris subgrisei, maculis sublividis interlincti, in tota substantia, durius, ac cultri aciei non parum renitens; Vesiculambilariam succo viridiori ac cœnoso, unde vix per compressionem etiam incisus longius membranis effluebat, turgidam; Lienem satis bene constitutum præterquam quod ipsius exterior membrana tota corpusculis tophosis, seminis mili magnitudine, respersa foret; Renes naturalem magnitudinem non parum excedentes, eorumdemque pelvim urinæ syrupi consistentiæ, ac colore prope sanguineo, plenum, coloris præterea illi erant pallidioris; Ureteres qui vix spe-

cillum admitterent, quod scilicet humore mucilaginoso interficerentur, hic humor præcipuè à dextris dum urinæ e pelvi delabenti, obicem in via poneret, in causa fuerat ut in hoc uretere paulo ipsum renem, dilataus confecta fuisset. Pollicem facile admitterens, urinâ prædictâ tota referta; Vesicam urinariam aliàs sanam, sed in sui cavo urinam, quam in a'is suis fecerniculæ ac canaliculis cœnosiorem, continentem. Inde in Thoracem cum ascenderemus reperimus Cor suâ capsulâ conclusum, ac aquæ pericardii, ut in sanis moris est, innatans substantiæ compactioris, cujus ventriculus dexter parum sanguinis grumosi, sinister verò cori quoddam polyposum album ac solidius, ramos duos in totidem venæ pulmonariæ, vulgo arteriæ venosæ dictæ, tubulos emittens, complectebatur; Pulmones per duos lobos dextros, superiorem scilicet minorem, inferiorem grandiore, pleuræ non parum firmiter adnatos, magnitudinis ab hoc latere ordinariæ, coloris prorsus albidii, quibus varie excisis ne guttula quidem sanguinis vel spumosi, vel alius consistentiæ, effluebat; à sinistris vero majores fuere lobi, crassiores, lividi, ac sanguine ita turgentes, ut ille materiz spumosæ aduillus, copiosius inter rescandum efflueret. Tandem cavitatem supremam attingentes reperimus Cerebrum substantiâ quidem sua incorruptum, sed ea feri citrini quantitate, & in basi, & in ventriculis suis suffusum, quæ ad uncias ad minimum octo assurgeret.

Hiscæ omnibus sic lustratis non difficile fuit statuere, in ventris viscera debiliora dum ferro inertiori, succisque glutinosioribus tota interficerentur, eorumque varii canales excretorii obstruerentur, distributioni alimenti, ac sanguinis purificationi non parum obstitisse; liquoresque ab eodem secretos in propriis vasis moram longiorem traxisse, & illius massæ post multam acquisitam in mora acrimoniâ redditos, cortosivum quid ipsi impressisse, quo membrana pulmones veliens exesa, hocque viscus pleuræ agglutinatum fuerat. Ipsum præterea sanguinem sero quasi obrutum, bonam ejusdem quantitatem in cerebrum tandem deposuisse, quæ suis aculeis epilepticos primum insultus, ac demùm inundato & submerso quali toro viscere, animalium spirituum vera officinâ per eorum suffocationem, lethargicam affectionem, ac tandem ipsam mortem induxerit.

## EPINYCTIS.

I. **A**D Furunculum haud ineptè referri possunt Epinyctis, & Terminthus. Epinyctis, ex C. Celsi, Pauli Aeginetæ, & Aëtii sententia, est pustula pessima colore sublivida, vel subnigra, vel rubicunda, vel alba, circa quam vehemens suboritur inflammatio cum ingenti dolore, noctu magis affligens, cumque aperta est, intus mucosa reperitur exulceratio. Color est humori suo similis, ab eaque cruenta emanat sanies. Dicta vero Græcis *ἑπινύκτις*, quia sæpe semper noctu oritur. Arabes *Esferè*, *Sere*, vel *Salse* appellantur.

II. Fit Epinyctis, haud secus ac Furunculus,

Kkkkk 3



e sanguine impuro, acri, maligno, critice in corporis superficiem expulso.

III. Signa vero quibus cognoscitur Epinyctis, sunt quod pustula hæc sua sponte proveniant, colore sint rubicunda, vel sublivida, vel albicantes, atque gravius nocui quam interdum affligant. Caterum dolor in Epinyctide vehementior est, quam pro ejus magnitudine, cum scabrum non sit: sponte exulceratur, & cum rumpitur mucosam parit exulcerationem, unde subcrenata emanat sanies.

IV. Equidem pustula hæc, ex C. Celsi sententia, maxime eveniunt in puerili ætate, raro in medio corpore, sæpe in eminentibus partibus, & verno tempore, suntque nullius periculi, nisi in curando error committatur, quamvis pravorum humores in corpore redundare indicent.

V. In Curatione Epinyctidis, haud secus ac in Furunculo Curando, procedendum; viz. Pustula maturanda. & Puris generatio acceleranda, appositis Uvis passis contulis; vel imposito Cataplasmate ex Uvis passis, Caricis pinguibus, & Ruta viridi, simul comminutis; vel Emplastro Diachylo cum gummi, cum Unguento Basilicone, vel, ut malignitas si quæ adsit corrigatur, tali Digestivo,

℞. Unguenti Basiliconis ℥i. Theriacis Andr. ℥ij. Mellis virginiei ℥vi. Olei Scorpionum ℥ij. M. F. S. A. Digestivum. Postea ulcus mundetur Digestivo communis; Unguento Aureo vel Basilicone impleatur; atque imposito Emplastro Diapalma, vel Styptico tandem cicatrice regatur.

VI. Terminthus autem Tuberculi species est, & Epinyctidi ferè similis, cui superne & inferne nigra pustula incumbit, qua rupta inferne desquamatio apparet: dissecio autem tuberculo pus invenitur sed cum Terminthus ex eadem causa, qua Epinyctis, hoc est, ex adusto, acri, & venenato sanguine fiat, eademque pars afficiatur; hinc eadem Curatio ei convenit, idemque Prognosticum, quod Epinyctidi.

## EPIPHORA.

**E**piphora (à *epi* fero) est immoderata tenuis humoris fluxio lachrymarum specie in oculos præter naturam facta, humor qui fluit, modò frigidus est & aqueus, nullo dolore molestus, modò acer est aut salus, dolorem, ardorem & ruborem, imò nonnunquam palpebrarum exulcerationem inferens, Symptoma est in excretis. Hujus affectus causa proxima est humor excrementitius, à capite vel aliunde à parte aliqua corporis in angulos oculi influens. Causæ disponentes sunt partis affectus imbecillitas, roburque mittentium. *Thom. Burnei Thesaur. Medico-Prælici lib. 5.*

Post evacuantia generalia & particularia, revellentia & derivantia, quibus cerebrum ab humoribus serosis depleatur; ad fluxionem sistendam utatur ager sequentibus.

℞. Nuc. cupress. gallar. virid. rad. bistort. ana ℥℥ pulverizentur, & irrorentur aceto acerrimo, & siccantur; add. mastich. sang. drac. sandarach. ana ℥vj. ochra in aceto lotæ & siccæ. ossium human. calcinat. lap. hæmatit. ana ℥ij. bol. Armen. alum. rup. ana ℥ij. Te-

rebint. Venet. ceræ ana q. s. hæc sit Emplastrum, cujus portio extendatur in panno sericeo & applic. arteriis temporibus & supra supercil. & tota nocte gelletur.

℞. Aloës & venicæ ℥j. tutiæ præp. ℥℥. Mac. ℥j. Ileos Flor. ℥j. Mastich. sang. drac. ana ℥ij. Vitriol. alb. gr. xv. Sacchar. cand. ℥j. Aq. stillatit. lœmcul. euphras. ros. plantag. ana ℥ij. M. insolentur per octiduum, mox l. colatura, de qua cap. ℥j. phlegm. alum. q. s. ad contentum perandum; instilletur gutta in ocul. sapiens in die. *Theodor. de M. yerne Præcos Medic. lib. 1.*

Puella quidam novem annorum ex uno oculo lachrymæ ultro effluebant, quæ frigidæ erant, neque oculum corrodebant. Erat autem puella pintoia & catarrho obnoxia, præmissis universalibus ut sequenti collyrio uteretur mandavi, quod omnibus convenit in quibus malum perseverat.

℞. Aloës, nucis cupr. thuris, mastich. myrrh. ana ℥ij. tutiæ præp. sarcocoll. nutrit. an. ℥j. sang. drac. berber. sumach. ros. rub. ana ℥j. pulverulentur tenuissime & excipiantur aqua fœnic. & hac collyrium, cujus ope ab hoc malo liberata est. *Petrus Forestus, observat. 11. lib. 11. De morbis Oculorum.*

Epiphoram calidam in muliere quadam ita curavi, corpore repurgato & vena scæa, collyrio sequenti utebatur.

℞. Troch. alb. rhafis sine opio, ℥j. Aq. ros. vel peculi ros. ℥ij. Aq. fœnic. (ne ob refrigerationem obtundatur acumen visus) ℥ij. M. F. Collyrium.

Si illud non juvaret, consului ut sequenti uteretur.

℞. Ceras. ablutæ, sarcocoll. nutrit. licii, acaciæ, thuris, ana ℥j. ossium myrobals. adulator. corall. alb. rub. ana ℥℥ Margarit. ℥℥. succi mali punici ad dimidii abluptionem cocti, q. s. F. Collyrium. Solus etiam malorum pomico- rum succus coctus, donec dimidium absumatur, lachrymas calidas curat. In hac Epiphora commendantur etiam cauteria retro aures. *Rondeletus* potius laudat cauterium supra commissuram. Vetula quædam in Italia cum oculos haberet lippientes, lachrymantes & saniosos, cum intenso dolore & prurigne, & nullis remediis posset curari, tandem raso capiti emplastrum vesicatorium impositum est; excitationisque vesicis ac ruptis, butyro imposito, ac demum caulis folio, quo præsidio perfecte curata fuit. Vesicatoria etiam in collo egregie profunt. *Petrus Forestus, observat. 12. & Schol. lib. 11.*

Pro singulari experimento habetur hoc unguentum.

℞. Ærugin. xris, gr. xij. camphoræ, ℥j. tutiæ præp. ℥℥. butyr. rec. quod cum aqua ros. lique- hat. & parum bulliat, ℥vj. M. decenter in hac unguentum. Indatur pili magnitudo in oculi canthum majorem: leviterque inungantur palpebræ. Est ad Epiphoras & pruritus oculorum, singulare experimentum. *Felix Platerus, tom. 1. prax. med. pag. 279.*

## EPIPOCELE.

Vid.

## HERNIA.

EPU.



## EPULIS ET PARULIS.

**I.** Quænamadmodum Laxa, Fungosaque intra Nares excrefcens Caro *Polypus*, ita *Hypercarcosis* seu *Carnea Gingivarum circum Dentes Excrefcencia* Epulis dicitur. Hæc vehementer aliquando increfcit, atque augetur, ut adeo & loquendi, & manducandi adimat facultatem: vnicidam, tenacem, ac foetidam effundit Salivam, & non raro in Cancrum quali degenerat.

II. Solet verò Affectus hic ex *Scorbuto* semper oriri. Enimvero Sanguis labe scorbuticâ infectus, recementa sua acrisalina tum per arteriolas, tum per vascula salivalia, in Gingivas quoque deponit; quæ laxam, fungosamque illarum Carnem erodiunt, hinc & corrumpunt sæpe, ut Dentes stabilire nequeat; aliquando vero trofam Gingivarum Carnem ultra excrefcere faciunt, adeoque *Epulidem* causant: quæ idcirco in Norvegia, aliisque Septentrionalibus Regionibus, ubi Scorbutus Endemicus est Morbus admodum frequenter contingit.

III. Refert Paræus *Chirurg. lib. 7. cap. 4.* sæpius se observasse, carnosam huiusmodi excrefcentiam in cartilagineam, & osseam vetustate induruisse: quapropter quam celerrime huius poterit, *Curationem* huius aggrediendam esse suadet. Igitur exilis quum sit Epulis, tentanda Ejus per Medicamenta Curatio, atque Universalibus, ut in Scorbuti Cura fieri solet, haud neglectis, topica adhibenda sunt Exsiccantia & Adstringentia; viz. *Aluminosa*, aliaque Antiscorbutica, v. gr.

II. Aq. Plantaginis, Salviz, Antiscorbutica, Vini Albi Gallici ana ʒi ss. Aluminis Crudi pulver. ʒij. Aquæ Cinamomi ʒiij. Misceantur pro Oris Collutione.

Sed Medicamentis si tolli nequeat hic Gingivarum Tumor quam citissime Filo, vel Cultro abscindatur, ne præter modum induretur, vel in Cancrum abeat. Ubi vero abscissa est Epulis, Agrotans frequenter os colluat, atque Gingivas fricet præscriptâ nunc Oris Collutione, vel simili.

IV. Nascitur quoque in Palato Tumor ex viscosa & acris materie, quæ Os inter & Membranam hærens, illud non raro putrefacit, atque corrumpit, hinc Ulcus grave excitat. Tumor hic Parulis dici consuevit, atque contingit ex Saliva præter modum acris & salsa, simulque glutinosa; quæ per exiles Palati ductus prodicens, & ob suam ipsius visciditatem membranæ poros transcolari nequens, adeoque inter Os & Membranam subsistens, Tumorem hunc producit. Qui ut Curetur, discissa pinguis Carica apponatur; hinc quamprimum non expectatâ suppuratione, sectione latâ & profunda, ad os Palati usque, incidatur, & acris, viscidus, necnon suberuentus humor exactè exprimatur: secus enim subjectum os facillimè corrumpitur, oriturque fistulosum, ægreque sanabile ulcus. Facta verò sectione, evacuatoque concluso humore, absque medicamentorum ope, sola saliva aperturam sanat. *Job. Munnicks Chirurgia lib. 1.*

*Parula* parva est inflammatio partis alicujus gingivarum cum tumore, quæ si non resolvitur suppurat, & in abscessum vertitur, qui malè cu-

ratus in ulcera serpentina sæpe degenerat. Si una dolor adsit, leniatur ille gargarismis e lacte tepido, cataplasmate ex mica panis albi in lacte cocta, misto ovi vitello, croco & oleo rosato. Si non resolvatur tumor, & ad suppurationem tendat, necus pinguis per medium secta carboni accenso superponitur, dum aliquantulum arefcit, dein tumori gingivæ apponitur, interdum atque noctu gestatur dum matura parulide pus sponte aut arte fluat. Abscessus hinc relictus non ad cutem faciei, non ad radices dentium aperiri solet, vel sponte naturæ, vel manu Chirurghi, quo aperto pus erumpit, statimque dolor cessat, & brevi pars redit ad pristinum statum. Si gingivæ extra tumorem inflammantur, idest, si phlogosi laborent, convenit gargarismus ex aqua communi tepida, Aqu. plantag. rosat. addito aceto rosato, vel oxycrato, vel ex succis sempervivi, plantaginis, solari.

*Epulis* est excrefcens gingivarum caro, parulidem male curatam sæpe consequens. Nisi enim in parulide, quæ suppuraverit, ulcus fuerit probe deterfum, luxuriat ibi caro, quæ Epulis dicitur, & sensim augetur, aliquando ovi magnitudinem superans, & sermone masticationemque impedit. Interdum in Cancrum degenerat, quod inde noscitur, quod cum prius esset indolens, nunc lancinante dolore comitata est. Cumque in Cancrum degenerat, nec ferro nec manu Chirurgica attingi debet. At quæ nullum dolorem excitat, aligetur filo duplicato, donec excidat, ubi autem excidit, ne repululet, ejus radix cauterio ignito attingatur, vel potenciali, vel oleo vitrioli aqua forti & similibus, cavendo tamen, ne ab his corrodentibus partes sanæ lædantur. *Autor Encheirid. Medico-Prætic. apud Fernel.*

## ERYSIPELAS.

## Curationes.

**T**umor qui Græcis *Erysipelas*, Latinis Ignis sacer, seu *Rosa* nuncupatur, ab Autoribus malè describitur, quod sit tumor præter naturam ex bile lere in solam cutem, quandoque etiam in muicuos subjectos, effusa, dolorem, calorem aliaque symptomata causante. Si namque sola Bilis in cutem effunditur Herpes, non Erysipelas oritur.

II. Sed quum vera Inflammatio, atque aded Phlegmonis species sit Erysipelas, potius dicendum videtur, quod sit Inflammatio valde ardens, maximeque circa cutem consistens, & aliquando subjectæ carnis aliquid occupans, orta ab effuso, extravasatoque bilioso, tenuiore, & subtiliore sanguine, cum tumore vel exiguo, vel sæpe, quoad sensum, nullo, cujus color pallidior aut magis flavescens est, quam Phlegmonis, & si tetigeris facillè sanguis subterfugit, rursumque illabitur exquisitè tenuis, aspectuque rubens.

III. Est autem Erysipelas duplex; verum seu legitimum, & non verum seu spurium. Verum Erysipelas simplex est, simplici fervore & rubore affectum sine ulla exulceratione, e sanguine bilioso, tenuiore, fervidiore, in quo Ac-



duum volatile prædominatur, genitum. Non verum seu spurium Erysipelas trium vulgo habetur generum: Unum quod oritur ex sanguine bilioso, tenuiore, ac acri, pungente, & rodente, qui ideoque latam, & aliquando profundam fissuram efficit exulcerationem: Alterum Erysipelas spurium est sine partis affectu exulceratione, in eo tamen exigua succedunt pustulae & vesiculae, quæ nonnihil incise, perforataeque saniei aliquantum emittunt: Tercium genus est, quod fit quidem ex sanguine tenui, fervido, ac simul vel copiose peccante, vel sero abundante, vel terribilibus, acido-austere, similibusve particulis redundante, unde Erysipelas dicitur vel Phlegmonodes, vel Oedematodes, vel Scythodes.

IV. Igitur verum seu legitimum Erysipelas est sanguine bilioso, tenui, subtili, fervido, in quo Aciditas volatilis abundat, generatur; qui ex minutissimis capillaribus vasculis exiliens, præ sua tenuitate & subtilitate in interiore carne subsistere nequit, sed per extremam cutem, partesque ei vicinas diffunditur, atque ardentem ibidem excitat inflammationem.

V. Ardens autem illa cutis, partiumque proximè ei subjectarum Inflammatio, Erysipelas elicta, à Phlegmone distinguitur, 1. Colore; est namque Inflammationis color ruber, Erysipelatis ex rubro flavescent. 2. Pulsatione; quæ magna adest in Phlegmone, parva vel nulla in Erysipelate. 3. Tumoris magnitudine; Etenim in inguinem tumorem Inflammatio partem attollit, cum & citem & subjectos musculos occupet; Erysipelas vero partem affectam modicè elevat, adeo ut vix appareat tumor, cum cutaneas partes solummodo ardens hæc Inflammatio invadat. 4. Calore, qui major est in Erysipelate, quam in Phlegmone. 5. Dolor, qui in Erysipelate minor est, ac pungitivus; in Phlegmone tensivus, & gravativus. 6. Duritie & Mollitie; cum Inflammatio tactui non cedat, sed remittitur; Erysipelas verò si tangatur, tactui cedat. 7. Eo, quod rubedo, quæ in Erysipelate adest, si digito prematur, statim abeat, & cutis sub digito alba evadat, deinde vero mox redeat eadem rubedo, ob tenuem subtilemque sanguinem, à quo fit: in Inflammatione verò hoc non accidat. 8. Quod in Erysipelate nulla tensio, ut in Phlegmone appareat. 9. Loco affecto; Erysipelas namque loco dimovetur, serpit, & vicinas partes similiter afficit, Inflammatio autem in uno hgitur loco, ab eoque nec discedit, nec dimovetur.

VI. Signa itaque, quibus hic affectus cognoscitur, sunt ætus ingens, dolor acris non valde vehemens, rubedo ad flavedinem tendens, ad tactum ut facillè cedens, ita & facillè rediens, partis intumescencia, ac tensio levis, pulsatio minor; sitque invasio eius plerumque cum Febre, nisi à causa externa oriatur.

VII. Equidem rardè periculosus est affectus Erysipelas, nisi ab exterroribus ad interiora materies repellatur: periculosior vero, si circa oculos, fauces, aliasve nobiles partes consistat; aut si vulneri, ulceri, fracturæ, luxationi superveniat. Ut autem facilius tutiusque sanetur, resolutione, aut insensibili transpiratione, seu per diaphoresin terminari debet, non suppuratione, quæ in hoc affectu mala admodum est, difficilisque curationis.

VIII. Ut verò Erysipelas ritè curetur, 1. Conveniens institueda. Dixta, atque eadem sex rerum nonnullarum dispensatio hic obervanda, quæ in Phlegmone. Deinde Antecedens Materia evacuada Cholagogis blandioribus, Venæsectione, ac inprimis Diaphoreticis iterandis, reiterandisque.

IX. Tertia Cura erit de Medicamentis Topicis: Quæ in Principio nimine sunt valide Repellentia, Exsiccantia, Adstringentia, quod illorum usu Materia acrior intro conpulsa vicinas partes corrodatur, & exulceretur. Sed si exiguum fuerit Erysipelas, pars affecta à nobilioribus remota, immoresque adhuc fluxerint, applicentur modicè Repellentia, ac Resolventibus iuxta; ne oclus nimium poris, hinc radiante nativo calido sepe suffocato, Gangrena accedat.

X. Pessime quoque Aegris suis consulunt Chyrurgi, qui partem Erysipelate affectam inungunt Unguento Nutrico, de Cerussa, Populeo, Rosaceo, Oleo Rosarum, Violarum, similibusve pinguis; utpote quæ biliosum, tenuem, fervidum, atque in partes cutaneas effusum, extravasatumque sanguinem excitant magis, incendunt, adeoque ardenti huic Inflammationi maxime adversantur, ut rectè monet Galenus lib. 7. de simpl. Med. Facult. Et scribit Fabricius Hildanus, Cent. 1. observ. 82. se observasse, Erysipelas ex Olei Rosæ inunctione in Gangrenam mutatum fuisse.

XI. Modicè ergo Repellentia, ac Resolventibus Volatilibusque permixta, quæ simul Acidum volatile infringere ac mitigare possunt, hic sunt apponenda, v. gr.

℞. Aquæ florum Sambuci ʒ viii. Aceti Sambuci ʒ ij. spir. vini ʒ i. Sacchari saturum gr. xv. Camphoræ ʒj. Misceantur pro Epithemate.

Vel ℞. Aquæ florum Sambuci ʒ viii. Vini albi Gallici ʒ iv. Misceantur.

Vel ℞. Aquæ florum Sambuci ʒ vi. Spiritus vini ʒ j. Camphoræ ʒj. Troch. alb. Rhalis ʒ ij. Misceantur.

Vel ℞. Fol. Malvæ, Altheæ, Parietariz, Salviæ an. Mj. Flor. Sambuci, Camomillæ an. Mij. Rosarum Rubr. Mj. Coq. in xq. part. aq. comm. & Vini albi Gallici. ad ʒ xxx. pro lomento. Vel decoquantur Flores Sambucina Lacte Dulci, vel Ebutyrate, & applicentur.

Vel fiat Sacculus intersutus ex Floribus Sambuci, isque in Aqua florum Sambuci, tantillo Aceti Sambucini addito, madefactus iterumque leviter expressus calide parti affectæ applicetur, & sæpius renovetur.

Vel dissolvatur Sapo Venetus in Aqua Pluviali, vel florum Sambuci, atque illo lixivio imbuantur panui lanci mundi, qui dein fortissimè exprimantur, & parti affectæ calidi applicentur, ac identidem permurgentur.

Sunt quidam ovis in vino aut aceto decoctum usurpant.

Alii laudant Cretam pulverisatam ope chartæ emporeticæ parti impositam.

Nonnulli Spiritum Vini, in quo Theriaca dissoluta est, linteis duplicatis aut quæ duplicatis imponunt.

XII. Sed remediis hæc si Erysipelas curari nequeat, quin potius exulceretur, hoc vel simile illinatur Unguentum.

℞. Troch. albor. Rhalis, Tutie præp. an. ʒj. Lithar.



Lithargyri ʒiſs. Ceruſſæ ʒij. Flor. Sulphuris ʒj. Camphoræ ʒſs. Olei Roſarum ʒij. Ceræ albæ q. ſ. terantur diu, & exacte levigentur in Mortario plumbeo, ac F. S. A. Unguentum.

XIII. Sin vero in Facie fuerit Erysipelas, nulla apponenda ſunt Repellentia vel Adſtringentia, ne quidem Reſolventibus mixta; ne materia ad Oculos, Fauces, aliasve partes nobiles peſſetur. Sed iñponatur ſacculus interſuſus ex Floribus Sambuci, in calida Aqua Florum Sambuci, addito Vino albo Gallico, madefactus, leuiterque expreſſus, qui identidem renouetur. Vel eandem applicetur ſacculus, ſubtiliſſima Tritici vel Hordei Farina repletus.

XIV. Atqui cum Caput occupet Erysipelas, uti Mulieres aliquando experiuntur, nulla omnino humida ſunt apponenda; ſed lineæ munda recenter lota, adeoque vapore ſaponis perſuſa, calida imponantur, ſæpiuſque permuteantur. Vel calide applicetur laudatus ſacculus, ſubtiliſſima Tritici vel Hordei Farina repletus. Vel Lixiuu nſi. & fortiffimum ex Sapone Veneto cum Aqua Florum Sambuci; eo imbuantur lintea munda, que dein exſiccata, & calide appoſita, identidemque renovata, mirum in modum Ardorem illam in capitis partibus cutaneis inflammationem diſcutiunt, reſolvuntque. *Joh. Munnichy Chirurgi lib. 1.*

Erysipelas recens quancumque partem invaſerit externa diſcutione requirit moderata. Sanguis menſtruus in aceto roſaceo diſſoluitur & calide applicatus ſubito ſolvit, præſertim ſi ſudores quoque moveantur ex Bezoardico cum ſimpliſi tum compoſito, vel ſolari vel lunari in aqua ſenecionis. Item ex miſtura ſimpliſi in eodem vehiculo.

Sic decoctum Myrrhæ & Olibani in Vino & aceto calideque applicatum cito diſſolvit.

Folia raphani ſylveſtris conquaſſatis fibris calidiuſcule applicata fervorem ſanguinis repræſentant.

Nonnulla aqua ſpermatis Ranarum, ad extinguendum ignem ſacrum familiaris eſt, ſed ſæpe malo cum ſucceſſu. Eſt nimirum nimis frigidum, hoc eſt, habet in ſe ſe Mercurium cum Saturnina quadam proprietate conjunctum. Itaque repercutionem quidem eſt, ſed ſubſequentium gravium ſymptomatum cauſa manifeſta. Mortificantur exinde tum partes nervoſæ tum venoſæ. Ejus tamen particula cum decocto Myrrhæ & Olibani miſta laudabilior eſt ad inſtitutum.

Tibialia lineæ imbibita aqua ſpermatis ranarum & viciſſim exſiccata, ſubindeque eodem opere præparata, pedes & crura ab Erysipelate ſæpius recurrente muniunt & præſervant.

Erysipelatis exulcerati curam vide apud Rulandum centuria 1. curatione 43. Hæc curâ feliciter uſus ſum in mulierculis, (Næſturtium aquaticum ſingulare.) Item Erysipelatis phlegmonoſi curat. 61. cent. 9. *Joh. Hartmann. in Prax. Chimiæ.*

#### Febris Erysipelatoſa.

Nullam non corporis partem, idque nullo non tempore inceſſit hic morbus, ac præ reliquis faciem, exeunte præſertim ætate; quo tempore ſæpe dum ſub dio verſatur, corripitur æger. Facies ſiquidem ex improviſo in tu-

morem attollitur, qui ſubito exorſus cum dolore ruboreque ſummiſ, denſo minimarum puſtularum ordine diſtinguitur, quæ aucta magis inflammatione in venticulas ſubinde facieſcunt; hinc per frontem ipſuſque caput latius ſerpit, oculis interim tumoris magnitudine planè obſeſſis (ruſticis Syderatio audit;) neque multum proſectò abluſit, niſi quod adſunt puſtule, ab iſis ſymptomatis quæ inſecta ab apum veſparumque aculeis comitantur vulnera. Hoc ſe habet modo Erysipelatis notiſſima ſpecies ac vulgaris.

At vero quancumque corporis partem hoc vitium obſederit, ut etiam quocumque anni tempore, rigor atque horror, niſi præceſſerint (quod nonnunquam pridie, aut nudius tertius ſolet contingere,) huic ſe inflammationi ut plurimum adiungunt, ſitis in ſuper, inquietudo, ac reliqua Febrium indicia. Procedente morbo, uti primùm Febris dolorem, tumorem, atque alia peperit ſymptomata, (quæ indies ingreſſeſcunt nonnunquam in Gangrænam terminantur,) ita hæc invicem haud mediocrem ad Febris augmentum conferunt operam, donec remediis idoneis utraque reſtinguantur.

Eſt & alia huiuſce morbi ſpecies. licet rariùs occurrens. Hæc quolibet anni tempore invadit, idque hæc ut plurimum *exſeſſa*, quod ſcilicet æger vinorum ſubtilium magis magiſque attenuantium potationi paulo liberaliùs indulſerit, aut liquoris ſimilis ſpirituofi. Febriculam, quæ agmen ducit, mox excipit puſtularum per univerſum ſere corpus eruptio, quæ urticarum puſtulas referunt, & nonnunquam in veſiculas attolluntur, mox recedentes, tuberculorum more ſub cute ſe condunt cum pruritu mordaciſſimo & vix tolerando. At quoties leviffimam ſcalpturam ſubeunt, ruſum apparent.

Curatio. Hic ego materiam peccantem ſanguini permixtam rite evacuandam, ejuſdemque ſanguinis ebullitionem remediis illum contemperantibus ſuſſaminandam cenſeo; eam denique, quæ jam partibus impaſta eſt, materiam evocandam, diſcutionemque.

Hæc ut hanc, ubi primùm accedo, ſatis largam ſanguinis quantitatem è brachio extrahi præcipio qui quidem Pleuriticorum ſanguinem terè ſemper zmulatur. Die ſequenti blandam illam Portionem Catharticam mihi in Praxi familiarem exhibeo, & horâ ſomni (ſi paulò frequentius deſecerit æger) hauſtum aliquem Paregoricum e. gr. Syr. de Meconio in Aqu. flor. Paralyſ. vel aliam ejuſmodi. Peractâ Catharſi, partem affectam ſequenti decocto ſoveri jubeo.

℞. Rad. Alth. & Lil. an. ʒij. fol. Malv. Sambuc. Verbasc. ʒn. Mij. flor. Melilot. ſummit. Hyper. & Centaur. min. an. Mj. Sem. Lini & Fœnugr. an. ʒſs. Coq in ſ. q. aq. ad lb ij. coletur liquor & tempore uſus adde ſingulis libris decocti, Spir. Vin. ʒij. Stuphæ è panno lanco levis textura hoc decocto immerſæ ac expreſſæ, calide admoveantur parti bis in die, quæ poſt ſortum quotidie illinatur ſeq. mixturâ.

℞. Spir. Vin. lb ſs. Theriac. Androm. ʒij. Pulv. Piperis longi, Caryophyll. an. ʒij. M. Charta Emporetica hæc mixturâ madefacta parti circumvolvatur.

Æger inſuper ut juſculis tantum hordeaceis atque avenaceis, cum pomis aſſatis veſcatur, volo; tum etiam cerevitiâ utatur tenuiſſimâ, &



per horas aliquot singulis diebus a lecto sibi temperet. Hæc methodo tum febris, tum alia symptomata citissime ut plurimum fugantur. Sin aliter, rursus venam secō; quod & tertium nonnunquam heri debet, interposito semper die uno, si prava nempe adne sanguinis diathesis, & febris intentior. Diebus à Venæsectione liberis Enema e Lacte cum Syr. Violaceo, & Julap. refrigerantia ex Aq. Nymph. &c. in Rheumatismi curatione jam dictis, qualibet horâ diei usurpanda præscribo. Ut plurimum vero unica Venæsectio & subsequens Catharsis, si tempori adhibeantur, rem expediunt.

Quæ urticarum puncturas, cum pruritu, refert species pari modo est amolenda, nisi quod hæc remediis ab extra applicandis minus egeat.

Hic obiter dicam, quod licet non solum hic affectus de quo jam loquimur, sed & plerique eorum qui cutim impetunt, & eruptionem aliqualem comitem sibi adjungunt (modo Chronici ii sunt) facile huic methodo cedant, ac proinde sanguinis missione & Catharsi iteratis brevi se propiciant; eorum tamen aliqui via planè diversâ tractandi sunt, nec evacuationes modo dictæ quantumlibet repetitæ, nec pulveres testacei sanguini edulcorando destinati quicquam proficiunt; cum recementa quædam pravam diathesin adepra intimius cuti impingantur, non nisi remediis quæ sanguini robur ac vim conciliant, proindeque cutis spiraculis deobstruendis apta nata sunt, ullatenus amovenda debellandaque: Cum successu itaque non vulgari sequentem methodum aggressus sum in Pruritu serino, atque inveteratis id genus cutis eruptionibus. Ut

℞. Theriac. Andromach. ʒß. electuar. de ovo ʒj. rad. serpent. Virgin. subtiliss. pulv. gr. xv. lapid. Bezoard. Oriental. gr. v. emul. q. syr. e Conditura Citri f. Bolus, sumendus mane & hora somni per dies ii. superbibendo cochl. vi. seq. Julapii.

℞. Aq. Card. Benedict. ʒvi. Aq. epidem. & Theriacal. stillat. an. ʒij. Syr. Caryoph. ʒj. Mf. f. Julapium.

Singulis matutinis post assumptum medicamentum sudet horæ unius vel alterius spatio, vel potius pluribus stragulis quam solet cooperatus in lectulo levi madori indulgeat per dictum tempus. His imitis si pustulæ adhuc non evanuerint, sequenti linimento partes affectæ inungantur.

℞. Unguent. ex oxylapatho. ʒij. Unguent. pomati ʒj. flor. sulphuris ʒij. ol. Rhodii ʒß. f. Liniment. Verumtamen medicamenta præscripta haud usurpentur, nisi Venæsectione atque catharsi ritè præmissis; quæ tametsi solum adhibita curationem non absolvunt, ægrum tamen contra febrem præmuniant, ob usum medicaminum calidorum alias occurruram.

Est & alia Eruptionis species, etsi minis frequens, ad cujus medelam nullæ prorsus evacuationes conferunt. Hæc tametsi in aliis pectore appareat, ac loco aliquo determinato se figit, vix cutim supereminens, atque latiore maculâ præ se ferens, nisi quod aliquantulum porriginosa, ac quasi furfuracea, cum squamulis colore ad flavum vergente tinctis, cernitur. Hæc sive maculâ, sive impetigine vigente, æger bene se habet, eadem vero evanescente, ut sæpe fit,

leviculam ægritudinem patitur, atque urina ejus turbidior, & rubicundior, sed ad flavedinem accedens, redditur. In hujus etiam affectus curatione eadem via atque videm post evacuationes universales, plaue remediis insistendum ac in Pruritu serino modo dicto; ac proinde, quod non omittendum, vini, ut & cerium <sup>usum</sup> usus omnino concedendus, cum refrigerantia omnia magis officiant quam prosint. Atque ita hæc postrema Eruptionis species curatur, quæ tamen aliquando non nisi Aquis ferreis diu epotis ceder. Thom. Sidenham de morb. acutis.

### Consultationes.

*De Tumoribus Erysipelatosis Crurum, & Pedum, cum Impedimento Motus. Pro Illustriss. & Excellentiss. Marchione Gonzaga.*

Ex doctissimis sermonibus præstantissimi Viri compertissimum ut Illustriss. & Excellent. Marchionem laborare tumore pedum, & genuum, qui se protert plurimum œdematis erysipelatidis facie quandoque, sed rarius, erysipelatis œdematosis, pro humore scil. vitioso redundante. Hernia inuper hydrocele testiculum dextrum, labefactatum fuisse, quæ nedum in præsentia detumuit omnino; cum testis affectus sinistro crassecat magis.

Qui tumores dubio procul ortum ducunt à materia heterogenea, cum magis minime prominent, ad exercitii modum validioris, aut remissi magis: & quidem serosa potius, quam aliorum aliquo humorum, hoc indicio; quod facili admodum negotio haur, & resuat a parte affecta, nullumque partibus tumefactis impressum digiti vestigium hæreat. Utrum autem a capite, vel a ventriculo produat, cum aliàs à nobis in dubium revocatum fuerit, quod ab utraque parte manare possit; nedum in præsentia ea de re quicquam nobis constet, ut non inani conjectura censeamus, prædictos humores potissimum à cerebro promanare calido, & humido: quod proinde facile repletur; accedente tamen aliqua ventriculi labe; prout & jecoris fervorem prodidere antehac fluentes hæmorrhoides; Patienti Excellent. adolescenti quod nunc luculentius palam facit erysipelas frequenter recurrens.

Affectus certe difficillimæ curationis. cum ob inæqualem partium intemperiem, tum ob affectarum partium imbecillitatem. Sperare tamen juvat, fore ut remittant, ope remedium a Viro Excellentiss. præscriptorum.

Inhærens propterea & ego prædictis intentionibus divertendæ fluxionis, evacuandæ materiz, quæ fluxit, conteniperandæ frigida ventriculi intemperiei usu calidorum, & calidæ jecoris, ac cerebri, refrigerantibus; non sine quibusdam caput exsiccantibus; commendo quam maximè universalem totius purgationem, eamque repetitam, simplicibus primò, & levioribus, mox & generosioribus, cum præparantibus, tum purgantibus.

Mittatur tamen primò sanguis ex jecoraria dextri brachii, mox & ex hæmorrhoidibus. Quod interim fluxio aliqua à capite conspicua fiat magis, de qua non levis viget suspicio, caput quoque peculiariter expurgandum erit, er-

rhinis,



timis, & masticatoriis temperatis. Neque præter rem fuerit tonticulus sinistro brachio intus, derivationis causa a capite, & revulsio- nis ab interioribus partibus.

Inter I harumæutica dejectoria illa præferen- da censeo, quæ serositates du-unt, hydragoga nuncupata. In quibus potissima sunt, manna ele- cia, radix mechoacan; necnon pulvis ex her- modactylis; aliquot item grana quandoque diagrydii, cum flor. Cassiæ & hujusmodi. Alteran- tia, & digerentia omnia a Viro Excell. præscri- pta mihi videntur apprimè accommodata; & decoctum potissimum; paratum tamen ex sal- p. rilla, lentisco, ligni sancti cortice, visco quer- cino, & santalis; immo salustias ligno, ob ejus in caput exhalationem; radice item chinæ, ma- la notæ ut plurimum, & cariola. Quod si in ven- triculo evidens noxa deprehendatur, decoctum parabitur cum columba turricola; alioquin sin- cerum præmissa drach. i. Ierebinthæ laticinæ, cum scrup. sem. ossium combustorum. Si vero dum utitur decocto, sudor manaverit in partibus interioribus, cum pane siligineo a furno recen- ti, inteo obvoluto, discutiet magis; misso vini u n tempore decocti; cujus loco parabitur mul- ta dilutior, ex hordeo, & coriandro; atque pro cibo erunt nuclei pinei, potius quàm amygd. dulces; quæ caput tentant magis. Extrinsecus utitur pulveribus capitalibus temperatis, ex cornu cervi, roni, siccis, ossibus combustis, & pu- lance. Hepar mungatur unguent. santalino, cum succo cichorii; vel epithema eidem applicetur ex succo cichorii, cum modico absinthii succo; ventriculus vero oleo n altichino, de mentha & absinthite; superaddito etiam cerato ex masti- che, & racam. haca. Ab his verò dum utitur pul- vere viperino, a Viro Excell. præscripto, & a me summo opere commendato, crura, & pedes robo- rentur lutis, & . quis Thermalibus; extrinsecus quinetiam adhibitis spongiis exsiccatis aqua calida prius inbutis, & fortiter expressis; para- tis calceamentis ex pelle canina, tanquam minus sequaci. In quorum tamen localium usu magna religione procedendum erit; cum experientia conset, Excell. Patientem a discutientibus de- terius habere, inualecente pedu intumescencia.

Victus ratio sit à Viro Excell. præscripta, quæ conset ex alimentis exsiccantibus, & facili co- ctionis; ac vino tenuis subtilitatis, non admo- dum generoso; assumpto medicamento aliquo familiari, quò alvus laxior fiat, & biliosum serum aliorum humorum vehiculum educatur; in quem usum conferent pilul. ex Aloë lora succo ros. quarum ope sanguis quinetiam hæmorrhoidalis nunc cohibitus revocari poterit, non omisis localibus tumenti testiculo applicandis, in pri- mis vero cerato oxelzo. Atque hæc potiora duxi, in salutem Illustriss. & Excell. Marchionis, quæ ut illi mihi sint, salutis autorem Deum O. M. cuius precor. *henedicti. Silvatic. Consilior. & R. spons. Medic. Cent. 3.*

#### *Erysipelas in facie.*

Juvenis 35. annum agens, temperamenti to- tius & ecoris, ad calidum & humidum vergen- tis, habitus mediocriter carnosus, comestationi- bus & comotationibus indigens, quatuor ab- hinc annis bis per annum, Erysipelate in facie corripit caput, quod incipere solet a parte dex-

tera faciei circa nares, indeque ad totum caput se diffundere, cum levi intumescencia, calore in- signi, & potius rubore quam flavitie, quod mali- genus ipsius quoque Genitor pati solebat. Quo- nam autem veris tempore, & ineunte Autumno invadere solet hujusmodi affectio, quæ reperi- ta sanguinis mensione, & alterantibus hucusque cu- rata fuit, non tamen sine vitæ discrimine, quia febris acutissima eandem comitatur, & quando- que ad fauces quoque propagetur, ideo hoc Mense Martio, & in posterum, de agendis pro præservatione consulit.

Hujusce affectus per intervalla periodica re- currentis, & hunc Juvenem Nobil. molestantis idea jam notissima est, Erysipelas enim nuncu- patur, quod licet vix ad auctam magnitudinem referri soleat. cum corporis potius superficiem, quam intimas partes occupare soleat, attamen quoniam rarissime datur legitimum Erysipelas, a sincera flava bile productum, ideo I phlegmo- nosum hoc proprie appellabimus, quod a san- guine bilioso, ut fere semper, ortum trahit, cujus causa familiare esse solet trigesimo ulque ad quadagesimum annum, quibus sanguis ple- rumque abundat, ideo color ejus, cum calore, rubens sive rubicundus observatur, qui roseus dicitur, redundantis sanguinis indicio, cujus effluxus atque proventus facilis in hoc Juvene semper fuit, temperamento calido & humido prædito, & metacioribus comotationibus de- dito, unde biliosior simul & copiosior genitus, venarum facultatem irritat, ad sui in partem hæreditario jure imbecillem, expulsionem, po- tissimum Veris tempore, quo humores a centro ad corporis peripheriam moveri solent, & Au- tumno ineunte, cum ab ambiente cutis meatus densantur, universa diaphoresis imminuitur, & humores per expressionem, utpote calidi, sur- sum in caput feruntur, & facilius obsident nares genamque dexteram & directo jecoris, partes icil. quæ facile tenuissimo sanguine suffundun- tur, utpote cæteris molliores atque imbecillio- res, a quo inflammantur, & in tumorem elevan- tur, unde phlegmonosum Erysipelas constituitur, quod necessario febris acuta, ut symptoma consequitur.

Affectus equidem non spernendus, nam ex levi aliquo errore, aut externa occasione lethalis evadere posset, si ab extra ad intra retroce- dat humor, unde Phrenitides nonnunquam suc- cedunt, quandoque etiam Angina, quandoque pariter suppurant. ut propterea summa cum ra- tione egregius hic Juvenis a nobis præservatio- nem postulet, cum melius sit prævenire quam præveniri. Quod si non statim adeo præservati- vis remediis arceri possit affectio, ejusdem quo- que præsentis curationem exposcit.

Pro præservatione autem intentiones Medi- cæ erunt, redundantem sanguinem imminuere, ejusdem vitium corrigere, regenerationem inhi- bere, & partem affectam roborare. Quibus omnibus satisfaciendum partim Mense morbi accessionem præcedente, partim post.

Fontem Chirurgicum spectantia locum ha- bent paucis diebus ante accessionem, sanguis enim omnino educendus, quia vitium in eo est, peccat enim quantitate, ut n. ultus, qualitate, ut acris & biliosus, & motu, quatenus ruit in caput, & ideo aperienda saphena pedis, præce- dente



dente tamen hac prima vice Jecorariæ dextera sectione. In usum etiam duci debent quotidianæ pedum lotiones aqua calente.

Ex Pharmaceutico reliqua sunt de promenda medica auxilia. Et primo Lenientia erunt, Syr. Ros. sol. cum portione Manna clarif. vel Cassia cum Tart. Præparans esse poterit decoct. Cich. Borrag. End. Acet. Viol. Sonchi, cui præmittat Julap. Acet. ad ʒj. l. Repetatur deinde præscriptum leniens, addita infus. consueta Rhabarb. drachma. Inde ad ulteriora præparantia erit progrediendum. Decoct. scil. Cich. End. Acet. Sonchi, Viol. Hepat. Portul. præmittendo Julap. Ros. & Viol. ad ʒij. Præparati humores sunt expurgandi. Rhab. potissimum, cujus ʒij. in Aq. End. intundantur, cum ʒj. Myrob. Citrin. Infus. addendo Syr. Ros. sol. vel præbeatur Elect. de Succo Ros. ad ʒij. cum Flor. Caf. quibus superbibat seri depur. Capr. aut Asin. lb ij.

Hac sequuta humorum biliosorum expurgatione, calida jecoris & venarum intemperies corrigenda venit, in quem finem Aq. Acidulæ ferreæ erunt omnino usurpandæ. Verum quoniam nonnisi sub Cane perhiciuntur & assumuntur, ideo interim in usum ducat Aq. stillaticias ad lb j. de Succo Cich. vel Acet. End. & Cucurb. Anguriz quoque aqua utebatur Avic. & Arabes, cum Syr. de Acido Cit. & de Succo Lim. ut tandem ad Acidulas, vel Calderianas in Agro Veronensi, vel B. Virginis in Patavino se conferat, 15. aut 20. diebus assumendas. Familiarem inde habeat Ros. Conf. & 15. aut 20. diebus autumnalem accessionem præmissa Leniente, ex saphena dextera pariter sanguinem sibi mitti permittat, & jam dictis alterantibus suavioribus utatur. Tandem pro partis roboratione, facies matutino tempore abluatur Aq. chalybeata, interdum madefiant genæ Aq. Rosar. Hæcque abunde.

A fonte Dietetico magna ex parte pendet hujus affectus præservatio. Etenim primo, nec igni, nec radiis solaribus caput diutius exponere debet. Secundo computationes evitandæ, merique potus, etiam in mensa, à cibis calefacientibus ac vaporosis abstinendum, à condimentis Aromatum, Allii, Cæparum, & hujusmodi. Somnus diurnus vitandus, vel sit brevis saltem, & capite elato. Exercitium probatur, sed ante cibum. Et semel per mensem assumere poterit ʒj. Pilul. de Trib. cum Rhab. sub cenam, & in cena ptisanam hordeac. Alacriter vivat, & inensas applicationes vitet. Quod si jam dictis non obstantibus recurrat affectus, eadem purgatio erit anno proximè futuro peragenda, ut mali radices omnino evelli & extirpari possint.

Erysipelas vero rursus invadens curandum erit ut alias, melius enim est, dicebat Avic. Medicamentum expertum non experto. Nihilominus, ut Parienti morem geram, nonnulla peculiariora attingam, quæ in curando Erysipelate Medentibus dubium asserre solent.

Et primo Medicæ intentiones esse solent, humorem ad partem affectam fluentem revelle-re. Secundo repellere. Tertio eundem expurgare. Et tandem partem roborare.

Quibus explendis, de sanguinis missione dubitari solet, cum Gal. in curatione Erysipelatis, necessariam non esse dixerit. Verum primò sanguinis missionem non reprobavit, sed præterea

omitti posse censet in Erysipelate exquisito, quod rarissime datur. In nostro autem casu de hoc dubitari non potest, siquidem phlegmonosum est, & præterea in capite, quo casu, Celsus & Paulus sanguinem educebant, & ideo sanguis iterum atque iterum ex interioribus & superioribus venis adducendus, & reliqua omnia genera revulsionum administranda, scilicet pedum lotiones, frictiones, & cu. urbitulæ.

Extrinsecus repellentia ad moveri solent, quæ tamen caute valde capiti sunt apponenda. Sufficiant igitur lintea Aq. Ros. tepida imbuta, vel succo sempervivi, qui & repellendi & quodammodo etiam digerendi facultatem obtinet, ab oleosis vero & pinguibus omnino abstinendum, ut quæ partis fervore exalefacta magis inflammare possint. Ab his autem repellentibus tertio aut ad limum quarto die abstinendum, nec quicquam aliud curiose agendum, sed circa septimam lintea apponantur Aqua, in qua sapo noster Venetus dissolutus fuerit, imbuta.

Intei un sanguine prima vice evacuato, post injectum clysterem, medicamentum evacuans est exhibendum, quod esse poterit Syr. Ros. sol. cum decoct. Pulp. Tamarind. vel Flos Cass. cum eadem pulpa, à quibus bibenda præbeatur Aq. Noer. ad lb ij. & inde usque ad declinationem Clysteribus utendum. Postea alterantia in usum quotidianum revocanda, ex Aq. still. Acet. End. quintimo & Plantag. parata, addito Syr. de Succo Lim. & de Acido Cit. Et licet videatur Gal. purgationem electivam approbare, ad hanc tamen valde cautè deveniendum est, nonnisi in declinatione, ne agitentur humores & in affectam partem irruant. Quare post septimam præberi potest Elect. de Succo Ros. cum Cass. & ab ea serum, aut Aq. Noer. ad libras.

Et his omnibus congrua addenda victus ratio, in casu nostro tenuis, non autem adeo ut in exquisito Erysipelate, sit autem incrassans, verbo, sufficiat ptisana hordeac. vel Lactuca, aut Cucurbita in jure cocta, cui prope septimam Ovum recens addi potest, conceduntur poma & pyra cocta, & cibum claudat Conf. Ros. Pro potu autem hauriatur Aq. stillat. Acet. aut Hordeac. Quibus addendum, quod nil perniciosius esse possit quam faciem aëri trigido, aut ventis exponere. Quæ pro curatione sufficiant. *Raym. Johan. Fortis Consulti. & Respons. Medit. Tom. 1. Cap. 1.*

Puella duodecim annorum, jam à tribus annis, circa mensem Majum, incidit in totius faciei tumorem subrubicundum, oculos pene claudentem. Adest calor & pruritus magnus. Pulsus etiam est justo celerior; appetitus est prostratus; & plus solito sitit.

Afficitur in hac puella facies, ut ad oculum est manifestum: uti & cor, quod pulsus justo celerior; item ventriculus & xiphagus, quod sitis & appetitus prostratus indicant.

Morbus, qui eam affligit, est tumor faciei, ex bilioso sanguine ortus, qui calorem immoderatum, & pruritum, ac colorem subrubicundum in faciei inducens, Erysipelas faciei phlegmonodes appellari solet.

Causa antecedens hujus morbi est sanguis biliosus, ex temperamento sanguineo & dicta forsau calidiore, tanquam à causa procacitica, in toto hujus puellæ corpore, singulis annis



genitus. Pars vero ejus circa mensem Majum, ob aeris caliditatem, in corde vehementius effervescebat, inducit pullum julto celeriore; ad ventriculum vero & œsophagum delata, ibique œsophagum nimium exsiccando, succumque acrem ventriculi, famem excitare solitum, corpora sua & qualitate biliosa perfundendo, sitim & appetitus prostrationem excitat: ad faciem vero a corde propulsa, ibique poros vasorum aperiens, & sese in cutim vicinasque partes magna quantitate effundens, vehementiusque, ob ulteriorem corruptelam sive putredinem supervenientem, incallescens, ibi, uti notis, ruboris, pruritus, & caloris faciei, causa continens existit.

Metus est, ne hic affectus erysipelas exulceratum faciei, vel, si humor hic ad cerebrum vel cerebrum vel alias nobiliores partes feratur, ne inflammationem cerebri, vel pulmonum, vel pleuræ inducat. Diligenti itaque hic morbus erit impugnandus Curatione, quæ in causâ procatartica, antecedentis, & continetis, item intemperiei, & tumoris ablatione, consistit.

Atque ideo primo tale exhibeatur purgans:

℞. Syr. ros. sol. cum sol. fennæ ʒj. Cremor. tartari ʒj. Scammonii gr. x. Aq. cichor. ʒij. Misce, fiat Haustus brevis, mane exhibendus.

Por. faciei deinde imponantur lintea sequenti liquore tepido imbuta; sæpiusque, ubi exsiccata fuerint, renovetur imbutio & applicatio:

℞. Aq. plantag. rosar. an. ʒ iv. Lapidis alchymiz ʒj ʒ. Misce.

Vel ℞. Aq. flor. sambuci ʒ x. Sperm. ranar. ʒ v. Spiritus vini opt. ʒvj. Misce.

Si palpebræ oculorum valde etiam intumescant, iis imponantur lintea, solâ aquâ ros. & plantag. tepidâ madefecta.

Ad præcavendum, ne sub sequentem Majum rursus recidivam patiatur, mense aprili semel atque iterum purgetur, & utatur diætâ tenuiore, & refrigerante. *Henric. Regius apud Theod. Craanen Medication. lib. 4.*

### Observationes.

Rusticus quidam Erysipelate phlegmonode in sinistra manu laborans, ex tonsoris consilio per aliquot dies manum & brachium oleo rosac. unxit: unde dolores, inflammatio, aliaque symptomata magis magisque ingravescerant; ita ut tandem gangræna correpta sit tota manus, is cum ad me accessisset, scarificatione aliisque remediis quæ ad gangræne curationem spectant, curatus fuit. Ex quibus perspicuum est, oleum maxime inflammationibus adversari. *Guil. Fabrici. Hildan. obs. 82. cent. 2.*

Quidam Erysipelas in seipso & aliis plurimis curavit secreto præstantissimo, quod sic habet, accipiebat folia & ramusculos babinæ & in pulverem crassiusculum redactis quotidie ter suffiebat membrum affectum. Si vero exulceratio adjuncta esset, ceram virginiam in aqua calida manibus tractatam, emplastri modo, solam imponebat. *Hieron. Reusnerus. obs. 124.*

### Erysipelas cruris.

Domino Kelfken, urbis Noviomagi Consuli, de extrum crus erysipellate correptum fuit, cui

malo sæpius etiam antea obnoxius esse consueverat. Sexagenarius erat, & corpore valde cacochymo. Erysipelati, ex more vulgi, ipsemet imposuerat lintea intincta in aceto & aqua florum sambuci quibus erysipelas aliquantum quidem minuebatur, sed vesiculæ quædam hic illic excitatæ fuerunt, quales etiam antea ab hujus aceti & aquæ usu sæpius habuerat: his acu percutulis imposuerat solum tabaci viridis (quo præcedentes vesiculas semper curaverat) quod cum per tres quatuorve dies applicatum fuisset, ab acrimonia humorum effluentium cutis magis magisque exulcerata fuit ac in medio particula quædam nigra & gangrænosa apparuit, qua visa, æger sibi metuens, Chirurgum accersiri jussit. Hic particulam istam gangrænosa in sola cute hærentem facile excidit, & variis emplastris impositis solutionem sanare conatus fuit, toti cruri propter erysipelas inungens unguentum refrigerans Galeni. Atque isto modo æger per sex septimanas tractatus est. Tandem cum variis & sæpe mutatis emplastris ac unguentis nihil omnino proceretur, sed malum in dies accresceret, mense Junio etiam ego ad curationem advocatus fui. Animadverti ægrum multis æquolis ac pituitolis humoribus abundare, qui salsi ad crus descendentes hujusmodi continuam exulcerationem inducebant: hinc etiam alvum humidam & liberam, imò quatuor vel quinque fecibus quotidie habebat. Appetitus mediocris erat: sed a medicamentis tantopere abhorrebat, ut nihil, nisi extrema urgente necessitate, per os assumere vellet. Inspecto crure, conperi emplastra in causa fuisse quod vicinæ partes exulcerarentur, cum enim ob pinguedinem & densitatem humores acres & salios effluentes in se retinere vel exsurgere non possent, illos ad circumvicinas partes effluere necesse erat, quæ ab eorum acrimonia exedebantur. Proinde crus istud cataplasmatibus curare præstabilius mihi visum fuit, quæ ob molliorem humores effluentes imbibere ac in se continere, partemque exsiccare possent. In hunc finem sequens cataplasma absque ulla pinguedine præscripsi.

℞. Corticum granatorum, flor. balaustrorum, an. ʒ ʒ. foliorum quercus, plantaginis, agrimoniz, fenuculæ, an. m. ij. pimpinellæ, flor. rosarum rub. an. m. j. aquæ communis lb iv. coquantur ad medias.

℞. Foliorum quercus m. iv. agrimoniz, plantaginis, an. m. j ʒ. pulveriscentur simul, tunc addet. rinz fabarum ʒ ij. decocti prædicti q. s. coquantur aliquantum, & fiat cataplasma.

Hoc postea aliquoties reiterato, ulcus omnino sanatum fuit. Circiter tertio post sanationem mense, rursus nova defluxio ad crus descendit, magnum ulcus erysipelatodes inducens. Præter unicum haustum purgantem, & unum decoctum ex radicibus chinæ, cassiæ parillæ, & similibus, nullum aliud medicamentum assumere voluit. Impositum fuit antedictum cataplasma, quod res ad tempus bene successit: tandem vero nova rursus accedente defluxione cum magno erysipellate, dolores valde accreverunt, ulcus multum extendebatur, ac paulo post etiam gangræna partem invasit, & in cruris exteriori latere particula gangrænosa nigricans, latitudinis dactyli imperialis, conspiciebatur. Chirurgus



gus vino tepido partem affectam aliquantum abluir, ac postea unguento mundificativo ex apio unxit, & prædictum cataplasma superposuit; atque his aliquot diebus continuatis, gangranosæ particulæ tandem exciderunt. Tunc ulcere prius mundato, solum cataplasma impositum est. Interea ad humorum descendendum commodiorem evacuationem, libenter fonticulum in suræ exteriori parte fecissem, verum illud permittere noluit æger. Mense Martio ulceribus jam sanatis, rursus nova accessit acris deluxio cum erysipelate, hinc ab utroque cruris latere novum vicus latitudinis palmæ manus excitatum fuit. Cataplasma impositum nihil profuit, vires cum appetitu dejectæ sunt, & æger adeo debilis evasit, ut amplius incedere non posset. Paulo post gangræna ad palmæ latitudinem subito accessit. Æger periclitari nobis vius fuit, tam propter cacochymiam corporis, quam propter magnam virium debilitatem. Ulceribus gangranosis inunctum fuit unguentum mundificativum ex pio, & cataplasma superpositum; si spiritus vini admoventur, tantus excitabatur dolor, ut illum protinus abijcere necesse foret. Tunc fonticulum in sura heri permisit æger, quem sectione novaculæ libenter fecissem, verum cum inde nimis abhorreret, cauterium potentiale, holosericum Parræi, impositum fuit, quod sine ullo dolore operationem suam brevi peregit. Post tres quatuorve dies gangræna in ulcere multum adaucta est, atque etiam invasit locum illum cui cauterium imposueramus, unde eschara nondum exciderat. Hunc proinde locum cauterizatum ad carnem usque vivam scarificavit Chirurgus, ut eschara citius separaretur, cuius etiam frustula quædam excidit. Sequentibus tribus diebus gangræna magis magisque accrevit, ita ut in loco fonticuli carnis emortuæ pars magnitudinis pollicis, excindenda foret. Pollridie gangranosæ partes fœtebant instar cadaveris putrescentis, tanto fœtore quem vix quispiam adstantium ferre poterat, & gangræna continuo crescebat. Ut mortificationi ac putrefactioni resistere, partes infectas abluimus cum spiritu vini in quo sal commune dissolveramus, & perias eodem liquore madefactas imposuimus, ulcusque ter de die religavimus, quo mediò fœtor fere totus intra sesquidiem recessit. Deinde ut gangranosæ & emortuæ partes à vicinis per suppurationem citius separarentur, & sanæ à corruptela præservarentur, balsamum nostrum Magistrale impositum fuit, quod putredini potenter resistebat, & suppurationem egregiè promovebat; atque ita partes gangranosæ paulatim cœperunt excidere; quibus ablatis, per aliquot dies impositum fuit unguentum digestivum, ac tandem rursus solum cataplasma, quo ulcera progressu temporis, sed admodum lente, sanata sunt, humoribus postmodum per fonticulum effluentibus. Hoc ægro, qui ab omnibus pro desperato habebatur, præter multorum opinionem, sanato, magnum nobis honorem conciliavimus. *Isbrand. de Diemerbroeck in Observat. & Curat. Medic.*

*De Erysipelate raro, Fonticuli naturalis additamento.*

Exemplum ejusmodi fonticuli, de quo historia prægreffa, seu potius scaturiginis cupuldam sine alveo fonticuli, producam, ut simul erysipelatis tam miri quam rari heri possit mentio.

In summitate interstitii, quod est inter digitos pedis sinistri majores, a multis annis ipsemet sensi, sed sine tristiculatu, exudationem quandam, modo humidam feri vel saniei, modo siccam squamularum vel crutularum, quæ sæpe & facile separabiles.

Aliquando peregre vocatus, post cenam finitam appuli, apponebatur serius venienti cyprinus, qui salis & elixationis defectu palato conciliabat nauseam: vitium hoc non satis poterat corrigi vino, quia villo. Lecti ingreditur comitabatur horror, hinc curiosè plumis sepultus dormiebam more solito. Somnus profundior exonerabat massam sanguineam sero per sudorem copiosissimum.

Evigilanti horæ matutinæ Bubonis rudimentum ostendebant in inguine, & amaritiem ex bile in palato, & dolorem quandam totius pedis gravativum, imprimis autem in interstitio digitorum pedis superius dicto extensivum.

A meridie don-itionem urgebam & expediebam, quo factò tandem radium seu ltriam *intermaxillæ* digitos duos latam, æquæ latitudine & rubore, a bubone usque ad digitorum pedis scaturiginem extensam vidi. Hæc serum conueto copiosius fundebat per aliquot dies, & mox a principio cum insigni levamine.

*Exemplum* ejusmodi, tanquam summum prophylacticum, optanda esset Podagris: sed cum beneficium hoc naturæ sit rarissimum, annon excretiones artificiales hic locorum querendæ?

Assentiri videtur Sennertus de arthritic. 7. qui & venæ sectionem & cucurbitulas ad pollices pedum laudat rationibus & experientia. Sal-muth. cent. 3. obs. 46. commendat suo & aliorum exemplo scarificationes mensruas pollicum pedis circa radices unguum.

Contradictor acerrimus est Crato Epl. 151. ad Thom. Jordanum. Dissensiones aliorum Medicorum in scenam non produco. Et affirmantibus & Negantibus non desunt rationes sat prægnantes. Arbitram optimam judicarem esse experientiam, quæ tamen fallax & non raro periculosa. Siquid sit tuendum, concludo, Artem utur Naturæ ministram & simulam, raro tam esse felicem in excretionibus materiæ morbificæ sollicitandis, ac Naturam & excretionem naturales ut plurimum esse placidas & criticas, artificiales contra violentas & quodam modo symptomáticas. *Sigismundi Grassii.*

*De Zona sive Zonæ Erysipelatis specie, ejusque curatione.*

Marcus Aurelius Severinus Philosophus & Medicus celebratissimus lib. de recondit. abscessuum natura 4. de novissime observatis abscessibus cap. 9. §. 11. p. m. 194. de Zona Hepetis, sive ignis sacri specie, ita scribit: Zonam quidem ad hoc tempus nemo tradidit a se observatam; usque adeo, ut veram ejusdem formam



man ipse, qui vidisset, testificari ceteris posset. Rarissimus hic affectus hic esse videtur: Nam ex Veteribus, præter Scribonium, Apulejum, Mattheum & Plinium o ejus meminit Jo. Mead. Angius Epist. Med. l. i. Epist. 32. sub alterius cujusdam Erysipelatis & quidem perniciosi specie, quæ merito a cingulo *Zurip* appellatur, eundem attingit, & hinc exemplis demonstrat. Henr. Sinetius Miscell. Medic. lib. 10. ubi rariorum aliquot morborum & Symptomatum Observation. recitat p. m. 310. sequentibus verbis eum describit Philolus civis Francodalenis febricitabat, & Erysipelate corripiebatur, quod totum pectus cum dorso toto occupabat. Inde deorsum per totum abdomen & femora ad genua usque, sursum vero per collum, in faciem & brachia ad cubitos usque sese exporrigebat. Den rooden Umloop vocant Hollandi, supra citatus M. Aur. Severinus loco prædicto p. m. 196. talem Zonæ modum & formam observavit, verba hic transcripsimus: *Sapius hæc visa posteriore thorace, & secundum superiores lumbos circumdata: Quam in Societate Jesu Sacerdote Sacrarum Collegii adunum vidi cum Mario Schipano diligenter, rem istam Observatore: Alteram cum Francisco de la Medico suis industriis curavi Mario Canello Sacerdoti integerrimo. In palmas similiter cujusdam Sutoris calceolarum, qui Syphile fuerat affectus, luxurientia nuper sui observata cum primis Zona: Quæ primum dolorem artem in pectore perpassus fuerat. Itemque alia præterea se obtulerunt in valendario morbis incurabilibus dicato: Quæ omnes explicare longum esset. Hic, Severinus.* Huc etiam referri possunt Macula Volaticæ Infantum, Germanice *der Flug dicke*, quas describit Wernerus Pract. Medic. lib. 5. Part. 1. Sect. 1. c. 6. & Melchior Sebizius Manualis sive Speculi Medic. Pract. p. m. 6. cap. 32. sub titulo Volaticæ. Autoribus hæc inter se collatis satis apparet, affectum hunc quem singuli describere, unum eundemque esse. promdeque ad Erysipelas referendum: Est enim (ut verbis sebizii citato loco p. m. 128. utat) utriusque eadem natura atque essentia, unaque causa & una curandi ratio. Discrimen in eo solum consistere videtur, quod Erysipelas in uno loco plerumque peristat: in Volaticæ autem seu Zona, rubor priorem locum deserat, ulterius tamen progrediatur, locaque vicina invadat. Deinde quod sanguis Volaticæ sit calidior, subtilior, & forsitan etiam malignior, quam Erysipelatis vulgaris: Quo fit ut hinc inde vagetur: & quia sanguis illius acrior est atque mordacior, expultricem partium facultatem irritat, ut uno in loco permanere nequeat. Quæ tamen omnia ratione naturarum & ætatum, temporum & locorum sapissime variant. Mihi, ut ingenuè fatear, in praxi Medica per Deigratiam spatium viginti unorum continue occupato, Erysipelas vulgare sapissime, illius autem generis, quod ex fide dignis Autoribus superius descripsimus, (sive Zona, vel *Zurip*, sive Volatica vocetur) tantum bis curandum obtigit. Primum hoc affectu correptum Vidi A. 1667. Spectabilem p. m. Andreæm Sculler Jurisconsultum doctissimum & Scabinum Thuronensem Suburbanum, dignissimum, quæque viginti sex annos natum, una Cancrum ulceratam in dorso soventem, quem dicti Anni, Mensis deprembriis die vigesima quinta febris adorta, usque ad ter-

tiam Octobris continue exercebat, tumor autem Erysipelatodes, incipiendo a scapulis, superiore pectoris parte ad collum sepebat, postea faciem totam & caput occupabat, cum tumore dolore, fervore & cordis angustia, ut neque cibum capere, nec somno indulgere potuerit: sed adhibitis tandem interne Medicamentis partim alterantibus, partim expulivis & Bezoarticis: externe vero tumori applicatis linamentibus, aquis plantaginis & rosarum, cum pauxillo croci tepide mauescentibus, pedetentim circa nonum diem & tumor & rubedo disparere coeperunt, donec undecima morbi die, decidentibus simul capillis planè evanescerent. An. dein 1668. die 4. Novemb. eodem morbo affectam observavi puellam septennem, Christianam, plurimum Reverendi Viri Simonis Weissii Ecclesiastæ Mariam Vigilantissimi & Professoris Gynnasii Clarissimi, Comitis mei admodum colendi Philolam: cui malum similiter totum pectus & dorsum ad collum usque cinxerat: hæcque partes paulatim deferendo, ad faciem & caput ascenderat, propinatis autem remediis idoneis, ut in priore casu, denique cum totali pilorum capitis defluvio evanuerat. Resert quidem ex aliorum mente loco supra allegato Sennerius, qui affectum hunc se nunquam vidisse testatur: Si macule illæ orificium aliquod, os puta, nares, oculos, aures attigerint, & eo usque penetr. rint, non solum lethale fieri, ideoque ad præcautionem orificia dicta aqua rosarum cum pauxillo croci mixto illinenda suadet: Verum nos tale quid animadvertere haud potuimus, sed licet tumor ille totam faciem, labia, nares, oculos & aures, in prædicto utroque casu plene occup. rit, morbi tamen lætum eventum subsequutum videmus. *Simonis Schulzii.*

#### Erysipelas Colicæ

Inter plura Ignis sacri genera *Colicæ* numerat Plinius N. lib. 16. cap. 11. qui medium hominem ambiens si cinxe, iteum, necat, quo Marchionem Brandenburgensem in Oneshbachino interisse, Principem vero Basilianum Otthenicum correptum, sanitati à se restitutum refert Langius lib. 1. epist. 32. Corripiebatur eodem honesta Matrona Hildesici Spanmanni Jurium Practici vidua, quod cum præ pudore dissimularet, & tibiam saltem eodem igne inflamm. matam & ulceratam Chirurgo tractand. exhiberet, accidit ut altero illo subito invalescente, & in gangrenam desinente, ægra præter spem placide exspiraret, paulo ante mortem & superioris illius inspicendi copiam faciens, deprehendi a. illud inferiorem ventrem tam accurate circumdedit ut cingulum fuscum palmarum latum examussim referret. *Joan. Henr. Brechfeld.*

Ancillam vetulam quandam habui quinquagenariam, Norimbergæ adhuc commorans, quæ trigidum diu noctuque inquieta de molestia cum cardialgia circa præcordia queritans, denique sensit sub præcordiis prope stomachum circumcirca ad latitudinem manus, cinguli instar, pustulas parvas lucidas, cum cutis inflammatione acri perorere, sed assumpto cathartico leni, & sudoriferis cum cordialibus ac alexiteriis mistis, externe quoque se sementis modice refri-



gerantibus saepius tepide detergens, & sponte deficcari permittens, intra sextiduum revelavit ea, a tam molesto & periculoso affectu liberata. *Joan. Holvigii.*

ESSERE

Vid.

EPINYCTIS.

## EXANTHEMATA.

**E**Xanthemata Scorbutica, quorum hinc inde facta mentio, luscæ imprimis tetræ tam vulgari, sunt atque obvia, ut nemo facile periculum inde ominetur, atque etiam non advocato Medico libens ea toleret; verum alia illa, quæ inter morbos exsurgunt corporisq; superficiem detecedant, magnum statim spectantibus, imprimis feminis, terrorem incutunt & nescio quid sinistra alere videntur. Atque hinc nulla est mora, quin ad eorum conspectum Medicus protinus acceratur, qui de iis sententiam ferat dubitantibusque metum eximat. Est febris quædam species, Purpura dicta, quæ variis sese maculis & ipsa exferit, nunc pallidioribus, nunc rubicundioribus, tandem etiam uigris; hanc, siue quod scorbutici salis ille fructus sit, seu quod intestino & proprio veneno exsurgat, malignam esse & periculosam omnino sum persuasus. Levior autem est species minusque habet discriminis, quam Galli febrem scarlatinam vocant; hæc fermentationis paulo vehementioris materiamque in cutem evomentis progenies est & ex facili dissipatur. At ego alia quoque exanthemata erumpere vidi, quæ cum illis quidem comparari minime possint, omni periculo vacua, certe ludicro spectaculo quam symptomati affinia. Et primo quidem in duobus ex pectore vulneratis, uni quidem post vomitum ebullitionemque sanguinis, alteri post sputa detenta ruborem toto corpore verecundum illum & planè cernesium effloruisse vidi, hinc intra quatuor horas cum colbre leviori paroxysmo. An forte de eo intelligi debeat Hippocrat. illud in Coacis *ἡ δὲ ἀνὰ μὲν πύλας ὁ δὲ ὁφθαλμοὶ, τὸ πρὸς τὸν ὁφθαλμὸν.* Alii, & ipsi Althmatico, Servo a pedibus, cutis tribus quidem diebus continuis elegantissimo rubore perfundebatur tota, periculum metuentibus, qui aderant, omnibus; ac vero cum singulis paroxysmis, qui quo-

tidie redibant, remittebat quoque color. Fœminam Nobilem ex febre tertiana cum vomitu laborantem itidem cum Paroxysmo invaserant hæc universo corpore maculæ, sed cum uno alteroque paroxysmo etiam ipse detenebant. Magna interim familiarum & domesticorum sollicitudo in corpore obessimo jam Morbillorum, jam Malignitatis suspensionem non erat; ac subita febris ruborisque remissio metum omnem exemere. Virgo venustissima, quæ elapsa hyeme cum Quartana conflictata erat, ad intempestivas mendicæ male morati preces percussa recidivam inveniunt vere sensit, sed quam tres ex ordine Paroxysmi hincrent; hanc & ipsam cum primo insultu paulo post terrorem color incellebat toto corpore eleganter roseus inque maculas distinctus, consternatis ad novum spectaculum parentibus; ac, quod tertio insultu apparuit, siue ulla admodum offensa corporisq; periculo. Sed quid de isto Exanthematum genere tenendum, quod Morbillorum specie totos sæpe terrarum tractus infestat, & ante hos sex annos, quando superior mihi Germania cum Principe persona decurrenda erat, Palatinatum & Sueviam occupabat, cuique tributum ipse quoque cum plerisque itineris sociis pendere debebam. Leviculus erat ille morbus, *Reibel* nomine notus, qui nullo habito sexus ætatisque discrimine promiscue omnes invadebat. Paucissimis ille erat funestus, aliquos diem biduumve aut triduum lecto affigebat, aliqui stando cum vincebant nonnullos impuro corpore diutius vexabat, plerisque tamen molestia quidam & calore paulo intensiore, appetitu dejecto & membrorum segnitie, multabat, quæ vel sponte aut sumito Sudorifero cessabant. In unâ autem Sturgardia simul semelque septingenti cum hoc morbo conflictati sunt, quo etiam in levibus contagium aut sporadicum quid hæere intelligas. Exanthemata vero illa non statim universo corpore, sed variis locis, ut constitutio ferebat, sese ostendebant, plerumque tamen in Capite erant manifestiora, in aliquibus tamen etiam remissior rubedo attente quæri debuit. Credi derim ego collectas per hyemem in sanguine sordes aliquas ad initia veris exfluante sanguine in cutem facile exiisse, quod superficiem nullâ potius quam centro inhærescerent, & sic originem febriculæ populari & critica darent, ubi tamen etiam certæ & astralis influxus partes fuisse aliquas non de nihilo quis suspicetur. *Joan. Nicol. Pechlenus Obser. Physico-Medicar. lib. 3.*

EXOMPHALOS

Vid.

HERNIA.

EXOSTOSIS.

Vid.

OSSIFR MORBI.

Fms Libri Quinti.



BIBLIO-















